

**PENGARUH KOMBINASI POSISI SEMI FOWLER DENGAN
MUROTTAL AL-QUR'AN TERHADAP TINGKAT NYERI
PASIEN HIPERTENSI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kedokteran Dan
Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

AINUN MAGHFIRAH RAMADANI B

70300118044

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ainun Maghfirah Ramadani B
NIM : 70300118044
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar/12 Desember 1999
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
Alamat : Jln. Dato' Ri Panggentungan
Judul : Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal
Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 03 Agustus 2022

Penyusun,



Ainun Maghfirah Ramadani B
NIM. 70300118044

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi*" yang disusun oleh Ainun Maghfirah Ramadani B, NIM: 70300118044, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 02 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 02 Agustus 2022 M
04 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Andi Budiyanto Adi Putra, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dra.Hj.Soraya, M.Pd	(.....)
Pembimbing I	: Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Huriati, S.Kep.,Ns.,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, atas segala nikmat kesehatan, iman, rahmat, hidayah, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Kombinasi Posisi Semi fowler Dengan Murottal Al-Qur’an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2022”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, keluarga, dan para pengikutnya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022.

Penulis menyadari adanya keterbatasan pengetahuan dan pengalaman sampai akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, sehingga banyak pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini. Dengan hormat dan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua saya yang tercinta. Ayahanda tercinta Basir dan ibunda tercinta Emmiliya atas segala support, moril, materi, do’a dan kasih sayang yang sangat besar kepada saya, sehingga saya berada di tahap ini. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, yang selalu mengarahkan, memberikan petunjuk dan senantiasa memberikan motivasi untuk terus maju, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A.,M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Hasnah S.SIT., S.Kep., Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, memotivasi, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Nurul Khusnul Khotimah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Pembimbing I dan Huriati, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku pembimbing II yang senantiasa sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran dalam penyusunan skripsi saya dari awal, memberi masukan penulisan skripsi, senantiasa memberikan arahan yang baik dalam pencarian referensi maupun arahan penyusunan skripsi, senantiasa memberikan motivasi yang membangun, hingga peneliti bisa sampai ke tahap ini.
5. Andi Budiyanto Adi Putra, S.Kep., Ns., M.Kep selaku Penguji I dan Dra. Hj. Soraya, M.Pd selaku Penguji agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu

dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.

6. Kepada Pimpinan, Perawat dan staf Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang telah membantu penulis dari awal penyusunan skripsi, memberikan data awal penelitian yang di butuhkan penulis, membantu dalam penelitian yang dilakukan penulis, hingga akhirnya sampai pada tahap ini.
7. Kepada keluarga besar saya, tante dan om, adik-adik saya, dan saudara-saudari saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menempuh pendidikan, serta dukungan materi yang lebih dari cukup. Bahkan semangat penulis untuk terus maju akan bangkit kembali jika mengingat kalian.
8. Kepada keluarga besar Jurusan Keperawatan yang senantiasa menumbuhkan semangat dan mengajarkan pentingnya kebersamaan, sehingga saya bisa sampai ke tahap ini.
9. Kepada Novita Karim S.Tr., Keb yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan membantu saya dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada seluruh teman-teman F18ROSA yang telah bersedia bertukar pikiran dengan penulis dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang di sengaja maupun tidak di sengaja, yang lisan maupun tulisan selama saya menimba ilmu di kampus peradaban yang saya banggakan dan cintai Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tidak menutup kemungkinan dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak di sadari oleh penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun, untuk

kemajuan ilmu penelitian. Karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan,
dan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT.

Sekian dan Terimakasih.

Makassar, Juni 2022

Penulis,

Ainun Maghfirah Ramadanani B

70300118044



DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian	13
G. Manfaat Penelitian	13

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi	
1. Definisi Hipertensi	15
2. Etiologi dan Faktor Resiko Hipertensi.....	15
3. Tanda dan Gejala Hipertensi	17
4. Patofisiologi Hipertensi.....	18
5. Komplikasi Hipertensi	20
6. Penatalaksanaan Hipertensi.....	21
B. Tinjauan Nyeri Pada Hipertensi	
1. Definisi Nyeri.....	25
2. Patofisiologi Nyeri	26
3. Transmisi Nyeri.....	27
C. Tinjauan Murottal Al-Qur'an	
1. Definisi Murottal Al-Qur'an	29
2. Tujuan	32

3. Persiapan	33
4. Tahap kerja.....	32
D. Tinjauan Posisi Semi Fowler	
1. Definisi Semi Fowler	33
2. Tujuan	33
3. Persiapan	33
E. Kerangka Teori.....	36
F. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	38
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
C. Populasi Dan Sampel	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Pengolahan Dan Analisa data	42
F. Instrumen Penelitian.....	43
G. Penyajian Data	43
H. Etika Penelitian	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian	46
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan	52
D. Keterbatasan	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	6
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan	48
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Pre Test Pasien Hipertensi di RS Bhayangkara Makassar, n = 17.....	49
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Nyeri Post Test Test Pasien Hipertensi di RS Bhayangkara Makassar, n = 17	50
Tabel 4.4 Data Penurunan Tingkat Nyeri Selama 3 Hari Pemberian Intervensi	50
Tabel 4.5 Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi	51



ABSTRAK

Nama : Ainun Maghfirah Ramadani B

NIM : 70300118044

Judul : Pengaruh Kombinasi Posisi *Semi Fowler* Dengan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi

Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik yang multidimensional. Pengaruh kombinasi posisi *semi fowler* dengan murottal Al-Qur'an memiliki peran penting dalam kaitannya dengan tingkat nyeri pada pasien hipertensi, karena mampu meningkatkan perasaan rileks pada pasien sehingga mengalihkan perhatian pasien dari nyeri yang dirasakannya.

Penelitian ini bertujuan bagaimana pengaruh kombinasi posisi *semi fowler* dengan Murottal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pasien hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif *quasi eksperimen* dengan menggunakan *pre-test post-test one group* melalui pengukuran berulang selama 3 hari.

Hasil penelitian diperoleh nilai *asympt.sig (2-tailed)* sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi $<0,05$. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa posisi *semi fowler* dengan Murottal Al-Qur'an memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat nyeri pasien hipertensi. Perawat dapat memberikan intervensi posisi *semi fowler* dengan terapi murottal Al-Qur'an pada pasien hipertensi untuk menurunkan tingkat nyeri pasien.

Kata Kunci : Semi Fowler, Murottal Al-Qur'an, Hipertensi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dengan tekanan darah sistolik di atas 140 mmHg dan tekanan darah diastolik di atas 90 mmHg. Penderita hipertensi memiliki tekanan darah normatif 110/90 mmHg dan mengalami peningkatan tekanan darah yang melebihi batas normal. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung, resistensi perifer pembuluh darah, dan jumlah atau kandungan darah yang bersirkulasi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti penyakit arteri koroner, hipertrofi ventrikel kiri, dan stroke, yang menyebabkan kematian yang tinggi. (Hasnawati, 2021).

Gejala yang biasa dialami oleh pasien Hipertensi adalah nyeri kepala. Nyeri kepala merupakan gejala paling umum dari pasien hipertensi karena peningkatan tekanan intrakranial. Lokalisasi sakit kepala yang paling sering dikeluhkan adalah di bagian belakang kepala. Vertigo juga merupakan keluhan umum, yang disebabkan oleh vasokonstriksi pembuluh darah, yang mengurangi aliran darah ke jaringan otak. Sakit kepala yang tidak diobati juga mempengaruhi kualitas tidur, karena menyebabkan kualitas tidur yang buruk dan insomnia. daya konsentrasi dan penurunan kemampuan pemenuhan *activity daily living* (Novitasari & Wirakhmi, 2018).

Nyeri kepala disebabkan oleh peningkatan aliran darah ke pembuluh darah di otak. Selama proses ini, pembuluh darah menyempit, yang merupakan penyebab utama nyeri kepala, yang juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan tekanan darah tinggi. Leher mengandung arteri dan arteriol yang mempengaruhi kepala dan otak, yang merupakan pembuluh resistensi utama di pohon vaskular. Dinding arteriol mengandung sangat sedikit jaringan ikat elastis. Pembuluh darah ini memiliki otot polos yang berjalan dalam lingkaran di sekitar arteriol, sehingga ketika berkontraksi, pembuluh berkontraksi, mengurangi resistensi dan mengalir melalui pembuluh. (Isnaningtyas, 2018).

Menurut *World health Organization* (WHO 2012), Sekitar 47% populasi orang dewasa dunia mengalami sakit kepala setidaknya setahun sekali. Bahkan, sebuah studi oleh Stovner et al. (2007) Kami menemukan bahwa prevalensi sakit kepala adalah 66%. Sakit kepala dapat dibagi menjadi sakit kepala primer dan sekunder, tergantung pada penyebabnya. (Akbar, 2017).

Berdasarkan hasil studi intensif berbasis rumah sakit di lima rumah sakit di Indonesia, prevalensi pasien sakit kepala adalah: migrain tak terduga 10%, migrain pendahuluan 1,8%, sakit kepala tipe tegang sementara 31%, sakit kepala tipe tegang kronis (CTTH) 24 %, Sakit kepala kelompok 0,5%, Sakit kepala campuran 14% (Akbar, 2017).

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di RS Bhayangkara terdapat 4 dari 5 pasien yang menunjukkan gejala sakit kepala bagian belakang akan mereda jika klien berbaring dengan posisi semi fowler.

Nyeri kepala terjadi akibat peningkatan aliran pembuluh darah di otak. Proses ini menyempitkan pembuluh darah, yang merupakan penyebab utama sakit kepala, yang juga menyebabkan peningkatan tekanan darah, atau tekanan darah tinggi. (Nurul Faizah Inaningtyas, 2018).

Data di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada tahun 2019 sebanyak 838 jiwa mengalami penruunan pada tahun 2020 sebanyak 569 jiwa, untuk tahun 2021 terjadi penurunan sekitar 233 jiwa. Walaupun angka 3 tahun terakhir mengalami penurunan tetapi tetap harus ada upaya untuk memberikan intervensi.

Upaya yang telah dilakukan selama ini untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien hipertensi yaitu dengan pemberian obat. Pemberian obat yang banyak memiliki efek. Berdasarkan Studi lain dalam jurnal studi yang dilakukan oleh Sri Anggraini dan Chanif tentang efektivitas tinggi kepala pada pasien darurat hipertensi menemukan bahwa tekanan darah meningkat meskipun tekanan darah menurun pada kedua pasien, menunjukkan bahwa kondisinya membaik. Tidak penting, maka bisa juga dilihat skala nyeri yang sudah mulai berkurang (Anggraini & Chanif, 2020).

Berdasarkan penelitian lain dari jurnal penelitian yang dilakukan (Saputri & Yuda, 2019) tentang Penerapan Terapi Murottal Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Hipertensi menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi murottal terdapat penurunan nyeri pada pasien.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik mengkombinasikan 2 tindakan yaitu posisi semi fowler dengan Murottal Al-Qur'an untuk menurunkan tingkat nyeri pada pasien Hipertensi yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi diatas penulis merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaruh kombinasi posisi semi fowler dengan Murottal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pasien hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar?

C. Hipotesis

Hipotesis penelitian adalah kesimpulan penelitian yang belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian (Bungin, 2017).

Ho : apakah tidak ada pengaruh kombinasi semi fowler pada pasien Hipertensi ?

Ha : apakah ada pengaruh kombinasi semi fowler pada pasien Hipertensi ?

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variable	Definisi operasional	Alat ukur	Kriteria Objektif	Skala
Posisi semi fowler	Memposisikan pasien 30° - 60° dengan memperhatikan kenyamanan pasien.	Kuisisioner	Persiapan, proses pemberian terapi posisi semifowler.	-
Murottal Al-Qur'an	Merupakan terapi religi dimana seseorang diperdengarkan surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah selama 1x15 menit (Sehari) melalui Headset sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang.	Lembar observasi	Responden mampu mendengarkan murottal Al-Qur'an	-
Nyeri	Nyeri adalah peristiwa yang tidak menyenangkan pada seseorang dan dapat menimbulkan penderitaan/sakit.	Kuisisioner	Skor 1-10 <i>Numeric Rating Scale</i> (NRS)	Numerik (interval)

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Peneliti	Judul penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan dengan riset
1.	Dwi Ana Eka Saputri, Hendri Tamara Yuda (2019)	Penerapan Terapi Murotal Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Hipertensi	Menjelaskan perawatan untuk mengurangi intensitas nyeri dengan memberikan terapi murotal.	menggunakan metode deskriptif studi kasus.	Setelah pemberian terapi murottal pada pasien 1 selama 4 hari selama 10-15 menit, intensitas nyeri menurun dari skala awal 7 (nyeri berat terkontrol) menjadi skala 2 (nyeri ringan). 4 hari setelah 4 hari, intensitas nyeri berkurang dari 8 pada skala awal (nyeri berat terkontrol) menjadi 6 pada skala akhir (nyeri ringan)	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu hanya berfokus pada penurunan intensitas nyeri
2.	Ikit Netra Wirakhmi, Tin Utami, Iwan purnawan (2018)	<i>Comparison of listening Mozart music with murotal Al-Qur'an on the pain of hypertension patients</i>	Mengidentifikasi perbedaan efektivitas mendengarkan musik Mozart pada Murotal Al Quran dalam menjernihkan nyeri pasien hipertensi.	Penelitian ini merupakan eksperimen semu dengan desain dua kelompok, pre-test dan post-test. Pengumpulan data dilakukan dengan metode sekuensial sampling dengan jumlah responden masing-masing 15 orang. Pada kelompok Al-Quran-Murotal	terdapat perbedaan rerata nyeri sebelum dan sesudah perlakuan (p-value = 0,002). Pada kelompok Mozart, perbedaan nyeri sebelum dan sesudah perlakuan tidak signifikan (p = 0,051). Mendengarkan Murotal Al Quran lebih efektif meredakan nyeri pada penderita hipertensi dibandingkan dengan musik Mozart	Perbedaan dari penelitian ini hanya berfokus pada perbedaan antara efek dari mendengarkan music Mozart dan murottal Al-Qur'an
3.	Noor Cholifah, Sukarmin, Ahmad Andul Kholiq	<i>The effectiveness of the combination therapy of emotional freedom</i>	untuk mengidentifikasi pengaruh terapi kombinasi	Penelitian ini menggunakan penelitian	terdapat perbedaan yang bermakna sebelum (pre-test) dan setelah (post-	Perbedaan penelitian ini hanya berfokus pada perubahan tekanan darah

	(2019)	<i>technique-murottal Al-Qur'an on blood pressure of the elderly with hypertension</i>	Emotional Freedom Technique - Murottal Alqur'an terhadap tekanan darah lansia dengan hipertensi di Jatirejo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Wonogiri.	eksperimen semu dengan pre-test dan post-test non-equivalent control group.	test) Terapi kombinasi EFT -Murottal Quran pada tekanan darah golongan Intervensi ($p < 0,001$ sistol; $< 0,001$ diastol), tidak ada Dengan observasi pertama (pre-test) Observasi akhir tekanan darah pada kelompok (post-test) Ada satu kontrol (p : sistol 0,889 ; diastol 0,169) Perbedaan tekanan darah rata-rata (sistol-diastol) Perbedaan yang signifikan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol $< 0,001$ memiliki efek yang kuat pada terapi kombinasi EFT- Murottal Alqur'an untuk menurunkan tekanan darah sistolik Dan tekanan darah diastolik ($p < 0,001$; nilai $r -0,507$ sistolik u $-0,526$ Diastol).	dengan murottal Al-Qur'an
4.	Sri Anggraini, Chanif (2020)	Efektivitas pemberian posisi kepala elevasi pada pasien hipertensi emergensi	untuk melihat pengaruh pemberian elevasi kepala 30° terhadap perubahan status hemodinamik pada pasien dengan hipertensi emergensi.	Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan total sampling.	Pasien memiliki kedua kondisi Tekanan darah meningkat Terlepas dari insiden itu, itu mulai menurun Penurunan tekanan darah yang signifikan Kemudian dapat dilihat pada skala nyeri Ini juga sudah mulai menurun.	Perbedaan dengan penelitian hanya berfokus pada pemberian posisi kepala elevasi pada pasien hipertensi emergensi
5.	W Wahyuni, A	<i>Effectiveness of</i>	terapi musik klasik dan	Jenis penelitian ini	Berdasarkan penelitian	Perbedaan penelitian ini

	Sinatrya, DRRB Utami, I Indrawati (2019)	<i>classical music and Qur'an murottal Therapies on patients with hypertension in middle adulthood for work area of Sibela Surakarta Health Center</i>	murottal Al-Qur'an. Untuk mengetahui efektifitas musik klasik dan murottal Al-Qur'an pada penderita hipertensi pada usia dewasa pertengahan.	adalah quasi eksperimen design dengan metode two groups in pre and post test design.	efektivitas musik klasik dan terapi murottal Al-Qur'an pada penderita hipertensi usia dewasa tengah di wilayah kerja Puskesmas Sibela Surakarta dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan penurunan tekanan darah antara musik klasik dan kelompok murottal Al-Qur'an ditunjukkan dengan skor penurunan tekanan darah sistolik, sedangkan penurunan tekanan darah diastolik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Terapi murottal Alquran lebih efektif menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Sibela Surakarta dibandingkan terapi musik klasik.	yaitu hanya berfokus pada bagaimana efektifitas penggunaan terapi music klasik dan murottal Al-Qur'an pada pasien hipertensi
6.	Arif Hendra Kusuma, Atika Dhiah Anggraeni (2019)	Pengaruh posisi head-up 30 derajat terhadap nyeri kepala pada pasien cedera kepala ringan	Untuk mengetahui pengaruh posisi head up 30 derajat terhadap nyeri kepala pada pasien cedera kepala ringan.	Desain penelitian menggunakan Quasi Experimental dengan pendekatan Pretest Posttest One Group Design.	Ada perbedaan yang signifikan dalam nilai rata-rata Skala sakit kepala antara anterior dan anterior Setelah mengatur posisi kepala ke 30 derajat Pasien cedera kepala ringan akibat RSUD Dr. Margono Soecargio	Perbedaan penelitian ini yaitu hanya berfokus pada pengaruh posisi kepala untuk menurunkan skala nyeri pada pasien cedera kepala ringan

					Purwokerto Nilai P adalah 0,002 ($\alpha < 0,05$).	
7.	Heni, Annisa Nur Syifaa (2021)	Pengaruh terap murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi	untuk mengetahui pengaruh terapi murottal Al- Qur'an surah Ar-Rahman terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Maja Tahun 2020.	Jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan quasi experiment melalui pendekatan one group pretest-posttest design.	Dari hasil survei dan analisis pada bab sebelumnya Kesimpulannya adalah sebagai berikut: 1) Tekanan arteri rata-rata pada pasien hipertensi Memperkenalkan ruang kerja UPTD Puskesmas Maja Badan Mata Uang Majaren Tahun 2020 Diterima 152.00 setelah mendengar tiruan dari terapi Murottal Coranthra Setelah itu, sistol adalah mmHg dan diastol adalah 100,00 mmHg. Rata-rata, mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an Surah Ah Rahman 140,67 mmHg untuk sistol dan 88,00 mmHg untuk diastol. 2) Ada Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman Terhadap Dekompresi Darah penderita hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Maya Tahun 2020 Perbedaan rata-rata antara tekanan darah sistolik dan diastolik adalah 11,33 mmHg,	Perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya berfokus untuk mengetahui pengaruh murottal Al-Qur'an surah Ar-Rahman terhadap penurunan tekanan darah penderita hipertensi

					12 mmHg dan sistol = 0,000 dan diastol = 0,001	
8.	Asmaa M. Abd El-Moaty, Naglaa M. EL-Mokadem (Ph.D, RN), Asmaa H. Abd-Elhy (2017)	<i>Effect of Semi Fowler's Positions on Oxygenation and Hemodynamic Status among Critically III Patients with Traumatic Brain Injury</i>	untuk menguji pengaruh posisi semi-fowler terhadap oksigenasi dan status hemodinamik pada pasien kritis dengan Traumatic Brain Injury.	Desain kuasi-eksperimental (pengukuran berulang).	terjadi peningkatan MAP yang signifikan secara statistik dari $93,02 \pm 1,69$ menjadi $96,50 \pm 1,33$, $p < 0,05$ setelah 30 menit memposisikan pasien pada Elevasi HOB 45° sedangkan tidak ada perbedaan bermakna pada RR, TD sistolik/diastolik, CVP, Parsial Tekanan Oksigen Arteri, Tekanan Parsial Karbon Dioksida ($P > 0,05$). Sedangkan setelah 30 menit Ketinggian HOB 30° terjadi penurunan HR, SBP, Tekanan Parsial Oksigen Arteri, Tekanan Parsial Karbon Dioksida, RR yang sangat signifikan secara statistik ($87,94 \pm 1,34$; $122,5 \pm 1,7$, 27; $36 \pm 2,19$; $18,54 \pm 1,58$) ($P < 0,001$).	perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini melihat pengaruh posisi semi fowler pada pasien kritis
9.	Marie-Eve Leblanc, Audrey Auclair, Jacinthe Leclerc, Jean Bussieres, Mohsen Agharazli, Frederic-Simon Hould, Simon Marceau, Patrice	<i>Blood Pressure Measurment in Severely Obese Patients : Validation of the Forearm Approach in Different Arm Positions</i>	untuk menilai kesesuaian antara nilai tekanan darah intraarteri (standar emas) dibandingkan dengan pengukuran tekanan darah lengan bawah pada pasien obesitas berat pada posisi lengan yang	Tiga puluh tiga pasien yang sangat gemuk dan 21 kontrol berpartisipasi dalam penelitian ini. Pasangan tekanan darah intra-arteri dibandingkan dengan pengukuran tekanan darah lengan bawah	Secara keseluruhan, korelasi pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik antara standar emas dan tekanan darah lengan bawah adalah 0,95 (sebuah =722; $P < 0,001$) dan 0,89 (sebuah =482; $P < 0,001$), masing-masing. Tekanan darah sistolik yang diukur menggunakan	perbedaan penelitian ini hanya berfokus pada nilai pengukuran tekanan darah lengan bawah pada pasien obesitas

	Brassard, Christian Godbout, Audrey Grenier, Lyne Cloutier, and Paul Poirier (2019)		berbeda.	secara simultan menggunakan perangkat osilometrik dalam 4 posisi: (i) terlentang, (ii) semifowler dengan lengan bawah sejajar dengan jantung, (iii) semi-fowler dengan lengan ke bawah, dan (iv) semifowler dengan lengan terangkat ke atas. Tingkat kesepakatan antara pengukuran dinilai.	pendekatan lengan bawah pada posisi terlentang dan semifowler dengan lengan ke bawah menunjukkan kesepakatan terbaik bila dibandingkan dengan standar emas (-4 ± 11 ($P < 0,001$) dan 2 ± 14 mm Hg ($P = 0,19$), masing-masing). $P < 0,001$) dan 2 ± 14 mm Hg ($P = 0,19$), masing-masing). Pada kelompok kontrol, kesepakatan yang lebih baik ditemukan antara posisi terlentang dan semifowler dengan lengan beristirahat setinggi jantung.	
10.	Nurten Alan RN, PhD, Lecturer, Leyla Khorshid RN, PhD, Professor (2019)	<i>The Effects of different positions on saturation and vital signs in patients</i>	Untuk menyelidiki efek dari lima posisi berbeda pada saturasi oksigen perifer (SpO ₂) dan tanda-tanda vital pada pasien dengan penyakit paru-paru. Desain: Sebuah studi semi-eksperimental dilakukan.	Sampel berturut-turut dicatat dari pasien perawatan kritis yang diikuti di klinik dada rumah sakit universitas.	Untuk pasien dengan penyakit paru kanan, kiri, dan bilateral, berbaring di sisi kanan tubuh pada 45 di tempat tidur, SpO ₂ lebih tinggi, tetapi perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Ada perbedaan yang signifikan pada 40 menit antara denyut nadi pada pasien dengan penyakit paru kiri dan bilateral, tetapi tidak pada pasien dengan penyakit paru kanan. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara tingkat pernapasan dan suhu tubuh pada pasien di salah satu dari tiga kelompok	perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada efek dari posisi yang berbeda pada saturasi dan tanda-tanda vital pasien

					pada 10, 25, dan 40 menit.	
--	--	--	--	--	----------------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

F. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler dengan Murottal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

2. Tujuan khusus

- a. Diketahuinya tingkat nyeri sebelum diberikan kombinasi posisi Semi Fowler pada pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
- b. Diketahuinya tingkat nyeri setelah diberikan kombinasi posisi Semi Fowler pada pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.
- c. Diketahuinya pengaruh kombinasi posisi Semi Fowler dengan Murottal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pada pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi pendidikan

Penelitian ini memberikan informasi bagi sekolah dan perguruan tinggi kesehatan tentang dampak kombinasi posisi Semifowler dan Murotal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pada pasien hipertensi di RS Bhayangkara Makasar, dan perkembangan pengetahuan khususnya kombinasi efek Semifowler dan Murotal Al-Quran tentang tingkat nyeri pada pasien hipertensi di RS Bhayangkara Makassar.

2. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti terkhusus pengaruh kombinasi posisi Semi Fowler dan Murotal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sehingga dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya

3. Bagi pelayanan

Penelitian ini berpotensi memberikan informasi dan referensi bagi perawat, konsultan, pemerintah dan masyarakat. Perawat memiliki kesejahteraan psikologis untuk mendukung kinerja perawat yang lebih baik dalam memberikan pelayanan medis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hipertensi

1. Definisi

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yang tidak normal yang dapat menjadi penyebab utama penyakit kardiovaskular. Prevalensi hipertensi di Indonesia masih cukup tinggi, sehingga pemerintah mencanangkan program skrining penyakit tidak menular (PTM), Posbindu, untuk mengendalikan faktor risiko yang ada. (Ansar et al., 2019).

Hipertensi merupakan suatu keadaan ketika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis. Hal tersebut dapat terjadi karena jantung bekerja keras memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi tubuh (Roesmono, 2017).

2. Etiologi dan faktor resiko hipertensi

Menurut Sylvestris, 2014 Risiko relatif tekanan darah tinggi tergantung pada jumlah dan tingkat keparahan. faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dikoreksi. Faktor yang tidak dapat diubah antara lain faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan etnis. Faktor variabel termasuk stres, obesitas, dan diet.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi yaitu :

a. Faktor Genetik

Adanya faktor genetik pada keluarga tertentu berisiko bagi keluarga tersebut untuk mengalami tekanan darah tinggi. Orang yang orang tuanya memiliki riwayat tekanan darah tinggi dua kali lebih mungkin terkena tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tidak memiliki anggota keluarga dengan riwayat tekanan darah tinggi. (Sylvestris, 2014)

b. Umur

Penuaan menghasilkan beberapa perubahan fisiologis. Pada orang tua, peningkatan resistensi perifer dan aktivitas saraf simpatis. Ginjal menahan garam dan air dalam tubuh karena pengaturan tekanan darah, refleksi baroreseptor pada orang tua, menjadi kurang sensitif dan peran ginjal menurun seiring dengan penurunan aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus. (Sylvestris, 2014).

c. Jenis Kelamin

Pria Ada peningkatan risiko mengembangkan tekanan darah tinggi pada usia muda. Laki-laki juga berisiko tinggi mengalami morbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Tekanan darah tinggi sering terjadi pada wanita di atas usia 50 (Sylvestris, 2014).

d. Ras

Hipertensi lebih sering terjadi pada orang kulit hitam daripada orang kulit putih. Sejauh ini, penyebab pastinya belum diketahui (Sylvestris, 2014).

e. Obesitas

Perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara obesitas dan tekanan darah: munculnya resistensi insulin dan hiperinsulinemia, aktivasi sistem saraf simpatik dan sistem renin-angiotensin, dan perubahan fisik pada ginjal. Peningkatan pengeluaran energi juga meningkatkan insulin plasma. Ini adalah diuretik natrium potensial yang menyebabkan reabsorpsi natrium dan peningkatan tekanan darah terus menerus (Sylvestris, 2014).

f. Nutrisi

Garam merupakan faktor yang sangat penting dalam penyebab hipertensi. Hipertensi jarang terlihat pada kelompok etnis dengan asupan garam minimal (Sylvestris, 2014).

g. Kebiasaan Merokok

Perokok berat dapat dikaitkan dengan peningkatan insiden hipertensi maligna dan risiko berkembangnya aterosklerosis dan stenosis arteri ginjal (Sylvestris, 2014).

3. Tanda dan Gejala Hipertensi

Peningkatan tekanan darah mungkin satu-satunya gejala. Hipertensi primer bersifat asimtomatik dan baru muncul setelah

terjadi komplikasi pada organ target seperti ginjal, mata, otak, dan jantung. Gejala tekanan darah tinggi bervariasi dari orang ke orang dan mirip dengan penyakit lain. Adapun menurut Sustrani dan Alam (2004) dalam (Hastuti, 2022) gejala hipertensi tersebut antara lain :

1. Sakit kepala
2. Palpitasi
3. Dispnea setelah bekerja keras atau mengangkat beban berat
4. Mudah lelah
5. Penglihatan kabur
6. Muka merah
7. Hidung berdarah
8. Sering buang air kecil, terutama pada malam hari
9. Tinnitus (Telinga berdenging)
10. Dunia terasa berputar (vertigo)

Sedangkan menurut Manjoer (2000) dalam (Hastuti, 2022) gejala-gejala hipertensi meliputi :

1. Rasa berat ditengkuk
2. Gangguan tidur
3. Mudah marah
4. Mata berkunang-kunang dan pusing (Hastuti, 2022).

4. Patofisiologi Hipertensi

Patofisiologi hipertensi didasarkan pada pembentukan angiotensin II dari angiotensin I oleh angiotensin I-converting enzyme (ACE).

ACE memainkan peran fisiologis penting dalam pengaturan tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen, yang diproduksi oleh hati. Selain itu, hormon renin diubah menjadi angiotensin I. ACE paru mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Renin disintesis dan disimpan dalam sel juxtaglomerular (JG) ginjal dalam bentuk inert yang disebut prorenin. Sel JG adalah sel otot polos yang dimodifikasi di dinding arteriol aferen, tepat di proksimal glomerulus (Sylvestris, 2014).

Ketika tekanan arteri turun, reaksi endokrin ginjal itu sendiri memecah banyak molekul protein dalam sel JG dan melepaskan renin. Angiotensin II adalah vasokonstriktor yang sangat kuat dan memiliki efek lain yang juga mempengaruhi sistem peredaran darah. Selama angiotensin II dalam darah, ada dua efek utama yang dapat meningkatkan tekanan arteri. (Sylvestris, 2014).

Efek pertama, vasokonstriksi terjadi segera. Vasokonstriksi terjadi terutama di arteriol dan sedikit lebih lemah di vena. Cara kedua angiotensin II meningkatkan tekanan arteri adalah bekerja pada ginjal untuk mengurangi ekskresi garam dan air. Vasopresin, juga dikenal sebagai hormon antidiuretik (ADH), mungkin bahkan lebih kuat sebagai vasokonstriktor daripada angiotensin, vasokonstriktor tubuh yang paling kuat. (Sylvestris, 2014).

Zat ini, yang dibentuk di hipotalamus, diangkut melalui pusat akson saraf ke kelenjar hipofisis posterior, di mana ia

akhirnya diekskresikan dalam darah. Aldosteron, disekresikan oleh sel-sel zona glomerulosa korteks adrenal, merupakan pengatur penting reabsorpsi natrium (Na^+) dan sekresi kalium (K^+) oleh tubulus ginjal. Tempat kerja utama aldosteron adalah di sel utama dari tabung pengumpul kortikal. Mekanisme aldosteron meningkatkan reabsorpsi natrium dan pada saat yang sama meningkatkan sekresi kalium adalah dengan merangsang pompa natrium-kalium ATPase pada membran duktus kortikal basolateral. (Sylvestris, 2014).

Aldosteron juga meningkatkan permeabilitas natrium pada sisi luminal membran. Sampai saat ini, pengetahuan tentang etiologi hipertensi primer terus berkembang, karena belum ada jawaban yang memuaskan untuk menjelaskan terjadinya hipertensi. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi perifer (Sylvestris, 2014).

5. Komplikasi hipertensi

Komplikasi karena hipertensi dapat mempengaruhi berbagai organ penting dalam tubuh, antara lain :

- a. penyakit jantung dan pembuluh darah
- b. hipertensi serebrovaskular
- c. Ensefalopati hipertensi dan retinopati hipertensi (Sylvestris, 2014).

Penyakit jantung dan pembuluh darah Hipertensi adalah penyebab paling umum dari hipertrofi ventrikel kiri. Dua bentuk utama penyakit jantung yang terjadi pada pasien hipertensi adalah penyakit jantung koroner dan penyakit jantung hipertensi.(Sylvestris, 2014).

Penyakit hipertensi serebrovaskular Hipertensi merupakan faktor risiko terpenting untuk stroke hemoragik atau emboli arteri. Pendarahan kecil atau penyumbatan pembuluh darah kecil dapat menyebabkan infark di area kecil(Sylvestris, 2014).

6. Penatalaksanaan Hipertensi

- a. Terapi nonfarmakologi
- b. Terapi nonfarmakologi berupa perubahan gaya hidup dapat menurunkan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup dan perubahan pola makan dapat menurunkan tekanan darah. Membatasi asupan garam, olahraga teratur, berhenti merokok, penurunan berat badan, dan membatasi asupan alkohol adalah beberapa perilaku yang direkomendasikan oleh banyak pedoman. (Pikir, 2015).
- c. Membatani asupan garam

Mengurangi asupan garam kurang dari 1700 mg (75 mmol) per hari dapat menurunkan tekanan darah sebesar 4-5 mmHg pada subjek hipertensi dan 2 mmHg pada subjek sehat (Pikir, 2015).

d. Modifikasi diet/nutrisi

Subjek dengan tekanan darah sistolik kurang dari 160 mmHg dan tekanan darah diastolik tekanan studi DASH dari 459 orang 80-90 mmHg. Dibagi menjadi tiga kelompok untuk mengontrol pola makan (lemak, karbohidrat, protein, kolesterol, serat, kalium, magnesium dan kalsium). Ini juga tinggi buah dan sayuran, rendah kolesterol dan produk lemak, dan rendah sodium. Pada akhir penelitian didapatkan hasil bahwa kelompok ketiga mengalami penurunan tekanan darah sistolik sebesar 11,4 mmHg dan tekanan darah diastolik sebesar 5,5 mmHg (Pikir, 2015).

e. Penurunan berat badan

Kegemukan dan obesitas menjadi permasalahan utama di amerika. Sekitar 67% penduduk laki-laki dewasa mengalami kegemukan dan obesitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa laki-laki atau wanita dengan body mass index (BMI) $\geq 30 \text{ kg/ m}^2$ akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 38,4% dan 32,2%. Sedangkan pada BMI $<25 \text{ kg/ m}^2$ akan memiliki resiko terjadinya hipertensi 18,2% dan 16,5%. Penurunan berat badan sebesar 10 pon akan dapat mengurangi tekanan darah (Pikir, 2015).

f. Olahraga rutin

Pada tahun 2004, American College of Sports Medicine (ACSM) mengeluarkan pernyataan bahwa aktivitas fisik secara teratur dapat mencegah dan menurunkan tekanan darah tinggi. Penurunan tekanan darah disebabkan oleh penurunan resistensi perifer sistemik yang berhubungan dengan peningkatan diameter pembuluh darah. Ini karena adaptasi yang lama terhadap aktivitas fisik yang mengarah pada vasodilatasi (Pikir, 2015).

g. Berhenti merokok

Merokok merupakan faktor risiko yang kuat untuk penyakit kardiovaskular. Merokok menyebabkan peningkatan tekanan darah dan detak jantung setelah menghirup rokok selama 15 menit. Perokok memiliki kemungkinan 2 sampai 6 kali lebih besar terkena penyakit arteri koroner dan 3 kali lebih mungkin terkena stroke dibandingkan bukan perokok. Berhenti merokok mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular seperti penyakit arteri koroner dan stroke. Pada pasien dengan arteri koroner, berhenti merokok dikaitkan dengan penurunan 36 persen kematian. Meskipun merokok diketahui dapat meningkatkan resiko pada perkembangan hipertensi tetapi tidak ada penelitian yang menunjukkan berhenti merokok dapat

menurunkan tekanan darah secara langsung pada pasien hipertensi (Pikir, 2015).

h. Terapi farmakologi

Ada kesepakatan umum tentang prinsip yang mengatur penggunaan obat anti hipertensi untuk menurunkan tekanan darah, tergantung pada pilihan obat tertentu. Prinsip-prinsip itu antara lain :

- a. Gunakan obat dosis rendah pada awal pengobatan untuk mengurangi efek samping. Jika respon hipotensi tidak tercapai, dosis dapat ditingkatkan dengan obat yang sama asalkan dapat ditoleransi dengan baik.
- b. Gunakan kombinasi obat yang tepat untuk memaksimalkan keberhasilan Anda dalam menurunkan tekanan darah sambil meminimalkan efek samping. Alih-alih meningkatkan dosis obat asli, Anda dapat menambahkan sedikit obat kedua. Dengan demikian, obat pertama dan kedua digunakan dengan dosis rendah untuk mengurangi efek samping.
- c. Jika obat pertama tidak responsif sebelum meningkatkan dosis obat pertama atau menambahkan obat kedua, beralih ke obat lain (Pikir, 2015).

B. Tinjauan Nyeri Pada Hipertensi

1. Definisi nyeri

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari kerusakan jaringan aktual atau potensial atau digambarkan dalam istilah kerusakan. Nyeri adalah pengalaman sensorik multidimensi. Fenomena tersebut adalah intensitas (ringan, sedang, berat), kualitas (kusam, terbakar, tajam), durasi (sementara, terputus-putus, persisten), dan menyebar (dangkal atau dalam, lokal atau menyebar).) Berbeda. Nyeri adalah sensasi, tetapi memiliki elemen kognitif dan emosional yang digambarkan sebagai penderitaan. Nyeri juga dikaitkan dengan perubahan refleks penghindaran dan kinerja otonom (Bahrudin, 2017).

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari kerusakan jaringan aktual atau potensial. Nyeri terjadi sebagai bentuk respon sensorik setelah menerima stimulus nyeri. Nyeri dapat disebabkan oleh kerusakan jaringan tubuh akibat prosedur medis seperti cedera, kecelakaan, atau pembedahan. Nyeri merupakan masalah kesehatan utama di dunia, dengan 1 dari 5 orang dewasa dan 1 dari 10 orang dewasa menderita nyeri. di diagnosa dengan nyeri di diagnosa dengan nyeri kronis tiap tahunnya (Kurniyawan, 2016).

Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang dihasilkan dari kerusakan jaringan yang

sebenarnya, Kemungkinan (Mohammad, 2012, Lestari, 2014). Arthur C. Curton, (1983) dalam A. Azis, (2009) mengemukakan bahwa nyeri adalah mekanisme pembangkitan tubuh yang terjadi ketika jaringan rusak dan mendorong individu untuk merespon rangsangan nyeri.

Menurut Smeltzer & Bare (2002), International Association for the Study of Pain (IASP) menggambarkan nyeri sebagai sensori subjektif dan emosi yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial atau sensorik pada saat terjadi cedera. . (Aisyah, 2017).

2. Patofisiologi nyeri

Rangsangan nyeri yang diterima nosiseptor di kulit dapat berupa intensitas tinggi atau rendah, seperti: B. Tergantung pada ketegangan dan suhu, dan lesi jaringan. Sel nekrotik melepaskan K^+ dan protein intraseluler. Peningkatan kadar K^+ ekstraseluler menyebabkan depolarisasi nosiseptor, tetapi dalam keadaan tertentu, protein menginfiltrasi mikroorganisme dan menyebabkan inflamasi. Akibatnya, mediator nyeri seperti leukotrien, prostaglandin E₂, dan histamin dilepaskan, merangsang nosiseptor, dan rangsangan berbahaya dan tidak berbahaya dapat menyebabkan nyeri (hiperalgesia atau allodynia) (Bahrudin, 2017).

Selain itu, lesi juga mengaktifkan faktor pembekuan darah, yang merangsang bradikinin dan serotonin, yang merangsang nosiseptor. Ketika oklusi vaskular terjadi, iskemia terjadi, akumulasi

K⁺ dan H⁺ ekstraseluler, dan nosiseptor diaktifkan. Histamin, bradikinin, dan prostaglandin E₂ memiliki efek vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah (Bahrudin, 2017).

Ini menyebabkan edema lokal, peningkatan tekanan jaringan, dan rangsangan nosiseptif. Ketika nosiseptor dirangsang, zat peptida P (SP) dan gen ikatan peptida calcitonin (CGRP) dilepaskan, merangsang proses inflamasi, menyebabkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas vaskular. Vasokonstriksi (akibat serotonin) diikuti oleh vasodilatasi juga dapat menyebabkan serangan migrain. Stimulasi nosiseptor ini menyebabkan nyeri. (Bahrudin, 2017).

3. Transmisi nyeri

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana nosiseptor dapat menghasilkan rangsangan nyeri. Sejauh ini, ada berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana rasa sakit terjadi, namun teori gerbang kendali rasa sakit dianggap paling tepat. (Bahrudin, 2017).

a. Teori Spesivitas (Specivity Theory)

Teori ini dijelaskan oleh Descartes pada abad ke-17. Teori ini adalah organ dalam tubuh yang menyampaikan rasa sakit dengan cara yang ditargetkan. Saraf ini menerima rangsangan rasa sakit dan mengirimkannya ke ujung punggung dan talamus, yang diperkirakan pada akhirnya mencapai tingkat yang lebih tinggi dan

memicu respons rasa sakit. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana faktor multidimensi dapat mempengaruhi nyeri (Hartwig & Wilson, 2005).

Menurut teori ini rangsangan sakit masuk ke medula spinalis melalui kommissura dorsalis yang bersinaps di daerah posterior. Kemudian naik ke tractus lissur dan menyilang di garis median ke sisi lainnya dan berakhir di korteks sensoris tempat rangsangan tersebut. Teori spesifitas dan pola menjelaskan impuls saraf berbagai intensitas diakhiri dipusat nyeri di otak depan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai dasar neurofisiologis nyeri (Tasnim et al., 2020).

b. Teori Pola (Pattern Theory)

Teori ini menjelaskan bahwa ada dua serabut nyeri, yang satu dapat memberikan rangsangan dengan cepat dan yang lainnya dapat memberikan rangsangan secara perlahan. Kedua serabut saraf ini membentuk sinapsis di sumsum tulang belakang dan menyampaikan informasi ke otak tentang intensitas dan jenis input sensorik nyeri yang menafsirkan sifat dan kualitas input sensorik nyeri (Hartwig & Wilson, 2005).

Rangsangan nyeri masuk melalui akar ganglion dorsal ke medula spinalis dan mengaktifkan aktivitas sel T. Hal ini mengakibatkan suatu respons yang menimbulkan ke bagian yang lebih tinggi yaitu korteks serebri serta kontraksi menimbulkan

persepsi dan berkontraksi sehingga menimbulkan nyeri. Persepsi dipengaruhi oleh modalitas respons dari reaksi sel T (Tasnim et al., 2020).

c. Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory)

Pada tahun 1959, Milzic dan Wall menjelaskan teori gerbang manajemen nyeri. Hal ini menunjukkan bahwa ada jenis gerbang yang dapat memfasilitasi transmisi sinyal rasa sakit. (Hartwig & Wilson, 2005). Teori kontrol gerbang adalah model umum dari modulasi nyeri. Teori ini mengklaim adanya kemampuan intrinsik untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat sensasi nyeri dengan menyesuaikan impuls yang masuk ke kornu dorsalis melalui “gerbang”. Masukan diberi bobot berdasarkan sinyal dari sistem naik dan turun. Integrasi semua input dari neuron sensorik, i. H. Menentukan apakah gerbang tertutup atau terbuka pada tingkat sumsum tulang belakang yang sesuai meningkatkan atau menurunkan intensitas nyeri yang terjadi. Teori kontrol gerbang menjelaskan variabel psikologis dalam persepsi nyeri, seperti motivasi untuk tidak nyeri dan peran pikiran, emosi, dan respons stres dalam meningkatkan atau menurunkan sensasi nyeri. Melalui model ini dapat dipahami bahwa nyeri dapat dikendalikan dengan manipulasi farmakologis dan intervensi psikologis (Bahrudin, 2017).

Menurut teori ini, nyeri dari kerja serta saraf besar dan kecil. Keduanya berada dalam akar ganglion dorsalis. Rangsangan pada serat besar akan meningkatkan aktivitas substansia gelatinosa yang mengakibatkan tertutupnya mekanisme sehingga aktivitas sel terhambat dan menyebabkan terhambatnya rangsangan. Rangsangan serat besar dapat langsung memicu ke korteks serebri. Hasil persepsi ini akan dikembalikan ke dalam medula spinalis melalui eferen dan reaksinya memengaruhi aktivitas sel T. Rangsangan pada serat kecil akan mengaktifkan aktivitas substansia gelatinosa dan membuka mekanisme pintu, sehingga memicu aktivitas sel T yang selanjutnya akan menghantarkan rangsangan nyeri (Tasnim et al., 2020).

d. Teori Transmisi dan Inhibisi

Adanya Stimulus pada nosiseptor untuk memulai transmisi impuls-impuls saraf, sehingga transmisi impuls nyeri menjadi efektif oleh neurotransmitter yang spesifik. Kemudian, penghambatan impuls nyeri menjadi efektif oleh impuls-impuls pada serabut-serabut yang memblok impuls-impuls pada serabut lamban dan endorfin opiate system supraspinal (Tasnim et al., 2020).

e. Teori nyeri neuromatriks

Penelitian yang berkelanjutan menunjukkan bahwa kontrol dan modulasi nyeri jauh lebih kompleks dibandingkan penjelasan mengenai teori kontrol gerbang, yang berperan sebagai dasar untuk

riset lebih lanjut tentang informasi sistem Taktil pemodulasi nyeri yang saat ini diketahui ditransmisikan melalui serat berdiameter besar dan kecil, dan interaksi diantara neuron sensori yang diketahui terjadi pada berbagai tingkat sistem saraf pusat. Melzack mengembangkan teori nyeri neuromatriks secara berurutan untuk mengintegrasikan faktor budaya dan genetik dengan fungsi neurofisiologis dasar. Teori ini sesuai, tetapi lebih kompleks dibanding teori kontrol gerbang.

Berdasarkan teori neuromatriks, otak berisi neuromatriks dari tubuh, yang mendistribusikan jaringan neuron secara luas yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan pengalaman sensori. Neuromatriks mengintegrasikan berbagai sumber input selain stimulus nyeri dan sentuhan. Pengalaman nyeri bagi individu dipengaruhi oleh input dari system sensori lain yang membantu menginterpretasikan stimulus (misal melihat luka); faktor-faktor seperti perhatian, harapan, kepribadian, dan budaya; system modulasi nyeri utama; dan komponen system regulasi stress (Porth & Matfin, 2010 dalam Bunner & Suddarth, 2014). Mekanisme ini diyakini ada pada level medulla spinalis yang terdiri dari beberapa bagian, komponen medulla spinalis pada teori gerbang control. Transmisi nyeri oleh serat berdiameter kecil dihambat ketika serat berdiameter besar membawa impuls sentuhan yang mendominasi,

menutup gerbang dalam kornu dorsalis pada medua spinalis (Tasnim et al., 2020).

C. Tinjauan Murottal Al-Qur'an

1. Definisi Murottal Al-Qur'an

Murottal al-qur'an merupakan terapi religi dimana seseorang dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayat al-qur'an selama beberapa menit atau beberapa jam sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang. Salah satu tujuan al-qur'an diturunkan Allah SWT ke bumi yaitu sebagai obat dari berbagai penyakit, dan firman Allah SWT dalam salah satu surah al-qur'an :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“Dan kami turunkan dari al-qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian” (QS Al-Isra/82) (Kemenag RI, 2020).

Makna dari ayat di atas yaitu bagaimana Tidak bertambah kuat dan yang batil tidak hilang, tetapi Kami telah mengirimkan Al-Qur'an sebagai penawar bagi kecurigaan dada dan penyakit, dan Al-Qur'an juga rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan itu adalah Al-Qur'an. an.” Tidak ada tambahan bagi orang yang zalim, kecuali hilangnya iman.

Suara manusia dapat disebut sebagai instrument. Irama suara manusia yang yang indah dapat mengaktifkan hormone endorphin dalam tubuh secara alami, sehingga dapat membuat

tubuh menjadi rileks, menurunkan rasa cemas, menstabilkan irama pernafasan, nadi, jantung serta gelombang otak. Saat seseorang diperdengarkan suara lantunan ayat-ayat Al-Qur'an maka seketika itu pula akan terjadi perubahan arus listrik di otot, sirkulasi darah, kadar darah dan detak jantung (Taslim & Cahyani, 2021).

Adanya perubahan yang dirasakan maka akan mengalami keadaan rileksasi pada syaraf sehingga terjadinya vasodilatasi (pelebaran pembuluh darah) pada urat nadi dan peningkatan kadar konsentrasi oksigen dalam darah, dengan di ikuti oleh perlambatan irama detak jantung. Ketika seseorang mendengarkan terapi murottal Al-Qur'an maka otak manusia akan bereaksi sehingga memproduksi zat kimia yaitu neuropeptide. Neuropeptide tersebut akan diangkut melalui berbagai reseptor keseluruh tubuh sehingga tubuh pun akan mengalami positive feedback yaitu yang disebut keadaan relaksasi (Taslim & Cahyani, 2021).

Efek terapi murottal Al-Qur'an efektif untuk menurunkan tingkat nyeri, menurunkan tingkat insomnia, menurunkan tingkat kecemasan, menurunkan kadar gula darah, meningkatkan kualitas tidur, menurunkan tekanan darah. Dalam Al-Qur'an Allah telah menerangkan fungsi dari mendengarkan lantunan ayat Al-Qur'an, yang dimana ayat tersebut berbunyi :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“Orang-orang beriman itu, hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, bahwa mengingat Allah itu dapat menentramkan jiwa” (QS Al-Ra’d/28) (Kemenag RI, 2020).

Makna dari ayat di atas yaitu Orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya itulah yang mendapat petunjuk, dan hati mereka menjadi tenang dan tenteram dengan mengingat Allah dengan baik. hati menjadi tentram.

وَأَنْتُمْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ فَلَا تُبَدِّلْ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

Terjemahnya :

“Dan bacakanlah (Muhammad) apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu Kitab Tuhanmu (A-Qur’an). Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepada-Nya” (QS Al-Kahfi/27) (Kemenag RI, 2020).

Lama waktu melakukan terapi murottal Al-Qur’an berdasarkan intervensi dari penelitian yang telah lalu sangat bervariasi, ada yang mengatakan selama 15 menit, 30 menit, 45 menit, 90 menit, 120 menit, 3 jam, dan 5 jam. Dengan adanya pilihan durasi yang bervariasi, jadi dapat menyesuaikan dengan waktu yang anda inginkan (Taslim & Cahyani, 2021).

2. Tujuan

Pasien mampu menikmati Murottal yang didengarkan

3. Persiapan

a. Persiapan pasien

- 1) Mengidentifikasi pasien yang dirawat
- 2) Mengkaji keadaan umum pasien

- 3) Menjelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan
- b. Persiapan alat
 - 1) Speaker MP3
 - 2) Headphone
4. Tahap kerja
 - a. Mengucapkan salam terapeutik
 - b. Menanyakan perasaan pasien saat ini
 - c. Menjelaskan tujuan kegiatan
 - d. Beri kesempatan pasien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan
 - e. Pertahankan privasi selama tindakan dilakukan
 - f. Bawa peralatan ke dekat pasien
 - g. Berikan posisi nyaman kepada pasien
 - h. Gunakan headphone agar tidak mengganggu pasien lain dan membantu pasien berkonsentrasi pada murottal
 - i. Anjurkan pasien untuk napas dalam
 - j. Anjurkan pasien untuk menutup mata dan menikmati murottal
 - k. Murottal diperdengarkan selama 15-20 menit
 - l. Evaluasi respon pasien
 - m. Berikan reinforcement positif
 - n. Mengakhiri kegiatan dengan cara yang baik
 - o. Catat kegiatan yang telah dilakukan

D. Tinjauan Posisi Semifowler

1. Defenisi Semifowler

Posisi fowler merupakan posisi tempat tidur dengan menaikkan kepala dan dada setinggi 30° - 60° tanpa fleksi lutut.

2. Tujuan

- a. Membantu mengatasi masalah kesulitan pernafasan dan kardiovaskular
- b. Melakukan aktivitas tertentu (makan, membaca, menonton TV)

3. Persiapan :

1) Pasien :


- a) Memberi penjelasan terhadap apa yang akan dilakukan pada klien

2) Alat :

- a) Tempat tidur
- b) Bantal kecil
- c) Gulungan handuk
- d) Footboard (bantalan kaki)
- e) Sarung tangan (jika diperlukan)

3) Prosedur kerja :


- a) Cuci tangan dan gunakan sarung tangan (bila digunakan)
- b) Baringkan klien terlentang ditangan kepalanya dekat papan
- c) Kepala ditinggikan tempat tidur 30°




- d) Letakkan kepala klien diatas kasur atau bantal yang sangat kecil.
- e) Gunakan bantal untuk menyanggah tangan dan lengan klien bila klien tidak mempunyai kontrol volunter atau menggunakan lengan dan tangan.
- f) Letakkan bantal pada punggung bawah klien
- g) Tempatkan bantal kecil atau gulungan handuk dibawah paha klien
- h) Bila ekstermitas bawah pasien mengalami paralisa atau ia tidak mampu untuk mengontrol ekstermitas bawah, gunakan

gulungan trokanter selain tambahan bantal di bawah punggungnya


- i) Tempatkan bantal kecil atau gulungan handuk di bawah pergelangan kaki.
- j) Tempatkan papan kaki pada dasar kaki pasien
- k) Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan
- l) Catat pada catatan perawat klien tentang posisi baru klien.



E. Kerangka Teori



F. Kerangka Konsep



Keterangan :

 : Variabel bebas yang diteliti (Variabel Independen)

 : Variabel terikat (Variabel Dependen)

 : Penghubung variabel yang diteliti

 : Tidak diteliti

 : Tidak diteliti

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif quasi eksperimen dengan *pre-test post-test one group*. Desain eksperimen digunakan karena data yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variable yang dinyatakan dengan angka atau skala numerik. *pre-test post-test one group* adalah kegiatan penelitian yang memberikan tes awal (*pre test*) sebelum diberikan perlakuan, setelah diberikan perlakuan barulah memberikan tes akhir (*post test*). Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh posisi Semi fowler dengan Murottal terhadap tingkat nyeri pasien Hipertensi. Intervensi dilakukan selama 3x selama 3 hari, hal ini didasari dari penelitian (Chanif, 2020) Menurut kriteria seleksi, total 2 pasien diperoleh. Hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan kondisi hemodinamik seperti tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan keadaan umum pada evaluasi hari ke-3, yang juga terlihat dari skala nyeri dan juga mulai menurun.

Table 1.3 Desain penelitian

<i>Pre Test</i>	<i>Treatment</i>	<i>Post Test</i>
T ₁	X	T ₂

Keterangan :

T₁ : Test awal (*Pre Test*) dilakukan sebelum diberikan perlakuan

X : Perlakuan (*Treatment*)

T₂ : Tes akhir (*Post Testi*) dilakukan setelah diberikan perlakuan

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Jl. Andi Mappaodang No.63 Jongaya. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2022.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah domain umum dari objek/subyek yang ditentukan oleh peneliti yang disurvei dan memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang menarik kesimpulan darinya (Siyoto & Sodik, 2015). Kendala populasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu jumlah penduduk dan jumlah penduduk sasaran (Wasis, 2006). Populasi total adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria penelitian, dan populasi sasaran adalah kelompok yang tersedia yang secara teoritis digeneralisasikan dari hasil penelitian. Kelompok sasaran untuk penelitian ini adalah jumlah pasien hipertensi di Rumah sakit Bhayangkara Makassar. Populasi target dalam penelitian ini adalah jumlah pasien hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar berdasarkan studi pendahuluan selama 3 bulan terahir sebanyak 118 pasien.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi, atau sebagian kecil dari anggota populasi, yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi (Siyoto &

Sodik, 2015). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling* adalah salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah jumlah pasien hipertensi di Rumah sakit Bhayangkara Makassar sebanyak 17 pasien.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Berusia 25-70 tahun
2. Pasien dengan diagnose Hipertensi ringan-sedang
3. Pasien berada pada saat penelitian berlangsung
4. Pasien bersedia mengikuti penelitian
5. Pasien yang memiliki keluhan nyeri

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pasien tidak bisa bicara
2. Pasien dengan cedera kepala

Penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus analitik komparatif numeric yaitu sebagai berikut

$$n = \left(\frac{[Z\alpha + Z\beta]S}{x_1 - x_2} \right)^2 \quad n = \frac{([1,64 + 0,84]10)^2}{3} = 17$$

Ket : M A K A S S A R

n : Jumlah subjek yang mendapat terapi

Alpha : Kesalahan tipe satu, ditetapkan 5%, hipotesis satu arah

Z α : Nilai standar alpha 5% hipotesis satu arah, yaitu 1,64

Beta : Kesalahan tipe dua, ditetapkan 20%

Z β : Nilai standar beta 20%, yaitu 0,84

$X_1 - X_2$: Selisih minimal skor kualitas hidup yang dianggap

S : Nilai rerata dari hasil penelitian sebelumnya

Alasan peneliti mengambil rumus tersebut karena penelitian ini merupakan komparatif dengan kategori numerik dengan pengukuran berulang terdiri dari dua kali pengukuran. Berdasarkan hasil perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus analitik komparatif numerik adalah sebanyak 17 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang di kumpulkan berasal dari jumlah pasien hipertensi di Rumah sakit Bhayangkara Makassar. Jelaskan kepada responden beberapa langkah yang digunakan dalam pengumpulan data: mengidentifikasi responden dan melakukan survei. Jika responden setuju, peneliti akan menyediakan lembar observasi untuk mengisi Formulir Data demografi di Rumah sakit Bhayangkara Makassar Adapun jenis data dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari hasil pengukuran intervensi di lembar observasi responden berupa data demografi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam studi pendahuluan dari jumlah pasien 3 bulan terakhir yang mengalami Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

E. Pengolahan Dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah dengan pengolahan data. Pengolahan data adalah proses mendapatkan ringkasan data berdasarkan kelompok data yang ada untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pemrosesan data terdiri dari tiga fase, yakni tahap *editing*, *coding* dan *tabulating* (Swarjana, 2016).

- a. *Editing* merupakan langkah awal dalam mengolah data penelitian, termasuk memeriksa data yang dikumpulkan dengan alat pengumpulan data (*research tools*). Pada fase ini, data yang hilang diselesaikan dan data yang ambigu dikoreksi atau dikoreksi.
- b. *Coding* fase ini merupakan kegiatan dimana diberikan kode dalam bentuk angka. Hal ini dilakukan untuk mempermudah tahapan *tabulating*. Usia, Jenis kelamin, Pendidikan diberi kode angka. Jenis kelamin laki-laki diberi kode angka 1 dan untuk perempuan angka 2. usia dikelompokkan menjadi 5 mulai dari usia 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun, 56-65 tahun, 65 – ke atas. Pendidikan diberi kode angka 1 untuk SD, angka 2 untuk SMP, angka 3 untuk SMA, angka 4 untuk S1, dan angka 5 untuk S2.
- c. *Tabulating*, Kegiatan pendataan. Penyusunan data ini sangat penting karena dapat memudahkan analisis statistik data baik melalui analisis statistik deskriptif maupun inferensi.

2. Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer program SPSS untuk melakukan analisis data dengan uji univariat dan bivariate. Uji univariat dilakukan pada masing-masing variable untuk melihat karakteristik sampel. Uji bivariate dilakukan untuk melihat hubungan posisi semi fowler dengan murottal al-qur'an terhadap tingkat nyeri dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* karna distribusi data tidak normal.

F. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan teknik dan media tertentu (Nasrudin, 2019). Penelitian ini merupakan penelitian intervensi pada pasien Hipertensi. Dalam penelitian ini menggunakan media lembar observasi, dimana lembar observasi untuk memperoleh informasi yang memudahkan surveyor dalam merespon hasil survey. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi pengukuran nyeri yaitu NRS (*Numeric Rating Scale*).

G. Penyajian Data

Data yang dihasilkan diolah menggunakan laptop dengan program SPSS. Setelah data diolah, data tersebut dituangkan dalam bentuk tabel untuk menjelaskan apakah ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel, yaitu variabel hipertensi dan variabel nyeri.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian sangat penting dalam penelitian sehingga peneliti terlebih dahulu meminta izin ke bidang keperawatan sebelum melakukan penelitian. Hanya responden yang secara sadar bersedia untuk berpartisipasi dan tidak dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini yang berpartisipasi. Penelitian ini telah lulus uji Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik : C.86/KEPK/FKIK/IV/2022. Prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini bertujuan untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan implikasi yang muncul selama kegiatan penelitian.

Terdapat beberapa etika penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Lembar persetujuan


Lembar persetujuan atau yang biasa disebut *informed consent* adalah lembaran yang menyatakan subjek atau responden bersedia untuk diteliti. Dalam lembaran persetujuan ini harus dilengkapi dengan judul penelitian dan apa manfaat penelitian ini. Namun jika responden menolak untuk diteliti maka peneliti harus menghargai hak dan keputusan responden.

2. *Anomity*

Anomity atau tidak mencantumkan nama adalah bentuk menjaga rahasia responden dimana dalam lembar terkait hanya menuliskan inisial nama seperti Ny/Tn. A.

3. *Confidentiality*

Confidentiality berarti peneliti menjamin kerahasiaan informasi responden dan hanya sebagian data responden yang akan diuraikan dalam hasil penelitian. Data yang tidak dibutuhkan peneliti tidak akan dipresentasikan atau diuraikan dalam hasil penelitian begitu pula dengan kuesioner. Data-data yang didapatkan akan dimusnahkan setelah melakukan presentasi hasil penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Sejarah berdirinya RS Bhayangkara Makassar diawali berdasarkan perintah lisan Pangdak (Panglima Daerah Kepolisian) XVIII Sulselra Brigjen Imam Supoyo kepada kapten Polisi dr. Adam Imam Santoso pada tanggal 2 November 1965, untuk menempati dan memfungsikan bekas sekolah polisi Negara Djongaya menjadi Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar dan sebagai Kepala Rumah Sakit pertama adalah Komisaris Polisi (Tit) dr. Zainal Arifin, berdasarkan surat perintah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian XVIII Sulselra Nomor: 6/1069, tanggal 24 Januari 1969. Pada tanggal 10 Januari 1970 Rumah Sakit Bhayangkara Makassar diakui oleh Mabes Polri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : B/117/34/I/1970 yang ditandatangani oleh Wakapolri. Dalam perjalanan waktu, RS Bhayangkara akhirnya berubah status menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II dengan surat Kapolri No. Pol : Skep/1549/X/2001 tanggal 10 November 2001 (RS Bhayangkara, 2017).

Upaya untuk menghilangkan kesan bahwa Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara hanya diperuntukkan bagi anggota Polri maka berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sulsel No. Pol:

Skep/321/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001 diputuskan pergantian nama Rumah Sakit Kepolisian Bhayangkara Makassar menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Mappaoudang Makassar.

2. Kondisi Geografis

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mempunyai lokasi yang strategis dipinggir jalan perkotaan dan lingkungan padat penduduk, Jalan Mappaoudang No. 63 Makassar, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

3. Visi, Misi dan Motto RS Bhayangkara Makassar

Visi : Menjadi Rumah Sakit Bhayangkara terbaik di kawasan Timur Indonesia dan jajaran Polri, dengan pelayanan Prima dan mengutamakan penyembuhan serta terkendali dalam pembiayaan.

Misi:

- 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima dengan meningkatkan kualitas disegala bidang pelayanan kesehatan, termasuk kegiatan kedokteran kepolisian (forensic, perawatan tahanan, kesehatan kamtibmas dan DVI) baik kegiatan operasional kepolisian, pembinaan kemitraan maupun pendidikan dan latihan.
- 2) Menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM yang professional, bermoral dan memiliki budaya organisasi sebagai pelayan prima.

4) Mengelola seluruh sumber daya secara efektif, efisien dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas pembinaan maupun operasional polri.

Motto : Prima dalam pelayanan, Utama dalam penyembuhan, Terkendali dalam pembiayaan.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Univariat

Penelitian ini tentang Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murotal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi Responden dalam penelitian ini adalah pasien Hipertensi sebanyak 17 orang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan hasil data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka kemudian desain penelitian yang digunakan quasi eksperimen.

a. Karakteristik Responden

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan

Karakteristik	Frekuensi	Persentase%
Usia		
26-35	1	5,9
36-45	1	5,9
46-55	3	17,6
56-65	5	29,4
65-atas	7	41,2
Total	17	100
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	4	23,5
Perempuan	13	76,5
Total	17	100
Pendidikan		
SD	4	23,5

SMP	3	17,6
SMA	6	35,3
S1	3	17,6
S2	1	5,9
Total	17	100

Sumber : Data Primer, 2022

Tabel 4.1 menunjukkan mayoritas responden yaitu usia 65 tahun ke atas dengan jumlah responden sebanyak 7 (41,2%). Berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah perempuan dengan jumlah responden sebanyak 13 (76,5%). Kemudian dari segi pendidikan mayoritas responden ialah berpendidikan SMA dengan jumlah responden 6 (35,3%).

b. Gambaran sebelum dan sesudah intervensi

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis univariat deskriptif untuk melihat distribusi frekuensi tingkat nyeri pasien hipertensi dengan menggunakan *Numeric Rating Scale* (NRS) di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar. Untuk klasifikasi tingkat nyeri dapat dilihat pada :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Nyeri Pre Test Pasien Hipertensi di
RS Bhayangkara Makassar, n = 17

Nyeri	Frekuensi	Presentase
Sedang	7	41,2%
Berat	10	58,8%
Total	17	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Pada tabel 4.2 didapatkan tingkat nyeri pre test pasien hipertensi di RS Bhayangkara Makassar lebih banyak mengalami nyeri berat dengan presentase 58,8% dengan total responden 10 orang, lalu responden dengan nyeri sedang memiliki presentase sebanyak 41,2% dengan total 7 orang.

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden
Berdasarkan Tingkat Nyeri Post Test Test Pasien
Hipertensi di RS Bhayangkara Makassar, n = 17

Nyeri	Frekuensi	Presentase
Ringan	9	52,9%
Sedang	8	47,1%
Total	17	100%

Sumber: Data Primer, 2022

Pada tabel 4.3 didapatkan tingkat nyeri post test pasien hipertensi di RS Bhayangkara Makassar lebih banyak mengalami nyeri ringan dengan presentase 52.9% dengan total responden 9 orang, lalu responden dengan nyeri sedang memiliki presentase sebanyak 47,1% dengan total responden 8 orang.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.4
Data Penurunan Tingkat Nyeri Selama 3 Hari Pemberian
Intervensi

Responden	Pre Hari 1	Post Hari 1	Pre Hari 2	Post Hari 2	Pre Hari 3	Post Hari 3
R1	8	7	6	6	5	4
R2	7	6	4	4	4	3
R3	7	6	6	5	4	3
R4	7	6	5	5	4	3
R5	8	7	6	5	5	4
R6	8	7	5	5	5	4
R7	8	7	6	6	6	5
R8	6	5	5	4	4	3
R9	6	5	5	4	3	3
R10	7	6	7	5	5	4
R11	5	4	5	4	3	3
R12	6	5	4	4	5	4
R13	5	4	4	3	3	2
R14	7	6	6	5	5	5
R15	5	4	4	3	4	3
R16	6	5	5	4	3	3
R17	8	7	6	6	6	5

Berdasarkan hasil pengolahan data dari lembar observasi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dapat dilihat pada tabel 4.4 rata-rata responden sebelum diberikan intervensi mengalami tingkat nyeri berat yaitu ada 10 responden dan setelah 3 hari diberikan intervensi kombinasi posisi semi fowler dengan terapi murottal Al-Qur'an responden tingkat nyerinya semakin menurun sehingga dapat disimpulkan bahwasanya penurunan tingkat nyeri selama 3 hari pemberian intervensi menunjukkan ada pengaruh antara variabel independen atau yang mempengaruhi (Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Terapi Murottal Al-Qur'an) terhadap variabel dependen atau yang dipengaruhi (Tingkat Nyeri).

Tabel 4.5
Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi

Hasil Statistik	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation	Negative Ranks	Postif Ranks	Ties	Uji Wilcoxon Signed Rank Test
Pre Test	6,41	5	8	1,064	17	0	0	0,000
Post Test	3,59	2	5	0,870				

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan hasil uji *Wilcoxon Signed Rank Test* yang dilakukan, table menunjukkan sebelum diberikan intervensi adalah nilai rerata 6,41 dengan nilai minimum 5 dan nilai maksimum 8 dengan *standar deviasi* 1,064. Setelah diberikan intervensi didapatkan hasil analisis nilai rerata 3,59 dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5 dengan *standar*

deviasi 0,870. Dan dari 17 responden semua mengalami penurunan tingkat nyeri (*Negatif Ranks*). Dan diperoleh nilai *asyp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,000 dan taraf signifikansi $<0,05$ sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terdapat pengaruh kombinasi posisi semi fowler dengan murottal AL-Qur'an terhadap penurunan tingkat nyeri pasien hipertensi.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Usia paling banyak dalam penelitian ini adalah 65 tahun keatas, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Syiddatul B, 2017) bahwa usia >60 tahun ke atas banyak yang mengalami nyeri kepala akibat hipertensi dengan rata-rata mengalami nyeri sedang dan berat.

Nyeri kepala disebabkan karena kerusakan vaskuler akibat dari hipertensi tampak jelas pada seluruh pembuluh perifer. Perubahan struktur-struktur dalam arteri kecil dan arteriola menyebabkan penyumbatan pembuluh darah (Syiddatul B, 2017). Berdasarkan pemaparan diatas bahwa usia 65 tahun ke atas mempengaruhi tingkat nyeri seseorang.

b. Jenis kelamin

Mayoritas jenis kelamin dalam penelitian ini adalah perempuan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian

(Syiddatul B, 2017) bahwa jenis kelamin perempuan lebih cenderung mengalami nyeri kepala.

Pada premenopause wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut dimana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami (Bianti Nuraini, 2015).

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa perempuan lebih cenderung mengalami nyeri kepala dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan hormon pada perempuan yang mempengaruhi terjadinya nyeri kepala pada perempuan.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan pada penelitian ini paling banyak adalah SMA, berdasarkan penelitian dari (Istiyawati et al., 1980) tingkat pendidikan dari responden tidak berpengaruh terhadap skala nyeri kepala yang dikeluhkan responden, dimana respon responden yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan sekolah dasar tidak ada perbedaan dalam menyikapi respon nyeri.

Peneliti mengasumsikan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh dalam skala nyeri akan tetapi pendidikan dalam penelitian ini mempengaruhi sikap responden terhadap penerimaan informasi yang didapatkan dari peneliti. Semakin tinggi pendidikan

seseorang maka semakin mudah pula seseorang menerima informasi.

2. Tingkat Nyeri *Pre Test* Pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat nyeri pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar *Pre Test* dalam rentang nyeri berat sebanyak 10 responden (58,8%). Penelitian ini didukung oleh (Rochmawati, 2018) menunjukkan bahwa distribusi rata-rata skala nyeri responden sebelum diberikan intervensi didapatkan rata-rata intensitas nyeri adalah 5,43. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rochmawati, 2018) Ditunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri sebelum intervensi adalah 5,43, rentang nyeri sedang, dan rata-rata intensitas nyeri setelah intervensi adalah 2,20, rentang nyeri ringan. Menyimpulkan bahwa mendengarkan Murottal al-Quran mempengaruhi intensitas nyeri, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata intensitas nyeri responden 3,23 menurun setelah menerima intervensi mendengarkan Murottal al-Quran dapat dilakukan. Hal ini sejalan dengan teori menurut (Rochmawati, 2018) terapi music maupun terapi murottal Al-Qur'an didengarkan minimal 15 menit untuk memberikan efek terapeutik. Terapi murottal Al-Qur'an terbukri bisa mengaktifkan sel-sel tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap tubuh, menurunkan stimuli reseptor nyeri dan memberikan ketenangan jiwa.

Hal di atas sesuai dengan teori nyeri neuromatriks dimana otak berisi neuromatriks dari tubuh, yang mendistribusikan jaringan neuron secara luas yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan pengalaman sensori. Neuromatriks mengintegrasikan berbagai sumber input selain stimulus nyeri dan sentuhan. Pengalaman nyeri bagi individu dipengaruhi oleh input dari system sensori lain yang membantu menginterpretasikan stimulus (misal melihat luka); faktor-faktor seperti perhatian, harapan, kepribadian, dan budaya; system modulasi nyeri utama; dan komponen system regulasi stress. Mekanisme ini diyakini ada pada level medulla spinalis yang terdiri dari beberapa bagian, komponen medulla spinalis pada teori gerbang control. Transmisi nyeri oleh serat berdiameter kecil dihambat ketika serat berdiameter besar membawa impuls sentuhan yang mendominasi, menutup gerbang dalam kornu dorsalis pada medulla spinalis (Tasnim et al., 2020).

Peneliti berpendapat bahwa tingginya tingkat nyeri pada *pre test* pasien hipertensi Karen belum diberikannya intervensi posisi semi fowler dengan terapi murottal Al-Qur'an.

3. Tingkat Nyeri *Post Test* Pada Pasien Hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar tingkat nyeri setelah diberikan murottal Al-Qur'an (*post test*) dalam rentang nyeri ringan sebanyak 9 responden (52,9%). Penelitian ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Rochmawati, 2018) menunjukkan bahwa dari 40 responden sesudah dilakukan terapi murottal al-qur'an sebagian besar berada pada tingkat nyeri ringan dimana sebelum diberikan intervensi berada pada tingkat nyeri sedang.

Setelah mendengarkan bacaan Al-Qur'an, seseorang dapat menemukan kedamaian, yang juga mempengaruhi keadaan emosi yang lebih stabil. Keadaan emosi yang stabil dapat memberikan kontribusi terhadap relaksasi sehingga persepsi intervensi nyeri pada pasien hipertensi berkurang. Mendengarkan pembacaan syair-syair Al-Qur'an juga merupakan semacam teknik pengalih perhatian untuk mengurangi intensitas rasa sakit (Rochmawati, 2018).

Menurut asumsi peneliti tingkat nyeri yang dialami pada pasien dapat berkurang atau menurun setelah dilakukan terapi murottal al-qur'an. Karena mendengarkan bacaan ayat suci al-qur'an bisa menurunkan tingkat nyeri. Saat pasien mendengarkan bacaan ayat suci al-qur'an yang dilakukan dengan baik, maka bisa menimbulkan rasa nyaman dan tenang bagi pasien sehingga nyeri dapat berkurang. Dengan mendengarkan murottal al-qur'an juga dapat merasakan perubahan secara fisiologis seperti kesedian serta memperoleh ketenangan jiwa sehingga menurunkan tingkat nyeri pada pasien.

4. Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Qur'an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi

Hasil penelitian ini menunjukkan ada pengaruh kombinasi posisi semi fowler dengan murottal al-qur'an terhadap tingkat nyeri pasien hipertensi yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dari 17 responden yang rata-rata mengalami nyeri berat sebelum diberikan intervensi dan setelah diberikan intervensi selama 3 hari mengalami penurunan tingkat nyeri, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sri anggraini dan chanif tentang Efektivitas pemberian posisi kepala elevasi 30 derajat pada pasien hipertensi emergensi menunjukkan bahwa kedua kondisi pasien mengalami peningkatan dilihat dari tekanan darah yang mulai menurun meskipun terjadinya penurunan tekanan darah tidak signifikan, kemudian dapat dilihat dari skala nyeri yang juga mulai mengalami penurunan (Anggraini & Chanif, 2020).

Berdasarkan penelitian lain dari jurnal penelitian yang dilakukan (Saputri & Yuda, 2019) tentang Penerapan Terapi Murottal Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Hipertensi menunjukkan bahwa setelah diberikan terapi murottal terdapat penurunan nyeri pada pasien.

Posisi semi fowler dengan peninggian anggota tubuh diatas jantung dengan *vertical axis*, akan menyebabkan cairan *cerebral spinal* terdistribusi dari kranial keruang subranoid spinal dan memfasilitasi

venus return serebral (Lilis Suryani,2016). Posisi semi fowler adalah posisi setengah duduk yaitu 15 derajat sampai dengan 60 derajat yang bertujuan untuk memberikan perasaan lega pada klien yang sesak napas. Namun, perlu diperhatikan kontraindikasi sebelum memberikan posisi semi fowler (Jurnal Keperawatan Suaka Insan, 2022).

Posisi semi fowler dengan derajat kemiringan 30° - 45° , dengan menggunakan gaya gravitasi untuk membantu mengembangkan paru dan mengurangi tekanan dari abdomen pada diafragma (Muhsinin & Kusumawardani, 2019). Posisi semi fowler akan mempengaruhi keadaan curah jantung dan pengembangan rongga paru-paru pasien. Pengembangan rongga dada dan paru-paru akan menyebabkan asupan oksigen membaik, sehingga proses respirasi akan kembali normal. Semi-duduk atau semifowler membantu mengurangi aliran balik vena pada pasien dengan gagal jantung yang akan mengurangi peningkatan dan distensi vena jugularis pada leher penderita (Ananda, 2019).

Lantunan Al-Qur'an secara fisik mengandung suara manusia, suara manusia merupakan instrument penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling mudah di jangkau. Suara dapat menurunkan hormone-hormon stress, mengaktifkan hormone endorphin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, memperbaiki system kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah (Noor Khalilati dan Muhammad Humaidi, 2019).

Murottal Al-Qur'an dapat menurunkan nyeri, stress, dan kecemasan dengan mengalihkan perhatian seseorang dari nyeri. Sehingga setelah dilakukan pengalihan perhatian melalui metode mendengarkan suara alunan ayat suci Al-Qur'an dapat memberikan rasa nyaman sehingga responden tidak berfokus terhadap rasa nyerinya (Andoko et al., 2021).

Murottal al-qur'an merupakan terapi religi dimana seseorang dibacakan atau diperdengarkan ayat-ayat al-qur'an selama beberapa menit atau beberapa jam sehingga memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang. Salah satu tujuan al-qur'an diturunkan Allah SWT ke bumi yaitu sebagai obat dari berbagai penyakit, dan firman Allah SWT dalam salah satu surah al-qur'an :

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya :

“Dan kami turunkan dari al-qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan al-qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang dzalim selain kerugian” (QS Al-Isra/82) (Kemenag RI, 2020).

Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia, kami turunkan al-qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad, sebagai obat penawar berbagai macam penyakit hati dan rahmat Bagi orang-orang yang zalim, Al-Qur'an hanya menambah hilangnya rasa tidak percaya mereka. Setiap kali dia mendengar Quran dilantunkan, ketidakpercayaannya tumbuh. Dan ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang, seperti kesehatan dan kekayaan, dia

pasti menjauh dari bersyukur kepada Tuhan dan dengan bangga mengingat Tuhan. Dan ketika kekhawatiran seperti penyakit dan kemiskinan melandanya, dia pasti menyerah dan kehilangan harapan akan rahmat Tuhan.

Peneliti berasumsi bahwa dengan murottal al-qur'an dapat menurunkan tingkat nyeri pada pasien hipertensi karena Al-qur'an merupakan salah satu metode pengobatan yang memiliki semua jenis program dan data yang diperlukan untuk mengobati berbagai macam gangguan pada sel tubuh pengaruh terapi mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an berupa adanya perubahan-perubahan arus listrik di otot, perubahan sirkulasi darah, perubahan detak jantung dan kadar darah pada kulit.

Perubahan ini menunjukkan adanya relaksasi atau penurunan tonus saraf refleks yang menyebabkan peningkatan relaksasi arteri dan peningkatan kadar darah di kulit yang disertai dengan penurunan denyut jantung. (Andoko et al., 2021).

Terapi murottal bekerja pada otak, dimana ketika didorong oleh rangasangan dari luar (terapi Al-Qur'an), maka otak memproduksi zat kimia yang disebut neuropeptide. Molekul ini akan mengangkut kedalam reseptor-reseptor mereka yang ada di dalam tubuh dan akan memeberikan umpan balik berupa kenikmatan atau kenyamanan (Andoko et al., 2021).

Terapi pendengaran murottal Al-Qur'an bersifat analgesik karena dapat mengontrol nyeri sampai batas yang dapat diterima berupa adaptasi kognitif. Al-Qur'an memiliki dampak positif pada psikologi. Di sana, entah seseorang mengetahui makna Al-Qur'an atau tidak, kesadaran Tuhan bangkit dan mengikuti aturan-aturan Allah (Andoko et al., 2021).

Nyeri adalah pengalaman sensorik maupun emosional yang tidak menyenangkan apalagi pada lanjut usia dan muncul akibat kerusakan jaringan actual atau potensial. Penyebab nyeri kepala pada penderita hipertensi adalah terjadi sensitifitas perifer terhadap nosiseptor (Damawiyah & Kamariyah, 2022).

Nyeri kepala pada pasien hipertensi disebabkan oleh penyakit pembuluh darah yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Ini terlihat jelas di semua pembuluh darah perifer. Pembuluh darah struktural di kecil dan arteriol menyumbat pembuluh darah. Ketika pembuluh darah menyempit, aliran arteri tersumbat. Pada jaringan yang terganggu, O₂ (oksigen) berkurang dan CO₂ (karbon dioksida) meningkat. Setelah itu, metabolisme anaerobik terjadi di dalam tubuh, asam laktat meningkat, dan kapiler otak yang peka terhadap rasa sakit dirangsang (Nugroho et al., 2022).

Peneliti mengasumsikan bahwa setelah dilakukan penelitian dengan memberikan intervensi posisi semi fowler dengan murottal al-qur'an terdapat perubahan yang signifikan terhadap tingkat nyeri

pasien hipertensi. Adapun pengobatan yang dapat diberikan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi.

Dalam pengobatan hipertensi biasanya ditujukan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas akibat hipertensi. Pemilihan obat untuk setiap pasien hipertensi dapat berinteraksi dengan efek samping metabolik dan subjektif yang ditimbulkan, adanya kondisi medis lain yang dapat diperbaiki atau diperburuk oleh obat antihipertensi pilihan, dan obat antihipertensi tertentu. obat-obatan seks lainnya. Keputusan penggunaan obat selalu mempertimbangkan manfaat dan risiko. Keamanan penggunaan obat antihipertensi harus diperhatikan. Meminimalkan risiko pengobatan dengan meminimalkan masalah ketidakpastian pemberian obat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dengan risiko minimal. Mekanisme keamanan terdiri dari pemantauan kemanjuran dan efek samping obat (Baharuddin et al., 2020).

Murottal Al-qur'an merupakan salah satu metode pengobatan yang memiliki semua jenis program dan data yang diperlukan untuk mengobati berbagai macam gangguan pada sel tubuh. Murottal adalah salah satu music yang memiliki pengaruh positif bagi pendengarnya dan salah satu metode penyembuhan dengan menggunakan Al-qur'an (Arum et al., 2021). Gelombang alfa atau dikenal dengan *posterior dominant rhythm* (PDR), amplitudo gelombang ini maksimal pada lobus oksipital dan dilemahkan dengan membuka mata dan dapat

maksimal selama relaksasi dan keadaan mata tertutup. *Elektroensefalografi* adalah alat pencitraan medis dengan membaca aktivitas listrik yang dihasilkan oleh kulit kepala pada struktur otak dan kemudian dihantarkan melalui kabel yang menuju computer. Terapi menggunakan bacaan al-qur'an telah digunakan oleh umat islam selama berabad-abad untuk mengurangi dan mengobati orang yang menderita stress dan gangguan psikologis, mendengarkan murottal al-qur'an merupakan salah satucara untuk meningkatkan gelombang alfa (Rozi, 2019).

D. Keterbatas Penelitian

Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang disadari oleh peneliti dalam pemberian intervensi yaitu peneliti tidak memisahkan antara farmakologis dengan intervensi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tingkat nyeri pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar sebagian besar mengalami tingkat nyeri berat.
2. Tingkat nyeri pasien hipertensi Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar mengalami penurunan setelah diberikan intervensi posisi semi fowler dengan murottal Al-Qur'an.
3. Ada pengaruh posisi semi fowler dengan murottal Al-Qur'an terhadap tingkat nyeri pasien hipertensi Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih dalam meneliti factor lain yang berpengaruh pada tingkat nyeri pasien hipertensi sehingga dapat mengetahui factor apa yang paling mempengaruhi.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan nilai positif seperti menambah khasanah dan keilmuan tentang cara mengatasi nyeri pada pasien hipertensi.

3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pada petugas kesehatan khususnya perawat dalam memberikan asuhan

keperawatan dengan melakukan pengkajian dan pendekatan dengan pasien secara holistic dan komprehensif sehingga dapat memberikan intervensi posisi semi fowler dengan terapi murottal Al-Qur'an pada pasien hipertensi.

4. Bagi Pasien dan Masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan bisa menjadi tambahan informasi kepada pasien hipertensi bahwa posisi semi fowler dengan murottal Al-Qur'an sangat penting untuk mengurangi tingkat nyeri.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2017). Manajemen Nyeri Pada Lansia Dengan Pendekatan Non Farmakologi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2(1), 178–182.
- Akbar, A. (2017). *FAKTOR PENCETUS TIMBULNYA NYERI KEPALA PRIMER PADA MAHASISWA TINGKAT AKHIR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN 2017*.
- Ananda, A. D. (2019). *PENGARUH POSISI SEMI FOWLER 45° TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA PASIEN CONGESTIVE HEART FAILURE DI RUANGAN INTENSIVE CORONARY CARE UNIT (ICCU) RUMAH SAKIT ABDUL WAHAB SJAHRANIE* (Vol. 59). Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- Andoko, Yulendasari, R., & Rachmawati, Y. (2021). Asuhan keperawatan komprehensif pada klien cedera kepala sedang dengan terapi komplementer murottal. *JOURNAL OF Public Health Concerns*, 1(3), 130–139.
- Anggraini, S., & Chanif. (2020). Efektifitas Pemberian Posisi Kepala Elevasi Pada Pasien Hipertensi Emergensi. *Nurs Muda*, 1(2), 78–87. <https://doi.org/10.26714/nm.v1i2.5491>
- Ansar, J., Dwinata, I., & Apriani, M. (2019). DETERMINAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA PENGUNJUNG POSBINDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BALLAPARANG KOTA MAKASSAR. *JURNAL NASIONAL ILMU KESEHATAN*, 1(3), 28–35.
- Arum, S., Erlinawati, Fauzia, Apriyanti, F., & Afrianty, L. (2021). *Kehamilan Sehat Mewujudkan Generasi Berkualitas di Masa New Normal* (Yuhanah & Yusriani (eds.); Desember). Insania.
- Baharuddin, Kabo, P., & Suwandi, D. (2020). PERBANDINGAN EFEKTIVITAS DAN EFEK SAMPING OBAT ANTI HIPERTENSI TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PASIEN HIPERTENSI. 27 Jan 2020.
- Bahrudin, M. (2017). *PATOFISIOLOGI NYERI (PAIN)*. 13(1), 7–13.
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Damawiyah, S., & Kamariyah, N. (2022). Implementasi Terapi Slow Stroke Back Massage Dengan Minyak Serai Terhadap Intensitas Nyeri Kepala Penderita Hipertensi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 7(1).
- Hasnawati. (2021). *Hipertensi*. KBM Indonesia.

- Hastuti, A. P. (2022). *Hipertensi*. Lakeisha.
- Isnaningtyas, N. F. (2018). Hubungan Tekanan Darah Dengan Nyeri Kepala di UPT Puskesmas Gedangsari I Gunungkidul. *Stikes Muhammadiyah Klaten*.
- Istyawati, P., Prastiani, D. B., & Rakhman, A. (1980). EFEKTIFITAS SLOW STROKE BACK MASSAGE (SSBM) DALAM MENURUNKAN SKALA NYERI KEPALA PASIEN HIPERTENSI DI RUMAH SAKIT MITRA SIAGA TEGAL. *Community of Publishing In Nursing (COPING)*, 8(2), 207–213.
- Kemenag RI. (2020). *Al-Quran dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan 2019*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurniyawan, E. H. (2016). Narrative Review: Terapi Komplementer Alternatif Akupresur Dalam Menurunkan Tingkat Nyeri. *NurseLine Journal*, 1(2), 246–256.
- Muhsinin, S. Z., & Kusumawardani, D. (2019). Pengaruh Penerapan Pemberian Posisi Semi Fowler Terhadap Perubahan Respiratory Rate Pada Pasien dengan Pneumonia. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(1), 42–46.
- Nasrudin, J. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Panca Terra Firma.
- Novitasari, D., & Wirakhmi, I. N. (2018). PENURUNAN NYERI KEPALA PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI MENGGUNAKAN RELAKSASI AUTOGENIK DI KELURAHAN MERSI PURWOKERTO. *Media Ilmu Kesehatan*, 7(2), 104–113.
- Nugroho, R. A., Ayubbana, S., & HS, S. A. S. (2022). PENERAPAN PEMBERIAN KOMPRES HANGAT PADA LEHER TERHADAP SKALA NYERI KEPALA PADA PASIEN HIPERTENSI DI KOTA METRO. *Jurnal Cendikia Muda*, 2(4), 514–520.
- Pikir, B. S. (2015). *Hipertensi; Manajemen Komprehensif*. Airlangga University Press.
- Rochmawati, N. P. (2018). *Pengaruh Murottal Qur'an Terhadap Nyeri Post Operasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang.
- Roesmono, B. (2017). HUBUNGAN PERILAKU MENGONTROL TEKANAN DARAH DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI. *JURNAL ILMIAH KESEHATAN PENCERAH*, 6(2), 70–75.
- Rozi, M. F. (2019). Aktivitas gelombang alfa pada otak manusia saat mendengar murrotal surah al quran tentang hari kiamat. In *Penelitian*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- RS Bhayangkara. (2017). *No Title*.
- Saputri, D. A. E., & Yuda, H. T. (2019). Penerapan Terapi Murotal Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri pada Pasien Hipertensi. *University Research Colloquium*, 3, 122–

126.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Swarjana, I. K. (2016). *Statistik Kesehatan*. Andi Offset.

Sylvestris, A. (2014). *HIPERTENSI DAN RETINOPATI HIPERTENSI*. 10(1), 1–9.

Taslim, R., & Cahyani, A. R. (2021). *Stes Akademik dan Penanganannya*. Guepedia.

Tasnim, Widiastuti, A., Kurniasih, H., Purnanti, K. D., & Hastuti, P. (2020). *Keterampilan Dasar Kebidanan: Teori dan Praktik* (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis.





LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Lembar Pernyataan Peneliti**LEMBAR PERNYATAAN PENELITI**

Kepada Yth.

Rumah Sakit Bhayangkara Makassar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makassar.

Nama : Ainun Maghfirah Ramadani B

NIM : 70300118044

Akan mengadakan penelitian tentang **“Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler dan Murottal Al-Qur’an terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2022”**. Untuk itu saya mohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan digunakan hanya untuk penelitian ini.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terimakasih.

Makassar 2022

Peneliti,

Ainun Maghfirah Ramadani B

Lembar II. Lembar Persetujuan Menjadi Responden**LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama responden :

Usia :

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud dari pengumpulan data untuk penelitian tentang **“Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler dan Murottal Al-Qur’an terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi Di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2022”** Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi kuesioner. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Makassar

2022

Responden,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN ()
M A K A S S A R

PETUNJUK PENGISIAN

Mohon Anda menjawab seluruh pernyataan yang ada dengan jujur dan memastikan bahwa tidak ada pernyataan yang terlewatkan. Sebelum mengisi angket ini, Anda dimohon menuliskan identitas Anda secara lengkap pada bagian berikut ini. Kerahasiaan identitas Anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. Terimakasih atas kesediaan dan kerjasamanya.

A. Identitas Responden

Inisial	
Umur	
Jenis Kelamin	
Pendidikan	
Tanggal Pengisian	

B. Skala Nyeri

Skala Nyeri sebelum intervensi dilakukan

Petunjuk :

Pada skala ini diisi oleh peneliti setelah responden menunjukkan angka berapa nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala nyeri Numerik Rating Scale (0-10) yaitu:

1. 0 : Tidak nyeri
2. 1-3 : Nyeri ringan
3. 4-6 : Nyeri sedang
4. 7-10 : Nyeri berat

Tanyakan kepada responden pada angka berapa nyeri yang dirasakannya dengan menunjukkan posisi garis yang sesuai untuk menggambarkan nyeri yang dirasakan oleh responden sebelum intervensi dilakukan dengan membuat tanda (X) pada skala yang telah disediakan.

Sebelum dilakukan tindakan (intervensi)



Skala Nyeri setelah intervensi dilakukan

Petunjuk :

Pada skala ini diisi oleh peneliti setelah responden menunjukkan angka berapa nyeri yang dirasakan dengan menggunakan skala nyeri Numerik Rating Scale (0-10) yaitu: 1. 0 : Tidak nyeri

2. 1-3 : Nyeri ringan

3. 4-6 : Nyeri sedang

4. 7-10 : Nyeri berat

Tanyakan kepada responden pada angka berapa nyeri yang dirasakannya dengan menunjukkan posisi garis yang sesuai untuk menggambarkan nyeri yang dirasakan oleh responden sebelum intervensi dilakukan dengan membuat tanda (X) pada skala yang telah disediakan.

Setelah dilakukan tindakan (intervensi)



LEMBAR OBSERVASI

Inisial :

Usia :

Agama :

Alamat :

No. HP :

Tanggal :

Petunjuk pengisian kuesioner:

1. Isilah hari dan tanggal dilaksanakannya prosedur pada kolom
2. Beri tanda ceklis (√) pada kolom 0 jika prosedur tidak dilakukan. Jika dilakukan beri tanda (√) pada kolom 1
3. Lembar observasi dapat diisi oleh peneliti atau responden dan keluarga

No	Hari/Tanggal	Pretest				Posttest				Nyeri
		Td	Nd	Rr	Suhu	Td	Nd	Rr	Suhu	
1.										
2.										
3.										

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

AL AUDDIN

MAKASSAR

1. Persiapan

a. Persiapan pasien

- 1) Pastikan identitas pasien yang akan diberikan intervensi
- 2) Kaji keadaan umum pasien
- 3) Jelaskan kepada pasien dan keluarga pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan

b. Persiapan alat

- 1) Speaker MP3

2) Headphone

2. Tahap kerja

- a. Mengucapkan salam terapeutik
- b. Menanyakan perasaan pasien saat ini
- c. Menjelaskan tujuan kegiatan
- d. Beri kesempatan pasien untuk bertanya sebelum kegiatan dilakukan
- e. Pertahankan privasi selama tindakan dilakukan
- f. Bawa peralatan ke dekat pasien
- g. Berikan posisi nyaman kepada pasien
- h. Gunakan headphone agar tidak mengganggu pasien lain dan membantu pasien berkonsentrasi pada murottal
- i. Anjurkan pasien untuk napas dalam
- j. Anjurkan pasien untuk menuup mata dan menikmati murottal
- k. Murottal diperdengarkan selama 15-20 menit
- l. Evaluasi respn pasien
- m. Berikan reinforcement positif
- n. Mengahiri kegiatan dengan cara yang baik
- o. Catat kegiatan yang telah dilakukan

Lampiran 3

Hasil Karakteristik Responden

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	26-35	1	5.9	5.9	5.9
	36-45	1	5.9	5.9	11.8
	46-55	3	17.6	17.6	29.4
	56-65	5	29.4	29.4	58.8
	65-atas	7	41.2	41.2	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	4	23.5	23.5	23.5
	Perempuan	13	76.5	76.5	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	4	23.5	23.5	23.5
	SMP	3	17.6	17.6	41.2
	SMA	6	35.3	35.3	76.5
	S1	3	17.6	17.6	94.1
	S2	1	5.9	5.9	100.0
	Total	17	100.0	100.0	

Lampiran 7

Distribusi Frekuensi berdasarkan Tingkat Nyeri

		Statistics	
		Nyeri Pre	Nyeri Post
N	Valid	17	17
	Missing	0	0
Mean		6.41	3.59
Median		7.00	3.00
Mode		7	3
Std. Deviation		1.064	.870
Minimum		5	2
Maximum		8	5



Lampiran 8

Hasil Uji *Wilcoxon Signed Rank Test*

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nyeri Post - Nyeri Pre	Negative Ranks	17 ^a	9.00	153.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	0 ^c		
	Total	17		

a. Nyeri Post < Nyeri Pre

b. Nyeri Post > Nyeri Pre

c. Nyeri Post = Nyeri Pre

Test Statistics^a

Nyeri Post - Nyeri Pre	
Z	-3.666 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Lampiran 9


Surat Pengambilan Data Awal

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
 NOMOR : S.Ket/ 18/ /VI/KES.2.6/2022/Rumkit
 TANGGAL : 14 Juni 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENGAMBILAN DATA AWAL
 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	AINUN MAGHFIRAH RAMADANI B	70300118044	PENGARUH KOMBINASI POSISI SEMI FOWLER DENGAN MUROTAL ALQURAN TERHADAP TINGKAT NYERI PASIEN HIPERTENSI

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 14 Juni 2022
 a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.
 KEPALA KAUR DIKLIT


 DARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

Lampiran 10



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION "

No. C.86/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Ainun Magfirah Ramadani B
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
"Pengaruh Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Quran Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi"

"The Effect Of Semi Fowler's Position With Murottal Al-Quran On Pain Levels In Hypertention Patient"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefius, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 21/4/2022, sampai dengan tanggal 21/4/2023

This declaration of ethics applies during the period 21/4/2022 until 21/4/2023



21 April 2022
and Chairperson,
Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

M A K A S S A R

Lampiran 11

Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsps@sulselprov.go.id Makassar 90231		
Nomor	: 611/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala RS Bhayangkara Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	
di-		
Tempat		
<p>Berdasarkan surat Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor : B-1763/UN.06/FKIK/PP.00.9/04/2022 tanggal 28 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:</p>		
Nama	: AINUN MAGHFIRAH RAMADANI B	
Nomor Pokok	: 70300118044	
Program Studi	: Keperawatan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa	
PROVINSI SULAWESI SELATAN		
<p>Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :</p>		
" PENGARUH KOMBINASI POSISI SEMI FOWLER DENGAN MUROTAL AL-QUR'AN TERHADAP TINGKAT NYERI PASIEN HIPERTENSI "		
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 09 Mei s/d 09 Juni 2022		
<p>Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami <i>menyetujui</i> kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.</p>		
<p>Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>		
Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 09 Mei 2022		
A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN		
		<u>Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.</u> Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19650606 199003 2 011
Tembusan Yth		
1. Dekan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Makassar; 2. <i>Peringgal</i> .		

Lampiran 12**Surat Telah Melakukan Penelitian**

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
NOMOR : S.Ket/177/VI/KES.2.6/2022/Rumkit
TANGGAL : 13 Juni 2022

DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	AINUN MAGHFIRAH RAMADANI B	70300118044	PENGARUH KOMBINASI POSISI SEMI FOWLER DENGAN MUROTAL ALQURAN TERHADAP TINGKAT NYERI PASIEN HIPERTENSI

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 13 Juni 2022
a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
KASUBBAG BINFUNG
u.b.
KAUR DIKLIT


BARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

Lampiran 13

Dokumentasi





AINUN MAGHFIRAH RAMADANI B

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	5%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
2	eprints.umm.ac.id Internet Source	2%
3	repo.stikesicme-jbg.ac.id Internet Source	2%
4	stikespanakkukang.ac.id Internet Source	1%
5	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1%
6	jurnal.unimus.ac.id Internet Source	1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
8	www.e-journal.stikesypib.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.poltekkesjogja.ac.id Internet Source	1%

10	zonaperawatindonesia.blogspot.com Internet Source	1%
11	ejournal.umm.ac.id Internet Source	1%
12	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
13	pdfcoffee.com Internet Source	1%
14	www.scribd.com Internet Source	1%
15	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
 Exclude bibliography On

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Kombinasi Posisi Semi Fowler Dengan Murottal Al-Qur’an Terhadap Tingkat Nyeri Pasien Hipertensi” bernama lengkap Ainun Maghfirah Ramadani B, lahir di Makassar pada tanggal 12 Desember 1999. Anak ke dua dari dua bersaudara dari Bapak Basir dan Ibu Emmiliya. Menempuh

pendidikan dasar di SD Inpres Rappokalling II pada tahun 2006-2012, selanjutnya pada tahun 2012-2015 penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 04 Makassar, selanjutnya pada tahun 2015-2018 penulis menempuh pendidikan menengah kejuruan di SMK PRATIDINA Makassar. Karena rasa ingin tahu yang lebih terhadap dunia keperawatan, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan Keperawatan UIN Alauddin Makassar jalur UMM pada tahun 2018. Pada tahun 2010-2017 penulis aktif mengikuti les bahasa Inggris di BRITON International English School, penulis juga telah meraih 3 buah ijazah Cambridge dan sempat mengikuti ujian TOEFL dengan peraihan skor 450 poin.