

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN DENGAN  
KETUBAN PECAH DINI**  
*(Literatur Review)*



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar  
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

**UIN Alauddin Makassar**  
**ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

Oleh :  
**HALIMAH**  
**NIM : 70400117005**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimah

Nim : 70400117005

TTL : Kampung Tangnga, 02 February 1999

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Minasaupa blok Ab 3 no 27

Judul : Manajamen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban PecahDini (*Literatur Review*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 9 Agustus 2022

Penulis

**Halimah**

**NIM: 70400117005**

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama :Halimah  
Nim :70400117005  
Judul :Manajamen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (*Literatur Review*)

Karya tulis ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin makassar

Makassar, 9 Agustus 2022



Pembimbing I

Pembimbing II

Firdayanti, S.SiT., M.Keb  
NIP : 19751113 200604 2 001

dr. Andi Tihardimanto K.M.Kes  
NIP : 19851030 200912 1 002

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul **“Manajemen Asuhan kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (*Literatur Review*)”**. Yang disusun oleh **HALIMAH** Nim: **70400117005**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 15 Oktober 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 15 Oktober 2021  
8 Rabiul Awal 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes**

Sekretaris : **Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb.**

Pembimbing I : **Firdayanti, S.SiT., M.Keb**

Pembimbing II : **dr Andi Tihardimato K, M.Kes**

Penguji I : **Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb**

Penguji II : **Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag**

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

**Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes**

NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil ‘Aalamin, “Maha Suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, Dia Maha Lagi Maha Pengampun.” (QS. Al Mulik: 1-2)

Shalawat, salam, dan berkah semoga selalu dicurahkan kepada nabi-Nya, rasul-Nya, kekasih-Nya, dan cahaya-Nya, Muhammad saw, beserta seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, juga kepada Allah, syuhada, shiddiqiin, orang-orang saleh, dan para pengikutnya, dari golongan mu’minin dan mu’minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman Perkasa.

Berkat ridho dan hidayah-Nya karya tulis ini dapat diselesaikan guna memperoleh gelar Ahli madya Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berbagai hambatan penulis hadapi selama penulisan karya tulis ilmiah ini, namun berkat bimbingan, arahan, dan bantuan moril maupun materi yang tulus dari berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat teratasi.

Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, “*Ayahanda*” *Sulaiman K* dan “*ibunda*” *Hanuria*, beliau-beliau bak sumber mata air yang tidak pernah putus-putusnya mengalirkan doanya dengan penuh keikhlasan sehingga Allah swt selalu memberi keberkahan hidup serta kelapangan hati kepada penulis dalam menuntut ilmu-Nya, menyembuhkan dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan kearifan secara lahir maupun bathin.

Dalam mencurahkan segala pengorbanan, bimbingan, motivasi, dan nasehat kepada penulis. Kepada saudaraku kupersembahkan karya sederhana ini kepada kalian, sebagai wujud cinta dan terima kasih karena telah mengajarkan penulis tentang arti kasih sayang. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis, Syukran Jaziilaa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, M. A. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc periode 2014-2019 dan Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A, M.Kes peroido 2020-2024, beserta seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.SiT.,M.Keb selaku ketua prodi kebidanan sekaligus sebagai pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Ayahanda dr. Andi Tihardimanto K, M.Kes sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya membantu, membimbing dan mengarahkan saya tanpa rasa lelah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibunda dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku penguji I seminar proposal dan Ibunda Zelna Yuni, S.ST, M.Keb selaku penguji 1 seminar hasil yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang membangun guna untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini.

6. Ibunda Dr Rahmi Damis, M,Ag selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
8. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2017 serta kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu semoga semua perjuangan kita sebagai amal baik di sisi-Nya.

*Akhirul Kalam*, terima kasih atas segalanya yang tak dapat penulis sebutkan. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan, dan berkah-Nya kepada mereka semua. *Amiin Ya mujiiban wa Ya Arhamar Rahimiin.*



Makassar, 9 Agustus 2022

Penulis

**Halimah**  
**NIM: 70400117005**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI. ....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI. ....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI. ....	iv
KATA PENGANTAR. ....	v
DAFTAR ISI. ....	vi
ABSTRAK. ....	vii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	5
C. Tujuan Penulisan. ....	6
D. Manfaat Penulisan. ....	7
E. Metode Penulisan. ....	7
F. Sistematika Penulisan. ....	8
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Asuhan Kebidanan Pada Persalinan. ....	9
1. Pengertian Asuhan Kebidanan. ....	9
2. Pengertian Persalinan. ....	10
3. Sebab sebab mulainya persalinan. ....	12
4. Tahap – tahap Persalinan. ....	13
5. Tanda – tanda persalinan. ....	14
6. Faktor – faktor yang mempengaruhi persalinan. ....	15
7. Air Ketuban. ....	16



B. Tinjauan Umum Tentang Ketuban Pecah Dini .....	17
1. Pengertian Ketuban pecah dini .....	17
2. Etiologi.....	18
3. Tanda & gejala Ketuban pecah dini. ....	18
4. Patofisiologi Ketuban Pecah dini . ....	18
5. Faktor yang mempengaruhi ketuban ketuban pecah dini.....	19
6. Komplikasi ketuban pecah dini . ....	22
7. Penatalaksanaan ketuban pecah dini . ....	23
C. Teori manajemen kebidanan berdasar kasus persalinan dengan KPD .....	24
1. Proses manajemen Asuhan Kebidanan .....	24
<b>BAB III: TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING</b>	
A. Matriks Langkah I.....	29
B. Matriks Langkah II.....	34
C. Matriks langkah III. ....	39
D. Matriks langkah IV. ....	43
E. Matriks langkah V.....	47
F. Matriks langkah VI. ....	51
G. Matriks langkah VII.....	55
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pembahasan Hasil Telaah Evidence Based Asuhan 7 langkah Varney berdasarkan hasil penelusuran Referensi. ....	60
1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar. ....	60
2. Langkah II: Perumusan Diagnosis/Masalah Aktual. ....	62
3. Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial. ....	65
4. Langkah IV: Tindakan Emergency/Kolaborasi. ....	67

5. Langkah V: Rencana Tindakan.....	69
6. Langkah VI: Implementasi. ....	70
7. Langkah VII: Evaluasi. ....	72
A. Implikasi Kebidanan . ....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
B. Kesimpulan. ....	79
C. Saran. ....	82
DAFTAR PUSTAKA. ....	83

LAMPIRAN





## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, 03 OKTOBER 2021

Name : Halimah  
Student Reg. No. : 70400117005  
Supervisor I : Firdayanti  
Supervisor II : Andi Tihardimanto

### **“A Midwifery Care for Premature Rupture of Membranes (*Literatur Review*)”**

Premature rupture of membranes (PROM) is a critical problem in obstetrics because it causes complications such as premature birth and infectious chorioamnionitis complications. Approximately 85% of perinatal morbidity and mortality problems are caused by prematurity, and prematurity's major cause is PROM signified by 30-40% incidents.

This paper investigated the issue by reviewing related literature and utilized the 7-stage Varney.

According to some research findings, premature rupture of membranes can be diagnosed through Anamnesis, physical examinations in laboratories and other supplementary examinations. The types of treatments for PROM need to be tailored according to the gestational age and other accompanying complications. It is also worth noting that premature rupture of membranes puts the patients at higher risk of contracting infections such as in the uterus, amniotic sac, cervix or vagina.

This study concluded that the treatments were found effective for the patient. To understand patient's medical condition, a series of evaluations such as the vital signs, the complications that follow, infections, and proper treatments for that patient.

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu didapatkannya penegakan diagnosis dan penatalaksanaan tersebut sangat bermanfaat bagi klien agar mendapatkan perawatan dengan baik. Untuk mengetahui keadaan klien maka harus dilakukan evaluasi untuk mendapatkan informasi klien seperti tanda-tanda vital normal, komplikasi yang terjadi seperti adanya infeksi atau tidak serta pemberian tindakan yang tepat pada klien tersebut.

**Keywords: Premature rupture of membranes (PROM), 7-stage Varney**

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, 03 OKTOBER 2021

**NAMA** : Halimah  
**Nim** : 70400117005  
**Pembimbing I** : Firdayanti  
**Pembimbing II** : Andi Tihardimanto K

**“Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (*Literatur Review*)”**

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetric berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan komplikasi infeksi korioamnionitis. Sekitar 85% masalah morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. KPD berhubungan dengan penyebab terjadinya prematuritas dengan insiden 30-40%.

Karya tulis ilmiah ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dan pengumpulan referensi yang kemudian dibuat menjadi literature Review dengan menggunakan pendekatan 7 langkah Varney.

Berdasarkan referensi penelitian untuk mendiagnosa ketuban pecah dini yaitu Anamnesis, pemeriksaan fisik pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang. Penatalaksanaan KPD tergantung pada usia kehamilan pasien serta komplikasi yang terjadi. Ketuban pecah dini lebih beresiko terjadi infeksi, seperti infeksi di rahim, kantung ketuban, leher rahim, atau vagina.

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu didapatkannya penegakan diagnosis dan penatalaksanaan tersebut sangat bermanfaat bagi klien agar mendapatkan perawatan dengan baik. Untuk mengetahui keadaan klien maka harus dilakukan evaluasi untuk mendapatkan informasi klien seperti tanda-tanda vital normal, komplikasi yang terjadi seperti adanya infeksi atau tidak, serta pemberian tindakan yang tepat pada klien tersebut.

**Kata Kunci:** Ketuban Pecah Dini (KPD), 7 Langkah Varney

## **BAB I**

### **PENDAHALUAN**

#### **A. Latar Belakang**

##### **1. Pengertian ketuban pecah dini**

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan masalah penting dalam obstetrik berkaitan dengan penyulit kelahiran prematur dan komplikasi infeksi korioamnionitis hingga sepsis yang meningkatkan morbiditas dan mortalitas perinatal dan menyebabkan infeksi ibu (Yaze dan Dewi, 2016:76). Pecahnya selaput janin bisa terjadi bila leher rahim tertutup atau melebar. Terkadang hal itu bisa terjadi pada kehamilan yang sangat awal (sebelum 28 minggu) atau pada trimester ketiga (antara 28 minggu dan 34 minggu). Faktor resiko yang sangat terkait dengan ketuban pecah dini atau premature rupture of membranes (PROM) yaitu infeksi, malpresentasi dari fetus, multiple pregnancy and excess amniotic fluid, servical incompetence, trauma Abdomen (Gahwagi, 2015:495).

Masalah KPD berkaitan keluarnya cairan berupa air air dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu, ketuban dinyatakan pecah jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung dan pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm (Saifuddin, 2010).

Sualma (2009) menyebutkan bahwa hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah dini. Sekitar 85% masalah morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas KPD berhubungan dengan penyebab terjadinya prematuritas dengan insiden 30-40%. Insidensi KPD lebih tinggi pada wanita dengan serviks inkopoten, polihidromnion, malpresentasi janin, kehamilan kembar atau infeksi vagina/serviks. Hubungan yang signifikan juga telah diemukan antara keletihan bekerja dan peningkatan resiko KPD sebelum cukup bulan.

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 2012), memperlihatkan bahwa 54% dari kelahiran tidak mengalami komplikasi selama persalinan. Wanita yang mengalami persalinan lama dilaporkan sebesar 35% kelahiran, KPD lebih dari 6 jam sebelum kelahiran dialami oleh 15% kelahiran. Perdarahan berlebih sebesar 8% dan demam sebesar 8%. Komplikasi lainnya dan kejang dialami juga pada saat persalinan (masing-masing 5 dan 2 %). Sementara itu, partus lama dan perdarahan merupakan dampak yang bisa ditimbulkan oleh KPD (SDKI, 2012:131-132).

Sementara itu, menurut penelitian Yaze dan Dewi (2016), insidensi KPD terjadi 10% pada semua kehamilan. Pada kehamilan aterm insidensinya bervariasi 6-19%, sedangkan pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm atau persalinan akan terjadi dalam satu minggu setelah selaput ketuban pecah. 70% KPD terjadi pada kehamilan cukup bulan. Sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal

disebabkan oleh prematuritas. KPD berhubungan dengan penyebab kejadian prematuritas dengan insidensi 30-40% (Yaze dan Dewi, 2016:76). Pada umumnya kehamilan dan persalinan memiliki resiko bagi ibu maupun janin. Pada kasus KPD komplikasi yang dapat terjadi yaitu infeksi dalam persalinan, infeksi masa nifas, partus lama, meningkatnya tindakan operatif obstetric atau sciscio sesarea (SC), atau akan mengarah ke morbiditas dan mortalitas ibu.

Selain KPD dapat memberi dampak buruk bagi ibu, KPD juga dapat memberi resiko pada janin yaitu prematuritas (sindrom distres pernafasan, hipotermia, masalah pemberian makan neonatal, retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, entercolitis necroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hiperbilirubienia, anemia, sepsis, prolapse funiculi/penutupan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder sekunder pusat, prolaps uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, enselepati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, gagal ginjal, distress pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hypoplasia paru, deformatis dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk, 2016:105-106).

AKI menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu prioritas utama dalam pembangunan sektor kesehatan sebagaimana tercantum dalam program pemerintah nasional serta strategi making pregnancy safer (MPS) atau kehamilan yang aman sebagai kelanjutan dari program Safe Motherhood dengan tujuan untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir (Arifin, 2015:1).

Kematian ibu pada saat ini masih menjadi masalah kesehatan reproduksi yang sangat penting di Indonesia. Indikator kesehatan yang menggambarkan tingkat kesehatan ibu dan anak adalah AKI dan AKB. Disamping itu AKI merupakan tolak ukur untuk menilai keadaan pelayanan obstetrik belum sempurna, sehingga memerlukan perbaikan (Kemenkes, 2015).

Menurut laporan World Health Organization (WHO), AKI di dunia masih tinggi, dan Indonesia berada di posisi teratas dengan jumlah kematian ibu tertinggi yang disebabkan oleh ketuban pecah dini (KPD) dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. AKI di dunia tahun 2014 yaitu 289.000 jiwa per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000 jiwa. AKI di negara-negara Asia Tenggara dimana Indonesia yaitu 190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup, Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015 angka kematian ibu (AKI) di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Salah satu penyumbang tingginya angka kematian ibu secara nasional adalah angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, yang diikuti pula dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Kota Semarang yang pada tahun 2016 yaitu 121,5 per 100.000 kelahiran hidup. (SDKI, 2015 dalam Pandori, dkk. 2018).

Di Sulawesi Selatan jumlah kematian ibu yang dilaporkan oleh Dinas kesehatan Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2012 jumlah kematian ibu sebanyak 160 orang atau 110,26 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2013 menurun menjadi 115 orang atau



orang atau 78.38 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 138 orang atau 93.20 per 100.000 kelahiran hidup.

Sedangkan AKB pada tahun 2011 sebanyak 868 bayi atau 5.90 per 100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.056 bayi atau 7.23 per 1000 kelahiran hidup dengan penyebab utama kematian adalah perdarahan, infeksi, hipertensi, preeklamsi-eklamsi, abortus, dan partus lama (Profil Kesehatan Sulsel, 2014:19-27).

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas kesehatan kabupaten Gowa, AKI dan AKB mengalami penurunan yaitu AKI pada tahun 2012 sebanyak 12 orang atau 106.53 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2013 menurun menjadi 10 orang atau 80 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2014 sebanyak 3 orang atau 24 orang per 100.000 kelahiran hidup.

Peran bidan dalam penanganan KPD dengan memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin secara tepat, cepat dan komprehensif karena jika ibu bersalin dengan KPD tidak mendapat asuhan yang sesuai maka resikonya akan berakibat pada ibu maupun janin. Dengan harapan setelah dilakukannya asuhan kebidanan yang cepat dan tepat, maka kasus ibu bersalin dengan KPD dapat di tangani dengan baik, sehingga AKI di Indonesia dapat dikurangi.

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Ketuban Pecah Dini (KPD).

## B. Rumusan Masalah

Ruang lingkup pembahasan Karya Tulis Ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan dengan ketuban pecah dini.

## C. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk :

### 1. Tujuan Umum

Mampu menyusun *literatur Review* dan mengetahui penatalaksanaan pada ketuban pecah dini.

### 2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan literatur review asuhan kebidanan pada ketuban pecah dini adalah:

- a. Didapatkannya tanda dan gejala tentang ketuban pecah dini
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis tentang ketuban pecah dini.
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini.
- d. Didapatkannya informasi dari referensi tentang kondisi emergency yang dapat terjadi serta penanganan pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini.
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja penatalaksanaan yang tepat pada ibu yang mengalami ketuban pecah dini.

- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan ibu yang mengalami ketuban pecah dini.
- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber.

#### **D. Manfaat penulisan**

Ada manfaat dari penulisan literature review sebagai berikut:

##### 1. Manfaat institusi

Sebagai bahan pembelajaran dan sumber pengetahuan untuk penulis berikutnya

##### 2. Manfaat bagi praktisi

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program diploma kebidanan Universitas Negeri Alauddin Makassar.

##### 3. Manfaat ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

##### 4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini.

##### 5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini.

#### **E. Metode Penulisan**

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini, metode yang digunakan adalah penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan ketuban pecah dini.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini terdiri dari bab I pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Pada bab II penulis membahas mengenai tinjauan umum ketuban pecah dini, serta proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan. Kemudian pada bab III yaitu Literatur Review, akan menguraikan tentang 7 langkah verney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnose/masalah actual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan /intervensi, implamentasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Asuhan Kebidanan Pada Persalinan**

##### **1. Pengertian Asuhan Kebidanan**

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan (Yulifah, 2014 : 56). Sedangkan sumber lain mengatakan bahwa asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi, kegiatan, dan tanggung jawab bidan dalam pelayanan yang diberikan kepada klien atau masalah kebidanan (kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi wanita, dan pelayanan kesehatan (Soepardan, 2008 : 5).

Tujuan asuhan kebidanan adalah menjamin kepuasan dan keselamatan ibu dan bayinya sepanjang siklus reproduksi, mewujudkan keluarga bahagia dan berkualitas melalui pemberdayaan perempuan dan keluarganya dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Keberhasilan tujuan asuhan kebidanan antara lain dipengaruhi oleh adanya keterkaitan penerapan masing-masing komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan asuhan, baik dari pemberi asuhan, maupun penerima asuhan (Soepardan, 2008 : 5-6).

## 2. Persalinan

Persalinan yaitu persalinan dapat didefinisikan secara medis sebagai kontraksi uterus yang teratur dan semakin kuat, menciptakan penipisan dan dilatasi serviks di sepanjang waktu, yang menimbulkan dorongan kuat untuk melahirkan janin melalui jalan lahir melawan resistansi jaringan lunak, otot, dan struktur tulang panggul (Kennedy dkk, 2013:2).

Sumber lain mengemukakan bahwa persalinan adalah serangkaian kejadian yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Kuswanti dan Melina, 2014:1). Kelahiran seorang bayi juga merupakan peristiwa sosial bagi ibu dan keluarga (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 3).

Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat telah diberikan penjelasan, ketetapan dan perumpamaan. Berikut ayat yang menjelaskan tentang setiap melahirkan pasti akan merasakan rasa sakit yang hebat.

Firman Allah dalam Q.S Maryam Ayat 23

فَإِجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا

Terjemahnya:

*Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan".*

Ayat berikut menguraikan kondisi psikologis Maryam ketika hamil. Proses kehamilannya dimulai ketika Jibril meniupkan roh ke tubuh Maryam, maka sesudah itu dia mengandung. Mengetahui dirinya hamil, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari tempatnya menetap selama ini.

Setelah Jibril menerangkan maksud kedatangannya itu, maka Maryam menjawab, "Aku berserah diri kepada ketetapan Allah." Lalu Jibril meniupkan roh Nabi Isa ke Maryam sehingga mengakibatkan Maryam mengandung; lalu ia mengasingkan diri dengan kandungannya ke suatu tempat yang jauh dari orang banyak untuk menghindari tuduhan dan cemoohan dari Bani Israil (kemenag.go.id).

Proses persalinan atau melahirkan merupakan momen yang dinantikan sekaligus mendebarkan bagi seorang ibu. Di momen ini, seorang ibu berjuang untuk melahirkan buah hatinya dengan harapan baik bayi dan sang ibu bisa melewati masa persalinan dengan lancar dan selamat.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada orang-orang Muslim dalam menyiapkan generasi, termasuk dalam proses melahirkan. Dianjurkan bagi seorang ibu melantunkan doa-doa ketika akan dan sedang melahirkan.

Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Doa-doa di saat genting adalah, "Ya Allah, aku memohon rahmat-Mu, maka jangan Engkau serahkan diriku kepada diriku walau sekejap. Perbaikilah urusanku semuanya! Tidak ada sesembahan yang hak, kecuali Engkau."

Saat akan melahirkan dianjurkan untuk membaca doa sebagai berikut.

"Hanna waladat maryam wa maryamu waladat 'iisaa, ukhruj ayyuhal mauluud, biqudratil malikil ma'buud."

Artinya: "Hanna melahirkan Maryam. Maryam melahirkan Isa AS. Keluarlah wahai jabang bayi dengan kekuasaan Maha Raja Yang Maha disembah."

### 3. Sebab-sebab mulainya persalinan

Bagaimana terjadinya persalinan belum diketahui dengan pasti, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya kekuatan his atau kontraksi yang merupakan awal dari mulai terjadinya persalinan.

Teori tersebut antara lain:

#### a. Teori penurunan hormon

Satu sampai dua minggu sebelum persalinan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron. Progesteron mengakibatkan relaksasi otot-otot rahim, sedangkan estrogen meningkatkan kerentanan otot-otot rahim. Selama kehamilan terjadi keseimbangan antara kadar estrogen dan progesteron, tetapi akhir kehamilan terjadi penurunan kadar progesteron sehingga timbul his.

#### b. Teori distensi rahim

Rahim yang menjadi besar dan meregang akan menyebabkan iskemik oto-otot rahim sehingga timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya.

#### c. Teori iritasi mekanik

Di belakang serviks terletak ganglion servikalis, bila ganglion ini ditekan oleh kepala janin, maka akan timbul kontraksi uterus.

#### d. Teori plasenta menjadi tua

Akibat plasenta tua, menyebabkan turunnya kadar progesteron yang menyebabkan ketegangan pada pembuluh darah, hal ini menimbulkan kontraksi rahim.

#### e. Teori prostaglandin

Prostaglandin yang dihasilkan oleh desidua menjadi sebab permulaan persalinan karena menyebabkan kontraksi pada miometrium pada setiap umur kehamilan.

#### f. Teori oxytocin

Pada akhir kehamilan kadar oxytocin bertambah, oleh karena itu timbul kontraksi otot-otot rahim (Kuswanti dan Melina, 2014 :3-4).



#### 4. Tahap-tahap persalinan

Tahap-tahap pada persalinan dibagi menjadi 4 kala yaitu:

a. Kala 1 (kala pembukaan)

Inpartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah atau blood show karena serviks mulai membuka atau dilatasi dan menipis (effacement). Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler kanalis servikalis karena pergeseran ketika serviks mendarat dan membuka.

Kala pembukaan dibagi atas 2 fase yaitu :

1) Fase laten

Dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Fase laten berlangsung lambat dari pembukaan 1-3 cm, lamanya 7-8 jam.

2) Fase aktif

Fase ini berlangsung selama 6 jam, dan dibagi atas 3 sub fase :

- a) Periode akselerasi: berlangsung 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm.
- b) Periode dilatasi maksimal atau steady: selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm.
- c) Periode deselerasi: berlangsung lambat, waktu 2 jam pembukaan menjadi 10 cm atau lengkap.

b. Kala II atau kala pengeluaran janin

Pada pengeluaran janin, his terkoordinir, kuat, cepat dan lebih lama kira kira 2-3 menit sekali. Kepala janin telah turun masuk ruang panggul sehingga terjadilah tekanan otot dasar panggul yang secara refleksoris menimbulkan mendedan. Karena tekanan pada rektum, ibu merasa seperti mau buang air besar, dengan tanda anus terbuka pada waktu his, kepala janin mulai kelihatan. Vulva membuka dan perineum menegang dengan his, mendedan yang terpimpin akan lahirlah kepala, diikuti oleh seluruh badan janin.

Kala II pada primi  $1\frac{1}{2}$  -2 jam dan pada multi  $\frac{1}{2}$  -1 jam (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 4).

c. Kala III atau kala pengeluaran uri

Setelah bayi lahir, kontraksi rahim istirahat sebentar. Uterus teraba keras dengan fundus uteri setinggi pusat dan berisi plasenta yang tebal 2 kali sebelumnya. Beberapa saat kemudian, timbul his pelepasan dan pengeluaran uri. Dalam waktu 5- 10 menit seluruh plasenta terlepas, terdorong kedalam vagina dan akan lahir spontan atau dengan sedikit dorongan dari atas simfisis atau fundus uteri seluruh proses biasanya berlangsung 5-10 menit setelah bayi lahir. Pengeluaran plasenta disertai dengan pengeluaran darah kira-kira 100-200 cc (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 4).

d. Kala IV atau kala pengawasan

Kala selama 1 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengamati keadaan ibu terutama terhadap bahaya perdarahan post partum (Mochtar, 2002). Pada saat proses persalinan berlangsung, ada beberapa faktor yang harus diamati, diawasi oleh tenaga kesehatan (bidan dan dokter) yaitu nyeri, lama pembukaan, lama meneran, robekan perineum, lama pelepasan plasenta dan volume perdarahan (Aisyah dan Oktarina, 2012 : 5).

## 5. Tanda tanda persalinan

Memasuki proses persalinan terdapat beberapa tanda tanda yang dirasakan oleh ibu dan dilihat oleh bidan melalui pemeriksaan

Tanda-tanda persalinan tersebut antara lain:

- a) Rasa sakit oleh adanya his yang datang lebih kuat, sering dan teratur
- b) Keluar lendir bercampur darah (show) yang lebih banyak karena robekan-robekan kecil pada serviks
- c) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya.

- d) Pada pemeriksaan dalam, serviks mendatar dan pembukaan sudah ada  
(Kuswanti dan Melina, 2014 :9).

## 6. Faktor faktor yang mempengaruhi persalinan

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya persalinan yaitu sebagai berikut:

### a. Power

Power adalah tenaga atau kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan tersebut meliputi his, kontraksi otot perut, kontraksi diafragma dan kasi ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna.

### b. Faktor janin (pasenger)

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah faktor janin, yang meliputi sikap janin, letak, presentasi, bagian terbawah, dan posisi janin.

### c. Presentasi

Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada dibagian bawah rahim, yang dijumpai ketika palpasi atau pemeriksaan dalam. Misalnya presentasi kepala, presentasi bokong, presentasi bahu.

### d. Posisi janin

Menetapkan arah bagian terbawah janin apakah sebelah kanan, kiri, depan, atau belakang terhadap sumbu ibu (materal-pelvis). Misalnya pada letak belakang kepala (LBK), ubun-ubun kecil (UUK) kiri depan, ubun- ubun kecil (UUK) kanan belakang.

### e. Faktor jalan lahir (passage)

Jalan lahir terdiri atas tulang-tulang panggul (rangka panggul) dan bagian lunak (otot-otot, jaringan-jaringan dan ligamen-ligamen).

### f. Faktor psikologi

Keadaan psikologi ibu mempengaruhi proses persalinan.Ibu bersalin yang didampingi oleh suami dan orang-orang yang dicintainya cenderung

mengalami proses persalinan yang lebih lancar dibandingkan dengan ibu bersalin yang tanpa didampingi suami atau orang-orang yang dicintainya.

g. Faktor penolong

Kompetensi yang dimiliki penolong sangat bermanfaat untuk memperlancar proses persalinan dan mencegah kematian maternal dan neonatal (Asrinah dkk, 2010 : 9-21).

## 7. Air Ketuban

a. Pengertian air ketuban

Air ketuban (AK) adalah cairan jernih dengan warna agak kekuningan yang menyelimuti janin di dalam rahim selama masa kehamilan berada di dalam kantong ketuban dan mempunyai banyak fungsi. Air ketuban yang berubah menjadi berwarna kehijauan atau kecoklatan menunjukkan bahwa neonatus telah mengeluarkan mekonium menjadi petanda bahwa neonatus dalam keadaan stress dan hipoksia (Kosim, 2010 : 1-2).

b. Fisiologi air ketuban

Janin bergerak bebas dalam AK sehingga membantu perkembangan otot dantulang. Kantung ketuban terbentuk saat 12 hari setelah pembuahan, kemudian segera terisi oleh AK. Saat minggu-minggu awal kehamilan AK terutama mengandung air yang berasal dari ibu setelah sekitar 20 minggu urin janin membentuk sebagian besar AK yang mengandung nutrien, hormon dan antibodi yang melindungi janin dari penyakit.

Hal yang demikian merupakan hal yang penting bahwa AK dihirup ke dalam paru janin untuk membantu paru mengembang sempurna. AK yang tertelan membantu pembentukan mekonium keluar saat ketuban pecah. Apabila ketuban pecah terjadi selama proses persalinan disebut ketuban pecah spontan, apabila terjadi sebelum proses persalinan disebut sebagai KPD.

## B. Tinjauan umum Ketuban Pecah Dini

### 1. Pengertian ketuban pecah dini

Ketuban pecah dini (KPD) didefinisikan sebagai pecahnya selaput ketuban secara spontan sebelum terjadinya tanda-tanda persalinan (Prawiroharjo, 2008). Ketuban pecah dini merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraselular amnion, korion, dan apoptosis membran janin (Jannah, 2018).

Ketuban Pecah Dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Ketuban Pecah Dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi ascendan. Salah satu fungsi selaput ketuban adalah untuk melindungi atau menjadi pembatas dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga mengurangi kemungkinan infeksi dalam rahim. Dalam keadaan normal, selaput ketuban pecah dalam proses persalinan. Bila Ketuban Pecah Dini terjadi sebelum usia kehamilan 37 minggu disebut Ketuban Pecah Dini pada premature (Sarwono, 2008).

Masalah KPD berkaitan dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu ketuban dinyatakan pecah jika terjadi sebelum proses persalinan berlangsung dan pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm (Saifudin, 2010).

Ada beberapa perhitungan yang mengukur Lag Period, diantaranya 1 jam atau 6 jam sebelum intrapartum, dan diatas 6 jam setelah ketuban pecah. Bila periode laten terlalu panjang dan ketuban sudah pecah, maka dapat terjadi infeksi pada ibu dan juga bayi (Fujiyarti, 2016).

## 2. Etiologi

Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini menurut (Manuaba, 2007) yaitu sebagai berikut:

- a) Multipara dan Grandemultipara
- b) Hidramnion
- c) Kelainan letak sungsang atau lintang
- d) Cephalo pelvic disproportion (CPD)
- e) Kehamilan ganda
- f) Pendular abdomen (perut gantung)

Adapun hasil penelitian yang dilakukan (Rahayu dan Sari 2017) mengenai penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin bahwa kejadian KPD mayoritas pada ibu multipara, usia ibu 20-35 tahun, umur kehamilan  $\geq 37$  minggu, pembesaran uterus normal dan letak janin preskep.

## 3. Tanda dan Gejala

Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat, cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran mendatang. Tetapi, bila duduk atau berdiri kepala janin yang sudah terletak dibawah biasanya “menggantal atau menyumbat” kebocoran untuk sementara. Sementara itu demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Sunarti, 2017).

## 4. Patofisiologi

Pecahnya selaput ketuban disebabkan oleh hilangnya elastisitas pada daerah tepi robekan selaput ketuban. Hilangnya elastisitas selaput ketuban ini sangat erat kaitannya dengan jaringan kolagen, yang dapat terjadi karena penipisan oleh infeksi atau rendahnya kadar kolagen.

Selaput ketuban pecah karena pada tertentu terjadi perubahan biokimia yang menyebabkan selaput ketuban mengalami kelemahan perubahan struktur, jumlah sel dan katabolisme kolagen menyebabkan aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah. pada daerah disekitar pecahnya selaput ketuban diidentifikasi sebagai suatu zona "restricted zone of extreme altered morphology (ZAM)" (Rangaswamy, 2012).

Penelitian oleh (Rangaswamy dkk, 2012), mendukung konsep paracervical weak zone tersebut, menemukan bahwa selaput ketuban di daerah paraservikal akan pecah dengan hanya diperlukan 20-50% dari kekuatan yang dibutuhkan untuk robek area selaput ketuban lainnya.

Berbagai penelitian mendukung konsep adanya perbedaan zona selaput ketuban, khususnya zona disekitar serviks yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan dengan zona lainnya seiring dengan terjadinya perubahan pada susunan biokimia dan histologi paracervical weak zone ini telah muncul sebelum terjadinya pecah selaput ketuban dan berperan sebagai initial breakpoint (Rangaswamy dkk, 2012). Didapatkan hasil laju ditemukan lebih tinggi pada amnion dari pasien dengan ketuban pecah dini dibandingkan pasien tanpa ketuban pecah dini dan laju apopsis ditemukan paling tinggi pada daerah sekitar serviks dibandingkan darah fundus (Reti dkk, 2007).

### **5. Faktor Yang Mempengaruhi Ketuban Pecah dini**

Menurut (Morgan, 2009), Kejadian Pecah Dini (KPD) dapat disebabkan oleh beberapa faktor meliputi:

#### **a. Usia**

Karakteristik pada ibu berdasarkan usia sangat berpengaruh terhadap kesiapan ibu selama kehamilan maupun menghadapi persalinan. Usia untuk reproduksi optimal bagi seorang ibu adalah antara umur 20-35 tahun.

Dibawah atau diatas usia tersebut akan meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan. Usia seseorang sedemikian besarnya akan mempengaruhi sistem reproduksi, karena organ-organ reproduksinya sudah mulai berkurang kemampuannya dan keelastisannya dalam menerima kehamilan (Sudarto, 2016).

b. Sosial Ekonomi

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas kesehatan di suatu keluarga. Pendapatan biasanya berupa uang yang mempengaruhi seseorang dalam mempengaruhi kehidupannya.

Pendapatan yang meningkat merupakan kondisi yang menunjang bagi terlaksana status kesehatan seseorang. Rendahnya merupakan rintangan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan (BPS, 2005).

c. Paritas

Wanita yang telah melahirkan beberapa kali dan pernah mengalami KPD pada kehamilan sebelumnya serta jarak kelahiran yang terlampau dekat diyakini lebih beresiko akan mengalami KPD pada kehamilan berikutnya (Helen, 2008). Paritas bisa mempengaruhi terjadinya KPD karena selaput ketuban lebih tipis sehingga mudah pecah sebelum waktunya. Pernyataan teori dari menyatakan semakin banyak paritas, semakin mudah terjadinya infeksi amnion karena rusaknya struktur serviks pada persalinan sebelumnya.

d. Anemia

Anemia dapat menyebabkan ketuban pecah dini. Anemia pada kehamilan dikarenakan kekurangan zat besi. Sehingga menyebabkan ibu pucat, lemas, cepat lelah, mata berkunang-kunang serat HB kurang. Hal ini lah yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini pada ibu hamil yang menderita anemia.



e. Perilaku merokok

Kebiasaan merokok atau lingkungan dengan rokok yang intensitas tinggi dapat berpengaruh pada kondisi ibu hamil. Rokok mengandung lebih dari 2.500 zat kimia yang teridentifikasi termasuk karbonmonoksida, ammonia, aseton, sianida hydrogen, dan lain-lain. Merokok pada masa kehamilan dapat menyebabkan gangguan-gangguan seperti kehamilan ektopik, ketuban pecah dini, dan resiko lahir mati yang lebih tinggi (Sinclair, 2003).

f. Riwayat KPD

Pengalaman yang pernah dialami oleh ibu bersalin dengan kejadian ketuban pecah dini dapat berpengaruh besar terhadap ibu jika menghadapi kondisi kehamilan riwayat KPD sebelumnya beresiko 2-4 kali mengalami ketuban pecah dini kembali. Patogenesis terjadinya KPD secara singkat ialah akibat penurunan kandungan kolagen dalam membran sehingga memicu terjadinya ketuban pecah dini dan ketuban pecah preterm.

Wanita yang pernah mengalami KPD pada kehamilan menjelang persalinan maka pada kehamilan berikutnya akan lebih beresiko dari pada wanita yang tidak pernah mengalami KPD sebelumnya karena komposisi membran yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya.

g. Serviks yang Inkompetensik

Inkompetensia serviks adalah istilah untuk menyebut kelainan pada otot-otot leher atau leher rahim (serviks) yang terlalu lunak dan lemah, sehingga sedikit membuka ditengah-tengah kehamilan karena tidak mampu menahan desakan janin yang semakin besar. Inkompetensia serviks adalah serviks dengan suatu kelainan anatomi yang nyata, disebabkan laserasi sebelumnya melalui ostium uteri atau merupakan suatu kelainan kongenital pada serviks yang memungkinkan terjadinya dilatasi berlebihan tanpa perasaan nyeri dan mules.

#### h. Tekanan intra uterin

Tekanan intra uterin yang meninggi atau meningkat secara berlebihan dapat menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini, misalnya :

1. Trauma

Berupa hubungan seksual, pemeriksaan dalam, amniosintesis.

2. Gemeli

Kehamilan kembar dalam suatu kehamilan dua janin atau lebih. Pada kehamilan gemeli terjadinya distensi uterus yang berlebihan, sehingga menimbulkan adanya ketegangan rahim secara berlebihan. Hal ini terjadi karena jumlahnya berlebih, isi rahim yang lebih besar dan kantung (selaput ketuban) relative kecil sedangkan dibagian bawah tidak ada yang menahan sehingga mengakibatkan selaput ketuban tipis dan mudah pecah (Novihandari, 2016).

## 6. Komplikasi

Adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin menurut (Sunarti, 2017) yaitu:

1. Prognosis ibu

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi intrapartal dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, dry labour/partus lama, perdarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

2. Prognosis janin

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas (sindrom distes pernapasan, hipotermia, masalah pemberian makanan neonatal), retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, enterocolitis netroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis, prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolapse uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah,

ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intracranial, gagal ginjal, distress pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hypoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin, hypoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk, 2016).

## 7. Penatalaksanaan

KPD termasuk dalam kehamilan berisiko tinggi. Kesalahan dalam mengelolah KPD akan membawa akibat meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayinya. Penatalaksanaan KPD masih dilema bagi sebagian besar ahli kebidanan. Kasus KPD yang cukup bulan, jika kehamilan segera diakhiri, maka akan meningkatkan insidensi sepsis, dan apabila menunggu persalinan spontan, maka akan meningkatkan insiden chorioamnionitis. Kasus KPD yang kurang bulan jika menempuh cara-cara aktif harus dipastikan bahwa tidak akan terjadi RDS, dan jika menempuh cara konservatif dengan maksud memberikan waktu pematangan paru, harus bisa memantau keadaan janin dan infeksi yang akan memperjelek prognosis janin.

Oleh Karena itu pada kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan matang, chorioamnionitis yang diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin. Pada kehamilan cukup bulan, infeksi janin langsung berhubungan dengan lama pecahnya selaput ketuban atau lamanya periode laten. Pastikan diagnosis terlebih dahulu kemudian tentukan umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin serta dalam keadaan inpartu terdapat gawat janin. Penanganan ketuban pecah dini dilakukan secara konservatif dan aktif pada penanganan konservatif yaitu rawat di rumah sakit (Prawirohardjo, 2009).

Penatalaksanaan KPD tergantung pada umur kehamilan tidak di ketahui secara pasti segera dilakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk mengetahui umur kehamilan dan letak janin. Resiko yang lebih sering pada KPD dengan janin kurang bulan adalah RDS dibandingkan dengan sepsis. Oleh Karena itu pada kehamilan kurang bulan perlu evaluasi hati-hati untuk menentukan waktu yang optimal untuk persalinan. Pada umur kehamilan matang, choriamnionitis yang diikuti dengan sepsis pada janin merupakan sebab utama meningkatnya morbiditas dan mortalitas janin.

### **C. Teori manajemen kebidanan berdasarkan kasus persalinan dengan KPD**

#### 1. Proses manajemen kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah, 2014:125). Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keterampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien (Heryani, 2011:111).

Tujuh langkah manajemen kebidanan menurut Helen Varney

Varney (2002) menjelaskan proses manajemen merupakan proses pemecahan masalah yang ditemukan oleh perawat dan bidan pada awal tahun 1970 an.

#### 1. Langkah I pengumpulan data dasar

Pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap. Pada kasus KPD, data yang diperlukan untuk dikumpulkan yaitu data subjektif yang terdiri dari alasan utama ibu masuk Rumah sakit, riwayat keluhan utama, riwayat menstruasi, riwayat perkawinan, riwayat kehamilan dan persalinan

yang lalu, riwayat nifas yang lalu, riwayat, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kesehatan sekarang dan yang lalu, riwayat penyakit keluarga, riwayat sosial ekonomi, psikososial, dan spiritual, riwayat KB, serta riwayat kebutuhan dasar ibu. Selain itu, data objektif pun termasuk kedalam asuhan kebidanan pada ibu dengan KPD yang terdiri pemeriksaan umum ibu, pemeriksaan fisik (head to toe), pemeriksaan dalam, dan pemeriksaan inspekulo.

Terakhir yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan penunjang yang sangat membantu dalam menegakkan diagnosis yaitu pemeriksaan laboratorium uji kertas nitrazin yang akan berubah warna menjadi biru gelap. jika pelepasan yang keluar adalah cairan amnion, kemudian pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk melihat jumlah cairan amnion yang ada di dalam kavum uteri dan pemeriksaan darah untuk melihat tanda tanda infeksi yang terjadi pada ibu.

## 2. Langkah II (interpretasi Data)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah aktual dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dikumpulkan, diinterpretasikan sehingga dapat merumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Masalah dan diagnosis keduanya digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi sungguh membutuhkan penanganan yang dituangkan dalam sebuah rencana asuhan terhadap klien. Masalah sering berkaitan dengan pengalaman wanita yang diidentifikasi oleh bidan sesuai dengan pengarahan.

### 3. Langkah III (Identifikasi Diagnosis Atau Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengikuti klien, bidan dapat diharapkan bersiap-siap bila diagnosis atau masalah potensial ini benar benar terjadi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman (Yulifah, 2014:133).

Tujuan dari langkah ketiga ini adalah untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang dapat muncul. Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial berdasarkan diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi atau diagnosis dan masalah aktual. Diagnosis potensial yang mungkin terjadi pada ibu yaitu infeksi intrapartal dalam persalinan, infeksi masa nifas atau puerperalis, dry labour atau partus lama, perdarahan post partum, meningkatnya tindakan operatif obstetric (khususnya sc), morbiditas dan mortalitas maternal.

Pada langkah ketiga ini, bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar masalah potensial yang diidentifikasi sudah tepat.

### 4. Langkah IV Tindakan segera

Tindakan segera merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara menetapkan kebutuhan tentang perlunya tindakan segera oleh bidan/dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah ke empat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Pada kasus persalinan dengan KPD.

Tindakan antisipasi atau tindakan segera yang harus dilakukan yaitu memberikan infus cairan larutan garam fisiologis, larutan glukosa 5-10%, induksi uterotonika dan pemberian antibiotik.

#### 5. Langkah V Perencanaan

Perencanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosis kebidanan dan masalah potensial yang akan terjadi. Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut.

Semua perencanaan yang dibuat harus berdasarkan pertimbangan yang tepat meliputi pengetahuan, teori yang terbaru, *evidence based care*, serta divalidasi dengan asumsi mengenai apa yang diinginkan dan apa perencanaan sebaiknya pasien dilibatkan, karena pada akhirnya pengambilan keputusan untuk suatu rencana harus disetujui oleh pasien.

#### 6. Langkah VI Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan rencana asuhan menyeluruh dan dilakukan dengan efisien dan aman. Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah sebelumnya dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi.

Keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan menghemat biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

#### 7. Langkah VII Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Kita mengacu kepada beberapa pertimbangan yaitu tujuan asuhan kebidanan, efektivitas tindakan untuk mengatasi masalah, dan hasil asuhan. Hasil yang diharapkan dari manajemen kebidanan pada ibu bersalin dengan KPD adalah dapat dilakukan partus secara spontan, komplikasi akibat tindakan medik dapat diatasi serta ibu dan janin dalam keadaan baik dan sehat. Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui faktor mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan (Varney dkk, 2002:31).



## TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING

### A. Matriks Langkah 1

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada pasien dengan ketuban pecah dini, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Untuk memperoleh data dilakukan.

**Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Ketuban Pecah Dini.**

No	Judul	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Determinan ketuban pecah dini di ruang cempaka rsud dr doris Sylvanus	Legawati dan Riyanti	2018	Penyebab atau etiologi KPD	Penyebab dari KPD masih belum jelas, maka tindakan preventive tidak dapat dilakukan, kecuali dalam usaha menekan terjadinya infeksi.	Jurnal ini tidak menjelaskan secara detail tentang penyebab ketuban pecah dini	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dan analitik, menggunakan rancangan cohort retrospectiv	penyebab KPD masih belum jelas

2	Faktor risiko ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di rsud bangkinang	Nia Aprilla	2017	Definisi KPD	Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan	Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif	Penelitian ini dilakukan dari tanggal 09-17 Juni tahun 2017 di ruang rekam medik RSUD Bangkinang dengan sampel sebanyak 55 orang pada tahun 2016. Data yang	pecahnya selaput ketuban pecah dini sebelum ada tanda persalinan
3	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah dr. Adjidarmo kabupaten lebak	Omo Sutomo Kadar Kuswandi	2013	Penjelasan tentang analisis faktor yang berhubungan dengan KPD	factor predisposisi yang dapat diidentifikasi penyebab KPD ialah infeksi, golongan darah ibu dan anak tidak sesuai, multigrafida, merokok, defisiensi gizi khususnya vitamin C, servik yang tidak kompeten, polihidramnion, riwayat KPD sebelumnya, kelainan selaput ketuban, tekanan intra uterin yang tinggi atau overdistesi, trauma, kelainan letak.	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan case control	Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak periode Januari sampai dengan Desember 2013 berjumlah 4.328 orang ibu bersalin	KPD seringkali menimbulkan konsekuensi yang berimbas pada morbiditas dan mortalitas pada ibu maupun bayi terutama pada kematian perinatal yang cukup tinggi

4	Analisis kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin di klinik pratama melania pademangan jakarta utara tahun 2017	Betty Nir Susanti Atik Kridawati Tri Budi Wahyuni Raharjo	2017	Analisis kejadian ketuban pecah dini	Pada kasus presentasi janin tidak normal (muka, dahi, bokong) lebih besar mengalami ketuban pecah dini sebesar 4% dibandingkan dengan yang tidak mengalami ketuban pecah dini (KPD) (kontrol) sebesar 1,5%.	Penelitian sursvey analitik dengan rancangan penelitian case control	Besar sampel sebanyak 297 ibu bersalin (kasus : 99 ibu bersalin dan kontrol : 198 ibu bersalin)	ketuban pecah dini yang dapat menjadi penyebab angka kematian ibu meningkat
5	Studi Deskriptif Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) pada Ibu Bersalin	Budi Rahayu, Ayu Novita Sari	2017	Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD)	Selaput ketuban mudah pecah dikarenakan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tua umur kehamilan akan mengakibatkan pembukaan serviks dan peregangan selaput ketuban	Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan waktu retrospektif	Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah 427 responden	sebagian besar ibu bersalin dengan KPD yaitu antara umur kehamilan 37-42 minggu.

6	Hubungan antara ketuban pecah dini dengan persalinan prematur di rumah sakit mutiara bunda salatiga	Ni Wayan Raina Purwahati , Eko MardiyarningsiWulansari	2017	hubungan antara KPD dengan persalinan prematur	Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan faktor utama penyebab infeksi pada kehamilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diperkirakan infeksi intauterin akibat KPD dapat menyebabkan kelahiran prematur	Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain cross sectional	Sampel penelitian ini ditentukan dengan simple random sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan check-list yang terdiri dari KPD, Tidak KPD, Prematur dan Tidak Prematur.	Saran untuk ibu hamil agar secara teratur memeriksakan kehamilannya (ANC) agar ibu dan bayi dalam keadaan sehat baik saat hamil maupun pada saat persalinan, sehingga dalam kehamilan dan proses persalinannya nanti dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah pada bayi maupun ibunya
---	---	--	------	--	---	--	--	--



7	Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) kurang bulan dengan pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	Afifatul Azisyah, Sri Wahyuni, Hernandia Distinarista	2019	gejala dan tanda KPD	gejala KPD sama seperti ketuban pecah sebagai tanda melahirkan, yaitu kebocoran cairan dari vagina. Air ketuban biasa keluar menetes bocor, mengalir, atau menyembur kuat seperti air kencing.	Desain dalam penelitian ini menggunakan metode survey analitik melalui pendekatan cross sectiona	Sempel pada penelitian ini ada 40 responden dengan teknik total sampling . Data yang di peroleh di olah statistic menggunakan uji Lambda	tanda khas KPD adalah waktu kejadiannya. Ketuban pecah dini (KPD) kurang bulan (dibawah minggu ke 37) termasyk komplikasi preterm premature rupture of membrane(PP ROM).
---	---	---	------	----------------------	--	--	--	--



## B. Langkah 2 Identifikasi Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa pasien mengalami ketuban pecah dini.

No	Judul	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Analisis penyebab terjadinya ketuban pecah dini pada ibu bersalin.	Eka Frelestanty, Yunida Haryanti	2019	Pemeriksaan dengan kertas lakmus	dapat diketahui bahwa pemeriksaan dengan kertas lakmus mampu mendiagnosa terjadinya ketuban pecah dini (KPD).	Metode yang dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif	Jumlah sampel yang digunakan adalah 20 orang yang mempunyai gejala KPD	Dengan gejala maka pemeriksaan dengan kertas lakmus dapat menegakkan diagnosis KPD
2	Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2019	Ikrawanty Ayu W, Melisa Febrianti, Ana Octaviani	2019	Diagnosis KPD	Ditegakkan dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti jumlah cairan yang hilang karena keluarnya sedikit cairan terus menerus dan perasaan basah pada celana dalamnya	metode yang digunakan dengan memperhatikan data hasil pengkajian	menggunakan format pengumpulan data yang disesuaikan dengan variabel yang diperlukan	Diagnosis KPD ditegakan dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien

3	Diagnosa Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu 2011	Heny Sepduwiana	2013	Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG dalam penegakkan diagnosis KPD	jika anamnesis menunjukkan kecenderungan kuat kearah KPD, tetapi pemeriksaan fisik sulit atau tidak khas dalam mengkonfirmasi diagnosis, USG dapat digunakan untuk membantu penegakan diagnosis	Metode yang digunakan disajikan dalam bentuk artikel	Populasi dalam penelitian ini adalah pasien yang dicurigai mengalami KPD	Perbandingan dalam setiap metode untuk diagnosis tifus maka didapatkan metode yang lebih efektif dan akurat yaitu tes Tubex dan biakan darah
4	Penerapan metode pemeriksaan fisik untuk mendiagnosa terjadinya ketuban pecah diini ( KPD) pada ibu.	Ira Ayu Melisa Febrianti, Ana Octaviani	2019	pemeriksaan fisik pada pasien	dilakukan pemeriksaan inspekulo yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis terjadinya ketuban pecah dini ( KPD) pada pasien	Metode yang digunakan Penelitian ini hanya menggunakan survey analitik	Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi	Metode pemeriksaan inspekulo digunakan untuk menegakkan diagnosis terjadinya ketuban pecah dini (KPD)

5	Gambaran ketuban pecah dini pada kehamilan aterm di rsup Sanglah tahun 2013	Angga Wiadnya,I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya	2013	Diagnosis KPD	pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen, pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu <b>diagnosis KPD</b>	Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif retrospektif.	Teknik pengambilan sampel dilakukan Teknik pengambilan sampel adalah dengan purposive sampling	dilakuakn pemeriksaan fisik dan berapa pemeriksaan lainnya untuk mendoagnosis KPD
6	Diagnosis KPD dengan speculum pada ibu bersalin	Hasnia Nur Laili	2018	Diagnosis KPD	menempatkan speculum (color bebek) ke dalam vagina dilakukan untuk memeriksa genangan air ketuban. Hasnia Nur Laili	Metode penelitian yang di gunakan berdasarkan sub variabel dalam bentuk table	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	dilakukan untuk mendiagnosis KPD



7	Manfaat vitamin C terhadap kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin	Durrotun Munnafiah jumiyatun	2019	Resiko kekurangan vitamin c	Kadar vitamin c yang rendah pada ibu dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi.	Menggunakan penelitian komparatif yang mampu membedakan satu variabel atau lebih dengan sampel yang lebih dari satu di analisis dalam waktu yang berbeda.	Kadar vitamin c yang rendah pada ibu dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini.
8	Analisis ketuban pecah dini (KPD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Rizky Manda Beladina	2016	Diagnosa KPD	menggunakan tes amnicator dengan membasahi sampel air ketuban dengan pewarna pendeteksi pH nitrazine kuning	jurnal ini tidak menjelaskan secara detail	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif	pemeriksaan menggunakan tes amnicator untuk mendiagnosa KPD.

9	BBLR, KPD dan Persalinan prematur dengan kejadian sepsis Neonatus di RSUD Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka tahun 2016	Karma Ibrahim	2016	Analisis pertahanan fisik terhadap BBLR, KPD dan Persalinan prematur dengan kejadian sepsis Neonatus	Bayi kurang bulan mempunyai pertahanan fisik yang lemah dan fungsi imunitas yang imatur, sehingga menyebabkan rentan terhadap invansi bakteri	Metode penelitian yang digunakan hanya metode observasi sehingga data yang di temukan kurang akurat	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 251 bayi dan adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 rekam medik bayi.	Bayi kurang bulan mempunyai pertahanan fisik yang lemah sehingga fungsi imunitasnya menurun dan bisa terjadi sepsis neonatus
---	--	---------------	------	--	---	---	---	--



### C. Matriks Langkah III

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada ketuban pecah dini jika tidak ditangani dengan tepat.

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Hubungan Antara Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Dengan Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil	Afifatul Hernandia	2019	komplikasi yang terjadi	KPD dapat meningkatkan kecemasan yang disebabkan karena rasa takut dan sakit yang dapat meningkatkan pengeluaran adrenalin penyebab dari kecemasan	Desain dalam penelitian ini menggunakan metode survey analitik melalui pendekatan cross sectional	Sempel pada penelitian ini ada 40 responden dengan teknik total sampling . Data yang di peroleh di olah statistic menggunakan uji Lambda	Ketuban pecah dini terjadi sebelum usia 37 minggu yang dapat menyebabkan suatu kecemasan
2	pengaruh anemia terhadap kejadian ketuban pecah dini di RSUD Cibinong tahun 2013	Betty Nir Susanti Atik Kridawati Tri Budi Wahyuni Raharjo	2018	komplikasi terhadap KPD	dapat meningkatkan insiden ketuban pecah dini melalui mekanisme biologi dan mekanisme penyakit	metode penelitian menggunakan rancangan kohort retrospektif	model binary log regression digunakan untuk melihat variable luar yang mempengaruhi hubungan anemia dan KPD	anemia pada trimester II terbukti meningkatkan kejadian KPD.

3	komplikasi ketuban pecah dini yang terjadi di RSUP Dr.M. Djamil Padang	Juan Habli Soufal, Ariadi, Sofina Rusdan	2016	komplikasi yang terjadi	rentan mengalami masalah paru saat lahir, apabila ketuban pecah sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup banyak sehingga menghambat perkembangan parunya.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode survei analitik dengan pendekatan kohort historikal dimana cara kohort ini memiliki keterbatasan	Teknik pengambilan sampel menggunakan sistem random sampling dimana secara sistematis cara ini lebih teliti dan lebih mudah diterapkan.	sebelum usia kehamilan 23 minggu bayi membutuhkan air ketuban agar paru-paru dapat berkembang secara normal.
4	komplikasi terjadinya KPD di rsu Kandou Manado	Suliswaty & Heny	2019	beberapa komplikasi yang dapat terjadi	resiko terbesar dari kondisi kantung ketuban pecah dini adalah infeksi pada janin.	penelitian ini tidak menjelaskan secara detail resiko yang terjadi pada ketuban pecah dini	Komplikasi pada KPD dapat beresiko infeksi janin	Pada pasien KPD jika tidak dapat ditangani dengan baik maka dapat menimbulkan komplikasi tersebut

5	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah dr. Adjidarmo kabupaten lebak tahun 2013	Kadar Kuswandi	2015	Analisis faktor yang terjadi pada KPD	adanya infeksi pada selaput yang menyelimuti janin beresiko menimbulkan infeksi serius pada ibu dan janin, seperti pneumonia, meningitis hingga sepsis	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi.	Menggunakan penelitian komparatif yang mampu membedakan satu variabel atau lebih dengan sampel yang lebih dari satu di analisis dalam waktu yang berbeda.	beresiko menimbulkan infeksi pada janin
6	Ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah ungaran	Nur Rohma Arulita Ika Fibriana	2018	komplikasi yang dapt ditimbulkan	tali pusat tertekan atau kompresi tali pusat kurangnya cairan ketuban akibat ketuban pecah dini dapat membuat tali pusat tertekan oleh janin.	jurnl ini tidak menjelaskan secara detail	Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif observatif	kompresi tali pusat dapat menyebabkan cedera otak yang serius dan bahkan kematian

7	Dampak persalinan prematur dan Ketuban Pecah Dini Di RS PKU Muhammadiyah Bantul.	Sri lestari	2018	dampak komplikasi terjadi atau yang	beresiko mengalami kelainan pada saraf dan gangguan pernafasan	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas	Jumlah sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria inklusi dan dibagi ada sampel kasus dan ada sampel control	KPD dapat terjadi sebelum kehamiolan berusia 24 minggu dan dapat menyebabkan kematian janin
---	--	-------------	------	-------------------------------------	--	--	--	---



#### D. Matriks langkah IV

Pada langkah ini bidan ini atau dokter melakukan identifikasi yang memungkinkan terdapat kondisi untuk melakukan kolaborasi dan tindakan segera bersama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi klien.

No	Judul Referensi	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Ketuban pecah dini dengan kehamilan Aterm pada ibu bersalin	Yuni marlinda sari	2019	Tindakan pada komplikasi usia kehamilan aterm	yaitu penatalaksanaan ketuban pecah dini (KPD) difokuskan pada induksi persalinan dengan oxytocin.	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Sampel penelitian ini sebanyak 165 orang dengan menggunakan teknik random sampling .	Majemen aktif berkaitan dengan penurunan resiko infeksi maternal, penurunan kebutuhan rawat intensif neonatus, dan antibiotik postnatal
2	Ketuban pecah dini dengan usia kehamilan preterm pada ibu bersalin di rumah sakit islam sunan kodus	N.L. Safitri & dkk	2017	tindakan pada komplikasi yang dapat terjadi	tatalaksana bergantung pada usia kehamilan	Waktu penelitian yang dilaksanakan di rumah sakit islam sunan kodus pada tahun 2017 hanya selama 2 bulan.	Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kuantitatif	ketuban pecah dini yang terjadi pada usia gestasi < 37 minggu disebut sebagai etketuban pecah dini preterm atau (PPROM).

3	Risiko terjadinya ketuban pecah dini pada kehamilan 34-36 minggu	Sudarto dan Tunut	2016	tindakan yang bisa diberikan	berikan antibiotic menggunakan kombinasi ampicillin 2 gram + erythromycin 250mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam. Diikuti dengan amoxicillin 250 mg + erythromycin 333 mg setiap 8 jam selama 5 hari	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari catatan rekam medis di bagian Obstetri dan Ginekologi. Pengolahan data dilakukan secara manual dan hasil disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.	bukti ilmiah menunjukkan bahwa induksi persalinan lebih menguntungkan dibandingkan expectant management pada pasien PPRM dengan usia kehamilan 34-36 minggu.
4	Risiko terjadinya ketuban pecah dini pada kehamilan 24-31 minggu di rumah sakit bantuan lawing	Zainal Alim, Yeni Agus Safitri	2015	tindakan pada komplikasi koriomnionitis	pada penderita koriomnionitis, persalinan perlu dilakukan segera. Pada pasien ini juga disarankan pemberian antibiotic dan kortikosteroid.	Populasi dalam penelitian ini jumlahnya hanya sedikit yaitu 81 orang serta hasil pengamatan tersebut tidak dibandingkan dengan teori yang ada	Menggunakan penelitian analitik dengan pendekatan <i>Cross Sectional Study</i> .	persalinan pada usia gestasi kurang dari 32 minggu memiliki resiko yang tinggi bagi janin.



5	Resiko ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di rsud bangkinang tahun 2017	Malik Niar	2017	penanganan yang dapat dilakukan	bayi terlahir prematur disebabkan KPD, harus dirawat di ruang NICU atau <i>neonatal intensive care unit</i> , yakni ruangan khusus bagi bayi yang baru lahir dan mengalami masalah kesehatan	Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional	Teknik pengambilan sampel dilakukan secara total sampling dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi	KPD dapat menyebabkan terjadinya kelahiran prematur
6	penatalaksanaan ketuban pecah dini pada perempuan hami usia 37 tahun	Kadar & dkk	2013	Penatalaksanaan yang bisa dilakukan	dilakukan observasi tanda vital ibu, observasi DJJ, His, pemberian cairan maintenance RL 20 tetes/ menit, injeksi ampocilin 1 g/ 8 jam IV dan direncanakan untuk terminasi per vaginam.	penelitian kuantitatif dengan pendekatan case control	Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah data skunder pada buku register ibu hamil di ruang bersalin, dengan menggunakan format pengumpulan data yang disesuaikan dengan variabel yang diperlukan	bila KP terjadi pada kehamilan prematur diperlukan penatalaksanaan yang komprehensif

7	hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia pada bayi barunlahir di RSUD Dr. R Koesma Tuban tahun 2009	Muntari	2018	tindakan yang dapat diberikan	melakukan pengawasan antenatal yang adekut dan melakukan koreksi sedini mungkin terhadap seiap kelainan yang terjadi	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi.	Jumlah sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria inklusi dan dibagi ada sampel kasus dan ada sampel kontrol.	kurangnya asupan kalori dan nutrisi saat hamil dapat mengakibatkan terjadinya Asfiksia
---	--	---------	------	-------------------------------	--	---	---	--



### E. Langkah V Perencanaan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus KPD.

No	Judul	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Analisis penatalaksanaan Asuhan kebidanan pada Ny Y G3P2A0 dengan ketuban pecah dini di BPM Bidan R kabupaten Purwakarta Tahun 2017.	Iis Trisnawati Dumilah Mardianti	2019	Penatalaksanaan KPD	dilakukan dengan cara akselerasi persalinan dengan oxytocin	Metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif	Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu semua ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang sebanyak 120 orang	ketidaksesuaian asuhan pada masa nifas dan bayi baru lahir meningkatkan resiko infeksi pada bayi dan meningkatkan resiko terjadinya komplikasi pada masa nifas

2	asuhan kebidanan pada Ny. S dengan post seksio sesarea dan mengalami ketuban peah dini (KPD) di Rumah sakit Marinir Cilandak Jakarta Selatan	Syifa Saras Arani	2020	penatalaksanaan KPD	dilakukan dengan observasi, teraaptik, edukasi, dan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya.	Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dimana metode ini orientasinya terbatas pada nilai dan jumlah serta pengambilan data berasal dari nilai tertinggi	populasi yang digunakan adalah semua ibu bersalin sebanyak 241 orang dengan jumlah sampel sebanyak 93 orang dipilih menggunakan systematic random sampling	rencana tindakan sesuai dengan kondisi klien yang mengalami sectio sesarea
3	asuhan kebidanan intranatal pada Ny M dengan ketuban pecah dini di RSUD SYEKH YUSUF kabupaten Gowa tahun 2018	Wiwi Agustina	2018	penanganan yang dilakukan	ajarkan teknik relaksasi dan pengaturan nafas pada saat kontraksi, menganjurkan ibu menarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti meniup niup selama timbul kontraksi.	Menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan retrospektif	Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu semua ibu bersalin dengan ketubanpecah dini di RSU Assalam, Gemolong, Sragen	untuk mengurangi rasa sakit saat kontraksi

4	KPD dengan kehamilan Aterm	ketut surya Ryan Saktika Evert Solomon	2017	penanganan yang dilakukan	Diberikan antibiotika profilaksis, Ampisilin 4 x 500 mg selama 7 hari	Metode yang dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus KPD	Sampel yang digunakan ini adalah pasien dengan KPD	untuk mencegah terjadinya infeksi pada janin
5	Korelasi karakteristik dengan penyebab ketuban pecah dini pada ibu bersalin di rsu denisa gresik	Renny Novi Puspitasari	2019	Penatalaksanaan ketuban pecah dini	pada umur kehamilan 24-32 minggu yang menyebabkan menunggu berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untuk melakukan induksi persalinan, dengan kemungkinan janin tidak dapat diselamatkan	Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan menggunakan simple random sampling	Sampel telah diambil sejumlah 59 responden dari 143 populasi, mulai dari Maret 2017 hingga Maret 2018	Resiko infeksi ibu dan bayi meningkat pada ketuban pecah dini. Pada ibu terjadi korioamnionitis. Pada bayi dapat terjadi septikemia pneumonia, omfalitis

6	Hubungan Kpd Dan kehamilan aterm Di Blud Rs Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka Tahun 2016	Ibrahim	2016	Penanganan yang bisa dilakukan	Dilakukan pemeriksaan "admission test" bila hasilnya patologis dilakukan terminasi kehamilan	Metode penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Simple Random Sampling	KDP dan kehamilan dapat menyebabkan infeksi pada janin dan ibu
7	KPD Dengan Kehamilan Pre Term	Nursasmita	2018	tindakan yang bisa dilakukan	diberikan kortikosteroid (untuk UK kurang dari 35 minggu) : Deksametason 5 mg setiap 6 jam	Metode penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 251 bayi, dan adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 rekam medik bayi	Untuk merangsang maturasi paru

## F. Matriks Langkah VI Pelaksanaan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan pasien serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan

No	Judul	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	perbandingan
1	Tehnik pemeriksaan penunjang	Ratna Hidayati	2019	Pemeriksaan penunjang	Untuk memastikan cairan yang keluar merupakan cairan amnion dapat dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti uji nitrazine, fern test, dan alfa mikroglobulin-1. Pemeriksaan penunjang lain adalah USG untuk memeriksa oligohidramnion, usia kehamilan, dan kondisi fetus	Belum menjelaskan secara lengkap tujuan pemeriksaan penunjang untuk klien	Mampu menguraikan penjelasan mengenai pemeriksaan penunjang serta data-data yang bisa didapatkan pada klien	Pemeriksaan penunjang lain adalah USG untuk memeriksa oligohidramnion, usia kehamilan, dan kondisi fetus

2	Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah dr. Adjidarmo kabupaten lebak	Omo Suto mo, Kadar Kuswandi	2015	Pemeriksaan fisik	pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis KPD	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan case control	Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah data skunder pada buku register ibu hamil di ruang bersalin, dengan menggunakan format pengumpulan data yang disesuaikan dengan variabel yang diperlukan	Diagnosis KPD ditegakan dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien.
3	Buku ajar Ketuban Pecah Dini	Ryan Saktika	2019	pemeriksaan laboratorium	Pemeriksaan laboratorium akan menghasilkan data-data yang membantu menegakkan diagnosis	Belum menjelaskan secara lengkap tentang pemeriksaan laboratorium	Menguraikan tentang tujuan dari pemeriksaan laboratorium bagi pasien yang mengalami KPD	Pemeriksaan laboratorium mempunyai peranan untuk menegakkan diagnosis KPD



4	Tehnik pemeriksaan fisik	Ratna Hidayanti	2019	pemeriksaan fisik	<b>Pemeriksaan fisik bertujuan sebagai tindakan yang dapat mengumpulkan data-data</b> berupa data subjektif/ pernyataan klien, serta data keluarga	Belum menjelaskan secara lengkap tujuan pemeriksaan fisik untuk klien	Mampu menguraikan penjelasan mengenai pemeriksaan fisik serta data-data yang bisa didapatkan pada klien	Pemeriksaan fisik merupakan tindakan berkelanjutan untuk mengidentifikasi berbagai macam data yang dibutuhkan para tenaga kesehatan
5	Hubungan antara ketuban pecah dini dengan persalinan prematur di rumah sakit mutiara bunda salatiga	Ni Wayan Raina Purwahati , Eko Mardiyani , Wulansari	2015	Pencegahan postnatal	Pencegahan postnatal berupa resusitasi dan perawatan bayi prematur, pemberian nutrisi yang adekuat dan penjelasan pada orang tua penderita tentang perannya dalam mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang pada bayi prematur	Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan menggunakan desain cross sectional	Desain penelitian analitik observasional dengan cross sectional dengan sampel 78 responde	Untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas pada kelahiran prematur diperlukan tindakan resusitasi dengan menggunakan peralatan resusitasi dengan benar pada bayi baru lahir

6	Teknik pemeriksaan fisik	Renny Novi Puspitasari	2019	Penatalaksanaan ketuban pecah dini	Penatalaksanaan KPD menurut Manuaba (2009) tentang penatalaksanaan KPD adalah : pada umur kehamilan 24-32 minggu yang menyebabkan menunggu berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untuk melakukan induksi persalinan, dengan kemungkinan janin tidak dapat diselamatkan	Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan menggunakan simple random sampling	Sampel telah diambil sejumlah 59 responden dari 143 populasi, mulai dari Maret 2017 hingga Maret 2018	Resiko infeksi ibu dan bayi meningkat pada ketuban pecah dini. Pada ibu terjadi korioamnionitis. Pada bayi dapat terjadi septikemia pneumonia, omfalitis
7	Hubungan antara Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) dengan Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	Afifatul Azisyah, Sri Wahyuni, Hernandia Distinarista	2019	penatalaksanaan yang bisa diberikan	tatalaksana Non Farmakologi yaitu terapi kognitif-perilaku dan terapi suportif	Desain dalam penelitian ini menggunakan metode survey analitik melalui pendekatan cross sectional	sampel pada penelitian ini ada 40 responden dengan teknik total sampling . Data yang di peroleh di olah statistic menggunakan uji Lambda.	Kecemasan adalah suatu kondisi emosional seseorang yang tidak menyenangkan yang di tandai dengan rasa takut dan khawatir pada diri individu.

### G. Langkah VII Evaluasi

Mengevaluasi semua perencanaan dan pelaksanaan pasien pada akseptor KB IUD dengan spotting berdasarkan referensi yang telah didapatkan

No	Judul	Oleh	Tahun	General idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Evaluasi dosis antibiotik pada pasien KPD di Instalasi Rawat Inap RSI Sultan Agung Semarang dan RSUD Tugurejo	Adilina Taufikarani	2018	Adilina Taufikarani Evaluasi dosis antibiotic	berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan kesimpulan bahwa antibiotik yang diberikan terhadap KPD kurang efektif	Metode yang digunakan yaitu non eksperimental karena tidak adanya perlakuan terhadap subjek uji	Populasi adalah seluruh subyek penelitian dan sampel yaitu pasien anak yang menderita tifus yang tercatat pada rekam medis Instalasi Rawat Inap RSI Sultan Agung Semarang dan RSUD Tugurejo	Penggunaan antibiotik yang rasional diharapkan memberikan dampak positif antara lain mengurangi mortalitas, kerugian ekonomi, dan mengurangi angka kejadiann resistensi bakteri terhadap antibiotic

2	Analiasa Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2019	Ikrawanty Ayu W, Melisa Febrianti, Ana Octaviani	2019	Analisa yang berhubungan dengan KPD	dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa usia dapat mempengaruhi KPD hal ini berdasarkan banyaknya ibu yang mengalami KPD sebanyak 12 (44%) hal ini menunjukkan usia ibu yang <20 tahun termasuk usia rentan untuk melahirkan sehingga mengalami ketuban pecah dini (KPD). Sedangkan usia >35 tahun tergolong usia yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan beresiko tinggi mengalami ketuban pecah dini (KPD).	Penelitian ini menggunakan Metode penelitian analitik dengan menggunakan pendekatan Cross Section	jumlah sampel 275 orang dengan menggunakan teknik Random sampling. Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square	Dengan adanya evaluasi maka tim kesehatan dapat mengetahui gambaran keadaan umum klien
3	Asuhan kebidanan pada KPD di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto	Dwi Khofida Sari	2016	Asuhan yang bisa diberikan	melakukan pendekatan kepada ibu dan keluarga, memantau TTV, menjaga pasien tetap bersih dan kering, memantau his tiap 30 menit,	Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus	Subyek yaitu pasien yang masih dalam perawatan di rumah sakit	Dengan adanya evaluasi maka tim kesehatan dapat mengetahui gambaran keadaan umum

					pemberian drip oksitosin tiap 2,5 unit oksitosin dalam infus RL 1 flash (500 ml) 10 tetes/menit			klien
4	Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien KPD di Kabupaten Garut pada Januari-Desember	Tita Puspita	2019	Evaluasi penggunaan antibiotik	Pada pasien <b>tepat indikasi, tepat dosis</b> ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam.	Metode yang digunakan berdasarkan data-data yang sudah ada tanpa adanya intervensi terhadap subyek uji	Sampel yang digunakan adalah pasien KPD yang terdiagnosis mengalami KPD yang ditunjang dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium	Tepat obat, tepat dosis, dan tepat indikasi adalah ketika obat yang diberikan sesuai.
5	Evaluasi pemberian antibiotik pada pasien KPD di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor	Lusi Indriani	2020	Evaluasi pemberian antibiotik	Berdasarkan hasil evaluasi pada kehamilan 32 minggu dilakukan tindakan konservatif, yaitu pemberian antibiotik selama 5 hari dan glukokortikosteroid seperti deksametason 3x5 mg selama 2 hari.	Metode yang digunakan dengan observasional non-eksperimental	Populasi dalam penelitian adalah seluruh pasien KPD dan menjalani pengobatan antibiotic.	Pemberian antibiotik menunjukkan terbukti efektif terhadap pencegahan infeksi.

6	Tingkat kecemasan ibu terhadap KPD	Ayatul Husna	2016	Evaluasi kembali pengetahuan ibu tentang KPD	Terlaksannya pemberian dukungan dan pemahaman yang diberikan suami dan keluarga kepada ibu terutama memberi dukungan psikologis.	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian survei analitik, dengan menggunakan pendekatan cross sectional	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mengalami KPD di Puskesmas Gedong Tengen Yogyakarta pada bulan April 2017	tingkat kecemasan ibu berkurang
7	Tinjauan pola penggunaan antibiotik di RSUP dr. Kariadi Semarang Tahun 2009	Truly Dian Anggraini	2013	Evaluasi pemberian antibiotik	Berdasarkan hasil evaluasi <b>maka didapatkan antibiotik yang efektif terhadap pasien KPD</b> yaitu antibiotik seperti ampicillin dan erythromycin mampu mencegah terjadinya infeksi	Metode penelitian yang digunakan yaitu non-eksperimental dengan pengambilan data dari catatan rekam medic	Populasi dalam penelitian yaitu pasien KPD	pemberian antibiotik pada pasien dengan yang tercantum pada standar prosedur operasional yaitu jauh lebih singkat

8	Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien KPD	Sri Rahayu	2019	Evaluasi penggunaan antibiotik	Pada pasien <b>tepat indikasi, tepat dosis</b> ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam.	Metode yang digunakan berdasarkan data-data yang sudah ada tanpa adanya intervensi terhadap subyek uji	Sampel yang digunakan adalah pasien KPD yang terdiagnosis mengalami KPD yang ditunjang dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Laboratorium	Tepat obat, tepat dosis, dan tepat indikasi adalah ketika obat yang diberikan sesuai.
---	--	------------	------	--------------------------------	--	--	--	---



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pembahasan Hasil Telaah *Evidence Based* asuhan 7 langkah Varneyberdasarkan Hasil penelusuran Referensi

##### 1. Langkah 1: Identifikasi Data Dasar

Pada langkah pertama ini identifikasi dilakukan segera pada ketuban pecah dini, semua informasi akurat dan lengkap dikumpulkan dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Didalam langkah ini akan diperoleh berbagai referensi tentang definisi, tanda dan gejala, serta faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan dari referensi matriks langkah I diatas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi, tanda dan gejala dan faktor penyebab ketuban pecah dini.

Menurut penelitian Legawati dan Riyanti (2018), Penyebab Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah multi faktor dan faktor risiko yang berhubungan dengan ini adalah infeksi intra amniotik, abrupsio plasenta dan prosedur invasiv uterin (amniocentesis, Cardosentesis, Choriotic Villus Sampling and Cervikal Carelage), penyebab dari KPD masih belum jelas, maka tindakan preventive tidak dapat dilakukan, kecuali dalam usaha menekan terjadinya infeksi.

Menurut penelitian Nia Aprilia (2017) Ketuban pecah dini (KPD) adalah pecahnya selaput ketuban sebelum ada tanda-tanda persalinan, dimana pada kasus ketuban pecah dini (KPD) banyak ditemukan pada ibu yang mempunyai riwayat KPD Wanita yang mengalami KPD pada kehamilan sebelumnya, maka pada kehamilan berikutnya akan lebih berisiko mengalaminya kembali antara 3-4 kali dari pada wanita yang tidak mengalami KPD sebelumnya, karena komposisi membran yang menjadi mudah rapuh dan kandungan kolagen yang semakin menurun pada kehamilan berikutnya.



Menurut penelitian Omo Sutomo Kadar Kuswandi (2013) factor predisposisi yang dapat diidentifikasi penyebab KPD ialah infeksi, golongan darah ibu dan anak tidak sesuai, multigrafida, merokok, defisiensi gizi khususnya vitamin C, servik yang tidak inkopeten, polihidramnion, riwayat KPD sebelumnya, kelainan selaput ketuban, tekanan intra uterin yang meninggi atau overdistesi, trauma, kelainan letak. Insiden KPD bervariasi, pada kehamilan aterm insidennya antara 1-19 %, sedangkan pada kehamilan aterm insidennya sebesar 2 % dari semua kehamilan.

Menurut penelitian Betty Nir Susanti & dkk (2017) Pada kasus presentasi janin tidak normal (muka, dahi, bokong) lebih besar mengalami ketuban pecah dini sebesar 4% dibandingkan dengan yang tidak mengalami ketuban pecah dini (KPD)(kontrol) sebesar 1,5%. Hasil uji statistik diperoleh p value 0.227 dengan menggunakan alpha 5% (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa presentasi janin tidak berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini (KPD).

Menurut penelitian Budi Rahayu, Ayu Novita Sari (2017) umur kehamilan 37-42 minggu Saat mendekati persalinan terjadi peningkatan matrix metalloproteinase yang cenderung menyebabkan KPD dan pada trimester akhir akan menyebabkan selaput ketuban mudah pecah dikarenakan pembesaran Selaput ketuban mudah pecah dikarenakan pembesaran uterus, kontraksi rahim, dan gerakan janin. Hal ini juga menunjukkan bahwa semakin tua umur kehamilan akan mengakibatkan pembukaan serviks dan peregangan selaput ketuban yang berpengaruh terhadap selaput ketuban sehingga semakin melemah dan mudah pecah.

Menurut penelitian Ni Wayan Raina Purwahati & dkk (2017) Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan faktor utama penyebab infeksi pada kehamilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diperkirakan infeksi intrauterin akibat KPD dapat menyebabkan kelahiran prematur. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa usaha untuk menghindari ketuban pecah dini adalah menghindari kerja berat dan

hubungan seksual pada bulan-bulan terakhir kehamilan, menjaga kebersihan umum/alat reproduksi karena pecahnya kulit ketuban kadang-kadang didahului cervicitis atau amnionitis.

Menurut penelitian Afifatul Azisyah & dkk (2019) gejala KPD sama seperti ketuban pecah sebagai tandamelahirkan, yaitu kebocoran cairan dari vagina. Air ketuban biasa keluar menetes bocor, mengalir, atau menyembur kuat seperti air kencing. Ketuban pecah dini merupakan sumber persalinan prematuritas. Selain itu dapat dijumpai juga sebagai sumber infeksi puerperalis (nifas), peritonitis, septicemia, dan partus kering atau dry labor (Manuaba, 2010). Infeksi dalam rahim membahayakan ibu dan janin yang akan menyebabkan penyulit pada persalinan bahkan kematian. Infeksi pada ibu bisa terjadi pada masa antenatal, intranatal dan postnatal. Salah satu penyebab infeksi adalah infeksi pada masa nifas yang dapat terjadi karena pertolongan persalinan yang tidak bersih dan aman, partus lama, ketuban pecah dini atau sebelum waktunya dan sebagainya (Prawiroharjo, 2008).

Jadi dapat disimpulkan bahwa banyaknya hasil penelitian diatas yang membahas tentang ketuban pecah dini (KPD) mulai dari pengertian, tanda dan gejala serta faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini (KPD) beberapa faktor penyebab terjadinya ketuban pecah dini (KPD) penyebab dari KPD masih belum jelas, maka tindakan preventive tidak dapat dilakukan, kecuali dalam usaha menekan terjadinya infeksi. Dari hasil penelitian yang terdapat yang terdapat di atas beberapa hasil penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian lainnya, dari hal ini tindakan yang perlu dilakukan bidan ataupun tenaga kesehatan lainnya yaitu membrikan edukasi lebih mendalam mengenai ketuban pecah dini (KPD) sehingga masyarakat lebih memahami mengenai ketuban pecah dini (KPD) dan dapat melakukan hal-hal yang dapat mencegah terjadinya ketuban pecah dini (KPD).

## 2. Langkah II: Perumusan Diagnosis/Masalah Aktual

Pada langkah ini bidan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Penegakan diagnosis dilakukan berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan sehingga mengetahui bahwa ketuban pecah dini (KPD). Dikemukakan setiap referensi yang ditemukan dan disimpulkan perbedaan dan persamaan dari setiap data diagnosis dari sumber referensi yang satu dengan referensi yang lainnya.

Menurut penelitian Eka Frelestanty, Yunida Haryanti (2019) dapat diketahui bahwa pemeriksaan dengan kertas lakmus mampu mendiagnosa terjadinya ketuban pecah dini (KPD). Pemeriksaan secara langsung cairan ketuban dapat dilakukan setelah pemasangan speculum steril dan menggunakan kertas lakmus/nitrazin test. Lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan kedalam cairan asam/basa. Ada dua macam kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Tes lakmus (tes nitrazin): jika kertas lakmus merah berubah menjadi biru menunjukkan adanya air ketuban (alkalis) karena pH air ketuban 7,0-7,5. Jika merah (asam) adalah air kencing/secret vagina ibu hamil pH 4,5-5,5.

Menurut penelitian Ikrawanty Ayu W & dkk (2019) diagnosis KPD ditegakkan dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti jumlah cairan yang hilang karena keluarnya sedikit cairan terus menerus dan perasaan basah pada celana dalamnya. Dalam anamnesis, pasien ketuban pecah dini (KPD) mengeluhkan sensasi basah dari vagina dan terasa sulit untuk berhenti berkemih. Perlu ditanyakan keberadaan darah yang ikut keluar dari vagina, riwayat berhubungan seks, serta demam.

Menurut penelitian Heny Sepduwiana (2013) pemeriksaan fisik dilakukan untuk dengan memeriksakan bagian dalam mulut rahim guna memastikan jika ketuban benar-benar sudah pecah. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan USG dalam

penegakkan diagnosis KPD jika anamnesis menunjukkan kecenderungan kuat kearah KPD, tetapi pemeriksaanfisik sulit atau tidak khas dalam mengkonfirmasi diagnosis, USG dapat digunakan untuk membantu penegakan diagnosis. USG dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi janin dan rahim, serta melihat jumlah air ketuban yang masih tersisa.

Menurut penelitian Ira Ayu Melisa & dkk (2019) dilakukan pemeriksaan inspekulo yang dilakukan untuk menegakkan diagnosis terjadinya ketuban pecah dini pada pasien. Pemeriksaan inspekulo adalah pemeriksaan fisik utama yang dilakukan untuk mengevaluasi ketuban pecah dini (KPD), pada pemeriksaan inspekulo dilakukan penilaian dilatasi dan pendataran serviks, serta adanya cairan yang terkumpul di vagina atau keluar dari serviks pada saat pasien batuk, uterus ditekan, atau saat gerakan fetus.

Menurut penelitian Angga Wiadnya & dkk (2013) penegakan diagnosis ketuban pecah dini (KPD) di tujukan untuk menentukan tatalaksana obstetri sesuai usia gestasi. Pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen, pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis KPD.

Menurut penelitian Hasnia NurLaili (2018) dalam menentukan diagnosis KPD pemeriksaan penunjang pertama dilakukan dengan menempatkan speculum(color bebek) ke dalam vagina dilakukan untuk memeriksa genangan air ketuban di dalamnya. Kemudian, dokter akan mengambil sampel air ketuban, dan memeriksa ada atau tidaknya infeksi yang disebabkan oleh ketuban pecah dini (KPD).

Menurut penelitian Durrotun Munnafiyah jumiyatun (2019) Kadar vitamin c yang rendah pada ibu dapat meningkatkan resiko terjadinya ketuban pecah dini sehingga asupan vitamin c pada ibu hamil harus terpenuhi.

Menurut penelitian Rizky Manda Beladina (2016) diagnosis KPD menggunakan tes amnicator dengan membasahi sampel air ketuban dengan

pewarna pendeteksi pH nitrazine kuning. Jika cairan bukan air ketuban, maka cairan tersebut akan berubah dari warna kuning menjadi biru-kuning atau biru tua. Kemudian dokter akan mengambil langkah yang tepat untuk mengatasinya.

Menurut penelitian Karma Ibrahim (2016) Bayi kurang bulan mempunyai pertahanan fisik yang lemah dan fungsi imunitas yang imatur, sehingga menyebabkan rentan terhadap invansi bakteri Analisis pertahanan fisik terhadap BBLR, KPD dan Persalinan prematur dengan kejadian sepsis. sehingga sangat rentan terjadinya ketuban pecah dini.

‘Pada pembahasan diatas dari beberapa penelitian dari jurnal dapat disimpulkan bahwa untuk menegakkan diagnosis ketuban pecah dini (KPD) dapat dilakukan dengan memerhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti jumlah cairan yang hilang karena keluarnya cairan terus menerus dan perasaan basah pada celana dalamnya dan tidak disertai his serta dapat dilakukan dengan pemeriksaan fisik pemeriksaan dengan USG dan pemeriksaan penunjang lainnya.

### **3. Langkah III: Perumusan Diagnosis/Masalah Potensial**

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosis atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan membutuhkan pencegahan. Bidan diharapkan waspada dan bersiap mencegah diagnosis/masalah potensial terjadi. Langkah ini akan menguraikan beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada ketubanpecah dini jika tidak ditangani dengan tepat.

Menurut penelitian Afifatul Hernandia (2019) komplikasi yang terjadi KPD dapat meningkatkan kecemasan yang disebabkan karena rasa takut dan sakit yang dapat meningkatkan pengeluaran adrenalin penyebab dari kecemasan juga dapat berdampak pada janin dan psikologis ibu.

Menurut penelitian Betty & dkk (2018) ketuban pecah dini (KPD) menimbulkan komplikasi morbiditas dan mortalitas maternal maupun perinatal. Anemia kehamilan dengan kadar hemoglobin < 11 gr/dl dapat meningkatkan komplikasi terhadap KPD dapat meningkatkan insiden ketuban pecah dini melalui mekanisme biologi dan mekanisme penyakit.

Menurut penelitian Juan Habli Soufal, Ariadi & dkk (2016) komplikasi yang terjadi pada ketuban pecah dini rentan mengalami masalah paru saat lahir, apabila ketuban pecah sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup banyak sehingga menghambat perkembangan paru-parunya. Komplikasi janin terkait ketuban pecah dini (KPD) dapat juga menyebabkan kematian janin. Menurut penelitian Suliswaty & Heny (2019) beberapa komplikasi yang dapat terjadi dari kondisi kantung ketuban pecah dini adalah infeksi pada janin yang dapat menyebabkan kematian janin, sindrom distres napas, infeksi polimikrobia intraamniotik, perdarahan intraventrikular, hipoplasia pulmonal, prolaps, prolaps tali pusat, dan malpresentasi janin.

Menurut penelitian Kadar Kuswandi (2015) analisis faktor yang terjadi pada KPD adanya infeksi pada selaput yang menyelubungi janin beresiko menimbulkan infeksi serius pada ibu dan janin, seperti pneumonia, meningitis hingga sepsis, prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, paru, deformitas ekstremitas dan menghambat perkembangan janin.

Menurut penelitian Nur Rohma Arulita Ika Fibriana (2018) komplikasi yang ditimbulkan kurangnya cairan ketuban pecah dini dapat membuat tali pusat tertekan oleh janin. Pada beberapa kasus, tali pusat bahkan keluar dari rahim dan turun menuju vagina. Kompresi tali pusat dapat menyebabkan cedera otak serius dan bahkan kematian yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas perinatal.

Menurut penelitian Sri lestari (2018) bayi yang terlahir prematur beresiko mengalami kelainan pada saraf, gangguan pernafasan. Ketuban pecah dini (KPD) dapat terjadi sebelum kehamilan berusia 24 minggu janin. Bayi yang terlahir

sebelum minggu ke 24 dan berhasil bertahan hidup, beresiko mengalami gangguan perkembangan, penyakit paru kronis, hidrosefalus, dan lumpuh otak.

Dari hasil berbagai penelitian di atas didapatkan bahwa ketuban pecah dini (KPD) dapat menyebabkan beberapa komplikasi yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Ketuban pecah dini (KPD) dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti meningkatkan kecemasan yang disebabkan karena rasa takut dan sakit yang dapat meningkatkan pengeluaran adrenalin, rentan mengalami masalah paru saat lahir, apabila ketuban pecah sebelum waktunya, janin akan kehilangan air ketuban yang cukup banyak sehingga menghambat perkembangan paruparunya, kematian janin, sindrom distres napas, infeksi polimikrobia intraamniotik, perdarahan intraventrikular, hipoplasia pulmonal, prolaps, prolaps tali pusat, dan malpresentasi janin. Bahkan kematian yang meningkatkan mortalitas dan morbiditas perinatal.

#### **4. Langkah IV: Tindakan Emergency/Kolaborasi**

Dari beberapa referensi matriks langkah IV di atas maka didapatkan tindakan emergency atau kolaborasi dengan dokter jika terjadi komplikasi pada pasien.

Menurut penelitian Yuni Marlinda Sari (2019) Tindakan pada komplikasi usia kehamilan aterm yaitu penatalaksanaan ketuban pecah dini (KPD) difokuskan pada induksi persalinan dengan oxytocin. Pemberian oksitosin untuk merangsang kontraksi atau his. Oksitosin diberikan dengan mencampur 2,5-5 unit oksitosin dalam 500 ml cairan kristaloid. Pemberian oksitosin intravena dimulai dengan 8 tetes per menit dan ditambahkan 4 tpm tiap 30 menit dengan dosis maksimal 20 tetes per menit.

Menurut penelitian N.L.Safitri & dkk (2017) tindakan pada komplikasi yang dapat dilakukan jika ketuban pecah dini terjadi saat usia kehamilan preterm yaitu mengkonfirmasi cairan ketuban, USG untuk memastikan usia kehamilan kehamilan dan jumlah cairan amnion, konfirmasi ada tidaknya infeksi, serta

terapi konsefvatif dengan pemberian uterorelaksan untuk menunda proses persalinan, pemebrian antibiotik sebagai profilaksis, dan kortokosteroid untuk pematangan paru janin.

Menurut penelitian Sudarto dan Tunut (2016) tindakan yang bisa diberikan Risiko terjadinya ketuban pecah dini pada kehamilan 34- 36 minggu berikan antibiotic menggunakan kombinasi ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam. Diikuti dengan amoxicillin 250 mg + erythromycin 333 mg setiap 8 jam selama 5 hari. Penatalaksanaan KPD usia kehamilan > 35 minggu lakukan induksi, bila gagal dilakukan seksio cesarea. Untuk mencegah terjadinya infeksi.

Menurut penelitian Zainal Alim, Yeni Agus Safitri (2015) tindakan pada komplikasi koriomnionitas pada penderita koriomnionitis, persalinan perlu dilakukan segera. Pada pasien ini juga disarankan pemberian antibiotic dan kortikosteriod untuk mempercepat pematangan paru paru janin, agar dapat secepatnya dilahirkan. Untuk mencegah infeksi, dokter juga akan memberikan antibiotik. Setelah janin dirasa sudah siap untuk dilahirkan, baru dokter akan melakukan prosedur induksi.

Menurut penelitian Niar Malik (2017) beresiko mengalami gangguan pernafsan penanganan yang dapat dilakukan bayi terlahir prematur disebabkan KPD, harus dirawat di ruang NICU atau *neonatal intensive care unit*, yakni ruangan khusus bagi bayi yang baru lahir dan mengalamimasalah kesehatan.

Menurut penelitian Kadar & dkk (2013) penatalaksaan ketuban pecah dini pada perempuan hamil usia 37 tahun Penatalaksanaan yang bisa dilakukan dilakukan observasi tanda vital ibu, observasi DJJ, His, pemberian cairan maintenance RL 20 tetes/menit, injeksi ampicilin 1 g/ 8 jam IV dan direncanakan untuk terminasi per vaginam.

Menurut penelitian Muntari (2018) hubungan antara ketuban pecah dini dengan kejadian asfiksia ketuban pecahn dini mempengaruhi asfiksia karena



terjadinya oligohidromnion yang menekan tali pusat sehingga talipusat mengalami penyempitan dan aliran darah yang membawa oksigen ibu ke bayi terhambat sehingga menimbulkan asfiksia neonatorum atau hipoksia pada janin, tindakan yang dapat diberikan melakukan pengawasan antenatal yang adekuat dan melakukan koreksidini mungkin terhadap setiap kelainan yang terjadi.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penanganan atau tindakan yang berkaitan dengan ketuban pecah dini (KPD) bidan dapat menjadi pendiagnosa dasar dalam kasus ketuban pecah dini (KPD) dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian melakukan tindakan atau penanganan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya sesuai tindakan klinis yang dialami pasien.

Induksi persalinan adalah upaya untuk melahirkan pervaginam dengan merangsang timbulnya his bagi ibu hamil yang belum inpartu sehingga terjadi persalinan. Tindakan diatas diberikan pada pasien yang mengarah mengalami komplikasi, tindakan segera/emergency merupakan tindakan untuk menangani pasien secara cepat dan tepat sebelum mengancam jiwa pasien.

## 5. Langkah V: Rencana Tindakan

Pada langkah ini dilakukan perencanaan yang menyeluruh, ditentukan langkah- langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi atau data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Pada langkah ini akan diuraikan beberapa referensi yang mencakup penatalaksanaan pada kasus ketuban pecah dini (KPD).

Berdasarkan dengan referensi matriks langkah V diatas maka didapatkan beberapa penatalaksanaan pada kasus ketubn pecah dini (KPD), semua rencana asuhan yang dilakukan tersebut berdasarkan pengetahuan, teori yang berkaitan dan terbaru. Penatalaksanaan pada pasien KPD adalah dilakukan dengan observasi, teraupitik, edukasi, dan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya.

Menurut penelitian Iis Trisnawati Dumilah Mardianti (2019) Penatalaksanaan KPD dilakukan dengan cara akselerasi persalinan dengan oxytocin namun waktu keputusan penatalaksanaan lambat. Masih adanya tindakan yang menyebabkan resiko infeksi pada ibu meningkat dan asuhan persalinan tidak sesuai standar.

Menurut penelitian Syifa Saras Arani 2020 penatalaksanaan KPD dilakukan dengan observasi keadaan pasien, melakukan komunikasi teraupitik kepada pasien untuk mendorong dan menganjurkan kerja sama antara bidan dan pasien melalui hubungan bidan dan pasien. Komunikasi teraupitik membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan fikiran serta dapat mengambil tindakan yang efektif untuk pasien. Membrikan edukasi kepada pasien tentang kasus yang dialaminya dan melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lainnya.

Menurut penelitian ketut surya Ryan Saktika Evert Solomon 2017 penatalaksanaan yang dilakukan pada kehamilan Aterm dengan ketuban pecah dini yaitu memperlambat kelahiran bayi lahir dan melakukan persiapan pematangan paru bayi jika kelahiran tak bisa dihindari.

Diberikan antibiotik profilaksis, Ampisilin 4 x 500 mg selama 7 hari untuk mencegah terjadinya infeksi pada pasien dan janin.

Menurut penelitian Renny Novi Puspitasari (2019) penatalaksanaan ketuban pecah dini pada umur kehamilan 24-32minggu yang menyebabkan menunggu berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untukmelakukan induksi persalinan, dengankemungkinan janin tidak dapat diselamatkan.

Menurut penelitian Ibrahim (2016) hubungan ketuban pecah dini dan kehamilan Aterm Penanganan yang bisa dilakukan Dilakukan pemeriksaan "admission test" bila hasilnya patologis dilakukan terminasi kehamilan dengan melakukan persalinan induksi untuk mempercepat proses persalinan. Hal yang perlu digaris bawahi, prosedur induksi tidak boleh dilakukan sembarangan, sebab banyak resiko yang bisa terjadi pada pasien nantinya.

Menurut penelitian Nursasmita (2018) tindakan yang bisa dilakukan diberikan kortikosteroid (untuk UK kurang dari 35 minggu) :Deksametason 5 mg setiap 6 jam untuk mengurangi angka motalitas dan morbiditas.

Dari hasil penelitian diatas perencanaan atau intervensi dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasien dan usia kehamilan pasien. Penanganan yang bisa di lakukan bidan dan tenaga medis lainnya tergantung keadaan klinis pasien apakah usia kehamilan preterm atau aterm. Untuk pencegahan dan penanganan ketuban pecah dini diperlukan kesadaran pasien. Dan tenaga kesehatan memberikan edukasi lebih menyeluruh tentang ketuban pecah dini (KPD) sehingga ibu lebih mengerti tentang ketuban pecah dini (KPD).

## 6. Langkah VI: Implementasi

Berdasarkan dengan referensi diatas maka didapatkan beberapa implementasi yang dapat diberikan pada klien dengan ketuban pecah dini (KPD) yaitu pemeriksaan kepada klien dan menjelaskan hal-hal yang dianggap penting, agar klien dapat mengetahui keadaannya serta penatalaksanaan untuk mencegah munculnya komplikasi. Implementasi berupa pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, dan pemberian antibiotik bagi klien yang mengalami ketuban pecah dini.

Menurut peneilitian Ratna Hidayati Pemeriksaan penunjang Untuk memastikan cairan yang keluar merupakan cairan amnion dapat dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang, seperti uji nitrazine, *fern test*, dan alfa mikroglobulin-1. Pemeriksaan penunjang lain adalah USG untuk memeriksa 2oligohidramnion, usia kehamilan, dan kondisi fetus.

Menurut penelitian Omo Sutomo & dkk pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis KPD.

Menurut penelitian Ryan Saktika 2019 dalam Buku ajar Ketuban Pecah Dini berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetric dan pemeriksaan penunjang lainnya akan menghasilkan data-datayang membantu menegakkan diagnosis ketuban pecah dini (KPD).

Menurut penelitian Ratna Hidayanti 2019 pemeriksaan inspekulo adalah pemeriksaan fisik utama yang dilakukan untuk mengevaluasi ketuban pecah dini (KPD). Pada pemeriksaan ini dilakukan penilaian dilatasi dan pendataran serviks, yang bertujuan sebagai tindakan yang dapat

mengumpulkan data data berupa data subjektif atau pernyataan klien, serta data keluarga.

Menurut penelitian Ni Wayan Raina & dkk (2015) bayi yang lahir prematur memiliki resiko kematian yang lebih tinggi, resiko penyakit, disabilitas dalam hal motorik jangka panjang, kognitif, visual, pendengaran, sikap, emosi sosial, kesehatan, dan masalah pertumbuhan jika dibandingkan bayi normal. Pencegahan postnatal berupa resusitasi dan perawatan bayi prematur, pemberian nutrisi yang adekuat dan penjelasan pada orang tua penderita tentang perannya dalam mencegah terjadinya gangguan tumbuh kembang pada bayi prematur.

Menurut penelitian Renny Novi Puspitasari Penatalaksanaan ketuban pecah dini. Pada pasien yang belum aterm, penatalaksanaan bergantung pada klinis masing masing pasien. Menurut Manuaba (2009) tentang penatalaksanaan KPD pada umur kehamilan 24-32 minggu yang menyebabkan menunggu berat janin cukup, perlu dipertimbangkan untuk melakukan induksi persalinan, dengan kemungkinan janin tidak dapat diselamatkan.

Menurut penelitian Afifatul Azisyah, Sri Wahyuni, Hernandia Distinarista 2019 tatalaksana Non Farmakologi yaitu terapi kognitif-perilaku dan terapi suportif. Memberikan edukasi tentang ketuban pecah dini kepada pasien dan menganjurkan kepada keluarga pasien agar mensupport pasien tiap saat.

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah ditemukan dari beberapa penelitian ataupun buku dapat disimpulkan bahwa implementasi yang baik dapat dilakukan dengan cara pendidikan kesehatan mengenai keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang maupun kolaborasi serta melakukan rujukan, untuk lebih mempertegas mengenai diagnosa ketuban pecah dini, agar dapat dilakukan penanganan yang sesuai dan dilakukan dengan baik.

## 7. Langkah VII: Evaluasi

Berdasarkan dari referensi di matriks langkah VII diatas maka didapatkan evaluasi yang telah dilakukan dalam pengkajian pada pasien yang mengalami ketuban pecah dini yaitu evaluasi pemberian antibiotik berdasarkan tepat dosis, tepat indikasi, tepat antibiotik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik dan evaluasi tanda-tanda vital.

Menurut penelitian Adilina Taufik arani 2018 Evaluasi dosis antibiotik padapasien KPD di Instalasi Rawat Inap RSI Sultan Agung Semarang dan RSUD Tugurejo Evaluasi dosis antibiotic berdasarkan hasil Evaluasi maka didapatkan kesimpulan bahwa antibiotik yang diberika terhadap KPD kurang efektif.

Menurut penelitian Ikrawanty Ayu W, Melisa Febrianti, Ana Octaviani Analisa yang berhubungan dengan KPD dari hasil penelitian dapat dianalisa bahwa usia dapat mempengaruhi KPD hal ini berdasarkan banyaknya ibu yang mengalami KPD sebanyak 12 (44%) hal ini menunjukkan usia ibu yang <20 tahun termasuk usia rentan untuk melahirkan sehingga mengalami ketuban pecah dini ( KPD). Sedangkan usia >35 tahun tergolong usia yang terlalu tua untuk melahirkan khususnya pada ibu primi (tua) dan beresiko tinggi mengalami ketubanpecah dini (KPD).

Menurut penelitian Dwi Khofida Sari (2016) Asuhan yang bisa diberikan melakukan pendekatan kepada ibu dan keluarga, memantau TTV, menjaga pasien tetap bersih dan kering, memantau his tiap 30 menit, pemberian dripoksitosin tiap 2,5 unit oksitosin dalam infus RL 1 flash (500 ml) 10 tetes/menit.

Menurut penelitian Tita Puspita 2019 Evaluasi penggunaan antibiotik Pada pasien tepatindikasi, tepat dosis ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam.

Menurut penelitian Lusi Indriani 2020 Evaluasi pemberian antibiotik Berdasarkan hasil evaluasi pada kehamilan 32 minggu dilakukan tindakan konservatif, yaitu pemberian antibiotik selama 5 hari dan glukokortikosteroid seperti deksametason 3x5 mg selama 2 hari.

Menurut penelitian Ayatul Husna 2016 Evaluasi kembali pengetahuan ibutentang KPD Terlaksannya pemberian dukungan dan pemahaman yang diberikan suami dan keluarga kepada ibu terutama memberi dukungan psikologis.

Menurut penelitian Truly Dian Anggraini Evaluasi pemberian antibiotik Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan antibiotik yang efektif terhadap pasien KPD yaitu antibiotik seperti ampicillin dan erythromycin mampu mencegah terjadinya infeksi.

Berdasarkan hasil evaluasi maka didapatkan antibiotik yang efektif terhadap ketuban pecah dini (KPD) yaitu antibiotik seperti ampicilin dan erythromycin mampu mencegah terjadinya infeksi (Truly Dian Anggraini, 2013). Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien tepat indikasi, tepat dosis ampicillin 2 gram + erythromycin 250 mg intravena setiap 6 jam selama 48 jam ( Tita Puspita, 2019).

Evaluasi tanda tanda vital pada ketuban pecah dini masih dalam batas normal asuhan yang diberikan melakukan pendekatan kepada ibu dan keluarga, memantau TTV, menjaga pasien tetap bersih dan kering, memantau his tiap 30 menit pemberian drip oksitosin tiap 2,5 unit oksitosin dalam infus RL 1 flash (500ml) 10 tetes/menit (Dwi Khofida Sari, 2016).

Berdasarkan referensi diatas maka hal-hal yang harus dievaluasi pada pasien KPD yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, komplikasi KPD dan penggunaan antibiotik. Pemeriksaan tanda-tanda vital dilakukan untuk mengetahui tingkat keadaan pasien selama mendapatkan perawatan seperti tanda- tanda vital dalam batas normal atau tidak dalam batas normal.

Pemeriksaan laboratorium berguna dalam menegakkan diagnosa pasien yang mengalami ketuban pecah dini. Pada pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dimaksudkan untuk melihat jumlah cairan ketuban dalam kavum uteri. Dikenal tiga cara pengukuran cairan ketuban, yaitu secara subyektif, semikuantitatif (pengukuran satu kantong), dan

pengukuran empat kuadran menurut Phelan. Evaluasi komplikasi sangat bermanfaat agar petugas kesehatan dapat mengetahui tingkat efektifitas selama mendapatkan perawatan secara intensif. Komplikasi ketuban pecah dini sangat berbahaya bagi ibu dan janin jika terlambat mendapatkan penanganan segera. Penggunaan antibiotik pada ketuban pecah dini perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat kesembuhan klien seperti tepat indikasi, dosis dan tepat antibiotik.

## **B. Implikasi kebidanan**

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan keadaan pecahnya selaput ketuban sebelum persalinan. Pecahnya selaput ketuban berkaitan dengan perubahan proses biokimia yang terjadi dalam kolagen matriks ekstraselular amnion, korion, dan apoptosis membran janin (Jannah, 2018). Ketuban Pecah Dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim, sehingga memudahkan terjadinya infeksi asenden. Masalah KPD berkaitan dengan keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kehamilan berusia 22 minggu, ketuban dinyatakan pecah jika terjadi sebelum



proses persalinan berlangsung dan pecahnya selaput ketuban dapat terjadi pada kehamilan preterm sebelum kehamilan 37 minggu maupun kehamilan aterm (Saifudin, 2010).

Faktor penyebab pasti ketuban pecah dini (KPD) sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Adapun penyebab terjadinya ketuban pecah dini menurut (Manuaba, 2007) yaitu sebagai berikut:

- a. Multipara dan Grandemultipara
- b. Hidramnion
- c. Kelainan letak sungsang atau lintang
- d. Cephalo Pelvic Disproportion (CPD)
- e. Kehamilan ganda
- f. Pendular abdomen (perut gantung).

Adapun hasil penelitian yang dilakukan (Rahayu dan Sari 2017) mengenai penyebab kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin bahwa kejadian KPD mayoritas pada ibu multipara, usia ibu 20-35 tahun, umur kehamilan  $\geq 37$  minggu, pembesaran uterus normal dan letak janin preskep. Tanda yang terjadi adalah keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis dan tidak seperti bau amoniak, berwarna pucat, cairan ini tidak akan berhenti atau kering karena uterus diproduksi sampai kelahiran mendatang. Tetapi, bila duduk atau berdiri kepala janin yang sudah terletak dibawah biasanya “menganjal atau menyumbat” kebocoran untuk sementara. Sementara itu demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi (Sunarti, 2017).

Adapun pengaruh KPD terhadap ibu dan janin menurut (Sunarti, 2017) yaitu

a. Prognosis ibu

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada ibu yaitu infeksi intrapartal dalam persalinan, infeksi puerperalis/masa nifas, dry labour/partus lama, perdarahan post partum, meningkatkan tindakan operatif obstetric (khususnya SC), morbiditas dan mortalitas maternal.

b. Prognosis janin

Komplikasi yang dapat disebabkan KPD pada janin itu yaitu prematuritas (sindrom distes pernapasan, hipotermia, masalah pemberian makanan neonatal), retinopati prematurit, perdarahan intraventrikular, enterocolitis netroticing, gangguan otak dan resiko cerebral palsy, hyperbilirubinemia, anemia, sepsis, prolapse funiculi/penurunan tali pusat, hipoksia dan asfiksia sekunder pusat, prolapse uteri, persalinan lama, skor APGAR rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intracranial, gagal ginjal, distress pernafasan), dan oligohidromnion (sindrom deformitas janin, hypoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin, hypoplasia paru, deformitas ekstremitas dan pertumbuhan janin terhambat), morbiditas dan mortalitas perinatal (Marni dkk, 2016).

Pemeriksaan sederhana yang bisa dilakukan untuk menentukan apakah cairan tersebut berasal dari ketuban pecah atau bukan adalah dengan melihat langsung menggunakan bantuan speculum , alat untuk memeriksa mulut rahim. Lam Sedangkan secara laboratorik, cairan ketuban tersebut bisa ditentukan dengan tes kertas nitrazin atau lebih dikenal dengan kertas lakmus. Warna kertas lakmus akan berubah menjadi biru apabila cairan ketuban.

Penanganan ketuban pecah dini dilakukan selama ini oleh para ahli dalam menghadapi kasus ketuban pecah dini adalah dengan

memperlambat bayi lahir dan melakukan persiapan pematangan paru bayi jika kelahiran tak bisa dihindari. Mencegah ketuban pecah dini mengingat ada begitu banyak resiko yang bisa muncul akibat ketuban pecah dini, setiap ibu hamil perlu mewaspadaai kondisi tersebut. Beberapa kelompok ibu hamil bahkan sangat dianjurkan untuk dapat mewaspadaai ketuban pecah dini, seperti, Ibu hamil dengan gizi yang kurang baik, Ibu hamil perokok, Ibu dengan penyakit infeksi menular seksual.

Mempunyai riwayat pecah ketuban pada kehamilan sebelumnya dan adanya perdarahan pervagina selama kehamilan. Bagi kelompok tersebut, alangkah baiknya konsultasi ke dokter untuk mendapat nasihat dalam merawat kehamilan dan pengobatan bila ada infeksi penyakit menular seksual. Bagi seseorang yang mengalami ketuban pecah berulang akibat mulut rahim lemah, akan dilakukan penjahitan mulut rahim saat usia kehamilan 4-5 bulan dan jahitan akan dibuka jika waktu persalinan tiba. Sebaiknya, bagi kelompok yang beresiko harus melakukan koreksi demi mencegga ketuban pecah awal.

Sedangkan bagi yang mempunyai riwayat mulut rahim lemah sebaiknya kurangi aktivitas yang berlebihan saat kehamilan memasuki usia 9 bulan, bila perlu mengambil cuti hamil sejak sebulan terakhir. Dengan adanya pengenalan faktor resiko ketuban pecah dini, diharapkan dapat menekan kejadian bayi lahir secara prematur dan menekan angka kesakitan dan kematian bayi. Tidak ada hal khusus yang dapat dilakukan untuk mencegah ketuban pecah dini (KPD).

## BAB V

### PENUTUP

Setelah mempelajari berbagai macam teori yang didapatkan dari referensi seperti jurnal maupun buku mengenai kasus ketuban pecah dini (KPD), sehingga penulis menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan dengan ketuban pecah dini (KPD) maka dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan referensi maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, faktor penyebab berbagai referensi tentang pasien yang mengalami ketuban pecah dini (KPD). Dari referensi didapatkan tanda dan gejala ketuban pecah dini atau KPD yaitu keluarnya cairan ketuban merembes melalui vagina, aroma air ketuban berbau amis adanya semburan cairan yang mendadak dari vagina yang terus menerus, panggul terasa tertekan, keputihan atau vagina terasa lebih basah, demam, bercak vagina yang banyak, nyeri perut, denyut janin bertambah cepat merupakan tanda-tanda infeksi yang terjadi. Faktor penyebab KPD masih belum jelas, namun ada beberapa kondisi yang beresiko menimbulkan ketuban pecah dini yaitu infeksi pada rahim, mulut rahim, atau vagina, mengalami perdarahan melalui vagina pada trimester kedua dan ketiga kehamilan, ibu hamil dengan berat badan yang kurang, atau mengalami kekurangan gizi, sedang hamil anak kembar, jarak antar kehamilan kurang dari 6 bulan, merokok atau menggunakan NAPZA pada saat hamil, pernah mengalami operasi atau biopsi pada mulut rahim dan pernah mengalami ketuban pecah dini atau KPD pada kehamilan sebelumnya.
2. Berdasarkan hasil referensi yang didapatkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan mendiagnosis ketuban pecah dini yaitu Diagnosis KPD ditegakan

dengan memperhatikan data hasil pengkajian terhadap riwayat klien seperti jumlah cairan yang hilang karena keluarnya sedikit cairan terus menerus dan perasaan basah pada celana dalamnya, warna dan bau cairan harus di perhatikan. Disamping itu pemeriksaan fisik dengan melakukan palpasi abdomen, pemeriksaan speculum steril serta uji laboratorium (uji pakis positif, uji kertas nitrizin positif, dan pemeriksaan specimen untuk kultur streptokokus Grup B) dapat membantu diagnosis KPD.

3. Masalah potensial yang bisa terjadi pada ketuban pecah dini (KPD) berdasarkan hasil referensi yaitu Pada ketuban pecah dini preterm terjadi risiko baik pada janin maupun pada ibu. Komplikasi maternal meliputi infeksi intrauterin, retensio plasenta, dan solusio plasenta; juga dilaporkan ada beberapa kasus sepsis dan kematian maternal. Pada kehamilan preterm angka insiden korioamnionitis sekitar 13-60% dan solusio plasenta terjadi pada 4-12% kehamilan dengan ketuban pecah dini. Komplikasi tersebut dapat terjadi jika pasien tidak mendapatkan perawatan secara intensif dan tindakan segera jika mengalami diantara komplikasi diatas.
4. Tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter berdasarkan referensi diatas yaitu melakukan ekstraksi vakum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu terutama pada KPD ketika telah terlihat adanya gawat janin, dan waktu persalinan kala yang terlalu lama. Terminasi juga dapat dilakukan persalinan dengan cara seksio sesarea yaitu pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Hal ini dilakukan dengan indikasi disproporsi sepelopelvik, gawat janin, plasenta previa, pernah seksio sesarea sebelumnya.
5. Rencana tindakan pada ketuban pecah dini yaitu pastikan diagnosis, tentukan umur kehamilan, evaluasi ada tidaknya infeksi maternal ataupun infeksi janin, apakah dalam keadaan inpartu dan terdapat kegawatan janin. Riwayat keluarnya air ketuban berupa cairan jernih keluar dari vagina yang kadang-

kadang yang disertai tanda-tanda lain dari persalinan. Bila air ketuban normal agaknya ketuban pecah dapat diragukan serviks. Penderita dengan KPD harus masuk rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Jika pada perawatan air ketuban berhenti keluar, pasien dapat pulang untuk rawat jalan. Bila terdapat persalinan dalam kala aktif, korioamnionitis, gawat janin, persalinan diterminasi. Bila ketuban pecah dini pada kehamilan premature, diperlukan penatalaksanaan yang komprehensif. Secara umum penatalaksanaan pasien KPD yang tidak dalam persalinan serta tidak ada infeksi dan gawat janin, penatalaksanaannya tergantung pada usia kehamilan. Cara persalinan pada kasus KPD, persalinan dapat diselesaikan dengan partus spontan, ekstraksi vakum, dan seksio sesarea. Rencana tersebut berguna untuk pasien agar dapat terhindar dari berbagai komplikasi yang dapat mengancam jiwa.

6. Tindakan yang dilakukan pada pasien ketuban pecah dini sesuai dengan intervensi yaitu Bidan diharapkan dapat melakukan penatalaksanaan ketuban pecah dini dengan berdasar atas diagnosa pasti dari hasil pemeriksaan. Jika umur kehamilan tidak diketahui secara pasti dapat dilakukan pemeriksaan Ultrasonografi.
7. Tindakan evaluasi pada kasus ketuban pecah dini (KPD) untuk mengetahui keadaan pasien dengan maksimal serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi. Kondisi klien baik dan tidak mengalami komplikasi serta kembali normal.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran antara lain:

### 1. Bagi peneliti

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih efektif, dengan melakukan penelitian dengan metode *surveillance* yang bersifat sosial dan tidak mengandalkan data dari rekam medik Rumah Sakit. Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil penelitian yang langsung observasional pasien yang mengalami tuban pecah dini agar hasilnya lebih efektif dan benar tentang mendiagnosis, pemberian tindakan dan penatalaksanaan untuk pasien tersebut.

### 2. Untuk Bidan

- a. Dalam melakukan tugas sebagai bidan untuk memberikan tindakan perlu diketahui rasional setiap tindakan yang diberikan kepada klien dan harus dengan persetujuan klien.
- b. Sebagai bidan dalam melakukan tindakan perlu membina hubungan yang baik antara klien ataupun keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan dalam merujuk sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang mengancam jiwa klien.

### 3. Untuk Institusi

Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perlu kiranya penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat bahwa proses sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan tenaga kesehatan yang berpotensi dan professional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, dkk, Karakteristik Luanan Kehamilan Dengan Ketuban Pecah Dini di RSUP Dr. Hasan Sadikin Periode Tahun 2013-2015. 2017.
- A, N., Wahyudin, E., & AM, N. (2017). Efektivitas Penggunaan MgSO<sub>4</sub> Sebagai Tokolitik Pada Ancaman Persalinan Prematur Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. *Majalah Farmasi Dan Farmakologi*, 21(3), 70–74. <https://doi.org/10.20956/mff.v21i3.6858>
- Afifatul,Hernandia Distinarista.2019.*Hubungan antara Kejadian Ketuban Pecah Dini(KPD) dengaTingkat Kecemasan pada Ibu Hamil di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*.Semarang, April 2019.
- Aisyah Siti dan Oktarina,Aini.”*perbedaan kejadian ketuban pecah dini Antara Primipara dan Multipara*”jurnal Midrop.Edisi 1 (2012).
- Alim, Zainal. Safitri, Yeni Agus. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Ketuban Pecah Dini Ibu Hamil Trimester III di Rumah Sakit Bantuan Lawang. Malang : Jurnal Hesti Wira Sakti, Volume 4, Nomor (1), 101-109.
- Angga Widnya, I Gede Ngurah Harry Wijaya Surya.*gambaran ketuban pecah dini pada kehamilan aterm di rsup sanglah tahun 2013*.E-JURNAL MEDIKA, VOL. 5 NO.10, OKTOBER, 2016.
- Aprilla Nia.2018. *Faktor Risiko Ibu Bersalin Yang Mengalami Ketuban Pecah Dini Di Rsud Bangkinang Tahun 2017*. Volume 2, Nomor 1.
- Arifah Istiqomah dkk.2017.*hubungan ketuban pecah dini (kpd) dengan kejadian asfiksia*.Akademi Kebidanan Ummi Khasanah, Jl. Pemuda Gandekan Bantul Yogyakarta.
- Ariana, Dhina Novi. (2011). Faktor Resiko Kejadian Persalinan Prematur (Studi di Bidan Praktek Mandiri Wilayah Kerja Puskesmas Geyer dan Puskesmas Toroh Tahun 2011). Semarang : Universitas Muhammadiyah Kedung Mundu Asrinah,dkk.*Asuhan kebidanan masa persalinan*.Yogyakarta:Graha Ilmu ,2010.
- Betty Nir Susanti, Atik Kridawati,Tri Budi Wahyuni Raharjo.*Analisis kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin di klinik pratama melania pademangan Jakarta utara tahun 2017*.Jurnal Formil (Forum Ilmiah) KesMas Respati, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018.
- Budi R, Ayu SN. 2017. *Studi deskriptif penyebab kejadian ketuban pecah dini ( KPD ) pada ibu bersalin*.
- Damarati (2012). *Analisis Tentang Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin Di RSUD Sidoarjo*.
- Dinas Kesehatan provinsi Sulawesi Selatan. *Profil kesehatan Sulawesi Selatan,2014*[http://depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KES\\_PROVINSI\\_2014/27\\_Sulawesi\\_Selatan\\_2014.pdf](http://depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_PROVINSI_2014/27_Sulawesi_Selatan_2014.pdf).



- Dinas kesehatan Kabupaten Gowa. Profil kesehatan Kabupaten Gowa, 2014. [http://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL\\_KAB\\_KOTA\\_2014/7306\\_Sulsel\\_Kab\\_Gowa\\_2014.pdf](http://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KAB_KOTA_2014/7306_Sulsel_Kab_Gowa_2014.pdf).
- Dwi Khofida Sari 2016. *Asuhan kebidanan pada ketuban pecah dini* di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Mojokerto
- Durrotun Munafiah jumiya 2019 *Manfaat vitamin C terhadap kejadian ketuban pecah dini* pada ibu bersalin di RSUD Dr. Soewondo Kendal.
- Ely Tjahjani. *gambaran umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan ibu bersalin terhadap kejadian kpd*. Akademi Kebidanan Griya Husada, Jl. Dukuh Pakis Baru II no.110 Surabaya.
- Eka Frelestanty, Yunida Haryanti 2019. *Analisis penyebab terjadinya ketuban pecah dini* pada ibu bersalin di RS PKU Muhammadiyah Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Fadlun. *Asuhan Kebidanan Patologis*. Jakarta; Salemba Medika, 2011.
- Fakhriyah N. 2008. *Hubungan Antara Persalinan Ketuban Pecah Dini Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum Di Rsud Dr. Soeselo Kabupaten Tegal*. [http://web.unikal.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/5.%20penaunikal\\_vol21\\_no1\\_jurnal\\_naty2%20.pdf](http://web.unikal.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/5.%20penaunikal_vol21_no1_jurnal_naty2%20.pdf).
- Fraser, D.M., & Cooper, M.A. (2009). *Buku Ajar Bidan Myles*. Sri Rahayu & Pamilih Eko Karyuni (penterjemah). Jakarta: EGC
- Fitrianti, Linda. (2014). *Paritas Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Hamil* di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Majapahit : Politeknik Kesehatan Majapahit.
- Fujiyarti, 2016. *Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini*. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*
- Forte, R. William. (2010). *Ilmu Kebidanan : Patologi & Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta : CV Andy Offset.
- Hastuti H, dkk. *Analis Faktor Risiko Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum Bahteramas*. 2016. <https://scholar.google.co.id>
- Hasnia NurLaili 2018. *Diagnosis ketuban pecah dini dengan speculum* pada ibu bersalin di RSUD Tugurejo Semarang
- Heny Sepduwiana. *Faktor Terjadinya Ketuban Pecah Dini pada Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu 201*. *Jurnal Maternity and Neonatal* Volume 1, No 3.
- Heryani, Reni. *Buku Ajar Konsep Kebidanan*. DKI Jakarta : CV Trans Info Media, 2011.
- Helen, 2008 *Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini*. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*.
- Hidayat, A. (2009). *Asuhan Patologi Kebidanan*. Edisi 1. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Huda. (2013). *Skripsi. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Ketuban Pecah Dini di RS PKU Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014* : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Isnaini, Nurul. (2015). Karakteristik Penyebab Terjadinya Ketuban Pecah Dini di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Lampung : Jurnal Kesehatan Holistik Vol 9, (4).

Iriyanti Bayu, dkk. Asuhan Kehamilan Berbasis Bukti. Jakarta : Sagung Seto, 2014.

Ira Ayu Melisa Febrianti & dkk 2019. Penerapan metode pemeriksaan fisik untuk mendiagnosa terjadinya ketuban pecah dini (KPD) pada ibu di RSUD Tugurejo Semarang

Iis Trisnawati 2019. Analisis penatalaksanaan Asuhan kebidanan pada Ny Y G3P2A0 dengan ketuban pecah dini di BPM Bidan R kabupaten Purwakarta Tahun 2017.

Ikrawaty Ayu. Faktor yang Berhubungan Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) di RSIA Sitti Khadijah I Makassar Tahun 2019. Vol 3, No.1, September 2019.

Irsam M, dkk. Jumlah Paritas Dan Anemia Sebagai Faktor Prediktor Kejadian Ketuban Pecah Dini. 2014. <https://scholar.google.co.id>.

Indrasari N. "Faktor Resiko Pada Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)." Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik 8.2 (2016): 114-123.

Jannah, Nurul. Buku Ajar Asuhan Kebidanan-Kehamilan. Yogyakarta : CV Andi Offset, 2012.

Juan Habli Soufal, Ariadi, Sofina Rusdan 2016 komplikasi ketuban pecah dini yang terjadi di RSUP Dr.M. Djamil Padang

Kadar Kuswandi 2015 Analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah dr. Adjidarmo kabupaten lebak tahun 2013

Karma Ibrahim 2016 BBLR, KPD dan Persalinan prematur dengan kejadian sepsis Neonatus di RSUD Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka tahun 2016

Kennedy dkk, 2013:2. Karakteristik Penyebab Terjadinya Ketuban Pecah Dini di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Holistik Jurnal Kesehatan; 9(4).

Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2013.

Fitria. Askeb II Persalinan. Yogyakarta: pustakapelajar.

Kuswanti, 2014 :3-4 . Ketuban Pecah Dini (kpd ) dan Kadar Leukosit Pada Ibu Bersalin , Malang : Poltekes Kemenkes Malang.

Kosim Sholeh M, Pemeriksaan Kekurangan Air Ketuban. 2010.

Legawati, Riyanti. 2018. determinan kejadian ketuban pecah dini (kpd) di ruang cempaka rsud dr doris sylvanus palangkaraya. Jurnal Surya Medika Volume 3 No. 2.

Lestari V.A, (2012). Hubungan Paritas dan Kelainan Letak dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin di RSUD Dr. Soewondo Kendal.

Lusi Indriani 2020. *Evaluasi pemberian antibiotik pada pasien ketuban pecah dini* di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Azra Kota Bogor.

Mamede dkk, 2012. Dampak persalinan prematur dan Ketuban Pecah Dini Di RS PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2018: Universitas Muhammadiyah Bantul.

Marni, dkk., *Asuhan Kebidanan Patologi*. Yogyakarta : pustaka pelajar, 2016.

Marni dkk, 2016. Faktor Determinan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Makassar : Akademi Kebidanan Muhammadiyah Makassar. P. 1 – 15. 2012.

Melina 2017. Analisis Faktor-Faktor Risiko Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Melahirkan di RSUD Tugurejo Semarang .

Melsiani (2009). *Asuhan Kebidanan Pathologi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Manuaba, 2008. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta : EGC , (2010). *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta : EGC

Manuaba, 2007. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta : EGC , (2010). *Pengantar Kuliah Obstetri*. Jakarta : EGC

Manuaba, Ida Ayu Chandranita. (2009). *Gadar Obstetri & Ginekologi & Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta : EGC.

Meliati, Linda. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Persalinan Prematur di RSUP NTB Tahun 2013*. Mataram : Poltekkes Kemenkes.

Mochtar, 2002. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita (Edisi 2)*. Jakarta: EGC.

Morgan, Geri dan Hamilton Carole. (2009). *Obstetri & Ginekologi*. Jakarta : EGC

Natiqotul. (2008). Hubungan Status Paritas Dengan Kejadian Persalinan Ketuban Pecah Dini di RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal Tahun 2008. Slawi : Stikes Bhamada

Nazila Maghfiratul. *Karakteristik Luaran Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini di RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2015*. Volume 2 Nomor 4 Juni Tahun 2017.

Nazila, Gita Indah Triyanti Rukmana. 2017. *Karakteristik Luaran Kehamilan dengan Ketuban Pecah Dini di RSUP Dr. Hasan Sadikin Periode Tahun 2013-2015*. Volume 2 Nomor 4 Juni Tahun 2017.

- Nugroho, Taufan. *Obstetri*. Jakarta: Salemba Medika, 2013.
- Nugroho, T., (2012). *Obstetri dan Ginekologi untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Nur Rohmawati, Arulita Ika Fibriana. *Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran*. Volume 2 Nomor (1) (2018).
- Nia aprilla. *faktor risiko ibu bersalin yang mengalami ketuban pecah dini di rsud bangkinang tahun 2017*. Volume 2, Nomor 1, April 2018.
- Ni Wayan Raina Purwahati, Eko Mardiyarningsih, Wulansari. *hubungan antara ketuban pecah dini dengan persalinan prematur di rumah sakit mutiara bunda salatiga*. Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo Ungaran.
- Novihandari, 2016 *Determinan ketuban pecah dini diruangcempaka rsud dr doris Sylvanus*
- Novriani .(2017) *Dukungan Keluarga Dengan Kecemasan Menjelang Persalinan Trimester III E- Jurnal IPTEKS Terpapar (vol.11 no.1 )* . Akademi Perawat Padang Panjang.
- Omo Sutomo, Kadar Kuswandi. *analisis faktor yang berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini di rumah sakit umum daerah dr. Adjidarmo kabupaten lebak tahun 2013*. Jurnal Medikes, Volume 2, edisi 1, April 2015.
- Pudiasuti. *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Patologi*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Purwoastuti, Th. Endang. *Konsep kebidanan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Purwanti, (2015). *Skripsi. Faktor – Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di RSUD Ungaran K : Stikes Ngudi Waluyo Ungaran*.
- Rahayu dan Sari 2017 *Studi Diskripsi Penyebab Kejadian Ketuban Pecah Dini (KPD) Pada Ibu Bersalin*. Yogyakarta : Indonesian Journal Of Nursing And Midwifery.
- Rachimnadh, editors. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Edisi ke-4. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal. 677 – 682.
- Renny Novi Puspitasari. *korelasi karakteristik dengan penyebab ketuban pecah dini pada ibu bersalin di rsu denisa gresik*. Vol.3, No.1, Maret 2019, Hal. 24-32.
- Rosmiarti. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang Tahun 2013*. Palembang : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang.

- Rizky Manda Beladina 2016 Analisis ketuban pecah dini (KPD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
- Ramayanti. (2011). Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Persalinan Prematur dan ketuban pecah dini (KPD)
- Safari F R. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum H.Abdul Manan Simatupan Tahun 2016* . 2016.
- Saifuddin 2010. *Gambaran Karakteristik Ibu Bersalin dengan Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang.*
- Sakti, Volume 4, Nomor 1, April 2016. Shlm. 101-109.
- Setiawan. (2011). Metode Penelitian Kebidanan DIII, DIV, S1 dan S2. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sari, (2014). Jurnal. *Paritas dan Kelainan Letak dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin di Puskesmas Balongan Surabaya Tahun 2013* : Akademi Kebidanan Griya Husada
- Sinclair, 2003. Faktor Determinan Ketuban Pecah Dini Di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Makassar : Akademi Kebidanan Muhammadiyah Makassar. P. 1 – 15. 2012.
- Sinsin, Iis, (2008). Masa Kehamilan dan Persalinan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Siregar, Fitri Amelia. (2011) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum Daerah Padangsidimpuan.*
- Sihotang, Ruth Canaya Br et al. (2013). Hubungan Umur Ibu Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di RSUD Ambarawa Tahun 2013.
- Sri lestari (2018) *Dampak persalinan prematur dan Ketuban Pecah Dini Di RS PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2018*: Universitas Muhammadiyah Bantul.
- Sari, (2016). *Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Kabupaten Banjarbaru Tahun 2015* : Akademi Kebidanan Banua Bina Husada Banjarbaru.
- Safari F R. *Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Di Rumah Sakit Umum H.Abdul Manan Simatupan Tahun 2016*

Sugiarti. (2015). *Kehamilan Letak Sungsang Dengan Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Bersalin*. Surabaya : Akademi Kebidanan Griya Husada

Soepardan,Suryani. *Konsep Kebidanan*.Jakarta : EGC,2008.

Shihab,M.Quraish.*Tafsir Al-Misbah*,Jakarta :Lentera Hati,2002.

Syifa Saras Arani 2020. *Asuhan kebidanan pada Ny. S dengan post seksio sesarea dan mengalami ketuban peah dini (KPD) di Rumah sakit Marinir Cilandak Jakarta Selatan*.

Sepduwiana,Henny."Faktor Terjadinya KPD pada ibu bersalin di RSUD Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal*."Vol.1 no 3.2011.

Sunarti, 2017. *Gambaran karakteristik ibu bersalin dengan ketuban pecah dini di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang tahun 2009*.

Sujiyatini. (2009). *Asuhan Kebidanan Pathologi*. Jakarta : Rineka Cipta.

Susilowati, E. (2010). *Gambaran Karakteristik Ibu Bersalin dengan Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang Tahun 2009*.

Suwiyoga & Budayasa, A.A. 2006. *Peran faktor resiko ketuban pecah dini terhadap insidens sepsis neonatorum dini pada kehamilan aterm*. Cermin Dunia Kedokteran.

Rachimnadhi, editors. *Ilmu Kebidanan* Sarwono Prawirohardjo. Edisi ke-4. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal. 677 – 682.

Tahir, Suriani et al. (2012). *Faktor Determinan Ketuban Pecah Dini di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa*. Makassar : Akademi Kebidanan Muhammadiyah

Tita Puspita 2019. *Evaluasi penggunaan antibiotik pada pasien ketuban pecah dini di Kabupaten Garut pada Januari-Desember*.

Varney,Helen dkk, *Buku saku Bidan*.2001. Varneys pocket midwife,ed,Jakarta: EGC,2002.

Varney dkk, 2002:31. Varneys pocket midwife,ed,Jakarta: EGC,2002.

Wulandari. *Analisis Faktor Faktor Risiko Terhadap Kejadian Ketuban Pecah Dini Pada Ibu Melahirkan di RSUD Tugurejo Semarang*. 2016

Yuniantini. *Hubungan Antara Usia Dan Jarak Kehamilan Sebelumnya Dengan Berat Bayi Lahir Rendah Di RS Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2016*

## RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

Nama : Halimah  
 Nim : 70400117005  
 TTL : Kampung Tangnga, 02 Februari 1999  
 Suku : Makassar  
 Agama : Islam  
 Alamat : Kampung Tangnga Kec. Pasimasunggu Kab. Kepulauan Selayar

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sulaiman K  
 Umur : 85 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : Petani  
 Agama : Islam  
 Nama ibu : Hanuria J  
 Umur : 64 tahun  
 Pendidikan : SD  
 Pekerjaan : IRT  
 Agama : Islam



### C. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2011 SDI KAMPUNG TANGNGA
2. Tahun 2011-2014 SMP NEGERI 2 BENTENG
3. Tahun 2014-2017 MAN SELAYAR
4. Tahun 2017-2022 Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN  
Alauddin Makassar

