

**HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG
PENANGANAN DIARE PADA BAYI
DI KELURAHAN TOMPOBALANG
KECAMATAN SOMBAOPU**




Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh:
MAKASSAR

JUNAEDAH MUIS
NIM : 70300110051

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan hidayah dan petunjuk dari-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul: **“Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Bayi Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan tetapi berkat ketekunan, ketabahan, kesabaran dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka kesemuanya itu dapat diatasi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa skripsi ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasanya ditemukan kekurangan-kekurangan karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga pada penyusunan yang akan datang dapat lebih baik seperti yang kita harapkan bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan moril dan material dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu Fatmawati Mallapiang, SKM., M.Kes selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., A.pt selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Wahyuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan izin penelitian dan dedikasinya sebagai pemimpin.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
5. Bapak Ns., Moh Syafar, S.MANP selaku Pembimbing I dan Ibu dr. Azizah Nurdin, S.Ked selaku Pembimbing II atas waktu dan keikhlasannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Dr. Muhsin Mahfuds, S.Ag., M.Ag selaku Penguji II yang telah memberikan saran dan kritiknya dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Staf Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasihat selama penulis menimba ilmu di Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Hj. Abd. Muis dan Ibunda Hj. Rahmatia yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberikan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Saudaraku Junaedy Muis yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat pantang menyerah kepada penulis.
10. Sahabat-sahabatku: Isra Mirawati, Indah Pratiwi, Ari Apriani, Panca Setiyawani, Herni, Nur Adhahiah, Meyli, Nur Asiah, Ifha, Hijrah, Mariana, Kiki, dan Nani yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan terbaik kepada penulis selama ini.

11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Keperawatan 2010 khususnya Keperawatan B yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan kepada penulis.

Sebagai akhir penulis berdo'a semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2014
Penyusun,



Junaedah Muis
NIM: 70300110051

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Umum Tentang Diare.....	12
1. Definisi Diare.....	12
2. Jenis-Jenis Diare.....	13
3. Etiologi.....	14
4. Patofisiologi	16
5. Manifestasi Klinis	19
6. Pencegahan Diare.....	20
7. Penanganan Penderita Diare	27
B. Tinjauan Umum Pengetahuan	33
1. Definisi Pengetahuan	33
2. Tingkat Pengetahuan.....	35
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan.....	37
4. Pengukuran Pengetahuan	39
C. Kerangka Konsep.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Populasi dan Sampel	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Validasi dan Reabilitasi Instrumen	45
G. Teknik Pengelolahan dan Analisa Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
B. Pembahasan.....	52
C. Keterbatasan Penelitian	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....	xvii



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Ibu
- Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan,
Pekerjaan, Tingkat Pengetahuan dan Tindakan Penanganan
- Tabel 4.3 Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan
Diare Pada Bayi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Permohonan Menjadi Responden
Lampiran 2	Lembar Persetujuan Menjadi Responden (<i>Informed Consent</i>)
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian
Lampiran 4	Master Tabel
Lampiran 5	Lembar Hasil Uji Reabilitas Kuesioner
Lampiran 6	Lembar Statistik Usia Responden
Lampiran 7	Lembar Hasil Analisis Data SPSS
Lampiran 8	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 9	Surat Izin Penelitian
Lampiran 10	Surat Rekomendasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Junaedah Muis
NIM : 70300110051
Judul : Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Bayi Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu

Penyakit diare masih menjadi masalah kesehatan terbesar di dunia terutama pada bayi. Penyebab utama kematian akibat diare adalah penanganan yang tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu tahun 2014.

Desain penelitian yang digunakan yaitu *cross sectional* dengan sampel sebanyak 61 orang yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner untuk menilai tingkat pengetahuan ibu dan penanganan diare. Analisis yang digunakan dengan uji *Chi Square* dengan tingkat kemaknaan $\alpha=0,05$.

Hasil penelitian menunjukkan responden mempunyai tingkat pengetahuan kurang dan tindakan penanganan diare kurang dengan $n=27$ (44,3%) dan *effect size* diperoleh nilai 0,392 yang artinya kekuatan hubungan sedang, bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu tentang diare dengan penanganan diare pada bayi ($p=0,005 < \alpha=0,05$).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu. Saran, diharapkan kepada pihak puskesmas agar pengetahuan ibu ditingkatkan dengan cara melakukan penyuluhan tentang penanganan diare pada bayi serta memotivasi ibu untuk mengikuti penyuluhan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Penyakit diare hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia terutama di Negara berkembang. Dengan angka kematian yang masih tinggi terutama pada bayi, menunjukkan bahwa diare memerlukan penanganan yang tepat dan memadai untuk mengatasinya. Diare dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa, tapi bayi cenderung lebih rentan terserang penyakit ini. Diare tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju, dinegara maju walaupun sudah terjadi perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetapi insiden diare tetap tinggi. Di Inggris dua dari lima orang menderita diare setiap tahunnya dan tiga dari enam orang pasien yang berobat ke praktek umum menderita diare. Di neg

ara berkembang, diare infeksi menyebabkan kematian sekitar tiga juta penduduk setiap tahun. Di Afrika orang terserang diare infeksi tujuh kali setiap tahunnya di banding di negara berkembang lainnya mengalami serangan diare tiga kali setiap tahun (Darmawati, 2012).

Menurut data UNICEF (*The United Nations Children's Fund*) dan WHO (*World Health Organization*) pada tahun 2009, diare merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita di dunia, nomor tiga pada bayi dan nomor lima bagi sejumlah umur. Data UNICEF memperkirakan bahwa 1,5

juta anak meninggal dunia setiap tahunnya karena diare. Angka tersebut lebih besar dari korban AIDS, malaria dan cacar jika digabung, sayangnya di beberapa negara berkembang hanya 39 % penderita mendapatkan penanganan serius (Sindo, 2010).

Diare atau dalam bahasa ilmiah disebut gastroenteritis, merupakan salah satu penyakit yang sering dialami oleh masyarakat. Diare adalah sebuah penyakit ketika penderita mengalami rangsangan buang air besar secara terus-menerus, dengan tinja atau feses yang mengandung air secara berlebihan melebihi 200 gram per hari (Ahira, 2013). Menurut Adisasmito (2007) banyak faktor risiko yang diduga menyebabkan terjadinya penyakit diare pada bayi dan balita. Salah satu faktor risiko yang sering diteliti adalah faktor lingkungan yang meliputi sarana air bersih (SAB), sanitasi, jamban, saluran pembuangan air limbah (SPAL), kualitas bakterologis air, dan kondisi rumah.

Adapun dalam hal ini banyak al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, menganjurkan kita agar senantiasa menjaga kebersihan lahir dan batin. Firman Allah SWT (Q.S al-baqarah:222):

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (al-sofwah, 2009).

Tiga Studi Bank Dunia tahun 2007, menyatakan bahwa 19 % dari kasus kematian anak di bawah usia 3 tahun disebabkan oleh diare (Apriyanti, 2009). Di Indonesia, diare masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama. Hal ini disebabkan masih tingginya angka kesakitan dan menimbulkan banyak kematian terutama pada bayi dan balita, serta sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) (Adisasmito, 2007). Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan Indonesia dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 IR penyakit diare 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk (Hardi, 2012).

Data yang diperoleh dari profil kesehatan Kota Makassar pada tahun 2008, kasus diare yaitu 209.153 kasus, tertinggi masih di Kota Makassar (45.929 kasus) dan terendah di Kabupaten Enrekang (400 kasus). Pada tahun 2009 angka kejadian diare meningkat yakni 22.961 kasus, dan kembali kasus tertinggi terjadi di Kota Makassar (45.014 kasus) dan terendah di Kabupaten Selayar (Dinkes Prov. Sulsel, 2010).

Menurut hasil penelitian Malikhah, dkk (2012), di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu dalam pencegahan dan penanggulangan secara dini kejadian diare pada balita, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa lebih dari setengah ibu memiliki pengetahuan baik. Walaupun secara umum pengetahuan ibu baik tetapi pengetahuan ibu tentang penanggulangan diare

berada pada kategori cukup. Sehubungan dengan itu di dapatkan penelitian yang sama dilakukan oleh Askrening (2007) dikutip dari Chusnul, dkk (2013) yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan perilaku ibu dalam pemberian rehidrasi oral pada balita diare di Kabupaten Purworejo, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap tentang rehidrasi oral berhubungan dengan perilaku pemberian rehidrasi oral pada balita diare. Sikap negatif berpeluang berperilaku salah sebesar 2,7 (95% CI 1,25-5,91), sedangkan pengetahuan tidak berhubungan dengan perilaku. Ada pula penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Namuwali (2009) Diponegoro tentang upaya orang tua dalam penanganan diare di rumah dengan pendekatan eksploratif ini bertujuan mengetahui upaya orang tua dalam penanganan diare di rumah, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya orangtua dalam penanganan diare di rumah meliputi pemberian oralit, larutan gula garam, teh dan asupan makanan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan pada 04 januari 2014 di Puskesmas Sombaopu, diperoleh data bahwa jumlah pasien diare selama tahun 2013 adalah sebanyak 1.749 orang. Dengan jumlah pasien diare di Kelurahan Tompobalang selama tahun 2013 adalah sebanyak 199 orang dengan presentasi usia <5 tahun sebanyak 79 orang, dan usia >5 tahun 117 orang.

Fakta diatas seolah mengatakan bahwa kesadaran penduduk Indonesia khususnya di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu akan kesehatan teramat minim. Dan bukan tidak mungkin bahwa kesadaran yang minim

tersebut disebabkan oleh tingkat pengetahuan yang kurang tentang diare, serta penanganannya. Oleh sebab itu maka peneliti merasa perlu untuk meneliti bagaimana tingkat pengetahuan ibu dan penanganan diare di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti berinisiatif untuk mengetahui “ Bagaimana hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu ? ”.

C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2008). Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Hipotesis nol (H_0)

Tidak ada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

2. Hipotesis alternatif (H_a)

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, dan sebagainya). Pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi yaitu kemampuan ibu menjawab dengan benar koesioner tentang penanganan diare pada bayi. Pengetahuan diukur melalui 11 pertanyaan dengan menggunakan skala *Thurstone*. Skala pengukuran pengetahuan, berdasarkan pada jawaban yang diperoleh dari responden terhadap semua pertanyaan yang diberikan nilai tertingginya adalah 2 sehingga total nilai sebesar 22. Menurut Arikunto (2002) dikutip dari Anita (2013) aspek pengukuran pengetahuan dengan kategori dari jumlah nilai yang ada dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori.

- 1) Tingkat pengetahuan baik, apabila nilai yang diperoleh $>76\%$ dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 22 yaitu > 17

- 2) Tingkat pengetahuan cukup, apabila nilai yang diperoleh 56-75% dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total 22 yaitu 12 -

- 3) Tingkat pengetahuan kurang, apabila nilai yang diperoleh $<56\%$ dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 22 yaitu ≤ 12
- b. Tindakan penanganan yaitu segala sesuatu yang dilakukan responden dalam penanganan diare pada bayi. Diukur melalui 13 pertanyaan dengan menggunakan skala *Thurstone*. Skala pengukuran tindakan berdasarkan pada jawaban yang diperoleh dari responden terhadap semua pertanyaan yang diberikan. Nilai tertinggi dari seluruh pertanyaan adalah 2, sehingga total nilainya adalah sebesar 13 dimana untuk pertanyaan no 2, 4, 7, 8, 10, 11 dan 12 nilai tertinggi 1 dengan pilihan jawaban ya dan pertanyaan no 1, 3, 5, 6, 9 dan 13 nilai tertinggi 1 untuk pilihan jawaban tidak. sehingga total nilainya adalah:
- Berdasarkan Arikunto (2002) dikutip dari Anita (2013), aspek pengukuran dengan kategori dari jumlah nilai yang ada dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu:
- 1) Tindakan baik, apabila nilai yang diperoleh $>76\%$ dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 13 yaitu > 10
 - 2) Tindakan kurang, apabila nilai yang diperoleh $<56\%$ dari nilai tertinggi seluruh pertanyaan dengan total nilai 13 yaitu ≤ 7
- c. Diare adalah kondisi dimana terjadi frekuensi defekasi yang abnormal (lebih dari 3 kali/hari), disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa darah dan lendir (Suraatmaja, 2005).

Ya : Jika BAB encer lebih dari 3 kali/hari

Tidak : Jika BAB tidak encer kurang dari 3 kali/hari

d. Bayi yaitu sejak usia 2 minggu sampai 2 tahun (Widyastuti, 2010)

2. Ruang lingkup penelitian

a. Lingkup masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi.

b. Lingkup keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu keperawatan komunitas yang berfokus pada masalah tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi.

c. Lingkup lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014.

d. Lingkup sasaran

Sasaran pada penelitian ini adalah ibu yang mempunyai bayi usia 2 minggu sampai dengan 2 tahun.

E. Kajian Pustaka

1. Dwi Anggrayani (2013) dalam jurnalnya tentang hubungan pengetahuan ibu tentang tatalaksana diare di rumah dengan kesembuhan diare pada balita di wilayah Puskesmas Pondok Ranji Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang bagaimana melakukan tatalaksana diare

dirumah dengan baik dan sebagian besar balita yang terkena diare mengalami kesembuhan kurang baik.

2. Nur Jihan (2013), dalam jurnalnya yang berjudul hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita dan adanya hubungan yang bermakna antara sikap ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita.
3. Herwindasari (2013), tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan awal diare pada balita di wilayah Puskesmas Perumnas II Pontianak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu mayoritas dalam kategori kurang dengan penatalaksanaan awal diare dalam kategori buruk, didapatkan adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan awal diare pada balita.
4. Saeed (2012), tentang penilaian pengetahuan ibu tentang manajemen diare pada anak dirumah dalam pengaturan Nigeria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu semakin baik pengetahuannya dan semakin baik pula penanganan diare yang dilakukannya. Mayoritas ibu setuju bahwa oralit diperlukan dalam pengobatan diare.
5. Subekti (2009), tentang hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan tindakan penanganan pada balita di RSUD dr. Sayidiman

Magetan. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar tingkat pengetahuan ibu adalah baik, kemudian tindakan penanganan ibu dalam penanganan balita diare sebagian besar adalah baik, maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Hal ini berarti terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan tindakan penanganan pada balita.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

a. Tujuan Umum

Diketuinya hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

b. Tujuan khusus

- 1) Diketuinya tingkat pengetahuan ibu tentang diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu
- 2) Diketuinya tindakan penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu
- 3) Menghubungkan antara tingkat pengetahuan ibu dengan tindakan penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

2. Kegunaan peneliti

a. Profesi keperawatan

Peneliti dapat memberikan pengetahuan tentang penanganan pada pasien diare.

b. Institusi

Sebagai bahan bacaan di perpustakaan sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa-mahasiswi khususnya tentang penanganan diare pada bayi.

c. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman berharga dan wadah latihan bagi peneliti dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan serta pengembangan diri khususnya sebagai peneliti lapangan.

d. Bagi responden

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan dan perilaku positif dalam menormalisis penanganan diare pada bayi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Diare

1. Definisi diare

Menurut *World Health Organization* (WHO), penyakit diare adalah suatu penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang lembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air besar yang lebih dari biasa, yaitu 3 kali atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai dengan muntah atau tinja yang berdarah. Penyakit ini paling sering dijumpai pada anak balita, terutama pada 3 tahun pertama kehidupan, dimana seorang anak bisa mengalami 1-3 episode diare berat (Simatupang, 2004).

Diare adalah kondisi dimana terjadi frekuensi defekasi yang abnormal (lebih dari 3 kali/hari), serta perubahan dalam isi (lebih dari 200 g/hari) dan konsistensi (feses cair). Hal ini biasanya dihubungkan dengan dorongan, ketidaknyamanan perinal, inkontinensia, atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Adanya kondisi yang menyebabkan perubahan pada sekresi usus, absorpsi mukosal, atau motilitas dapat menimbulkan diare.

Diare dapat bersifat akut atau kronis. Ini dapat kita klasifikasikan sebagai volume tinggi, volume rendah, sekresi, osmotik, atau campuran. Diare dengan volume banyak terjadi bila terdapat lebih dari satu liter feses

cair perhari. Diare dengan volume sedikit terjadi bila terdapat kurang dari satu liter feses cair yang dihasilkan per hari. Diare dapat disebabkan oleh obat-obatan tertentu (penggantian hormon tiroid, pelunak feses dan laksatif, antibiotik, kemoterapi, dan antasida), pemberian makan per selang, gangguan metabolik dan endokrin (diabetes, addison, tirotoksikosis), serta proses infeksi virus/bakteri (disentri, shigelosis, keracunan makanan). Proses penyakit lain yang dihubungkan dengan diare adalah gangguan nutrisi dan malabsorpsi (sindrom usus peka, colitis ulseratif, enteritis regional, dan penyakit seliaka), deficit sfingter anal, sindrom Zollinger-Ellison, paralitik, ileus, dan obstruksi usus (Smeltzer, Suzanne & Brenda, 2005).

2. Jenis-jenis diare

a. Diare akut

Diare yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat.

b. Diare kronik

Diare yang berlanjut sampai 2 minggu atau lebih dengan kehilangan berat badan atau berat badan tidak bertambah (*failure to thrive*) selama masa diare tersebut (Suraatmaja, 2007).

Menurut Ahlquist & Camilleri (2005), diare dibagi menjadi akut apabila kurang dari 2 minggu, persisten jika berlangsung selama 2-4 minggu, dan kronik jika berlangsung lebih dari 4 minggu. Lebih dari 90% penyebab diare akut adalah agen penyebab infeksi dan akan disertai dengan muntah,

demam dan nyeri pada abdomen. 10% lagi disebabkan oleh pengobatan, intoksikasi, iskemia dan kondisi lain. Berbeda dengan diare akut, penyebab diare yang kronik lazim disebabkan oleh penyebab non infeksi seperti alergi dan lain-lain.

3. Etiologi

Tingginya angka kematian akibat diare tersebut masih disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : karena kesehatan lingkungan yang belum memadai, keadaan gizi yang belum memuaskan, kepadatan penduduk, sosial ekonomi maupun pendidikan atau pengetahuan dan perilaku masyarakat, yang secara langsung maupun pendidikan atau pengetahuan dan perilaku masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi penyakit diare ini (Depkes RI, 2003). Menurut Mansjoer dkk (2003) dikutip dari Wijaya (2013), penyebab diare dapat di bagi dalam beberapa faktor yaitu :

1. Faktor infeksi

- a. Infeksi Internal adalah infeksi pencernaan, yang merupakan penyebab diare pada anak disebabkan oleh bakteri Shigella, Salmonella, dan E. Coli.
- b. Infeksi Eksternal adalah infeksi diluar alat pencernaan makanan seperti Otitis Media Akut yang banyak terdapat pada bayi dan anak di bawah dua tahun.

2. Faktor mal absorpsi

Malabsorpsi Karbohidrat, disakarida (Intoransi, Laktosa Maltosa dan Subkorosa) dan monosakarida (Intoleransi Glukosa, Frugtosa dan Glaktosa) pada bayi dan anak yang terpenting dan terserang malabsorpsi lemak dan protein.

3. Faktor makanan

Faktor makanan adalah seperti makanan beracun, basi dan alergi terhadap makanan yang di makan.

Adapun ayat yang terkait dalam firman Allah SWT (Q.S al-baqarah 168) yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Terjemahan:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Depag, 2013).

4. Faktor psikologis

Faktor psikologis yaitu rasa takut dan cemas (jarang terjadi pada anak namun sering terjadi).

4. Patofisiologi

Proses terjadinya diare dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan faktor di antaranya:

Pertama faktor infeksi, proses ini dapat diawali adanya mikroorganisme (kuman) yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang kemudian berkembang dalam usus dan merusak sel mukosa usus yang dapat menurunkan daerah permukaan usus. Selanjutnya terjadi perubahan kapasitas usus yang akhirnya mengakibatkan gangguan fungsi usus dalam absorbs cairan dan elektrolit. Atau juga dikatakan adanya toksin bakteri akan menyebabkan sistem transport aktif dalam usus sehingga sel mukosa mengalami iritasi yang kemudian sekresi cairan dan elektrolit akan meningkat.

Kedua, faktor malabsorpsi merupakan kegagalan dalam melakukan absorbs yang mengakibatkan tekanan osmotik, meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke rongga usus yang dapat meningkatkan isi rongga usus sehingga terjadilah diare.

Ketiga, faktor makanan ini dapat terjadi peningkatan peristaltik usus yang mengakibatkan penurunan kesempatan untuk menyerap makanan yang kemudian menyebabkan diare.

Keempat, faktor psikologis dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan peristaltik usus yang akhirnya mempengaruhi proses penyerapan makanan yang dapat menyebabkan diare (Hidayat, 2008).


Diare sekresi biasanya diare dengan volume banyak disebabkan oleh peningkatan produksi sekresi air serta elektrolit oleh mukosa usus ke dalam lumen usus. Diare osmotik terjadi bila air terdorong ke dalam usus oleh tekanan osmotik dari partikel yang tidak dapat diabsorpsi, sehingga reabsorpsi air menjadi lambat. Diare campuran disebabkan oleh peningkatan kerja peristaltik dari usus (biasanya karena penyakit usus inflamasi) dan kombinasi peningkatan sekresi atau penurunan absorpsi dalam usus.

Meningkatnya motilitas dan cepatnya pengosongan pada intestinal merupakan akibat dari gangguan absorpsi dan ekskresi cairan dan elektrolit yang berlebihan. Cairan, sodium, potasium dan bikarbonat berpindah dari rongga ekstraseluler ke dalam tinja, sehingga mengakibatkan dehidrasi kekurangan elektrolit, dan dapat terjadi asidosis metabolik.

Diare yang terjadi merupakan proses dari :

1. Transpor aktif akibat rangsangan toksin bakteri terhadap elektrolit ke dalam usus halus. Sel dalam mukosa intestinal mengalami iritasi dan meningkatnya sekresi cairan dan elektrolit. Mikroorganisme yang masuk akan merusak sel mukosa intestinal sehingga menurunkan area permukaan intestinal, perubahan kapasitas intestinal dan terjadi gangguan absorpsi cairan dan elektrolit.

2. Peradangan akan menurunkan kemampuan intestinal untuk mengabsorpsi cairan dan elektrolit dan bahan-bahan makanan. Ini terjadi pada sindrom malabsorpsi.
3. Meningkatnya motilitas intestinal dapat mengakibatkan gangguan absorpsi intestinal (Suriadi & Yulianni, 2006).



5. Manifestasi klinis

Mula-mula bayi/anak menjadi cengeng, gelisah, suhu badan mungkin meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja makin cair mungkin mengandung darah dan/atau lender, warna tinja berubah menjadi kehijau-hijauan karena bercampur empedu. Karena seringnya defekasi, anus dan sekitarnya lecet karena tinja makin lama menjadi makin asam akibat banyaknya asam laktat yang terjadi dari pemecahan laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare. Bila penderita telah banyak kehilangan air dan elektrolit, terjadilah gejala dehidrasi. Berat badan turun, pada bayi ubun-ubun besar cekung, tonus dan turgor berkurang, selaput lender mulut dan bibir terlihat kering (Suraatmaja, 2005).

Menurut Suriadi & Yulianni (2006) manifestasi klinis diare :

- a. Sering buang air dengan konsistensi tinja cair atau encer
- b. Terdapat tanda dan gejala dehidrasi : turgor kulit jelek (elastisitas kulit menurun), ubun-ubun dan mata cekung, membrane mukosa kering
- c. Keram abdominal
- d. Demam
- e. Mual dan muntah
- f. Anorexia

- g. Lemah
- h. Pucat
- i. Perubahan tanda-tanda vital, nadi dan pernafasan cepat
- j. Menurun atau tidak ada pengeluaran urine.

6. Pencegahan diare

Kegiatan pencegahan penyakit diare yang benar dan efektif yang dapat dilakukan adalah :

a. Pemberian ASI

ASI adalah makanan paling baik untuk bayi. Komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja, tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol, menghindarkan bayi dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini di sebut disusui secara penuh (memberikan ASI Eksklusif). Bayi harus disusui secara penuh sampai mereka berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan dari kehidupannya, pemberian ASI harus diteruskan sambil ditambahkan dengan makanan lain (proses

menyapih). ASI adalah ungkapan kasih sayang Allah SWT sekaligus anugerah yang luar biasa terhadap setiap bayi yang terlahir ke muka bumi. Di dalam al-Qur'an, ayat tentang ASI sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S al-baqarah 2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Terjemahan:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Depag, 2008).

ASI mempunyai khasiat preventif secara imunologi dengan adanya antibodi dan zat-zat lain yang dikandungnya. ASI turut

memberikan perlindungan terhadap diare. Pada bayi yang baru lahir, pemberian ASI secara penuh mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare daripada pemberian ASI yang disertai dengan susu botol. Flora normal usus bayi yang disusui mencegah tumbuhnya bakteri penyebab botol untuk susu formula, berisiko tinggi menyebabkan diare yang dapat mengakibatkan terjadinya gizi buruk (Kementrian Kesehatan RI, 2011).

b. Makanan pendamping ASI

Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Perilaku pemberian makanan pendamping ASI yang baik meliputi perhatian terhadap kapan, apa, dan bagaimana makanan pendamping ASI diberikan.

Ada beberapa saran untuk meningkatkan pemberian makanan pendamping ASI, yaitu:

- 1) Perkenalkan makanan lunak, ketika anak berumur 6 bulan dan dapat teruskan pemberian ASI. Tambahkan macam makanan setelah anak berumur 9 bulan atau lebih. Berikan makanan lebih sering (4x sehari). Setelah anak berumur 1 tahun, berikan semua makanan yang dimasak dengan baik, 4-6 x sehari, serta teruskan pemberian ASI bila mungkin.

- 2) Tambahkan minyak, lemak dan gula ke dalam nasi /bubur dan biji-bijian untuk energi. Tambahkan hasil olahan susu, telur, ikan, daging, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran berwarna hijau ke dalam makanannya.
 - 3) Cuci tangan sebelum menyiapkan makanan dan meyuapi anak. Suapi anak dengan sendok yang bersih.
 - 4) Masak makanan dengan benar, simpan sisanya pada tempat yang dingin dan panaskan dengan benar sebelum diberikan kepada anak.
- c. Menggunakan air bersih yang cukup

Penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui Face-oral kuman tersebut dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman atau benda yang tercemar dengan tinja, misalnya jari-jari tangan, makanan yang wadah atau tempat makan-minum yang dicuci dengan air tercemar. Masyarakat yang terjangkau oleh penyediaan air yang benar-benar bersih mempunyai risiko menderita diare lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih. Masyarakat dapat mengurangi risiko terhadap serangan diare yaitu dengan menggunakan air yang bersih dan melindungi air tersebut dari kontaminasi mulai dari sumbernya sampai penyimpanan di rumah.

Yang harus diperhatikan oleh keluarga :

- 1) Ambil air dari sumber air yang bersih
- 2) Simpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup serta gunakan gayung khusus untuk mengambil air.
- 3) Jaga sumber air dari pencemaran oleh binatang dan untuk mandi bayi
- 4) Minum air yang sudah matang (dimasak sampai mendidih)
- 5) Cuci semua peralatan masak dan peralatan makan dengan air yang bersih dan cukup

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-anfal ayat 11:

وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ

Terjemahan:

“Dan Tuhan menurunkan air dari langit kepada kamu, agar kamu membersihkan kamu dengannya” (Muhammadiyah, 2011).

d. Mencuci tangan

Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan anak dan sebelum makan, mempunyai dampak dalam kejadian diare (Menurunkan angka kejadian diare sebesar 47%) (Kementrian Kesehatan RI, 2011).

e. Menggunakan jamban

Pengalaman di beberapa negara membuktikan bahwa upaya penggunaan jamban mempunyai dampak yang besar dalam penurunan risiko terhadap penyakit diare. Keluarga yang tidak mempunyai jamban harus membuat jamban dan keluarga harus buang air besar di jamban.

Yang harus diperhatikan oleh keluarga :

- 1) Keluarga harus mempunyai jamban yang berfungsi baik dan dapat dipakai oleh seluruh anggota keluarga
- 2) Bersihkan jamban secara teratur
- 3) Gunakan alas kaki bila akan buang air besar

f. Membuang tinja bayi yang benar

Banyak orang beranggapan bahwa tinja bayi itu tidak berbahaya. Hal ini tidak benar karena tinja bayi dapat pula menularkan penyakit pada anak-anak dan orang tuanya. Tinja bayi harus dibuang secara benar.

Yang harus diperhatikan oleh keluarga:

- 1) Kumpulkan segera tinja bayi dan buang di jamban
- 2) Bantu anak buang air besar di tempat yang bersih dan mudah di jangkau olehnya

- 3) Bila tidak ada jamban, pilih tempat untuk membuang tinja seperti di dalam lubang atau di kebun kemudian ditimbun
- 4) Bersihkan dengan benar setelah buang air besar dan cuci tangan dengan sabun

Menurut (Abuzubair, 2008) Ada beberapa tempat yang dilarang oleh Islam dalam membuang air, diantaranya:

- a) Ditempat berteduh dan ditempat umum

Diharamkan buang air besar dan kecil di tempat ini karena akan mengganggu orang yang memanfaatkan tempat tersebut untuk berjalan ataupun berteduh. Allah SWT berfirman dalam surah al-ahzab (58):

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
TERAKKASAB
فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مِثْلُنَا

Terjemahan:

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

Dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Takutlah kalian dari dua perkara yang menyebabkan laknat!” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apa dua perkara yang menyebabkan laknat tersebut?” Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam menjawab: “Orang yang buang hajat di jalan manusia dan tempat berteduh mereka.” (HR. Muslim).

- b) Di bawah pohon yang dimanfaatkan manusia
- c) Di sumber air
- d) Di lubang

- e) Di air yang tergenang
- g. Pemberian imunisasi campak

Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Bayi yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oleh karena itu berilah imunisasi campak segera setelah bayi berumur 9 bulan (Kementrian Kesehatan RI, 2011).

7. Penanganan Penderita Diare

Menurut Kemenkes RI (2011) Kebijakan pengendalian penyakit diare di Indonesia bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian karena diare bersama lintas program dan lintas sektor terkait.

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian karena diare adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tata laksana penderita diare yang sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun di rumah tangga
- b. Melaksanakan surveilans epidemiologi & penanggulangan kejadian luar biasa
- c. Mengembangkan pedoman pengendalian penyakit diare
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknis medis

- e. Mengembangkan jejaring lintas sektor dan lintas program
- f. Pembinaan teknis dan monitoring pelaksanaan pengendalian penyakit diare
- g. Melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya

Strategi pengendalian penyakit diare yang dilaksanakan pemerintah adalah :

- a. Melaksanakan tatalaksana penderita diare yang standar di sarana kesehatan melalui lima langkah tuntaskan diare (LINTAS Diare)
- b. Meningkatkan tata laksana penderita diare di rumah tangga yang tepat dan benar
- c. Meningkatkan SKD dan penanggulangan KLB diare
- d. Melaksanakan upaya kegiatan pencegahan yang efektif
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi

LINTAS Diare (Lima Langkah Tuntaskan Diare) Menurut Kementerian Kesehatan RI, 2011

1. Berikan oralit

Untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan oralit osmolaritas rendah, dan bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, air matang. Oralit saat ini yang beredar di pasaran sudah oralit yang baru dengan osmolaritas yang rendah, yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk

mengganti cairan yang hilang. Bila penderita tidak bisa minum harus segera di bawa ke sarana kesehatan untuk mendapat pertolongan cairan melalui infus.

Derajat dehidrasi dibagi dalam 3 klasifikasi :

a. Diare tanpa dehidrasi

Tanda diare tanpa dehidrasi, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih :

- 1) Keadaan Umum : baik
- 2) Mata : Normal
- 3) Rasa haus : Normal, minum biasa
- 4) Turgor kulit : kembali cepat

Dosis oralit bagi penderita diare tanpa dehidrasi sbb :

Umur < 1 tahun : $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret

Umur 1 – 4 tahun : $\frac{1}{2}$ - 1 gelas setiap kali anak mencret

Umur diatas 5 Tahun : 1 – $1\frac{1}{2}$ gelas setiap kali anak mencret

b. Diare dehidrasi ringan/sedang

Diare dengan dehidrasi Ringan/Sedang, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- 1) Keadaan Umum : Gelisah, rewel
- 2) Mata : Cekung
- 3) Rasa haus : Haus, ingin minum banyak
- 4) Turgor kulit : Kembali lambat

Dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml/ kg bb dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi.

c. Diare dehidrasi berat

Diare dehidrasi berat, bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih:

- 1) Keadaan Umum : Lesu, lunglai, atau tidak sadar
- 2) Mata : Cekung
- 3) Rasa haus : Tidak bisa minum atau malas minum
- 4) Turgor kulit : Kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik)

Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke Puskesmas untuk di infus.

2. Berikan zat besi

Zat besi merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Zat besi dapat menghambat enzim INOS (*Inducible Nitric Oxide Synthase*), dimana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Zat besi juga berperan dalam

epitelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare.

Pemberian zat besi selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa zat besi mempunyai efek protektif terhadap diare sebanyak 11 % dan menurut hasil pilot study menunjukkan bahwa zat besi mempunyai tingkat hasil guna sebesar 67 %. Berdasarkan bukti ini semua anak diare harus diberi zat besi segera saat anak mengalami diare.

3. Pemberian ASI / makanan

Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita terutama pada bayi agar tetap kuat dan tumbuh serta mencegah berkurangnya berat badan. Bayi yang masih minum ASI harus lebih sering di beri ASI. Bayi yang minum susu formula juga diberikan lebih sering dari biasanya. Bayi yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit lebih sedikit dan lebih sering. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan.

4. Pemberian antibiotika hanya atas indikasi


Antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada bayi yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotika hanya

bermanfaat pada penderita diare dengan darah (sebagian besar karena shigellosis), suspek kolera.

Obat-obatan anti diare juga tidak boleh diberikan pada bayi yang menderita diare karena terbukti tidak bermanfaat. Obat anti muntah tidak di anjurkan kecuali muntah berat. Obat-obatan ini tidak mencegah dehidrasi ataupun meningkatkan status gizi, bahkan sebagian besar menimbulkan efek samping yang berbahaya dan bisa berakibat fatal. Obat anti protozoa digunakan bila terbukti diare disebabkan oleh parasit (amuba, giardia).

5. Pemberian nasehat

Ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan bayi harus diberi nasehat tentang :

- 
- a. Cara memberikan cairan dan obat di rumah
 - b. Kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan bila:
 - 1) Diare lebih sering
 - 2) Muntah berulang
 - 3) Sangat haus
 - 4) Makan/minum sedikit
 - 5) Timbul demam
 - 6) Tinja berdarah
 - 7) Tidak membaik dalam 3 hari (Kemenkes RI, 2011).

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Defenisi pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi melalui proses sensoris khususnya mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku terbuka (*overt behavior*) (Sunaryo, 2004). Pengetahuan (*knowledge*) juga diartikan sebagai hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung dan sebagainya), dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek (Notoatmodjo, 2007).

Adapun ayat tentang pengetahuan dalam surah al-isra':36 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ
عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahan:

“Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan fuad, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya” (Depag, 2008).

Terkait dengan pengetahuan ada beberapa hasil penelitian yang berkaitan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Anita (2012) di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai bertujuan

untuk menggambarkan perilaku ibu tentang penanganan awal diare dalam mencegah terjadinya dehidrasi pada balita, hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran karakteristik responden yaitu sebagian besar responden berusia 25-34 tahun sebanyak 52%, sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir SLTP 36% sebagian besar pekerjaan responden bekerja sebanyak 54% dan sebagian besar responden memiliki jumlah anak <3 orang yaitu 46%. Sumber informasi yang paling efektif dalam menyampaikan informasi menurut responden adalah TV 68%. Pengetahuan responden sudah cukup baik yaitu kategori sedang 64%. Sikap responden masuk dalam kategori sedang sebanyak 70%. Tindakan responden tentang mencegah dehidrasi akibat diare masih rendah karena masuk dalam kategori kurang sebanyak 66%.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2013) yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit diare pada balita di Desa Nglebak Tawangmangu Karanganyar yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang diare pada balita di Desa Nglebak Tawangmangu Karanganyar pada tingkat baik, cukup dan kurang, dan hasil penelitian tingkat pengetahuan ibu tentang penyakit diare pada bayi di Desa Nglebak Tawangmangu Karanganyar tingkat pengetahuan baik sebanyak 3 responden (8,3%), pengetahuan cukup sebanyak 25 responden (69,4%) dan pengetahuan kurang sebanyak 8 responden (22,3%).

Sehubungan dengan penelitian diatas ada pula penelitian yang dilakukan oleh Chusnul, dkk (2013) tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu balita dengan perilaku pemberian oralit pada balita diare di Kecamatan Kepanjen Malang yang bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap ibu balita dengan perilaku pemberian oralit pada balita diare, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengetahuan ibu di Kecamatan Kepanjen termasuk kategori baik sebanyak 39 responden (76,5%), sikap ibu balita yang termasuk kategori positif sebanyak 28 responden (54,9%), dan tindakan ibu balita meberikan oralit 20 responden (39,2%), memberikan LGG sebanyak 22 responden (43,1%).

2. Tingkat pengetahuan

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan :

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan hanya sebagai memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu (Notoatmodjo, 2010). Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendefenisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami suatu objek bukan sekedar tahu terhadap objek tersebut, tidak sekedar dapat menyebutkan, tetapi orang tersebut harus dapat menginterpretasikan secara benar tentang objek yang diketahui tersebut.

c. Aplikasi (*aplication*)

Aplikasi diartikan apabila seseorang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip yang telah diketahui tersebut pada situasi yang lain.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan, dan mencari hubungan antara komponen-komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan, atau mengelompokan, membuat diagram (bagan) terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam satu hubungan yang logis dari komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain

sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian ini dengan sendirinya didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri (Notoatmodjo, 2010).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Menurut Mubarak, dkk (2007) ada tujuh faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :

a. Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.

b. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

d. Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

e. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha

untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif.

f. Kebudayaan

Kebudayaan lingkungan sekitar, apabila dalam suatu wilayah mempunyai budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan maka sangat mungkin masyarakat sekitarnya mempunyai sikap untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

g. Informasi


Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru.

4. Pengukuran pengetahuan


Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkatan pengetahuan (Notoatmodjo, 2003).

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan, maka digambarkan kerangka konsep sebagai berikut :



Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik yang menilai tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah-rumah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah:

- a. Kawasan Sombaopu salah satunya adalah Kelurahan Tompobalang. Keadaan lingkungan Kelurahan ini bervariasi dari daerah pasar, kumuh dan perumahan sosial ekonomi menengah.
- b. Dari data kasar yang ada di Puskesmas Sombaopu kejadian diare pada bayi masih cukup tinggi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*, yaitu penelitian yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena kesehatan itu terjadi, kemudian melakukan analisis dinamika korelasi antara fenomena, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (Notoatmodjo, 2005).

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut wasis (2008) populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh ibu yang mempunyai bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

2. Sampel

Sample adalah elemen-elemen populasi yang dipilih atas dasar kemampuan mewakilinya (Danim, 2003). Banyaknya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus (Lemeshow, 1994), yaitu:

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot (1-P) \cdot N}{d^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot P \cdot (1-P)}$$

Keterangan :

- n = Besar sample
- N = Besar populasi
- d = Galat pendugaan (0,1)
- Z = Tingkat kepercayaan (90%=1, 645)
- P = Proporsi populasi (0,5)

Berdasarkan data dari Puskesmas Sombaopu bahwa jumlah ibu yang membawa bayinya berobat ke Puskesmas Sombaopu yang persentasi <5 tahun sebanyak 79 orang dalam kurun waktu satu tahun.

$$n = \frac{Z^2 \cdot P(1-P) \cdot N}{d^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot P(1-P)}$$

$$n = \frac{(1,645)^2 \cdot 0,5(1-0,5) \cdot 79}{(0,1)^2 \cdot (79-1) + (1,645)^2 \cdot 0,5(1-0,5)}$$

$$n = 61,31 = 61$$

Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh sampel sebanyak 61 orang. Teknik pengambilan sampel yaitu secara *simple random sampling* dengan cara menuliskan semua nama ibu dikertas lalu dimasukkan kedalam wadah atau botol kemudian dilakukan pengundian seperti arisan sebanyak 61 kali sesuai dengan jumlah sampel.

D. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden. Pembagian kuesioner dilakukan oleh peneliti kepada ibu yang mempunyai bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu. Sebelum pelaksanaan, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta melakukan kontrak waktu kepada responden. Peneliti meminta persetujuan untuk menjadi responden dengan memberikan lembaran *informed consent* sebagai bukti kesediaan sebagai responden dalam penelitian ini. Jika responden bersedia, maka responden menandatangani lembar *informed consent*. Setelah itu peneliti memberikan penjelasan mengenai cara-cara pengisian kuesioner, kemudian kuesioner diberikan kepada responden.

Responden diberikan waktu dan diminta untuk mengisi data sesuai yang tercantum dalam kuesioner penelitian. Apabila ada pertanyaan yang tidak jelas dapat ditanyakan kepada peneliti. Kuesioner langsung diisi oleh responden sehingga data yang diperoleh adalah data primer. Semua data yang ada dikumpulkan, diperiksa kelengkapannya untuk kemudian di analisa oleh peneliti.

1. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh yaitu dengan mengunjungi lokasi penelitian dan meminta kesediaan responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Selanjutnya diadakan penyebaran kuesioner dengan dipandu pada saat pengisiannya, sehingga diperoleh penilaian dari responden terhadap pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi.

b. Data sekunder

Data Sekunder diperoleh dari pihak lain atau dari laporan-laporan dan penelitian yang telah ada, dan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dari data bayi diare di Puskesmas Sombaopu.

E. Instrumen Penelitian

1. Wawancara

Wawancara digunakan pada saat pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare di rumah di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

2. Kuesioner

Alat untuk pengumpulan data adalah kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Kuesioner terdiri dari data karakteristik responden, data dari pengetahuan, dan tindakan responden dalam upaya melakukan penanganan diare pada bayi. Penelitian ini terdiri dari 24 pertanyaan yang terdiri dari 11 pertanyaan pengetahuan, dan 13 pertanyaan tentang tindakan.

F. Validasi dan Reabilitas Instrumen

Dua karakteristik alat ukur penelitian yang harus diperhatikan peneliti adalah validitas dan reabilitas. Validitas (kesahihan) menanyakan sejauhmana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data sedangkan reabilitas (keandalan) adalah adanya suatu kesamaan hasil apabila pengukuran dilaksanakan oleh orang yang berbeda terhadap gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama (Hastono, 2006 dalam Novita, 2012).

Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah alat ukur yang sudah baku berdasarkan literatur sehingga tidak perlu lagi diuji validitas

dan reabilitas dengan nilai *chronbach alpha* sebesar 0,73 yang interpretasinya termasuk kategori cukup. Instrumen ini pernah digunakan oleh Anita (2013) di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Universitas Sumatera Utara Medan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan data dengan bantuan komputer. Tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. Penyunting Data (*Editing*)

Dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Yakni upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan.

b. Pengkodean (*Coding*)

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data. Coding merupakan kegiatan pemberian kode atau angka terhadap data yang terdiri dari beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali melalui lokasi dan arti suatu kode dari suatu variable.

c. Entri Data (*Tabulasi*)

Data entri adalah kegiatan memasukkan data yang telah dikumpul kedalam master tabel, kemudian membuat distribusi

frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontigensi.

2. Analisa data

a. Analisa univariat

Analisa univariat dilakukan secara deskriptif yang berfungsi untuk meringkas, mengklasifikasikan, dan menyajikan data. Data ditampilkan dengan tabel frekuensi mengenai pengetahuan dan penanganan diare.

b. Analisa bivariat

Analisa bivariat ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable independen (pengetahuan) dan variable dependen (tindakan penanganan). Penelitian ini menggunakan uji data *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan yaitu $p < \alpha$ ($\alpha = 0,05$). Jadi, Hipotesis akan diterima jika $p < 0,05$, sedangkan Hipotesis akan ditolak jika $p > 0,05$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu. Desain penelitian yang digunakan yaitu *cross sectional* dengan banyaknya yang dijadikan sampel dan responden berjumlah 61 orang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu dari tanggal 9 Juni sampai dengan 6 Juli 2014. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *simple random sampling*. Kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa analisis yaitu :

1. Analisis univariat

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran masing-masing variabel penelitian diantaranya data demografi sampel dan responden serta variabel pengetahuan, dan penanganan diare dimana data yang diperoleh ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun variabel yang dimaksud dalam analisis akan di jelaskan dalam bentuk tabel dan narasi, yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Usia Ibu Di Kelurahan
Tompobalang Kecamatan Sombaopu (n=61)

Rata-Rata	Standar Deviasi	Median	Min	Max
27,00	2,793	27,00	22	33

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 61 orang responden rata-rata usia ibu sebanyak 27,00, standar deviasi 2,793 dengan median 27,00, usia termuda 22 tahun dan usia tertua 33 tahun.

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Menurut Pendidikan Ibu, Pekerjaan,
Tingkat Pengetahuan dan Tindakan Penanganan Diare
Di Kelurahan Tompobalang (n=61)

Karakteristik	n	%
Pendidikan		
Tidak Sekolah	1	1,6
Tidak Lulus SD	2	3,3
Lulus SD	23	37,7
Lulus SLTP	13	21,3
Lulus SLTA	19	31,1
Perguruan Tinggi	3	5,0
Pekerjaan		
Pedagang	3	4,9
Buruh	1	1,6
IRT	54	88,5
PNS	1	1,7
Lainnya	2	3,3
Tingkat Pengetahuan		
Kurang	37	60,7
Cukup	24	39,3
Tindakan Penanganan		
Kurang	35	57,4
Baik	26	42,6

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan pendidikan ibu yang tidak sekolah sebanyak 1 orang (1,6%), tidak lulus SD sebanyak 2 orang (3,3), lulus SD sebanyak 23 orang (37,7%), lulus SLTP sebanyak 13 orang (21,3%), lulus SLTA sebanyak 19 orang (31,1%) dan perguruan tinggi sebanyak 3 orang (5,0%). Data di atas diketahui pula bahwa responden menunjukkan pekerjaan pedagang sebanyak 3 orang (4,9%), buruh sebanyak 1 orang (1,6%), IRT sebanyak 54 orang (88,5%), PNS sebanyak 1 orang (1,7%) dan lainnya sebanyak 2 orang (3,3%). Selanjutnya responden lebih banyak menunjukan pengetahuan ibu termasuk dalam kategori kurang yaitu 37 orang (60,7%) dan 24 orang lainnya (39,3%) pengetahuan ibu termasuk dalam kategori cukup. Dan tindakan penanganan responden lebih banyak menunjukkan kategori kurang sebanyak 35 orang (57,4%) dan 26 orang (42,6%) tindakan penanganan termasuk dalam kategori baik.

2. Analisis bivariat

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (pengetahuan) dan variabel dependen (tindakan penanganan). Penelitian ini menggunakan uji data *Chi-Square* dengan tingkat kemaknaan yaitu $p < \alpha$ ($\alpha = 0,05$). Jadi, Hipotesis akan diterima jika $p < 0,05$, sedangkan Hipotesa akan ditolak jika $p > 0,05$. Analisis data tersebut akan diolah dengan bantuan komputer menggunakan uji statistik *SPSS versi 11,5 for Windows*.

Tabel 4.3
 Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Bayi
 Di Kelurahan Tompobalang

Pengetahuan	Tindakan Penanganan				Jumlah		Nilai <i>p</i>	<i>Effect Size</i>
	Kurang		Baik		N	%		
	n	%	N	%				
Kurang	27	44,3	10	16,4	37	60,7		
Cukup	8	13,1	16	26,2	24	39,3	0,005	0,392
Jumlah	35	57,4	26	42,6	61	100,0		

Sumber : Data Primer 2014

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh bahwa ibu yang memiliki pengetahuan yang kurang dan tindakan penanganan diare termasuk dalam kategori kurang sebanyak 27 orang (44,3%) sedangkan ibu yang memiliki pengetahuan yang cukup dan tindakan penanganan diare dalam kategori baik sebanyak 16 orang (26,2%).

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *chi-square* diperoleh nilai $p = 0,005$ yang artinya lebih kecil dari $\alpha (0,05)$ dan *effect size* diperoleh nilai 0,392 yang artinya kekuatan hubungan sedang. Dengan demikian maka hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang penanganan diare pada bayi Di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa ibu yang memiliki pengetahuan kurang dan tindakan penanganan diare kurang disebabkan karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan mengenai tindakan penanganan diare baik melalui program pemerintah maupun melalui media informasi selain itu kecenderungan responden tersebut dominan berpendidikan dalam kategori rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan uji *Chi square* menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu dengan ($p=0,005 < \alpha=0,05$).

Penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya oleh Mauliku (2009) tentang hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di Puskesmas Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah sampel sebanyak 87 orang. Dimana diperoleh bahwa pengetahuan ibu yang masih kurang berhubungan dengan tindakan penanganan yang buruk terhadap kejadian diare. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Tami Fediani (2011) tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan tindakan ibu terhadap kejadian diare pada balita di Kelurahan Tanjung Sari dengan jumlah sampel sebanyak 72 orang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan mayoritas responden mempunyai tingkat pengetahuan sedang dan didapatkan mayoritas tindakan dalam kategori baik,

didapati hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu dengan tindakan ibu terhadap kejadian diare pada balita.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Dwi Anggrayani (2013) tentang hubungan pengetahuan ibu tentang tatalaksana diare di rumah dengan kesembuhan diare pada balita di wilayah Puskesmas Pondok Ranji Jakarta Selatan dengan sampel sebanyak 53 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu masih memiliki pengetahuan yang rendah tentang bagaimana melakukan tatalaksana diare di rumah dengan baik dan sebagian besar balita yang terkena diare mengalami kesembuhan kurang baik. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nur Jihan (2013), tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dengan jumlah sampel sebanyak 42 responden. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden mempunyai tingkat pengetahuan cukup, mayoritas sikap ibu adalah mendukung, dan penatalaksanaan diare pada balita adalah baik. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita dan adanya hubungan yang bermakna antara sikap ibu dengan penatalaksanaan diare pada balita.

Penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Herwindasari (2013), tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan awal diare pada balita di wilayah Puskesmas Perumnas II Pontianak dengan jumlah sampel sebanyak 55 responden. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu mayoritas dalam kategori kurang dengan penatalaksanaan awal diare dalam kategori buruk, didapatkan adanya hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan penatalaksanaan awal diare pada balita. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hartono (2007), tentang hubungan tingkat pengetahuan dan sikap ibu tentang diare dengan praktik penanganan diare pada balita di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dengan jumlah sampel sebanyak 72 responden. Dimana diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu baik, sikap ibu tentang diare baik dan praktik penanganan diare yang tepat. Ada kaitan yang signifikan antara tingkat pengetahuan ibu, sikap ibu dengan praktik penanganan diare.

Relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saeed (2012), tentang penilaian pengetahuan ibu tentang manajemen diare pada anak dirumah dalam pengaturan Nigeria dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu semakin baik pengetahuannya dan semakin baik pula penanganan diare yang dilakukannya. Mayoritas ibu setuju bahwa oralit diperlukan dalam pengobatan diare. Hal ini juga dilakukan oleh Subekti (2009) tentang hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan tindakan penanganan pada balita di RSUD dr. Sayidiman Magetan dengan jumlah sampel sebanyak 13 orang. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar tingkat pengetahuan ibu adalah baik, kemudian tindakan penanganan ibu dalam penanganan balita diare sebagian besar adalah baik, maka hubungan kedua variabel tersebut signifikan. Hal ini

berarti terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang diare dengan tindakan penanganan pada balita.

Adapun penelitian yang tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Keiwkarnka (2010), tentang perilaku pencegahan diare Myanmar oleh pengasuh imigran dengan anak dibawah lima tahun di Muang District Samut Sakhon Province Thailand dengan jumlah sampel sebanyak 67 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan tingkat pengetahuan responden tentang diare dengan praktik perilaku pencegahan diare. Penelitian yang dilakukan Babak Abdinia (2014), tentang pengetahuan dan praktek ibu dalam pengelolaan diare anak-anak di Northwest Iran dengan jumlah sampel sebanyak 956 orang. Diperoleh bahwa dalam penelitian kami, ibu memiliki pengetahuan yang cukup tentang peran oralit dalam kompensasi dehidrasi pada diare pediatrik, tetapi memiliki kinerja terhadap diare yang buruk dalam menggunakannya. Tidak ada hubungan linier yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan kinerja terhadap diare dalam kasus diare pediatrik, hasil ini didapatkan karena pengetahuan dan kinerja mayoritas ibu yang sedang atau miskin.

Penelitian ini tidak relevan dengan peneliti Maryatun (2008), tentang hubungan antara tingkat pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada anak balita wilayah kerja Puskesmas Setabelan Kota Surakarta dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan dan perawatan diare dengan angka kejadian diare di wilayah kerja Puskesmas Stabelan baik. Tidak ada hubungan

antara tingkat pengetahuan ibu tentang diare dengan kejadian diare pada balita. Penelitian ini pula tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2012), tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan terjadinya diare pada anak balita (1-4 tahun) dengan jumlah sampel 67 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan ibu tentang diare memiliki hubungan yang tidak bermakna dengan terjadinya diare pada anak balita usia 1-4 tahun. Hasil ini kemungkinan dapat disebabkan oleh jumlah sampel yang kurang dan karakteristik sampel yang bervariasi

Berdasarkan hasil tersebut membuktikan bahwa pengetahuan (kognitif) merupakan domain yang sangat penting untuk tindakan seseorang di mana pengetahuan tersebut mengandung enam tingkatan domain kognitif yang mendominasi pengetahuan, pemahaman, penerapan, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi (Notoatmodjo, 2007). Setelah seseorang mengetahui stimulus atau objek, proses selanjutnya akan menilai dan bersikap terhadap stimulus atau objek kesehatan tersebut. Menurut Green dalam Notoatmodjo (2003) mengemukakan bahwa pengetahuan merupakan faktor predisposisi dalam perilaku seseorang. Sebelum seseorang mengadopsi perilaku (perilaku baru), ia harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya. Seorang ibu akan melakukan berperilaku sehat apabila ia tahu apa bahaya dan kerugian yang akan terjadi bila dia tidak melakukan hal tersebut. Pengetahuan berkaitan erat dengan perilaku manusia yaitu sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, ingin mengetahui adalah suatu sifat yang sudah melekat di dalam diri setiap orang. Seseorang

mengabsorpsi perilaku (berperilaku baru), pada awalnya ia harus tahu terlebih dahulu apa arti atau manfaat perilaku tersebut bagi dirinya atau keluarganya. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Selanjutnya dari pengetahuan tersebut menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap subjek terhadap objek yang diketahui itu.

Menurut Beckler dan Wiggins yang dikutip oleh Azwar (2005) sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap perilaku berikutnya. Rangsangan yakni objek yang telah diketahui dan disadari sepenuhnya tersebut akan menimbulkan tindakan terhadap stimulus atau objek tersebut sehingga terbentuk suatu perilaku hidup individu (Notoatmodjo, 2003). Menurut Kusriani (2006), aspek dalam perilaku terdiri dari pengetahuan, sikap dan tindakan. Pengetahuan merupakan kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan objek dengan tepat dan mempresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu obyek. Jadi, setiap orang selalu ingin mengetahui sesuatu yang belum di ketahuinya. Dorongan ingin mengetahui membuat seseorang berusaha dengan cara apapun agar keinginanya itu menjadi kenyataan atau terwujud. Jarak dan waktu, tenaga maupun materi tidak menjadi soal, yang penting hal-hal yang belum di ketahuinya dapat di lihat secara langsung. Menurut Maramis (2006), sikap merupakan bentuk respon atau tindakan yang memiliki nilai positif dan

negatif terhadap suatu objek atau orang yang disertai dengan emosi. Sikap adalah juga diartikan sebagai respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya) (Notoatmodjo, 2010) dan sikap yang diperoleh lewat pengalaman akan menimbulkan pengalaman langsung terhadap perilaku berikutnya (Azwar, 2005). Untuk mempengaruhi perilaku, suatu sikap mempunyai tiga komponen yang secara bersama-sama membentuk suatu sikap yang utuh (*total attitude*) dan dipengaruhi oleh pengetahuan, pikiran, keyakinan dan emosi (Notoatmodjo, 2010). Sikap belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan, diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terwujudnya suatu tindakan, diantaranya adalah faktor fasilitas dan faktor dukungan dari pihak lain. Untuk itu peran ibu menjadi sangat penting karena di dalam merawat anaknya, ibu seringkali berperan sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam mengasuhan anak, yaitu dalam hal memberi makan, memberi perawatan kesehatan dan penyakit, memberi stimulasi mental. Dengan demikian bila ibu berperilaku baik mengenai diare, ibu sebagai pelaksana dan pembuat keputusan dalam mengasuhan, diharapkan dapat memberikan penanganan dan pertolongan pertama pada diare dengan baik (Sari, 2009). Kemudahan untuk memperoleh suatu informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Mubarak, 2007).

Adapun ayat yang terkait tentang pengetahuan dengan tindakan dalam

Q.S az-zumar (9):

أَمَّنْ هُوَ قَنْتِ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا مَحَذِرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahan:

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Tingkat pengetahuan seseorang memiliki relevansi dengan ajaran islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an-nahl (16): 43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

Terjemahan:

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” (Depag, 2013).

C. Keterbatasan peneliti

1. Penelitian ini didesain dengan pendekatan *cross sectional* dimana penelitian hanya dilakukan sesaat. Segala kejadian pada sampel tidak digali secara mendalam, karena penilaian hanya disesuaikan pada kuesioner yang juga tidak terlepas dari keterbatasan penulis, selain itu juga karena keterbatasan waktu.

2. Sampel hanya terbatas pada Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu tanggal 9 Juni sampai dengan 6 Juli 2014 dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat pengetahuan ibu tentang diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu termasuk kategori kurang.
2. Tindakan penanganan ibu tentang diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu termasuk kategori kurang.
3. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan penanganan diare pada bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu ($p= 0,005 < \alpha=0,05$).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk puskesmas agar lebih meningkatkan program puskesmas yaitu penyuluhan guna meningkatkan pengetahuan masyarakat dan memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pencegahan dan penanganan diare. Sehingga dapat mengurangi angka morbiditas kejadian diare pada bayi.

2. Untuk masyarakat agar lebih menjaga kesehatan bayi dan dapat mengikuti program-program puskesmas yang sudah dicanangkan.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan penelitian dengan variabel-variabel lain yang lebih inovatif mengenai faktor yang berhubungan dengan penanganan diare pada bayi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, al-Karim.

Abdinia, Babak. "Knowledge and Practice of Mothers in The Management of Children's Diarrhea in Northwest Iran", *Tesis*. http://pedinfect.com/?page=article&article_id=17581 (13 April 2014).

Abuzubair. "Inilah Adab-Adab Istinja' dan Buang Air". *Official Website Abuzubair*. <http://abuzubair.com/2008/02/20/inilah-adab-adab-istinja-dan-buang-air/> (16 Juli 2008).

Adisasmito, Wiku. "Faktor Risiko Diare Pada Bayi dan Balita Di Indonesia: Systematic Review Penelitian Akademik Bidang Kesehatan Masyarakat", *Makara Kesehatan Vol. 11 No. 1 Juni 2007*. <http://journal.ui.ac.id/health/article/viewFile/212/208> (15 Desember 2007).

Ahira, Anne. "Defenisi Diare". *Official Website AnneAhira* <http://www.anneahira.com/definisi-diare.htm> (17 Maret 2013).

Ahlquist D.A, & Camilleri M. *Diarrhea and Constipation*. In: Harrison's Principles Of Internal Medicine 16th ed. USA: McGraw Hill, 2005.

Al-Sofwah. "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat:222". *Official Website Alsofwah*, <http://www.alsofwah.or.id/?pilih=lihatquran&id=118> (29 April 2009).

Anggrayani, Dwi. "Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Tatalaksana Diare di Rumah Dengan Kesembuhan Diare Pada Balita di Wilayah Puskesmas Pondok Ranji", *Jurnal Keperawatan*. <https://www.academia.edu/5257072> (3 Juni 2013).

Anita, Yunika. "Gambaran Perilaku Ibu Tentang Penanganan Awal Diare dalam Mencegah Terjadinya Dehidrasi Pada Balita di Kelurahan Tegal Sari Mandala III Kecamatan Medan Denai Tahun 2012", *Skripsi*. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/37494> (21 Mei 2013).

Apriyanti, Marisa, dkk. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Swakelola 11 Ilir Palembang Tahun 2009". *Skripsi*. <http://libraryusu.ac.id> (8 Juni 2009).

Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Chodjim, Achmad. *Menerapkan Keajaiban Surah Yasin dalam Kehidupan Sehari-hari "Sungguh aku menginginkan yasin berada di dalam hati setiap insan dari Umatku" Hadis Nabi*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008.

- Chusnul, Chuluk, dkk. “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Perilaku Pemberian Oralit Pada Balita Diare di Kecamatan Kepajeng Malang”, *Jurnal Keperawatan*. id.scribd.com/doc/230981906/2-Abstrak-Indonesia-Inggris (23 Juni 2013).
- Danim, Sudarwan. *Riset Keperawatan Sejarah dan Metodologi*. Jakarta: EGC, 2003.
- Darmawati. “Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare Pada Masyarakat di Kelurahan Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012”, *Jurnal Kesehatan*. id.scribd.com/doc/201651005/Jurnal-Thita-PDF (23 Januari 2014).
- Departemen Kesehatan RI. *Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)*. Jakarta : Depkes RI, 2003.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. “Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2009”. *Official Website*. <http://datinkessulsel.wordpress.com/2009/11/30/profil-kesehatan-provinsi-sulawesi-selatan-tahun-2009/> (30 November 2010).
- Hardi, Masni, dkk. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Baranglombo Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2012”, *Jurnal Ilmiah*. repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4666 (7 Juni 2013).
- Hartono, Rudi. “Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Diare dengan Praktik Penanganan Diare Pada Balita di Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes”, *Skripsi*. core.kmi.open.ac.uk/display/11736365 (20 Februari 2007).
- Herwindasari, Erisa. “Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Dengan Penatalaksanaan Awal Diare Pada Balita Di Wilayah Puskesmas Perumnas II Pontianak”, *Jurnal Mahasiswa Vol. 1 No. 1 Januari 2013*. jurnal.untan.ac.id/index.php/jfk/article/download/4889/4983 (14 Juni 2013).
- Hidayat, Aziz Alimul. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak Buku 2*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Kementrian Kesehatan RI. *Panduan Sosialisasi Tatalaksana Diare pada Balita*. Direktorat Jendral Pengadiln Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 2011.
- Keiwkarnka, Boonyong. *Diarrhea Preventive Behavior of Myanmar Immigrant Caregivers With Children Under Five Years in Muang District Samut Sakhon Province Thailand*. ASEAN: Institute for Health Development (AIHD) Mahidol University, 2010.

- Kharisman. "Sikap Terhadap Perintah dan Larangan Nabi (Hadist Ke-9 Arbain Annawiyah". *Blog Salafy*. <http://salafy.or.id/blog/2012/05/30/sikap-terhadap-pemerintah-dan-larangan-nabi-hadist-ke-9-arbain-annawiyah/> (30 Mei 2012).
- Kusrini. *Sistem Pakar Teori dan Aplikasi (Edisi Pertama)*. Penerbit: Yogyakarta, 2006.
- Malikhah, Lina, dkk. "Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu dalam Pencegahan dan Penanggulangan Secara Dini Kejadian Diare Pada Balita di Desa Hegarmanah Jatinangor", *Jurnal Keperawatan*. journals.unpad.ac.id/ejournal/article/download/783/829 (8 Mei 2012).
- Maramis, WF. *Ilmu Perilaku Dalam Pelayanan Kesehatan*. Universitas Airlangga: Surabaya, 2006.
- Maryatun. "Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Diare Dengan Kejadian Diare Pada Anak Balita Wilayah Kerja Puskesmas Setabelan Kota Surakarta", *Jurnal Kesehatan Vol. 3*. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/search.html?act=tampil&id=26105&idc=24> (24 Agustus 2008).
- Mauliku, Novie E. "Hubungan Antara Faktor Perilaku Ibu dengan Kejadian Diare Pada Balita di Puskesmas Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat", *Jurnal Keperawatan*. stikesayani.ac.id/publikasi/e-journal/files/2009/.../200912-005.pdf (28 Januari 2009).
- Mubarak, Wahit, dkk. *Ilmu Keperawatan Komunitas Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika, 2007.
- Muhammadiyah, Putusan. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- Namuwali, Domianus. "Upaya Orangtua dalam Penanganan Diare di Rumah", *Skripsi*. eprints.undip.ac.id/8797/ (20 April 2010).
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Nur, Jihan S. "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Penatalaksanaan Diare Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tilote Kecamatan

Tilango Kabupaten Gorontalo”, *Skripsi*.
kim.ung.ac.id/index.php/KIMFIKK/article/viewFile/2802/2778 (13 Mei 2013).

Purwanti, Anik. “Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penyakit Diare Pada Balita di Desa Nglebak Tawangmangu Karanganyar”, *KTI*.
digilib.stikeskusumahusada.ac.id/download.php?id=421 (22 Juli 2013).

Rahayu, Sri Dedeh. “Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Dengan Terjadinya Diare Pada Anak Balita (1-4 Tahun) Di Rumah Sakit Umum Cibabat Kota Cimahi”, *Tesis*, <http://www.scribd.com/doc/107494529/> (1 Oktober 2012).

Saeed, Kamaldeen. “Assessment of Mothers’ Knowledge of Home Management of Childhood Diarrhea in a Nigerian Setting”, *Journal of Pharmaceuticals Research and Bio-Science Vol. 1 No. 4*.
www.ijprbs.com/.../8/8-5-53-IJPRBS-111.11.pdf (27 Agustus 2012).

Sari. “Perilaku Ibu dalam Penatalaksanaan Rehidrasi Oral Pada Balita Diare yang Berada di Rumah di Kelurahan Siringo-Ringo Labuhanbatu”,
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17125/7/Cover.pdf (26 Februari 2019).

Sindo, Harian. “Diare, Penyebab Kematian Kedua Balita di Dunia”. *Harian Sindo*.
library.um.ac.id/images/stories/kliping_pendidikan_2009/.../diare.doc (14 Juni 2010).

Simatupang, Mei Yati. “Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Kota Sibolga Tahun 2003”, *Tesis*.
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/6764> (14 April 2004).

Smeltzer, Suzanne C & Brenda G. Bare. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner dan Suddarth Edisi 8*. Jakarta: EGC, 2005.

Subekti, Heni. “Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Diare Dengan Tindakan Penanganan Pada Balita Di RSUD dr. Sayidiman Magetan”,
Laporan Tugas Akhir.
<http://dglib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=showview&id=14518> (29 Mei 2009).

Sunaryo. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC, 2004.

Suraatmaja, Sudaryat. *Gastroenterologi Anak*. Jakarta: Kapita Selekta, 2005.

Suraatmaja, Sudaryat. *Aspek Gizi Air Susu Ibu*. Jakarta: EGC, 2007.

Suriadi & Yulianni. *Buku Pegangan Praktik Klinik Asuhan Keperawatan Pada Anak*. Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 2006.

Wasis. *Pedoman Riset Praktis Untuk Profesi Perawat*. Jakarta: EGC, 2008.

Widyastuti, Danis. *Panduan Perkembangan Anak 0-1 Tahun*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, 2010.

Wijaya, Andra Saferi. *Keperawatan Medikal Bedah (Keperawatan Dewasa)*. Jakarta: EGC, 2013.


Yurisa, Wella. *Etika Penelitian Kesehatan*. Fakultas Kedokteran. Universitas Riau, 2008.



L

A

M



I

R

ALAUDDIN
MAKASSAR

A

N

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth
Calon Responden
Di-
Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Junaedah Muis
NIM : 70300110051
Alamat : Jl. Poros Malino, Tompobalang

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu”**.

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesedian dari ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden. Selanjutnya saya mengharapkan ibu untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang saya berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya. Jika ibu tidak bersedia menjadi responden, tidak ada sanksi bagi ibu.

Apabila ibu menyetujui, maka saya mohon kesediaannya untuk menandatangani lembar persetujuan dan mengikuti semua rangkaian proses penelitian ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Sungguminasa, 2014
Peneliti

(Junaedah Muis)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN
(INFORMED CONSENT)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :

Setelah mendapat penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian dan bahwa segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan serta hanya digunakan untuk kepentingan peneliti, maka saya (bersedia/tidak bersedia)* untuk menjadi responden penelitian yang berjudul **“Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Penanganan Diare Pada Bayi di Kelurahan Tompobalang Kecamatan Sombaopu”**,

Saya memahami penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka menyusun skripsi bagi peneliti dan tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya tanda tangani dan kiranya dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sungguminasa,

2014

Responden

(_____)

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PENANGANAN DIARE PADA BAYI DI KELURAHAN TOMPOBALANG KECAMATAN SOMBAOPU

I. Data Responden

No. Responden

Anonim

Umur

Pendidikan

1. Tidak sekolah

2. Tidak lulus SD

3. Lulus SD

4. Lulus SLTP

5. Lulus SLTA

6. Lulus D3/S1

Pekerjaan

1. Pedagang

2. Buruh/pembantu

3. Ibu Rumah Tangga

4. PNS

5. Lainnya, sebutkan



II. Data Perilaku

A. Pengetahuan

1. Menurut ibu apa yang dimaksud diare?
 - a. Mencret dan muntah berturut-turut
 - b. Buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari tiga kali dalam satu hari
 - c. Keadaan pengeluaran tinja yang tidak normal
2. Menurut ibu apa yang dimaksud dengan kekurangan cairan (dehidrasi)?
 - a. Gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada tubuh
 - b. Banyaknya air yang keluar dari tubuh
 - c. Gangguan pencernaan yang menyebabkan kurangnya air dalam tubuh
3. Menurut ibu kekurangan cairan (dehidrasi) disebabkan karena?
 - a. Sedikitnya asupan makanan atau minuman yang diterima balita
 - b. Balita tidak mau minum dan menangis terus
 - c. Banyaknya cairan yang keluar saat mengalami diare
4. Menurut ibu diare dapat ditularkan melalui ?
 - a. Feces, udara, tangan dan makanan
 - b. Tidak mencuci tangan dan feces
 - c. Polusi udara, air yang tercemar dan pakaian yang kotor

5. Menurut ibu untuk menentukan tingkat dehidrasi yang diderita anak dapat dilihat dari?

- a. Berapa kali anak mengalami mencret dalam 1 hari
- b. Penurunan berat badan anak
- c. Sudah berapa lama anak mengalami diare

6. Menurut ibu apa langkah pertama yang harus dilakukan pada anak yang mengalami dehidrasi akibat diare?

- a. Membawa anak berobat segera ke pelayanan kesehatan
- b. Memberikan oralit pada anak
- c. Memberikan sup, air tajin atau air kelapa pada anak

7. Menurut ibu komplikasi apa yang sering dijumpai akibat diare pada anak?

- a. Kekurangan cairan dan gangguan gizi akibat kelaparan
- b. Kehilangan berat badan
- c. Rasa haus dan lapar yang sangat besar

8. Menurut ibu bagaimana cara membuat larutan gula garam sebagai pengganti oralit?

- a. 1 sendok teh gula ditambah $\frac{1}{2}$ sendok teh garam dilarutkan dalam 1 liter air
- b. 2 sendok teh gula ditambah 1 sendok teh garam dilarutkan dalam 1 liter air
- c. 1 sendok teh gula ditambah $\frac{1}{4}$ sendok teh garam dilarutkan dalam 1 liter air

9. Menurut ibu ketika anak diare makanan apa saja yang harus dihindari?

- a. Minuman bersoda dan dengan pemanis buatan
- b. Kentang, bakmi dan biscuit
- c. Makanan mengandung lemak dalam jumlah tinggi dan sup

10. Menurut ibu kapan waktu yang tepat membawa anak yang terserang diare ke dokter? Ketika:

- a. Buang air besar cair lebih sering dan tidak membaik dalam tiga hari
- b. panas tinggi, muntah dan mengalami keringat dingin
- c. Tinja keras dan anak muntah berulang-ulang dalam jumlah banyak

11. Menurut ibu langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah diare pada anak?

- a. Memasak sayuran sampai lembek dan mencuci tangan sehabis makan
- b. Membersihkan bak mandi 3 kali sehari dan mencuci botol susu
- c. Membuang tinja dengan benar dan menggunakan air yang bersih



B. Tindakan Penanganan (Dikutip dari Anita,Y, 2013)

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah ketika anak ibu buang air besar tidak seperti biasanya ibu akan langsung membawanya kedokter atau pelayanan kesehatan		
2.	Apakah ibu tetap memberikan susu formula ketika anak mengalami kekurangan cairan akibat diare		
3.	Ketika anak mengalami dehidrasi apakah ibu memuaskan anak dari makanan dan minuman		
4.	Ketika anak diare apakah ibu segera memberikan oralit atau larutan gula garam		
5.	Apakah ibu memberikan jus buah atau teh manis sebagai pengganti oralit ketika anak mengalami kekurangan cairan		
6.	Apakah ibu memberikan oralit setiap 30 menit sekali saat anak mengalami kekurangan cairan		
7.	Apakah ibu menyediakan ORS atau oralit dirumah		
8.	Apakah selain memberikan oralit ibu juga memberikan makanan tambahan pada anak		
9.	Apakah ketika anak mengalami kekurangan cairan ibu memberikan antibiotik		
10.	Apakah ibu memberikan oralit ketika anak diare		

	walaupun anak belum memasuki tahap kekurangan cairan		
11.	Apakah ketika anak muntah ibu menghentikan pemberian oralit selama 10 menit		
12.	Apakah ibu memberikan cairan oralit secara terus menerus sampai diare yang diderita anak sembuh		
13.	Apakah ibu menghentikan pemberian ASI pada saat anak mengalami dehidrasi akibat diare		



No	Inisial	Umur	Pendidikan		Pekerjaan		Pengetahuan											
			Ket	Kod	Ket	Kod	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Σ
1	S	24	LSD	3	IRT	3	1	2	0	1	1	2	1	1	1	0	1	11
2	P	29	TLSD	2	IRT	3	0	1	1	0	1	2	2	2	0	0	1	10
3	K	31	LSD	3	IRT	3	0	1	1	1	0	2	2	1	0	1	1	10
4	N	26	LSD	3	IRT	3	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	2	11
5	N	29	LSD	3	IRT	3	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	1	17
6	J	27	LSD	3	IRT	3	1	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	17
7	S	23	TS	1	IRT	3	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	2	17
8	H	27	LSLTA	5	IRT	3	1	2	1	1	1	1	2	0	1	0	1	11
9	H	27	LSLTP	4	IRT	3	1	0	1	2	2	1	1	1	1	0	1	11
10	S	24	LSD	3	IRT	3	1	1	2	2	1	1	1	1	0	0	1	11
11	S	30	LSLTP	4	IRT	3	0	1	1	2	2	1	1	0	1	1	0	10
12	M	28	LSD	3	IRT	3	1	0	1	2	1	2	2	2	1	2	2	16
13	M	22	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	15
14	S	22	LSLTA	5	IRT	3	1	2	2	1	1	2	1	2	2	1	1	16
15	R	27	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	14
16	N	25	LSLTA	5	IRT	3	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	11
17	S	25	LSLTP	4	IRT	3	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	9
18	F	30	P.Tinggi	6	Lainnya	5	1	2	2	1	1	2	2	1	2	1	1	16
19	H	28	LSLTP	4	IRT	3	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	10
20	R	32	LSLTA	5	IRT	3	0	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2	17
21	A	30	LSLTA	5	IRT	3	1	1	2	2	1	2	1	1	2	1	2	16
22	F	25	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	0	2	1	1	11
23	T	25	LSLTA	5	IRT	3	1	2	1	1	1	1	1	0	0	0	1	9
24	W	25	LSLTP	4	IRT	3	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	10
25	R	28	LSD	3	IRT	3	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	1	10
26	N	24	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	9
27	S	33	LSLTA	5	IRT	3	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	14
28	R	27	P.Tinggi	6	IRT	3	1	2	1	1	2	1	2	1	1	1	2	15
29	S	24	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	1	10
30	N	24	LSLTA	5	IRT	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	16
31	I	28	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	0	12
32	I	31	LSLTA	5	IRT	3	1	1	2	1	1	2	1	2	0	1	1	13
33	S	25	LSLTP	4	IRT	3	1	2	2	1	1	1	1	0	1	1	0	11
34	W	30	LSD	3	Pedagang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
35	T	29	LSD	3	Pedagang	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11
36	D	25	LSLTA	5	IRT	3	1	2	2	1	1	2	1	1	2	2	1	16
37	S	25	LSLTP	4	IRT	3	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1	2	16

38	H	26	LSD	3	IRT	3	1	1	2	2	1	1	1	2	1	2	2	16
39	S	30	LSLTA	5	IRT	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	14
40	A	26	LSLTP	4	IRT	3	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	13
41	A	31	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
42	H	32	P.Tinggi	6	PNS	4	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	13
43	T	24	LSD	3	IRT	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
44	L	33	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10
45	R	28	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	2	10
46	N	26	LSLTP	4	IRT	3	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2	16
47	T	27	TLSD	2	IRT	3	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	15
48	R	27	LSD	3	Buruh	2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11
49	A	30	LSD	3	IRT	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9
50	J	29	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10
51	S	25	LSD	3	Pedagang	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	0	11
52	S	22	LSLTP	4	IRT	3	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	14
53	C	25	LSLTP	4	IRT	3	1	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	15
54	I	25	LSLTP	4	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10
55	J	24	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	8
56	H	25	LSLTA	5	IRT	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
57	D	27	LSD	3	IRT	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	14
58	H	29	LSD	3	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	13
59	J	30	LSLTA	5	IRT	3	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	9
60	A	25	LSLTA	5	Lainnya	5	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	11
61	G	27	LSLTP	4	IRT	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10

Keterangan

Pekerjaan:

- 1 = Pedagang
- 2 = Buruh/pembantu
- 3 = Ibu Rumah Tangga
- 4 = PNS
- 5 = Lainnya

Pendidikan :

- 1 = Tidak sekolah
- 2 = Tidak lulus SD
- 3 = Lulus SD
- 4 = Lulus SLTP
- 5 = Lulus SLTA

6 = Perguruan Tinggi



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Junaedah Muis lahir di Sungguminasa, 15 Mei 1992. Merupakan anak bungsu dari dua bersaudara, pasangan H. Abd Muis dan Hj. Rahmatia. Penulis memulai pendidikannya di TK Pertiwi tahun 1997. Pendidikan SD Inpres Batangkaluku tahun 1998 Gowa. Sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Sungguminasa pada tahun 2004. Di tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bontomarannu. Dan setelah lulus dari SMA di tahun 2010, penulis tetap melanjutkan studinya dan memilih UIN Alauddin Makassar jurusan keperawatan sebagai tempat terbaik untuk menggali ilmu.

Selama mengenyam pendidikan, penulis juga aktif dalam organisasi. Sejak di bangku SD, SMP dan SMA, penulis telah aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler PRAMUKA dan PMR. Di bangku kuliah, penulis bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).

Penulis berharap perjalanan pendidikan penulis tidak berhenti sampai disini, tapi akan terus berlanjut. Semoga apa yang dijalani penulis bernilai ibadah dan apa yang diperoleh dapat diaplikasikan kepada masyarakat, sebagai bakti kepada orang tua, Bangsa dan Negara. Amin