

**PENGARUH PEMBERIAN SARI KURMA TERHADAP  
STATUS GIZI (BB/U) ANAK DI MADRASAH  
IBTIDAIYAH NURUL MUTTAQIN  
BOLE KABUPATEN SINJAI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Oleh

**NURDANINGSIH**

**NIM: 70300110073**

**PRODI KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2014**

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat, taufik-Nyalah sehingga Skripsi dengan judul **"Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Status Gizi (BB/U) Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai "** ini dapat terselesaikan.

Sembah Sujudku kepada Allah SWT. Terimah kasih untuk Ayahanda Ahmad, Ibunda tercinta Sitti normaliah dan tanteku Hamsiah atas segala pengorbanan, kesabaran, limpahan kasih sayang, bimbingan serta doa restunya dalam membesarkan, dan mendidik penulis hingga saat ini, sehingga menjadikan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terimah kasih juga buat keluargaku tersayang : "Lukman sekeluarga, Basri sekeluarga, Ukkas sekeluarga, Rajmawati serta Nilmawati yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa pula ucapan sayang dan terimah kasih buat sepupuku Muh. Nardiansyah, Hasriani ukkas, Sitti nurbaya dan sitti fatmawati ilyas yang turut mendoakan aku hingga saat ini.

Perkenankan juga penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terimah kasih yang sedalam-dalamnya dan tak terhingga kepada:

ibu Nurmaulid S.Kep. Ns, M.Kep selaku pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran, dan keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberi perhatian dan bimbingan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir penyusunan Skripsi ini. Bapak Dr. H. Muh Nasir M.ag dan Patmawati S.Kep.,M.Kes selaku penguji. Yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

Pada Kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan terimah kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr.H.A.Qadir Gassing HT, M.S, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof.Dr.H. Ahmad, M Sewang, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep.Ns,M.Kes selaku ketua program studi Keperawatan sekaligus selaku pembimbing I yang selalu membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga akhir penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN ALauddin Makassar, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis
5. Spesial buat Kanda Sukardi Burhan, Dinda nurdanianti, dan Bunda Risnah. Terimah kasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga karna telah banyak memberikan masukan, bantuannya serta segala nasehat-nasehat dan motivasinya yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman-teman KKN Kanda, Saleh, Yusuf, Ahmad alim, musdalifah taftim, Dan Mirnawati atas Dukungan dan Doanya.
7. Buat Anak Pondok Islamiyah Nurintan, Nani Mayani, Sartika, Darna, Kiki, Reni, Nilam, Fajri, Imma, lenni Serta Fika.
8. Sahabat-Sahabatku Nurhidayah, Syamsidar, Syamsuddin, Rahmawati, Dhyfa, Ratna, Husnul, Naga, Wana, Nurlin. Terimah kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama ini. Serta semua teman-teman Keperawatan angkatan 2010 yang ikut memberikan semangatnya. Terimah Kasih !

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Semoga semua karya kita bernilai ibadah di sisi-Nya. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Makassar, 06 Agustus 2014

**Penyusun**

**Nurdaningsih**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Defenisi operasional.....	4
E. Kajian pustaka.....	5
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi.....	10
1. Konsep Dasar gizi Seimbang.....	10
2. Konsep Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar.....	13
3. Penilaian status gizi.....	16

B. Tinjauan Tentang Sari Kurma.....	21
1. Buah kurma.....	21
2. Proses pengolahan sari kurma.....	23
3. Kandungan zat gizi sari kurma.....	25
4. Pengaruh sari kurma terhadap peningkatan Berat Badan.....	30
5. Konsep kurma menurut Al-Qur'an.....	31
C. Kerangka Konseptual.....	35
1. Variabel penelitian.....	35
2. Kerangka teori.....	36
3. Kerangka kerja.....	37
4. Kerangka konseptual penelitian.....	38

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Desain Penelitian.....	39
B. Tempat dan waktu penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel.....	39
D. Pengumpulan Data.....	41
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	43
F. Etika Penelitian.....	44

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil penelitian.....	47
2. Pembahasan.....	53

## **BAB V PENUTUP**

3. Kesimpulan.....62
4. Saran.....62

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan perorang perhari.....	16
Tabel 2.2 Nilai kalori dan buah-buahan yang lain.....	22
Tabel 2.3 Kandungan nutrisi per 330 g sari kurma sahara.....	24
Tabel 2.4 Kandungan nutrisi per 100 g buah kurma.....	25
Table 5.1 Distribusi frekuensi variabel kategorik pada masing-masing kelompok intervensi.....	47
Tabel 5.2 Distribusi perubahan status gizi pada masing-masing kelompok.....	48
Tabel 5.3 Uji normalita shapiro wilk.....	48
Table 5.4 Distribusi Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Perubahan Berat Badan Pada Masing-Masing Kelompok.....	50
Tabel 5.5 Distribusi perbandingan Status gizi dengan indeks (BB/U) z score kelompok Perlakuan dan kontrol sebelum dan sesudah intervensi.....	51
Tabel 5.6 Distribusi perbedaan status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol diakhir penelitian.....	52

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
2.1 Gambar kerangka teori.....	35
2.2 Gambar kerangka kerja.....	36
2.3 Gambar kerangka konseptual penelitian.....	37



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Grafik peningkatan berat badan tiap minggu selama intervensi antara kelompok dengan kelompok kontrol



## ABSTRAC

**Nama** : Nurdaningsih  
**Nim** : 70300110073  
**Jurusan** : Keperawatan  
**Judul** : **The influence of date juice giving to children's nutritional status (weight/age) in Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.**

---

Nutrition problems in elementary school still become one topic that is always discussed whether globally or nationally. Currently, Indonesia faces nutrition problems of children who suffer of malnutrition and poor nutrition. This study aims to look at the effect to look at the effect of date juice on the nutritional status (weight / age) of children aged 6-12 nutrition in Elementary School Nurul Muttaqin Bole Sinjai.

The study design was an experimental Quaisy of 10 children sample in the treatment group and 10 children in the control group were selected using puspositive sampling techniques. The treatment group was given a date juice during the study while the control group was given at the end of the study.

The results of this study based on the Mann-Whitney test shows that the comparison between the treatment group and the control group at the end of the study showed no significant difference with p value of  $0.24 > 0.05$ . But the Wilcoxon test results showed that there were significant differences before and after giving date juice in the treatment group with p value  $0.008 < 0.05$ .

The conclusion of this study is there is no difference in nutritional status (weight / age) between the treatment group and the control group, but there are changes in nutrition status (weight / age) of children in Elementary School Nurul Muttaqin Bole Sinjai after they have given the date juice that can be suggested to parents child to make date juice as an alternative to improve the nutrition status of children.

## ABSTRAK

**Nama** : Nurdaningsih  
**Nim** : 70300110073  
**Jurusan** : Keperawatan  
**Judul** : **Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Status Gizi (Bb/U) Anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.**

---

Masalah gizi pada anak usia sekolah masih menjadi salah satu topik yang selalu dibicarakan baik secara global maupun secara nasional. Saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi yaitu masih dijumpainya anak-anak yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak usia 6-12 tahun di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.

Desain Penelitian ini merupakan Quaisy eksperimental dengan jumlah sampel 10 anak pada kelompok perlakuan dan 10 anak pada kelompok kontrol yang dipilih dengan menggunakan tehnik pengambilan sampel *puspositive sampling*. Kelompok perlakuan diberi sari kurma selama penelitian berlangsung sedangkan kelompok kontrol diberi sari kurma di akhir penelitian.

Hasil penelitian ini berdasarkan uji mann-whitney menunjukkan bahwa perbandingan staus gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diakhir penelitian tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan p value  $0,24 > 0,05$ . Namun hasil uji wilcoxon menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan sebelum dan setelah pemberian sari kurma pada kelompok perlakuan dengan p value  $0,008 < 0,05$ .

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol diakhir penelitian namun terdapat perubahan status gizi (BB/U) anak di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai setelah diberikan sari kurma sehingga dapat disarankan kepada orang tua anak untuk menjadikan sari kurma sebagai salah satu alternatif meningkatkan status gizi anak.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Anak merupakan aset Sumber Daya Manusia dan generasi penerus bangsa. Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia bergantung pada kualitas anak-anak sebagai generasi penerus dalam mempertahankan keutuhan dan kedaulatan Negara di masa yang akan datang. Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan perhatian utama pada proses tumbuh kembang anak. Kecukupan gizi sangat mempengaruhi terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja manusia (Aryani, 2010).

Masalah gizi pada anak usia sekolah masih menjadi salah satu topik yang selalu di bicarakan, saat ini Indonesia menghadapi masalah gizi ganda yaitu masih dijumpainya anak-anak yang menderita gizi kurang dan buruk serta meningkatnya jumlah anak yang mengalami gizi lebih. Berbagai permasalahan gizi kurang diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak untuk berbagai proses biologis (Almatsier, 2001;Rauf, 2007).

Pada usia sekolah Anak akan banyak berada di luar rumah untuk jangka waktu antara 4-5 jam. Aktivitas fisik anak semakin meningkat seperti pergi dan pulang sekolah, bermain dengan teman, akan meningkatkan kebutuhan energi. Apabila anak tidak memperoleh energi sesuai kebutuhannya maka akan terjadi pengambilan cadangan lemak untuk

memenuhi kebutuhan energi, sehingga anak menjadi lebih kurus dari sebelumnya (Aryani, 2010).

Secara global, gizi buruk pada usia sekolah menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama. Lebih dari 200 juta anak usia sekolah yang terhambat dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan secara tepat, diperkirakan sekitar 1 miliar anak sekolah terhambat akan tumbuh pada tahun 2020 dengan gangguan fisik dan mental (Cheshire, 2008). Sedangkan penelitian terbaru dikatakan masih terdapat 146 juta anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di dunia (Rawat, 2012)

Kasubdit Bina Gizi Klinis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Andry Harmami mengatakan saat ini 4 dari 10 anak usia sekolah pendek karena kekurangan gizi, tingkat gizi kurang di Indonesia 17,9 persen. Dari total tersebut 4,7 persennya mengalami gizi buruk. Padahal, prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemenkes 2010-2014 adalah perbaikan faktor gizi masyarakat. Di mana secara jangka panjang perbaikan gizi diterapkan untuk menurunkan tingkat gizi kurang. Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin kita capai pada 2014 dalam hal perbaikan gizi adalah menurunkan persentase gizi kurang menjadi 15 persen dari saat ini yang sebesar 17,9 persen. Serta mengurangi persentase anak pendek menjadi 32 persen dari saat ini 35,8 persen (Febrida, 2013).

Berdasarkan data RISKESDAS tahun 2010 menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah dasar yang prevalensi status gizinya (BB/U)

dengan kategori kurus Menurut Depkes (Departemen Kesehatan) 2007, di Indonesia prevalensi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur (BB/U) untuk anak laki-laki usia 6-14 tahun yaitu kurus 13,3% dan gemuk 9,5%, untuk anak perempuan usia 6-14 tahun yaitu kurus 10,9% dan gemuk 6,4% (Makalew dkk, 2013). Di Sulawesi Selatan sekitar 44% mengalami kekurangan gizi, 14% gizi buruk, dan 17.6% dengan gizi kurang (Kuncoro, 2013).

Di dalam penelitian ini memakai alternatif sari kurma untuk perbaikan gizi anak karena mengkonsumsi sari kurma berarti mengkonsumsi makanan berenergi tinggi (258 kkal), Kadar karbohidrat tersedia pada sari kurma yang cukup tinggi (63.22%) dan kandungan serat yang rendah (0.9-1.6%) menjadikan sari kurma sebagai pangan yang ber Indeks Glikemik (84.4%), lebih tinggi dari Indeks Glikemik buah kurma yaitu 82.6% dan berbagai vitamin, air (33.6%), zat besi (0.9%), protein (1.2%), lemak (0,4%) dan antioksidan alami, serta juga dapat meningkatkan nafsu makan pada anak-anak. Disamping itu sari kurma juga banyak dijumpai di kehidupan kita dan harganya juga sesuai dengan kebutuhan ekonomi (Hardiansyah, 2011;Satuhu 2010).

Peneliti memilih Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten sinjai sebagai tempat untuk meneliti karena berdasarkan data dari situs RSUD kabupaten sinjai dikutip dari DEPKES RI tercatat pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang 17.9% sedangkan gizi buruk sebanyak 4.9%, sementara target penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menjadi

15% dan 3,5% pada tahun 2015 diharapkan dapat tercapai. Sedangkan pengambilan data awal oleh peneliti terdapat 30% gizi kurang dari 69 siswa Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian Tentang pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole ?

## **C. Hipotesis**

- a. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) Ada pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole.
- b. Hipotesis alternatif ( $H_o$ ) Tidak ada pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole

## **D. Defenisi Oprasional**

### **1. Status gizi**

Status gizi (BB/U) dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan timbangan Berat Badan dengan merek *one-med* sebelum dan sesudah diberi sari kurma dengan nilai rujukan WHO–NCHS (Kepmenkes RI No.920 / Menkes /SK/VIII/2002) menurut indeks BB/U.

Gizi Baik :  $-2 \text{ SD} - +2 \text{ SD}$

Gizi Kurang :  $< -2 \text{ SD} - > -3 \text{ SD}$

## 2. Sari kurma

Pemberian sari kurma sebanyak 1 botol perorang yang mengandung total karbohidrat (81.9%), total protein (0.6%), total lemak (0,22%), energi (332 kal/100g) dilakukan di sekolah madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole dengan dosis 1 sendok makan (5 ml/1sdm) mengandung total energi sebanyak 29 kal, pada hari sekolah waktu pagi dan siang diberikan langsung oleh peneliti namun pada hari libur diberikan oleh orang tua anak yang telah mendapat penjelasan tentang pemberian sari kurma. Dilaksanakan mulai tanggal 22 Mei sampai 12 Juni 2014 dengan pengukuran berat badan tiap minggu.

## E. Kajian pustaka

Berdasarkan analisis laboratorium yang dilakukan Hardiansyah dkk dikatakan bahwa sari kurma mengandung banyak karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana mudah dipecah dalam tubuh menghasilkan energi siap pakai bagi tubuh sedangkan zat besi dalam tubuh terutama berfungsi sebagai komponen pembentuk hemoglobin dalam sel darah merah yang berperan mengikat oksigen bagi oksidasi pembetukan energi sehingga sari kurma dapat menjadi penyedia energi instant terutama karena mengandung karbohidrat sederhana yang cukup tinggi.

Sedangkan dalam 'Buku Pintar Jus untuk Bayi dan Balita' karangan Ayu Bulan Febry K.D, S.Km. dan dr. Zulfito Marendra, khusus untuk menaikkan bobot badan si buah hati yaitu dengan memberikan jus pisang kurma karena mengandung kalori yang tinggi.

Dokter Fatmah sebagai Master Gizi Kesehatan Masyarakat UI memilih kombinasi biskuit tempe dengan kurma karena Kurma, menurut dia, mengandung kadar tinggi karbohidrat (glukosa), zat besi, kalsium, vitamin A, dan vitamin C. Menurutnya Kurma dapat meningkatkan berat badan karena kandungan energinya tinggi sehingga dapat merangsang pertumbuhan badan dan meningkatkan nafsu makan balita sehingga baik dijadikan suplemen untuk perbaikan gizi bagi balita pendek dan kurus. Penelitian ini di dukung oleh mahasiswa departemen gizi kesehatan masyarakat universitas indonesia yang melakukan penelitian selama 4 minggu Hasilnya, berat badan balita (BB) yang diteliti rata-rata naik 1,3 kilogram dan tinggi badan (TB) meningkat 0,7 sentimeter.

Penelitian yang dilakukan oleh Giyatmo, menganalisa efektifitas pemberian jus kurma dalam meningkatkan trombosit pada pasien demam berdarah dengue di RSUD Bunda Purwokerto. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar trombosit darah antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol selama post 3 hari. Pemberian jus kurma efektif dalam peningkatan kadar trombosit darah pasien demam berdarah dengue di RSUD Bunda Purwokerto. Pemberian jus kurma merupakan salah satu tambahan diet alternatif yang dapat

dikembangkan sebagai wawasan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi pasien, sehingga menjadi acuan sebagai alternatif untuk meningkatkan status nutrisi pasien.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Mochamad Aji Nara 'Metabolism of Date Extract in Dengue Hemorrhagic Fever Patients: Hematological Studies' selama 6 hari dengan dosis 2 kali sehari pagi dan siang setelah makan secara keseluruhan, pemberian sari kurma pada pasien DBD tidak berpengaruh nyata terhadap trombosit, hematokrit, hemoglobin, dan leukosit. Saran dari peneliti perlunya dilakukan penelitian lanjutan pada pasien anak-anak dengan rentang umur yang lebih dekat dan penggunaan dosis yang berpatokan pada bobot badan pasien.

Makanan/minuman berkalori tinggi juga telah dikembangkan di bagian Ilmu Kesehatan Anak FK UNAIR/RS dr Sutomo Surabaya dengan menggunakan MODISCO (Modified Disco) yang merupakan modifikasi dari DISCO 150 dari Uganda, penggunaannya pada balita di pedesaan Kediri memberikan peningkatan berat badan berkisar 150 – 600g selama 10 hari pemberian, Sari kurma merupakan minuman instan yang berkalori tinggi sehingga peneliti tertarik meneliti pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul MuttaQin Bole.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan suriani sebelumnya pemberian ikan abon yang mengandung kecukupan protein yang tinggi

selama 3 minggu tidak mengalami perubahan status gizi karena asupan energi tiap hari belum cukup untuk memenuhi kebutuhan anak, walaupun konsumsi protein sudah lebih dari kebutuhan sehingga dalam penelitian ini memakai sari kurma karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi yang tinggi. Oleh karena itu mengonsumsi sari kurma berarti mengonsumsi makanan berenergi tinggi yang diperkaya dengan berbagai vitamin, mineral dan antioksidan alami dan meningkatkan nafsu makan sehingga akan dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak.

#### **F. Tujuan penelitian**

##### **a. Tujuan umum**

Diketuainya pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole.

##### **b. Tujuan khusus**

1. Menilai status gizi (BB/U) anak sebelum diberikan sari kurma pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin bole.
2. Menilai status gizi (BB/U) anak sesudah diberikan sari kurma pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin bole.
3. Menilai perbedaan status gizi (BB/U) anak sebelum dan setelah pemberian sari kurma

4. Menilai perbedaan status gizi berdasarkan BB/U pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol setelah diberikan sari kurma pada anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole.

## **G. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang peneliti harapkan setelah proses penelitian yaitu secara:

### 1. Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah pengetahuan tentang pengaruh sari kurma terhadap status Gizi (BB/U) serta dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan status gizi anak.

### 2. Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang manfaat sari kurma untuk perbaikan status gizi anak.
- b. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan khususnya dalam memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi ibu yang memiliki anak tentang manfaat sari kurma.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang manfaat sari kurma bagi tubuh.
- d. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.
- e. Merupakan pengalaman berharga dalam rangka menambah wawasan keilmuan bagi peneliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi**

##### **1. Konsep Dasar gizi Seimbang**

Gizi berasal dari bahasa arab “*Al Gizzai*” yang artinya makanan dan manfaat untuk kesehatan. *Al Gizzai* juga dapat diartikan sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Ilmu Gizi adalah ilmu yang mempelajari cara memberikan makanan yang sebaik-baiknya agar tubuh selalu dalam kesehatan yang optimal (PERSAGI, 2009).

Status gizi adalah keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel-variabel tertentu atau perwujudan nutriture dalam variabel-variabel tertentu, sebagai contoh Kurang energi Protein (KEP) merupakan keadaan tidak seimbang antar pemasukan dan pengeluaran energi dan protein dalam tubuh (Supariasa, 2001).

Jahari (2002) mendefenisikan status gizi adalah gambaran tentang perkembangan keadaan keseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi seorang anak untuk berbagai proses biologis termasuk tumbuh. Suplai energi bagi pemeliharaan sel lebih diutamakan dari suplai protein untuk pertumbuhan, sehingga bila konsumsi energi dalam makanan sehari-hari tidak cukup maka protein akan dipergunakan sebagai sumber energi (Rauf, 2007).

Angka kecukupan gizi yang di anjurkan *Recomended dietary Allowances* (RDA) adalah tingkat komsumsi zat-zat gizi esensial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di suatu negara. Angka Kecukupan Gizi di indonesia di dasarkan atas patokan berat badan untuk masing-masing kelompok menurut umur, genjer, dan aktivitas fisik yang di tetapkan secara berkala melalui survei penduduk (Almaitser, 2004).

Angka Kecukupan Gizi berbeda dengan angka kebutuhan gizi (*Dietary Requirements*). Angka kebutuhan gizi adalah banyak zat-zat gizi yang di butuhkan seseorang (individu) untuk mencapai dan mempertahankan status gizi adekuat, sedangkan AKG (Angka kecukupan Gizi) adalah kecukupan gizi untuk rata-rata penduduk ( Almaitser, 2004).

Pedoman umum gizi seimbang (PUGS) adalah pedoman dasar tentang gizi seimbang yang disusun sebagai penuntun pada perilaku komsumsi makanan di masyarakat secara baik dan benar. Pedoman Umum Gizi Seimbang pada bahan makanan di kelompokkan berdasarkan tiga fungsi utama zat gizi yaitu:

- a. Sumber energi atau tenaga, yaitu padi-padian, jagung, dan gandum, sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas; serta hasil olahan seperti tepung-tepungan, mi, roti, makaroni, haverhout, dan bihun.
- b. Sumber protein, yaitu sumber protein hewani, seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju; serta sumber protein nabati seperti kacang-

kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai dan oncom.

- c. Sumber zat pengatur sayuran dan buah. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, dan tomat; serta sayuran kacang-kacangan, seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutamakan berwarna kuning jingga, kaya serat dan yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk ( Almatsier, 2004).

Tubuh memerlukan makanan untuk mempertahankan kelangsungan fungsinya. Kebutuhan nutrisi ini diperlukan sepanjang kehidupan manusia, namun jumlah nutrisi yang diperlukan tiap orang berbeda sesuai dengan karakteristiknya, seperti jenis kelamin, usia, aktivitas dan lain-lain.

Pemenuhan kebutuhan nutrisi bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, melainkan mempunyai banyak fungsi. Adapun fungsi umum dari nutrisi diantaranya adalah sebagai sumber energi, memelihara jaringan tubuh, mengganti sel tubuh yang rusak, mempertahankan vitalitas tubuh, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan nutrisi perlu diperhatikan zat gizinya.

*Nutrien* merupakan zat kimia organik maupun anorganik yang ditemukan dalam makanan dan diperlukan agar tubuh dapat berfungsi

dengan sebaik-baiknya. *Nutrien* tersebut diabsorpsi di saluran pencernaan kemudian didistribusikan ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, *nutrien* digunakan untuk proses fungsional sel tersebut, sumber energi, dan sistem protein. Untuk itu, maka intake nutrisi ke dalam tubuh harus adekuat. Artinya, nutrisi yang kita makan harus mengandung *nutrien* esensial tertentu yang seimbang. *Nutrien* esensial tersebut meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air (Supartini, 2004).

## 2. Konsep Gizi Pada Anak Usia Sekolah Dasar

Pada usia sekolah, anak banyak mengikuti aktifitas fisik maupun mental, seperti bermain, belajar, berolahraga. Zat gizi akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh anak, sehingga sistem pertahanan tubuhnya pun baik dan tidak mudah terserang penyakit (Mitayanti, 2010).

Pada usia sekolah perkembangan pertumbuhan tidak secepat pada usia balita, namun masa ini memerlukan perhatian khusus dalam macam dan kecukupan gizi. Pengaruh gizi dan kesehatan pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah sangat penting. Sehingga pemberian makanan dengan gizi seimbang akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak (Sukfiyanty, 2011).

Anak usia sekolah membutuhkan lebih banyak energi dan zat gizi dibanding anak balita. Diperlukan tambahan energi, protein, kalsium, zat besi, sebab pertumbuhan sedang pesat dan aktifitas kian bertambah. Untuk memenuhi energi dan zat gizi, anak usia sekolah ini membutuhkan makan 5 kali waktu makan, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan

dua kali makan selingan. Perlu ditekankan pentingnya sarapan supaya dapat berpikir dengan baik (Mitayanti dan wiwi sartika, 2010).

Parameter yang paling mudah untuk melihat asupan kalori cukup adalah dengan memantau berat badan anak. Bila berat badan anak menurun dan tidak sesuai dengan perkembangan umurnya berarti asupan gizinya berkurang dan perlu diwaspadai untuk mempertimbangkan taraf perkembangan anak (Mitayanti, 2010).

Akibat kekurangan gizi pada proses tubuh bergantung pada zat-zat gizi apa yang kurang. Kekurangan gizi secara umum (makanan kurang dalam kualitas dan kuantitas ) menyebabkan gangguan pada proses – proses:

a. Pertumbuhan

Anak-anak tidak tumbuh menurut potensialnya. Protein digunakan sebagai zat pembakar, sehingga otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok.

b. Produksi tenaga

Kekurangan energi berasal dari makanan, menyebabkan seorang kekurangan tenaga untuk bergerak, bekerja dan melakukan aktivitas. Orang menjadi malas, merasa lemah, dan produktifitas kerja menurun.

c. Pertahanan tubuh

Daya tahan terhadap tekanan atau stress menurun. Sistem imunitas dan antibodi berkurang, sehingga orang mudah terserang infeksi

seperti pilek, batuk, dan diare. Pada anak-anak hal ini dapat membawa kematian.

d. Struktur dan fungsi otak

Kurang gizi pada usia muda dapat berpengaruh pada perkembangan mental, dengan demikian kemampuan berfikir. Otak mencapai bentuk maksimal pada usia dua tahu. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen.

e. Perilaku

Bagi anak-anak maupun orang dewasa yang kurang gizi menunjukkan perilaku tidak tenang. Mereka mudah tersinggung, cengeng, dan apatis.

Dari keterangan diatas tampak bahwa gizi yang baik merupakan modal bagi pengembangan sumber daya manusia (Almatsir, 2009).

Kecukupan gizi rata-rata perorang dalam sehari untuk anak yaitu untuk umur 4-12 tahun, yaitu antara 1550 kalori sampai 2050 kalori dan antara 37-54 g protein (widya karya nasional pangan gizi V,1998 dalam Supariasa, 2002).

**Tabel 2.1**

Angka kecukupan gizi rata-rata yang dianjurkan (per orang perhari)

Zat Gizi	Umur 7-9 thn	Umur 10-12 thn	
		L	P
Energi	1850 kkal	2100 kkal	2000 kkal
Protein	48 g	56 g	60 g
Lemak	72 g	70 g	67 g
Karbohidrat	254 g	289 g	275 g
Serat	26 g	30 g	28 g
Air	1900 ml	1800 ml	1800 ml
Vitamin A	500 mcg	600 mcg	600 mcg
Vitamin D	15 mcg	15 mcg	15 mcg
Vitamin E	7 mg	11 mg	11 mg
Vitamin K	25 mcg	35 mcg	35 mcg
Vitamin B1	0.9 mg	1,1 mg	1,0 mg
Vitamin B2	1,1mg	1,3 mg	1,2 mg
Vitamin B3	10 mg	12 mg	11 mg
Vitamin B5	3,0 mg	4,0 mg	4,0 mg
Vitamin B6	1,0 mg	1,3 mg	1,2 mg
Vitamin B9	300 mcg	400 mcg	400 mcg
Vitamin B12	1,2 mcg	1,8 mg	1,8 mg
Biotin	12 mcg	20 mcg	20 mcg
Kolin	375 mg	375mg	375 mg
Vitamin C	45 mg	50 mg	50 mg

Sumber : AKG 2013

### 3. Penilaian status gizi

Salah satu cara untuk melihat status gizi seseorang adalah dengan melihat indikator antropometri yang meliputi beberapa parameter. Parameter disini adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia,

seperti umur, berat badan, tinggi atau panjang tubuh, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran pinggang, tebal lemak dibawah kulit. Ukuran antropometri gizi dapat diketahui untuk mengetahui status gizi masa lampau dan status gizi saat ini. Pertumbuhan linier dapat menunjukkan status gizi dimasa lampau, yaitu dengan menggunakan indeks TB atau PB, LIDA, LIKA, sedangkan pertumbuhan massa jaringan dapat menunjukkan status gizi saat ini diketahui dengan menggunakan indeks BB, LILA, dan TLBK (Proverawati Dan Kusumawati, 2011).

Antropometri biasanya digunakan secara luas untuk penilaian status gizi diantaranya untuk pertumbuhan anak. Pengukuran antropometri dipilih di antara metode penilaian status gizi lainnya seperti penilaian biokimia, klinis dan fungsional karena pengukuran antropometri lebih murah, mudah dan tidak membutuhkan fasilitas yang sulit didapat serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi malnutrisi zat gizi ringan, sedang dan parah (Wahyuniar, 2004).

a. Berat badan menurut umur (BB/U)

Berat badan menggambarkan jumlah dari protein, lemak, air dan mineral dan tulang. Anak usia sekolah membutuhkan lebih banyak energi dan zat gizi dibanding anak balita. Pada usia sekolah anak banyak mengikuti aktifitas mental, seperti bermain, belajar, berolahraga. Zat gizi akan membantu meningkatkan kesehatan tubuh

anak, sehingga sistem pertahanan tubuhnya pun baik dan tidak mudah terserang penyakit (Nurasni, 2011).

Berat badan dapat memberikan gambaran tentang massa tubuh otot dan lemak, karena massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan keadaan yang mendadak, misalnya terserang penyakit/infeksi, menurunnya nafsu makan, menurunnya jumlah makanan yang dikonsumsi, dan oleh karena adanya bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Berat badan dapat digunakan untuk mengetahui kecepatan pertumbuhan. Dalam keadaan normal, berat badan akan berkembang mengikuti pertambahan umur, sedangkan dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan dalam perkembangan berat badan yaitu dapat berkembang lebih cepat atau berkembang lebih lambat. Berat badan diukur menggunakan timbangan, seperti *dacin*, *salter*, timbangan injak, timbangan *detecto*, *seca* (Proverawati Dan Kusumawati, 2011).

Berdasarkan karakteristik berat badan ini, maka indeks berat badan menurut umur digunakan sebagai salah satu cara pengukuran status gizi. Mengingat karakteristik berat badan yang labil, maka indeks berat badan lebih menggambarkan status gizi seseorang saat ini (Supriasa, 2002)

b. Tinggi badan menurut umur (TB/U)

Pengukuran tinggi badan dapat menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Dalam keadaan normal, pertumbuhan tinggi

badan akan beriringan bersama dengan penambahan umur. Pertumbuhan tinggi badan relatif kurang sensitif terhadap masalah defisiensi zat gizi.

Istilah tinggi badan digunakan ketika mengukur tinggi badan anak diatas dua tahun, sedangkan istilah panjang badan ketika mengukur tinggi badan anak di bawah usia 2 tahun. Pada lansia yang tidak dapat berdiri dan bungkuk diukur panjang lengannya yang merupakan proxy dari tinggi badan. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur panjang badan adalah infantometer (Proverawati Dan Kusumawati, 2011).

c. Berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)

Berat badan memiliki hubungan yang linier dengan tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan berat badan dengan kecepatan tertentu. Indeks BB/TB merupakan indikator yang baik untuk menilai status gizi saat ini (Supariasa, 2002).

Keuntungan indeks ini adalah tidak memerlukan data umur; dapat membedakan proporsi badan (gemuk, normal dan kurus). Kelemahan indeks ini adalah tidak dapat memberikan gambaran apakah anak tersebut pendek, cukup tinggi badan atau kelebihan tinggi badan menurut umurnya, karena faktor umur tidak dipertimbangkan; dalam praktek sering mengalami kesulitan dalam melakukan pengukuran panjang/tinggi badan pada kelompok balita;

mempunyai beberapa kelemahan, yaitu: membutuhkan dua macam alat ukur; pengukuran relatif lebih lama; membutuhkan dua orang untuk melakukannya; sering terjadi kesalahan dalam pembacaan hasil pengukuran, terutama bila dilakukan oleh kelompok non-profesional (Supriasa, 2002).

Dari berbagai jenis indeks tersebut, untuk menginterpretasikan dibutuhkan ambang batas, penentuan ambang batas diperlukan kesepakatan para ahli gizi. Ambang batas dapat disajikan kedalam 3 cara yaitu persen terhadap median, persentil, dan standar deviasi unit

#### 1. Persen terhadap median

Median adalah nilai tengah dari suatu populasi dalam antropometri median sama dengan persentil 50. Nilai median ini dinyatakan 100% (untuk standar).

Rumus persen terhadap median :

$$\% \text{ median} = \frac{\text{Nilai individu subjek}}{\text{Nilai median baku rujukan}} \times 100 \%$$

#### 2. Persentil

Para pakar merasa kurang puas dengan menggunakan persen terhadap median, akhirnya memilih cara persentil. Persentil 50 sama dengan median atau nilai tengah dari jumlah populasi berada di atasnya dan setengahnya berada dibawahnya (Supriasa, 2002).

National Center for Health Statistics (NCHS) merekomendasikan persentil ke-5 sebagai batas gizi baik dan kurang, serta persentil 95 sebagai batas gizi lebih dan gizi baik.

### 3. Standar deviasi Unit (SD)

Standar deviasi unit disebut juga Z-skor. WHO menyarankan menggunakan cara ini untuk meneliti dan untuk memantau pertumbuhan (Supriasa, 2002).

Rumus perhitungan Z-skor adalah :

$$Z \text{ skor} = \frac{\text{Nilai individu subjek} - \text{nilai median baku rujukan}}{\text{Nilai simpang baku rujukan}}$$

## B. Tinjauan Tentang Sari Kurma

### a. Buah kurma

Buah kurma (*phoenix dactylifera*) berasal dari tanaman sejenis palem yang tumbuh di gurun pasir. Meskipun tidak tumbuh baik di Indonesia. Buah ini banyak diperjual belikan di pasar terutama pada saat bulan puasa. Di Indonesia dengan mayoritas Islam, pada bulan tersebut permintaan terhadap buah kurma meningkat sangat tajam. Hal ini berhubungan dengan anjuran sunnah berbuka puasa yang didahului dengan makan beberapa butir kurma (Hardiansyah, 2011)

Buah kurma dimasyarakat dikenal dan dipercaya mempunyai khasiat diantaranya untuk mengatasi kurang darah, meningkatkan stamina, meningkatkan kesuburan, penyembuhan penyakit, dan aneka manfaat lainnya. Analisis terhadap kandungan buah kurma menunjukkan

komposisi zat gizi yang lengkap dan seimbang. Kurma banyak mengandung karbohidrat, beberapa mineral terutama potasium dan zat besi, serat, makanan, serta vitamin lainnya (Hardiansyah, 2011)

Kurma mengandung 666 mg kalium per 100 gram berat kering. Fosfor (P) adalah mineral yang berperan penting dalam struktur dan fungsi tubuh, setelah kalsium. Sebanyak 80% fosfor tubuh kita berada dalam tulang dan gigi, yakni dalam bentuk kalsium fosfat. Fosfor memiliki peranan penting dalam mempertahankan kalsium, tulang, dan gigi, serta membantu mempertahankan pH dalam darah agar sedikit basah. Komponen penting DNA adalah bagian dari semua membran sel, terutama dalam jaringan otak. Fosfor berguna untuk membangun aktifitas kelenjar dan mengembalikan fungsi kelenjar tubuh. Fosfor juga berperan penting sebagai nutrisi otak sehingga bila dikonsumsi secara teratur dalam jangka panjang akan dapat mencerdaskan otak. Gejala kekurangan fosfor kelemahan otot, kehilangan nafsu makan, sakit tulang, kelainan sistem saraf seperti kesemutan, mengantuk penurunan reflek, dan kelelahan otak (Satuhu, 2010)

**Tabel 2.2**

**Nilai kalori kurma dan buah-buahan lain**

Nilai kalori kurma dan buah-buahan lain	
Aprikot	520 kalori/ kg
Pisang	970 kalori / kg
Jeruk	480 kalori / kg
Kurma	3000 kalori/ kg

Sumber : Rosita 2009

## b. Proses pengolahan Sari kurma

Pengolahan buah kurma menjadi minuman siap saji sudah banyak di pasaran. Pembuatan minuman instan berbahan dasar kurma dalam bentuk serbuk ini diharapkan dapat meningkatkan umur simpan buah kurma dan meningkatkan kepraktisan dalam penggunaannya. proses pembuatan minuman instan kurma dengan menggunakan alat pengering semprot (*spray dryer*), mengkaji karakteristik dari minuman instan kurma dan penerimaan konsumen terhadap minuman yang dihasilkan. Pembuatan instan kurma melalui beberapa tahap produksi. Pada tahap persiapan dilakukan sortasi dan pemisahan biji kurma. Proses blanching dilakukan untuk inaktifasi enzim dan mikroorganismen yang terkandung dalam buah kurma. Proses ekstraksi sari kurma dilakukan dengan cara menghancurkan buah kurma menggunakan blender, dengan penambahan air panas untuk mempermudah proses ekstraksi sari kurma. Rasio antara buah kurma dan air yang digunakan adalah 2:3. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk memisahkan sari buah kurma dengan ampas kurma. Pada pembuatan minuman instan kurma ditambahkan bahan pengisi yaitu dekstrin dan maltodekstrin. Formulasi produk dilakukan dengan menambahkan bahan pemanis yaitu sukrosa bubuk ( Bahtiar, 2011).

Buah kurma yang digunakan merupakan buah kurma kering dengan karbohidrat sebagai komponen utama dengan komposisi sebesar 94.31% adalah gula-gula sederhana serta komponen-komponen nutrisi lainnya, protein 2.39%, lemak kasar 3.93% dan serat kasar 6.47%).

Pembuatan minuman instan kurma dilakukan dengan menggunakan alat pengering semprot dengan kondisi suhu inlet sebesar 180°C dan suhu outlet sebesar 90°C. Pemilihan jenis bahan pengisi dilihat dari penampakan atau tekstur produk, viskositas dan kelarutan produk di dalam air. Maltodekstrin dengan konsentrasi 60% menghasilkan produk dengan tingkat kelarutan yang tinggi (97.49%) dan viskositas yang rendah (18.49 cP). Sukrosa bubuk ditambahkan untuk meningkatkan derajat kemanisan. Sukrosa sebanyak 50% merupakan konsentrasi gula yang paling sesuai dengan penerimaan konsumen. Produk terbaik dan yang paling disukai konsumen yaitu minuman instan kurma yang menggunakan bahan pengisi maltodekstrin dengan tingkat konsentrasi 60%. Produk ini memiliki rendemen yang tinggi (37.84%) dan kadar air yang rendah (0.86 %) (Bahtiar, 2011).

c. **Kandungan Zat Gizi Sari Kurma**

Tabel 2.3

**Tabel kandungan nutrisi per 330 g Sari Kurma SAHARA**

<b>Parameter</b>	<b>Kadar</b>
Air	16,5 %
Total protein	0,6 %
Total lemak	0,22%
Total karbohidrat	81,9 %
Energi	332 kal/100 g
Kalium	778,8 mg/100 g
Kalsium	31,5 mg/100 g

**Tabel 2.4****Tabel Kandungan nutrisi per 100 g buah kurma**

<b>Unsur</b>	<b>Kadar</b>
Glukosa	38,5 gms
Fruktosa	35,5 gms
Protein	2,35 gms
Lemak	0,43 gms
<b>Vitamin</b>	
Vitamin A	90 IU
Vitamin B1	93 mg
Vitamin B2	144 mg
Biotin	4,4 µg
Asam folat	5,4 µg
Niacin	2 mg
VitaminC	6,1 mg
<b>Mineral</b>	
Kalsium	52 mg
Zat besi	1,2 mg
Magnesium	50 mg
Kalium	667 mg
Natrium	13 mg
Posfor	60 mg
Klorida	271 mg
Sulfur	14,7 mg
Mangan	4,9 mg
Copper	2,4 mg
Zinc	1,2 mg
Cobalt	1,9 mg

Kandungan glukosa sari kurma dianalisis untuk mengandung kajian prefensi konsumen. Glukosa merupakan senyawa dalam pangan yang dapat memberikan kesan rasa manis, sehingga sari kurma dapat digunakan sebagai sari untuk disajikan dengan minuman (teh,susu) atau sebagai selai yang di oleskan pada roti. Sari kurma mengandung glukosa sebesar 67.97 g/100 g atau sekitar 68% sari kurma berupa glukosa. Kandungan glukosa yang tinggi pada sari kurma tersebut setara dengan kebanyakan glukosa pada sari sekitar 60-80%. Sehingga sari kurma dapat berfungsi sebagai

pengganti sari atau pelengkap (komplemen) dalam penyajian makanan (Hardiansyah, 2011).

Sari kurma dikaji kemungkinan efeknya terhadap perubahan status gizi, Untuk itu diperlukan beberapa data terutama kandungan energi dan zat gizi lainnya

a. Karbohidrat

Kadar karbohidrat tersedia pada sari kurma yang cukup tinggi (81.9%) dan kandungan serat yang rendah (0.9-1.6%). Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat melimpah dan merupakan nutrisi yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia (Hardiansyah, 2011).

Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan keperluan energi tubuh, selain itu karbohidrat juga mempunyai fungsi lain yaitu karbohidrat diperlukan bagi kelangsungan proses metabolisme lemak. Diketahui juga karbohidrat mengadakan suatu aksi penghematan terhadap protein. Orang-orang yang membatasi pemasukan kalori, akan membakar terlalu banyak asam amino ( unit pembangun molekul protein ) bersama dengan lemak akan dibakar untuk menghasilkan energi. Akibatnya orang tersebut akan mengalami kehilangan banyak asam amino yang berfungsi membangun jaringan tubuh akan tetapi bila kebutuhan tenaga bisa dicukupi oleh karbohidrat, maka tubuh akan mengoksidasinya tanpa

harus mempergunakan protein yang sebenarnya mempunyai fungsi yang lebih penting sebagai zat pembangun. Dengan demikian akan menyelamatkan asam amino untuk fungsinya yang lain dari pada sekedar penghasil energi (Suhardjo, 2009).

b. Protein

Kandungan total protein pada buah kurma mencapai angka 1.4-1.7g/100g daging kurma (berat basah). Treonin, Lisin dan Isoleusin adalah asam amino esensial (tidak dapat disintesis oleh tubuh) yang ditemukan pada buah kurma. Kandungan Isoleusin dan Lisin mencapai ratusan kali lebih banyak pada buah kurma dibandingkan dengan kandungannya pada apel untuk setiap gram buahnya.

Protein dibutuhkan untuk pembentukan hormon yang berfungsi mengontrol berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan seks, dan proses metabolisme. Selain berfungsi sebagai sumber zat pembangun, protein juga merupakan sumber energi (Rauf, 2007).

c. Lemak

Lemak adalah makanan sumber energi yang paling besar, setiap gram lemak menyediakan 9 kalori, kalori yang dihasilkan oleh lemak lebih besar dari karbohidrat dan protein kalori itu merupakan bahan bakar bagi tubuh untuk beraktifitas. Lemak juga membantu tubuh menggunakan vitamin, dimana vitamin dalam tubuh harus

digunakan dengan baik agar tubuh sehat. Lemak merupakan salah satu zat yang membantu untuk menggunakan vitamin A, D, E, dan K, dimana Vitamin-Vitamin ini larut dalam lemak dan lemak pun membantu usus untuk menyerap zat-zat penting dari vitamin tersebut( Graha, 2010).

Fungsi lain lemak yaitu pembangun sel tubuh, dengan bantuan lemak, sel-sel dalam tubuh dapat terbangun dengan baik, selain itu pula lemak merupakan penyusun sel-sel dengan menyelimuti setiap sel sehingga sel-sel itu bekerja dengan baik (Graha, 2010).

d. Vitamin

Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktifitas hidup. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita.

e. Mineral

Mineral merupakan kebutuhan tubuh manusia yang mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, seperti untuk pengaturan kerja enzim-enzim, pemeliharaan keseimbangan asam-basa, membantu pembentukan ikatan yang

memerlukan mineral seperti pembentukan haemoglobin (Almatsier, 2004).

Mineral dapat diklasifikasikan menurut jumlah yang dibutuhkan tubuh. Mineral utama (major) adalah mineral yang kita perlukan lebih dari 100 mg sehari, sedangkan mineral minor (*trace elements*) adalah yang kita perlukan kurang dari 100 mg sehari. Kalsium, tembaga, fosfor, kalium, natrium dan klorida adalah contoh mineral utama, sedangkan kromium, magnesium, yodium, besi, fluor, mangan, selenium dan zinc adalah contoh mineral minor.

Kandungan kalium dalam kurma yang paling banyak di antara buah-buahan. Kalium adalah mineral penting yang diperlukan tubuh untuk kontraksi otot, menjaga kesehatan sistem saraf dan membantu metabolisme tubuh (Rosita, 2009).

Berbagai zat-zat yang terkandung dalam sari kurma diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat tumbuh dan berfungsi secara normal. Berbagai proses biologis tubuh memerlukan sumber energi agar dapat bekerja dengan baik, seperti pertumbuhan, proses pencernaan, perkembangan mental dan ketahanan tubuh terhadap infeksi (Jannah, 2010).

#### **d. Pengaruh sari kurma terhadap peningkatan berat badan**

Kurma dapat meningkatkan berat badan karena memiliki kandungan energi yang tinggi Selain itu Kandungan mikronutrien dalam

sari kurma menolong tubuh untuk pertumbuhan tulang yang kuat, otot untuk bekerja secara harmonis, dan pertumbuhan serta perbaikan sel sehingga dapat merangsang pertumbuhan badan (Ruthy, 2012).

Manfaat lain Sari kurma dapat merangsang peningkatan nafsu makan, bila nafsu makan baik maka proses makan guna memenuhi kebutuhan gizi tubuh terutama keseimbangan energi akan berjalan maksimal sejalan dengan peningkatan nafsu makan tentu akan menambah berat badan (Rostita, 2009).

Karbohidrat yang terkandung dalam sari kurma cukup tinggi, karbohidrat merupakan salah satu Makronutrien yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan tidak hanya bertugas untuk membantu kinerja otot, tetapi juga membantu perbaikan dan pertumbuhan otot, sehingga nutrisi ini menjadi salah satu nutrisi kunci dalam menambah berat badan dan massa otot (Hardiansyah, 2011).

Penambahan berat badan seseorang pada masa pertumbuhan disebabkan oleh terbentuknya jaringan-jaringan baru, seperti dinding dan protoplasma sel, membran-membran, massa otot, darah dan lainnya. Dalam sari kurma mengandung Protein, air, dan mineral-mineral dalam jumlah cukup diperlukan untuk pertumbuhan. Sehingga apabila protein yang kita makan tidak cukup, pertumbuhan badan pun akan terganggu (Sumardjo, 2006).

Sari kurma Kurma mengandung kadar glukosa yang tinggi yang sangat baik dijadikan sebagai sumber energi tubuh sehingga apabila anak

memperoleh energi sesuai kebutuhannya maka anak akan memiliki berat badan yang ideal (Aryani, 2009).

**e. Konsep kurma menurut al-Qur'an**

Salah satu ayat dalam al-Qur'an tentang kurma yang menjadi bahan kajian penting paling diminati kalangan ilmuwan muslim adalah firman Allah swt dalam surah maryam (19) ayat 25 yang berbunyi sebagai berikut :

وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾

Terjemahan : *“Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu kearahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang matang untukmu.”*

Orang yang mendalami ayat-ayat al-Qur'an akan menyadari bahwa Allah sudah menerangkan segala penjelasan didalam kitab al-Quran dan menunjukkan kepada manusia bahwa terdapat banyak manfaat di dalam buah kurma bagi tubuh manusia. al-Qur'an menyebutkan sejumlah buah-buahan yang ilmu pengetahuan modern ditegaskan memiliki khasiat untuk mencegah beberapa penyakit. Buah-buahan yang memberikan manfaat bagi tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Di dalam ayat al-Qur'an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan kebenarannya dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-NYA yang amat menakjubkan.

(Jabir, 2009)

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, maka dalam firman-Nya al-Qur'an Surah AL-An'am (6) ayat 99 berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ  
شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مَخْرُجًا مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنْ  
النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ  
وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahan : “ Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula (zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa, perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah dan perhatikan pula lah kematangannya sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan : "...Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai..." Kata قِنْوَانٌ adalah jamak dari kata قِنْوٌ yang berarti tandan kurma, sedangkan kata دَانِيَةٌ yaitu yang menjulai maksudnya adalah mudah dijangkau oleh orang yang memetikinya. Dalam ayat tersebut Allah memuji kedua jenis buah yaitu

kurma dan anggur yang merupakan buah yang paling berharga bagi penduduk Hijaz, bahkan mungkin merupakan dua jenis buah terbaik di dunia."( Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq oleh Hani al-Haj III/221, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir )

Sebagaimana juga disebutkan dalam al-Qur'an dalam surah Al-Mu'minin (23) ayat 19 sebagai berikut:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ خَيْلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا  
فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahan : *"Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan."*

"Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur." Yaitu, Allah keluarkan bagi kalian melalui apa yang Allah turunkan dari langit, aneka macam kebun dan taman. (Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq oleh Hani al-Haj V/345, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir.)

Kurma yang disebut dalam ayat ini hanya 3 dari 26 penyebutan lain dalam kitab suci Al-Qur'an. Kalangan medis dan ahli agama sepakat, penyebutan sampai 26 kali kata "kurma" dalam Al-Qur'an menunjukkan peran penting kurma. Itu sebabnya, penelitian tentang khasiat kurma, keajaiban kurma dan seluk beluk kurma tak pernah berhenti dilakukan.

Kerja keras studi tentang kurma berhasil mengungkap kisah-kisah menarik, beragam manfaat tak terduga (Rosita, 2009).

Dimulai dari kisah penciptaan kurma. Legenda arab menyebutkan bahwa setelah menciptakan manusia pertama Nabi Adam as., Allah Swt, menggunakan sisa-sisa bahan yang digunakan adam sebagai bahan untuk membuat pohon kurma. Buah kurma adalah sajian bagi adam disurga nutrisi pertama untuk manusia pertama. Jadi berbeda dengan tanaman dan isi alam semesta lainnya, kurma adalah satu-satunya ciptaan Allah yang asalnya sama dengan manusia, itu sebabnya masyarakat arab juga percaya, kurma adalah nakhla, yang berarti pohon kehidupan. Sebutan itu memang tidak berlebihan karena seluruh bagian tanaman kurma bermanfaat.

Buah kurma adalah makanan kaya nutrisi, pucuknya bisa dimakan, dikeringkan atau digiling menjadi tepung. Nira atau getahnya bisa dibuat minuman, sabutannya ditunen, biji kurma diolah menjadi pakan keledai dan onta. Belum lagi pemanfaatan kurma untuk beragam obat. Sampai saat ini seluruh bagian dari pohon kurma sudah dimanfaatkan untuk 800 kegunaan. Luar biasa tidak diragukan lagi, kurma adalah satu-satunya tanaman yang pemanfaatannya bisa sebanyak dan sehebat itu (Rosita, 2009).

Sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ

Artinya : “*bahwa rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar di waktu pagi “ idul fitri sampailah beliau terlebih dahulu memakan beberapa tamr ( kurma kering ),”* ( Shahih Al- Bukharih, no 953 dalam Numair, 2013).

Dalam hadits tersebut menggambarkan bahwa kurma memang merupakan salah satu makanan yang baik untuk kesehatan tubuh dilihat dari sejak zaman Rasulullah yang menjadikan kurma sebagai sarapan pagi dan juga menganjurkan saat berbuka puasa. Setelah dipelajari dari segi medis dan kesehatan hadits tersebut mengisyaratkan bahwa kurma jika dimakan pada saat berbuka puasa, ketika perut dalam keadaan kosong akan melenyapkan rasa lapar dan mengembalikan kesegaran tubuh dengan cepat. itu pula sebabnya ilmu nutrisi mengatakan kurma sebagai makanan yang mudah dikonsumsi, menahan lapar dan menjaga stamina ( Rosita. 2009).

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Variabel Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini terdapat dua variable, yaitu:

- b) Variable independent (bebas) : Komsumsi Sari Kurma
- c) Variable dependent (terikat) : Status Gizi (BB/U) Anak
- d) Variable perancuh : Kebiasaan makan (konsumsi makanan), Daya beli keluarga, Pemeliharaan kesehatan.

## 2. Kerangka Teori

Gambar 2.1




### 3. Kerangka kerja

Gambar 2.2



#### 4. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.3



Keterangan :

Variabel yang diteliti : \_\_\_\_\_

Variabel yang tidak diteliti : \_\_\_\_\_

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian Exprimental Design dengan menggunakan rencana pretest-posttest yang bertujuan untuk mengetahui suatu gejala atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Ciri khusus dari penelitian eksperimen adalah adanya percobaan atau trial. Percobaan itu berupa perlakuan atau intervensi terhadap suatu variabel. Dari perlakuan tersebut diharapkan terjadi perubahan atau pengaruh terhadap variabel yang lain (Notoatmodjo, 2005).

Dalam penelitian anak dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 1 sebagai kelompok perlakuan diberi 1 botol kurma sedangkan kelompok ke 2 yaitu kelompok kontrol tidak diberi sari kurma. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak di Madrasah Ibtidiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai.

#### **B. Tempat dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidiyah Nurul Muttaqin Bole Kabupaten Sinjai mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 12 Juni 2014.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam dan Pariani, 2002). Dalam penelitian ini

populasinya adalah semua murid madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole sebanyak 69 orang dengan jumlah ruangan kelas 6 ruang.

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam;Pariani, 2002). Sampel dalam penelitian ini adalah 10 orang sebagai kelompok perlakuan dan 10 orang sebagai kelompok kontrol yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

### a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008).

1. Tercatat sebagai murid MIS Bole
2. Status gizi di bawah batasan normal

Gizi Kurang  $< -2 \text{ SD}$   $> +3 \text{ SD}$

3. Bersedia untuk berpartisipasi.

### b. Kriteria Esklusi

Kriteria eskklusi adalah menghilangkan / mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

- 1) Sedang menderita penyakit dalam 3 bulan terakhir
- 2) Menderita Gizi buruk
- 3) Tidak hadir saat penelitian

#### 4. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan cara Non Probability Sampling jenis Purposive Sampling yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. (Nursalam, 2008).

### D. Pengumpulan data

#### 1. Instrumen Penelitian.

Penelitian ini merupakan eksperimental design. Instrumen Dalam penelitian ini adalah data responden meliputi nama anak, umur dan berat badan anak sebelum dan sesudah diberi sari kurma. Untuk mengukur berat badan anak menggunakan alat penimbang berat badan yaitu *one-med digital*. Sari kurma yang diberikan adalah sari kurma sahara.

#### 2. Prosedur pengumpulan data

##### a. Persiapan

Mengurus surat izin penelitian ke Kepala sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. Dan Mengurus surat persetujuan kepada orang tua siswa yang bersedia menjadi responden

##### b. Pelaksanaan Pengumpulan Data.

1. Mengidentifikasi data sekunder dan identifikasi anak. Untuk memperoleh data tersebut peneliti bekerjasama dengan kepala sekolah untuk mendapatkan data siswa.

2. Screening sampel untuk memperoleh sampel sesuai kriteria inklusi.
3. Menimbang berat badan anak sebelum diberikan sari kurma.
4. Menentukan status gizi anak dengan indeks BB/U sebelum diberi Sari kurma.
5. Pada tahap intervensi pemberian sari kurma sahara sebanyak 1 botol perorang yang mengandung total karbohidrat (81.9%), total protein (0.6%), total lemak (0,22%), energi (332 kal/100g) dilakukan di sekolah madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole dengan dosis 1 sendok makan mengandung total energi 29 kal, pada waktu pagi dan siang diberikan langsung oleh peneliti namun pada saat libur diberikan oleh orang tua anak yang telah diberikan penjelasan tentang pemberian sari kurma. Dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai 12 Juni 2014 dengan pengukuran berat badan tiap minggu.
6. Menentukan status gizi anak dengan indeks BB/U sesudah penelitian (sesudah diberikan sari kurma).
7. Menganalisa status gizi anak dengan dengan membandingkan status gizi sebelum dan sesudah penelitian serta membandingkan perubahan status gizi antara dua kelompok.

## E. Pengolahan dan analisis data

Menurut Notoatmodjo, S (2005), analisa data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

### a. Analisa Univariat

Menganalisa data yang diperoleh dari tiap–tiap variabel dari hasil penelitian. Dalam penelitian ini dengan menganalisa variabel dependen status gizi (BB/U) dan variabel independen konsumsi sari kurma sehingga dapat diketahui distribusi frekuensi dan persentase dari tiap tabel.

### b. Analisa bivariat

Menganalisa data yang dilakukan terhadap 2 variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen perubahan status gizi (BB/U) dengan variabel independen konsumsi sari kurma. Analisa data dilakukan dengan menggunakan computer program SPSS 16 for windows. Uji statistik yang digunakan adalah uji t dependen (Paired Sample). Apabila nilai  $p < \alpha$  (0,05), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya ada pengaruh pemberian sari kurma Terhadap status gizi (BB/U) anak Di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole. Dan jika nilai  $P > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh pemberian sari kurma Terhadap status gizi (BB/U) anak Di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole.

## F. Etika penelitian

Yurisa (2008) mengatakan dalam bukunya *Etika Penelitian Kesehatan*, bahwasanya komite nasional etika penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu :

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*Respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*Autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formolir persetujuan subjek (*Informed consent*).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*Respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk yang bersifat pribadi sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuisioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Penelitian dapat

menggunakan koding (*inisial atau identification*) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketetapan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subjek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

Dalam penelitian ini pemberian sari kurma diberikan pada kelompok perlakuan selama proses penelitian berlangsung sedangkan pada kelompok kontrol diberikan setelah proses penelitian berlangsung. Dalam hal ini agar tidak terjadi intimidasi serta tidak melanggar etika penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Pelitiaan melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun, kematian subyek penelitian



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Gambaran lokasi penelitian

Lokasi penelitian berada di salah satu Sekolah yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Tengah, Desa saohiring, khususnya Dusun bole. Lokasi penelitian ini merupakan daerah pegunungan dimana rata-rata penduduk mata pencahariannya yaitu bertani. Penelitian ini dilakukan selama 3 minggu mulai tanggal 22 Mei sampai tanggal 12 Juni 2014 untuk melihat pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) setelah intervensi dilakukan.

##### 2. Karakteristik responden

Distribusi jenis kelamin anak pada kelompok perlakuan berdasarkan tabel 5.1 sebanding yaitu laki-laki sejumlah 5 orang (50%), dan perempuan sejumlah 5 orang (50%). Sementara itu distribusi frekuensi pada kelompok kontrol sebagian besar anak berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 7 orang (70%) dan perempuan sejumlah 3 orang (30%).

Distribusi frekuensi kelompok perlakuan berdasarkan umur terdapat 2 anak (20%) yang berumur 7 Thn, 2 anak (20%) berumur 8 Thn, 4 anak (40%) yang berumur 9 Thn dan 2 anak (20%) berumur 11 Thn. Sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 3 anak (30%) yang berumur 7

Thn, 2 anak (20%) berumur 8 Thn, 1 anak (10%) yang berumur 9 Thn, 1 anak (10%) berumur 10 Thn serta 3 anak (30%) yang berumur 11 Thn.

**Tabel 5.1**  
**Distribusi frekuensi variabel kategorik pada**  
**masing-masing kelompok intervensi**

Variabel	Kelompok perlakuan (n=10)		Kelompok kontrol (n=10)	
	F	%	F	%
<b>Jenis kelamin</b>				
• Laki-laki	5	50 %	7	70%
• Perempuan	5	50 %	3	30%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>Rentang umur</b>				
• 7 Thn	2	20%	3	30%
• 8 Thn	2	20%	2	10%
• 9 Thn	4	40%	1	10%
• 10 Thn	-	-	1	10%
• 11 Thn	2	20%	3	30%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>Tingkat pendidikan ibu</b>				
• SD	6	60%	6	60%
• SMP	2	20%	2	20%
• SMA	1	10%	2	20%
• S1	1	10%	-	-
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>
<b>Penghasilan perbulan</b>				
• <1.440.000	7	70%	8	80%
• ≥1.440.000	3	20%	2	20%
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>100%</b>

Distribusi tingkat pendidikan ibu pada kelompok perlakuan yaitu terdapat 6 (60%) ibu yang tingkat pendidikannya hanya SD, 2 (20%) ibu yang tamatan SMP, 1 (10%) ibu yang tamatan SMA dan hanya 1 (10%) ibu yang tingkat pendidikan S1. Sedangkan pada kelompok kontrol yaitu

terdapat 6 (60%) ibu yang tingkat pendidikannya SD, 2 (20%) ibu yang tamat smp, dan hanya 2 (20%) yang tamat sma.

Distribusi rata-rata penghasilan orang tua responden berdasarkan upah minimum Reguler kabupaten sinjai yaitu pada kelompok perlakuan terdapat 7 (70%) orang yang berpenghasilan <1.440.000 dan hanya 3 (30%) orang yang berpenghasilan >1.440.000 sedangkan pada kelompok kontrol terdapat 8 (80%) orang yang berpenghasilan < 1.440.000 dan hanya 2 (20%) orang yang berpenghasilan > 1.440.000.

### 3. Analisis univariat

Tabel 5.2

#### Distribusi perubahan status gizi pada masing-masing kelompok

(n =10)

Variabel	Pre test				Post test			
	Gizi kurang		Gizi baik		Gizi kurang		Gizi baik	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Kelompok perlakuan	10	100%	0	0%	5	50%	5	50%
Kelompok kontrol	10	100%	0	0%	9	90%	1	10%

Sumber : Data primer 2014

Dari tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa perubahan status gizi pada kelompok perlakuan dari 10 (100%) orang yang mengalami gizi kurang, setelah pemberian sari kurma menunjukkan bahwa 5 (50 %) orang yang mengalami gizi kurang dan 5 (50%) yang mengalami gizi baik.

sedangkan pada kelompok kontrol, dari 10 (100%) orang yang mengalami gizi kurang, setelah penelitian dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa 9 (90%) anak yang mengalami gizi kurang dan 1 (10%) anak yang menjadi gizi baik.

**Tabel 5.3**  
**Uji normalitas Shapiro wilk**

Test of normality	Hasil Uji Shapiro Wilk	
	Klp perlakuan	Klp kontrol
<b>BB Pre test</b>	.266	.351
<b>BB Post test</b>	.074	.377

Uji shapiro wilk

Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro Wilk* menunjukkan bahwa semua data berdistribusi normal ( $> 0.05$ ). Sehingga uji statistik yang digunakan adalah uji t paired.

**Tabel 5.4**  
**Distribusi Pengaruh Pemberian Sari Kurma Terhadap Perubahan Berat Badan Pada Masing-Masing Kelompok**

Variabel	Kelompok perlakuan				Kelompok kontrol			
	Mean	SD	Min – max	P value	Mean	SD	Min-max	P value
BB Pretest	19.30	1.54	17-21	0.002	20.40	2.70	17-24.50	0.195
BB Posttest	19.73	1.72	18-22		20.50	2.78	17-24.80	


**Uji t paired**

Berdasarkan tabel 5.4 diatas memberikan gambaran bahwa Setelah dilakukan intervensi pada kelompok perlakuan didapatkan p value sebesar 0,002 atau  $< 0,05$  berarti ada pengaruh signifikan pemberian sari kurma

terhadap peningkatan berat badan. Adapun rata-rata berat badan setelah intervensi yaitu 19,3 kg dengan rata-rata perubahan yang diberikan sebesar 0,43 kg. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan p value sebesar 0,195 atau  $> 0,05$  berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap peningkatan berat badan. Rata-rata berat badan yaitu 20,4 kg dengan rata-rata kenaikan yang ditunjukkan hanya sebesar 0,1 kg.

**Grafik 5.1**

**Grafik peningkatan berat badan tiap minggu selama intervensi antara Kelompok perlakuan dengan dengan kelompok kontrol**



**Uji t paired**

Dari grafik 5.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan berat badan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan secara statistik terlihat ada peningkatan yang signifikan tiap minggunya sedangkan pada kelompok kontrol tidak terlihat peningkatan yang signifikan.

#### 4. Analisis bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk menjawab hipotesis yaitu untuk menilai apakah status gizi kelompok perlakuan menjadi lebih baik setelah diberikan sari kurma jika dibandingkan dengan sebelum pemberian sari kurma. Uji statistik yang akan dipakai adalah uji wilcoxon karena merupakan jenis data numerik yang terdistribusi tidak normal. Analisis bivariat juga digunakan untuk menilai apakah status gizi kelompok perlakuan lebih baik dibandingkan dengan kelompok kontrol diakhir intervensi.

Tabel 5.5

**Distribusi perbandingan Status gizi dengan indeks (BB/U) z score kelompok Perlakuan dan kontrol sebelum dan sesudah intervensi**

Variabel	Kelompok perlakuan (n=10)				Kelompok kontrol (n=10)			
	Mean	Medi an	Min- max	P value	Mean	Medi an	Min- max	P value
Pre test	-2.24	-2,15	(-2.65) - (-2.02)	0.008	-2.20	-2,16	(-2.64)- (-2.03)	0.36
Post test	-2.14	-2,05	(-2.65) - (-1.92)		-2.19	-2,13	(-2.61)- (-1.96)	

#### Uji wilcoxon

Dari tabel 5.5 diatas memberikan gambaran bahwa secara statistik menunjukkan pengaruh yang signifikan perubahan status gizi berdasarkan indeks BB/U sebelum dan setelah pemberian sari kurma pada kelompok

perlakuan sebesar 0.10 SD dilihat dari p value sebesar  $0.008 < 0,05$ . Sedangkan pada kelompok kontrol tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, perubahannya hanya sebesar 0.01 SD dilihat dari p value sebesar  $0.36 > 0.05$ . Hasil ini menggambarkan bahwa setelah intervensi dilakukan, perbandingan status gizi berdasarkan indikator BB/U lebih baik atau lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol dengan selisih perbedaan mean antara keduanya yaitu 0,05 SD

**Tabel 5.6**  
**Distribusi perbedaan status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol diakhir penelitian**

Variabel	N	Median	P value
Kelompok perlakuan	10	-2,05	0,24
Kelompok kontrol	10	-2,13	

**Uji mann-whithney U**

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan setelah dilakukan intervensi antara kelompok perlakuan perlakuan dengan kelompok kontrol dilihat dari p value sebesar  $0,24 < 0,05$ .

**B. Pembahasan**

Hasil uji wilcoxon pada penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi selama 3 minggu, Perubahan status gizi anak berdasarkan indeks BB/U pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah pemberian sari kurma, sedangkan

pada kelompok kontrol secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Perbandingan status gizi berdasarkan indikator BB/U lebih baik atau lebih tinggi pada kelompok perlakuan dibanding dengan kelompok kontrol dengan selisih perbedaan mean antara keduanya yaitu 0,05 SD.

Sementara itu Perubahan berat badan sebelum dan setelah intervensi selama 3 minggu juga terbukti ada pengaruh yang signifikan. Peningkatan rata-rata berat badan pada kelompok perlakuan terjadi sebesar 0,43 kg. Sedangkan pada kelompok kontrol, peningkatan rata-rata berat badan hanya sebesar 0,1 kg.

Peningkatan berat badan juga terlihat pada grafik peningkatan berat badan tiap minggu ( Grafik 5.1) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan setiap minggunya pada kelompok perlakuan. Pada minggu pertama, rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,22 kg, Pada minggu kedua rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,24 kg. Kemudian pada minggu ketiga rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,43 kg. sedangkan pada kelompok kontrol tidak terlihat ada peningkatan setiap minggunya. Pada minggu pertama, rata-rata peningkatan berat badan sebesar 0,21 kg, pada minggu kedua, rata-rata perubahan berat badan menurun sebesar 0,16 kg, kemudian pada minggu ketiga, rata-rata perubahan berat badan menurun sebesar 0,10 kg. Hal ini sejalan dengan teori yang dikatakan Dalam buku *The miracle of date* bahwa orang-orang yang berbadan kurus, kurma merupakan salah satu asupan bergizi untuk balita dan dapat menambah berat badan anak-anak (Salim, 2008). Dalam buku *Islamic Food*

*Combining* juga dikatakan bahwa mengkonsumsi kurma dengan mentimun dapat meningkatkan berat badan (Indra, 2014).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruthy pada salah satu kecamatan terpilih Di Jakarta yang menggabungkan kurma dan tempe untuk memperbaiki staus gizi balita menunjukkan hasil yang tidak jauh beda dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa, Status gizi pada kelompok perlakuan berdasarkan indeks BB/U meningkat sebesar 0,144 SD sementara itu rata-rata berat badan meningkat sebesar 0,29 kg. Namun tidak bermakna secara statistik pada kedua indikator. Sementara dalam penelitian ini menggunakan sari kurma untuk memperbaiki status gizi anak usia sekolah menunjukkan hasil bahwa status gizi pada kelompok perlakuan berdasarkan indeks BB/U meningkat sebesar 0,10 SD dengan rata-rata perubahan berat badan meningkat sebesar 0,43 kg.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Giyatmo pada salah satu Rumah Sakit di Purwokerto. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pemberian sari kurma merupakan salah satu tambahan diet alternatif untuk meningkatkan status nutrisi pasien yang mengalami penyakit DBD.

Dalam hal ini peneliti berasumsi bahwa pemberian sari kurma merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki status gizi anak meskipun kandungan nutrisi sari kurma tidak persis sama dengan buah kurma namun bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan sari kurma adalah buah kurma.

Karbohidrat yang terkandung dalam sari kurma cukup tinggi (81,9%), karbohidrat merupakan salah satu Makronutrien yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh dan tidak hanya bertugas untuk membantu kinerja otot, tetapi juga membantu perbaikan dan pertumbuhan otot, sehingga nutrisi ini menjadi salah satu nutrisi kunci dalam menambah berat badan dan massa otot (Hardiansyah, 2011). karbohidrat yang tinggi juga dapat meningkatkan metabolisme dalam tubuh serta dapat menambah asupan energi dalam tubuh (Ruthy, 2012).

Dalam sari kurma juga mengandung Protein, air, dan mineral-mineral dalam jumlah cukup diperlukan untuk pertumbuhan. Penambahan berat badan seseorang pada masa pertumbuhan disebabkan oleh terbentuknya jaringan-jaringan baru, seperti dinding dan protoplasma sel, membran-membran, massa otot, darah dan lainnya (Sumardjo, 2006).

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : *"Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan."*

Maksudnya adalah yang diharamkan dari kedua jenis buah tersebut yaitu kurma dan anggur yakni buah yang kering dari keduanya baik dari buah kurma (tamr) maupun anggur kering (kismis) dan segala yang sudah diolah dari kedua buah tersebut baik itu berupa manisan, cuka, maupun minuman perasan, semuanya diharamkan untuk diminum sebelum disalahgunakan (sebagai minuman keras). (Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq oleh Hani al-Haj IV/406, cet. Al-Maktabah at-Taufiqiyah, Mesir.)

Allah telah menjelaskan bahwa buah kurma yang sudah diolah menjadi minuman diharamkan kecuali jika telah memabukkan. Dalil ini merupakan Salah satu bukti bahwa kurma adalah anugrah yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan Terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang betul-betul memahami.

Kurma juga mengandung unsur-unsur penting berupa vitamin mineral dan gula yang mudah diserap, dan membantu untuk mengurangi kelaparan dan memberi rasa kenyang dengan cepat, karena itulah Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ

Artinya :*“Jika salah seorang diantara kalian berbuka puasa maka makanlah buah kurma karena ia mengandung keberkahan”*.  
{(HR. Abu Daud) Dalam Siraaj, 2013}.

Dalam penelitian ini juga diperkuat dengan menggunakan uji man- whitney U. Hasil Uji mann-whitney U menunjukkan bahwa perbedaan status gizi (BB/U) antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Namun Pada awal penelitian

menunjukkan bahwa status gizi semua responden, baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol berdasarkan indeks BB/U yaitu mengalami gizi kurang namun setelah dilakukan intervensi selama 3 minggu diakhir penelitian terdapat perubahan status gizi berdasarkan indeks BB/U. Pada kelompok perlakuan jumlah status gizi baik telah menunjukkan perubahan sebesar 50% sedangkan pada kelompok kontrol hanya terdapat perubahan sebesar 10%. Hal ini kemungkinan terjadi karena status gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya asupan gizi tidak adekuat, tingkat pendidikan ibu, dan tingkat penghasilan orang tua.

Salah satu manfaat Sari kurma dapat merangsang nafsu makan, bila nafsu makan baik maka proses makan guna memenuhi kebutuhan gizi tubuh terutama keseimbangan energi akan berjalan maksimal sejalan dengan peningkatan nafsu makan tentu akan menambah berat badan (Rostita, 2009). Namun Anak dalam usia sekolah mulai susah makan, mereka lebih menyenangi makanan jajanan yang tergolong hampa kalori dan gizi jadi walaupun nafsu makan meningkat tetapi yang dikonsumsi hanya makanan hampa kalori dan gizi maka tetap tidak mempengaruhi status gizi (Rauf, 2007).

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi status gizi kurang yaitu penghasilan orang tua. Rauf mengatakan ketahanan pangan keluarga yang kurang memadai baik jumlah maupun mutu kemiskinan kadang menjadikan hambatan dalam penyediaan pangan bagi keluarga sehingga

berpengaruh bagi status gizi anak (Rauf, 2009). Prof azrul juga mengatakan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang belum mencukupi berkaitan erat dengan rendahnya penghasilan keluarga secara tidak langsung mempengaruhi status gizi anak hal ini juga berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah ( Azrul, 2004). Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua anak yang tingkat penghasilannya kurang dari upah minimum reguler kabupaten sinjai yaitu  $< 1.440.000$  lebih cenderung mengalami status gizi kurang. Dalam hal ini berarti terdapat hubungan yang erat antara tingkat penghasilan orang tua dengan status gizi anak di madrasah ibtidaiyah nurul muttaqin bole.

Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa semakin rendah tingkat pendidikan ibu maka semakin tinggi pula cenderung terjadinya status gizi kurang pada anak. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Tingkat pendidikan ibu yang rendah mengakibatkan kurangnya pengertian ibu tentang status gizi sehingga lebih cenderung mempunyai peluang anak mengalami status gizi kurang dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan tinggi ( Budiarto, 2003).

Hal lain juga dikatakan bahwa, bagi anak usia sekolah soal makan kadang- kadang merupakan hal yang kurang menyenangkan karena pada usia sekolah mereka lebih cenderung senang bermain, ketergantungan pada orang tua mulai berkurang dan mulai menolak makanan yang tidak disukainya sehingga peran orang tua sangatlah berpengaruh dalam mengawasi pola makan anak ( Sunardi, 2006).

Pada umumnya anak dengan indikator BB/U yang rendah, secara genetik mungkin memang pendek, rendahnya nilai indikator ini juga sebagai hasil dari keadaan pendek atau gagal tumbuh (Rauf, 2007). Indikator BB/U hanya memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat umum karena berat badan berkorelasi positif dengan usia dan tinggi badan. Berat badan yang rendah juga dapat disebabkan karena postur anak yang pendek (Supriasa, 2002). Dimana dalam penelitian tidak mengukur tinggi badan anak sehingga bisa menjadi salah satu bias dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempengaruhi status gizi anak Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Muttaqin Bole. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan dkk bahwa tidak terdapat hubungan asosiasi yang signifikan antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, keduanya mempunyai kemungkinan yang relatif sama mengalami status gizi kurang (Ihsan, 2012).

Namun Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan yang memungkinkan mempengaruhi hasil penelitian. Diantaranya yaitu Dalam penelitian ini tidak menghomogenkan kelompok umur anak, Namun masih dalam satu kategori anak usia sekolah sehingga kemungkinan terdapat perbedaan karakteristik anak misalnya perbedaan tingkat kemandirian anak dalam menyiapkan makanan, kebutuhan energi lebih besar dibutuhkan dalam rentang usia pra remaja, serta adanya perbedaan tingkat pengetahuan anak.

Rencana awal penelitian ini, intervensi akan diberikan langsung bagi responden oleh peneliti pada waktu pagi dan siang hari namun kendala pada saat penelitian ternyata banyak hari libur sehingga peneliti mempercayakan pemberian sari kurma dilakukan oleh orang tua yang telah mendapat penjelasan dengan baik. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada orang tua yang lalai dalam pemberian sari kurma terhadap anaknya. Saat intervensi juga sulit memantau pemberian sari kurma oleh orang tua karena rata-rata tempat tinggal responden berjauhan sehingga hanya bagian yang dapat dijangkau yang dipantau secara baik.

Pada awal penelitian ini jumlah sampel sebanyak 28 orang namun saat dilakukan penelitian banyak anak yang tidak hadir disekolah sehingga sampel dalam penelitian hanya 20 orang dengan masing-masing 10 orang untuk tiap kelompok perlakuan dan kelompok kontrol sehingga mengurangi jumlah sampel dalam penelitian.

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
MAKASSAR

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Status Gizi menurut indeks BB/U sebelum dilakukan intervensi pada semua sampel baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol menunjukkan status gizi kurang yaitu rata-rata hasil z-score < dari -2 SD.
- b. Status Gizi menurut indeks BB/U setelah dilakukan intervensi menunjukkan perubahan status gizi pada kelompok perlakuan sebesar 50% menjadi status gizi baik dengan peningkatan rata-rata z-score sebesar 0.10 SD. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan perubahan sebesar 10 % dengan peningkatan rata-rata z-score sebesar 0,01 SD.
- c. Status gizi menurut indeks BB/U sebelum dan setelah intervensi dilakukan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun perbandingan antara kedua kelompok tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

#### 2. Saran

- a. Bagi pelayanan kesehatan

Dari hasil penelitian ini diharapkan bagi petugas kesehatan agar dapat memberikan pemahaman kepada orang tua anak tentang pentingnya gizi bagi anak serta dapat menjadikan sari kurma sebagai salah satu alternatif meningkatkan status gizi.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah ilmu dan pengembangan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi peneliti selanjutnya

1. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut mengenai pengaruh sari kurma terhadap status gizi dengan jumlah sampel yang lebih besar dan rentang waktu yang lebih lama mengingat kesimpulan dari hasil penelitian ini masih belum ada perbedaan antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol yang signifikan tentang perubahan status gizi.
2. Saran untuk Penelitian selanjutnya perlu ada modifikasi sari kurma sehingga anak merasa tidak bosan meminum sari kurma misalnya menjadikan sari kurma sebagai selei dalam roti namun tetap mempertimbangkan nilai gizi yang terkandung di dalamnya.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih menghomogenkan rentang usia anak.

## DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an

Almatsier, sunito. 2009. *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Almatsier,sunito.2004. *Penuntun diet edisi baru*.jakarta : PT Gramedia Pustaka utama

Aryani, Oginawati, & Santoso. 2010. *Penentuan Total Asupan Harian Unsur Gizi Mikro dalam Makanan Anak-Anak Sekolah Dasar Di Bandung dengan Menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom*.Bandung : PTNBR – BATAN

Azwar, azrul.2004. *aspek Kesehatan Dan Gizi Dalam Ketahanan Pangan*. Jakarta : Prosiding Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi Vii.

Bahtiar, Ryzki. 2011. *Pembuatan minuman instan sari kurma (phoenyx dactylifera)*. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/53057>. update : 22:30 2014.

Budiarto, eko.2003. *pengantar epidemiologi*. Jakarta : EGC

Chezire.2008. *East African Medical Journal Determinants of under nutrition among school age children in a nairobi peri-urban slum* : Department of Community Nutrition

Febrida, melly.2013. *4 dari 10 Anak SD di Indonesia Pendek Karena Kurang Gizi*.liputan 6.com : posted: 26/03/2013 17:34

Giyatmo.2013. *Jurnal efektifitas pemberian jus kurma dalam meningkatkan trombosit pada Pasien demam berdarah dengue di rsu bunda purwokerto: STIKES Muhammadiyah Gombong*

Graha, Chairinniza K. 2010. *100 Question dan answer kolesterol*. Jakarta : PT. Elex media komputindo.

Hardiansyah dkk. 2011. *Uji preferensi nilai anti oksidan indeks glikemik, serta pengaruh sari kurma dan buah kurma terhadap stamina*. Departemen gizi masyarakat FEMA :Bogor

Indra, denny.2014. *Islamic Food Combining Menu Sehat Nabi Muhammad*. Penerbit garudhawaca : Yogyakarta.

- Ihsan, Muhammad.2012. *jurnal faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi anak balita di desa teluk rumbia kecamatan singkil kabupaten aceh* :FKM USU
- IDN Supariasa, *Penilaian Status Gizi* .Jakarta: Buku Kedokteran EGC hlm.13
- Jabir, jardianty 2009. *Hubungan status gizi dengan prestasi belajar siswa SD Inpress jongaya kelurahan Pa'baeng baeng kecamatan tamalate di wilayah andi tonro makassar* : UIN alauddin makassar
- Jalaluddin mas'ud.2011. *hubungan antara berat badan dengan peningkatan kadar glukosa darah pegawai di rektorat uin alauddin makassar* :UIN alauddin makassar
- Jannah, raudatul.2010.*jurnal pengaruh pemberian suplemen vitamin terhadap Perubahan status gizi (bb/u) balita bawah garis merah (bgm) di wilayah kerja puskesmas kambat utara kabupaten Hulu sungai tengah (hst) tahun 2010*": Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Borneo Banjar baru
- Kuncoro dkk, *jurnal Pengaruh pemberian suplemen zink intrauterin terhadap Berat badan anak di kabupaten takalar*. Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin
- Makalew dkk.2013. *jurnal Hubungan Antara Asupan Energi Dan Zat Gizi Dengan Status Gizi Anak Sekolah Dasar Kelas 4 Dan Kelas 5 SDN 1 Tounelet Dan SD Katolik St. Monica Kecamatan Langowan Barat* : Program Studi Gizi Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat-Universitas Sam Ratulangi Manado
- Mitayanti, SST, M.biomed, sartika wiwi, DCn, M. Biomed. *Buku saku ilmu gizi*. Jakarta : TIM, 2010
- Notoatmodjo, S. (2005) *Metodologi Penelitian Kesehatan* Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Numair, abu. 2013. *Keutamaan kurma dalam as-sunnah*. <http://www.ilmusunnah.com/keutamaan-kurma-dalam-as-sunnah/>. Update : 20.00 : 2014
- Nurasni tompo 2011. *skripsi Gambaran pemberian makan tambahan anak sekolah (PMT-AS) Dengan status gizi murid di sekolah dasar negeri n0.17pokobulo di desa bangkalaloe kabupaten jene ponto* : universitas islam negeri alauddin Makassar.
- Nursalam dan Siti Pariani. 2002. *Pedoman Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto.

- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Sangung Seto.
- PERSAGI. 2009. *Kamus gizi pelengkap kesehatan keluarga*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara.
- Proverawati dan kusumawati.2011. *Ilmu gizi untuk keperawatan dan gizi kesehatan*. Nuha Medika : Yogyakarta.
- Rauf, suriani.2007. *Tesis pengaruh pemberian abon ikan terhadap Perubahan status gizi anak gizi kurang Umur 24-59 bulan* : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Rawat Dkk. 2012. *Prevalence Of Malnutrition Among School Children With Reference To Overweight And Obesity And Its Associated Factors*. Indian journal of community health.
- Rosita.2009. *khasiat dan keajaiban kurma*. Bandung: PT Mizan pustaka
- Ruthy. 2012, *Pengaruh pemberian biskuit tempe terhadap status gizi balita penderita tbc dikecamatan terpilih jakarta timur*.FKM UI
- Salim, Ahmad.2008. *The miracle of date*. PUSTAKA IIMAN
- Salim, sarah.2011. *Statu gizi anak usia sekolah dan hubungannya dengan tingkat asupan kalium harian di yayasan kampung kids pejaten jakarta selatan*. FK UI.
- Satuhu, suyanti.2010. *kurma khasiat dan olahannya*. Jakarta : penebar swadaya hlm 19
- Siraaj, 2013 : *Mengenal Rahasia Makanan Buah Kurma*: <http://www.arahmah.com/news/2013/07/13/mengenal-rahasia-makanan-3rahasia-buah-kurma.html#sthash.QtUAHLE9.dpuf>. Update : 20.00 : 2014
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjo. 2009. *Prinsip-Prinsip Ilmu Gizi*. Yogyakarta : Kanisius
- Sukfitriyanty, syahrir. 2011, *gambaran status sosial ekonomi dan status gizi anak SD no.234 inpres takalar kota kabupaten takalar* : Universitas islam negeri alauddin makassar.
- Sumardjo, Damin. 2006. *Pengantar kimia*. Jakarta : EGC

Sunardi T, 2006. *Hidup sehat gizi seimbang dalam siklus kehidupan manusia. Gizi seimbang untuk bayi dan balita*. Gramedia. Jakarta.

Supartini.2004. *konsep dasar keperawatan anak*. Jakarta: EGC

Supariasa, I Dewa Nyoman. 2002. *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: EGC.

Syahaubuddin. 2013. *Skripsi faktor yang berhubungan dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan jajanan sehat anak usia sekolah di SDN maccini sawah II kelurahan maccini kota makassar*. : UIN alauddin makassar.

Wahyuniar, Lely.2004. *Antropometri Keluarga Sebagai Indikator Kondisi Ekonomi Keluarga. [Desertasi]*. Program Doktor Ilmu Epidemiologi Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.

Yatim, f.2005. *30 gangguan kesehatan pada anak usia sekolah*. Jakarta :pustaka populer obor.

Yurisa, Wella.2008. *Etika penelitian kesehatan*. Riau : FKUR





Nurdaningsih, lahir di sinjai pada tanggal 02 juli 1993. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan suami istri Achmad dan Sitti. Normaliah S.Pd, sekarang orang tua penulis menetap dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 1998 di Madrasah Ibtidiyah Nurul Muttaqin Bole, di sekolah tersebut penulis menimba ilmu selama enam tahun dan selesai pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya di Madrasah Tsanawiyah Nurul Jihad saohiring dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan pada SMA Negeri 1 Sinjai Timur dan selesai pada tahun 2010.

Setelah berhasil menyelesaikan studi di SMA, Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Makassar yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis mengambil program strata satu di Fakultas Ilmu kesehatan Jurusan Keperawatan dan selesai pada tahun 2014.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan yang akan datang serta mendapatkan Ridho dari ALLAH SWT.

**L**

**A**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**R**

**A**

**N**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## LAMPIRAN



## LAMPIRAN

1. Tabel Kelompok perlakuan

NO	NAMA	Jenis kelamin	Tingkat pendidikan ibu	Penghasilan rata-rata perbulan	Umur	BB PRE	POST minggu 1	Post minggu 2	Post minggu 3	STATUS GIZI PRE	Z score pre	STATUS GIZI POST	Z score post
1	S	L	SD	< 1.440.000	9 thn 4 bln	18.3	18.1	18.3	18.3	Gizi kurang	-2,65	Gizi kurang	-2,65
2	AJ	P	SD	< 1.440.000	9 thn 3 bln	19.9	20.3	20.2	20.2	Gizi kurang	-2,06	Gizi baik	-2,00
3	KE	P	SMP	>1.440.000	11 thn 4 bln	21.8	22	22.1	22.6	Gizi kurang	-2,53	Gizi kurang	-2,40
4	N	P	SD	< 1.440.000	8 thn 5 bln	18	18.3	18.5	18.7	Gizi kurang	-2,18	Gizi baik	-2,00
5	KH	P	S1	> 1.440.000	8 thn 7 bln	18.8	19.2	19	19.1	Gizi kurang	-2,02	Gizi baik	-1,95
6	M	P	SD	< 1.440.000	9 thn 2 bln	19.3	19.2	19.5	19.6	Gizi kurang	-2.17	Gizi kurang	-2,11
7	H	L	SD	< 1.440.000	9 thn	20	20.3	19.9	20.1	Gizi kurang	-2,13	Gizi kurang	-2,10
8	RF	L	SMA	> 1.440.000	7 thn 1bln	17.5	17.7	17.8	18	Gizi kurang	-2.11	Gizi baik	-1,92
9	MF	L	SMP	< 1.440.000	7 thn 2 bln	17.7	17.7	17.8	18	Gizi kurang	-2,03	Gizi baik	-1,92
10	U	L	SD	< 1.440.000	11 thn 5 bln	21.7	22.4	22.3	22.7	Gizi kurang	-2,56	Gizi kurang	-2,40

2. Tabel kelompok kontrol

NO	Nama	Jenis kelamin	Tingkat pendidikan	Penghasilan rata-rata perbulan	Umur	BB PRE	BB post minggu 1	BB post minggu 2	BB post minggu 3	STATUS GIZI PRE	Z score pre	STATUS GIZI POST	Z score post
1	Y	L	SD	< 1.440.000	11 thn 4 bln	24.5	24.6	24.9	24.6	Gizi kurang	-2,48	Gizi kurang	-2,46
2	S	P	SMP	< 1.440.000	11 thn 4 bln	24.5	24.9	24.8	24.8	Gizi kurang	-2,12	Gizi kurang	-2,07
3	H	L	SD	< 1.440.000	10 thn 9 bln	22.3	22.9	22.4	22.7	Gizi kurang	-2,22	Gizi kurang	-2,14
4	SA	L	SD	< 1.440.000	9 thn 7 bln	20.5	20.1	20.1	20.5	Gizi kurang	-2,20	Gizi kurang	-2,20
5	HA	L	SD	< 1.440.000	8 thn 10 bln	20.2	20.6	20.7	20	Gizi kurang	-2,05	Gizi kurang	-2,11
6	NR	P	SMA	> 1.440.000	7 thn 9 bln	17.4	17.7	17.9	17.7	Gizi kurang	-2,06	Gizi baik	-1,96
7	HS	P	SD	< 1.440.000	7 thn 6 bln	17	17.3	17.3	17	Gizi kurang	-2,03	Gizi kurang	-2,03
8	AS	L	SMA	> 1.440.000	7 thn 8 bln	18.5	18.5	18.3	18.2	Gizi kurang	-2,04	Gizi kurang	-2,13
9	AL	L	SD	< 1.440.000	11 thn 3 bln	20.8	21.2	21	21	Gizi kurang	-2,64	Gizi kurang	-2,61
10	SA	L	SMP	< 1.440.000	8 thn	18.3	18.3	18.2	18.5	Gizi kurang	-2,25	Gizi kurang	-2,19

Uji normalitas berat badan

Kelompok perlakuan

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	.141	10	.200*	.908	10	.266
bbminggu1	.175	10	.200*	.897	10	.202
bbminggu2	.143	10	.200*	.891	10	.174
bbminggu3	.193	10	.200*	.859	10	.074

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**Paired Samples Statistics**


	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	19.3000	10	1.54919	.48990
bbminggu1	19.5200	10	1.69954	.53744

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu1	-.22000	.26583	.08406	-.41016	-.02984	-2.617	9	.028

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	19.3000	10	1.54919	.48990
bbminggu2	19.5400	10	1.62289	.51320



**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu2	-.24000	.21187	.06700	-.39156	-.08844	-3.582	9	.006

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	19.3000	10	1.54919	.48990
bbminggu3	19.7300	10	1.72952	.54692

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu3	-.43000	.31640	.10006	-.65634	-.20366	-4.298	9	.002


Kelompok Kontrol

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	.159	10	.200*	.919	10	.351
bbminggu1	.176	10	.200*	.915	10	.316
bbminggu2	.193	10	.200*	.901	10	.226
bbminggu3	.163	10	.200*	.922	10	.377

a. Lilliefors Significance Correction

\*. This is a lower bound of the true significance.



**Paired Samples Statistics**


	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	20.4000	10	2.70842	.85648
bbminggu1	20.6100	10	2.77667	.87806

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu1	-.21000	.28848	.09123	-.41637	-.00363	-2.302	9	.047

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	20.4000	10	2.70842	.85648
bbminggu2	20.5600	10	2.76895	.87562




**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu2	-.16000	.30623	.09684	-.37906	.05906	-1.652	9	.133

**Paired Samples Statistics**

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 pretest	20.4000	10	2.70842	.85648
bbminggu3	20.5000	10	2.78927	.88204



**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 pretest - bbminggu3	-.10000	.22608	.07149	-.26173	.06173	-1.399	9	.195

## CROSTABULATION

**jeniskelamin \* statusgizi Crosstabulation**

			Kelompok perlakuan		Total
			gizi kurang	gizi baik	
jeniskelamin	laki-laki	Count	3	2	5
		% of Total	30.0%	20.0%	50.0%
	perempuan	Count	2	3	5
		% of Total	20.0%	30.0%	50.0%
Total		Count	5	5	10
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

**jeniskelamin \* statusgizi Crosstabulation**

			Kelompok kontrol		Total
			gizikurang	gizi baik	
jeniskelamin	laki-laki	Count	7	0	7
		% of Total	70.0%	0.0%	70.0%
	perempuan	Count	2	1	3
		% of Total	20.0%	10.0%	30.0%
Total		Count	9	1	10
		% of Total	90.0%	10.0%	100.0%

**umur \* statusgizi Crosstabulation**

			Perlakuan		Total
			gizi kurang	gizi baik	
umur	umur 7 tahun	Count	0	2	2
		% of Total	.0%	20.0%	20.0%
	umur 8 tahun	Count	0	2	2
		% of Total	.0%	20.0%	20.0%
	umur 9 tahun	Count	3	1	4
		% of Total	30.0%	10.0%	40.0%
	umur 11 tahun	Count	2	0	2
		% of Total	20.0%	.0%	20.0%
Total		Count	5	5	10
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

**UMUR \* statusgizi Crosstabulation**

			Kontrol		Total
			gizikurang	gizi baik	
UMUR	7 Tahun	Count	2	1	3
		% of Total	20.0%	10.0%	30.0%
	8 TAHUN	Count	2	0	2
		% of Total	20.0%	.0%	20.0%
	9 TAHUN	Count	1	0	1
		% of Total	10.0%	.0%	10.0%
	10 TAHUN	Count	1	0	1
		% of Total	10.0%	.0%	10.0%
	11 TAHUN	Count	3	0	3
		% of Total	30.0%	.0%	30.0%
Total		Count	9	1	10

tingkatpendidikanortu \* statusgizi Crosstabulation

			Perlakuan		Total
			gizi kurang	gizi baik	
tingkatpendidikanortu	SD	Count	4	2	6
		% of Total	40.0%	20.0%	60.0%
	SMP	Count	1	1	2
		% of Total	10.0%	10.0%	20.0%
	SMA	Count	0	1	1
		% of Total	.0%	10.0%	10.0%
	S1	Count	0	1	1
		% of Total	.0%	10.0%	10.0%
Total	Count	5	5	10	
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%	

TINGKATPENDIDIKAN \* statusgizi Crosstabulation

			Kontrol		Total
			gizikurang	gizi baik	
TINGKATPENDIDIKAN	SD	Count	6	0	6
		% of Total	60.0%	.0%	60.0%
	SMP	Count	2	0	2
		% of Total	20.0%	.0%	20.0%
	SMA	Count	1	1	2
		% of Total	10.0%	10.0%	20.0%
Total	Count	9	1	10	
	% of Total	90.0%	10.0%	100.0%	

**TINGKATPENGHASILAN \* statusgizi Crosstabulation**

			Perlakuan		Total
			gizi kurang	gizi baik	
TINGKATPENGHASILAN <1.440.000	Count		4	3	7
	% of Total		40.0%	30.0%	70.0%
>1.440.000	Count		1	2	3
	% of Total		10.0%	20.0%	30.0%
Total	Count		5	5	10
	% of Total		50.0%	50.0%	100.0%

**tingkatpenghasilan \* statusgizi Crosstabulation**

			Kontrol		Total
			gizikurang	gizi baik	
tingkatpenghasilan < 1440.000	Count		8	0	8
	% of Total		80.0%	.0%	80.0%
> 1.440.000	Count		1	1	2
	% of Total		10.0%	10.0%	20.0%
Total	Count		9	1	10
	% of Total		90.0%	10.0%	100.0%

**STATUSGIZIPRE \* STATUSGIZIPOST Crosstabulation**

			STATUSGIZIPOST		Total
			gizi kurang	gizi baik	
STATUSGIZIPRE PERLAKUAN	Count		5	5	10
	% of Total		25.0%	25.0%	50.0%
KONTROL	Count		9	1	10
	% of Total		45.0%	5.0%	50.0%
Total	Count		14	6	20
	% of Total		70.0%	30.0%	100.0%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## FORMAT DATA JADWAL MINUM

Kode sampel :

Nama :

Jenis kelamin : L/P

Umur :

Tgl/hari :

Hari	Waktu minum sari kurma	
	Pagi	Siang
Senin		
Selasa		
Rabu		
Kamis		
Jumat		
Sabtu		
Minggu		

.....2014

Peneliti

## KUISIONER DASAR

Pengaruh pemberian sari kurma terhadap status gizi (BB/U) anak di Madrasah

Ibtidaiyah Nurul MuttaQin Bole Kabupaten Sinjai

No kuisioner :

Tgl wawancara :

### A. IDENTITAS RESPONDEN (IBU)

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pendidikan terakhir :
4. Penghasilan perbulan :

### B. IDENTITAS SAMPEL (ANAK)

1. Nama :
2. Jenis kelamin :
3. Umur :
4. Berat badan (BB) :.....Kg

.....2014

Peneliti

## FORMAT DATA PENGUKURAN ANTROPOMETRI

Kode sampel :

Nama :

Jenis kelamin :

Pengukuran ke:	Umur	Pengukuran BB (Kg)



.....2014

Peneliti

**KELOMPOK PERLAKUAN**

**Descriptives**

		Statistic	Std. Error	
PRETEST	Mean	-2.2440	.07578	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-2.4154	
		Upper Bound	-2.0726	
	5% Trimmed Mean	-2.2339		
	Median	-2.1500		
	Variance	.057		
	Std. Deviation	.23964		
	Minimum	-2.65		
	Maximum	-2.02		
	Range	.63		
	Interquartile Range	.48		
	Skewness	-.909	.687	
	Kurtosis	-1.021	1.334	
POSTEST	Mean	-2.1450	.07956	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-2.3250	
		Upper Bound	-1.9650	
	5% Trimmed Mean	-2.1294		
	Median	-2.0500		
	Variance	.063		
	Std. Deviation	.25158		
	Minimum	-2.65		
	Maximum	-1.92		
	Range	.73		
	Interquartile Range	.46		
	Skewness	-1.095	.687	
	Kurtosis	.071	1.334	

### Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PRETEST	.305	10	.009	.809	10	.019
POSTEST	.255	10	.064	.837	10	.041

a. Lilliefors Significance Correction

### Wilcoxon Signed Ranks Test


#### Test Statistics<sup>b</sup>

	POSTEST - PRETEST
Z	-2.668 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.008

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

### KELOMPOK KONTROL



#### Descriptives

		Statistic	Std. Error	
pretest	Mean	-2.2090	.06473	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-2.3554	
		Upper Bound	-2.0626	
	5% Trimmed Mean	-2.1950		
	Median	-2.1600		
	Variance	.042		
	Std. Deviation	.20469		
	Minimum	-2.64		
	Maximum	-2.03		
	Range	.61		
	Interquartile Range	.26		
	Skewness	-1.319	.687	
	Kurtosis	.999	1.334	

posttest	Mean		-2.1900	.06279
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	-2.3320	
		Upper Bound	-2.0480	
	5% Trimmed Mean		-2.1794	
	Median		-2.1350	
	Variance		.039	
	Std. Deviation		.19855	
	Minimum		-2.61	
	Maximum		-1.96	
	Range		.65	
	Interquartile Range		.21	
	Skewness		-1.330	.687
	Kurtosis		1.300	1.334

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pretest	.221	10	.184	.833	10	.036
posttest	.280	10	.025	.860	10	.077

a. Lilliefors Significance Correction



**Test Statistics<sup>b</sup>**

	posttest - pretest
Z	-.911 <sup>a</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	.362

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

## Mann-Whitney Test


### POST TEST

		Ranks		
kelompok		N	Mean Rank	Sum of Ranks
postest	kelompokperlakuan	10	12.05	120.50
	kelompok kontrol	10	8.95	89.50
	Total	20		

Test Statistics <sup>b</sup>	
	postest
Mann-Whitney U	34.500
Wilcoxon W	89.500
Z	-1.173
Asymp. Sig. (2-tailed)	.241
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.247 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: kelompok



### PRE TEST

		Ranks		
kelompok		N	Mean Rank	Sum of Ranks
PRETEST	kelompokperlakuan	10	10.40	104.00
	kelompok kontrol	10	10.60	106.00
	Total	20		

Test Statistics <sup>b</sup>	
	PRETEST
Mann-Whitney U	49.000
Wilcoxon W	104.000
Z	-.076
Asymp. Sig. (2-tailed)	.940
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.971 <sup>a</sup>

a. Not corrected for ties.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR