

**Faktor Yang Berhubungan Dengan hipertensi Pada
Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kab. Gowa**



skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat pada
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar


Nurul Ardianty Syani
NIM 70200109068

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Hipertensi	7
B. Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi	13
C. Tinjauan Umum Lanjut Usia	28
D. Hipertensi Pada Lansia	45
BAB III KERANGKA KONSEP	48
A. Dasa Pemikiran Variabel	48
B. Kerangka Konsep	50
C. Definisi Operasional	51
D. Hipotesis Penelitian	53
BAB IV METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55

C. Populasi dan Sampel.....	55
D. Instrumen Penelitian.....	56
E. Metode Pengumpulan Data	56
F. Pengolahan dan Analisis Data	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Hasil	59
B. Pembahasan.....	76
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Fakultas : Ilmu Kesehatan
Judul Tugas Akhir : Faktor Yang Berhubungan Dengan hipertensi Pada Lanjut Usia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Nama : Nurul Ardianty Syani
Nim : 70200109068
Nama Pembimbing : Hj. Syarfaini Suyuti & St. Raodhah

Pada tahun 2000 jumlah penduduk lanjut usia di seluruh dunia mencapai 426 juta atau sekitar 6,8 % dari total populasi. Dalam Boedhi Darmojo (2006), Pada tahun 1995 WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa di dunia penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian terbesar pada populasi usia 65 tahun ke atas dengan jumlah kematian lebih banyak di negara berkembang. Hipertensi menjadi *silent killer* karena pada sebagian besar kasus tidak menunjukkan gejala apapun hingga pada suatu hari hipertensi menjadi stroke dan serangan jantung yang menjadikan penderita meninggal. Berdasarkan studi pendahuluan di PSTW Gau Mabaji diperoleh terdapat 100 jumlah lansia, dan 30% (30 orang) yang tercatat sebagai penderita hipertensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan hipertensi pada lansia PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa tahun 2013. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan *cross sectiona study*. Sampel penelitian ini berjumlah 43 orang.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 58,1% lansia menderita hipertensi. berdasarkan analisis bivariat diketahui bahwa konsumsi natrium, lemak, merokok dan minum kopi memiliki hubungan yang bermakna dengan hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013.

Dari hasil penelitian saran yang dapat diberikan bagi PSTW Gau Mabaji yaitu membuat langkah kebijakan yang terprogram dalam mengurangi kasus hipertensi seperti memberikan penyuluhan. Bagi masyarakat, mengurangi asupan natrium, mengubah gaya hidup dengan tidak merokok dan minum kopi. Bagi peneliti lain, menambah variabel penelitian serta penggunaan rancangan sampel yang lebih baik.

Kata kunci : Asupan karbohidrat, protein, lemak natrium, merokok, minum kopi, hipertensi, Lansia

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia laki-laki.
2. Tidak terdapat hubungan antara konsumsi karbohidrat dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang mengkonsumsi karbohidrat tinggi.
3. Tidak terdapat hubungan antara konsumsi protein dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang mengkonsumsi protein kurang.
4. Terdapat hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang mengkonsumsi lemak tinggi.
5. Terdapat hubungan antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang

menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang mengkonsumsi natrium tinggi.

6. Terdapat hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang perokok sedang.
7. Terdapat hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian hipertensi pada lansia di PSTW Gau Mabaji Kab.Gowa Tahun 2013. Lansia yang menderita hipertensi jumlahnya lebih banyak pada lansia yang peminum kopi ringan.

B. Saran

1. Bagi PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

- a. Membuat langkah kebijakan yang terprogram dalam mengurangi kasus hipertensi, seperti memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencegah hipertensi, pentingnya mengubah gaya hidup seperti tidak merokok dan mengurangi minum kopi bagi penderita hipertensi.
- b. Sebaiknya dilakukan perbedaan antara makanan bagi penderita hipertensi dan non hipertensi maupun penderita lainnya.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dini terhadap penyakit hipertensi seperti

mengurangi asupan natrium dengan menggantinya dengan bumbu alami, lemak, serta mengubah gaya hidup dengan tidak merokok dan mengurangi konsumsi kopi secara berlebihan.

3. Bagi peneliti lain

Peneliti lain diharapkan menambah variable-variabel lain yang kemungkinan berhubungan dengan kejadian hipertensi yang tidak ada dalam penelitian ini. Penggunaan rancangan penelitian yang lebih baik, atau dengan jumlah sampel yang lebih besar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hipertensi

a. Defenisi Hipertensi

Tekanan darah berubah-ubah sepanjang hari sesuai dengan situasi. Tekanan darah akan meningkat dalam keadaan gembira, cemas atau sewaktu melakukan aktivitas fisik dan turun selama tidur. Setelah itu berlalu, tekanan darah akan kembali menjadi normal. Apabila tekanan darah tetap tinggi maka disebut sebagai hipertensi atau tekanan darah tinggi. (Rinawang, 2011)

Hipertensi adalah keadaan peningkatan tekanan darah yang memberi gejala yang akan berlanjut ke suatu organ target seperti stroke (untuk otak), penyakit jantung koroner (untuk pembuluh darah jantung) dan hipertrofi ventrikel kanan/left ventricle hypertrophy (untuk otot jantung). Dengan target organ di otak yang berupa stroke, hipertensi menjadi penyebab utama stroke yang membawa kematian yang tinggi, (Bustan, 2007).

Hipertensi atau penyakit tekanan darah tinggi adalah kondisi medis saat tekanan darah dalam arteri meningkat melebihi batas normal. Tekanan darah menunjukkan tingkat kekuatan dorongan darah para pembukaan pembuluh darah arteri saat darah dipompa oleh jantung. Tekanan darah yang di ukuran ditunjukkan dengan angka, misalnya 120/80 mmHg. Nilai 120 menunjukkan tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung

berkontraksi, dinamakan sistolik. Nilai 80 menunjukkan tekanan darah relaksasi, disebut tekanan diastolik. (Widjadja, 2009)

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah penyakit yang umum terjadi di masyarakat kita. Keadaan ini terjadi jika tekanan darah pada arteri utama di dalam tubuh terlalu tinggi. Hipertensi kini semakin sering dijumpai pada orang lanjut usia. Hipertensi merupakan kelainan yang sulit diketahui oleh tubuh kita sendiri. Satu-satunya cara untuk mengetahui hipertensi adalah dengan mengukur tekanan darah kita secara teratur. Tekanan darah tubuh yang normal adalah 120/80 mmHg. (Shanty, 2011)

b. Klasifikasi Hipertensi

1. Klasifikasi berdasarkan etiologi

a) Hipertensi Esensial/primer

Menurut Yogiantoro (2006), Tidak jelas penyebabnya dan merupakan sebagian besar $\pm 90\%$ dari seluruh kejadian hipertensi. Hipertensi esensial adalah penyakit multifaktoral yang timbul terutama karena interaksi antara faktor-faktor risiko tertentu. Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. (Rinawang, 2011)

b) Hipertensi Sekunder

Hipertensi yang penyebabnya dapat diketahui. sering berhubungan dengan beberapa penyakit misalnya ginjal, jantung koroner, diabetes, kelainan sistem syaraf pusat. Jumlah kejadiannya mencapai $\pm 10\%$ (Sunardi, 2000).

2. Klasifikasi Berdasarkan Derajat Hipertensi

Berikut ini adalah klasifikasi tekanan darah pada orang dewasa berdasarkan JNC-VII (*The Joint National Committee On Prevention, Detection Evaluation, and Treatment Of High Blood Pressure* (JNC 7).

Tabel 2.1 Klasifikasi Tekanan Darah Menurut JNC 7

Klasifikasi Tekanan Darah	TDS (mmHg)	TDD (mmHg)
Normal	< 120	<80
Prahipertensi	120-139	80-89
Hipertensi derajat 1	140-159	90-99
Hipertensi derajat 2	≥ 160	≥100

Sumber : Rinawang, 2011

c. Gejala Klinis Hipertensi

Gejala-gejala penyakit yang biasa terjadi baik pada penderita hipertensi, maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal hipertensi yaitu sakit kepala, pusing, gelisah, jantung berdebar, perdarahan hidung, sukar tidur, sesak nafas, cepat marah, telinga berdenging, tekuk terasa berat, berdebar dan sering kencing di malam hari. Gejala akibat komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai meliputi gangguan; penglihatan, saraf, jantung, fungsi ginjal dan gangguan serebral (otak) yang mengakibatkan kejang dan perdarahan pembuluh darah otak yang mengakibatkan kelumpuhan, gangguan kesadaran hingga koma (Cahyono, 2008).

d. Patofisiologi Hipertensi

Dimulai dengan atherosclerosis, gangguan struktur anatomi pembuluh darah *peripher* yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh

darah. Kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran *plaque* yang menghambat gangguan peredaran darah peripher. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam system sirkulasi. (Bustan, 2007).

e. Komplikasi Hipertensi

Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2006) dalam Rinawang (2011) Tekanan darah tinggi dalam jangka waktu lama akan merusak endothel arteri dan mempercepat atherosklerosis. Bila penderita memiliki faktor-faktor risiko kardiovaskular lain, maka akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas akibat gangguan kardiovaskularnya tersebut. Menurut Studi Farmingham, pasien dengan hipertensi mempunyai peningkatan risiko yang bermakna untuk penyakit koroner, stroke, penyakit arteri perifer, dan gagal jantung.

Hipertensi yang tidak diobati akan mempengaruhi semua sistem organ dan akhirnya akan memperpendek harapan hidup sebesar 10-20 tahun. Selain itu penurunan tekanan darah dapat mencegah demensia dan penurunan kognitif pada usia lanjut. Kemunduran kognitif ditandai dengan lupa pada hal-hal yang baru, akan tetapi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Kerusakan organ yang terjadi berkaitan dengan derajat keparahan hipertensi. Perubahan-perubahan utama organ yang terjadi akibat hipertensi dapat dilihat dibawah ini:

1. Jantung.

Komplikasi berupa infark miokard, *angina pectoris*, gagal jantung.

2. Ginjal.

Dapat terjadi gagal ginjal karena kerusakan progresif akibat tekanan tinggi pada kapiler-kapiler ginjal, glomerulus. Dengan rusaknya glomerulus, darah akan mengalir ke unit-unit fungsional ginjal, nefron akan terganggu dan dapat berlanjut menjadi hipoksik dan kematian.

Dengan rusaknya membran glomerulus, protein akan keluar melalui urin sehingga tekanan osmotik koloid plasma berkurang, menyebabkan edema yang sering dijumpai pada hipertensi kronik.

3. Otak.

Komplikasinya berupa stroke dan serangan iskemik. Stroke dapat timbul akibat pendarahan tekanan tinggi di otak, atau akibat embulus yang terlepas dari pembuluh non-otak yang terpajan tekanan tinggi.

Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang memperdarahi otak mengalami hipertrofi dan menebal, sehingga aliran darah ke daerah-daerah yang diperdarahi berkurang. Arteri-arteri otak yang mengalami arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan kemungkinan terbentuknya *aneurisma*.

4. Mata.

Komplikasi berupa perdarahan retina, gangguan penglihatan sampai dengan kebutaan.

5. Pembuluh perifer.

Penelitian meta-analisis yang melibatkan lebih dari 420.000 pasien telah menunjukkan hubungan yang kontinyu dan independen antara tekanan darah dengan stroke dan penyakit jantung koroner. Peningkatan tekanan diastolik >10 mmHg dalam jangka panjang akan meningkatkan risiko stroke sebesar 56% dan penyakit jantung koroner sebesar 37%.

f. Diet untuk penderita tekanan darah tinggi

Sebenarnya mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobati. Karena itu, penderita penyakit hipertensi dianjurkan untuk melakukan diet. Sebaiknya, seseorang yang mengidap penyakit hipertensi mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, sodium, dan natrium. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk pengontrolan diet ini.

1. Jangan meletakkan garam di atas meja makan.
2. Pilih jumlah kandungan sodium yang rendah saat membeli makanan.
3. Batasi konsumsi daging dan keju
4. Kurangi pemakaian saus yang umumnya memiliki kandungan sodium.
5. Perbanyak konsumsi kandungan potasium (Kalium Suplements potasium) sekitar 2-4 gram/hari.

Sebab, potasium dapat membantu penurunan tekanan darah. Umumnya, potasium banyak didapati dalam beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah dan sayuran yang mengandung potasium dan baik

untuk dikonsumsi penderita tekanan darah tinggi, antara lain semangka, alpukat, melon, pare, labu siam, mentimun, lidah buaya, seledri, bawang merah dan bawang putih. Selain itu, makanan yang mengandung unsur omega 3 dikenal sangat efektif dalam membantu penurunan tekanan darah (Adib, 2011)

B. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi

Dari beberapa sumber kepustakaan yang diperoleh, faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, dimana pria lebih banyak dibandingkan wanita. Pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung dapat meningkatkan tekanan darah dibanding wanita. Namun setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat (Depkes, 2006). Hal tersebut dikarenakan adanya pengaruh hormon estrogen yang dapat melindungi wanita dari penyakit kardiovaskuler. Kadar hormon ini akan menurun setelah menopause (Gray, 2005).

Menurut Kumar (2005) dalam Rinawang (2011) wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormone estrogen yang berperan dalam meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL). Kadar kolesterol HDL yang tinggi merupakan faktor pelindung dalam mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Efek perlindungan estrogen

dianggap sebagai penjelasan adanya imunitas wanita pada usia premenopause. Pada premenopause wanita mulai kehilangan sedikit demi sedikit hormon estrogen yang selama ini melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Proses ini terus berlanjut dimana hormon estrogen tersebut berubah kuantitasnya sesuai dengan umur wanita secara alami, yang umumnya mulai terjadi pada wanita umur 45-55 tahun.

Data Riskesdas menyebutkan bahwa prevalensi penderita hipertensi di Indonesia lebih besar pada perempuan (8,6%) dibandingkan laki-laki (5,8%). Sedangkan menurut Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2006), sampai umur 55 tahun, laki-laki lebih banyak menderita hipertensi dibanding perempuan. Dari umur 55 sampai 74 tahun, sedikit lebih banyak perempuan dibanding laki-laki yang menderita hipertensi.

b. Konsumsi karbohidrat

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Di negara sedang berkembang karbohidrat dikonsumsi sekitar 70-80% dari total kalori, bahkan pada daerah-daerah miskin bisa mencapai 90%. Sedangkan pada negara maju karbohidrat dikonsumsi hanya sekitar 40-60%. Hal ini disebabkan sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat lebih murah harganya dibandingkan sumber bahan makanan kaya lemak maupun protein. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam.

Asupan karbohidrat mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap resiko terjadinya hipertensi. Asupan karbohidrat sederhana lebih mudah meningkatkan tekanan darah sistolik daripada karbohidrat kompleks. Sumber dari karbohidrat sederhana adalah gula murni, sirup jagung, molasses, madu, soft drink. Oleh karena itu, pemakaiannya harus dibatasi dan lebih dianjurkan untuk memilih karbohidrat kompleks. Selain itu, asupan tinggi serat dalam makanan sehari-hari terutama serat yang larut dapat menghalangi penetrasi enzim pencernaan. Akibatnya penyerapan berlangsung lebih lambat dan sekresi hormon insulin berkurang. Rendahnya kadar insulin dalam darah dapat menyebabkan bertambahnya ekskresi natrium yang berakibat menurunnya tekanan darah. Sumber makanan berserat dapat berasal dari nasi, jagung, ubi, talas, kentang, gandum.

c. Konsumsi protein

Protein banyak ditemukan dalam bahan makanan hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, kedelai, kacang-kacangan, dan sebagainya. Konsumsi sumber protein hewani dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah, hal ini dikarenakan kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya lebih tinggi daripada sumber protein nabati.

d. Konsumsi lemak

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diet tinggi lemak berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak

jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh polivalen secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian, dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah.

Komponen lemak polivalen tidak jenuh, yang disebut asam lemak esensial, merupakan rintangan untuk zat-zat yang mirip hormon didalam darah yang disebut prostaglandin. Beberapa jenis prostaglandin membantu mengatur tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan diameter dari arteri dan mengurangi jumlah darah yang harus dipompa oleh jantung. Tekanan darah berkurang bila asupan asam lemak esensial dalam diet ditingkatkan. Lemak merupakan 42% dari kalori total yang dikonsumsi dalam diet rata-rata orang Amerika. Tekanan darah menurun bila lemak dikurangi sampai 25% dari total kalori.

Bila mengonsumsi makanan berlemak, maka didalam usus makanan tersebut akan diubah menjadi kolesterol. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis yaitu suatu kondisi dimana kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah arteri. Pembentukan aterosklerosis diawali dengan rusaknya pembuluh darah. Setelah pembuluh darah rusak, maka kolesterol yang dibawa LDL terperangkap pada dinding pembuluh darah tersebut dalam waktu bertahun-tahun Maka terjadilah pembentukan plak sehingga pembuluh darah makin sempit dan elastisitasnya berkurang (Cahyono, 2008).

Dalam Rinawang (2011) Almatsier mengatakan, kandungan lemak yang dapat mengganggu kesehatan jika jumlahnya berlebih lainnya adalah: kolesterol, trigliserida, *low density lipoprotein (LDL)*. Secara umum, asam lemak jenuh cenderung meningkatkan kolesterol darah, 25-60% lemak yang berasal dari hewani dan produknya merupakan asam lemak jenuh. Setiap peningkatan 1% energi dari asam lemak jenuh, diperkirakan akan meningkatkan 2.7 mg/dL kolesterol darah, akan tetapi hal ini tidak terjadi pada semua orang. Lemak jenuh terutama berasal dari minyak kelapa, santan dan semua minyak lain seperti minyak jagung, minyak kedelai yang mendapat pemanasan tinggi atau dipanaskan berulang-ulang. Kelebihan lemak jenuh akan menyebabkan peningkatan kadar LDL kolesterol. Sedangkan lemak tidak jenuh, meskipun mengkonsumsinya kadar kolesterol tidak meningkat dan tetap stabil.

Berikut ini merupakan contoh bahan-bahan makanan yang mengandung lemak sedang sampai lemak yang cukup tinggi antara lain meliputi: ayam dengan kulit, bebek, *corned beef*, daging babi, kuning telur ayam, sosis, bakso, daging kambing, daging sapi, hati ayam, hati sapi, otak, telur ayam, telur bebek, usus sapi, susu kerbau, susu kental manis, sarden dalam kaleng, kelapa, lemak babi/sapi, mentega, minyak kelapa, santan dan lain-lain (Almatsier, 2006).

Penelitian Hasirungan (2001) dalam Rinawang (2011) didapatkan hubungan yang tidak bermakna antara konsumsi lemak dengan hipertensi. Namun, hasil penelitian Sugihartono (2007) diketahui sering

mengonsumsi lemak jenuh mempunyai risiko untuk terserang hipertensi sebesar 7,72 kali dibandingkan orang yang tidak biasa mengonsumsi lemak jenuh.

e. Konsumsi Natrium

Sumber utama natrium dalam pangan adalah garam dapur (garam meja) yang secara kimia berupa NaCl. Garam diperoleh dari hasil evaporasi air laut atau hasil galian deposit batu karang (*rock salt deposits*). Garam selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan, juga digunakan untuk mengwetkan bahan pangan, misalnya ikan asin, sayur asin dan lain-lain. Sumber natrium lainnya adalah penyedap masakan yaitu vetsin (*MSG, monosodium glutamate*) dan soda kue (bahan pengembang roti/kue) yaitu natrium bikarbonat.

Di dalam tubuh, natrium terdapat sebagai kation (Na^+) atau elektrolit dalam cairan ekstraseluler, intra seluler, dan inter seluler. Sedikit natrium ini terdapat pada permukaan tulang, di mana setengah bagian dari natrium ini berguna sebagai cadangan bagi tubuh bila konsumsi Na kurang yang dapat diserap oleh tubuhnya hanya sedikit.

Natrium merupakan ion positif utama dalam cairan ekstra seluler yang menimbulkan tekanan osmotik untuk menjaga agar air tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Tekanan osmotik ini menyeimbangkan tekanan yang sama yang ditimbulkan oleh kalium (K) di dalam sel, yang menjaga agar tetap berada di dalam sel. Bila kadar ion natrium atau kalium tidak seimbang lagi, air akan masuk atau keluar dari sel untuk menjaga

agar konsentrasi Na dan K berada pada level yang benar. Secara normal, tubuh dapat menjaga keseimbangan antara Na di luar sel dan K di dalam sel, dan juga dapat menjaga keseimbangan air.

Konsumsi natrium yang berlebihan dapat menyebabkan timbulnya hipertensi (penyakit tekanan darah tinggi). Mekanisme terjadinya dapat dijelaskan sebagai berikut : pada umumnya natrium yang diserap oleh tubuh dari makanan melebihi kebutuhan tubuh, dan kelebihan ini akan dibuang melalui ginjal bersama urine, sehingga kadar Na dalam darah tetap konstan. Apabila suatu waktu konsumsi Na berlebihan dan ginjal tidak mampu lagi mengeluarkannya (karena kapasitasnya terbatas), maka kadar Na dalam darah meningkat untuk menurunkannya kembali, lebih banyak cairan yang ditahan oleh darah. Akibatnya volume darah yang beredar dalam saluran darah tubuh meningkat apabila volumenya telah mencapai tingkat tertentu, tekanan di dalam sistem meningkat dan orangnya dikatakan menderita tekanan darah tinggi (Muchtadi, 2010).

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf/7 : 31

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahannya :

Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Adapun sikap tidak berlebih-lebihan, ilmu pengetahuan modern telah menetapkan bahwa tubuh tidak menyerap semua makanan yang

masuk, tetapi hanya mengambil secukupnya, kemudian berusaha membuang yang tersisa lebih dari kebutuhan. Disamping itu, lambung dan alat-alat pencernaan lainnya akan terpersir dan mengalami gangguan. Seseorang akan menderita penyakit tertentu yang berhubungan dengan alat-alat tersebut. Diantara bentuk sikap berlebih-lebihan, mengkonsumsi suatu zat makanan tertentu dalam jumlah yang besar melebihi zat-zat lain yang juga diperlukan. Seperti mengkonsumsi lemak dengan kadar yang mengalahkan albumen yang dibutuhkan tubuh. Disamping itu, ayat ini menganjurkan kita untuk makan yang baik-baik agar badan sehat sehingga kuat bekerja. Demikian pula, sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan dapat menyebabkan kelebihan berat badan tubuh menjadi terpersir dan mudah terkena tekanan darah tinggi, gula dan kejang jantung.

Makna dari ayat tersebut adalah makan dan minum agar sesuai dengan kebutuhanmu dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal, dengan menambah kadarnya baik dalam makanan dan minuman, dalam hal ini menambah kadar natrium/garam pada makanan secara berlebihan dapat menyebabkan hipertensi, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai. Yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran bagi orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا

Terjemahannya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi.

Makna dari ayat tersebut adalah Allah SWT telah membolehkan (manghalalkan) seluruh manusia agar memakan apa saja yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri yang tidak membahayakan tubuh dan akal fikiran.

Allah SWT berfirman dalam surah Al-baqarah/2: 172



يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Makna (طَيِّبًا) *Tayyiban* adalah lawan dari *khabitsan* atau jelek/menjijikan, perkara yang baik adalah perkara yang secara akal dan fitrah dianggap baik. secara akal (ilmu/pengetahuan) tembakau itu jelek oleh sebab membahayakan kesehatan, maka ini bukanlah perkara yang bukan *tayyib* namun jelek dan juga kecoa secara fitrah adalah hewan menjijikan meski ada sebagian orang yang tidak jijik, maka kecoa ini

adalah hewan yang jelek/*khabits* dan bukan perkara *tayyib*. Maka dari itu mengkonsumsi kecoa dan tembakau berarti mengkonsumsi barang yang jelek/*Khabits* atau bukan yang *tayyib* sebagaimana Allah perintahkan.

Di dalam ayat ini ditegaskan pula supaya seorang mukmin memakan makanan yang baik-baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikan itu haruslah disyukuri. Manusia diseru mengutamakan makanan yang bermutu dari segi kesehatan serta halal pula dalam islam.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَغَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنِ حَسْبِ الْآدَمِيِّ لَقِيَمَاتٌ يُقَمَّنُ صَلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتْ
الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ قُنُتْ لِلطَّعَامِ وَتُنْتُ لِلشَّرَابِ وَتُنْتُ لِلنَّفْسِ

Terjemahannya :

"Tidaklah anak Adam memenuhi tempat yang lebih buruk daripada perutnya, ukuran bagi (perut) anak Adam adalah beberapa suapan yang hanya dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika jiwanya menguasai dirinya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum dan sepertiga untuk bernafas."

Cahyono (2008) memaparkan bahwa *Dash-eating Plan (Dietary Approaches to stop Hypertension Eatings Plan)* atau pengaturan pola makan yang bertujuan untuk mengendalikan hipertensi. Diet ini pada intinya mengatur pola makan dengan mengurangi asupan natrium dan banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, serelia, biji-bijian, makanan rendah lemak, dan produk susu rendah lemak. DASHNATRIUM

yang dilakukan *National Heart, Lung and Blood Institute* menunjukkan hasil yang bermakna. Dengan membatasi asupan natrium, yaitu melalui pengurangan konsumsi garam hanya sebanyak 1.500 mg/hr (2/3 sendok teh sehari), maka terjadi penurunan tekanan darah.

Contoh bahan-bahan makanan yang tidak dianjurkan karena mengandung natrium yang kadarnya cukup tinggi antara lain sebagai berikut:

1. Sumber karbohidrat, yakni roti, biskuit dan kue yang dimasak dengan garam dapur dan atau *baking powder* dan soda.
2. Sumber protein hewani, yakni otak, ginjal, lidah, sardin, daging, ikan, susu, dan telur yang diawetkan dengan garam dapur seperti daging asap, ham, bacon, dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, ebi, udang kering, dan telur asin. Dianjurkan daging dan ikan maksimal 100 gram sehari; telur maksimal 1 butir sehari.
3. Sumber protein nabati, yakni keju, kacang tanah dan semua kacang-kacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam dapur atau ikatan natrium lain.
4. Sayuran dan buah-buahan yang diawetkan dengan menggunakan natrium benzoat ataupun garam dapur. Seperti yang dikemas dalam kaleng.
5. Lemak, yakni margarin dan mentega biasa.
6. Minuman bersoda (soft drink).

7. Bumbu, yakni garam dapur, kecap, tomato ketchup, vetsin (Almatsier, 2006).

f. Kebiasaan merokok

Rokok mengandung nikotin yang dapat meningkatkan denyut jantung, tekanan darah sistolik dan diastolik. Peningkatan denyut jantung pada perokok terjadi pada menit pertama merokok dan sesudah 10 menit peningkatan mencapai 30%. Sedangkan tekanan sistolik meningkat mencapai 10%. Diketahui pula bahwa merokok dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung melalui mekanisme sebagai berikut: *pertama*, merangsang saraf simpatis untuk melepaskan norepinefrin melalui saraf adrenergi dan meningkatkan catecolamin yang dikeluarkan melalui medula adrenal. *Kedua*, merangsang chemoreseptor di arteri karotis dan aorta bodies dalam meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. *Ketiga*, secara langsung terhadap otot jantung. (Rinawang, 2011)

Menurut Depkes RI Pusat Promkes (2008), telah dibuktikan dalam penelitian bahwa dalam satu batang rokok terkandung 4000 racun kimia berbahaya termasuk 43 senyawa. Bahan utama rokok terdiri dari 3 zat, yaitu 1) Nikotin, merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dengan adanya penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, pengerasan pembuluh darah dan pengumpulan darah. 2) Tar, dapat mengakibatkan kerusakan sel paru-paru dan menyebabkan kanker. 3) Karbon Monoksida (CO),

merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen.

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah/2:195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahannya :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat tersebut berisi mengenai larangan menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Rokok menimbulkan penyakit-penyakit yang membinasakan seperti kanker, TBC dan lain-lain. Rokok juga merupakan pemborosan dan penghambur-hamburan terhadap harta yang merupakan perbuatan setan. Belanjakanlah harta di jalan Allah SWT seperti berinfaq, sekecil apapun infaq yang disisikan dengan penuh ikhlas sudahlah mencukupi untuk meraih balasan yang besar dari Allah SWT.

Dalam Rinawang (2011) Depkes (2008) menyatakan Asap rokok bukan saja memberikan dampak buruk bagi perokok, melainkan juga bagi orang lain yang menghisap asap rokok tersebut tanpa dirinya sendiri merokok (disebut perokok pasif). Para ilmuwan membuktikan bahwa zat-zat kimia yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi kesehatan orang-orang disekitar perokok yang tidak merokok. Dampak bahaya merokok tidak langsung bisa dirasakan dalam jangka pendek tetapi

terakumulasi beberapa tahun kemudian, terasa setelah 10-20 tahun pasca digunakan. Dengan demikian secara nyata dampak rokok berupa kejadian hipertensi akan muncul kurang lebih setelah berusia lebih dari 40 tahun, sebab dipastikan setiap perokok yang menginjak usia 40 tahun ke atas telah menghisap rokok lebih dari 20 tahun. Jika merokok dimulai usia muda, berisiko mendapat serangan jantung menjadi dua kali lebih sering dibanding tidak merokok. Serangan sering terjadi sebelum usia 50 tahun.

Setiap tahun tidak kurang dari tiga koma lima sampai lima juta jiwa melayang akibat merokok (sekitar 10.000 orang/hari). Di Negara Cina dilaporkan dari 300 juta populasi laki-laki berusia 0-29 tahun, 200 juta di antaranya memiliki kebiasaan merokok (Cahyono, 2008).

Risiko yang ditimbulkan oleh kebiasaan merokok ternyata cukup besar, terutama dalam menimbulkan hipertensi, mengingat kebiasaan ini berisiko tinggi untuk menimbulkan arteriosklerosis atau pengerasan pembuluh darah nadi, termasuk pembuluh darah jantung (koroner). Bahkan merokok memberikan risiko yang jauh lebih besar daripada kelebihan berat badan. Hal ini karena dua hal, yaitu (a) merokok yang meningkatkan kecenderungan sel-sel darah untuk menggumpal dalam pembuluhnya dan kecenderungan ini melekat pada lapisan dalam pembuluh darah, dan (b) merokok menurunkan jumlah HDL (High Density Lipoprotein) atau “kolesterol baik”. (Anies, 2006)

Jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, pak per hari, terbagi atas 3 kelompok yaitu :

1. Perokok Ringan, apabila seseorang menghisap kurang dari 10 batang rokok per hari.
2. Perokok Sedang, apabila seseorang menghisap 10 – 20 batang rokok per hari.
3. Perokok Berat, apabila seseorang menghisap lebih dari 20 batang rokok per hari (Bustan, 2007).

Majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengundang kontroversial, yang menetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil dan meokok di tempat-tempat umum. Sebagai bentuk keteladanan, diharamkan bagi pengurus MUI untuk merokok dalam kondisi bagaimanapun. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri.

g. Minum kopi

Kafein bukan termasuk zat gizi. Tetapi karena kita terbiasa minum kopi yang banyak mengandung kafein, ada baiknya kita memperhatikan nasihat para ahli. Secangkir kopi ternyata menyebabkan naiknya tekanan darah dalam waktu singkat untuk kemudian kembali normal (Khomsan, 2010)

Konsumsi kopi yang berlebihan dalam jangka yang panjang dan jumlah yang banyak diketahui dapat meningkatkan risiko penyakit hipertensi atau kardiovaskuler. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi kafein (kopi) secara teratur sepanjang hari mempunyai tekanan darah rata-rata lebih tinggi di dibandingkan di dalam 2-

3 gelas kopi (200-250 mg) terbukti meningkatkan tekanan sistolik sebesar 3-14 mmHg dan tekanan diastolik sebesar 4-13 mmHg pada orang yang tidak mempunyai hipertensi. Mengonsumsi kafein secara teratur sepanjang hari mempunyai tekanan darah rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kalau mereka tidak mengonsumsi sama sekali. Kebiasaan minum kopi dapat meningkatkan kadar kolesterol darah dan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung.

Kebiasaan minum kopi diklasifikasikan menjadi :

1. Minum kopi ringan bila konsumsi kopi kurang dari 200 mg perhari (1-2 gelas sehari) atau kurang dari 4 sdm perhari
2. Minum kopi sedang bila konsumsi kopi 200-400 mg perhari (3-4 gelas sehari) atau konsumsi 4-8 sdm perhari.
3. Minum kopi berat bila konsumsi lebih dari 400 mg perhari (>5 sdm sehari) atau konsumsi lebih dari 8 sdm perhari.

C. Tinjauan Umum Lanjut Usia (Lansia)

Proses menua merupakan proses normal yang dimulai sejak perubahan dan berakhir pada kematian. Sepanjang hidup tubuh berada dalam keadaan dinamis, ada pembangunan dan ada kerusakan. Pada saat pertumbuhan, proses pembangunan lebih banyak daripada proses kerusakan. Setelah tubuh mencapai tingkat kedewasaan (Almatseir, 2011)

Menjadi tua (menua) merupakan suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri secara perlahan-lahan dan

mempertahankan struktur dan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Fatmah, 2010)

Secara statistik dan kependudukan di Indonesia saat ini usia 19-49 tahun tergolong dalam usia dewasa, usia 50-64 tahun tergolong dalam usia setengah tua, sedangkan usia 65 keatas tergolong dalam usia tua/lanjut (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, 2004). Namun kecepatan dalam proses menua antar orang berbeda-beda. Seseorang pada usia 50 tahun mungkin sudah kelihatan tua, sedangkan yang lain pada usia 65 tahun masih kelihatan muda. Oleh karena itu dikenal istilah umur kronologis, yaitu umur menurut tahun, dan umur biologis, yaitu umur menurut tingkat proses menua. Umur biologis yang berjalan terlalu cepat banyak dipengaruhi oleh kebiasaan makan yang kurang seimbang, kurang baiknya pemeliharaan kesehatan, serta aktivitas mental dan fisik.

Istilah menjadi tua sering dikaitkan dengan ketidak mampuan seseorang untuk berfungsi secara efisien, proses berfikir yang menurun, dan kepikunan yang sudah berada di ambang pintu. Proses menua (aging) adalah proses menghilangnya secara perlahan kemampuan jaringan tubuh untuk mempertahankan struktur dan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat bertahan terhadap benda-benda asing, termasuk mikroorganisme, dan menurunnya kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang diderita (Almatsier, 2012).

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-mu'min/40 : 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahannya :

Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, Kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), Kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahami(nya).

Dalam surah tersebut, menggambarkan proses kejadian manusia yang sangat mulia dan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia akan mengalami tiga tahap kehidupan , yaitu : masa kanak-kanak, masa dewasa dan masa tua. Di antara manusia ada yang meninggal pada masa kanak-kanak, ada yang meninggal pada masa dewasa, dan adapula yang meninggal setelah berusia lanjut.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl/16 :70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا

يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾

Terjemahannya :

“Allah menciptakan kamu, Kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan dan mematikan, dan diantara kamu ada yang disampaikan-Nya pada batas usia lanjut dari usiamu, hingga tidak mengetahui lagi sesuatu yang dahulu pernah diketahuinya (pikun). Ayat tersebut berkaitan dengan proses menua, dimana dengan bertambahnya usia, proses berfikir seseorang akan menurun.

Dengan demikian usia secara berangsur akan kehilangan daya tahan terhadap infeksi dan akan semakin banyak mengalami gangguan metabolik dan structural yang dinamakan penyakit degeneratif seperti hipertensi, aterosklerosis, diabetes mellitus dan kanker. Orang tua sering mengakhiri hidupnya dengan gejala stroke, infark miokard (gagal jantung), dan metastasis kanker (Almatsier, 2012)

a. Batasan-Batasan Lanjut Usia

1. Menurut pasal 1 ayat (2), (3), (4) UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun.

2. Menurut WHO :

- a) Usia pertengahan (middle age) : kelompok usia 45-59 tahun
- b) Lanjut usia (elderly) : kelompok usia 60-70 tahun
- c) Lanjut usia tua (old) : kelompok usia 75-90 tahun

3. Menurut Setyonegoro pengelompokan lanjut usia sebagai berikut :

- a) Usia dewasa muda : 18 atau 20-25 tahun
- b) Usia dewasa penuh : 25-60 atau 65 tahun
- c) Lanjut usia : >65 tahun atau 70 tahun
- d) Young old : 70-75 tahun
- e) Old : 75-80 tahun
- f) Very Old : >80 tahun

b. Fisiologi proses menua

Secara alami, fungsi fisiologis dalam tubuh lansia menurun seiring pertambahan usianya. Penurunan fungsi ini tentunya akan menurunkan kemampuan lansia tersebut untuk menanggapi datangnya rangsangan baik dari luar tubuh maupun dari dalam tubuh lansia itu sendiri. (Fatmah, 2010)

Beberapa sistem organ seperti otak dan saraf, kardiovaskuler dan paru-paru memegang peranan penting dalam proses menua. Pada proses menua pun terjadi perubahan kulit, rongga mulut, mata dan pendengaran (Almatsier, 2011)

1. Perubahan komposisi tubuh

Perubahan besar terjadi pada komposisi tubuh sebagai akibat proses menua. Pada proses ini terjadi penurunan massa pada lemak

(lean body mass) dan massa tulang, sedangkan massa lemak tubuh meningkat. Sebagian perubahan tersebut terjadi karena aktifitas beberapa jenis hormon yang mengatur metabolisme menurun sesuai dengan umur (seperti insulin, hormone pertumbuhan, dan endrogen) sedangkan yang lain meningkat (seperti prolaktin). Penurunan aktifitas beberapa jenis hormon ini menyebabkan penurunan massa tanpa lemak sedangkan peningkatan aktifitas hormon lainnya meningkatkan massa lemak. Hal ini bukan disebabkan karena proses menua saja. Sebagian besar disebabkan oleh menurunnya aktifitas fisik dengan bertambahnya umur yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya angka metabolisme basal (AMB). Dengan menurunnya AMB, kebutuhan energy orang tua lebih rendah dari pada usia dewasa, sehingga konsumsi makanan hendaknya dikurangi. Namun kebutuhan zat gizi mikro (mineral dan vitamin) tidak menurun pada lansia (Almatsier, 2011)

2. Perubahan kulit pada lansia

Menurut Gilchrest 1991, seperti yang telah dikutip pada buku geriatri, gambaran morfologik kulit menua dibagi menjadi empat jenis, yaitu kulit kering, permukaan kulit kasar dan bersisik, kulit kendur, dan gangguan pigmentasi pada kulit (Fatmah, 2010)

Meningkatnya kehilangan air dari permukaan kulit (epidermis) terjadi karena berkurangnya kemampuan kulit untuk menahan air sehingga kulit mengering. Disamping itu, terjadi penurunan aktifitas

kelenjar lemak. Di dalam kulit (dermis), aktifitas sel-sel yang memproduksi jaringan kolagen elastis berupa fibroblast berkurang seiring dengan berlanjutnya usia. Jaringan yang elastis ini mengerut dan melepaskan dari epidermis. Inilah yang menyebabkan mengerutnya kulit pada usia lanjut. Kapiler kulit bertambah lemah yang menyebabkan mudahnya terjadi perdarahan dibawah kulit oleh sentuhan. Fungsi imun pada sel-sel kulit berkurang, hal ini untuk sebagian menjelaskan mudahnya terjadi infeksi jamur dan tumor ganas pada lansia. Perubahan pada rambut yang terjadi pada lansia adalah rambut memutih dan mudah rontok. Rontoknya rambut pada kaki dapat menimbulkan kebutakan di tempat-tempat tertentu pada bagian kepala atau seluruh kepala. Proses menua pada kulit dapat terjadi pada usia lebih dini karena paparan sinar matahari secara kronis dan pengaruh keturunan (Almatsier, 2011).

3. Kehilangan gigi

Kehilangan gigi merupakan bagian dari proses menua. Gigi mungkin diganti dengan gigi palsu, atau tidak diganti,. Gigi palsu yang dipasang sering tidak cocok. Hal ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman sewaktu mengunyah (Almatsier, 2011).

Bagian dalam rongga mulut yang lazim terpengaruh adalah gigi, gusi dan ludah mudah tanggalnya gigi bukan hanya disebabkan oleh ketuaan tetapi juga dikondisikan oleh pemeliharaan yang tidak baik, ketidak bersihan mulut menyebabkan gigi dan gusi kerap terinfeksi

selain itu sekresi air ludah berkurang sampai kira-kira 75% sehingga mengakibatkan rongga mulut dan berkemungkinan menurunkan cita rasa (Almatsier, 2011).

4. Perubahan pada system otak dan saraf

Perubahan struktur dan biokimia pada proses menua menyebabkan perubahan pada fungsi otak. Dengan bertambahnya usia, sel-sel otak akan berkurang. Berkurangnya aliran darah ke otak sebagai akibat perubahan pembuluh darah yang mengalami aterosklerosis (penyempitan pembuluh darah) juga menyebabkan menurunnya fungsi otak. Perubahan biokimia pada otak kadang-kadang menyebabkan menurunnya pembentukan pengantar saraf (neurotransmitter) seperti dopamin, serotonin, dan asetilkolin yang dibutuhkan untuk mengirim rangsangan saraf. Penyakit lansia yang disebut penyakit Parkinson berkaitan dengan menurunnya produksi pengantar saraf dopamine. Penyakit ini disertai dengan melambatnya kemampuan bergerak (bradykinesia), tremor dan kehilangan ekspresi pada muka (Almatsier, 2011)

5. Sistem Kardiovaskular

Seiring pertambahan usia akan terjadi penurunan elastisitas dari dinding aorta. Hal ini juga disertai dengan berkembangnya kaliber aorta. Organ jantung pada lansia tidak mengalami penurunan ukuran seperti organ-organ tubuh lainnya, bahkan jantung pada lansia umumnya membesar. Perubahan secara fisiologis ini dapat terjadi pada katup-

katup jantung di mana inti sel pada sel-sel katup jantung ini berkurang dari jaringan fibrosa stroma jantung, penumpukan lipid, degenerasi kolagen, dan juga klasifikasi fibrosa jaringan katup tersebut. Ukuran katup pun bertambah dengan penambahan usia (Fatmah, 2010)

Irama inheren pada jantung menurun dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh menurunnya denyut jantung. Denyut jantung pada lansia tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan orang dewasa, walaupun pada lansia yang sering melakukan aktifitas fisik. Aritmia berupa ekstrasistol pada lansia, ditemukan lebih dari 10% pada lansia yang memeriksakan EKG-nya secara rutin. Hal yang tidak berubah pada lansia adalah fungsi sistolik pada jantung. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit utama yang memakan korban di Negara-negara maju. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem kardiovaskular antara lain hipertensi, penyakit jantung coroner, jantung pulmonik, kardiomiopati, dan sebagainya (Fatmah, 2010)

6. Sistem Ginjal

Sistem ginjal berubah pada usia lanjut yang disebabkan oleh kehilangan sel-sel dan penurunan darah ke ginjal sebesar 30%. Karena kecepatan menyaring sel-sel ginjal menurun, pengeluaran sisa metabolisme obat dan produk makanan akan berlangsung lebih lama. Dengan demikian mudah terjadi penumpukan garam dan gula dalam darah pada usia lanjut. Komposisi protein berlebihan yang menyebabkan produk sisa ureum yang tinggi, serta konsumen

suplemen vitamin larut air dosis tinggi hendaknya dihindarkan. Kemampuan ginjal pada usia lanjut untuk memekatkan urin menurun. Itulah sebabnya lansia hendaknya banyak minum (Almatsier, 2011).

7. Sistem endokrin

Proses menua banyak menyebabkan perubahan fisiologi pada sistem endokrin, namun hal ini tidak terjadi secara merata. Perubahan ini banyak terjadi sebagai akibat suatu penyakit. Hormon-hormon reproduksi menurun pada lansia. Produksi estrogen menurun pada perempuan setelah umur 40 tahun, penurunan ini semakin tajam sesudah menopause. Nilai estrogen yang rendah dihubungkan dengan rapuhnya tulang, kelemahan fisik, dan penurunan kemampuan. Penurunan testogen pada laki-laki (Almatsier, 2011)

8. Keseimbangan cairan

Keseimbangan cairan perlu diperhatikan pada lansia, dehidrasi menyebabkan peningkatan kadar natrium dan kalium darah. Hal ini merupakan alasan tambahan agar orang lansia banyak minum dan mengurangi konsumsi garam (Almatsier, 2011).

9. Fungsi saluran cerna

Kekuatan dan elastisitas saluran cerna menurun pada proses menua, hal ini memperlambat gerakan usus, sehingga resiko terhadap konstipasi meningkat (empat hingga delapan kali lebih sering terjadi pada lanjut usia daripada usia muda). Lansia sering mengalami

kontraksi pada otot laring yang menyebabkan kesukaran menelan (Almatsier, 2011).

10. Perubahan pada rongga mulut

Penurunan fungsi fisiologis pada rongga mulut akan mempengaruhi proses mekanisme makanan. Pada lansia, mulai banyak gigi yang tanggal serta terjadi kerusakan gusi karena proses degenerasi. Kedua hal ini sangat mempengaruhi proses mengunyah makanan. Lansia akan kesulitan untuk mengonsumsi makanan berkonsistensi keras. Kelenjar saliva juga mulai sukar disekresi yang mempengaruhi proses perubahan karbohidrat kompleks menjadi disakarida karena enzim ptyalin menurun. Fungsi lidah sebagai pelican pun berkurang sehingga proses menelan menjadi lebih sulit. Fungsi pengecap juga mengalami penurunan karena papilla pada ujung lidah berkurang, terutama untuk rasa asam, sehingga lansia cenderung memakan makanan asam. Sebaliknya, asupan gizi juga berpengaruh pada penurunan fungsi fisiologis di rongga mulut. Kekurangan protein sering dikaitkan dengan degenerasi jaringan ikat gingiva, membrane periodontal, dan mukosa pendukung basis gigi tiruan. (Fatmah, 2010)

11. Perubahan pada mata

Pada lansia telah terjadi penurunan kemampuan penglihatan atau degenerasi jaringan di dalam bola mata. Perubahan kemampuan ini berhubungan dengan perubahan struktur jaringan dalam bola mata yang meliputi perubahan pada lensa mata, iris, pupil, badan kaca, dan

juga retina. Penurunan kemampuan pada organ mata lansia dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit pada organ mata mereka, seperti katarak, glaukoma, *age-related macular degeneration*, degenerasi retina senilis, dan degenerasi retina perifer. (Fatmah, 2010).

12. Pendengaran

Gangguan pendengaran pada lansia meliputi kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh gangguan fungsi telinga bagian dalam dan atau hubungan antar saraf pendengaran yang ada di dekat atau di dalam otak. Gangguan pendengaran pada lansia dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keturunan, terkena bising, penyakit telinga kronis, dan aterosklerosis. Namun usia tidak menentukan kecepatan penurunan pendengaran (Almatsier, 2011).

13. Perubahan psikologis

Orang tua sering mengalami depresi atau rasa tertekan karena merasa kesepian, kurang berharga, atau karena kurangnya penghasilan yang sering disertai dengan hilangnya nafsu makan dan motifasi untuk menyiapkan makanan. Depresi seperti ini lebih banyak terjadi pada orang lanjut usia yang hidup sendiri atau tinggal di institusi di panti jompo (Almatsier, 2011)

c. Kebutuhan gizi pada lanjut usia

Angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan adalah banyaknya tiap-tiap zat gizi esensial yang harus dipenuhi dari makanan sehari-hari untuk mencegah defisiensi zat gizi. AKG dipengaruhi oleh usia, jenis

kelamin, berat badan, aktifitas fisik, dan keadaan fisiologis seperti hamil dan menyusui. Angka kebutuhan gizi adalah banyaknya zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adekuat. (Fatmah, 2010).

Pada prinsipnya zat gizi dibutuhkan oleh lansia sama seperti usia muda yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat dalam jumlah seimbang yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lansia. Konsumsi makanan yang cukup dan seimbang bermanfaat bagi lansia untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan penyakit degeneratif serta kemungkinan kurang gizi.

Bagi lansia pemenuhan kebutuhan gizi yang diberikan dengan baik dapat membantu dalam proses beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang dialaminya selain itu dapat menjaga kelangsungan pergantian sel-sel tubuh sehingga dapat memperpanjang usia. Kebutuhan kalori pada lansia berkurang karena berkurangnya kalori dasar dari kebutuhan fisik. Kalori dasar adalah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tubuh dalam keadaan istirahat, misalnya : untuk jantung, usus, pernafasan dan ginjal (Properawati, 2011)

Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh lansia untuk mendapatkan kehidupan yang adekuat. Namun tidak biasa dihindarkan proses penuaan yang terjadi di mana terjadi penurunan fungsi. Lansia memerlukan tambahan protein yaitu 1,-1,25 g/kg perhari. Kebutuhan zat besi pada lansia sangat rendah atau bahkan mengalami penurunan sehubungan

dengan proses penuaan. Rekomendasi diet yang dianjurkan untuk zat besi ada wanita turun 15 mg pada usia 23-50 tahun sampai 10 mg pada umur 51 tahun atau lebih. Selain itu lansia juga memiliki resiko terkena defisiensi kalsium karena penurunan asupan dan absorsinya. Untuk kebutuhan megnesium lansia mengalami penurunan absorpsi dan meningkatkan eksresi lewat perkemihan. (Properawati, 2011).

Menurut Departemen Kesehatan RI (2003) Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap individu akan berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing pada umumnya dihitung berdasarkan kebutuhan kalori atau energi, sebagai berikut :

a. Energi

Menurut Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 1998, secara umum kecukupan gizi yang dianjurkan untuk lansia (>60 tahun) pada laki-laki adalah 2200 kalori dan pada wanita adalah 1850 kalori. Kebutuhan energi pada lansia menurun sehubungan dengan penurunan metabolisme basal (sel-sel banyak inaktif) dan kegiatan fisik cenderung menurun. Kebutuhan kalori akan menurun sekitar 5% pada usia 40-49 tahun dan 10% pada usia 50-69 tahun.

b. Protein

Kecukupan protein sehari yang dianjurkan pada lansia adalah sekitar 0,8 gram/kg BB atau 15-25 % dari kebutuhan energi. Untuk lansia dianjurkan memenuhi kebutuhan protein terutama dari protein nabati dan protein hewani dengan perbandingan 2:1.

Jumlah protein yang diperlukan untuk laki-laki lansia adalah 55 gram/hari dan wanita 48 gram/hari yang terdiri 15% protein ikan, 10% protein hewani lain dan 75% protein nabati.

c. Lemak

Karena total kebutuhan energi telan menurun saat seseorang berada di atas usia 40 tahun, maka dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan berlemak terutama lemak hewani yang kaya akan asam lemak jenuh dan kolesterol. Lemak nabati umumnya tidak berbahaya karena banyak mengandung asam lemak tak jenuh, asam lemak tak jenuh tunggal, dan asam lemak tak jenuh ganda, masing-masing dapat berkontribusi sebesar 10%.

d. Karbohidrat

Untuk lansia dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks karena mengandung vitamin, mineral, dan serat daripada mengonsumsi karbohidrat murni seperti gula. Dianjurkan pada lansia mengonsumsi 60-65% karbohidrat sebagai kebutuhan energi

e. Vitamin

Untuk lansia dianjurkan untuk meningkatkan konsumsi makanan kaya vitamin A, D, dan E untuk mencegah penyakit degeneratif (sebagai antioksidan). Selain itu konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B₁₂, asam folat, vitamin B₁ dan vitamin C juga dianjurkan untuk mencegah resiko penyakit jantung.

f. Mineral

Secara umum terdapat 3 fungsi mineral dalam tubuh yaitu: (1) sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi metabolik. (2) bagian dari senyawa yang mengandung zat organik seperti enzim, hormon dan unsur tertentu dalam darah, dan (3) sebagai ion yang memungkinkan peregrakan zat membran sel darah dan pergerakan otot. Walaupun mineral mempunyai fungsi sangat penting, tetapi secara keseluruhan beratnya hanya sekitar 4% berat badan.

Pada dasarnya kebutuhan gizi orang lanjut usia hampir sama dengan kebutuhan gizi orang dewasa, tetapi sedikit berbeda dalam hal kuantitas atau jumlahnya. Dianjurkan bagi lansia mengikuti pola makan tertentu untuk menjaga kesehatannya yaitu 50% karbohidrat, 20% protein, 20-30% lemak. Dianjurkan pula makan sesuai dengan pedoman empat sehat lima sempurna sebagaimana yang telah kita kenal selama ini, yaitu nasi atau sumber karbohidrat lainnya, laik-pauk, sayuran, buah-buahan, dan disempurnakan dengan minum susu.

Unsur gizi yang perlu memperoleh perhatian khusus adalah vitamin dan mineral. Konsumsinya yang memadai mempunyai dampak anti penuaan. Bila konsumsi secara teratur, maka selain memperbaiki dan mempertahankan fungsi enzim, mineral juga mempunyai efek antioksidan, melawan kerusakan akibat radikal bebas dari dalam tubuh, serta mengurangi pengaruh penuaan karena radikal bebas pada sel.

Beberapa jenis mineral yang menunjang kebugaran di usia lanjut dan mempunyai efek anti-penuaan adalah kalsium (Ca), zat besi (Fe), Zinc (Zn), selenium (Se), magnesium (Mg), Kromium (Cr), dan kalium (K).

g. Air dan Serat.

Air sangat penting untuk proses metabolisme dan mengeluarkan sisa pembakaran tubuh. Selain itu serat juga dianjurkan untuk lansia agar buang air besar menjadi lancar.

Tabel 2.2
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Untuk Lansia (WNPG, 2004)

Zat Gizi	Pria (berat badan = 62 kg)	Wanita (berat badan = 54 kg)
Energi (kkal)	2050	1600
Protein (g)	60	45
Vitamin A (RE)	600	500
Vitamin D (g)	15	15
Vitamin E (mg)	15	15
Vitamin K (mg)	65	55
Tiamin (mg)	1,0	0,8
Riboflavin (mg)	1,3	1,1
Niasin (mg)	1,6	1,4
Vitamin B ₁₂ (mg)	2,4	2,4
Asam folat (g)	400	400
Piridoksin (mg)	1,7	1,5
Vitamin C (mg)	90	75
Kalsium (mg)	800	800
Fosfor (mg)	600	600
Besi (mg)	13	12
Zinc (mg)	13,4	9,8
Iodium (g)	150	150
Selenium (g)	30	30

D. Hipertensi Pada Lansia

Pranaka (2006) dalam kristian (2006), menyatakan prevalensi pada populasi lanjut usia sangat tinggi merupakan faktor risiko kardiovaskuler yang utama. Hipertensi merupakan masalah kronik yang paling dapat dikendalikan, tetapi karena sering tidak ada keluhan, sepertiga dari penderita tidak menyadari bahwa mereka terkena hipertensi.

Usia lanjut membawa konsekuensi meningkatnya berbagai penyakit kardiovaskular, infeksi dan gagal jantung. TDS (tekanan darah siastolik) meningkat sesuai dengan peningkatan usia, akan tetapi TDD (tekanan darah diastolik) meningkat seiring dengan TDS sampai sekitar usia 55 tahun, yang kemudian menurun oleh karena kekakuan arteri akibat ateroklerosis. Di Negara maju saat ini tekanan darah yang terkontrol (TDS <140, TDD <90 mmHg) hanya terdapat 20% pasien hipertensi. Keberhasilan pengobatan yang rendah pada usia lanjut diakibatkan juga oleh karena banyak dokter tidak mengobati hipertensi usia lanjut sampai optimal (kurang dari 140/90). Pada usia lanjut, prevalensi gagal jantung dan stroke tinggi, yang keduanya merupakan akibat dari hipertensi. Oleh karena itu pengobatan hipertensi penting sekali dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas kardiovaskular (Rinawang, 2011).

Telah diperhitungkan bahwa seorang pria berusia 55 tahun dengan tekanan darah sistolik 160 mmHg, mempunyai risiko masalah vascular dalam 10 tahun mendatang sekitar 14%. Baik pria maupun wanita hidup lebih lama dan 50% dari mereka yang berusia di atas 60 tahun akan menderita hipertensi

sistolik terisolasi (TDS 160 mmHg dan diastolik 90 mmHg). Dengan menurunkan tekanan darah telah terbukti mengurangi insiden gagal jantung, mengurangi demensia, dan dapat membantu mempertahankan fungsi kognitif (Gray, 2005).

a. Hipertensi sistolik terisolasi

Hipertensi sistolik terisolasi ditandai dengan peningkatan progresif dari tekanan sistolik, disertai penurunan tekanan diastolik. Hipertensi sistolik merupakan tipe hipertensi yang paling sering dijumpai pada usia lanjut.

Dokter spesialis penyakit dalam khusus penyakit geriatri, Kris Pranaka (2006) juga menyatakan bahwa hipertensi sistolik sebagai jenis hipertensi yang paling sering pada usia lanjut, jelas menunjukkan menjadi penyebab yang penting dari morbiditas dan mortalitas penyakit-penyakit arteri koronaria, gagal jantung kongestif, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Penelitian-penelitian juga menunjukkan pentingnya tekanan nadi (tekanan sistolik dikurangi tekanan diastolik) sebagai prediktor untuk terjadinya masalah kardiovaskuler. Makin besar tekanan nadi ini antara lain dapat meramalkan risiko untuk terjadinya gagal jantung kongestif.

Data prospektif dari studi Framingham menunjukkan penderita dengan hipertensi sistolik mempunyai kemungkinan 4 kali terjadinya stroke dibandingkan dengan tekanan darah normal. Hipertensi sistolik juga sering menyebabkan lesi pada substansia alba pada daerah

sub kortikal yang dapat menurunkan fungsi kognitif, risiko demensia tipe vaskuler meningkat lebih banyak pada hipertensi sistolik.

b. Penatalaksanaan hipertensi pada lansia

Penatalaksanaan hipertensi hendaknya dimulai dengan memperbaiki gaya hidup, yaitu dengan mengatur diet (makanan rendah garam dan mempertahankan berat badan dalam batas-batas normal), latihan jasmani yang teratur sepanjang tidak bertentangan dengan keadaan atau penyakit yang dialami penderita, menghentikan kebiasaan merokok dan alkohol. Jika hal-hal tersebut berhasil didalam mengontrol tekanan darah maka mungkin tidak memerlukan obat-obat anti hipertensi ataupun hanya membutuhkan obat-obatan dengan dosis minimal, sedangkan jika memperbaiki gaya hidup yang dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama tidak berhasil maka obat anti hipertensi yang sesuai perlu diberikan. Selain daripada itu, pada mereka yang telah didapati komplikasi-komplikasi maka pemberian obat anti hipertensi perlu segera dimulai.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel

Kerangka konsep merupakan penyederhanaan dari kerangka teori. Dalam pelaksanaan penelitian berdasarkan kerangka teori yang ada, peneliti memilih beberapa faktor risiko yang fisibel (dapat diukur) untuk diteliti sebagai variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah hipertensi lansia, sedangkan variabel independennya adalah jenis kelamin, asupan karbohidrat, protein, lemak, natrium, kebiasaan merokok, dan kebiasaan minum kopi.

a. Jenis kelamin

Jenis kelamin adalah Faktor gender berpengaruh pada terjadinya hipertensi, dimana wanita setelah memasuki menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat.

b. Asupan Karbohidrat

Sumber karbohidrat seperti roti, biskuit, dan kue mengandung natrium yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat memicu terjadinya hipertensi.

c. Asupan Protein

Ada beberapa sumber protein hewani dan sumber protein nabati yang diawetkan atau dimasak dengan garam dapur atau ikatan natrium lainnya, yang dapat memicu terjadinya tekanan darah tinggi.

d. Asupan lemak

Sering mengonsumsi lemak jenuh mempunyai risiko untuk terserang hipertensi sebesar 7,72 kali dibandingkan orang yang tidak biasa mengonsumsi lemak jenuh.

e. Asupan natrium (Na)

Konsumsi natrium yang berlebih menyebabkan konsentrasi natrium di dalam cairan ekstraseluler

meningkat. Untuk menormalkannya cairan intraseluler ditarik ke luar, sehingga volume cairan ekstraseluler meningkat. Meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan meningkatnya volume darah, sehingga berdampak kepada timbulnya hipertensi.

f. Kebiasaan merokok


Zat-zat kimia beracun, seperti nikotin dan karbonmonoksida yang diisap melalui rokok, yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan proses arterosklerosis, dan tekanan darah tinggi

g. Kebiasaan minum kopi

Kopi merupakan salah-satu minuman yang banyak digemari oleh orang. Kopi dapat mengakibatkan pembuluh darah menyempit akibat diblokirnya efek hormone adenosin, hormon ini dapat membuat pembuluh darah tetap melebar, dan dapat merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan

lebih banyak kortisol dan adrenalin yang dapat membuat pembuluh darah menyempit dan memaksa jantung bekerja lebih keras.

B. Kerangka Konsep



Keterangan:

- : Variabel Independen
- : Variabel Dependen
- : Variabel Yang diteliti
- - - - - : Variabel Yang Tidak Diteliti

C. Definisi Operasional

a. Hipertensi

Hipertensi pada penelitian ini adalah keadaan dimana tekanan darah melebihi batas normal.

Kriteria Objektif :

Hipertensi : Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah \geq 140/90 mmHg

Tidak Hipertensi : Apabila hasil pemeriksaan tekanan darah $<$ 140/90 mmHg

b. Asupan Makanan

1. Karbohidrat

Yang dimaksud dengan karbohidrat pada penelitian ini adalah tingkat asupan karbohidrat yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh dengan menggunakan *recall 24 jam*.

Kriteria Objektif

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat $<$ 80%

Cukup : Bila konsumsi karbohidrat 80-100%

Tinggi : Bila konsumsi karbohidrat $>$ 100%

2. Protein

Yang dimaksud dengan protein pada penelitian ini adalah tingkat asupan protein yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh dengan menggunakan *recall 24 jam*.

Kriteria Objektif

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80%

Cukup : Bila konsumsi protein 80-100%

Tinggi : Bila konsumsi protein > 100%

3. Lemak

Yang dimaksud dengan lemak pada penelitian ini adalah tingkat asupan lemak yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh dengan menggunakan *recall 24 jam*.

Kriteria Objektif :

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80%

Cukup : bila asupan lemak 80-100%

Tinggi : bila asupan lemak > 100%

4. Natrium

Yang dimaksud dengan Natrium pada penelitian ini adalah tingkat asupan garam/natrium yang dikonsumsi responden perharinya yang diperoleh dengan menggunakan *recall 24 jam*.

Kriteria Objektif :

Kurang : Bila konsumsi karbohidrat < 80%

Cukup : apabila responden mengkonsumsi garam/nutrium 80-100%

Tinggi : apabila responden mengkonsumsi garam/nutrium > 100%

c. Kebiasaan Merokok

Yang dimaksud dengan kebiasaan merokok pada penelitian ini adalah Kebiasaan merokok yang diperoleh dari kuesioner terpimpin.

Kriteria objektif.

Perokok ringan : Jika responden merokok < 10 batang/hari

Perokok sedang : Jika responden merokok 10-20 batang/hari

Perokok berat : Jika responden merokok > 20 batang/hari

d. Kebiasaan minum kopi

Kebiasaan responden minum kopi yang di dapat dari kuesioner terpimpin.

Kriteria Objektif .

Ringan : Jika responden minum kopi 1-2 gelas/hari


Sedang : Jika responden minum kopi 3-4 gelas/hri

Berat : Jika responden minum kopi ≥ 5 gelas/hari

D. Hipotesis Penelitian

- a. Terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.
- b. Terdapat hubungan antara karbohidrat dengan kejadian hipertensi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa
- c. Terdapat hubungan antara konsumsi protein dengan kejadian hipertensi pada lansia di Panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

- d. Terdapat hubungan antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi pada lansia di panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa
- e. Terdapat hubungan antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia di Panti sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.
- f. Terdapat hubungan antara merokok dengan kejadian hipertensi pada lansia di panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.
- g. Terdapat hubungan antara kebiasaan minum kopi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *observasional* dengan pendekatan *cross sectional study*, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variable dependen (Hipertensi lansia) dan variable independen (jenis kelamin, asupan karbohidrat, protein, lemak, natrium, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum kopi).

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Panti Sosial Tresna Wredha Gau Mabaji Kab. Gowa pada bulan Juni 2013.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia dengan di Panti Tresna Wredha Gau Mabaji Gowa sebanyak 100 lansia.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang di ambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Soekidjo Notoatmodjo, 2005).

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*, yang penarikan sampelnya dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.

Adapun kriteria responden adalah sebagai berikut :

1. Berusia di atas 60 tahun
2. Bersedia di jadikan responden
3. Mampu berbahasa Indonesia
4. Mampu berkomunikasi dengan baik.

Dari kriteria di atas, maka jumlah sampel yang diteliti sebanyak 40 lansia.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data (Soekidjo Notoatmodjo, 2005). Instrument penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Alat pengukur tekanan darah (Sphymomanometer) dan stetoskop.
- b. Kuesioner, yang berisi sejumlah pertanyaan mengenai jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan kebiasaan minum kopi.
- c. Formulir Recall, yang digunakan untuk mengetahui tingkat konsumsi natrium, kalium, dan lemak.

E. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri dari :

1. Data tekanan darah/Hipertensi, diperoleh dengan menggunakan alat *spyghmomanometer* air raksa dan stetoskop sesuai prosedur pengukuran tekanan darah yang benar.
2. Data konsumsi natrium, kalium, lemak dan magnesium diperoleh dengan menggunakan Formulir Racall.
3. Data jenis kelamin, kebiasaan merokok dan kebiasaan minum kopi diperoleh dari wawancara terstruktur dengan bantuan kuesioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari Panti Sosial Tresna werdha.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 16,0 (*Statistical Product and Service Solution*) melalui tahapan *editing*, *coding*, *entry data* dan *cleaning*. Jenis analisis yang dilakukan adalah :

a. Analisis Univariat

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran distribusi frekuensi atau besarnya proporsi berdasarkan variabel yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variable independen (bebas) dengan variable dependen (terikat) dengan menghitung rasio prevalensi (Riyanto, 2011). Analisis ini dilakukan dengan menggunakan uji *Chi Square*. Dasar pengambilan keputusan

penerimaan hipotesis berdasarkan tingkat signifikan (nilai $\alpha = 0,05$) sebesar 95%:

1. H_0 ditolak jika nilai ($p < 0,05$), berarti ada hubungan yang bermakna.
2. H_0 diterima jika nilai ($p > 0,05$), berarti tidak ada hubungan yang bermakna.

c. Tabel Kontigensi

Analisis ini merupakan teknik penyusunan data yang cukup sederhana untuk melihat hubungan antara beberapa variabel dalam satu tabel. Variabel yang dianalisis merupakan variabel kategorikal, yang memiliki skala nominal atau ordinal.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Pendirian

Berdasarkan amanat UUD 1945 pasal 34 maka pada tahun 1968 melalui SK Mensos RI No.HUK 3-1-50/107 tentang pemberian penghidupan santunan lanjut usia/jompo, didirikan pusat penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) termasuk dalam hal ini adalah lanjut usia yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 400 C Rk.II Lingk.Sambung Jawa Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Pada tahun 1977, untuk lebih memudahkan penanganan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para lanjut usia, maka dibangun Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji yang berlokasi Jl. Jurusan Malino Km.29 Samaya Desa Romangloe, Kec. Bontomarannwu, Kab. Gowa.

Panti Sosial Tresna Werdha "Gau Mabaji" yang dalam bahasa Makassar memiliki arti "Perbuatan yang Baik" adalah Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan Departemen Sosial RI yang bertanggung jawab dibawah Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sehari-hari secara fungsional dibina oleh Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia sesuai dengan bidang tugasnya.

PSTW Gau Mabaji Gowa memiliki 39 orang pegawai negeri sipil yang terdiri dari 20 orang perempuan dan 19 orang pria, dan terdiri dari 17 orang tenaga honorer.

b. Visi, Misi dan Motto

1) Visi

Mewujudkan PSTW Gau Mabaji Gowa sebagai Pusat Pelayanan Lansia dengan standar pelayanan sosial maksimum

2) Misi

- a) Meningkatkan pelayanan sosial bagi lanjut usia baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
- b) Menggali serta mengembangkan potensi lansia yang diarahkan pada pengisian waktu luang guna mempertahankan fungsi kognitif, afektif dan psikomotorik, membangun citra diri positif, penerimaan diri, kebermaknaan hidup, serta interaksi sosial lansia.
- c) Menjamin terwujudnya perlindungan sosial bagi lanjut usia terutama di dalam panti
- d) Memberdayakan lansia dan/keluarga agar dapat memberikan pelayanan, perawatan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia yang mendapatkan pelayanan dalam rumah.
- e) Meningkatkan profesionalisme pelayanan, manajemen dan administrasi melalui peningkatan Mutu SDM serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

f) Menjadikan panti sebagai pusat pengembangan ilmu gerontik.

3) Motto

Profesional, Transparan dan Akuntabel

c. Sarana

1) Sarana yang dimiliki oleh PSTW Gau Mabaji Gowa antara lain :

Kantor, Asrama Klien Reguler (12 buah), Asrama VIP Subsidi Silang (2 buah), Poliklinik, Aula, Ruang Case Conference, Wisma Tamu (2 buah), Ruang Pameran, Perpustakaan, Gedung Keterampilan (2 buah), Mesjid, Instalasi Penjernihan Air, Dapur, Gudang, Rumah Dinas, Jalan dan Jembatan, dan lain sebagainya untuk menunjang.

2) Fasilitas Asrama Reguler :

Kamar Tidur kapasitas 2 orang (5 kamar), Tempat Tidur 10 buah, Lemari klien 10 buah, Kamar Mandi 2 buah, Kursi Tamu/Sofa 1 Set, Meja Makan Kayu 1 set, Dispenser, Kipas Angin Gantung dan Stand, TV Berwarna 21 inchi, Radio

3) Fasilitas Asrama Subsidi Silang (Asrama Vip Sakura)

Kamar Tidur dengan AC kapasitas 2 orang (5 kamar), Kasur spring bed susun (5 set), Lemari Kayu Mahoni (5 buah), Kamar mandi dengan shower per Ruangan (5 kamar mandi), Dapur, Toilet Duduk, Sofa Tamu , Meja Makan (6 set), TV berwarna 29 inchi,

DVD Player, Meja Seterika dan Seterika (1 set), Dispenser, Kipas Angin Stand, Meja Receptionist, Mesin Cuci (1 buah)

4) Fasilitas Asrama Subsidi Silang (Asrama Vip Cempaka)

Kamar Tidur dengan AC kapasitas 1 orang (4 kamar), Kamar Tidur pendamping klien (1 kamar), Kasur spring bed susun (5 set), Lemari Kayu Agatis (5 buah), Kamar mandi per Ruangan dengan shower (5 kamar), Toilet Duduk, Meja Makan (5 set), TV berwarna 14 inci, Dispenser, Kipas Angin Stand, Meja Receptionist, Lampu tidur.

2. Karakteristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Jenis Kelamin	n	%
Laki-laki	18	45
Perempuan	22	55
Total	40	100.0

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 18 lansia (45%) berjenis kelamin laki-laki dan 22 lansia (55%) berjenis kelamin perempuan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada lansia yang berjenis kelamin laki-laki.

b. Umur Responden

Tabel 5.2
Distibusi Frekuensi Umur pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Kelompok Umur	n	%
60-74 tahun	15	37,5
75-90 tahun	25	62,5
Total	40	100.0

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.2 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 15 lansia (37,5%) yang berada pada kelompok umur 60-74 tahun, 25 lansia (62,5%) yang berada pada kelompok umur 75-90 tahun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kelompok umur 75-90 tahun lebih banyak daripada lansia yang berada pada kelompok umur 60-74 tahun.

3. Analisis Univariat

a. Kejadian Hipertensi

Tabel 5.3
Distibusi Frekuensi Kejadian Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Kejadian Hipertensi	n	%
Hipertensi	24	60
Tidak Hipertensi	16	40
Total	40	100.0

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 24 lansia (60%) menderita hipertensi dan sebanyak 16 lansia (40%) tidak

hipertensi. Hasil tersebut menunjukkan lansia yang menderita hipertensi lebih banyak daripada lansia yang tidak menderita hipertensi.

b. Asupan Karbohidrat

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi Asupan Karbohidrat pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Karbohidrat	n	%
Kurang	12	30
Cukup	13	32,5
Tinggi	15	37,5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 12 lansia (30%) yang asupan karbohidratnya kurang, 13 lansia (32,5%) asupan karbohidratnya cukup, dan 15 lansia (35,0%) asupan karbohidratnya tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan karbohidratnya tinggi lebih banyak daripada yang asupan karbohidratnya kurang dan cukup.

c. Asupan Protein

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi Asupan Protein pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Protein	n	%
Kurang	20	50
Cukup	18	45
Tinggi	2	5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 20 lansia (50%) yang asupan protein kurang, 18 lansia (45%) yang asupan protein cukup, dan 2 lansia (5%) yang asupan protein tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan protein kurang lebih banyak daripada asupan protein cukup dan tinggi.

d. Asupan Lemak

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi Asupan Lemak pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Lemak	n	%
Kurang	8	20
Cukup	7	17,5
Tinggi	25	62,5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 8 lansia (20%) yang asupan lemaknya kurang, 7 lansia (17,5%) asupan lemaknya cukup, dan 25 lansia (62,5%) yang asupan lemaknya tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan lemaknya tinggi lebih banyak daripada asupan lemaknya kurang dan cukup.

e. Asupan Natrium

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Asupan Natrium pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Natrium	n	%
Kurang	8	20
Cukup	7	17,5
Tinggi	25	62.5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 8 lansia (20%) yang asupan natriumnya kurang, 7 lansia (17,5%) asupan natriumnya cukup, dan 25 lansia (62,5%) yang asupan natriumnya tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang asupan natriumnya tinggi lebih banyak daripada asupan natriumnya kurang dan cukup.

f. Kebiasaan Merokok

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Kebiasaan Merokok pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Kebiasaan Merokok	n	%
Merokok	15	37,5
Tidak Merokok	25	62,5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 15 lansia (37,5%) yang merokok, 25 lansia (62,5%) yang tidak merokok. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang tidak merokok lebih banyak daripada lansia yang merokok.

g. Kategori merokok

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi Kategori Merokok pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Merokok	n	%
Ringan	2	13,3
Sedang	10	66,7
Berat	3	20
Total	15	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.9 diketahui bahwa dari 15 lansia yang merokok, sebanyak 2 lansia (13,3%) berada pada kategori perokok ringan, 10 lansia (66,7%) berada pada kategori perokok sedang, dan 3 lansia

(20%) berada pada kategori perokok berat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kategori perokok sedang lebih banyak daripada proporsi lansia yang berada pada kategori perokok ringan dan perokok berat.

h. Kebiasaan Minum Kopi

Tabel 5.10
Distibusi Frekuensi Kebiasaan Minum Kopi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Kebiasaan minum kopi	n	%
Minum	27	67,5
Tidak Minum	13	32,5
Total	40	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.10 diketahui bahwa dari 40 lansia sebanyak 27 lansia (67,5%) yang minum kopi, 13 lansia (32,5%) yang tidak minum kopi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang minum kopi lebih banyak daripada lansia yang tidak minum kopi.

i. Kategori Minum Kopi

Tabel 5.11
Distribusi Frekuensi Kategori Minum Kopi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Minum Kopi	n	%
Ringan	16	59,3
Sedang	9	33,3
Berat	2	7,4
Total	27	100

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.11 diketahui bahwa dari 27 lansia yang minum kopi, sebanyak 16 lansia (59,3%) berada pada kategori peminum kopi ringan, 9 lansia (33,3%) berada pada kategori peminum kopi sedang, dan 2 lansia (7,4%) berada pada kategori peminum kopi berat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa lansia yang berada pada kategori peminum kopi ringan lebih banyak daripada proporsi lansia yang berada pada kategori peminum kopi sedang dan berat.

4. Analisis Bivariat

a. Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi

Tabel 5.12
Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Jenis Kelamin	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	n	%			
Laki-laki	15	83,3	3	16,7	18	100	0.62
Perempuan	9	40,9	13	59,1	22	100	
Total	24	60	16	40	40	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.12, hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi diperoleh bahwa diantara 18 lansia yang berjenis kelamin laki-laki, terdapat 15 lansia (83,3%) yang menderita hipertensi. Sedangkan diantara 22 lansia yang berjenis kelamin perempuan, terdapat 9 lansia (40,9%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,62. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi pada lanjut usia.

b. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi

Tabel 5.13
Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Karbohidrat	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	7	58,3	5	41,7	12	100	0,659
Cukup	7	53,8	6	46,2	13	100	
Tinggi	10	66,7	5	33,3	15	100	
Total	24	60	16	40	40	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.13, hasil analisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 12 lansia yang asupan karbohidratnya kurang terdapat 7 lansia (58,3%) yang menderita hipertensi, diantara 13 lansia yang asupan karbohidratnya cukup terdapat 7

lansia (53,8%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 15 lansia yang asupan karbohidratnya tinggi terdapat 10 lansia (66,7%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,659. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan karbohidrat dengan hipertensi pada lanjut usia.

c. Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi

Tabel 5.14
Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Protein	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi				
	n	%	n	%	n	%	
Kurang	14	70	6	30	20	100	0.140
Cukup	10	55,6	8	44,4	18	100	
Tinggi	0	0	2	100	2	100	
Total	24	60	16	40	40	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.14, hasil analisis asupan protein dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 20 lansia yang asupan proteinnya kurang terdapat 14 lansia (70%) yang menderita hipertensi, diantara 18 lansia yang asupan proteinnya cukup terdapat 10 lansia (55,6%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 2 lansia yang asupan proteinnya tinggi tidak terdapat lansia yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan protein dengan hipertensi pada lanjut usia.

d. Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi

Tabel 5.15
Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Lemak	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi				
	n	%	n	%	n	%	
Kurang	0	0	8	100	8	100	0.00
Cukup	1	14,3	6	85,7	7	100	
Tinggi	23	92	2	8	25	100	
Total	24	60	16	40	40	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.15, hasil analisis hubungan antara asupan lemak dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 7 lansia yang asupan lemaknya cukup terdapat 1 lansia (14,3%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 25 lansia yang asupan lemaknya tinggi terdapat 23 lansia (92%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan lemak dengan hipertensi pada lanjut usia.

e. Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi

Tabel 5.16
Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Asupan Natrium	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi				
	n	%	n	%	n	%	
Kurang	1	12,5	7	87,5	8	100	0.00
Cukup	2	28,6	5	71,4	7	100	
Tinggi	21	84	4	16	25	100	
Total	24	60	16	40	40	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.16, hasil analisis hubungan antara asupan natrium dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 8 lansia yang asupan natriumnya kurang terdapat 1 lansia (12,5%) yang menderita hipertensi, diantara 7 lansia yang asupan natriumnya cukup terdapat 2 lansia (28,6%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 25 lansia yang asupan natriumnya tinggi terdapat 21 lansia (84%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara asupan natrium dengan hipertensi pada lanjut usia.

f. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi

Tabel 5.17
Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Kebiasaan Merokok	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		N	%	
	n	%	n	%			
Ringan	2	100	0	0	2	100	0,01
Sedang	8	80	2	20	10	100	
Berat	3	100	0	0	3	100	
Total	13	86,7	2	13,3	15	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.17, hasil analisis hubungan antara kebiasaan merokok dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 2 lansia yang perokok ringan terdapat 2 lansia (100%) yang menderita hipertensi, diantara 10 lansia yang perokok sedang terdapat 8 lansia (80%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 3 lansia yang perokok berat terdapat 3 (100%) lansia yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan hipertensi pada lanjut usia.

g. Hubungan Minum Kopi dengan Hipertensi

Tabel 5.18
Hubungan Kebiasaan Minum Kopi dengan Hipertensi pada Lansia
di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa Tahun 2013

Minum Kopi	Hipertensi				Total		P-Value
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	n	%			
Ringan	13	86,7	2	13,3	15	100	0.00
Sedang	7	87,5	1	12,5	8	100	
Berat	2	100	0	0	2	100	
Total	22	88	3	12	25	100	

Sumber: *Data Primer, 2013*

Berdasarkan tabel 5.18, hasil analisis hubungan antara kebiasaan minum kopi dengan hipertensi, diperoleh bahwa diantara 15 lansia yang peminum kopi ringan terdapat 13 lansia (86,7%) yang menderita hipertensi, diantara 8 lansia yang peminum kopi sedang terdapat 7 lansia (87,5%) yang menderita hipertensi, sedangkan diantara 2 lansia yang peminum kopi berat terdapat 2 lansia (100%) yang menderita hipertensi. Dari hasil uji statistik diperoleh nilai *P value* sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara kebiasaan minum kopi dengan hipertensi pada lanjut usia.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Jenis Kelamin dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

Menurut Depkes (2006) dalam Gray (2005), hipertensi lebih banyak didapatkan pada laki-laki dibandingkan perempuan, karena laki-laki memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah dibanding wanita, seperti merokok. Namun setelah memasuki masa menopause, prevalensi hipertensi pada wanita meningkat.

Menurut Kumar (2005) dalam Rinawang (2011), wanita yang belum mengalami menopause dilindungi oleh hormon estrogen yang berperan meningkatkan kadar *High Density Lipoprotein* (HDL) sehingga mencegah terbentuknya aterosklerosis. Sebelum memasuki masa menopause, wanita mulai kehilangan hormon estrogen sedikit demi sedikit dan sampai masanya hormon estrogen harus mengalami perubahan sesuai dengan umur wanita, yaitu dimulai sekitar umur 45-55 tahun.

Hasil analisis univariat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa lansia berjenis kelamin perempuan lebih banyak (53,5%) dibandingkan dengan lansia berjenis kelamin laki-laki (46,5%). Selain itu diketahui pula bahwa lansia yang jenis kelamin laki-laki lebih banyak menderita hipertensi.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh tidak terdapatnya hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi pada lansia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rinawang (2011) diketahui

bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Yuliarti (2007). Dengan kata lain, hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kejadian hipertensi dengan jenis kelamin.

Menurut Kumar (2005) dalam Rinawang (2011), hal tersebut diasumsikan oleh telah menebalnya dinding arteri akibat dari akumulasi menumpuknya zat kolagen pada lapisan otot selama bertahun-tahun, yang berdampak pada penyempitan dan pengerasan pembuluh darah. Selain itu, dapat pula disebabkan oleh penurunan refleksi baroreseptor dan fungsi ginjal. Sehingga hal-hal tersebut dapat memicu timbulnya hipertensi tanpa memandang jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan (Kumar, *et all*, 2005).

Price dan Wilson (2002) menambahkan bahwa penyebab hipertensi dapat disebabkan pula oleh penurunan elastisitas pembuluh darah sehingga pembuluh darah menjadi kaku. Pembuluh darah tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengembang pada saat jantung memompa darah melalui pembuluh darah tersebut. Sehingga jantung harus meningkatkan denyutnya pada pembuluh darah yang menyempit agar aliran darah dapat didistribusikan keseluruh tubuh. Hal ini menyebabkan naiknya tekanan darah.

Selain itu, adanya faktor lain yang mendukung adalah adanya faktor psikologis. Salah satu contohnya adalah baik perempuan maupun laki-laki pada ketika memasuki usia lansia kecenderungan mengalami

depresi atau stres. Disebabkan oleh status pekerjaan ataupun sudah tidak bekerja lagi (pengangguran). Selain itu, seseorang yang pendapatannya rendah kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada sehingga kurang mendapatkan pengobatan yang baik ketika seseorang menderita hipertensi.

2. Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat banyak ditemukan pada sereal (beras, gandum, jagung, kentang dan sebagainya), serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam.

Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin : 33

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahannya :

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan.

Dari ayat di atas telah membuka lebar mata dan fikiran kita bahwa Allah telah menciptakan atau menjadikan bumi sebagai pijakan atau

tempat tumbuhnya berbagai macam kebutuhan bagi makhluk hidup baik manusia, maupun hewan. Yang salah satunya adalah sumber karbohidrat dari biji-bijian seperti beras, gandum, jagung dan lain-lain.

Asupan karbohidrat mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap resiko terjadinya hipertensi. Asupan karbohidrat sederhana lebih mudah meningkatkan tekanan darah sistolik daripada karbohidrat kompleks.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang tinggi (35,0%). Dari hasil recall 24 jam diketahui bahwa rata-rata lansia mengkonsumsi sumber karbohidrat seperti nasi, mie instan, roti dan lain-lain. Konsumsi karbohidrat sederhana berlebih seperti sirup jagung, gula murni dapat meningkatkan tekanan darah sistolik.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi karbohidrat dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Sugianti (2008) yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara konsumsi karbohidrat dengan kejadian hipertensi.

Tidak adanya hubungan pada penelitian ini diasumsikan oleh karbohidrat sederhana yang jarang diberikan pada lansia di panti sosial tersebut.

3. Hubungan Asupan Protein dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

Protein banyak ditemukan dalam bahan makanan hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, kedelai, kacang-kacangan, dan sebagainya. Konsumsi sumber protein hewani dalam jumlah yang berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah, hal ini dikarenakan kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya lebih tinggi daripada sumber protein nabati.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa (51,2%) lansia mengkonsumsi protein dalam jumlah yang kurang. Dari hasil recall 24 jam diketahui bahwa sumber protein nabati yang sering sebagian besar di konsumsi oleh lansia seperti tahu, tempe an lain-lain.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi protein dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sugianti (2008) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi protein dengan kejadian hipertensi.

4. Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diet tinggi lemak berkaitan dengan kenaikan tekanan darah. Penurunan konsumsi lemak jenuh, terutama lemak dalam makanan yang bersumber dari hewan dan

peningkatan konsumsi lemak tidak jenuh polivalen secukupnya yang berasal dari minyak sayuran, biji-bijian, dan makanan lain yang bersumber dari tanaman dapat menurunkan tekanan darah.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar lansia mengkonsumsi lemak dalam jumlah yang tinggi. Konsumsi lemak berlebih yang berasal dari hewani cenderung meningkatkan kolesterol yang beresiko terhadap hipertensi.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rinawang (2011) yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi lemak dengan kejadian hipertensi. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Abdullah (2005) yang menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi lemak berlebih dengan kejadian hipertensi. berdasarkan recall 24 jam sumber lemak hewani yang dikonsumsi oleh lansia yaitu ayam, telur, susu, ikan dan lain-lain.

Bila mengkonsumsi makanan berlemak, maka didalam usus makanan tersebut akan diubah menjadi kolesterol. Kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya aterosklerosis yaitu suatu kondisi dimana kolesterol menumpuk di dinding pembuluh darah arteri. Pembentukan aterosklerosis diawali dengan rusaknya pembuluh darah. Setelah pembuluh darah rusak, maka kolesterol yang dibawa LDL terperangkap pada dinding pembuluh darah tersebut dalam waktu bertahun-tahun Maka terjadilah

pembentukan plak sehingga pembuluh darah makin sempit dan elastisitasnya berkurang (Cahyono, 2008).

5. Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa

Sumber utama natrium dalam pangan adalah garam dapur (garam meja) yang secara kimia berupa NaCl. Garam diperoleh dari hasil evaporasi air laut atau hasil galian deposit batu karang (*rock salt deposits*). Garam selain digunakan untuk menambah cita rasa makanan, juga digunakan untuk mengwetkan bahan pangan, misalnya ikan asin, sayur asin dan lain-lain. Sumber natrium lainnya adalah penyedap masakan yaitu vetsin (*MSG, monosodium glutamate*) dan soda kue (bahan pengembang roti/kue) yaitu natrium bikarbonat.

Menurut Hull (1996) dalam Rinawang (2011) diketahui bahwa meningkatnya asupan garam lama kelamaan dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan, selain itu dapat mengecilkan diameter arteri. Sehingga berdampak pada peningkatan volume dan tekanan darah meningkatkan.

Hasil analisis univariat menunjukkan bahwa lansia yang konsumsi natriumnya berlebih jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan lansia yang konsumsi natriumnya cukup. Akibat proses menua, seseorang mengalami penurunan sensitifitas indera pengecap dan perasa yang mengakibatkan berkurangnya nafsu makan. Hal tersebut mengakibatkan

penggunaan bumbu masak atau garam dalam jumlah yang lebih banyak (Arisman, 2004). Diketahui pula bahwa lansia yang konsumsi natriumnya berlebih cenderung menderita hipertensi. Almatsier (2006) memaparkan bahwa kelebihan natrium yang berkepanjangan bisa mengakibatkan keracunan, edema serta hipertensi.

Berdasarkan uji statistik diketahui bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Widiastuti (2006) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan natrium dengan hipertensi pada usia lanjut. Namun, berlawanan dengan penelitian Hasirungan (2002) bahwa tidak terdapatnya hubungan yang bermakna antara konsumsi natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia.

Pada penderita hipertensi maupun non hipertensi, pengaturan, pencegahan maupun perbaikan pola makan, salah satunya dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi natrium sebanyak 1.500 mg/hr (2/3 sendok teh sehari). Karena setiap individu memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap jumlah natrium yang dikonsumsi dalam tubuh.

6. Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013

Menurut Depkes RI Pusat Promkes (2008), telah dibuktikan dalam penelitian bahwa dalam satu batang rokok terkandung 4000 racun kimia berbahaya termasuk 43 senyawa. Bahan utama rokok terdiri dari 3 zat,

yaitu 1) Nikotin, merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dengan adanya penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung, pengerasan pembuluh darah dan pengumpulan darah. 2) Tar, dapat mengakibatkan kerusakan sel paru-paru dan menyebabkan kanker. 3) Karbon Monoksida (CO), merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen. Zat-zat kimia tersebut dapat merusak lapisan dalam dinding arteri sehingga menyebabkan penumpukan plak dan lama-kelamaan akan terjadi peningkatan tekanan darah atau munculnya penyakit hipertensi.

Dalam penelitian ini dari 43 lansia terdapat 15 lansia yang merokok atau pernah merokok. Diketahui pula lansia yang merokok sebagian besar menderita hipertensi. Jika dilihat dari banyaknya batang rokok yang dikonsumsi setiap harinya, diperoleh bahwa lansia yang merokok 10-20 batang perharinya lebih banyak, dalam hal ini lansia tersebut dikategorikan dalam perokok sedang. Merokok sebatang setiap harinya akan meningkatkan tekanan sistolik 10-25 mmHg dan menambah detak jantung 5-20 kali/menit.

Berdasarkan uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanusi (2002) dimana diketahui terdapat hubungan yang bermakna antara merokok dengan kejadian hipertensi. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian

Rinawang (2011) dimana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara merokok dengan kejadian hipertensi. peningkatan denyut jantung pada perokok terjadi pada menit pertama merokok dan sesudah 10 menit peningkatan mencapai 30%. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan mengkonsumsi satu batang rokok saja seseorang memiliki risiko meningkatnya tekanan darah.

Dalam penelitian ini tidak terdapat lansia perempuan yang merokok, namun kemungkinan besar terpapar oleh asap rokok yang dikonsumsi oleh perokok di sekelilingnya sehingga berdampak pada kesehatannya dalam waktu beberapa tahun kemudian setelah memasuki usia tua.

Depkes (2008) menambahkan bahwa asap dari rokok juga berdampak terhadap orang yang menghirupnya (disebut perokok pasif) untuk terjadinya penyakit. Para ilmuwan membuktikan bahwa zat-zat kimia didalam rokok juga mempengaruhi kesehatan seseorang yang tidak merokok disekitar perokok. Dampak yang akan ditimbulkan oleh rokok tersebut untuk menderita hipertensi akan terakumulasi dalam beberapa tahun kemudian yaitu sekitar usia 40 tahun ke atas.

7. Hubungan Kebiasaan Minum kopi dengan Hipertensi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kab. Gowa 2013

Kafein bukan termasuk zat gizi. Tetapi karena kita terbiasa minum kopi yang banyak mengandung kafein, ada baiknya kita memperhatikan

nasihat para ahli. Secangkir kopi ternyata menyebabkan naiknya tekanan darah dalam waktu singkat untuk kemudian kembali normal (Khomsan, 2010)

Hasil analisis univariat diketahui bahwa dari 43 lansia terdapat 25 lansia yang minum kopi. Dilihat dari banyaknya kopi yang di konsumsi perharinya yang paling tinggi adalah lansia yang masuk dalam kategori peminum kopi ringan, yaitu lansia yang minum kopi 1-2 gelas sehari. Diketahui pula lansia yang minum kopi sebagian besar menderita hipertensi. Dari hasil penelitian ini jenis kopi yang paling banyak dikonsumsi oleh lansia adalah jenis kopi instan yaitu sebanyak 17 lansia (39,5%).

Berdasarkan uji statistic menunjukkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara kebiasaan minum kopi dengan kejadian hipertensi. Minum kopi berbahaya bagi penderita hipertensi (tekanan darah tinggi) karena senyawa kafein bisa menyebabkan tekanan darah meningkat tajam. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari John Hopkins Hospital, rumah sakit terbaik di AS, terhadap seribu orang laki-laki selama 33 tahun yang menyatakan bahwa kebiasaan minum kopi hanya berpengaruh sangat kecil atas risiko penyakit hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. 2011. *Pengetahuan Praktis Ragam Penyakit Mematikan Yang Paling Sering Menyerang Kita*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Almatsier, Sunita. 2006. *Penuntun Diet Edisi Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Almatsier, Sunita dkk. 2011. *Gizi Seimbang Dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Anies. 2006. *Waspada Ancaman Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Bustan, M.N. 2007. *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyono, Suharjo. 2008. *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*. Jakarta: Kanasius.
- Fatmah. 2010. *Gizi Usia Lanjut*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gray, Huon. 2005. *Kardiologi Edisi IV*. Jakarta : Erlangga.
- Khomsan, Ali. 2010. *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Sport.
- Kristian. 2006. *Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2006*. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan UNS.
- Muchtadi, Deddy. 2009. *Pengantar Ilmu Gizi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Notoadmojo, Soekidjo. 2005. *Metedologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurrahmani, Ulfah. 2012. *Stop Hipertensi*. Jakarta: Familia.

Properawati, Atikah. 2007. *Ilmu Gizi Untuk Keperawatan dan Gizi Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Rinawang. 2011. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Pada Kelompok Lanjut Usia*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah.

Riyanto, Agus. 2011. *Pengolahan dan Analisis Data Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Shanty, Meita. 2011. *Silent Killer*. Jogjakarta: Javalitera.

Sunardi, Tuti. 2000. *Hidangan Sehat Untuk Penderita Hipertensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suwarasa, Iwan. 2006. *Kiat Sehat Bagi Lansia*. Bandung: MQS Publishing.

Widjaja, Reflina. 2009. *Penyakit Kronis*. Jakarta: Bee Media Indonesia.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Ardianty Syani Lahir di Kendari 04 oktober 1990 yang merupakan anak ketiga dari tiga bersodara dari pasangan syamsuri karim dan Murni Wahab BA .Penulis mengawali pendidikan formalnya berturut-turut di SD Negeri 9 kolaka, MTsN Kolaka, dan SMA Negeri 1 Kolaka. Tahun 2009 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, sebagai angkatan kelima pada Jurusan Kesehatan Gizi Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2. Surat Pengambilan Data Awal

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 4. Izin / Rekomendasi Penelitian

Lampiran 5. Surat Kerangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 6. Kuesioner Penelitian

Lampiran 7. Formulir Recall 24 jam Konsumsi

Lampiran 8. Master Tabel SPSS

Lampiran 9. Hasil Output SPSS

