

**HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI (Fe) DAN INFEKSI KECACINGAN  
TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK JALANAN  
DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2014**



**SKRIPSI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**ALAUDDIN**  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
M A K A S S A R  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh**

**NUR RAHMI**

**70200110071**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2014**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014”. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang mukmin yang senantiasa tetap istiqomah di jalan-Nya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa maupun sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak sehingga skripsi ini bias bermanfaat.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari partisipasi banyak pihak. Penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kasman ST dan Ibunda Hasmawati Amd. Terimakasih atas semua doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya diberikan kepada penulis. Terkhusus kepada saudaraku satu-satunya Hasriyanto serta seluruh keluarga besar atas segala dukungan dan do'a yang tiada henti-hentinya selalu dipanjatkan kepada Allah swt untuk keberhasilan penulis dalam menjalankan kehidupan ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Ibunda Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes dan Ibunda St. Raodhah, SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi dengan telaten dan penuh kesabaran hingga terselesaikannya skripsi ini.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih khususnya kepada:

1. Prof. DR. H. Qadir Gassing, HT., MS, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. DR. Dr. H. A. Armyn Nurdin, M.sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Nurdiyana S, SKM., MPH, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dwi Santy Damayati, S.KM., M.Kes, selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
6. Dra. Susmihara. M.Pd selaku penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penelitian.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dan karyawan FIKES yang telah berjasa dalam proses penyelesaian administrasi.
8. Kepala Camat Mariso beserta seluruh staf kepegawaian yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Mariso Kota Makassar.
9. Terimakasih untuk Ibunda Asmy sebagai staf bagian di Laboratorium Parasitologi UNHAS yang telah berbagi pengetahuan dan pengalamannya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.
10. Terimakasih untuk saudariku Lusy Nurdiani Putri, Mega Rezky Suhan, Husnul Mar'ah, Ummu Kalsum, Rahmayana, Trihardianti rahmawan yang telah setia meluangkan hari-harinya untuk menemani peneliti melaksanakan penelitian.

11. Keluarga besar Dg Lewadi Malino Kota. Teman-teman seperjuangan PBL I, II, dan III; Enal, Fikrul, Rahmat, Rahma, Machi, Angky, Khusnul, dan Fira. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama kegiatan PBL.
12. Ibunda Rahmawati dan seluruh petugas Puskesmas Minasa Upa, serta sahabat-sahabat seperjuangan Magang di Puskesmas Minasa Upa; Rahma dan Mega. Terima kasih atas kerjasama kalian yang telah memberikan pengalaman berharga.
13. Keluarga besar Kecamatan Bontonompo Desa Romanglasa. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Posdaya Angkatan 49; Ima, tiwi, rubi, anis, kamil, awal, jasman dan wirman. Terima kasih atas pelajaran hidup serta kekeluargaan yang lahir selama kegiatan KKN. Saya banyak belajar dari kalian.
14. Teman-teman se-angkatan Jurusan Kesehatan Masyarakat, Kesmas B dan Gizi Kesmas 2010, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan baik suka maupun duka, bantuan dan dukungannya selama ini, senang mengenal kalian.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di universitas sehingga tidak cukup bila dicantumkan semua dalam ruang yang terbatas ini. Hanya rasa terima kasih yang dapat penulis sampaikansertado'a dan harapan semoga Allah SWT melipatgandakan pahala bagi semua.

Makassar, September 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definsi Operasional dan Kriteria Objektif Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Tentang Asupan Zat Besi (Fe) .....	11
B. Tinjauan Tentang Anemia.....	20
C. Tinjauan Tentang Infeksi Kecacingan .....	32
D. Tinjauan Tentang Anak Jalanan .....	40
E. Kerangka Pikir .....	44
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Populasi dan Sampel .....	46
D. Metode Pengumpulan Data .....	46

E. Instrumen Penelitian.....	52
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	53
G. Validasi dan Rehabilitasi Instrument .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
2. Karakteristik Sampel.....	58
3. Asupan Zat Besi .....	61
4. Infeksi Kecacingan.....	62
5. Kejadian Anemia.....	63
6. Hubungan Asupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia.....	64
7. Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia ....	66
B. Pembahasan.....	67
1. Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) terhadap Kejadian Anemia .	76
2. Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia ...	86
C. Keterbatasan Penelitian.....	86
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Implikasi Penelitian .....	87
<b>KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	


## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Zat Besi dalam Bahan Makanan.....	16
Tabel 2.2	Batas Normal Kadar Hb Menurut Umur dan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 2.3	Klasifikasi Anemia Sebagai Masalah Kesehatan Masyarakat.....	23
Table 3.1	Klasifikasi Intensitas Infeksi Menurut Jenis Cacing.....	51
Tabel 4.1	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	58
Tabel 4.2	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	58
Tabel 4.3	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kelurahan Tempat Tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	59
Tabel 4.4	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	59
Tabel 4.5	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	60
Tabel 4.6	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Status Tinggal dengan Orang Tua di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	60
Tabel 4.7	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Asupan Zat Besi (Fe) di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.8	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	61
Tabel 4.9	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	62

Tabel 4.10	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Infeksi Kecacingan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	62
Tabel 4.11	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Cacing yang Terdapat pada Tinja di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014	
Tabel 4.12	Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kejadian Anemia di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	63
Tabel 4.13	Analisis Hubungan Asupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014 .....	64
Tabel 4.14	Distribusi Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi Berdasarkan kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014 .....	65
Tabel 4.15	Disrtribusi Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi Berdasarkan kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	65
Tabel 4.16	Analisis Hubungan Infeksi Kecacingan dengan Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014 .....	66
Tabel 4.17	Distribusi Jenis Cacing Berdasarkan Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	44
------------	---------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 2 Formulir *Food Recall*
- Lampiran 3 Formulir FFQ (*Food Frequency Questionnaire*)
- Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 5 Master Tabel
- Lampiran 6 Data View Pengolahan Data SPSS
- Lampiran 7 Out put SPSS
- Lampiran 8 AKG Berdasarkan Permenkes 2013
- Lampiran 9 Data Jumlah Anak Jalanan Kota Makassar 2014
- Lampiran 10 Surat Permohonan Peminjaman Alat Tes Hb dari Laboratorium UIN  
Alauddin Makassar
- Lampiran 9 Surat Pengantar Izin Penelitian dari BKPMMD
- Lampiran 10 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kesbangpol
- Lampiran 11 Surat Pengantar Izin Penelitian dari Kecamatan
- Lampiran 12 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 13 Surat Pengantar Izin Penelitian di Laboratorium Parasitologi  
Fakultas Kedokteran UNHAS
- Lampiran 14 Hasil Pemeriksaan Feses di Laboratorium Parasitologi Fakultas  
Kedokteran Universitas Hasanuddin

## ABSTRAK

**Nama : Nur Rahmi**

**NIM : 70200110071**

**Judul : Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

---

Anemia merupakan masalah gizi yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi, serta menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak (Hadju dkk, 2013). Kurangnya akses makanan serta kondisi lingkungan yang kumuh menyebabkan anak jalanan berisiko mengalami anemia.

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional study*. Jumlah sampel sebanyak 34 anak jalanan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposif sampling* dengan kriteria anak jalanan berumur 6-12 tahun, bersedia untuk diwawancarai serta bersedia diambil darah dan fesesnya, tidak minum obat cacing dalam 6 bulan terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampel (52,9%) menderita anemia dan selebihnya (47,1%) tidak menderita anemia. Terdapat (70,6%) memiliki asupan zat besi yang kurang serta terdapat (61,8%) yang menderita infeksi kecacingan. Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test*, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia ( $p=0,000$ ), sedangkan untuk infeksi kecacingan berdasarkan hasil uji *Chi-Square* tidak ditemukan adanya hubungan ( $p=0,134$ ) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Diharapkan peranan orang tua khususnya ibu agar lebih memperhatikan asupan zat gizi anaknya dengan cara meningkatkan pemahamannya tentang makanan sumber-sumber zat besi dan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Selain itu perlu dilakukan pencegahan dengan menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan serta pemberian obat cacing secara berkala yaitu 6 bulan sekali kepada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

**Kata Kunci : Anemia, Asupan zat besi, Anak jalanan, Infeksi kecacingan**

**Daftar Pustaka : 48 ( 2001 - 2014)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, "Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) Dan Infeksi Kecacingan Terhadap Kejadian Anemia Pada Anak Jalanan Di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014", yang disusun oleh **Nur Rahmi**, NIM: 70200110071, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 15 Desember 2014**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

### DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** (.....)

Sekretaris : **Fatmawaty Mallapiang SKM., M.Kes** (.....)

Pembimbing I : **Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes** (.....)

Pembimbing II : **St. Raodhah, SKM., M.Kes** (.....)

Penguji I : **Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes** (.....)

Penguji II : **Dra. Susmihara, M.Pd** (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Samata, 15 Desember 2014

Diketahui Oleh:


Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



**Andi Armyn Nurdin, M.Sc.**  
70200110071

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usia</b>	<b>JK</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tinggal</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>BB</b>
1	Intana Resky	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	45,4
2	Karina	10	P	Panambungan	Tidak	Jual Plastik	Putus Sekolah (SD)	28,6
3	Fajar	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	28,2
4	Agung	12	L	Panambungan	Tidak	Jual Plastik	Putus Sekolah (SD)	28,3
5	Muthi	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	26,6
6	Angga	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	23,3
7	Mega	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	35,5
8	Mariama	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	25,6
9	Takbir	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	28,5
10	Feriyanto	10	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	23,3
11	Supriadil	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SMP)	28,2
12	Fikri	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	46,6
13	Jody	10	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	22,7
14	Lisna	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	25
15	Muh. Rifki	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	22,1
16	Ulfa	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	31,2
17	Gasali	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	23,9
18	Saldi	10	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	19,6
19	Akbar	12	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	26,1
20	Erni	10	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	27,3
21	Erna	10	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	26,2
22	Indri	12	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SMP)	31,7
23	Ardi	10	L	Lette	Ya	Pengamen dan parkir	Sekolah (SD)	20,6
24	Armita	12	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SD)	25
25	Melisa	11	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SD)	26,8
26	Ririn	12	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	22,4
27	Bagas	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	20,7
28	Abida	8	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	28,4
29	Erwin	9	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	19,8
30	Ridho	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	26,3
31	Gaffar	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	20,9

32	Ai Fajayyun	7	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)	14,9
33	Flora	9	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	20,5
34	Al Fauzan	7	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)	15,9



Kadar HB	Status Anemia	Asupan Fe	sumber zat besi	penghambat penyerapan zat besi
Low	anemia	kurang	kurang	tidak baik
15,8	tidak anemia	cukup	baik	tidak baik
12,2	tidak anemia	cukup	baik	baik
12,4	tidak anemia	kurang	kurang	tidak baik
12,7	tidak anemia	cukup	baik	baik
11,4	anemia	kurang	kurang	baik
13,5	tidak anemia	cukup	baik	baik
Low	anemia	kurang	kurang	baik
Low	anemia	kurang	baik	tidak baik
12,9	tidak anemia	cukup	baik	baik
13	tidak anemia	cukup	baik	baik
12,7	tidak anemia	cukup	baik	baik
11	anemia	kurang	baik	tidak baik
Low	anemia	kurang	baik	tidak baik
12,1	tidak anemia	cukup	kurang	tidak baik
14,2	tidak anemia	cukup	baik	baik
12	tidak anemia	kurang	baik	baik
11	anemia	kurang	kurang	baik
13,5	tidak anemia	cukup	baik	baik
9,6	anemia	kurang	kurang	tidak baik
Low	anemia	kurang	baik	tidak baik
Low	anemia	kurang	kurang	tidak baik
Low	anemia	kurang	kurang	tidak baik
Low	anemia	kurang	kurang	tidak baik
13,9	tidak anemia	kurang	kurang	tidak baik
Low	anemia	kurang	kurang	baik
10,2	anemia	kurang	kurang	tidak baik
13,5	tidak anemia	kurang	kurang	tidak baik
12,9	tidak anemia	kurang	kurang	tidak baik
9,5	anemia	kurang	baik	tidak baik
9,8	anemia	kurang	baik	baik

11,9	tidak anemia	kurang	kurang	tidak baik
11	anemia	kurang	kurang	tidak baik
Low	anemia	kurang	kurang	baik



**Master Tabel Variabel Penelitian**  
**Asupan Zat Besi (Fe) dan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia**  
**pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

No.	IDR	Umur	JK	Kelurahan	Tingg I dengan	Jenis Pekerjaan	Pendidikan
1	A1	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
2	A2	10	P	Panambungan	Tidak	Jual Plastik	Putus Sekolah (SD)
3	A3	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
4	A4	12	L	Panambungan	Tidak	Jual Plastik	Putus Sekolah (SD)
5	A5	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
6	A6	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
7	A7	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
8	A8	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
9	A9	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
10	A10	10	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
11	A11	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SMP)
12	A12	12	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
13	A13	10	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
14	A14	11	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
15	A15	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
16	A16	12	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
17	A17	11	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
18	A18	10	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
19	A19	12	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
20	A20	10	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
21	A21	10	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
22	A22	12	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SMP)
23	A23	10	L	Lette	Ya	Pengamen dan parkir	Sekolah (SD)
24	A24	12	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SD)
25	A25	11	P	Lette	Ya	Pengamen dan jual plastik	Sekolah (SD)
26	A26	12	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
27	A27	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
28	A28	8	P	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
29	A29	9	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
30	A30	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
31	A31	9	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
32	A32	7	L	Panambungan	Ya	Jual Plastik	Sekolah (SD)
33	A33	9	P	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)
34	A34	7	L	Lette	Ya	Pengamen	Sekolah (SD)

Minum Obat Cacing	Infeksi Kecacingan	Jenis Cacing	Kadar Hb (g/dl)	Kejadian Anemia	BB
Tidak	negatif		Low (<7)	anemia	45,4
Tidak	negatif		15,8	tidak anemia	28,6
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12,2	tidak anemia	28,2
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12,4	tidak anemia	28,3
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12,7	tidak anemia	26,6
Tidak	negatif		11,4	anemia	23,3
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	13,5	tidak anemia	35,5
Tidak	negatif		Low (<7)	anemia	25,6
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Low (<7)	anemia	28,5
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12,9	tidak anemia	23,3
Tidak	negatif		13	tidak anemia	28,2
Tidak	negatif		12,7	tidak anemia	46,6
Tidak	negatif		11	anemia	22,7
Tidak	positif	<i>Trichuris trichiura</i>	Low (<7)	anemia	25
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12,1	tidak anemia	22,1
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	14,2	tidak anemia	31,2
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	12	tidak anemia	23,9
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	11	anemia	19,6
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	13,5	tidak anemia	26,1
Tidak	negatif		9,6	anemia	27,3
Tidak	negatif		Low (<7)	anemia	26,2
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Low (<7)	anemia	31,7
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Low (<7)	anemia	20,6
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura</i>	Low (<7)	anemia	25
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	13,9	tidak anemia	26,8
Tidak	negatif		Low (<7)	anemia	22,4
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Hymnelopis nana</i>	10,2	anemia	20,7
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	13,5	tidak anemia	28,4
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura</i>	12,9	tidak anemia	19,8
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	9,5	anemia	26,3
Tidak	negatif		9,8	anemia	20,9
Tidak	negatif		11,9	tidak anemia	14,9
Tidak	negatif		11	anemia	20,5
Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>	Low (<7)	anemia	15,9

Jumlah Asupan Zat Besi			Kecukup an Zat	Kategori	Sumber Zat Besi	Penghambat Penyerapan Zat Besi
Asupan Zat besi						
Recall I	Recall II	Rata-rata				
5,7	5,4	5,55	22	kurang	kurang	sering
12,5	14,3	13,4	84,8	cukup	baik	sering
8,8	8,4	8,6	80,3	cukup	baik	jarang
2,5	1,8	2,15	19,9	kurang	kurang	jarang
12,2	13,3	12,75	86,7	cukup	baik	jarang
2,7	1,7	2,2	24,7	kurang	kurang	jarang
16,7	15,5	16,1	84,3	cukup	baik	jarang
5,1	4,1	4,6	32,3	kurang	kurang	jarang
0,8	3,5	2,2	20,1	kurang	baik	sering
6,2	8,6	7,4	83,1	cukup	baik	jarang
9,7	7,9	8,8	82,2	cukup	baik	jarang
14,9	13,7	14,3	80,3	cukup	baik	jarang
2	1,9	1,95	22,4	kurang	baik	sering
3,4	6,6	5	36,2	kurang	baik	sering
6,8	7,6	7,2	84,7	cukup	kurang	sering
6,7	8,6	15,3	88,4	cukup	baik	jarang
2,2	1,6	1,9	20,8	kurang	baik	jarang
1,9	1,3	1,6	21,3	kurang	kurang	jarang
8,9	7,3	8,1	81	cukup	baik	jarang
2,5	3,7	3,1	20,3	kurang	kurang	sering
3,3	1,9	2,6	17,8	kurang	baik	sering
4,7	5,1	4,9	27,8	kurang	kurang	sering
1,5	1,9	3,4	43	kurang	kurang	sering
1,19	1,06	2,25	16,1	kurang	kurang	sering
3,2	4,2	3,7	24,8	kurang	kurang	sering
0,6	0,4	0,5	4	kurang	kurang	jarang
1,3	2,1	1,7	22,1	kurang	kurang	sering
4,7	4,7	4,7	44,7	kurang	kurang	sering
2,9	2,5	2,7	36,9	kurang	kurang	sering
1,8	2,4	2,1	21,6	kurang	baik	sering
1,9	2,1	2	25,9	kurang	baik	jarang
2,4	1,8	2,1	38,1	kurang	kurang	sering
2,2	2	2,1	27,6	kurang	kurang	sering
1,3	0,5	0,9	15,2	kurang	kurang	jarang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Data Infeksi Kecacingan Anak Jalanan  
Kecamatan Mariso Kota Makassar  
Tahun 2014**

No	ID Responden	Minum Obat	Infeksi Kecacingan	Jenis Cacing
1	A1	Tidak	negatif	
2	A2	Tidak	negatif	
3	A3	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
4	A4	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
5	A5	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
6	A6	Tidak	negatif	
7	A7	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
8	A8	Tidak	negatif	
9	A9	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
10	A10	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
11	A11	Tidak	negatif	
12	A12	Tidak	negatif	
13	A13	Tidak	negatif	
14	A14	Tidak	positif	<i>Trichuris trichiura</i>
15	A15	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
16	A16	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
17	A17	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
18	A18	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
19	A19	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
20	A20	Tidak	negatif	
21	A21	Tidak	negatif	
22	A22	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
23	A23	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
24	A24	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura</i>
25	A25	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
26	A26	Tidak	negatif	
27	A27	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Hymnelopis nana</i>
28	A28	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
29	A29	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides + Trichuris trichiura</i>
30	A30	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>
31	A31	Tidak	negatif	
32	A32	Tidak	negatif	
33	A33	Tidak	negatif	
34	A34	Tidak	positif	<i>Ascaris lumbricoides</i>


**Data Kejadian Anemia Responden Anak Jalanan  
Kecamatan Mariso Kota Makassar  
Tahun 2014**

No.	ID Responden	Umur	Kadar Hb (g/dl)	Kejadian Anemia
1	A1	12	Low (<7)	anemia
2	A2	10	15,8	tidak anemia
3	A3	12	12,2	tidak anemia
4	A4	12	12,4	tidak anemia
5	A5	11	12,7	tidak anemia
6	A6	11	11,4	anemia
7	A7	11	13,5	tidak anemia
8	A8	12	Low (<7)	anemia
9	A9	11	Low (<7)	anemia
10	A10	10	12,9	tidak anemia
11	A11	12	13	tidak anemia
12	A12	12	12,7	tidak anemia
13	A13	10	11	anemia
14	A14	11	Low (<7)	anemia
15	A15	9	12,1	tidak anemia
16	A16	12	14,2	tidak anemia
17	A17	11	12	tidak anemia
18	A18	10	11,5	anemia
19	A19	12	13,5	tidak anemia
20	A20	10	9,6	anemia
21	A21	10	Low (<7)	anemia
22	A22	12	Low (<7)	anemia
23	A23	10	Low (<7)	anemia
24	A24	12	Low (<7)	anemia
25	A25	11	13,9	tidak anemia
26	A26	12	Low (<7)	anemia
27	A27	9	10,2	anemia
28	A28	8	13,5	tidak anemia
29	A29	9	12,9	tidak anemia
30	A30	9	9,5	anemia
31	A31	9	9,8	anemia
32	A32	7	11,9	tidak anemia
33	A33	9	11	anemia
34	A34	7	Low (<7)	anemia

**Data Asupan Zat Besi (Fe) Responden Anak Jalanan  
Kecamatan Mariso Kota Makassar  
Tahun 2014**

No.	IDR	BB	Jumlah Asupan Zat Besi			Kecukupan Zat Besi (%)	Kategori	Sumber Zat Besi	Penghambat Penyerapan Zat Besi
			Asupan Zat besi						
			Recall I	Recall II	Rata-rata				
1	A1	45,4	5,7	5,4	5,55	22	kurang	kurang	tidak baik
2	A2	28,6	12,5	14,3	13,4	84,8	cukup	baik	tidak baik
3	A3	28,2	8,8	8,4	8,6	80,3	cukup	baik	baik
4	A4	28,3	2,5	1,8	2,15	19,9	kurang	kurang	baik
5	A5	26,6	12,2	13,3	12,75	86,7	cukup	baik	baik
6	A6	23,3	2,7	1,7	2,2	24,7	kurang	kurang	baik
7	A7	35,5	16,7	15,5	16,1	84,3	cukup	baik	baik
8	A8	25,6	5,1	4,1	4,6	32,3	kurang	kurang	baik
9	A9	28,5	0,8	3,5	2,2	20,1	kurang	baik	tidak baik
10	A10	23,3	6,2	8,6	7,4	83,1	cukup	baik	baik
11	A11	28,2	9,7	7,9	8,8	82,2	cukup	baik	baik
12	A12	46,6	14,9	13,7	14,3	80,3	cukup	baik	baik
13	A13	22,7	2	1,9	1,95	22,4	kurang	baik	tidak baik
14	A14	25	3,4	6,6	5	36,2	kurang	baik	tidak baik
15	A15	22,1	6,8	7,6	7,2	84,7	cukup	kurang	tidak baik
16	A16	31,2	6,7	8,6	15,3	88,4	cukup	baik	baik
17	A17	23,9	2,2	1,6	1,9	20,8	kurang	baik	baik
18	A18	19,6	1,9	1,3	1,6	21,3	kurang	kurang	baik
19	A19	26,1	8,9	7,3	8,1	81	cukup	baik	baik
20	A20	27,3	2,5	3,7	3,1	20,3	kurang	kurang	tidak baik
21	A21	26,2	3,3	1,9	2,6	17,8	kurang	baik	tidak baik
22	A22	31,7	4,7	5,1	4,9	27,8	kurang	kurang	tidak baik
23	A23	20,6	1,5	1,9	3,4	43	kurang	kurang	tidak baik
24	A24	25	1,19	1,06	2,25	16,1	kurang	kurang	tidak baik
25	A25	26,8	3,2	4,2	3,7	24,8	kurang	kurang	tidak baik
26	A26	22,4	0,6	0,4	0,5	4	kurang	kurang	baik

27	A27	20,7	1,3	2,1	1,7	22,1	kurang	kurang	tidak baik
28	A28	28,4	4,7	4,7	4,7	44,7	kurang	kurang	tidak baik
29	A29	19,8	2,9	2,5	2,7	36,9	kurang	kurang	tidak baik
30	A30	26,3	1,8	2,4	2,1	21,6	kurang	baik	tidak baik
31	A31	20,9	1,9	2,1	2	25,9	kurang	baik	baik
32	A32	14,9	2,4	1,8	2,1	38,1	kurang	kurang	tidak baik
33	A33	20,5	2,2	2	2,1	27,6	kurang	kurang	tidak baik
34	A34	15,9	1,3	0,5	0,9	15,2	kurang	kurang	baik






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Kadar Hb	Kejadian
Low (<7)	anemia
15,8	dak anemia
12,2	dak anemia
12,4	dak anemia
12,7	dak anemia
11,4	anemia
13,5	dak anemia
Low (<7)	anemia
Low (<7)	anemia
12,9	dak anemia
13	dak anemia
12,7	dak anemia
11	anemia
Low (<7)	anemia
12,1	dak anemia
14,2	dak anemia
12	dak anemia
11	anemia
13,5	dak anemia
9,6	anemia
Low (<7)	anemia
13,9	dak anemia
Low (<7)	anemia
10,2	anemia
13,5	dak anemia
12,9	dak anemia
9,5	anemia
9,8	anemia
11,9	dak anemia
11	anemia
Low (<7)	anemia



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Anemia pada umumnya terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan pada kelompok sosio-ekonomi rendah. Secara umum kontribusi terbesar anemia adalah defisiensi besi yaitu sebesar 50%, sehingga prevalensi anemia seringkali digunakan untuk memprediksi anemia defisiensi besi. (Endang, 2011 dalam Nurnia, 2013). Secara global prevalensi anemia usia sekolah masih menunjukkan angka yang tinggi yaitu 37%. (Arisman, 2010 dalam Nurnia, 2013).

Di Indonesia, anemia defisiensi besi masih merupakan masalah gizi utama, disamping tiga masalah gizi lainnya yaitu (1) Kurang Energi Protein (KEP); (2) Kurang Vitamin A (KVA) dan (3) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Menurut data Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa secara nasional prevalensi anemia sebesar 21,7%. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa proporsi anemia pada perempuan sedikit lebih tinggi yaitu 23,9% dibandingkan pada laki-laki yaitu 18,4%. Sedangkan prevalensi anemia pada anak usia 5-14 tahun sebanyak 26,4%.

Anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terkena anemia defisiensi besi di samping kelompok usia subur. Kelompok ini dikatakan rentan karena berada pada fase percepatan pertumbuhan, dimana kebutuhan zat besi selama masa ini meningkat dengan adanya pertumbuhan jaringan dan kenaikan massa sel darah merah. (Zulaekah, 2008 dalam Nurnia, 2013).

Berdasarkan hasil studi di Sulawesi, menunjukkan angka anemia pada murid sekolah dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sebesar 40,0% (Arifin, dkk, 2013). Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nurnia, dkk, 2013) di Wilayah Pesisir Kota Makassar Sulawesi Selatan sebanyak 37,6% anak sekolah dasar mengalami anemia.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi adalah terjadinya kehilangan darah karena penyakit infeksi seperti kecacingan. Infeksi kecacingan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi prevalensinya pada kelompok anak usia sekolah terutama di daerah pedesaan dan daerah kumuh perkotaan. Penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah atau *Soil Transmitted Helminths* (STH) yang sering dijumpai pada anak usia sekolah yaitu *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Ancylostoma duodenale* dan *Necator Americanus*. (Mardiana dan Djarismawati, 2008 dalam Pertiwi, dkk, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa anak usia sekolah merupakan golongan yang sering terkena infeksi kecacingan. Hal ini dibuktikan oleh Pertiwi, dkk (2013) pada 181 murid SD di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, menemukan 75,7% murid menderita kecacingan. Kecacingan dapat ditemukan pada semua golongan umur, namun tertinggi pada usia anak SD. Anak jalanan termasuk kedalam kelompok anak usia sekolah yaitu berusia 6-12 tahun.

Anak jalanan merupakan komunitas yang kurang memperhatikan perilaku hidup sehat, dan umumnya tinggal di daerah kumuh dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Hal ini kemudian meningkatkan risiko bagi mereka untuk mengalami

kecacingan dan anemia defisiensi besi. Keberadaan anak jalanan merupakan hal yang lazim dan telah menjadi ciri khas dari setiap kota besar yang ada di Indonesia. Pada tahun 2011 jumlah anak jalanan di Kota Makassar terus mengalami peningkatan sebanyak 918, tahun 2012 sebanyak 990 dan tahun 2013 menjadi 1043 anak. Jumlah anak jalanan terbanyak berada di Kecamatan Mariso sebanyak 162 anak. (Dinas Sosial Kota Makassar, 2013)

Anak jalanan merupakan kelompok berisiko mengalami gangguan gizi. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang dilakukan di Kediri sebesar 33% anak jalanan masih kekurangan kebutuhan nutrisi dan 40% anak jalanan memiliki status gizi kurang (Pramessti dan Kurniajati, 2012). Di Kota Bandung dimana hanya 3,9% anak jalanan yang mengalami gizi kurang dan 96% anak jalanan justru berstatus gizi normal (Aini, dkk, 2009). Berbeda di Kota Makassar sebesar 100% anak jalanan umur 10-13 tahun berstatus gizi gemuk dan menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak yang berstatus gizi sangat kurus yaitu sebesar 94,7% (Isbach, dkk, 2013)

Anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Mereka identik dengan kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi serta aktifitasnya yang tinggi di jalanan membuat asupan makanannya juga berkurang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014?
2. Bagaimana hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014?

## **C. Hipotesis**

### **1. Hipotesis Alternatif (Ha)**

- a. Ada hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014
- b. Ada hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

### **2. Hipotesis Nol (Ho)**

- a. Tidak ada hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014
- b. Tidak ada hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

## **D. Definisi Operasional dan Ruang lingkup Penelitian**

### **1. Definisi Operasional**

#### **a. Anak jalanan**

Anak jalanan adalah anak yang berumur 6-12 tahun, menghabiskan sebagian besar waktunya (lebih dari 4 jam dalam satu hari) di jalanan untuk melakukan berbagai aktifitas ekonomi seperti (mengamen, mengemis, melakukan usaha dagang)

#### **b. Asupan Zat Besi (Fe)**

Asupan zat besi adalah semua makanan yang dikonsumsi oleh anak jalanan dengan kandungan zat besi yang diukur secara kuantitatif dengan menggunakan metode recall 24 jam, kemudian dibandingkan dengan AKG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VII, 2004).

*Kriteria Objektif:*

Cukup : Jika asupan zat besi (Fe)  $\geq$  80% dari AKG

Kurang: Jika asupan zat besi (Fe)  $<$  80% dari AKG

Asupan zat besi pada anak jalanan juga diukur secara kualitatif dengan menggunakan formulir FFQ (*Food Frequency Questionnaire*) yaitu dengan menanyakan jenis bahan makanan sumber zat besi dan jenis makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi.

*Kriteria Objektif Sumber Zat Besi:*

Cukup : Apabila jenis bahan makanan sumber zat besi yang dikonsumsi dari nilai rata-rata

Kurang : Apabila jenis bahan makanan sumber zat besi yang dikonsumsi < dari nilai rata-rata

*Kriteria Objektif* Penghambat Penyerapan Fe:

Jarang : Apabila jenis bahan makanan penghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi < dari nilai rata-rata

Sering : Apabila jenis bahan makanan penghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi > dari nilai rata-rata

### c. Infeksi Kecacingan

Infeksi kecacingan adalah terdapatnya telur cacing pada sampel tinja yang diambil.

Infeksi : Jika pada sampel tinja ditemukan telur cacing

Tidak Infeksi : Jika pada sampel tinja tidak ditemukan telur cacing.

### d. Anemia

Anemia adalah suatu keadaan kekurangan kadar hemoglobin dalam darah anak jalanan yang terutama disebabkan oleh kekurangan zat gizi (khususnya zat besi) diperoleh dari hasil pengukuran hemoglobin yang menggunakan metode *cyanmethemoglobin* dengan satuan gram/dl.

*Kriteria Objektif* (WHO, 2001 dalam Nursari, 2010):

Anemia : Apabila kadar Hb anak jalanan umur 5-11 tahun < 11,5 g/dl  
kadar Hb anak jalanan umur 12-14 tahun <12 g/dl

Tidak Anemia : Bila kadar Hb anak jalanan umur 5-11 tahun >11,5 g/dl  
kadar Hb anak jalanan umur 12-14 tahun >12 g/dl

## 2. Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini berfokus pada asupan zat besi yang merupakan salah satu penyebab langsung dan infeksi kecacingan yang merupakan penyebab tidak langsung terjadinya anemia gizi besi pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

### E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dkk tahun 2013 dengan judul Hubungan Asupan Zat Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna asupan besi dengan kejadian anemia dengan  $p=0,01$ . Terdapat hubungan yang bermakna asupan protein dengan kejadian anemia dengan  $p=0,01$ . Tidak terdapat hubungan yang bermakna asupan vitamin C dengan kejadian anemia dengan  $p=0,10$ .

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nancy, dkk tahun 2013 yang berjudul Hubungan antara Asupan Zat Besi, Protein dan Vitamin C dengan Kejadian Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado memberikan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi, protein, vitamin C dengan kejadian anemia.

Penelitian yang dilakukan Andawari, dkk tahun 2013 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado yang berjudul Hubungan antara Asupan Zat Besi dengan Kadar Feritin pada Siswa Kelas 4 dan 5 SD Katolik ST. Theresia Malalayang Kota Manado memperoleh hasil penelitian 83,3% asupan

zat besi tergolong defisit, 50% kadar feritin rendah dan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kadar feritin.

Penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi, dkk tahun 2013 dengan judul “Analisis Faktor Praktik Hygiene Perorangan Terhadap Kejadian Kecacingan Pada Murid Sekolah Dasar Di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar Tahun 2013”, di temukan 75,7% positif terjadi kecacingan paada murid sekolah dasar, hal ini disebabkan bahwa semua faktor praktik hygiene perorangan memiliki resiko tinggi terhadap kejadian kecacingan pada murid sekolah dasar di Pulau Barrang Lompo.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim, Novita, dkk tahun 2013 yang berjudul Hubungan Kecacingan dengan Anemia pada Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan hasil bahwa ada hubungan yang bermakna antara kecacingan dengan anemia pada murid sekolah dasar dengan nilai  $p = 0,001$ .

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti hubungan asupan zat besi dan infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

#### **a. Tujuan Umum**

Mengetahui hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

#### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Mengetahui hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014
- 2) Mengetahui hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Manfaat Ilmiah**


Sebagai bahan informasi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan utamanya dibidang gizi kesehatan masyarakat mengenai kejadian anemia pada anak jalanan

#### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan Dinas Sosial Kota Makassar agar lebih memperhatikan masalah kesehatan, khususnya gizi dikalangan anak jalanan. Diharapkan pula agar masyarakat, utamanya orang tua yang anaknya berprofesi sebagai anak jalanan untuk lebih memperhatikan asupan makanannya dan tidak menjadikan mereka sebagai pencari nafkah.

**c. Manfaat Bagi Peneliti**

Menambah wawasan bagi peneliti sehingga dapat dijadikan pengalaman yang paling berharga dan meningkatkan keterampilan serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### *A. Tinjauan Tentang Asupan Zat Besi*

##### **1. Definisi Zat Besi**

Zat besi (Fe) merupakan mikromineral yang esensial bagi tubuh. Zat ini terutama diperlukan dalam hemopoiesis (pembentukan darah), yaitu dalam mensintesa hemoglobin (Hb) (Sediaoetama, 2008).

Fungsi utama dari zat besi adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Untuk mengangkut oksigen, zat besi harus bergabung dengan protein dan membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah dan myoglobin di dalam serabut otot. Bila bergabung dengan protein di dalam sel, zat besi membentuk enzim yang berperan di dalam pembentukan energi di dalam sel. Jadi, zat besi paling banyak ditemukan di dalam sel darah merah, zat inilah yang memberikan warna merah pada darah (Efran, 2013).

Dalam hemoglobin, Fe akan mengikat 4 oksigen, sehingga gejala kekurangan Fe akan menyebabkan rendahnya peredaran oksigen dalam tubuh sehingga mengakibatkan mudah pusing, lelah, letih, lesu dan turunnya konsentrasi berpikir (Achadi, 2011).

Asupan zat besi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam pembentukan sel darah, akan mengakibatkan terjadinya anemia, menurunkan kekebalan individu,

sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Hal ini berhubungan erat dengan menurunnya fungsi enzim pembentuk antibody seperti mieloperoksidase sebagai akibat kekurangan besi tersebut (Proverawati dan Erna, 2011).

## 2. Kebutuhan Zat Besi

Kebutuhan akan zat besi meningkat selama masa pertumbuhan. Jika tidak terdapat cukup besi untuk memenuhi kebutuhan tubuh, maka jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berkurang dan volume sel darah merah (eritrosit) juga menurun. Hal ini disebabkan hemoglobin untuk mengisi sel berkurang. Keadaan seperti ini, dikenal sebagai anemia defisiensi besi (Siregar dan Adelina, 2009 dalam Tanri, 2013).

Kebutuhan zat besi pada seseorang tergantung pada usia dan jenis kelamin. Khususnya pada wanita subur (wanita hamil), bayi, anak-anak dan para remaja lebih beresiko untuk mengalami anemia zat besi dari pada orang lain. Kebutuhan zat besi pada wanita lebih banyak dari pada laki-laki karena mereka mengalami menstruasi (Citrakesumasari, 2012).

Taraf gizi besi bagi seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah konsumsinya melalui makanan, bagian yang diserap melalui saluran pencernaan, cadangan zat besi dalam jaringan, kebutuhan tubuh dan ekskresi (Adriani dan Bambang, 2012).

Menurut Adriani dan Bambang (2012) pembuangan besi keluar tubuh terjadi melalui beberapa jalan diantaranya melalui keringat 0,2-1,2 mg/hari, air seni 0,1 mg/hari, dan melalui feses dan menstruasi 0,5-1,4 mg/hari

### 3. Sumber dan penyerapan zat besi

Sumber utama zat besi adalah bahan pangan hewani dan kacang-kacangan serta sayuran berwarna hijau tua. Zat besi dalam makanan dapat berbentuk *heme* dan *nonheme*. Zat besi *heme* adalah zat besi yang berikatan dengan protein berasal dari hemoglobin dan mioglobin, banyak terdapat dalam bahan makanan hewani misalnya daging, unggas, dan ikan. Zat besi *nonheme* adalah senyawa besi anorganik yang kompleks, zat besi *nonheme* ini umumnya terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, seperti serelia, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Absorpsi besi non heme sangat dipengaruhi oleh faktor yang mempermudah dan faktor yang menghambat, yang terdapat di dalam bahan makanan yang dikonsumsi. Sementara itu, zat besi heme tidak dipengaruhi oleh faktor penghambat. Karena itu, jumlah zat besi heme yang dapat diabsorpsi lebih banyak dari pada zat besi dalam bentuk non heme. Zat besi *heme* dapat diabsorpsi sebanyak 20-30%, sebaliknya zat besi *nonheme* hanya diabsorpsi sebanyak 1-6%. Namun, tingkat penyerapan zat besi non heme yang rendah itu dapat ditingkatkan dengan penambahan faktor yang mempermudah, yaitu vitamin C (Anwar, 2009 dalam Saifi 2011).

Absorpsi Fe dalam pencernaan dipengaruhi oleh simpanan serta hal-hal lain terkait dengan cara Fe dikonsumsi. Zat penghambat absorpsi Fe diantaranya adalah tannin (teh), pitat (serelia), dan serat. Sementara itu, zat peningkat absorpsi adalah sistein (daging), vitamin C, yang umum terdapat dalam buah-buahan (Achadi, 2011).

Sejauh ini, sumber yang terbaik untuk besi adalah hati, daging, dan ikan sebagai pilihan kedua. Sayur-sayuran merupakan sumber yang baik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS.*An-Nahl*/16:10-11


  
 10. “Dia-lah yang telah menurunkan dari langit air untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang padanya kamu mengembalakan ternak kamu” 11. “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Terjemahnya:

10. “Dia-lah yang telah menurunkan dari langit air untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang padanya kamu mengembalakan ternak kamu” 11. “Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Maksud ayat diatas mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri Allah swt.dan memanfaatkan dengan baik anugrah-Nya bahwa Dia yang Maha Kuasa itulah yang telah menurunkan dari arah langit, yakni awan air hujan untuk kamu manfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyebutkan tumbuh-tumbuhan yang padanya, yakni ditempat tumbuhnya, kamu mengembalakan ternak kamu sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya dapat menghasilkan untuk kamu susu, daging, dan bulu (Shihab, 2002). Sedangkan, maksud ayat 11 yaitu setelah ayat yang lalu menyebut tumbuh-tumbuhan secara umum, ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat atau populer dalam

masyarakat Arab tempat dimana turunnya al-Qur'an dengan menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanaman-tanaman; dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaat. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik, dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga angguryang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram, dan dari segalamacam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu, benar-benar ada tandayang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempat, tetapi ragam dan rasanya berbedabeda (Shihab, 2002).

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya air hujan yang diturunkan Allah swt. untuk dapat dimanfaatkan sebagai minuman begitu pula tumbuh-tumbuhan khususnya sayuran dan buah-buahan dengan berbagai jenis, warna, bentuk dan kandungan gizinya. Dimana sayuran dan buah-buahan sangat baik untuk kesehatan karena mempunyai banyak vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh dan kesehatan.

Berbagai sumber zat besi yang terkandung dalam bahan pangan hewani, nabati dan hasil olahannya, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 2.1**  
**Zat Besi Dalam Bahan Makanan**

Bahan Makanan	Zat Besi (mg/100g)
Hati	6,0 - 14,6
Daging sapi	2,0 - 4,3
Ikan	0,5 - 1,0
Telur ayam	2,0 - 3,0
Kacang-kacangan	1,9 - 14,0
Tepung gandum	1,5 - 7,0
Sayur daun hijau	0,4 - 18,0
Umbi-umbian	0,3 - 2,0
Buah-buahan	0,2 - 4,0
Beras	0,5 - 0,8
Susu sapi	0,1 - 0,4

*Sumber: (Davidson, dkk 1973 dalam Jannah, 2010)*

Menurut Almatier (2001) dalam Wulansari (2006) pada umumnya, besi di dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan biologik (tingkat sejauh mana zat gizi diserap dan beredar dalam tubuh) yang tinggi, besi di dalam sereal dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik yang sedang, dan besi yang terdapat pada sebagian besar sayur-sayuran terutama yang mengandung asam oksalat tinggi seperti bayam mempunyai ketersediaan biologik yang rendah.

Dijelaskan pula dalam QS.*An-Nahl*/ 16: 14



Terjemahnya:

“Dan Dia yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan kamu mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan agar kamu (bersungguh-sungguh) mencari dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur”

Melalui ayat 14 di atas, diuraikan apa yang terdapat “di dalam air”. Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan Dia*, yakni Allah swt yang menundukkan laut dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yakni binatang laut itu, dan kamu dapat mengeluarkan, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan darinya, yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai (Shihab, 2002).

Maksudnya, bahwa Allah menciptakan lautan yang dalam lautan itu terdapat hewan laut seperti ikan, udang dan lainnya yang kemudian dapat diolah oleh manusia untuk dapat dikonsumsi serta akan membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh seseorang. Hal ini kemudian menjadikan bukti bahwa ikan yang segar selain

mengandung banyak protein juga merupakan salah satu unsur yang mengandung zat besi heme yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan seseorang.

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Absorpsi Besi

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap absorpsi besi (Almatsier, 2009).

- a. *Bentuk Besi* di dalam makanan berpengaruh terhadap penyerapannya. Besi-heme, yang merupakan bagian dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat di dalam daging hewan yang dapat diserap dua kali lipat dari pada besi non-heme. Kurang lebih 40% dari besi di dalam daging, ayam dan ikan terdapat sebagai besi-heme dan selebihnya sebagai non-heme. Besi non-heme juga terdapat di dalam serelia, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Makan besi heme dan non-heme secara bersama dapat meningkatkan penyerapan besi non-heme. Daging, ayam, dan ikan mengandung suatu faktor yang membantu penyerapan besi. Faktor ini terdiri dari asam amino yang mengikat besi dan membantu penyerapannya.
- b. *Asam organik*, seperti vitamin C sangat membantu penyerapan besi non-heme dengan merubah bentuk ferri menjadi bentuk ferro. Seperti telah dijelaskan bentuk ferro lebih mudah diserap. Vitamin C disamping itu membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi dalam duodenum. Oleh karena itu sangat dianjurkan memakan makanan sumber vitamin C tiap kali makan. Asam organik lain adalah asam sitrat.

- c. *Asam fihat* dan faktor lain di dalam serat sereal dan asam oksalat di dalam sayuran menghambat penyerapan besi. Faktor-faktor ini mengikat besi sehingga mempersulit penyerapannya. Protein kedelai menurunkan absorpsi besi yang mungkin disebabkan oleh nilai fihatnya yang tinggi. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat melawan sebagian pengaruh faktor-faktor yang menghambat penyerapan besi ini.
- d. *Tanin* yang merupakan polifenol dan terdapat di dalam teh, kopi, dan beberapa jenis sayuran juga menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya. Tanin yang terdapat dalam teh dan kopi dapat menurunkan absorpsi besi sampai 40% untuk kopi dan 85% untuk teh. Minum teh satu jam sesudah makan dapat menurunkan absorpsi besi hingga 85%. Bila besi tubuh tidak terlalu tinggi sebaiknya tidak meminum teh atau kopi waktu makan.
- e. *Tingkat keasaman lambung* meningkatkan daya larut besi. Kekurangan asam klorida di dalam lambung atau penggunaan obat-obatan yang bersifat basah seperti antacid menghalangi absorpsi besi.
- f. *Faktor intrinsik* di dalam lambung membantu penyerapan besi, di duga karena heme mempunyai struktur yang sama dengan vitamin B12.
- g. *Kebutuhan tubuh* akan besi berpengaruh besar terhadap absorpsi besi. Bila tubuh kekurangan besi atau kebutuhan meningkat pada masa pertumbuhan absorpsi besi non-heme dapat meningkat sampai 10 kali sedangkan besi heme 2 kali

##### **5. Metode Food Recall 24 jam**

Untuk mengukur asupan zat besi Fe seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan Food recall 24 jam. Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu (kemarin). Sebagai alat bantu untuk memperlancar pelaksanaan digunakan ukuran rumah tangga dan model pangan untuk mempermudah perkiraan konsumsi pangan. Hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan recall 24 jam data yang diperoleh cenderung lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan individu ditanyakan secara teliti dengan menggunakan alat URT (sendok, gelas, piring, dan lain-lain) atau ukuran lainnya yang biasa dipergunakan sehari-hari (Supariasa dkk, 2001).

#### **6. Metode *Food Frequency Questionnaire* (FFQ)**

FFQ merupakan kuesioner yang menggambarkan frekuensi responden dalam mengkonsumsi beberapa jenis makanan dan minuman. Kuesioner makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan jadi dan frekuensi makanan tersebut selama periode tertentu seperti hari, minggu, bulan atau tahun. Metode ini digunakan untuk menggambarkan seberapa sering mengkonsumsi bahan makanan atau minuman tertentu (Supariasa dkk, 2001).

### **B. Tinjauan Tentang Anemia**

#### **1. Definisi Anemia**

Menurut Sief (2012) Anemia adalah gangguan darah yang umum terjadi ketika tubuh memiliki sel darah merah lebih sedikit dari biasanya. Sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh anak anda menggunakan protein yang disebut

hemoglobin. Jika sel-sel ini atau protein ini tidak cukup, maka kondisi ini disebut dengan anemia.

Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum terjadi ketika kadar sel darah merah (eritrosit) dalam tubuh menjadi terlalu rendah. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi, termasuk kelelahan dan stress pada organ tubuh. Memiliki kadar sel darah yang normal dan mencegah anemia membutuhkan kerjasama antara ginjal, sumsum tulang, dan nutrisi dalam tubuh. Jika ginjal atau sumsum tulang tidak berfungsi, atau tubuh kurang gizi, maka jumlah sel darah merah dan fungsi normal mungkin sulit untuk dipertahankan (Proverawati, 2011).

Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah (Hb) tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Menurut WHO dan pedoman Kemenkes 1999, cut-off anemia berbeda-beda antar kelompok umur, maupun golongan individu. Kelompok umur atau golongan individu tertentu dianggap lebih rentan mengalami anemia dibandingkan kelompok lainnya (Risksedas, 2014).

Batas kadar normal Hb untuk kelompok orang ditentukan menurut umur dan jenis kelamin seperti yang diperlihatkan dalam tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel .2.2**

**Batasan Anemia Menurut WHO**

<b>Kelompok</b>	<b>Umur</b>	<b>Hemoglobin (g/dl)</b>
Anak-anak	5 – 11 tahun	11,5

	12 – 14 tahun	12
--	---------------	----

*Sumber: (WHO, 2008 dalam Saifi, 2011)*

## 2. Tipe Anemia

Ada dua tipe anemia yang dikenal selama ini yaitu anemia gizi dan non-gizi.

### a. Anemia Gizi

#### 1. Anemia Gizi Besi

Anemia gizi besi adalah kekurangan kadar hemoglobin (Hb) dalam darah yang disebabkan karena kekurangan zat gizi besi yang diperlukan untuk pembentukan Hb tersebut. Di Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) hingga disebut Anemia Kekurangan Zat Besi atau Anemia Gizi Besi (Dewi dkk, 2013).

Anemia Gizi Besi adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan cadangan besi dalam hati, sehingga jumlah hemoglobin darah menurun dibawah normal. Sebelum terjadi Anemia Gizi Besi, diawali lebih dulu dengan keadaan Kurang Gizi Besi (KGB). Apabila cadangan besi dalam hati menurun tetapi belum parah, dan jumlah hemoglobin masih normal, maka seseorang dikatakan mengalami Kurang Gizi Besi saja (tidak disertai Anemia Gizi Besi). Keadaan Kurang Gizi Besi yang berlanjut dan semakin parah akan mengakibatkan Anemia Gizi Besi, dimana tubuh tidak lagi mempunyai cukup zat besi untuk membentuk hemoglobin yang diperlukan dalam sel-sel darah yang baru (Soekirman 2000 dalam Wulansari, 2006).

Anemia Gizi Besi (AGB) atau disebut juga anemia defisiensi besi ini dapat terjadi karena kurangnya asupan zat besi dari makanan, seperti ikan, daging, hati, dan sayuran hijau tua; meningkatnya kebutuhan tubuh akan besi, yaitu ketika masa pertumbuhan, kehamilan, ataupun pada penderita penyakit menahun; meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh, oleh karena perdarahan, cacingan dan menstruasi.

Raspati (2010) dalam Saifi (2011) menyebutkan bahwa anemia defisiensi besi lebih sering ditemukan di negara yang sedang berkembang sehubungan dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, masukan protein hewani yang rendah dan infestasi parasit yang merupakan masalah endemik. Dengan demikian, kekurangan besi mempunyai dampak yang merugikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, menurunkan daya tahan tubuh, menurunkan konsentrasi belajar dan mengurangi aktivitas kerja.

## 2. Anemia gizi vitamin E

Anemia defisiensi vitamin E dapat mengakibatkan integritas dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga sangat sensitif terhadap hemolisis (pecahnya sel darah merah).

## 3. Anemia gizi asam folat

Anemia gizi asam folat disebut juga anemia megaloblastik atau makrositik; dalam hal ini keadaan sel darah merah penderita tidak normal dengan ciri-ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit dan belum matang. Penyebabnya adalah kekurangan asam folat dan vitamin B12.

#### 4. Anemia gizi vitamin B12

Keadaan dan gejalanya mirip dengan anemia gizi asam folat. Gejalanya meliputi kelelahan, kehilangan nafsu makan, diare, dan murung. Defisiensi berat B12 potensial menyebabkan bentuk anemia fatal yang disebut Pernicious anemia.

#### 5. Anemia gizi vitamin B6

Keadaannya mirip dengan anemia gizi besi, namun bila darahnya diuji secara laboratoris, serum besinya normal. Kekurangan vitamin B6 akan mengganggu sintesis (pembentukan) hemoglobin.

### b. Anemia Non Gizi

#### 1. Anemia Sel Sabit

Penyakit Sel Sabit/ *sickle cell* anemia adalah suatu penyakit keturunan, ditandai dengan sel darah merah yang berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Sel sabit ini rapuh dan akan pecah pada saat melewati pembuluh darah, menyebabkan anemia berat, penyumbatan aliran darah, kerusakan organ bahkan sampai pada kematian.

#### 2. Talasemia

Merupakan penyakit keturunan (genetik) dimana terjadi kelainan darah (gangguan pembentukan sel darah merah) akibatnya tubuh penderita talasemia akan kekurangan oksigen, menjadi pucat, lemah, sesak dan sangat membutuhkan pertolongan yaitu pemberian transfusi darah. Bila tidak segera ditransfusi bisa berakibat fatal, bisa meninggal.

### 3. Anemia Aplastik

Penderita mengalami pansitopenia, yaitu keadaan dimana terjadi kekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Anemia aplastik sering diakibatkan oleh radiasi dan paparan bahan kimia. Akan tetapi, kebanyakan pasien penyebabnya adalah idiopatik, yang berarti penyebabnya tidak diketahui. Anemia aplastik dapat juga terkait dengan infeksi virus dan dengan penyakit lain.

### 3. Gejala Anemia Defisiensi Besi

Sudoyo (2009) menyatakan bahwa gejala anemia defisiensi besi dapat digolongkan menjadi 3 golongan besar, yaitu: Gejala umum anemia, gejala khas akibat defisiensi besi, dan gejala penyakit dasar.

#### a. Gejala Umum Anemia

Gejala umum anemia yang disebut juga sebagai sindrom anemia dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin turun di bawah 7-8 g/dl. Gejala ini berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga mendenging. Pada anemia defisiensi besi karena penurunan kadar hemoglobin yang

terjadi secara perlahan-lahan sehingga seringkali gejalanya tidak terlalu menyolok dibandingkan dengan anemia lain yang penurunan kadar hemoglobinnya terjadi lebih cepat. Hal ini dikarenakan mekanisme tubuh untuk mempertahankan kadar Hb berjalan dengan baik. Anemia bersifat simptomatik (menimbulkan gejala) jika hemoglobin telah turun di bawah 7 g/dl. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah kuku

b. Gejala khas defisiensi besi

Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai pada anemia jenis lain adalah:

- 1) *Koilonychia*: kuku sendok (spoon nail), kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertical dan menjadi cekung sehingga mirip sendok
- 2) *Atrofi papil lidah*: permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap karena papil lidah menghilang
- 3) Stomatitis angularis (*cheilosis*): adanya peradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan
- 4) Disfagia: nyeri menelan karena kerusakan epitel hipofaring
- 5) Pica: keinginan untuk memakan bahan yang tidak lazim, seperti: tanah liat, es, lem dan lain-lain.

c. Gejala penyakit dasar


Pada anemia defisiensi besi dapat dijumpai gejala-gejala penyakit yang menjadi penyebab anemia defisiensi besi tersebut. Misalnya pada anemia akibat

penyakit cacing tambang dijumpai dispepsia, parotis membengkak, dan kulit telapak tangan berwarna kuning seperti jerami. Pada anemia karena perdarahan kronik akibat kanker kolon dijumpai gejala gangguan kebiasaan buang air besar atau gejala lain tergantung dari lokasi kanker tersebut.

#### **4. Penyebab Anemia Defisiensi Besi**

Anemia gizi disebabkan oleh karena tidak tersedia zat-zat gizi dalam tubuh yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Zat-zat yang berperan dalam hemopoesis ialah protein, vitamin, (asam folat, vitamin B12, Vitamin C dan Vitamin E) dan mineral (Fe dan Cu). Tetapi dari sekian banyak penyebab, namun yang paling menonjol menimbulkan hambatan hemopoesis adalah kekurangan zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Namun karena kekurangan asam folat dan vitamin B12 jarang ditemukan pada masyarakat maka anemia gizi selalu dikaitkan sebagai anemia kurang zat besi (Husaini, 1989 dalam Citrakesumasari, 2012).

Berikut merupakan penyebab langsung dan tidak langsung anemia gizi.



Sumber: Husaini,1989

Secara umum, ada tiga penyebab anemia defisiensi zat besi, yaitu (1) kehilangan darah secara kronis sebagai dampak pendarahan kronis, seperti pada penyakit ulkus peptikum, infestasi parasit, dan proses keganasan; (2) asupan zat besi tidak cukup dan penyerapan tidak adekuat; (3) peningkatan kebutuhan akan zat besi

untuk pembentukan sel darah merah yang lazim berlangsung pada masa pertumbuhan, masa pubertas, masa kehamilan dan menyusui (Arisman, 2009).

### **5. Akibat Anemia Defisiensi Besi**

Anemia gizi besi yang terjadi pada anak-anak, baik balita maupun usiasekolah, akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Anak menjadi lemah karena sering terkena infeksi akibat pertahanan tubuhnya menurun. Dalam kegiatan sehari-hari anak menjadi tidak aktif, malas, cepat lelah, dan di sekolah sulit berkonsentrasi dalam belajar, serta cepat mengantuk. Akibat lanjutnya akan mempengaruhi kecerdasan dan daya tangkap anak (Citrakesumasari, 2012)

Anak yang menderita anemia digambarkan sebagai apatis, mudah tersinggung dan kurang memperhatikan sekelilingnya. Kurang zat besi mempunyai hubungan dengan enzim aldehyd-oksidas di dalam otak yang mengakibatkan menurunnya kemampuan memperhatikan sesuatu. Anemia juga menyebabkan daya ingat dan daya konsentrasi menjadi rendah (Ristrini, 1991 dalam Citrakesumasari, 2012).

### **6. Pencegahan Anemia Defisiensi Besi**


Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia pada dasarnya mengatasi penyebabnya. Biasanya terdapat penyakit yang melatar belakangi yaitu antara lain penyakit TBC, infeksi cacing, dan malaria. Sehingga, selain penanggulangan anemia gizi dapat dilakukan pengobatan terhadap penyakit tersebut. pencegahan dan

penanggulangan anemia dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: (Dewi dkk, 2013)

a. Meningkatkan konsumsi makanan yang bergizi

1. Makan makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan makanan hewani (daging, ikan, ayam, hati, telur) dan bahan makanan nabati (sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan padi-padian) dapat mencegah anemia.
2. Makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C (daun katuk, jambu, tomat, jeruk, dan nanas) sangat bermanfaat untuk meningkatkan penyerapan besi dalam usus.

Sesuai dengan firman Allah swt.dalamQS.*Al-An'am*/ 6: 95 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah adalah pembelah butir dan biji.Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan pengeluar yang mati dari yang hidup. Itulah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling”

Berdasarkan ayat tersebut di atas maka kebutuhan manusia akan bahan makanan, maka Allah swt.telah menciptakan bumi untuk pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Dia menumbuhkan dari butir dan biji itu tumbuh-tumbuhan yang juga menghasilkan buah-buahan, semua itu diciptakan oleh Allah swt untuk dinikmati oleh manusia agar dapat bersyukur. Dan apabila ayat di atas

dikaitkan dengan kesehatan bahwa pentingnya tumbuhan dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh.

Makanan yang beraneka ragam memiliki zat gizi yang saling melengkapi. Sayuran dan buah-buahan ditambah kacang-kacangan dan padi-padian yang cukup banyak mengandung zat besi dan vitamin lain untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Mengonsumsi makanan yang cukup beragam jumlah maupun kualitasnya dapat membantu mencegah anemia gizi besi. Namun tetap menjaga gizi seimbang hal ini terkait dengan pesan dalam QS. *Al-A'raf* 7: 31



Terjemahnya:

Hai anak adam pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Maksudnya bahwa kita diharuskan untuk memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi agar tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanlah makanan namun jangan lebih dan jangan kurang dan jangan pula melampaui batas-batas makanan dan minuman yang dihalalkan. karena makan yang berlebihan atau bahkan tidak mencukupi kandungan zat gizinya akan menimbulkan suatu penyakit. Salah satu penyakit yang disebabkan karena ketidakcukupan zat gizi besi dalam tubuh adalah anemia defisiensi besi atau anemia gizi besi.

- b. Menambah pemasukan zat besi kedalam tubuh dengan minum Tablet Tambah darah (TTD)
- c. Mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia seperti: kecacingan, malaria, dan penyakit TBC. Bila penyakit tersebut dapat diatasi, maka kemungkinan terjadinya anemia lebih kecil.

### **7. Metode Pencegahan Anemia Defisiensi Besi**

Untuk mendeteksi keadaan anemia seseorang, parameter yang biasa dan telah digunakan secara luas adalah hemoglobin (Hb), karena pada umumnya tujuan dari berbagai penelitian adalah menetapkan prevalensi anemia dan bukan prevalensi kurang besi (Cook, 1982 dalam Saifi, 2011).

Kadar Hb merupakan indikator yang paling reliabel untuk mengetahui status anemia dalam populasi. Pemeriksaan Hb di lapangan umumnya menggunakan 3 metode yaitu: kertas saring (Talquist), Sahli, Hemocue, dan Cyanmethemoglobin. Metode umum yang direkomendasikan untuk digunakan pada survei prevalensi anemia pada populasi adalah dengan metode *Cyanmethemoglobin* (UNICEF, UNU, WHO, 2001 dalam Saifi 2011).

### **C. Tinjauan Tentang Infeksi Kecacingan**

#### **1. Definisi Kecacingan**

Kecacingan merupakan salah satu mikroorganisme penyebab penyakit dari kelompok helminth (cacing), membesar dan hidup dalam usus halus manusia, Cacing ini terutama tumbuh dan berkembang pada penduduk di daerah yang beriklim panas dan lembab dengan sanitasi yang buruk (Sulistiyorini, 2011)

Beberapa hasil penelitian menunjukkan penyakit cacingan lebih banyak menyerang pada anak - anak sekolah dasar dikarenakan aktifitas mereka yang lebih banyak berhubungan dengan tanah. Cacing sebagai hewan parasit tidak saja mengambil zat-zat gizi dalam usus anak, tetapi juga merusak dinding usus sehingga mengganggu penyerapan zat-zat gizi tersebut. Secara keseluruhan gejala-gejala kecacingan pada anak-anak adalah berbadan kurus dan pertumbuhan terganggu (kurang gizi); Kurang darah (anemia); Daya tahan tubuh rendah, sering-sering sakit, dan lemah. (Sulistyorini, 2011)

Cacing-cacing yang menginfestasi anak dengan prevalensi yang tinggi ini adalah cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*), cacing cambuk/ cacing kremi (*Trichuris trichiura*), cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator Americanus*). Kalau diperhatikan dengan teliti, cacing-cacing yang tinggal di usus manusia ini memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kejadian penyakit lainnya misalnya kurang gizi yang dapat dengan mudah akan jatuh kedalam gizi buruk dengan infestasi cacing gelang yang suka makan karbohidrat dan protein di usus sebelum diserap oleh tubuh dimana 1 ekor cacing akan mengambil karbohidrat 0,14 gram/hari dan protein 0,035 gram/hari, kemudian penyakit anemia (kurang kadar darah) karena cacing tambang suka isap darah di usus dan cacing cambuk suka sekali mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak (Sulistyorini, 2011)

## **2. Hubungan Infeksi Kecacingan dengan Anemia**

Infeksi kecacingan dapat menyebabkan perdarahan kronik dengan menempel pada dinding usus dan memakan jaringan dan darah. Kehilangan darah terjadi karena dimakan oleh cacing dan karena perdarahan mukosa yang rusak. Kehilangan darah 1 ml akan mengakibatkan kehilangan besi 0,5 mg, sehingga kehilangan darah 3-4 ml/hari (1,5-2 mg besi) dapat mengakibatkan keseimbangan negatif besi. Kehilangan darah pada anak disebabkan oleh infestasi cacing (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) yang menyerang usus halus bagian proksimal dan menghisap darah dari pembuluh darah submukosa usus (Chiwille, 2001 dalam Saifi, 2011). Begitu pula dengan Gibney (2008) dalam Saifi (2011) yang menyatakan bahwa di negara tropis, infeksi cacing tambang merupakan penyebab utama kehilangan darah melalui saluran cerna yang turut menimbulkan defisiensi besi pada anak dan orang dewasa.

Zat besi yang hilang per 1.000 telur per gram tinja diperkirakan sekitar 0,8 mg per hari oleh *Necator americanus* dan 1,2 oleh *Ancylostoma duodenale* (Maeyer, 1995 dalam Wijianingsih, 2010)

Infeksi mengganggu masukan makanan, penyerapan, penyimpanan serta penggunaan berbagai zat gizi, termasuk zat besi. Pada banyak masyarakat pedesaan dan daerah urban yang kumuh dimana sanitasi lingkungan buruk, angka kesakitan akibat infeksi virus, kecacingan dan bakteri tinggi. Dalam masyarakat tersebut, makanan yang sering dimakan mengandung sangat sedikit energi. Kalau

keseimbangan zat besi goyah, episode infeksi yang berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya anemia (Maeyer, 1995 dalam Wijianingsih, 2010)

Anemia bisa disebabkan bukan hanya oleh defisiensi zat besi (atau lebih jarang lagi zat-zat gizi lain) tetapi juga oleh kondisi-kondisi lain. Penyakit malaria, cacing tambang (*ancylostomiasis* atau *necatoriasis*), schistosomiasis dan infeksi-infeksi lain berperan penting di daerah-daerah yang beriklim tropis (Maeyer, 1995 dalam Wijianingsih, 2010)

Kehilangan zat besi yang berlebihan pada pendarahan termasuk haid yang berlebihan, dan pada infeksi cacing dimana cacing menyebabkan banyak darah yang keluar, sehingga mengganggu keseimbangan zat besi, dimana zat besi yang dikeluarkan lebih banyak dari zat besi yang masuk menyebabkan seseorang mengalami anemia berat (kadar Hb < 7 gr/dl). Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan selain pada anemianya, harus dilakukan pengobatan terhadap penyakit-penyakit yang melatarbelakangi terjadinya anemia (Depkes RI, 1999 dalam Wijianingsih, 2010).

### **3. Infeksi Cacing yang ditularkan melalui tanah (Soil-Transmitted Helminths)**

Pencemaran tanah dengan tinja manusia merupakan penyebab transmisi telur *A.lumbricoides* dan *T.trichiura* dari tanah kepada manusia melalui tangan dan kuku yang tercemar telur cacing, lalu masuk kemulut melalui makanan (Mahfuddin, 1994 dalam Baharuddin, 2010).

Selain melalui tangan, transmisi telur cacing ini dapat juga melalui makanan dan minuman, terutama makanan jajanan yang tidak dikemas dan tidak tertutup rapat. Telur cacing yang ada di tanah atau debu akan sampai pada makanan tersebut, jika diterbangkan oleh angin, atau dapat juga melalui lalat (media perantara) yang sebelumnya hinggap di tanah/ selokan/ air limbah sehingga kaki-kakinya membawa telur cacing tersebut (Helmy, 2000 dalam Baharuddin, 2010).

Transmisi melalui sayuran yang dimakan mentah (tidak dimasak) dan proses membersihkannya tidak sempurna juga dapat terjadi, terlebih jika sayuran tersebut diberi pupuk dengan tinja segar (Baharuddin, 2010)

Berikut ini akan dibahas jenis cacing yang penulrannya lewat tanah (Puspita, 2009)

a. Cacing Gelang (*Ascaris lumbricoides*)

Diperkirakan diseluruh dunia terdapat 1300 juta orang yang terinfeksi *Ascaris*. Di Indonesia, prevalensi askariasis tinggi, terutama pada anak dengan prevalensi antara 60-90%. Tingginya prevalensi askariasis terkait dengan kondisi sosio-ekonomi yang buruk. Semakin buruk hygiene dan sanitasi, semakin mudah terinfeksi *Ascariasis*.

Seekor cacing betina dapat bertelur sebanyak 100.000-200.000 butir sehari. Diagnosis ditegakkan dengan menemukan telur dalam tinja. Selain itu diagnosis dapat dibuat bila cacing dewasa keluar sendiri baik melalui mulut atau hidung, maupun melalui tinja.

b. Cacing tambang (*Necator americanus* dan *Ancylostoma duodenale*)

Infeksi cacing tambang adalah salah satu infeksi kronik yang paling umum, ditemukan lebih kurang 740 juta kasus di daerah pedesaan baik di negara tropis maupun subtropis. *N.americanus* ditemukan merata di seluruh dunia, sedangkan *A.duodenale* terbatas di area geografis tertentu. Cacing betina *A.duodenale* dapat bertelur 10.000-25.000 butir per hari, sedangkan *N.americanus* 5.000-10.000 butir.

Cacing tambang hidup menempel di dinding usus halus dan mengambil makanannya dengan mengisap darah kapiler mukosa usus. Tidak mengherankan kalau infeksi cacing tambang menyebabkan anemia defisiensi besi di negara-negara berkembang.

c. Cacing Cambuk (*Trichuris trichura*)

Cacing ini ditemukan di daerah panas dan lembab. Diperkirakan 1049 juta orang terinfeksi cacing ini, termasuk diantaranya 114 balita dan 233 juta anak usia sekolah (5-14 tahun). Prevalensi 98% ditemukan pada anak usia sekolah di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang penting untuk penyebaran penyakit ini adalah kontaminasi tanah dengan tinja. Telur tumbuh di tanah liat, tempat lembab dan teduh. Seekor cacing betina diperkirakan menghasilkan telur setiap hari antara 3000-10.000 butir. Di beberapa negeri, tinja dipakai sebagai pupuk kebun yang merupakan sumber infeksi.

Pada infeksi berat, terutama pada anak, cacing ini kadang terlihat di mukosa rektum akibat mengejanya penderita pada waktu defekasi. Cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus, hingga terjadi peradangan mukosa usus dan

menimbulkan iritasi. Disamping itu cacing ini mengisap darah hospesnya, sehingga dapat menyebabkan anemia.

Penderita terutama anak dengan infeksi *T.trichura* yang berat dan menahun, menunjukkan gejala-gejala nyata seperti diare yang sering diselingi dengan sindrom disentri, anemia, dan berat badan menurun.

#### 4. Dampak Infeksi Cacingan pada Anak

Kecacingan jarang sekali menyebabkan kematian secara langsung, namun sangat memengaruhi kualitas hidup penderitanya. Infeksi cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*) yang berat akan menyebabkan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak. Infeksi cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) mengakibatkan anemia defisiensi besi, sedangkan cacing cambuk (*Trichuris trichiura*) menimbulkan morbiditas yang tinggi (Soedarto, 1999 dalam Baharuddin, 2010).

Berbagai penelitian membuktikan bahwa sebagian kalori yang dikonsumsi manusia tidak dimanfaatkan badan karena adanya parasit dalam tubuh. Pada infeksi ringan akan menyebabkan gangguan penyerapan nutrien kurang lebih 3% dari kalori yang dicerna, pada infeksi berat 25% dari kalori yang dicerna tidak dapat dimanfaatkan oleh badan. Cacing gelang (*Ascaris lumbricoides*) yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekurangan kalori protein (Hidayat, 2002 dalam Baharuddin, 2010).

Pada infeksi cacing kremi (*Trichuris trichiura*) berat sering dijumpai diare darah, turunnya berat badan dan anemia. Anemia berat ini dapat terjadi karena infeksi *Trichuris trichiura* mampu menghisap darah sekitar 0,005 ml/hari/cacing dan menurunkan hemoglobin 30% di bawah normal. Seekor cacing tambang (*Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*) mampu menghisap darah 2 ml per hari. Apabila terjadi infeksi berat, maka penderita akan kehilangan darah secara perlahan dan dapat menyebabkan anemia berat (Gandahusada dkk, 2004 dalam Baharuddin, 2010).

## 5. Pencegahan Infeksi Kecacingan

Infeksi kecacingan dapat dilakukan dengan tiga tahap pencegahan sebagai berikut: (Riama, 2011)

### 1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan kesehatan oleh petugas kesehatan tentang kecacingan dan sanitasi lingkungan atau meningkatkan perilaku hygiene perorangan.

### 2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dapat dilakukan dengan memeriksakan diri ke puskesmas atau rumah sakit dan memakan obat cacing tiap 6 bulan sekali.

### 3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier dapat dilakukan dengan melakukan tindakan medis berupa operasi.

## 6. Diagnosis Kecacingan

Untuk mendiagnosis kecacingan banyak cara dan tehniknya, namun cara yang lazim dilakukan ialah memeriksa tinja segar dengan membuat sediaan langsung (direct smear). Untuk pemeriksaan ini sebaiknya jangan diambil tinja yang sudah kering atau yang lama (lebih dari 24 jam) karena telur cacing tambang dalam tinja yang agak basah dalam waktu itu akan menetas dan sukar untuk diidentifikasi. Cara yang dianjurkan internasional adalah cara Kato Katz (Endrawati, 2012)

#### **D. Tinjauan Tentang Anak Jalanan**

##### **1. Definisi Anak Jalanan**

Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial, (2001) dalam Puspareni (2012) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Dalam mencari nafkah, ada beberapa anak yang rela melakukan kegiatan mencari nafkah di jalanan dengan kesadaran sendiri, namun banyak pula anak-anak yang dipaksa untuk bekerja di jalan (mengemis, mengamen, menjadi penyemir sepatu, dan lain-lain) oleh orang-orang di sekitar mereka, entah itu orang tua atau pihak keluarga lain, dengan alasan ekonomi keluarga yang rendah. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun, berada di jalanan lebih dari 4 jam dalam satu hari, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, dan mobilitasnya tinggi.

Selain itu dijelaskan oleh Departemen Sosial RI (2001) dalam Puspareni (2012) indikator anak jalanan menurut usianya adalah anak yang berusia berkisar antara 6 sampai 18 tahun

Menurut Shalahuddin (2000) dalam Pratiwi (2010) yang dimaksud anak jalanan adalah individu yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya. Jalanan yang dimaksudkan tidak hanya merujuk pada “jalanan” saja, melainkan juga tempat-tempat lain seperti pasar, pusat pertokoan, taman kota, alun-alun, terminal, dan stasiun.

Shalahuddin (2007) dalam Pratiwi (2010) mengkategorikan anak jalanan menjadi beberapa macam diantaranya adalah anak jalanan yang melakukan kegiatan di jalan tapi masih pulang ke rumah baik rutin maupun tidak rutin, anak jalanan yang seluruh waktunya berada di jalanan dan cenderung tidak memiliki hubungan dengan orang tua maupun keluarga lagi, serta anak jalanan yang dilahirkan dari keluarga yang tinggal di jalanan.

Anak jalanan adalah anak yang berusia 5–18 tahun baik laki-laki maupun perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan, memiliki komunikasi yang minimal atau sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga dan kurang pengawasan, perlindungan dan bimbingan sehingga rawan terkena gangguan kesehatan dan psikologi (UNICEF, 2001 dalam Aini, 2009).

## **2. Kategori Anak Jalanan**

Hasil penelitian dan penanganan anak jalanan di beberapa kota besar menunjukkan ada dua kategori anak jalanan yaitu (Aini, dkk, 2009):

Pertama, *children of the street*, tipe ini adalah anak yang hidup dan tinggal di jalanan, tidak berhubungan lagi dengan keluarganya dan di lingkungan anak-anak jalanan

biasanya disebut gelandangan, gembel, tekyan dan sebagainya. Mereka biasanya tidak mempunyai tempat tinggal maupun pekerjaan yang tetap sehingga banyak diantara mereka terlibat dalam pencurian, kriminalitas dan penggunaan NARKOBA (Narkotik, Alkohol, Obat dan Bahan Adiktif).

Kedua, *children on the street also called working children*. Di Indonesia jenis anak ini disebut pekerja anak di jalan yakni anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalan atau tempat-tempat umum untuk membantu keluarganya. Pada umumnya mereka bekerja untuk memperoleh pendapatan sehingga biasanya mereka relatif tidak banyak menggunakan waktu luang untuk hal lain seperti penggunaan NARKOBA.

### **3. Faktor- faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Anak Jalanan**


Handayani (2009) dalam Herdiana (2012) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak harus bertahan hidup dijalanan, diantaranya seperti kondisi ekonomi keluarga, konflik internal rumah tangga, serta konflik hubungan antara anak-orang tua.

Rikawarasturi (2003) dalam Herdiana (2012) membeberkan fakta yang didapatkan dari data laporan UNICEF. Dari laporan tersebut diketahui bahwa dari 100 juta anak yang hidup di negara berkembang dan harus bekerja di jalanan, maka 75% dari jumlah anak tersebut kembali ke rumahnya setiap malam hari, namun 25% sisanya tidak dapat kembali ke rumahnya dengan berbagai alasan. Anak-anak jalanan tersebut tinggal di suatu tempat yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk

mengalami berbagai macam hal, diantaranya adalah menjadi korban pelecehan seksual, hingga kondisi yang buruk dalam hal kesehatan, nutrisi, serta kebersihan.

Dari beberapa laporan penelitian yang dikutip dari Shalahuddin (2000) dalam Kushartati (2004) terungkap bahwa ada berbagai faktor pendorong dan penarik yang menyebabkan anak turun kejalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor-faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu : kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman.

E. Kerangka Fikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan:

-  = Variabel yang diteliti (Variabel Independen)
-  = Penghubung antar variabel
-  = Variabel yang diteliti (Variabel Dependen)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, merupakan suatu jenis penelitian yang mengukur data berupa angka dan analisis menggunakan statistik. Kemudian hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. (Sugiyono, 2013).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai wilayah yang memiliki jumlah anak jalanan tertinggi di Kota Makassar. Sedangkan untuk mengetahui infeksi kecacingan dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional study* yaitu suatu penelitian yang melihat hubungan antara variabel independen (asupan zat besi dan infeksi kecacingan) dengan variabel dependen (kejadian anemia), dimana observasi atau pengukuran variabel dilakukan sekaligus pada waktu yang sama.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. (Notoatmodjo, 2012)

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak jalanan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar, yaitu sebanyak 162 anak jalanan.

#### **2. Sampel**

Sample adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. (Notoatmodjo, 2012)

Sampel dalam penelitian ini adalah anak jalanan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar yang berjumlah 34 anak jalanan yang diambil dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan yakni mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Anak jalanan yang berumur 6-12 tahun
- b. Bersedia untuk diwawancarai serta bersedia diambil darah dan fesesnya
- c. Tidak meminum obat cacing dalam 6 bulan terakhir

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer yang dikumpulkan adalah data-data yang merupakan variabel dependen dan

independen penelitian. Adapun data untuk variabel dependen adalah kejadian anemia dan variabel independen penelitian, yaitu: asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan. Adapun prosedur pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

a. Asupan Zat Besi (Fe)

Data tentang Asupan zat besi (Fe) diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden yaitu dengan menggunakan metode *recall* 2x24 yang kemudian dibandingkan dengan AKG. Langkah pelaksanaan recall 24 jam yaitu:

1. Responden diminta untuk mengingat seluruh makanan yang dikonsumsi sebelumnya
2. Pewawancara menanyakan dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga (URT) selama kurun waktu 24 jam yang lalu
3. Menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM)
4. Membandingkan dengan Daftar Kecukupan Gizi Angka yang dianjurkan (DKGA) atau Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia

$$\text{AKG Fe Individu} = \frac{\sum (B \cdot p \cdot s \cdot p_t)}{B \cdot s \cdot d_t \cdot t_t \cdot (A)} \times A \cdot p \cdot t_t$$

Selanjutnya pencapaian AKG (tingkat konsumsi Fe) untuk Individu tersebut adalah

$$\text{Tingkat konsumsi Fe} = \frac{R - r}{A \cdot F \cdot I} \times 100\%$$

**Sumber: Supriasa, 2001**

## b. Infeksi Kecacingan

Data tentang Infeksi kecacingan diperoleh melalui pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan feses dengan menggunakan metode *Kato Katz*.

### 1. Metode Pemeriksaan *Kato Katz*

Pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan kualitatif dan kuantitatif. Pemeriksaan kualitatif bertujuan untuk mengetahui apakah orang yang diperiksa positif atau negatif kecacingan, sedangkan pemeriksaan kuantitatif untuk mengetahui jumlah telur cacing per gram tinja (EPG) pada setiap jenis cacing, sehingga dapat pula diketahui intensitas infeksi cacing. Teknik pemeriksaan yang umum dilakukan adalah metode *Kato-Katz* (Endrawati, 2012).

### 2. Cara Pengumpulan Data Spesimen

Responden terlebih dahulu diberikan penjelasan terkait tujuan penelitian ini, selanjutnya responden diberikan penjelasan tentang cara pengambilan fesesnya. Disarankan mengambil tinja pada pagi hari, sebanyak kurang lebih dua ujung sendok kayu yang telah disediakan bersama pot tinja atau sekitar 150 mg. Pot tinja yang akan dibagikan sudah diisi sebelumnya dengan beberapa tetes formalin untuk mempertahankan telur cacing agar tidak menetas. Setelah semuanya jelas, kemudian dibagikan pot tinja yang telah diberikan kode sesuai dengan kode yang tertulis pada kuesioner identitas responden. Keesokan harinya, pot-pot tinja tersebut dikumpulkan dan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa dengan metode *Kato-Katz*.

### *Bahan dan Cara Pengumpulan Feses*

#### I. Alat dan Bahan

- a. Objek Glass
- b. Selotip (tebal:  $\pm 40 \mu\text{m}$ , ukuran: 7 x 2,5 cm)
- c. Kawat kasa ukuran 3 x 3 cm untuk menyaring feses
- d. Karton tebal yang diberi lubang dengan volume tertentu, sehingga tinja yang dicetak dengan karton tersebut dapat diketahui beratnya
- e. Lidi
- f. Kertas minyak
- g. Larutan malachite-green-gliserin (100 ml gliserin + 100 ml akuades + 1 ml 3% malachite-green).
- h. Feses yang akan diperiksa

#### II. Prosedur Kerja

- a. Selotip terlebih dahulu direndam dalam larutan malachite-green-gliserin minimal dalam waktu 1 x 24 jam.
- b. Tinja diletakkan di atas kertas minyak, kemudian kawat kasa diletakkan di atas tinja tersebut dan ditekan, sehingga feses akan tersaring melalui kasa tersebut.
- c. Karton yang telah dilubangi diletakkan di atas objek glass, kemudian feses yang telah disaring dicetak sebesar lubang karton.

- d. Berat tinja yang tercetak pun dapat diketahui. Kemudian ditutup dengan potongan selotip dengan meratakan tinja diseluruh permukaan selotip sampai sama tebal dengan menggunakan gelas objek lain
- e. Sediaan dibiarkan pada temperatur kamar selama minimal 30-60 menit agar menjadi transparan.
- f. Seluruh permukaan selotip tersebut diperiksa dengan mikroskop pada perbesaran lemah. Jumlah telur cacing yang ditemukan dihitung, perhitungan jumlah telur cacing untuk tiap spesies cacing usus dilakukan secara terpisah.

### III. Cara Menghitung Telur Cacing Usus

Perhitungan telur cacing merupakan hasil pemeriksaan tinja secara kuantitatif dengan cara menghitung jumlah telur per gram tinja (Egg Per Gram/ EPG) untuk tiap jenis cacing, sehingga intensitas kecacingan dapat diketahui. Adapun perhitungan intensitas kecacingan adalah sebagai berikut:

$$\text{Intensitas kecacingan} = \frac{\text{jumlah telur cacing (tiap jenis cacing)}}{\text{jumlah sampel yang positif kecacingan}} \times \frac{1000}{R}$$

Keterangan: R = berat tinja sesuai ukuran lubang karton (40 mg)

### **Klasifikasi Intensitas Infeksi**

Klasifikasi intensitas infeksi merupakan angka serangan dari masing-masing jenis cacing. Klasifikasi tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu ringan, sedang dan berat. Intensitas infeksi menurut jenis cacing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1

## Klasifikasi Intensitas Infeksi Menurut Jenis Cacing

No.	Klasifikasi	Jenis Cacing		
		Cacing Gelang ( <i>Ascaris lumbricoides</i> )	Cacing Cambuk ( <i>Trichuris trichiura</i> )	Cacing Tambang ( <i>Ancylostoma duodenale</i> dan <i>Necator americanus</i> )
1.	Ringan	1 - 4.999	1 – 999	1 – 1.999
2.	Sedang	5.000 - 49.999	1.000 - 9.999	2.000 – 3.999
3.	Berat	50.000	10.000	4.000

Sumber : Endrawati, 2012

## c. Kejadian anemia

Data tentang kejadian anemia diperoleh melalui pemeriksaan Hb dengan menggunakan metode *Cyanmethemoglobin* kemudian dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

## I. Alat dan Bahan

## a. Alat

Hb digital, Check strip, Lancet, Kapas steril, Alkohol 70%

## b. Bahan

Darah

## II. Prosedur Pemeriksaan

## a. Siapkan peralatan

b. Bersihkan jari yang akan diambil darahnya terlebih dahulu dengan kapas yang mengandung alkohol.

c. Gunakan auto lancet untuk mengambil darah pada jari yang telah diolesi alkohol.

- d. Buang darah pertama yang menetes dengan mengusapnya dengan kapas alkohol, selanjutnya tetesan darah kedua diambil menggunakan check strip
- e. Lakukan pemeriksaan pada alat Hb digital

## 2. Data Sekunder

Diperoleh melalui penelusuran pustaka, jurnal-jurnal hasil penelitian, buku literatur yang relevan, instansi terkait dalam hal ini data tentang jumlah anak jalanan diperoleh dari Dinas Sosial Kota Makassar dan data penderita infeksi kecacangan yang diperoleh dari Dinas Kesehatan kota Makassar

### E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### 1. Formulir *Food recall*

Formulir *food recall* digunakan untuk mengukur variabel kebiasaan makan yang terdiri dari bahan makanan yang mengandung zat besi, dimana pewawancara menanyakan apa yang telah dikonsumsi oleh responden pada periode 24 jam kemarin.

#### 2. *Food Frequence Questionnaire* (FFQ)

Formulir FFQ digunakan untuk mengetahui frekuensi konsumsi sumber zat besi dan konsumsi penghambat penyerapan zat besi.

#### 3. Timbangan digital untuk mengukur berat badan

4. Analisis data konsumsi zat besi dihitung dengan menggunakan Software Nutri Survey.

5. Pengukuran kadar hemoglobin untuk mengetahui kejadian anemia dengan metode *cyanmethemoglobin*.
6. Pot tinja digunakan untuk pengambilan sampel tinja/ feses anak jalanan. Kemudian dilakukan pengukuran infeksi kecacingan dengan diperiksa di laboratorium menggunakan metode Kato Katz.
7. Komputer untuk pengolahan data.

#### **F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan komputer sebagai berikut:

##### **1. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul, lalu dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

- a. *Editing*: Dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh semua telah diisi, relevan, dan dapat dibaca dengan baik.
- b. *Coding*: Setelah memperoleh semua data, kemudian dilakukan identifikasi, klasifikasi kemudian diberi kode.
- c. *Entry data*: Memasukkan data yang telah diberi kode pada lembar hasil pengukuran untuk diproses secara komputerisasi.
- d. *Cleaning*: Melakukan pengecekan kembali data-data yang sudah dientry apakah ada kesalahan atau tidak.

- e. *Tabulasi data*: Setelah instrument diisi dengan baik, maka data kemudian ditabulasi disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (Riyanto, 2011).

## 2. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini berupa analisis univariat dan analisis bivariat.

### a. Analisis Univariat

Analisis ini dilakukan pada masing-masing variabel. Hasil ini berupa distribusi dan persentase setiap variabel, baik variabel dependen yaitu kejadian anemia maupun variabel independen yaitu asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan

### b. Analisis Bivariat

Analisa ini dilakukan untuk melihat apakah ada hubungan yang bermakna antara variabel dependen yaitu kejadian anemia dengan variabel independen yaitu asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan.

Pada analisis ini uji statistik yang digunakan yaitu uji Chi – Square dengan bantuan SPSS untuk mengetahui ada tidaknya hubungan variabel dependen dengan variabel independen. Melalui uji statistik chi square akan diperoleh nilai p, dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0.05. Penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai p  $\leq$  0.05 dan dikatakan tidak bermakna jika mempunyai nilai p  $>$  0.05.

## **G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

### **a. Validitas**

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan pengukuran, valid artinya alat tersebut mengukur apa yang ingin di ukur. (Riyanto, 2011)

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan pengukuran berat badan, maka perlu dilakukan pengkalibrasian terhadap alat ukur yang digunakan untuk memastikan validitasnya. Adapun cara untuk mengkalibrasi alat ukur berat badan adalah selalu memastikan timbangan masih berfungsi dengan baik serta angka pada timbangan digital selalu menunjukkan skala 0 kg.

Untuk menguji validitas metode *recall*, dilakukan dengan membandingkannya dengan metode lainnya. Ini dilakukan karena tidak adanya suatu metode baku (gold standard) yang dapat mengukur konsumsi yang sebenarnya dari responden. Metode pembandingnya yaitu dengan penimbangan bahan makanan. Metode ini dilakukan apabila bahan makanan responden masih tersedia. Namun apabila bahan makanan responden sudah tidak tersedia, maka metode pembanding lainnya yang dapat digunakan yaitu menanyakan jumlah bahan makanan responden melalui buku foto makanan.

Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkn data yang valid dan reliable yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrument penelitiannya (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, keseluruhan unsur validitas yaitu alat pengukur Hb dan uji laboratorium feses sudah sesuai dengan standar validitas yang ada, artinya semua telah sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan sehingga ke semua unsur dapat berjalan sesuai dengan nilai fungsionalitasnya.

#### **b. Reliabilitas**

Reliabilitas ialah kestabilan pengukuran, alat dikatakan reliabel jika digunakan berulang-ulang nilai sama. (Riyanto, 2011)

Untuk menjaga tingkat reliabilitas dari timbangan berat badan maka dilakukan pengulangan pengukuran sebanyak dua kali agar data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya.

Metode recall 24 jam harus dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan nilai reliabilitas yang lebih maksimal. Jadi untuk mendapatkan tingkat reliabilitasnya dalam penelitian ini dilakukan recall sebanyak 2x24 jam.

Reliabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peralatan dan prosedur kerja yang dilakukan. Dalam hal ini adalah pengujian kadar Hb dan uji laboratorium untuk feses responden. Untuk melakukan suatu tes pemeriksaan, terdapat standar prosedur kerja untuk berbagai jenis pengujian. Dalam reliabilitas uji kadar Hb dilakukan pengujian berulang terhadap beberapa responden penelitian dengan harapan hasil yang didapatkan sama. Namun dalam pengujian feses responden, reliabilitas ditekankan pada kesamaan dan ketetapan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah Kecamatan Mariso Kota Makassar terdiri atas 9 kelurahan yakni Kelurahan Bontorannu, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Mattoanging, Kelurahan Kampung Buyang, Kelurahan Mariso, Kelurahan Lette, Kelurahan Mario, Kelurahan Panambungan, Kelurahan Kunjun Mae. Luas wilayah Kecamatan mencapai 1,82 km<sup>2</sup> dengan dengan batas-batas wilayah mencakup :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Ujung Pandang.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Mamajang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tamalate.
4. Sebelah Barat : Selat Makassar.

Kecamatan Mariso Kota Makassar memiliki jumlah penduduk sebanyak 67.589 jiwa yang terdiri dari 16.880 rumah tangga. Jumlah RW di Kecamatan Mariso yakni 47 Rw yang terdiri dari 216 RT.

Fasilitas pendidikan yang ada yaitu TK sebanyak 6 unit, SD sebanyak 23 unit, SLB sebanyak 1 unit, SLTP sebanyak 6 unit, SMU/SMK sebanyak 6 unit dan ST/UNIV sebanyak unit.

Fasilitas kesehatan yang berada di Kecamatan Mariso Kota Makassar yaitu Puskesmas sebanyak 3 unit, Poliklinik sebanyak 1 unit, Balai Kesehatan Ibu dan

Anak (BIKA) sebanyak 1 unit, sebanyak 9 Posyandu, Dokter praktker 7 klinik, Bidan praktek 2 klinik.

## 2. Karakteristik Sampel

### a. Umur

Tabel 4.1

#### Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

Umur (Tahun)	n	%
7-9	9	26.5
10-12	25	73.5
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel terdapat pada kelompok umur 10-12 tahun yaitu sebanyak 25 orang (73.5%) dari 34 sampel sedangkan selebihnya atau sebanyak 9 orang (26.5%) berada pada kelompok umur 7-9 tahun.

### b. Jenis Kelamin

Tabel 4.2

#### Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

Jenis Kelamin	n	%
Laki-laki	19	55.9
Perempuan	15	44.1
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 19 orang (55.9%) dari 34 orang sedangkan sampel berjenis kelamin perempuan sebanyak 15 orang (44.1%).

### c. Kelurahan Tempat Tinggal

**Tabel 4.3**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kelurahan Tempat Tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Kelurahan</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Panambungan	22	64.7
Lette	12	35.3
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel bertempat tinggal di kelurahan Panambungan sebanyak 22 orang (64.7%) dari 34 sampel sedangkan selebihnya atau 12 sampel (35.3%) berada di kelurahan Lette.

### d. Jenis Pekerjaan

**Tabel 4.4**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Jual kantong plastik	22	64.7
Mengamen	8	23.5
Mengamen dan Jual kantong plastik	3	8.8
Mengamen dan tukang parkir	1	2.9
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel. 4.4 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel bekerja sebagai penjual kantong plastik yaitu sebanyak 22 orang (64.7%) dari 34 sampel sedangkan yang paling sedikit bekerja sebagai pengamen dan tukang parkir yaitu hanya 1 orang (2.9%).

e. **Tingkat Pendidikan**

**Tabel 4.5**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Putus Sekolah SD	2	5.9
Sekolah SD	32	94.1
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel yang sekolah SD ada sebanyak 32 orang (94.1%) dari 34 sampel sedangkan putus sekolah SD terdapat 2 orang (5.9%).

f. **Status Tinggal dengan Orang Tua**

**Tabel 4.6**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Status Tinggal dengan Orang Tua di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Tinggal dengan Orang Tua</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Ya	32	94.1
Tidak	2	5.9
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sebagian besar sampel tinggal dengan orang tua yaitu sebanyak 32 orang (94.1) dan ada 2 orang (5.9%) yang tidak tinggal dengan orang tua.

### 3. Asupan Zat Besi (Fe)

**Tabel 4.7**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Asupan Zat Besi (Fe) di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Asupan Zat Besi (Fe)	n	%
Cukup	10	29.4
Kurang	24	70.6
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.7 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan asupan zat besi pada anak jalanan di Kecamatan Mariso dengan kategori cukup sebanyak 10 orang (29.4%) dan kategori kurang sebanyak 24 orang (70.6%).

#### a. Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi

**Tabel 4.8**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi	n	%
Cukup	16	47.1
Kurang	18	52.9
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.8 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan frekuensi konsumsi sumber zat besi pada anak jalanan di Kecamatan Mariso yaitu sebanyak 16 orang (47.1%) berada pada kategori cukup dan sebanyak 18 orang (52.9%) berada pada kategori kurang.

**b. Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi**

**Tabel 4.9**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Jarang	16	47.1
Sering	18	52.9
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.9 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi pada anak jalanan di Kecamatan Mariso dengan kategori jarang sebanyak 16 orang (47.1%) dan kategori sering sebanyak 18 orang (52.9%)

**4. Infeksi Kecacingan**

**Tabel 4.10**

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Infeksi Kecacingan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Infeksi Kecacingan</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Infeksi	21	61.8
Tidak Infeksi	13	38.2
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.10 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan infeksi kecacingan pada anak jalanan di Kecamatan Mariso dengan kategori infeksi sebanyak 21 orang (61.8%) dan kategori tidak infeksi sebanyak 13 orang (38.2%)

Tabel 4.11

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Cacing yang Terdapat pada Tinja di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Jenis Cacing</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
<i>Ascaris lumbricoides</i>	17	50.0
<i>Trichuris trichiura</i>	1	2.9
<i>Trichuris trichiura</i> + <i>Ascaris lumbricoides</i>	2	5.9
<i>Hymnolepis Nana</i> + <i>Ascaris lumbricoides</i>	1	2.9
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>61.8</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.8 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan jenis cacing pada anak jalanan di Kecamatan Mariso dengan jenis cacing yang paling banyak terdapat pada tinja sampel adalah *Ascaris lumbricoides* atau cacing gelang sebanyak 17 orang (55.3%) dan jumlah cacing yang paling sedikit adalah *Trichiuris trichiura* dan *Hymnolepis Nana* + *Ascaris lumbricoides* masing-masing berjumlah 1 orang (4.8%)

## 5. Kejadian Anemia

Tabel 4.12

**Distribusi Anak Jalanan Berdasarkan Kejadian Anemia di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

<b>Kejadian Anemia</b>	<b>n</b>	<b>%</b>
Anemia	18	52.9
Tidak Anemia	16	47.1
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.12 menunjukkan distribusi sampel berdasarkan kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso dengan kategori anemia sebanyak 18 orang (52.9%) dan kategori tidak anemia sebanyak 16 orang (47.1%)

## 6. Hubungan Asupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia

### a. Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan.

Tabel 4.13

#### Analisis Hubungan Asupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014

Asupan Zat Besi (Fe)	Kejadian Anemia				Total		p value
	Tidak Anemia		Anemia		N	%	
	n	%	n	%			
Cukup	10	100.0	0	0	10	100	0,000
kurang	6	25.0	18	75.0	24	100	
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2014

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 10 orang dengan asupan zat besi yang cukup semuanya tidak anemia (100.0%). Sedangkan dari 24 orang dengan asupan zat besi yang kurang terdapat 6 orang (25.0%) tidak anemia dan 18 orang (75.0%) anemia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $P=0,000 < (\alpha=0,05)$  maka hipotesis  $H_a$  diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso.

### 1) Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi

**Tabel 4.14**

**Distribusi Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi Berdasarkan kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Frekuensi Konsumsi Sumber Zat Besi	Kejadian Anemia				Total	
	Tidak Anemia		Anemia			
	n	%	n	%	N	%
Cukup	10	62.5	6	37.5	16	100
Kurang	6	33.3	12	66.7	18	100
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 16 orang dengan frekuensi konsumsi sumber zat besi cukup terdapat 10 orang (62.5%) yang tidak anemia dan 6 orang (37.5%) anemia. Sedangkan dari 18 orang dengan konsumsi sumber zat besi kurang terdapat 6 orang (33.3%) yang tidak anemia dan 12 orang (66.7%) anemia.

### 2) Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi

**Tabel 4.15**

**Disribusi Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi Berdasarkan kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Frekuensi Konsumsi Penghambat Penyerapan Zat Besi	Kejadian Anemia				Total	
	Tidak Anemia		Anemia			
	n	%	n	%	N	%
Jarang	10	62.5	6	37.5	16	100
Sering	6	33.3	12	66.7	18	100
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa dari 16 orang dengan konsumsi penghambat penyerapan zat besi yang jarang terdapat 10 orang (62.5%) tidak anemia dan 6 orang (37.5%) anemia. Sedangkan dari 18 orang dengan konsumsi

penghambat penyerapan zat besi sering terdapat 6 orang (33.3%) yang tidak anemia dan 12 orang (66.7%) anemia.

## 7. Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia

### b. Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan

**Tabel 4.16**

**Analisis Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Infeksi Kecacingan	Kejadian Anemia				Total		pvalue
	Tidak Anemia		Anemia		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Infeksi	4	6.1	9	6.9	13	100	<b>0.134</b>
Infeksi	12	57.2	9	42.9	21	100	
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 21 orang yang infeksi kecacingan terdapat 12 orang (57.2%) tidak anemia dan 9 orang (42.9%) mengalami anemia. Sedangkan dari 13 orang yang tidak infeksi kecacingan terdapat 4 orang (6.1%) tidak anemia dan 9 orang (6.9%) mengalami anemia.

Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *Chi-Square* diperoleh nilai  $P=0,134 > (\alpha=0,05)$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan di kecamatan mariso.

### a. Jenis Cacing

**Tabel 4.17**

**Distribusi Jenis Cacing Berdasarkan Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Jenis Cacing	Kejadian Anemia				Total	
	Tidak Anemia		Anemia		N	%
	n	%	n	%		
<i>Ascaris lumbricoides</i>	11	64.7	6	35.3	17	100
<i>Trichuris trichiura</i>	0	0	1	100	1	100
<i>Trichuris trichiura</i> + <i>Ascaris lumbricoides</i>	1	50.0	1	50.0	2	100
<i>Hymenolepis Nana</i> + <i>Ascaris lumbricoides</i>	0	0	1	100	1	100
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>57.1</b>	<b>9</b>	<b>42.9</b>	<b>21</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Primer, 2014*

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa dari 17 orang yang terinfeksi jenis cacing *Ascaris lumbricoides* terdapat 6 orang (35.3%) anemia dan 11 orang (64.7%) tidak anemia. Sedangkan jenis cacing yang paling sedikit menginfeksi, ditemukan pada *Trichuris trichiura* dan *Hymenolepis Nana* + *Ascaris lumbricoides* masing-masing sebanyak 1 orang (100.0%) menderita anemia.

### B. Pembahasan

#### 1. Hubungan Asupan Zat Besi (Fe) dengan Kejadian Anemia

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *fisher's exact test* diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada anak jalanan. Maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan yang asupan zat besinya kurang akan menimbulkan kejadian anemia pada anak jalanan.

Asupan zat besi yang kurang, didominasi oleh anak yang anemia sebanyak 18 orang (75.0%) artinya dapat dikatakan bahwa kurangnya asupan zat besi dapat

menyebabkan terjadinya anemia. Hal ini mengindikasikan pentingnya peranan zat besi dalam proses pembentukan sel darah merah. Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa zat besi adalah salah satu mineral mikro yang penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Secara alamiah zat besi diperoleh dari makanan. Kekurangan zat besi dalam menu makanan sehari-hari dapat menimbulkan penyakit anemia gizi atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nancy (2013) pada anak sekolah dasar di Kota Manado bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kejadian anemia, dimana asupan zat besi pada anak sekolah dasar di Kelurahan Bunaken tergolong kurang yaitu, 29,3% dengan prevalensi anak yang anemia sebesar 6,7%.

Dalam penelitian ini terdapat anak jalanan yang asupan zat besinya kurang tetapi tidak anemia yaitu sebanyak 6 orang (25,0%). Hal ini mengindikasikan bahwa mereka yang asupan zat besinya kurang tidak akan langsung menyebabkan anemia. Perlu kita ketahui bahwa anemia berkembang secara bertahap seiring dengan kondisi dimulainya penurunan kadar zat besi di dalam darah tetapi jumlah sel darah merah tetap konstan. Ketika asupan zat besi terus berkurang dan kondisi ini tidak diperhatikan maka akan berlanjut menjadi penurunan total zat besi yang akan menyebabkan anemia defisiensi besi atau anemia gizi besi beserta gejala-gejalanya.

Menurut Adriani dan Bambang (2012) ada tiga tahap defisiensi besi, tahap pertama terjadi bila simpanan besi berkurang yang terlihat dari penurunan feritin

dalam plasma. Pada tahap ini belum terjadi perubahan fisiologis pada tubuh. Tahap kedua terlihat dengan habisnya simpanan besi, menurunnya jenuh transferin dan meningkatnya protoporfirin yaitu bentuk pendahulu heme. Pada tahap ini nilai hemoglobin di dalam darah sedikit menurun namun masih berada pada 95% nilai normal. Pada tahap ketiga terjadi anemia gizi besi, dimana kadar hemoglobin total turun dibawah nilai normal.

Asupan zat besi sangat berperan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso. Hal ini dibuktikan oleh konsumsi sumber zat besi yang diperoleh dari formulir (*Food Frequency Questionnaire*) FFQ satu bulan terakhir pada anak jalanan berhubungan dengan terjadinya anemia. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran konsumsi sumber zat besi baik terdapat 10 orang (62,5%) anak jalanan tidak menderita anemia. Konsumsi sumber zat besi yang kurang akan berkorelasi dengan banyaknya jumlah anak jalanan yang menderita anemia yaitu sebanyak 12 orang (66,7%) dibandingkan yang konsumsi zat besinya baik. Artinya anak jalanan yang konsumsi sumber zat besi dalam kehidupan sehari-harinya kurang lebih banyak memberikan kontribusi terhadap kejadian anemia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan *food recall* 2x24 jam dan *food frekuensi* kepada anak jalanan yang menjadi sampel, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar anak jalanan kurang mengkonsumsi sayuran dan buah, serta pola konsumsi makan dari mereka belum bervariasi. Hal ini terlihat dari variasi menu yang dikonsumsi pagi juga kembali dikonsumsi siang bahkan sampai malam hari. Tidak hanya itu kebanyakan dari mereka juga kurang mengkonsumsi

makanan yang berasal dari sumber *heme* (bahan pangan hewani) dibanding sumber *non heme* (bahan pangan nabati). Hal ini dikarenakan bahan makanan sumber *non heme* seperti tempe dan tahu tergolong murah dan mudah di dapatkan untuk menu hidangan sehari-hari. Walaupun sering mengkonsumsi tetapi porsi tiap kali konsumsi sedikit, dapat juga mempengaruhi asupan zat besinya.

Menurut Anwar (2009) dalam Saifi (2011) Kesulitan utama untuk memenuhi kebutuhan zat besi adalah rendahnya tingkat absorpsi zat besi di dalam tubuh. Absorpsi besi *non heme* sangat dipengaruhi oleh faktor yang mempermudah dan faktor yang menghambat yang terdapat dalam bahan makanan, dimana sumber zat besi *non heme* hanya dapat diabsorpsi 1-6% dibandingkan dengan sumber zat besi *heme* yang dapat diabsorpsi 20-30%. Sumber besi *heme* tidak dipengaruhi oleh faktor penghambat, oleh karena itu jumlah absorpsi *heme* lebih banyak dari pada zat besi *non heme*. Namun tingkat absorpsi zat besi *non heme* yang rendah itu dapat ditingkatkan dengan menambah faktor yang mempermudah penyerapannya yaitu vitamin C yang umum terdapat dalam buah-buahan.

Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang kurang beragam. Selain itu, karena kurangnya penyediaan makanan, distribusi makanan yang kurang baik, kemiskinan dan ketidaktahuan dalam pemilihan makanan, ditambah lagi dengan kebiasaan mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti polifenol yang banyak terkandung dalam kopi dan teh secara bersamaan pada waktu makan sehingga menyebabkan penyerapan zat besi semakin rendah

(Nancy dkk, 2013). Hasil *food recall* dan *food frekuensi* pada anak jalanan juga memperlihatkan konsumsi jajanan instan (snack dan minuman ringan seperti teh gelas) lebih sering dikonsumsi dibanding konsumsi sayur dan buah, hal ini juga meningkatkan risiko untuk mengalami anemia karena kurangnya asupan zat besi yang diperlukan oleh tubuh ditambah lagi konsumsi secara bersamaan dengan penghambat penyerapan zat besi dapat memperberat terjadinya anemia.

Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa seseorang yang banyak makan nasi, tetapi kurang makan sayur-sayuran serta buah-buahan dan lauk-pauk, akan tetap menjadi anemia walaupun zat besi yang dikonsumsi dari makanan sehari-hari cukup banyak. Oleh karena itu makanan yang beraneka ragam memiliki zat gizi yang saling melengkapi. Mengonsumsi makanan yang cukup beragam jumlah maupun kualitasnya dapat membantu mencegah anemia

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andawari dkk (2013) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kadar feritin, dimana hasil penelitian menunjukkan 83,3% asupan zat besi tergolong defisit, 50% kadar feritin rendah. Masrizal (2007) dalam penelitian Andawari dkk (2013) mengatakan bahwa kadar feritin yang rendah dipengaruhi oleh kurangnya asupan zat besi. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang mengonsumsi bahan makananan yang kurang beragam dengan menu makanan yang terdiri dari nasi, kacang-kacangan dan sedikit daging, unggas, ikan yang merupakan sumber zat besi.

Selain itu, penelitian Arifin dkk (2013) juga mendukung hasil penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan

kejadian anemia pada murid sekolah dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana digambarkan dalam hasil penelitian ini yang menjawab asupan zat besi <AKG menunjukkan 68.9% menderita anemia. Hal ini mungkin disebabkan karena Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten yang baru dan baru saja dilakukan pemekaran. Sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang makanan yang mengandung zat besi serta peran ibu dalam mengontrol asupan untuk anaknya.

Menurut Pranadji (1988) dalam buku Citrakesumasari (2012) bahwa pendidikan formal seseorang juga akan mempengaruhi pengetahuan gizinya. Orang yang memiliki pendidikan tinggi cenderung memilih bahan pangan yang lebih baik dalam kuantitas dibandingkan dengan orang yang berpendidikan rendah

Anak jalanan merupakan kelompok yang identik dengan kemiskinan kebanyakan orang tua dari mereka berada pada tingkat pengetahuan yang rendah. Akibatnya pemenuhan dan pemilihan akan konsumsi makanan yang bernilai gizi tinggi kurang dapat dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian salah satunya adalah zat gizi besi. Kurangnya konsumsi makanan yang kaya akan zat besi akan menurunkan kadar hemoglobin dalam tubuh yang akan berdampak pada kejadian anemia.

Citrakesumasari (2012) dalam bukunya juga menuliskan bahwa faktor utama penyebab anemia adalah kekurangan zat besi yang menjadi salah satu unsur penting dalam memproduksi hemoglobin. Kekurangan zat ini, bisa karena penderita memang kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, ikan, hati, telur, dan daging, serta mengonsumsi makanan

yang mengandung zat penghambat absorpsi zat besi (seperti kopi dan teh) dalam tubuh dalam waktu bersamaan.

Selain itu dalam penelitian ini juga diperoleh konsumsi sumber zat besi yang baik menunjukkan 37,5% atau sebanyak 6 orang menderita anemia. Hal ini dikarenakan meskipun konsumsi sumber zat besi berada pada kategori baik namun kebanyakanyang menderita anemia juga banyak mengkonsumsi makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Sehingga meskipun konsumsi sumber zat besinyabaik namun lebih banyak mengkonsumsi makanan penghambat penyerapan zat besi juga akan mempengaruhi terjadinya anemia karena makanan yang mengandung zat besi tidak dapat diserap tubuh oleh adanya zat penghambat yang dikonsumsi.

Gibney 2008) dalam Saifi (2011) juga menjelaskan bahwa selain kurangnya asupan, penyebab anemia di negara-negara berkembang adalah adanya makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan *food recall* 2x24 jam dan *food frekuensi* pada anak jalanan yang menjadi sampel, diperoleh gambaran bahwa setiap hari mereka gemar mengkonsumsi teh. Teh merupakan bahan makanan banyak mengandung tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh Guthrie (1995) dalam Saifi (2011) menyatakan bahwa tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi pada waktu makan sebesar 70%. Sedangkan menurut Almatsier (2009) bahwa tanin yang terdapat dalam teh dan kopi dapat menurunkan absorpsi besi sampai 40% untuk kopi dan 85% untuk teh.

Minum teh satu jam sesudah makan dapat menurunkan absorpsi besi hingga 85%, hal ini disebabkan karena terdapatnya polyphenol seperti tanin dalam teh.

Teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian Syukri (2004) dalam Saifi (2011) pada anak SD kelas 2 di Kecamatan Batu Ceper dan Neglasari Kota Tangerang, diketahui bahwa sampel yang mengkonsumsi makanan yang mengandung faktor penghambat absorpsi Fe minimal 1 kali sehari mempunyai kemungkinan menderita anemia sebesar 2,091 kali dibanding yang tidak anemia.

Sedangkan anak jalanan yang konsumsi sumber zat besinya kurang ditemukan sebanyak 6 orang (33,3%) yang tidak menderita anemia. Hal ini dapat terjadi karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa meskipun sumber zat besi yang dikonsumsi kurang, kejadian anemia tidak akan langsung dapat terjadi. Diperlukan tahapan untuk dapat menimbulkan anemia, dimana apabila konsumsi sumber zat besi kurang ditambah lagi setiap harinya konsumsi tersebut mengalami kemunduran maka semakin lama simpanan zat besi akan habis sehingga mempengaruhi turunnya kadar hemoglobin untuk dapat menimbulkan anemia.

Hal tersebut juga didukung oleh distribusi frekuensi antara konsumsi penghambat penyerapan zat besi berdasarkan kejadian anemia. Dimana digambarkan pada hasil tersebut yakni konsumsi penghambat penyerapan zat besi dalam kategori jarang menunjukkan 10 orang (62,5%) tidak menderita anemia. Artinya konsumsi penghambat penyerapan zat besi yang semakin sedikit dikonsumsi akan memberikan pengaruh kearah yang positif terhadap terjadinya anemia. Sedangkan anak jalanan yang konsumsi penghambat penyerapan zat besi

dalam kategori sering lebih mendominasi menderita anemia yaitu sebanyak 12 orang (66.7%) dibandingkan yang konsumsi penghambat penyerapan zat besinyajarang. Hal ini diartikan bahwa anak jalanan yang konsumsi penghambat penyerapan zat besinya seringakan memberikan kontribusi yang besar terhadap kejadian anemia.

Dalam penelitian ini juga diperoleh konsumsi penghambat penyerapan zat besi yang jarangnamun terdapat 6 orang (37,5%) yang menderita anemia. Hal ini dapat terjadi karena meskipun konsumsi penghambat penyerapan zat besi sedikit dikonsumsi namun asupan zat besi yang dikonsumsi juga kurangan tetap berpengaruh terhadap kejadian anemia. Sedangkan anak jalanan yang konsumsi penghambat penyerapan zat besinya sering terdapat 6 orang (33,3%) yang tidak menderita anemia. Artinya anak jalanan yang meskipun lebih banyak mengkonsumsi penghambat penyerapan zat besi dan diketahui asupan makanannya juga kurang tidak akan langsung membuat seseorang menderita anemia. Hal ini dikarenakan meskipun cadangan zat besinya sudah berkurang namun kadar hemoglobinnya masih berada pada keadaan normal sehingga kejadian anemia belum terjadi. Namun seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anemia terjadi secara bertahap, dimana cadangan zat besi yang semakin berkurang dan terus menerus berkurang serta tidak didukung oleh asupan makanan yang kaya zat besi serta diperparah dengan konsumsi penghambat penyerapan zat besi yang lebih banyak akan menambah kerentanan untuk mengalami anemia.

## 2. Hubungan Infeksi Kecacingan dengan Kejadian Anemia

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebanyak 12 orang (57.2%) anak jalanan yang terinfeksi kecacingan namun tidak mengalami anemia. Hal ini disebabkan karena keadaan kecacingan pada anak jalanan di Kecamatan Mariso kota Makassar masih tergolong ringan sehingga belum dapat mempengaruhi terjadinya anemia. Keadaan tersebut dibuktikan dengan dilakukannya perhitungan intensitas kecacingan untuk mengetahui berat ringannya infeksi yang terjadi.

Hasil perhitungan (Egg Per Gram/ EPG) dari jenis cacing yang terdeteksi termasuk intensitas ringan yaitu *Ascariasis* ditemukan 1300 telur cacing dalam tinja dan *Trichuris trichiura* ditemukan 66 telur cacing. Selain itu anak jalanan yang terinfeksi kecacingan namun tidak menderita anemia juga dikarenakan memiliki asupan zat besi yang cukup dan penghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi juga jarang.

Sedangkan untuk jenis cacing *Hymenolepis nana* tidak dilakukan perhitungan EPG karena diasumsikan hanya ada tiga jenis cacing (*Soil Transmitted Helminths/STH*) yang paling sering menginfeksi anak usia sekolah yaitu *Ascariasis*, *Trichuris trichiura*, *Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*.

*Hymenolepis nana* adalah salah satu spesies nematoda yang paling sering ditemukan pada daerah beriklim kering dan hangat diseluruh dunia. Hospesnya

adalah manusia dan tikus. *H.nana* ditemukan banyak terdapat pada orang-orang dengan sanitasi yang buruk dan padat. Terutama menyerang anak-anak dengan hygiene yang buruk. Penularannya dari feses melalui tangan ke mulut. Parasit ini biasanya tidak menyebabkan gejala. Sakit perut, diare, dan anoreksia merupakan gejala ringan. Pada infeksi yang berat akibat infestasi lebih dari 1000 cacing menyebabkan keluhan neurologi yang gawat, kejang-kejang, insomnia, pusing dan anemia. Infeksi cacing pada manusia selalu disebabkan oleh telur yang tertelan dari benda-benda yang terkena tanah, dari tempat buangan air atau langsung dari anus kemulut, kebersihan individu, keluarga serta kelompok masyarakat yang padat penduduk.(Marbawati, 2010).

Pada masyarakat kumuh padat perkotaan khususnya Kecamatan Mariso Kota Makassar yang merupakan tempat bekas pembuangan sampah dimana sanitasi lingkungannya buruk, telah diketahui infeksi kecacingan yang terjadi cukup tinggi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pengamatan diperoleh kebanyakan dari sampel diteliti terinfeksi kecacingan yaitu sebanyak 21 orang (61,8%) disebabkan karena perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang. Terlihat dari kebiasaan tidak menggunakan sandal bila keluar rumah terutama bila berjalan diatas tanah yang terkontaminasi oleh tinja tikus yang mengandung telur *hymnolepis nana* sehingga terinfeksi kecacingan. Selain itu sebagian besar dari mereka yang tinggal didaerah tersebut tidak memiliki septic tank untuk membuang tinjanya melainkan mengalirkannya ke got besar yang ada di wilayah Kecamatan Mariso Kota Makassar, sehingga hal ini dapat membuat pencemaran lingkungan oleh telur cacing dan mengakibatkan infeksi kecacingan cukup tinggi.

Dalam penelitian ini juga digambarkan bahwa yang tidak terinfeksi kecacingan menunjukkan 4 orang (6.1%) tidak menderita anemia. Artinya mereka yang tidak terinfeksi kecacingan tidak berpengaruh terhadap kejadian anemia. Sistem imun menjadi pertahanan tubuh terhadap terjadinya penyakit. Mereka yang tidak terinfeksi kecacingan dan tidak mengalami anemia dikarenakan memiliki sistem imun yang kuat hal ini terlihat dari asupan yang mereka konsumsi kebanyakan berada pada kategori cukup yang kemudian diikuti dengan kadar hemoglobin yang normal sehingga tidak menyebabkan anemia.

Selain itu anak jalanan yang terinfeksi kecacingan namun menderita anemia terdapat 9 orang (42.9%). Artinya anak jalanan yang terinfeksi kecacingan lebih rentan terkena anemia dibandingkan yang tidak terinfeksi kecacingan. Meskipun semua intensitas infeksi kecacingan berada pada tahap ringan namun asupan zat besi yang dikonsumsi juga kurang serta makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi lebih banyak juga akan membuatnya sampai pada kondisi anemia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori, infeksi cacingan mengganggu masukan makan, penyerapan, penyimpanan serta penggunaan berbagai zat gizi, termasuk zat besi. Pada banyak masyarakat pedesaan dan daerah urban yang kumuh dimana sanitasi lingkungan buruk, angka kesakitan akibat infeksi virus, kecacingan dan bakteri tinggi. Dalam masyarakat tersebut, makanan yang sering dimakan mengandung sangat sedikit energi. Kalau keseimbangan zat besi goyah, episode infeksi yang berulang-ulang dapat menyebabkan terjadinya anemia. (Maeyer, 1995 dalam Wijianingsih, 2010).

Selain itu anak jalanan terinfeksi kecacingan dan menderita anemia dikarenakan aktifitasnya lebih banyak bersentuhan dengan tanah yang mengandung telur cacing baik dilingkungan sekolah maupun rumah. Hygiene dan sanitasi yang buruk ditambah kondisi lingkungan yang disukai untuk perkembangan parasit yang pada akhirnya menginfeksi host karena respon imun mereka yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa membuatnya lebih rentan terinfeksi kecacingan.

Hasil pemeriksaan Kato-Katz, distribusi frekuensi jenis telur cacing berdasarkan kejadian anemia memperlihatkan bahwa jenis cacing yang banyak menginfeksi pada anak jalanan adalah infeksi tunggal yaitu *Ascaris lumbricoides* dimana 6 orang (35,3%) anak jalanan mengalami anemia. *Ascaris lumbricoides* hidup dalam rongga usus halus manusia dan mengambil makanan terutama karbohidrat dan protein. Adanya *Ascaris lumbricoides* dalam usus dapat menyebabkan kelainan mukosa usus, berupa proses peradangan pada dinding usus, yang berakibat pada gangguan absorpsi makanan. Akibat adanya cacing tersebut, maka akan mengganggu penggunaan berbagai zat gizi termasuk zat besi. (Siregar, 2006)

Salah satu penyebab anemia adalah asupan protein yang kurang dari kebutuhan. Oleh karena itu tingkat konsumsi protein perlu diperhatikan karena semakin rendah tingkat konsumsi protein maka semakin cenderung untuk menderita anemia. Hal ini dikarenakan zat pembentuk hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Protein juga berperan dalam proses pengangkutan zat-zat gizi termasuk besi dari saluran cerna ke dalam darah, dari darah ke jaringan-

jaringan, dan melalui membran sel kedalam sel-sel. Sehingga apabila kekurangan protein akan menyebabkan gangguan pada absorpsi dan transportasi zat-zat gizi. (Almatsier, 2009)

Dalam penelitian ini anak jalanan yang menderita anemia memiliki asupan zat besi kurang dan lebih banyak mengkonsumsi zat penghambat penyerapan zat besi. Hal ini menyebabkan konsumsi makanan menjadi kurang seimbang sehingga dapat mengganggu absorpsi besi dalam tubuh. Berdasarkan formulir *food recall* dan *food frekuensi* diperoleh anak jalanan ini lebih sering mengkonsumsi protein nabati dari pada protein hewani, sehingga meskipun protein nabati yang dikonsumsi lebih banyak namun zat penghambat penyerapan zat besi juga lebih banyak atau sering dikonsumsi juga akan cenderung mempengaruhi absorpsi besi dalam tubuh dan menyebabkan anemia karena zat besi yang diperoleh dari protein nabati tidak dapat diserap seutuhnya oleh tubuh karena adanya zat penghambat tersebut. Menurut Citrakesumasari (2012) Banyaknya zat besi yang dapat diserap tubuh tergantung pada tingkat absorpsi. Tingkat absorpsi zat besi tergantung pada zat besi dalam makanan dan zat aktif pemicu dan penghambat penyerapan.

Dalam penelitian ini terdapat 11 orang (64.7%) anak jalanan yang tidak mengalami anemia namun terinfeksi cacing *Ascaris lumbricoides*. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak anemia dan terinfeksi cacing *Ascaris lumbricoides* memiliki asupan makanan yang baik serta lebih sedikit atau jarang mengkonsumsi zat penghambat penyerapan zat besi. Sehingga meskipun protein nabati yang dikonsumsi anak jalanan ini berdasarkan *food recall* dan *food frekuensi* sedikit dan zat penghambat yang dikonsumsi juga sedikit tetapi semua zat besi yang

terkandung dalam protein tersebut dapat diserap maka hal ini akan ikut membantu proses penyerapan zat besi dalam tubuh. Dan dengan terserapnya semua zat besi tersebut maka tubuh akan memiliki sistem imun yang kuat sehingga tidak mudah menyebabkan anemia. Karena pathogenesis *Ascaris* berhubungan dengan respon imun hospesnya.

Proverawati dan Erna (2011) mengatakan bahwa asupan zat besi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam pembentukan sel darah, akan mengakibatkan terjadinya anemia, menurunkan kekebalan tubuh, sehingga sangat peka terhadap serangan bibit penyakit. Penyakit-penyakit infeksi lebih rawan terjadi pada penderita anemia gizi besi. Karena kemampuan membunuh bakteri menjadi rendah akibat kekurangan zat besi.

Dalam penelitian ini adapun jenis cacing yang paling sedikit menginfeksi anak jalanan adalah infeksi tunggal oleh cacing *Trichuris Trichuria* menyebabkan 1 orang (100,0%) mengalami anemia dan infeksi ganda oleh cacing *Hymnolepis Nana* dan *Ascaris lumbricoides* juga menyebabkan 1 orang (100,0%) mengalami anemia serta terdapat 1 orang (100,0%) yang tidak anemia. Pada jenis cacing *Trichuris Trichuria* dapat terjadi anemia dikarenakan cacing ini memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus hingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Pada tempat pelekatnya dapat menimbulkan perdarahan, disamping itu cacing ini menghisap darah hospesnya sehingga dapat menyebabkan anemia (Wijianingsih, 2010).

Selain itu meskipun cacing tersebut paling sedikit menginfeksi namun hal ini juga terkait dengan hygiene dan sanitasi yang buruk. Anak jalanan yang

terinfeksi cacing dan mengalami anemia tersebut juga dikarenakan asupan zat besinya tergolong kurang serta lebih banyak mengonsumsi penghambat penyerapan zat besi sehingga menyebabkan zat besi berkurang dan ikut menurunkan kadar hemoglobin sehingga terjadi anemia. Adapun yang terinfeksi cacing *Trichuris Trichuria* namun tidak anemia meskipun asupan zat besi yang dikonsumsi kurang dan zat yang menghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi juga banyak. Hal ini terkait dengan adanya tahapan defisiensi zat besi dalam tubuh sehingga tidak menyebabkan anemia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadju dkk (2013) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan dengan status hemoglobin pada anak sekolah dasar di wilayah pesisir kota makassar dimana digambarkan dalam hasil penelitian ini prevalensi anemia sebesar 38% dan prevalensi infeksi kecacingan sebesar 57%. Jenis cacing yang paling banyak menginfeksi yaitu *Ascaris lumbricoides* 34% dan pada infeksi ganda, jenis cacing sebanyak 14% untuk cacing *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris Trichuria*.

Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infeksi kecacingan pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar tidak selalu berpengaruh terhadap kejadian anemia. Anak jalanan yang terinfeksi kecacingan namun tidak anemia disebabkan karena asupan makanannya yang baik. Meskipun pada dasarnya diketahui bahwa anak jalanan rentan terkena kecacingan karena kondisi lingkungannya yang kumuh, status sosial ekonomi, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang. Namun fakta yang diperoleh dilapangan membuktikan

bahwa tidak semua dari anak jalanan yang berada pada lingkungan kumuh terkena anemia. Begitupun sebaliknya, anak jalanan yang tidak terinfeksi kecacingan namun menderita anemia disebabkan oleh faktor lain yaitu absorpsi zat besi yang rendah atau pola menu makanan yang tergolong rendah absorpsinya, bukan karena faktor penyakit infeksi.

Dalam penelitian ini terdapat 9 orang (6.9%) anak jalanan yang tidak terinfeksi kecacingan namun menderita anemia. Hal ini disebabkan karena meskipun tidak terinfeksi kecacingan namun asupan makanan sumber zat besi yang dikonsumsi juga kurang. Hal ini terlihat pada anak jalanan yang konsumsi asupan zat besinya kurang yaitu sebanyak 24 orang (75.0%) dari total jumlah anak jalanan yang menjadi sampel penelitian.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya konsumsi zat besi dan zat gizi lainnya banyak ditemukan pada anak dari keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Anak jalanan juga berada pada situasi ini dimana banyak pihak yang meyakini bahwa kemiskinan yang menjadi faktor utama anak turun kejalan dengan harapan dapat menambah uang sendiri untuk mendapatkan konsumsi makanan tambahan (jajan tambahan). Akhirnya orang tua dari mereka yang berstatus ekonomi rendahkurang sanggup membeli dan memilih makanan yang bergizi dan beragam untuk konsumsi hari-harinya. Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengungkapkan bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan memilih dan membeli bahan makanan jenis *heme* (daging) dibandingkan dengan jenis *non-heme*. Bahan makanan jenis *heme* merupakan bahan makanan yang banyak mengandung zat gizi Fe yang diperlukan oleh tubuh seperti daging, ikan

dan unggas. Sedangkan jenis *non-heme* terutama dalam biji-bijian, umbi-umbian, sayur, kacang-kacangan dan buah-buahan ditentukan oleh adanya faktor yang mempermudah dan menghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi secara bersamaan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS *Al-Mu'Min*/ 40: 79



Terjemahnya:

Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.

Maksudnya bahwa Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia sebagiannya untuk dikendarai dan sebagiannya lagi untuk dimakan. Termasuk dalam hal ini sapi, kambing dan ayam, sebagaimana yang diketahui bahwa ternak ini merupakan sumber zat besi heme yang tinggi dan akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi non heme. Namun sumber zat besi heme ini tergolong mahal sehingga sulit dipenuhi untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari utamanya bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Menurunnya kualitas dan kuantitas makanan yang dibeli dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat gizi salah satunya zat besi yang akan berdampak terhadap timbulnya anemia. Menurut Husaini (1989) dalam Hadju (2013) pola makan yang tidak berkualitas dalam hal keragaman jenis makanan dan ketersediaan biologis besinya rendah merupakan faktor penting yang berperan dalam anemia karena dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Pola menu makanan yang hanya terdiri dari sumber karbohidrat, seperti

nasi dan umbi-umbian, atau kacang-kacangan, tergolong menu rendah (penyerapan zat besi 5%). Pola menu yang kurang bervariasi ini sangat jarang atau sedikit sekali mengandung daging, ikan, dan sumber vitamin C. Terdapat lebih banyak bahan makanan yang mengandung zat penghambat absorpsi besi dalam menu makanan ini, sehingga keragaman atau variasi makanan yang dikonsumsi diperlukan untuk memperoleh penyerapan zat gizi yang baik.

Berdasarkan hasil *food recall* dan *food frekuensi* menemukan bahwa pola konsumsi anak jalanan yang tinggal di daerah kumuh perkotaan dan padat penduduk umumnya terdiri dari nasi, ikan namun lebih didominasi oleh tahu dan tempe, serta sayur yang jarang dikonsumsi dikarenakan ada yang tidak suka dan tidak adanya sayur yang disediakan pada saat ingin dikonsumsi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak adanya keanekaragaman dalam jenis makanan yang dikonsumsi akan berdampak pada anemia.

Rendahnya kualitas makanan yang dikonsumsi anak jalanan dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dafid (2012) yang menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan dengan kejadian anemia pada anak usia sekolah di SDN 1 Rowosari Kabupaten Grobogan ( $p=0,018$ ).

Sebagian besar sampel memiliki pola makan yang kurang bervariasi, hal ini kemungkinan karena sebagian besar sampel lebih suka mengonsumsi makanan jajanan yang tidak memenuhi asupan zat gizinya dengan baik. Selain itu, sebagian besar sampel mengaku tidak suka mengonsumsi sayur-sayuran dan ketersediaan buah-buahan di rumah mereka sangat jarang. Sehingga asupan makanan sehari-hari mereka kebanyakan hanya didominasi oleh sumber

karbohidrat dan protein. Kurang bervariasinya jenis makanan tersebut dapat menyebabkan penyerapan zat gizi kurang berjalan dengan baik, sehingga dapat menyebabkan kadar hemoglobin menurun atau anemia.

### ***C. Keterbatasan Penelitian***

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat pengambilan pot tinja, ada beberapa sampel yang tidak dapat memberikan pot tinjanya kembali dengan alasan hilang. Sehingga terjadinya pengurangan sampel dalam penelitian.
2. Tidak adanya data sekunder yang menyangkut tentang identitas anak jalanan sehingga peneliti kesulitan dalam mendapatkan sampel.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Terdapat hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan nilai  $p=0.000$
2. Tidak terdapat hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar dengan nilai  $p=0,134$

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Perlunya dilakukan penyuluhan tentang konsumsi makanan sumber zat besi untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang makanan sumber-sumber zat besi dan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh.
2. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan pencegahan dengan lebih meningkatkan hygiene dan sanitasi lingkungan serta pemberian obat cacing secara berkala yaitu tiap 6 bulan sekali kepada anak jalanan yang berada di Kecamatan Mariso Kota Makassar.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti faktor lain (pendidikan ibu, jumlah anggota keluarga, konsumsi sumber protein, vitamin C dan konsumsi

sumber zat tanin) selain asupan zat besi dan infeksi kecacingan yang berhubungan dengan kejadian anemia baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung.

4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti jenis cacing *Ascaris lumbricoides* dalam kaitannya dengan kejadian anemia.



## DAFTAR PUSTAKA


- Achadi. "*Gizi dan Kesehatan Masyarakat*". Jakarta: PT Raja Grafindo. 2011
- Adriani dan Bambang. "*Pengantar Gizi Masyarakat*". Jakarta: Pernada Media Group. 2012.
- Aini, Nur., Khomsan, Ali., dan Dewi, Mira. "*Pola Aktivitas, Konsumsi Pangan, Status Gizi dan Kesehatan Anak Jalanan di Kota Bandung*". Bogor: dalam Jurnal Gizi dan Pangan, Juli 2009; Vol. 4, No. 2
- Arifin, Sri Utami., Mayulu, Nelly., dan Rottie, Julia. "*Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Kejadian Anemia Pada Anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*". Manado: dalam ejournal keperawatan (e-Kp), Agustus 2013; Vol. 1, No. 1
- Almatsier, Sunita. "*Prinsip Dasar Ilmu Gizi*". Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Andawari, Inrawati., Bolang, Alexander S. L., Rattu, Joy M. "*Hubungan Antara Asupan Zat Besi dengan Kadar Feritin pada Siswa Kelas 4 dan 5 SD Katolik St. Theresia Malalayang Kota Manado*". Manado: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi. 2013
- Arisman. "*Gizi dalam Daur Kehidupan*". Jakarta: EGC. 2009
- Baharuddin. "*Pengaruh Perilaku Higienitas terhadap Kejadian Kecacingan pada Murid Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat*". Medan: Tesis. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. 2010.
- Citrakesumasari. "*Anemia Gizi, Masalah dan Pencegahannya*". Yogyakarta: Kalika, cet. 1. 2012
- Dafid, Rudi. "*Hubungan Pola Makan dengan Kejadian Anemia pada Anak Usia Sekolah Dasar 6-12 tahun di SDN 1 Rowosari Kecamatan Gubug Kabupaten Grobongan*". Semarang: Tesis. Universitas Muhammadiyah Semarang. 2012
- Dewi, Ayu Bulan., Pujiastuti, N., dan Fajar Ibnu. "*Ilmu Gizi untuk Praktisi Kesehatan*". Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013
- Dinas Sosial Kota Makassar. "*Jumlah Gelandangan, pengemis, dan Anak Jalanan Menurut Kecamatan di Kota Makassar*". 2013

- Efran. “*Pentingnya Zat Besi Bagi Tubuh*”. <http://www.medkes.com/>. 2013. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2014.
- Endrawati, Heny. “*Pemeriksaan Tinja Metode Kato Katz*”. <http://habibi.staff.ub.ac.id.pdf>. 2012. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2014.
- Hadju., Samudar, Nurhaitil., dan Jafar, Nurhaedar. “*Hubungan Infeksi Kecacingan Dengan Status Hemoglobin pada Anak Sekolah Dasar di wilayah Pesisir Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013*”. Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2013
- Hadju., Supardin, Nurhaema., dan Sirajuddin, Saifuddin. “*Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Hemoglobin pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Makassar Tahun 2013*”. Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2013
- Hasyim, Novita., Mayulu, N., dan Ponidjan, Tatti. “*Hubungan Kecacingan dengan Anemia pada Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara*”. Manado: dalam ejournal keperawatan (e-Kp), Agustus 2013; Vol. 1 No. 1
- Herdiana dan Pramudita. “*Dampak Psikososial pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya*”. Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial. Juni 2012; Vol. 1 No. 2
- Isbach, Indina Delaputri., Amiruddin, Ridwan., dan Ansar, Jumriani. “*Gambaran Status Gizi Anak Jalanan di Kota Makassar*”. Makassar: Jurnal. Bagian Epidemiologi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. UNHAS. 2012
- Jannah, Miftahul. “*Hubungan Kadar Hemoglobin Darah dan Asupan Zat Besi dengan Prestasi Belajar Siswi MTsN Model Makassar*”. Makassar: Skripsi. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin. 2010
- Kushartati, Sri. “*Pemberdayaan Anak Jalanan*”. Yogyakarta: Dalam Journal Humanitas: Indonesian Psychological. Agustus 2004; Vol.1 No. 2
- Marbawati, Dewi. 2010. *Hymenolepis sp, Cacing Pita Parasit pada Tikus dan Manusia*. Artikel Serba Serbi Parasit. Banjarnegara: Desember 2010; Vol.6 No.2
- Nancy., Tadete, Allenfina O., dan Basuki, Anita. “*Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein dan Vitamin C dengan Kejadian Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado*”. Manado:

- Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013
- Nurnia., Hadju, Veni., Citrakesumasari. *“Hubungan Pola Konsumsi dengan Status Hemoglobin Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Makassar”*. Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin. 2013
- Riama. *”Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Infeksi Kecacingan yang Ditularkan melalui Tanah pada Murid Kelas IV, V dan VI SD Negeri No. 173327 Bahalimbalo Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan”*. Medan: Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. 2011
- Riyanto, Agus. *“Aplikasi Metode Penelitian Kesehatan”*. Yogyakarta: Nuha Medika, cet. 2. 2011
- Saifi. *“Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Status Anemia Defisiensi Besi Anak Sekolah Kelas V Dan VI di MI Negeri 02 Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan”*. Jakarta: Skripsi. Gizi Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2011
- Sediaoetama, Achmad Djaeni. *“Ilmu Gizi Jilid I”*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. 2010
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an Volume 6. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Sieff, Colin. *“Pediatric Anemia”* <http://www.childrenshospital.org>. Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2014.
- Siregar, Charles D. *“Pengaruh Infeksi Cacing Usus yang Ditularkan Melalui Tanah pada Pertumbuhan Fisik Anak Usia Sekolah Dasar”*. Medan; dalam Jurnal Pediatri. September 2006; Vol. 8 No. 2
- Sudoyo Aru, W., Setiyohadi, B., Alwi I., Simadibrata dan Setiati Siti. *“Buku Ajar Ilmu Penyakit dalam Jilid II, Edisi V”*. Jakarta: Internal Publishing. 2009.
- Sugiyono. *“Metode Peneitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2013
- Syukri. Status Anemia dan Faktor-Faktor yang Berhubungan pada Anak SD Kelas 2 di Kecamatan Batu Ceper dan Neglasari Kota Tangerang Tahun 2003/2004. Depok : Tesis. FKM UI, 2004.

- Pratiwi, Wijayanti. *“Aspirasi Hidup Anak Jalanan Semarang”*. Semarang: Skripsi. Fakultas Psikologi. Universitas Diponegoro. 2010.
- Pertiwi, Andi Cendra., La Ane, Ruslan., dan Selomo, Makmur. *“Analisis Faktor Praktik Hygiene Perorangan terhadap Kejadian Kecacingan pada Murid Sekolah Dasar di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar”*. Makassar: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNHAS. 2013
- Pramesti, Denok dan Sandy, Kurniajati. *“Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Anak Jalanan Usia 6-12 Tahun”*. Kediri: dalam Jurnal STIKES Juli 2012; Vol.5 No.1
- Puspita, Anna. *“Prevalensi Cacing Ascariasis Lumbricoides, Cacing Tambang, dan Trichuris Trihiura Setelah Lima Tahun Program Eliminasi Filariasis di Desa Mainang, Alor, Nusa Tenggara Timur”*. Jakarta: Skripsi. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara. 2009
- Puspreni, Yuniar. *Impian Anak Jalanan (Studi Eksplorasi Tentang Orientasi Masa Depan Anak Jalanan)*. Yogyakarta: Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.
- Proverawati, Atikah dan Erna Kusuma Wati. *“Ilmu Gizi untuk Keperawatan dan Gizi Kesehatan”*. Yogyakarta : Nuha Medika. 2011.
- Proverawati, Atikah. *“Anemia dan Anemia Kehamilan”*. Yogyakarta: Nuha Medika. 2011
- KEMENKES. *“Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia Tahun 2013”*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2014
- Supriasa, I Dewa Nyoman, Bachyar bakri, dan Fajar Ibnu. *“Penilaian Status Gizi”*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. 2001
- Sulistiyorini. *“Pengamatan Epidemiologi Hasil Pemeriksaan Kecacingan di SD Muh. Kedunggong, SD Dukuh Ngestiharjo, SDN I Bendungan dan SD Conegaran Triharjo Kec. Wates. (Hasil Pemeriksaan Laboratorium Desember 2010)*. Universitas Sumatera Utara. 2011.
- Tanri. *“Peran Fe dan Vitamin C dalam Pembentukan Eritrosit dan Kadar Hemoglobin (Hb)”*. <http://www.biologi-sel.com>. Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2014.
- Wijianingsih. *“Hubungan Antara Infeksi Kecacingan dengan Anemia dan Status Gizi pada Siswa SDN Purwosari I.1 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010”*. Skripsi. STIKES Husada Borneo Banjarbaru. 2010.

Wulansari, Yulia. “*Estimasi Kerugian Ekonomi Akibat Anemia Gizi Besi (AGB) di Berbagai Provinsi di Indonesia dan Biaya Penanggulangannya Melalui Suplementasi Zat Besi*”. Bogor. Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor. 2006.



**HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI (Fe) DAN INFEKSI KECACINGAN  
TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK JALANAN  
DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2014**

**The Correlation Between Iron Nutrient Intake and Worm Infection to Street  
Children in Mariso District, Makassar in 2014**

*Nur Rahmi<sup>1</sup>, Irviani A. Ibrahim<sup>2</sup>, St. Raodhah<sup>3</sup>*

*<sup>2</sup>Bagian Gizi Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar,*

*<sup>3</sup>Bagian Organisasi dan Manajemen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Alamat Korespondensi:**

Nur Rahmi, SKM.

Jalan To' Ciung

Kota Palopo

HP : 082395101417

*e-mail : rahmy.pebrian@gmail.com*

## ABSTRAK

Anemia merupakan masalah gizi yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Anemia dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit infeksi, serta menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak (Hadju dkk, 2013). Kurangnya akses makanan serta kondisi lingkungan yang kumuh menyebabkan anak jalanan berisiko mengalami anemia.

Penelitian ini untuk mengetahui hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional study*. Jumlah sampel sebanyak 34 anak jalanan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposif sampling* dengan kriteria anak jalanan berumur 6-12 tahun, bersedia untuk diwawancarai serta bersedia diambil darah dan fesesnya, tidak minum obat cacing dalam 6 bulan terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar sampel (52,9%) menderita anemia dan selebihnya (47,1%) tidak menderita anemia. Terdapat (70,6%) memiliki asupan zat besi yang kurang serta terdapat (61,8%) yang menderita infeksi kecacingan. Berdasarkan hasil uji *Fisher Exact Test*, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia ( $p=0,000$ ), sedangkan untuk infeksi kecacingan berdasarkan hasil uji *Chi-Square* tidak ditemukan adanya hubungan ( $p=0,134$ ) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Diharapkan peranan orang tua khususnya ibu agar lebih memperhatikan asupan zat gizi anaknya dengan cara meningkatkan pemahamannya tentang makanan sumber-sumber zat besi dan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Selain itu perlu dilakukan pencegahan dengan menjaga hygiene dan sanitasi lingkungan serta pemberian obat cacing secara berkala yaitu 6 bulan sekali kepada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

**Kata Kunci : Anemia, Asupan zat besi, Anak jalanan, Infeksi kecacingan**

**Daftar Pustaka : 48 ( 2001 - 2014)**

## ABSTRACT

Anemia is the most common nutritional problems found throughout the world. Anemia can lower the immune system so susceptible to infectious diseases, as well as inhibiting the growth of physical it makes one and intellectual development of the brain (Hadju et al, 2013). Lack of access to food and slum environmental conditions may cause street children risk of anemia.

This study was to determine the relationship between the intake of iron (Fe) and worm infection on the incidence of anemia among street children in Mariso District of Makassar City of 2014. This study is an analytic observational study with cross-sectional study. The total sample is 34 street children with the use of purposive sampling technique, criteria street children aged 6-12 years, were willing to be interviewed and willing to transfusion blood and feces, do not take medicine worms in the last 6 months.

The results showed that the majority of the sample (52.9%) suffered from anemia and the rest (47.1%) did not suffer from anemia. (70.6%) has less iron intake and (61.8%) was suffering from worm infection. Based on the test results of Fisher's Exact Test, showed a significant relationship between the intake of iron (Fe) on the incidence of anemia ( $p = 0.000$ ), whereas for worm infection based on the Chi-square test did not reveal any correlation ( $p = 0.134$ ) on the incidence of anemia on street children in District Mariso Makassar.

Expected role of parents, especially mothers to pay more attention about nutrient intake by increasing the understanding of the food sources of iron and foods that can inhibit iron absorption. In addition, it should be prevented by keeping the hygiene and environmental sanitation also the provision of regular worming 6 months to the street children in Mariso District of Makassar City is really required.

**Keywords** : Anemia, iron intake, street children, worm infestation Infection  
**Bibliography** : 48 (2001 - 2014)

## PENDAHULUAN

Anemia pada umumnya terjadi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan pada kelompok sosio-ekonomi rendah. Secara umum kontribusi terbesar anemia adalah defisiensi besi yaitu sebesar 50%. (Endang, 2011 dalam Nurnia, 2013). Di Indonesia, anemia defisiensi besi masih merupakan masalah gizi utama, disamping tiga masalah gizi lainnya yaitu (1) Kurang Energi Protein (KEP); (2) Kurang Vitamin A (KVA) dan (3) Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Menurut data Riskesdas tahun 2013 diketahui bahwa secara nasional prevalensi anemia sebesar 21,7%. Sedangkan prevalensi anemia pada anak usia 5-14 tahun sebanyak 26,4%. (Kemenkes, 2014)

Anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terkena anemia defisiensi besi. Kelompok ini dikatakan rentan karena berada pada fase percepatan pertumbuhan, dimana kebutuhan zat besi selama masa ini meningkat dengan adanya pertumbuhan jaringan dan kenaikan massa sel darah merah. (Zulaekah, 2008 dalam Nurnia, 2013).

Berdasarkan hasil studi di Sulawesi, penelitian yang dilakukan oleh (Nurnia, dkk., 2013) di Wilayah Pesisir Kota Makassar Sulawesi Selatan menunjukkan sebanyak 37,6% anak SD mengalami anemia.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi adalah terjadinya kehilangan darah karena penyakit infeksi seperti kecacingan. Penyakit kecacingan yang ditularkan melalui tanah atau *Soil Transmitted Helminths* (STH) yang sering dijumpai pada anak usia sekolah yaitu *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris trichiura*, *Ancylostoma duodenale* dan *Necator americanus*. (Mardiana dan Djarismawati, 2008 dalam Pertiwi, dkk, 2013).

Kecacingan dapat ditemukan pada semua golongan umur, namun tertinggi ditemukan pada usia anak SD. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Pertiwi, dkk., 2013) pada 181 murid SD di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, ditemukan 75,7% murid menderita kecacingan.

Anak jalanan termasuk kedalam kelompok anak usia sekolah yaitu berusia 6-12 tahun, merupakan komunitas yang kurang memperhatikan perilaku hidup sehat, dan umumnya tinggal di daerah kumuh dengan sanitasi lingkungan yang buruk. Hal ini kemudian meningkatkan risiko bagi mereka untuk mengalami kecacingan dan anemia defisiensi besi.

Anak jalanan merupakan kelompok berisiko mengalami gangguan gizi. Adanya penelitian yang dilakukan di Kediri membuktikan sebanyak 33% anak jalanan masih kekurangan kebutuhan nutrisi dan 40% anak jalanan memiliki status gizi kurang (Pramesti dan Kurniajati, 2012).

Anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Mereka identik dengan kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap makanan yang bergizi serta aktifitasnya yang tinggi di jalanan membuat asupan makanannya juga berkurang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk

meneliti hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

## **BAHAN DAN METODE**

### ***Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai wilayah yang memiliki jumlah anak jalanan tertinggi di Kota Makassar. Sedangkan untuk mengetahui infeksi kecacingan dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar.

### ***Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan *cross-sectional study* yaitu suatu penelitian yang melihat hubungan antara variabel independen (asupan zat besi dan infeksi kecacingan) dengan variabel dependen (kejadian anemia), dimana observasi atau pengukuran variabel dilakukan sekaligus pada waktu yang sama.

### ***Populasi dan sampel***

Populasi dalam penelitian ini adalah semua anak jalanan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar, yaitu sebanyak 162 anak jalanan.

Sampel dalam penelitian ini adalah anak jalanan yang bertempat tinggal di Kecamatan Mariso Kota Makassar yang berjumlah 34 anak jalanan yang diambil dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan yakni mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Anak jalanan yang berumur 6-12 tahun
- b. Bersedia untuk diwawancarai serta bersedia diambil darah dan fesesnya
- c. Tidak meminum obat cacing dalam 6 bulan terakhir

### ***Metode Pengumpulan Data***

Data primer dalam penelitian ini yaitu data asupan zat besi, infeksi kecacingan dan kejadian anemia. Data tentang asupan zat besi diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan formulir *food recall 2x24* jam. Adapun data infeksi kecacingan diperoleh dengan pemeriksaan feses di laboratorium menggunakan metode *Kato Katz*, Sedangkan data tentang kejadian anemia diperoleh melalui pemeriksaan Hb dengan metode *Cyanmethemoglobin*. Data sekunder berupa data jumlah anak jalanan dan data penderita infeksi kecacingan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014.

### ***Instrumen***

Instrumen yang digunakan adalah formulir *Food Recall* untuk mengukur kebiasaan makan yang mengandung zat besi, formulir *Food Frequency Questionnaire (FFQ)* untuk mengetahui frekuensi konsumsi sumber zat besi dan konsumsi penghambat penyerapan zat besi, timbangan digital untuk mengukur berat badan, Software Nutri Survey untuk menganalisis data konsumsi zat besi, metode *Cyanmethemoglobin* untuk mengukur kadar hemoglobin, pot tinja untuk mengambil feses.

### **Validasi dan Reliabilitas Instrumen**

Uji validitas pengukuran berat badan dilakukan dengan pengkalibrasian untuk memastikan tingkat validitas alat ukur yang digunakan sudah baik. Uji validitas formulir *food recall* 2x24 jam dilakukan dengan membandingkannya dengan metode lain (penimbangan bahan makanan dan buku foto makanan).

Uji reliabilitas pengukuran berat badan dilakukan dengan pengulangan pengukuran sebanyak dua kali agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan lebih akurat. Uji reliabilitas metode *food recall* harus dilakukan beberapa kali yaitu sebanyak 2x24 jam untuk mendapatkan nilai reliabilitas yang lebih maksimal.

### **Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dilakukan *editing*, *coding* dan tabulasi dalam mengolah data. Data secara keseluruhan dianalisis dengan menggunakan program komputerisasi yaitu *SPSS (System Paket Sosial Science)* meliputi analisis univariat dan analisis bivariat. Adapun analisa statistik menggunakan uji *chi-square*.

## **HASIL**

**Tabel 1** menunjukkan bahwa sebagian besar sampel terdapat pada kelompok umur 10-12 tahun yaitu sebanyak 25 orang (73.5%) dari 34 sampel sedangkan selebihnya atau sebanyak 9 orang (26.5%) berada pada kelompok umur 7-9 tahun. Untuk jenis kelamin kebanyakan sampel adalah laki-laki yaitu sebanyak 19 orang (55.9%) dari 34 orang sedangkan perempuan sebanyak 15 orang (44.1%). Berdasarkan kelurahan tempat tinggal menunjukkan sebagian besar sampel bertempat tinggal di kelurahan Panambungan yaitu sebanyak 22 orang (64.7%) dari 34 sampel sedangkan 12 sampel (35.3%) berada di kelurahan Lette. Sementara untuk jenis pekerjaan sebagian besar dari sampel bekerja sebagai penjual kantong plastik yaitu sebanyak 22 orang (64.7%) dari 34 sampel sedangkan paling sedikit bekerja sebagai pengamen dan tukang parkir yaitu hanya 1 orang (2.9%). Untuk tingkat pendidikan sebagian besar sampel yang sekolah SD ada sebanyak 32 orang (94.1%) dari 34 sampel sedangkan putus sekolah SD terdapat 2 orang (5.9%).

**Tabel 2** menunjukkan analisis hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di kecamatan mariso kota Makassar tahun 2014. Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $P=0,000 < ( =0,05)$  maka hipotesis  $H_a$  diterima yang berarti ada hubungan yang signifikan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada anak jalanan, dimana digambarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 orang dengan asupan zat besi cukup semuanya tidak anemia (100.0%). Sedangkan dari 24 orang dengan asupan zat besi kurang terdapat 6 orang (25.0%) tidak anemia dan 18 orang (75.0%) anemia.

**Table 3** menunjukkan analisis hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan di kecamatan mariso kota Makassar tahun 2014. Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistic *Chi-Square* diperoleh nilai  $P=0,134 > ( =0,05)$  maka hipotesis  $H_0$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia pada anak jalanan, dimana digambarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 21 orang yang infeksi kecacingan terdapat 12 orang (57.2%) tidak

anemia dan 9 orang (42.9%) mengalami anemia. Sedangkan dari 13 orang yang tidak infeksi kecacingan terdapat 4 orang (6.1%) tidak anemia dan 9 orang (6.9%) mengalami anemia.

## PEMBAHASAN

### *Asupan Zat Besi (Fe) terhadap Kejadian Anemia*

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *fisher's exact test* diperoleh hasil yang menunjukkan adanya hubungan antara asupan zat besi terhadap kejadian anemia pada anak jalanan. Maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan yang asupan zat besinya kurang dapat menyebabkan terjadinya anemia. Hal ini mengindikasikan pentingnya peranan zat besi dalam proses pembentukan sel darah merah. Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa zat besi adalah salah satu mineral mikro yang penting dalam proses pembentukan sel darah merah. Secara alamiah zat besi diperoleh dari makanan. Kekurangan zat besi dalam menu makanan sehari-hari dapat menimbulkan penyakit anemia gizi atau yang dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah.

Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi bahan makanan yang kurang beragam. Selain itu, karena kurangnya penyediaan makanan, distribusi makanan yang kurang baik, kemiskinan dan ketidaktahuan dalam pemilihan makanan, ditambah lagi dengan kebiasaan mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat besi seperti polifenol yang banyak terkandung dalam kopi dan teh secara bersamaan pada waktu makan sehingga menyebabkan penyerapan zat besi semakin rendah (Nancy dkk, 2013).

Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengatakan bahwa seseorang yang banyak makan nasi, tetapi kurang makan sayur-sayuran serta buah-buahan dan lauk-pauk, akan tetap menjadi anemia walaupun zat besi yang dikonsumsi dari makanan sehari-hari cukup banyak. Oleh karena itu makanan yang beraneka ragam memiliki zat gizi yang saling melengkapi. Mengonsumsi makanan yang cukup beragam jumlah maupun kualitasnya dapat membantu mencegah anemia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andawari dkk (2013) bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kadar feritin, dimana hasil penelitian menunjukkan 83,3% asupan zat besi tergolong defisit, 50% kadar feritin rendah. Masrizal (2007) dalam penelitian Andawari dkk (2013) mengatakan bahwa kadar feritin yang rendah dipengaruhi oleh kurangnya asupan zat besi. Hal ini sering terjadi pada orang-orang yang mengonsumsi bahan makanan yang kurang beragam dengan menu makanan yang terdiri dari nasi, kacang-kacangan dan sedikit daging, unggas, ikan yang merupakan sumber zat besi.

Selain itu, penelitian Arifin dkk (2013) juga mendukung hasil penelitian ini bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada murid sekolah dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana digambarkan dalam hasil penelitian ini yang menjawab asupan zat besi <AKG menunjukkan 68.9% menderita anemia. Hal ini mungkin disebabkan karena Bolaang Mongondow Utara merupakan kabupaten yang baru dan baru saja dilakukan pemekaran. Sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang

makanan yang mengandung zat besi serta peran ibu dalam mengontrol asupan untuk anaknya.

Citrakesumasari (2012) dalam bukunya juga menuliskan bahwa faktor utama penyebab anemia adalah kekurangan zat besi. Kekurangan zat ini, bisa karena penderita memang kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, ikan, hati, telur, dan daging, serta mengonsumsi makanan yang mengandung zat penghambat absorpsi zat besi (seperti kopi dan teh) dalam tubuh dalam waktu bersamaan.

Gibney (2008) dalam Saifi (2011) juga menjelaskan bahwa selain kurangnya asupan, penyebab anemia di negara-negara berkembang adalah adanya makanan yang menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi.

Teh merupakan bahan makanan banyak mengandung tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Guthrie (1995) dalam Saifi (2011) menyatakan bahwa tanin dalam teh dapat menghambat penyerapan zat besi pada waktu makan sebesar 70%. Sedangkan menurut Almatsier (2009) bahwa tanin yang terdapat dalam teh dan kopi dapat menurunkan absorpsi besi sampai 40% untuk kopi dan 85% untuk teh. Minum teh satu jam sesudah makan dapat menurunkan absorpsi besi hingga 85%, hal ini disebabkan karena terdapatnya polyphenol seperti tanin dalam teh.

#### ***Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia***

Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh hasil yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan. Tidak adanya hubungan tersebut dikarenakan kebanyakan dari anak jalanan yang terinfeksi kecacingan juga tidak menderita anemia. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak anemia memiliki asupan zat besi cukup sehingga ikut menormalkan kadar hemoglobinnya dan tidak menyebabkan anemia. Meskipun diketahui anak jalanan rentan terkena kecacingan karena kondisi lingkungannya yang kumuh, status sosial ekonomi rendah, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang. Namun fakta yang diperoleh dilapangan membuktikan bahwa tidak semua dari anak jalanan yang berada pada lingkungan kumuh menderita anemia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hadju dkk (2013) bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi kecacingan dengan status hemoglobin pada anak sekolah dasar di wilayah pesisir kota makassar dimana digambarkan dalam hasil penelitian ini prevalensi anemia sebesar 38% dan prevalensi infeksi kecacingan sebesar 57%. Jenis cacing yang paling banyak menginfeksi yaitu *Ascaris lumbricoides* 34% dan pada infeksi ganda, jenis cacing sebanyak 14% untuk cacing *Ascaris lumbricoides* dan *Trichuris Trichuria*.

Begitupun sebaliknya, anak jalanan yang tidak terinfeksi kecacingan namun menderita anemia disebabkan oleh faktor lain yaitu absorpsi zat besi yang rendah atau asupan zat besi yang kurang, bukan karena faktor penyakit infeksi.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kurangnya konsumsi zat besi dan zat gizi lainnya banyak ditemukan pada anak dari keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Anak jalanan juga berada pada situasi ini dimana banyak pihak yang meyakini bahwa kemiskinan yang menjadi faktor utama anak

turun kejalan dengan harapan dapat menambah uang sendiri untuk mendapatkan konsumsi makanan tambahan (jajan tambahan). Akhirnya orang tua dari mereka yang berstatus ekonomi rendah kurang sanggup membeli dan memilih makanan yang bergizi dan beragam untuk konsumsi hari-harinya.

Citrakesumasari (2012) dalam bukunya mengungkapkan bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan memilih dan membeli bahan makanan jenis heme (daging) dibandingkan dengan jenis *non-heme*. Bahan makanan jenis *heme* merupakan bahan makanan yang banyak mengandung zat gizi Fe yang diperlukan oleh tubuh seperti daging, ikan dan unggas. Sedangkan jenis *non-heme* terutama dalam biji-bijian, umbi-umbian, sayur, kacang-kacangan dan buah-buahan ditentukan oleh adanya faktor yang mempermudah dan menghambat penyerapan zat besi yang dikonsumsi secara bersamaan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Mu'Min/40:79



Terjemahnya:

*“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan”.*

Maksudnya bahwa Allah menciptakan binatang ternak untuk manusia sebagiannya untuk dikendarai dan sebagiannya lagi untuk dimakan. Termasuk dalam hal ini sapi, kambing dan ayam, sebagaimana yang diketahui bahwa ternak ini merupakan sumber zat besi *heme* yang tinggi dan akan membantu meningkatkan penyerapan zat besi *non heme* jika dikonsumsi secara bersamaan. Namun sumber zat besi *heme* ini tergolong mahal sehingga sulit dipenuhi untuk konsumsi kebutuhan sehari-hari utamanya bagi mereka yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah.

Menurunnya kualitas dan kuantitas makanan yang dibeli dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan tubuh akan zat gizi salah satunya zat besi yang akan berdampak terhadap timbulnya anemia. Menurut Husaini (1989) dalam Hadju (2013) pola makan yang tidak berkualitas dalam hal keragaman jenis makanan dan ketersediaan biologis besinya rendah merupakan faktor penting yang berperan dalam anemia karena dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Pola menu makanan yang hanya terdiri dari sumber karbohidrat, seperti nasi dan umbi-umbian, atau kacang-kacangan, tergolong menu rendah (penyerapan zat besi 5%). Pola menu yang kurang bervariasi ini sangat jarang atau sedikit sekali mengandung daging, ikan, dan sumber vitamin C. Terdapat lebih banyak bahan makanan yang mengandung zat penghambat absorpsi besi dalam menu makanan ini, sehingga keragaman atau variasi makanan yang dikonsumsi diperlukan untuk memperoleh penyerapan zat gizi yang baik.

## **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan asupan zat besi (Fe) dan infeksi kecacingan dengan kejadian anemia pada anak jalanan di kecamatan mariso kota Makassar tahun 2014, maka dapat disimpulkan

bahwa Untuk mencegah terjadinya peningkatan kejadian anemia, diharapkan dilakukannya penyuluhan tentang konsumsi makanan sumber zat besi untuk meningkatkan pemahaman ibu tentang makanan sumber zat besi dan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Perlunya dilakukan pencegahan dengan lebih meningkatkan hygiene dan sanitasi lingkungan serta pemberian obat cacing secara berkala yaitu tiap 6 bulan sekali kepada anak jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

terdapat hubungan asupan zat besi (Fe) terhadap kejadian anemia dengan nilai  $p=0.000$ . Dan tidak terdapat hubungan infeksi kecacingan terhadap kejadian anemia dengan nilai  $p=0,134$ .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, Sunita. *“Prinsip Dasar Ilmu Gizi”*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2009
- Andawari, Inrawati., Bolang, Alexander S. L., Rattu, Joy M. *“Hubungan Antara Asupan Zat Besi dengan Kadar Feritin Pada Siswa Kelas 4 dan 5 SD Katolik St. Theresia Malalayang Kota Manado”*. Manado: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sam Ratulangi. 2013
- Arifin, Sri Utami., Mayulu, Nelly., dan Rottie, Julia. *“Hubungan Asupan Zat Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Anak Sekolah Dasar Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”*. Manado: dalam ejournal keperawatan (e-Kp), Agustus 2013; Vol. 1, No. 1
- Citrakesumasari. *“Anemia Gizi, Masalah dan Pencegahannya”*. Yogyakarta: Kalika, cet. 1. 2012
- Hadju., Samudar, Nurhaitil., dan Jafar, Nurhaedar. *“Hubungan Infeksi Kecacingan Dengan Status Hemoglobin Pada Anak Sekolah Dasar di wilayah Pesisir Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013”*. Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2013
- Hadju., Supardin, Nurhaema., dan Sirajuddin, Saifuddin. *“Hubungan Asupan Zat Gizi dengan Status Hemoglobin Pada Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Makassar Tahun 2013”*. Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2013
- KEMENKES. *“Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar Indonesia Tahun 2013”*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2014
- Nancy., Tadete, Allenfina O., dan Basuki, Anita. *“Hubungan Antara Asupan Zat Besi, Protein dan Vitamin C dengan Kejadian Anemia pada Anak Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado”*. Manado: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. 2013
- Nurnia., Hadju, Veni., Citrakesumasari. *“Hubungan Pola Konsumsi dengan Status Hemoglobin Anak Sekolah Dasar di Wilayah Pesisir Kota Makassar”*.

Makassar: Jurnal. Ilmu Gizi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin. 2013

Pertiwi, Andi Cendra., La Ane, Ruslan., dan Selomo, Makmur. “*Analisis Faktor Praktik Hygiene Perorangan terhadap Kejadian Kecacingan pada Murid Sekolah Dasar di Pulau Barrang Lompo Kota Makassar*”. Makassar: Jurnal. Fakultas Kesehatan Masyarakat, UNHAS. 2013

Pramesti, Denok dan Sandy, Kurniajati. “*Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis Anak Jalanan Usia 6-12 Tahun*”. Kediri: dalam Jurnal STIKES Juli 2012; Vol.5 No.1

Saifi. “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Status Anemia Defisiensi Besi Anak Sekolah Kelas V Dan VI di MI Negeri 02 Cempaka Putih Ciputat Timur Tangerang Selatan*”. Jakarta: Skripsi. Gizi Kesehatan Masyarakat. Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2011.



**Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Karakteristik Sampel	n	%
<b>Umur (Tahun)</b>		
7-9	9	26.5
10-12	25	73.5
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	19	55.9
Perempuan	15	44.1
<b>Kelurahan</b>		
Panambungan	22	64.7
Lette	12	35.3
<b>Jenis Pekerjaan</b>		
Jual kantong plastik	22	64.7
Mengamen	8	23.5
Mengamen dan Jual kantong plastik	3	8.8
<b>Tingkat Pendidikan</b>		
Putus Sekolah SD	2	5.9
Sekolah SD	32	94.1
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer, 2014

**Tabel 2. Analisis Hubungan Asupan Zat Besi terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**


Asupan Zat Besi (Fe)	Kejadian Anemia				Total		P value
	Tidak Anemia		Anemia		N	%	
	n	%	n	%			
Cukup	10	100.0	0	0	10	100	<b>0,000</b>
kurang	6	25.0	18	75.0	24	100	
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	

Sumber : Data Primer, 2014

**Tabel 3. Analisis Hubungan Infeksi Kecacingan terhadap Kejadian Anemia pada Anak Jalanan di Kecamatan Mariso Kota Makassar Tahun 2014**

Infeksi Kecacingan	Kejadian Anemia				Total		p value
	Tidak Anemia		Anemia		N	%	
	n	%	n	%			
Tidak Infeksi	4	6.1	9	6.9	13	100	<b>0.134</b>
Infeksi	12	57.2	9	42.9	21	100	
<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>47.1</b>	<b>18</b>	<b>52.9</b>	<b>34</b>	<b>100</b>	

*Sumber : Data Primer, 2014*



## KUESIONER PENELITIAN

### HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI (Fe) DAN INFEKSI KECACINGAN TERHADAP KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK JALANAN DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR TAHUN 2014

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Nur Rahmi, mahasiswa Gizi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam kuesioner ini, tidak ada jawaban benar atau salah dan identitas adik-adik akan dirahasiakan. Dengan ini saya mengucapkan banyak terimakasih untuk kesediaan adik-adik menjadi responden dalam penelitian.

**Tanggal Wawancara:**

**Identitas Responden :**

No. Responden :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kelurahan :

Jenis Pekerjaan :

Status Pendidikan : a. Tidak Sekolah  
b. Putus Sekolah (SD, SMP)  
c. Masih Sekolah (SD, SMP,SMA)

Tinggal dgn Orang Tua : a. Ya

b. Tidak

pernah minum obat cacing 6 bulan terakhir : a. Ya

b. Tidak

Kadar Hemoglobin : g/dL

Pemeriksaan Infeksi Kecacigan : a. Infeksi

b. Tidak Infeksi


*Formulir Food Recall*

Hari Ke:

Waktu	JenisMakanan/BahanMakanan	Cara Pengolahan	Jumlah (Ukuran)	
			URT	Gram
Pagi				
Selingan				
Siang				
Selingan				
Malam				
Selingan				

**FORM FFQ (*Food Frequency Questionnaire*)**

Jenis bahan makanan	Frekuensi					
	Setiap makan	1x sehari	<3x seminggu	>3x seminggu	jarang	Tidak pernah
	5	4	3	2	1	0
<b>Sumber Zat Besi</b>						
Daging						
Ayam						
Ikan						
Hati						
Telur						
Sayuran hijau						
Tempe						
Kacang-kacangan						
<b>Penghambat Penyerapan zat besi</b>						
Kopi						
Teh						
Coklat						
Susu, keju dan produk olahannya						



**L**

**A**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**R**

**A**

**N**

## Frequency Table

### umur responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7-9	9	26.5	26.5	26.5
	10-12	25	73.5	73.5	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

### jenis kelamin responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	19	55.9	55.9	55.9
	perempuan	15	44.1	44.1	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

### kelurahan tempat tinggal responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Panambungan	22	64.7	64.7	64.7
	Lette	12	35.3	35.3	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

### jenis pekerjaan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	jual kantong plastik	22	64.7	64.7	64.7
	mengamen	8	23.5	23.5	88.2
	mengamen dan jual kantong plastik	3	8.8	8.8	97.1
	mengamen dan tukang parkir	1	2.9	2.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

### tingkat pendidikan responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Putus sekolah SD	2	5.9	5.9	5.9
	Sekolah SD	32	94.1	94.1	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

### status tinggal responden dengan orang tua

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	32	94.1	94.1	94.1
	Tidak	2	5.9	5.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

**asupan zat besi responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	10	29.4	29.4	29.4
	kurang	24	70.6	70.6	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

**frekuensi konsumsi sumber zat besi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	cukup	16	47.1	47.1	47.1
	kurang	18	52.9	52.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

**frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	jarang	16	47.1	47.1	47.1
	sering	18	52.9	52.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

**infeksi kecacingan responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak infeksi	13	38.2	38.2	38.2
	infeksi	21	61.8	61.8	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

**jenis cacing yang terdapat pada tinja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ascariasis lumbricoides	17	50.0	81.0	81.0
	Trichuris trichiura	1	2.9	4.8	85.7
	Trichuris trichiura dan Ascaris lumbricoides	2	5.9	9.5	95.2
	Hymnolepis Nana dan Ascaris lumbricoides	1	2.9	4.8	100.0
	Total	21	61.8	100.0	
Missing	System	13	38.2		
Total		34	100.0		

**kejadian anemia responden**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak anemia	16	47.1	47.1	47.1
	anemia	18	52.9	52.9	100.0
	Total	34	100.0	100.0	

asupan zat besi responden \* kejadian anemia responden Crosstabulation

			kejadian anemia responden		Tota
			tidak anemia	anemia	
asupan zat besi responden	cukup	Count	10	0	10
		Expected Count	4.7	5.3	10.0
		% within asupan zat besi responden	100.0%	.0%	100.0%
		% of Total	29.4%	.0%	29.4%
	kurang	Count	6	18	24
		Expected Count	11.3	12.7	24.0
		% within asupan zat besi responden	25.0%	75.0%	100.0%
		% of Total	17.6%	52.9%	70.6%
Total	Count	16	18	34	
	Expected Count	16.0	18.0	34.0	
	% within asupan zat besi responden	47.1%	52.9%	100.0%	
	% of Total	47.1%	52.9%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	15.938 <sup>a</sup>	1	.000	.000	.000
Continuity ...	13.069	1	.000		
Likelihood Ratio	20.024	1	.000	.000	.000
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases <sup>b</sup>	34				

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.71.

b. Computed only for a 2x2 table

## Crosstabs

frekuensi konsumsi sumber zat besi \* kejadian anemia responden Crosstabulation

			kejadian anemia responden		Total
			tidak anemia	anemia	
frekuensi konsumsi sumber zat besi	cukup	Count	10	6	16
		Expected Count <sup>a</sup>	7.5	8.5	16.0
		% within frekuensi konsumsi sumber zat besi	62.5%	37.5%	100.0%
		% of Total	29.4%	17.6%	47.1%
	kurang	Count	6	12	18
		Expected Count <sup>a</sup>	3.5	9.5	18.0
		% within frekuensi konsumsi sumber zat besi	33.3%	63.7%	100.0%
		% of Total	17.6%	35.3%	52.9%
Total		Count	16	18	34
		Expected Count <sup>a</sup>	13.0	18.0	34.0
		% within frekuensi konsumsi sumber zat besi	47.1%	52.9%	100.0%
		% of Total	47.1%	52.9%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.892 <sup>a</sup>	1	.089	.168	.087
Continuity ...	1.840	1	.175		
Likelihood Ratio	2.932	1	.087	.168	.087
Fisher's Exact Test				.168	.087
N of Valid Cases <sup>b</sup>	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.53.

b. Computed only for a 2x2 table

**frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi \* kejadian anemia responden Crosstabulation**

			kejadian anemia responder		Total
			tidak anemia	anemia	
frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi	jarang	Count	10	6	16
		Expected Count	7.5	8.5	13.0
		% within frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi	62.5%	37.5%	100.0%
		% of Total	29.4%	17.6%	47.1%
	sering	Count	6	12	18
		Expected Count	8.5	9.5	13.0
		% within frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi	33.3%	66.7%	100.0%
		% of Total	17.6%	35.3%	52.9%
Total	Count	16	18	34	
	Expected Count	16.0	18.0	34.0	
	% within frekuensi konsumsi penghambat penyerapan zat besi	47.1%	52.9%	100.0%	
	% of Total	47.1%	52.9%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.892 <sup>a</sup>	1	.089	.168	.087
Continuity ...	1.840	1	.175		
Likelihood Ratio	2.932	1	.087	.168	.087
Fisher's Exact Test				.168	.087
N of Valid Cases <sup>b</sup>	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.53.

b. Computed only for a 2x2 table

## infeksi kecacingan responden \* kejadian anemia

Crosstab

			kejadian anemia responden		Total	
			tidak anemia	anemia		
infeksi kecacingan responden	tidak infeksi	Count:	4	9	13	
		Expected Count	6.1	6.9	13.0	
		% within infeksi kecacingan responden	30.8%	69.2%	100.0%	
		% of Total	11.8%	26.5%	38.2%	
	infeksi	Count:	12	9	21	
		Expected Count	9.9	11.1	21.0	
Total			Count:	16	18	34
			Expected Count	16.0	18.0	34.0
			% within infeksi kecacingan responden	47.1%	52.9%	100.0%
			% of Total	47.1%	52.9%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.242 <sup>a</sup>	1	.134	.172	.126
Continuity ...	1.308	1	.253		
Likelihood Ratio	2.286	1	.131	.172	.126
Fisher's Exact Test				.172	.126
N of Valid Cases <sup>b</sup>	34				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.12.

b. Computed only for a 2x2 table

## CROSSTABS

### Jenis Cacing yang Terdapat pada Tinja \* Kejadian Anemia Responden

			kejadian anemia responden		Total
			tidak anemia	anemia	
jenis cacing yang terdapat pada tinja	Ascariasis lumbricoides	Count	11	6	17
		Expected Count	9.7	7.3	17.0
		% within jenis cacing yang terdapat pada tinja	64.7%	35.3%	100.0%
		% of Total	52.4%	28.8%	81.2%
Trichuris trichiura		Count	0	1	1
		Expected Count	.6	.4	1.0
		% within jenis cacing yang terdapat pada tinja	0%	100.0%	100.0%
		% of Total	0%	4.8%	4.8%
Trichuris trichiura dan Ascariis lumbricoides		Count	11	1	12
		Expected Count	11.3	.7	12.0
		% within jenis cacing yang terdapat pada tinja	50.0%	50.0%	100.0%
		% of Total	4.8%	4.8%	9.6%
Hymenolepis Nana dan Ascariis lumbricoides		Count	0	1	1
		Expected Count	.6	.4	1.0
		% within jenis cacing yang terdapat pada tinja	0%	100.0%	100.0%
		% of Total	0%	4.8%	4.8%
Total		Count	12	9	21
		Expected Count	12.0	9.0	21.0
		% within jenis cacing yang terdapat pada tinja	57.1%	42.9%	100.0%
		% of Total	57.1%	42.9%	100.0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)	Point Probability
Pearson Chi-Square	3.105 <sup>a</sup>	3	.376	.570		
Likelihood Ratio	3.836	3	.280	.570		
Fisher's Exact Test	3.174			.570		
Linear-by-Linear Association	1.720 <sup>b</sup>	1	.190	.230	.147	.084
N of Valid Cases	21					

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .43.

b. The standardized statistic is 1.311.

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Kondisi Lingkungan Rumah Penelitian



**Wawancara dengan Responden**



**Penimbangan Berat Badan**



Pemeriksaan kadar Hb



Pembagian dan pengembalian Pot Tinja



## Proses Pemeriksaan Tinja



**Sampel Siap Untuk Diteliti**



**Sampel tinja yang akan diteliti**



**Pemberian Nomor pd Objek Glass**



**Tinja diambil lalu diletakkan diatas kرتون**



**Tinja disaring menggunakan kawat kasa**



**Selotip di rendam dalam larutan malachite-green-gliserin**



**Selotip yang telah direndam di letakkan di atas tinja**



**Tinja yang siap di periksa dengan menggunakan mikroskop**



1965  
Pemeriksaan Jenis dan Jumlah Telur Cacing



## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palopo pada tanggal 06 Agustus 1992, puteri dari pasangan Bapak Kasman ST dan Ibu Hasmawati Amd. Penulis merupakan anak bungsu dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari Taman Kanak-Kanak Masyitah Palopo tahun 1996-1998, pada tahun 1998 masuk Sekolah Dasar Muhammadiyah Palopo dan lulus pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Palopo pada tahun 2007, dan pada tahun 2010, penulis menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Palopo. Alhamdulillah, pada tahun 2010 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada fakultas Ilmu kesehatan Jurusan kesehatan masyarakat peminatan Gizi.