

Cut Muthiadin

Pengantar Rekayasa

GENETIKA



Tentang Penulis



Cut Muthiadin, S.Si., M.Si, lahir di bottoe kabupaten Barru, 10 Nopember 1982. Beliau mendapat gelar sarjana sains (Jurusan Biologi) dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Universitas Hasanuddin, Makassar tahun 2005, dan gelar Magister sains dari konsentrasi Mikrobiologi Prodi Biomedik, PascaSarjana Universitas Hasanuddin tahun 2007, dan sekarang sedang melanjutkan studi program Doktor (Prodi Ilmu Kedokteran), fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau menjadi staf pengajar di Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar dalam mata kuliah binaan Genetika. Selain mengajar, ia juga sedang melakukan penelitian dalam tahap penyelesaian disertasi dan aktif dalam penelitian-penelitian bersama mahasiswa untuk tugas akhir/skripsi sebagai promotor/pembimbing. Beberapa buku yang telah ditulis diantaranya Biologi sel dan Genetika.

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Cut Muthiadin., S.Si., M.Si

N I P : 19821110 200912 2 005

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tulisan yang saya susun ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tulisan ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2014

Yang Menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Cut Muthiadin

DAFTAR ISI

SAMPUL

KEASLIAN TULISAN **i**

KATA PENGANTAR **ii**

DAFTAR ISI **iii**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1. Apa itu Teknik Rekayasa Genetik? 1

1.2. Sejarah Perkembangan Teknik Rekayasa Genetik 2

1.3. Intisari Tulisan 6

2 PENGANTAR BIOLOGI MOLEKULER **13**

2.1. Arus Informasi Genetik 13

2.2. Struktur dari DNA dan RNA 13

STRUKTUR PRIMER DNA & RNA 17

2.3. Struktur Sekunder DNA (Heliks Ganda) 20

2.4. Fungsi Asam Nukleat 23

2.5. Struktur Protein 23

2.6. Organisasi Gen 26

2.7. Struktur Gen Prokariot 27

2.8. Struktur Organisasi Pada Gen Eukariot 28

2.9. Ekspresi Gen 36

3 ENZIM	39
Enzim Restriksi	40
Enzim Legase	44
4 TEKNIK REKAYASA GENETIK	47
4.1. Isolasi DNA	47
Isolasi DNA Plasmid	48
4.2. PCR	48
Komponen PCR	53
4.3. RT-PCR	53
4.4. Metoda Deteksi Produk Pcr	54
4.5. Sekuensing Dna	56
4.6. Teknik Hibridasi	60
4.7. Analisis RFLP	62
5 VEKTOR KLONING	69
5.1. DNA Sisipan	70
5.2. DNA Vektor	71
5.3. Vektor Ekpresi	77
6 PERPUSTAKAAN GEN	83
PENGERTIAN & MACAM PERPUSTAKAAN GEN	83
7 REKAYASA GENETIK & BIOTEKNLOGI	93



7.1. Penelitian Dasar	93
7.2. Proyek “Human Genom”	94
7.3. Aplikasi Di Bidang Medik	95
7.4. Aplikasi Untuk Lingkungan	99
7.5. Penggunaan Dna Rekombinan Untuk Pertanian	100
8 TERAPI GEN	104
8.1. Definisi Dan Prinsip Terapi Gen	105
8.2. Jenis Terapi Gen	105
8.3. Hambatan Dalam Terapi Gen	110
8.4. Prasyarat Terapi Gen	111
8.5. Contoh Terapi Gen	112
9 REKAYASA GENETIK DI BIDANG PETERNAKAN	114
Bioteknologi Reproduksi Hewan	115
10 REKAYASA GENETIK DI BIDANG PERTANIAN	127
10.1. Tanaman Transgenik dan Jenisnya	127
10.2. Contoh Tanaman yang telah menggunakan Rekayasa Genetika	127
10.3.Keunggulan Tanaman Rekayasa Genetika	133
11 TINJAUAN REKAYASA GENETIKA DALAM PERSPEKTIF ISLAM	135

12 ASPEK KEAMANAN DAN REGULASI **138**

PRODUK HASIL REKAYASA GENETIKA

12.1. Pendahuluan **138**

12.2. Produk Hasil Rekayasa Genetika **140**

12.3. Keamanan Produk Hasil Rekayasa **141**

Genetika

12.4. Etika & Hasil Regulasi Produk Hasil **144**

Rekayasa Genetika

DESKRIPSI SINGKAT

TENTANG PENULIS

DAFTAR PUSTAKA



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis dapat menyusun buku "Pengantar Rekayasa Genetika". Rekayasa Genetika merupakan cabang ilmu terapan dari bioteknologi. Bioteknologi mulai berkembang dengan cepat beberapa tahun terakhir ini. Setiap hari bila kita membaca surat kabar, atau menonton televisi, kita sering mendapat informasi beberapa terobosan baru yang merupakan hasil langsung dari bioteknologi.

Teknologi DNA rekombinan yang merupakan dasar dari semua produk berbasis bioteknologi sangat cepat berkembang akhir-akhir ini. Untuk mengerti apa yang ada dibalik suatu produk bioteknologi, maka sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami teknologi DNA rekombinan. Buku ini dimulai dengan ilmu-ilmu dasar di balik bioteknologi, yaitu DNA sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian dilanjutkan beberapa teknik yang biasa dilakukan dalam teknologi DNA rekombinan dan diakhiri dengan aplikasi dan produk-produk bioteknologi.

Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami prinsip dan metoda-metoda di bidang teknologi DNA rekombinan. Penulis menyadari, masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, saran dan kritik akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki buku ini.

Makassar, September 2014
Penulis

DESKRIPSI SINGKAT

Sejarah perkembangan genetika sebagai ilmu pengetahuan dimulai menjelang akhir abad ke 19 ketika seorang biarawan Austria bernama GregorJohann Mendel berhasil melakukan analisis yang cermat dengan interpretasi yangtepat atas hasil-hasil percobaan persilangannya pada tanaman kacang ercis (*Pisum sativum*). Sebenarnya, Mendel bukanlah orang pertama yang melakukanpercobaan-percobaan persilangan. Akan tetapi, berbeda dengan parapendahulunya yang melihat setiap individu dengan keseluruhan sifatnya yangkompleks, Mendel mengamati pola pewarisan sifat demi sifat sehingga menjadilebih mudah untuk diikuti. Deduksinya mengenai pola pewarisan sifat inikemudian menjadi landasan utama bagi perkembangan genetika sebagai suatucabang ilmu pengetahuan, dan Mendelpun di akui sebagai Bapak Genetika.

Selanjutnya, pada awal abad ke-20 ketika biokimia mulai berkembangsebagai cabang ilmu pengetahuan baru, para ahli genetika tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang hakekat materi genetik, khususnya mengenai sifat biokimianya.Pada tahun 1920-an, dan kemudian tahun 1940-an, terungkap bahwasenyawa kimia materi genetik adalah asam dioksiribonekleat (DNA).Denganditemukannya model struktur molekul DNA pada tahun1953 oleh J.D.Watson dan F.H.C. Crick dimulailah era genetika yang baru, yaitu genetika molekuler.

Perkembangan penelitian genetika molekuler terjadi demikian pesatnya. Jika ilmu pengetahuan pada umumnya mengalami perkembangan dua kali lipat(doubling time) dalam satu dasa warsa, maka hal pada genetika molekuler hanyalah dua tahun. Bahkan, perkembangan yang lebih revolusioner dapat disaksikan semenjak tahun 1970-an, yaitu pada saat dikenalnya teknologi manipulasi molekul DNA atau teknologi DNA rekombinan atau dengan istilah yang lebih populer disebut **Rekayasa Genetika**.

Rekayasa genetika dalam arti paling luas adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Dengan pengertian ini kegiatan pemuliaan hewan atau tanaman melalui seleksi dalam populasi dapat dimasukkan. Demikian pula penerapan mutasi buatan tanpa target dapat pula dimasukkan. Masyarakat ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan yang lebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik genetika molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu. Perubahan sifat biologis melalui rekayasa genetika tersebut menyebabkan “lahirnya organisme baru” produk bioteknologi dengan sifat-sifat yang menguntungkan bagi manusia.

Dalam buku ini, saya telah mengorganisir bab-bab selanjutnya menjadi tiga bagian . Bagian I (Dasar rekayasa genetika ; Bab 1-3) berkaitan dengan dasar teknologi -teknik . Bab1 (Pengantar biologi molekuler) dan Bab 2 (Bekerja dengan asam nukleat) memberikan informasi latar belakang tentang DNA dan teknik digunakan ketika bekerja dengan itu . Bab 3 (alat-alat) melihat kisaran enzim yang dibutuhkan untuk manipulasi gen . Bagian II (Metodologi manipulasi gen ; Bab 4-7) menguraikan tehnik dan strategi yang diperlukan untuk mengkloning dan mengidentifikasi gen . Bab 4 (sel host dan vektor) dan Bab 5 (strategi Kloning) menggambarkan berbagai sistem dan protokol yang dapat digunakan untuk mengkloning DNA . Bab 6 membahas Polymerase chain reaction , yang telah merevolusi banyak bidang molekul biologi . Bab 7 (Seleksi , screening dan analisis rekombinan) menjelaskan bagaimana sekuens DNA tertentu dapat dipilih dari koleksi kloning fragment. Dalam Bagian III (Rekayasa genetika dalam tindakan, Bab 8-13) aplikasi manipulasi gen dan teknologi yang terkait yang dibahas. topik yang dibahas yaitu Memahami gen dan genom (Bab 8) , Rekayasa genetika dan bioteknologi (Bab 9) , aplikasi kedokteran dan forensik (Bab 10) , dan transgenik tumbuhan dan hewan (Bab 11) . Kloning organisme dibahas dalam Bab 12 (jenis lain dari kloning) , dan pertimbangan moral dan etis dari ahli rekayasa genetik dalam Bab 13 (Bioetika Kloning) .

1

Pendahuluan


1.1 Apa itu Teknik Rekayasa genetik?

Kemajuan dalam disiplin ilmu apapun bergantung pada tersedianya teknik dan metode yang memperluas jangkauan dan kesempurnaan dari percobaan yang akan dilaksanakan. Lebih dari 30 tahun terakhir telah ditunjukkan dengan jalan yang spektakuler oleh kemunculan teknik rekayasa genetik. Bidang ini berkembang dengan cepat ke segala bidang, di beberapa laboratorium di seluruh dunia, sekarang ini rutin praktek mengisolasi fragmen DNA spesifik dari genom satu organisme, menentukan urutan basanya, dan menilai fungsinya.

Teknologi ini juga sekarang terpakai pada beberapa aplikasi lain, meliputi analisa forensik dari sampel tindakan kriminal, sengketa garis keturunan, hasil diagnosa medis, pemetaan genom dan sekuensing, dan industri bioteknologi.

Bentuk teknik rekayasa genetik sering dipikir agak dan bahkan remeh, namun ini mungkin label yang kebanyakan orang-orang akan akui. Akan tetapi, ada beberapa bentuk lain yang biasa dipakai untuk mendeskripsikan teknologi tersebut, meliputi **manipulasi gen, kloning gen, teknologi rekombinasi DNA, dan modifikasi genetik.**

Meskipun ada banyak macam-macam dan jenis teknik yang terlibat, akan tetapi prinsip dasar dari manipulasi genetik sebenarnya agak mudah.



Gambar 1.1. Empat langkah dalam eksperimen kloning gen.

Dasar pada teknologi tersebut berdasarkan informasi genetiknya, dikode oleh DNA, dan diatur dalam bentuk gen, merupakan satu sumber yang bias dimanipulasi dalam berbagai cara untuk mendapatkan tujuan yang jelas untuk kedua ilmu terapan dan murni serta kedokteran. Ada beberapa bidang dimana manipulasi genetik adalah berharga, termasuk diantaranya:

- Riset dasar pada struktur gen dan fungsi
- Produksi protein berguna dengan cara terbaru
- Menghasilkan tanaman dan hewan transgenik
- Diagnosa medis dan pengobatan.

1.2 Sejarah Perkembangan Teknik Rekayasa Genetika


Pada awalnya, proses rekayasa genetika ditemukan oleh Crick dan Watson pada tahun 1953. Rekayasa genetika merupakan suatu rangkaian metode yang canggih dalam perincian akan tetapi sederhana dalam hal prinsip yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan gen atau sekelompok gen dari sebuah sel dan mencangkokkan gen atau sekelompok gen tersebut pada sel lain dimana gen atau sekelompok gen tersebut mengikat diri mereka dengan gen atau sekelompok gen yang sudah ada dan bersama-sama menanggung reaksi biokimia penerima.

Modifikasi genetika adalah suatu perubahan yang terjadi pada DNA dengan cara transfer gen di antara dan di dalam benda hidup lainnya yang berbeda. Secara tradisional, modifikasi/ rekayasa genetika sebenarnya telah dilakukan oleh para petani melalui proses penyilangan dan perbaikan tanaman. Misalnya melalui tahap penyilangan dan seleksi tanaman dengan tujuan tanaman tersebut menjadi lebih besar, kuat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Selama puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, para petani dan para pemulia tanaman telah berhasil memuliakan tanaman padi, jagung, dan tebu, sehingga tanaman-tanaman tersebut mempunyai daya hasil tinggi dan memiliki kualitas panen yang lebih baik.

Proses pemindahan gen pada pemuliaan tradisional dilakukan melalui proses penyerbukan dengan perantara angin maupun bantuan serangga penyerbuk. Proses penyerbukan ini sering kali melibatkan bantuan manusia, misalnya melalui penyerbukan dengan cara memindahkan serbuk sari tanaman yang satu ke ujung putik tanaman lainnya. Prinsip rekayasa genetika sama dengan pemuliaan tanaman, yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambahkan sifat-sifat ketahanan terhadap cekaman makhluk hidup pengganggu maupun cekaman lingkungan yang kurang menguntungkan serta memperbaiki kualitas nutrisi makanan. Rekayasa genetika adalah kelanjutan dari pemuliaan secara tradisional. Dalam arti paling luas merupakan penerapan genetika untuk kepentingan manusia akan tetapi masyarakat ilmiah sekarang lebih bersepakat dengan batasan yang lebih sempit, yaitu penerapan teknik-teknik genetika molekuler untuk mengubah susunan genetik dalam kromosom atau mengubah sistem ekspresi genetik yang diarahkan pada kemanfaatan tertentu.

Obyek rekayasa genetika mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Bidang kedokteran dan farmasi paling banyak berinvestasi di bidang yang relatif baru ini. Sementara itu bidang lain, seperti ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan bidang masing-masing. Tidak seperti halnya pemuliaan tanaman secara tradisional yang menggabungkan seluruh komponen materi genetika dari dua tanaman yang disilangkan, rekayasa genetika memungkinkan pemindahan satu atau beberapa gen yang dikehendaki dari satu tanaman ke tanaman lain.


Keunggulan rekayasa genetika adalah mampu memindahkan materi genetika dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Melalui proses rekayasa genetika ini, telah berhasil dikembangkan tanaman yang tahan terhadap organisme pengganggu seperti serangga, penyakit dan gulma yang sangat merugikan tanaman. Rekayasa genetika bermain pada tingkat molekuler khususnya DNA.



Gambar 1.2 Sejarah Genetika sejak 1900. Daerah yang diarsir menunjukkan masa periode dari perkembangan utama di setiap cabang subjek.

Di akhir tahun 1960 di situ adalah masa frustrasi di antara ahli sains yang bekerja di bidang biologi molekular. Penelitian telah berkembang ke titik dimana kemajuan dirintangi oleh batasan teknis. Bagaimanapun, sejumlah perkembangan memberikan stimulus yang perlu untuk manipulasi gen menjadi nyata. Di tahun 1967 enzim DNA Ligase diisolasi. Enzim ini dapat menggabungkan dua untai bersama. Kemudian dilanjutkan dengan isolasi oleh enzim restriksi pertama di tahun 1970. Enzim restriksi merupakan gunting molekuler yang sangat penting, yang memotong DNA pada urutan yang tepat. Lalu, pada tahun 1970, alat dasar yang diperlukan untuk membuat DNA rekombinan ditemukan. Molekul DNA rekombinan pertama dilakukan di universitas Stanford tahun 1972, menggunakan alur pembelahan dari enzim restriksi dan kemampuan dari DNA ligase menggabungkan dua untai DNA bersama. Cara ini kemudian dikembangkan di tahun 1973 dengan menggabungkan fragmen DNA ke plasmid pSC101, dimana merupakan **elemen ekstrakromosomal** yang diisolasi dari bakteri

Escherichia coli. Molekul rekombinan ini bertindak sebagai **replicon** (mereka dapat bereplikasi ketika dikenalkan kedalam sel *E.coli*). Sehingga dengan membuat molekul rekombinan *in vitro*, dan menempatkannya ke dalam sel bakteri dimana kemudian bereplikasi secara *in vivo*, ketika ditumbuhkan dalam cawan agar. Hal ini kemudian dikenal sebagai **kloning gen (Gbr 1.3)**. Penemuan pada tahun 1972 dan 1973 memicu kemungkinan terjadinya revolusi ilmiah terbesar pada semua ke- genetika baru. Akan tetapi perkembangan Organime Modifikasi Genetika (OMG), khususnya tanaman pertanian, telah membuka kembali perdebatan tentang keamanan organisme tersebut dan konsekuensi dari pelepasan OMG ke lingkungan.



Gambar 1.3 Kloning Fragmen DNA (Desmond)

1.3 Intisari tulisan

Dalam buku ini, saya telah mengorganisir bab-bab selanjutnya menjadi tiga bagian . Bagian I (Dasar rekayasa genetika ; Bab 1-3) berkaitan dengan dasar teknologi -teknik . Bab1 (Pengantar biologi molekuler) dan Bab 2 (Bekerja dengan asam nukleat) memberikan informasi latar belakang tentang DNA dan teknik digunakan ketika bekerja dengan itu . Bab 3 (alat-alat) melihat kisaran enzim yang dibutuhkan untuk manipulasi gen . Bagian II (Metodologi manipulasi gen ; Bab 4-7) menguraikan tehnik dan strategi yang diperlukan untuk mengkloning dan mengidentifikasi gen . Bab 4 (sel host dan vektor) dan Bab 5 (strategi Kloning) menggambarkan berbagai sistem dan protokol yang dapat digunakan untuk mengkloning DNA . Bab 6 membahas Polymerase chain reaction , yang telah merevolusi banyak bidang molekul biologi . Bab 7 (Seleksi , screening dan analisis rekombinan) menjelaskan bagaimana sekuens DNA tertentu dapat dipilih dari koleksi kloning fragment. Dalam Bagian III (Rekayasa genetika dalam tindakan, Bab 8-13) aplikasi manipulasi gen dan teknologi yang terkait yang dibahas. topik yang dibahas yaitu Memahami gen dan genom (Bab 8) , Rekayasa genetika dan bioteknologi (Bab 9) , aplikasi kedokteran dan forensik (Bab 10) , dan transgenik tumbuhan dan hewan (Bab 11) . Kloning organisme dibahas dalam Bab 12 (jenis lain dari kloning) , dan pertimbangan moral dan etis dari ahli rekayasa genetik dalam Bab 13 (Bioetika Kloning) .

2

Pengantar Biologi Molekuler

2.1 Arus Informasi Genetik

Sudah menjadi fakta yang luar biasa bahwa karakteristik suatu organisme disandi oleh empat-huruf alphabet, menjadi bahasa yang terdiri dari kata- tiga huruf. Huruf alphabet tersebut adalah basa Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), dan Thymine (T), dengan kombinasi triplet dari ketiga basa ini menjadikan suatu "KAMUS" yang biasa disebut **kode genetik**.

Tabel 2.1. Kode genetik

Basa I (5')	Basa II				Basa III (3')
	U	C	A	G	
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	Stop	Stop	A
	Leu	Ser	Stop	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C

	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

Keterangan :

phe = ser = serin
fenilalanin

his = glu = asam
histidin glutamate

leu = leusin pro = prolin

gln = cys = sistein
glutamin

ile = thr = treonin
isoleusin

asn = trp = triptofan
asparagin

met = ala = alanin
metionin

lys = lisin arg = arginin

val = valin tyr = tirosin asp = asam gly = glisin
aspartat

AUG (kodon metionin) dapat menjadi kodon awal (*start codon*)

stop = kodon stop (*stop codon*)


Sifat-sifat kode genetik

Kode genetik mempunyai sifat-sifat yang akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Kode genetik bersifat **universal**. Artinya, kode genetik berlaku sama hampir di setiap spesies organisme.
2. Kode genetik bersifat **degenerate** atau **redundant**, yaitu bahwa satu macam asam amino dapat disandi oleh lebih dari satu triplet kodon. Sebagai contoh, treonin dapat disandi oleh ACU, ACC, ACA, dan ACG. Sifat ini erat kaitannya dengan sifat **wobble** basa ketiga, yang artinya bahwa basa ketiga dapat berubah-ubah tanpa selalu disertai perubahan macam asam amino yang disandinya. Diketuinya sifat **wobble** bermula dari penemuan basa inosin (I) sebagai basa pertama pada antikodon tRNA^{ala} ragi, yang ternyata dapat berpasangan dengan basa A, U, atau pun C. Dengan demikian, satu antikodon pada tRNA dapat mengenali lebih dari satu macam kodon pada mRNA.
3. Oleh karena tiap kodon terdiri atas tiga buah basa, maka tiap urutan basa mRNA, atau berarti juga DNA, mempunyai tiga **rangka baca yang berbeda** (***open reading frame***). Di samping itu, di dalam suatu segmen tertentu pada DNA dapat terjadi transkripsi dan translasi urutan basa dengan panjang yang berbeda. Dengan perkataan lain, suatu segmen DNA dapat terdiri atas lebih dari sebuah gen yang saling **tumpang tindih** (***overlapping***). Sebagai contoh, bakteriofag ϕ X174 mempunyai sebuah untai tunggal DNA yang panjangnya lebih kurang hanya 5000 basa. Seandainya dari urutan basa ini hanya digunakan sebuah rangka baca, maka akan terdapat sekitar 1700 asam amino yang dapat disintesis. Kemudian, jika sebuah molekul protein rata-rata tersusun dari 400 asam amino, maka dari sekitar 1700 asam amino tersebut hanya akan terbentuk 4 hingga 5 buah molekul protein. Padahal kenyataannya, bakteriofag ϕ X174 mempunyai 11 protein

yang secara keseluruhan terdiri atas 2300 asam amino. Dengan demikian, jelaslah bahwa dari urutan basa DNA yang ada tidak hanya digunakan sebuah rangka baca, dan urutan basa yang diekspresikan (gen) dapat tumpang tindih satu sama lain.

Informasi genetik mengkode DNA menjadi RNA , disebut **transkripsi** (TC), selanjutnya RNA diterjemahkan menjadi protein disebut **translasi** (TL). Konsep alur informasi ini dikenal sebagai Dogma Central dari biologi molecular. ,dan merupakan satu tema dasar pada semua pembahasan pada ekspresi gen.




Gambar. 2.1. Dogma Central Biologi Molekulari

Perubahan urutan basa di dalam molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA dinamakan **transkripsi**, sedangkan penerjemahan urutan basa RNA menjadi urutan asam amino suatu protein dinamakan **translasi**. Jadi, proses transkripsi dan translasi dapat dilihat sebagai tahap-tahap ekspresi urutan basa DNA. Namun, tidak semua urutan basa DNA akan diekspresikan menjadi urutan asam amino. Urutan basa DNA yang pada akhirnya menyandi urutan asam amino disebut sebagai gen. Dengan demikian, secara kimia gen adalah urutan basa nitrogen tertentu pada molekul DNA yang dapat diekspresikan melalui tahap-tahap transkripsi dan translasi menjadi urutan asam amino tertentu.

2.2 Struktur dari DNA dan RNA


DNA dan RNA merupakan polimer linier (polinukleotida) yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida. Komponen penyusun nukleotida

= U) (Gambar 2.2). Monomer nukleotida mempunyai gugus hidroksil pada posisi karbon 3', gugus fosfat pada posisi karbon 5' dan basa pada posisi karbon 1' molekul gula. Nukleotida satu dengan yang lainnya berikatan melalui ikatan fosfodiester antara gugus 5' fosfat dengan gugus 3' hidroksil.



Gambar 2.2. Struktur Nukleotida


Struktur DNA mirip dengan struktur RNA. Perbedaan diantara keduanya terdapat pada jenis gula dan basa pada monomernya serta jumlah untaian penyusunnya. Pada DNA, tidak terdapat gugus hidroksil pada posisi karbon 2' dari molekul gula (2- deoksiribosa) sementara pada RNA molekul gulanya adalah ribosa. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin dan timin, sedangkan pada RNA jenis basanya adalah adenin, sitosin, guanin dan urasil. RNA merupakan polinukleotida yang membentuk satu rantai/unta. Sedangkan DNA merupakan polinukleotida yang membentuk 2 untaian (heliks ganda).



Gambar 2.3. Struktur Purin dan Pyrimidin (Adenin dan Guanin; Cytosin, Tymin dan Urasil)

STRUKTUR PRIMER DNA DAN RNA


Asam nukleat merupakan polimer dari ratusan, ribuan, bahkan jutaan nukleotida yang bergabung satu sama lainnya melalui ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester terbentuk antara gugus OH pada posisi 3' dengan gugus fosfat pada posisi 5'. Sehingga tulang punggung molekul DNA dan RNA terdiri dari gugus fosfat dan pentosa secara bergantian (Gambar 2.4).



Gambar 2. 4. Struktur primer DNA dan RNA

2.3. STRUKTUR SEKUNDER DNA (HELIKS GANDA)

Struktur sekunder DNA pertama kali ditemukan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953, dengan menggunakan teknik difraksi sinar X. Struktur molekul DNA merupakan rantai heliks ganda yang memutar ke kanan (Gambar 2.4). Kedua rantai polinukleotida memutar pada sumbu yang sama dan bergabung satu dengan yang lainnya melalui ikatan hidrogen antara basa-basanya. Basa guanin berpasangan dengan basa cytosin, sedangkan basa adenin berpasangan dengan basa tymin. Antara basa guanin dan basa cytosin terbentuk tiga ikatan hidrogen, sedang antara basa adenin dan tymin terbentuk dua ikatan hidrogen. Sehingga dalam molekul DNA jumlah basa G akan selalu sama dengan jumlah basa C, sedangkan jumlah basa A=T. Kemudian jumlah basa purin (A + G) akan sama dengan jumlah basa pyrimidin (C + T). Kedua untai DNA saling berkomplementasi melalui basa penyusunnya dengan arah antiparalel (berlawanan $5' \rightarrow 3'$ vs $3' \rightarrow 5'$), ujung yang mengandung gugus fosfat bebas disebut ujung 5' sedangkan pada ujung lainnya yang mengandung gugus hidroksil bebas disebut ujung 3'. Kedua untai tersebut saling melilit satu sama lain membentuk struktur heliks ganda. Gugus fosfat dan gula yang tersusun bergantian menjadi tulang punggung (*backbone*) molekul DNA sementara pada bagian dalam terdapat basa yang melekat pada molekul gula.



Gambar 2.5. Struktur double heliks DNA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk memudahkan pembacaan dan penulisannya, urutan DNA hanya dituliskan nama-nama basanya dengan menuliskan tanda 5' dan 3' pada ujung-ujungnya. Contoh :

5'-GATCGGTAACTG-3'


3'-CTAGCCATTGAC-5'

Contoh diatas, merupakan oligonukleotida dengan ukuran 12 pasang basa (=pb). Rantai pertama komplemen dengan rantai kedua. Untuk memudahkan, DNA untai ganda biasanya hanya dituliskan satu untai saja dengan menuliskan tanda 5' dan 3' pada ujung-ujungnya.

Rantai RNA berbentuk untai tunggal sehingga tidak membentuk struktur heliks yang teratur seperti DNA. Walaupun demikian RNA mungkin bisa membentuk struktur sekunder dan tersier karena pasangan basa bisa terbentuk pada daerah yang

membentuk loops. Terdapat tiga tipe molekul RNA dalam sel, yaitu mRNA, tRNA dan rRNA. Molekul mRNA mengandung urutan nukleotida yang akan mengode urutan asam amino dari protein pada proses translasi. mRNA eukariot terdiri dari urutan leader pada ujung 5', daerah pengode, dan ekor poli A pada ujung 3'.

rRNA dan tRNA merupakan perangkat untuk sintesa protein, tapi tidak mengode protein. Struktur rRNA mengandung banyak loops, dan terdapat pasangan basa diantara loops, sedangkan struktur tRNA berbentuk seperti daun (*cloverleaf*). rRNA memiliki pasangan basa internal yang membentuk kompleks dengan protein membentuk partikel ribonukleoprotein yang disebut ribosom.



Gambar 2.6. Perbedaan DNA dan RNA


2.4. FUNGSI ASAM NUKLEAT

Asam nukleat DNA berperan penting dalam menjaga kelestarian spesies dari generasi ke generasi. DNA melalui urutan basanya membawa kode informasi genetik yang spesifik untuk setiap individu dan untuk spesies tertentu. Informasi genetik pada DNA akan ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya RNA akan ditranslasikan menjadi protein. Tidak semua informasi genetik tersimpan dalam bentuk DNA, pada virus tertentu seperti retrovirus materi genetik tersimpan dalam bentuk RNA.

2.5. STRUKTUR PROTEIN

Protein adalah polimer lurus yang tersusun dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Struktur dasar asam amino terdiri dari atom karbon $C\alpha$ sebagai pusatnya yang terikat dengan gugus amino (atau imino pada prolin), gugus karrboksil, atom hidrogen, dan rantai samping yang disebut gugus R. Gugus R ini membedakan sifat antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain.

Rantai samping



Garrett & Grisham: Biochemistry, 2/e

Gugus Amino

Gugus Karboksil


Gambar 2.7. Struktur asam amino

Berdasarkan muatan listrik totalnya pada kondisi fisiologi, asam amino diklasifikasikan menjadi (1) asam amino netral (tidak bermuatan), (2) asam amino asam (bermuatan positif), dan (3) asam amino basa (bermuatan negatif). Asam amino netral dapat digolongkan menjadi asam amino nonpolar dan hidrofob (Ala, Val, Ile, Leu, Trp, Pro, Met, Phe, Cys, Tyr); dan yang lainnya adalah polar dan hidrofil (Ser, Thr, Gln, Asn). Di antara asam amino yang polar dan hidrofil, dua bersifat asam (bermuatan negatif) yaitu asam aspartat dan asam glutamat dan tiga bersifat basa (bermuatan positif) yaitu lisin, arginin dan histidin. Gugus R pada asam amino glisin adalah atom hidrogen yang tidak memberikan sifat hidrofob ataupun hidrofil pada asam amino berukuran paling kecil ini. Dua asam amino mengandung sulfur yaitu sistein dan metionin. Hanya sistein yang membentuk ikatan disulfida. Penulisan asam amino dapat menggunakan simbol satu huruf (A untuk alanin, W untuk triptofan) atau tiga huruf (ala untuk his).

Struktur linier asam amino yang dihubungkan melalui ikatan peptida disebut polipeptida. Ikatan peptida terjadi antara gugus amino (NH_2) dari satu asam amino dengan gugus karboksil (COOH) asam amino yang berdekatan. Reaksi ini disebut reaksi kondensasi yang melepaskan molekul air. Polipeptida yang terdiri dari kurang dari 30 asam amino disebut oligopeptida atau peptida saja. Panjang polipeptida pada sel hidup sangat beragam, umumnya berukuran 40-1000 asam amino. Satu molekul protein dapat terdiri atas dua atau lebih rantai polipeptida identik (homopolimer), atau rantai berbeda (heteropolimer). Setiap rantai polipeptida mempunyai polaritas, gugus amino berada pada ujung N dan gugus karboksil terdapat pada ujung C.

Protein yang ada di alam tidak hanya berbentuk rantai linier lurus. Adanya interaksi antar asam amino penyusunnya melalui ikatan kovalen dan menyebabkan terbentuknya struktur sekunder, tersier dan kuarterner pada protein. Struktur primer suatu protein terdiri atas urutan linier asam amino. Struktur sekunder protein dapat berupa heliks- α dan β -pleated sheet. Struktur tersier protein terjadi oleh adanya ikatan nonkovalen lemah (ikatan hidrogen,

dan ikatan ion, ikatan hidrofob) dan ikatan kovalen yang lebih kuat (ikatan disulfida) pada rantai polipeptida membentuk konformasi tertentu yang menstabilkan struktur protein. Struktur kuarterner dibentuk bila dua atau lebih rantai polipeptida berasosiasi secara spontan. Protein hanya berfungsi pada kondisi alaminya yang biasanya membentuk konformasi tertentu baik dalam bentuk struktur tersier maupun kuarterner.



Gambar 2.8. Tingkatan struktur protein


Struktur primer protein ditentukan oleh gen pengkodanya. Jika terjadi mutasi (perubahan) pada gen normal, protein yang terbentuk dari hasil mutasi dapat mempunyai urutan asam amino berbeda. Perubahan satu asam amino dapat mengubah atau menghilangkan fungsi protein.

Bakteri pada umumnya mampu membentuk semua asam amino, tetapi hewan (termasuk manusia) hanya dapat membentuk jenis asam amino tertentu. Manusia misalnya tidak mampu mensintesis delapan dari dua puluh asam amino. Kedelapan asam amino tersebut disebut asam amino esensial yang terdiri dari valin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, threonin, fenilalanin, dan triptofan. Tirosin dapat disintesis dari asam amino esensial fenilalanin, oleh karena itu tirosin juga dianggap sebagai asam amino esensial.

2.6. Organisasi gen

Setiap sel dari organisme multiselular, mengandung materi genetik yang sama. Molekul DNA merupakan makromolekul yang paling panjang dalam sel dan terbungkus dalam kromosom. Bakteri dan virus pada umumnya memiliki satu kromosom, sementara sel eukaryot memiliki banyak kromosom. Didalam satu kromosom terdapat ribuan gen. Kumpulan semua gen yang terdapat dalam kromosom, dan termasuk daerah antar gen disebut genom.

Gen merupakan segmen DNA yang mengkode polipeptida atau RNA. Dimana polipeptida atau RNA tersebut mempunyai fungsi struktural atau katalitik. Disamping gen, DNA juga mempunyai segmen yang berfungsi sebagai pengatur yang disebut urutan regulator. Urutan ini menyediakan sinyal-sinyal pada awal atau akhir gen, yang berfungsi untuk memulai atau mengakhiri transkripsi serta sebagai titik awal dimulainya proses replikasi DNA.



Gambar 2.9 Gen merupakan segmen DNA yang mengkode protein/ polipeptida.


Ukuran gen bisa kita perkirakan dari jumlah asam amino pada protein/ polipeptida. Satu asam amino dikode oleh tiga nukleotida. Bila ukuran rantai polipeptida mengandung 50 asam amino-ribuan asam amino, maka ukuran gen yang mengkode polipeptida ini kita kalikan 3 pasang basa. Sehingga polipeptida yang mengandung 350 asam amino dikode oleh 1.050 pb. Gen pada eukariot pada umumnya di interupsi oleh urutan DNA yang tidak mengkode, sehingga biasanya ukuran gennya lebih panjang daripada perhitungan di atas.

Berapa jumlah gen yang terdapat dalam satu kromosom? Kromosom *Escherichia coli*, yang merupakan salah satu genom prokariot yang telah ditentukan urutannya, mengandung molekul DNA sirkular dengan ukuran 4.638.858 pasang basa. Dan mengkode 4.300 gen pengkode protein dan 115 gen pengkode mulekol RNA stabil. Manusia

mempunyai 24 kromosom yang berbeda. genom manusia kira kira mengandung DNA dengan ukuran 3 milyar pasang basa yang mengkode 50.000 –100.000 gen.

2.7. Struktur Gen Prokariot


Bakteri hanya memiliki satu kromosom yang mengandung hanya satu copy masing-masing gen, kecuali beberapa gen yang mengkode rRNA. Hampir semua DNA prokariot mengkode gen dan regulator. Dan setiap gen ko-linear dengan urutan asam amino yang dikodenyanya.




Gambar 2.10 Kromosom *E. coli*

Secara struktur maupun fungsi, organisasi gen dalam DNA eukariot jauh lebih kompleks dibandingkan prokariot. Sekitar 10% DNA tikus terdiri dari urutan pendek (kurang dari 10 pb) yang berulang jutaan kali per sel. Urutan ini disebut urutan *highly repetitive* atau urutan DNA sederhana. Selain itu juga ditemukan urutan sekitar 100 pasang basa yang berulang sekitar 1000x pada 20% DNA tikus. Bagian DNA ini dikenal dengan istilah *moderately repetitive*. Sisanya 70% DNA tikus mengandung urutan yang unik yang terdapat pada kromosom eukariot, termasuk sejumlah gen.

Urutan DNA sederhana disebut juga 'DNA satelit', karena dapat berpindah- pindah tempat. Urutan ini tidak mengkode protein maupun RNA, namun berhubungan dengan struktur centromer dan telomer pada kromosom eukariot. Centromer merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pengikatan protein selama pembelahan sel. Telomer merupakan urutan pada ujung kromosom eukariot yang membantu menstabilkan kromosom.






Gambar 2.11. (a) Kromosom eukariot. (b) Posisi centromer dan telomer pada kromosom eukariot. (c) DNA pada kromosom eukariot.

Yuwono (2008) menyebutkan bahwa pada umumnya, gen yang mengkode protein pada prokariot adalah gen dengan kopi tunggal (single copy), sedangkan gen yang mengkode tRNA dan rRNA berupa gen dengan jumlah kopi banyak (multiple copies). Organisasi gen dalam organisme prokariot disebut operon. Suatu operon adalah organisasi beberapa gen struktural yang ekspresinya dikendalikan oleh satu promoter yang sama.

Contoh dari operon adalah lac operon, operon yang mengendalikan kemampuan metabolisme pada *E. coli*. Terdapat 3 macam gen dalam lac operon, yaitu gen Z (mengkode β -galaktosidase), gen Y (mengkode permease), dan gen A (mengkode trans-asetilase).


Masing-masing gen struktural memiliki kodon inisiasi awal dan kodon terminasi, tetapi ekspresinya dikendalikan oleh satu promoter yang sama. Pada saat transkripsi, terbentuk 1 RNAd yang membawa kodon untuk 3 macam polipeptida yang berbeda (polisistronik). Masing-masing polipeptida akan ditranslasi secara independen dari satu untaian RNAd yang sama (Yuwono, 2008).



Gambar 2.12 *Operon lac*

Proses transkripsi terdiri dari tahap **inisiasi**, **elongasi** (polimerisasi) dan **terminasi**. Transkripsi dikatalisis oleh suatu enzim yang dikenal sebagai RNA polimerase. RNA polimerase pada bakteri terdiri atas enam subunit, yaitu dua subunit α , dua subunit β , satu subunit ω , dan satu subunit σ . RNA polimerase bersama-sama dengan subunit σ (disebut holoenzim) akan berjalan sepanjang molekul DNA untuk menemukan lokasi awal transkripsi. Fungsi subunit σ adalah membantu RNA polimerase untuk mengenali suatu urutan tertentu pada molekul DNA yang menandai tempat awal transkripsi (awal suatu gen) yang dikenal sebagai promoter. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase bersama-sama subunit σ mengikat daerah promoter dengan kuat dan memisahkan untai ganda DNA agar inisiasi transkripsi dapat terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap elongasi, dimana rantai RNA disintesis, subunit σ terlepas dari RNA polimerase (RNA polimerase tanpa subunit σ disebut *core enzyme*) dan transkripsi berlangsung terus sampai mencapai suatu daerah pada akhir gen yang disebut terminator. Urutan terminator menandai tempat akhir transkripsi (akhir suatu gen) (Gambar

4.8). Pada *E. Coli*, terdapat dua mekanisme terminasi yaitu: adanya protein ρ (rho) yang membantu melepaskan RNA atau terminasi tanpa bantuan protein ρ (rho-independent) dimana pada daerah terminator membentuk seperti loop.




Gambar 2.13. Mekanisme transkripsi pada prokariot.


RNA polimerase tidak mempunyai aktifitas *proofreading* (pembacaan kembali) eksonuklease 3'→5' (seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase), sehingga sekitar satu kesalahan terjadi setiap 10^4 - 10^5 ribonukleotida yang dimasukkan selama transkripsi RNA. Karena di dalam sel diproduksi banyak copy RNA dari satu gen dan semua RNA segera di degradasi dan diganti, maka kesalahan pada molekul RNA tidak terlalu berpengaruh terhadap sel dibandingkan kesalahan pada informasi yang tersimpan dalam DNA.

Setiap gen organisme mempunyai sinyal transkripsi

(promotor dan terminator) yang spesifik. Untuk kesepakatan daerah sebelum awal gen (*start site*) diberi penomoran negatif, dan daerah dalam gen diberi penomoran positif. Pada *E. coli*, RNA polimerase mengikat sekitar 70 basa sebelum start site sampai sekitar 30 basa setelah *start site*. Berdasarkan penelitian pada promotor-promotor gen-gen *E. coli* ditemukan urutan yang selalu ada (urutan konsensus) yaitu TTGACA (sekitar daerah -35) dan TATAAT (sekitar daerah -10). Selain itu sebelum promotor (daerah -40 sampai -60) juga terdapat daerah yang disebut UP element yang berfungsi untuk mengikat subunit α RNA polimerase. Sedangkan promotor untuk eukariot adalah urutan variabel TATAAA (daerah -30) dan urutan Inr (inisiator) yang berada dekat dengan *start site* (Gambar 4.9).



(a)




(b)

Gambar 2.14 (a) Tipikal promotor *E. coli* yang dikenali oleh RNA

polimerase; (b)promotor pada eukariot yang dikenali oleh RNA polimerase II

2.8. Struktur Organisasi Pada Gen Eukariot


Gen-gen pada DNA kromosom eukariot pada umumnya mengandung segmen DNA yang tidak mengkode asam amino yang disebut **intron**. Segmen yang mengkode protein disebut **ekson**. Hanya beberapa gen prokariot yang mengandung intron. Panjang intron bervariasi antara satu gen dengan gen lainnya. Sebagai contoh gen yang mengkode satu rantai polipeptida pada protein ovalbumin telur burung memiliki intron yang lebih panjang dibandingkan ekson, terdapat tujuh intron yang mengisi 85% bagian gen. Sementara gen yang mengkode ovalbumin pada telur ayam mengandung 17 intron. Gen yang mengkode protein histon tidak mengandung intron. Sampai saat ini fungsi dari intron belum diketahui.



Gambar 2.15. Gen Ovalbumin dan Hemoglobin subunit β . (A, B,... = Intron; 1, 2, ... = Ekson)

Gen organisme prokariot pada umumnya mempunyai struktur yang berbeda dengan gen organisme eukariot. Gen organisme prokariot bersifat kontinyu, artinya seluruh nukleotida menspesifikasi asam amino, sedangkan gen organisme eukariot bersifat tidak kontinyu, artinya tidak seluruh urutan nukleotida mengkode asam amino. Bagian gen yang mengkode asam amino disebut ekson, sedangkan yang tidak mengkode asam amino disebut intron. Ekson dan intron letaknya bergantian. Hasil transkripsi gen organisme prokariot dapat langsung ditranslasi menjadi protein, sedangkan transkrip gen organisme eukariot

pada umumnya masih harus melalui proses tambahan untuk menghilangkan intron. Transkrip mRNA yang mengandung intron disebut **transkrip primer (pre mRNA)**. Proses penghilangan intron terjadi di dalam nukleus dan disebut dengan *splicing*. Transkrip bebas intron ini berfungsi sebagai mRNA yang kemudian ditranslasi menjadi protein. mRNA eukariot juga mengalami modifikasi pada kedua ujungnya. Pada ujung 5' ditambahkan beberapa residu guanilat yang termodifikasi yang disebut *5'cap* (5'-kepala) Sementara ujung 3' dipotong dan ditambahkan 80-250 residu adenilat untuk membentuk ekor poli-A.



Gambar 2.16 Transkripsi eukariot


2.9 Ekspresi Gen

Seperti telah diuraikan di gambar 2.1, alur informasi genetic adalah dari DNA ke protein. Pembahasan detail mengenai ekspresi gen tidak diperlukan untuk memahami prinsip rekayasa genetic, hanya saja penting untuk mengenali wujud dasar dari transkripsi dan translasi. Deskripsi singkat mengenai proses tersebut akan dijelaskan disini.

Transkripsi meliputi sintesis RNA dari template DNA, dibantu oleh untai anti-kodon pada unit transkripsi. Enzim yang bertanggung jawab adalah **RNA polymerase (RNA Polimerase bergantung-DNA)**. Pada prokariot, ada enzim tunggal RNA polymerase, tapi pada eukariot ada tiga tipe RNA polymerase (I,II, III). Sintesis berupa messenger RNA (mRNA), ribosom RNA (rRNA), dan transfer RNA(tRNA). Semua RNA polymerase merupakan protein multisub unit besar dengan massa relative molecular sekitar 500.000.

Transkripsi memiliki beberapa komponen tahapan, yaitu (1)pengikatan DNA/RNA polymerase, (2)rantai inisiasi, (3)rantai elongasi, (4) rantai terminasi dan pelepasan RNA. Struktur promoter sangat penting untuk menetapkan ikatan pada RNA polymerase, tetapi tidak berlaku disini. Ketika molekul RNA dilepaskan, dengan segera dilanjutkan translasi (berlaku bagi prokariot) atau mungkin berproses dan diekspor ke sitoplasma (pada eukariot) sebelum translasi terjadi.

Translasi memerlukan molekul mRNA, didukung oleh daya tRNA dan ribosom (tersusun atas rRNA dan protein ribosomal). Ribosom adalah letak dimana sintesis protein berlangsung, pada prokariot ribosom tersusun atas tiga rRNA, dan sekitar 52 protein ribosomal yang berbeda. Ribosom merupakan struktur kompleks yang sangat penting berperan sebagai “penari” yang memegang RNA di tempatnya sehingga kodon akan sesuai dengan antikodon yang tepat pada tRNA. Kemudian memastikan asam amino yang tepat disisipkan ke dalam rantai polipeptida yang berkembang. Molekul mRNA ditranslasi pada arah 5' ke 3', bersamaan dengan elongasi polipeptida dari terminal N ke C.



Gambar 2.17. Ringkasan ekspresi gen

3

Enzim

Teknologi DNA rekombinan berperan penting dalam perkembangan pengetahuan yang berkaitan dengan ekspresi gen yang terjadi pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dasar teknologi DNA rekombinan adalah kemampuan untuk memanipulasi molekul DNA dalam tabung reaksi. Kemampuan teknologi ini tergantung pada ketersediaan enzim-enzim murni yang aktivitasnya diketahui dan dapat dikontrol sehingga dapat digunakan untuk memanipulasi secara spesifik molekul DNA.

Enzim yang digunakan dalam biologi molekuler dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu


1. DNA polimerase, yaitu enzim yang mampu mensintesis polinukleotida baru yang komplementer dengan templat DNA atau RNA yang telah ada sebelumnya. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengkaji DNA tergantung pada sintesis kopi seluruh atau sebagian molekul DNA atau RNA yang telah ada. Enzim ini merupakan komponen esensial PCR, sekunsing DNA, pelabelan DNA, dan banyak prosedur penting lain dalam riset biologi molekuler.
2. Nuklease, yaitu enzim yang mampu mendegradasi molekul DNA dengan memotong ikatan fosfodiester yang menghubungkan satu nukleotida dengan nukleotida berikutnya. Endonuklease restriksi (enzim restriksi) merupakan salah satu contoh nuklease yang berperan penting dalam banyak aspek teknologi DNA rekombinan.
3. Ligase, yaitu enzim yang dapat digunakan untuk menyambung molekul DNA dengan mensintesis ikatan fosfodiester di antara nukleotida pada ujung dua molekul DNA berbeda, atau pada dua ujung molekul tunggal.

4. Enzim pemodifikasi-ujung, yaitu enzim yang mampu mengubah ujung molekul DNA. Enzim ini berperan penting untuk merancang percobaan ligasi dan pelabelan molekul DNA dengan radioaktif dan marker lain. Deoksinukleotidil transferase terminal, yang berasal dari jaringan timus sapi, adalah satu contoh enzim pemodifikasi ujung.

ENZIM RESTRIKSI

Asam nukleat baik DNA maupun RNA mampu dipotong dengan menggunakan suatu enzim yaitu **nuklease**. Enzim nuklease yang mampu memotong RNA disebut **ribonuklease** atau **Rnase**, sementara enzim yang mampu memotong DNA disebut **deoksiribonuklease** atau **Dnase**. Beberapa nuklease hanya memotong urutan asam nukleat yang *single strand* dan apa pula yang mampu memotong asam nukleat yang *double strand*. Nuklease ada dua macam yakni **eksonuklease** yang mampu memotong molekul asam nukleat *single strand* atau beberapa oligonukleotida pendek yang hanya mengenali salah satu ujung asam nukleat, yaitu ujung 5' atau ujung 3'; sementara **endonuklease** mampu memotong asam nukleat di daerah tengah dari sekuens asam nukleat yang mampu mengenali daerah spesifik pada urutan asam nukleat (Clark, 2010; Howe, 2007; Murray *et al.*, 2009).

Salah tujuan untuk memperoleh suatu daerah DNA dalam suatu genom adalah untuk melakukan perbanyakan (kloning). Untuk memperoleh suatu urutan DNA tersebut maka dilakukan pemotongan genom DNA menjadi fragmen-fragmen dengan menggunakan enzim tertentu yang mampu memotong ikatan fosfodiester pada untai DNA tersebut yakni berupa **enzim restriksi**. Enzim restriksi yang diproduksi oleh bakteri dinamakan endonuklease yang secara tipikal mampu mengenali 4 – 8 bp urutan nukleotida yang spesifik. Urutan nukleotida yang spesifik tersebut dinamakan *restriction sites* yang secara umum merupakan sekuens *palindromic (run back)* yang pendek dengan pola urutan sekuens yang sama ketika dibaca pada arah 5' → 3' (Howe, 2007; Lodish *et al.*, 2003; Ream *et al.*, 2003). Pada Gambar1 ditunjukkan enzim *EcoRI* yang mampu mengenali enam urutan nukleotida spesifik yang kemudian dipotong menjadi dua. Sementara beberapa contoh enzim restriksi dengan daerah spesifiknya disajikan pada Tabel 1.



Gambar 1. Suatu *double strand* dari DNA yang dipotong oleh enzim restriksi *EcoRI* (Lodge *et al.*, 2007).

Tabel 1. Beberapa contoh endonuklease dengan daerah spesifiknya (Lehninger *et al.*, 2000).

Enzim	Restriction sites	Enzim	Restriction sites
<i>Bam</i> III	5' G↓G-A-T-C-C 3' 3' C-C-T-A-G↑G 5'	<i>Hind</i> III	5' A↓A-G-C-T-T 3' 3' T-T-C-G-A↑A 5'
<i>Clal</i>	5' A-T↓C-G-A-T 3' 3' T-A-G↑C-T-A 5'	<i>Nof</i> I	5' G-C↓G-G-C-C-G-C 3' 3' C-G-C↑G-G-C-G 5'
<i>Eco</i> RI	5' G↓A-A-T-T-C 3' 3' C-T-T-A-A↑G 5'	<i>Pst</i> I	5' C-T-G-C-A↓G 3' 3' G↑A-C-G-T-C 5'
<i>Eco</i> RV	5' G-A-T↓A-T-C 3' 3' C-T-A↑T-A-G 5'	<i>Pvu</i> II	5' C-A-G↓C-T-G 3' 3' G-T-C↑G-A-C 5'
<i>Hae</i> III	5' G-G↓C-C 3' 3' C-C↑G-G 5'	<i>Not</i> III	5' G-A-C-N↓N-N-G-T-C 3' 3' C-T-G-N-N↑N-C-A-G 5'


Keterangan: N = semua jenis basa N

Enzim restriksi endonuklease dibagi menjadi tiga tipe dengan karakteristik yang berbeda-beda dan disajikan dalam Tabel 2.


Tabel 2. Karakteristik dari masing-masing tipe endonuklease (Howe, 2007; Reece, 2004).

	Tipe I	Tipe II	Tipe III
Komposisi	Kompleks multienzim yang mengandung subunit R (endonuklease), M (metilase), dan S (Spesifikasi)	Komponen subunit enzim terpisah	Komponen subunit enzim terpisah
Struktur Subunit Nuklease	Heterodimer	Homodimer	Heterodimer
Kofaktor	ATP, Mg ²⁺ , SAM	Mg ²⁺	Mg ²⁺ , SAM
Sisi dari pemotongan DNA	Acak, daerah sekitar dengan 100-1000 nukleotida dari <i>restriction sites</i>	Di daerah <i>restriction sites</i> atau didekatnya	25-27 dari <i>restriction sites</i>

Adapun cara kerja enzim endonuklease tersebut berbeda-beda. Enzim endonuklease tipe II telah diketahui strukturalnya yang sisi katalitiknya tersusun atas 5 macam protein sekunder dalam bentuk β -sheet yang diapit oleh 2 protein sekunder dalam bentuk α -heliks (Gambar 2). Enzim restriksi endonuklease tersebut dapat melakukan ‘*scanning*’ pada untai molekul DNA jika tidak menemukan *restriction sites* yang spesifik. Peristiwa tersebut dinamakan mekanisme *sliding*. Mekanisme *sliding* tersebut melibatkan pergerakan di sepanjang lekukan DNA. Namun enzim restriksi endonuklease tersebut akan mengubah konformasinya ketika mengenali daerah *restriction sites* yang spesifik. Ketika sudah mengenali daerah spesifik, maka enzim tersebut akan memotong dua ikatan gula deoksiribosa dengan fosfat dari *double helix* DNA yang berbeda dan menghasilkan gugus 3' hidroksil (OH) dan gugus 5' fosfat (PO₄). Selanjutnya DNA tersebut menjadi fragmen-fragmen yang sesuai dengan daerah pemotongannya. Enzim endonuklease tidak selamanya memotong DNA menjadi fragmen yang ujungnya simetris (*blunt ends*), namun ada juga yang ujungnya asimetris (*sticky ends*) (Gambar 3). Pola potongan simetris atau tidaknya tergantung kinerja enzim endonuklease seperti yang tertera pada Tabel 1 (Allison, 2007; Reece, 2004).



Gambar 3.1 Struktur enzim restriksi *Bam*HI yang mengikat DNA. Enzim tersebut mengenali *double strand* dari DNA dengan dengan sekuens spesifik 5'-GGATCC-3', yang selanjutnya memecah ikatan fosfodiester antara dua residu G. Hasilnya adalah berupa dua fragmen yang ujungnya *sticky ends*. Pada gambar tersebut warna hijau dan biru menunjukkan subunit protein dimer yang identik (Reece, 2007).



Gambar 3.2 Contoh pola pemotongan enzim restriksi endonuklease. Enzim tersebut menghidrolisis ikatan fosfodiester yang menghasilkan formasi 5'-PO₄⁻ dan 3'-OH yang bagian terminalnya berbentuk asimetris atau *sticky ends* (*Bam*HI) dan bentuk simetris atau *blunt ends* (*Sma*I) (Allison, 2007).

Enzim *Bam*HI ini memiliki kofaktor berupa ion Mg^{2+} , sehingga dalam prosedur protokol restriksi suatu sekuens DNA terkadang diberi $MgCl$. Kation bivalen Mg^{2+} dari $MgCl$ tersebut berfungsi dalam proses pemotongan plasmid yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas enzim restriksi (Ausubel, 2003; Reece, 2004). Adapun kinerja enzim *Bam*HI tersebut mampu memotong ikatan fosfodiester pada urutan DNA pada sisi:

5' G↓G-A-T-C-C 3'

3' C-C-T-A-G↑G 5'

Enzim restriksi tersebut mampu mengenali urutan nukleotida yang sama (G-G), sehingga *Bam*HI disebut juga sebagai *isoschizomer*. Hasil potongan oleh enzim *Bam*HI berupa formasi 5'- PO_4^- dan 3'-OH yang bagian terminalnya berbentuk asimetris atau *sticky ends*. (Ausubel, 2003; Becker *et al.*, 1996).

Enzim *Bam*HI bekerja dengan cara melakukan *scanning* sekuens non-spesifik di sepanjang DNA dengan cara meluncur (*sliding*), setelah itu ketika enzim tersebut menemukan sekuens spesifik berupa 5' G-G-A-T-C-C 3' maka akan berupa konformasian dan sisi katatiliknya bekerja untuk memotong ikatan fosfodiester antara nukleotida G menjadi fragmen yang terpisah (Allison, 2007).

Sebagian besar enzim restriksi mempunyai urutan target heksanukleotida, sedangkan yang lain mengenali urutan yang lebih pendek atau lebih panjang (Table 4.3).

Enzim Ligase

Enzim ligase merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara ujung 5'-fosfat dan 3'-hidroksil pada DNA yang mengalami *nick*. *Nick* pada DNA dapat terjadi pada saat replikasi DNA, rekombinasi dan kerusakan. Secara biologis, DNA ligase diperlukan untuk menggabungkan fragmen Okazaki saat proses replikasi, menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis, serta berperan dalam proses reparasi DNA. Oleh karena pentingnya peranan DNA ligase, sekarang ini telah dikembangkan obat

antibakterial yang menghambat DNA ligase. Dengan diinhibisinya DNA ligase, diharapkan kromosom menjadi terdegradasi dan sel akan mati. DNA ligase merupakan enzim yang sangat berguna baik di dalam sel, maupun di luar sel. Untuk penggunaan di luar sel, penggabungan dengan enzim restriksi telah membuat terobosan baru di bidang teknologi DNA rekombinan. Enzim restriksi diibaratkan seperti gunting yang memungkinkan kita untuk memotong DNA di tempat yang spesifik. Kemudian DNA ligase berperan sebagai lem yang menyambung DNA yang telah terpotong sehingga menjadi DNA yang fungsional

Peranannya.

Enzim Ligase adalah menyambung dua molekul/fragmen DNA.

Mekanisme Enzim Ligase

Mekanisme DNA ligase dimulai dari hidrolisis kofaktor, yaitu NAD^+ atau ATP. Peristiwa ini menghasilkan **kompleks** enzim-adenylate AMP yang berikatan kovalen dengan grup α -amino residu lysin pada sisi aktif dengan melepaskan pyrofosfat inorganik (PPi), jika kofaktor berupa ATP; atau nicotinamide mononucleotide (NMN), jika kofaktor berupa NAD^+ . Kemudian sebagian AMP akan berpindah dari sisi aktif lysin ke ujung bebas 5'-fosfat yang berada pada nick utas DNA. Pada akhirnya, iktan fosfodiester akan terbentuk antara ujung 3'-OH yang berada di ujung nick dengan 5'-fosfat dan melepaskan AMP dan enzim adenylate.

Enzim polimerase nukleotida adalah enzim penting dalam replikasi DNA maupun dalam reparasi DNA. DNA polimerase merupakan sebuah enzim yang mengkatalisasi reaksi polimerisasi deoksiribonukleotida menjadi rantai DNA, dengan kata lain enzim ini mengkatalisasi reaksi pembentukan DNA. DNA polimerase pertama kali ditemukan pada tahun 1957 oleh Arthur Kornberg. DNA polimerase membaca rantai DNA utuh sebagai cetakan (*templat*) dan menggunakannya untuk membentuk rantai baru. Molekul polimer yang baru terbentuk merupakan komplemen atau pasangan dari rantai yang digunakan sebagai cetakan, dan identik dengan pasangan dari rantai cetakan sebelum terjadi reaksi.

Peranannya.

Enzim Polimerase adalah mengisi kekosongan dalam dupleks dengan penambahan nukleotida pada ujung 3'.



4

Teknik Rekayasa Genetik


Sebelum menguji beberapa teknik spesifik yang dipakai pada manipulasi gen, sangat berguna menentukan metode dasar yang diperlukan untuk melaksanakan, menghitung, dan menganalisa molekul asam nukleat. Seringkali sulit untuk membuat rangkaian antara aspek teori dan praktek pada subjek dari metode yang dipakai pada pengerjaan rutin dengan asam nukleat, sehingga perlu digambarkan lebih detail disini tentang teknik untuk cloning dan analisis gen.

4.1 ISOLASI DNA

Semua organisme disusun oleh sel yang mengandung elemen genetik yang sama yaitu DNA yang terdapat dalam kromosom. Kromosom eukariot berbentuk linear sedangkan kromosom prokariot berbentuk sirkular. Selain itu prokariot juga mengandung satu atau lebih plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA sirkular dengan ukuran yang jauh lebih kecil dibanding kromosom.

Isolasi DNA kromosom.

Prinsipnya adalah memisahkan DNA kromosom atau DNA genom dari komponen-komponen sel lain. Sumber DNA bisa dari tanaman, kultur mikroorganise, atau sel manusia. Membran sel dilisis dengan menambahkan detergen untuk membebaskan isinya, kemudian pada ekstrak sel tersebut ditambahkan protease (yang berfungsi mendegradasi protein) dan RNase (yang berfungsi untuk mendegradasi RNA), sehingga yang tinggal adalah DNA. Selanjutnya ekstrak tersebut dipanaskan sampai suhu 90 °C untuk menginaktivasi enzim yang mendegradasi DNA (DNase). Larutan DNA kemudian di presipitasi dengan etanol dan bisa dilarutkan lagi dengan air.



Gambar 4.1 Isolasi DNA

Isolasi DNA plasmid

DNA plasmid merupakan wadah yang digunakan untuk kloning gen, sehingga DNA plasmid harus di pisahkan dari DNA kromosom. DNA plasmid mempunyai ukuran yang jauh lebih kecil daripada DNA kromosom. Untuk memisahkan DNA plasmid, maka memerlukan perlakuan yang sedikit berbeda dengan prosedur di atas. Pertama, membran sel dilisis dengan penambahan detergen. Proses ini membebaskan DNA kromosom, DNA

plasmid, RNA, protein dan komponen lain. DNA kromosom dan protein diendapkan dengan penambahan potasium. DNA + protein + potasium yang mengendap dipisahkan dengan cara sentrifugasi. Supernatan yang mengandung DNA plasmid, RNA dan protein yang tersisa dipisahkan. Kemudian ditambahkan RNase dan protease untuk mendegradasi RNA dan protein. Akhirnya DNA plasmid dapat dipresipitasi menggunakan etanol.

Isolasi RNA

RNA, terutama mRNA merupakan materi genetik yang mengkode suatu protein. Jumlah populasi mRNA akan lebih banyak dibanding dengan DNA. mRNA eukariot dapat dipisahkan dari DNA dengan menggunakan oligonukleotida dT. Atau RNA total juga dapat di isolasi dari sel dengan menambahkan enzim DNase yang berfungsi untuk mendegradasi DNA

4.2 PCR (*Polimerase Chain Reaction*)

PCR (*Polymerase Chain Reaction*) merupakan suatu teknik perbanyakan (amplifikasi) potongan DNA secara *in vitro* pada daerah spesifik yang dibatasi oleh dua buah primer oligonukleotida. Primer yang digunakan sebagai pembatas daerah yang diperbanyak adalah DNA untai tunggal yang urutannya komplemen dengan DNA templatnya. Proses tersebut mirip dengan proses replikasi DNA secara *in vivo* yang bersifat semi konservatif.

PCR memungkinkan adanya perbanyakan DNA antara dua primer, hanya di dalam tabung reaksi, tanpa perlu memasukkannya ke dalam sel (*in vivo*). Pada proses PCR dibutuhkan DNA untai ganda yang berfungsi sebagai cetakan (templat) yang mengandung DNA-target (yang akan di amplifikasi) untuk pembentukan molekul DNA baru, enzim DNA polimerase, deoksinukleosida trifosfat (dNTP), dan sepasang primer oligonukleotida. Pada kondisi tertentu, kedua primer akan mengenali dan berikatan dengan untaian DNA komplemennya yang terletak pada awal dan akhir fragmen DNA target, sehingga kedua primer tersebut akan menyediakan gugus hidroksil bebas pada karbon 3'. Setelah kedua primer menempel pada DNA templat, DNA polimerase

mengkatalisis proses pemanjangan kedua primer dengan menambahkan nukleotida yang komplemen dengan urutan nukleotida templat. DNA polimerase mengkatalisis pembentukan ikatan fosfodiester antara OH pada karbon 3' dengan gugus 5' fosfat dNTP yang ditambahkan. Sehingga proses penambahan dNTP yang dikatalisis oleh enzim DNA polimerase ini berlangsung dengan arah 5'→3' dan disebut reaksi polimerisasi. Enzim

DNA polimerase hanya akan menambahkan dNTP yang komplemen dengan nukleotida yang terdapat pada rantai DNA templat.

PCR melibatkan banyak siklus yang masing-masing terdiri dari tiga tahap berurutan, yaitu pemisahan (denaturasi) rantai DNA templat, penempelan (*annealing*) pasangan primer pada DNA target dan pemanjangan (*extension*) primer atau reaksi polimerisasi yang dikatalisis oleh DNA polimerase.

Tahapan PCR

1. Denaturasi

Selama proses denaturasi, DNA untai ganda akan membuka menjadi dua untai tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusannya ikatan hidrogen diantara basa-basa yang komplemen. Pada tahap ini, seluruh reaksi enzim tidak berjalan, misalnya reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. Denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90 °C – 95 °C.


2. Penempelan primer

Pada tahap penempelan primer (*annealing*), primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses *annealing* ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada templat. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 50 °C – 60 °C. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila

dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada 72 °C.

3. Reaksi polimerisasi (*extension*)


Umumnya, reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini, terjadi pada suhu 72 °C. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisi 3'nya dengan penambahan dNTP yang komplemen dengan templat oleh DNA polimerase.



Gambar 4.2. Siklus PCR, yang terdiri dari denaturasi, penempelan primer (annealing) dan polimerisasinya.

Jika siklus dilakukan berulang-ulang maka daerah yang dibatasi oleh dua primer akan di amplifikasi secara eksponensial (disebut amplicon yang berupa untai ganda), sehingga mencapai jumlah copy yang dapat dirumuskan dengan $(2^n) \times x$. Dimana n adalah jumlah siklus dan x adalah jumlah awal molekul DNA. Jadi, seandainya ada 1 copy DNA sebelum siklus berlangsung, setelah satu siklus, akan menjadi 2 copy, sesudah 2 siklus akan menjadi 4, sesudah 3 siklus akan menjadi 8 kopi dan seterusnya. Sehingga perubahan ini akan berlangsung secara eksponensial. PCR dengan

menggunakan enzim *Taq DNA polimerase* pada akhir dari setiap siklus akan menyebabkan penambahan satu nukleotida A pada ujung 3' dari potongan DNA yang dihasilkan. Sehingga nantinya produk PCR ini dapat di kloning dengan menggunakan vektor yang ditambahkan nukleotida T pada ujung-ujung 5'-nya. Proses PCR dilakukan menggunakan suatu alat yang disebut *thermocycler*.



Gambar 4.3. Jumlah copy fragmen DNA pada tahapan PCR.

Komponen PCR

1. Enzim DNA Polymerase

Dalam sejarahnya, PCR dilakukan dengan menggunakan Klenow fragment DNA Polimerase I selama reaksi polimerisasinya. Enzim ini ternyata tidak aktif secara termal selama proses denaturasi, sehingga peneliti harus menambahkan enzim di setiap siklusnya. Selain itu, enzim ini hanya bisa dipakai untuk perpanjangan proses PCR dapat dilakukan dalam satu mesin

2. Primer

Primer merupakan oligonukleotida pendek rantai tunggal yang mempunyai urutan komplemen dengan DNA templat yang akan diperbanyak. Panjang primer berkisar antara 20-30 basa. Untuk merancang urutan primer, perlu diketahui urutan nukleotida pada awal dan akhir DNA target. Primer oligonukleotida disintesis menggunakan suatu alat yang disebut *DNA synthesizer*.

3. Reagen lainnya

Selain enzim dan primer, terdapat juga komponen lain yang ikut menentukan keberhasilan reaksi PCR. Komponen tersebut adalah dNTP untuk reaksi polimerisasi, dan buffer yang mengandung $MgCl_2$. Konsentrasi ion Mg^{2+} dalam campuran reaksi merupakan hal yang sangat kritis. Konsentrasi ion Mg^{2+} sangat mempengaruhi proses primer annealing, denaturasi, spesifisitas produk, aktivitas enzim dan fidelitas reaksi.

4.3 REVERSE TRANSCRIPTION POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)

RT-PCR merupakan singkatan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction*. Seperti namanya, proses RT-PCR merupakan bagian dari proses PCR biasa. Perbedaanya dengan PCR yang biasa, pada proses ini berlangsung satu siklus tambahan yaitu adanya perubahan RNA menjadi cDNA (*complementary DNA*) dengan menggunakan enzim Reverse Transkriptase. Reverse Transcriptase adalah suatu enzim yang dapat mensintesa molekul DNA secara *in vitro* menggunakan template RNA.

Seperti halnya PCR biasa, pada pengerjaan RT-PCR ini juga diperlukan DNA Polimerase, primer, buffer, dan dNTP. Namun berbeda dengan PCR, templat yang digunakan pada RT-PCR adalah RNA murni. Oleh karena primer juga dapat menempel pada DNA selain pada RNA, maka DNA yang mengkontaminasi proses ini harus dibuang. Untuk proses amplifikasi mRNA yang mempunyai poly(A) tail pada ujung 3', maka oligo dT, random heksamer, maupun primer spesifik untuk gen tertentu dapat dimanfaatkan untuk memulai sintesa cDNA.

4.4 METODA DETEKSI PRODUK PCR


Produk PCR adalah segmen DNA (amplikon) yang berada dalam jumlah jutaan copy, tetapi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu PCR perlu diikuti dengan suatu tahap akhir yang bertujuan untuk memvisualisasikan produk PCR serta sekaligus bertujuan untuk mengetahui ukuran produk PCR dan mengetahui apakah produk yang dihasilkan adalah benar seperti yang diinginkan. Salah satu metoda deteksi yang umum dilakukan adalah elektroforesis gel agarosa.

1. Elektroforesis gel agarosa.

Metoda ini didasarkan pada pergerakan molekul bermuatan dalam media penyangga matriks stabil di bawah pengaruh medan listrik. Media yang umum digunakan adalah gel agarosa atau poliakrilamid. Elektroforesis gel agarosa digunakan untuk memisahkan fragmen DNA yang berukuran lebih besar dari 100 pb dan dijalankan secara horisontal, sedangkan elektroforesis poliakrilamid dapat memisahkan

1 pb dan dijalankan secara vertikal. Elektroforesis poliakrilamid biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA (sekuensing).

Larutan DNA yang bermuatan negatif dimasukkan ke dalam sumur-sumur yang terdapat pada gel agarosa dan diletakkan di kutub negatif, apabila dialiri arus listrik dengan menggunakan larutan buffer yang sesuai maka DNA akan bergerak ke kutub positif. Laju migrasi DNA dalam medan listrik erbanding rbaik dengan massa DNA. Migrasi DNA terutama ditentukan oleh ukuran panjang dan bentuk DNA. Fragmen DNA yang berukuran kecil akan bermigrasi lebih cepat dibanding yang berukuran besar, sehingga elektroforesis mampu memisahkan fragmen DNA berdasarkan ukuran panjangnya. Untuk visualisasi maka ditambahkan larutan etidium bromida yang akan masuk diantara ikatan hidrogen pada DNA, sehingga pita fragmen DNA akan kelihatan dibawah lampu UV. Panjang amplicon bisa diperkirakan dengan membandingkannya dengan pita DNA standar.



Gambar 4.4. Foto produk PCR pada gel agarosa.

4. 5 SEKUENSING DNA

Sekuensing DNA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui urutan nukleotida atau basa dalam suatu fragmen DNA. DNA menyimpan informasi genetik dalam bentuk urutan nukleotida. Dengan mengetahui urutan nukleotida suatu gen, maka dapat ditentukan urutan asam amino protein yang dikodenya. Sebaliknya, urutan asam amino protein tidak dapat memberikan informasi lengkap tentang urutan nukleotida gen yang mengkodennya. Karena alasan tersebut, selain karena mahalanya sekuensing protein, maka sekuensing DNA jauh lebih banyak digunakan.


Metode sekuensing DNA yang paling banyak digunakan adalah metode dideoksi Sanger. Reaksi sekuensing dimulai dengan reaksi PCR untuk memperbanyak fragmen DNA dan diikuti dengan elektroforesis gel poliakrilamida untuk memisahkan basa-basa DNA. Seperti proses PCR, reaksi sekuensing juga meniru proses pembentukan *leading strand* pada replikasi DNA di alam.

Ada tiga tahapan penting yang harus dilakukan pada sekuensing, yaitu:

1. pembentukan fragmen-fragmen DNA untai tunggal dengan

- berbagai ukuran melalui proses PCR
2. pemisahan fragmen-fragmen DNA dengan gel elektroforesis poliakrilamida
 3. pembacaan hasil elektroforesis.

Tahap pertama reaksi sekuensing serupa dengan teknik PCR yang memerlukan siklus suhu berulang. Sekuensing dilakukan dengan menggunakan enzim DNA



Gambar 4.5 Hasil Elektroforesis

polimerase untuk memperpanjang primer sepanjang templat DNA untai tunggal dengan adanya empat deoksinukleotida trifosfat (dNTP: dATP, dTTP, dGTP, dCTP). Berbeda dengan PCR, DNA yang akan disekuensing dapat berupa untai tunggal maupun untai ganda dan primer yang diperlukan hanya satu.

Komponen kunci dalam reaksi sekuensing adalah analog dNTP yaitu dideoksinukleotida trifosfat (ddNTP) yang tidak memiliki gugus 3'-OH. Reaksi sekuensing diterminasi secara acak dengan masuknya ddNTP. Dengan menggunakan sejumlah kecil ddNTP (dibandingkan dengan dNTP), maka setelah 20-30 siklus suhu akan diperoleh fragmen-fragmen DNA yang panjangnya berbeda-beda dengan selisih satu nukleotida yang semuanya memiliki ddNTP pada ujung 3'-nya.

Pada tahap kedua, fragmen-fragmen DNA ini dipisahkan dengan elektroforesis gel poliakrilamid. DNA bermuatan negataif, jadi akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Gel harus memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk memisahkan fragmen-fragmen yang ukurannya hanya berbeda satu nukleotida. Fragmen DNA yang lebih kecil akan bergerak lebih cepat daripada fragmen yang lebih besar. Fragmen yang pertama mencapai ujung bawah gel merupakan fragmen terkecil.

Pembacaan hasil elektroforesis dapat dilakukan bila ada label pada fragmen- fragmen DNA yang terbentuk. Label dapat berbentuk isotop radioaktif atau fluoresen. Pelabelan dapat dilakukan terhadap primer maupun pada ddNTP.

1. Pelabelan dengan Radioisotop

Pada awal perkembangan teknik DNA sekuensing, pelabelan fragmen DNA dilakukan dengan menggunakan radioisotop, seperti ^{32}P . Komponen reaksi yang dilabel adalah primer atau ddNTP. Dengan menggunakan pelabelan radioisotop, reaksi pembentukan fragmen DNA harus dilakukan dalam **empat tabung** terpisah, masing- masing mengandung ddNTP yang

berbeda. Keempat hasil reaksi sekuensing tersebut selanjutnya harus di-*run* di **empat lajur** yang berbeda pada elektroforesis gel poliakrilamid.

2. Pelabelan dengan Pewarnaan Fluoresen

Pelabelan fluoresen dilakukan dalam satu tabung, sehingga memungkinkan pemisahan fragmen-fragmen hasil reaksi sekuensing dilakukan hanya pada satu lajur gel poliakrilamid karena fragmen dengan nukleotida terakhir yang berbeda akan memberikan warna yang berbeda. Terdapat dua cara pelabelan, yaitu menggunakan *dye primer* dan *dye terminator*.

Dye primer

Jika pewarnaan fluoresen dilakukan pada primer, reaksi pembentukan fragmen DNA harus dilakukan dalam **empat tabung** terpisah, masing-masing mengandung ddNTP yang berbeda dan primer yang dilabel dengan empat warna yang berbeda. Keempat hasil reaksi sekuensing tersebut selanjutnya di-*run* di **satu lajur** pada elektroforesis gel poliakrilamid.

Dye terminator

Pelabelan fluoresen yang dilakukan pada ddNTP (*dye terminator labeling*) memberikan kemudahan karena reaksi sekuensing dapat dilakukan hanya dalam **satu tabung**, dan tentu saja di-*run* di **satu lajur** pada elektroforesis gel poliakrilamid.

Mesin sekuensing otomatis dilengkapi dengan laser penginduksi fluoresen yang bergerak bolak-balik horisontal sepanjang gel poliakrilamid. Jika ada DNA pada lokasi tersebut maka laser akan mengeksitasi *dye* yang terikat pada primer atau ddNTP. Sebuah kamera atau tabung fotomultiplier akan menangkap sinar yang diemisikan. Keempat jenis *dye* mengemisi sinar dengan warna (panjang gelombang) yang berbeda-beda.

4.6 TEKNIK HIBRIDISASI

Teknik ini berdasarkan kemampuan urutan asam nukleat yang komplementer untuk berikatan satu sama lain. Dengan hibridisasi fragmen DNA tertentu dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari fragmen lain. Untuk melakukan hibridisasi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui urutan gen yang dicari.

Teknik hibridisasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi klon yang mengandung DNA sisipan. Pertama, kita harus membuat replika menggunakan master plate (plate/petri yang mengandung koloni bakteri pada permukaannya). Replika ini dibuat menggunakan filter nitroselulosa. Sel bakteri yang menempel pada replika di lisis dengan menambahkan detergen, dan DNAnya dibebaskan ke filter. DNA untai ganda akan didenaturasi oleh natrium hidroksida, DNA untai tunggal yang dihasilkan akan tetap menempel pada filter pada posisi yang sama dengan koloni asalnya. Sehingga pola koloni pada master plate akan sama dengan pola DNA yang menempel pada filter.

Selanjutnya ditambahkan *probe* radioaktif. *Probe* adalah oligonukleotida untai tunggal yang komplementer dengan urutan DNA yang kita cari. *Probe* di label sehingga dapat divisualisasi. Bila *probe* ditambahkan, maka akan berikatan dengan urutan yang komplementer, membentuk hibrida untai ganda. Setelah itu filter dicuci, sehingga *probe* yang tidak berikatan akan terbuang, dan divisualisasikan dengan sinar X. DNA yang berikatan dengan *probe* akan kelihatan seperti spot hitam. Spot ini dibandingkan posisinya dengan koloni pada master plate, sehingga koloni yang mengandung fragmen DNA yang diklon dapat diketahui posisinya.

Hibridisasi merupakan teknik yang sangat bermanfaat. Teknik ini sangat sensitif: sejumlah kecil *probe* yang berikatan ke membran dapat dideteksi, dan selektif: karena berdasarkan komplementaritas urutan DNA sehingga urutan spesifik dapat diidentifikasi. Hibridisasi dapat dilakukan terhadap DNA dan RNA, dari koloni atau dari gel. Bila kita tidak memiliki informasi tentang urutan DNA untuk merancang *probe*, maka kita bisa juga memperkirakan dari urutan asam amino dari protein.

Dengan adanya kode genetik, maka kita dapat menerjemahkan urutan nukleotida dari urutan asam amino. Masalahnya adalah terdapat degenerasi pada kode genetik, terdapat beberapa asam amino yang memiliki lebih dari satu kodon. Untuk mengatasi masalah ini maka kita dapat merancang berbagai urutan *probe* yang mungkin, dan mensintesisnya dengan *DNA syntetizer*.

Aplikasi utama dari hibridisasi adalah penelitian tentang regulasi gen. Regulasi ekspresi gen sangat vital pada sel-sel tertentu. Penelitian yang intensif telah dilakukan untuk menentukan bagaimana gen-gen tertentu diregulasi untuk menyediakan tipe sel tertentu, atau untuk memungkinkan sel merespon perubahan lingkungan. Karena regulasi berhubungan dengan tingkat transkripsi, maka penelitian tentang produksi mRNA dari gen tertentu sangatlah penting.

Sebagai contoh, mari kita lihat satu tipe sel dengan dua kondisi lingkungan yang berbeda. Sel-sel pada kulit kita terpapar terhadap semua kondisi lingkungan: dingin, panas, angin, air, cahaya, dan gelap. Dalam merespon kondisi ini, sel mensintesis protein yang dapat membantu memproteksi sel terhadap lingkungan. Sebagai contoh, kebanyakan sel merespon sinar UV dosis tinggi dengan mensintesis sejumlah enzim yang terlibat pada perbaikan mutasi DNA. Sinar UV merupakan mutagen yang potensial. Tanpa enzim untuk *repair* (perbaikan), mutasi akan terakumulasi dan mungkin dapat menyebabkan kanker. Namun, pada kondisi normal enzim *repair* tidak akan diproduksi, sehingga gennya inaktif. Jadi ekspresi dari gen ini di induksi oleh sinar UV.

Induksi ekspresi gen dapat di deteksi dengan metoda hibridisasi. Pertama, bila perlu gen tersebut dikloning, *probenya* dirancang, selanjutnya hibridisasi. Sel-sel kulit dapat diambil dan dikulturkan dilaboratorium. Setelah waktu pemaparan yang berbeda-beda, mRNA diisolasi dari sel, dipisahkan dengan gel elektroforesis, dan kemudian ditransfer ke membran nitroselulosa dan dihibridisasi dengan *probe*. Ketebalan pita yang terlihat setelah autoradiografi menggambarkan jumlah mRNA tertentu dalam sel.

4.7 ANALISIS RFLP

Teknik lain yang berdasarkan elektroforesis dan hibridisasi adalah analisis *Restriction fragment length polymorphism* (RFLP). Sebagian besar DNA eukariot tidak mengkode protein. Dalam daerah *noncoding* lebih banyak terdapat mutasi dibandingkan di dalam gen, karena mutasi ini tidak berpengaruh terhadap sel, jaringan, organ dan organisme. Karena mutasi pada daerah *noncoding* tidak menghasilkan perubahan fenotip, sehingga tidak menunjukkan perbedaan diantara individu.

Jika dua individu X dan Y, masing-masing mengandung gen A dan B yang dipisahkan oleh daerah *noncoding* pada kromosom. Dalam gen A dan B pada kedua individu tersebut terdapat sisi restriksi enzim *HindIII*. Sisi ini sama pada kedua individu tersebut, karena tidak ada mutasi pada gen A dan B. Namun terdapat juga sisi restriksi di antara gen A dan B. Pada sisi restriksi ini, kedua individu tersebut berbeda, X memiliki dua sisi pemotongan, dan Y hanya memiliki satu sisi pemotongan. Mutasi pada Y telah merubah satu basa pada salah satu sisi pengenalan enzim *HindIII*, sehingga tidak bisa memotong pada sisi tersebut. Keberadaan mutasi ini dapat dideteksi dengan mengisolasi DNA dari kedua individu tersebut, kemudian dilakukan pemotongan dengan enzim *HindIII*. Fragmen DNA dipisahkan dengan gel elektroforesis, kemudian ditransfer ke membran nitroselulosa dan dilakukan hibridisasi dengan menggunakan *probe* spesifik seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Kenapa RFLP menjadi penting? RFLP sama seperti mutasi lain,

merupakan marker genetik yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun tidak terdapat fenotip yang berhubungan dengannya, hanya menghasilkan variasi panjang fragmen restriksi. Banyaknya penemuan mutasi gen yang berhubungan dengan penyakit manusia, kemampuan untuk mengkloning gen ini dan mempelajarinya, menjadi bermanfaat. Lebih banyak informasi yang diketahui tentang gen ini, semakin mudah mengkloningnya. Marker genetik berguna untuk memetakan gen. Peta gen lebih mudah dibuat menggunakan RFLP sebagai marker.


Teknik Sekuensing DNA

Teknik Sekuensing DNA (*DNA sequencing*) adalah cara untuk menentukan urutan basa-basa nukleotida suatu fragmen DNA. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang sangat penting dalam bidang biologi molekular, yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan urutan basa nukleotida suatu gen ataupun sekuen genom total suatu sel atau organisme.

Teknik pengurutan basa DNA terdiri dari 2 macam cara yang dikembangkan hampir secara bersamaan yaitu (i). Cara degradasi kimiawi oleh A. Maxam dan W. Gilbert di Amerika, dan (ii). Cara terminasi oleh F. Sanger dan A.R. Coulson di Inggris.

Teknik Maxam-Gilbert

Teknik pengurutan basa DNA yang pertama dikenal adalah teknik kimia yang dikembangkan oleh A.M. Maxam dan W. Gilbert pada tahun 1977. Fragmen DNA yang diurutkan dilabel dengan radioaktif (^{32}P) pada salah satu ujung 5'. Teknik Maxam dan Gilbert, dapat ditetapkan, baik untuk DNA untai ganda maupun DNA untai tunggal.



Gambar.4.6 DNA sequencing using the chemical (Maxam–Gilbert) method. (a) Radiolabelled single-stranded DNA is produced. (b) The bases in the DNA are chemically modified and removed, with, on average, one base being affected per molecule. (c) The phosphodiester backbone is then cleaved using piperidine. (d) The process produces a set of fragments differing in length by one nucleotide, labelled at their 5' termini.


Molekul DNA dipotong terlebih dahulu secara parsial dengan piperidin. Pengaturan lama inkubasi atau konsentrasi piperidin yang digunakan dapat menghasilkan potongan fragmen DNA dalam berbagai ukuran. Selanjutnya basa DNA di modifikasi sedemikian rupa, dengan menggunakan senyawa kimia tertentu. Dimetilsulfat digunakan untuk metilasi basa G, asam format untuk menghidrolisis basa A dan G, sedangkan hidrazin digunakan untuk menghidrolisis basa C dan T. Akan tetapi dengan penambahan larutan 1,5 M NaCl, hidrazin hanya dapat bereaksi dengan baik untuk memecah sitosin (C). Dengan demikian akan dihasilkan empat jenis fragmen DNA yang memiliki ukuran berbeda dengan masing-masing memiliki ujung G, ujung C, ujung A, dan ujung T.

Fragmen-fragmen DNA yang dihasilkan dielektroforesis dengan gel poliakrilamida. Berdasarkan pola migrasi pada gel elektroforesis dapat ditentukan urutan basa-basa DNA dari molekul DNA yang akan ditentukan urutan basa-basanya.

Teknik Sanger-Coulson

Teknik Sanger-Coulson merupakan teknik yang saat ini lebih sering digunakan urutan basa DNA. Teknik Sanger-Coulson lebih praktis daripada teknik Maxam-Gilbert, sehingga teknik Sanger lebih banyak dikembangkan dan digunakan untuk sekuensing DNA.

Teknik Sanger-Coulson pada dasarnya memanfaatkan sifat enzim DNA polimerase yaitu fragmen klenow, yang memiliki kemampuan untuk mensintesis DNA dengan adanya (dNTP), dengan dideoksinukleotida trifosfat (ddNTP). Molekul dNTP, tidak memiliki gugus hidroksil (OH), pada atom C nomor 2 pada cincin gula pentose, sedangkan molekul ddNTP, tidak memiliki 2 gugus OH pada posisi atom C nomor 2 dan nomor 3 pada cincin gula pentose, seperti yang terlihat pada gambar 3.8.



Gambar. 4.7 DNA sequencing using the dideoxy chain termination (Sanger–Coulson) method. (a) A primer is annealed to a single-stranded template and (b) the Klenow fragment of DNA polymerase I used to synthesise a copy of the DNA. A radiolabelled dNTP (often [^{35}S]dNTP, filled circles) is incorporated into the DNA. (c) Chain termination occurs when a dideoxy nucleoside triphosphate (ddNTP) is incorporated. (d) A series of four reactions, each containing one ddNTP in addition to the four dNTPs required for chain elongation, generates a set of radiolabelled nested fragments.

Teknik sekuensing DNA menggunakan teknik dideoksinukleotida dilakukan pada 4 tabung reaksi yang berbeda, dimana pada setiap tabung reaksi berisi campuran reagen yang terdiri dari cetakan DNA untai tunggal yang akan disekuens, polimer oligonukleotida. DNA polymerase, campuran dNTP dan larutan buffer.

DNA cetakan yang akan disekuensing adalah DNA untai tunggal sehingga biasanya diklon terlebih dahulu dalam vector M13. Sedangkan molekul ddNTP yang dilabel dengan senyawa radioaktif atau non radioaktif, hanya ditambahkan pada campuran reaksi yang sesuai, yaitu, untuk tabung A hanya ditambahkan ddATP, untuk tabung C hanya ditambahkan dd CTP, untuk tabung G hanya ditambahkan ddGTP, sedangkan untuk tabung T hanya ditambahkan ddTTP.

Pada proses pemanjangan untai DNA, selain menggunakan dNTP, secara acak juga menggunakan ddNTP, maka jika ddNTP terikat, polimerisasi lebih lanjut basa-basa DNA tidak terjadi atau terhenti, pada ujung molekul DNA yang memiliki ujung ddNTP.

Disiapkan 4 tabung reaksi yang masing-masing mengandung DNA untai tunggal yang akan disekuens, primer oligonukleotida, keempat jenis dNTP, enzim DNA polymerase, dan larutan buffer. Kemudian kedalam tabung no. 1 ditambahkan ddGTP, tabung No. 2, tabung No. 3. ddATP, dan tabung No. 4. ddTTP. DNA cetakan dalam masing-masing tabung kemudian secara in vitro dengan teknik PCR. Dengan demikian dalam setiap reaksi akan dihasilkan sejumlah fragmen DNA dengan ukuran bervariasi dimana setiap fragmen DNA tersebut memiliki gugus ddNTP yang telah dilabel dengan radioaktif pada setiap ujung 3' nya. Untuk mengetahui ukuran fragmen-fragmen DNA yang terbentuk dilakukan elektroforesis menggunakan gel poliakrilamida, kemudian dideteksi dengan autoradiografi.

Berdasarkan perbedaan migrasi masing-masing fragmen DNA akan dapat ditentukan urutan basa-basa DNA-nya. Hasil sekuensing DNA merupakan urutan basa yang komplementer terhadap urutan basa-basa yang terbaca pada hasil elektroforesis.

Dewasa ini sebagai mesin DNA sekuensing otomatis telah dikembangkan dan mampu mengurutkan sekitar ratusan sampel DNA sekaligus dalam sekali elektroforesis.

Sistem pelabelan yang semula dilakukan dengan radioisotope, telah dikembangkan dengan sistem pelabelan senyawa

fluoresen yang berbeda warna pendarannya untuk setiap ddNTP terminal. Perbedaan emisii cahaya senyawa fluoresen ketika tereksitasi oleh sinar laser, akan terbaca dengan jelas oleh alat pendeteksi optic (detektor) yang terdapat pada mesin DNA sekuensing, sehingga urutan basa-basa DNA dapat terdeteksi pada sistem elektroforesis kapiler.

Mesin DNA sekuensing otomatis yang dilengkapi dengan perangkat lunak pengolah data menampilkan warna spesifik dari masing-masing keempat basa DNA, yang sekaligus merupakan urutan sekuen DNA.




5

Vektor Kloning

Sejak ditemukannya **enzim restriksi** (enzim yang dapat memotong DNA pada urutan yang spesifik) dan ditemukannya **enzim ligase** (enzim yang dapat menyambungkan potongan DNA), maka DNA dari organisme apa saja dapat diisolasi, dipotong-potong, disambungkan kembali dan dipindahkan ke organisme lain. Proses mengkombinasikan beberapa DNA dan memperbanyak **DNA rekombinan** tersebut di dalam sel disebut **kloning** (Gambar 6.4). Proses memasukkan DNA ke dalam sel disebut **transformasi** dan sel yang dihasilkan disebut **transforman**. Agar suatu DNA dapat diperbanyak di dalam sel, maka DNA tersebut harus disisipkan ke dalam suatu **plasmid** (berfungsi sebagai vektor/pembawa) yang dapat bereplikasi di dalam sel. Kumpulan sel-sel yang mengandung **plasmid rekombinan** yang sama disebut sebagai suatu **klon**.

Pada kloning gen: suatu fragmen DNA yang mengandung gen yang akan di klon disisipkan pada molekul DNA vektor untuk menghasilkan molekul DNA rekombinan. DNA rekombinan ini digunakan untuk mentransformasi sel inang (biasanya bakteri). Di dalam sel, vektor mengadakan replikasi, menghasilkan banyak copy atau turunan yang identik, baik vektornya maupun gen yang dibawanya. Ketika sel inang membelah, copy molekul DNA rekombinan diwariskan pada progeni. Setelah terjadi sejumlah besar pembelahan sel, maka dihasilkan koloni atau klon sel inang yang identik. Tiap-tiap klon mengandung satu copy atau lebih molekul DNA rekombinan.



Gambar 5.1. Proses kloning

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kloning melibatkan lima komponen utama, yaitu : fragmen DNA (gen) yang akan di kloning (disebut juga DNA sisipan), DNA vektor (bisa plasmid, bakteriofaga atau cosmid), enzim restriksi, enzim ligase dan sel inang (bakteri atau ragi).

5.1. DNA sisipan.

Tujuan kloning adalah memperbanyak suatu fragmen DNA dari suatu organisme dalam suatu sel inang. Namun tujuan akhirnya bisa bermacam-macam, diantaranya: produksi protein penting dengan skala besar, untuk deteksi patogen atau sel abnormal. DNA sisipan bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu :

1. Produk PCR.
2. Fragmen DNA hasil pemotongan dengan enzim restriksi

5.2. DNA vektor

Vektor merupakan suatu molekul DNA sirkular yang bertindak sebagai wadah untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Berdasarkan fungsinya vektor dapat dibagi dua, yaitu : vektor kloning dan vektor ekspresi. Vektor kloning hanya berfungsi untuk memperbanyak fragmen DNA yang disisipkan, sehingga fragmen DNA tersebut hanya direplikasi, tidak di transkripsi. Biasanya vektor ini digunakan untuk tujuan sekuensing atau untuk memperbanyak DNA yang nantinya akan di sisipkan ke vektor ekspresi. Sementara vektor ekspresi digunakan untuk memproduksi protein dari gen yang diklon.

Syarat suatu vektor adalah : (1) mampu memasuki sel inang, (2) bereplikasi sendiri (memiliki *ori*), (3) menghasilkan jumlah copy yang banyak dan (4) mempunyai ukuran yang relatif kecil (< 10 kb). Molekul DNA yang memenuhi persyaratan tersebut adalah : plasmid dan kromosom virus terutama bakteriofaga.

Plasmid

Plasmid merupakan DNA rantai ganda yang berbentuk sirkular dan terdapat bebas di dalam sel. Plasmid dapat bereplikasi sendiri di dalam sel inang karena mempunyai suatu urutan DNA spesifik yang disebut *ori* (*origin of replication*/titik awal replikasi). Plasmid hampir selalu membawa satu gen atau lebih yang menyebabkan ciri- ciri penting yang ditunjukkan oleh bakteri inang, misalnya plasmid yang membawa gen resistan antibiotik

Banyak spesies bakteri mempunyai plasmid, tetapi plasmid yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan bukan plasmid dalam bentuk alami, melainkan yang sudah direkayasa. Plasmid tersebut telah diberi sisi pengenalan beberapa enzim restriksi agar dapat disisipi dengan DNA asing. Plasmid juga telah diberi dua gen marker, satu gen diperlukan untuk mendeteksi dengan mudah adanya plasmid di dalam sel, dan gen yang kedua diperlukan untuk mendeteksi adanya DNA asing.

Bakteriofaga merupakan virus yang menginfeksi bakteri. Bakteriofaga mempunyai struktur yang sangat sederhana, hanya terdiri dari satu molekul DNA atau RNA yang membawa sejumlah gen, dan dikelilingi oleh selubung atau kapsid yang disusun oleh molekul protein. Pada proses infeksi bakteri oleh faga, partikel faga melekat pada bagian luar bakteri dan memasukkan DNA kromosomnya ke dalam sel. Molekul DNA faga kemudian mengadakan replikasi, gen-gen faga mengatur sintesis protein komponen kapsid. Partikel-partikel faga yang baru kemudian dirakit dan dilepaskan dari bakteri. Sel bakteri mengalami lisis. Sama seperti plasmid, DNA faga yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan umumnya sudah dimodifikasi dengan penambahan sisi restriksi. Perbedaannya dengan plasmid, bakteriofaga dapat menampung fragmen DNA dengan ukuran yang lebih besar.

Bakteriofag

Bakteriofag atau fag λ merupakan virus kompleks yang menginfeksi bakteri *E. coli*. Berkat pengetahuan yang memadai tentang fag ini, kita dapat memanfaatkannya sebagai vektor kloning semenjak masa-masa awal perkembangan rekayasa genetika. DNA λ yang diisolasi dari partikel fag ini mempunyai konformasi linier untai ganda dengan panjang 48,5 kb. Namun, masing-masing ujung fosfatnya berupa untai tunggal sepanjang 12 pb yang komplementer satu sama lain sehingga memungkinkan DNA λ untuk berubah konformasinya menjadi sirkuler. Dalam bentuk sirkuler, tempat bergabungnya kedua untai tunggal sepanjang 12 pb tersebut dinamakan kos. Seluruh urutan basa DNA λ telah diketahui. Secara alami terdapat lebih dari satu tempat pengenalan restriksi untuk setiap enzim restriksi yang biasa digunakan. Oleh karena itu, DNA λ tipe alami tidak cocok untuk digunakan sebagai vektor kloning. Akan tetapi, saat ini telah banyak dikonstruksi derivat-derivat DNA λ yang memenuhi syarat sebagai vektor kloning. Ada dua macam vektor kloning yang berasal dari DNA λ , yaitu vektor insersional, yang dengan mudah dapat disisipi oleh fragmen DNA asing, vektor substitusi, yang untuk membawa fragmen DNA asing harus membuang sebagian atau seluruh urutan basanya yang

terdapat di daerah nonesensial dan menggantinya dengan urutan basa fragmen DNA asing tersebut. Di antara kedua macam vektor λ tersebut, vektor substitusi lebih banyak digunakan karena kemampuannya untuk membawa fragmen DNA asing hingga 23 kb. Salah satu contohnya adalah vektor WES, yang mempunyai mutasi pada tiga gen esensial, yaitu gen W, E, dan S. Vektor ini hanya dapat digunakan pada sel inang yang dapat menekan mutasi tersebut. Cara substitusi fragmen DNA asing pada daerah nonesensial membutuhkan dua tempat pengenalan restriksi untuk setiap enzim restriksi. Jika suatu enzim restriksi memotong daerah nonesensial di dua tempat berbeda, maka segmen DNA λ di antara kedua tempat tersebut akan dibuang untuk selanjutnya digantikan oleh fragmen DNA asing. Jika pembuangan segmen DNA λ tidak diikuti oleh substitusi fragmen DNA asing, maka akan terjadi religasi vektor DNA λ yang kehilangan sebagian segmen pada daerah nonesensial. Vektor religasi semacam ini tidak akan mampu bertahan di dalam sel inang. Dengan demikian, ada suatu mekanisme seleksi otomatis yang dapat membedakan antara sel inang dengan vektor rekombinan dan sel inang dengan vektor religasi.

Bakteriofag λ mempunyai dua fase daur hidup, yaitu fase litik dan fase lisogenik. Pada fase litik, transfeksi sel inang (istilah transformasi untuk DNA fag) dimulai dengan masuknya DNA λ yang berubah konformasinya menjadi sirkuler dan mengalami replikasi secara independen atau tidak bergantung kepada kromosom sel inang. Setelah replikasi menghasilkan sejumlah salinan DNA λ sirkuler, masing-masing DNA ini akan melakukan transkripsi dan translasi membentuk protein kapsid (kepala). Selanjutnya, tiap DNA akan dikemas (packaged) dalam kapsid sehingga dihasilkan partikel λ baru yang akan keluar dari sel inang untuk menginfeksi sel inang lainnya. Sementara itu, pada fase lisogenik DNA λ akan terintegrasi ke dalam kromosom sel inang sehingga replikasinya bergantung kepada kromosom sel inang. Fase lisogenik tidak menimbulkan lisis pada sel inang. Di dalam medium kultur, sel inang yang mengalami lisis akan membentuk plak (plaque) berupa daerah bening di antara koloni-koloni sel inang yang tumbuh. Oleh karena itu, seleksi vektor

rekombinan dapat dilakukan dengan melihat terbentuknya plak tersebut.

Bakteriofag M13

Ada jenis bakteriofag lainnya yang dapat menginfeksi *E. coli*. Berbeda dengan λ yang mempunyai struktur ikosahedral berekor, fag jenis kedua ini mempunyai struktur berupa filamen. Contoh yang paling penting adalah M13, yang mempunyai genom berupa untai tunggal DNA sirkuler sepanjang 6.408 basa. Infeksinya pada sel inang berlangsung melalui pili, suatu penonjolan pada permukaan sitoplasma. Ketika berada di dalam sel inang genom M13 berubah menjadi untai ganda sirkuler yang dengan cepat akan bereplikasi menghasilkan sekitar 100 salinan. Salinan-salinan ini membentuk untai tunggal sirkuler baru yang kemudian bergerak ke permukaan sel inang. Dengan cara seperti ini DNA M13 akan terselubungi oleh membran dan keluar dari sel inang menjadi partikel fag yang infeksiif tanpa menyebabkan lisis. Oleh karena fag M13 terselubungi dengan cara pembentukan kuncup pada membran sel inang, maka tidak ada batas ukuran DNA asing yang dapat disisipkan kepadanya. Inilah salah satu keuntungan penggunaan M13 sebagai vektor kloning bila dibandingkan dengan plasmid dan λ . Keuntungan lainnya adalah bahwa M13 dapat digunakan untuk sekuensing (penentuan urutan basa) DNA dan mutagenesis tapak terarah (site directed mutagenesis) karena untai tunggal DNA M13 dapat dijadikan cetakan (templat) di dalam kedua proses tersebut.

Meskipun demikian, M13 hanya mempunyai sedikit sekali daerah pada DNANYA yang dapat disisipi oleh DNA asing. Di samping itu, tempat pengenalan restriksinya pun sangat sedikit. Namun, sejumlah derivat M13 telah dikonstruksi untuk mengatasi masalah tersebut.

Kosmid

Kosmid merupakan vektor yang dikonstruksi dengan menggabungkan kos dari DNA λ dengan plasmid. Kemampuannya

untuk membawa fragmen DNA sepanjang 32 hingga 47 kb menjadikan kosmid lebih menguntungkan daripada fag λ dan plasmid.

Fasmid

Selain kosmid, ada kelompok vektor sintesis yang merupakan gabungan antara plasmid dan fag λ . Vektor yang dinamakan fasmid ini membawa segmen DNA λ yang berisi tempat att. Tempat att digunakan oleh DNA λ untuk berintegrasi dengan kromosom sel inang pada fase lisogenik.

Vektor YACs

Seperti halnya kosmid, YACs (yeast artificial chromosomes atau kromosom buatan dari khamir) dikonstruksi dengan menggabungkan antara DNA plasmid dan segmen tertentu DNA kromosom khamir. Segmen kromosom khamir yang digunakan terdiri atas sekuens telomer, sentromir, dan titik awal replikasi.

YACs dapat membawa fragmen DNA genomik sepanjang lebih dari 1 Mb. Oleh karena itu, YACs dapat digunakan untuk mengklon gen utuh manusia, misalnya gen penyandi cystic fibrosis yang panjangnya 250 kb. Dengan kemampuannya itu YACs sangat berguna dalam pemetaan genom manusia seperti yang dilakukan pada Proyek Genom Manusia.

Vektor YEps

Vektor-vektor untuk keperluan kloning dan ekspresi gen pada *Saccharomyces cerevisiae* dirancang atas dasar plasmid alami berukuran 2 μ m, yang selanjutnya dikenal dengan nama plasmid 2 mikron. Plasmid ini memiliki sekuens DNA sepanjang 6 kb, yang mencakup titik awal replikasi dan dua gen yang terlibat dalam replikasi.

Vektor-vektor yang dirancang atas dasar plasmid 2 mikron disebut YEps (yeast episomal plasmids). Segmen plasmid 2 mikronnya membawa titik awal replikasi, sedangkan segmen kromosom khamirnya membawa suatu gen yang berfungsi sebagai penanda seleksi, misalnya gen LEU2 yang terlibat dalam biosintesis leusin. Meskipun biasanya bereplikasi seperti plasmid pada umumnya, YEps dapat terintegrasi ke dalam kromosom khamir inangnya.

Plasmid Ti *Agrobacterium tumefaciens*

Sel-sel tumbuhan tidak mengandung plasmid alami yang dapat digunakan sebagai vektor kloning. Akan tetapi, ada suatu bakteri, yaitu *Agrobacterium tumefaciens*, yang membawa plasmid berukuran 200 kb dan disebut plasmid Ti (tumor inducing atau penyebab tumor). Bakteri *A. tumefaciens* dapat menginfeksi tanaman dikotil seperti tomat dan tembakau serta tanaman monokotil, khususnya padi. Ketika infeksi berlangsung bagian tertentu plasmid Ti, yang disebut T-DNA, akan terintegrasi ke dalam DNA kromosom tanaman, mengakibatkan terjadinya pertumbuhan sel-sel tanaman yang tidak terkendali. Akibatnya, akan terbentuk tumor atau crown gall.

Plasmid Ti rekombinan dengan suatu gen target yang disisipkan pada daerah T-DNA dapat mengintegrasikan gen tersebut ke dalam DNA tanaman. Gen target ini selanjutnya akan dieskpresikan menggunakan sistem DNA tanaman.

Dalam prakteknya, ukuran plasmid Ti yang begitu besar sangat sulit untuk dimanipulasi. Namun, ternyata apabila bagian T-DNA dipisahkan dari bagian-bagian lain plasmid Ti, integrasi dengan DNA tanaman masih dapat terjadi asalkan T-DNA dan bagian lainnya tersebut masih berada di dalam satu sel bakteri *A. tumefaciens*. Dengan demikian, manipulasi atau penyisipan fragmen DNA asing hanya dilakukan pada T-DNA dengan cara seperti halnya yang dilakukan pada plasmid *E.coli*. Selanjutnya, plasmid T-DNA rekombinan yang dihasilkan ditransformasikan ke dalam sel *A. tumefaciens* yang membawa plasmid Ti tanpa bagian T-DNA.

Perbaikan prosedur berikutnya adalah pembuangan gen-gen pembentuk tumor yang terdapat pada T-DNA.

Baculovirus

Baculovirus merupakan virus yang menginfeksi serangga. Salah satu protein penting yang disandi oleh genom virus ini adalah polihedrin, yang akan terakumulasi dalam jumlah sangat besar di dalam nuklei sel-sel serangga yang diinfeksi karena gen tersebut mempunyai promoter yang sangat aktif. Promoter ini dapat digunakan untuk memacu overekspresi gen-gen asing yang diklon ke dalam genom baculovirus sehingga akan diperoleh produk protein yang sangat banyak jumlahnya di dalam kultur sel-sel serangga yang terinfeksi.

Vektor Kloning pada Mamalia

Vektor untuk melakukan kloning pada sel-sel mamalia juga dikonstruksi atas dasar genom virus. Salah satu di antaranya yang telah cukup lama dikenal adalah SV40, yang menginfeksi berbagai spesies mamalia. Genom SV40 panjangnya hanya 5,2 kb. Genom ini mengalami kesulitan dalam pengepakan (packaging) sehingga pemanfaatan SV40 untuk mentransfer fragmen-fragmen berukuran besar menjadi terbatas. Retrovirus mempunyai genom berupa RNA untai tunggal yang ditranskripsi balik menjadi DNA untai ganda setelah terjadi infeksi. DNA ini kemudian terintegrasi dengan stabil ke dalam genom sel mamalia inang sehingga retrovirus telah digunakan sebagai vektor dalam terapi gen. Retrovirus mempunyai beberapa promoter yang kuat.

5.3. Vektor ekspresi

Vektor ekspresi merupakan vektor yang mana disamping dapat bereplikasi sendiri juga mengandung sinyal-sinyal ekspresi, sehingga gen yang di klon juga akan ditranskripsi menjadi mRNA dan kemudian ditranslasi menjadi protein. Vektor ekspresi memungkinkan untuk produksi protein hewan, manusia atau tanaman di dalam bakteri. Tiga sinyal ekspresi yang paling penting adalah : (1) Promotor

transkripsi, (2) terminator transkripsi, dan (3) tempat pengikatan ribosom. Selain sistem vektor ekspresi untuk bakteri, juga terdapat beberapa sistem vektor ekspresi untuk *Saccharomyces cerevisiae* dan vektor ekspresi untuk *Pichia pastoris*. Kedua jenis sistem ekspresi ini terbukti dapat memproduksi protein eukariot dengan hasil yang tinggi dan berfungsi seperti protein natif (asli).

Tahapan-tahapan kloning.

Tahapan pengerjaan kloning DNA/gen adalah sebagai berikut :

1. Isolasi/ preparasi DNA sisipan dan DNA vektor
2. Pemotongan molekul DNA
3. Penggabungan fragmen DNA sisipan ke DNA vektor (proses ligasi)
4. Transformasi (proses memasukkan molekul DNA plasmid rekombinan ke dalam sel inang.
5. Identifikasi sel yang mengandung DNA plasmid rekombinan.
6. Isolasi DNA rekombinan

1. Isolasi/ preparasi DNA

Sebelum disisipkan ke suatu DNA vektor, maka DNA sisipan harus diisolasi terlebih dulu. Beberapa prinsip isolasi DNA sudah dijelaskan di atas. Selain itu DNA sisipan juga dapat diperoleh dari produk PCR.

2. Pemotongan DNA dengan enzim restriksi

Molekul plasmid yang digunakan sebagai vektor harus dipotong untuk membuka DNA lingkaran, sehingga molekul DNA

asing bisa disisipkan. Enzim restriksi merupakan suatu endonuklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan memotong pada urutan yang spesifik tersebut. Sisi pengenalan enzim restriksi umumnya merupakan suatu polindrom, dimana urutan nukleotida rantai atas sama dengan urutan nukleotida rantai bawah. Misalnya :


Enzim restriksi hanya terdapat pada beberapa bakteri, dan berfungsi untuk mempertahankan diri dari infeksi bakteriofaga. Contoh beberapa enzim restriksi dan sisi pengenalannya:

Tabel 5.1. Beberapa enzim restriksi dan urutan pengenalannya

Nama enzim	Sumber bakteri	Urutan pengenalan
AluI	<i>Arthrobacter luteus</i>	AG↓CT
BamHI	<i>Bacillus</i>	G↓GATCC
ClaI	<i>Caryophanon latum</i>	AT↓GCAT
EcoRI	<i>Escherichia coli</i>	G↓AATTC
HaeIII	<i>Haemophilus aegyptius</i>	GG↓CC
HindIII	<i>Haemophylus influenzae</i>	A↓AGCTT
KpnI	<i>Klebsiella pneumonia</i>	GGTAC↓C
NotI	<i>Nocardia otidis-caviarum</i>	GC↓GGCCGC
PstI	<i>Providencia stuartii</i>	CTGCA↓G
XbaI	<i>Xanthomonas bradii</i>	T↓CTAGA
XhoI	<i>Xanthomonas holcicola</i>	C↓TCGAG

3. Penyambungan DNA dengan enzim ligase.

Apabila dua molekul DNA mempunyai ujung rantai tunggal yang komplementer, maka kedua ujung DNA tersebut dapat berpasangan, kemudian enzim ligase dapat membentuk ikatan fosfodiester antara kedua molekul DNA tersebut. Reaksi enzimatik ini memerlukan energi dari ATP.



Gambar 5.2 penyambungan dengan enzim ligase

4. Transformasi sel

Untuk memasukkan DNA ke dalam sel bakteri, sel tersebut harus diberi perlakuan agar menjadi sel kompeten, yaitu sel yang mampu menerima DNA dari luar. Kemampuan paling tinggi untuk memasukkan DNA dari luar terjadi pada sel yang berada dalam fase logaritmik, yaitu pada waktu pertumbuhan sel sedang cepat. Perlakuan dengan CaCl₂ menyebabkan dinding sel menjadi lebih permeabel dan bermuatan positif, sehingga dapat menarik DNA yang bermuatan negatif.

Transformasi (pengambilan DNA oleh sel bakteri) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) dengan cara *heat shock* (kejutan panas) dimana campuran sel dan DNA plasmid rekombinan didinginkan dalam waktu yang lama, kemudian di panaskan dengan segera pada suhu 42 °C. (2) dengan cara elektroporasi (kejutan listrik) menggunakan suatu alat yang dialiri arus listrik.

5. Seleksi klon rekombinan

Sel inang yang telah ditransformasi kemudian ditumbuhkan pada media padat yang sesuai pada suhu 37 °C. Setelah inkubasi semalam, maka kita akan mendapatkan koloni-koloni bakteri yang tumbuh di media padat. Satu koloni bakteri terdiri dari jutaan sel bakteri yang mempunyai sifat yang sama. Sehingga klon-klon ini perlu dipilih untuk menentukan mana koloni bakteri yang membawa plasmid rekombinan. Terdapat beberapa cara seleksi klon rekombinan, diantaranya :

1. Seleksi berdasarkan sifat resistan terhadap antibiotik. Pada seleksi ini plasmid yang digunakan mempunyai dua gen resistan terhadap antibiotik. Misalnya gen Amp^r (gen resistan ampisilin dan gen Tet^r (gen resistan terhadap tetracyclin). Penyisipan DNA asing dilakukan di dalam gen Tet^r, sehingga bila mengandung sisipan DNA asing gen Tet^r tidak akan aktif. Bakteri transforman pertama ditumbuhkan pada media yang mengandung Ampicilin, sehingga koloni yang tumbuh adalah koloni yang membawa plasmid. Kemudian koloni-koloni ini dipindahkan ke media yang mengandung tetrasiklin, sehingga koloni yang mengandung DNA sisipan (dimana gen Tet^r-nya sudah tidak aktif) tidak akan tumbuh. Maka kita akan tahu koloni mana yang mengandung DNA sisipan.
2. Seleksi dengan melibatkan gen *LacZ*. Pada seleksi ini plasmid yang digunakan mempunyai gen Amp^r dan gen *LacZ*. Gen *LacZ* mengkode enzim β -galaktosidase yang mengkatalisis pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Penyisipan DNA dilakukan di dalam gen *LacZ* ini, sehingga bila mengandung DNA sisipan maka gen

LacZ akan inaktif. Seleksi dilakukan dengan menambahkan substrat analog laktosa yaitu X-gal yang akan dipecah oleh enzim β -galaktosidase menjadi senyawa yang berwarna biru (5-bromo-4 kloro-3-indigo). IPTG (isopropil tiogalaktopiranosida) digunakan sebagai inducer. Bakteri transforman ditumbuhkan pada media yang mengandung Ampicilin, X-gal dan IPTG. Koloni yang tumbuh adalah koloni yang membawa plasmid. Akan tetapi terdapat dua jenis koloni, yaitu yang berwarna putih dan biru. Koloni yang berwarna biru menandakan terdapat senyawa 5-bromo-4 kloro-3-indigo (hasil penguraian X-gal oleh β -galaktosidase), artinya gen *LacZ*nya aktif sehingga tidak ada DNA sisipan. Sedangkan koloni yang berwarna putih, adalah koloni yang tidak menghasilkan senyawa berwarna, gen *LacZ* inaktif dan mengandung DNA sisipan.

6. Isolasi DNA plasmid rekombinan.

DNA plasmid rekombinan, kemudian dapat diisolasi untuk kepentingan pengerjaan berikutnya dengan menggunakan metoda yang sudah dijelaskan di atas. DNA ini selanjutnya dapat di karakterisasi, misalnya disekuensing untuk menentukan urutan nukleotidanya atau dapat juga di potong dengan enzim restriksi kemudian di kloning ke vektor ekspresi.

6

Perpustakaan Gen

Pokok bahasan di dalam bab ini menguraikan pengertian dan macam perpustakaan gen, besarnya perpustakaan gen, prinsip kerja elektroforesis, dan prosedur skrining DNA rekombinan dari perpustakaan gen. Setelah mempelajari pokok bahasan di dalam bab ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan

1. pengertian perpustakaan gen,
2. perbedaan antara perpustakaan genom dan perpustakaan cDNA,
3. cara menghitung besarnya perpustakaan gen yang diperlukan,
4. prinsip kerja dan kegunaan elektroforesis, dan
5. macam-macam prosedur skrining DNA rekombinan dari perpustakaan gen.

Pengetahuan awal yang diperlukan oleh mahasiswa agar dapat mempelajari pokok bahasan ini dengan lebih baik adalah pengertian teknologi DNA rekombinan beserta tahapan-tahapan kloning gen seperti telah dibahas pada Bab sebelumnya

6.1. Pengertian dan Macam Perpustakaan Gen

Suatu perpustakaan gen dapat diartikan sebagai sekumpulan sekuens (urutan) DNA dari suatu organisme yang masing-masing telah diklon ke dalam vektor tertentu untuk memudahkan pemurnian, penyimpanan, dan analisisnya. Pada dasarnya terdapat dua macam perpustakaan gen yang dapat dikonstruksi, bergantung kepada sumber DNA digunakan. Jika DNA yang digunakan adalah DNA

genomik/kromosom, maka perpustakaan yang dihasilkan disebut **perpustakaan genom**. Sementara itu, jika DNA yang digunakan merupakan hasil transkripsi balik suatu populasi mRNA seperti yang umum dijumpai pada eukariot, maka perpustakaan yang diperoleh dinamakan **perpustakaan cDNA**.

Hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan konstruksi suatu perpustakaan gen adalah bahwa perpustakaan tersebut harus merepresentasikan semua gen yang ada di dalam sumber DNA asalnya. Dengan perkataan lain, suatu perpustakaan gen dikatakan representatif apabila berisi semua sekuens aslinya. Selain itu, jika suatu perpustakaan tidak mengandung klon dalam jumlah yang mencukupi, maka sangat dimungkinkan hilangnya beberapa gen tertentu.

Untuk mendapatkan perpustakaan genom yang representatif, DNA genomik harus dimurnikan dan kemudian dipotong secara acak menjadi fragmen-fragmen yang ukurannya sesuai dengan keperluan kloning menggunakan vektor yang dipilih. Fraksionasi sel pada eukariot akan mengurangi kontaminasi oleh DNA organel (mitokondria, kloroplas). Oleh karena itu, pemurnian DNA genomik eukariot biasanya dilakukan dengan terlebih dahulu mengisolasi nukleus dan menghilangkan protein, lemak, serta makromolekul lain yang tidak diinginkan dengan memberikan protease dan melakukan ekstraksi fenol-kloroform. Sementara itu, DNA prokariot dapat diekstraksi langsung.

DNA genomik hasil pemurnian tersebut selanjutnya dipotong-potong secara acak. Pada dasarnya ada dua cara pemotongan, yaitu pemotongan fisik seperti sonikasi dan digesti menggunakan enzim restriksi. Pemotongan dengan enzim restriksi akan menghasilkan fragmen-fragmen dengan ujung tertentu (lihat Bab IX). Untuk mendapatkan fragmen-fragmen dengan ukuran relatif besar dilakukan **digesti parsial** dengan cara mengurangi jumlah enzim restriksi atau waktu pemotongan yang digunakan. Dengan digesti parsial ini enzim restriksi tidak akan memotong DNA genomik pada setiap tempat pengenalan yang ada sehingga akan diperoleh fragmen-fragmen DNA genomik yang relatif panjang.

Besarnya Perpustakaan Gen

Besarnya suatu perpustakaan gen dilihat dari banyaknya rekombinan yang terdapat di dalamnya. Untuk menghitung banyaknya rekombinan yang harus ada di dalam suatu perpustakaan gen digunakan rumus sebagai berikut.

$$N = \ln(1 - P) / \ln(1 - f)$$

Pada rumus tersebut N adalah banyaknya rekombinan yang harus ada di dalam perpustakaan gen, P peluang yang diinginkan, dan f nisbah panjang fragmen sisipan terhadap panjang genom. Sebagai contoh, untuk mendapatkan fragmen sisipan berukuran 20 kb (20.000 pb) dengan peluang 0,99 diperlukan perpustakaan gen yang besarnya berbeda antara *E. coli* dan manusia.

$$N_{E. coli} = \ln(1 - 0,99) / \ln(1 - 20.000 / 4,6 \times 10^6) = 1,1 \times 10^3$$

$$N_{manusia} = \ln(1 - 0,99) / \ln(1 - 20.000 / 3 \times 10^9) = 6,9 \times 10^5$$

Kita bisa melihat bahwa banyaknya rekombinan yang diperlukan untuk mendapatkan fragmen dengan ukuran dan peluang yang sama ternyata berbeda, bergantung kepada panjang genom organismenya. Pada *E. coli* dengan panjang genom yang lebih pendek ($4,6 \times 10^6$) daripada panjang genom manusia (3×10^9) diperlukan rekombinan yang lebih sedikit ($1,1 \times 10^3$) daripada rekombinan untuk perpustakaan gen manusia ($6,9 \times 10^5$).

Perhitungan seperti tersebut di atas juga dapat menjelaskan alasan bahwa apabila genom suatu prokariot dengan fragmen sisipan sepanjang 5 hingga 10 kb diklon menggunakan plasmid akan menghasilkan perpustakaan gen yang baik meskipun hanya membawa beberapa ribu rekombinan. Demikian pula, untuk genom-genom yang besar cukup diperlukan sedikit rekombinan meskipun fragmen sisipannya panjang. Penggunaan vektor yang dapat mengklon fragmen-fragmen panjang, misalnya kosmid dan YAC, memungkinkan

konstruksi perpustakaan genom dengan jumlah rekombinan yang tidak terlalu besar.

Elektroforesis

Sebelum fragmen-fragmen DNA genomik hasil digesti restriksi diligasikan ke dalam suatu vektor tertentu (lihat Bab IX) terlebih dahulu perlu dilakukan pemeriksaan atas keberhasilan digesti tersebut. Untuk melihat keberhasilan digesti restriksi, DNA divisualisasikan menggunakan teknik elektroforesis. Namun, elektroforesis sendiri sebenarnya bukanlah teknik visualisasi DNA semata-mata karena teknik ini dapat juga digunakan untuk keperluan isolasi dan pemurnian fragmen DNA tertentu.

Prinsip kerja elektroforesis adalah memisahkan molekul-molekul bermuatan listrik berdasarkan atas ukuran (berat molekul) dan muatan listriknya. Khusus untuk DNA, pemisahan tidak didasarkan atas perbedaan muatan listriknya, tetapi menurut ukuran dan konformasi atau struktur fisik molekulnya. Gel yang biasa digunakan adalah agarosa dan poliakrilamid. Gel agarosa digunakan untuk memisahkan sampel DNA dengan ukuran dari beberapa ratus hingga 20.000 pasang basa (pb), sedangkan gel poliakrilamid digunakan untuk fragmen-fragmen DNA yang lebih kecil.

Molekul DNA bermuatan negatif sehingga di dalam medan listrik akan bermigrasi melalui matriks gel menuju kutub positif (anode). Makin besar ukuran molekulnya, makin rendah laju migrasinya. Jika hubungan antara ukuran molekul dan laju migrasi dipetakan dalam suatu grafik logaritmik, maka akan diperoleh kurva linier. Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan berat molekul suatu fragmen DNA dengan melihat atau membandingkan laju migrasinya dengan laju migrasi fragmen-fragmen molekul DNA standar (marker) yang telah diketahui ukurannya.

Fragmen-fragmen DNA divisualisasikan di bawah sinar ultraviolet setelah terlebih dulu direndam di dalam larutan etidium bromid, pewarna yang akan menyisip atau melakukan interkalasi di sela-sela basa DNA. Perendaman dilakukan setelah migrasi dianggap cukup

untuk dihentikan. Fragmen DNA akan nampak sebagai pita berwarna merah dengan posisi migrasi yang sesuai dengan berat molekulnya. Cara ini dapat memvisualisasikan fragmen DNA hingga sekecil 0,05 µg.

Seperti telah dikatakan di atas bahwa selain karena perbedaan ukurannya, laju migrasi DNA pada gel elektroforesis juga ditentukan oleh konformasi molekulnya. DNA dengan bentuk *covalently closed circular* (CCC) akan bergerak paling cepat, disusul berikutnya konformasi *open circular* (OC), dan yang terakhir linier. Oleh karena perbedaan konformasi menyebabkan perbedaan laju migrasi, maka penentuan ukuran suatu fragmen DNA selalu dilakukan pada konformasi linier.

Marilah kembali kita bicarakan visualisasi fragmen-fragmen DNA genomik hasil digesti restriksi. DNA genomik, baik yang utuh maupun yang telah dipotong menggunakan enzim restriksi, perlu divisualisasikan pada gel elektroforesis. Begitu pula halnya dengan vektor utuh dan vektor yang telah dilinierkan serta vektor rekombinan hasil ligasi dengan fragmen DNA genomik (lihat Bab IX). Selain itu, molekul DNA marker yang telah diketahui ukurannya juga dimigrasikan sebagai standar untuk menentukan ukuran sampel-sampel DNA yang kita analisis.

DNA genomik utuh pada lajur 2 nampak sebagai pita dengan laju migrasi paling lambat. Jika dibandingkan dengan marker, akan terlihat bahwa ukurannya lebih besar dari 21,3 kb. Berikutnya pada lajur 3, DNA genomik yang telah dipotong menggunakan enzim restriksi tertentu tervisualisasi sebagai pita melebar (*smear*). Pita ini merupakan kumpulan fragmen-fragmen DNA hasil pemotongan tersebut yang sangat bervariasi ukurannya. Sementara itu, pada lajur 4 dan 5 terlihat jelas perbedaan laju migrasi antara plasmid utuh yang mempunyai konformasi CCC dan plasmid linier hasil pemotongan dengan suatu enzim restriksi. Plasmid linier bergerak lebih lambat daripada plasmid CCC, dan posisi migrasinya digunakan untuk menentukan ukurannya (sekitar 4,9 kb). Terakhir pada lajur 6, plasmid rekombinan hasil ligasi dengan fragmen DNA genomik menunjukkan ukuran yang lebih besar dari 4,9 kb. Hal ini terlihat dari migrasinya yang lebih lambat daripada plasmid linier tanpa fragmen sisipan.

Prosedur Skrining

Proses untuk mengidentifikasi suatu klon yang membawa gen tertentu yang diinginkan di antara sejumlah besar klon lainnya di dalam perpustakaan gen dinamakan **skrining**. Pada dasarnya skrining dilakukan dengan teknik **hibridisasi** menggunakan suatu molekul **pelacak DNA (*DNA probe*)**. Beberapa pengetahuan mengenai gen yang akan dicari, atau produknya, diperlukan dalam pembuatan molekul pelacak bagi gen tersebut. Di dalam proses skrining, molekul pelacak akan menempel pada sekuens DNA yang komplementer dengannya sehingga klon yang diinginkan dapat dikenali.

Apabila diperoleh protein yang merupakan produk gen tertentu dalam jumlah yang memungkinkan untuk penentuan sekuens asam aminonya, maka dari informasi sekuens asam amino ini dapat disusun beberapa kemungkinan sekuens DNA yang menyandinya. Selanjutnya, informasi sekuens DNA yang disusun dapat digunakan untuk membuat molekul pelacak.


Hibridisasi koloni dan plak

Seleksi transforman dengan vektor rekombinan yang dikonstruksi menggunakan vektor λ dilakukan dengan melihat terbentuknya plak pada medium kultur sel inang. Sementara itu, seleksi transforman dengan vektor rekombinan yang dikonstruksi menggunakan plasmid dilakukan dengan melihat pertumbuhan koloni pada medium seleksi (lihat Bab XI). Namun, prosedur skrining bagi kedua sistem kloning tersebut pada dasarnya sama saja.

Langkah pertama adalah mentransfer DNA di dalam plak atau koloni ke suatu **membran nilon atau nitroselulosa**. Untuk plak, DNA λ dapat langsung diperoleh dan ditransfer ke membran karena plak merupakan area tempat keberadaan bakteri inang yang mengalami lisis. Akan tetapi, jika yang ditransfer ke membran adalah koloni-koloni bakteri, maka perlu dilakukan lisis sel bakteri untuk mendapatkan DNA. Sebelumnya, dibuat replika bagi koloni-koloni yang ditransfer tersebut di dalam medium kultur yang baru.

Lisis sel bakteri biasanya dilakukan dengan merendam membran nilon di dalam sodium dodesil sulfat (SDS) dan protease. Selanjutnya, DNA yang keluar dari sel didenaturasi menggunakan alkali sehingga diperoleh DNA untai tunggal, yang kemudian difiksasi ke membran dengan pengeringan atau iradiasi UV. Membran dicelupkan ke dalam larutan pelacak DNA dan diinkubasi agar terjadi hibridisasi antara pelacak, yang juga berupa untai tunggal, dan beberapa DNA untai tunggal yang komplementer dengannya. Pelacak DNA biasanya diberi label radioaktif.

Setelah hibridisasi, membran dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa pelacak yang tidak terhibridisasi. Beberapa DNA di dalam membran yang mengalami hibridisasi divisualisasikan menggunakan autoradiografi dengan sinar X. Dengan membandingkan posisi DNA yang terhibridisasi oleh pelacak dengan posisi koloni pada kultur replika akan diketahui koloni-koloni yang membawa DNA rekombinan dengan fragmen sisipan yang diinginkan.



Gambar 6.1 Prinsip Dasar hibridisasi koloni

Skrining ekspresi

Pada dasarnya skrining ekspresi sama dengan skrining perpustakaan gen melalui hibridisasi koloni/plak. Hanya saja pada skrining ekspresi, bukannya DNA yang dideteksi pada membran, melainkan protein yang merupakan produk suatu gen yang diinginkan. Sebagai pelacak digunakan antibodi, sedangkan untuk mengetahui terjadinya hibridisasi digunakan antibodi lain atau bahan kimia yang dapat mengenalinya.

Dengan cara seperti ini dapat ditentukan koloni/plak yang mengekspresikan protein yang dikehendaki.

Penghambatan dan pelepasan translasi oleh hibrid

Klon-klon cDNA dapat digunakan untuk menghibridisasi mRNA yang diisolasi. Setelah dilakukan hibridisasi, populasi mRNA langsung ditranslasi menjadi protein. Translasi tidak akan terjadi pada segmen mRNA yang terhibridisasi oleh cDNA, atau dengan perkataan lain, translasi telah dihambat oleh hibrid (*hybrid-arrest translation*). Dengan mendeteksi produk-produk protein yang tidak terbentuk dapat diketahui cDNA yang menghambat translasi suatu protein. Artinya, cDNA ini dapat dipastikan membawa sekuens yang menyandi protein yang tidak ditranslasi tersebut.


Cara kebalikannya juga dapat dilakukan. Hibrid-hibrid antara cDNA dan mRNA dimurnikan. Kemudian, mRNA dilepaskan dari hibrid dengan pemanasan atau menggunakan agen denaturasi. Setelah itu, mRNA ditranslasi (*hybrid-release translation*) untuk menghasilkan produk protein tertentu. Dengan mengetahui protein yang terbentuk dapat diketahui klon cDNA yang membawa sekuens penyandi protein tersebut. Secara skema perbandingan kedua prosedur skrining tersebut dapat dilihat pada Gambar 10.4.

Southern blotting dan Northern blotting

Kedua prosedur skrining ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan sekuens tertentu tetapi tidak dilakukan langsung pada klon-klon rekombinannya. Skrining didasarkan atas hasil hibridisasi antara molekul asam nukleat dan pelacaknya pada gel agarosa. Istilah Southern blotting berasal dari nama penemunya, sedangkan Northern blotting diekstrapolasi dari nama tersebut. Jika Southern blotting ditujukan untuk DNA, Northern blotting digunakan untuk hibridisasi RNA.

Tahap pertama untuk kedua prosedur tersebut adalah migrasi molekul asam nukleat pada gel agarosa. Khusus untuk Southern blotting, dilakukan denaturasi DNA (biasanya menggunakan alkali) sehingga akan diperoleh DNA untai tunggal. Pita-pita untai tunggal, baik DNA

maupun RNA, kemudian dipindahkan ke membran nilon atau nitroselulosa seperti halnya pada hibridisasi koloni.



Gambar 6.2 Analisis Southern blotting

Begitu asam nukleat dipindahkan ke membran, tahap-tahap selanjutnya pada kedua prosedur skrining tersebut sama, yaitu fiksasi asam nukleat pada membran, hibridisasi dengan pelacak, pencucian sisa pelacak, dan deteksi fragmen yang mengalami hibridisasi menggunakan autoradiografi. Di antara tahap-tahap tersebut kondisi hibridisasi merupakan faktor yang paling memerlukan perhatian. Jika antara pelacak dan sekuens target terdapat homologi yang sangat tinggi (mendekati atau sama dengan 100%), maka dapat diberlakukan kondisi hibridisasi yang ketat, yaitu dengan suhu hibridisasi tinggi dan konsentrasi garam rendah pada bufer hibridisasi. Sebaliknya, jika sekuens pelacak tidak terlalu homolog dengan sekuens target, maka ketetapan kondisi hibridisasi harus diturunkan sampai pada tingkatan yang memungkinkan terbentuknya hibrid-hibrid yang kurang sempurna. Namun, jika keketatannya diturunkan terlalu banyak, fragmen pelacak mungkin akan berikatan dengan sekuens-sekuens lain yang tidak spesifik.

Southern blotting terhadap fragmen-fragmen DNA genomik yang diklon dapat dilakukan menggunakan pelacak berupa cDNA untuk mencari bagian-bagian klon genomik yang sesuai dengan fragmen cDNA pelacak. Jika fragmen DNA genomik yang membawa suatu gen tertentu dapat dideteksi, maka akan diketahui ukuran fragmen yang membawa gen tersebut. Blot-blot dengan sampel DNA atau RNA dari organisme yang berbeda (*zoo blots*) dapat menunjukkan betapa konservatifnya suatu gen di antara spesies yang satu dan lainnya.



7

Rekayasa Genetik dan Bioteknologi

Kita sudah mempelajari bagaimana gen di kloning, dan kita juga telah melihat beberapa teknik yang digunakan pada rekayasa genetika. Sekarang kita akan melihat beberapa aplikasi dari teknologi DNA rekombinan.

7.1. PENELITIAN DASAR

Pengaruh langsung teknologi DNA rekombinan adalah terhadap penelitian dasar. Terdapat dua topik utama dimana yang dapat dipelajari dengan teknologi ini, yaitu: pertama untuk mempelajari gen yang bertanggung jawab terhadap fungsi tertentu dari sel dan kedua untuk menemukan lokasi dimana produk suatu gen bekerja.

Sebagai contoh: penyakit genetik cystic fibrosis (kerusakan sistem pencernaan). Bukti mengatakan bahwa kerusakan pada satu gen bertanggung jawab terhadap penyakit ini. Untuk mengerti penyakit ini maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana gen normalnya. Protein apa yang dikodinya? Bagaimana ekspresinya diregulasi? Mutasinya dimana? Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengkloning gen tersebut.

Aplikasi umum lain dari teknologi DNA rekombinan adalah dari proses yang berlawanan. Misalkan kita mempelajari adanya populasi mRNA pada sel hati yang terpapar terhadap senyawa kimia tertentu. Kita menemukan mRNA tertentu hanya diekspresikan setelah pemaparan terhadap zat kimia tersebut. Logikanya mRNA ini mengkode protein yang terlibat pada respon sel terhadap racun. Apakah fungsi spesifik dari gen tersebut? Apakah mengkode protein yang mendetoksifikasi senyawa kimia? Terdapat berbagai kemungkinan. Bagaimana rekayasa genetika dapat mengetahui fungsi dari gen ini?

Tahap pertama adalah mengkloning gen tersebut. Kita dapat mengkloning gen dari mRNA dengan merubahnya menjadi urutan DNA terlebih dahulu melalui proses RT-PCR, dan kemudian menentukan urutan nukleotida dari gen tersebut. Urutan nukleotida

gen dapat digunakan untuk memprediksikan urutan asam amino yang dikodenya. Dengan mengetahui urutan asam amino dari protein, dapat membantu kita untuk mengidentifikasi, memurnikan dan menentukan fungsinya. Urutan DNA juga dapat dibandingkan dengan urutan yang sudah ditemukan sebelumnya yang sudah dipublikasikan.

7.2. PROYEK "HUMAN GENOME"

Proyek "*human genome*" atau penentuan urutan nukleotida dalam genom manusia, merupakan proyek yang besar. Dapat kita bayangkan bagaimana menentukan urutan DNA genom manusia yang berjumlah 9 milyar pasang basa? Untuk mendapatkan urutan keseluruhan genom manusia maka pertama perlu dibuat peta restriksinya. Genom manusia dipotong-potong dengan enzim restriksi, potongan ini kemudian di kloning dan ditentukan urutan nukleotidanya.

Sekarang timbul pertanyaan: untuk apa urutan DNA manusia ditentukan? Dengan diketahuinya urutan DNA manusia maka kemudian dapat dipelajari lokasi gen dan nama gen (misalnya gen A di kromosom 1 pada posisi sekian). Data ini akan memberikan petunjuk ke arah produk dari gen tersebut. Bila produknya diketahui, kemudian bisa dipelajari fungsinya. Hal ini akan memberikan manfaat besar di bidang kesehatan. Bila bentuk gen normal diketahui, maka untuk mengetahui apakah ada gen yang rusak akan lebih mudah.

Beberapa urutan genom dari organisme lain juga telah ditentukan urutannya. Diantaranya *E. coli*, ragi *S. cerevisiae*, jamur *Arabidopsis thaliana*, dan cacing *Caenorhabditis elegans*. Masing-masing organisme ini sangat penting untuk penelitian, dan dengan mengetahui urutan genomnya akan membantu penelitian biologi molekuler.

7.3. APLIKASI DIBIDANG MEDIK

Salah satu promosi akibat perkembangan teknologi DNA rekombinan adalah peningkatan prosedur dibidang medis. Sebagai contoh, perusahaan farmasi menghabiskan banyak uang untuk penelitian pengembangan produk farmasi. Mereka melakukan ini karena besarnya pangsa pasar dari produk-produk medis tersebut.

Produk farmasi.

Kita sudah melihat contoh produksi insulin rekombinan. Bioteknologi telah menyediakan metoda untuk produksi insulin yang lebih murah, mengurangi resiko penggunaan produk akhir dan menghilangkan ketergantungan terhadap organ binatang. Di samping itu produk farmasi lain juga sudah diproduksi menggunakan teknologi ini (Tabel 7.1). Tidak seperti insulin, tanpa adanya teknologi DNA rekombinan produk ini tidak akan pernah ada atau sangat mahal.

Tabel 7.1. Beberapa produk farmasi hasil teknologi DNA rekombinan

Produk	Kegunaan
Hormon adenocorticotropic	Pengobatan penyakit rematik
Alfa dan gamma interferon	Terapi kanker dan infeksi virus
Sel beta faktor pertumbuhan	Pengobatan kelainan imun
Erythropoietin	Pengobatan anemia
Hormon pertumbuhan manusia	Terapi defisiensi pertumbuhan pada anak-anak
Lympotoxin	Antitumor
Vaksin hepatitis B	Mencegah hepatitis B
Interleukin-2	Pengobatan kanker, merangsang sistem imun
Antibodi monoclonal	Terapi kanker dan rejeksi transplantasi
Nerve growth factor	Memperbaiki syaraf yang rusak
Praurokinase	Antikoagulan; terapi serangan jantung
Platelet-derived growth factor	Mengobati arterosclerosis

Diagnosa penyakit

Diagnosis yang akurat dan cepat merupakan sesuatu yang mutlak pada diagnosa penyakit. Terdapat dua cara diagnosa penyakit menggunakan teknologi DNA rekombinan, yaitu (1) melibatkan penggunaan antibodi, (2) berdasarkan teknik hibridisasi DNA. Konsepnya adalah: jika seseorang terinfeksi virus tertentu maka materi genetik dari virus itu akan terdapat di dalam tubuhnya dan berbeda dengan DNA manusia. DNA dapat

di isolasi dari darah pasien, yang mengandung DNA virus dan DNA manusia. Jika kita mengetahui virus apa yang akan kita cari dan jika urutan DNA virus ini sudah tersedia (di internet) maka kita dapat merancang oligonukleotida pendek (*probe*) yang dilabel radioaktif dan akan dapat berhibridisasi dengan DNA virus. Jadi apabila terdapat DNA virus dalam sampel, maka *probe* akan menempel dan dapat dilihat dengan autoradiografi.

Masalah yang dihadapi dengan teknik ini adalah bila level infeksi rendah, hanya terdapat sedikit DNA virus, sehingga sulit dideteksi. Masalah ini dapat diatasi dengan adanya teknik PCR. PCR digunakan untuk memperbanyak DNA. Primer PCR dapat dirancang, yang akan memperbanyak potongan DNA virus. Setelah itu produk PCR dihibridisasi menggunakan *probe* seperti di atas. Diagnosa ini sangat akurat, spesifik dan cepat dibandingkan teknik tradisional seperti pengkulturan organisme.

Diagnosa dan pengobatan penyakit genetik

Prinsip diagnosa berdasarkan teknik hibridisasi dapat digunakan untuk diagnosa penyakit genetik. Misalkan mutasi spesifik diketahui merupakan penyebab dari penyakit tertentu, seperti penyakit Alzheimer. Bila kita mengetahui mutasi spesifik tersebut, maka kita dapat merancang *probe* DNA yang dapat berhibridisasi untuk mendeteksi mutasi tersebut. Sehingga diagnosa genetik dapat dilakukan menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan untuk diagnosa penyakit infeksi.

Bila perbedaan genetik dapat dideteksi, kerusakan genetik dapat didiagnosa, maka mungkin juga dapat diperbaiki. Proses ini dikenal dengan **terapi gen**, yang akan dibahas pada bab 8.

Vaksin subunit rekombinan

Vaksin jenis ini mengandung protein antigen patogen yang diproduksi dengan teknologi DNA rekombinan. Contohnya vaksin hepatitis B yang digunakan untuk mencegah infeksi hepatitis B. Antigen virus hepatitis B yang telah diketahui dapat

menginduksi antibodi protektif adalah HbsAg (*Hepatitis B Surface Antigen*). Gen pengkode HbsAg di klon dan di ekspresikan di *E. coli*, ragi (*Saccaromyces cerevisiae*). Protein HbsAg yang diperoleh dari ragi digunakan sebagai vaksin rekombinan pertama untuk perdagangan pada tahun 1986, dan harganya lebih murah daripada vaksin Hepatitis B konvensional.

Keunggulan vaksin subunit rekombinan:

1. aman, hanya mengandung antigen tunggal terhadap imunitas yang diharapkan.
2. tidak menimbulkan penyakit.
3. tidak ada kemungkinan terkontaminasi patogen lain.
4. jarang menginduksi reaksi yang tidak diinginkan.
5. menjamin penyediaan kontinu dan mudah dari sumber yang aman.
6. harga murah
7. mencegah transmisi penyakit dengan tidak sengaja pada pegawai produksi dan pemakai.

Kerugian vaksin subunit rekombinan:

Protein antigen dapat mempunyai konformasi yang berbeda dibandingkan bila terletak pada sel atau virus asal. Hal ini dapat ditanggulangi dengan mentargetkan antigen rekombinan pada permukaan suatu sel mikroorganisme. Vaksin ini disebut disebut dengan vaksin rekombinan hidup karier.

FORENSIK

Salah satu yang sudah dipublikasikan secara legal adalah penggunaan "DNA *fingerprinting*". Teknik ini berdasarkan pada aplikasi RFLP (*Restriction Fragment Length Polymorphism*) yang berdasarkan kenyataan bahwa setiap individu, walaupun mempunyai gen yang sama, tapi pasti punya perbedaan pada materi genetiknya (DNA). Perbedaan ini umumnya terjadi pada daerah "bukan pengkode protein". DNA *fingerprinting* bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan materi genetik, dalam rangka menentukan apakah dua sampel DNA berasal dari orang yang sama atau orang yang berbeda. Teknik ini dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak kriminal. Metoda yang digunakan adalah PCR, RFLP, elektroforesis dan hibridisasi.

Sampel DNA dapat disiapkan dari materi yang ditemukan dilokasi kriminal, seperti darah, semen atau rambut. PCR digunakan untuk mengamplifikasi fragmen DNA spesifik dari tersangka dan korban kejahatan. Produk PCR dipotong dengan enzim restriksi dan dipisahkan dengan gel elektroforesis, diikuti dengan transfer ke membran nitroselulosa dan hibridisasi dengan *probe* spesifik. Bila sampel DNA dari tersangka dan korban memperlihatkan pita DNA yang sama setelah hibridisasi, maka dengan perhitungan statistik dapat dikatakan bahwa sampel tersebut berasal dari orang yang sama.

7.4 APLIKASI UNTUK LINGKUNGAN

Aplikasi lain dari teknologi DNA rekombinan adalah manajemen lingkungan. Salah satunya adalah melalui penggunaan biomassa. Biomassa merupakan materi yang dihasilkan selama produksi dan pemrosesan produk agrikultur dan makanan dan biasanya dibuang sebagai sampah yang tidak dapat diolah lebih lanjut. Sampah ini biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak dan biasanya tidak toksik dan tidak berbahaya. Komponen utama dari sampah ini adalah bagian dari tanaman yang tidak dimanfaatkan untuk produk, seperti selulosa dan lignin. Limbah pabrik makanan,

kertas timber pada umumnya mengandung selulosa.

Selulosa dapat didegradasi oleh enzim selulase. Sehingga penelitian tentang identifikasi, isolasi dan purifikasi selulase menjadi penting. Produksi selulase oleh organisme biasanya tidak akan mencukupi untuk penggunaan industri. Disinilah peran dari teknologi DNA rekombinan, untuk mengisolasi gen pengkode selulosa dan mengekspresikannya pada organisme yang berbeda. Kegunaannya adalah untuk pengolahan limbah kertas dengan selulase rekombinan yang membebaskan glukosa dan digunakan pada fermentasi ragi. Salah satu produk akhir dari fermentasi ini adalah alkohol, yang merupakan bahan industri yang penting dan juga dapat digunakan untuk bahan bakar. Sehingga akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

Manfaat lain teknologi DNA rekombinan adalah untuk pengolahan limbah toksik dan berbahaya. Pengolahan limbah dengan mikroba bukanlah hal baru. Beberapa mikroba, secara alami dapat mendegradasi dan mendetoksifikasi senyawa kimia seperti herbisida dan pestisida, senyawa organik dan senyawa yang mengandung logam berat. Salah satu genus bakteri, *Pseudomonas*, mengandung beberapa spesies yang dapat beradaptasi dengan lingkungan ini. Pada umumnya senyawa-senyawa tersebut di uraikan menjadi senyawa metabolit antara dan kemudian digunakan sebagai makanan. Salah satunya, "*oil eating bacteria*" sudah direkayasa secara genetik sehingga dapat menggunakan limbah minyak sebagai sumber makanan.

7.5. PENGGUNAAN DNA REKOMBINAN UNTUK PERTANIAN

Penggunaan yang baru dibidang pertanian adalah usaha untuk meningkatkan hasil tanaman dan hewan ternak dengan teknologi DNA rekombinan. Selain itu tanaman dan hewan ternak juga dapat digunakan untuk produksi protein rekombinan, atau dikenal dengan istilah "*molecular farming*".

Aplikasi untuk hewan ternak

Dua proses yang telah diteliti adalah: insersi gen dari hewan lain dan insersi gen manusia ke hewan ternak. Proses transfer gen ke mamalia tidak sama dengan pada prokariot dan relatif lebih sulit.

Misalkan kita sudah mengidentifikasi sapi yang secara genetik resistan terhadap mastitis, yaitu bakteri yang menginfeksi sel kelenjar susu, dan kita ingin memindahkan gen resistan mastitis ini ke sapi lain. Pertama kita harus mengidentifikasi gen tersebut dan mengkloninya menggunakan prosedur standar. Kemudian gen tersebut harus ditransfer ke sapi lain. Supaya gen itu diturunkan ke anak, maka cara yang paling masuk akal adalah mentransfer gen tersebut ke sel telur atau sel sperma. Karena sel telur yang sudah dibuahi akan memproduksi setiap sel dalam organisme, maka telur yang membawa gen asing tersebut akan menghasilkan anak dimana setiap sel mengandung gen tersebut. Konstruksi hewan transgenik ini dilakukan dengan memanipulasi embrio diluar tubuh sapi. Gen asing disisipkan melalui proses mikroinjeksi menggunakan jarum yang sangat halus. Didalam sel DNA akan bergabung dengan kromosom. Setelah mikroinjeksi, telur dibuahi *in vitro* dan kemudian di inplantasikan ke sapi. Karena telur yang telah dibuahi mengandung DNA asing, maka setiap sel yang berkembang biak selama perkembangan embrio akan mengandung DNA asing. Asumsikan juga gen asing tersebut diekspresikan dan berfungsi dengan tepat, maka sapi transgenik tersebut akan resistan terhadap mastitis.

Teknologi DNA rekombinan dapat digunakan untuk meningkatkan produksi ternak dan tanaman dengan cara yang tidak mungkin dilakukan secara tradisional. Hasil juga dapat diperoleh dengan cepat karena perubahan yang terjadi lebih terarah. Namun perubahan pada satu gen dapat mempengaruhi banyak keturunan. Proses yang sederhana kadang dapat menjadi rumit karena adanya efek genetik yang tidak kita mengerti seluruhnya.

Hewan ternak juga dapat dimanfaatkan oleh industri bioteknologi melalui cara lain. Salah satu kesulitan ekspresi gen eukariot pada prokariot adalah produk gen eukariot pada umumnya mengalami modifikasi pasca translasi, contohnya penambahan gugus karbohidrat pada protein. Sel prokariot tidak dapat

melakukan proses ini, sehingga inang lain harus digunakan untuk mendapatkan produk yang dimodifikasi. Pada beberapa kasus, tidak ada organisme disamping mamalia yang dapat melakukan modifikasi yang dibutuhkan untuk sintesis protein manusia. Sebagai contoh adalah faktor IX, protein yang ditemukan dalam darah mamalia yang terlibat pada pembekuan darah dan umumnya tidak terdapat pada penderita hemofili.

Gen pengkode protein ini digunakan untuk mengkonstruksi sapi transgenik, namun ekspresinya tidak dikontrol oleh promotornya sendiri, namun oleh promotor untuk protein yang membantu produksi susu sapi. Promotor ini hanya akan aktif pada sel-sel di kelenjar susu. Bila sapi transgenik dapat diperoleh dengan teknik ini, maka protein faktor IX akan terdapat didalam susu sapi.

Sekresi protein oleh kelenjar susu sapi ini mempunyai beberapa keuntungan disamping mengalami modifikasi yang tepat, yaitu: (1) karena sapi memproduksi susu dalam jumlah besar, maka sekresi protein juga akan melimpah. Sehingga kelenjar susu akan menjadi bioreaktor untuk memproduksi produk farmasi. (2) protein faktor IX akan disekresikan dalam bentuk yang mudah untuk dimurnikan. Karena terdapat beberapa jenis protein yang berbeda dalam susu, proses pemisahan dan purifikasi akan berkurang. Sejumlah binatang "pabrik" ini telah digunakan pada saat ini, dan beberapa masih dalam perencanaan.

Aplikasi untuk tumbuhan dan bakteri

Gen dapat dimasukkan kedalam tanaman melalui plasmid yang dibawa oleh *Agrobacterium tumifaciens*, yang merupakan patogen tanaman dan menyebabkan kondisi seperti kanker pada sejumlah tanaman. Pertumbuhan tumor pada tanaman disebabkan oleh Ti (*tumor-inducing*) plasmid yang dapat berintegrasi ke kromosom tumbuhan.

Gen yang akan dikloning dapat diinsersikan ke plasmid Ti pada daerah tertentu. Insersi ini akan menghentikan plasmid menginduksi tumor. Plasmid ini kemudian dimasukkan kembali ke *A. tumifaciens*, dan bakteri dibiarkan menginfeksi sel tumbuhan yang ditumbuhkan pada kultur jaringan. Setelah didalam sel tumbuhan,

gen yang diinsersikan bersama keseluruhan plasmid Ti akan terintegrasi ke kromosom tanaman. Selanjutnya setiap sel anak akan mengandung gen asing tersebut. Akhirnya, sel dari kultur jaringan itu ditumbuhkan untuk memproduksi tanaman utuh, dan masing-masing sel dari tanaman mengandung gen asing tersebut. Ketika tumbuhan menghasilkan biji, setiap biji akan membawa gen ini.



8

TERAPI GEN

Salah satu aplikasi kloning dalam bidang kedokteran adalah terapi gen. Terapi ini bertujuan untuk mengobati penyakit genetik dengan memberikan fragmen asam nukleat tertentu, seringkali berupa DNA pada penderita penyakit genetik. Terapi gen telah dilakukan dengan sukses pada hewan dan percobaan klinik pada manusia telah disetujui oleh Food and Drug Administration (FDA).

Hingga kini kira-kira ada 5000 penyakit bawaan pada manusia yang telah diketahui.¹ Akan tetapi dari semua penyakit bawaan tersebut hanya sedikit sekali yang dapat diobati. Pada penyakit bawaan ini didapatkan adanya defisiensi produk gen tertentu. Kekurangan produk gen tertentu tersebut umumnya tidak dapat digantikan dengan material yang sama yang berasal dari luar tubuh. Hanya sedikit yang dapat digantikan dengan material dari luar tubuh, misalnya pemberian insulin pada penderita diabetes.

Defisiensi enzim¹ yang disebabkan oleh adanya defek pada gen umumnya tidak dapat digantikan dengan enzim dari luar tubuh karena (1) enzim merupakan senyawaan kimia yang tidak stabil dan mudah rusak; (2) tidak dapat dimasukkan kedalam tubuh ke lokasi kerjanya dalam bentuk aktif; (3) membran sel bersifat impermeabel terhadap molekul-molekul besar termasuk enzim.

Pengobatan penyakit herediter umumnya terbatas hanya pada penyakit herediter yang menyebabkan hilang atau kurangnya metabolit tertentu yang mempunyai molekul yang kecil yang didistribusikan ke jaringan tubuh tertentu melalui sirkulasi darah. Disamping itu pengobatan penyakit herediter yang menyebabkan terjadinya defek pada enzim juga dilakukan dengan mengontrol makanan.

Salah satu metoda pengobatan untuk mengatasi penyakit herediter adalah menggunakan terapi gen (*gene therapy*).^{1,2,3,4} Persetujuan prosedur terapi gen masih sangat sulit dan berliku serta kontroversial.

Aspek biologi terapi gen pada manusia sangat kompleks dan masih membutuhkan banyak teknik yang hingga kini masih terus dikembangkan.

8.1. DEFINISI & PRINSIP TERAPI GEN

Terapi gen (*Gene therapy*)^{1,2,3,4} adalah suatu proses terapi untuk mengobati penyakit tertentu dengan cara menginsersikan gen yang telah diperbaiki atau gen tertentu kedalam genom sel-sel atau jaringan individu untuk menggantikan gen yang abnormal yang menyebabkan terjadinya penyakit tersebut.

Ada beberapa prinsip yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak

1. Insersi gen yang normal pada lokasi yang tidak spesifik di dalam genom untuk menggantikan gen yang tidak berfungsi. Prinsip ini merupakan pendekatan umum yang paling sering digunakan.
2. Gen yang tidak normal dihilangkan dari genom individu dan digantikan oleh gen yang normal menggunakan cara *homologous recombination*.
3. Gen yang tidak normal dapat diperbaiki melalui cara *selective reverse mutation*.
4. Mengubah regulasi (pengaturan) gen tertentu.

8.2. JENIS TERAPI GEN

Terapi gen dibedakan atas 2 jenis yaitu

1. Terapi gen sel somatik (*somatic-cell gene therapy*) atau *gene therapy non heritable*.
Pada terapi gen sel somatik, gen yang normal atau telah dimodifikasi ditransfer ke dalam sel-sel somatik pasien. Terapi gen ini hanya dapat mengatasi penyakit atau kelainan pada pasien yang bersangkutan. Gen yang telah diperbaiki atau dimodifikasi ini tidak dapat diturunkan kepada generasi

selanjutnya, karena gen yang telah diperbaiki ini hanya ada pada sel-sel somatik saja dan tidak ada pada sel-sel germinal.

Terapi gen somatik (somatic cell gene therapy) mirip dengan transplantasi sel, jaringan atau organ. Pada transplantasi organ ketubuh resipien, organ yang ditransplantasikan itu mengandung gen-gen yang berbeda dengan pasien. Pada terapi gen ini beberapa sel pasien diambil, diperbaiki diperbaiki gennya dan kemudian dikembalikan ke pasiennya. Hal ini menyebabkan terapi gen sel somatik tidak serumit dan tidak seberbahaya transplantasi organ.

2. Terapi gen sel germinal (Germ line /hereditary gene therapy)
Pada terapi gen sel germinal, gen yang mengalami defek pada sel-sel germinal akan diperbaiki dengan cara menginsersikan dan mengintegrasikan gen yang normal atau gen yang telah dimodifikasi kedalam genom sel-sel germinal. Gen yang telah diinsersikan ini kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya. Terapi gen sel germinal sangat bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit genetik dan penyakit-penyakit yang bersifat hereditas. Akan tetapi terapi gen sel germinal hingga kini masih sulit dilakukan karena alasan teknis dan etik. Bila gen yang mengalami defek pada sel-sel germinal ini diperbaiki dan diturunkan berarti kita telah mengubah genetik seseorang. Hal inilah yang menjadi kendala untuk melakukan terapi gen sel germinal

8.3. METODA TERAPI GEN

Metoda terapi gen dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu

1. transfer gen yang telah dimodifikasi atau gen normal kedalam sel-sel sasaran pada pasien dengan menggunakan vektor biologi yaitu virus.
2. transfer gen yang telah dimodifikasi atau gen yang normal kedalam sel-sel sasaran pada pasien dengan menggunakan cara

non virus. Beberapa cara non virus yang dapat digunakan adalah Naked DNA, Oligonucleotides, lipoplexes dan polyplexes, hibrid methods, dendrimers.

Transfer gen menggunakan vektor biologis

Vektor biologi yang digunakan untuk membawa gen yang telah diperbaiki adalah virus yang susunan genetiknya telah diubah sehingga dapat membawa gen manusia yang normal. Virus-virus ini akan membawa gen yang telah diperbaiki kedalam sel-sel sasaran pada tubuh manusia dengan cara tertentu dan kemudian berintegrasi pada genom tertentu.⁴ Untuk mencapai tujuan ini gen-gen pada virus yang dapat menyebabkan penyakit harus dihilangkan dan diganti dengan gen-gen yang telah diperbaiki. Sebagai contoh virus A diketahui dapat berreplikasi atau memperbanyak diri dengan cara menginsersikan gen-gen nya kedalam genom sel-sel host. Virus ini mempunyai 2 jenis gene yaitu gen A dan gene B. Gen A adalah gen yang mengkode protein yang berguna untuk menginsersikan gen-gen nya kedalam genom sel host (inang). Sebaliknya gen B adalah gen yang menyebabkan timbulnya penyakit pada host. Gen C adalah gen yang telah diperbaiki dan akan menggantikan gen B. Dengan dilakukannya reengineering sedemikian rupa sehingga gen C dapat menggantikan gen B. Dengan demikian gen A tetap dipertahankan untuk menjalankan fungsinya.

Adenovirus merupakan virus generasi pertama yang digunakan dalam terapi gen dan sangat efektif sebagai vektor pembawa transgen.^{2,4} Virus lain yang dapat digunakan dalam terapi gen adalah retrovirus, adeno-associated viruses, virus herpes simplex dan lain-lainnya termasuk virus penyebab HIV.^{2,4} 2 jenis virus yang banyak digunakan sebagai vektor adalah

A. Retrovirus.

Materi genetik pada virus ini adalah dalam bentuk RNA, sebaliknya materi genetik pada sel-sel tubuh sasaran adalah dalam bentuk DNA. Ketika retrovirus menginfeksi sel sasaran (host), selain memasukkan RNA-nya, ia juga akan memasukkan enzim reverse transcriptase dan integrase kedalam sel sasaran tersebut. RNA ini kemudian akan diubah menjadi DNA melalui proses *reverse*

transcription menggunakan enzim reverse transcriptase. DNA kemudian akan ditransfer ke dalam inti sel sasaran dan kemudian akan berintegrasi pada tempat tertentu di genom sel sasaran dengan bantuan enzim integrase. Setelah DNA yang telah diperbaiki ini terintegrasi pada tempat tertentu di genom sel sasaran maka dikatakan bahwa genom sel-sel sasaran (host) ini telah dimodifikasi

Salah satu masalah yang dapat terjadi pada terapi gen menggunakan retrovirus adalah enzim integrase dapat menginsersikan materi genetik virus pada tempat yang kurang sesuai misalnya pada bagian tengah gen-gen endogen pada host, sehingga gen endogen ini tidak dapat berfungsi, dikenal sebagai insertional mutagenesis. Bila gen-gen virus ini berinsersi pada gen pengatur fungsi gen lainnya, maka proses pembelahan sel dapat tidak terkontrol dan berubah menjadi sel kanker. Hal ini sekarang dapat diatasi dengan menggunakan enzim Zinc finger nucleases.⁵ Keuntungan menggunakan retrovirus adalah transgen yang dimasukkan bisa ditransmisikan ke semua sel yang terinfeksi dan turunannya, tetapi kerugiannya dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik yang berbahaya selama tahap pengintegrasian.

B. Adenovirus

Ketika virus adenovirus meninfeksi sebuah sel inang, molekul DNA virus tersebut akan dimasukkan ke dalam sel inang tersebut. Materi genetik adenovirus tidak bersatu dengan materi genetik sel inang. Molekul DNA virus terletak bebas dalam inti sel dan proses transkripsinya berlangsung secara sendiri. Molekul DNA virus tidak ikut berreplikasi ketika sel mengalami pembelahan sehingga sel-sel inang hasil pembelahan tidak mengandung DNA virus. Akibatnya pada terapi gen menggunakan vektor adenovirus membutuhkan pemasukkan kembali gen-gen yang sudah dimodifikasi ke dalam populasi sel yang baru. Sebaliknya keadaan ini akan mencegah terjadinya kanker. Gendicine adalah adenovirus yang telah mengandung gen p53 yang digunakan pada terapi gen untuk mengobati penyakit kanker pada kepala dan leher. Gendicine sudah diizinkan oleh FDA China untuk digunakan pada manusia pada tahun 2003, sementara itu FDA Amerika Serikat telah menyetujui advexin, suatu vektor yang serupa dengan Gendicine untuk digunakan di Amerika Serikat pada tahun 2008.

Transfer gen menggunakan cara non virus

Disamping menggunakan cara transfer gen yang diperantarai oleh virus (virus-mediated gene-delivery systems), ada beberapa metoda lain tanpa menggunakan virus. Metoda non virus ini mempunyai keuntungan yaitu dapat diproduksi dalam jumlah besar dan immunogenisitas pada sel inang yang rendah. Beberapa metoda non virus yang dapat digunakan adalah

1. Naked DNA
Metoda ini merupakan metoda transfeksi non virus yang sangat sederhana. Penelitian klinik dengan cara menyuntikan naked DNA secara intramuskular menunjukkan sebagian hasil yang sukses dan sebagian lagi mengalami kegagalan. Ekspresi gen pada metoda transfeksi ini sangat rendah dibandingkan dengan cara transfeksi lainnya.
2. Oligonukleotida
Oligonukleotida sintetik digunakan untuk menginaktifkan gen-gen yang terlibat dalam proses penyakit. Beberapa metoda yang dapat digunakan antara lain adalah
 - a. Menggunakan antisense yang spesifik untuk gen sasaran yang akan mengganggu proses transkripsi gen sasaran yang rusak.
 - b. Menggunakan oligonukleotida rantai ganda (double strand oligonucleotide) yang akan mengikat faktor-faktor transkripsi yang diperlukan untuk regulasi promoter gen sasaran.
3. Lipoplexes and polyplexes
Untuk meningkatkan kualitas pengangkutan DNA yang baru ke dalam sel, DNA tersebut harus dilindungi dari kerusakan dan pemasukkannya ke dalam sel harus difasilitasi. Untuk memfasilitasi pemasukan gen ke dalam sel dapat digunakan molekul lipid yang dikenal sebagai lipoplexes dan polyplexes yang dirancang untuk melindungi DNA dari proses degradasi selama proses transfeksi. Molekul lipid ini digunakan untuk membungkus plasmid yang mengandung DNA dalam bentuk seperti micelle atau liposome. Lipoplexes atau polyplexes yang

telah mengandung DNA dikenal sebagai lipoplex. Lipoplex akan berinteraksi dengan membran sel dan masuk ke dalam secara endositosis. Endosome yang mengandung lipoplex ini kemudian akan lisis dan transgen yang ada di dalamnya akan dikeluarkan ke dalam sitoplasma sel untuk kemudian akan masuk ke dalam inti sel

4. Metoda Hibrid (Hybrid method)
Untuk meningkatkan efisiensi transfer transgen dikembangkan metoda hibrid (campuran) yaitu kombinasi liposome dengan virus influenza atau HIV yang diinaktifkan.

8.3. HAMBATAN DALAM TERAPI GEN

Ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas penggunaan terapi gen dalam mengatasi penyakit-penyakit genetik yaitu

1. Masa hidup alami terapi gen yang pendek (Short-lived nature of gene therapy). Agar terapi gen menjadi efektif, gen yang dimasukkan ke dalam sel-sel target harus dapat berfungsi dan sel-sel yang mengandung gen terapi ini harus dapat hidup lama dan stabil.
2. Respons Imunologik. Adanya stimulus tertentu yang merangsang timbulnya respons imunologik yang dapat menurunkan efektivitas terapi gen tentu sangat merugikan. Lebih jauh adanya respon imunologik ini juga akan menyulitkan pengulangan terapi gen pada pasien.
3. Masalah dengan virus yang berfungsi sebagai vektor. Beberapa masalah yang harus dipertimbangkan pada penggunaan virus sebagai kendaraan pembawa gen yang telah diperbaiki adalah toksisitas, reaksi imunologik dan inflamasi, kontrol gen dan jaringan sasaran. Ketakutan lainnya adalah kemungkinan pulihnya kembali kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit pada manusia

4. Kelainan gen yang multipel. Terapi gen sulit digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh adanya kombinasi gen-gen yang mengalami kerusakan, misalnya pada penyakit jantung, tekanan darah tinggi, Alzheimer, artritis dan diabetes.
5. Potensi untuk timbulnya tumor.
Bila DNA diintergrasikan pada tempat yang salah di dalam genom, misalnya pada daerah tumor suppressor gene, hal ini dapat menyebabkan timbulnya tumor. Hal ini pernah terjadi pada percobaan klinis pada pasien dengan X-linked severe combined immunodeficiency (X-SCID) yang diterapi dengan sel punca darah (Hematopoietic stem cells yang diinfeksi oleh retrovirus yang mengandung transgen. Tiga dari 20 pasien yang diterapi dengan cara ini kemudian menderita leukemia.

8.4. PRASYARAT TERAPI GEN

Untuk melakukan terapi gen ada persyaratan yang harus dipenuhi yang dikembangkan oleh National Institute of Health (NIH). Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar prosedur terapi gen dapat diizinkan adalah

1. Gen harus diklon dan diketahui karakteristiknya, sehingga harus tersedia dalam bentuk murni.
2. Harus ada metoda efektif yang digunakan untuk memasukkan transgen ke dalam jaringan atau sel yang dituju
3. Resiko terapi gen harus dievaluasi secara berhati-hati dan dibuat seminimal mungkin
4. Penyakit tidak dapat diobati dengan cara lainnya.
5. Harus ada data penelitian pendahuluan dengan hewan model atau sel manusia dan hasilnya menunjukkan bahwa usulan terapi gen tersebut adalah efektif.

8.5. CONTOH TERAPI GEN

Terapi gen pada manusia pertama kali dilakukan tahun 1990 pada seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang menderita penyakit "Adenosine deaminase-deficient severe combined immunodeficiency disease (ADA-SCID). SCID merupakan penyakit autosomal yang jarang terjadi yang mengenai system imun. Penderita penyakit ini tidak mempunyai sistem imun sehingga infeksi yang ringan sekalipun dapat mengakibatkan gangguan yang serius dan sering berakhir fatal. Beberapa penderita mengalami defisiensi enzim adenosine deaminase (ADA).

Ketiadaan enzim ini menyebabkan kadar deoxyadenosine yang terfosforilasi meningkat mencapai tingkat toksik dan terakumulasi dalam limfosit T yang pada akhirnya akan membunuh sel limfosit. Limfosit T akan menstimulasi limfosit B yang akan berkembang menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi.

Langkah-langkah terapi gen yang dilakukan terdiri atas

1. pertama kali dirancang konstruksi gen dengan cara memasukkan gen ADA ke vektor DNA dengan promotor yang kuat.
2. Vector yang mengandung gen ADA ini kemudian diintegrasikan ke dalam virus retrovirus.
3. Sel darah putih diisolasi dari darah penderita
4. Sel darah putih ini kemudian diinfeksi dengan virus yang mengandung gen ADA
5. Sel darah putih yang telah terinfeksi virus ini kemudian dikembangkan didalam media kultur dan diidentifikasi sel-sel darah putih yang mengandung transgen.
6. Sel darah putih yang mengekspresikan gen ADA kemudian diinfuskan kedalam sirkulasi sistemik
7. Sel-sel darah putih ini kemudian menghasilkan produk gen ADA yang akan memperbaiki sistem imun penderita selama waktu tertentu dan terapi ini harus diulang kembali secara periodik.

Untuk mengatasi keterbatasan lifespan sel darah putih yang pendek, dapat digunakan sel punca (stem cells) sumsum tulang yang merupakan sel induk sel darah putih. Stem cells yang telah dimodifikasi

ini akan menghasilkan sel-sel limfosit T yang mengandung transgen ADA secara terus menerus.

Contoh penggunaan adenovirus dalam terapi gen adalah terapi gen yang dipakai untuk mengobati cystic fibrosis (CF). Pada terapi gen ini virus adenovirus yang membawa gen CF diinhalasi oleh pasien, dengan harapan sel-sel paru akan terinfeksi dan mensintesa produk gen CF untuk mengatasi simptom dan gejala penyakit. Akan tetapi kuatnya reaksi imunologik tubuh menyebabkan terapi gen menjadi tidak efektif. Sel-sel yang terinfeksi virus dan mengandung transgen akan mati dan tidak bisa memperbanyak diri sehingga mengakibatkan ekspresikan gen akan menurun. Untuk ini transgen lebih baik bila dibawa oleh virus retrovirus.



9

Rekayasa Genetik bidang Peternakan

Menurut Sudrajat (2003) aplikasi bioteknologi peternakan dilakukan pada tiga bidang utama, yaitu bioteknologi reproduksi (inseminasi buatan, transfer embrio dan rekayasa genetik), bioteknologi pakan ternak dan bioteknologi bidang kesehatan hewan. Bioteknologi peternakan dapat digunakan mempercepat pembangunan peternakan melalui peningkatan daya reproduksi dan mutu genetik ternak, perbaikan kualitas pakan dan kualitas kesehatan ternak

Bioteknologi adalah penggunaan biokimia, mikrobiologi, dan rekayasa genetika secara terpadu, untuk menghasilkan barang atau lainnya bagi kepentingan manusia. Biokimia mempelajari struktur kimiawi organisme. Rekayasa genetika adalah aplikasi genetik dengan mentransplantasi gen dari satu organisme ke organisme lain.

Ciri utama bioteknologi:

1. Adanya Benda biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan
2. Adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri
3. Produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian

Obyek rekayasa genetika mencakup hampir semua golongan organisme, mulai dari bakteri, fungi, hewan tingkat rendah, hewan tingkat tinggi, hingga tumbuh-tumbuhan. Bidang kedokteran dan farmasi paling banyak berinvestasi di bidang yang relatif baru ini. Sementara itu bidang lain, seperti ilmu pangan, kedokteran hewan, pertanian (termasuk peternakan dan perikanan), serta teknik lingkungan juga telah melibatkan ilmu ini untuk mengembangkan bidang masing-masing.

Teknologi Rekayasa Genetika merupakan inti dari bioteknologi didefinisikan sebagai teknik in-vitro asam nukleat, termasuk DNA rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam sel atau organel; atau fusi sel di luar keluarga taksonomi; yang dapat menembus rintangan reproduksi dan rekombinasi alami, dan bukan teknik yang digunakan dalam pemuliaan dan seleksi tradisional.

Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA (gen) atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima dapat berasal dari organisme apa saja.

Dampak produk rekayasa genetika bagi kesehatan manusia tidak perlu dikhawatirkan sepanjang jenis produk yang dilepas ke masyarakat telah memenuhi Protokol Cartagena dan terlebih dulu melalui proses pemeriksaan keamanan pangan dan lingkungan. Hal yang sering dikhawatirkan para ilmuwan bioteknologi adalah keikutan gen marker (biasanya gen tahan antibiotika) terselip ke dalam khromosom organisme penerima, sehingga jika makan produk tersebut kita juga akan memakan zat tahan antibiotika. Tentang hal ini telah ada teknologi untuk menghilangkan gen tersebut agar tidak ikut terselip ke organisme penerima. Di samping itu konsentrasi zat ini tidak tinggi untuk ukuran manusia. Kekhawatiran juga muncul terhadap adanya gene flow yaitu menyebarnya gen baru yang diselipkan pada organisme penerima kepada organisme lain yang sejenis di sekitarnya melalui proses penyerbukan atau kawin silang.

9.1. BIOTEKNOLOGI REPRODUKSI HEWAN

Bioteknologi reproduksi terus berkembang untuk meningkatkan konsistensi dan keamanan produk dari ternak yang berharga secara genetik dan menyelamatkan spesies langka. Bioteknologi reproduksi juga memudahkanantisipasi kemungkinan industri yang mengarah pada produk dengan sifat-sifat genetik bernilai ekonomis seperti pertumbuhan jaringan otot, produk rendah lemak, dan ketahanan terhadap penyakit.

1. Inseminasi Buatan dan Seksing Sperma

Program peningkatan produksi dan kualitas pada ternak berjalan lambat bila 13 proses reproduksi berjalan secara alamiah. Melalui rekayasa bioteknologi reproduksi, proses reproduksi dapat dimaksimalkan antara lain dengan teknologi IB (inseminasi buatan). Tujuan utama dari teknik IB ialah memaksimalkan potensi pejantan berkualitas unggul. Sperma dari satu pejantan berkualitas unggul dapat digunakan untuk beberapa ratus bahkan ribuan betina, meskipun sperma tersebut harus dikirim ke suatu tempat yang jauh.

Jenis kelamin anak pada ternak yang diprogram IB dapat ditentukan dengan memanfaatkan teknologi seksing sperma X dan sperma Y. Dewasa ini ada dua teknik yang umum dipakai untuk seksing sperma yaitu separasi albumin yang menghasilkan 75 sampai 80 persen sperma Y dan filtrasi *sephadex* yang menghasilkan 70 hingga 75 persen sperma X. Perubahan proporsi sperma X atau Y akan menyebabkan peluang untuk memperoleh anak dengan jenis kelamin yang diharapkan lebih besar. Seleksi gender pada hewan digunakan untuk beberapa tujuan diantaranya:

1. memproduksi lebih banyak anak betina dari induk superior untuk meningkatkan produksi susu, daging dan kulit.
2. menghasilkan lebih banyak anak jantan untuk produksi daging dari betina-betina yang telah diculling.
3. mencegah *intersex* pada kelahiran kembar (khususnya ternak sapi).

2. Transfer Embrio

TE (transfer embrio) merupakan teknologi yang memungkinkan induk betina unggul memproduksi anak dalam jumlah banyak tanpa harus bunting dan melahirkan. TE dapat mengoptimalkan bukan hanya potensi dari jantan saja tetapi potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada proses reproduksi alamiah, kemampuan betina untuk bunting hanya sekali dalam 1 tahun (9 bulan bunting ditambah persiapan untuk bunting berikutnya) dan hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 anak bila terjadi kembar. Menggunakan teknologi TE, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer (dititipkan) pada induk titipan (resipien) dengan kualitas genetik rata-rata tetapi mempunyai kemampuan untuk bunting.

3. Bayi Tabung

Kematian bukan lagi merupakan berakhirnya proses untuk melahirkan keturunan. Melalui teknik bayi tabung, sel telur yang berada di dalam ovarium betina berkualitas unggul sesaat setelah mati dapat diproses *in vitro* di luar tubuh sampai tahap embrional. Selanjutnya embrio tersebut ditransfer pada resipien sampai dihasilkan anak.

Secara alamiah sapi betina berkualitas unggul dapat menghasilkan sekitar tujuh ekor anak selama hidupnya. Jumlah tersebut

dapat berkurang atau menjadi nol bila ada gangguan fungsi reproduksi atau kematian karena penyakit. Untuk menyelamatkan keturunan dari betina berkualitas unggul tersebut, embrio dapat diproduksi dengan cara aspirasi sel telur pada hewan tersebut selama masih hidup atau sesaat setelah mati. Dari ovarium yang diperoleh di rumah potong hewan bisa diperoleh sekitar 20 sampai 30 sel telur untuk setiap ternak betina yang dipotong. Sel telur hasil aspirasi tersebut selanjutnya dimatangkan secara *in vitro*. Sel telur yang sudah matang diproses lebih lanjut untuk dilakukan proses fertilisasi secara *in vitro* dengan melakukan inkubasi selama lima jam mempergunakan semen beku dari pejantan berkualitas unggul. Sel telur yang dibuahi dikultur kembali untuk perkembangan lebih lanjut. Pada akhirnya embrio yang diperoleh akan dipanen dan dipindahkan rahim induk betina dan dibiarkan tumbuh sampai lahir.

4. Kriopreservasi Embrio

Kriopreservasi merupakan komponen bioteknologi yang memiliki peranan yang sangat besar dan menentukan kemajuan teknologi transfer embrio. Hal ini dikaitkan dengan kemampuannya dalam mempertahankan viabilitas embrio beku dalam waktu yang tidak terbatas sehingga sewaktu-waktu dapat ditransfer ketika betina resipien telah tersedia, serta dapat didistribusi ke berbagai tempat secara luas. Dengan kata lain, Kriopreservasi merupakan suatu proses penghentian sementara kegiatan metabolisme sel tanpa mematikan sel dimana proses hidup dapat berlanjut setelah kriopreservasi dihentikan. Metode kriopreservasi dapat dilakukan dengan dua cara yakni kriopreservasi secara bertahap dan kriopreservasi secara cepat (*vitrifikasi*).

Secara umum, mekanisme kriopreservasi merupakan perubahan bentuk fisik timbal balik dari fase cair ke padat dan kembali lagi ke fase cair. Mekanisme fisika kriopreservasi meliputi penurunan temperatur pada tekanan normal disertai dengan dehidrasi sampai tingkat tertentu dan mencapai temperatur jauh di bawah 0°C (-196 °C). Proses ini harus reversibel ke kondisi fisiologis awal. Tujuan kriopreservasi adalah mempertahankan sesempurna mungkin sifat-sifat material biologis terutama viabilitasnya.

5. Hewan Transgenik

Hewan transgenik merupakan satu alat riset biologi yang potensial dan sangat menarik karena menjadi model yang unik untuk mengungkap fenomena biologi yang spesifik (Pinkert, 1994). Sedangkan hewan transgenik menurut Federation of European Laboratory Animal Associations adalah hewan dimana dengan sengaja telah dimodifikasi genome-nya, gen disusun dari suatu organisme yang dapat mewarisi karakteristik tertentu. Dua alasan umum mengapa hewan transgenic tetap diproduksi :

- Beberapa hewan transgenic diproduksi untuk mempunyai sifat ekonomis spesifik. Contoh, ternak transgenic diciptakan untuk memproduksi susu yang mengandung protein khusus manusia, dimana mungkin dapat membantu dalam perawatan penyakit emphysema pada manusia (penyakit pembengkakan paru-paru karena pembuluh darah).
- Hewan transgenic lainnya diproduksi sebagai model penyakit (secara genetic hewan dimanipulasi untuk menunjukkan gejala penyakit sehingga perawatan efektif dapat dipelajari). Contoh, ilmuwan Harvard membuat terobosan besar secara ilmiah ketika mereka diterima sebuah paten U.S. untuk keahlian tikus secara genetic, dimana tikus membawa gen yang mengembangkan variasi kanker manusia.

Kemampuan untuk mengintroduksi gen-gen fungsional ke dalam hewan menjadi alat berharga untuk memecah proses dan sistem biologi yang kompleks. Transgenik mengatasi kekurangan praktek pembiakan satwa secara klasik yang membutuhkan waktu lama untuk modifikasi genetik. Aplikasi hewan transgenik melingkupi berbagai disiplin ilmu dan area riset diantaranya:

1. basis genetik penyakit hewan dan manusia, disain dan pengetesan terapinya;
2. resistensi penyakit pada hewan dan manusia;
3. terapi gen

Hewan transgenik merupakan model untuk pertumbuhan, immunologis, neurologis, reproduksi dan kelainan darah);

4. obat-obatan dan pengetesan produk;
5. pengembangan produk baru melalui “molecular farming”

Introduksi gen ke dalam hewan atau mikroorganisme dapat merubah sifat dari hewan atau organisme tersebut agar dapat menghasilkan produk tertentu yang diperlukan oleh manusia seperti factor IX dan hemoglobin manusia.

6. produksi peternakan

a) Ternak

Pemanfaatan teknologi transgenik memungkinkan diperolehnya ternak dengan karakteristik unggul (Pinkert, 1994; Prather *et al*, 2003). Petani selalu menggunakan peternakannya yang selektif untuk menghasilkan hewan yang sesuai dengan keinginan. Misalnya meningkatkan produksi susu, meningkatkan kecepatan pertumbuhan. Peternakan tradisional memakan waktu dan sulit memenuhi permintaan. Ketika teknologi menggunakan biologi molekuler untuk mengembangkan karakteristik hewan dengan waktu yang singkat dan tepat. Disamping itu, transgenik hewan menyediakan cara yang mudah untuk meningkatkan hasil.

b) Kualitas produksi

Sapi transgenic bisa memproduksi susu yang banyak dan rendah laktosa dan kolesterol, babi dan unggas menghasilkan daging yang lebih banyak, dan domba yang memiliki wool yang tebal. Di masa lampau, petani menggunakan hormone pertumbuhan untuk memacu perkembangan hewan tetapi teknik ini bermasalah, khususnya sejak residu hormone masih terkandung dalam produk.

c) Resistensi penyakit

Ilmuwan mencoba menghasilkan hewan yang resisten terhadap penyakit, seperti babi yang resisten terhadap influenza, tetapi jumlah gen yang berperan masih terbatas jumlahnya.

6. Aplikasi Kesehatan

a) Pasien yang meninggal tiap tahun karena butuh pengganti jantung, hati, atau ginjal. Contoh, sekitar 5000 organ dibutuhkan tiap tahun di UK. Babi transgenic menyediakan transpalantasi organ yang dibutuhkan untuk meredakan. Xenotransplantation adalah wadah yang diproduksi oleh protein babi yang dapat menyebabkan alergi pada penerima donor, tetapi bisa dihindarkan dengan mengganti protein babi dengan protein manusia.

b) Suplement nutrisi dan Obat-obatan

Produk seperti insulin, hormone pertumbuhan, factor anti penggumpalan darah mungkin terkandung dalam susu sapi, kambing, dan domba transgenic. Penelitian merupakan cara untuk menghasilkan susu melalui transgenesis untuk penyembuhan penyakit seperti

phenylketonuria (PKU), penyakit pembengkakan paru-paru yang menurun, dan penyakit kista.

Contoh : Pada tahun 1997, sapi transgenic pertama kali, memproduksi yang kaya akan protein 2,4 gr per liter. Susu sapi transgenic ini lebih bernutrisi daripada susu sapi biasa. Susu ini dapat diberikan pada bayi atau dan orang dewasa dengan gizi yang dibutuhkan dan mudah dicerna. Karena mengandung gen alpha-lactalbumin.

c) **Terapi Gen Manusia**

Terapi gen manusia meliputi penambahan copyan gen normal pada genome orang yang memiliki gen yang tidak normal. Perlakuan tersebut berpotensi pada 5000 penyakit genetic yang besar dan hewan transgenic. Contoh, salah satu institute di finladia memproduksi gen anak sapi mampu memacu pertumbuhan sel darah merah di manusia (Margawati,2009).

7. Aplikasi industri

Pada tahun 2001, 2ilmuwan di Canada menyambung gen laba-laba ke dalam sel penghasil susu kambing. Kambing mulai menghasilkan strand seperti serabut sutra saat pemerahan susu. Dengan mengekstrak polimer strand dari susu dan menenunnya menjadi benang, kemudian ilmuwan membuatnya menjadi mengkilat, keras, dan fleksibel dan diaplikasikan pada pembuatan kain, kasa steril, dan string raket tenis.

Hewan transgenic yang sensitive terhadap racun telah diproduksi untuk uji keamanan kimia. Mikroorganisme telah dirancang untuk memproduksi varietas protein yang dapat memproduksi enzim untuk mempercepat reaksi kimia pada industri.

8. Kualitas produk transgenic

Di masa yang akan datang hewan transgenic akan diproduksi dengan penyisipan gen pada lokasi yang spesifik dalam genom. Teknik ini telah terbukti berhasil pada mencit tetapi masih lintensif diteliti pada hewan-hewan besar.

Tabel 9.1 Contoh-contoh Locyt-Locyt Gen dan Aplikasi pada Ternak

Spesies	Gen	Aplikasi
Babi	α -1,3-galactosyl trasferase	Mencegah rejeksi hiperakut dalam xenotransplantasi

Babi, sapi	Fas, Fas-L	Menekan rejeksi yang dimediasi sel pada xenotransplantasi
Sapi	Menekan rejeksi yang dimediasi sel pada xenotransplantasi	Produksi serum labumin manusia dalam susu
Sapi	Milk casein	Meningkatkan produksi protein dan formula bayi
Semua	SRY dan penentu sex lainnya	Produksi daging dan susu yang lebih efisien
Semua	Growth/differentiation factor 8	Produksi daging yang lebih efisien

9. Kloning

Kloning adalah upaya multiplikasi hewan secara asexual yang menghasilkan turunan-turunan dengan komposisi genetik yang identik. Klon sapi dan kuda pertama kali diproduksi pembelahan embrio tahap blastosis umur 8-10 hari (jumlah sel embrio ± 64 sel). Dengan memakai teknik bedah mikro untuk memproduksi turunan-turunan bergenetik identik, para peneliti menemukan bahwa setiap sel embrio dapat tumbuh menjadi satu embrio utuh dengan jumlah sel ± 128 sel. Hal ini memungkinkan penggunaan inti sel embrio untuk memproduksi lusinan klon sapi dari satu embrio yang tumbuh.

Kemajuan teknologi ini berlangsung cepat, tetapi prosedur kerja membutuhkan teknik yang rumit dan efisiensi masih rendah. Untuk saat ini, kloning belum terbukti mampu menghasilkan ternak dalam jumlah besar secara ekonomis. Terobosan penting metode cloning hewan ditandai lahirnya “Dolly”, domba hasil kloning para peneliti Roslin Institute (Skotlandia). Sel-sel diperoleh dari kelenjar ambing domba betina dewasa dan dikultur di laboratorium. Sel hasil kultur tersebut selanjutnya digunakan sumber inti berisi material genetik

yang menggantikan inti sel telur domba setelah percobaan diulang 273 kali, diperoleh seekor domba hasil kloning (Wilmot et al, 1997). Produksi "Dolly" sangat signifikan karena: pertama, merupakan mamalia pertama yang diproduksi menggunakan material genetik yang berasal dari sel hewan dewasa. Kedua, memungkinkan pengembangan metode baru dan lebih efisien untuk memproduksi hewan transgenik yang mengandung gen sintetik manusia di dalamnya (Niswender, 2004). Menyusul keberhasilan Dolly, kloning berhasil dibuat pada berbagai hewan lain seperti sapi dan kuda. Penelitian tentang kloning ini berlanjut terus dan menjadi perhatian dari banyak peneliti di berbagai negara khususnya Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Skotlandia, dan Jepang.

Pengembangan kloning yang sangat menarik adalah pembuatan hewan transgenik. Embrio hasil kloning disisipi gen-gen tertentu (umumnya gen manusia) sehingga ternak kloning yang lahir memiliki sifat genetik baru yang bermanfaat. Hewan kloning transgenik pertama kali dihasilkan adalah "Moly" dan "Poly" yang juga diproduksi di Roslin Institute. Para peneliti berharap hewan kloning transgenik akan menghasilkan substansi kimia tertentu dalam jumlah besar (umumnya lewat air susu) untuk keperluan biomedis dan farmasi (Stice *et al.*, 1998).

Para peneliti saat ini telah membuat banyak kemajuan dalam metode kloning, dan diprediksi adanya kemungkinan produksi ratusan hingga ribuan individu yang identik secara genetik menggunakan teknologi ini (Han *et al.*, 2003; Wells *et al.*, 2003). Produksi ternak transgenik hasil kloning secara komersial sudah dirintis di beberapa negara (Faber *et al.*, 2003)

10. Kloning Terapeutik Dengan Teknik SCNT pada Domba Dolly

Teknologi SCNT meliputi suatu teknologi rekayasa terhadap sel telur, dengan cara mentransfer inti dari sel donor ke sel telur yang telah dikeluarkan intinya (enucleated oocyte). Kedua jenis kloning memiliki kegunaannya masing-masing. Kloning reproduktif berperan penting dalam pelestarian hewan-hewan langka yang hampir punah. Sedangkan, kloning terapeutik bertujuan untuk menghindari adanya reaksi penolakan terhadap sistem imun pasien dalam terapi sel punca (stem cell). Keberhasilan suatu penelitian yang menghasilkan sel punca embrionik monyet dengan teknik SCNT. Akhir-akhir ini membawa

dunia semakin dekat dengan produksi sel punca embrionik manusia dari sel somatik dewasa sehingga risiko penolakan terhadap sistem imun akan semakin berkurang.

Domba dolly yang berhasil diklon oleh Ian Wilmut pada tahun 1996. Domba Dolly merupakan salah satu contoh dari kloning reproduktif. Sebenarnya terdapat dua jenis kloning, yaitu kloning reproduktif dan kloning terapeutik. Kedua jenis kloning ini merupakan penerapan dari aplikasi teknologi Somatic Cell Nuclear Transfer atau SCNT.

11. TEKNIK SCNT

Perbedaan fertilisasi dengan SCNT:

Pada fertilisasi alami, setelah mengalami pembelahan meiosis, sel telur dan sel sperma memiliki materi genetik haploid (n). Terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma atau fertilisasi akan menghasilkan embrio satu sel yang memiliki materi genetik $2n$. Kemudian, embrio ini akan terus berkembang ke tahapan perkembangan selanjutnya menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya.

Teknik SCNT merupakan suatu teknik rekayasa sel telur dengan cara mentransfer inti dari sel donor ke dalam sel telur yang telah dikeluarkan intinya (enucleated oocyte). Enucleated oocyte tidak memiliki materi genetik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan embrio konstruksi yang diploid, sel telur harus direkonstruksi dengan cara mentransfer sel somatik ($2n$) ke dalam enucleated oocyte¹. Proses enukleasi sel telur dapat dilakukan secara mekanik menggunakan teknik mikromanipulasi. Sedangkan, proses introduksi sel donor dapat dilakukan dengan teknik mikroinjeksi. Keberadaan cytochalasin B (CB) pada medium kultur bertujuan untuk menghambat sitokinesis atau pembelahan sel sehingga dapat dihasilkan klon embrio diploid².

Aplikasi dari teknologi SCNT adalah pada penelitian kloning reproduktif dan juga kloning terapeutik. Pada perkembangan secara normal (A), zigot diploid terbentuk setelah terjadi fertilisasi. Kemudian, zigot akan membelah sampai terbentuk blastosit yang akan menempel pada dinding uterus sampai akhirnya berakhir pada proses melahirkan. Pada kloning reproduktif (B), sel donor yang berupa sel somatik ($2n$) diintroduksi ke enucleated oocyte. Keberhasilan proses aktivasi embrio konstruksi secara kimiawi atau mekanik mengakibatkan

terjadinya proses pembelahan sampai ke tahap blastosit. Kemudian, embrio "dititipkan" ke surrogate mother untuk dilahirkan secara normal. Sedangkan, pada kloning terapeutik (C), setelah embrio mencapai tahapan blastosit, embrio dikultur secara in vitro untuk didiferensiasikan menjadi berbagai jenis sel untuk kegunaan terapeutik.

Kloning reproduktif adalah suatu teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu (hewan) baru. Genetika hewan klon tidak seluruhnya memiliki kesamaan dengan sang induk¹. Dengan menggunakan teknik SCNT, persamaan genetika hewan klon dengan induknya hanya terletak pada inti DNA donor yang berada di kromosom. Hewan klon juga memiliki material genetik lainnya yang berasal dari DNA mitokondria di sitoplasma¹. Teknologi kloning reproduktif dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kepunahan hewan-hewan langka ataupun hewan-hewan sulit dikembangbiakkan. Namun, laju keberhasilan teknologi ini sangatlah rendah.

Parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam SCNT adalah kemampuan sitoplasma pada sel telur untuk mereprogram inti dari sel donor dan juga kemampuan sitoplasma untuk mencegah terjadinya perubahan-perubahan secara epigenetik selama dalam perkembangannya¹². Dari semua penelitian yang telah dipublikasikan, tercatat hanya sebagian kecil saja dari embrio hasil rekonstruksi (menggunakan sel somatik dewasa atau fetal) yang berkembang menjadi individu muda yang sehat, dan umumnya laju keberhasilannyakurang dari 4%.

SCNT merupakan bagian dari terapi sel punca yang bertujuan untuk menghindari Adanya reaksi penolakan terhadap system imun pasien pada saat dilakukan terapi. Dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap penelitian sel punca terus meningkat tajam. Sel punca memiliki potensi yang sangat menjanjikan untuk terapi berbagai penyakit sehingga menimbulkan harapan baru untuk mengobatinya. Sampai saat ini, ada 3 golongan penyakit yang dapat diatasi dengan penggunaan sel punca di antaranya adalah:

1. Penyakit autoimun, contoh penyakit lupus.
2. Penyakit d e g e n e r a tif, contoh stroke, Parkinson, Alzheimer.
3. Penyakit kanker, contoh leukemia.

Sel punca embrionik sangat plastis dan mudah dikembangkan menjadi berbagai macam jaringan sel, seperti neuron, kardiomyosit,

osteoblast, fibroblast, dan sebagainya. Oleh karena itu, sel punca embrionik dapat digunakan untuk transplantasi jaringan yang rusak¹⁴. Selain itu, sel punca embrionik memiliki tingkat imunogenisitas yang rendah selama belum mengalami diferensiasi .

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya graft versus host disease (GVHD) adalah dengan menggunakan sel punca embrionik dengan sel somatik yang bersumber dari pasien itu sendiri sehingga tidak akan ada penolakan lagi terhadap sistem imunnya. Dengan menggunakan teknologi SCNT, sel punca embrionik yang dihasilkan akan identik dengan induknya (dalam hal ini adalah pasien itu sendiri).

Hal itu mengakibatkan tidak akan adanya reaksi penolakan terhadap system imun pasien apabila dilakukan transplantasi. Secara teoritis, teknik SCNT memiliki potensi besar dalam dunia kesehatan karena dapat dipergunakan untuk transplantasi berbagai organ dan jaringan pada manusia. Secara singkat tahapan untuk melakukan kloning terapeutik pada manusia adalah mengambil biopsy sel somatik dari tubuh pasien dan inti dari sel somatic tersebut ditransfer ke dalam sel telur donor yang telah dikeluarkan intinya (unfertilized enucleated oocyte). Sel telur hasil manipulasi dikultur sampai ke tahapan tertentu dan setelah mengalami berbagai proses akan didapatkan sel punca embrionik. Sel punca embrionik ini diarahkan perkembangannya menjadi suatu jaringan atau organ tertentu yang akan dapat digunakan untuk transplantasi jaringan atau organ dan tidak akan mengalami rejeksi sistem imun pada pasien itu sendiri (immunologically compatible transplant).

12. Kultur Sel Hewan

Kultur sel hewan adalah sistem menumbuhkan sel manusia maupun hewan untuk tujuan memproduksi metabolit tertentu. Pada saat sekarang aplikasi dari system ini banyak digunakan untuk menghasilkan produk-produk farmasi dan kit diagnostik dengan kebanyakan jenis produk berupa molekul protein kompleks. Hal yang paling mendorong kearah aplikasi ini adalah karena biaya operasionalnya yang tinggi, terutama medium. Selain itu system metabolisme sel hewan tidak “seramai” pada system metabolisme sel tanaman. Sekalipun demikian ada aplikasi yang berhubungan tidak langsung dengan masalah pangan, misalnya: penetapan jenis kelamin dari embrio yang akan ditanam, penentuan masa ovulasi dari sapi dan

fertilisasi in vitro untuk hewan. Adapun contoh-contoh produk yang biasa dihasilkan oleh sel hewan misalnya: interferon, tissue plasminogen activator, erythropoetin, hepatitis B surface antigen.



10

Rekayasa Genetik di bidang Pertanian

10.1. Tanaman Transgenik dan Jenisnya

Apakah transgenik itu? Transgenik terdiri dari kata *trans* yang berarti pindah dan *gen* yang berarti pembawa sifat. Jadi transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya, atau dari gen hewan ke tanaman. Transgenik secara definisi adalah *the use of gene manipulation to permanently modify the cell or germ cells of organism* (penggunaan manipulasi gen untuk mengadakan perubahan yang tetap pada sel makhluk hidup).

Tujuan rekayasa genetika dan contohnya pada tanaman:

1. Menghambat pematangan dan pelunakan buah (Tomat)
2. Tahan terhadap serangan insektisida (Tomat, kentang, jagung)
3. Tahan terhadap serangan ulat (Kapas)
4. Tahan terhadap insekta dan virus (Kentang)
5. Tahan terhadap virus (Squash, Pepaya)
6. Tahan terhadap insekta dan herbisida (Jagung, Padi, Kapas dan Canola)
7. Toleran terhadap herbisida (Kedelai, Canola, Kapas, Jagung)
8. Perbaikan komposisi nilai gizi (Canola (high laurate oil), Kedelai (high oleid acid oil), Padi (high beta-carotene))

10.2. Contoh Tanaman yang telah Menggunakan Rekayasa Genetika

a. Kedelai Transgenik

Dengan rekayasa genetika, dihasilkan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, tahan terhadap herbisida dan memiliki kualitas hasil yang tinggi. Saat ini secara global telah dikomersialkan dua jenis

kedelai transgenik yaitu kedelai toleran herbisida dan kedelai dengan kandungan asam lemak tinggi

b. Jagung Transgenik

Di Amerika Serikat, komoditi jagung telah mengalami rekayasa genetika melalui teknologi rDNA, yaitu dengan memanfaatkan gen dari bakteri *Bacillus thuringiensis* (Bt) untuk menghindarkan diri dari serangan hama serangga yang disebut *corn borer* sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Gen *Bacillus thuringiensis* yang dipindahkan mampu memproduksi senyawa pestisida yang membunuh larva *corn borer* tersebut



Gambar 10.1 Jagung transgenik

c. Kapas Transgenik

Gen yang paling banyak digunakan adalah gen *cry* (gen toksin) dari *Bacillus thuringiensis*, gen-gen dari bakteri untuk sifat toleransi terhadap herbisida, gen yang menunda pematangan buah. Bagi para petani, keuntungan dengan menggunakan kapas transgenik adalah menekan penggunaan pestisida atau membersihkan gulma tanaman dengan herbisida secara efektif tanpa mematikan tanaman kapas. Serangga merupakan kendala utama pada produksi tanaman kapas. Di

samping dapat menurunkan produksi, serangan serangga hama dapat menurunkan kualitas kapas. Saat ini lebih dari 50 persen areal pertanaman kapas di Amerika merupakan kapas transgenik dan beberapa tahun ke depan seluruhnya sudah merupakan tanaman kapas transgenik.



Gambar 10.2 Kapas transgenik

d. Tomat Transgenik


Tomat transgenik memiliki suatu gen khusus yang disebut *antisenesescens* yang memperlambat proses pematangan (*ripening*) dengan cara memperlambat sintesis enzim poligalakturonase sehingga menunda pelunakan tomat. Dengan mengurangi produksi enzim poligalakturonase akan dapat diperbaiki sifat-sifat pemrosesan tomat. Varietas baru tersebut dibiarkan matang di bagian batang tanamannya untuk waktu yang lebih lama sebelum dipanen. Bila dibandingkan dengan generasi tomat sebelumnya, tomat jenis baru telah mengalami perubahan genetika, tahan terhadap penanganan dan ditransportasi lebih baik, dan kemungkinan pecah atau rusak selama pemrosesan lebih sedikit.



Gambar 10.3 Tomat transgenik


F. Buah tanpa biji

Tren baru dalam budi daya buah-buahan adalah menghasilkan buah tanpa biji (*seedless*), terutama untuk buah yang harganya mahal seperti anggur, jeruk, dan durian. Selain meningkatkan daya tarik konsumen, harga buah tanpa biji juga lebih mahal. Secara alami, biji sebenarnya diperlukan tanaman untuk berkembang biak, terutama bagi tanaman yang tidak bisa diperbanyak secara vegetatif. Biji biasanya terlindung di dalam buah.



Gambar 10.4 Anggur transgenik

Biji merupakan sumber hormon (auksin) yang diperlukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan buah. Namun, pada beberapa jenis buah-buahan, biji terkadang mengganggu dan tidak diinginkan karena merepotkan pada saat buah dikonsumsi.



Gambar 10.5 Semangka transgenik

Kontra

- secara ekonomi: Tanaman transgenik diperkirakan berbahaya, di beberapa Negara telah mengatur dan menolak produk transgenik, sehingga menutup pasar ekspor transgenik
 - Produk bebas transgenik memperoleh harga yang lebih baik di pasaran internasional
 - Perusahaan transgenik memonopoli sistem produksi pangan
 - Perubahan pasar internasional atas produk minyak tangeran
- Dari segi konsumen:
 - Keracunan makanan transgenik
 - Berisiko kanker
 - Alergi terhadap makanan
 - Rusaknya kandungan gizi dan kualitas makanan
 - Kekebalan bibit penyakit terhadap antibiotik

Dari segi pertanian:

- Hasil panen lebih rendah
- Biaya produksi lebih tinggi

- Memicu pertanian monokultur yang tidak berkelanjutan
- Hilangnya varietas lokal
- Peningkatan penggunaan bahan kimia pertanian

Dari segi lingkungan:

- Polusi genetika
- Hilangnya keanekaragaman hayati
- Virus tanaman baru yang lebih berbahaya
- Dampak negative pada ekologi tanah
- Gulma super
- Hama super

Keuntungan buah tanpa biji yaitu lebih mudah dalam mengkonsumsinya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

10.3. Keunggulan Tanaman Rekayasa Genetika (*Genetically Modified Organism*)

Berbagai keunggulan dari tanaman yang diperoleh dengan teknik rekayasa genetika adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan jenis tanaman baru yang tahan terhadap kondisi pertumbuhan yang keras seperti lahan kering, lahan yang berkadar garam tinggi dan suhu lingkungan yang ekstrem.
2. Toleran terhadap herbisida yang ramah lingkungan yang dapat mengganggu gulma, tetapi tidak mengganggu tanaman itu sendiri. Contoh kedelai yang tahan herbisida dapat mempertahankan kondisi bebas gulamnya hanya dengan separuh dari jumlah herbisida yang digunakan secara normal

3. Meningkatkan sifat-sifat fungsional yang dikehendaki, seperti mereduksi sifat atau daya alergi (toksisitas), menghambat pematangan buah, kadar pati yang lebih tinggi serta daya simpan yang lebih panjang. Misalnya, kentang yang telah mengalami teknologi rDNA, kadar patinya menjadi lebih tinggi sehingga akan menyerap sedikit minyak bila goreng (*deep fried*). Dengan demikian akan menghasilkan kentang goreng dengan kadar lemak yang lebih rendah.
4. Sifat-sifat yang lebih dikehendaki, misalnya kadar protein atau lemak dan meningkatnya kadar fitokimia dan kandungan gizi.

Penggunaan rekayasa genetika khususnya pada tanaman tidak terlepas dari pro kontra mengenai penggunaan teknologi tersebut. Berikut ini disebutkan berbagai pandangan yang setuju terhadap tanaman transgenik :

1. Tanaman transgenik memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding dengan tanaman konvensional.
2. Teknik rekayasa genetika sama dengan pemuliaan tanaman yaitu memperbaiki sifat-sifat tanaman dengan menambah sifat-sifat ketahanan terhadap cengkeraman hama maupun lingkungan yang kurang menguntungkan.
3. Mengurangi dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Selain pandangan yang setuju terhadap tanaman transgenik ada juga pandangan-pandangan yang tidak setuju atau kontra terhadap tanaman transgenik, berikut alasan-alasannya:

1. Pengaruh pada kesehatan manusia
2. Pengaruh pada lingkungan (ekologis)
3. Pengaruh etika dan agama
4. Pengaruh terhadap ekonomi global

11

Tinjauan Rekayasa Genetik dalam Perspektif Islam

Hukum kloning pada hewan dan tumbuhan masih diperbolehkan selama benar-benar digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Teknik kloning di sini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas hewan dan tumbuhan yang dikonsumsi manusia. Dengan kata lain, juga merupakan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia itu sendiri. Adapun Hadis yang dikeluarkan oleh Abdul Razzaq di dalam kitab Jami'nya, adalah sebagai berikut:

وعلى العامل عند الإطلاق ما يحتاجه الثمر مما يتكرر كل سنة كسقي وتنقية نهر وإصلاح أحاجين وتلقيح للنحل وهو وضع طلع ذكر في طلع أنثى (/)

Artinya: “Dan bagi pekerja, maka ia diperbolehkan untuk melakukan apapun yang diperlukan oleh buah yang berulang-ulang setiap tahun, seperti pengairan, penjernihan sungai, perbaikan peralatan pertanian yang rusak, dan mengawinkan kurma, yakni meletakkan tepung sari jantan ke tepung sari betina.”^[12]

فإن تناسل الحيوان مطلوب لذاته لمصالح العبد. (الجمال شرح المنهج /)
Artinya: “Sesungguhnya reproduksi hewan itu memang dicari bagi kemaslahatan manusia.”^[13]

Kloning pada manusia haram menurut hukum Islam dan tidak boleh dilakukan. Dalil-dalil keharamannya adalah sebagai berikut :

1. Anak-anak produk proses Kloning tersebut dihasilkan melalui cara yang tidak alami. Padahal justru cara alami itulah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia dan dijadikan-Nya sebagai sunnatullah untuk menghasilkan anak-anak dan keturunan. Allah SWT berfirman :

“Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dari air mani apabila dipancarkan.” (QS. An Najm : 45-46)

Allah SWT berfirman :

“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya.” (QS. Al Qiyaamah : 37-38)

2. Anak-anak produk Kloning dari perempuan saja (tanpa adanya laki-laki), tidak akan mempunyai ayah. Dan anak produk Kloning tersebut jika dihasilkan dari proses pemindahan sel telur-yang telah digabungkan dengan inti sel tubuh-ke dalam rahim perempuan yang bukan pemilik sel telur, tidak pula akan mempunyai ibu. Sebab rahim perempuan yang menjadi tempat pemindahan sel telur tersebut hanya menjadi penampung, tidak lebih. Ini merupakan tindakan menyia-nyiakan manusia, sebab dalam kondisi ini tidak terdapat ibu dan ayah. Hal ini bertentangan dengan firman Allah SWT :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al Hujuraat : 13)

3. Kloning manusia akan menghilangkan nasab (garis keturunan). Padahal Islam telah mewajibkan pemeliharaan nasab. [\[14\]](#)
Rasulullah SAW telah bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ
فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Nabi saw. Bersabda: *“Barang siapa mengaku bernasab kepada orang selain ayahnya sedangkan ia tahu bahwa ia bukan ayahnya maka ia diharamkan masuk surga”.* (HR. Bukhari dan Muslim).[\[15\]](#)

Berdasarkan dalil-dalil itulah proses Kloning manusia diharamkan menurut hukum Islam dan tidak boleh dilaksanakan.



12

BIOETIKA, ASPEK KEAMANAN DAN REGULASI PRODUK HASIL REKAYASA GENETIKA

12.1. PENDAHULUAN

Teknologi rekayasa genetika telah memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam perkembangan produk dan jasa dalam berbagai kepentingan umat manusia. Namun demikian beberapa produk hasil rekayasa genetika dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negative, baik ditinjau dari aspek meliputi etika, agama, maupun dari aspek social, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Khawatiran yang paling vocal datang dari para pecinta lingkungan hidup yang mengatakan bahwa produk hasil rekayasa genetika telah mengancam kelestarian ekosistem. Keadaan ini bisa dimengerti karena kemungkinan adanya dampak negative yang disebabkan oleh produk hasil rekayasa genetika. Salah satu contoh yang paling menarik adalah tanaman transgenic (jagung Bt), yang membawa gen Bt, yang menyandi protein Cry bakteri *Bacillus thuringiensis*, disinyalir dapat menyebabkan kematian larva spesies kupu-kupu raja (*Danaus plexipus*). Meskipun kebenaran bahwa kematian kupu-kupu raja disebabkan oleh serbuk sari tanaman jagung transgenic masih controversial, namun perlu diantisipasi kemungkinan dampak negatif tanaman transgenic terhadap keseimbangan ekosistem karena bagaimanapun kecilnya kemungkinan tersebut tetap ada.

Target utama produksi jagung Bt adalah proteksi terhadap serangga pemakan daun, namun gen cry pada jagung Bt juga mengekspresikan protein Cry pada serbuk sari tanaman tersebut. Diduga bahwa serbuk sari jagung Bt tertiuap angin dan menempel pada daun tanaman gulma yang berada tidak jauh dari perkebunan tanaman jagung Bt, sehingga larva kupu-kupu raja yang memakan daun gulma yang telah dilapisi oleh serbuk sari tanaaman transgenic tersebut mengalami kematian. Berdasarkan hasil percobaan laboratorium yang

dilakukan oleh John Losey dan kawan-kawan yang dipublikasi pada Majalah Nature, bulan Mei 1999, menyebutkan bahwa daun tanaman gulma (*Asclepias curassavica*) yang diteburi dengan serbuk sari jagung Bt dapat mematikan ulat kupu-kupu raja. Kematian larva kupu-kupu raja, selain akan mengancam kehidupan kupu-kupu raja, juga dikhawatirkan dapat menyebabkan kematian pada organisme bukan target lainnya.

Tanaman transgenik yang dibuat tahan terhadap serangan hama tertentu misalnya terhadap serangga Lepidoptera, setelah ditanam ternyata memiliki akar yang dapat mematikan mikroorganisme dan organisme tanah, misalnya cacing tanah, sehingga dikhawatirkan bahwa tanaman transgenik dapat mengalami pergeseran genetik dan dapat menyebabkan gangguan pada ekosistem.

Penggunaan gen yang berasal dari babi untuk memproduksi bahan makanan, cloning manusia, xenotransplantasi, kloning sel punca (stem cell) dari embrio manusia untuk kepentingan medis juga dinilai dapat menimbulkan kontroversi, baik dari segi norma agama maupun nilai-nilai moral kemanusiaan.

Organisme transgenik terutama pangan transgenik misalnya ikan atau tomat transgenik dikhawatirkan dapat menjadi sumber transfer genetik yang berpotensi menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Rekayasa genetika bahan pangan dapat menghasilkan allergen atau toksin baru yang semula tidak pernah dijumpai pada bahan pangan alamiah. Perlu diwaspadai kemungkinan timbulnya risiko yang terkait dengan akumulasi hasil metabolisme hewan, tanaman, atau mikroorganisme transgenik yang dapat menghasilkan produk sampingan yang berbahaya baik toksin, allergen, bahan karsinogenik atau kemungkinan adanya transfer genetik yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang berbagai aspek yang dapat menjadi rambu-rambu dalam pemanfaatan teknologi rekayasa genetika agar dapat mengurangi atau menghindari dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

12.2. PRODUK HASIL REKAYASA GENETIKA

Produk hasil rekayasa genetika adalah suatu organisme yang memiliki materi genetic yang diperoleh melalui teknologi rekayasa genetika. Prinsip umum dalam menghasilkan produk hasil karya genetika dilakukan dengan cara memasukkan materi genetik baru ke dalam genom individu suatu organism.

Jenis-jenis produk hasil rekayasa genetika antara lain terdiri dari (i). Hewan hasil rekayasa genetika, dan hasil olahannya, (ii). Tanaman hasil rekayasa genetika, dan hasil olahannya, dan (iii). Mikroorganisme hasil rekayasa genetika dan hasil olahannya.

Produk hasil rekayasa genetika yang merupakan hasil inovasi penting dalam biologi, dan data dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan umat manusia karena memiliki berbagai keuntungan antara lain:

1. Tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Keunggulan ini dapat memberikan keuntungan pada petani dengan cara menekan biaya pembelian peptisida, dan mengurangi penolakan konsumen atas hasil pertanian yang terkontaminasi dengan peptisida, serta dapat menekan kerusakan lingkungan akibat akumulasi pemakaian peptisida.
2. Toleran terhadap herbisida, sehingga tak memiliki efek negatif terhadap penggunaan herbisida.
3. Tahan terhadap cuaca dingin. Gen anti beku ikan yang dapat hidup pada air laut di luar daerah kutup yang dingin diisolasi dan dipindahkan ke dalam tanaman tembakau dan tomat, sehingga tanaman transgenic tersebut tahan apabila ditanam pada musim dingin.
4. Tahan terhadap kekeringan dan air payau, sehingga tanaman hasil rekayasa genetika mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang kering dan tanah yang mengandung garam tinggi.
5. Dapat membantu menambah kekurangan jenis vitamin dan nutrisi tertentu, misalnya galur padi transgenik yang mengandung provitamin A, sehingga mampu mencegah kebutaan pada penduduk di Negara berkembang.
6. Sebagai sumber produksi obat dan vaksin. Vaksin yang diproduksi oleh tanaman hasil rekayasa genetika memudahkan

dalam pemberian, pengiriman, dan cara penyimpanannya dibandingkan dengan vaksin injeksi.

7. Sebagai remediasi lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kualitas hidup manusia dengan dapat diproduksinya berbagai jenis protein terapan yang dapat digunakan sebagai obat maupun untuk alat bantu diagnosis penyakit.

12.3. KEAMANAN PRODUK HASIL REKAYASA GENETIKA

Kontroversi tentang keamanan produk hasil rekayasa genetika sampai saat ini masih terus terjadi. Sebagian pendapat menganggap bahwa produk hasil rekayasa genetika telah memberikan berbagai manfaat yang besar pada peningkatan kesejahteraan manusia, baik dalam bidang pertanian, pangan, industry, kesehatan, dan lingkungan hidup. Di pihak lain ada anggapan bahwa produk hasil rekayasa genetika, dapat menimbulkan dampak buruk terhadap ekosistem. Untuk meminimalkan dampak yang merugikan dari produk hasil rekayasa genetika, melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati telah diatur ketentuan umum mengenai keamanan hayati produk hasil rekayasa genetika. Protokol ini mengatur pergerakan lintas batas, penanganan dan pemanfaatan produk hasil rekayasa genetika. Protokol yang dikenal dengan Protokol Cartagena ini secara langsung mengikat Negara-negara yang telah meratifikasinya termasuk Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi Protokol Cartagena, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 21/2004, mengenai Pengesahan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati dan kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika. Melalui undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Indonesia telah menyikapi setiap permasalahan yang terkait dengan produk hasil rekayasa genetika, dengan prinsip pendekatan kehati-hatian dalam dalam rangka memperhatikan aspek keamanan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan mempertimbangkan aspek agama, etik, social budaya dan estetika. Implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, harus dibentuk suatu kelembagaan dan infra struktur untuk menyusun sistem dan prosedur pengawasan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Menurut PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika yang dimaksud dengan keamanan hayati produk hasil rekayasa genetika, meliputi keamanan lingkungan, dan keamanan pangan produk hasil rekayasa genetika. Keamanan lingkungan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya resiko yang merugikan keanekaragaman hayati sebagai akibat pemanfaatan produk hasil rekayasa genetika.

Keamanan pangan produk hasil rekayasa genetika adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya dampak yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, akibat proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pangan produk hasil rekayasa genetika.

Informasi dan petunjuk tentang keamanan lingkungan produk hasil rekayasa genetika harus menjadi perhatian antara lain adalah (i). Deskripsi dan tujuan penggunaan produk hasil rekayasa genetika, (ii). Perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi, (iii). Identitas yang jelas tentang taksonomi, fisiologi, dan reproduksi produk hasil rekayasa genetika, (iv). Organisme yang digunakan sebagai sumber gen, harus dinyatakan secara jelas dan lengkap, (v). Metode rekayasa genetika yang digunakan harus mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, (vi). Karakterisasi molecular produk hasil rekayasa genetika harus terperinci dengan jelas, (vii). Ekspresi gen yang ditransformasikan ke dalam sistem ekspresi harus stabil, dan (viii). Cara pemusnahan produk hasil rekayasa genetika yang digunakan bila terjadi penyimpanan.

Sedangkan informasi dan petunjuk tentang keamanan pangan produk hasil rekayasa genetika antara lain adalah (i). Metode rekayasa genetika yang digunakan harus mengikuti prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan (ii). Kandungan gizi produk hasil rekayasa genetika, secara substansial harus sepadan dengan produk alamiah, (iii). Kandungan senyawa beracun, dan penyebab alergi dalam produk hasil rekayasa genetika, secara substansial harus sepadan dengan produk alamiah, (iv). Kandungan Karbohidrat, protein, lemak, serat, asam amino, asam lemak, mineral dan vitamin dalam produk hasil rekayasa genetika, secara substansial harus sepadan dengan produk alamiah, (v). Protein yang diekspresikan oleh gen yang dipindahkan ke

dalam sistem ekspresi tidak bersifat sebagai allergen, dan (vi). Harus diinformasikan cara pemusnahan bila terjadi penyimpangan pada produk hasil rekayasa genetika.

Penggunaan gen asing yang ditransfer ke dalam sel hospes untuk memproduksi organisme transgenik dapat menimbulkan dampak negative terhadap keamanan hayati dan ekosistem. Oleh sebab itu, diperlukan cara pengujian yang cepat dan cermat sebelum produk hasil rekayasa genetika tersebut digunakan. Pada dasarnya cara pengujian keamanan hayati adalah mengetahui tingkat ekspresi DNA rekombinan yang sengaja dimasukkan, dan memastikan bahwa materi genetik tersebut tidak dipindahkan atau me-nyebar ke organism lain yang terdapat di lingkungan sekitarnya.

Produk hasil rekayasa genetika yang akan dimanfaatkan dan diedarkan terlebih dahulu harus dilakukan kajian tentang tingkat keamanannya (*premarket food safety assessment*). Jika dianggap aman untuk dikonsumsi dan dijual maka harus diberikan label yang menyatakan bahwa produk tersebut adalah “produk hasil rekayasa genetika”.

Pengujian yang dapat dilakukan sebelum produk hasil rekayasa genetika diedarkan pada masyarakat antara lain meliputi (i). Kajian dampak produk hasil rekayasa genetika terhadap keamanan lingkungan, (ii). Kajian dampak produk hasil rekayasa genetika terhadap kesehatan manusia, dan (iii). Kajian dampak produk hasil rekayasa genetika terhadap aspek social ekonomi.

Badan internasional Food and Agriculture Organization (FAO), telah memberikan beberapa petunjuk mengenai pengawasan produk hasil rekayasa genetika antara lain adalah :

1. Peraturan dan regulasi mengenai keamanan pangan yang terpadu harus diterapkan dengan baik untuk melindungi kesehatan masyarakat, dimana semua Negara harus menempatkan peraturan dan regulasi tersebut seimbang dengan perkembangan teknologi.
2. Pemindahan gen yang dapat menyebabkan alergi hendaknya dihindari, kecuali telah terbukti bahwa gen yang dipindahkan tidak menunjukkan terjadinya alergi.

3. Pemindahan gen dari bahan pangan yang mengandung allergen ke organisme lain tidak boleh dipasarkan.
4. Senyawa allergen yang dapat menimbulkan reaksi imunitas harus diidentifikasi.
5. Validasi metode pengujian keamanan produk hasil rekayasa genetika harus divalidasi secara berkala,
6. Perlu adanya pangkalan data tentang organism transgenik yang digunakan sebagai sumber produksi pangan.
7. Perlu dibentuk jejaring badan pengawas antar Negara FAO untuk membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keamanan produk hasil rekayasa genetika.
8. Negara berkembang harus dibantu dalam pendidikan dan latihan tentang keamanan pangan dan komponen pangan yang ditimbulkan oleh modifikasi genetik.
9. Perlu ditingkatkan penelitian dan pengembangan metode untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap keamanan produk hasil rekayasa genetika.

12.4. ETIKA DAN REGULASI PRODUK HASIL REKAYASA GENETIKA

Teknologi rekayasa genetika merupakan capaian yang menakutkan dalam bidang biologi molekular, apabila digunakan dengan baik dan tepat dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan taraf kehidupan umat manusia di dunia.

Kemampuan manusia untuk merekayasa makhluk hidup dengan cara merubah sifat filogenik suatu organisme melalui rekayasa genetika tentu memerlukan rambu dan batasan agar tidak terjadi penyalahgunaan ataupun menimbulkan gangguan pada kesehatan manusia dan kelestarian ekosistem. Oleh sebab itu, penciptaan suatu organisme yang memiliki sifat-sifat baru ini perlu diatur baik dari aspek etik profesi sebagai ilmuwan maupun dari aspek regulasi dan perundangan.

Kode etik dan standar perilaku yang diharapkan dapat diberlakukan bagi para pakar khususnya kelompok ilmuwan rekayasa genetika antara lain:

1. Ilmuwan yang berkecimpung dalam bidang rekayasa genetika, hendaknya menghormati standar kode etik tertinggi yang bersifat universal yang secara aktif dan proaktif melayani dan memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Penemuan dan pernyataan ilmiah untuk umum harus terpelihara ketepatannya jauh dari sensasi dan penyalahgunaan, tanpa membesar-besarkan kelebihannya ataupun menutupi kekurangan atau efek pengembangan suatu teknologi tersebut.
2. Berkewajiban memajukan, mengembangkan, memanfaatkan bidang keahliannya untuk didarmabaktikan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia, dan dapat memahami keterbatasan pengetahuan dan ilmunya, serta menghormati makna dari kebenaran ilmiah.
3. Harus senantiasa berusaha untuk memajukan profesinya dengan cara meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan mutakhir dalam bidang ilmunya, dan dapat meningkatkan kemitraan serta jejaring ilmiah diantara sesama ilmuwan lainnya.
4. Dituntut untuk memahami dan mengantisipasi dampak negatif dari pengembangan ilmu dan teknologi terhadap kesehatan dan lingkungan.

Regulasi dan perundangan tentang keamanan hayati produk hasil rekayasa genetika, antara lain Undang-Undang Nomor 21 tahun 2004, dan PP No. 21/2005, dibuat untuk menjadi dasar hukum dalam mewujudkan keamanan hayati, keamanan pangan dan kesehatan bagi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya hayati, perlindungan konsumen dan kepastian berusaha, menggunakan pendekatan kehati-hatian dan prinsip kaidah metodologi ilmiah, asek agama, estetika dan sosial budaya.

Cakupan regulasi dan perundangan tentang keamanan hayati produk hasil rekayasa genetika, meliputi :

1. Jenis dan persyaratan produk hasil rekayasa genetika.
2. Penelitian dan pengembangan.
3. Regulasi dan cara pemasukan produk hasil rekayasa genetika dari luar negeri.

4. Pengkajian, pelepasan, dan peredaran serta pemanfaatan produk hasil rekayasa genetika.
5. Pengawasan dan pengendalian produk hasil rekayasa genetika.
6. Kelembagaan yang mengawasi produk hasil rekayasa genetika.

Penelitian dan Pengembangan

Setiap orang yang melakukan penelitian dan pengembangan produk hasil rekayasa genetika, wajib mencegah atau menanggulangi dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penelitiannya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Proses penelitian dan pengembangan produk hasil rekayasa genetika, harus dilakukan di laboratorium atau di lapangan uji yang terbatas. Produk hasil rekayasa genetika, sebelum diusulkan untuk dilepas atau diedarkan harus melalui uji efikasi dan memenuhi persyaratan keamanan hayati. Tata cara penelitian dan pengembangan produk hasil rekayasa genetika, dilaksanakan berdasarkan kaidah penelitian dan pengembangan yang berlaku di Indonesia serta diatur oleh kementerian yang terkait.

Pemasukan produk hasil rekayasa genetika dari luar negeri

Setiap orang atau badan usaha yang akan memasukkan produk hasil rekayasa genetika dari luar negeri untuk pertama kali, wajib mengajukan permohonan kepada kementerian yang berwenang. Permohonan untuk memasukkan produk hasil rekayasa genetika, wajib dilengkapi dengan informasi tentang produk meliputi (i). Dokumen yang menerangkan bahwa telah memenuhi persyaratan keamanan lingkungan, keamanan pangan, (ii). Surat keterangan yang menyatakan bahwa produk hasil rekayasa genetika tersebut telah diperdagangkan secara bebas di Negara asalnya, dan (iii). Dokumentasi pengkajian dan pengelolaan resiko dari institusi yang berwenang dimana pengkajian resiko tersebut pernah dilakukan.

Pengkajian, pelepasan dan peredaran serta pemanfaatan

Pengkajian terhadap produk hasil rekayasa genetika, wajib dilakukan sebelum pelepasan dan peredaran. Pengkajian dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis dari pemohon, dan lembaga

keanekaragaman hayati atau kementrian lingkungan hidup harus melaksanakan kajian menyeluruh terhadap produk hasil rekayasa genetika yang akan diedarkan tersebut. Sebelum diedarkan untuk pertama kali, pemohon wajib melakukan pengujian keamanan produk hasil rekayasa genetika, di laboratorium, di fasilitas pengujian atau di lapangan uji yang terbatas.

Produk hasil rekayasa genetika yang telah memperoleh rekomendasi keamanan hayati, maka kementrian yang berwenang memberikan izin pelepasan atau peredaran sesuai dengan perundangan yang berlaku. Produk hasil rekayasa genetika yang diedarkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan berbagai bidang sesuai dengan peruntukannya.

Pengaturan dan regulasi pemanfaatan organisme transgenik perlu dilakukan secara berhati-hati dan berdasarkan pada data ilmiah yang memadai, sehingga regulasi yang dibuat tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh organisme transgenik akan tetapi juga memungkinkan bagi masyarakat dapat memanfaatkan produk transgenik secara maksimal.

Penelitian pengembangan dan pemanfaatan produk rekayasa genetika dalam bidang kefarmasian dan kedokteran sudah tentu harus mengikuti kaidah dan kode etik penelitian dan uji klinik yang telah diatur oleh komisi etik uji klinik berlaku secara universal. Pengembangan suatu produk yang akan digunakan sebagai pengobatan harus melalui tahapan tertentu yang dimulai uji praklinik meliputi uji bioaktivitas farmakologis pada binatang percobaan, uji toksisitas akut, sub akut, dan kronis, yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa fase uji klinik pada manusia.

Tahapan uji klinik suatu obat termasuk senyawa hasil rekayasa genetika harus mengikuti fase-fase uji klinik yang dipersyaratkan. Uji klinik fase I, dilakukan untuk mengetahui keamanan obat jika digunakan pada manusia. Lama uji klinik fase I biasanya lebih dari satu tahun, dengan subjek sukarelawan sehat sebanyak 20-100 orang. Uji klinik fase II, dilakukan untuk mengetahui efikasi dari senyawa obat, dilakukan selama lebih dari 2 tahun pada 100-300 orang pasien. Sefangkan uji klinik fase III, dilakukan untuk mengetahui efikasi dan adanya efek samping dari obat, dilakukan selama 1-4 tahun setelah obat digunakan

oleh 1000-3000 orang pasien. Setelah uji klinik fase ke III, biasanya obat didaftarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendapatkan persetujuan peredaran dan penggunaan obat. BPOM melakukan suatu tinjauan menyeluruh terhadap senyawa obat yang didaftarkan berdasarkan analisis data hasil uji laboratorium maupun hasil uji klinik yang telah dilakukan.

Umumnya waktu yang dibutuhkan mulai dari penemuan senyawa baru sampai mendapatkan persetujuan dan digunakan sebagai pengobatan memerlukan waktu sekitar 10 sampai 14 tahun.

Setelah mendapatkan persetujuan edar dari BPOM, produsen masih harus melakukan survailans untuk memantau secara berkesinambungan tentang kemungkinan adanya efek samping obat selama dipasarkan.

Dalam pelaksanaan uji klinik produk hasil rekayasa genetika, kaidah-kaidah etik uji klinik harus dipatuhi. Para sukarelawan, baik sehat maupun sakit harus diinformasikan dengan melalui suatu formulir persetujuan (*informed consent*), bahwa para sukarelawan tersebut setuju untuk diikutsertakan dalam proses uji klinik produk hasil rekayasa genetika.

Menurut Permenkes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU nomor 29 tahun 2004 Pasal 45, informed consent adalah tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau terapi yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut.

Daftar Pustaka

- Jamsari. 2007. Bioteknologi Pemula, Prinsip Dasar Teknik Analisis Molekuler. Unri- Press. 180 halaman.
- Jamsari, 2008. Pengantar Pemuliaan, Landasan Biologis, Genetis dan Molekuler. Unri Press.
- Nicholl, D. 2002. An Introduction Genetics Engineering. Cambridge University Press. NewYork
- Lewin, B. 2000. Genes. Oxford-University Press. 990 pp.
- Watson, J.D., J. Tooze, D.T. Kurtz. 1983. Recombinant DNA, A short course. Scientific American Book. 260 pp.
- Marshall, G., D. Walters. 1994. Molecular Biology in Crop Protection. Chapman & Hall. 283 pp.
- Suzuki, D.T., A.J.F. Griffith, J. H. Miller, R.C. Lewontin. 1989. An Introduction to Genetic Analysis. W.H. Freeman and Company. 768 pp.
- Kempken, F and R. Kempken. 2000. Gentechnik bei Pflanzen. Springer-Verlag. Berlin. 245 pp.
- Brown, T.A. 2007. Genomes 3. Garland Science Publishing. Academic Press. USA.