


**PENGARUH TERAPI KOGNITIF TERHADAP KEMAMPUAN
MENGONTROL PIKIRAN NEGATIF PADA KLIEN SKIZOFRENIA**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**



ANDI RAHMAYANI
NIM: 70300112028

**PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Juni 2016

Penyusun

Andi Rahmayani

NIM. 70300112028



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya yang tiada terhingga sehingga penyusun masih diberikan nikmat kesehatan serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan sebuah karya berupa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemberian Terapi Kognitif Terhadap Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Pada Klien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar”**. Shalawat serta salam senantiasa selalu turunkan kepada Rasulullah saw. Nabi sebagai *Rahmatan Lil Alamin* serta para sahabat *shahabiyah, tabi'in, tabi'ut tabi'in*. Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini tentu banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril dan materilnya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak **Andi Sulaeman S.Pd** dan Ibu **Sukmawati S.Pd** atas segala doa terbaik yang telah ditujukan kepada penyusun serta bimbingan, semangat, kasih sayang dan bantuan moril maupun material yang selama ini diberikan. Dan juga kepada Kakak dan Adikku, **Andi Suliana S.Pd** dan **Andi Sriana** yang telah memberikan motivasi dan semangat selama ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Risnah S.KM., S. Kep., Ns., M. Kes.,** selaku Pembimbing I dan **Ibu Syisnawati S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. J** selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar untuk meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan saran, arahan ataupun bimbingan demi tercapainya hasil penelitian yang professional serta bermanfaat.

Penyusun menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penyusun mengikuti pendidikan.
3. **Bapak Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns., M.Kes,** selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penyusun.
5. Pimpinan dan segenap staf Puskesmas Mangasa Makassar yang telah banyak membantu sepanjang proses penelitian ini.
6. Pembina PIBA (Program Intensifikasi Bahasa Asing) *Dormitory* yang telah memberikan bekal ilmunya dari awal menjadi seorang mahasiswi hingga sekarang.

7. Sahabat PIBA angkatan 2012 yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan, motivasi serta doanya selama ini dan telah menjadi inspirator bagi penyusun.
8. Keluarga besar PIBA *Dormitory* atas segala dukungan dan doanya.
9. Sahabat seperjuanganku, Risqa Nurul Fikriyah, Mukarramah As'ad, Susi Kushandarwati yang selalu setia berjuang bersama dan memberikan dukungan dan motivasinya.
10. Teman-teman IGSHA dari angkatan pertama hingga sekarang atas segala dukungan dan doanya.
11. Teman-teman Alumni SMA Negeri Watansoppeng atas segala dukungan dan doanya.
12. Mahasiswa(i) Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Angkatan 2012 atas kebersamaanya selama ini.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi, dimana nama-namanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun persembahkan sebagai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini selain doa serta harapan kepada Allah SWT. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan sekiranya dapat menjadi wasilah penolong dan pengampunan di hari akhir, Amin. Skripsi ini merupakan sebuah karya penyusun yang tentunya tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan masukan baik berupa kritikan ataupun saran, sekiranya masukan tersebut dapat menjadikan skripsi ini

menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. *Aamin Yaa Rabbal Alamin.*

Gowa, Juni 2016

Penyusun



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Hipotesis.....	4
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	4
E. Kajian Pustaka	5
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-34
A. Tinjauan Umum Tentang Terapi Kognitif.....	11
B. Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif.....	14
C. Tinjauan Umum tentang Skizofrenia.....	16
D. Kerangka Konsep.....	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35-43
A. Desain Penelitian	35
B. Kerangka Kerja	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Waktu Penelitian	36
E. Populasi dan Sampel.....	36
F. Teknik Pengambilan Sampel	37
G. Identifikasi Variabel.....	38
H. Teknik Pengumpulan Data.....	38
I. Pengolahan Data	39
J. Analisis Data.....	40
K. Etika Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44-69
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	49
C. Keterbatasan Penelitian.....	68
BAB V PENUTUP.....	70-72
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73-76
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan dan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4.2 Distribusi Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif klien Skizofrenia Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif	47
Tabel 4.3 Rerata Skor kemampuan mengontrol pikiran negatif Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif	48
Tabel 4.4 Hasil Uji Perbandingan Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Sebelum dan Setelah dilakukan Terapi Kognitif	49



Abstrak

Nama : Andi Rahmayani

Nim : 70300112028

**Judul : Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Kemampuan Mengontrol
Pikiran Negatif Klien Skizofrenia**

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik, dengan gangguan dasar pada kepribadian, distorsi khas pada proses pikir. Distorsi pikiran negatif yang muncul pada klien Skizofrenia dapat memicu timbulnya tekanan mental yang akan berakibat pada timbulnya kecemasan, depresi atau bahkan dorongan untuk bunuh diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar.

. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Maret sampai 21 April 2016 dengan metode penelitian berupa *Pre-Experimental One Group Pretest-Posttest*. Analisa data menggunakan uji statistik *Wilcoxon t-test*. Responden sebanyak 14 orang dengan metode pengumpulan berupa *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan $p\text{ value}=0.001$, yang berarti ada perbedaan bermakna kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum dan setelah dilakukan terapi kognitif. Hal ini berarti H_0 diterima yakni terapi kognitif mempengaruhi kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

Terapi kognitif mampu meningkatkan kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia. Dengan mengurangi frekuensi berpikir negatif, hal ini seakan dapat menjadi *antidepresan* bagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental. Pemikiran negatif yang muncul juga akan digantikan dengan pemikiran positif. Orang yang berpikir positif akan dapat merasa lebih rileks dan dapat mengontrol stres dengan lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terapi kognitif efektif terhadap peningkatan kemampuan mengontrol pikiran negatif dan terapi ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang yang memiliki pikiran-pikiran negatif yang sering mengganggu.

Kata Kunci: Terapi Kognitif, Pikiran Negatif, Skizofrenia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator kesehatan jiwa yang dinilai pada Riskesdas 2013 antara lain gangguan jiwa berat, gangguan mental emosional serta cakupan pengobatannya. Potensi seseorang mudah terserang gangguan jiwa memang tinggi, setiap saat 450 juta orang di seluruh dunia terkena dampak permasalahan jiwa, saraf, maupun perilaku (Arisandy, 2014). Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realitas atau tilikan (insight) yang buruk. Gejala yang menyertai gangguan ini antara lain berupa halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh, misalnya agresivitas atau katatonik. Gangguan jiwa berat dikenal dengan sebutan psikosis dan salah satu contoh psikosis adalah skizofrenia (Riskesdas, 2013). Maramis (2009), Jenis dan karakteristik gangguan jiwaupun sangat beragam, salah satunya gangguan jiwa yang sering kita temukan dan dirawat yaitu skizofrenia (Mahendra dkk, 2014).

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik, dengan gangguan dasar pada kepribadian, distorsi khas pada proses pikir. Gangguan Skizofrenia, pada umumnya ditandai oleh distorsi pikiran dan persepsi yang mendasar dan khas, dan afek yang tidak serasi atau tumpul. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Health Organization (WHO) 2010, penderita gangguan psikis dengan

diagnosis Skizofrenia telah menjangkiti kurang lebih 24 juta jiwa di seluruh dunia. Dari jumlah 24 juta jiwa tersebut, di Indonesia tercatat sebanyak 1.928.663 juta jiwa dengan Skizofrenia (Hidayat, 2013).

Data yang didapatkan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, prevalensi orang dengan Skizofrenia adalah sebesar 1,7 per mil. Dari data tersebut juga didapatkan bahwa prevalensi psikosis/skizofrenia tertinggi berada di Yogyakarta dan Aceh (masing-masing 2,7‰), disusul oleh Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 2,6‰ (Riskesdas, 2013). Jumlah kunjungan pada fasilitas kesehatan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Selama tahun 2012 hingga 2014 pada wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar, Penderita Skizofrenia diantaranya sebanyak 92 orang .

Menurut Videbeck (2008) *deteriorasi* konsep diri merupakan masalah utama pada skizofrenia. Harga diri merupakan salah satu dari lima komponen dari konsep diri yang dapat diartikan sebagai penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri (Kustiawan, 2012). Pasien Skizofrenia juga biasanya akan merasakan gejala-gejala seperti halusinasi, distorsi isi pikir (waham), distorsi dalam proses pikir dan bahasa dan distorsi perilaku dan pengontrolan diri, keterbatasan dalam ekspresi emosi, keterbatasan dalam produktifitas berpikir (Suryani, 2013). Hal yang sama dijelaskan oleh Kaplan & Sadock (2007), Penderita skizofrenia akan mengalami gangguan dalam kognitif, emosional, persepsi serta gangguan dalam

tingkah laku (Maryatun, 2013). Distorsi pikiran negatif yang muncul pada klien Skizofrenia dapat memicu timbulnya tekanan mental yang akan berakibat pada timbulnya kecemasan, depresi atau bahkan dorongan untuk bunuh diri.

Ada beberapa terapi yang dapat diberikan pada klien Skizofrenia yakni *Assertiveness Training*, Terapi Perilaku Token Ekonomi, *Cognitive Behaviour Therapy*, Latihan Keterampilan Sosial (*Social Skill Training*, Terapi *Thought Stopping*, *Cognitive Behavioral Social Skills Training (CBSST)*, *Rational Emotive Behaviour Therapy*, Terapi Perilaku: *Modeling* Partisipan, Terapi Kelompok Logoterapi *Paradoxical Intension*, *Acceptance And Commitment Therapy (ACT)*, Terapi Aktivitas Kelompok, serta Terapi Kognitif (Modul UI, 2013).

Untuk mengatasi masalah yang terdapat pada klien Skizofrenia diatas maka klien Skizofrenia dapat diberikan salah satu dari beberapa terapi yang telah disebutkan diatas yakni Terapi Kognitif. Menurut Townsend (2009) , terapi kognitif juga dapat membantu individu mengatasi respon ansietas akibat yang ditimbulkan oleh distorsi pikiran negatif (UI, 2013). Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut. Terapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas, mengurangi perilaku

yang tidak diinginkan serta meningkatkan keterampilan sosial (Syisnawati, 2011).

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap penderita skizofrenia yang berada di wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar terkait pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada penderita skizofrenia tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini yakni “Bagaimana pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada pasien Skizofrenia ?”.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Null (H_0)

Tidak ada pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

2. Hipotesis Alternatif (H_A)

Ada pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

D. Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Parameter	Skor
Independen: Terapi Kognitif	Terapi Kognitif merupakan terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut.	Sesi 1: Mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran negatif yang pertama Sesi 2: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang Kedua Sesi 3: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang Ketiga Sesi 4: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif) Sesi 5: Support system	
Dependen : Kemampuan mengontrol pikiran negatif pada Pasien Skizofrenia	Pikiran negatif adalah Pikiran yang timbul akibat penilaian yang negatif terhadap stimulus yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan.	Mampu mengontrol pikiran negatif. : <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif. • Menggunakan tanggapan rasional dalam mengatasi pikiran otomatis negatif yang muncul. • Mengungkapkan manfaat tanggapan 	Selalu = 0 Kadang-kadang= 1 Jarang = 2 Tidak Pernah = 3 Dengan penilaian: 1-12 = Buruk 13-24 = Baik

		<p>rasional terhadap pikiran otomatis yang negatif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan dukungan dari keluarga dalam membantu klien meningkatkan kemampuan merubah pikiran negatif. <p>Dalam kuesioner terdapat 8 pertanyaan yang mengukur kemampuan responden menggunakan skala likert dengan rentang nilai 0-3.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

E. Kajian Pustaka

NO	Judul Penelitian	Peneliti	Desain Penelitian	Kesimpulan Penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh terapi kognitif dan terapi penghentian pikiran terhadap perubahan ansietas, depresi, dan kemampuan mengontrol pikiran negatif klien kanker di RS Dharmais Jakarta.	Jesika Pasaribu	Quasy eksperimental pre-post test with control group	Terapi kognitif dan terapi penghentian pikiran secara bermakna menurunkan ansietas dan depresi serta meningkatkan kemampuan mengontrol pikiran negatif (p value: 0,000 $\alpha = 0,005$).	Terapi kognitif yang digunakan pada penelitian ini yakni objek penelitian yang digunakan bukan pada klien skizofrenia melainkan pada penderita kanker di Rumah Sakit. Variabel depeden dalam penelitian ini juga menggunakan 3 variabel yakni ansietas, depresi dan kemampuan mengontrol pikiran

					negatif. Variabel independen juga terdiri dari 2 variabel yakni selain terapi kognitif juga terapi penghentian pikiran.
2.	Penerapan terapi kognitif dan psikoedukasi keluarga pada Klien harga diri rendah di ruang yudistira rumah sakit dr.H.Marzoeki mahdi bogor tahun 2013.	Titiek Suerni	Studi Kasus	Hasil penerapan pada kelompok klien dengan tindakan keperawatan generalis, terapi kognitif dan psikoedukasi keluarga menunjukkan penurunan tanda dan gejala rata-rata 71,2%; peningkatan kemampuan klien rata-rata 100%; peningkatan kemampuan keluarga rata-rata 98%; lama rawat rata-rata 26 hari. Berdasarkan penurunan tanda dan gejala, peningkatan kemampuan klien dan	Penelitian ini menggabungkan antara terapi kognitif dengan psikoedukasi keluarga sedangkan pada penelitian yang dilakukan hanya terapi kognitif. Desain penelitian yang digunakan merupakan studi kasus sedangkan pada penelitian yang dilakukan merupakan <i>Quasy Experimental</i> .

				keluarga serta lama hari rawat maka terapi kognitif dan psikoedukasi keluarga direkomendasikan pada klien dengan harga diri rendah.	
3.	Terapi kognitif dan relaksasi untuk meningkatkan optimisme pada pensiunan Universitas X.	Sendy Limono	Quasy Eksperimen- <i>Purposive non random sampling.</i>	Hasil menunjukkan bahwa subjek mampu meningkatkan optimisme dengan mengendalikan distorsi kognitif.	Terapi kognitif pada penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan optimisme bukan untuk mengukur kemampuan mengontrol pikiran negatif .Penelitian ini juga menggabungkan terapi kognitif dengan relaksasi dan objek penelitian juga bukan pada klien Skizofrenia tapi pada pensiunan.
4.	Pengaruh terapi kognitif terhadap tingkat kecemasan pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa.	Dian eka nurjanah	<i>Pra Eksperimenal dengan desain one group pretest-posttest.</i>	Ada perbedaan rata-rata kecemasan sebelum dan setelah dilakukan terapi kognitif, dan ada penurunan yang signifikan antara rata-rata	Terapi kognitif pada penelitian ini diberikan pada pasien Gagal Ginjal Kronik yang menjalani hemodialisa bukan pada klien Skizofrenia dengan tujuan untuk mengetahui

				kecemasan setelah dilakukan terapi kognitif dibandingkan sebelum dilakukan terapi kognitif pada pasien gagal ginjal kronik yang menjalani terapi hemodialisa di Ruang Hemodialisa RSUD M. Yunus Bengkulu (<i>p value</i> = 0,000).	pengaruh Ct terhadap tingkat kecemasan pasien GGK bukan untuk mengukur kemampuan mengontrol pikiran negatif.
5.	Pengaruh terapi kognitif terhadap perubahan kondisi depresi pasien gagal ginjal kronik	Widodo	<i>Quasi experiment</i> dengan desain <i>pre-post test design with control group</i> .	Hasil penelitian membuktikan adanya perbedaan yang bermakna kondisi depresi sebelum dan sesudah pemberian terapi kognitif (<i>p value</i> < 0,05).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi depresi pada pasien gagal ginjal kronik bukan kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada pasien Skizofrenia.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuahuinya kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia sebelum dilakukan terapi kognitif.
- b. Diketuahuinya kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia setelah dilakukan terapi kognitif.
- c. Mengalalisis pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Sebagai bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memberikan pelayanan kepada klien Skizofrenia terkait pemberian intervensi berupa terapi kognitif sehingga klien Skizofrenia mampu untuk mengontrol pikiran negatif serta keluarga dari klien Skizofrenia juga mampu untuk merawat dan membantu klien Skizofrenia untuk memecahkan setiap pikiran-pikiran negatif yang selalu dipikirkan oleh klien Skizofrenia.

2. Bagi Peneliti

Sebagai bahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait terapi kognitif.

3. Bagi Perawat

Dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif melalui beberapa pendekatan khususnya pendekatan fisio dan psikologi agar klien dengan Skizofrenia dapat mengontrol pikiran negatif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Terapi Kognitif

1. Definisi Terapi

Dalam Kamus Psychology Therapy dijelaskan bahwa terapi adalah prosedur untuk menyembuhkan atau meringankan suatu penyakit. Menurut J.S. Badudu dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa terapi merupakan cara pengobatan untuk menyembuhkan orang sakit dari penyakitnya, dan perawatan penyakit (Nurkholisoh, 2009).

2. Definisi Terapi Kognitif

Townsend 2005, Terapi kognitif yaitu psikoterapi individu yang pelaksanaannya dengan melatih klien untuk mengubah cara klien menafsirkan dan memandang segala sesuatu pada saat klien mengalami kekecewaan, sehingga klien merasa lebih baik dan dapat bertindak lebih produktif (Suerni, 2013). Beck 1995, Terapi kognitif berlandaskan model kognitif yakni emosi dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap suatu peristiwa (Pasaribu, 2012).

Sharf 2012, Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut (Limono,2013). Terapi kognitif

merupakan terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut (Syisnawati, 2011).

Dalam sebuah penelitian juga dijelaskan bahwa terapi kognitif merupakan suatu terapi yang berfokus pada perubahan cara berpikir atau persepsi klien sehingga pikiran yang negatif dapat diubah menjadi pikiran positif. Jika klien memiliki pikiran positif maka diharapkan klien dapat lebih adaptif dalam mengatasi setiap peristiwa yang terjadi (Pasaribu, 2012).

3. Tujuan Terapi Kognitif

Secara umum tujuan dari terapi kognitif meningkatkan kemampuan mengubah pikiran negatif. Tujuan khusus dari terapi kognitif ini diharapkan klien mampu mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif, menggunakan tanggapan rasional dalam mengatasi pikiran otomatis negatif yang muncul, mengungkapkan manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis yang negatif, mendapatkan dukungan dari keluarga dalam membantu klien meningkatkan kemampuan merubah pikiran negatif (Modul Terapi Kognitif UI, 2013).

Terapi kognitif yang diberikan kepada klien Skizofrenia diharapkan mampu untuk membantu klien Skizofrenia untuk dapat mengontrol pikiran negatifnya. Terapi kognitif ini juga dapat meningkatkan semangat dan motivasi

klien Skizofrenia serta keluarga. Keluarga yang berperan dalam sesi ke V diharapkan akan mampu menjadi *Support System* dimana keluarga membantu klien Skizofrenia dalam memecahkan setiap pikiran-pikiran negatif yang dimiliki.

4. Indikasi Terapi Kognitif

Beck et al, 1995 dalam Townsend 2009, Terapi kognitif diterapkan untuk masalah depresi dan masalah psikiatrik lainnya, seperti *panic disorder*, *social fobia*, *generalized anxiety disorder*, OCD, PTSD, gangguan makan, penyalahgunaan zat, gangguan *personality*, skizofrenia, gangguan bipolar, hipokondria, gangguan somatoform serta masalah dengan pasangan (Pasaribu, 2012).

5. Pedoman Pelaksanaan Terapi Kognitif

Modifikasi pelaksanaan terapi kognitif yang dilaksanakan oleh Kristyaningsih (2007) adalah sebagai berikut, Sesi pertama: identifikasi pikiran otomatis, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh pikiran otomatis negatif, berdiskusi untuk 1 pikiran otomatis yang dipilih, memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif pertama dan membuat catatan harian.

Sesi kedua: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif, yaitu mengevaluasi kemampuan klien dalam melakukan tugas mandiri dalam sesi 1 (memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif 1), mendiskusikan cara dan kesulitan klien dalam menggunakan catatan harian, dan

mendiskusikan penyelesaian klien dalam menggunakan catatan harian, dan mendiskusikan penyelesaian terhadap pikiran otomatis negatif kedua dengan langkah-langkah yang sama seperti dalam sesi 1.

Sesi ketiga: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif), yaitu mengevaluasi kemampuan klien dalam melakukan tugas mandiri sesi kedua di rumah, mendiskusikan penyelesaian terhadap pikiran otomatis negatif ketiga dengan langkah-langkah yang sama seperti dalam sesi 1-2, mendiskusikan cara dan kesulitan klien dalam menggunakan catatan harian, dan diskusikan manfaat dan perasaan setelah klien mengikuti terapi (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi).

Sesi keempat: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif), Sesi Kelima: *Support system*, yaitu melibatkan keluarga untuk dapat membantu klien dalam melakukan terapi kognitif secara mandiri (Pasaribu, 2012).

Pada klien Skizofrenia pemberian terapi kognitif tidak secara langsung diberikan pada saat memulai *Inform Consent*. BHSP atau Bina Hubungan Saling Percaya harus terlebih dahulu dilakukan agar klien Skizofrenia mau untuk mengutarakan setiap pikiran-pikiran negatif yang dimiliki nantinya. Setelah terjadi hubungan saling percaya maka peneliti memulai terapi kognitif.

B. Kemampuan mengontrol pikiran negatif

Pikiran negatif pertama kali dikembangkan oleh Beck (1967), ia adalah seorang psikoterapis yang dikenal dengan *cognitive triad* tentang pikiran negatif yaitu terhadap diri sendiri, dunia dan masa depan. Pikiran negatif terhadap kemampuan diri sendiri dipandang sebagai harga diri rendah, pikiran negatif terhadap dunia dipandang sebagai ketidaberdayaan, dan pikiran negatif terhadap masa depan dipandang sebagai keputusasaan (Modul Terapi Kognitif UI, 2013).

Townsend (2009), pikiran atau kognisi merupakan operasional mental yang berhubungan dengan logika, kewaspadaan, intelektual, memori bahasa, dan kekuatan memberikan alasan (Pasaribu, 2012). Burn (1980) menjelaskan bahwa pikiran negatif berasal dari perasaan negatif atau maladaptif yang tidak disadari. Pikiran negatif timbul akibat penilaian yang negatif terhadap stimulus yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan.

Dialog internal dalam diri terjadi saat individu berusaha menafsirkan peristiwa yang terjadi dengan sederetan pikiran. Dialog internal tersebut akan menghasilkan mood atau suasana perasaan. Perasaan sedih timbul dari penafsiran yang negatif terhadap stimulus yang datang melainkan cara individu tersebut mempersepsikan peristiwa atau stimulus yang terjadi (Pasaribu, 2012).

Pada penderita Skizofrenia pemikiran-pemikiran negatif yang sering terlintas dalam pikiran akan dapat memperparah penyakitnya akibat dari pemikiran negatif yang dapat menyebabkan tekanan mental pada penderitanya

jika tidak mampu untuk diselesaikan. Beberapa dari penderita Skizofrenia biasanya akan lebih memilih memendam masalahnya sendiri. Namun masalah tersebut kadangkala tidak dapat diselesaikan dikarenakan ketidatakhuan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik pada penderita Skizofrenia sekiranya dapat membantu dan memberikan pengetahuan kepada penderita Skizofrenia tentang bagaimana cara untuk mengontrol pikiran-pikiran negatif yang terus mengganggunya.

C. Tinjauan umum tentang Skizofrenia

1. Definisi Skizofrenia

Skizofrenia terdiri dari dua kata, yakni *skhizein* = split = pecah, dan *phrenia* = *mind* = pikiran. Skizofrenia ialah gangguan berpikir (delusi), persepsi (halusinasi), pembicaraan, emosi, dan perilaku (Mark Durand dan David H. Barlow, 2007). Skizofrenia adalah salah satu gangguan psikiatri yang paling melemahkan (Puri, dkk, 2013). Menurut Faisal (2008), penyakit Skizofrenia atau *Schizophrenia* artinya kepribadian yang terpecah antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam artian apa yang dilakukan tidak sesuai dengan pikiran dan perasaannya. Secara spesifik Skizofrenia adalah orang yang mengalami gangguan emosi, pikiran, dan perilaku (Prabowo, 2014).

2. Etiologi

Luana (2007) menjelaskan penyebab dari Skizofrenia dalam model diathesis-stres, bahwa Skizofrenia timbul akibat faktor psikososial dan lingkungan. Terdapat beberapa penyebab Skizofrenia, yakni:

a. Faktor Biologi

1) Komplikasi kelahiran

Bayi laki-laki yang mengalami komplikasi saat dilahirkan sering mengalami komplikasi Skizofrenia, hipoksia, perinatal akan meningkatkan kerentanan seseorang terhadap Skizofrenia.

2) Infeksi

Perubahan anatomi pada susunan syaraf pusat akibat infeksi virus pernah dilaporkan pada orang dengan Skizofrenia. Penelitian mengatakan bahwa terpapar infeksi virus pada trimester kedua kehamilan akan meningkatkan seseorang menjadi Skizofrenia.

3) Hipotesis Dopamin

Dopamin merupakan neurotransmitter pertama yang berkontribusi terhadap gejala skizofrenia. Hampir semua obat antipsikotik baik tipikal maupun atipikal menyekat reseptor dopamin D2, dengan terhalangnya transmisi sinyal di sistem dopaminergik maka gejala psikotik diredakan. Berdasarkan pengamatan diatas dikemukakan bahwa gejala-gejala skizofrenia disebabkan oleh hiperaktivitas sistem dopaminergik.

4) Hipotesis Serotonin

Gaddum, Wooley, dan Show tahun 1954 mengobservasi efek *Lysergic Acid Diethylamide* (LSD) yaitu suatu zat yang bersifat campuran agonis/antagonis reseptor 5-HT. Ternyata zat ini menyebabkan keadaan psikosis berat pada orang normal. Kemungkinan serotonin berperan pada skizofrenia kembali mengemukakan karena penelitian obat antipsikotik atipikal clozapine yang ternyata mempunyai afinitas terhadap reseptor serotonin 5-HT lebih tinggi dibandingkan reseptor dopamin D2.

5) Struktur Otak

Daerah otak yang mendapatkan banyak perhatian adalah sistem limbik dan ganglia basalis. Otak pada penderita skizofrenia terlihat sedikit berbeda dengan orang normal, ventrikel terlihat melebar, penurunan massa abu-abu dan beberapa area terjadi peningkatan maupun penurunan aktifitas metabolik. Pemeriksaan mikroskopis dan jaringan otak ditemukan sedikit perubahan dalam distribusi sel otak yang timbul pada masa prenatal karena tidak ditemukannya sel glia, biasa timbul pada trauma otak setelah lahir.

b. Faktor Genetika

Para ilmuan sudah lama mengetahui bahwa skizofrenia diturunkan, 1% dari populasi umum tetapi 10% pada masyarakat yang mempunyai hubungan

derajat pertama seperti orang tua, kakak laki-laki, ataupun perempuan dengan skizofrenia. Masyarakat yang mempunyai hubungan derajat ke dua seperti paman, bibi, kakek/nenek dan sepupu dikatakan lebih sering dibandingkan populasi umum (Puri, 2013).

Kembar identik 40% sampai 65% berpeluang menderita skizofrenia sedangkan kembar dizigotik 12%. Anak dan kedua orang tua yang skizofrenia berpeluang 40%, satu orang tua 12%. Namun sampai sekarang belum diketahui dasar penyebab Skizofrenia. Dapat dikatakan bahwa faktor keturunan mempunyai pengaruh/faktor yang mempercepat yang menjadikan manifestasi/faktor pencetus seperti stress psikologis (Puri, 2013).

c. Faktor Psikologi

Sebagian besar Skizofrenia terjadi pada orang tua yang memiliki karakteristik dingin, otoriter dan penolak. Hal ini didukung pula oleh trauma hubungan orang tua-anak yang tidak kondusif, serta interaksi yang salah dalam keluarga, merupakan beberapa faktor pendukung munculnya skizofrenia (Yosep, 2016).

d. Faktor Sosiokultural

Faktor lain yang sangat penting adalah masalah ekonomi. Faktor ekonomi dan pekerjaan mempengaruhi seseorang untuk mengalami gangguan skizofrenia (Yosep, 2016).

e. Stres Lingkungan

Florian dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penduduk urban yang datang ke kota-kota besar beresiko mengalami skizofrenia karena tuntutan pekerjaan.

3. Patogenesis

Patofisiologi skizofrenia melibatkan sistem dopaminergik dan serotonergik. Skizofrenia terjadi akibat dari peningkatan aktivitas neurotransmitter dopaminergik. Peningkatan ini mungkin merupakan akibat dari meningkatnya pelepasan dopamin, terlalu banyaknya reseptor dopamin, turunnya nilai ambang, atau hipersensitivitas reseptor dopamin, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut (Kurnia, 2015).

Hipotesis/teori tentang patofisiologi skizofrenia (Kurnia, 2015):

- a. Pada pasien skizofrenia terjadi hiperaktivitas sistem dopaminergik.
- b. Hiperdopaminergia pada sistem *meso limbic* yang berkaitan dengan gejala positif.
- c. Hipodopaminergia pada sistem meso kortis dan nigrostriatal yang bertanggungjawab terhadap gejala negatif.

Jalur dopaminergik sara (Kurnia, 2015):

- a. Jalur nigrostriatal: dari substansia nigra ke basal ganglia (fungsi gerakan dan EPS).

- b. Jalur mesolimbik: dari tegmental area menuju ke sistem *limbic* (fungsi memori, sikap, kesadaran, dan proses stimulus).
- c. Jalur mesokortikal: dari tegmental area menuju frontal korteks (fungsi kognisi, sosial, komunikasi, dan respon stimulus).
- d. Jalur mesokortikal: dari tegmental area menuju ke frontal korteks (fungsi kognisi, sosial, komunikasi, dan respon terhadap stres).
- e. Jalur tuberoinfundibular: dari hipotalamus ke kelenjar pituitary (fungsi pelepasan prolaktin).

Pada skizofrenia terdapat tiga fase (Kurnia, 2015):

- a. Premorbid: semua fungsi masih normal.
- b. Prodromal: gejala psikotik mulai nyata (isolasi sosial, ansietas, gangguan tidur, dan curiga). Pada fase ini individu mengalami kemunduran dalam fungsi-fungsi mendasar (pekerjaan dan rekreasi) dan muncul gejala nonspesifik seperti gangguan tidur, ansietas, konsentrasi berkurang, dan defisit perilaku. Gejala positif seperti curiga sudah mulai berkembang di akhir prodromal dan berarti sudah mendekati menjadi fase psikosis.
- c. Psikosis:
 - 1) Fase akut: dijumpai gambaran psikotik yang jelas, misalnya waham, halusinasi, gangguan proses pikir, dan pikiran kacau. Gejala negatif menjadi lebih parah sampai tidak mampu mengurus diri. Berlangsung 4-8 minggu.

- 2) Stabilisasi: 6-18 bulan.
- 3) Stabil: terlihat residual, berlangsung 2-6 bulan.

4. Manifestasi Klinis

Menurut Bleuler gejala-gejala skizofrenia dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

a. Gejala primer

1) Gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran)

Pada skizofrenia inti gangguan memang terdapat pada proses pikiran yang terganggu terutama asosiasi, kadang-kadang satu idea belum selesai diutarakan sudah timbul idea yang lain. Seseorang dengan skizofrenia juga mempunyai kecenderungan untuk menyamakan hal-hal, kadang-kadang pikiran seakan-akan berhenti, tidak timbul lagi idea lagi. Keadaan ini dinamakan “*Blocking*” biasanya berlangsung beberapa detik saja, tetapi kadang-kadang sampai beberapa hari.

2) Gangguan efek dan emosi

Gangguan ini pada skizofrenia mungkin, berupa:

- a) Kedangkalan efek dan emosi (*emotional blunting*)
 - b) Parhatimi: apa yang seharusnya menimbulkan rasa senang dan gembira, pada penderita timbul rasa sedih dan marah.
 - c) Paramimi: penderita merasa senang dan gembira, akan tetapi menangis.
- Kadang-kadang emosi dan efek serta ekspresinya tidak mempunyai

kesatuan, misalnya setelah membunuh anaknya penderita menangis sehari-hari tetapi mulutnya tertawa.

- d) Emosi yang berlebihan, sehingga kelihatan seperti dibuat-buat seperti sedang bermain sandiwara. Yang penting juga pada skizofrenia ialah hilangnya kemampuan untuk mengadakan hubungan emosi yang baik (*Emotional Rapport*). Karena terpecahnya kepribadian, maka dua hal yang berlawanan mungkin terdapat bersama-sama, umpamanya membenci dan mencintai satu orang yang sama atau menangis dan tertawa tentang satu hal yang sama ini dinamakan ambivalensi pada efek.

3) Gangguan kemauan

Banyak penderita dengan skizofrenia mempunyai kelemahan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan, tidak dapat bertindak dalam suatu keadaan. Mereka selalu memberikan alasan, meskipun alasan itu tidak jelas atau tepat atau mereka menganggap hal itu biasa saja dan tidak perlu diterangkan.

4) Gangguan psikomotor

Gejala ini disebut juga sebagai gejala katatonik atau gangguan perbuatan kelompok gejala oleh Bluker dimasukkan kedalam kelompok gejala Skizofrenia yang sekunder sebab didapat juga pada penyakit lain.

b. Gejala Sekunder

1) Waham

Pada skizofrenia waham sering tidak logis sama sekali dan sangat bizar

Mayer-gross membagi waham dalam 2 kelompok:

- a) Waham primer timbul secara tidak logis sama sekali, tanpa penyebab apa-apa dari luar.
- b) Waham sekunder biasanya logis kedengarannya, dapat diikuti dan merupakan cara bagi penderita untuk menerangkan gejala-gejala Skizofrenia lain.

2) Halusinasi

Pada Skizofrenia, halusinasi timbul tanpa penurunan kesadaran dan hal ini merupakan suatu gejala yang hampir tidak dijumpai pada keadaan lain.

Paling sering pada Skizofrenia ialah halusinasi pendengaran (aditif atau akustik). Kadang-kadang terdapat halusinasi penciuman (olfaktorik), halusinasi cita rasa (gustatorik), atau halusinasi singgungan (Taktik). Halusinasi penglihatan agak jarang pada Skizofrenia, lebih sering pada psikosa akut yang berhubungan dengan sindroma otak organik.

5. Fase-fase skizofrenia

a. Fase Prodromal

Pada beberapa kasus skizofrenia, gangguan skizofrenia dapat menyerang secara tiba-tiba dan berlangsung dalam beberapa hari.

Penderitanya mengalami penurunan fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi perawatan diri, sosial, waktu luang, pekerjaan, pendidikan akademis. Keadaan ini berlangsung 6-12 bulan hingga timbul gejala positif dan negatif skizofrenia. Ciri-ciri umum pada fase prodromal antara lain :

- 1) Berhenti memerhatikan dan memedulikan penampilan dan kebersihan, seperti lupa mandi, lupa tidur, atau lupa makan.
- 2) Sering mengalami kebingungan.
- 3) Berbicara tidak jelas dan serampangan.
- 4) Prestasi sekolah atau pekerjaan secara drastis menurun.
- 5) Sering melakukan kesalahan, seperti sering terlambat datang kerja, sering ceroboh, kurangnya konsentrasi, dan perhatian.
- 6) Sering melakukan aktivitas yang aneh, seperti berpakaian aneh atau tidak pas dengan situasi dan berjalan tanpa busana.
- 7) Senang memungut sampah.

b. Fase Aktif

Pada fase aktif, penderita skizofrenia telah menunjukkan gejala psikotik umumnya, seperti delusi, halusinasi, pembicaraan yang disorganisasi, dan penarikan diri.

c. Fase Residual

Pada fase residual perilaku skizofrenia merupakan kelanjutan dari fase aktif, yakni pola pembicaraan yang melantur, mengalami halusinasi, delusi

memiliki ide-ide yang rumit, merasa mengetahui kehidupan masa yang akan datang, dan penarikan diri dari relasi sosial (Pieter, 2011).

6. Tipe-tipe Skizofrenia

Diagnosa Skizofrenia berawal dari *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM) yaitu: DSM-III (*American Psychiatric Assosiation*, 1980) dan berlanjut dalam DSM-IV (*American Psychiatric Assosiation*, 1994) dan DSM-IV-TR (*American Psychiatric Assosiation*, 2000). Berikut ini adalah tipe skizofrenia dari DSM-IV-TR 2000. Diagnosis ditegakkan berdasarkan gejala yang dominan yaitu (Davison, 2006) :

a. Tipe Paranoid

Ciri utama skizofrenia tipe ini adalah waham yang mencolok atau halusinasi auditorik dalam konteks terdapatnya fungsi kognitif dan afektif yang relatif masih terjaga. Waham biasanya adalah waham kejar atau waham kebesaran, atau keduanya, tetapi waham dengan tema lain (misalnya waham kecemburuan, keagamaan, atau somatisasi) mungkin juga muncul. Ciri-ciri lainnya meliputi ansietas, kemarahan, menjaga jarak dan suka berargumentasi, dan agresif.

b. Tipe *Disorganized* (tidak terorganisasi)

Ciri utama skizofrenia *tipe disorganized* adalah pembicaraan kacau, tingkah laku kacau dan afek yang datar atau inappropriate. Pembicaraan yang

kacau dapat disertai kekonyolan dan tertawa yang tidak erat kaitannya dengan isi pembicaraan. Disorganisasi tingkah laku dapat membawa pada gangguan yang serius pada berbagai aktivitas hidup sehari-hari.

c. Tipe Katatonik

Ciri utama skizofrenia tipe ini adalah gangguan pada psikomotor yang dapat meliputi ketidakbergerakan motorik (*waxy flexibility*). Aktivitas motor yang berlebihan, negativism yang ekstrim, sama sekali tidak mau bicara dan berkomunikasi (*mutism*), gerakan-gerakan yang tidak terkendali, mengulang ucapan orang lain (*echolalia*) atau mengikuti tingkah laku orang lain (*echopraxia*).

d. Tipe *Undifferentiated*

Tipe *Undifferentiated* merupakan tipe skizofrenia yang menampilkan perubahan pola simptom-simptom yang cepat menyangkut semua indikator skizofrenia. Misalnya, indikasi yang sangat ruwet, kebingungan (*confusion*), emosi yang tidak dapat dipegang karena berubah-ubah, adanya delusi, referensi yang berubah-ubah atau salah, adanya ketergugahan yang sangat besar, autisme seperti mimpi, depresi, dan sewaktu-waktu juga ada fase yang menunjukkan ketakutan.

e. Tipe Residual

Tipe ini merupakan kategori yang dianggap telah terlepas dari skizofrenia tetapi masih memperlihatkan gejala-gejala residual atau sisa, seperti

keyakinan-keyakinan negatif, atau mungkin masih memiliki ide-ide tidak wajar yang tidak sepenuhnya delusional. Gejala-gejala residual itu dapat meliputi menarik diri secara sosial, pikiran-pikiran ganjil, inaktivitas, dan afek datar, berlebihan, negativism yang ekstrim, sama sekali tidak mau bicara dan berkomunikasi (*mutism*), gerakan-gerakan yang tidak terkendali, mengulang ucapan orang lain (*echolalia*) atau mengikuti tingkah laku orang lain (*echopraxia*).

7. Penanganan Skizofrenia

Menurut hadits riwayat Bukhari Muslim bahwa penyakit-penyakit itu adalah juga ciptaan Allah SWT. Hadist tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Husam dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." (HR. Bukharino.5246).

Maka dari itu diseruhkan kepada manusia yang menderita suatu penyakit agar berobat, ditegaskan pula oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an Surah Asy'araa/:26:80 sebagai berikut:

وَإِذَا مَرَضْتُمْ فَهُوَ يَشْفِين



Terjemahnya:

“Dan apabila Aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (Kementerian Agama RI).”

Berikut ada beberapa penatalaksanaan untuk pasien Skizofrenia, yakni:

a. Terapi psikoreligius (Terapi religius dalam perspektif agama islam)

Pada orang gelisah, langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalani terapi keagamaan. Orang ini harus diterapi jiwa dan komitmen keagamaannya sehingga siap untuk menghadapi kenyataan. Ini adalah suatu contoh tentang pentingnya peranan agama. Terapi psikoreligius ini juga dapat diterapkan bersama terapi lain. Ada uji perbandingan terapi yang diterapkan kepada para penderita penyakit jiwa skizofrenia, yakni antara cara konvensional (dengan obat dan sebagainya) dan dengan cara pendekatan keagamaan, hasilnya kelompok skizofrenia yang terapinya ditambah dengan keagamaan waktu perawatannya lebih pendek dan gejala-gejalanya jadi cepat hilang.

Terapi keagamaan (intervensi religi) pada kasus-kasus gangguan jiwa ternyata juga membawa manfaat. Misalnya angka rawat inap pada klien Skizofrenia yang juga mengikuti kegiatan keagamaan lebih rendah bila dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti (Chu dan Klein, 1985). Comstock dan Patridge (1972) dalam Yosep 2016, studi Stark menunjukkan bahwa angka frekuensi kunjungan ke tempat ibadah lebih merupakan indikator dan faktor yang efektif dalam hubungannya dengan penurunan angka bunuh diri. Sedangkan klien yang tidak diberikan psikoreligius terapi pada *suicide* memiliki

risiko 4 kali lebih besar untuk melakukan bunuh diri. Stack, Rusky (1983) dalam Yosep 2016, Riset yang lain menyebutkan bahwa menurunnya kunjungan ke tempat ibadah, meningkatkan jumlah bunuh diri di USA.

Kesimpulan dari berbagai riset menunjukkan bahwa religiusitas mampu mencegah dan melindungi dari penyakit kejiwaan, mengurangi penderitaan meningkatkan proses adaptasi dan penyembuhan (Yosep, 2016). Menurut H.Aulia dalam bukunya *Agama dan Kesehatan Jiwa*, seorang dokter beragama islam yang dianutnya dengan penuh keyakinan dan mempunyai pengetahuan tentang ajaran dan hikmah Islam yang lebih banyak daripada yang biasa dimiliki kaum muslimin. Biasanya terapi dengan pendekatan keagamaan tersebut dapat berhasil dengan baik. Pengobatan kejiwaan dengan pendekatan agama Islam juga akan berhasil dengan baik meskipun penderita beragama lain atau orang yang tidak beragama sekalipun, asal saja didahului dengan pembicaraan sekedarnya mengenai agama. WHO telah menyempurnakan batasan sehat dengan menambahkan satu elemen spiritual (agama) sehingga sekarang ini yang dimaksud dengan sehat adalah tidak hanya sehat dalam arti fisik, psikologik, dan sosial, tetapi juga sehat dalam arti spiritual (agama) sehingga dimensi sehat menjadi Biopsikososialspiritual.

b. Penanganan psikologis

Secara umum langkah-langkah penanganan psikologis yang dapat diambil ialah membantu klien dan keluarganya memahami jenis penyakit skizofrenia dan

faktor-faktor pencetusnya, apakah akibat kejadian traumatis, sikap permusuhan, menyediakan sumber daya untuk menghadapi tantangan emosional, dan mengajarkan keterampilan komunikasi kepada klien dan anggota keluarganya.

c. Terapi Kognitif

Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut. Terapi ini juga bertujuan untuk meningkatkan aktivitas, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan serta meningkatkan keterampilan sosial (Syisnawati, 2011). Terdiri dari beberapa sesi yakni 5 sesi.

d. Terapi perilaku

- 1) Ajarkan klien untuk memiliki rasa percaya diri.
- 2) Bantu klien untuk menghilangkan pola pikir yang salah, waham, dan halusinasinya.
- 3) Bantu klien untuk menghilangkan kecemasannya.
- 4) Fokuskan pada konsekuensi perilaku disfungsional dan cara-cara mengubahnya.
- 5) Ajarkan klien untuk belajar dalam keterampilan sosial atau aktivitas sehari-hari.
- 6) Ajarkan klien untuk berkomunikasi

- 7) Ajarkan kepada klien untuk memiliki ekspresi afeksi
- 8) Gunakan sistem penghargaan untuk menguatkan perilaku yang diinginkan sesuai dengan hak-hak pribadinya.

e. Terapi kelompok

- 1) Fokuskan pada keterampilan kehidupan sehari-hari
- 2) Ajarkan cara-cara mengelola stresor lingkungan.
- 3) Ajari klien dalam membina hubungan interpersonal.
- 4) Bantu klien untuk mengembangkan rasa percaya diri.
- 5) Berikan interaksi yang bersifat mendukung dan memberikan umpan balik langsung kepada klien.
- 6) Menyediakan tempat bagi klien untuk mengekspresikan perasaannya dan membicarakan masalah-masalahnya.
- 7) Hadirkan kesempatan untuk memberikan dan menerima dukungan kepada klien.

f. Terapi Keluarga

- 1) Fokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang struktur dan fungsi sistem keluarga
- 2) Membantu keluarga untuk bisa bersikap mendukung dan merawat penderita tanpa menjadi *over protective*.
- 3) Anjurkan kejujuran dalam mengekspresikan perasaan.

- 4) Tingkatkan cara-cara efektif dalam mengatasi perasaan negatif dan konflik keluarga
- 5) Klarifikasi pembatasan dan peran keluarga
- 6) Diskusikan kebutuhan sosial dalam berbagai kesempatan.

g. Latihan Keterampilan Sosial

Langkah-langkah yang dapat diambil yaitu :

- 1) Dapat dilakukan dengan membuat setting rumah sakit atau lingkungan sosial, misalnya dengan memberikan suasana lingkungan yang aman, terstruktur, dan kondusif.
- 2) Mengajarkan keterampilan sosial, seperti mengurus diri sendiri, mandi, dan makan.
- 3) Mengajarkan keterampilan vokasional kepada klien
- 4) Dukung kemampuan klien dalam membuat keputusan
- 5) Tingkatkan aktivitas-aktivitas yang mampu mengalihkan delusi atau halusinasi klien.
- 6) Tingkatkan pengontrolan terhadap perilaku agresivitasnya.

h. Penggunaan obat-obatan


Memberikan obat-obat neuroleptik yang dapat membantu klien dalam menjernihkan pikiran dan menghilangkan delusi dan halusinasi. Terapi dengan pemakaian obat-obatan harus konsisten agar efektif. Dosis yang

inkonsisten akan memperberat gejala yang sudah ada dan menciptakan gejala psikotik yang baru (Pieter, 2011).

8. Prognosis

Walaupun remisi penuh atau sembuh pada skizofrenia itu ada, kebanyakan orang mempunyai gejala sisa dengan keparahan yang bervariasi. Secara umum 25% individu sembuh sempurna, 40% mengalami kekambuhan, dan 35% mengalami perburukan. Sampai saat ini belum ada metode yang dapat memprediksi siapa yang akan menjadi sembuh siapa yang tidak, tetapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya seperti: usia tua, faktor pencetus jelas, onset akut, riwayat sosial, gejala depresi, menikah, riwayat keluarga gangguan mood, sistem pendukung baik dan gejala positif ini akan memberikan prognosis yang baik sedangkan onset muda, tidak ada faktor pencetus onset ini tidak jelas, riwayat sosial buruk, *autistic*, tidak menikah, riwayat keluarga skizofrenia, sistem pendukung buruk, gejala negatif, riwayat trauma prenatal, tidak remisi dalam 3 tahun, sering kambuh dan riwayat agresif akan memberikan prognosis yang buruk (Kurnia, Farida Yan Pratiwi, 2015).

D. Kerangka Konsep



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Quasy-experimental dengan menggunakan rancangan penelitian *One-Group Pre-Post Test Design*. Pada penelitian ini kelompok subjek diobservasi sebelum dilakukan intervensi, kemudian diobservasi kembali setelah dilakukan intervensi. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari skema berikut :

Subjek	Pre	Perlakuan	Post-tes
K	O	I	O1
	Waktu 1	Waktu 2	Waktu 3

Keterangan :


K : Subjek (Klien Skizofrenia)

O : Observasi kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum intervensi

I : Intervensi

O1 : Observasi kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah intervensi

B. Kerangka Kerja



C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Mangasa Makassar dengan pertimbangan banyaknya pasien yang menderita Skizofrenia di lokasi tersebut.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 21 Maret 2016 – 21 April 2016.

E. Populasi dan sampel

1. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh klien dengan kasus Skizofrenia yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar yaitu sebanyak 92 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah klien Skizofrenia yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Besar sampel penelitian ditentukan dengan rumus (Nursalam, 2013) :

$$n = \frac{N}{1 + (d)^2}$$

Keterangan :

N : Besar populasi

n : Besar sampel

d : Tingkat kepercayaan ketetapan yang diinginkan (0.05)

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{92}{1 + 92(0.05)^2}$$

$$n = \frac{92}{6,75}$$

$$n = 13,62$$

$$n = 14$$

Jadi besar sampelnya adalah 14 orang

F. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Nonprobability Sampling*” dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti tujuan/masalah penelitian sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2013).

2. Teknik Inklusi dan eklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah :

- 1) Klien penderita Skizofrenia.
- 2) Klien penderita Skizofrenia, klien yang mampu berkomunikasi dengan baik (kooperatif).
- 3) Jenis kelamin laki – laki/perempuan.
- 4) Tidak sedang menjalani terapi jiwa meskipun sebelumnya pernah diberikan terapi jiwa oleh petugas kesehatan atau seorang peneliti.

b. Kriteria eksklusi

- 1) Klien Skizofrenia yang memiliki diagnosis keperawatan perilaku kekerasan.
- 2) Sedang mengalami kekambuhan
- 3) Pasien Skizofrenia yang tidak bersedia menjadi responden.

G. Identifikasi variabel

1. Variabel independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Terapi Kognitif.

2. Variable dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu klien Skizofrenia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak Puskesmas yang berhubungan dengan jumlah pasien yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar dalam hal ini rekam medik pasien Skizofrenia.

2. Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan menggunakan lembar kuesioner.

b. Instrumen

Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu buku kerja responden (penderita Skizofrenia) serta kuesioner dengan menggunakan *likert scale*. Responden diminta pendapatnya mengenai setuju atau tidak setuju terhadap hal. Pendapat ini dinyatakan dalam berbagai tingkat persetujuan (0-3) terhadap pernyataan yang disusun oleh peneliti. Dengan penilaian: Selalu = 0, Kadang-kadang = 1, Jarang = 2, Tidak Pernah = 3 (Pasaribu, 2012).

c. Prosedur

Responden yang akan diteliti, pada mulanya dilakukan *pre test* untuk mengetahui kemampuan klien dalam mengontrol pikiran negatif dengan menggunakan lembar kuesioner dengan *likert scale* untuk diisi oleh peneliti. Setelah itu diberikan terapi yaitu Terapi Kognitif. Terapi ini berlangsung dalam beberapa sesi. Setelah menyelesaikan sampai sesi terakhir, selanjutnya peneliti melakukan *post test* yaitu dengan mengisi kuesioner yang sama untuk mengetahui kemampuan klien dalam mengontrol pikiran negatif setelah dilakukan intervensi. Kuesioner tersebut diisi oleh peneliti dengan cara menanyakan kepada klien terkait isi kuesioner yang tersedia.

I. Pengolahan Data

Cara analisa data yang digunakan adalah Uji statistik non parametrik untuk mengetahui variabel independen dan dependen dengan tingkat kemaknaan $p < 0.05$. Selanjutnya membandingkan kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum dan sesudah diberikan intervensi yakni Terapi Kognitif pada responden. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui signifikansi

pengaruh pemberian Terapi Kognitif terhadap pasien Skizofrenia, analisis ini menggunakan program yang disebut dengan program SPSS.

Adapun tahap-tahap pengolahan datanya adalah sebagai berikut :

1. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian, serta konsistensi dari pengisian kuesioner.

2. Coding

Memberi kode jawaban responden sesuai dengan indikator pada kuesioner. Kode pada kuesioner terhadap pasien Skizofrenia yaitu Selalu (S), Kadang-Kadang (KK), Jarang (J) dan Tidak Pernah (TP).

3. Tabulating

Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

J. Analisa Data

1. Analisa Univariat

Analisa Univariat adalah proses menganalisis tiap-tiap variabel penelitian yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel.

2. Analisa Bivariat

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh atau untuk membuktikan hipotesis pengaruh variabel dianalisis dengan menggunakan uji statistik dengan bantuan program SPSS.

K. Etika Penelitian

Yurisa (2008), Etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun terdapat empat prinsip utama yang perlu dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*Respect For Human Dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (autonomy). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah: peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*Informed Consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian
- e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja

f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*Respect for Privacy and Confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau identification number) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*Respect for Justice and Inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian.

Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat.

Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*Balancing Harms and Benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia telah dilaksanakan sejak tanggal 21 Maret hingga 21 April 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Puskesmas Mangasa merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kota Makassar. Puskesmas mangasa terletak di Jalan Monumen Emmy Saelan Komp. BTN II Mangasa kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, kota Makassar. Luas wilayah kerja Puskesmas Mangasa yakni seluas 43.062 Km³.

Wilayah kerja Puskesmas Mangasa meliputi 3 kelurahan yakni, Kelurahan Gunung Sari, Kelurahan Mangasa, Kelurahan Mannuruki dengan jumlah penduduk 42.899 jiwa yang terdiri dari 22.848 jiwa laki-laki dan 20.052 jiwa perempuan. Jumlah rumah yang ada pada wilayah tersebut adalah sebanyak 8306 rumah dengan jumlah RT 142 dan RW sebanyak 29. Tenaga Kesehatan pada Puskesmas Mangasa terdiri dari Dokter Umum sebanyak 2 orang, Dokter Gigi 1 orang, Bidan 4 orang, Perawat 9 orang, Perawat Gigi 1 orang, Tenaga Kefarmasian 2 orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat 3 orang, Tenaga sanitasi 2 orang, serta Tenaga Gizi 2 orang.

Responden dalam penelitian ini adalah klien yang mengalami Skizofrenia dengan jumlah responden sebanyak 14 responden. Jenis penelitian ini merupakan

jenis penelitian *Quasy Eksperimental* dengan desain penelitian *One Group Pre Test Post Test*. Dalam penelitian ini, klien skizofrenia diberikan perlakuan berupa terapi kognitif sebanyak 5 sesi dan berlangsung selama 3 hari. Sesi pertama dan kedua dilakukan pada hari pertama, sesi ketiga dan keempat dilakukan pada hari kedua, sedangkan sesi kelima dilakukan pada hari ketiga. Antara pertemuan pertama, kedua, dan ketiga memiliki jeda waktu pertemuan masing-masing 1 hari. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada responden untuk berlatih secara mandiri di rumah masing-masing. Setiap sesi dilaksanakan selama ± 45 menit.

Sebelum diberikan terapi kognitif, pertama-tama responden dalam hal ini klien skizofrenia mengikuti *pre test* untuk mengetahui kemampuan mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia sebelum diberikan terapi kognitif. *Pre test* tersebut dilakukan dengan cara mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh peneliti. Kuesioner diisi oleh peneliti sesuai dengan jawaban yang diutarakan oleh responden. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan pemberian terapi kognitif. Pada sesi pertama: Mengidentifikasi pikiran otomatis negatif dan penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran negatif yang pertama, Sesi 2: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang kedua, Sesi 3: Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga, Sesi 4: Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif (ungkapan hasil dalam mengikuti terapi kognitif), dan Sesi 5: *Support system*. *Support system* pada sesi kelima tersebut ditujukan kepada anggota keluarga dari klien skizofrenia.

Setelah semua sesi telah selesai dilaksanakan, maka peneliti melakukan *post test* untuk mengetahui kemampuan mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia setelah dilakukan terapi kognitif. Apakah klien skizofrenia memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik atau buruk.

1. Karakteristik Responden

Karakteristik Responden menurut umur dibagi menjadi 4 klasifikasi yaitu kelompok umur remaja akhir (17-25 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok umur dewasa awal (26-35 tahun) sebanyak 6 responden (42,9%), kelompok dewasa akhir (36-45 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok lansia awal (46-55 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), dan kelompok lansia akhir (56-70 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%). Dan untuk distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 responden (57,1%), perempuan sebanyak 6 responden (42,9%). Selanjutnya distribusi responden berdasarkan status perkawinan didapatkan bahwa jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 1 orang (7,1%), yang belum menikah sebanyak 13 orang (92,9%). Sedangkan untuk distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/Sederajat sebanyak 6 orang (42,9%), SMP/Sederajat 1 orang (7,1%), dan SMA/Sederajat sebanyak 7 orang (50%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Status Perkawinan dan Pendidikan Terakhir

No	Karakteristik	Jumlah (f)	Presentase %	
1	Umur	Remaja Akhir (17-25)	2	14,3
		Dewasa Awal (26-35)	6	42,9
		Dewasa Akhir (36-45)	2	14,3
		Lansia Awal (46-55)	2	14,3
		Lansia Akhir (56-70)	2	14,3
		Total	14	100
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki	8	57,1
		Perempuan	6	42,9
		Total	14	100
3	Status Perkawinan	Menikah	1	7,1
		Belum Menikah	13	92,9
		Total	14	100
4	Pendidikan Terakhir	SD/Sederajat	6	42,9
		SMP/Sederajat	1	7,1
		SMA/Sederajat	7	50
		Total	14	100

Sumber Data Primer, 2016

1. Analisis Univariat

Tabel 4.2
Distribusi Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif klien Skizofrenia Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif

KMPN (Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif)	<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>	
	F	%	F	%
Baik	1	7,1	12	85,7
Buruk	13	92,9	2	14,3
Jumlah (n)	14	100	14	100

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa 92,9% klien Skizofrenia (13 responden) sebelum dilakukan terapi kognitif memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. Sedangkan 1 responden (7,1%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. Setelah dilakukan terapi kognitif, sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk.

Tabel 4.3
Rerata Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Sebelum dan Setelah Dilakukan Terapi Kognitif

	<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>SD</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>
<i>Pre-test</i>	8,86	9,00	2,143	6	14
<i>Post-test</i>	15,57	16.00	2.243	11	19

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa sebelum diberikan terapi kognitif skor kemampuan mengontrol pikiran negatif responden tertinggi adalah 14 sedangkan terendah adalah 6 dengan rata-rata skor untuk kemampuan mengontrol pikiran negatif sebesar 8,86. Setelah diberikan terapi kognitif skor tertinggi kemampuan mengontrol pikiran negatif responden adalah 19 dan terendah 11 dengan rata-rata skor untuk kemampuan mengontrol pikiran negatif sebesar 16.00.

2. Analisa Bivariat

Tabel 4.4
Hasil Uji Perbandingan Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif
Sebelum dan Setelah dilakukan Terapi Kognitif

Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (KMPN)	Skor KMPN				P
	Pre-test		Post-test		
	Mean	SD	Mean	SD	
Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif	8,86	2,143	15,57	2,243	0.001*

Keterangan: *uji wilcoxon

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa setelah dilakukan *uji wilcoxon* didapatkan nilai $p=0.001$ ($p<0.05$) yang berarti terdapat perbedaan bermakna kemampuan mengontrol pikiran negatif responden sebelum dilakukan Terapi Kognitif dengan kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah dilakukan Terapi Kognitif.

B. Pembahasan

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *Pre Eksperimental One Group Pre Test Post Test* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang timbul sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Maret-21 April 2016 di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang mengalami Skizofrenia yang ada di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Nonprobability Sampling*” dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara

populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti tujuan/masalah penelitian sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 14 responden.

Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini diantaranya: Klien penderita Skizofrenia, klien yang mampu berkomunikasi dengan baik (kooperatif), serta berjenis kelamin laki-laki/perempuan, dan tidak sedang menjalani terapi jiwa meskipun sebelumnya pernah diberikan terapi jiwa oleh petugas kesehatan atau seorang peneliti. Sedangkan untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah klien Skizofrenia yang memiliki diagnosa keperawatan dengan perilaku kekerasan, sedang mengalami kekambuhan serta klien yang tidak bersedia menjadi responden.

Dalam penelitian ini kelompok perlakuan diberi terapi kognitif selama 5 sesi dan berlangsung selama 3 hari. Sesi I dan II dilaksanakan pada hari pertama, sesi III dan IV dilaksanakan pada hari kedua sedangkan sesi V dilaksanakan pada hari ketiga. Setiap sesi dilakukan selama ±45 menit. Namun, sebelum dilakukan terapi terlebih dahulu dilakukan sebuah *pre test* untuk mengetahui kemampuan mengontrol pikiran negatif klien. Pada akhir sesi juga dilakukan hal yang sama yaitu *post test* untuk kembali mengukur kemampuan mengontrol pikiran negatif klien Skizofrenia setelah diberikan perlakuan yakni Terapi Kognitif. Cara mengukur kemampuan mengontrol pikiran negatif tersebut yaitu dengan menggunakan sebuah alat ukur yakni kuesioner yang diambil dari penelitian terdahulu yang dibuat oleh Jesica Pasaribu pada tahun 2012. Kuesioner tersebut berisi 8 pertanyaan dengan distribusi

pertanyaan: 7 pertanyaan negatif dan 1 pertanyaan positif. Jumlah skor dalam kuesioner tersebut sebanyak 24 dengan teknik penilaian buruk jika skornya berjumlah 1-12 dan dikatakan baik jika skornya 13-24.

Setelah semua hasil penelitian telah terkumpul, kemudian dilakukan penyuntingan data, pengkodean data, dan entri data ke dalam *master table*. Data tersebut kemudian diolah menggunakan *software statistic*. Hasil pengolahan disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Shapiro wilk*, didapatkan bahwa data karakteristik responden untuk kelompok umur berdistribusi normal dengan $p=0,053$, namun untuk data jenis kelamin $p=0,000$, status perkawinan $p=0,000$, dan untuk pendidikan terakhir $p=0,000$ tidak berdistribusi normal sehingga dilakukan transformasi data pada karakteristik responden tapi pada hasil uji normalitas didapatkan bahwa data yang disajikan masih berdistribusi tidak normal. Selain karakteristik responden, uji normalitas juga dilakukan pada kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum (*pre test*) dan setelah (*post test*) nilai $p<0,05$ hasil yang di dapatkan adalah skor kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum perlakuan (*pre test*) $p=0,159$ sehingga $p>0,05$ namun untuk *post test* $p=0,016$ sehingga $p<0,05$ (belum berdistribusi normal) . Hasil pengolahan disajikan ke dalam tabel frekuensi dan distribusi serta penjelasan dalam bentuk narasi.

1. Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini distribusi frekuensi berdasarkan umur yakni, kelompok umur remaja akhir (17-25 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok umur dewasa awal (26-35 tahun) sebanyak 6 responden (42,9%), kelompok dewasa akhir (36-45 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), kelompok lansia awal (46-55 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%), dan kelompok lansia akhir (56-70 tahun) sebanyak 2 responden (14,3%). Dari data tersebut responden terbanyak berada dalam kelompok dewasa awal, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masdar. J (2005) dalam Amiruddin (2010) bahwa ada hubungan antara umur dengan kejadian skizofrenia. Gangguan jiwa skizofrenia, umur <40 tahun lebih berisiko dibandingkan dengan kelompok umur >40 tahun.

Usia remaja dan dewasa muda memang berisiko tinggi karena tahap kehidupan ini penuh stresor. Kondisi penderita sering terlambat disadari keluarga dan lingkungannya karena dianggap sebagai bagian dari tahap penyesuaian diri. Psikosis Involusional terjadi pada penderita wanita sekitar umur 40 tahun dan laki-laki 50 tahun. Diperkirakan bahwa pada umur tersebut kelenjar-kelenjar endokrin dan kelenjar-kelenjar reproduktif mulai mengalami penurunan dari fungsinya. Bagaimana penurunan fungsi ini menjadi penyebab dari timbulnya psikosa tidak diketahui dengan pasti. Namun jelas bahwa implikasi-implikasi psikologis yang timbul adalah sangat penting. Hilangnya fungsi-fungsi biologis dan mulainya proses ketuaan

dengan segala konsekwensinya adalah lebih penting dari pengaruh endokrin tersebut dalam memberikan penekanan terhadap kepribadian.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa kelompok jenis kelamin laki-laki sebanyak 8 responden (57,1%), perempuan sebanyak 6 responden (42,9%). Budiana Keliat (1999) dalam Amiruddin (2010), Laki-laki memiliki perbedaan dalam banyak hal termasuk kebiasaan. Hubungan sosial, pengaruh lingkungan dan segi-segi lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Gangguan jiwa jenis skizofrenia pada laki-laki tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dan tuntutan hidup sebagai pencari kerja dan pembiayaan kerja keluarganya dituntut untuk bekerja keras sementara lapangan pekerjaan sulit didapatkan (Amiruddin, 2010).

Selanjutnya distribusi responden berdasarkan status perkawinan didapatkan bahwa jumlah responden yang sudah menikah sebanyak 1 orang (7,1%), yang belum menikah sebanyak 13 orang (92,9%). Dari data tersebut terlihat perbedaan jumlah penderita Skizofrenia dengan status perkawinan, pada data tersebut 92,9% penderita Skizofrenia belum menikah dan 7,1% atau 1 dari 14 penderita Skizofrenia telah menikah. Sejumlah penelitian telah membahas tentang hubungan antara status perkawinan terhadap skizofrenia. Diantaranya ada yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Status perkawinan dengan awitan Skizofrenia.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Fakhari *et all* dalam Anugrah (2014), yang menyatakan ada perbedaan bermakna antara status perkawinan terhadap kejadian gangguan jiwa skizofrenia ($p < 0,001$). Status marital perlu untuk pertukaran ego ideal dan identifikasi perilaku antara suami dan istri menuju tercapainya kedamaian. Adanya perbedaan jumlah antara dua variabel ini terutama dari kelompok yang belum menikah diasumsikan karena faktor stressor sosial dimana banyak penderita yang mengatakan bahwa mereka ingin menikah tetapi terhambat oleh masalah ekonomi ataupun oleh masalah lainnya. Sebaliknya, penderita yang mengalami skizofrenia sejak usia remaja juga akan sulit untuk kemudian mendapatkan pasangan hidup karena status gangguan jiwa yang disandangnya (Anugrah, 2014). Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Amiruddin (2010), mengatakan bahwa Status perkawinan berhubungan dengan kejadian gangguan jiwa skizofrenia ($p = 0,044 < 0,05$, $\phi = 0,15$).

Sedangkan untuk distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir didapatkan jumlah responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/Sederajat sebanyak 6 orang (42,9%), SMP/Sederajat 1 orang (7,1%), dan SMA/Sederajat sebanyak 7 orang (50%). Pada penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pada analisis bivariat Erlina dkk tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara status pendidikan terhadap timbulnya skizofrenia dan non skizofrenia ($p > 0,05$). Jadi status pendidikan tidak mempunyai pengaruh terhadap timbulnya skizofrenia, tetapi tergantung kapan onset terjadinya gangguan tersebut (Anugrah, 2014).

2. Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Klien Skizofrenia Sebelum Dilakukan Terapi Kognitif

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh hasil bahwa rata-rata responden yang berjumlah 13 orang (92,9%) pada masing-masing kelompok perlakuan berada pada kategori buruk dalam mengontrol pikiran negatif. Sedangkan 1 responden (7,1%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. Seluruh responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah klien skizofrenia. Klien Skizofrenia yang memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk beresiko untuk mengalami kecemasan, depresi atau bahkan bunuh diri karena adanya tekanan mental yang berasal dari pemikiran-pemikiran negatif yang mengganguya.

Beberapa klien Skizofrenia yang menjadi responden pada penelitian ini mengungkapkan bahwa terkadang ketika mereka memiliki sebuah masalah yang menjadi beban pikiran, mereka cenderung ingin menceritakan masalah mereka kepada anggota keluarga namun disisi lain mereka takut untuk bercerita kepada anggota keluarganya dikarenakan mereka merasa bahwa ketika mereka menceritakan permasalahan mereka kepada anggota keluarganya maka anggota keluarganya akan terbebani dengan masalah tersebut sehingga klien skizofrenia akan lebih memilih memendam masalah mereka sendiri dan kadang masalah tersebut pada akhirnya tidak dapat mereka atasi.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan juga didapatkan bahwa dari beberapa responden terdapat beberapa klien skizofrenia yang memiliki anggota keluarga yakni

bapak/ibu yang cenderung cuek dengan kondisi anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. Bahkan dalam beberapa kasus terdapat anggota keluarga skizofrenia yang justru sering memberikan penilaian negatif terhadap anggota keluarganya yang menderita skizofrenia. Hal inilah yang justru bisa menjadi faktor yang mendasari penderita skizofrenia ini tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya terkait pemikiran-pemikiran negatif yang sering mengganggunya. Sehingga membuat klien skizofrenia ini memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. Jadi anggota keluarga yang seharusnya bisa menjadi *support system* untuk klien skizofrenia sehingga masalah-masalah yang dihadapi dan mengganggu pikiran dari klien skizofrenia itu sendiri bisa diatasi. Varcarolis (2009) dalam Pasaribu (2012), mengungkapkan bahwa adanya *Support System* sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah dengan coping yang lebih adaptif.

3. Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Setelah Dilakukan Terapi Kognitif

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah dilakukan Terapi Kognitif, sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. Dengan memberikan terapi kognitif sebanyak 5 sesi dan dilakukan selama 3 hari maka kemampuan mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia dapat menjadi meningkat/baik. Dalam pelaksanaan terapi kognitif dimana sesi pertama dan kedua dilaksanakan pada hari pertama, sesi ketiga dan keempat

dilaksanakan pada hari kedua dan sesi kelima dilaksanakan pada hari ketiga dimana pada sesi terakhir ini anggota keluarganya yang akan memberikan peran yang lebih untuk menjadi *support system* bagi anggota keluarganya yang menderita skizofrenia.

Sesuai tujuan dari terapi kognitif yakni mampu memonitor pikiran otomatis yang negatif, mengenali hubungan antara kognitif, afek dan perilaku, mengkoreksi penyebab dari pikiran otomatis yang negatif, mengganti interpretasi ke arah yang lebih realita akibat pemikiran yang salah, dan belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan yang salah akibat pengalamannya yang negatif (Beck, dkk, 1987; Townsend, 2009).

Dalam pelaksanaan terapi, masing-masing responden perlakuan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam menjalani terapi. Sebagian besar responden memiliki sikap antusias dalam mengikuti setiap rangkaian proses terapi kognitif terutama responden yang masuk dalam kategori remaja akhir dan dewasa awal. Sedangkan untuk responden yang masuk dalam kategori dewasa akhir, lansia awal, dan lansia akhir cenderung lambat dalam memahami penjelasan yang diberikan sehingga peneliti harus mengulangi setiap penjelasan untuk lebih memberikan pemahaman pada responden agar responden dapat mengerti dan dapat mengikuti proses terapi dengan baik. Namun, secara umum responden yang ikut berpartisipasi dalam proses terapi ini mampu mengikuti proses terapi kognitif dengan baik.

Setiap akhir pertemuan, peneliti selalu kembali mengingatkan klien skizofrenia untuk berlatih dan mengisi buku panduan terapi jika sedang memikirkan

hal-hal negatif yang mengganggu. Selain itu, peneliti juga selalu mengingatkan kepada anggota keluarga yang mendampingi untuk selalu membantu klien skizofrenia baik hanya untuk sekedar mengingatkan untuk berlatih atau membantu klien skizofrenia memecahkan setiap masalah yang mereka pikirkan.

Dalam proses terapi, rata-rata responden masih memiliki pikiran negatif yang dipikirkan pada sesi I dan II (hari pertama) meskipun responden mengatakan bahwa mereka selalu berlatih saat dirumah. Namun, pada sesi terakhir yakni sesi V rata-rata responden mengatakan bahwa pikiran negatif mereka mulai berkurang intensitas kemunculannya dan mereka merasa senang saat mampu mengontrol pikiran negatif mereka. Namun ada juga responden yang merasa belum berhasil dan masih selalu berpikir negatif meskipun sudah berlatih.

Pemikiran-pemikiran negatif yang muncul pada klien Skizofrenia saat diberikan terapi beraneka ragam, ada yang mengungkapkan masalah tentang dirinya yang mungkin tidak dapat menikah karena kondisi mereka yang berdiagnosis Skizofrenia, ada yang mengungkapkan tentang masalah keluarga yang membuat mereka merasa tidak berdaya (tidak berguna), ada juga yang mengungkapkan tentang ketakutan mereka ditinggal oleh orangtua atau saudara dan lain-lain.

Dalam proses terapi kognitif, pada sesi keempat dan kelima rata-rata responden mengungkapkan bahwa mereka merasa senang setelah diberikan terapi kognitif. Beberapa responden juga sudah mulai terbuka dengan anggota keluarga serta memiliki motivasi dan dorongan yang lebih untuk menyelesaikan setiap

permasalahan mereka. Keluarga yang ikut berpartisipasi dalam terapi juga mengungkapkan bahwa mereka merasa sedikit terbantu dengan terapi yang diberikan kepada anggota keluarganya. Jadi, efek yang ditimbulkan oleh pemberian terapi kognitif ini yakni secara tidak langsung selain dapat meningkatkan kemampuan mengontrol pikiran negatif klien skizofrenia juga mampu untuk meningkatkan motivasi, rasa senang dan rasa terbuka dalam memecahkan setiap permasalahan yang setiap saat dipikirkan oleh klien skizofrenia.

Sehubungan dengan proses pelaksanaan terapi yang hanya berlangsung selama 3 hari dan setiap pertemuan memiliki jeda waktu atau selisih waktu 1 hari dengan pertemuan selanjutnya. Namun didapatkan bahwa semua responden tidak ada yang mampu menghilangkan pikiran negatifnya secara permanen. Namun mereka hanya berhasil dalam mengurangi intensitas kemunculan dari pikiran negatif mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa, pemikiran-pemikiran negatif pada klien skizofrenia ini dapat hilang jika pelaksanaan terapi berlangsung lebih lama lagi.

Penelitian terkait terapi kognitif juga telah dilakukan oleh Kismanto (2014), mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan kondisi depresi sesudah pelaksanaan terapi kognitif yang menunjukkan bahwa penurunan kondisi depresi pada kelompok lansia yang mendapatkan terapi kognitif (kelompok intervensi) lebih tinggi ($p \text{ value} = 0.001 < 0.05$) dibandingkan dengan penurunan kondisi depresi pada kelompok yang tidak mendapatkan terapi kognitif (kelompok kontrol). Pada

kelompok yang mendapat terapi kognitif dilakukan pertemuan sebanyak 2 sesi dalam rentang waktu 1 minggu dengan jumlah responden sebanyak 26.

Penelitian yang dilakukan oleh Safara dkk (2012) yang menyatakan bahwa terapi kognitif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan depresi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safara dkk ini, terapi yang diberikan berlangsung selama 14-16 sesi terhadap siswa perempuan dengan kisaran umur 18-45 tahun yang dipilih dari pusat konseling di India. Namun, pada penelitian ini, peneliti menggabungkan antara terapi kognitif dan terapi spiritual dalam menurunkan depresi. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin lama terapi kognitif diberikan, maka kemungkinan untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu juga besar.

4. Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif klien Skizofrenia

Dari hasil analisis dengan menggunakan *Uji Wilcoxon* diperoleh *value* 0,001 dengan demikian berdasarkan analisis tersebut dapat dilihat bahwa $p < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien Skizofrenia.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa setelah dilakukan Terapi Kognitif, sebanyak 12 responden (85,7%) memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik sedangkan 2 responden (14,3%) masih memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang buruk. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Jesica Pasaribu pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa terapi kognitif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien kanker yang dirawat di Rumah Sakit. Penelitian terkait terapi kognitif juga telah dilakukan oleh Widodo (2013) yang menyatakan bahwa terapi kognitif memiliki pengaruh terhadap tingkat depresi seseorang, dimana kondisi depresi sebelum dan sesudah pemberian terapi kognitif ($p\ value < 0,05$).

Penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tujuan dari terapi kognitif mampu memonitor pikiran otomatis yang negatif, mengenali hubungan antara kognitif, afek dan perilaku, mengkoreksi penyebab dari pikiran otomatis yang negatif, mengganti interpretasi ke arah yang lebih realita akibat pemikiran yang salah, dan belajar untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan yang salah akibat pengalamannya yang negatif (Beck, dkk, 1987; Townsend, 2009).

Semua manusia pasti pernah, bahkan acapkali mengalami masalah-masalah yang dapat membuat manusia semakin dewasa, matang, dan cerdas bila dihadapi dengan *positive thinking*. Namun bila *negative thinking* yang digunakan, masalah dapat membawa petaka. Disinilah pentingnya *positive thinking* dalam menghadapi setiap masalah. Bagi orang yang berpikir positif, setiap masalah selalu ada solusi. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya (Hidayati, 2010). Orang-orang yang senantiasa berpikir positif akan mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar, sehingga ia tetap menjaga kesehatan dan kecerdasan emosional secara

seimbang. Mereka tidak akan membiasakan diri larut dalam kekecewaan dan kemarahan berkepanjangan (Asmani, 2009:2; Hidayati, 2010).

Pada penelitian ini diharapkan bahwa setelah diberikan Terapi Kognitif klien Skizofrenia mampu memiliki kemampuan mengontrol pikiran negatif yang baik. Setiap pemikiran negatif yang dirasakan mengganggu atau membuat klien cemas dapat berkurang atau bahkan tidak muncul lagi dan dapat digantikan dengan pemikiran-pemikiran yang positif dan membuat klien skizofrenia memiliki semangat/optimisme yang baik dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Limono (2013), menyatakan bahwa terapi kognitif mampu meningkatkan optimisme. Penelitian ini berlangsung sebanyak 5 sesi dan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan.

Pikiran negatif akan melahirkan energi-energi negatif yang tentunya sangat membahayakan daripada apa yang kita bayangkan. Ia merangkai hidup ini menjadi mata rantai penderitaan. Pada dasarnya, pikiran negatif muncul dari jiwa yang labil atau jiwa yang memiliki stabilitas spiritual yang kurang baik. Kemudian, pikiran tersebut berulang-ulang sehingga menjadi sebuah gagasan yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dipikirkannya. Dan disanalah energi negatif sama seperti candu yang dapat menarik perilaku-perilaku negatif yang lainnya. Segala sesuatu yang ada didunia ini dimulai dari sebuah pikiran, kemudian menjadi sebuah rencana yang akan direalisasikan dengan tindakan nyata, hingga akhirnya terciptalah sebuah kenyataan (Afifi, 2000).

Rasa sedih, kecewa, marah, takut dan lain-lain adalah sesuatu yang sebenarnya muncul dari *setting* dan pola pikir yang telah terbentuk. Begitu pula sebaliknya, rasa bahagia, senang, gembira, berharga, dicintai, dan lain-lain merupakan hasil dari pola berpikir dan *setting* dari pikiran yang telah terbentuk. Individu yang menginginkan hidupnya bahagia, tentunya harus membentuk pola pikirnya menjadi pola pikir yang positif. Artinya proses kognitif memainkan peran sangat penting dalam mengatur kecemasan dan kebahagiaan pada seseorang (Butler & Mathews, 2004). Selain itu, proses berpikir sangatlah penting karena berhubungan dengan perilaku dan berbagai keberhasilan hidup seseorang (Lyubomirsky dkk, 2005; Schweingruber, 2006, Rusydi, 2012).

Pada penderita Skizofrenia yang memiliki pemikiran-pemikiran negatif setelah dilakukan terapi kognitif maka pemikiran-pemikiran negatif yang sebelumnya sering terlintas dalam pikirannya akan berkurang intensitas kemunculannya atau bahkan hilang (tidak pernah) terlintas kembali. Jika pada penderita Skizofrenia memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif dan tidak mampu untuk dikendalikan maka hal tersebut bisa menyebabkan penderita Skizofrenia mengalami tekanan mental dan tidak menutup kemungkinan penderita Skizofrenia memilih untuk bunuh diri. Dalam Islam pun kita dilarang untuk berprasangka atau berpikir negatif tentang sesuatu hal ataupun terhadap orang lain.

Allah swt. berfirman dalam QS.al-Hujuraat/49:12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ ... (١٢)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa (Kementerian Agama RI).

MacLeod (2005) dalam Rusydi (2012), telah banyak penelitian yang menemukan bahwa pola berpikir negatif memiliki banyak dampak buruk pada psikologis manusia. Salah satunya adalah pola berpikir negatif dapat menyebabkan rasa tidak punya harapan hidup (*hopelessness*), sehingga rasa tidak punya harapan ini dapat berakibat pada perilaku bunuh diri. Penelitian yang dilakukan oleh Peden dan koleganya menemukan bahwasanya berpikir negatif dapat menjadi mediator antaranya rendahnya *self-esteem* dengan simptom-simptom depresi dan *stressor* kronis. Karena itu, dalam penerapannya lebih penting mengintervensi pikiran negatif dari pada mengintervensi stres (Peden, 2004; Rusydi, 2012).

Beberapa dokter percaya bahwa depresi adalah bagian dari proses skizofrenia itu sendiri. Orang dengan skizofrenia memiliki risiko untuk bunuh diri sebesar 10% (Anugrah, 2014). Bunuh diri adalah penyebab umum kematian diantara penderita Skizofrenia, 50% penderita skizofrenia pernah mencoba bunuh diri satu kali seumur hidupnya, dan 10% dari populasi tersebut berhasil melakukannya. Faktor risiko bunuh diri adalah adanya gejala depresi (Muhyi, 2010).

Rusydi (2012), Agama Islam menjelaskan bahwa prasangka, keyakinan, dan pola pikir individu sangatlah berpengaruh terhadap realitas kehidupan individu tersebut. Islam sangat menghargai kepribadian yang optimistik, sebagaimana dalam sebuah Hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah berfirman: 'Aku selalu tergantung prasangka hamba-Ku terhadap-Ku'"* (HR. Bukhari no.6951).

Dalam hadis lain juga dijelaskan tentang larangan berpikir/berprasangka negatif/buruk. Hadis tersebut sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ كَذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: *"Jauhilah prasangka sebab prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara"* (HR. Bukhari no.6229).

Husn al-zhann (berpikir positif) merupakan cara berpikir yang sangat dihargai dalam Islam. Karena dengan berpikir positif manusia akan terbebas dari

beban hidup dan dari pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah dialami. Karena itu agama Islam sangat mementingkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-sehari, khususnya bersikap berpikir positif terhadap Allah (Rusyidi, 2012).

Hal yang sama diutarakan oleh Shyh (2012), Berpikir negatif secara signifikan akan menambah variasi-variasi unik pada depresi, stres kecemasan, rendahnya kepuasan hidup, dan rendahnya kebahagiaan. Sebaliknya, berpikir positif secara besar dan signifikan dapat menambah variasi unik pada kebahagiaan dan kepuasan hidup (Rusyidi, 2012).

Latifa (2010), Salah satu faktor penyebab terjadinya skizofrenia adalah karena faktor religius dimana dalam kenyataan sehari-hari banyak orang yang tidak berhasil dalam mencapai kebahagiaan di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Akibatnya kegagalan dan ketidakharmonisan manusia mencapai yang diinginkannya, maka ia akan dihinggapi oleh rasa kecewa, khawatir, dan rasa takut tidak akan berhasil dalam usaha apapun akibatnya ada di antara mereka yang berkeluh kesah, bimbang, dan rasa cemas yang mendalam. Keadaan seperti itu banyak terjadi yang tidak hanya pada orang-orang tertentu saja tetapi dapat terjadi pada siapapun termasuk penderita Skizofrenia karena sifat manusia sering gelisah dan berkeluh kesah. Namun jika rasa gelisah dan cemas yang mendalam tersebut terus berlanjut hingga dapat membuat tekanan yang hebat dalam individu maka akan berdampak buruk nantinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perasaan cemas, gelisah itu dapat berasal dari pemikiran-pemikiran yang negatif.

Dengan mengurangi ferkuensi berpikir negatif, hal ini seakan dapat menjadi *antidepresan* bagi orang-orang yang sedang mengalami tekanan mental. Orang yang berpikir positif akan dapat merasa lebih rileks dan dapat mengontrol stres dengan lebih baik. Fava (1996) dalam Rusyidi (2012), Orang yang selalu berpikir negatif tentunya akan berakibat pada tekanan jiwanya.

Dalam Surah Al-Inshirah/94:1-8

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا
لَكَ ذِكْرَكَ (٤) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧)
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ (٨)

Terjemahnya:

Bukankah kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)? Dan kami telah menghilangkan untukmu bebanmu. Yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan padamu sebutan namamu. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan. Kerjakanlah urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap (Kementerian Agama RI).

Dalam ayat diatas, kata (نَشْرَحَ) *nasyrah* terambil dari kata (شَرَحَ) *syaraha* yang

antara lain berarti memperluas, melapangkan. Bila diartikan secara non-imaterial mengandung makna membuka, memberi pemahaman, menganugrahkan ketenangan, dan semaknanya. Ayat diatas berbicara tentang kelapangan dada dalam pengertian immaterial yang dapat menghasilkan kemampuan menerima dan menemukan kebenaran, hikmah, dan kebijaksanaan, serta kesanggupan menampung bahkan memaafkan kesalahan dan gangguan-gangguan orang lain (Shihab, 2007).

Sedangkan ayat kelima dan keenam diatas menyatakan bahwa jika engkau telah mengetahui dan menyadari berapa besar anugerah Allah itu, maka dengan demikian, menjadi jelas pula bahwa sesungguhnya bersama atau sesaat sesudah kesulitan ada kemudahan yang besar, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan yang besar (Shihab, 2007). Jadi setiap manusia hendaknya tidak merasa putus asa dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebab sesudah kesulitan ada kemudahan, cukup kita hanya berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Hendaknya kita tidak berpikiran negatif dan hanya berpikir positif terhadap setiap hal yang menghampiri kita sehingga perasaan kecewa, cemas, depresi atau putus asa tidak menghampiri kita. Khususnya pada klien Skizofrenia agar tidak terjadi kekambuhan yang bisa saja berakibat pada bunuh diri. Karena setiap penyakit ada obatnya. Seperti sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, "*Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla*" (HR Muslim 7/21).

C. Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, setiap responden diberikan sebuah buku kerja yang nantinya akan diisi oleh klien saat sedang melakukan terapi kognitif langsung oleh peneliti atau saat pemikiran-pemikiran negatif muncul saat sesi terapi telah selesai. Sebagian besar dari responden tidak mengisi buku kerja sendiri, sehingga peneliti

yang menuliskan setiap *point* yang harus dituliskan pada buku kerja tersebut. Namun setiap hal yang dituliskan oleh peneliti dibaca kembali untuk memperjelas apa yang telah disebutkan oleh klien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didapatkan bahwa rata-rata kemampuan mengontrol pikiran negatif sebelum dilakukan terapi kognitif adalah sebesar 8,86 dengan skor kemampuan mengontrol pikiran negatif responden tertinggi adalah 14 sedangkan terendah adalah 6.
2. Didapatkan bahwa rata-rata kemampuan mengontrol pikiran negatif setelah dilakukan terapi kognitif adalah sebesar 15,57 dengan skor tertinggi kemampuan mengontrol pikiran negatif responden adalah 19 dan terendah adalah 11.
3. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *Wilcoxon Signed Test* pada sampel penelitian menunjukkan bahwa nilai $p=0,001$ ($p<0,05$) berarti terdapat perbedaan yang bermakna kemampuan mengontrol pikiran negatif responden sebelum dan sesudah diberikan terapi kognitif. Hal ini berarti bahwa hipotesis pada penelitian diterima yakni terdapat pengaruh terapi kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif pada klien skizofrenia. Sehingga, terapi ini bisa menjadi salah satu alternatif bagi seseorang yang mengalami skizofrenia untuk dapat mengontrol pikiran negatif yang dimiliki agar pikiran negatif dapat berkurang atau bahkan hilang dan klien skizofrenia mampu memiliki pemikiran positif dalam dirinya sehingga mampu mencegah

kekambuhan, menyakiti diri sendiri atau bahkan mencoba bunuh diri akibat dari pemikiran negatif yang dapat menimbulkan tekanan mental.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi alternatif terapi yang digunakan untuk mampu mengontrol pemikiran negatif bagi penderita Skizofrenia. Khususnya bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan Skizofrenia sekiranya dapat menjadi *Support System* bagi klien Skizofrenia agar kekambuhan dan resiko untuk bunuh diri dapat dicegah.

2. Bagi Puskesmas

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan sebagai terapi tambahan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita Skizofrenia dan kedepannya dapat dijadikan sebagai program rutin puskesmas untuk memberikan terapi kognitif bagi klien Skizofrenia serta agar anggota keluarga mampu ikut/berpartisipasi menjadi *Support System* bagi klien Skizofrenia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih jauh tentang pengaruh terapi kognitif pada pasien Skizofrenia penelitian ini bisa dijadikan dasar dengan menggunakan sampel yang lebih besar atau dalam pemilihan sampel yang digunakan memiliki kelompok kontrol sehingga hasil yang didapatkan lebih

akurat atau dapat meneliti penyebab atau determinan faktor yang mempengaruhi kejadian Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar.

- b. Pada penggunaan Buku Kerja, sebaiknya lebih dimaksimalkan penggunaannya agar lebih efektif atau melakukan modifikasi buku kerja untuk lebih meningkatkan motivasi responden untuk mengisi buku kerja yang telah diberikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Afifi, Jhon. "Mengubah Energi Negatif Menjadi Positif Dalam Diri". Naskah Presentasi.

Amiruddin. "Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gangguan Jiwa Skizofrenia Di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara". *Tesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2010.

Anugrah, Anastanio D. "Karakteristik Penderita Skizofrenia Yang Di Rawat Inap Di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode Januari–Mei 2013". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, 2014.

Arisandy, Widya dan Meita Ismalinda. "Hubungan Peran Keluarga dengan Kepatuhan Minum Obat pada Pasien Skizofrenia di Poliklinik Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar". *Skripsi*, Palembang: Akademi Keperawatan 'Aisyiyah Palembang, 2014.

Asmani, Jamal Ma'mur. *The Law Of Positive Thinking*. Yogyakarta: Gara Ilmu, 2009

Beck, J.S. *Cognitive Therapy: Basic and Beyond*. New York: The Guilford Press, 1995.

Fava, M., dkk. "Hostility Changes Following Antidepressant Treatment: Relationship to Stress and Negative Thinking. *Journal of Psychiatric Research*, 1996.

Hidayati, Arini. "Pengaruh *Positive Thinking* Terhadap Kemampuan Menyelesaikan Masalah (*Problem Solving*) Pada Siswa Kelas II Madrasah Aliyah Ma'arif Cepogo, Boyolali". *Skripsi*. Boyolali: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2010.

Hidayat, Cepi. "Hubungan Masalah Psikososial dengan Kejadian Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Cibeber Kota Cimahi". *Skripsi*. Cimahi: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Luhur, 2013.

Kaplan & Sadock. *Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Psikiatri Klinis Jilid*. Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2007.


Kementerian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Kemenkes RI, 2013.

Kismanto, Joko. "Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Perubahan Kondisi Depresi Lansia Di Panti Wreda Darma Bakti Kasih Surakarta". *Jurnal*. Surakarta: STIKes Kusuma Husada Surakarta, 2014.

- Kristyaningsih, T. "Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Harga Diri dan Kondisi Depresi pada Penderita Gagal Ginjal Kronik di Ruang Haemodialisa RSUP Fatmawati Jakarta". *Tesis*, Jakarta: 2009.
- Kurnia, Farida Yan Pratiwi. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekambuhan pada Pasien Skizofrenia di Poli Psikiatri RSD dr. Soebandi Jember". *Skripsi*. Jember: Fakultas Kedokteran, 2015.
- Kustiawan, Ridwan. Karakteristik Klien Harga Diri Rendah (HDR) Kronik dan Karakteristik Keluarga yang Merawatnya di Kota Tasikmalaya. *Skripsi*, Tasikmalaya.
- Latifa, Reninta. "Proses Bimbingan Islam pada Penderita Skizofrenia di Panti Rehabilitasi Cacat Mental Yayasan Galuh Bekasi". *Skripsi*. Bekasi: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Limono, Sedy. "Terapi Kognitif dan Relaksasi untuk Meningkatkan Optimisme Pensiunan Universitas X". *Skripsi*, Surabaya: Universitas Surabaya, 2013.
- Lyubomirsky, S., dkk. "The Benefits of Frequent Positive Affect: Does Happiness Lead to Success?". *Psychological Bulletin*, Volume. 131, No. 6, 803–855, 2005.
- Mahendra, Adi, Dkk. "Pengaruh Terapi Spiritual Tri Sandya Terhadap Perubahan Gejala Halusinasi Pendengaran pada Pasien Skizofrenia di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali". *Skripsi*. Bali: STiKes Wira Medika PPNI Bali, 2014.
- Maramis, W.F. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Surabaya: Erlangga Universitas Press, 2009.
- Mark, Durank dan David H. Barlow. *Essential of Abnormal*. USA, 2007.
- Maryatun, Sri. "Peningkatan Kemandirina Perawatan Diri Pasien Skizofrenia Melalui Rehabilitasi Terapi Gerak". *Skripsi*. Palembang: Fakultas Kedokteran, 2013.
- MacLeod, A.K. "Hopelessness and Positive and Negative Future Thinking in Parasuicide". *British Journal of Clinical Psychology*, Volume 44, Issue 4, 495–504, 2005.
- Muhyi, Ahmad. "Prevalensi Penderita Skizofrenia Paranoid dengan Gejala Depresi di RSJ dr. Soeharto Heerdjan Jakarta". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2011.

- Nurkholisoh. "Pelaksanaan Terapi bagi Pasien Skizofrenia di Madani Mental Health Care Jakarta Timur". *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2009.
- Pasaribu, Jesika. "Pengaruh Terapi Kognitif dan Terapi Penghentian Pikiran Terhadap Perubahan Ansietas, Depresi dan Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif Klien Kanker di RS Dharmais Jakarta". *Tesis*, Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2012.
- Peden, A.R. "Negative Thinking and the Mental Health of Low-Income Single Mothers". *Journal of Nursing Scholarship*, Volume 36, Issue 4, 337–344, 2004.
- Pieter, Herri Zan, dkk. *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Prabowo, Eko. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta: Numed, 2014.
- Puri, B.K, dkk. *Buku Ajar Psikiatri, Ed. 2*. Jakarta: EGC, 2013.
- Riskesdas, Kemenkes RI. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Jakarta, 2013.
- Rusydi, Ahmad. *Husn Al-Zhann: Konsep Berpikir Positif Dalam Perspektif Psikologi Islam Dan Manfaatnya Bagi Kesehatan Mental*. *Disertasi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2012.
- Safara, Maryam, dkk. "Comparing The Effect Of Cognitive Therapy And Spiritual Therapy On Depression Between Iranian Students Residing In Iran And India". *Article*, Iran, 2012.
- Schweingruber, D. "Success Through A Positive Mental Attitude?: The Role of Positive Thinking in Door-to-Door Sales". *The Sociological Quarterly*, Volume 47, Midwest Sociological Society, 41–68, 2006.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____ *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, vol. 15*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shyh ,Shin Wong. *Negative Thinking Versus Positive Thinking in A Singaporean Student Sample: Relationships with Psychological Well-Being and Psychological Maladjustment*. 2012.
- Suerni, Titik. "Penerapan Terapi Kognitif dan Psikoedukasi Keluarga pada Klien Harga Diri Rendah di Ruang Yudistira Rumah Sakit Dr.H. Marzoeki Mahdi Bogor". *Skripsi*, Bogor: Fakultas Ilmu Keperawatan, 2013.

- Suryani. "Mengenal gejala dan penyebab gangguan jiwa". Makalah (Seminar Nasional). Bandung: BEM Psikologi UNJANI, 2013.
- Syisnawati. Keperawatan Jiwa. Makassar: Alauddin Universitas Press, 2011
- Townsend, T.C. *Psychiatry Mental Health Nursing*, 6th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2009.
- Varcarolis, Elizabeth M., dan Halter. *Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing*, 4th ed. Philadelphia: F.A. Davis Company, 2009.
- Videbeck, S.L. *Psychiatric Mental Health Nursing*. Philadelphia: Lippicont Williams & Wilkins, 2006.
- Widodo. "Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Perubahan Kondisi Depresi Pasien Gagal Ginjal Kronik". *Skripsi*, Surakarta: Politeknik Kesehatan Surakarta Jurusan Keperawatan, 2013.
- Yosep, H. Iyus dan Titin Sutini. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Bandung: Refika Aditama, 2016.





L
A
M
P
I
R
A
N

LAMPIRAN I

PENJELASAN DAN INFORMASI

Kepada Bapak / Ibu yang saya hormati,

Saya atas nama Andi Rahmayani adalah mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, akan melakukan penelitian tentang: **Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif terhadap klien Skizofrenia.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Terapi Kognitif terhadap kemampuan mengontrol pikiran negatif. Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan setelah diberi terapi pada pasien Skizofrenia yang menunjukkan kemampuan dalam mengontrol pikiran negatif yang muncul sehingga dapat memiliki pikiran yang positif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa sesi, yakni sebanyak 5 sesi dan dilaksanakan selama 3 kali pertemuan. Sesi 1 dan 2 dilaksanakan pada pertemuan pertama, sedangkan sesi 3 dan 4 dilaksanakan pada pertemuan kedua dan sesi 5 dilaksanakan pada akhir pertemuan.

Untuk keperluan penelitian ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada bapak / ibu. Dengan ikut sertanya bapak / ibu dalam penelitian ini, tidak akan ada resiko apapun terhadap bapak / ibu. Segala keterangan yang saya dapat dari bapak / ibu akan tetap saya rahasiakan.

Demikian keterangan yang dapat saya berikan dan atas kesediaannya mengikuti penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih.

LAMPIRAN II

PERNYATAAN PERSETUJUAN (*INFORMED CONSENT*)

Saya yang bertandatangan di bawah ini (Diisi oleh Peneliti):

Nama (inisial) :
Umur :
Alamat :
Jenis Kelamin :



Setelah mendapat penjelasan mengenai penelitian tersebut, saya menyatakan: **BERSEDIA** untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengetahui bahwa segala hal mengenai diri saya akan tetap dirahasiakan sesuai dengan kode etik profesi keperawatan begitupun dengan kode etik penelitian.

Peneliti

Makassar,

Subjek Penelitian

Andi Rahmayani

(.....)

NIM : 70300112028

LAMPIRAN III

DATA RESPONDEN

No. Responden:

1. Nama :

2. Usia :

3. Jenis Kelamin :

Laki-laki

Perempuan

4. Pendidikan Terakhir:

SD

SMP

SMA

PT

5. Status Perkawinan :

Menikah

Tidak Menikah (Janda/duda, belum menikah)



LAMPIRAN IV

LEMBAR KUESIONER

(Diisi oleh Peneliti)

Likert Scale

No Respoden:

Berilah tanda silang () pada salah satu pilihan:

NO	PERNYATAAN	S	KK	J	TP
		0	1	2	3
1.	Pikiran negatif masih saja mengganggu saya				
2.	Saya tidak mengendalikan pikiran negatif				
3.	Saya masih merasa sedih karena tidak mampu menghilangkan pikiran negatif				
4.	Saya berhasil mengontrol pikiran dan saya merasa lebih nyaman				
5.	Menurut saya, mengontrol pikiran negatif tidak dapat mengurangi kecemasan dan kesedihan saya				
6.	Saya mengalami kesulitan dalam				

	mengendalikan pikiran yang mengganggu				
7.	Saya merasa takut terhadap pikiran negatif saya				
8.	Jika pikiran negatif tidak segera diatasi maka akan membuat saya tidak nyaman				

PENILAIAN:

- S : Selalu = 0
 KK : Kadang-kadang = 1
 J : Jarang = 2
 TP : Tidak Pernah = 3



LAMPIRAN V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TERAPI KOGNITIF

A. Definisi

Terapi kognitif adalah terapi jangka pendek yang teratur, yang memberikan dasar berpikir pada klien untuk mengekspresikan perasaan negatifnya, memahami masalahnya serta mampu mengatasi perasaan negatifnya dan mampu memecahkan masalah tersebut.

B. Tujuan

1. Mengidentifikasi pikiran otomatis yang negatif.
2. Menggunakan tanggapan rasional dalam mengatasi pikiran otomatis negatif yang muncul
3. Mengungkapkan manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis yang negatif
4. Mendapatkan dukungan dari keluarga dalam membantu klien
5. Meningkatkan kemampuan merubah pikiran negatif.

C. Indikasi

Pasien yang menderita penyakit Skizofrenia dan bersedia diberikan Terapi Kognitif.

D. Kontraindikasi

Pasien yang mengalami kekambuhan penyakit.

E. Persiapan

3. Persiapan pasien
 - a. Salam terapeutik
 - b. Jelaskan prosedur tindakan kepada klien/keluarga.
 - c. Atur posisi pasien nyaman mungkin agar pasien mampu mendengarkan penjelasan dengan baik.
4. Persiapan alat
 - a. Alat Tulis
 - b. Buku kerja *CT*

F. Prosedur Pelaksanaan Terapi Kognitif

Sebelum melakukan terapi terlebih dahulu peneliti mengisi kuesioner yang telah disiapkan untuk mengetahui bagaimana kemampuan mengontrol pikiran negatif klien Skizofrenia.

- 1 Tahap Orientasi
 - a. Salam terapeutik
 - i. Perkenalkan nama dan nama panggilan peneliti (pakai papan nama)
 - ii. Menanyakan nama dan panggilan klien
 - b. Evaluasi / Validasi
 - 1) Menanyakan perasaan klien pada saat ini

- 2) Menanyakan apa yang sudah dilakukan klien untuk mengatasi perasaannya.
- c. Kontrak
- 1) Menjelaskan pengertian dan tujuan terapi, yaitu meningkatkan kemampuan klien mengenal pikiran otomatis dan hal yang mendasari pemikiran tersebut.
 - 2) Menjelaskan tentang proses pelaksanaan, tugas-tugas yang harus dikerjakan klien di rumah, buku kerja yang akan digunakan klien dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - 3) Menjelaskan jumlah pertemuan dan sesi-sesi dalam terapi.
 - 4) Menjelaskan bahwa pertemuan pertama berlangsung selama kurang lebih 45 – 60 menit.
 - 5) Menjelaskan peraturan terapi, yaitu klien duduk dengan peneliti berhadapan dari awal sampai selesai.
- d. Tahap Kerja
- 1) Peneliti mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien
 - 2) Diskusikan sumber masalah, perasaan klien serta hal yang menjadi penyebab timbulnya masalah.
 - 3) Diskusikan pikiran-pikiran otomatis yang negatif tentang dirinya.
 - 4) Minta klien untuk mencatat semua pikiran otomatis yang negatif pada lembar pikiran otomatis negatif yang terdapat dalam buku catatan harian klien.
 - 5) Bantu klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif yang paling mengganggu klien dan ingin diselesaikan saat ini.
 - 6) Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif dengan memberi tanggapan positif (rasional) berupa aspek-aspek positif yang dimiliki klien dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional.
 - 7) Latih klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien untuk melawan pikiran-pikiran otomatis yang negatif dengan cara:
Minta klien untuk mengingat dan mengatakan pikiran otomatis negatif.
 - 8) Minta klien untuk mengatakan aspek positif dalam (tentang) dirinya untuk melawan pikiran otomatis negatif tersebut.
 - a) Lakukan kedua hal tersebut diatas minimal 3 kali
 - b) Evaluasi perasaan klien setelah melakukan latihan ini
 - c) Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif tersebut.
 - d) Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain.
 - e) Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien.

- e. Tahap Terminasi.
1. Evaluasi
 - a. Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi sesi pertama ini.
 - b. Peneliti memberikan pujian yang sesuai.
2. Tindak Lanjut
 - a. Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara
 - b. melawan pikiran otomatis yang negatif dengan aspek positif yang dimiliki klien dan melakukan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif tersebut.
 - c. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi apakah pikiran otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif tersebut
 - d. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi pertama ini dan minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya
 - e. Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif pertama yang belum diidentifikasi dalam pertemuan pertama ini dan mencatatnya dalam buku catatan hariannya.

SESI 2 : Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran negatif kedua. Sesi kedua dilanjutkan setelah sesi I.

A. Tujuan

1. Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif pertama yang telah didiskusikan sebelumnya (Sesi1).
2. Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif kedua yang akan diselesaikan dalam pertemuan kedua ini.
3. Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif kedua dan menuliskannya di lembar/buku catatan harian.
4. Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pikiran otomatis yang timbul.
5. Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis lainnya.

B. Langkah Kegiatan

1. Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis kedua untuk didiskusikan dalam pertemuan ini.
2. Menjelaskan tujuan pertemuan kedua ini adalah meningkatkan kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang kedua.
3. Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit. Sama dengan sesi I.

4. Mengingat kembali peraturan terapi yaitu klien duduk dengan peneliti berhadapan dari awal sampai selesai.
 5. Diskusikan dengan klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif kedua yang ingin diselesaikan dalam pertemuan kedua ini.
 6. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan cara yang sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negative yang pertama yaitu dengan memberi tanggapan positif (aspek-aspek positif yang dimiliki klien) dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional.
 7. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif pasien dalam melawan pikiran otomatis negatif keduanya dengan cara yang sama seperti sesi pertama.
 8. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif keduanya tersebut.
 9. Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain.
 10. Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien.
- C. Tahap Terminasi
- a. Evaluasi
 - 1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi.
 - 2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai.
 - b. Tindak lanjut
 - 1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan aspek positif yang dimiliki pasien dan melakukan tindakan pasien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif kedua tersebut.
 - 2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif kedua tersebut.
 - 3) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi kedua ini dan minta pasien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya.
 - 4) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif kedua yang belum diidentifikasi dalam pertemuan kedua ini dan mencatatnya dalam buku catatan hariannya.
 - c. Kontrak yang akan datang
 - 1) Menyepakati topik pertemuan yang akan datang (sesi ketiga dan keempat), yaitu mengevaluasi kemampuan klien dalam melaksanakan tugasnya, berdiskusi untuk penyelesaian terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga.
 - 2) Menyepakati waktu dan tempat.

D. Evaluasi dan Dokumentasi

1. Evaluasi
 - a. Ekspresi klien pada saat terapi.
 - b. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi.
2. Dokumentasi

Sesi 3 : Penggunaan tanggapan rasional terhadap pikiran negatif ketiga (Hari kedua)

A. Tujuan

1. Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional dan pembuatan catatan harian terhadap pikiran otomatis negatif sebelumnya (Sesi 1 dan 2).
2. Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif ketiga yang akan diselesaikan dalam pertemuan ketiga ini.
3. Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif ketiga dan menuliskannya di lembar/buku catatan harian.
4. Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pikiran otomatis yang timbul.
5. Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis lainnya.

B. Setting tempat

Klien dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman.

C. Alat

1. Alat tulis
2. Buku kerja klien

D. Metode

Diskusi dan tanya jawab

E. Langkah Kegiatan

1. Persiapan
 - a. Mengingat kontrak dengan klien.
 - b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif.
2. Tahap Orientasi
 - a. Salam terapeutik
Salam dari peneliti kepada klien.
 - b. Evaluasi Validasi
 - 1) Menanyakan perasaan dan kondisi klien pada saat ini.
 - 2) Menanyakan apakah klien telah melakukan latihan secara mandiri di rumah.
 - 3) Menanyakan apakah pikiran otomatis negatif pertama dan kedua masih muncul, waktu atau situasi munculnya pikiran otomatis tersebut, pikiran otomatis negatif yang baru, dan tanggapan rasional yang lainnya.

- 4) Menanyakan apakah klien telah mencoba berlatih mandiri dalam menyelesaikan masalah dan membuat catatan harian di rumah. Peneliti melihat buku catatan harian klien.
 - 5) Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis ketiga untuk didiskusikan dalam pertemuan ini.
- 3 Kontrak
- a. Menjelaskan tujuan pertemuan kedua ini adalah meningkatkan kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga.
 - b. Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit.
 - c. Mengingatkan kembali peraturan terapi yaitu pasien duduk dengan peneliti berhadapan dari awal sampai selesai.
- 4 Tahap Kerja
- a. Evaluasi kemampuan dan hambatan klien dalam membuat catatan harian di rumah.
 - b. Diskusikan dengan klien untuk memilih satu pikiran otomatis negatif ketiga yang ingin diselesaikan dalam pertemuan ketiga ini
 - c. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif kedua dengan cara yang sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negatif yang pertama dan kedua yaitu dengan memberi tanggapan positif (aspek-aspek positif yang dimiliki klien) dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional.
 - d. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien dalam melawan pikiran otomatis negatif keduanya dengan cara yang sama seperti sesi pertama dan kedua.
 - e. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatifnya.
 - f. Motivasi klien berlatih untuk pikiran otomatis yang lain.
 - g. Memberikan pujian terhadap keberhasilan klien.
- 5 Tahap Terminasi
- a. Evaluasi
 - 1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi
 - 2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai
 - b. Tindak lanjut
 - 1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan pikiran otomatis negatif ketiga dengan aspek positif yang dimiliki klien dan melakukan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif ketiga tersebut.
 - 2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif ketiga tersebut.

- 3) Mengajukan klien untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi ketiga ini dan minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya.
- 4) Mengajukan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif ketiga yang belum diidentifikasi dalam pertemuan kedua ini dan mencatatnya dalam buku catatan hariannya.

F. Evaluasi dan Dokumentasi

1. Evaluasi
Ekspresi klien pada saat terapi.
2. Dokumentasi

Sesi 4 : Manfaat tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif. Sesi keempat dilanjutkan setelah sesi ketiga selesai.

A. Tujuan

1. Evaluasi kemampuan klien dalam memberi tanggapan rasional dan pembuatan catatan harian terhadap pikiran otomatis yang negatif pertama, kedua dan ketiga tentang dirinya yang telah didiskusikan sebelumnya.
2. Klien mampu memilih pikiran otomatis negatif yang akan diselesaikan dalam pertemuan ini.
3. Klien mampu memberikan tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif tentang dirinya dan menuliskannya di lembar tanggapan rasional dalam buku catatan harian klien.
4. Klien mampu meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pikiran otomatis yang timbul.
5. Klien mampu menuliskan kembali pembuatan catatan harian terkait dengan penyelesaian masalah dalam mengatasi pikiran otomatis negatif lainnya.
6. Klien dapat memberi tanggapan (perasaan) terhadap pelaksanaan terapi kognitif di rumah.
7. Klien dapat mengungkapkan hambatan yang ditemui dalam membuat catatan harian.
8. Klien dapat mengungkapkan hasil dan manfaat dalam mengikuti terapi kognitif.
9. Klien dapat meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan pikiran-pikiran otomatis negatif yang timbul.

B. Setting Tempat

Klien dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman

C. Alat

1. Alat tulis
2. Buku kerja klien

D. Metode

Diskusi dan tanya jawab.

E. Langkah Kegiatan

1. Persiapan
 - a. Mengingatnkan kontrak dengan klien.
 - b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif.
2. Tahap Orientasi
 - a. Salam Terapeutik : Salam dari peneliti kepada klien
 - b. Menanyakan apakah klien telah mengidentifikasi pikiran otomatis ketiga untuk didiskusikan dalam pertemuan ini.
 - c. Kontrak
 - 1) Menjelaskan tujuan pertemuan dari sesi keempat ini, yaitu meningkatkan kemampuan pasien dalam memberi tanggapan rasional terhadap pikiran otomatis negatif yang ketiga dan mengungkapkan hasil atau manfaat dalam mengikuti terapi.
 - 2) Menjelaskan lama kegiatan yaitu 30 – 45 menit.
 - 3) Mengingatnkan kembali peraturan terapi yaitu pasien duduk dengan peneliti berhadapan dari awal sampai selesai.
3. Tahap Kerja
 - a. Diskusikan pikiran otomatis negatif keempat yang ingin diselesaikan dalam pertemuan ini
 - b. Diskusikan cara melawan pikiran otomatis negatif keempat dengan cara yang sama seperti dalam melawan pikiran otomatis negatif yang pertama/dua/ketiga yaitu dengan memberi tanggapan positif (aspek-aspek positif yang dimiliki klien) dan minta klien mencatatnya dalam lembar tanggapan rasional.
 - c. Latih kembali klien untuk menggunakan aspek-aspek positif klien dalam melawan pikiran otomatis negatifnya dengan cara yang sama seperti sesi pertama/dua/ketiga.
 - d. Tanyakan tindakan klien yang direncanakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif keempatnya tersebut.
 - e. Diskusikan perasaan klien setelah menggunakan tahapan-tahapan dalam memberikan tanggapan rasional (melawan pikiran-pikiran otomatis yang negatif) dan beri umpan balik.
 - f. Diskusikan manfaat tanggapan rasional yang dirasakan klien dalam menyelesaikan pikiran otomatis yang timbul.
 - g. Tanyakan apakah cara tersebut dapat menyelesaikan masalah yang timbul karena pikiran otomatisnya.
 - h. Tanyakan hambatan yang dialami klien dalam memberi tanggapan rasional dan menyelesaikan masalahnya.
 - i. Diskusikan cara mengatasi hambatan.
 - j. Anjurkan pasien untuk mengungkapkan hasil yang diperoleh selama mengikuti pertemuan-pertemuan dalam terapi.
 - k. Beri reinforcement positif terhadap kemampuan klien

4. Tahap Terminasi
 - a. Evaluasi
 - 1) Peneliti menanyakan perasaan klien setelah menjalani terapi
 - 2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai
 - b. Tindak Lanjut
 - 1) Menganjurkan klien untuk berlatih di rumah tentang cara melawan pikiran otomatis negatif keempat dengan aspek positif yang dimiliki pasien dan melakukan rencana tindakan untuk mengatasi pikiran otomatis negatif ketiga tersebut.
 - 2) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi di rumah apakah pikiran otomatis negatif yang telah didiskusikan masih muncul dalam pemikirannya dan catat waktu/situasi timbulnya pikiran negatif keempat tersebut.
 - 3) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi pikiran-pikiran otomatis negatif lainnya yang belum diidentifikasi dalam sesi keempat ini dan minta klien untuk mencatatnya dalam buku catatan hariannya.
 - 4) Menganjurkan klien untuk mengidentifikasi aspek-aspek positif lainnya dalam menanggapi pikiran otomatis negatif keempat yang belum diidentifikasi dalam pertemuan ini dan mencatatnya dalam buku catatan hariannya.
 - c. Kontrak yang akan datang
 - 1) Menyepakati topik pertemuan yang akan datang (sesi kelima), yaitu mengevaluasi kemampuan pasien dalam melaksanakan tugasnya, berdiskusi bersama keluarga untuk mendapatkan dukungan keluarga dalam melakukan terapi kognitif secara mandiri di rumah.
 - 2) Menyepakati waktu dan tempat.
- F. Evaluasi dan Dokumentasi
 1. Evaluasi
 - a. Ekspresi klien pada saat terapi
 - b. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi
 2. Dokumentasi

Sesi 5 : *Support system* (Pertemuan ketiga)

- A. Tujuan
 - 1) Meningkatkan komunikasi peneliti dengan klien dan keluarga.
 - 2) Klien mendapat dukungan (*support system*) dari keluarga.
 - 3) Keluarga dapat menjadi support sistem bagi klien.
- B. Setting

Klien, keluarga dan peneliti dalam suatu ruangan yang tenang dan nyaman
- C. Alat
 1. Alat tulis
 2. Buku kerja

D. Metode

Diskusi dan tanya jawab

E. Langkah Kegiatan

1. Persiapan

- a. Mengingat kontrak dengan pasien dan keluarga.
- b. Mempersiapkan alat dan tempat yang kondusif.

2. Tahap Orientasi

a. Salam terapeutik

Salam dari peneliti kepada klien dan keluarga

b. Evaluasi / Validasi

- 1) Menanyakan perasaan pasien dan keluarga pada saat ini.
- 2) Menanyakan apakah klien sudah membuat catatan harian (kegiatan) dalam upaya untuk mengatasi pikiran otomatis dan perasaannya.

c. Kontrak

- 1) Menjelaskan tujuan pertemuan kelima ini, yaitu keluarga dapat memberikan dukungan bagi pasien dalam melakukan terapi kognitif secara mandiri di rumah.
- 2) Menjelaskan pengertian dan tujuan terapi kepada keluarga, yaitu meningkatkan kemampuan pasien dalam mengatasi pikiran-pikiran otomatis (negatif) dan cara penyelesaian masalah yang timbul akibat pikiran otomatis tersebut.
- 3) Menjelaskan lama kegiatan yaitu 45 – 60 menit
- 4) Menjelaskan peraturan terapi yaitu klien dan keluarga duduk dengan peneliti berhadapan dari awal sampai selesai.

3. Tahap Kerja

- a. Jelaskan pada keluarga tentang pengertian, tujuan dan manfaat terapi kognitif bagi klien.
- b. Jelaskan pada keluarga tentang pelaksanaan terapi kognitif yang telah dilakukan pasien termasuk pembuatan catatan hariannya.
- c. Minta klien untuk menjelaskan pada keluarga tentang pikiran-pikiran negatif yang dirasakan, cara mengatasi/melawan pikiran tersebut, pembuatan catatan harian, dan manfaat hasil yang dirasakan pasien dalam menjalani terapi kognitif.
- d. Libatkan keluarga dalam mengidentifikasi perilaku klien sebelum, selama dan sesudah mengikuti terapi kognitif.
- e. Diskusikan dengan keluarga kemampuan yang telah dimiliki pasien.
- f. Anjurkan keluarga untuk siap mendengarkan masalah-masalah (pikiran-pikiran negatif) yang dialami klien.
- g. Libatkan keluarga dalam diskusi untuk membantu penyelesaian masalah yang telah dilakukan klien.
- h. Beri reinforcement positif terhadap kemampuan klien dan keluarga.

4. Tahap Terminasi

a. Evaluasi

- 1) Peneliti menanyakan perasaan klien dan keluarga setelah menjalani terapi.
- 2) Peneliti memberikan pujian yang sesuai.

b. Tindak Lanjut

- 1) Menganjurkan pada keluarga untuk dapat menerima dan merawat klien di rumah.
- 2) Membuat kesepakatan dengan keluarga untuk dapat menjadi *support system* bagi klien.

F. Evaluasi dan Dokumentasi

a. Evaluasi

- 1) Ekspresi klien dan keluarga pada saat terapi
- 2) Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian tujuan terapi

b. Dokumentasi



LAMPIRAN VI



PIKIRAN NEGATIF

Tanggal	No	Daftar Pikiran Negatif	Pikiran Negatif (Yang dipilih/tanggal)
		 <p data-bbox="279 1185 735 1218">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p data-bbox="196 1234 828 1331">ALAUDDIN</p> <p data-bbox="279 1347 735 1380">M A K A S S A R</p>	

PIKIRAN NEGATIF

Tanggal	No	Daftar Pikiran Negatif	Pikiran Negatif (Yang dipilih/tanggal)
		 <p data-bbox="1253 1185 1709 1218">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</p> <p data-bbox="1170 1234 1802 1331">ALAUDDIN</p> <p data-bbox="1253 1347 1709 1380">M A K A S S A R</p>	

CARA AKU MELAWAN PIKIRAN NEGATIFKU

No :
Pikiran Negatifku :


Tanggal	No	Cara Aku Melawan
		 <p data-bbox="300 1218 849 1421">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN M A K A S S A R</p>

CARA AKU MELAWAN PIKIRAN NEGATIFKU

No :
Pikiran Negatifku :

Tanggal	No	Cara Aku Melawan
		 <p data-bbox="1284 1218 1833 1421">UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN M A K A S S A R</p>

CATATAN HARIANKU

Hari/ Tgl Jam	Pikiran Negatifku	Cara Aku Melawan	Hasil
			

CATATAN HARIANKU

Hari/ Tgl Jam	Pikiran Negatifku	Cara Aku Melawan	Hasil
			

LAMPIRAN VII

DOKUMENTASI PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



LAMPIRAN VIII

MASTER TABLE

NAMA (inisial)	Umur	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Pendidikan Terakhir	Skor Pre Test	Skor Post Test
Nn.I	3	2	1	3	1	2
Nn.A	1	2	1	1	1	1
Tn. D	4	1	1	3	1	2
Tn.S	2	1	1	3	1	1
Tn.T	2	1	1	3	1	2
Tn.O	5	1	1	1	1	2
Ny. S	5	2	1	1	1	2
Tn.M	4	1	1	1	1	2
Tn.A	2	1	2	2	2	2
Nn.R	3	2	1	1	1	2
Tn.H	2	1	1	3	1	2
Ny.A	2	2	1	1	1	2
Nn.S	1	2	1	3	1	2
Tn.R	2	1	1	3	1	2

Jenis Kelamin

L : 1
P : 2

Umur

Remaja Akhir (17-25 tahun) : 1
Dewasa Awal (26-35 tahun) : 2
Dewasa Akhir (36-45 tahun) : 3
Lansia Awal (46-55 tahun) : 4
Lansia Akhir (56-70 tahun) : 5

Pendidikan Terakhir

SD : 1
SMP : 2
SMA : 3

Kemampuan mengontrol pikiran negatif

1-12 (Buruk) : 1
13-24 (Baik) : 2

Status Perkawinan

Belum Menikah : 1
Sudah Menikah : 2

LAMPIRAN IX

HASIL PENELITIAN (UJI SPSS)

Distribusi Frekuensi

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Remaja Akhir (17-25)	2	14.3	14.3	14.3
Dewasa Awal (26-35)	6	42.9	42.9	57.1
Dewasa Akhir (36-45)	2	14.3	14.3	71.4
Lansia Awal (46-55)	2	14.3	14.3	85.7
Lansia Akhir (56-70)	2	14.3	14.3	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Jenis Kelamin Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	8	57.1	57.1	57.1
Perempuan	6	42.9	42.9	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Status Perkawinan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Belum Menikah	13	92.9	92.9	92.9
Menikah	1	7.1	7.1	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD/Sederajat	6	42.9	42.9	42.9
SMP/Sederajat	1	7.1	7.1	50.0
SMA/Sederajat	7	50.0	50.0	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Tingkat Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Buruk	13	92.9	92.9	92.9
Valid Baik	1	7.1	7.1	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Tingkat Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Buruk	2	14.3	14.3	14.3
Valid Baik	12	85.7	85.7	100.0
Total	14	100.0	100.0	

Uji Normalitas Distribusi Responden

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur Responden	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
Jenis Kelamin Responden	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
Status Perkawinan Responden	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
Pendidikan Terakhir Responden	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
Umur Responden	Mean	2.71	.354	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	1.95	
		Upper Bound	3.48	
	5% Trimmed Mean	2.68		
	Median	2.00		
	Variance	1.758		
	Std. Deviation	1.326		
	Minimum	1		

Jenis Kelamin Responden	Maximum		5		
	Range		4		
	Interquartile Range		2		
	Skewness		.613	.597	
	Kurtosis		-7.717	1.154	
	Mean		1.43	.137	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		1.13	
		Upper Bound		1.73	
	5% Trimmed Mean		1.42		
	Median		1.00		
	Variance		.264		
	Std. Deviation		.514		
	Minimum		1		
	Maximum		2		
	Range		1		
	Interquartile Range		1		
	Skewness		.325	.597	
Kurtosis		-2.241	1.154		
Mean		1.07	.071		
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		.92		
	Upper Bound		1.23		
5% Trimmed Mean		1.02			
Median		1.00			
Variance		.071			
Std. Deviation		.267			
Minimum		1			
Maximum		2			
Range		1			
Interquartile Range		0			
Skewness		3.742	.597		
Kurtosis		14.000	1.154		
Mean		2.07	.267		
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound		1.50		
	Upper Bound		2.65		
5% Trimmed Mean		2.08			
Median		2.50			
Variance		.995			
Std. Deviation		.997			
Pendidikan Terakhir Responden					

Minimum		1	
Maximum		3	
Range		2	
Interquartile Range		2	
Skewness		-.161	.597
Kurtosis		-2.219	1.154

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur Responden	.276	14	.005	.877	14	.053
Jenis Kelamin Responden	.369	14	.000	.639	14	.000
Status Perkawinan Responden	.534	14	.000	.297	14	.000
Pendidikan Terakhir Responden	.324	14	.000	.689	14	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Normalitas Skor KMPN (Pre-test dan Post-test)

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test)	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%

Descriptives

			Statistic	Std. Error
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)	Mean		8.86	.573
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	7.62	
		Upper Bound	10.09	
	5% Trimmed Mean		8.73	

	Median	9.00	
	Variance	4.593	
	Std. Deviation	2.143	
	Minimum	6	
	Maximum	14	
	Range	8	
	Interquartile Range	3	
	Skewness	.981	.597
	Kurtosis	1.137	1.154
	Mean	15.57	.600
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound 14.28 Upper Bound 16.87	
	5% Trimmed Mean	15.63	
	Median	16.00	
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test)	Variance	5.033	
	Std. Deviation	2.243	
	Minimum	11	
	Maximum	19	
	Range	8	
	Interquartile Range	2	
	Skewness	-1.135	.597
	Kurtosis	1.158	1.154

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)	.188	14	.196	.910	14	.159
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test)	.290	14	.002	.840	14	.016

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Wilcoxon Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (*Pre-test* dan *Post-Test*)

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) - Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	14 ^b	7.50	105.00
	Ties	0 ^c		
	Total	14		

- a. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) < Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)
- b. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) > Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)
- c. Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) = Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)

Test Statistics ^a	
	Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Post Test) - Skor Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif (Pre Test)
Z	-3.315 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Alamat: Jl. Tadjul Mulana, A. Makassar, Sulawesi Selatan, 90911

Nama : **IRVYANGI, Rizka**
 Jenis : **Fisik**
 No : **Pemeriksaan dan Penelitian**

Lokasi : **14 Maret 2014**

Kepada Yth,
 Gubernur Sulawesi Selatan
 Di Rumah RTT RST, BORMO Provinsi Sulawesi Selatan

Id -
 Makassar

Assalamualaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian studi mahasiswa program studi kefarmasian Fakultas
 Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar maka kami
 mohon pertimbangan Bapak / Ibu untuk memvalidasi dan menyetujui yang tertera di bawah
 ini guna memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Nama	Rizka Irvyangi
NPM	703000100004
Alamat	Buana, Makassar
Waktu Penelitian	16 Maret 2014 - 14 April 2014
Program Studi	Farmasi
Judul	Pengaruh Terapi Fisioterapi Terhadap Kemampuan Mengontrol UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Daerah Penelitian	1. Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Gowa 2. Kecamatan Selayar, Kabupaten Selayar

Demiikian Harapan Kami Atas Perhatian Dan Arahan yang kami harapkan dengan baik.

Rt. Dehari,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 STS by Alauddin Makassar



Dr. Nur Hidayat, S.Pd., M.Pd., M.Hum
 NIP. 19510401196403001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
 Telp +62811 - 3615807 Fax +62811 - 3615807

Email : Korlap@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, Maret 2016.

Nomor : 070 / 1443 / 2016 / KORLAP
 Sifat : Informasi
 Perihal : Info Penelitian

Kepada
 Yth. KEPALA BIDANG KESIBIHATAN
 KOTA MAKASSAR

Di -
 MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 2174/S.01/PP2T/02/2016, Tanggal 17 Maret 2016. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini diungkapkan kepada Bapak bahwa :

Nama	ANIS RAHMAYANI
NIM / Jurusan	7020110008 Ilmu Kesehatan
Pekerjaan	Monevitas (ST)
Alamat	Jl. H.M. Yasin Lingsi No. 20, Gowa
Judul	"PENGUJIAN TERAPI KOGNITIF TERHADAP KEMAMPUAN MENENTUKAN PEROLEH NEGATIF PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANGENI MAKASSAR"

Beberapa mengadakan Penelitian pada tanggal / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret s.d 21 April 2016.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perijanya kami dapat menyertakan dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seoptimalnya.

Demikian diungkapkan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya pengembalian melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Bidang Kesehatan Bangsa dan Politik.

Ah. Walikota Makassar
 KEPALA BADAN KESIBIHATAN DAN POLITIK
 DR. AHMAD TELUNGAN AHMAD LINGSAH


Dr. AKHMAD NAMSUN, RM
 Pangkat : Penata
 NIP : 196706240306041004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar
3. Dalam Fak. Kesehatan dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Melampirkan yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KESEHATAN



Jl. Tattar Seneke No. 11 Tnp. (411) 80560 Makassar 90111
 Telp. (0411) 8056000 Fax. (0411) 8056000
 www.makassar.go.id www.dinkes.makassar.go.id

Nomor : 492/G/2 /PSDK/V/2016
 Lamp :
 Hal : Ses. Bercakupan

Kepada Yth.
 Kepala Puskesmas Mangasa
 Di
 Makassar

Selubungan dengan surat dari Badan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Ibu/DB No. 000/K/10/KP/11114, Tanggal 17 Maret 2016, perihal terdapat di atas, maka bersama ini dibagikan kepada bapak/ibu sebagai berikut:

Nama : ALAUDDIN MAKASSAR
 NIP : 1965010119810010000
 Instansi : MAHASISWA
 Jabat : PERSERIKATAN TERBUKA KOMUNITAS TERHADAP KEMAMPUAN MENYENANGI PERILAKU NEGATIF PADA PASIEN - KADATUMBUHA DI LAYANAN PERUK/PUSKESMAS MANGASA MAKASSAR

Akan melaksanakan penelitian di wilayah kerja saudara dalam rangka "Penyusunan tugas" UNIVERSITAS ISLAM NEGERI yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2016 s.d. 25 Maret 2016. Untuk keperluan tersebut dapat dibenarkan dan ditandatangani.

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan

Makassar, 18 Maret 2016

Kepala Dinas Kesehatan
 Kota Makassar



IMAN FATHIMAH T. AZHAR, S.Pd, M.Pd
 Kepala Puskesmas Mangasa
 NIP. 19601014 1980032003

Terselubung
 1. Ring Bercakupan
 2. A Lamp



DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
PUSKESMAS MANGASA

Jl. Wirokromo Diringo Sassiyo Kota Makassar 90111
MAKASSAR



SURAT REKOMENDASI

Nomor: 14 / PNMUMK/IV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Natigala Mawati, SpDK
NIP : 19621210 199001 2 0001
Pangkat/Golongan : Revisi Mada III / IV
Jabatan : Ketua Puskesmas Mangasa

Dengan ini merekomendasikan dengan ketentuan:

Nama : Alauddin
No. Tawaran : 1401/2016/1001/Seprekom
Instansi : Universitas Islam Negeri Makassar
Jadwal : Program Tawaran Kerja Tertinggi Kejuruan
Mendukung Bidang Sosial pada Faskes Skinfrenan
di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Kota Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dewan telah melaksanakan Pemilihan dan telah ditetapkan Mangasa pada Tanggal
21 Maret s.d. 21 April 2016. **ALAUDDIN**
berprestasi telah memperoleh **MAKASSAR** sebagai pemenang yang telah

Dewan Rekomendasi ini dibuat dan di percetakan pada:

Makassar, 21 April 2016



[Signature]

Dr. Natigala Mawati, SpDK
19621210 199001 2 0001

RIWAYAT HIDUP



Andi Rahmayani, Sosok perempuan yang kesehariannya biasa dipanggil Emma, ditakdirkan lahir disebuah kota yang terkenal dengan julukan bumi latemmamala (Kota Kalong) yakni Watansoppeng pada tanggal 24 Februari 1994. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari buah cinta pasangan Bapak Andi

Sulaeman S.Pd, dan Ibu Hj. Sukmawati S.Pd.

Penulis mengawali riwayat pendidikannya di TK Negeri Pembina Watansoppeng, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 167 Togigi. Setelah itu menempuh pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Watansoppeng dan lulus pada tahun 2012, karena ingin mencari pengalaman baru menempuh pendidikan diluar kampung halaman, maka pada tahun yang sama penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Ilmu Keperawatan. Syukur Alhamdulillah berkat ridho Allah SWT, perjuangan keras yang tidak pernah luput akan iringan doa dari orangtua, keluarga serta rekan-rekan yang

senantiasa membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun sebuah karya skripsi yang berjudul “Pengaruh Terapi Kognitif Terhadap Kemampuan Mengontrol Pikiran Negatif pada Klien Skizofrenia di Wilayah Kerja Puskesmas Mangasa Makassar”.

