

**ISOLASI MIKROBA PENGHASIL ANTIBIOTIK DARI AIR
KANAL PASAR PA'BAENG-BAENG, KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh
RAKHMAT WAHYUDI SOETOMO
NIM. 70100109066

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Air Kanal Pasar Pa’Baeng-Baeng, Kota Makassar” yang disusun oleh Rakhmat Wahyudi Soetomo, NIM: 70100109066, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 24 Desember 2013

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Hj. Gemy Nastity Handayani, S.si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Lomba Sultan, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Pjs. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A.
NIP. 19520811 198203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Wahyudi S
NIM : 70100109066
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/22 Oktober 1990
Jurusan : Farmasi
Alamat : Jl. Karaeng Loe Raya
Judul : Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotik dari Air Kanal Pasar
Pa' Baeng-baeng, Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Desember 2013

Penyusun,

Rakhmat Wahyudi Soetomo

NIM: 70100106066

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas kita ucapkan karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan lainnya untuk tegaknya syiar Islam yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak/Ibu:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Soetomo Noer dan Ibunda Rifka Maliran serta kakanda Sinta Wati, Sri Irna Wati, dan Ruaida Dewi yang tiada henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, dan selalu memberikan nasehat, kritik, semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembimbing kedua yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt, selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Gemy Nastity Handayani S.Si. M.Si., Apt., selaku penguji Kompetensi yang telah memberikan saran serta kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Haeria, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing pertama atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
10. Dr. H. Lomba Sultan, M.Ag selaku penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi dan memberikan saran pada skripsi penulis.

11. Dosen-dosen Jurusan Farmasi baik yang berada di luar maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh staf Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
13. Laboran Farmasi yang telah membantu kelancaran pada saat penelitian dilakukan.
14. Rekan-rekan seperjuangan, Hidrogenasi yang terus mendukung, mengingatkan, penulis untuk segera menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada kakak-kakak angkatan 2005, 2006, 2007, 2008 serta adik-adik angkatan 2010, 2011, 2012, dan 2013 penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebersamaannya selama ini dan buat adik-adik tetap semangat.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.



Makassar, 24 Desember 2013

Rakhmat Wahyudi Soetomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-37
A. Air.....	7
B. Mikroorganisme.....	11
C. Antibiotik.....	16
D. Pengecatan Gram.....	21
E. Pengujian Aktivitas Biokimia.....	22
F. Uraian bakteri uji.....	27

G. Tinjauan islam mengenai mikroba penghasil antiotika.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38-44
A. Alat dan Bahan yang Digunakan.....	38
B. Cara Kerja	38
C. Penyiapan Mikroba Uji	40
D. Karakterisasi Mikroorganisme	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45-61
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	62-63
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	66
BIOGRAFI	83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Hasil Pemurnian Isolat Mikroba	46
Tabel 2 Hasil Uji Aktivitas Antibiotik dari Fermentat Isolat Mikroba	46
Tabel 3 Hasil Pengecatan Gram Mikroba	47
Tabel 4 Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri Secara Makroskopik	47
Tabel 5 Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri dan Jamur Pada Agar Lempeng	48
Tabel 6 Hasil Pengamatan Morfologi Jamur Secara Makroskopik	48
Tabel 7 Hasil Pengamatan Uji Aktivitas Biokimia	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Foto Hasil Isolat Bakteri pada Media Agar GNA	67
Gambar 2	Foto Hasil Isolat Jamur pada Media Agar PDA	68
Gambar 3	Foto Hasil Pemurnian Isolat Bakteri dan Jamur dengan Metode Kuadran pada Medium GNA dan PDA.....	69
Gambar 4	Foto Hasil Pengujian Aktivitas Antibiotik Fermentat Isolat Bakteri dan Jamur	70
Gambar 5	Foto Hasil Pengecatan Gram Isolat Bakteri Murni	71
Gambar 6	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Miring.....	72
Gambar 7	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Tegak.....	73
Gambar 8	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Cair.....	74
Gambar 9	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Lempengan.....	75
Gambar 10	Foto Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi Suhu Isolat Bakteri	76
Gambar 11	Foto Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi pH Isolat Bakteri.....	76
Gambar 12	Foto Tempat Pengambilan Sampel.....	77
Gambar 13	Foto Blank Disk.....	77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran 1	Skema Kerja	66
Lampiran 2	Gambar Hasil Pengamatan	67
Lampiran 3	Pembuatan Medium.....	78
Lampiran 4	Pembuatan Pereaksi.....	80



ABSTRAK

Nama Penyusun : RAKHMAT WAHYUDI SOETOMO

NIM : 70100109066

Judul Skripsi : Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Air Kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar.

Telah dilakukan penelitian isolasi mikroba penghasil antibiotika dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat mikroba penghasil antibiotik yang dapat menghambat mikroba uji dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar. Tahap pertama isolasi mikroba dilakukan pengenceran 10^{-1} hingga 10^{-7} dengan menggunakan metode tuang pada medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) dan Potato Dextrosa Agar (PDA), kemudian difermentasi menggunakan medium Maltosa Yeast Broth (MYB). Aktivitasnya diujikan menggunakan metode difusi agar dalam medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) terhadap mikroba uji. Tahap selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi, secara makroskopik dengan melihat pertumbuhan bakteri pada medium NA tegak, NA miring, dan medium NB, sedangkan secara mikroskopik dilakukan pengecatan Gram. Kemudian dilakukan pengujian aktivitas biokimia yang meliputi, uji katalase, uji pertumbuhan variasi suhu dan pH.

Hasil isolasi didapatkan 3 isolat bakteri dan 2 isolat jamur dan semua isolat memberikan aktivitas : untuk bakteri uji *Escherichia coli* dihambat oleh isolat A, B, C, dan D. Untuk bakteri uji *Staphylococcus aureus* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk bakteri uji *Streptococcus mutans* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk bakteri uji *Vibrio sp* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk bakteri uji *Bacillus subtilis* dan *Staphylococcus epidermidis* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk bakteri uji *Pseudomonas auroginosa* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk bakteri uji *Salmonella typhi* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Untuk jamur uji *Candida albicans* dihambat oleh isolat A, B, C, D, dan E. Hasil dari pengujian mikroskopik yaitu semua isolat termasuk bakteri Gram Negatif dan untuk uji aktivitas biokimia diketahui bahwa semua isolat mengandung enzim katalase, dan termasuk dalam mikroba mesofilik (mesotermik) dan tumbuh pada pH netral dan basa lemah.

ABSTRACT

Author : RAKHMAT WAHYUDI SOETOMO

Student Reg. Number : 70100109066

Title : Isolation of Microbes Producing Antibiotic from Water of Canal at Pa'Baeng-Baeng Market, Makassar City.

A research about isolation of microbe producing antibiotic from Water of Canal at Pa'Baeng-Baeng Market, Makassar City. This research aims to get microbes from water of canal. In first step, isolation of microbe was done by diluting at concentration 10^{-1} to 10^{-7} by using pour method on Glukosa Nutrient Agar (GNA) medium and Potato Dextrose Agar (PDA) medium, then fermented by using Maltosa Yeast Broth (MYB) medium. Their activity was tested by using agar diffusion method on Glukosa Nutrient Agar (GNA) medium to tested microbe. Next step, observation of morphologi was done in a macroscopic manner by looking growing of upright NA medium, sloping NA medium, and NB medium and in a microscopic manner by gram painting. Next, biochemistry activity testing was done that include motility test, catalase test, citrate test, and growing at variant temperature and pH test.

The result of isolation was 3 bacteria isolat and 2 fungus and all isolates which gives the activity : for bacteria test *Escherichia coli* inhibited by isolate A, B, C and D. For bacteria test *Staphylococcus aureus* inhibited by isolate A, B, C, D and E. For bacteria test *Streptococcus mutans* inhibited by isolate A, B, C, D, and E. For bacteria test *Vibrio sp* inhibited by isolate isolat A, B, C, D, and E. For bacteria test *Bacillus subtilis* and *Staphylococcus epidermidis* inhibited by isolate A, B, C, D, and E. For bacteria test *Pseudomonas auroginosa* inhibited by isolate A, B, C, D, and E. For bacteria test *Salmonella typhi* inhibited by isolate A, B, C, D, and E. For fungus test *Candida albicans* inhibited by isolate A, B, C, D, and E. The result observation of morphologi that all isolates were included gram Negative bacteria that the shapes were coccus and result of biochemistry activity testing that all isolates contain enzyme catalase, included mesophilic (mesothermic) microbes, and grow at neutral pH and weak alkali.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara yang beriklim tropis seperti Indonesia, penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme merupakan kasus yang banyak sekali terjadi. Oleh sebab itu penggunaan obat antibiotika menduduki persentase yang tinggi dalam pemakaian obat-obatan (Djauhari E, 2008: 20).

Kebutuhan antibiotika yang semakin luas dalam pengobatan penyakit infeksi selain menggembirakan juga ada masalah. Salah satu masalah yang mendapat perhatian serius adalah penggunaan antibiotika yang kurang terkontrol sehingga menyebabkan resistensi. Gejala resistensi bakteri merupakan informasi studi yang menuntut diteruskannya usaha dan kegiatan pencarian senyawa antibiotika baru (Naid, 1999: 5).

Salah satu masalah utama pengobatan adalah banyaknya bakteri resisten terhadap antibiotika yang dipicu penggunaan obat yang tidak rasional. Sebagian orang sering menggunakan antibiotika tidak sesuai ketentuan, baik itu berupa penggunaan yang tidak tuntas ataupun penggunaan tanpa dasar diagnosa yang jelas. Akibatnya banyak muncul bakteri yang resisten terhadap beberapa antibiotika sehingga penyakit menjadi sulit disembuhkan (Ramadhitya F, 2008: 1).

Berkembangnya resistensi terhadap obat-obatan antibiotik mendorong para ilmuwan untuk melakukan berbagai penelitian. Resistensi mikroba penyebab infeksi

terhadap beberapa antibiotika tertentu menimbulkan permasalahan tersendiri dalam mengatasi penyakit infeksi. Dengan melihat keberadaan mikroba air yang sangat potensial, hal ini dapat dijadikan sebagai sumber penelitian guna mendapatkan senyawa antibiotika baru (Pelczar, 1988: 531).

Banyak antibiotik yang berasal dari mikroorganismenya, beberapa dihasilkan oleh spesies fungi biasa, misalnya penisilin. Tetapi kebanyakan diperoleh dari bermacam-macam bakteri yang menyerupai fungi. Sedikit sekali yang dihasilkan oleh bakteri asli, kecuali yang berasal dari spesies *Bacillus* (Irianto, 2002: 91).

Untuk mempertahankan hidupnya mikroba dapat membuat pertahanan diri dengan berbagai cara, salah satunya dengan menghasilkan produk metabolit sekunder. Produk metabolit sekunder tersebut dapat berupa bahan toksik yang dapat mempengaruhi metabolisme mikroba lain sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Bahan-bahan toksik yang dihasilkan oleh mikroba tersebut disebut sebagai antibiotika (Salle, 1961: 139).

Sumber mikroorganismenya penghasil antibiotika antara lain berasal dari tanah, air, lumpur, kompos, isi rumen, limbah domestik, bahan makanan busuk dan lain-lain. (Suwandi, 1989: 20).

Antibiotika merupakan substansi yang sangat efektif untuk mengurangi penyakit infeksi. Namun organisme hidup selalu berusaha beradaptasi terhadap lingkungannya untuk mempertahankan hidup kelangsungan hidupnya, demikian juga mikroorganismenya atau kuman penyebab infeksi akan berusaha beradaptasi terhadap toksisitas antimikroba. Fleksibilitas dan kemampuan populasi bakteri beradaptasi

dengan lingkungannya dapat menimbulkan masalah resistensi yang dapat diturunkan dari generasi ke generasi (Suwandi, 1992: 1).

Oleh karena itu kebutuhan antibiotika baru masih sangat diperlukan, terutama yang efektif melawan bakteri resisten, virus, protozoa, fungi atau jamur. Untuk mendapatkan antibiotika baru, para peneliti banyak melakukan berbagai cara seperti biotransformasi senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan mikroba atau membuat derivat antibiotika baru dari mikroba yang ada di alam (Naid, 1999: 5).

Air merupakan komponen utama dalam sel mikroorganisme dan medium untuk hidupnya mikroorganisme. Fungsi dari pada air adalah sebagai sumber oksingne untuk bahan organik sel pada respirasi. Selain itu, air berfungsi sebagai pelarut dan alat trasfor dalam proses metabolisme mikroorganisme. (Djide, 2008: 127).

Kontaminan yang mencemari air digolongkan dalam tiga kategori: kimiawi, fisik, dan hayati. Kontaminan ini dapat mempunyai pengaruh nyata terhadap kualitas air (Pelczar, 1988: 531).

Limbah merupakan buangan atau bahan sisa yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Air limbah industri maupun rumah tangga (domestik) apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan akibat dari pencemaran yang mengandung mikroorganisme, bakteri, virus, dan parasit (PP No.18 1999).

Air limbah mentah (belum dibersihkan) dapat mengandung jutaan bakteri per mililiter, termasuk *Coliform*, *Streptococcus*, *Basillus* anaerobik pembentuk spora,

kelompok *proteus*, dan tipe-tipe lain yang berasal dari saluran pencernaan manusia (Pelczar, 1988: 535).

Air adalah tempat tumbuh mikroorganisme yang paling baik sehingga berbagai macam mikroorganisme akan hidup dan berkembang biak. Demikian juga pada air kanal pasar Pa’Baeng-Baeng, yang mengandung banyak mikroorganisme yang ditunjukkan dengan banyaknya limbah rumah tangga yang membuat air kanal berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sehingga besar kemungkinan mikroorganisme pada air kanal Pasar Pa’Baeng-Baeng terdapat mikroba penghasil antibiotik.

Dari sumber ajaran Islam, terlihat banyak ayat al-Quran dan sunnah rasul yang menggambarkan bahwa penciptaan Allah di darat dan udara tidak sia-sia.

Diantara ayatnya terdapat pada surah an-Nur; 45 ayat :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah Telah menciptakan semua jenis hewan dari air, Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. an-Nur; 45).

Ayat di atas telah membuktikan bahwa betapa pentingnya air bagi kehidupan semua makhluk hidup, semua makhluk yang berjalan di bumi ini membutuhkan air,

ini dibuktikan secara ilmiah bahwa tubuh makhluk hidup di bumi dibentuk cairan khusus dengan perbandingan 50-95%.

Sehingga dilakukan penelitian ini dengan maksud untuk mengisolasi mikroba penghasil antibiotik dari air kanal pasar Pa'baeng-baeng, Kota Makassar, yang diharapkan mikroba yang berhasil diisolasi dapat menambah koleksi mikroba penghasil antibiotik.

B. Rumusan Masalah


1. Apakah mikroorganisme yang terdapat di air kanal pasar Pa'baeng-baeng, kota Makassar memiliki potensi sebagai penghasil antibiotik?
2. Apakah jenis mikroorganisme apa yang dapat menghasilkan antibiotik dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar?
3. Bagaimana tinjauan Islam mengenai pemanfaatan mikroba sebagai penghasil senyawa antibiotik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh isolat mikroorganisme penghasil antibiotika dari air kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar.
2. Untuk mengetahui jenis mikroorganisme yang dapat menghasilkan antibiotik dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumber rujukan dan data ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam pengujian mikroba penghasil antibiotika pada air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar.
2. Dapat menambah data ilmiah bagi mahasiswa atau peneliti lainnya tentang mikroba pada air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar, sebagai penghasil antibiotika.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Air

Zat cair yang khusus dipilih untuk kehidupan “air” meliputi dua pertiga bagian permukaan bumi. Tubuh seluruh makhluk hidup di bumi dibentuk cairan khusus ini dengan perbandingan berkisar antara 50-95%. Dari mikroorganisme yang hidup di sumber air panas dengan suhu yang mendekati titik didih air, sampai lumut pada aliran lelehan salju, kehidupan ada disegala tempat dimana ada air tidak peduli pada suhu berapa pun. Bahkan pada setetes embun di daun setelah hujan, beribu-ribu mikroorganisme hidup, berkembang biak, dan mati (yahya ,2003: 68).

1. Pengertian Air Limbah

Limbah cair merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan. Air tanah, air permukaan dan air hujan pada kondisi tertentu masuk sebagai komponen limbah cair, karena pada keadaan sistem saluran pengumpulan limbah cair sudah rusak atau retak, air alam itu dapat menyatu dengan komponen limbah cair lainnya dan harus diperhitungkan penanganannya (Suparmin, 2001: 12).

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah air limbah yang dibuang tanpa pengolahan ke dalam suatu saluran air. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 82 tahun 2001, air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga (*domestic*) maupun industri (Mulia, 2005: 67-68).

Air limbah rumah tangga terdiri dari 3 fraksi penting :

- a. Tinja (*faeces*) berpotensi mengandung mikroba patogen.
- b. Air seni (*urine*). Umumnya mengandung nitrogen dan posfor, serta kemungkinan kecil mikroorganisme.
- c. *Grey water*, merupakan air bekas cucian dapur, mesin cuci dan kamar mandi. *Grey water* sering juga disebut dengan istilah *sullage*.

Campuran feses dan urine disebut sebagai *excreta*, sedangkan campuran *excreta* dengan air bilasan toilet disebut sebagai *black water*. Mikroba patogen banyak terdapat pada *excreta*. *Excreta* ini merupakan cara transport utama bagi penyakit yang dapat disebabkan air yang kurang bersih.

2. Dampak Buruk Air Limbah

Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak buruk bagi mahluk hidup dan lingkungannya. Beberapa dampak buruk tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gangguan kesehatan.
- b. Penurunan kualitas lingkungan.
- c. Gangguan terhadap keindahan lingkungan.

d. Gangguan terhadap kerusakan benda (Mulia , 2005: 69).

3. Pengolahan Air Limbah

Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi merupakan kolam yang digunakan untuk mengolah air limbah secara alamiah. Kolam stabilisasi sangat direkomendasikan untuk pengolahan air limbah di daerah tropis dan negara berkembang sebab biaya yang diperlukan untuk membuatnya relatif murah tetapi membutuhkan area yang luas (Mulia, 2005: 73).

Fosfor ada di dalam air limbah melalui hasil buangan manusia, air seni, dan melalui komponen fosfat dapat digunakan untuk membuat sabun sebagai pembentuk buih. Dari setiap sumbar tersebut akan menambah jumlah total dari fosfor. Pada proses biologis dalam air limbah yang diolah jenis polifosfat ke dalam ortofosfat, sehingga fosfor buangan akhir air limbah terdiri dari 80% ortofosfat. Air limbah yang berasal dari rumah tangga banyak sekali mengandung nitrat dan fosfor, akan tetapi diimbangi dengan kekurangan zat ini pada air limbah yang berasal dari air limbah industri. (Sugiarto, 2005: 34).

4. Mikroorganisme Air

Mikroorganisme yang terdapat dalam air berasal dari berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman hidup atau mati, hewan hidup atau mati (Bangkai), kotoran manusia atau hewan, bahan organik lainnya, dan sebagainya (Fardiaz, 1992: 39).

Air dapat merupakan medium pembawa mikroorganisme patogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Patogen yang biasa ditemukan dalam air terutama adalah bakteri-bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan seperti *Vibrio cholerae* penyebab penyakit kolera, *Salmonella typhosa* penyebab tifus dan *S. paratyphi* penyebab paratifus, virus polio dan hepatitis. Untuk mencegah penyebaran penyakit melalui air perlu dilakukan kontrol terhadap polusi air (Fardiaz, 1992: 39).

Air merupakan komponen utama di dalam sel dan media, baik sebagai sumber oksigen untuk bahan organik sel dan respirasi, ataupun sebagai pelarut dan sebagai alat pengangkut di dalam metabolisme. Pada air yang kotor atau sudah tercampur misalnya: air selokan, air sungai atau air bangunan, didalamnya akan didapati kelompok bakteri. Seperti pada air yang masih jernih, ditambah dengan kelompok lainnya (Suriawirya, 1986: 25-26).

Mikrobakteria merupakan kuman yang tersebar luas baik di tanah, air maupun organisme lain. Kuman ini pula yang bertanggung jawab terhadap terjadinya dua jenis penyakit ganuloma kronis yang membinasakan umat manusia yaitu tuberculosis dan kusta (Sanjaja, 1992: 53).

Keuntungan ekologis untuk bakteri dapat tetap berada dalam bentuk kelompok tidak selalu jelas. Populasi campuran bersatu membentuk flokulasi yang stabil di bawah satu pengendalian keadaan yang tidak banyak diketahui. Sifat ini digunakan untuk menjernihkan air dalam pengerjaan air gorong (*riol*).

Dalam sistem pengaktifan lumpur, sisa-sisa buangan dalam *riol* ini diudarakan secara aktif. (Irianto, 2006: 51).

Semua bentuk kehidupan, dari mikroorganisme sampai kepada manusia, mempunyai persamaan dalam hal persyaratan nutrisi tertentu dalam bentuk zat-zat kimiawi yang diperlukan untuk pertumbuhan fungsinya yang normal. Pengamatan berikut ini melukiskan hal tersebut dan juga menampakkan keragaman yang amat besar dalam hal tipe nutrisi yang dijumpai diantara bakteri (Pelczar, 1986: 132).

B. Mikroorganisme

Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya, sehingga sulit untuk dapat dilihat tanpa alat pembesar. Yang tergolong dalam mikroorganisme adalah bermacam-macam bakteri, khamir, kapang (jamur), algae, protozoa, mycoplasma, dan virus (Djide, 2008: 21).

1. Nutrisi Mikroorganisme

Mikroorganisme sebagai makhluk hidup sama dengan organisme hidup lainnya yang sangat memerlukan energi dan bahan untuk tumbuh. Bahan-bahan yang dibutuhkan mikroorganisme untuk tumbuh dapat digolongkan atas tujuh golongan besar yaitu:

a. Air

Air merupakan komponen utama dalam sel mikroorganisme dan medium untuk tumbuh mikroorganisme. Fungsi dari pada air adalah sebagai sumber oksigen

untuk bahan organik sel pada proses respirasi dan juga berfungsi sebagai pelarut dan alat transfor dalam proses metabolisme.

b. Sumber Energi

Ada beberapa sumber energi bagi mikroorganisme antara lain berupa senyawa organik ataupun senyawa anorganik yang dapat dioksidasi oleh cahaya matahari. Untuk menghasilkan energi metabolit dilakukan dengan cara fermentasi, respirasi, fotosintesis.

c. Sumber Karbon

Sumber karbon untuk mikroorganisme dapat berupa senyawa organik seperti karbohidrat, asam-asam organik seperti poli alkohol, dan ada juga mikroorganisme yang menggunakan karbonat-karbonat atau CO_2 sebagai sumber utama karbonnya.

d. Sumber Nitrogen

Mikroorganisme dapat memanfaatkan nitrogen dalam bentuk amoniak, nitrat, asam-asam amino, protein-protein. Jenis senyawa protein yang digunakan tergantung dari jenis mikroorganismenya.

e. Sumber Mineral yang Penting

Mineral merupakan bagian sel yang merupakan unsur-unsur utama dalam menyusun sel unsur-unsur tersebut antarlain: K, Ca, Mg, Na, S, dan Cl selain unsur-unsur tersebut terdapat pula unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil antarlain: Fe, Mn, Cu, Co, Bo, Mo, Zn, dan Al.

f. Sumber Aceptor Elektron

Di dalam sel selalu terjadi proses oksidasi biologi yang merupakan proses pengambilan atau pemindahan elektron dari substrat, oleh karena itu elektron di dalam sel tidak dapat berada dalam bentuk bebas maka perlu sesuatu yang menangkap elektron tersebut. Aseptor elektron tersebut merupakan agensia pengoksidasi pada mikroorganismenya seperti O_2 , senyawa-senyawa organik, NO_3^- , NO_2^- , SO_4^{2-} , CO_2 , Fe^{3+} .

g. Faktor Tumbuh

Pada mikroorganismenya dibutuhkan adanya faktor tumbuh berupa senyawa-senyawa organik sebagai prekursor atau penyusun bahan sel yang tidak dapat disintesis dari sumber karbon sederhana. Faktor tumbuh dapat dikelompokkan atas asam amino (sebagai penyusun protein), purin dan pirimidin (sebagai penyusun asam nukleat), dan vitamin-vitamin (sebagai gugusan prostetik atau bagian aktif dari sel) (Djide, 2008: 127-131).

2. Fase Pertumbuhan Mikroorganismenya

Jika suatu mikroorganismenya dimasukkan kedalam medium yang baru pada umumnya tidak akan segera membelah diri, tetapi memerlukan waktu untuk penyesuaian diri dalam medium tersebut. Jika pertumbuhan suatu mikroorganismenya dalam medium diamati dengan waktu yang cukup lama maka akan terlihat fase-fase pertumbuhan mikroorganismenya yaitu:

a. Fase Permulaan (adaptasi)

Pada fase permulaan mikroorganisme melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya yang baru. Berbagai macam enzim dan zat-zat perantara dibentuk pada fase ini, sehingga memungkinkan pertumbuhan lebih lanjut, sel-sel pada fase ini mulai membesar tetapi belum melakukan pembelahan.

b. Fase Pertumbuhan Dipercepat

Pada fase ini mikroorganisme mulai melakukan pembelahan diri tetapi waktu generasinya masih panjang.

c. Fase Pertumbuhan Logaritma

Pada fase ini kecepatan tumbuh mikroorganisme paling cepat waktu generasinya pendek dan konstan. Panjang pendeknya fase ini sangat bergantung pada spesies mikroorganisme, medium, dan faktor lingkungan selama pertumbuhan.

d. Fase Pertumbuhan Mulai Terhambat

Pada fase ini pertumbuhan mulai terhambat karena adanya pengurangan nutrisi dan menumpuknya sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun serta terjadinya perubahan lingkungan seperti meningkatnya pH dan lain-lain.

e. Fase Stasioner atau Fase Konstan

Karena adanya penurunan kadar nutrisi dan adanya penimbunan zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun maka kecepatan pertumbuhan dan perbanyakan mikroorganisme terhambat selain itu jumlah dari mikroorganisme yang mati akan meningkat sehingga jumlah mikroorganisme yang mati akan sama dengan jumlah

mikroorganisme yang hidup. Pada fase inilah mikroorganisme mengeluarkan metabolik sekunder-nya untuk bertahan hidup.

f. Fase Kematian yang Dipercepat atau Fase Kematian Logaritma

Kedua fase ini sering disebut sebagai fase penurunan kehidupan. Pada fase ini kecepatan kematian akan meningkat dan kecepatan pembelahan sel mikroorganisme menjadi nol (Djide, 2003: 206-210).

3. Tehnik Isolasi Mikroba

Teknik isolasi mikroba adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamiahnya. Pemisahan mikroba dari lingkungannya ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan ini disebut dengan biakan murni (Dwyana, 2006: 24).

Mikroba dapat diperoleh dari lingkungan air, tanah, udara, substrat yang berupa bahan pangan, tanaman dan hewan. Jenis mikroba dapat berupa bakteri, khamir, kapang, dan lain-lain. Populasi mikroba dilingkungan sangat beranekaragam sehingga dalam mengisolasi diperlukan beberapa tahap penanaman sehingga berhasil diperoleh koloni tunggal. Koloni tunggal ini kemudian diperbanyak untuk suatu tujuan penelitian misalnya untuk mengisolasi DNA mikroba yang dapat mendeteksi mikroba yang telah resisten terhadap suatu antibiotika. Atau untuk mengetahui mikroba yang dipakai bioremediasi halokarbon (pencemaran akibat penggunaan insektisida) yaitu

Methylococcus capsulatus, *Arthrobacter* dan *Phanerochhaete chrysosporium*.

Atau untuk proses keperluan fermentasi (Zaraswati, 2006: 83-84).

Cara isolasi dan identifikasi bakteri adalah merupakan suatu topik yang sangat luas dan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman, karena mikroorganisme atau bakteri tersebut terdapat dalam berbagai sumber yang terdiri dari ribuan spesies, dan terdapat dalam habitat (Djide, 2008: 299).

Pemahaman mengenai bakteri yang diinokulasikan merupakan hal yang wajib. Inokulasi bakteri termasuk pula di dalamnya dalam prinsip untuk membuat lingkungan medium menjadi semirip mungkin dengan medium aslinya (Suharni, 1999: 28). Pemahaman ini meliputi :

- a. Sifat dan jenis mikroba yang akan diisolasi
- b. Tempat hidup / atau asal mikrobia tersebut.
- c. Medium yang sesuai untuk pertumbuhan.
- d. Cara inkubasi mikroba.
- e. Cara menanam mikroba. (Soetarto, 2010: 35)

Teknik dalam mengisolasi bakteri memiliki beberapa variasi metode misalnya, metode goresan (*streak plate*), metode taburan / sebar (*pour plate*), dan metode apusan (*surface plate*). Pemilihan teknik ini didasarkan pada tujuan penelitian / percobaan (Pelczar, 1986: 235).

C. Antibiotika

Metabolit sekunder adalah suatu molekul atau produk metabolik yang dihasilkan oleh proses metabolisme sekunder mikroorganisme di mana produk

metabolik tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok mikroorganisme untuk hidup dan tumbuh. Meskipun tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan, namun metabolit sekunder dapat juga berfungsi sebagai nutrisi darurat untuk bertahan hidup (Pratiwi, 2008: 130).

Fungsi metabolit sekunder bagi mikroorganisme penghasil itu sendiri sebagian besar belum jelas. Metabolit sekunder dibuat dan disimpan secara ekstraseluler. Metabolit sekunder banyak bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain karena banyak di antaranya bersifat sebagai obat, pigmen, vitamin, ataupun hormon. Metabolit sekunder tidak diproduksi pada saat pertumbuhan sel secara cepat (fase logaritmik), tetapi biasanya disintesis pada akhir siklus pertumbuhan sel, yaitu pada fase stasioner saat populasi sel tetap karena jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang mati. Pada fase ini sel mikroorganisme lebih tahan terhadap keadaan ekstrem, misalnya suhu yang lebih panas atau dingin, radiasi, bahan-bahan kimia, dan metabolit yang dihasilkannya sendiri (Pratiwi, 2008: 130).

Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Banyak antibiotika dewasa ini di buat secara semisintetik atau sintetik penuh (Ganiswarna, 1995: 571).

Antibiotika yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas (broad spectrum antibiotik).
- b. Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen.

- c. Tidak menimbulkan pengaruh samping (side effect) yang buruk pada host, seperti: reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung dan sebagainya.
- d. Tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau flora kulit (Entjang, 2003: 54).

Antibiotika dapat dibedakan berdasarkan spektrum kerjanya. Antibiotika yang efektif terhadap beberapa jenis mikroorganisme baik bentuk basil, kokus, maupun spiral disebut antibiotika berspektrum luas. Sebaiknya antibiotika berdasarkan mekanisme kerjanya dapat di bagi dalam lima kelompok:

- a. Bersifat sebagai anti metaboli.

Menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara bertindak sebagai inhibitor kompetitif terhadap enzim dihidropteroate sintetase (DHPS). Dengan dihambatnya enzim DHPS ini menyebabkan tidak terbentuknya asam tetra-hidrofolat. Tetra-hidrofolat merupakan bentuk aktif asam folat, di mana fungsinya adalah untuk berbagai peran biologis di antaranya dalam produksi dan pemeliharaan sel serta sintesis DNA dan protein.

- b. Menghambat sintesis dinding sel mikroba.

Menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara berikatan pada enzim DD-transpeptidase yang memperantarai dinding peptidoglikan bakteri, sehingga dengan demikian akan melemahkan dinding sel bakteri Hal ini mengakibatkan sitolisis karena ketidakseimbangan tekanan osmotis, serta pengaktifan hidrolase dan autolysins yang mencerna dinding peptidoglikan yang sudah terbentuk sebelumnya.

Dalam hal ini bakteri yang berfungsi sebagaimana dikatakan diatas adalah bakteri golongan Beta-laktam.

c. Mengganggu permeabilitas membran sel mikroba.

Menghambat pertumbuhan bakteri dengan bekerja meningkatkan kadar kalsium intrasel sehingga mengganggu kesetimbangan osmosis dan menyebabkan kebocoran sel.

d. Menghambat sintesis protein sel mikroba.

Menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara berikatan pada subunit 50S ribosom, sehingga dengan demikian akan menghambat translokasi peptidil tRNA yang diperlukan untuk sintesis protein. Peristiwa ini bersifat bakteristatis, namun dalam konsentrasi tinggi hal ini dapat bersifat bakteriosida.

e. Menghambat asam nukleat.

Menghambat pertumbuhan mikroorganisme dengan cara mempengaruhi proses metabolisme asam nukleat dengan cara berikatan dengan *DNA-dependent* dan *RNA-polimerase* yang ada pada mikroorganisme (Djide, 2008: 341-342).

Penemuan sumber-sumber antibiotik baru di alam dilakukan dengan cara penapisan atau skrining (screening) untuk menemukan mikroorganisme penghasil antibiotik. Sampel dari berbagai macam sumber, termasuk tanah, air dari berbagai tempat diuji kemampuan potensialnya dalam menghasilkan antibiotik. Proses penapisan ini terdiri dari dua tahap, yaitu skrining primer dan skrining sekunder. Tahap-tahap skrining primer meliputi:

a. Mencari sumber penghasil

- b. Menumbuhkan mikroorganismenya yang didapat
- c. Mengisolasi dan mengoleksi mikroorganismenya
- d. Uji kemampuan isolat

Tahap skrining sekunder meliputi:

- a. Mendapatkan koloni mikroorganismenya terpilih
- b. Mencari kondisi optimal untuk pertumbuhan (temperature, pH, lama inkubasi, media, dll)
- c. Identifikasi mikroorganismenya (secara morfologi, kimiawi, ataupun genetik)
- d. Identifikasi substansi (Pratiwi, 2008: 153).

1. Uji Aktivitas Antibiotika dengan Metode Difusi Agar

Difusi adalah proses perpindahan molekul dari satu posisi ke posisi lain.

Pada metode ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah difusi silinder pipih, difusi dengan mangkuk pipih, difusi dengan kertas saring, difusi Kirby-Bauer, dan difusi agar berlapis (Djide 2003: 105).

- a. Cara difusi pipih. Cara ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah hambatan yang dibentuk larutan contoh pada pertumbuhan mikroba dengan daerah hambatan yang dibentuk oleh larutan pembanding. Pada cara ini digunakan plat silinder yang diletakkan pada media, kemudian larutan dimasukkan ke dalamnya.
- b. Cara difusi dengan mangkuk pipih. Cara ini sama dengan silinder pipih namun perbedaannya menggunakan lubang yang dibuat langsung pada medium.
- c. Cara difusi kertas saring. Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk ukuran tertentu, biasanya dengan garis tengah 0,7-1 cm, yang nantinya akan

dicelupkan ke dalam larutan contoh dan pembanding. Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi dengan melihat daerah hambatan yang terbentuk.

- d. Cara difusi Kirby-Bauer. Cara ini menggunakan alat ukur meletakkan kertas saring dan cawan yang digunakan berukuran 15x15 mm sehingga langsung dapat diuji dengan berbagai larutan.
- e. Cara difusi agar berlapis. Cara ini merupakan modifikasi dari Kirby-Bauer. Perbedaannya pada cara ini menggunakan dua lapis agar. Lapis pertama (*based layer*) tidak mengandung mikroba, sedangkan lapis ke dua (*seed layer*) mengandung mikroba.

D. Pengecatan Gram

Pengecatan gram adalah pewarnaan diferensial yang sangat penting, ditemukan oleh Cristian Gram pada tahun 1884. Pada umumnya bakteri bersifat tembus cahaya, ini akan mempersulit untuk dilihat atau diteliti sekalipun di bawah mikroskop. Hal tersebut disebabkan karena banyak mikroba yang tidak mempunyai zat warna, seperti umumnya yang didapatkan pada bakteri. Berbeda dengan mikroalga yang jelas mempunyai butir-butir atau serta warna dalam selnya. Bakteri yang masih hidup tidak tampak jelas bentuk maupun sifat-sifat morfologi lainnya. Bakteri tunggal yaitu yang berupa satu sel saja, walaupun bakteri itu diambilkan dari suatu koloni tertentu. Oleh karena itu untuk memperlihatkan bagian-bagian sel diperlukan pewarnaan (Waluyo 2004: 150).

Ada kalanya, setelah suatu preparat yang sudah meresap suatu zat warna, kemudian dicuci dengan asam encer, maka semua zat warna akan terhapus. Suatu

bakteri perlu diwarnai dua kali, setelah zat warna yang pertama (ungu) terserap, maka bakteri dicuci dengan alkohol, kemudian ditumpangi dengan zat warna yang berlainan, yaitu dengan zat yang berwarna merah. Jika sediaan itu dicuci dengan air, lalu dengan alkohol maka dua kemungkinan dapat terjadi. Pertama, zat warna tambahan terhapus, sehingga yang tampak ialah zat warna yang asli (ungu). Dalam hal ini bakteri itu disebut gram positif. Kedua zat warna tambahan warna (merah) bertahan hingga zat warna asli tidak tampak dalam hal ini bakteri itu disebut gram negatif.

E. Pengujian Aktivitas Biokimia

Aktivitas biokimia sangat penting dalam mengidentifikasi suatu bakteri. Pada setiap jenis bakteri memiliki jenis reaksi biokimia yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa reaksi biokimia merupakan sidik jari organisme dalam pengidentifikasian. Tiap jenis bakteri berbeda kode DNANYA untuk sintesis protein, maka berbagai jenis bakteri harus mempersatukan berbagai protein enzim agar dapat diperoleh DNA yang khas dengan rangkaian nucleotide base (Waluyo, 2004:151).

Adapun beberapa pengujian aktivitas biokimia yang biasa dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri, antara lain:

a. Uji H₂S

H₂S diproduksi oleh beberapa jenis mikroorganisme melalui pemecahan asam amino yang mengandung unsur balerang (S) seperti lisin dan metionin, H₂S dapat juga diproduksi melalui reduksi senyawa-senyawa balerang anorganik misalnya: tiosulfat, sulfit atau sulfat. Adanya H₂S dapat diamati dengan menambahkan garam-

garam logam berat ke dalam medium. H_2S akan bereaksi dengan senyawa-senyawa ini membentuk logam sulfat yang berwarna hitam (Presscot, 2002: 131).

b. Uji Pertumbuhan pada Daerah Aktivitas pH Mikroba

Sebagian besar bakteri memiliki nilai pH minimum dan maksimum antara 4 dan 9 dalam pertumbuhannya. Pada umumnya pH optimum pertumbuhan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan asam atau basa. Berdasarkan pH-nya mikroba dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (a) *mikroba asidofil*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 2,0-5,0, (b) *mikroba mesofil (neutrofil)*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 5,5-8,0, dan (c) *mikroba alkalifil*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 8,4-9,5 (Sumarsih, 2003: 83).

c. Uji Motilitas

Uji ini dapat digunakan untuk memeriksa kemampuan bakteri untuk bergerak. Dimana gerakan bakteri tersebut dipengaruhi oleh adanya flagella. Bakteri diinokulasikan secara tusukan ke dalam medium SIM (Semisolid Indol Motility). Bila positif artinya bersifat motil (bergerak), yang dimana bakteri akan tumbuh menyebar di sepanjang garis tusukan inokulasi (Waluyo, 2004: 175).

d. Uji Katalase

Dengan banyak oksigen bebas di lingkungannya, kebanyakan bakteri akan memproduksi H_2O_2 yang bersifat toksis terhadap bakteri yang masih hidup. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, enzim katalase memecah H_2O_2 menjadi molekul air dan oksigen, sehingga sifat toksiknya hilang (Benson, 2001: 46).

e. Uji Indol

Uji ini untuk mendeteksi adanya indol yang dihasilkan oleh suatu bakteri tertentu. Bakteri tersebut dapat memecah asam amino triptofan dan menghasilkan senyawa yang berbau busuk yang disebut indol. Kemudian diberi pereaksi Kovacz atau Ehrlich yang mengandung amil alkohol sehingga dengan adanya indol akan menyebabkan amil alkohol berubah warnanya menjadi merah. Dimana uji ini menunjukkan adanya indol yang dihasilkan oleh suatu bakteri tertentu. Apabila terjadi warna merah, maka reaksi dikatakan positif dan jika terjadi warna jingga, maka reaksi dikatakan negatif (Benson, 2001: 162).

f. Uji Sitrat

Penanaman dalam medium pembiakan sitrat (Simons Citrate Medium) dimaksudkan untuk mengetahui apakah senyawa sitrat dapat dipakai sebagai satu-satunya sumber karbon bagi mikroorganisme. Dalam medium ini digunakan natrium sitrat sebagai sumber karbon. Bila natrium sitrat ini dapat diuraikan maka amonium hidrogen posfat ikut terurai dan akan melepaskan NH_3 sehingga menyebabkan medium menjadi alkalis, dan indikator brom timol biru (Iranto, 2006: 60).

g. Uji Metil Merah

Untuk mendeteksi keasaman yang tinggi akibat pertumbuhan bakteri tertentu dalam pembedahan pada medium MRVP. Prinsipnya adalah pendeteksian derajat keasaman dimana selama proses fermentasi suatu bakteri menghasilkan asam lebih banyak dari bakteri lain dengan menurunkan pH medium yang mengandung 0,5%

glukosa sehingga mencapai pH 5,0 yang menyebabkan indikator metil merah tersebut menjadi merah yang berarti hasilnya positif, sedangkan hasil yang negatif ditandai dengan warna kuning (Presscot, 2002: 125).

h. Uji Voges-Proskauer

Menurut Voges-Proskauer pengujian yang dilakukannya adalah untuk mengetahui apakah dalam proses pertumbuhan organisme terbentuk asetilmetilkarbinol sebagai produk-antara (*intermediate product*) dari proses metabolisme karbohidrat. Asetilmetilkarbinol dalam lingkungan yang mengandung kalium hidroksida dan udara, teroksidasi menjadi senyawa diasetil. Senyawa ini dengan alfa-naftol dan inti guanidin dari asam aminoorganina (dari pepton) menghasilkan warna merah (Irianto, 2006: 59).

i. Uji Hidrolisis Urea

Hidrolisis urea Genus *proteus* dapat dibedakan dari beberapa bakteri Gram negatif lain karena kesanggupannya menghasilkan banyak enzim urease. Bila biakan terdapat urease dan urea hidrolisis, maka terbentuk amonia yang merubah warna indikator kuning menjadi merah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat medium pembiakan diinkubasi di atas penangas air (Presscot, 2002: 132).

j. Uji Fermentasi Karbohidrat

Sifat karakteristik suatu spesies mikroba antara lain adalah determinasinya terhadap gula-gula (dekstrosa, laktosa, sukrosa dan hidrolisis pati). Gula dapat difermentasi menjadi bermacam-macam zat, seperti: alkohol, asam, dan gas tergantung macam gula dan spesiesnya. Terbentuknya asam dapat diketahui dengan

adanya perubahan warna indikator dalam medium, sedangkan terbentuknya gas dapat dilihat dengan tabung fermentasi lainnya. Amilum dapat dihidrolisis menjadi gula oleh bakteri tertentu. Penguraian karbohidrat dapat terjadi dalam keadaan aerob dan anaerob.

Sifat-sifat fermentasi karbohidrat dari tiap mikroorganisme dapat diketahui dengan menginokulasikan mikroorganisme tersebut ke dalam tabung yang berisi medium karbohidrat yang diberi indikator dan tabung durham. Tabung durham adalah suatu tabung kecil yang diletakan terbalik dalam medium karbohidrat tadi. Hasil akhir fermentasi biasanya berupa asam dan gas atau asam saja. Terjadinya asam dapat diketahui dengan adanya perubahan warna indikator, sedangkan gas yang terjadi akan tertampung di dalam tabung durham (Irianto, 2006: 61-62).

k. Uji Fenylalanin Deaminase

Uji ini untuk mendeteksi adanya enzim fenilalanin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dalam medium phenylalanin agar. Pendeteksian enzim phenylalanin deaminase yang terdapat pada bakteri tertentu yang diinokulasikan pada medium phenylalanin agar. Mikroorganisme yang memiliki enzim diaminase akan mengkatalisis pemindahan gugus amino (NH_2) dari asam amino dan molekul yang mengandung NH. Hasil positif jika terjadi warna hijau pada permukaan medium (Presscot, 2002: 133).

F. Uraian Bakteri Uji

1. *Escherichia coli* (Garrity, 2004: 24-141)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Enterobacteriales
 Suku : Enterobacteriaceae
 Marga : *Escherichia*
 Jenis : *Escherichia coli*

b. Sifat dan Morfologi.

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, diameter 1,1-1,5 μm x 2,0-6,0 μm , motil dengan flagelum peritrikus atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar, 2008: 949).

2. *Staphylococcus aureus* (Garrity, 2004: 24-187)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Staphylococcaceae

Marga : *Staphylococcus*

Jenis : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif, sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 μm , terdapat tunggal dan berpasangan, dan secara khas membelah diri lebih dari satu bidang sehingga membentuk kolom yang tidak teratur. Dinding sel mengandung dua komponen utama; peptidoglikan dan asam teikoat. Metabolisme secara respiratif dan fermentatif. Tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerob. Suhu optimum 35-40⁰C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar, 2008: 954-955).

3. *Candida albicans* (Kill, 1995: 136)

a. Klasifikasi

Domain : Fungi
 Filum : Ascomycota
 Kelas : Saccharomycetes
 Bangsa : Saccharomycetales
 Suku : Saccharomycetaceae
 Marga : *Candida*
 Jenis : *Candida albicans*



b. Sifat dan Morfologi.

Candida albicans mempunyai bentuk sel bermacam-macam. Menghasilkan banyak pseudomiselium. Dapat terbentuk miselium sejati dan klamidospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut masing-masing spesies. Perkembangbiakan vegetatif ialah melalui penguncupan multilateral. Diasimilasi mungkin okidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Di dalam medium cair dapat berbentuk endapan, cincin dan polikel (Pelczar, 2008: 957).

4. *Pseudomonas aeruginosa* (Garrity, 2004: 24-95)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Pseudomonadales
 Suku : Pseudomonadaceae
 Marga : *Pseudomonas*
 Jenis : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan Morfologi.

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-1,0 μm . Motil dengan flagelum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Metabolisme dengan respirasi, beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H_2 atau CO_2 sebagai

sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron unifersal, dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar, 2008: 952).

5. *Vibrio sp* (Garrity, 2004: 24-109)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Proteobacteria
 Kelas : Gammaproteobacteria
 Bangsa : Vibrionales
 Suku : Vibrionaceae
 Marga : *Vibrio*
 Jenis : *Vibrio sp*



b. Sifat dan Morfologi.

Vibrio sp adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tidak membentuk spora, sumbunya melengkung atau lurus 0,5 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flgelum dalam satu berkas polar. Mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan, tidak tahan asam, dan tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrien baku. metabolisme dengan respirasi dan fermentasi. Suhu optimum berkisar dari 18 sampai 37⁰C (Pelczar, 2008: 956).

6. *Bacillus subtilis* (Garrity,2004: 24-172)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Bacillaceae
 Marga : Bacillus
 Jenis : *Bacillus subtilis*

b. Sifat dan Morfologi.

Bacillus subtilis memiliki sel berbentuk batang 0,3-2,2 μm x 1,27-7,0 μm , sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora; tidak lebih satu sel sporangium. Termasuk bakteri Gram positif bersifat kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif. (Pelczar, 2008: 947).

7. *Streptococcus mutans* (Garrity, 2004: 24-203)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Lactobacillales
 Suku : Streptococcaceae

Marga : Streptococcus

Jenis : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan Morfologi

Streptococcus mutans bentuk bulat, termasuk bakteri Gram positif dan biasanya tidak berpigmen. Berdiameter 0,5-1,5 μ m, koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45°C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipikoat (Pelczar, 2008: 955).

8. *Salmonella typhi* (Garrity, 2004: 24-203)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Salmonella

Jenis : *Salmonella typhi*

b. Sifat dan Morfologi

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5 μ m, biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagela peritrik, hidup secara aerobik fakultatif, meragikan

glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37⁰C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar, 1958: 948).

9. *Staphylococcus epidermidis* (Garrity, 2004: 24-178)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Filum : Firmicutes
 Kelas : Bacilli
 Bangsa : Bacillales
 Suku : Staphylococcaceae
 Marga : Staphylococcus
 Jenis : *Staphylococcus epidermidis*



b. Sifat dan Morfologi

Staphylococcus epidermidis sel-selnya berbentuk bola, berdiameter 0,5 µm-1,5 µm, terdapat tunggal atau berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang, sehingga membentuk gerombol yang tidak teratur. Merupakan bakteri Gram positif, tidak ditemukan adanya protein A, sedangkan ribitol digantikan oleh gliseril (Pelczar, 2008: 954).

G. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotika

Allah SWT telah menyiratkan didalam Al-Quran akan pentingnya pengaruh lingkungan bagi kehidupan makhluk yang Ia ciptakan termasuk mikroba yang juga

merupakan salah satu contoh makhluk hidup ciptaan Allah SWT, hal ini tersirat dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran diantaranya:

(Q.S Al-Baqarah 164).

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dari air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”
(Q.S. Al- Baqarah: 164)

Q.S Al-Furqan 61:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾

Terjemahan:

”Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan angin bercahaya.”(Q.S. Al-Furqan).

Dari beberapa ayat di atas dapat di ketahui bahwa Allah SWT mengisyaratkan bahwa faktor lingkungan sangat berperan dalam kehidupan mikroba. Hal ini diisyaratkan Al Quran dengan angin dan cahaya matahari yang merupakan salah satu

faktor lingkungan yang berperan dalam kehidupan mikroba sangat mempengaruhi pertumbuhan mikroba.

Kebutuhan akan obat-obatan di zaman moderen seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit di kalangan masyarakat

(Ali Al-Ju'aisin 2001, 59).

Diriwayatkan oleh Abu Daud R.A. bahwa Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
 إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ
 عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا
 تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه ابوا داود)

Artinya :

“Muhammad bin Ubadah Al-Wasithy menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Ismail bin ayyas mengabarkan kepada kami dari Tsa'labah bin Muslim dari abi Imran al- Ansyari dari Ummi Darda dari Abi Darda dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda; “sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat , serta menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan cara yang haram.”(HR. Abu Daud).

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diriwayatkan pula oleh Muslim R.A. bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا
 ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ
 عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه
 مسلم)

Artinya :

“Harun bin Ma’ruf dan Abu Tahir, Ahmad bin Isa menceritakan kepada Ismail sambil berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amardan Al-Harits mengabarkan kepada saya dari Abdurrabbi bin Sa’id, dari Abu Zubaer dari Jabir dari Rasulullah Saw. bahwasanya dia bersabda: “untuk semua penyakit itu ada obat, maka apabila obat bagi penderita itu telah sampai maka dia telah sembuh dengan izin Allah .” (HR. Muslim).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya.

Tidaklah yang diciptakan oleh Allah SWT adalah sia-sia sekecil atau sesederhana apa pun itu semisal mikroba atau yang lebih sederhana darinya, sebagaimana dalam Q.S Al-Imran:191.

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

"Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Salah satu bukti nyata dari ayat di atas yang menerangkan bahwa sekecil apapun makhluk itu pasti memiliki manfaat sehingga penelitian ini dilakukan untuk mencari senyawa antibiotika yang berasal dari mikroba-mikroba yang ada pada air sehingga nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang kesehatan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Alat yang digunakan

Autoklaf (Smic model YX-280 B®), botol steril, cool box, cawan petri (Iwaki Pyrex®), deck glass, erlenmeyer 250 ml dan 100 ml (Iwaki Pyrex®), gelas kimia 250 ml (Iwaki Pyrex®), gelas ukur 100 ml (Iwaki Pyrex®), incubator (Mettler®), lampu spiritus, laminar air flow (LAF), lemari pendingin, seker, mikroskop, objek glass, ose bulat, ose lurus, oven (Fisher®), penangas air, tabung reaksi, tabung durham, dan timbangan analitik.

2. Bahan yang digunakan

Air suling, air steril, aluminium foil, amonium hidroksida, asam asetat, biakan murni (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Candida albicans* dan *Vibrio sp*), cat A, B, C dan D, disk blank (oxid), alkohol 70%, kapas, kertas timbang, kertas indikator pH, larutan HCl 0,1 %, larutan H₂O₂ 3% , medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), medium Maltose Yeast Broth (MYB), medium Nutrient Agar (NA), medium Nutrient Broth (NB), medium Potato Dekstrosa Agar (PDA), dan spoit 1 ml dan 10 ml

B. Cara Kerja

1. Pengambilan dan Pengolahan Sampel

Sampel air kanal diambil pada tiga titik pengambilan pada kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng, Kota Makassar dengan menggunakan timba yang telah disemprot dengan alkohol 70 %, sampel dimasukkan ke dalam botol steril dan disimpan dalam *coolbox*, selanjutnya dibawa ke laboratorium.

2. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan cara direndam larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlemeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 1 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

3. Pembuatan Suspensi Sampel

Sampel air diambil sebanyak 1ml lalu dimasukkan ke dalam botol pengencer dan dicukupkan dengan air suling steril hingga 10 ml (pengenceran 10^{-1}). Suspensi sampel dari pengenceran 10^{-1} kemudian dibuat pengenceran 10^{-2} , 10^{-3} sampai pada pengenceran 10^{-5} .

4. Isolasi dan Pemurnian Mikroba Air Kanal

Masing-masing pengenceran dipipet 1 ml dan dimasukkan ke botol pengencer bersama 9 ml medium GNA lalu dituang ke masing-masing cawan petri kemudian dihomogenkan. Begitupun untuk medium PDA. Dibiarkan memadat lalu diinkubasi selama 1×24 jam pada suhu 37°C untuk medium GNA dan suhu kamar untuk medium PDA selama 3×24 jam.

Dari koloni yang memperlihatkan adanya zona hambatan, diambil 1 ose lalu digoreskan pada medium PDA dan medium GNA dengan metode kuadran pada cawan petri yang lain lalu diinkubasikan selama 1 hari untuk menumbuhkan bakteri dan 3 hari untuk menumbuhkan jamur. Selanjutnya dipindahkan 1 ose koloni yang terpisah baik ke dalam medium PDA miring dan medium GNA miring sebagai stok dan inkubasikan selama 1 hari untuk isolat bakteri dan 3 hari untuk isolat jamur. Isolat bakteri dan jamur yang diperoleh dimurnikan dengan menggunakan metode kuadran.

5. Peremajaan dan Pembenihan Isolat Mikroba

Diambil sebanyak 1 ose koloni yang murni dan digoreskan pada medium agar miring. Diinkubasikan selama 1 hari pada suhu 37°C untuk bakteri dan 3 hari pada suhu 25°C untuk biakan jamur. Diinokulasikan 1 ose ke dalam 10 ml medium pembenihan MYB, lalu inkubasikan selama 3×24 jam sambil dishaker.

C. Penyiapan Mikroba Uji

1. Peremajaan Mikroba Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella tyhposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dan *Vibrio sp.* Bakteri yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmi Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1x 24 jam pada suhu 37⁰ C.

Jamur uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Candida albicans* diambil satu ose lalu diinokulasikan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.

2. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur transmittannya 25% T untuk bakteri dan 75% T untuk jamur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Visibel.

3. Pengujian aktifitas antibiotik

Suspensi mikroba uji sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalam 10 ml medium NA untuk bakteri dan medium PDA untuk jamur kemudian dihomogenkan, kemudian dibiarkan hingga setengah memadat. Setelah itu diletakkan disk yang sudah direndam dengan filtrat hasil fermentasi secara

aseptis. Diinkubasi pada suhu 37°C selama 1x24 jam. Daerah hambatan berupa zona bening disekitar disk yang berisi hasil fermentasi, setelah itu diukur dan dicatat.

D. Karakterisasi Mikroorganisme

1. Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik

- a. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi tegak. Setelah memadat isolat A diinokulasikan dengan cara tusukan, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat B dan C. Untuk isolat D dan E, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.
- b. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi miring. Setelah memadat isolat A diinokulasikan dengan cara digores, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat B dan C. Untuk isolat D dan E, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.
- c. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml lalu dimasukkan ke botol dan ditambahkan 1 ml isolat A kemudian dihomogenkan. Dituang kedalam cawan petri steril dan dibiarkan memadat. Setelah memadat kemudian diinkubasi pada suhu

37° C, selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, elevasi, tepi dan struktur dalam. Dilakukan hal yang sama pada isolat B dan C. Untuk isolat D dan E, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.

- d. Medium Nutrien Broth (NB) dipipet 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diinokulasikan isolat A dengan menggunakan ose bulat. Diinkubasi pada suhu 37 °C, selama 1x24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat B dan C. Untuk isolat D dan E, menggunakan medium GNB (Glukosa Nutrient Broth).

2. Pengecatan Gram

Objek glass dibersihkan dengan menggunakan etanol 96% sehingga bebas lemak, kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus. Isolat A diletakkan di atas objek glass, kemudian diratakan seluas 1-2 cm. kemudian difiksasi di atas lampu spiritus. Setelah dingin ditetesi dengan cat Gram A (gentian violet) sebanyak 3 tetes dan dibiarkan selama 20 detik. Selanjutnya dicuci dengan air mengalir selama 2 detik. Ditetesi cat Gram B (mordan), dibiarkan selama 1 menit dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di udara, ditetesi dengan cat Gram C (peluntur), dibiarkan selama 10-20 detik dan dicuci dengan air mengalir selama 2 menit. Terakhir ditetesi dengan cat Gram D (zat penutup), dibiarkan selama 2 menit. Dikeringkan di atas kertas, dan diamati di bawah mikroskop. Dilakukan hal yang sama pada isolat B, C, D, dan E.

3. Pengujian Aktivitas Biokimia

a. Uji Katalase

Dibersihkan objek glass, lalu diteteskan beberapa tetes larutan H_2O_2 3% di atas gelas objek tersebut. Kemudian diambil sedikit biakan isolat A biakan mikroba dengan ose, diletakkan dalam tetesan H_2O_2 diamati adanya gelembung-gelembung O_2 di dalam tetesan H_2O_2 di bawah mikroskop. Dilakukan hal yang sama pada isolat B, C, D, dan E.

b. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi Suhu

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diinokulasikan dengan isolat A biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam, di dalam lemari es untuk $4^\circ C$, dilakukan hal yang sama untuk suhu inkubasi $25^\circ C$, $37^\circ C$, $60^\circ C$ di inkubator, dan pada isolat B, C, D, dan E. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan dan dibandingkan dengan kontrol.

c. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi pH

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, ditambahkan asam asetat hingga pH 4, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat A biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam dalam inkubator, dilakukan hal yang sama dengan penambahan ammonium hidroksida hingga pH 12 dan pada isolat B, C, D, dan E. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan pada medium dan dibandingkan dengan kontrol.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengenceran pada air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar dari pengenceran 10^{-1} sampai pada pengenceran 10^{-5} telah berhasil diperoleh tiga isolat bakteri yang menunjukkan adanya zona hambat berupa daerah bening disekelilingnya pada pengenceran 10^{-1} dan dua isolat jamur pada pengenceran 10^{-2} . Dapat dilihat pada tabel 1, Gambar 1 dan 2.

1. Pemurnian Isolat mikroba

Koloni mikroba yang memperlihatkan zona hambatan kemudian dimurnikan dengan menggunakan medium GNA dan PDA pada cawan petri lalu diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C untuk bakteri dan 3 x 24 jam pada suhu kamar untuk jamur, sehingga diperoleh kultur koloni mikroba yang murni, yaitu isolat yang hanya mengandung satu bentuk morfologi koloni yang sama. Isolat murni tersebut kemudian dibuat menjadi kultur dalam media agar miring sebagai stok. Dari hasil isolasi diperoleh 5 isolat murni dari bakteri dan 2 isolat murni dari jamur. Dapat dilihat pada tabel 1, Gambar 1 dan 2.

Tabel 1. Hasil Pemurnian Isolat Mikroba Air kanal pasar Pa' Baeng-Baeng

No.	Kode Bakteri dan jamur	Biakan Bakteri
1.	A	Isolat Bakteri ke-1
2.	B	Isolat Bakteri ke-2
3.	C	Isolat Bakteri ke-3
4.	D	Isolat Jamur ke-1
5.	E	Isolat Jamur ke-2

2. Uji Aktivitas Antibiotik dari Isolat Mikroba Air Limbah

Uji aktivitas antibiotik diperoleh hasil bahwa hampir semua isolat mikroorganisme yang didapatkan memberikan zona hambat pada mikroba uji kecuali isolat E yang tidak memberikan zona hambat pada mikroba uji *Escherchia coli*. Dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 4.

Tabel 2. Hasil pengukuran zona hambat isolat bakteri terhadap mikroba uji

No.	Kode Isolat	Diameter Penghambatan Mikroorganisme uji (mm)								
		BS	EC	ST	SA	CA	Vsp	PA	SM	SE
1	A	10,05	7,2	11,2	13,3	10,15	11,2	10,2	7,2	9,05
2	B	11	6,05	6,15	9,4	10,25	8	10,05	11,05	7,1
3	C	7,35	7,1	7,05	9,05	13,2	7	8,05	8,2	7,05
4	D	11,3	7,05	11,2	6,45	9,05	7,35	10,2	11,2	8,35
5	E	7	-	7,05	9,4	9,05	8	7,35	9,35	8,3

Keterangan :

BS : *Basillus subtilis*

ST : *Salmonella typhi*

CA : *Candida albicans*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

EC : *Escherchia coli*

SA : *Staphylococcus aureus*

Vsp : *Vibrio sp*

SM : *Streptococcus mutans*

3. Pengamatan dengan Pengecetan Gram

Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk morfologi dan warna dimana warna ungu menunjukkan bakteri gram positif, dan warna merah menunjukkan bakteri gram negatif. Hasil pengamatan dapat dilihat pada Tabel 3 dan gambar 5.

Tabel 3. Hasil pengecetan Gram mikroba Limbah pada perbesaran 10 x

NO.	Isolat	Pengecetan Gram	
		Warna	Keterangan
1.	A	Ungu	Positif
2.	B	Ungu	Positif
3.	C	Ungu	Positif

4. Identifikasi pada beberapa medium pertumbuhan

Pengamatan dilakukan dengan menanam isolat mikroba pada beberapa bentuk medium pertumbuhan, diantaranya adalah pada medium agar tegak, medium agar miring, medium cair dan pada medium agar di cawan petri. Dapat dilihat pada tabel 4,5,dan 6, serta gambar 6, 7, 8, dan 9.

Tabel 4. Hasil pengamatan Morfologi pertumbuhan bakteri pada beberapa bentuk medium

NO.	Isolat	Medium		
		NA Tegak	NA miring	NB Cair
1.	A	Villose	Berduri	Keruh
2.	B	Filiform	Menyebar	Pelikel, keruh, sedimen
3.	C	Filiform	Menyebar	Pelikel, keruh, sedimen

Keterangan : A = isolat bakteri ke-1 B = isolat bakteri ke-2
C = isolat bakteri ke-3

Tabel 5. Hasil pengamatan Morfologi pertumbuhan bakteri dan jamur pada medium agar lempeng

NO.	Isolat	Bentuk Koloni		
		Dari Atas	Dari samping	Tepi
1.	A	Bulat	Cembung	Cembung
2.	B	Bulat	Cembung	Cembung
3.	C	Seperti Kerang	Timbul	Cembung
4.	D	Bulat	Rata	Cembung
5.	E	Bulat	Timbul	Cembung

Keterangan : A = Isolat bakteri ke-1 D = Isolat jamur ke-1
 B = Isolat bakteri ke-2 E = Isolat jamur ke-2
 C = Isolat bakteri ke-3

Tabel 6. Hasil pengamatan Morfologi pertumbuhan Jamur pada beberapa bentuk medium

NO.	Isolat	Medium		
		PDA Tegak	PDA Miring	GNB Cair
1.	D	villose	Berduri	Pelikel, keruh, sedimen
2.	E	filiform	Menyebar	Pelikel, keruh, sedimen

Keterangan : D = Isolat jamur ke-1 E = Isolat jamur ke-2

5. Uji Aktivitas Biokimia Mikroba dari Limbah

a. Hasil Pengamatan pada Uji Katalase

Semua isolat bakteri penghasil antibiotik memperlihatkan adanya gelembung gas pada objek gelas. Dapat dilihat pada tabel 7.

b. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh pH

isolat A, B, dan C tumbuh pada pH 7 dan pH 10, sedangkan pada pH 3 tidak ada pertumbuhan untuk tiap isolat. Dapat dilihat pada tabel 7 dan gambar 11.

c. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh Suhu

Semua isolat penghasil antibiotik tumbuh pada suhu 37°C, dan pada suhu 25°C dan tidak terdapat pertumbuhan pada suhu 4°C. Dapat dilihat pada tabel 7 dan gambar 10.

Tabel 7. Hasil Pengujian Aktifitas Biokimia Mikroba

No.	Uji Biokimia	A	B	C
1.	Katalase	+	+	+
2.	Pengaruh pH			
	a. 3	-	-	-
	b. 7	+	+	+
	c. 10	+	+	+
3.	Pengaruh Suhu			
	a. 4°C	-	-	-
	b. 25°C	+	+	+
	c. 37°C	+	+	+
	d. 60°C	-	-	-

Keterangan :

- A = Isolat bakteri ke-1 - = Tidak tumbuh
 B = Isolat bakteri ke-2
 C = Isolat bakteri ke-3
 + = Menghasilkan dan Tumbuh

B. Pembahasan

Allah swt menciptakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, dan Allah swt pula yang menghendaki terciptanya obat dari kelompok mikroorganisme tersebut sebagai antibiotika. Hal ini membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah swt yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan manfaat yang beraneka ragam, dan Dia pula lah yang mengatur semuanya dengan segala keteraturan yang sempurna. Alam dan segala isinya, termasuk manusia, hewan

dan tumbuhan diciptakan dengan berbagai macam rahasia yang belum terungkap sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam tentang ciptaannya.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

(رواه البخاري)

Terjemahnya :

Dari abu; bahwa rasulullah bersabda, “tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit, kecuali Allah juga menurunkan obatnya” (H.R. Al-Bukhari, VII, 12)

Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan penyakit dan Dia pulalah yang menurunkan obatnya. Untuk itu, kita perlu melakukan pencarian bahan obat untuk tiap penyakit, dimana dengan izin Allah SWT setiap penyakit memiliki obatnya masing-masing.

Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya, sehingga sulit untuk dapat dilihat tanpa alat pembesar. Mikroorganisme ada yang bersifat patogen yaitu mikroorganisme yang dapat menyebabkan organisme inangnya mengalami gejala-gejala abnormal sebagai tanda-tanda penyakit. Penyakit yang disebabkan karena bakteri patogen dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain.

Sehingga penelitian ini dilakukan sebagai tahap awal untuk menemukan bakteri penghasil antibiotik pada air kanal pasar Pa’Baeng-Baeng kota Makassar dengan cara mengisolasi mikroba yang terdapat pada air kanal pasar Pa’Baeng-

Baeng, kemudian pemurnian isolat, fermentasi isolat, dan pengujian aktivitas antibiotik yang dihasilkan isolat, pengamatan morfologi secara mikroskopik dengan pengecatan gram, pengamatan morfologi secara makroskopik pada medium NA tegak, NA miring, dan NB cair, dan uji aktivitas biokimia. Pengambilan sampel air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar dilakukan di tiga titik dengan tujuan agar mikroba yang diperoleh lebih beragam.

Metode yang digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme menggunakan metode tuang yang terlebih dahulu sampel air yang diambil kemudian diencerkan mulai dari pengenceran 10^{-1} sampai 10^{-5} menggunakan air steril dengan tujuan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme yang terdapat pada sampel sehingga tidak terjadi penumpukan saat membiakkan mikroorganisme pada medium, sehingga akan mempermudah pengamatan saat akan mengisolasi mikroorganisme yang ingin diisolasi. Mikroorganisme yang di isolasi adalah mikroorganisme yang membentuk zona bening di sekitar tempat tumbuhnya pada fase stasioner pertumbuhan mikroorganisme tersebut, karena menurut Sermonfi (1969) pembentukan antibiotika umumnya terjadi pada fase stasioner yaitu mikroorganisme tersebut akan berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara menghasilkan metabolit sekunder yang berupa bahan-bahan toksik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wattimena (1989) bahwa mikroba-mikroba penghasil antibiotika membentuk suatu zat yang dapat mempertahankan hidupnya dari kompetisi untuk memperebutkan nutrient pada medium tempat tumbuhnya.

Dalam penelitian ini medium yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme sebelum di isolasi ditumbuhkan pada medium GNA untuk menumbuhkan bakteri karena komposisi dari GNA yang mengandung ekstrak beef sebagai sumber protein dan pepton sebagai sumber nitrogen yang dibutuhkan bakteri untuk tumbuh, sedangkan medium PDA untuk menumbuhkan jamur karena komposisi dari PDA yang mengandung ekstrak kentang sebagai sumber karbohidrat dan dekstrosa sebagai sumber karbon yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh.

Mikroba yang diisolasi menunjukkan adanya koloni mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme di sekitarnya. Pada medium GNA diperoleh 3 isolat yang diisolasi dari pengenceran 10^{-1} dan diberi kode A, B, dan C, sedangkan pada medium PDA diperoleh 2 isolat yang diisolasi dari 10^{-2} dan diberi kode D dan E.

Selanjutnya hasil isolat dimurnikan dengan metode kuadran pada medium GNA pada bakteri dan medium PDA pada jamur, sehingga diperoleh koloni mikroba yang murni. Pada metode kuadran cawan petri dibagi menjadi 4 bagian, dengan metode kuadran diperoleh goresan yang berbeda pada 4 daerah goresan, daerah pertama merupakan goresan awal yang masih banyak mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotongkan dari goresan sebelumnya sehingga jumlahnya semakin sedikit setiap goresan dan akhirnya terpisah menjadi koloni tunggal. Kemudian isolat yang diperoleh dibuat menjadi kultur dalam media agar miring sebagai stok. Media agar yang dimaksud adalah medium GNA untuk isolat bakteri dan medium PDA untuk isolat jamur.

Setelah memperoleh isolat yang murni, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi dalam medium Maltosa Yeast Broth (MYB) selama 3 x 24 jam, sambil di shaker dengan kecepatan 200 rpm agar selama fermentasi bakteri akan mencapai fase stasioner dan menghasilkan metabolit sekunder, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Salle A.J (1961) bahwa untuk mempertahankan hidup mikroorganisme dapat membuat pertahanan sendiri dengan menghasilkan metabolit sekunder yang mempengaruhi mikroorganisme lain sehingga mikroorganisme lain itu tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Bahan-bahan toksik yang dihasilkan mikroorganisme itu disebut antibiotika, sehingga untuk melihat potensi dari hasil metabolisme sekunder maka dilakukan pengujian aktivitas antibiotika.

Media fermentasi yang digunakan adalah Maltosa Yeast Broth (MYB), karena media ini merupakan media cair yang mengandung ekstrak yeast sebagai sumber protein, maltosa dan dekstrosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber asam amino, yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme mikroorganisme.

Dalam pengujian aktivitas antibiotika digunakan metode difusi agar dengan menggunakan disc blank. Metode ini efektif dan efisien. Karena tidak membutuhkan sampel yang banyak pada saat di ujikan. Paper disk akan menyerap sampel yang kemudian diletakkan pada medium sehingga berdifusi ke medium padat (agar) lalu diukur zona bening di sekitar paper disk. Selain itu dalam satu kali pembenihan mikroba dapat diujikan 5 macam isolat antibiotik sekaligus dengan meletakkan paper disk yang telah direndam pada larutan isolat ke dalam 1 cawan petri yang bersamaan.

Medium yang digunakan adalah Glukosa Nutrien Agar (GNA) karena medium tersebut mengandung glukosa sebagai sumber karbon, ekstrak yeast sumber protein, pepton sebagai sumber asam amino, dan NaCl untuk menjaga sifat isotonik dari sel mikroba uji.

. Uji aktivitas antibiotika dilakukan dengan menggunakan mikroba uji *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Escherichia coli*, *Vibrio sp*, *Staphylococcus epidermidis*, dan jamur *Candida albicans*. Adapun alasan pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Bacillus subtilis* penyebab bisul, *Staphylococcus aureus* penyebab infeksi kulit dan bisul, sedangkan *Streptococcus mutans* dapat menyebabkan karies pada gigi. *Escherichia coli* penyebab utama diare, *Salmonella typhi* penyebab demam tifoid dan infeksi saluran kemih. *Pseudomonas aeruginosa* yang bersifat invasif dan toksigenik dapat menimbulkan kebutaan, *Vibrio sp* merupakan bakteri enterotoksin dan penyebab kolera, *Staphylococcus epidermidis* penyebab jerawat puru dan *candida albicans* penyebab vaginitis atau keputihan.

Hasil pengujian aktivitas antibiotik menunjukkan hampir semua isolat yang diperoleh dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng memberikan aktivitas terhadap mikroba uji, hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya zona hambatan disekitar Paper disk kecuali isolat E yang tidak menunjukkan zona bening pada medium yang telah disuspensikan biakan bakteri *Escherichia coli*. Adapun isolat yang menunjukkan aktivitas terhadap terhadap mikroba uji adalah isolat A yang memberikan daya

hambat terhadap bakteri mikroba uji *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat sebesar 7,2 mm, *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat sebesar 13,3 mm, *Streptococcus mutans* diameter zona hambat sebesar 7,2 mm, *Salmonella typhi* dengan diameter zona hambat sebesar 11,2 mm, *Vibrio sp* dengan diameter zona hambat sebesar 11,2 mm, *Bacillus subtilis* dengan diameter zona hambat sebesar 10,05 mm, *pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat sebesar 10,2 mm, *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona hambat sebesar 9,05 mm, dan *Candida albicans* dengan diameter zona hambat sebesar 10,15 mm. Isolat B memberikan daya hambat terhadap bakteri mikroba uji *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat sebesar 11,0 mm, *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat sebesar 9,4 mm, *Streptococcus mutans* diameter zona hambat sebesar 11,05 mm, *Salmonella typhi* dengan diameter zona hambat sebesar 6,15 mm, *Vibrio sp* dengan diameter zona hambat sebesar 8,0 mm, *Bacillus subtilis* dengan diameter zona hambat sebesar 11,0 mm, *pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat sebesar 10,05 mm, *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona hambat sebesar 7,1 mm, dan *Candida albicans* dengan diameter zona hambat sebesar 10,25 mm. Isolat C memberikan daya hambat terhadap bakteri mikroba uji *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat sebesar 7,1 mm, *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat sebesar 9,05 mm, *Streptococcus mutans* diameter zona hambat sebesar 8,2 mm, *Salmonella typhi* dengan diameter zona hambat sebesar 7,05 mm, *Vibrio sp* dengan diameter zona hambat sebesar 7,0 mm, *Bacillus subtilis* dengan diameter zona hambat sebesar 7,35 mm, *Pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat

sebesar 8,05 mm, *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona hambat sebesar 7,05 mm, dan *Candida albicans* dengan diameter zona hambat sebesar 13,2 mm.

Sedangkan untuk isolat dari jamur yaitu isolat D memberikan daya hambat terhadap bakteri mikroba uji *Escherichia coli* dengan diameter zona hambat sebesar 7,05 mm, *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat sebesar 6,45 mm, *Streptococcus mutans* diameter zona hambat sebesar 11,2 mm, *Salmonella typhi* dengan diameter zona hambat sebesar 11,2 mm, *Vibrio sp* dengan diameter zona hambat sebesar 7,35 mm, *Bacillus subtilis* dengan diameter zona hambat sebesar 11,3 mm, *Pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat sebesar 10,2 mm, *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona hambat sebesar 8,35 mm, dan *Candida albicans* dengan diameter zona hambat sebesar 9,05 mm. Dan isolat E memberikan daya hambat terhadap bakteri mikroba uji *Staphylococcus aureus* diameter zona hambat sebesar 9,4 mm, *Streptococcus mutans* diameter zona hambat sebesar 9,35 mm, *Salmonella typhi* dengan diameter zona hambat sebesar 7,05 mm, *Vibrio sp* dengan diameter zona hambat sebesar 8,0 mm, *Bacillus subtilis* dengan diameter zona hambat sebesar 7,0mm, *pseudomonas aeruginosa* dengan diameter zona hambat sebesar 7,35 mm, *Staphylococcus epidermidis* dengan diameter zona hambat sebesar 8,3 mm, dan *Candida albicans* dengan diameter zona hambat sebesar 9,05 mm.

Selanjutnya dilakukan dua tahap identifikasi yaitu pengamatan secara morfologi makroskopik maupun mikroskopik dan pengujian aktivitas biokimia mikroba. Dapat dilihat dari hasil penelitian bentuk koloni bakteri penghasil antibiotik

pada medium NA tegak, Na miring, dan NB (medium cair) adalah: untuk isolat A pada medium NA tegak berbentuk villose, pada NA miring berbentuk Berduri, dan pada medium cair berbentuk keruh. Sedangkan untuk isolat B pada medium NA tegak berbentuk filiform, pada Na miring berbentuk menyebar, dan pada medium cair berbentuk pelikel, keruh, dan terbentuk sedimen. Dan untuk isolat C pada medium NA tegak berbentuk filiform, pada Na miring berbentuk menyebar, dan pada medium cair berbentuk pelikel, keruh, dan terbentuk sedimen.

Adapun bentuk koloni jamur untuk isolat D pada medium PDA tegak berbentuk villose, pada medium PDA miring berbentuk berduri, dan pada medium cair (GNB) berbentuk pelikel, keruh, dan terbentuk sedimen. Sedangkan untuk isolat E pada medium PDA tegak berbentuk filiform, pada medium PDA miring berbentuk menyebar, dan pada medium cair (GNB) berbentuk pelikel, keruh, dan terbentuk sedimen.

Untuk pengamatan morfologi isolat mikroorganisme pada medium agar lempeng dengan menggunakan medium GNA untuk Isolat A, B, dan C adalah untuk isolat A jika diamati dari atas berbentuk bulat, jika diamati dari samping berbentuk cembung dan tepi koloni isolat A berbentuk cembung, untuk isolat B jika diamati dari atas berbentuk bulat, jika diamati dari samping berbentuk cembung, dan tepi koloni isolat B berbentuk cembung, dan untuk isolat C jika diamati dari atas berbentuk seperti kerang, jika diamati dari samping berbentuk timbul, dan tepi koloni isolat C berbentuk cembung.

Sedangkan bentuk morfologi dari isolat D dan E pada pengamatan medium agar lempeng dengan menggunakan medium PDA yang dituang pada cawan petri adalah untuk isolat D jika diamati dari atas berbentuk bulat, jika diamati dari samping berbentuk rata, dan tepi koloni isolat D berbentuk cembung. Dan untuk isolat E jika diamati dari atas berbentuk bulat, jika diamati dari samping berbentuk timbul, dan tepi koloni isolat E berbentuk cembung.

Selanjutnya dilakukan pengamatan secara mikroskopik, yaitu dengan pengecatan gram dimana pengecatan gram dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang diperoleh agar dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Bakteri yang berwarna ungu pada pewarnaan gram disebut bakteri positif, sedangkan yang berwarna merah disebut bakteri gram negative. Namun sebelum dilakukan pengecatan gram, terlebih dahulu dilakukan fiksasi pada objek gelas yang di atasnya telah diletakkan bakteri, untuk mengurangi kadar air pada sel bakteri dan menghambat pertumbuhan dari bakteri yang ingin diamati.

Cat-cat yang digunakan dalam pengecatan gram adalah cat A (Kristal violet), cat B (larutan iodium), cat C (alcohol), dan cat D (safranin). Cat-cat yang digunakan merupakan senyawa organik yang mengandung gugus kromofor dan gugus ausokrom yang terikat dalam cincin benzen.

Pada pengecatan gram, digunakan cat A sebagai cat bersifat basa. Dimana zat warna basa yang bermuatan positif ini akan berikatan dengan dinding sel, membrane sel, sitoplasma yang bermuatan negative pada sel sehingga berubah warna menjadi ungu.

Penambahan cat B yang merupakan larutan membrane yang berfungsi untuk meningkatkan afinitas pengikatan zat warna pada bakteri agar lebih kuat. Pewarna cat B menyebabkan terbentuknya persenyawaan kompleks Kristal violet di dalam sel bakteri.

Penambahan cat C sebagai deklorikasi atau zat peluntur zat warna. Dimana bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal sehingga dinding sel mengalami dehidrasi. Pori-pori pada lapisan tersebut akan menyusut dan merapat, daya rembes dinding sel dan membrane menurun, kompleks Kristal violet-iodium tidak dapat keluar dari sel, sehingga warna sel tetap ungu sedangkan untuk bakteri gram negative mempunyai kandungan lipid yang tinggi dan senyawa ini mudah luntur dengan dengan zat peluntur alcohol. Dan hal inilah yang memungkinkan terjadinya pelunturan zat warna awal.

Penambahan cat D, sebagai untuk memberikan warna kontras pada sel-sel bakteri. Penambahan cat ini yang membedakan bakteri gram negatif dan bakteri positif yang akan diamati pada mikroskop. Jika pada penggunaan tetap warna ungu maka dinyatakan sebagai bakteri gram positif, sedangkan jika terjadi perubahan warna merah dinyatakan sebagai gram negatif.

Hasil dari pengecatan gram adalah semua isolat A, B, dan C termasuk dalam bakteri Gram positif, dimana bakteri Gram positif mempunyai kadar lipid dan protein yang rendah sehingga mengalami denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alcohol sehingga protein menjadi keras dan beku, pori-pori

mengecil sehingga kompleks kristal violet dan Iodium dipertahankan karenanya sel bakteri berwarna biru atau ungu.

Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas biokimia untuk isolat bakteri yakni uji katalase, uji pengaruh suhu pada pertumbuhan mikroorganisme, dan uji pengaruh pH pada pertumbuhan mikroorganisme. Diagnose mikroskopik hanya merupakan dugaan untuk itu agar diperoleh diagnose yang konklusif, sifat-sifat biokimia merupakan keharusan yang harus dilakukan. Uji aktivitas biokimia dilakukan setelah diperoleh koloni yang terpisah atau biasa disebut isolat murni.

Uji katalase adalah pengujian untuk mengidentifikasi kelompok bakteri tertentu yang dapat menghasilkan enzim katalase atau tidak. Katalase adalah enzim yang digunakan untuk menguraiakan hidrogen peroksida (H_2O_2) menjadi air (H_2O) dan oksigen (O_2) yang biasanya terbentuk sewaktu metabolisme aerob. Hidrogen peroksida (H_2O_2) bersifat toksik terhadap sel karena bahan ini menginaktivasikan enzim dalam sel. Pada pengujian ini semua isolat A, B, dan C merupakan mikroorganisme yang bersifat katalase-positif karena pada pengujian katalase adanya gelembung gas pada objek gelas saat penambahan hidrogen peroksida 3%.

Sewaktu pertumbuhan mikroorganisme seringkali terjadi perubahan pH medium. Mikroorganisme yang melakuakn fermentasi akan menghasilkan asam sehingga pH medium akan turun menjadi asam. Sebaliknya sewaktu metabolisme protein dan asam amino akan melepaskan ion ammonium sehingga pH medium menjadi basa. Dalam pengujian ini isolat A, B, dan C tidak tumbuh pada medium yang memiliki pH 3 dan ketiga isolat ini hanya tumbuh pada pH 7 dan 10.

Mikroorganisme dapat dipisahkan berdasarkan suhu optimum pertumbuhannya. Mikroorganisme yang mempunyai suhu optimum diantara 0° - 20°C disebut psikrofil. Mikroorganisme yang tumbuh cepat pada suhu 20° - 50°C disebut mesofil. Sedangkan mikroorganisme yang tumbuh pada kisaran suhu 50° - 100°C disebut termofil. Pada pengujian ini ketiga isolat A, B, dan C hanya tumbuh pada suhu 25°C dan suhu 37°C jadi isolat ini termasuk pada mikroorganisme mesofil.

Allah menciptakan alam semesta ini untuk kesejahteraan umat manusia. Manusia disuruh untuk mengelola alam ini agar dapat dimanfaatkan guna keperluan hidup mereka. Untuk mengelola alam ini tentu saja diperlukan akal (ilmu). Allah menyuruh manusia untuk menggunakan akalnya dalam memanfaatkan segala yang diciptakannya termasuk mikroorganisme yang merupakan jasad hidup yang sangat kecil. dimana mikroorganisme memiliki metabolisme yang tinggi karena mikroorganisme ini memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang besar apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan menyebabkan terjadinya konversi zat yang tinggi pula akan tetapi ukurannya yang kecil, maka tidak ada tempat untuk menyimpan enzim-enzim yang telah dihasilkan. Dengan demikian enzim yang tidak diperlukan tidak akan disimpan dalam sel tetapi akan dikeluarkan sebagai senyawa yang dapat digunakan salah satunya sebagai antibiotik. Manusia hendaknya senantiasa menyesuaikan diri dengan alam dan perkembangan zaman yang terus berkembang. Sehingga manusia memerlukan ilmu pengetahuan serta ilmu agama dalam mengolah alam, menciptakan hal-hal baru tapi tetap tidak melanggar syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Air Kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng kota Makassar mengandung mikroba penghasil antibiotik yang terdiri dari 3 isolat bakteri dan 2 isolat jamur.
2. Isolat mikroorganisme yang diperoleh dari air kanal pasar Pa'Baeng-Baeng hamper semua dapat menghambat pertumbuhan dari mikroba uji *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Escherichia coli*, *Vibrio sp*, *Staphylococcus epidermidis*, dan jamur *Candida albicans* kecuali isolat E yang tidak menghambat pertumbuhan dari bakteri *Escherichia coli*.
3. Dari pengujian aktivitas biokimia diketahui bahwa ketiga isolat A, B, dan C merupakan mikroorganisme mampu menghasilkan enzim katalase. Saat pengujian pertumbuhan dipengaruhi suhu dan pH mikroorganisme ini tumbuh pada suhu 25⁰C dan 37⁰C sehingga mikroorganisme yang berhasil di isolasi digolongkan dalam golongan mikroorganisme mesofil dan pH dari medium yang harus dimiliki untuk menumbuhkan isolat adalah pada pH 7 dan pH 10 karena pada pH asam isolat tidak dapat tumbuh. Serta dari pengamatan mikroskopik ketiga isolat bakteri tersebut merupakan bakteri gram positif.

4. Dalam Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Begitupun dengan senyawa (antibiotik) yang dihasilkan oleh mikroba yang dapat digunakan sebagai salah satu obat yang digunakan dalam pengobatan.

B. Saran

Disarankan untuk agar melengkapi uji aktifitas biokimia dari isolat yang diperoleh agar isolat yang diperoleh dapat diketahui spesiesnya. Serta melakukan uji optimasi produksi antibiotik pada isolat yang diperoleh dan identifikasi serta karakterisasi senyawa kimia yang dihasilkan oleh metabolit sekunder dari isolat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. 2009. Departemen Agama Republik Indonesia. PT.Syamil Cipta Media. Bandung.
- Benson, V. 2001. *Microbiological Application Laboratory Manual 8th Edition*. The Mc Graw-Hill. Company.
- Djide, N., dkk. 2003. "*Mikrobiologi Farmasi Terapan, Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Dan Bioteknologi Farmasi*". Jurusan Farmasi Fakultas MIFA. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Djide, M, N., dan Sartini. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Lembaga Penerbit UNHAS. Makassar.
- Dwyana, Z. 2006. *Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Djauhari. Edy Purwakiisumah. 2008. *Perbandingan Fermentasi Antibiotik Oleh Streptomyces sp.* www.akademikunsiri.ac.id. Jakarta. diakses pada 12 Desember 2011.
- Entjang. 2003. *Mikrobiologi dan Parasitologi untuk Akademi Keperawatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bekti.
- Fardiaz S. 1992. "*Polusi Air dan Udara*". Kanisius. Jakarta.
- Ganiswarna, S,G. 1995. "*Farmakologi dan Terapi, Edisi 4*", Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
- Garrity, G, M, Bell, J, A, and Lilburn, T. G. 2004. "*Taxonomic Outline of the Prokaryotes Brgey's Manual of Systematic Bacteriology*", 2nd Edition. New York Berlin Heidelberg: Springer, United Stat ed of Amerika.
- Irianto koes, 2002. "*Mikrobiologi Menguak Dunia Mikroorganisme*", CV Yrama Widya. Bandung.
- Kil, M, A.. 1995. "*Candida Pracital Hand Book for Book for Suffereers, Boomsburry*".
- Mulia Ricki M. 2005. "*Kesehatan Lingkungan*". Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Naid , T. 1999. “*Potensi Bioteknologi dalam Produksi dan Pengembangan Antibiotika Baru Menuju Paradigma Sehat*”. Hasanuddin University Press.
- Pleczar, J.M., and Reid, D.R. 1958. “*Microbiology*”. New York: Mc. Grow – Hill Book Company, Inc.
- Pelczar, Jr, M, J. 1988. “*Dasar-dasar Mikrobiologi*”. penerjemah R,S.Hadiotomo dkk, Jakarta.
- Presscot, H. 2002. *Laboratory Exercises in Microbiology 8th Edition*. The Mc Graw-Hill. Company.
- Ramadhya Fajar P. 2008. Bakteri yang Menyukai Antibiotik. Yahoo News Health. Jakarta. Diakses 5 februari 2010.
- Salle , A. J. 1961. “*Fundamental Principles of Bacteriology*”, 5th edition. New York: Mc Graw Hill Company.
- Sanjaja, B. 1992. “*Isolasi dan karakterisasi Mikrobakteria*”. Widya Medika, Jakarta.
- Sumarsih, Sri. 2003. *Diktat Kuliah Mikrobiologi Dasar*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UPN “Veteran”.
- Suwandi , U. 1989. ” *Mikroorganisme Penghasil Antibiotik*”, [http : www.Kalbe Farma.com](http://www.KalbeFarma.com), diakses 14 Desember 2011).
- Sugiarto. 2005. “*Pengolahan Air Limbah*”, Universitas Indonesia. Jakarta.
- Suryawirya Anus. 1986. ” *Mikrobiologi Air Dan Dasar-dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*”. Penerbit Alumni, Bandung.
- Suwandi , U.” *Mikroorganisme Penghasil Antibiotik*”. 1989 ([http : www.Kalbe Farma.com](http://www.KalbeFarma.com), diakses 20 juni 2009).
- Waluyo, L. 2004. “*Mikrobiologi umum*”, Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yahya Harun. 2003. ”Keajaiban Pada Atom”. Bandung: PT.Saayamil Cipta Media
- Zaraswati, D. 2006. “*Mikrobiologi Farmasi*”. Lembaga Penerbit UNHAS Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas MIPA.


Biografi Penulis




Rakhmat Wahyudi Soetomo, lahir di Ujung Pandang yang kini telah berubah nama menjadi Kota Makassar, tanggal 22 Oktober 1990 merupakan anak ke empat dari empat bersaudara pasangan Ayahanda Soetomo Noer, dengan Ibunda Rifka Maliran. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari TK Idata selama 2 tahun. Pada tahun 1997 melanjutkan pendidikan dasarnya di SD Komp. IKIP I Makassar selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sungguminasa pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 11 Makassar pada Tahun 2006. Tepat pada tahun 2009 ia telah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.



Lampiran1. Skema Kerja




Lampiran 2. Gambar Hasil Pengamatan



Gambar 1. Foto Hasil Isolat Bakteri dari Air Kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng pada Media Agar GNA

Keterangan :

- A = GNA bakteri pengenceran 10^{-1}
- B = GNA bakteri pengenceran 10^{-2}
- C = GNA bakteri pengenceran 10^{-3}
- D = GNA bakteri pengenceran 10^{-4}
- E = GNA bakteri pengenceran 10^{-5}



Gambar 2. Foto Hasil Isolat Jamur dari Air Kanal Pasar Pa'Baeng-Baeng pada Media Agar PDA

Keterangan :


A = PDA jamur pengenceran 10^{-1}

B = PDA jamur pengenceran 10^{-2}

C = PDA jamur pengenceran 10^{-3}

D = PDA jamur pengenceran 10^{-4}


E = PDA jamur pengenceran 10^{-5}



Gambar 3. Foto Hasil Pemurnian Isolat Bakteri dan Jamur dari Air Kanal Pasar Pa' Baeng-Baeng dengan Metode Kuadran pada Medium GNA dan PDA

Keterangan :


- A = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri A
- B = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri B
- C = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri C
- D = Koloni Pemurnian Isolat Jamur D
- E = Koloni Pemurnian Isolat Jamur E
- I = Area Awal Goresan Mikroba
- II = Area Ke-dua Goresan Mikroba
- III = Area Ke-tiga Goresan Mikroban
- IV = Area Ke-empat Gores Mikroba



Gambar 4. Foto Hasil Pengujian Aktivitas Antibiotik Fermentat Isolat Bakteri dan Jamur Terhadap Mikroba Uji

Keterangan :

- BS = *Bacillus subtilis*
- EC = *Escherichia coli*
- V.Sp = *Vibrio sp*
- PA = *Pseudomonas aeruginosa*
- SM = *Streptococcus mutans*
- CA = *Candida albicans*
- SE = *Staphylococcus epidermidis*
- ST = *Salmonella typhi*
- SA = *Staphylococcus aureus*



Gambar 5. Foto Hasil Pengecatan Gram Isolat Bakteri Murni.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri A

B = Koloni Bakteri B

C = Koloni Bakteri C





Gambar 6. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Miring.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri A

B = Koloni Bakteri B

C = Koloni Bakteri C

D = Koloni Jamur D

E = Koloni Jamur E



Gambar 7. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Tegak.

Keterangan :

- A = Koloni Bakteri A
- B = Koloni Bakteri B
- C = Koloni Bakteri C
- D = Koloni Jamur D
- E = Koloni Jamur E



Gambar 8. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Cair.

Keterangan :


A = Koloni Bakteri A

B = Koloni Bakteri B

C = Koloni Bakteri C

D = Koloni Jamur D

E = Koloni Jamur E



Gambar 9. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri dan Jamur pada Medium Agar Lempengan.

Keterangan :


A = Koloni Bakteri A

B = Koloni Bakteri B

C = Koloni Bakteri C

D = Koloni Jamur D

E = Koloni Jamur E



Gambar 10. Foto Hasil Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi Suhu Isolat Bakteri.

Keterangan :

A = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 4⁰C

B = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 25⁰C

C = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 37⁰C

D = Pertumbuhan Isolat Bakteri Pada Suhu 60⁰C



Gambar 11. Foto Hasil Pengujian Pertumbuhan Dipengaruhi pH Isolat Bakteri.

Keterangan :


A = Koloni Bakteri Pada pH 4

B = Koloni Bakteri Pada pH 7

C = Koloni Bakteri Pada pH 10



Gambar 12. Foto Tempat Pengambilan Sampel



Gambar 13. Foto Blank Disk yang Digunakan Untuk Pengujian Aktivitas Antibiotik

Lampiran 3. Pembuatan Medium

a. Nutrient Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Agar	15,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Ditimbang bahan sebanyak 23,0 g dilarutkan dalam 1000 ml sampai larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

b. Nutrient Broth (NB)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan di masukkan ke dalam erlemeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit.

c. Medium Malatosa Yeast Broth (MYB)

Komposisi :

Maltosa	10 g
---------	------

Yeast Extract	3 g
Pepton	5 g
Dekstrosa	10 g
Aquadest	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut. Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

d. Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Komposisi :

Glukosa	10 g
Ekstrak Yeast	5 g
Pepton	10 g
NaCl	2,5 g
Aquadest	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut. Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

e. Medium Potato Dextrosa Agar (PDA)

Komposisi :

Potato	200 gram
--------	----------

Dextrosa	10 gram
Agar	15 gram
Air suling	hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit.

Lampiran 4. Pembuatan Pereaksi

a. Cat A

- Larutan kristal violet

Komposisi :

Kristal violet

20,0 g

Etanol 95%

100,0 ml

- Larutan amonium oksalat

Amonium oksalat

1,0 g

Air suling

100,0 ml

Larutan yang digunakan dilaboratorium :

Larutan Kristal violet 1 bagian

Air suling 10 bagian

Larutan ammonium oksalat 4 bagian

Pembuatan :

Dicampur larutan (1) dan (2), kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.

b. Cat B

- Larutan Iodium

Komposisi :

Kristal iodium 1,0 g

Kalium Iodida 2,0 g

Air suling 5,0 g

Pembuatan :

Setelah kedua bahan tersebut larut, ditambahkan air suling 240 ml dan 60 ml cairan Natrium bikarbonat 5%..

c. Cat C

- Larutan pemucat

Komposisi :

Etanol 95% 250 ml

Aseton 250 ml

Pembuatan :

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.



d. Cat D

- Larutan safranin

Komposisi :

Safranin 2,5 g

Etanol 95% 100,0 ml

Larutan yang digunakan di laboratorium

Diencerkan dengan safranin,

Larutan safranin 1 bagian

Air suling 5 bagian

Pembuatan :

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam botol tertutup gelas.

e. Larutan H₂O₂ 3 %Komposisi :

H₂O₂ 3 ml

Aquadest 100 ml

Pembuatan :

Sebanyak 3 ml H₂O₂ diencerkan dengan aquadest 100 ml. Larutan disimpan di dalam botol gelap tertutup pada suhu ruang.

