

**GAMBARAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN
KEJADIAN DIARE DI RW IV KELURAHAN TAMANGAPA
KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh
MAKASSAR
YUYUN NIRWANA SUBAIR**

NIM: 70200108091

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Gambaran Kualitas Air Sumur Gali dengan Kejadian Diare di RW. IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Mangala Kota Makassar Tahun 2012*” yang disusun oleh **Yuyun Nirwana Subair**, NIM : **70200108091** Mahasiswi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 10 Desember 2012** dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **DR. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes**(.....)

Sekretaris : **Drs. Wahyuddin G., M. Ag** (.....)

Pembimbing I : **Irviani A. Ibrahim., SKM., M. kes** (.....)

Pembimbing II: **Fatmawaty Mallapiang., SKM., M. Kes** (.....)

Penguji I : **A. Muh. Fadil Hayat, SKM, M. Kes** (.....)

Penguji II : **Dr. Hasaruddin., M. Ag** (.....)

Samata Gowa, 10 Desember 2012

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,

Penyusun,



YUYUN NIRWANA SUBAIR
NIM. 70200108091

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul “Gambaran Kualitas Air Sumur Gali dengan Kejadian Diare di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2012” dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan kerendahan hati, penulis memberanikan diri untuk mempersembahkannya sebagai syarat dalam menyelesaikan studi di Peminatan Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi selama menempuh perkuliahan sampai pada penulisan skripsi ini, namun alhamdulillah, berkat petunjuk Allah SWT dan dukungan semua pihak kepada penulis sehingga semua ini dapat teratasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kedua Orang Tua tercinta ayahanda A.B. Subair, S.Pd dan Ibunda Nursahid, S.Pd, atas segala kasih sayang, perhatian, kesabaran, dukungan dan motivasi yang tak ternilai harganya, ananda sangat bangga memiliki orangtua seperti kalian. Adik-adik kandungku tersayang Dedi Pranomo, Muh.farid sanjaya, Sevtania

Anawai Yunita dan Azzahra Adenia Oktavia kalian sumber inspirasi bagi saya, Tante Heniwati, Om Harmin dan seluruh keluargaku yang senantiasa memberikan bantuan dan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.

Ungkapan kebahagiaan dan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya juga tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin dan segenap birokrasi institusi yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan berupa sarana dan prasarana selama penulis menimba ilmu.
2. Ayahanda Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPD. MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.
3. Ibu A. Susilawaty, S.Si. M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Irviani A. Ibrahim, SKM, Mkes selaku Pembimbing I dan Ibu Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.kes. selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Para Pembantu Dekan, Dosen, serta segenap Staf Fakultas Ilmu Kesehatan, yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menempuh kuliah.
6. Bapak A. Muh.Fadhil Hayat, SKM, M.Kes selaku penguji I dan Bapak Dr. Hasaruddin, M.ag selaku Penguji II yang banyak memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada keluarga besar Mahasiswa UIN Alauddin Makassar: terkhusus teman-teman seangkatan 2008, teman-teman kesling, teman-teman PBL (Ira,ateng,acha,rdl,bunda,dara,aii).
8. Sahabatku tercinta Fauziah Noviyanti, Andi Amelia Amanda dan Rizky Pramadani terima kasih banyak atas segala kebersamaan baik suka maupun duka yang tidak bisa ditukar oleh apapun.
9. Teman-temanku tersayang selama masa-masa kuliah yang tidak terganti Afri,Ira,Sinta,Cebong,Gladis. Sitti,Ami kecil,jangan lupakan kebersamaan kita.
10. Terkhusus kepada Ichsana Iskandar penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan dan kesabarannya menemani penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis dengan segala kerendahan hati berharap semoga skripsi memberikan manfaat dan memberikan khasanah ilmu pengetahuan. Penulis pun berdo'a semoga amal dan budi baik semua pihak yang telah membantu selama menyusun skripsi ini mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT, Amiin.

Wallahu Walliyut Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 10 Desember 2012

Yuyun Nirwana Subair



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSIii
KATA PENGANTARiii
DAFTAR ISIiv
DAFTAR TABELv
DAFTAR LAMPIRANvi
ABSTRAKvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah10
C. Tujuan Penelitian11
D. Manfaat Penelitian 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Air	
1. Air13
2. Air Bersih18
3. Standar Kualitas Air Bersih19
4. Sumber Air Bersih23
5. Penularan Penyakit melalui Air25
B. Tinjauan Kualitas bakteriologis Air	
1. Golongan Coliform dan MPN coli27
2. Morfologi dan Fisiologi28
3. Tempat Hidup28
4. Sebagai Indikator Pencemaran Air28
C. Tinjauan Umum Sumur Gali	
1. Pengertian29
2. Syarat-syarat29
D. Tinjauan Umum Diare	
1. Pengertian31
2. Mekanisme Penularan32
3. Faktor Kesehatan Lingkungan dan Perilaku terhadap Diare35

BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel yang di Teliti	42
B. Kerangka Konsep	45
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	45

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
D. Metode Pengumpulan Data	48
E. Pengolahan dan Penyajian Data	49
F. Alat dan Metode Pemeriksaan Sampel	49
G. Jadwal Penelitian	52

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	53
B. Pembahasan	61

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Distribusi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Sumur gali MPN coliform di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
2. Distribusi responden berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
3. Distribusi Kualitas Fisik Air Air Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
4. Distribusi Indikator Konstruksi Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
5. Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
6. Distribusi Responden Menurut Pendidikan di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
7. Distribusi Responden Menurut Kejadian Diare di RW. IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012
8. Distribusi Kejadian Diare Berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Kuesioner
2. Lembar Observasi
3. Master Tabel
4. Hasil Analisis
5. Dokumentasi
6. Surat Izin Penelitian
7. Permenkes RI No.416/Per/IX/1990
8. Riwayat Hidup



ABSTRAK

Yuyun Nirwana Subair, Gambaran Kualitas Sumur Gali Dengan Kejadia Diare Di Rw IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Kualitas sumur gali tergantung kepada beberapa faktor diantaranya terjadinya pencemaran, baik pencemaran bentuk fisik, kimia maupun biologis. Penyakit yang disebabkan akibat mengkonsumsi air sumur yang mengandung bakteri golongan Coliform adalah diare.

Penelitian bertujuan mengetahui gambaran kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV di kelurahan tamangapa kecamatan manggala Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga yang menggunakan sumur gali sebagai sarana air bersih di RW.IV pemukiman terdekat dengan TPA Tamangapa sebanyak 56 kepala keluarga, dengan jumlah sampel sebanyak 23 kepala keluarga dan 7 buah sumur umum yang berada di tiga titik terdekat dengan TPA Tamangapa. Pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling dan di olah menggunakan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang konstruksi sumur, kualitas bakteriologis dan fisik air sumur galinya yang tidak memenuhi syarat yaitu terdapat 12 penderita diare, sedangkan yang memenuhi syarat tidak ada penderita diare.

Penelitian ini menyarankan kepada masyarakat kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, memasak air hingga mendidih sebelum di konsumsi oleh keluarga dan melakukan desinfektan pada sumber air bersih yang yang digunakan dengan bubuk kaporit sesuai dosis yang telah tentukan, konstruksi sumur masih perlu diperbaiki agar tidak terjadi pencemaran terhadap air sumur gali tersebut dan kepada petugas puskesmas agar dapat memantau kualitas air bersih yang digunakan masyarakat secara berkala.

Kata Kunci : Bakteriologis Air Sumur, Kualitas Fisik, Konstruksi Sgl, Diare

Daftar Bacaan : 28 (1992-2012)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Air merupakan suatu zat yang istimewa dan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Air tampil dalam tiga wujud sekaligus sebagai benda cair, benda padat (es, glacier) dan benda gas (uap). Air juga terdapat di tiga ruang yaitu permukaan bumi, didalam tanah dan atmosfer bumi. Wilayahnya mencakup hampir tiga perempat permukaan bumi. Sebagai air permukaan volume air 1.350 juta km³ (99,3%) yang tersimpan di danau, sungai, samudera luas, rawa, sawah dan got. Di dalam atau di bawah air berwujud sebagai air tanah volumenya sekitar 8,3 juta km³ (0,6%) yang tersimpan di dalam tanah termasuk sumur-sumur. Dan sisanya terdapat di atmosfer bumi, dalam wujud uap atau awan dengan volume sekitar 12.900 km³ (0,1%). Jadi secara keseluruhan, di planet bumi ini terdapat sekitar 1.360 km³ air (Daud, 2005).

Air di dunia pada dasarnya adalah konstan, namun penyebarannya tidak merata disetiap daerah / wilayah, hal ini disebabkan karena faktor geologi atau struktur tanah. Disamping itu yang ikut berpengaruh adalah faktor cuaca seperti curah hujan, suhu, kelembapan dan kecepatan angin. Selain faktor cuaca yang ikut pula berpengaruh adalah keadaan topografi seperti daerah pegunungan, daerah pesisir dan kepulauan serta daerah gurun.

Konsep kekekalan energi pada siklus hidrologi, bahwa jumlah air di bumi selalu tetap. Hanya distribusi dan wujud air yang berubah, kecuali ada beberapa komponen air tanah yang tidak ikut siklus hidrologi semisal air *connate* dan air meteorik dalam jumlah yang sangat kecil.

Salah satu sumber air adalah air angkasa atau biasa disebut hujan. Allah swt berfirman tentang pergiliran hujan di bumi sehingga terjadi variasi spasial curah hujan yaitu dalam QS al-Furqan ayat (25): 50

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَثُورًا

Artinya :

“Dan Sesungguhnya Kami telah memergilirkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (dari padanya); Maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat)”.

Jika kita memahami ayat di atas bahwasanya Allah menurunkan air dari langit sekali turun di tempat dalam waktu ini dan dikali lain di tempat waktu itu. Tidak lain supaya mereka yang hidup dapat mengambil pelajaran dan menyukuri nikmat Allah namun sungguh mengherankan kebanyakan mereka sangat kufur yaitu mengingkari nikmat yang diturunkan (Shihab, Tafsir al-Mishbah).

Air adalah kekayaan alam yang dikaruniakan Allah swt sebagai sarana hidup dan kehidupan yang amat penting dan menyangkut hajat hidup manusia, hewan maupun tumbuhan. Kehidupan di alam ini berkepentingan kepada air. Adanya kenyataan bahwa bumi yang kita huni dua pertiga adalah laut, lebih

memperkuat lagi kedudukan dan kepentingan air bagi seluruh makhluk dan lingkungan dimana ia berada (Efendi,2003, hal 17).

Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit. Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau. Melalui penyediaan air bersih dan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, masyarakat melakukan suatu usaha dengan swadaya dana masyarakat sendiri yaitu dengan membuat sumur artesi atau sumur dalam. Kemampuan penyediaan air bersih untuk kehidupan sehari-hari bagi manusia adalah hal yang sangat penting. Air, tanah, dan manusia adalah hal yang tidak dapat dipisahkan (Jack, 2008).

Pentingnya air dalam tubuh manusia , berkisar antara 50-70% dari seluruh berat badan. Dalam tulang terdapat air sebanyak 22% berat tulang, didarah dan ginjal sebanyak 823%. Pentingnya air bagi kesehatan dapat dilihat dari jumlah air yang ada dalam organ, 80% dari darah terdiri dari air, 25% dari tulang, 75% dari usrat syaraf, 80% dari ginjal, 755 dari hati, 75% dari otot adalah air. Kekurangan air dapat menyebabkan banyaknya didapat penyakit batu ginjal dan kandung kemih, karena terjadi kristalisasi unsur-unsur yang ada di dalam cairan tubuh. Kehilangan air sebanyak 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian. Kebutuhan orang dewasa perlu minum 1,5-2 liter air sehat (Soemirat, 2006).

Air sangat penting bagi kehidupan manusia, manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh

manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air, tubuh orang dewasa sekitar 55 - 60% berat badan terdiri air, untuk anak- anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 8% (Notoatmodjo, 2007, hal 172).

Air yang sehat dan berkualitas mengandung energi yang dapat dimanfaatkan untuk keseimbangan tubuh karena apabila tidak ada keseimbangan energi di dalam tubuh maka metabolisme akan mengalami ketidakstabilan. Kalau hal ini terjadi faktor-faktor resiko terjadinya penyakit di dalam tubuh mengalami suatu pergerakan sehingga tubuh tidak mampu lagi mengontrol maka terjadilah drop atau penurunan energi di bawah titik normal. Untuk mendapatkan energi dari energi yang sehat maka tentu air itu perlu perlakuan yang baik, baik sebelum diminum atau dimanfaatkan untuk keperluan tubuh kita termasuk mandi mencuci dan sebagainya.

Banyak penduduk yang terpaksa memanfaatkan air yang kurang bagus kualitasnya. Hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan ekonomi serta pengetahuan yang memadai tentang kualitas air yang baik. Tentu saja hal ini akan berakibat kurang baik bagi kesehatan masyarakat dalam jangka pendek. Kualitas air yang kurang baik dapat mengakibatkan penyakit diantaranya muntaber, diare, kolera, tipus atau disentri. Salah satu bakteri penyebab munculnya penyakit itu adalah bakteri *Escherichia Coli (E. Coli)*.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional adalah meningkatnya derajat kesehatan. Derajat kesehatan suatu negara dapat diukur dengan melihat tingkat kesakitan dan tingkat kematian yang disebabkan oleh

umur dan usia harapan hidup. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) telah merumuskan salah satu tujuan pembangunan nasional yaitu tercapainya kemampuan hidup sehat. Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa mencari tempat tinggal dekat air supaya mudah untuk mengambil air untuk keperluan hidupnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan air bersih dapat tercukupi sehingga mereka dapat hidup sehat dan tidak muda terkena penyakit (Soemirat, 2006).

Masalah penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas dalam perbaikan derajat kesehatan. Mengingat keberadaan air sangat vital dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kehidupan dimuka bumi ini hanya dapat berlangsung dengan keberadaan air. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pesatnya pembangunan, maka kebutuhan air pun semakin meningkat. Sehingga dituntut tersedianya air yang sehat yang meliputi pengawasan dan penetapan kualitas air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjamin tercapainya air minum maupun air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat (Rismunandar, 2001, hal 2).

Banyak penduduk terpaksa memanfaatkan air yang kurang bagus kualitasnya. Tentu saja hal ini berakibat kurang baik bagi kesehatan masyarakat pada jangka pendek, kualitas yang kurang baik dapat menyebabkan muntaber, diare, kolera, tipus atau disentri. Hal ini dapat terjadi pada keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik. Bila air tanah dan air permukaan tercemari oleh kotoran, secara otomatis kuman-kuman tersebar di sumber air yang dipakai untuk

keperluan rumah tangga, contoh makan minum. Dalam jangka panjang air yang kualitasnya kurang baik dapat mengakibatkan tulang keropos, korosi gigi, anemia dan kerusakan ginjal. Hal ini terjadi karena terdapatnya logam-logam yang berat yang bersifat toksik (Kusnaedi, 2004).

Masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air di Indonesia meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik dan kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kerusakan dan berbahaya untuk semua makhluk hidup yang tergantung pada sumber daya air (Efendi, 2003, hal 17).

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang pengawasan dan syarat-syarat kualitas air yang disebut air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persyaratan air minum meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisik.

Program cakupan air bersih di Kota Makassar pada tahun 2008 sebesar 82,55%, sedangkan cakupan air minum pada tahun 2007 sebesar 80,85% untuk fisik, cakupan kualitas air bersih sebesar 87,02% terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2007 yaitu 83,43% (Dinkes Kota Makassar).

Air digunakan oleh manusia untuk keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, mencuci, kakus dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya. Namun dalam banyak hal, air yang digunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan karena sering ditemukan air tersebut mengandung bibit penyakit dan justru membahayakan kelangsungan hidup manusia. Hal ini disebabkan karena banyaknya pencemaran yang terjadi pada air yang dapat menyebabkan dapat menyebabkan diare dan berbagai penyakit menular lainnya.

Air merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan sebagai pelarut, pembersih dan keperluan lain rumah tangga, industri maupun usaha lainnya. Demikian eratnya hubungan air dengan kehidupan manusia, air dapat berperan sebagai *vehicle* penularan penyakit maupun gangguan kesehatan karena kandungan bahan tertentu di dalamnya (Sarudji, 2010, hal 165). Masalah air bersih perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Apabila sumber air minum yang dikonsumsi keluarga tidak sehat, maka seluruh anggota keluarga akan menghadapi masalah kesehatan atau sakit contohnya diare (Adriani, 2011, hal 61).

Diare termasuk dalam golongan penyakit menular yang diprioritaskan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, penyelenggaraan kesehatan pada umumnya, karena angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi. Karena menurut WHO, penyakit diare membunuh satu anak di dunia ini setiap 15 detik,

karena akses pada sanitasi masih terlalu rendah. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan lingkungan yang besar, serta merugikan pertumbuhan ekonomi dan potensi sumber daya manusia pada skala nasional. Mikroorganisme yang digunakan sebagai indikator polusi pada air adalah bakteri yang tergolong dalam bakteri *Coliform*. Jumlah dan jenis mikroorganisme juga dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik seperti bau, rasa, warna, suhu (Fardiaz, 2008, hal 43).

Salah satu contoh kasus mengenai pencemaran air pernah terjadi di Jakarta. Kepadatan penduduk dibarengi tingginya pembangunan di Jakarta memicu terjadinya penyempitan lahan. Sempitnya lahan mengakibatkan warga terpaksa membangun sumur berdekatan dengan *septic tank*. Kondisi ini mengakibatkan sekitar 85 persen sumur di Jakarta tercemar bakteri yang berasal dari rembesan limbah *septic tank*. Karena lokasi *septic tank* dengan sumur berdekatan, maka bakteri *E.Coli* dikenal sebagai mikroba yang bisa menyebabkan faktor keracunan pada makanan. Karena itu dinas kesehatan mengingatkan warga bahwa idealnya pembangunan *septic tank* berjarak 10 meter dari sumur. Sumur merupakan sumber air yang banyak digunakan masyarakat Indonesia kurang lebih 45%. Agar air sumur memenuhi syarat kesehatan sebagai sarana air bersih, maka air sumur harus dilindungi dari kontaminasi zat-zat berbahaya (Entjang, 2000, hal 77).

Contoh kasus lain tentang banyaknya sumur gali yang tercemar juga terjadi di Kelurahan Antang Makassar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Joeharno, didapati bahwa 53% sumur yang ada di kelurahan Antang tidak

memenuhi syarat mikrobiologis, artinya 53% sumur yang ada di kelurahan Antang kurang layak dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, begitu pula dengan konstruksi sumur galinya sekitar 66,7% tidak memenuhi syarat.

Data-data di atas, menunjukkan bahwa baik kuantitas air bersih dalam pengertian cangkupannya maupun kualitas air (bakteriologis) belum 100% terpenuhi sehingga memungkinkan terjadinya penularan penyakit melalui air seperti diare. Kejadian diare adalah gejala suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan perubahan bentuk tinja menjadi encer, berair dan biasanya berwarna putih pucat bercampur darah. Akibat diare adalah kekurangan cairan tubuh dan garam-garam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Makin lama seorang terkena diare semakin banyak dan cepat kehilangan cairan. Akibatnya akan menimbulkan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian (Depkes RI, 2003)

Data dari dinas kesehatan Kota Makassar wilayah Antang (Puskesmas Tamangapa, Antang, Antang Sakura) untuk tahun 2011-2012 masih termasuk wilayah yang angka kejadian diarenya cukup tinggi. Data menunjukkan sekitar 1435 kasus diare yang terjadi di wilayah tersebut, sedangkan data dari puskesmas Tamangapa tahun 2011-2012 terdapat 484 kasus diare dan berada di urutan kedua dari 10 penyakit terbanyak. Salah satu faktor penyebab diare adalah konsumsi sumber air yang terkontaminasi oleh E.coli. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik meneliti sumber air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat kelurahan Tamangapa Kecamatan manggala Kota makassar.

Masyarakat kelurahan Tamangapa dominan menggunakan air PDAM namun masih cukup banyak juga yang menggunakan sumber air bersih dari sumur gali sebagai sumber utama kebutuhan air. Data Puskesmas Tamangapa Tahun 2011-2012 dilaporkan bahwa jumlah sumur gali di Kelurahan Tamangapa terdapat 372 unit dengan jumlah rumah 1.715 unit dan 2.364 orang KK, Wilayah terbanyak menggunakan sumur gali adalah RW.IV yaitu sekitar 102 unit, 40 di antaranya berada disekitar pemukiman terdekat dengan TPA (Tempat pembuangan akhir). Dimana diketahui bahwa sarana sumur gali sangat mudah mengalami pencemaran tidak hanya karena konstruksinya yang sederhana namun dipengaruhi juga oleh jaraknya dari sumber pencemaran, yang dapat memperbesar kemungkinan pencemaran dengan perembesan. Hal-hal di atas merupakan alasan mengapa peneliti memilih RW.IV kelurahan Tamangapa sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui ***“Gambaran kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2012”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk mengetahui Gambaran kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar Tahun 2012.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui gambaran hubungan kualitas bakteriologis (MPN coli) air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012.
- b) Untuk mengetahui gambaran hubungan kualitas Fisik air sumur gali dengan kejadian diare RW.IV kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

- a. Sebagai sumbangan ilmiah dan informasi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan utamanya dibidang kesehatan lingkungan serta dapat menjadi bahan bacaan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Bagi institusi dan peneliti

- a. Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sumber informasi serta sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota serta Dinas kesehatan dan

Puskesmas Tamangapa sebagai acuan untuk perencanaan kesehatan kedepannya.

- b. Sebagai pengalaman yang berharga untuk menambah wawasan ilmiah peneliti serta mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar.



BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Air

1. Air

Air adalah zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutupi hampir 71% permukaan bumi. Terdapat 1,4 triliun kilometer kubik (330 juta mil³) tersedia di bumi. Air sebagian besar terdapat di laut (air asin) dan pada lapisan-lapisan es (dikutub dan puncak-puncak gunung), akan tetapi juga dapat hadir sebagai awan, hujan, sungai, danau, uap air dan lautan es. Air dalam obyek-obyek tersebut bergerak mengikuti suatu siklus air yaitu: melalui penguapan, hujan, dan aliran air di atas permukaan tanah (meliputi mata air, sungai, muara) menuju laut.

Kondisi kesehatan individu dan masyarakat dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kualitas lingkungan yang buruk merupakan penyebab timbulnya berbagai gangguan pada kesehatan masyarakat. Untuk mewujudkan status kesehatan masyarakat yang optimum diperlukan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum (Mulia, 2005).

Air adalah bagian dari permukaan bumi. Bagi kehidupan mahluk,air bukan merupakan hal yang baru, karena tanpa adanya air tidak satupun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung. Oleh karena itu, air dikatakan sebagai benda

mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dari jumlah air yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya maupun diperolehnya air. Air mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair dan uap. Dalam bentuk padat adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa sedangkan air yang berbentuk uap adalah awan, embun. Air terdiri dari unsur kimia, yaitu ion hidrogen dan ion oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk air.

Air merupakan dasar bagi perikehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia (Sumantri,2010, hal 19).

Air sangat penting bagi kehidupan manusia, manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air, tubuh orang dewasa sekitar 55-60% berat badan terdiri air, untuk anak- anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 8% (Notoatmodjo, 2007, hal 172).

Masalah air bersih perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Apabila sumber air bersih yang dikonsumsi keluarga tidak sehat, maka seluruh anggota keluarga akan

menghadapi masalah kesehatan atau penyakit seperti diare (Adriani,2011, hal 61).

Air minum merupakan kebutuhan manusia paling penting. Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen dan untuk tetap hidup air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan aktivitasnya. Namun, agar tetap sehat, air minum harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, maupun bakteriologis (Suriawiria, 2005).

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau,tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100°C, banyak zat berbahaya,terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini (Suprihatin, 2003).

Air yang bersih sangat penting bagi kehidupan manusia dan alam sekitar, dan banyak tempat di dunia terjadi kekurangan persediaan air. Selain di bumi, sejumlah besar air juga diperkirakan terdapat pada kutub utara dan selatan planet Mars, serta pada bulan-bulan Eropa dan Enceladus. Air dapat berwujud padatan (es), cairan (air) dan gas (uap air). Air merupakan satu-satunya zat yang secara alami terdapat dipermukaan bumi dalam ketiga wujudnya tersebut.

Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, monopolisasi serta privatisasi dan bahkan menyulut konflik. Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur sumber daya air sejak tahun 2004, yakni Undang Undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Danau, sungai, lautan dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Selain mengalirkan air juga mengalirkan sedimen dan polutan. Berbagai macam fungsinya sangat membantu kehidupan manusia. Pemanfaatan terbesar danau, sungai, lautan dan air tanah adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya berpotensi sebagai objek wisata.

Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit dan tercatat atas kematian lebih dari 14.000 orang setiap harinya. Diperkirakan 700 juta orang India tidak memiliki akses ke toilet, dan 1.000 anak-anak India meninggal karena penyakit diare setiap hari. Sekitar 90% dari kota-kota Cina menderita polusi air hingga tingkatan tertentu, dan hampir 500 juta orang tidak

memiliki akses terhadap air minum yang aman. Ditambah lagi selain polusi air merupakan masalah akut di negara berkembang, negara-negara industri/maju masih berjuang dengan masalah polusi juga. Dalam laporan nasional yang paling baru pada kualitas air di Amerika Serikat, 45 persen dari mil sungai dinilai, 47 persen dari danau hektar dinilai, dan 32 persen dari teluk dinilai dan muara mil persegi diklasifikasikan sebagai tercemar.

Air biasanya disebut tercemar ketika terganggu oleh kontaminan antropogenik dan ketika tidak bisa mendukung kehidupan manusia, seperti air minum/mengalami pergeseran ditandai dalam kemampuannya untuk mendukung komunitas penyusun biotik, seperti ikan. Fenomena alam seperti gunung berapi, algae blooms, badai, dan gempa bumi juga menyebabkan perubahan besar dalam kualitas air dan status ekologi air. Masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air di Indonesia meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik dan kegiatan lain yang berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kerusakan dan berbahaya untuk semua makhluk hidup yang tergantung pada sumber daya air (Efendi, 2003, hal 17).

Air bersih adalah air yang tidak tercemar sehingga dapat diminum dengan tanpa mengganggu kesehatan. Sedangkan air murni adalah air yang tidak mengandung garam-garam mineral. Air sumur merupakan air bersih (karena tidak

tercemar), namun bukan air murni (karena mengandung garam-garam mineral). Air merupakan kebutuhan esensial bagi seluruh makhluk hidup dan merupakan habitat yang secara alaminya sangat mudah tercemar oleh faktor biotik dan abiotik. Air permukaan relatif telah terkontaminasi oleh bakteri *Coliform*, khususnya pada daerah perkotaan. Demikian pula halnya dengan kota makassar. Salah satu indikator bahwa air tercemar adalah adanya mikroorganisme patogen dan non patogen didalamnya misalnya bakteri *Coliform* (Mukono, 2008, hal 19-20).

2. Air bersih

Masalah air bersih perlu diperhatikan dengan baik karena menyangkut sumber air minum yang dikonsumsi sehari-hari. Apabila sumber air bersih yang dikonsumsi keluarga tidak sehat, maka seluruh anggota keluarga akan menghadapi masalah kesehatan atau penyakit seperti diare (Adriani,2011, hal 61).

Air bersih yang disebut sebagai air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan, yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Syarat kesehatan yang dimaksud meliputi syarat fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktivitas. Sedangkan yang disebut sebagai air minum adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum (Permenkes RI Nomor : 416/MENKES/PER/IX/1990).

3. Standar Kualitas Air Bersih

Air yang diperlukan untuk minum, memasak mandi, mencuci, membersihkan dan untuk keperluan-keperluan lainnya. Untuk semua itu diperlukan air yang memenuhi syarat kesehatan baik kuantitas maupun kualitasnya (Entjang, 2000, hal 75).

Ada dua segi penting yang harus diperhatikan dalam penyediaan air bersih yaitu :

a. Segi kualitas

Kualitas air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum pun harusnya tidak mengandung kuman pathogen dan segala mahluk yang membahayakan kesehatan manusia. Tidak mengandung zat kimia yang dapat mengubah fungsi tubuh, tidak dapat diterima secara estesis dan dapat merugikan secara ekonomis. Air itu seharusnya tidak korosif, tidak meninggalkan endapan pada seluruh jaringan distribusinya (Soemirat, 2006).

Atas dasar pemikiran tersebut dibuat standar air minum yaitu suatu peraturan yang memberi petunjuk tentang konsentrasi berbagai parameter yang sebaiknya diperbolehkan ada dalam air minum agar tujuan penyediaan air bersih tercapai.

Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan biologi. Berikut persyaratan air bersih sesuai dengan peraturan permenkes RI No.

416/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bersih harus memenuhi syarat fisik, kimia, mikrobiologi dan radioaktiv.

a. Syarat Fisik Air

1) Tidak berwarna

Air untuk rumah tangga harus jernih, air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan.

2) Tidak Berbau

Bau air tergantung dari sumbernya. Bau air dapat disebabkan oleh bahan-bahan kimia, gangguan, plankton atau tumbuhan dan hewan air baik yang hidup ataupun yang sudah mati.

3) Tidak Berasa

Secara fisik air biasa dirasakan lidah, air yang terasa asam, manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan oleh garam-garam yang larut dalam air, sedangkan rasa asam di akibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik.

4) Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel padatan sehingga memberikan warna yang berlumpur dan kotor,. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan meliputi tanah liat, lumpur dan bahan-bahan organik.

5) Temperaturnya normal air yang baik harus memiliki temperatur udara ($20^{\circ} - 26^{\circ}\text{C}$).

b. Syarat Kimia

1) pH netral, derajat keasaman air minum harus netral. Tidak boleh bersifat asam atau basa. Air minum mempunyai pH 7, apabila pH di bawah, apabila pH di bawah 7 berarti bersifat asam, sedangkan di atas 7 bersifat basa.

2) Tidak mengandung zat kimia beracun, seperti sianida, sulfida, dan fenolik. Tidak mengandung ion logam seperti Fe, Mg, Mg, Ca, dan sebagainya.

3) Kesadahan rendah, tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut dalam air.

4) Tidak mengandung bahan-bahan organik, kandungan organik yang terlarut dalam air dapat terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

c. Syarat Biologi

Air sebaiknya tidak mengandung bakteri patogen yang mengganggu kesehatan. Standar yang dipakai adalah total bakteri Coliform (MPN) pada sarana air bersih bukan perpipaan tidak boleh lebih 50/100 ml sedangkan pada sarana air bersih sistem perpipaan tidak boleh lebih dari 10/ 100 ml air.

d. Syarat radioaktiv

Yaitu adanya batas tertinggi yang diperkenankan adanya aktivitas Alpha dan beta tidak boleh lebih dari 0,1 Bq/L. Pengadaan air bersih untuk berbagai keperluan hidup manusia dapat berasal dari berbagai sumber dengan kualitas dan kuantitanya yang berbeda.

b. Segi Kuantitas

Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap waktu. Terpenuhinya dua segi di atas, adalah sangat penting untuk memungkinkan pengolahan kesehatan masyarakat yang lebih baik serta tersedianya air yang cukup untuk fasilitas sanitasi (mandi, cuci, kakus).

Kebutuhan untuk daerah perkotaan diperkirakan 150-300 liter/ orang/ hari, sedangkan untuk daerah pedesaan sekitar 100-150/ orang/ hari.

Dengan rincian:

1) Minum	: 5 Liter
2) Memasak	: 5 Liter
3) Mencuci/ membersihkan	: 15 Liter
4) Mandi	: 30 Liter
5) Kakus	: 45 Liter
Jumlah	<u>100/ Liter/ hari/ kapita</u>

4. Sumber Air bersih

Secara garis besar air untuk keperluan rumah tangga berasal dari beberapa sumber yang digolongkan dalam kelompok :

a. Air Permukaan

Pada umumnya sumber air permukaan baik yang berupa sungai, danau maupun waduk adalah merupakan air yang kurang baik untuk langsung dikonsumsi oleh manusia, karena itu perlu adanya pengolahan terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan.

b. Air Tanah

Dalam proses daur air, dapat di ambil pengertian bahwa air tanah adalah air yang tersimpan/ terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian/ penambahan secara terus-menerus oleh alam.

Melalui air Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup. Banyak fakta dari hasil penelitian ilmu pengetahuan modern menyatakan bahwa hampir seluruh makhluk di bumi memerlukan air sebagai salah satu substansi pembentuk kehidupan.

Hal ini dapat dilihat dalam Q,S al-Anbiyaa (21) : 30

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan

segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman”.

Dalam ayat al-Anbiyaa ayat 30 mengungkapkan tentang air sebagai substansi dasar dari kehidupan secara umum. Dalam ayat ini mengungkapkan tentang keesaan Allah swt. Nalar kita digugah dengan ayat yang menyatakan bahwa : dan apakah orang-orang kafir belum juga menyadari apa yang telah Allah jelaskan melalui ayat yang lalu dan tidak melihat, yakni menyaksikan dengan mata hati dan fikiran sejelas pandangan mata bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian Allah memisahkan keduanya. Dan Allah jadikan dari air yang tumpah dari langit, yang terdapat didalam bumi dan Allah menjadikan segala sesuatunya menjadi hidup (Shihab, Tafsir al-Mishbah).

Kondisi suatu lapisan tanah membuat suatu pembagian zona air tanah menjadi dua zona besar yaitu :

1) Zona air jenuh (zona of saturation)

Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air tanah yang relatif tak berhubungan dengan udara luar dan lapisan tanahnya disebut aquifer bebas.

2) Zona air berudara (zona of aeratuion)

Zona ini adalah suatu lapisan tanah yang mengandung air yang masih dapat kontak dengan udara. Pada zona ini terdapat 3 lapis tanah yaitu :

lapisan air tanah permukaan, lapisan intermediate yang berisi air gravitasi lapisan kapiler yang berisi kapiler.

c. Air Angkasa

Pada umumnya kualitas cukup baik, namun air yang berasal dari sini akan bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan terhadap logam, yaitu timbulnya karat. Disamping itu khusus untuk daerah perkotaan air hujan akan dikotori pun oleh debu-debu, dan apabila terjadi ledakan gunung berapi air hujan pun akan dikotori oleh debu. Beberapa sifat air hujan adalah :

- 1) Air hujan bersifat lunak (soft water) karena tidak/kurang mengandung larutan garam dan mineral sehingga terasa kurang segar.
- 2) Dapat mengandung beberapa zat yang di udara seperti NH_3 dan CO_2 agresif sehingga bersifat korosif.
- 3) Dari segi bakteriologis maka relatif lebih bersih tergantung pada tempat penampungannya.
- 4) Besar curah hujan di suatu daerah merupakan patokan yang utama dalam perencanaan penyediaan air bagi kesehatan.

5. Penularan Penyakit Melalui Air

Air mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penularan beberapa bibit penyakit, besarnya pengaruh air dalam penularan penyakit tergantung keadaan air itu sendiri (Tempo, 2011).

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap makhluk hidup. Keadaan yang digunakan sehari-hari baik langsung atau tidak langsung sangat

mempengaruhi kesehatan manusia karena air dapat menjadi media perantara bagi penyebaran penyakit seperti diare, kolera, demam, tifoid, leptospirosis dan hepatitis A. Air tidak boleh mengandung sesuatu bibit penyakit. Penyakit-penyakit yang sering menular dengan perantara air adalah penyakit-penyakit yang tergolong dalam golongan “ water borne disease “ (Entjang, 2000, hal 76).

Adapun bagaimana cara penyakit yang terkait dengan air terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Waterborne mechanism

Didalam mekanisme ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau sistem pencernaan. Contoh kolera, tifoid, hepatitis, viral, disentri basiler dan poliomyelitis.

2. Waterwashed mechanism

Pada mekanisme ini terdapat tiga cara penularan :

- a. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak.
- b. Infeksi melalui kulit dan mata, seperti skabies dan trakhoma.
- c. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit *leptospirosis*.

3. Water based mechanism

Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya didalam tubuh

vektor. Contohnya skistosomiasis dan penyakit akibat *Dracunculus medinensis*.

4. Water-related insect vector mechanism

Agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak didalam air contoh *filariasis, dengue, malaria, dan yellow fever*

B. Tinjauan Kualitas Bakteriologis air

1. Golongan Coli dan MPN coliform

Organisme coliform merupakan jasad indikator pencemaran tinja dalam air, bahan makanan, dan sebagainya untuk kehadiran jasad berbahaya yang memiliki persamaan gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, serta mampu memfermentasikan laktosa pada suhu 37°C dengan membentuk asam dan gas dalam waktu 48 jam. Contoh tipikal coliform tinja adalah *E. Coli* dan coliform non Tinja adalah *Klebsiella aerogenus* (Chandra, 2007).

Karena bibit penyakit keluar bersama faeces penderita, maka diisyaratkan sumber air tidak boleh dikotori oleh faeces, sebagai petunjuk bahwa air telah terkontaminasi oleh tinja adalah adanya bakteri *E.coli* (Entjang, 2000, hal 76).

MPN (Most Probable Number) / jumlah perkiraan terdekat total bakteri coliform. Suatu metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah perkiraan dari bakteri golongan Coliform. Metode MPN menggunakan tabung dengan jumlah porsi tertentu yang berisi kaldu laktosa dan tabung durham untuk memperlihatkan fermentasi terhadap laktosa serta pembentukan gas.

Dalam klasifikasi bakteri, coliform merupakan salah satu species dari genus *Escherichia* yang berasal dari family *Enterobacteriaceae*. Bakteri golongan coliform sering dihubungkan dengan adanya pencemaran tinja, mengingat coliform terdapat dalam jumlah besar pada tinja dan hewan berdarah panas.

2. Morfologi dan fisiologi

- a) Tidak berspora, berbentuk batang, berflagel, berukuran antara 2-4 um.
- b) Gram negatif, fermentasi dalam lactose menghasilkan gas serta asam
- c) Bersifat aerobic dan fakultatif anaerobie

3. Tempat Hidup

- a) *E. Coli* : hidup dalam usus manusia dan hewan berdarah panas, dikeluarkan bersamaan dengan tinja.
- b) *Aerobacter aerogenes* : biasanya hidup pada tumbuh-tumbuhan dan jenis padi-padian, dalam tanah, daun kacang-kacangan dan juga dalam tinja manusia/ hewan.
- c) *Aerobacter clocae* : biasanya hidup dalam tanah dan tinja manusia/ hewan.
- d) *Escherichia frundi* : biasanya hidup dalam tanah dan tinja manusia ataupun hewan.

4. Sebagai indikator pencemaran air

Bakteri coliform sebagai indikator pencemaran air, secara bakteriologis ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kelompok bakteri coliform terdiri dari species-species yang dikeluarkan dalam jumlah banyak dari usus manusia bersama tinja.
- b. Mereka secara normal tidak patogen.
- c. Umumnya tidak bisa berkembang biak diluar tubuh manusia.
- d. Mudah dikenal dan dihitung dengan pemeriksaan laboratorium.

C. Tinjauan Sumur gali

1. Pengertian

Sumur gali merupakan sarana penyediaan air bersih tradisional yang banyak dijumpai dimasyarakat pada umumnya. Cara pembuatannya dengan menggunakan pacul atau linggis yang dikerjakan secara manual dapat juga dengan menggunakan alat pengebor kemudian dikerek dengan menggunakan alat kerekan. Cara mendapatkan air dengan kerekan atau cara lainnya (Joeharno, 2008)

. Sumur gali pada umumnya dibuat adalah untuk mengambil air tanah bebas sehingga dipengaruhi oleh musim. Dari segi kesehatan, sumur ini memang kurang baik kalau cara pembuatannya tidak benar-benar diperhatikan karena selain sangat dipengaruhi oleh musim juga sangat besar kemungkinannya untuk mendapatkan pencemaran apabila peletakannya salah.

2. Syarat-syarat

Syarat-syarat konstruksi sumur gali perpipaaan dan non perpipaaan menurut (Entjang,2000, hal 78) adalah :

a. Dinding sumur

- Tinggi 3 meter dalamnya dari permukaan tanah yang tak tembus air (disemen) agar perembesan air tak terjadi dari lapisan ini, sebab tanahnya mengandung bakteri (bakteri hanya dapat hidup dilapisan tanah, sampai 3 meter dibawah tanah).
- 1 ½ meter dinding berikutnya (sebelah bawahnya) di buat dari bata yang ditembok, untuk bidang perembesan dan agar bila ditimba dinding sumur tidak runtuh.
- Kedalaman sumur sampai mencapai lapisan tanah yang mengandung air cukup banyak walaupun pada musim kemarau.
- Di atas tanah dibuat dinding tembok yang kedap air, setinggi minimal 70 cm, untuk mencegah dari air permukaan dan untuk keselamatan.

b. Lantai sumur :

- Dibuat lantai sumur yang ditembok (kedap air) kurang lebih 1 ½ meter lebarnya dari dinding sumur.
- Dibuat agak miring dan ditinggikan 20cm di atas permukaan tanah bentuknya bulat atau segiempat.

c. Dasar Sumur :

- Dasar sumur diberi kerikil agar airnya tidak keruh bila ditimba.
- Permukaan tanah sekitar bangunan sumur dibuat miring untuk memudahkan penyaringan.

- d. Saluran pembuangan air bekas/ limbah dari sekitar sumur dibuat dari tembok yang kedap air yang panjangnya sekurang-kurangnya 10 meter.

D. Tinjauan Umum Diare

1. Pengertian

Menurut WHO (2008), dikatakan diare bila keluarnya tinja yang lunak atau cair dengan frekuensi tiga kali atau lebih sehari semalam dengan atau tanpa darah atau lendir dalam tinja. Sedangkan menurut Depkes (2000), diare adalah buang air besar lembek atau cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih dari tiga kali atau lebih dalam sehari. Jenis diare dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Disentri yaitu diare yang disertai darah dalam tinja.
- b) Diare persisten yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus menerus.
- c) Diare dengan masalah lain yaitu diare yang disertai penyakit lain, seperti: demam dan gangguan gizi.

Kejadian Diare di Indonesia diperkirakan 40-50 per 1000 penduduk/ tahun dimana 70-80% daripadanya terjadi pada usia balita, sedangkan insiden tertinggi terjadi pada usia dibawah 2 tahun. Ditinjau dari daya tahan tubuh atau kekebalan terhadap serangan penyakit anak balita merupakan kelompok umur yang rawan dibandingkan dengan kelompok umur yang lebih tua dari itu. Sebagai akibat diare anak balita akan kehilangan cairan dalam jumlah banyak dalam waktu yang sangat singkat, keadaan itu disebut dehidrasi atau kekurangan cairan, dehidrasi

dapat membuat anak kejang karena kehilangan zat-zat tertentu seperti natrium, kalsium, magnesium kalium dan lain-lain tergantung dari berapa banyak terjadinya penurunan berat badan akan terjadi dehidrasi sedang atau berat. Untuk menentukan tingkat dehidrasi ini maka pertimbangan berat badan penderita sangat penting sekali karena diare dapat menyebabkan dehidrasi dan bila tidak segera diobati dapat menyebabkan kematian maka pengobatan diare yang paling penting adalah dengan jalan mengganti cairan yang hilang.

2. Mekanisme penularan

a. Penyebab diare infeksius

Ketiga tipe penyebab infeksi utama yaitu bakteri, urin dan parasit di negara berkembang. *Entero toxigenic*, *E.Coli*, *Compilabacter jejuni*, *Shigella* dan *Enthero pathogenic*. *E.Coli* merupakan bakteri penyebab paling utama diare bayi. *E.Coli* merupakan penyebab diare di negara berkembang.

b. Sumber Penularan

Agen penyebab penyakit yang akan menginfeksi manusia sebelum berpindah ke host, berasal dari sumber penularan yang disebut *resevoir*. Sebelum memasuki jalur penularan agen penyebab diare hidup dan berkembang biak pada manusia, binatang piaraan, termasuk tikus, kucing, jenis unggas, kura-kura dan anjing.

c. Cara keluar masuk kuman dari sumber penularan

Kuman penyakit diare keluar dari tubuh *resevoir* melalui saluran pencernaan baik bersama ludah, muntah maupun tinja.

d. Cara penularan dan faktor resiko

Agent infeksius yang menyebabkan diare biasanya ditularkan melalui jalur *fukaloral* terutama karena :

- 1) Makanan atau air yang ditelan terkontaminasi
- 2) Kontak dengan tangan yang terkontaminasi

Beberapa faktor di kaitkan dengan bertambahnya penularan kuman *Enteropathogen* perut termasuk :

- 1) Tidak memadainya penggunaan air bersih
- 2) Air tercemar oleh tinja
- 3) Kurangnya sarana kebersihan
- 4) Kebersihan perorangan atau lingkungan yang jelek
- 5) Penyajian dan penyimpanan makanan yang tidak saniter
- 6) Tindakan penyapihan yang jelek

Sebagai tambahan, beberapa faktor yang berhubungan dengan bertambahnya kecendrungan untuk terkena diare dan tingginya insiden diare adalah :

1. Gizi kurang
2. Menurunnya daya tahan tubuh
3. Berkurangnya asam lambung

4. Menurunnya mortalitas usus

5. Faktor genetik

e. Diare menurut prose berlangsungnya

1. Diare akut

Bila penderita buang air besar dengan frekuensi tinja atau cair, kejadian bersifat mendadak dan berlangsungnya dalam kurun waktu 2 minggu.

2. Diare Kronis

Bila berlangsung sampai 2 minggu atau lebih umunya bersifat menahun.

f. Pencegahan dan Pemberantasan Diare

Pencegahan diare dapat dilakukan dengan kegiatan antara lain :

1. Promosi kesehatan
2. Meningkatkan makanan pendamping ASI
3. Pengawasan penyediaan air bersih
4. Higiene sanitasi makanan
5. Higiene sanitasi perorangan
6. Sanitasi lingkungan dan penyuluhan
7. Imunisasi campak bagi bayi

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pemberantasan diare adalah berupa kegiatan :

1. Upaya pengobatan dan perawatan penderita, dengan usaha pemberian oralit pada penderita
2. Pengamatan terhadap terjadinya kejadian luar biasa dalam upaya penanggulangannya, yang dilakukan oleh petugas yang ada di puskesmas dan rumah sakit, yang mempunyai tugas membagikan oralit dan mengadakan penanggulangan diare pada balita, sehingga dapat memberikan laporan jumlah penderita diare yang ditolong.
3. Peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, di arahkan untuk peningkatan mutu hidup keluarga, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.
4. Upaya peningkatan sanitasi lingkungan hygiene dan hygiene perorangan serta menerapkan Perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Faktor kesehatan Lingkungan dan Perilaku terhadap Diare

Penyakit diare merupakan salah satu penyakit yang berbasis lingkungan. Dua faktor yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat, seperti makanan dan minuman maka dapat menimbulkan kejadian diare (Depkes RI, 2000).

Pada pertengahan abad ke-15 para ahli kedokteran telah menyebutkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor

lingkungan merupakan faktor yang sangat penting terhadap timbulnya berbagai penyakit tertentu, sehingga untuk memberantas penyakit menular diperlukan upaya perbaikan lingkungan (Notoatmodjo, 2003).

Faktor lingkungan seseorang yang keadaan fisik atau daya tahannya terhadap penyakit kurang, akan mudah terserang penyakit (Soemirat, 2006). Masalah kesehatan lingkungan utama di negara-negara yang sedang berkembang adalah penyediaan air minum, tempat pembuangan kotoran, pembuangan sampah, Kondisi rumah dan pembuangan pengelolaan air limbah (Notoatmodjo, 2003 hal 146 -174).

a. Kebersihan Jamban

Kotoran manusia adalah semua benda atau zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan harus dikeluarkan dari dalam tubuh seperti tinja, air seni dan CO₂. Masalah pembuangan kotoran manusia merupakan masalah pokok karena kotoran manusia adalah sumber penyebaran penyakit yang multikompleks. Beberapa penyakit yang dapat disebarkan oleh tinja manusia antara lain: tipus, diare, disentri, kolera, bermacam-macam cacing seperti cacing gelang, kremi, tambang, pita, dan *schistosomiasis*. Syarat pembuangan kotoran antara lain, tidak mengotori tanah permukaan, tidak mengotori air permukaan, tidak mengotori air tanah, kotoran tidak boleh terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh lalat untuk bertelur atau berkembang biak, jamban harus terlindung atau tertutup, pembuatannya mudah dan murah (Notoatmodjo, 2003 hal 158-159).

Bangunan jamban yang memenuhi syarat kesehatan terdiri dari: rumah jamban, lantai jamban, sebaiknya semen, slab, *closet* tempat feses masuk, pit sumur penampungan feses atau cubluk, bidang resapan, bangunan jamban ditempatkan pada lokasi yang tidak mengganggu pandangan, tidak menimbulkan bau, disediakan alat pembersih seperti air atau kertas pembersih. Menurut Notoatmodjo (2003 hal 161-165), jenis jamban dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) *Pit privy* (cubluk)

Lubang dengan diameter 80-120cm sedalam 2,5-8m. Dinding diperkuat dengan batu-bata, hanya dapat dibuat di tanah dengan air tanah dalam.

2) *Bored hole latrine*

Bored hole latrine seperti cubluk, hanya ukurannya kecil, karena untuk sementara. Jika penuh dapat meluap sehingga mengotori air permukaan.

3) *Angsatrine*

Closet-nya berbentuk leher angsa sehingga selalu terisi air. Fungsinya sebagai sumbat sehingga bau busuk tidak keluar.

4) *Overhung latrine*

Rumah kakusnya dibuat di atas kolam, selokan, kali, rawa dan lain-lain. Feses dapat mengotori air permukaan.

5) Jamban cemplung, kakus (*Pit Latrine*)

Jamban cemplung kurang sempurna karena tanpa rumah jamban dan tanpa tutup. Sehingga serangga mudah masuk dan berbau, dan jika musim hujan

tiba maka jamban akan penuh oleh air. Dalamnya kakus 1,5-3 meter, jarak dari sumber air minum sekurang-kurangnya 15 meter.

6) Jamban empang (*fishpond latrine*)

Jamban ini dibangun di atas empang ikan. Didalam sistem ini terjadi daur ulang, yaitu tinja dapat dimakan ikan, ikan dimakan orang demikian seterusnya.

b. Pembuangan sampah

Sampah adalah semua zat atau benda yang sudah tidak terpakai baik yang berasal dari rumah tangga atau hasil proses industri. Jenis-jenis sampah antara lain, yakni sampah anorganik, adalah sampah yang umumnya tidak dapat membusuk, misalnya: logam atau besi, pecahan gelas, plastik. Sampah organik adalah sampah yang pada umumnya dapat membusuk, misalnya: sisa makanan, daun-daunan, dan buah-buahan (Notoatmodjo, 2003 hal 166).

c. Kondisi rumah

Keadaan kondisi rumah merupakan salah satu faktor yang menentukan keadaan higiene dan sanitasi lingkungan. Menurut Notoatmodjo (2003 hal 149-152), syarat-syarat rumah yang sehat ditinjau dari ventilasi, cahaya, luas bangunan rumah, fasilitas-fasilitas didalam rumah sehat adalah sebagai berikut:

a. Ventilasi

Fungsi ventilasi adalah untuk menjaga agar aliran udara didalam rumah tersebut tetap segar dan untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-

bakteri, terutama bakteri patogen. Luas ventilasi kurang lebih 15-20% dari luas lantai rumah.

b. Cahaya

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, kurangnya cahaya yang masuk kedalam ruangan rumah, terutama cahaya matahari disamping kurang nyaman, juga merupakan media atau tempat baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit. Penerangan yang cukup baik siang maupun malam adalah 100-200 lux.

c. Luas bangunan rumah

Luas bangunan yang optimum adalah apabila dapat menyediakan 2,5-3 m² untuk tiap orang. Jika luas bangunan tidak sebanding dengan jumlah penghuni maka menyebabkan kurangnya konsumsi O₂, sehingga jika salah satu penghuni menderita penyakit infeksi maka akan mempermudah penularan kepada anggota keluarga lain.

d. Fasilitas-fasilitas didalam rumah sehat

Rumah yang sehat harus memiliki fasilitas seperti penyediaan air bersih yang cukup, pembuangan tinja, pembuangan sampah, pembuangan air limbah, fasilitas dapur, ruang berkumpul keluarga, gudang, dan kandang ternak.

d. Pengelolaan air limbah

Pengelolaan air limbah adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri dan pada umumnya mengandung bahan atau zat yang

membahayakan. Sesuai dengan zat yang terkandung didalam air limbah, maka limbah yang tidak diolah terlebih dahulu akan menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup antara lain limbah sebagai media penyebaran berbagai penyakit terutama kolera, diare, typhus (Notoatmodjo, 2003 hal 171-172).

Usaha untuk mencegah atau mengurangi akibat buruk tersebut diperlukan kondisi, persyaratan dan upaya sehingga air limbah tersebut tidak mengkontaminasi sumber air minum, tidak mencemari permukaan tanah, tidak mencemari air mandi, air sungai, tidak dihinggapi serangga, tikus dan tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit dan vektor, tidak terbuka dan terkena udara luar sehingga baunya tidak mengganggu (Notoatmodjo, 2003 hal 172).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar pemikiran variabel yang di Teliti

Dalam hal penyediaan air bersih dikenal berbagai sarana di antaranya sumur gali yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, kakus. Dengan demikian perlu adanya pengawasan kualitas air dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran.

Perlu diketahui syarat kualitas air bersih yang dimanfaatkan karena membawa dampak kesehatan yang masih dipengaruhi oleh status ekonomi, status pekerjaan dan pengetahuan yang masih rendah serta perilaku keluarga yang masih berpola hidup tradisional. Air sumur gali yang kualitasnya tidak memenuhi syarat dapat mengakibatkan terjadinya penularan penyakit diare, faktor lain yaitu kondisi sanitasi lingkungan yang tidak memenuhi syarat seperti pembuangan tinja, makan / minum, membuang sampah di sembarang tempat.

Allah swt berfirman dalam Q.S al Furqaan (25): 48

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

Artinya:

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang Amat bersih”.

Ayat ini menjelaskan bahwa sungguh Allah Maha pemurah dengan menurunkan segala sesuatu yang baik-baik salah satunya adalah air hujan sebagai sumber air bagi mahluk hidup. Agar mahluk hidup dapat terus mengelangkan kehidupannya dimuka bumi ini. Ayat ini memulai menyebutkan turunnya air ke bumi, lalu betapa pentingnya air bagi mahluk hidup (Shihab, Tafsir al-Mishbah).

Berdasarkan hal tersebut disusunlah dasar pemikiran variabel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kualitas Bakteriologis (MPN coliform)

Air mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam penularan beberapa bibit penyakit, besarnya pengaruh air dalam penularan penyakit tergantung keadaan air itu sendiri (Tempo, 2011).

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap mahluk hidup. Keadaan yang digunakan sehari-hari baik langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena air dapat menjadi media perantara bagi penyebaran penyakit seperti diare, kolera, demam, tifoid, leptospirosis dan hepatitis A.

Adapun bagaimana cara penyakit yang terkait dengan air terjadi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Waterborne mechanism

Di dalam mekanisme ini, kuman patogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui

mulut atau sistem pencernaan. Contoh kolera, tifoid, hepatitis, viral, disentri basiler dan poliomielitis.

b. Waterwashed mechanism

Pada mekanisme ini terdapat tiga cara penularan :

1. Infeksi melalui alat pencernaan, seperti diare pada anak-anak.
2. Infeksi melalui kulit dan mata, seperti skabies dan trakhoma.
3. Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit *leptospirosis*.

c. Water based mechanism

Penyakit yang ditularkan dengan mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vektor. Contohnya skistosomiasis dan penyakit akibat *Dracunculus medinensis*.

d. Water-related insect vector mechanism

Agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak didalam air contoh *filariasis*, *dengue*, *malaria*, dan *yellow fever*.

Selain di atas, batas standar kualitas dari masing-masing jenis air tercantum pada permenkes RI No. 416/Per/IX/1990 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Air Bersih

MPN bakteri golongan Coliform 10/100 mL air untuk air yang berasal dari perpipaan dan 50/100 mL air bersih non perpipaan.

b. Air Minum


MPN bakteri Coliform 0/100 mL air

MPN bakteri Coliform tinja 0/100 mL air

2. Diare

Kejadian diare adalah gejala suatu penyakit yang ditandai dengan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali per hari dengan perubahan bentuk tinja menjadi encer, berair, dan biasanya berwarna putih pucat bercampur darah. Akibat diare adalah kekurangan cairan tubuh dan garam-garam yang sangat berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Makin lama seorang terkena diare semakin banyak dan cepat kehilangan cairan. Akibatnya akan menimbulkan dehidrasi dan bisa menyebabkan kematian (Depkes RI, 2003)

B. Kerangka Konsep



Keterangan:

- : Variabel yang di teliti
 - - - - - : Variabel yang tidak di teliti

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1) Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali

Definisi Operasional:

Kualitas bakteriologis yang dimaksud dalam penelitian ini ditinjau dari keberadaan MPN Coli dalam air sumur gali melalui pemeriksaan laboratorium.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : Apabila hasil pemeriksaan laboratorium MPN coli dalam air sumur gali dengan jumlah kuman dibawah 50/ 100 mL sampel air (permenkes RI No. 416/Per/IX/1990).

Tidak memenuhi syarat : Apabila tidak memenuhi syarat di atas.

2) **Kualitas Fisik Air Sumur Gali**

Definisi Operasional

Kualitas fisik air Sumur gali yang dimaksud dalam penelitian ini ditinjau dari parameter warna, bau dan rasa.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : Apabila air tersebut jernih atau tidak berwarna, tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan rasa.

Tidak memenuhi syarat : Apabila tidak memenuhi syarat di atas..

3) **Diare**

Definisi Operasional :

Diare yang dimaksud adalah meningkatnya frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja yang encer dan kadang disertai muntah.

Kriteria Objektif :

Menderita diare : Menderita jika kepala/anggota keluarga pernah Buang Air Besar > 3kali dengan konsistensi tinja yang encer dan kadang disertai muntah sehari selama tiga bulan terakhir sampai dengan penelitian di laksanakan.

Tidak menderita diare : apabila tidak memenuhi kriteria di atas.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif dengan melihat gambaran hubungan kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV Kelurahan tamangapa kecamatan Manggala. Metode yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung serta pemeriksaan sampel air di laboratorium Politeknik Kesehatan makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RW.IV daerah Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota. Alasan yang menjadi pertimbangan pemilihan peneliti, yaitu termasuk wilayah yang cukup banyak menggunakan sumur gali, prevalensi kejadian diare cukup tinggi dan wilayahnya sangat dekat dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memperbesar kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap sumur gali .

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang Menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua KK yang memakai sumur gali sebagai sarana air bersih di daerah terdekat dengan TPA

tamangapa yaitu 56 KK dan Sumur gali yang digunakan secara umum dengan jumlah 15 Unit.

2. *Sampel* :

Sampel dalam penelitian ini diperoleh secara *purposive Sampling* dengan jumlah 23 KK dan 7 Sumur Gali. Dengan kriteria inklusi :

- a) Hanya KK yang memakai sumur gali umum sebagai sarana air bersih dan,
- b) Hanya sumur yang digunakan secara umum, digunakan sebagai salah satu sumber air minum dan jaraknya berada dalam 3 titik terdekat dengan TPA Tamangapa.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap kualitas bakteriologis dan kualitas fisik air sumur gali dengan kejadian diare. Melalui cara pengisian kuesioner pada masyarakat yang terpilih sebagai sampel yang bermukim di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar.

2. Data sekunder

Diperoleh dari buku-buku literatur, Laporan penelitian dan instansi-instansi terkait.

E. Pengolahan dan Penyajian Data

1. Pengolahan data

Dari hasil penelitian yang telah terkumpul akan di olah dengan menggunakan pengolahan data SPSS versi 16.00.

2. Penyajian data

Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan–penjelasan dan data tabel analisa Variabel dependent dan variabel independent dengan kejadian diare.

F. Alat dan Metode Pemeriksaan sampel

1. Alat dan Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel air untuk pemeriksaan sampel bakteriologis

Alat : *Botol sampel steril, Label dan Bolpoin*

Bahan : *Air sumur gali*

Prosedur pengambilan Sampel :

- a) Botol yang sudah steril, pembungkus dibuka secara hati–hati begitu pula penutup botol dibuka dengan hati-hati, tangan tidak boleh bersentuhan dengan bibir botol.
- b) Tutup botol dibuka kemudian diplampir selanjutnya diturunkan secara pelan–pelan jangan biarkan botol menyentuh dinding sumur
- c) Tenggelamkan botol sepenuh-penuh ke dalam air sampai ke dasar sumur (minimal 10 cm ke dalam air).

- d) Botol di angkat dan tidak boleh tersentuh oleh dinding sumur, botol diplampir terlebih dahulu kemudian disumbat, antara ditutup dengan memutar kemudian melindungi dan membungkus kertas warna coklat dan diikat kemudian diberikan label dan kode sampel.
- e) Segera dibawa ke laboratorium untuk diperiksa kualitas bakteriologisnya.

2. Parameter Bakteriologis

a. Alat yang di gunakan

1. Incubator
2. Pipet ukur
3. Kapas steril
4. Lampu flambur
5. Autoclave
6. Tabung reaksi beserta raknya
7. Ose
8. Alkohol 70%
9. Tabung durham
10. Korek api

b. Bahan

1. Laktosa Broth (LB)
2. Berlian green lactose bile broth (BGLB)
3. Larutan pencemar
4. Sampel air sumur gali

c. Prosedur Pemeriksaan

1. Tes perkiraan

- a. Siapkan tabung reaksi yang berisi media laktosa broth dan tabung durham sebanyak 7 buah masukkan ke dalam tabung reaksi.
- b. Tabung diberi tanda untuk masing–masing porsi
- c. Sampel dikocok sampai air di dalam bercampur rata atau homogen.
- d. Masukkan sampel ke dalam tabung yang telah disiapkan dengan menggunakan pipet yaitu masing – masing 5 tabung berisi laktosa broth 1,5% diisi sampel air 10 mL 1 tabung berisi laktosa 0,5% diisi sampel air.
- e. Tabung ditutup dengan kapas steril.
- f. Tabung didalam rak di goyang supaya sampel air dengan media bercampur rata.
- g. Disimpan atau di eramkan pada temperatur 35° C selama 24 jam.
- h. Gas yang terbentuk dalam tabung durham Bdi amati
- i. Tabung yang mengandung gas di anjurkan tes sampai 4 jam lagi.

2. Tes penegasan

- a. Contoh gas yang mengandung gas baik dalam jangka waktu 20 jam sampai 48 jam dilanjutkan dengan pengujian penegasan dimana jumlah tabung yang di unakan sesuai dengan jumlah tabung yang menghasilkan gas dalam pengujian perkiraan.

- b. Dari masing–masing yang menghasilkan gas,di ambil contoh sebanyak 1-2 Ose sebelum digunakan Ose harus diflambir terlebih dahulu.
- c. Contoh ini dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi media brilian Green Lactose Broth
- d. Diamkan / eramkan pada temperatur 35° C selama 2 kali 24 jam.
- e. Amati gas yang terbentuk dalam tabung dirham
- f. Tabung yang menggunakan gas dicatat
- g. Tabung yang mengandung bakteri coliform di amati sedangkan tabung yang tidak mengandung di eramkan lagi selama 24 jam bila ternyata tidak terbentuk pengujian penegasan dinyatakan negativ dan tidak dilanjutkan ke pengujian lengkap.

G. Jadwal penelitian

Penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan sekitar 1 minggu pada tanggal

27 juli - 7 agustus 2012.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Mulai tanggal 27 juli - 7 agustus 2012 dimaksudkan untuk mengetahui gambaran Kualitas Air Sumur gali dengan Kejadian Diare. Jumlah sampel sebanyak 23 KK dan 7 sampel sumur gali. Variabel yang diteliti adalah MPN Coliform, Kuaitas Fisik air, Konstruksi sumur dan Kejadian Diare. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kualitas air sumur apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Pengambilan sampel dilakukan sehari selanjutnya sampel tersebut langsung dibawa ke laboratorium dan diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 7 sumur gali diperoleh hasil sebagai berikut:

1. MPN coliform

Kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang telah ditetapkan. Pada dasarnya perubahan kualitas air di alam ini terjadi dalam dua cara yaitu berlangsung secara alamiah maupun sebagai akibat kegiatan manusia (Daud,2005)

Pada penelitian ini kualitas air diukur berdasarkan parameter MPN coliform sebagai indikator adanya pencemaran yang berasal dari tinja atau buangan rumah tangga.

Hasil penelitian dari laboratorium berdasarkan parameter MPN coliform dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Distribusi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Sumur gali MPN coliform
di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kode Sumur Gali	Hasil pemeriksaan MPN Coliform	Keterangan
01	> 2400/100 ml	TMS
02	> 2400/100 ml	TMS
03	> 2400/100 ml	TMS
04	> 2400/100 ml	TMS
05	> 2400/100 ml	TMS
06	> 2400/100 ml	TMS
07	> 2400/100 ml	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Ket: Batas maksimum MPN coliform air bersih dari air sumur gali menurut permenkes RI No. 416/Per/IX/1990 : $\leq 50/100$ mL sampel air.

Tabel 1 Menunjukkan bahwa kualitas air sumur gali berdasarkan MPN coliform di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan manggala Kota Makassar 100% sampel air sumur gali yang digunakan sebagai sumber air bersih tidak memenuhi syarat.

2. Kualitas Fisik Air Sumur Gali

Berdasarkan kualitas fisik air sumur gali secara khusus di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi responden berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di RW.IV
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kode Sumur Gali	Kualitas Fisik Air			Keterangan
	Tidak berwarna	Tidak Bau	Tidak Berasa	
01	MS	MS	MS	MS
02	MS	MS	MS	MS
03	MS	MS	MS	MS
04	MS	MS	MS	MS
05	TMS	MS	MS	TMS
06	TMS	MS	MS	TMS
07	TMS	MS	MS	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Ket: MS (memenuhi syarat), TMS (Tidak memenuhi syarat)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sumur dengan kode 01-04 semua memenuhi syarat untuk Indikator tidak berwarna , tidak berbau dan tidak berasa. Sedangkan pada sumur kode 05-07 umumnya memenuhi syarat pada indikator tidak berbau dan tidak berasa dan tidak memenuhi syarat pada indikator tidak berwarna.

Berdasarkan kualitas fisik air sumur gali di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

**Distribusi Kualitas Fisik Air Air Sumur Gali di RW.IV Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012**

Kualitas Fisik (warna,bau,rasa)	Jumlah	Persen(%)
Tidak memenuhi syarat	3	42,8
Memenuhi syarat	4	57,1
Total	7	100%

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 2 menunjukkan bahwa umumnya air sumur gali responden mempunyai kualitas yang memenuhi syarat yaitu 4 sumur (57,1%). Sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sumur (42,8%).

3. Konstruksi Sumur

Dalam membuat sumur perlu diperhatikan persyaratan yang memenuhi syarat kesehatan. Persyaratan tersebut antara lain dinding sumur harus dibuat kedap air sekurang-kurangnya 3 meter dalamnya dari permukaan tanah. Bibir sumur dibuat kedap air sekurang-kurangnya setinggi 70 cm dari permukaan tanah. Lantai sumur dibuat kedap air dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari dinding sumur, dibuat agak miring dan ditinggikan 20 cm dari permukaan tanah dan mempunyai jarak dari sumber pencemar minimal 10m. Secara umum maka konstruksi sumur gali di wilayah penelitian yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

**Distribusi Indikator Konstruksi Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa
Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012**

Kode Sumur Gali	Konstruksi Sumur Gali					KET
	Bibir Sumur	Lantai	Dinding	SPAL	Jarak dari pencemar	
01	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
02	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
03	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
04	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
05	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS
06	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS
07	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 4 menunjukkan bahwa konstruksi Sumur Gali responden umumnya tidak memenuhi syarat terutama pada Sumur kode 05-07 yang indikator Lantai, SPAL dan jarak sumber pencemarnya tidak memenuhi syarat.

Secara umum maka distribusi konstruksi sumur gali di wilayah penelitian menunjukkan bahwa umumnya sumur gali responden mempunyai konstruksi yang tidak memenuhi syarat yaitu 100%.

4. Diare

a. Umur Responden

Distribusi responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di RW.IV Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persen(%)
20 - 29	6	26,1
30 – 39	10	43,1
> 40	7	30,4
Total	23	100%

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 5 menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 10 orang (43,1%) sedangkan yang paling sedikit yaitu yang berumur 20-29 sebanyak 6 orang (26,1%).

b. Pendidikan

Distribusi responden menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Distribusi Responden Menurut Pendidikan di RW.IV Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Pendidikan	Jumlah	Persen(%)
Tidak Sekolah	1	4,3
Tamat SD	15	65,2
Tamat SMP	5	21,7
Tamat SMA	2	8,7
Total	23	100%

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 6 menunjukkan umumnya responden paling banyak mempunyai pendidikan SD sebanyak 15 orang (65,2%) sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang tidak sekolah (4,3%).

c. Kejadian Diare

Distribusi responden menurut kejadian Diare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Distribusi Responden Menurut Kejadian Diare di RW. IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Kejadian Diare	Jumlah	Persen(%)
Tidak	11	47,8
Ya	12	52,2
Total	23	100%

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 8 menunjukkan bahwa umumnya responden anggota keluarga yang tidak menderita diare sebanyak 11 orang (47,8%) sedangkan yang menderita diare sebanyak 12 orang (52,2%).

5. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Kualitas Bakteriologis air sumur Gali (MPN coliform)

Distribusi kejadian diare berdasarkan kualitas Bakteriologis air Sumur yaitu ditinjau dari parameter MPN menunjukkan bahwa Kualitas Bakteriologis semua Air sumur Gali menyebabkan 12 orang menderita diare sedangkan yang tidak menderita diare sebanyak 11 orang.

6. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Kualitas Fisik air sumur Gali

Distribusi kejadian diare berdasarkan kualitas fisik air sumur gali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Distribusi Kejadian Diare Berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di
RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kualitas Fisik Air Sumur Gali	Menderita Diare		Jumlah
	Ya	Tidak	
Tidak memenuhi Syarat	12	0	12
Memenuhi Syarat	0	11	11
Jumlah	12	11	23

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 9 menunjukkan bahwa Kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat lebih banyak menyebabkan diare dengan jumlah 12 orang.

7. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Konstruksi Sumur Gali

Distribusi kejadian diare berdasarkan konstruksi sumur gali menunjukkan bahwa konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat lebih banyak menyebabkan diare yaitu 12 orang dibandingkan yang tidak menderita diare yaitu 11 orang.

B. Pembahasan

1. Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali kaitannya dengan Diare

Keberadaan sumur gali sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih namun demikian secara umum kondisi sanitasi air bersih dan cara pemeliharaan Sumur gali belum maksimal sehingga dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis air sumur gali.

Bakteri golongan coliform merupakan indikator terjadinya pencemaran air hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kuman pathogen yang berbahaya bagi kesehatan. Tingginya kadar MPN coliform yang terkandung dalam sumur gali dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah jarak sumur gali dari sumber pencemar serta konstruksi sumur gali. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun dari hasil penelitian semua sampel sumur gali yang konstruksinya sumurnya telah memenuhi syarat akan tetapi tetap mengandung MPN coliform hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain, seperti kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan letak timba setelah menggunakannya timba diletakkan disembarang tempat, sehingga bakteri masuk ke dalam air melalui timba yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai anggota keluarga yang pernah menderita diare sebanyak 12 responden (52,2%) sedangkan yang tidak menderita diare sebanyak 11 responden (47,8).

Penyebab terjadinya diare pada anggota keluarga 12 KK yang menjadi responden antara lain karena jarak rumah mereka merupakan rumah-rumah terdekat dari Tempat Pembuangan Akhir. Dari hasil wawancara langsung kepada 12 KK ini didapatkan bahwa air yang sudah tercemar tersebut ternyata tidak dimasak sampai mendidih hingga akhirnya dikonsumsi keluarga. Hal ini jelas menjadi faktor utama terjadinya diare, karena seperti diketahui bahwa bakteri golongan coliform hanya dapat mati jika air tersebut dimasak hingga mendidih. Tidak hanya menggunakan sumur gali untuk sumber air minum, air sumur juga dipakai mandi, mencuci pakaian, peralatan dapur, sayur, beras dan buah-buahan yang akan dimakan. 12 KK ini juga kurang menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan pembuangan tinja yang tidak saniter selain itu jarak rumah mereka adalah yang terdekat dari TPA.

Sementara pada 11 KK yang tidak menderita diare namun menggunakan sumber air bersih yang sama, peneliti mendapatkan meskipun responden mencuci peralatan dapur, beras, sayur, buah-buahan dan memasak nasi menggunakan air sumur tersebut tetapi untuk keperluan minum mereka benar-benar memahami untuk memasak air tersebut hingga benar-benar mendidih.

Adanya perbedaan jumlah kejadian diare pada penggunaan air sumur gali yang sama-sama tercemar mendorong peneliti memberi pemahaman, bahwa penggunaan sumur gali tidak apa-apa selama air dalam sumur gali tersebut tidak tercemar. Hal-hal yang terkait dalam pemeliharaan sumur gali harus tetap dijaga.

Seperti diketahui sumur gali lebih rentan tercemar apalagi jika konstruksinya tidak memenuhi syarat kesehatan dan jarak sumber pencemarnya cukup dekat. Peneliti juga memberikan pemahaman bahwa bakteri golongan coliform dapat mati jika air yang tercemar tersebut dimasak hingga benar-benar mendidih. Namun demikian walaupun bakteri coliform dapat mati jika air dimasak hingga mendidih tetap saja air yang tercemar bakteri coliform melebihi batas standar kualitas air yang tercantum dalam permenkes RI no.416/Per/IX/1990 tidak memenuhi syarat kesehatan untuk digunakan sebagai sumber air bersih ataupun air minum.

Dampak pencemaran air oleh bakteri terhadap kesehatan adalah timbulnya penyakit, maka upaya pencegahan timbulnya penyakit yang ditularkan melalui air perlu dilaksanakan. Salah satu penyakit yang penularannya melalui air adalah kejadian diare. Penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat terutama penggunaan air minum yang dimasak dan juga tentang cara-cara pembangunan tempat pembuangan tinja dan sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan.

Telah kita ketahui bahwa betapa pentingnya peranan air untuk itu kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar, agar air tanah tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Karena air merupakan kebutuhan mutlak manusia, termasuk seluruh makhluk hidup.

Sebagaimana dijelaskan bahwa air itu sumber penghidupan dalam Q.S Al_Baqarah (2):22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“ Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa bumi telah dijadikan Allah swt begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia sehingga menjadi sumber kehidupan. Bukan hanya itu, Dia juga menyiapkan segala sarana kehidupan berupa material dan immaterial (Shihab, Tafsir al-Misbah).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yaitu mengenai air dimana air sebagai sumber utama kehidupan manusia yang sebaiknya mendapatkan pengawasan. Upaya pengawasan kualitas bakteriologis air sumur gali, dapat dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan sampel secara berkala sebagai informasi yang dibutuhkan oleh Dinas kesehatan terutama untuk upaya pencegahan pencemaran sumber air bersih oleh bakteri dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air. Bila sumber air bersih yang digunakan manusia tidak memenuhi syarat baik secara fisik, kimia, biologi dan radioaktiv maka tubuh kita akan mengalami gangguan keseimbangan yang pada akhirnya menimbulkan penyakit.

Air bersih yang berasal dari Sarana Air Bersih sampai dapat diminum biasanya melalui beberapa tahap, misalnya : Tahap pengambilan, pengangkutan, tahap penyimpanan dan tahap pengambilan dari penyimpanan, tahap pemasakan, tahap penyimpanan air masak, kemudian tahap penyajian air masak. Masing-masing tahap tersebut mempunyai resiko terkontaminasi. Proses kontaminasi yang terjadi ini sangat tergantung pada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam penanganan air bersih ini terutama untuk keperluan minum.

Seperti yang dikemukakan oleh Lilis Mardiyuani (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Kualitas Sumur Gali dengan Kejadian Diare di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air yang digunakan mempengaruhi adanya kejadian diare, karena air merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen maupun non pathogen, dimana Diare yang berkaitan dengan air dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu melalui air minum, melalui air cucian, melalui mikroorganisme dan melalui serangga yang sebagian besar hidupnya di air.

Untuk usaha pencegahan agar sumber infeksi yang mengandung penyakit tidak sampai ke pejamu yaitu dengan yaitu dengan memutus mata rantai penyakit melalui media air minum dan makanan dengan memperhatikan sanitasinya. Infeksi oleh agen disebabkan apabila makanan/ minuman terkontaminasi tinja/ muntahan penderita diare. Penularan langsung dapat terjadi bila air atau tangan

tercemar dipergunakan untuk makan tanpa mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu.

2. Kualitas Fisik Air

Kualitas fisik air sumur gali dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa indikator yaitu indikator tidak berwarna, tidak bau dan tidak berasa. Dari 7 sampel sumur yang di observasi langsung oleh peneliti terdapat 4 sumur yang kualitas fisiknya memenuhi syarat dan 3 sumur yang tidak memenuhi syarat.

Sumur-sumur gali yang tidak memenuhi syarat merupakan sumur yang jaraknya paling dekat dengan TPA Tamangapa. Berdasarkan pengamatan pada indikator tidak berwarna yang merupakan indikator tidak memenuhi syarat, disebabkan oleh Lantai sumur yang tidak kedap air sehingga air limbah bekas mandi dan mencuci yang dibuang disekitar sumur dapat merembes kedalam sumur. Salah satu faktor lain mengapa sampel tidak memenuhi syarat adalah jarak dari sumber pencemar yang sangat dekat yaitu TPA Tamangapa dan hal itu didukung oleh konstruksi sumur yang tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi warna air tersebut . Air sumur yang berwarna menunjukkan bahwa didalamnya ada aktivitas pencemaran bakteri.

Sedangkan pada 4 sumur yang lain meskipun kondisi SPAL dan jarak pencemarnya cukup dekat namun peneliti mendapatkan kualitas fisik air sumur tersebut memenuhi syarat hal ini dikarenakan 4 sumur ini memiliki lantai dan dinding yang kedap air. Sehingga walaupun air bekas mandi dan mencuci mengalir di sekitar sumur namun limbahnya merembes kedalam sumur.

Berdasarkan pengamatan lanjutan oleh peneliti, Kualitas fisik air sumur gali merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya diare hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat yang menggunakan air sumur gali yang tidak memenuhi syarat menderita diare sebanyak 12 orang. Sedangkan yang memakai air sumur gali yang memenuhi syarat tidak ada menderita diare.

Kualitas fisik air yang sudah tercemar secara fisik dalam tingkatan tertentu akan mengurangi segi estetika dan tidak diterima oleh masyarakat baik itu untuk minum maupun air yang dipergunakan sebagai sarana kebersihan dalam pelaksanaan ibadah. Selain itu air yang tercemar jika digunakan sebagai sumber air minum tanpa dimasak hingga mendidih dapat mengganggu kesehatan seperti terjadinya diare.

Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisik yang sesuai dengan peraturan permenkes RI No.416/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan air bersih.

3. Konstruksi Sumur Gali

Berdasarkan hasil penelitian dari 7 sampel sumur secara umum semua sumur konstruksinya tidak memenuhi syarat kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan Konstruksi sumur (bibir sumur, lantai, dinding, SPAL dan jarak dari sumber pencemar) dengan kejadian diare didapatkan masyarakat yang

menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat dan menderita diare yaitu 12 orang sedangkan yang memenuhi syarat tidak ada penderita.

Ada beberapa sumur gali yang di observasi indikator bibir, lamtai dan dindingnya memenuhi syarat, tetapi SPAL dan jarak dari sumber pencemarnya tidak memenuhi syarat misalnya kotoran hewan, air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah disekitar rumah. Seperti kita ketahui bahwa jarak sumber air bersih dengan sumber pencemar secara bakteriologis dapat mempengaruhi kualitas dari air sumur, sebab perjalanan jenis mikroorganisme pathogen dalam tanah dapat mencapai radius 11 meter dari sumber pencemar. Sedangkan kenyataan yang didapat dilokasi penelitian, jarak sumur dengan sumber pencemar masih banyak yang beresiko mengenai hal tersebut.

Beberapa masalah/resiko dalam pada saat observasi kondisi sumur yaitu peletakkan timba atau talinya sesekali dilantai sumur, tidak tergantung, sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran air pada air sumur tersebut. Diketahui air merupakan sumber penularan penyakit utama khususnya penyakit saluran pencernaan, salah satunya diare.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianti Andua (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas bakteriologis Air Sumur Gali di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang menyatakan penyimpanan standar kualitas bakteriologis disebabkan oleh kondisi

sumur yang meliputi bibir, lantai, dinding, SPAL dan jarak sumber pencemaran. Walaupun semua indikator memenuhi syarat tetapi perlu diperhatikan kembali tata cara menyimpan timba, pengambilan air menggunakan tangan yang kadang-kadang dalam keadaan kotor, oleh karena itu disimpulkan bahwa kondisi sumur yang memenuhi syarat kesehatan belum tentu menghasilkan kualitas air yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan sebagian besar responden tidak tamat SD dan pendidikan paling tinggi responden adalah SMA, sehingga pengetahuan mereka masih kurang mengenai sumur yang memenuhi syarat dan umumnya mereka tidak mengetahui penularan-penularan penyakit melalui air. Responden rata-rata bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pemulung, kemungkinan penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan bagaimana membangun sumur yang memenuhi syarat kesehatan. Apalagi dilihat rata-rata sumur yang digunakan adalah sumur umum. Dengan demikian pengangkutan air dari sumur kerumah pada prosesnya menggunakan wadah yang tidak tertutup sehingga berpotensi untuk terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti halnya diare.

Sedangkan ditinjau dari pengetahuan berobat didapatkan bahwa sarana kesehatan yang ada sudah cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat jika ada anggota keluarga yang sakit dan khusus menderita diare sudah banyak

yang berkunjung ke puskesmas, sedangkan bila mereka menganggap parah mereka ke rumah sakit atau dokter.

a. Bibir Sumur

Bibir sumur gali adalah bagian sumur gali yang berfungsi menahan air bilasan dan zat-zat pencemar lain yang ada di sekitar sumur agar tidak jatuh/masuk ke dalam sumur termasuk pakaian, anak-anak dan hewan. Bibir sumur gali mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengatasi masuknya zat-zat yang dapat mencemari air sumur gali.

Dari hasil survey yang dilakukan bahwa 7 sumur gali yang disurvei 100% memenuhi syarat. Bibir sumur responden rata-rata memenuhi syarat dan dapat dilihat mereka cukup menyadari pentingnya indikator bibir sumur. Umumnya mereka beralasan bahwa jika bibir sumur tidak tinggi maka air bekas mandi cuci bisa mengotori air sumur dan akan membahayakan bagi anak-anak yang sering bermain disekitar sumur

b. Keadaan Lantai Sumur

Lantai sumur adalah bagian sumur gali yang sangat penting, di atas sumur gali biasanya masyarakat melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, alat dapur dan mencuci kendaraan. Lantai yang baik/sehat adalah lantai sumur yang kedap air, tidak retak dan luas 2x2(jari-jari 1m) serta mudah dibersihkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 7 buah sumur gali yang di survey hanya 4 yang memenuhi syarat dan 3 tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumur yang digunakan masyarakat umumnya memenuhi syarat kesehatan namun masih ada sebagian yang tidak memenuhi syarat seperti lantai kedap air akan tetapi lebarnya kurang dari 1 meter dari sumur gali dapat menyebabkan air yang sudah digunakan tergenang disekitar sumur gali dan merembes masuk kembali kedalam sumur menyebabkan terjadi pencemaran air sumur gali. Berdasarkan wawancara langsung responden yang memiliki 4 sumur yang memenuhi syarat sudah cukup mengetahui pentingnya lantai sumur yang memenuhi syarat oleh karena itu mereka membuat lantai yang kedap air dan baik, sedangkan pada responden yang 3 sumurnya tidak memenuhi syarat mereka beralasan tidak begitu mengetahui pentingnya lantai sumur yang memenuhi syarat kesehatan dan lagi mereka terbentur oleh masalah keuangan untuk membuat lantai sumur yang terbuat dari semen.

Konstruksi lantai sumur gali, salah satu indikator yang dapat mempengaruhi kualitas *E.coli* didalam air, dan ini menjadi indikator telah terjadi pencemaran bakteri pathogen maupun non-pathogen didalam air.

c. Dinding Sumur

Dinding sumur gali adalah bagian sumur yang memberi batas antara air dan tanah, dinding sumur yang baik akan berperan dalam proses perolehan air bersih. Dari penelitian yang dilakukan 7 sampel sumur semua dindingnya

memenuhi syarat. Hal ini menggambarkan responden cukup sadar pentingnya dinding sumur dalam hal melindungi sumur dari pencemaran ataukah masuknya hewan-hewan yg dapat mencemari air sumur, Syarat-syarat secara umum sesuai Depkes RI, dinding sumur minimal 3 meter dari lantai dan terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, tidak mudah bocor.

Sejalan dengan Chandra (2007) bahwa dinding sumur gali yang kokoh serta permanen akan jadi proteksi terhadap bakteri-bakteri pathogen maupun non pathogen yang ada dalam tanah, sehingga kualitas air dapat terjaga dan perembesan air permukaan yang telah tercemar tidak terjadi dan harus didukung oleh bibir sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan.

d. SPAL sumur Gali

Saluran pembuangan air limbah sumur gali merupakan bagian dari sumur gali yang jarang sekali mendapat perhatian dari masyarakat. Karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap saluran pembuangan air limbah Dari hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 7 sumur semua SPAL nya tidak memenuhi syarat.

Dengan melihat survey yang di atas dapat di asumsikan bahwa semua responden belum menyadari dan tidak mengetahui pentingnya SPAL dalam pencegahan pencemaran air sumur. Sumur yang SPAL nya tidak memenuhi syarat dapat dengan mudah tercemar kuman golongan *coli*, (penyebab diare) karena dapat memungkinkan terjadinya peresapan dengan mudah yang disebabkan oleh

saluran pembuangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal ini mendorong peneliti untuk memberikan pengetahuan tambahan terkait masalah pentingnya SPAL.

SPAL (Saluran pembuangan air limbah) meskipun bukan faktor utama namun merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya diare di pemukiman TPA Tamangapa, hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapatkan peneliti bahwa sebagian masyarakat yang Saluran pembuangan air limbahnya tidak memenuhi syarat ada beberapa yang menderita diare.

Saluran pembuangan air limbah adalah salah satu indikator konstruksi sumur yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu di adakan penyuluhan lanjutan karena 100% responden tidak memiliki SPAL yang memenuhi syarat kesehatan.

e. Jarak Sumur Gali dengan Sumber Pencemar

Jarak sumur gali dari sumber pencemar merupakan hal yang kurang diperhatikan masyarakat sama halnya dengan saluran pembuangan air limbah. Padahal indikator- indikator ini juga sebagai pelengkap terpenuhinya syarat kesehatan dari suatu konstruksi sumur gali. Namun dari onservasi yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 7 sumur gali semua sampel tidak memenuhi syarat kesehatan.

Seperti diketahui jarak sumber pencemar terbesar cukup dekat dengan pemukiman responden namun hal tersebut didukung lagi dengan keadaan sekitar rumah yang lingkungannya sama sekali tidak terjaga sanitasinya. Berdasarkan observasi semua lingkungan sekitar rumahnya menjadi tempat pembuangan sampah-sampah rumah tangga. Tidak terdapat tempat khusus untuk menampung sampah-sampah kecil. Hal tersebutlah yang semakin mendukung sumber pencemar semakin dekat dengan lingkungan keluarga terutama anak-anak.

Hasil di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya indikator jarak sumber pencemar, karena indikator ini dapat menyebabkan air sumur gali secara tidak langsung tercemar. Apabila hal ini masih kurang mendapat perhatian maka air sumur tidak akan pernah aman dari bahan pencemar terutama terhadap kuman yang dapat menyebabkan diare. Telah diketahui bahwa jarak sumur minimal 10 meter dari sumber pencemar antara lain jamban, air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah, kandang ternak dan lain-lain,sesuai dengan syarat-syarat Depkes RI.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air sumur gali kaitannya dengan kejadian diare maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejadian diare yang terjadi pada responden yang mempunyai kualitas bakteriologis yang tidak memenuhi syarat yaitu 12 orang.
2. Kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang kualitas Fisik Air Sumur Gali yang tidak memenuhi syarat yaitu 12 orang.
3. Kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang menggunakan sumur dengan konstruksi tidak memenuhi syarat yaitu 12 orang.

B. Saran

- 1) Diharapkan kepada masyarakat untuk memasak air yang akan dikonsumsi hingga mendidih, menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, dan melakukan desinfektan pada sumber air bersih dengan membubuhkan kaporit sesuai dosis yang ditentukan.
- 2) Diharapkan kepada Dinas kesehatan agar dapat memantau kualitas air bersih yang digunakan masyarakat secara berkala mengingat pemukiman masyarakat sangat dekat dengan TPA Tamangapa.

- 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut terhadap upaya pencegahan yang lebih terarah dari kejadian diare dengan memperhatikan proses masak air minum.



**GAMBARAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN KEJADIAN DIARE
DI RW IV KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR**



**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

RIWAYAT HIDUP



Yuyun Nirwana Subair Lahir di Tongauna 16 maret 1991. Anak Pertama dari Bpk A.B Subair, S.Pd & Ibu Nursahid, S.Pd. Pada tahun 1996-2002 memasuki pendidikan formal di SDN 2 Palangga, tahun 2003-2005 lanjut di SMPN 2 ranomeeto dan tahun 2005-2008 Penulis melanjutkan sekolah di SMAN 1 Ranomeeto, SMAN 1 Andoolo dan tamat di SMAN 4 Kendari. Setelah lulus SMA Pada Tahun 2008 penulis diterima sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu kesehatan Jurusan kesehatan Masyarakat Peminatan kesehatan lingkungan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Mulai tanggal 27 juli - 7 agustus 2012 dimaksudkan untuk mengetahui gambaran Kualitas Air Sumur gali dengan Kejadian Diare. Jumlah sampel sebanyak 7 sumur gali, variabel yang diteliti adalah MPN Coliform, Kualitas Fisik air, Konstruksi sumur dan Kejadian Diare. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung dan pemeriksaan laboratorium untuk memeriksa kualitas air sumur apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Pengambilan sampel dilakukan sehari selanjutnya sampel tersebut langsung dibawa ke laboratorium dan diperiksa. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 7 sumur gali diperoleh hasil sebagai berikut:

1. MPN coliform

Kualitas air adalah tingkat kondisi kualitas air yang menunjukkan kondisi tercemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang telah ditetapkan. Pada dasarnya perubahan kualitas air di alam ini terjadi dalam dua cara yaitu berlangsung secara alamiah maupun sebagai akibat kegiatan manusia (Daud,2004)

Pada penelitian ini kualitas air diukur berdasarkan parameter MPN coliform sebagai indikator adanya pencemaran yang berasal dari tinja atau buangan rumah tangga.

Hasil penelitian dari laboratorium berdasarkan parameter MPN coliform dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Distribusi Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Sumur gali MPN coliform
di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kode Sumur Gali	Hasil pemeriksaan MPN Coliform	Keterangan
01	> 2400/100 ml	TMS
02	> 2400/100 ml	TMS
03	> 2400/100 ml	TMS
04	> 2400/100 ml	TMS
05	> 2400/100 ml	TMS
06	> 2400/100 ml	TMS
07	> 2400/100 ml	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Ket: Batas maksimum MPN coliform air bersih dari air sumur gali menurut permenkes RI No. 416/Per/IX/1990 : $\leq 50/100$ mL sampel air.

Tabel 1 Menunjukkan bahwa kualitas air sumur gali berdasarkan MPN coliform di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan manggala Kota Makassar 100% sampel air sumur gali yang digunakan sebagai sumber air bersih tidak memenuhi syarat.

2. Kualitas Fisik Air Sumur Gali

Berdasarkan kualitas fisik air sumur gali secara khusus di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Distribusi responden berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di RW.IV
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kode Sumur Gali	Kualitas Fisik Air			Keterangan
	Tidak berwarna	Tidak Bau	Tidak Berasa	
01	MS	MS	MS	MS
02	MS	MS	MS	MS
03	MS	MS	MS	MS
04	MS	MS	MS	MS
05	TMS	MS	MS	TMS
06	TMS	MS	MS	TMS
07	TMS	MS	MS	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Ket: MS (memenuhi syarat), TMS (Tidak memenuhi syarat)

Tabel 2 menunjukkan bahwa sumur dengan kode 01-04 semua memenuhi syarat untuk Indikator tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasa. Sedangkan pada sumur kode 05-07 umumnya memenuhi syarat pada indikator tidak berbau dan tidak berasa dan tidak memenuhi syarat pada indikator tidak berwarna.

Berdasarkan kualitas fisik air sumur gali di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

**Distribusi Kualitas Fisik Air Air Sumur Gali di RW.IV Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012**

Kualitas Fisik (warna,bau,rasa)	Jumlah	Persen(%)
Tidak memenuhi syarat	3	42,8
Memenuhi syarat	4	57,1
Total	7	100%

Sumber : Data Primer,2012

Tabel 2 menunjukkan bahwa umumnya air sumur gali responden mempunyai kualitas yang memenuhi syarat yaitu 4 sumur (57,1%). Sedangkan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sumur (42,8%).

3. Konstruksi Sumur

Dalam membuat sumur perlu diperhatikan persyaratan yang memenuhi syarat kesehatan. Persyaratan tersebut antara lain dinding sumur harus dibuat kedap air sekurang-kurangnya 3 meter dalamnya dari permukaan tanah. Bibir sumur dibuat kedap air sekurang-kurangnya setinggi 70 cm dari permukaan tanah. Lantai sumur dibuat kedap air dengan jarak sekurang-kurangnya 1 meter dari dinding sumur, dibuat agak miring dan ditinggikan 20 cm dari permukaan tanah dan mempunyai jarak dari sumber pencemar minimal 10m. Secara umum maka konstruksi sumur gali di wilayah penelitian yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4

**Distribusi Indikator Konstruksi Sumur Gali di RW.IV Kelurahan
Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012**

Kode Sumur Gali	Konstruksi Sumur Gali					KET
	Bibir Sumur	Lantai	Dinding	SPAL	Jarak dari pencemar	
01	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
02	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
03	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
04	MS	MS	MS	TMS	TMS	TMS
05	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS
06	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS
07	MS	TMS	MS	TMS	TMS	TMS

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 4 menunjukkan bahwa konstruksi Sumur Gali responden umumnya tidak memenuhi syarat terutama pada Sumur kode 05-07 yang indikator Lantai, SPAL dan jarak sumber pencemarnya tidak memenuhi syarat.

Secara umum maka konstruksi sumur gali di wilayah penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 5
**Distribusi Konstruksi Sumur Gali di RW.IV Kelurahan Tamangapa
Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012**

Konstruksi Sumur Gali	Jumlah	Persen(%)
Tidak Memenuhi syarat	7	100

Sumber: Data Primer 2012

Tabel 5 menunjukkan bahwa umumnya sumur gali responden mempunyai konstruksi yang tidak memenuhi syarat yaitu 100%

4. Diare

a. Umur Responden

Distribusi responden menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persen(%)
20 - 29	6	26,1
30 – 39	10	43,1
> 40	7	30,4
Total	23	100%

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 6 menunjukkan bahwa umumnya responden mempunyai kelompok umur 30-39 tahun sebanyak 10 orang (43,1%) sedangkan yang paling sedikit yaitu yang berumur 20-29 sebanyak 6 orang (26,1%).

b. Pendidikan

Distribusi responden menurut pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Distribusi Responden Menurut Pendidikan di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Pendidikan	Jumlah	Persen(%)
Tidak Sekolah	1	4,3
Tamat SD	15	65,2
Tamat SMP	5	21,7
Tamat SMA	2	8,7
Total	23	100%

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 7 menunjukkan umumnya responden paling banyak mempunyai pendidikan SD sebanyak 15 orang (65,2%) sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang tidak sekolah (4,3%).

c. Kejadian Diare

Distribusi responden menurut kejadian Diare dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8
Distribusi Responden Menurut Kejadian Diare di RW. IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Kejadian Diare	Jumlah	Persen(%)
Tidak	11	47,8
Ya	12	52,2
Total	23	100%

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 8 menunjukkan bahwa umumnya responden anggota keluarga yang tidak menderita diare sebanyak 11 orang (47,8%) sedangkan yang menderita diare sebanyak 12 orang (52,2%).

5. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Kualitas Bakteriologis air sumur Gali (MPN coliform)

Distribusi kejadian diare berdasarkan kualitas Bakteriologis air Sumur yaitu ditinjau dari parameter MPN coliform dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9
Distribusi Kejadian Diare Berdasarkan Kualitas Bakteriologis
Air Sumur Gali Di RW IV.Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali	Menderita Diare		Jumlah
	Ya	Tidak	
Tidak memenuhi Syarat	12	11	23

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 9 menunjukkan bahwa Kualitas Bakteriologis semua Air sumur Gali menyebabkan 12 orang menderita diare sedangkan yang tidak menderita diare sebanyak 11 orang.

6. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Kualitas Fisik air sumur Gali

Distribusi kejadian diare berdasarkan kualitas fisik air sumur gali dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Distribusi Kejadian Diare Berdasarkan Kualitas Fisik Air Sumur Gali di
RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala
Kota Makassar 2012

Kualitas Fisik Air Sumur Gali	Menderita Diare		Jumlah
	Ya	Tidak	
Tidak memenuhi Syarat	12	0	12
Memenuhi Syarat	0	11	11
Jumlah	12	11	23

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 10 menunjukkan bahwa Kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat lebih banyak menyebabkan diare dengan jumlah 12 orang.

7. Distribusi Kejadian Diare berdasarkan Konstruksi Sumur Gali

Distribusi kejadian diare berdasarkan konstruksi sumur gali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Distribusi Kejadian Diare Berdasarkan Konstruksi Sumur Gali RW.IV
Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012

Konstruksi Sumur Gali (Bibir,lantai,dinding,SPAL)	Menderita Diare		Jumlah
	Ya	Tidak	
Tidak memenuhi Syarat	12	11	23

Sumber : Data Primer, 2012

Tabel 11 menunjukkan bahwa konstruksi sumur gali yang tidak memenuhi syarat lebih banyak menyebabkan diare yaitu 12 orang dibandingkan yang tidak menderita diare yaitu 11 orang.

B. Pembahasan

1. Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali kaitannya dengan Diare

Keberadaan sumur gali sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih namun demikian secara umum kondisi sanitasi air bersih dan cara pemeliharaan SGL belum maksimal sehingga akan mempengaruhi kualitas bakteriologis air sumur gali.

Bakteri golongan coliform merupakan indikator terjadinya pencemaran air hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kuman pathogen yang berbahaya bagi kesehatan. Menurut hasil penelitian nurlinda (2002) menunjukkan bahwa Kualitas air sumur gali yang tidak memenuhi syarat

sangat dipengaruhi oleh konstruksi sumur gali, jarak sumber pencemar, saluran air limbah dan lantai sumur, dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi kualitas bakteriologis air (MPN coliform) yang dapat menyebabkan terjadinya diare pada masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber utama air bersih

Tingginya kadar MPN coliform yang terkandung dalam sumur gali dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah jarak sumur gali dari sumber pencemar serta konstruksi sumur gali. Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu sama lain hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun dari hasil penelitian semua sampel sumur gali yang konstruksinya sumurnya telah memenuhi syarat akan tetapi tetap mengandung MPN coliform hal ini bias disebabkan oleh faktor lain, seperti kebiasaan masyarakat yang kurang memperhatikan leetak timba setelah menggunakannya timba di letakkan disembarang tempat, sehingga bakteri masuk ke dalam air melalui timba yang digunakan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang mempunyai anggota keluarga yang pernah menderita diare sebanyak 12 responden (52,2%) sedangkan yang tidak menderita diare sebanyak 11 responden (47,8).

Penyebab terjadinya diare pada anggota keluarga 12 KK yang menjadi responden antara lain karena jarak rumah mereka merupakan rumah- rumah terdekat dari Tempat Pembuangan Akhir, menggunakan sumber air bersih yang 100% tercemar bakteri golongan coliform, pembuangan air limbah dan

pembuangan tinja yang sembarangan. Dari hasil wawancara langsung kepada 12 KK ini didapatkan bahwa air yang sudah tercemar tersebut ternyata tidak dimasak sampai mendidih hingga akhirnya dikonsumsi keluarga. Hal ini jelas menjadi faktor utama terjadinya diare karena seperti diketahui bahwa bakteri golongan coliform hanya dapat mati jika air tersebut dimasak sampai mendidih. Tidak hanya menggunakan sumur gali untuk sumber air minum, air sumur juga di pakai mandi, mencuci pakaian, peralatan dapur, sayur, beras dan buah-buahan yang akan dimakan. 12 KK ini juga kurang menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan pembuangan tinja yang tidak saniter selain itu jarak rumah mereka adalah yang terdekat dari TPA.

Sementara pada 11 KK yang tidak menderita diare meskipun menggunakan sumber air bersih yang sama namun peneliti mendapatkan responden mencuci peralatan dapur, beras, sayur, buah-buahan dan memasak nasi menggunakan air sumur tersebut tetapi untuk keperluan minum mereka benar-benar memahami untuk memasak air tersebut hingga benar-benar mendidih.

Adanya perbedaan jumlah kejadian diare pada penggunaan air sumur gali yang sama-sama tercemar mendorong peneliti memberi pemahaman, bahwa penggunaan sumur gali tidak apa-apa selama air dalam sumur gali tersebut tidak tercemar. Hal – hal yang terkait dalam pemeliharaan sumur gali harus tetap dijaga. Seperti diketahui sumur gali lebih rentan tercemar apalagi jika konstruksinya tidak memenuhi syarat kesehatan dan jarak sumber pencemarnya cukup dekat. Peneliti juga memberikan pemahaman bahwa

bakteri golongan coliform dapat mati jika air yang tercemar tersebut dimasak hingga benar-benar mendidih. Namun demikian walaupun bakteri coliform dapat mati jika air dimasak hingga mendidih tetap saja air tercemar bakteri coliform melebihi batas standar kualitas air yang tercantum dalam permenkes RI no.416/Per/IX/1990 tidak memenuhi syarat kesehatan untuk digunakan sebagai sumber air bersih ataupun air minum. .

Dampak pencemaran air oleh bakteri terhadap kesehatan adalah timbulnya penyakit, maka upaya pencegahan timbulnya penyakit yang ditularkan melalui air perlu dilaksanakan. Salah satu penyakit yang penularannya melalui air adalah kejadian diare. Penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat terutama penggunaan air minum yang dimasak dan juga tentang cara-cara pembangunan tempat pembuangan tinja dan sumur gali yang memenuhi syarat kesehatan.

Telah kita ketahui bahwa betapa pentingnya peranan air untuk itu kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar agar air tanah tidak tercemar oleh bahan-bahan yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Karena air merupakan kebutuhan mutlak manusia, termasuk seluruh mahluk hidup.

Sebagaimana dijelaskan bahwa air itu sumber penghidupan dalam Q.S Al_Baqarah (2):22 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

الْتَمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اُنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“ Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu Mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa bumi telah dijadikan Allah swt begitu mudah dan nyaman untuk dihuni manusia sehingga menjadi sumber kehidupan. Bukan hanya itu, Dia juga menyiapkan segala sarana kehidupan berupa material dan immaterial (Shihab, Tafsir al-Misbah).

Hal tersebut sejalan dengan penelitian ini yaitu mengenai air dimana air sebagai sumber utama kehidupan manusia yang sebaiknya mendapatkan pengawasan.

Upaya pengawasan kualitas bakteriologis air sumur gali, dapat dengan mengadakan pemeriksaan sampel secara berkala sebagai informasi yang dibutuhkan oleh Dinas kesehatan terutama untuk upaya pencegahan pencemaran sumber air bersih oleh bakteri dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui air. Bila sumber air bersih yang digunakan manusia tidak memenuhi syarat baik secara fisik, kimia, biologi dan radioaktiv maka tubuh

kita akan mengalami gangguan keseimbangan yang pada akhirnya menimbulkan penyakit.

Air bersih yang berasal dari Sarana Air Bersih sampai dapat diminum biasanya melalui beberapa tahap, misalnya : Tahap pengambilan, pengangkutan, tahap penyimpanan dan tahap pengambilan dari penyimpanan, tahap pemasakan, tahap penyimpanan air masak, kemudian tahap penyajian air masak. Masing-masing tahap tersebut mempunyai resiko terkontaminasi. Proses kontaminasi yang terjadi ini sangat tergantung pada tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam penanganan air bersih ini terutama untuk keperluan minum.

Seperti yang dikemukakan oleh Lilis Mardiyuani(2008) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Kualitas Sumur Gali dengan Kejadian Diare di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air yang digunakan mempengaruhi adanya kejadian diare, karena air merupakan tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya mikroorganisme pathogen maupun non pathogen, dimana Diare yang berkaitan dengan air dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu melalui air minum, melalui air cucian, melalui mikroorganisme dan melalui serangga yang sebagian besar hidupnya di air.

Untuk usaha pencegahan agar sumber infeksi yang mengandung penyakit tidak sampai ke pejamu yaitu dengan yaitu dengan memutus mata

rantai penyakit melalui media air minum dan makanan dengan memperhatikan sanitasinya. Infeksi oleh agen disebabkan apabila makanan/ minuman terkontaminasi tinja/ muntahan penderita diare. Penularan langsung dapat terjadi bila air atau tangan tercemar dipergunakan untuk makan tanpa mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil penelitian juga peneliti mendapatkan bahwa sarana kesehatan yang ada sudah cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini terlihat jika ada anggota keluarga yang sakit dan khusus menderita diare sudah banyak yang berkunjung ke puskesmas, sedangkan bila mereka menganggap parah mereka ke rumah sakit atau dokter.

2. Kualitas Fisik Air

Kualitas fisik air sumur gali dalam penelitian ini ditinjau dari beberapa indikator penilaian yaitu indikator tidak berwarna, tidak bau dan tidak berasa. Dari 7 sampel sumur yang di observasi langsung oleh peneliti terdapat 4 sumur yang kualitas fisiknya memenuhi syarat dan 3 sumur yang tidak memenuhi syarat.

Sumur-sumur gali yang tidak memenuhi syarat merupakan sumur yang jaraknya paling dekat dengan TPA Tamangapa. Berdasarkan pengamatan pada indikator tidak berwarna yang merupakan indikator tidak memenuhi syarat, disebabkan oleh Lantai sumur yang tidak kedap air sehingga air limbah bekas mandi dan mencuci yang dibuang disekitar sumur dapat merembes kedalam sumur. Salah satu faktor lain mengapa sampel tidak memenuhi syarat adalah jarak dari sumber pencemar yang sangat dekat yaitu

TPA Tamangapa dan hal itu didukung oleh konstruksi sumur yang tidak memenuhi syarat sehingga mempengaruhi warna air tersebut . Air sumur yang berwarna menunjukkan bahwa didalamnya ada aktivitas pencemaran bakteri.

Sedangkan pada 4 sumur yang lain meskipun kondisi SPAL dan jarak pencemarnya cukup dekat namun peneliti mendapatkan kualitas fisik air sumur tersebut memenuhi syarat hal ini dikarenakan 4 sumur ini memiliki lantai dan dinding yang kedap air. Sehingga walaupun air bekas mandi dan mencuci mengalir di sekitar sumur namun limbahnya merembes kedalam sumur.

Berdasarkan pengamatan lanjutan oleh peneliti, Kualitas fisik air sumur gali merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya diare hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat yang menggunakan air sumur gali yang tidak memenuhi syarat menderita diare sebanyak 12 orang. Sedangkan yang memakai air sumur gali yang memenuhi syarat tidak menderita diare.

Kualitas fisik air yang sudah tercemar secara fisik dalam tingkatan tertentu akan mengurangi segi estetika dan tidak diterima oleh masyarakat baik itu untuk minum maupun air yang dipergunakan sebagai sarana kebersihan dalam pelaksanaan ibadah. Selain itu air yang tercemar jika digunakan sebagai sumber air minum tanpa dimasak hingga mendidih terlebih dahulu dapat mengganggu kesehatan seperti terjadinya diare.

Parameter kualitas air yang digunakan untuk kebutuhan manusia haruslah air yang tidak tercemar atau memenuhi persyaratan fisik yang sesuai

dengan peraturan permenkes RI No.416/Per/IX/1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan air bersih.

3. Konstruksi Sumur Gali

Berdasarkan hasil penelitian dari 7 sampel sumur yang telah di observasi secara umum semua sumur konstruksinya tidak memenuhi syarat kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan Konstruksi sumur (bibir sumur, lantai, dinding, SPAL dan jarak dari sumber pencemar) dengan kejadian diare adalah masyarakat yang menggunakan sumur gali yang tidak memenuhi syarat menderita diare yaitu 12 orang sedangkan yang memenuhi syarat tidak ada penderita.

Ada beberapa sumur gali yang di observasi dalam kondisi memenuhi syarat, tetapi SPAL dan jarak dari sumber pencemarnya tidak memenuhi syarat misalnya kotoran hewan, air kotor/comberan, tempat pembuangan sampah disekitar rumah. Padahal seperti kita ketahui bahwa jarak sumber air bersih terhadap sumber pencemar secara bakteriologis dapat mempengaruhi kualitas dari air sumur, sebab perjalanan jenis mikroorganisme phatogen dalam tanah dapat mencapai radius 11 meter dari sumber pencemar. Sedangkan kenyataan yang didapatkan dilokasi penelitian, jarak sumur dengan sumber pencemar masih banyak yang beresiko mengenai hal tersebut.

Satu hal lagi yang paling banyak ditemukan masalah/resiko dalam onservasi kondisi sumur yaitu peletakkan timba atau talinya sesekali dilantai sumur, tidak tergantung, sehingga memungkinkan terjadinya pencemaran air

pada air sumur tersebut, dimana diketahui air merupakan sumber penularan penyakit utama khususnya penyakit saluran pencernaan, salah satunya diare.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fianti Andua (2006) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas bakteriologis Air Sumur Gali di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang menyatakan penyimpanan standar kualitas bakteriologis disebabkan oleh kondisi sumur yang meliputi bibir, lantai, dinding, SPAL dan jarak sumber pencemaran. Walaupun semua indikator memenuhi syarat tetapi perlu diperhatikan kembali tata cara menyimpan timba, pengambilan air menggunakan tangan yang kadang-kadang dalam keadaan kotor, oleh karena itu disimpulkan bahwa kondisi sumur yang memenuhi syarat kesehatan belum tentu menghasilkan kualitas air yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya penyakit.

Selain itu hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden tidak tamat SD dan yang pendidikan paling tinggi responden adalah SMA, sehingga pengetahuan mereka masih kurang mengenai bagaimana sumur yang sehat ataupun mereka tidak mengetahui adanya penularan penyakit melalui air.

Peneliti juga mendapatkan kebanyakan reponden bermata pencaharian sebagai wiraswasta dan pemulung, kemungkinan penghasilan mereka cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa memikirkan bagaimana membangun sumur dengan kondisi yang memenuhi syarat kesehatan. Apalagi dilihat dari status kepemilikan sumur yang rata-rata sumur yang digunakan adalah sumur

umum. Dengan demikian pengangkutan air dari sumur kerumah pada prosesnya menggunakan wadah yang tidak tertutup sehingga berpotensi untuk terkontaminasi dengan bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan penyakit berbasis lingkungan seperti halnya diare.

a. Bibir Sumur

Bibir sumur gali adalah bagian sumur gali yang berfungsi menahan air bilasan dan zat-zat pencemar lain yang ada di sekitar sumur agar tidak jatuh/masuk ke dalam sumur termasuk pakaian, anak-anak dan hewan. Bibir sumur gali mempunyai peranan yang cukup penting dalam mengatasi masuknya zat-zat yang dapat mencemari air sumur gali.

Dari hasil survey yang dilakukan bahwa 7 sumur gali yang disurvei 100% memenuhi syarat. Bibir sumur responden rata-rata memenuhi syarat dan dapat dilihat mereka sudah cukup menyadari pentingnya indikator bibir sumur. Umumnya mereka beralasan bahwa jika bibir sumur tidak tinggi maka air bekas mandi cuci bisa mengotori air sumur dan akan membahayakan bagi anak-anak yang sering bermain disekitar sumur

b. Keadaan Lantai Sumur

Lantai sumur adalah bagian sumur gali yang sangat penting, di atas sumur gali biasanya masyarakat melakukan aktivitas seperti mandi, mencuci pakaian, alat dapur dan mencuci kendaraan. Lantai yang baik/sehat adalah lantai sumur yang kedap air, tidak retak dan luas 2x2(jari-jari 1m) serta mudah dibersihkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 7 buah sumur gali yang di survey hanya 4 yang memenuhi syarat dan 3 tidak memenuhi syarat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumur yang digunakan masyarakat umumnya memenuhi syarat kesehatan namun masih ada sebagian yang tidak memenuhi syarat seperti lantai kedap air akan tetapi lebarnya kurang dari 1 meter dari sumur gali dapat menyebabkan air yang sudah digunakan tergenang disekitar sumur gali dan merembes masuk kembali kedalam sumur menyebabkan terjadi pencemaran air sumur gali. Berdasarkan wawancara langsung responden yang memiliki 4 sumur yang memenuhi syarat sudah cukup mengetahui pentingnya lantai sumur yang memenuhi syarat oleh karena itu mereka membuat lantai yang kedap air dan baik, sedangkan pada responden yang 3 sumurnya tidak memenuhi syarat beralasan mereka tidak begitu mengetahui pentingnya lantai sumur yang memenuhi syarat kesehatan dan lagi mereka terbentur oleh masalah keuangan untuk membuat lantai sumur yang terbuat dari semen.

Konstruksi lantai sumur gali, dinding serta jarak dengan sumber pencemaran sangat mempengaruhi kualitas *E.coli* didalam air, dan ini menjadi indicator telah terjadi pencemaran bakteri pathogen maupun non-pathogen didalam air.

c. Dinding Sumur

Dinding sumur gali adalah bagian sumur yang memberi batas antara air dan tanah, dinding sumur yang baik akan berperan dalam proses perolehan air bersih. Dari penelitian yang dilakukan 7 sampel sumur semua dindingnya memenuhi syarat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinding sumur gali 100% memenuhi syarat kesehatan. Hal ini menggambarkan responden cukup sadar pentingnya dinding sumur dalam hal melindungi sumur dari pencemaran ataukah masuknya hewan-hewan yg dapat mencemari air sumur, Syarat-syarat secara umum sesuai Depkes RI, dinding sumur minimal 3 meter dari lantai dan terbuat dari bahan yang kuat dan kedap air, tidak mudah bocor.

Sejalan dengan Chandra (2007) bahwa dinding sumur gali yang kokoh serta permanen akan jadi proteksi terhadap bakteri-bakteri pathogen maupun non pathogenyang ada dalam tanah, sehingga kualitas air dapat terjaga dan perembesan air permukaan yang telah tercemar tidak terjadi dan harus didukung oleh bibir sumur gali yang memenhi syarat kesehatan.

d. SPAL sumur Gali

Saluran pembuangan air limbah sumur gali merupakan bagian dari sumur gali yang jarang sekali mendapat perhatian dari masyarakat. Karena kurangnya perhatian masyarakat terhadap saluran pembuangan air limbah Dari hasil survey yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 7 sumur yang disurvey SPALnya 100% tidak memenuhi syarat

Dengan melihat survey yang di atas dapat di asumsikan bahwa semua responden belum menyadari dan tidak mengetahui pentingnya SPAL dalam

pencegahan pencemaran air sumur. Sumur yang SPAL nya tidak memenuhi syarat dapat dengan mudah tercemar kuman golongan *coli*, (penyebab diare) karena dapat memungkinkan terjadinya peresapan dengan mudah yang disebabkan oleh saluran pembuangan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Hal ini mendorong peneliti untuk memberikan pengetahuan tambahan terkait masalah pentingnya SPAL.

SPAL (Saluran pembuangan air limbah) meskipun bukan faktor utama namun merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya diare di pemukiman TPA Tamangapa, hal tersebut dapat dilihat dari data yang didapatkan peneliti bahwa sebagian masyarakat yang Saluran pembuangan air limbahnya tidak memenuhi syarat ada beberapa yang menderita diare.

Saluran pembuangan air limbah adalah salah satu indikator konstruksi sumur yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu perlu di adakan penyuluhan lanjutan karena 100% responden tidak memiliki SPAL yang memenuhi syarat kesehatan.

e. Jarak Sumur Gali dengan Sumber Pencemar

Jarak sumur gali dari sumber pencemar merupakan hal yang kurang diperhatikan masyarakat sama halnya dengan saluran pembuangan air limbah. Padahal indikator- indikator ini juga sebagai pelengkap terpenuhinya syarat kesehatan dari suatu konstruksi sumur gali. Namun dari Survey yang dilakukan menunjukkan bahwa dari 7 sumur gali 100% tidak memenuhi syarat kesehatan.

Seperti diketahui jarak sumber pencemar terbesar cukup dekat dengan pemukiman responden namun hal tersebut didukung lagi dengan keadaan sekitar rumah yang lingkungannya sama sekali tidak terjaga sanitasinya. Berdasarkan survey 100% rumah responden halaman sekitar rumahnya menjadi tempat pembuangan sampah-sampah rumah tangga. Tidak terdapat tempat khusus untuk menampung sampah-sampah kecil. Hal tersebutlah yang semakin mendukung sumber pencemar semakindekat dengan lingkungan keluarga terutama anak-anak.

Hasil di atas menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya indikator saluran pembuangan limbah dan jarak sumber pencemar, karena indikator ini dapat menyebabkan air sumur gali secara tidak langsung tercemar.

Apabila hal ini masih kurang mendapat perhatian maka air sumur tidak akan pernah aman dari bahan pencemar terutama terhadap kuman yang dapat menyebabkan diare. Telah diketahui bahwa jarak sumur minimal 10 meter dari sumber pencemar antara lain jamban, air kotor/comberan. Tempat pembuangan sampah, kandang ternak dan lain-lain, sesuai dengan syarat-syarat Depkes RI. Jarak minimal 10 meter ini bertujuan agar sumur gali terhindar dari berbagai macam pencemaran yang mungkin dapat merembes ke sumur. Jarak sumur gali yang tidak memenuhi syarat kesehatan sangat memungkinkan berkembangbiaknya bakteri pathogen yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air.

Walaupun masyarakat sebagian masyarakat memasak air hingga mendidih yang digunakan untuk keperluan minum, namun kemungkinan pencemaran terhadap manusia dari air yang tercemar tetap terbuka. Hal ini disebabkan air sumur tersebut di gunakan juga untuk keperluan lainnya seperti mencuci peralatan dapur dan makan maupun untuk mencuci bahan makanan yang dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu seperti buah-buahan. Sehingga pencemar yang telah ada air masuk kedalam tubuh melalui cara pencucian tadi.

Berdasarkan penelitian semua sumur yang di uji 100% mengandung MPN coli .2400/100 ml air. Meskipun terdapat juga sumur yan konstruksinya memenuhi syarat namun mengandung MPN coli >2400/100 ml hal ini bisa disebabkan karena sumur yang diteliti adalah sumur yang berada di tiga titik terdekat dengan TPA Tamangapa dan merupakan sumur umum sehingga banyak yang menggunakan. Kadang timba disimpan di lantai sedangkan lantai mungkin dalam keadaan kotor sehingga saat digunakan kuman dapat masuk ke sumur melalui timba.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas air sumur gali kaitannya dengan kejadian diare maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejadian diare yang terjadi pada responden yang mempunyai kualitas bakteriologis yang tidak memenuhi syarat yaitu 12orang.
2. Kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang kualitas Fisik Air Sumur Gali yang tidak memenuhi syarat yaitu 12 orang.
3. Kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang menggunakan sumur dengan konstruksi tidak memenuhi syarat yaitu 12orang.

B.Saran

- 1) Diharapkan kepada masyarakat untuk memasak air yang akan dikonsumsi hingga mendidih, menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, dan melakukan desinfektan pada sumber air bersih yang digunakan dengan membubuhkan kaporit sesuai dosis yang ditentukan.
- 2) Diharapkan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas kesehatan agar dapat memantau kualitas air bersih yang digunakan masyarakat secara berkala mengingat pemukiman masyarakat sangat dekat dengan TPA Tamangapa.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih lanjut terhadap upaya pencegahan yang lebih terarah dari kejadian diare..

**GAMBARAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN KEJADIAN
DIARE DI RW IV KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN
MANGGALA MAKASSAR 2012**



OLEH

NAMA : YUYUN NIRWANA SUBAIR

NIM : 70200108091

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

ABSTRAK

Yuyun Nirwarna Subair, *Gambaran Kualitas Air Sumur Gali dengan kejadian Diare di RW IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar 2012*

Kualitas air sumur gali tergantung kepada beberapa faktor diantaranya terjadinya pencemaran, baik pencemaran bentuk fisik, kimia maupun biologis. Penyakit yang dapat disebabkan akibat mengkonsumsi air sumur yang mengandung bakteri golongan Coliform adalah diare.

Penelitian bertujuan mengetahui gambaran kualitas air sumur gali dengan kejadian diare di RW.IV Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang menggunakan sumur gali sebagai sarana air bersih di RW.IV pemukiman terdekat dengan TPA Tamangapa sebanyak 56 kepala keluarga, dengan jumlah sampel sebanyak 23 kepala keluarga dan 7 buah sumur umum yang berada ditiga titik terdekat dengan TPA Tamangapa. Pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling dan di olah menggunakan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian diare lebih banyak terjadi pada responden yang konstruksi sumur, kualitas bakteriologis dan fisik air sumur galinya tidak memenuhi syarat yaitu terdapat 12 penderita diare, sedangkan yang memenuhi syarat tidak ada penderita diare.

Penelitian ini menyarankan kepada masyarakat untuk menggunakan air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, memasak air hingga mendidih sebelum dikonsumsi oleh keluarga dan melakukan desinfektan pada sumber air bersih yang digunakan dengan membubuhkan kaporit sesuai dosis yang telah ditentukan, Konstruksi sumur masih perlu diperbaiki agar tidak terjadi pencemaran terhadap air sumur gali tersebut dan kepada petugas puskesmas agar dapat memantau kualitas air bersih yang digunakan masyarakat secara berkala.

Kata Kunci : Bakteriologis Air Sumur, Kualitas Fisik, Konstruksi SGL, Diare
Daftar Bacaan : 28 (1992-2011)

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Rukaesih. 2004. *Kimia Lingkungan*. Andi. Yogyakarta
- Adriani.2011. *Ilmu Kesehatan masyarakat*.Cetakan Pertama. Penerbit Nuha Medika.Yogyakarta
- Andua, Fianti. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali di Kelurahan Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar (skripsi)*. Politeknik Kesehatan Jurusan Kesehatan Lingkungan, Makassar
- Azwar, Asrul. 2002. *Pengantar Ilmu kesehatan Lingkungan*. Cetakan kesembilan. Penerbit Buku mutiara Sumber Widy. Jakarta
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar kesehatan Lingkungan*. Cetakan kelima. Penerbit Buku Kedokteran (EGC). Jakarta
- Darmono. 2006. *Lingkungan Hidup dan Pencemarannya*. Cetakan Pertama. Penerbit Buku Universitas Indonesia. Jakarta
- Daud, Anwar. 2007. *Aspek Kesehatan Penyediaan Air Bersih*. Cetakan pertama. Penerbit Buku CV. Healthy & Sanitation. Makassar
- Daud, Anwar. Anwar, 2005. *Dasar – dasar Kesehatan Lingkungan*. Cetakan pertama. Penerbit Buku Hasanuddin University Press. Makassar
- Dinkes Kota Makassar.2011. *Profil Kesehatan*. Makassar
- Efendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Bagi Pengelolaan Sumber daya dan Lingkungan perairan*. Yogyakarta: Kanisius. H.17
- Fardiaz, Srikandi. 1992. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta : Kanisius

Indan, Entjang. 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Cetakan kedua penerbit Buku kawan Pustaka. Bandung

Jack. 2008. *Air Bersih*
<http://abahjack.com/air-bersih.html#more-89>, akses 22 juni 2012

Joeharno, SKM. 2008. *Kualitas Air Berdasarkan Konstruksi Sumur gali*. Skripsi. Makassar : S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Makassar

Permenkes RI Nomor 416/Per/LX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih. Jakarta.

Kusnaedi. 2004. Kualitas Sumur Gali. Dalam
<http://blogjoeharno.blogspot.com/2008/05/kualitas-air-sumur-gali.html/> . Diakses 10 juni 2012

Mardiyuani, Liris, 2008. *Hubungan Kualitas Sumur Gali dengan Kejadian Diare di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (skripsi)*. Politeknik Kesehatan Jurusan Kesehatan Lingkungan, Makassar

Mukono, H.J. 2005. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga university press

Mulia, Ricki M. 2005 *Kesehatan Lingkungan Edisi pertama*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Notoatmodjo, s. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta

Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Notoatmodjo. 2003. *Prinsip-Prinsip Dasar Kesehatan masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta

- Nurzalzalina, st. 2011. ***Hubungan Kualitas Air Sumur gali Dengan Kejadian Diare Di Desa Labuaja Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Skripsi).*** Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan, Makassar
- Rismunandar. 2011. ***Fungsi Air dan Kegunaannya bagi Pertanian.*** Bandung : Sinar baru algasindo. H.2
- Sarudji, Didik. 2010. ***Kesehatan lingkungan.*** Cetakan pertama. Penerbit Karya Putra darwati. Bandung
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah: ***Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Qur'an*** edisi baru, cet.1, Jakarta : lentera Hati.2009
- Slamet, Juli Soemirat.1994. ***Kesehatan Lingkungan.*** Yogyakarta. Gajah Mada University Pres
- Slamet, Juli Soemirat. 2000. ***Kesehatan Lingkungan.*** Cet 4. Yogyakarta. Gajah Mada University Press
- Slamet, Soemirat, Juli. 2006. ***Kesehatan Lingkungan.*** Cetakan Kedua. Penerbit Buku Gadjah Mada University Press. Bandung
- Sumantri, Arif, Desember. 2010. ***Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam.*** Cetakan pertama. Penerbit Kencana Prenada media Group. Jakarta
- Suprihatin. 2003. ***Hasil studi Kualitas Air Minum Depot Isi Ulang Makalah pada Seminar Sehari Permasalahan Depot Air Minum dan Upaya Pemecahannya***
- Suriawiria, Unus. ***Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat.*** Bandung: PT Alumni,1996
- _____, ***Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat.*** Bandung: PT Alumni,2005
- _____, ***Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat.*** Bandung: PT Alumni,2008
- Tempo. 2011. ***Pencegahan Penyakit berbasis Lingkungan.***

L
L

A
A

M
M



P
P

I
I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

R
A

A
N

N

DOKUMENTASI PENELITIAN


1. Foto Pengambilan sampel air sumur Gali



2. Wawancara Langsung Kepada Pemilik Sumur Gali



No	Nama	umur	didik	diare	bibir	lantai	dinding	spal	jarak	konstruk	warna	bau	rasa	jernih	kua.fisik	Bakteri
1	Samsudin	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
2	Ardi	0	2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
3	Haris	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
4	Sangkala	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
5	Suyuti	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
6	Muhta dg saru	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
7	Hamzah	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	Pg.Suhu	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
9	Sulaiman	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
10	Jamaluddin	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
11	Samma	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
12	Hasni	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
13	Kasma	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
14	Haeruddin dg.lompo	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
15	Kahar dg.Tutu	2	3	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
16	Dg.Jumadi	2	2	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0
17	Sudirman	1	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
18	Alwi	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
19	Dg.Guling	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
20	Dg.Maros	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	Sarifuddin	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
22	Dg.Mala	2	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
23	Dg. Sena	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0



FREQUENCY

Kualitas bakteriologis

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	7	100.0	100.0	100.0

kualfisik fisik air sumur gali

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	3	42.9	42.9	42.9
memenuhi syarat	4	57.1	57.1	100.0
Total	7	100.0	100.0	

Konstruksi sumur berdasarkan bibir,lantai,dinding,spal dan jarak

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak memenuhi syarat	7	100.0	100.0	100.0

Menderita Diare

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak	11	47.8	47.8	47.8
ya	12	52.2	52.2	100.0
Total	23	100.0	100.0	

Pendidikan responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tidak sekolah	1	4.3	4.3	4.3
tamat SD	15	65.2	65.2	69.6
Tamat SMP	5	21.7	21.7	91.3
Tamat SMA	2	8.7	8.7	100.0
Total	23	100.0	100.0	

Umur responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-29 thn	6	26.1	26.1	26.1
30-39 thn	10	43.5	43.5	69.6
>40thn	7	30.4	30.4	100.0
Total	23	100.0	100.0	

CROSSTABS

Konstruksi sumur berdasarkan bibir, lantai, dinding dan spal * Menderita Diare Crosstabulation

Count		Menderita Diare		Total
		tidak	ya	
Konstruksi sumur berdasarkan bibir, lantai, dinding dan spal	Tidak memenuhi syarat	11	12	23
Total		11	12	23

Kualitas fisik air beirdasarkan tidak berwarna,tidak bau dan tidak berasa * Menderita Diare Crosstabulation

Count		Menderita Diare		Total
		tidak	ya	
Kualitas fisik air beirdasarkan tidak berwarna,tidak bau dan tidak berasa	tidak memenuhi syarat	0	12	12
	memenuhi syarat	11	0	11
Total		11	12	23

Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali (MPN coliform) * Menderita Diare Crosstabulation

Count		Menderita Diare		Total
		tidak	ya	
Kualitas Bakteriologis Air Sumur Gali (MPN coliform)	tidak memenuhi syarat	11	12	23
Total		11	12	23

LEMBAR OBSERVASI

Nomor :

Nama responden :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan:

Konstruksi Sumur Gali :

- | | | |
|------------------------------------|-------|----------|
| 1. Bibir sumur : | | |
| a. Tinggi minimal 70cm | 1. Ya | 2. Tidak |
| b. Pasangan batu bata (tembok) | 1. Ya | 2. Tidak |
| c. Kedap air | 1. Ya | 2. Tidak |
| 2. Lantai sumur: | | |
| a. Baik (tidak retak – retak) | 1. Ya | 2. Tidak |
| b. Luas 2x2 (jari-jari 1 m) | 1. Ya | 2. Tidak |
| c. Kedap air dan pengaliran lancar | 1. Ya | 2. Tidak |
| 3. Dinding sumur: | | |
| a. Kedap air minimal 3 meter | 1. Ya | 2. Tidak |
| b. Pasangan batu bata | 1. Ya | 2. Tidak |
| 4. Saluran pembuangan air bekas: | | |
| a. Jarak minimal 10 meter | 1. Ya | 2. Tidak |
| b. Konstruksi baik | 1. Ya | 2. Tidak |
| 5. Kualitas fisik air sumur gali | | |
| a. Tidak berwarna | 1. Ya | 2. Tidak |
| b. Tidak bau | 1. Ya | 2. Tidak |
| c. Tidak berasa | 1. Ya | 2. Tidak |

KETERANGAN:

- **RISIKO : YA / TIDAK**
- **SKOR RISIKO PENCEMARAN :**

0 – 8 = TIDAK MEMENUHI SYARAT

9-16= MEMENUHI SYARAT

Tanggal penelitian :

KUESIONER PENELITIAN

**GAMBARAN KUALITAS AIR SUMUR GALI DENGAN KEJADIAN DIARE DI .RW
IV KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR**

2012

A. Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Nama kepala keluarga :
3. Umur :
4. Pendidikan :
5. Pekerjaan :

B. Pengadaan air bersih

1. Dari manakah sumber air bersih yang digunakan setiap hari?
 - a. PDAM
 - b. Sumur Gali
 - c. Sumur Bor
2. Jika dari Sumur Gali, sumur gali tersebut milik siapa?
 - a. Sendiri
 - b. Tetangga
 - c. Umum
3. Apakah air minum yang di sediakan keluarga di masak hingga mendidih terlebih dahulu sebelum di minum ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Dimana anda atau keluarga anda buang air besar ?
 - a. Semak_semak
 - b. WC cemplung
 - c. WC Permanen
5. Jarak sumber air bersih dengan septic tank/ bak wc?



a. <10m

b. >10m

C. Kejadian diare

1. Adakah keluarga bapak/ ibu menderita diare (berak encer >3x sehari) atau > dluar dari kebiasaan sehari – hari dalam tiga bulan terakhir?

a. Ada

b. Tidak ada

2. Berapa orang ?

a. < 3 orang

b. > 3 orang

3. Golongan Usia?

a. Bayi dan balita

b. Remaja

c. Dewasa

4. Jika sakit, di mana anda berobat ?

a. Di obati sendiri

b. Ke puskesmas

c. Rumah sakit

d. Dokter

e. Dukun

