

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
TAHUN 2021**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan  
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**AINUN NADIA**

**70400118034**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Nadia  
NIM : 70400118034  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai, 1 Februari 2001  
Jurusan/ Prodi : D3 Kebidanan  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Samata  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “H”  
Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea Di  
RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2021

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 19 Januari 2022

Penyusun

Ainun Nadia

70400118034

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ainun Nadia  
Nim : 70400118034  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “H” Dengan Nyeri Luka  
Jahitan Post Sectio Caesarea Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar  
Tahun 2021

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 19 Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Zelna Yuni Andayani, S.ST, M.Keb

NIP: 198903282 019032 2 018

  
dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

NIP: 19870407 201503 2 003

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny. "H" Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea Di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tahun 2021" yang disusun oleh Ainun Nadia Nim: 70400118034, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 19 Januari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 19 Januari 2022

17 Jumadil Akhir 1443 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT, M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Hartini Tahir, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Islam Negeri Alauddin Makassar



Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 198007012006042002

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH

**Nama : Ainun Nadia**

**Nim : 70400118034**

**“Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “H” Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar Tanggal 6 Oktober 2021 – 17 November 2021”**

---

Sectio caesarea adalah melahirkan janin melalui irisan pada dinding perut dan dinding uterus. Sectio caesarea umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya.

Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar sesuai dengan 7 Langkah Varney dan SOAP.

Hasil pada penelitian studi kasus yang dilakukan pada Ny “H” dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea berjalan lancar karena adanya kerjasama dengan klien sehingga tingkat nyeri yang dirasakan klien dapat berkurang dan teratasi. Pemantauan dilakukan sebanyak 12 kali selama kurang lebih 6 minggu dengan asuhan untuk mobilisasi dini, istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, dan menjelaskan pada ibu penyebab nyeri.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 Langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan yang telah dilaksanakan pengkajian dan analisa pada Ny “H” dengan nyeri luka jahitan post section caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar. Dengan hasil asuhan tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu berkurang, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan hasil pemeriksaan fisik tidak ada kelainan. Sehingga dalam pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny “H” dengan hasil tidak ditemukan kesenjangan dan tingkat nyeri yang dirasakan oleh klien berkurang bahkan teratasi dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi.

**Daftar Pustaka:**

**Kata Kunci: Ibu Nifas, Post Sectio Caesarea, 7 Langkah Varney.**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UTN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER

Name : Ainun Nadia

Reg. Number : 70400118034

“Midwifery Care Management on Mrs. "H" with the Case of Suture Pain after cesarean delivery at RSIA Sitti Khadijah 1 of Makassar, October 6, 2021 to November 17, 2021”

Cesarean delivery is defined as the delivery of a fetus through surgical incisions made through the abdominal wall and the uterine wall. Cesarean delivery is mostly performed when normal vaginal delivery is not possible because of the risk of other medical complications.

The major purpose of this research was to conduct midwifery care management of the patient with the case of suture pain after the cesarean delivery at RSIA Sitti Khadijah 1 of Makassar. The research was conducted based on the Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that the cesarean delivery conducted on Mrs H was considered to be successful despite the case of suture pain felt by the patient. The cooperation of the patient in the caring management assisted the medical staff to reduce the patient's pain. The monitoring procedures were also carried out for 12 times within approximately 6 weeks. Several suggestions were also given to the patient such as getting adequate rest and eating healthy foods. The patient was also given further explanations related to the cause of pain so that the patient could feel relief.

This study concluded that after the conduct of examination, analysis, and assesment, it was evident that the pain felt by the patient was reduced and resolved with no signs of infection. In general, the mother's condition was good in which the patient showed a composmentis awareness. The vital signs of the patient were also within normal limits, and no abnormalities were found on children during her physical examination. Therefore, it could be suggested that all the theories on cesarean delivery were in line with the findings found from this study

**Key Words:** Postpartum Mother, Sectio Caesarea, 7-Stages of Varney.



## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dan diusahakan bernilai ibadah di sisi-Nya. Salam dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah memberikan pencerahan dan petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia di muka bumi terutama kepada penulis yang menyusun proposal yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “H” Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea Di RSIA Sitti Khadijah 1 Tahun 2021”**. Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini di susun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Ahli Madya Kebidanan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat di butuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda tercinta Syuaib dan Ibundaku tercinta Mia yang telah memberiku kasih sayang, yang telah susah payah membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis

dengan ihklas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batin serta senantiasa selalu sabar dalam mengajarkan banyak hal kepada penulis dan kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam setiap shalat beliau untuk penulis yang tiada hentinya, tanpa kalian penulis tidak akan bisa dan sampai pada titik seperti ini. Demikian pula untuk tercinta kakakku Idham Khaliq yang selalu mendukung penulis baik secara materi dan senantiasa mendukung penulis dalam segala hal, serta untuk adikku Agung Anugrah yang selalu memberi semangat.

2. Pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
3. Pimpinan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A., M.kes beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa fakultas selamamasa pendidikan.
4. Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku pembimbing I yang telah membimbing Karya Tulis Ilmiah (KTI), dan telah menuntun, mendidik, dan mengajarkan dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini.



6. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI). Yang telah menuntun, mengajarkan, dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Para dosen Jurusan Kebidanan yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.
8. Kepada sahabat saya tercinta Astrid Nurjannah. H, Jusmawati, Nurhakiki, Khusnul Khatimah Basri yang selalu menyemangati dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
9. Kepada semua teman-teman Kebidanan khususnya angkatan 2018 terutama kelas Kebidanan A yang telah memberikan dukungan, motivasi dan warna bangku perkuliahan. Kepada semua teman-teman Komunitas Kesehatan Makassar (INHESTY), teman-teman Relawan Pendidikan Indonesia (RPI), serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua perjuangan kita dicatat sebagai amal ibadah di sisi ALLAH swt.

*Akhirul Kalam*, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kesehatan khususnya di Kebidanan. Penulis menyadari Proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis


mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima kasih.

Samata-Gowa, 19 Januari 2022

Penulis

**Ainun Nadia**

**70400118034**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas.....	10
1. Beberapa pengertian masa nifas menurut para ahli, yaitu.....	10
2. Tujuan masa nifas.....	11
3. Tahapan masa nifas.....	12
4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas.....	12
5. Asuhan masa nifas berdasarkan waktu kunjungan nifas.....	13
6. Perubahan fisiologis masa nifas.....	14
7. Perubahan psikologis masa nifas.....	23


8. Kebutuhan dasar ibu masa nifas.....	27
9. Tindak lanjut asuhan masa nifas dirumah.....	30
10. Deteksi dini komplikasi masa nifas.....	32
11. Asuhan pada ibu nifas post sectio caesarea.....	33
<b>B. Tinjauan Khusus Tentang Sectio Caesarea.....</b>	<b>34</b>
1. Defenisi.....	34
2. Jenis sectio caesarea.....	35
3. Indikasi.....	36
4. Komplikasi post sectio caesarea.....	37
5. Proses penyembuhan luka post sectio caesarea.....	43
6. Perawatan post sectio caesarea yang dilakukan bidan.....	44
7. Asuhan luka sectio caesarea.....	45
8. Nutrisi masa nifas.....	48
9. Ambulasi dini.....	49
10. Defekasi.....	51
11. Kebersihan diri.....	52
<b>C. Tinjauan Agama Islam.....</b>	<b>52</b>
<b>D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan.....	58
2. Langkah-langkah dalam manajemen asuhan kebidanan.....	59
<b>E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	<b>66</b>
A. Kunjungan I.....	66
B. Kunjungan II.....	91

C. Kunjungan III.....	95
D. Kunjungan IV.....	99
E. Kunjungan V.....	103
F. Kunjungan VI.....	107
G. Kunjungan VII.....	111
H. Kunjungan VIII.....	114
I. Kunjungan IX.....	117
J. Kunjungan X.....	120
K. Kunjungan XI.....	123
L. Kunjungan XII.....	126
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>129</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>153</b>
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran.....	155
<b>DAFTAR PUSTAK</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.9 Jadwal Kunjungan Rumah.....	31
---------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat pengambilan data awal kepada pimpinan RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
- Lampiran II : Surat dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan
- Lampiran III : Surat penelitian kepada pimpinan RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar
- Lampiran IV : Persetujuan penelitian oleh responden
- Lampiran V : Riwayat hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masa nifas (puerperium) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika organ dalam kandungan kembali seperti sebelum hamil. masa nifas berlangsung kira- kira 6 minggu (Prawihardjo, 2018).

Masa nifas merupakan masa penting atau kritis bagi ibu maupun bayinya. *World Health Organisation (WHO)* menyatakan bahwa persalinan di negara berkembang sekitar 10-15% dengan metode sectio caesarea. Dengan adanya luka bekas operasi sectio caesarea menimbulkan nyeri pada pasien sehingga pasien cenderung berbaring saja, oleh karena itu ibu nifas dengan riwayat sectio caesarea dibutuhkan asuhan mobilisasi dini. Pada ibu post sectio caesarea diperbolehkan bangun dari tempat tidur paling lama 24-48 jam setelah melahirkan (Ferinawati, 2019: 319-321).

Secara fisik tindakan section caesarea menyebabkan nyeri pada abdomen yang berasal dari luka operasi. Persalinan sectio caesarea memiliki tingkat nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% di bandingkan dengan persalinan normal yang hanya sekitar 9%. Umumnya tingkat nyeri yang dirasakan dominan tinggi pada hari pertama post operasi section caesarea. Secara psikologis tindakan sectio caesarea berdampak terhadap rasa takut, cemas terhadap nyeri yang dirasakan setelah analgetik hilang. Nyeri dapat diatasi dengan penatalaksanaan nyeri. Tujuan penatalaksanaan nyeri untuk meringankan atau mengurangi rasa nyeri. (Utami, 2016)



Data WHO mengenai status kesehatan nasional pada pencapaian target SDGs menyatakan secara global sekitar 830 wanita meninggal dalam setiap harinya karena komplikasi selama kehamilan, persalinan, serta nifas dengan tingkat AKI sebanyak 216 per 100.000 kelahiran yang hidup. Sebanyak 99% kematian ibu di akibatkan oleh masalah kehamilan, persalinan, dan nifas di Negara-negara berkembang (WHO, 2017).

Angka kematian ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan di karenakan penyebab lain seperti kecelakaan, AKI mencapai angka 100.000 kelahiran hidup di dunia dan angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. (KEMENKES RI, 2016).

Tingkat kasus ibu nifas dengan riwayat sectio caesarea menurut WHO memperkirakan angka persalinan dengan sectio caesarea sekitar 10-15 % dari semua proses persalinan di negara berkembang jika dibandingkan dengan Negara Amerika Serikat sekitar 23% dan Canada 21%. Sedangkan Indonesia peningkatan sectio caesarea sebesar 9,8% dan provinsi Sulawesi Selatan juga terjadi peningkatan kurang lebih 44% kasus pertahunnya. (Zulhaedah, 2016).

Menurut penelitian Zulhaedah tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari data rekam medik di RSIA Pertiwi Makassar tahun 2016 diperoleh jumlah ibu yang melakukan persalinan sectio caesarea yaitu

sebanyak 259 ibu dimana prevalensinya sebesar 0,1% sama dengan tingkat kasus ibu nifas dengan riwayat sectio caesarea. (Zulhaedah, 2016).

Nyeri akut pasca operasi masi menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia. hampir 50% pasien pasca operasi mengalami nyeri yang berujung terhadap peningkatan kejadian nyeri kronik dan penurunan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Nyeri yang berdasar atas *international association for the study of pain* (IASP) adalah sensori tidak nyaman dan pengalaman emosional yang sangat berhubungan dengan potensial kerusakan jaringan atau terdapat kerusakan jaringan yang nyata. Nyeri umumnya dapat hilang dengan sendirinya namun jika respon nyeri tersebut tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan perubahan menjadi nyeri kronik. Nyeri harus dinilai dengan benar agar dapat di tangani secara efektif. Standar umum yang digunakan adalah penilaian pasien itu sendiri yang dilakukan secara rutin setelah operasi menggunakan sistem skoring 0-10, dinilai dengan 0 tidak nyeri, dan 10 merupakan nyeri yang paling berat. Kunci utama keberhasilan kontrol nyeri adalah evaluasi ulang skala nyeri pasien secara berkala untuk meminimalkan kemungkinan terapi nyeri yang tidak diketahui. (Prabandari, dkk, 2018)

Berdasarkan data yang diambil dari RSIA Sitti Khadijah 1, pada tahun 2016 jumlah ibu post sectio caesarea sebanyak 2556 kasus, pada tahun 2017 jumlah ibu post sectio caesarea sebanyak 2432 kasus, pada tahun 2018 jumlah ibu post sectio caesarea sebanyak 2441 kasus, pada tahun 2019 jumlah ibu post sectio caesarea sebanyak 2636 kasus, dan pada tahun 2020

jumlah ibu post section caesarea sebanyak 1762 kasus, dan pada tahun 2021 mulai bulan januari – mei sebanyak 583 kasus. (RSIA Sitti Khadijah 1, 2021).

Berdasarkan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil studi kasus dengan judul “Manajemen asuhan kebidanan pada ibu nifas hari pertama dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea” agar kedepannya asuhan yang diberikan kepada ibu dapat mengurangi tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu.

### ***B. Ruang Lingkup Pembahasan***

Ruang lingkup dalam studi kasus tersebut adalah Manajemen Asuhan Kebidanan ibu nifas pada Ny ”X” dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan yang diberikan pada Ny “X” dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.

#### **2. Tujuan Khusus**

a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisis data pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.

- b. Dirumuskannya diagnosa atau masalah aktual pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- c. Dirumuskannya diagnosa/ masalah potensial pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- d. Dilakukannya Identifikasi tindakan segera/ kolaborasi pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- g. Diketahuinya hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

##### **1. Manfaat praktis**

Mebagai salah satu sumber informasi bagi penentu kebijakan dan pelaksanaan program diploma III di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya prodi Kebidanan maupun pihak rumah sakit dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi progam upaya melakukan Manajemen Asuhan Kebidanan pada ibu post sectio caesarea.

##### **2. Manfaat Bagi Institusi**

Untuk menambah wacana bagi pembaca di Perpustakaan dan sebagai masukan bagi Program Studi D3 Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

##### **3. Manfaat Ilmiah**

Diharapkan dari hasil ini dapat menjadi sumber informasi menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan penulisan selanjutnya.

##### **4. Manfaat Bagi Penulis**

Proses penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga dan menarik, dimana proses ini dapat menambah pengetahuan tentang metode penelitian yang telah diperoleh dalam perkuliahan serta menambah wawasan tentang post sectio caesarea.

## ***E. Metode Penelitian***

### **1. Studi Perpustakaan**

Penulis mempelajari berbagai literatur dan mengambil data dari jurnal nasional dan internasional yang ada referensinya tentang post sectio caesarea termasuk karya tulis ilmiah.

### **2. Studi Kasus**

Melaksanakan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah melalui asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian, merumuskan masalah/ diagnosa aktual maupun potensial, kolaborasi, pemecahan, implementasi, melaksanakan evaluasi terhadap asuhan kebidanan pada klien dengan post sectio caesarea serta mendokumentasikan. Untuk memperoleh data/informasi dalam pengkajian penulisan menggunakan teknik:

#### **a. Anamnesa**

Penulis melakukan Tanya jawab dengan klien dan keluarganya dapat membantu memberikan keterangan/ informasi yang dibutuhkan.

#### **b. Pemeriksaan Fisik**

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis untuk menjamin diperolehnya data yang lengkap mulai dari kepala sampai dengan kaki (head to toe) meliputi:

1) Inspeksi merupakan proses observasi menggunakan mata.

Inspeksi dilakukan dengan mendeteksi tanda-tanda fisik normal ataupun tidak normal untuk melengkapi pemeriksaan fisik.

2) Palpasi dilakukan dengan sentuhan atau perabaan pada tubuh pasien. Metode ini dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada organ atau jaringan pada tubuh.

3) Perkusi adalah metode pemeriksaan dengan cara pengetahuan yang hanya dilakukan pada tungkai bawah pada pemeriksaan fisik.

4) Auskultasi adalah metode pengkajian dengan menggunakan pendengaran.

#### c. Pengkajian Psikososial

Pengkajian psikososial meliputi emosional, respon terhadap kondisi yang dialami serta pola interaksi klien terhadap keluarga, petugas kesehatan, dan lingkungannya.

#### d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien bersumber pada catatan medis klien, baik dari bidan, dokter, maupun data penunjang lainnya yang dapat menjadi kontribusi menyelesaikan karya tulis ilmiah.

#### ***F. Sistematika Penulisan***

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah yaitu: pada bab I pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan pustaka, yang akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang defenisi nifas, tinjauan umum tentang post sectio caesarea, tinjauan islami tentang post sectio caesarea, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, identifikasi/ diagnosa masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana tindakan/ intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilaksanakan di RSIA Sitti Khadijah 1 dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu nifas post sectio caesarea.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulisan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

##### 1. Beberapa Pengertian Masa Nifas Menurut Para Ahli, yaitu:

- a. Masa nifas (peurperium) adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika organ dalam kembali seperti keadaan sebelum hamil. masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, tetapi seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. (Wahyuningsih, 2018).
- b. Masa nifas atau piurperium dimulai sejak 1 jam setelah lahirnya plasenta sampai dengan 6 minggu atau 42 hari setelah itu (Prawihardjo, 2018).
- c. Masa nifas (peuperium) adalah masa pemulihan kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat kandungan kembali seperti pra hamil. lama masa nifas yaitu 6-8 minggu (Sukma, dkk, 2017).
- d. Pasca persalinan (masa nifas) adalah masa pembersihan rahim yang dimulai pada akhir persalinan, dan berakhir sekitar 6 minggu atau 40 hari setelah persalinan. Perawatan nifas bertujuan untuk mengembalikan rahim dan alat kelamin seperti sebelum hamil. proses pengembalian kondisi rahim dan alat kelamin membutuhkan waktu 3 bulan untuk pulih. (Rauily, 2013).

## 2. Tujuan Masa Nifas

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologis dimana dalam asuhan pada masa ini peranan keluarga sangat penting, dengan pemberian nutrisi, dukungan psikologi, maka kesehatan ibu dan bayi selalu terjaga.
- b. Melaksanakan skrining yang komprehensif (menyeluruh) dimana bidan harus memberikan manajemen asuhan kebidanan pada ibu masa nifas secara sistematis yaitu mulai penkajian, interpretasi data dan analisa masalah, perencanaan, penatalaksanaan, dan evaluasi. Sehingga dengan asuhan kebidanan masa nifas dapat mendeteksi dini komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayinya.
- c. Melakukan rujukan secara aman dan tepat waktu bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu dan bayinya, ke fasilitas layanan rujukan.
- d. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan nifas dan menyusui, kebutuhan nutrisi, perencanaan pengaturan jarak kelahiran, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, perawatan bayi sehat serta pemberian pelayanan keluarga berencana sesuai dengan pilihan ibu (Wahyuningsih, 2018).

### 3. Tahapan Masa Nifas

Tahapan yang terjadi pada masa nifas yaitu:

a. Tahapan dini

Yaitu pemulihan dimana ibu sudah diperbolehkan berdiri dan berjalan-berjal.

b. Peurperium intermedial

Yaitu penulihan menyeluruh alat alat genetalia yang lamanya 6-8 minggu.

c. Remote peurperium

Yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih kembali dan sehat sempurna baik selama hamil atau sempurna berminggu minggu, berbulan bulan, atau tahunan (Wahyuningsih: 2018).

### 4. Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas

Adapun peran bidan dalam masa nifas yaitu:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik fisik maupun psikologi.
- b. Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.
- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, keluarga berencana, menyusui, pemberian imunisasi kepada bayinya, dan perawatan bayi sehat.

d. Memberikan pelayanan KB

**5. Asuhan masa nifas berdasarkan waktu kunjungan nifas**

a. Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan)

- 1) Pencegahan perdarahan masa nifas.
- 2) Mendeteksi dan merawat penyebab perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut.
- 3) Pemberian ASI awal, 1jam setelah inisiasi menyusui dini(IMD) berhasil dilakukan.
- 4) Melakukan hubungan antara ibu dan bayi.
- 5) Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.

b. Kunjungan II (6 hari setelah persalinan)

- 1) Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal dan tidak bau menyengat.
- 2) Menilai adanya tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal.
- 3) Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit dalam menyusui.
- 4) Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi yaitu perawatan tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari.

c. Kunjungan III (2 minggu setelah persalinan)

- 1) Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi fundus dibawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau menyengat.
- 2) Menilai adanya tanda demam, infeksi atau perdarahan abnormal.
- 3) Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat.
- 4) Memastikan ibu menyusui dengan baik, dan tidak ada tanda-tanda penyulit dalam menyusui.
- 5) Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi yaitu perawatan tali pusat, menjaga bayi agar tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari.

d. Kunjungan IV (6 minggu setelah persalinan)

- 1) Menanyakan pada ibu tentang keluhan dan penyulit yang dialaminya.
- 2) Memberikan konseling untuk menggunakan KB secara dini.  
(Sukma, dkk, 2017)

## 6. Perubahan fisiologis masa nifas

Sistem tubuh ibu akan kembali beradaptasi untuk menyesuaikan dengan kondisi postpartum. Organ-organ tubuh ibu yang mengalami perubahan setelah melahirkan antara lain:

a. Perubahan sistem reproduksi

1) Uterus

Kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil, dan dapat diketahui dengan pemeriksaan palpasi untuk merabadimana TFU nya (Tinggi Fundus Uteri). Proses kembalinya uterus dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot polos dalam uterus. Besar uterus kira-kira sama besar uterus saat umur kehamilan 16 minggu (kira-kira sebesar jeruk asam) dan beratnya kira-kira 100 gram.

Dalam waktu 12 jam, TFU mencapai lebih 1 cm diatas umbilicus. Dalam beberapa hari kemudian, perubahan involusi berlangsung cepat. Fundus turun kira-kira 1-2 cm setiap 24 jam. Postpartum hari keenam fundus normal akan berada dipertengahan antara umbilikus dengan simpisis pubis. Uterus tidak bisa dipalpasi pada abdomen di hari ke sembilan postpartum.

Uterus pada waktu hamil penuh beratnya 11 kali lebih berat dari sebelum hamil. berinvolusi kira-kira 500 gram 1 minggu setelah melahirkan dan 350 gram (11-12 ons) seminggu setelah lahir. Seminggu setelah lahir uterus berada didalam panggul sejati lagi. Pada minggu keenam, beratnya menjadi 50-60 gram.

Kembalinya uterus tidak selalu berjalan dengan baik, kegagalan uterus untuk kembali pada keadaan tidak hamil disebut

subinvolusi. Penyebab paling seringnya adalah tertahannya fragmen plasenta dan infeksi.

## 2) Lochea

Lochea adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas. Lochea berbau amis atau anyir dengan volume yang berbeda-beda pada setiap wanita. Lochea yang berbau tidak sedap menandakan adanya infeksi. Lochea mempunyai perubahan warna dan volume karena adanya proses involusi. Lochea dibedakan menjadi 4 jenis berdasarkan warna dan waktu keluarnya:

### a) Lochea rubra

Lochea ini keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan mekonium.

### b) Lochea sanguinolenta

Lochea ini berwarna merah kecoklatan dan berlendir, serta berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 post partum.

### c) Lochea serosa

Lochea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi

plasenta. Keluar pada hari ke-7 sampai hari ke-14.

d) Lochea alba

Lochea ini mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lender serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lochea alba dapat berlangsung selama 2-6 minggu post partum.

3) Endometrium

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, degenerasi dan nekrosis ditempat implantasi plasenta. Pada hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan desidua dan selaput janin. Setelah tiga hari mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan perut pada bekas implantasi plasenta.

4) Serviks

Uterus dan serviks berinvolusi bersama-sama. Perubahan yang terdapat pada serviks postpartum adalah bentuk serviks yang akan menganga seperti corong. Bentuk ini disebabkan oleh korpus uteri yang dapat menimbulkan kontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi sehingga seolah-olah pada pembatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk semacam cincin. Warna serviks sendiri merah



kehitam hitaman karena pembuluh darah.

Beberapa hari setelah persalinan, ostium eksternum dapat dilalui oleh 2 jari, pinggir-pinggirnya tidak rata, tetapi retak-retak karena robekan saat persalinan. Pada akhir minggu pertama hanya dapat dilalui oleh 1 jari saja, dan lingkaran retraksi berhubungan dengan bagian atas dari kanalis servikalis.

#### 5) Perineum

Segera setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya teregang oleh tekanan bayi yang bergerak maju. Pada post natal hari ke-5, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum hamil.

#### 6) Vagina

Vulva dan vagina mengalami penekanan, serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi. Dalam beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva dan vagina kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugae dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali, sementara labiamenjadi lebih menonjol.

## 7) Payudara

Pada semua wanita yang telah melahirkan proses laktasi terjadi secara alami. Proses menyusui mempunyai dua mekanisme fisiologis, yaitu sebagai berikut:

- a) Produksi asi
- b) Sekresi dan let down

Selama Sembilan bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi untuk menghambat pituitari akan mengeluarkan prolaktin (hormone laktogenik). Sampai hari ketiga setelah melahirkan efek prolaktin mulai dirasakan.

### b. Perubahan sistem pencernaan

Biasanya ibu mengalami konstipasi setelah persalinan. Hal ini disebabkan karena pada waktu melahirkan alat pencernaan mendapat tekanan yang menyebabkan kolon menjadi kosong, pengeluaran cairan yang berlebihan pada waktu persalinan, kurangnya asupan makan, hemoroid dan kurangnya aktivitas tubuh.

c. Perubahan sistem perkemihan.

Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya ibu akan sulit untuk buang air kecil dalam 24 jam pertama. Penyebab dari keadaan ini adalah terdapat spasme sfinkter dan edema leher kandung kemih setelah mengalami kompresi (tekanan) antarakepala kepala janin dan tulang pubis selama persalinan berlangsung. Kadar hormone estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok. Keadaan tersebut disebut “diuresis”.

d. Perubahan sistem muskuloskeletal

Otot-otot uterus berkontraksi segera setelah partus, pembuluh darah yang berada diantara anyaman otot-otot uterus akan terjepit, sehingga akan menghentikan perdarahan. Ligament-ligamen, diafragma pelvis, serta fascia yang meregang pada waktu persalinan, segera berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan.

e. Perubahan sistem endoktrin

Selama proses kehamilan dan persalinan terdapat perubahan pada sistem endokrin, terutama pada hormone-hormon yang berperan dalam proses tersebut.

1) Oksitosin

Oksitosin disekresikan dari kelenjar otak bagian belakang.

Selama tahap ketiga persalinan, hormon oksitosin berperan

dalam pelepasan plasenta dan mempertahankan kontraksi, sehingga mencegah pendarahan. Isapan ASI dan sekresi oksitosin yang sehingga membantu uterus untuk kembali ke bentuk normal.

## 2) Prolaktin

Menurunnya kadar estrogen menimbulkan terangsngnya kelenjar pituitari bagian belakang untuk mengeluarkan prolaktin, hormone ini berperan dalam perbesaran payudara untuk merangsang produksi air susu. Pada wanita yang menyusui bayinya, kadar prolaktin tetap tinggi dan pada permulaan ada rangsangan folikel dalam ovarium yang ditekan. Pada wanita yang tidak menyusui bayinya tingkat sirkulasi prolaktin menurun dalam 14-21 hari setelah persalinan, sehingga merangsang kelenjar bawah depan untuk mengontrol ovarium kearah permulaan pola produksi estrogen dan progesteron yang normal, pertumbuhan folikel, ovulasi dan menstruasi.

## 3) Estrogen dan progesterone

Selama hamil volume darah normal meningkat walaupun mekanismenya secara penuh belum dimengerti. Diperkirakan bahwa tingkat estrogen yang tinggi memperbesar hormon anti deuritik yang meningkatkan volume darah. Disamping itu, progesteron mempengaruhi otot halus yang mengurangi perangsangan dan peningkatan pembuluh darah. Hal ini sangat

mempengaruhi saluran kemih, ginjal, usus, dilsing vena, dasar panggul, perineum, vulva serta vagina.

#### 4) Perubahan tanda-tanda vital

Pada saat masa nifas tanda-tanda vital yang harus dikaji yaitu:

##### a) Suhu tubuh

Dalam 1 hari (24 jam) postpartum, suhu tubuh akan naik sedikit ( $37,5- 38\text{ }^{\circ}\text{C}$ ) akibat dari kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan. Apabila dalam keadaan normal, suhu badan akan menjadi biasa. Biasanya pada hari ketiga suhu badan naik lagi karena ada pembentukan ASI. Bila suhu tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada endometrium.

##### b) Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. Denyut nadi sehabis melahirkan biasanya akan lebih cepat. Denyut nadi akan melebihi 100 kali permenit, harus waspada kemungkinan dehidrasi, infeksi atau perdarahan postpartum.

##### c) Tekanan

Tekanan darah biasanya tidak berubah. Kemungkinan tekanan darah akan lebih rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada saat

postpartum menandakan terjadinya preeklamsi postpartum.

d) Pernafasan

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Bila suhu nadi tidak normal, pernafasan juga akan mengikutinya, kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas. Bila pernafasan pada masa postpartum menjadi lebih cepat, kemungkinan ada tanda-tanda syok. (Fitriahadi, 2018).

## **7. Perubahan psikologis masa nifas**

a. Adaptasi psikologis ibu nifas

Kelahiran anggota baru bagi suatu keluarga memerlukan penyesuaian bagi ibu. Perubahan peran seorang ibu memerlukan adaptasi yang harus dijalani, perubahan tersebut berupa perubahan emosi dan sosial. Tanggung jawab ibu postpartum bertambah dengan hadirnya bayi baru lahir. Proses penyesuaian ibu atas perubahan yang dialaminya terdiri atas 3 fase yaitu:

1) Fase talking in

Fase talking in yaitu periode ketergantungan. Periode ini berlangsung dari hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu sedang berfokus terutama pada dirinya sendiri. Ibu akan berulang kali menceritakan proses persalinan yang dialaminya dari awal sampai akhir. Ibu perlu

bicara tentang dirinya sendiri. Ketidak nyamanan fisik yang dialami ibu pada fase ini seperti rasa mules, nyeri pada jahitan, kurang tidur dan kelelahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hal tersebut membuat ibu perlu cukup istirahat untuk mencegah gangguan psikologis yang mungkin dialami, seperti mudah tersinggung dan menangis.

Hal ini membuat ibu cenderung menjadi pasif. Pada fase ini petugas kesehatan harus menggunakan pendekatan yang empatik agar ibu dapat melewati fase ini dengan baik.

## 2) Fase taking hold

Fase taking hold yaitu periode yang berlangsung 3- 10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini ibu timbul rasa khawatir akan ketidak mampuan dan rasa tangguang jawabnya dalam merawat bayi. Ibu mempunyai perasaan sangat sensitive sehingga mudah tersinggung dan gampang marah. Kita perlu berhati-hati, menjaga komunikasi dengan ibu. Dukungan moral sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri ibu.

## 3) Fase letting go

Fase letting go yaitu periode menerima tanggung jawab akan peran barunya. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya. Ibu memahami bahwa bayi butuh disusui

sehingga siap terjaga untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Keinginan untuk merawat diri dan bayinya sudah meningkat pada fase ini. Ibu akan menjadi lebih percaya diri dalam menjalani peran barunya.

Dukungan suami dan keluarga masi terus diperlukan oleh ibu. Keluarga dan suami dapat membantu merawat bayi, membantu mengerjakan urusan rumah tangga sehingga ibu tidak terlalu terbebani. Ibu memerlukan istirahat yang cukup, sehingga mendapatkan kondisi fisik yang bagus untuk dapat merawat bayinya.

b. Postpartum blues

Postpartum blues adalah kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan yang dialami oleh ibu yang berkaitan dengan bayinya atau disebut juga dengan baby blues, yang disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami oleh ibu saat hamil sehingga sulit menerima keadaan bayinya. Perubahan perasaan ini merupakan respon alami terhadap rasa lelah yang dirasakan. Selain itu, juga karena perubahan fisik dan emosional selama beberapa bulan kehamilan. Perubahan ini akan kembali secara perlahan setelah ibu menyesuaikan diri dengan peran barunya dan tumbuh kembali dalam keadaan normal.



c. Kesedihan duka cita/ depresi

Penelitian menunjukkan 10% ibu mengalami depresi setelah melahirkan dan 10%nya saja yang tidak mengalami perubahan emosi. Keadaan ini berlangsung 3-5 bulan bahkan pada beberapa kasus terjadi selama 1 tahun pertama kehidupan bayi. Penyebab depresi terjadi karena reaksi terhadap rasa sakit yang muncul saat melahirkan dan karena sebab-sebab yang kompleks lainnya. Beberapa gejala depresi antara lain perubahan pada mood, gangguan pada pola tidur dan pola makan, perubahan mental dan libido, dan dapat pula muncul phobia serta ketakutan akan menyakiti dirinya sendiri dan bayinya. Depresi berat akan terjadi biasanya pada wanita/keluarga yang pernah mempunyai riwayat kelainan psikiatrik. Selain itu, kemungkinan dapat terjadi pada kehamilan berikutnya. Penatalaksanaan depresi berat yaitu dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar, terapi psikologis dan psikiater, kolaborasi dengan dokter untuk memberikan anti depresan (diperhatikan pada ibu hamil dan menyusui), jangan tinggalkan ibu sendirian dirumah, jika diperlukan lakukan perawatan dirumah sakit, dan tidak dianjurkan rawat gabung (rooming in) pada ibu dengan depresi berat. (Fitriahadi, 2018).

## 8. Kebutuhan dasar ibu masa nifas

### a. Nutrisi dan cairan

Nutrisi dan cairan sangat penting karena berpengaruh pada proses laktasi dan involusi. Makan dengan diet seimbang, tambahan kalori 500-800 kal/hari. Makan dengan diet seimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum setidaknya 3 liter/ hari, pil zat besi (Fe) diminum untuk menambah zat besi setidaknya selama 40 hari selama persalinan, kapsul vitamin A (200.000 IU) agar dapat memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI.

### b. Mobilisasi

Segera mungkin membimbing klien keluar dan turun dari tempat tidur, tergantung kepada keadaan klien, namun dianjurkan pada persalinan normal klien dapat melakukan mobilisasi 2 jam post partum. Pada persalinan dengan anastesi miring kanan kiri setelah 12 jam, lalu tidur ½ duduk, turun dari tempat tidur setelah 24 jam. Mobilisasi pada ibu berdampak positif, ibu merasa lebih sehat dan kuat, faal usus dan kandung kemih lebih baik, ibu juga dapat merawat anaknya.

### c. Eliminasi

Buang Air Kecil (BAK). Pada persalianan normal masalah berkemih dan buang air besar tidak mengalami hambatan apapun.

Kebanyakan pasien dapat melakukan BAK secara spontan dalam 8 jam setelah melahirkan. Ibu diminta untuk buang air kecil (miksi) 6 jam postpartum. Jika dalam 8 jam postpartum belum dapat berkemih atau sekali berkemih belum melebihi 100 cc, maka dilakukan kateterisasi. Akan tetapi, kalau ternyata kandung kemih penuh, tidak perlu menunggu 8 jam untuk kateterisasi.

Buang air besar (Defekasi), Ibu postpartum diharapkan dapat buang air besar (defekasi) setelah hari kedua postpartum. Jika hari ketiga belum juga BAB, maka perlu diberi obat pencahar per oral atau per rectal. Jika setelah pemberian obat pencahar masih belum bisa BAB, maka dilakukan klisma (huknah).

d. Personal hygiene

Ibu nifas rentan terhadap infeksi, untuk itu personal hygiene harus dijaga, yaitu dengan:

- 1) Mencuci tangan setiap habis genital hygiene, kebersihan tubuh, pakaian, lingkungan, tempat tidur harus selalu dijaga.
- 2) Membersihkan daerah genital dengan sabun dan air bersih.
- 3) Mengganti pembalut setiap 6 jam minimal 2 kali sehari.
- 4) Menghindari menyentuh luka perineum.
- 5) Menjaga kebersihan vulva perineum dan anus.
- 6) Memberikan salep, betadine pada luka.

e. Aktivitas Seksual

Aktivitas seksual yang dapat dilakukan oleh ibu masa nifas harus memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat memasukkan satu-satu dua jarinya ke dalam vagina tanpa rasa nyeri, maka ibu aman untuk memulai melakukan hubungan suami istri kapan saja ibu siap.
- 2) Banyak budaya yang mempunyai tradisi menunda hubungan suami istri sampai masa waktu tertentu, misalnya setelah 40 hari atau 6 minggu setelah persalinan. Keputusan ini bergantung pada keputusan pasangan yang bersangkutan.

f. Kebutuhan perawatan payudara

Sebaiknya perawatan mammae telah dimulai sejak wanita hamil supaya puting lemas, tidak keras, dan kering sebagai persiapan untuk menyusui bayinya. Berikut ini cara perawatan payudara yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- 1) Sokong payudara kiri dengan tangan kiri (kanan dengan tangan kanan) dua atau tiga jari dari tangan yang berlawanan membuat gerakan memutar sambil menekan, dari pangkal payudara dan berakhir dengan gerakan spiral pada daerah puting susu, setiap payudara minimal 2 kali gerakan.

- 2) Tempatkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara. Urutlah dari tengah sambil mengangkat kedua payudara dan lepaskan kedua payudara perlahan– lahan sambil membuat sentakan kecil. Lakukan gerakan ini  $\pm$  30 kali.
- 3) Sokong payudara dengan satu tangan, sedang tangan lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah putting susu. Lakukan gerakan ini  $\pm$  30 kali setiap payudara.
- 4) Kompres kedua payudara dengan waslap hangat selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres dingin selama 1 menit. Kompres berganti-ganti selama 3 kali berturut- turut akhiri dengan kompres hanga. (Sukma, dkk, 2017).

## **9. Tindak lanjut asuhan masa nifas dirumah**

### **a. Jadwal kunjungan rumah**

Program dan kebijakan teknis yang lebih baru mengenai jadwal Kunjungan Masa Nifas di Rumah Paling sedikit dilakukan empat kali, yaitu diantaranya:

Kunjungan	Waktu	Tujuan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencegah terjadinya perdarahan masa nifas.</li> <li>• Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan dan memberi rujukan bila perdarahan berlanjut.</li> <li>• Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah perdarahan masa nifas karena atoniuteri.</li> <li>• Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu.</li> <li>• Mengajarkan cara mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>• Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.</li> </ul>
2	6 hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan involusio uteri berjalan normal, uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, dan tidak ada bau.</li> <li>• Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan pascamelahirkan.</li> <li>• Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat.</li> <li>• Memastikan ibu dan tidak ada tanda-tanda penyulit</li> </ul>
3	2 minggu setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi agar tetap hangat.</li> <li>• Sama seperti yang diatas (6 hari setelah persalinan)</li> </ul>

Tabel 2.9: Jadwal Kunjungan Rumah

#### b. Keuntungan dan Keterbatasan

Kunjungan rumah post partum memiliki keuntungan yang sangat jelas karena membuat bidan dapat melihat dan berinteraksi dengan anggota keluarga didalam lingkungan yang alami dan aman. Bidan mampu mengkaji kecukupan sumber yang ada dirumah dan dilingkungan sekitar.

Selain keuntungan, kunjungan rumah post partum juga memiliki keterbatasan yang masih sering dijumpai, yaitu:

1. Besarnya biaya untuk mengunjungi pasien yang jaraknya jauh.
2. Terbatasnya pelayanan bidan dalam memberipelayanan kebidanan.
3. Kekhawatiran tentang keamanan untuk mendatangipasien didaerah tertentu (Sukma, dkk,2017).

### 10. Deteksi dini komplikasi masa nifas

#### a. Infeksi masa nifas

Infeksi masa nifas adalah peradangan yang terjadi pada organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme atau virus kedalam organ reproduksi tersebut selama proses persalinan dan masa nifas. Infeksi masa nifas biasanya ditandai dengan demam.

#### b. Keadaan abnormal pada Rahim

##### 1) Sub involus

Pada beberapa keadaan proses involusi rahim tidak berjalan sebagai mana mestinya. Sehingga proses pengecilan rahim terhambat.

Keadaan demikian disebut sub involusi uteri.

## 2) Perdarahan masa nifas

Penyebab perdarahan masa nifas adalah sebagai berikut:

- a) Sisa plasenta dan polip plasenta
- b) Endometritis puerperalis
- c) Sebab-sebab fungsional
- d) Perdarahan luka

## 3) Perdarahan oleh sebab-sebab fungsional

Yang termasuk sebab-sebab perdarahan fungsional antara lain:

- a) Perdarahan karena hiperplasia glandularis yang dapat terjadi dan berhubungan dengan siklus anovulatorius dalam nifas.
- b) Perubahan dinding pembuluh darah. Pada golongan ini tidak ditemukan plasenta, endometritis, ataupun luka (Sukma, dkk,2017).

## 11. Asuhan pada ibu nifas post section caesarea

### a. Pemberian cairan

Pemberian cairan per intravena harus cukup banyak dan mengandung elektrolit agar tidak terjadi dehidrasi atau komplikasi pada organ lainnya. Bila kadar Hb ibu rendah di berikan transfusi darah sesuai kebutuhan.



- b. Menilai tingkat nyeri yang dirasakan ibu setelah operasi kemudian melakukan pemberian analgetik sesuai dosis yang ditetapkan jika tingkat nyeri ibu tinggi.
- c. Melakukan perawatan luka dengan melihat kondisi balutan luka yang dilihat pada 1 hari post sc, bila basah dan berdarah harus dibuka dan di ganti.
- d. Mobilisasi dini yang diajarkan pada ibu untuk menunjang proses penyembuhan luka dan mencegah terjadinya infeksi.
- e. Pemeriksaan rutin dilakukan seperti pemeriksaan suhu, tekanan darah, nadi dan pernapasan.
- f. Pemberian KIE tentang perawatan luka dan pencegahan infeksi pada pasien post Sectio Caesarea. ( Tampilang, dkk, 2018).

## ***B. Tinjauan Khusus Tentang Sectio Caesarea***

### **1. Definisi**

Sectio caesarea atau kelahiran caesarea adalah melahirkan janin melalui irisan pada dinding perut (laparotomi) dan dinding uterus (histerektomi). Sectio caesarea umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena beresiko kepada komplikasi medis lainnya. (Nurjannah, dkk, 2020: 213).

Sectio caesarea atau operasi cesar adalah tindakan bedah untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan uterus. Pada masa sekarang ini, sectio caesarea jauh lebih aman dan nyaman karena adanya

antibiotika generasi terbaru, transfusi darah yang lebih *available*, teknik operasi yang sempurna dan anastesi yang lebih baik. (Setiawati, 2020 ; 85).

## 2. Jenis section caesarea

Teknik pembedahan yang paling banyak dilakukan ialah *sectio caesarea transperitonealis profunda* (SSTP) dengan insisi di segmen di bawah uterus. Keuntungannya adalah perdarahan luka insisi tidak seberapa banyak, bahaya peritonitis tidak besar dan parut pada uterus yang umumnya kuat sehingga bahaya ruptur uteri dikemudian hari tidak besar karena dalam masa nifas segmen bawah uterus tidak seberapa banyak mengalami kontraksi seperti korpus uteri, sehingga luka dapat sembuh lebih sempurna.

Sectio caesarea memiliki dua tipe, yang pertama ialah dengan melakukan insisi melintang melalui segmen bawah uteri yang teregang. Yang kedua adalah teknik sectio caesarea klasik yaitu dengan insisi vertikal pada myometrium. Namun jarang dilakukan, kecuali jika terjadi vaskularisasi di segmen bawah uteri yang banyak sekali atau tidak dapat dilakukan karena perlengketan yang luas atau posisi janin letak lintang dengan bahu terjepit.

Teknik operasi SSTP sebagai berikut:

- a. Asepsis lapangan operasi.
- b. Insisi kurang lebih 10 cm horizontal di atas simfisis hingga

mencapai peritoneum.

- c. Peritoneum yang menutupi segmen bawah uterus diiris dan didorong ke bawah.
- d. Otot segmen bawah Rahim di insisi sehingga nyaris mencapai selaput ketuban.
- e. Selaput ketuban dipecahkan dan kepala dilahirkan dengan manual tangan atau menggunakan forsep sebagai bidang miring, fundus di tekan ke bawah.
- f. Setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin intramural. Lalu keluarkan plasenta. Pastikan plasenta keluar sempurna.
- g. Penjahitan luka insisi dilakukan lapis demi lapis dengan jahitan di sudut luka harus dilakukan dengan cermat.
- h. kontrol perdarahan di daerah luka.
- i. Dilakukan penjahitan peritoneum.
- j. Jahit dinding abdomen setiap lapis.
- k. Operasi selesai.
- l. Tutup luka dengan verban. (Setiawati, 2020 ; 86-87).

### **3. Indikasi**

Secara etiologi operasi sectio caesarea dilakukan jika kelahiran pervaginam mungkin akan menyebabkan resiko kepada ibu, maupun janin. Indikasi dilakukan sectio caesarea adalah:

- a. Distosia janin-panggul
- b. Gawat janin
- c. Plasenta previa totalis
- d. Riwayat sectio caesarea sebelumnya.
- e. Kelahiran letak (utamanya letak lintang)
- f. Hipertensi, pre-eklamsi berat
- g. Eklamsia
- h. Janin besar (Nurjannah, dkk, 2020: 214).

#### **4. Komplikasi post sectio caesarea**

Komplikasi yang dapat timbul pada ibu post sectio caesarea yaitu:

- a. Nyeri

Defenisi nyeri menurut *International Asociation For The Study Of Pain* (IASP) merupakan suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Konsep lama menyatakan bahwa proses nyeri hanya bergantung pada jalur nyeri saja dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang di dapatkan.

- 1) Skala nyeri

Intensitas dan penentuan tipe nyeri sangat penting dikarenakan menyangkut jenis pengobatan yang sesuai yang sebaiknya diberikan terutama pada terapi farmakologis. Namun

ada beberapa alat ukur yang sudah umum dipakai untuk mengukur intensitas nyeri adalah *visual analogue scale* (VAS) atau *Numeric Pain Scale* (NPS).



Gambar 1 *visual analogue scale* (VAS) sebagai alat ukur nyeri.

Score total minimum dalam pembacaan *Visual Analog Scale* (VAS) Atau *Numeric Pain Scale* (NPS) score total minimum adalah (-1), dan score total maksimum (5). Jika skor pasien  $> 2$  maka dokter atau bidan harus melakukan evaluasi lanjutan dan kemungkinan nyeri yang diderita pasien adalah nyeri neuropatik.

Assessment nyeri:

a) Deskripsi: bagaimana gambaran nyeri yang anda rasakan (tumpul, tajam, pegal-pegal, panas, seperti disengat listrik).

b) Lokasi: dimana lokasi nyeri yang anda rasakan?

Apakah lebih dari satu tempat?

c) Intensitas:

- bagaimana derajat nyeri yang anda rasakan saat ini?

- Bagaimana derajat nyeri yang anda rasakan

sebelumnya?

- Apakah nyeri yang anda rasakan terus menerus?
- Kapan anda mulai merasakan nyeri ini?

## 2) Mekanisme nyeri

Pada tindakan post sectio caesarea meninggalkan sayatan pada kulit abdomen dan mengakibatkan terputusnya jaringan yang diinsisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia yang berupa histamine, bradikinin, kalium dan sustansi P. Zat kimia ini yang dibawa serabut saraf delta A dan C yang berperan membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju thalamus, kemudian transmisi nyeri tersebut dilanjutkan menuju korteks serebal dan otak akan mempersepsikan nyeri yang mengakibatkan pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anastesi hilang.

Sebagian besar pasien dengan infeksi berat, terjadi trauma intra abdomen, demam tinggi, dan komplikasi berat lainnya seperti nyeri yang diakibatkan oleh luka atau pembuatan perlukaan seperti sectio caesarea memerlukan obat penghilang rasa sakit atau analgesik. Namun beberapa analgesik memiliki efek anti peuretik sehingga tidak boleh di berikan sampai tes suhu atau pemeriksaan fisik lainnya selesai dilakukan. (Nadyah, 2013).

b. Syok

Peristiwa ini terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat sel-sel jaringan tidak mendapat zat-zat makanan dan O<sub>2</sub> dengan akibat terjadi kematiannya.

Penyebab-penyebab syok adalah: hemoragi merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan bila terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik, atau kombinasi antara berbagai sebab tersebut.

Gejala-gejalanya ialah nadi dan pernafasan meningkat, tensi menurun, oliguri, penderita gelisah, ekstermitas dan muka dingin, serta warna kulit keabu-abuan. Dalam hal ini sangat penting untuk membuat diagnosis sedini mungkin yang dikenal dengan sistem peringatan dini (early warning system), karena jika terlambat, perubahannya sudah tidak dapat dipengaruhi lagi.

c. Kecemasan.

Kecemasan yang pasien rasakan yaitu nyeri luka post sectio caesarea, harus bergantung kepada orang lain bahkan ancaman kematian. Dampak terjadinya kecemasan setelah operasi dikaitkan dengan takutnya pasien dengan peningkatan rasa nyeri, peningkatan masa rawat inap dirumah sakit, dan pikiran-oikiran negative pada ibu.

Adapun salah satu terapi untuk mengatasi kecemasan pada pasien yaitu dengan PMR (*Progressive muscle relaxation*) yaitu merangsang

pikiran pasien sehingga ketegangan mengakibatkan ketegangan fisiologis yang biasanya ditandai dengan ketegangan otot. Ketegangan fisiologis sebaliknya akan meningkatkan pengalaman subjektif terhadap kecemasan. Dengan merilekskan otot maka akan menurunkan ketegangan fisiologis yang akhirnya akan menurunkan ketegangan pada pasien. (Rahmawati, dkk,2017).

d. Infeksi

Pencegahan infeksi, atau aseptik adalah istilah umum yang banyak digunakan dalam perawatan kesehatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala upaya yang dilakukan tenaga medis untuk mencegah masuknya mikro organisme kedalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Teknik aseptik adalah sebuah prosedur yang lebih aman untuk pencegahan infeksi bagi ibu, bayi baru lahir, dan tenaga medis serta berpengaruh dalam mengurangi jumlah atau pembuangan semua mikro organisme yang ada pada kulit, jaringan, dan instrumen ketingkat yang aman.

Adapun praktik pencegahan infeksi yang dapat mencegah atau mengurangi mikro organisme berpindah dari satu individu ke individu lain yaitu:

- Mencuci tangan.
- Memakai sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya.
- Menggunakan teknik asesis dan asptik.



- Memproses alat bekas pakai
- Menangani alat-alat kesehatan yang tajam.
- Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan termasuk pengelolaan sampah medis secara benar. (Nadyah, 2014).

e. Gangguan saluran kemih

Pada operasi ada kemungkinan terjadi retensio urinae. Pengeluaran air seni perlu diukur, jika air seni yang dikeluarkan jauh berkurang, ada kemungkinan oliguri atau retensio urinae. Pemeriksaan abdomen seringkali dapat menentukan adanya retensi. Apabila daya upaya supaya penderita dapat berkemih tidak berhasil, maka terpaksa dilakukan kateterisasi.

f. Infeksi saluran kemih

Kemungkinan infeksi saluran kemih selalu ada, terutama pada penderita penderita yang untuk salah satu sebab dikateter. Penderita menderita panas dan seringkali menderita nyeri pada saat berkemih, dan pemeriksaan air seni (yang dikeluarkan dengan kateter atau sebagai midstream urine) mengandung leukosit dalam kelompok. Hal ini dapat segera diketahui dengan meningkatnya leukosit esterase.

g. Distensi perut

Pada pasca laparatomi tidak jarang perut agak kembungakan tetapi, setelah flatus keluar, keadaan perut menjadi normal. Akan tetapi, ada kemungkinan bahwa distensi bertambah, terdapat timpani

diatas perut pada periksa ketok, serta penderita merasa mual dan muntah.

h. Infeksi puerperal

ada komplikasi ini biasanya bersifat ringan, sepertikenaikan suhu selama beberapa hari dalam masa nifas, bersifat berat seperti Tromboflebitis, peritonitis, sepsis dan lainnya.

i. Terbukanya luka operasi eviserasi

Sebab-sebab terbukanya luka operasi pasca pembedahan ialah luka tidak dijahit dengan sempurna, distensi perut, batuk atau muntah keras, serta mengalami infeksi. (Nurjannah, dkk, 2020).

## 5. Proses penyembuhan luka post sectio caesarea

Proses penyembuhan luka terdiri dari tiga fase yaitu inflamasi, proliferasi (epitelisasi), dan maturasi (remodeling).

Pada fase inflamasi, penyembuhan luka pada fase ini terjadi sampaihari kelima setelah pembedahan. Namun fase ini bisa saja singkat jika tidak terjadi infeksi.

Fase proliferasi adalah fase dimana terjadinya penurunan jumlah sel-sel inflamasi, tanda-tanda radang berkurang, munculnya sel fibroblast, pembentukan pembuluh darah baru. Pada fase ini terjadi juga epiteliasasi yaitu proses pembentukan kembali lapisan kulit yang rusak.

Fase maturasi adalah fase dimana proses penyembuhan luka dimulai dari ke-21 hingga 1 tahun yang dimana proses ini di dasari dari

pergantian kolagen tipe-3 menjadi kolagen tipe-1. Perubahan peningkatan kolagen terjadi secara signifikan pada minggu ketiga hingga minggu keenam setelah luka.

Faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu usia, anemia, penyakit penyerta, faskulirisasi, nutrisi, kegemukan, obat-obatan, merokok, mobilisasi dini, personal hygiene, dan sters.

#### **6. Perawatan Post section caeserea yang dilakukan bidan**

- a. Periksa tekanan darah, frekuensi nadi, dan pernafasan, serta ukur jumlah urine yang tertampung di kanton urine. Periksa/ukur jumlah perdarahan selama operasi.
- b. Buat laporan operasi dan cantumkan hasil pemeriksaan pada lembar laporan. Catat lama operasi, jenis kelamin, nilai Apgar, dan kondisi bayi saat lahir. Lembar operasi di tanda tangani oleh operator.
- c. tekanan darah, frekuensi nadi dan nafas, jadwal pengukuran jumlah produksi urine, berikan edukasi dengan jelas, lengkap dan terperinci yang mencakup: nama, obat, dosis, cara pemberiannya, dan waktu/jam pemberian.
- d. Nasihat dan konseling pasca operasi diantaranya:
  - 1) Kepada keluarga pasien beritahu bahwa operasi telah selesai dan sampaikan jalannya operasi, kondisi ibu saat ini, dan apa yang diharapkan, minimal mencakup 24 jam pasca operasi. Waktu

lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan, dan keadaan operasi. Resiko fungsi reproduksi pasien dan kehamilan/persalinan yang akan datang, alat kontrasepsi yang akan digunakan, jelaskan rencana perawatan dan perkiraan waktu pasien dapat dipulangkan. mintakan pada keluarga untuk ikut mengawasi pasien, khususnya terhadap resiko fungsi reproduksi berupa bekas section caesarea.

- 2) Kepada pasien (setelah sadar/dapat berkomunikasi) beritahu keadaan saat ini. Waktu lahir, jenis kelamin, panjang badan, berat badan, dan keadaan bayi. Risiko fungsi reproduksi, kehamilan, dan persalinan yang akan datang. Lakukan konseling dan rencanakan upaya-upaya pencegahan kehamilan (bila tidak dilakukan tubektomi). Jelaskan hingga pasien memahami, menerima dan dapat memilih kontrasepsi yang sesuai. Jelaskan kembali resiko yang dihadapi oleh pasien, berikan cukup waktu untuk berdiskusi hingga diyakini bahwa pasien sudah cukup mengerti dan paham. (Nurjannah, dkk, 2020: 214-215).

## **7. Asuhan luka sectio caesarea**

Luka adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh, yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh sehingga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka dan luka operasi merupakan luka yang bersih sehingga mudah untuk perawatannya, namun jika salah dalam

merawat luka akan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu pastikan anda tidak salah dalam merawat luka operasi, melakukan pembalutan dengan tujuan mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka.

Luka insisi dibersihkan dengan alkohol dan tutup dengan kain penutup luka. Pembalut luka diganti dan dibersihkan setiap hari dan luka yang mengalami komplikasi seperti hanya sebagian luka yang sembuh sedangkan sebagian mengalami infeksi dengan eksudat dengan luka terbuka seluruhnya memerlukan perawatan khusus bahkan memerlukan reinfeksi. Pembersihan luka insisi dimulai mencuci tangan sampai bersih kemudian mengkaji atau mengobservasi status luka apakah luka bersih atau kotor serta sejenisnya. Kasa steril dipegang dengan pinset lalu dicelupkan kedalam larutan savlon dan dilakukan pembersihan pada luka. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> diberikan jika diperlukan atau diberi larutan 0,9%, kemudian luka dibersihkan sampai bersih dan dilanjutkan dengan pengobatan luka menggunakan betadin atau sejenisnya. Setelah luka bersih, tangan dicuci kembali.

a. Setiap 1 minggu kasa harus dibuka

Idealnya kasa yang dipakai kasa baru setiap satu minggu sekali. Tidak terlalu sering agar luka cepat kering, jika sering dibuka luka bisa menempel pada kasa sehingga sulit untuk kering. Maka, mintalah kepada keluarga membunya satu minggu sekali.

b. Bersihkan jika keluar darah dan langsung ganti kasal

Jika luka operasi keluar darah, maka segeralah untuk mengganti kasanya agar tidak basah atau lembap oleh darah, karena darah merupakan kuman yang bisa cepat menyebar keseluruhan bagian luka.

c. Jaga luka agar tidak lembap

Usahakan semaksimal mungkin agar luka tetap kering karena tempat lembap akan menjadikan kuman cepat berkembang. Misalkan, suhu kamar terlalu dingin dengan AC yang membuat ruangan lembap, dan bisa jadi luka juga ikut lembap. Hindari ruangan lembap, dan atur suhu AC.

d. Menjaga kebersihan

Agar luka operasi tidak terkena kotoran yang mengakibatkan cepat berkembangnya kuman, maka kebersihan diri dan lingkungan sekitar semaksimal mungkin harus dijaga. Jauhkan luka dari kotoran, untuk itu seprei dan bantal harus selalu bersih dan debu.

e. Gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air (opset)

Jika mau mandi atau aktivitas yang mengharuskan bersentuhan dengan air, gunakan bahan plastik atau pembalut yang kedap air (opset) untuk melindungi luka bekas operasi agar tidak terkena air. Upayakan agar luka tidak sampai basah, karena bisa mempercepat pertumbuhan kuman. (Nurjannah, dkk, 2020: 215-217).

## 8. Nutrisi masa nifas

Nutrisi atau gizi adalah zat yang diperlukan oleh tubuh untuk keperluan metabolismentya. Makan dan minum sesuai dengan kebutuhan. hidup sehat dengan minum air putih. Minum dengan 8 – 9 ( 3 liter air ) gelas standar per hari, sebaiknya minum setiap kali menyusui. Anggapan salah jika anda minum air putih mengakibatkan luka sulit kering. Tidak demikian halnya, karena jika tubuh sehat, luka akan cepat mengering dan sembuh. Kebutuhan gizi pada masa nifas meningkat 25 % dari kebutuhan biasa, karena berguna untuk proses kesembuhan sehabis melahirkan dan untuk memproduksi air susu yang cukup. Makanan yang di konsumsi harus bermutu tinggi dan cukup kalori, cukup protein, banyak cairan serta banyak buah – buahan dan sayuran, karena si ibu mengalami hemokonsentrasi.

Ibu menyusui harus mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari, pil zat besi harus diminum untuk menambah zat gizi setidaknya selama 40 hari pasca – bersalin, makan dengan diet berimbang untuk mendapat protein, mineral, dan vitamin yang cukup, mengonsumsi kapsul vitamin A ( 200.000 unit ) agar bisamemberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI-nya. Makanan bergizi terhadap pada sayuran hijau, lauk – pauk dan buah. Konsumsi sayur hijau, seperti bayam, sawi, kol, dan sayur hijau lainnya menjadi sumber makanan bergizi. Untuk lauk – pauk dapat memiliki daging ayam, ikan, telur, dan sejenisnya.

Ibu post section caesarea harus menghindari makanan dan minuman yang mengandung bahan kimia, pedas dan menimbulkan gas karena gasperut kadang – kadang menimbulkan masalah sesudah section caesara. Jika ada gas dalam perut, ibu akan merasakan nyeri yang merusak. Gerak fisik dan bangun dari tempat tidur, pernapasan dalam, dan bergoyang di kursi dapat membantu mencegah dan menghilang gas. (Nurjannah, dkk, 2020: 217).

## **9. Ambulasi Dini**

Sehabis melahirkan, ibu merasa lelah karena itu ibu harus istirahat dan tidur terlentang selama 8 jam pasca-persalinan. Kemudian, ibu boleh miring ke kanan dan ke kiri untuk mencegah terjadinya trombosis dan tromboemboli. manfaat mobilisasi bagi ibu post operasi adalah sebagai berikut :

- a. Ibu merasa lebih sehat dan kuat dengan ambulasi dini. Dengan bergerak otot – otot perut dan panggul akan kembali normal, sehingga otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Dengan demikian ibu merasa sehat dan membantu memperoleh kekuatan, mempercepat kesembuhan, faal usus dan kandung kencing lebih baik. Dengan bergerak akan merangsang peristaltik usus kembali normal. Aktivitas ini juga membantu mempercepat organ – organ tubuh bekerja seperti semula



- b. Mencegah terjadinya thrombosis dan tromboemboli dengan mobilisasi sirkulasi darah normal/lancar sehingga resiko terjadinya thrombosis dan tromboemboli dapat dihindarkan.

Setelah persalinan yang normal, jika gerakan ibu tidak terhalang oleh pemasangan infus atau keteter dan tanda-tanda vitalnya juga baik, biasanya ibu diperbolehkan untuk mandi dan pergi ke WC dengan dibantu, satu atau dua jam setelah melahirkan secara normal. Sebelum 2jam, ibu harus diminta untuk melakukan latihan menarik nafas dalam serta latihan tungkai yang sederhana dan harus duduk serta mengayunkan tungkainya dari tepi ranjang. Pasien sectio caesarea biasanya mulai ambulasi 24-36 jam sesudah melahirkan. Jika pasien mengalami analgesia epidural, pemulihan sensibilitas yang total harus dibuktikan dahulu sebelum ambulasi dimulai.

Pada hari pertama, dapat dilakukan miring ke kanan dan ke kiri yang dapat dimulai sejak 6-8 jam setelah ibu sadar. Latihan pernafasan dapat dilakukan ibu sambil tidur telentang sedini mungkin setelah sadar. Ibu turun dari tempat tidur dengan dibantu paling sedikit dua kali. Hari kedua, ibu dapat duduk dan dianjurkan untuk bernafas dalam-dalam lalu menghembuskannya disertai batuk-batuk kecil yang digunakan untuk melonggarkan pernafasan dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada diri ibu bahwa ia mulai pulih. Kemudian posisi tidur telentang diubah menjadi setengah duduk. Selanjutnya secara berturut-turut, hari demi hari ibu yang sudah

melahirkan dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan, kemudian berjalan sendiri pada hari ke-3 sampai ke-5 hari setelah operasi. Mobilisasi secara teratur dan bertahap serta diikuti dengan istirahat dapat membantu menyembuhkan ibu. (Nurjannah, dkk, 2020: 217-218).

#### **10. Defekasi**

Fungsi gestasional pada pasien obstetrik yang tindakannya tidak terlalu berat akan kembali normal dalam waktu 12 jam. Buang air besar secara spontan biasanya tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini disebabkan karena tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan pada masa postpartum, dehidrasi, kurang makan, dan efek anastesi. Bising usus biasanya belum terdengar pada hari pertama setelah operasi, mulai terdengar pada hari kedua, dan mulai aktif pada hari ketiga. Rasa mulas akibat gas usus karena aktivitas usus yang tidak terkoordinasi dapat mengganggu pada hari kedua dan ketiga setelah operasi. Untuk dapat buang air besar secara teratur dapat dilakukan diet teratur, pemberian cairan yang banyak, makan cukup serat, dan olahraga atau ambulasi dini. Jika hari ketiga ibu juga tidak buang air besar, maka laksan supositoria dapat diberikan pada ibu. (Nurjannah, dkk, 2020: 218).

## 11. Kebersihan diri

Kebersihan diri ibu membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan perasaan kesejateraan ibu. Mandi di tempat tidur dilakukan sampai ibu dapat mandi sendiri di kamar mandi, yang terutama dibersihkan adalah puting susu dan mammae dilanjutkan perawatan payudara. Pada hari ketiga setelah operasi, ibu sudah dapat mandi tanpa membahayakan luka operasi. Payudara harus diperhatikan pada saat mandi. (Nurjannah, dkk, 2020: 120).

### C. Tinjauan Agama Islam

#### 1. Masa nifas

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu dalam keadaan postpartum agar masa nifas berjalan dengan baik dan tidak ada komplikasi yang menyertai, dalam hal ini sebaiknya ibu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti halnya makan makanan yang bergizi, menjaga personal hygiene terutama pada luka bekas operasi agar tidak terjadi infeksi, dan dapat menyusui bayinya dengan baik.

Untuk itu ibu harus tahu larangan-larangan dalam masa nifas, yaitu:

- a. Larangan melakukan shalat. Larangan ini berdasarkan atas hadis Nabi SAW yang diwariskan oleh Fatimah Binti Abi Hubaisy yang artinya: “apabila haid tinggalkanlah shalat” (HR. Bukhari Muslim,

AbuDaud, At-Tarmidzi dan An-Nasa'i).

- b. Larangan melakukan puasa dengan ketentuan puasa yang ditinggalkan karena haid dan nifas harus di qada dihari lainnya.
- c. Larangan melakukan tawaf. Larangan ini didasarkan atas hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada Aisyah RA. “apabila engkau dalam keadaan haid, kerjakanlah hal-hal yang dikerjakan oleh orang-orang haji lainnya, tetapi engkau tidak boleh melakukan tawaf di Baitullah kecuali setelah suci” (HR Bukhari, Muslim).
- d. Larangan bergaul suami istri. Larangan ini didasarkan atas Firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah/2: 222.

وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ  
يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

“mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “ia adalah suatu kotoran”. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah amat suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Kementrian AgamaRI, 2018).

Ayat diatas menjelaskan bahwa: Allah SWT melarang

suami menggauli istrinya saat sedang haid atau nifas karena berakibat buruk dan berdampak negatif pada kesehatan diantaranya membuat vagina luka dan infeksi serta dapat terjadi hamil diluar kandungan dan lain-lain. (Sa'adah, 2020).

ayat menjelaskan bahwa larangan menggauli istri saat sedang haid atau nifas serta mendekatinya saat belum bersuci. Begitupun dalam asuhan kebidanan. Karena pada saat masa nifas saluran antara vagina dan mulut rahim membuka sehingga penyakitakan mudah masuk kedalam rahim. Di samping itu juga terdapat resiko yang sangat fatal dimana kalau sampai ada udara yang masuk ke dalam rahim saat melakukan hubungan seksual lalu masuk ke pembuluh darah, ini akan membawa kuman ke jantung sehingga dapat menimbulkan gangguan jantung. Kalau terbawakeotak, dengan cepat akan terjadi reaksi alergi atau akan menyebabkan gangguan otak. Serta mempunyai reasiko kanker.

Dan dalam masa nifas ibu juga dianjurkan untuk menyusui bayinya seperti yang dijelaskan dalam surah Q.S Al- Baqarah/2:

\* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ  
 لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

“Dan ibu- ibu hendaklah menyusui anak- anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Kementrian Agama RI, 2018).

## 2. Sectio Caesarea

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan umatnya. Berbagai aspek diatur di dalamnya dimana semuanya terungkap dalam Al Qur'an yang dilengkapi dengan terjemahnya. Mulai dari konsepsi sampai meninggalnya seorang islam semuanya telah diatur.

Post sectio caesarea merupakan suatu indikasi untuk menyelamatkan nyawanya ibu dan bayinya. Namun tidak menutup kemungkinan hal-hal buruk dapat terjadi baik kepada ibu maupun

bayinya. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Q.S Al Ahqaf/46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ  
 إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ  
 أَعْتَدَ صَالِحًا تُرْضَهُ وَأُصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

terjemahnya:

”kami telah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri” (Kementrian Agama RI, 2018).

Ayat diatas bagaikan menjelaskan: sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia siapapun manusia itu selama dia benar benar manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka dan kami telah wasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapapun dan apapun sang ayah mencappakkan sperma ke rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami berbagai kesulitan bermula dari mengidam, dengan

berbagai gangguan fisik dan psikis, dan melahirkan dengan susah payah setelah berlalunya kehamilan. (Quraish Shihab, 2002:67-68).

Adapun kaitannya ayat tersebut dengan judul penelitian yang saya ambil yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Post Sectio Caesarea Hari Pertama. Dalam ayat menjelaskan bahwa betapa susahnyanya ibu mengandung selama kurang lebih Sembilan bulan lamanya, dan selama persalinan tersebut banyak komplikasi- komplikasi yang bisa terjadi dan dapat berdampak kepada ibu dan bayinya, semua itu dapat beresiko yang akhirnya dapat berdampak pada kematian. Berbagai komplikasi yang dapat timbul pada ibu mulai dari dalam rahim sang ibu saat mengandung dengan susah payah sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, sampai mengalami gangguan pada psikis dan fisik. Sehingga berbagai asuhan dapat diberikan kepada ibu untuk menjaga ibu dan janin yang dikandungnya seperti pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat, bergizi, lunak, dan takaran yang sesuai.

Makanan yang baik untuk ibu juga dijelaskan menurut islam haruslah dipilih yang betul-betul halal, sehingga bisa menciptakan generasi yang jujur baik untuk agama dan bangsanya. Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang HalalanThoyyiban serta baik sebagaimana yang dijelaskan



dalam firman Allah Q.S Al Maidah/5:88.

﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾

Terjemahnya:

“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya” (Kementrian Agama RI, 2018).

Manusia dapat mengantisipasi penyulit – penyulit pada masa kehamilan tetapi setiap kematian Allah SWT yang menentukan. Firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 3:185.

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

Terjemahnya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan” (Kementrian Agama RI, 2018).

#### **D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan**

##### **1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan, keterampilan dalam

rangkaian tindakan, atau tahapan yang logis untuk mengambil suatu keputusan yang berfokus pada pasien atau klien.

Manajemen kebidanan merupakan tindakan pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis dimulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat. (Tajmiati, dkk, 2016)

## 2. Langkah-langkah dalam manajemen asuhan kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah asuhan kebidanan yang diawali dari pengumpulan data dan diakhiri dengan evaluasi. Adapun langkah-langkah varney asuhan kebidanan yaitu:

### a. Langkah I: pengumpulan data dasar

Pada langkah ini kita harus mengumpulkan data atau semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang. (Tajmiati, dkk, 2016)

Data yang diperoleh untuk kasus post sectio caesarea dilakukan dengan cara mengumpulkan data lengkap dari pasien dengan menilai keadaan pasien melalui anamnesa, informasi dari

keluarga, dan pemeriksaan fisik.

b. Langkah II: Interpretasi data dasar

Pada langkah ini bidan akan melakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang akurat atas data-data yang telah dikaji dan dikumpulkan pada langkah pengumpulan data dasar. Data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan agar dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumusan diagnosa dan masalah keduanya dapat digunakan karena masalah yang terjadi pada pasien dapat didefinisikan seperti diagnosa tapi tidak membutuhkan penanganan. Masalah juga sering menyertai diagnose. (Tajmiati, dkk, 2016).

Dari data subjektif dan objektif yang didapatkan pada saat pengkajian data maka diagnosa yang ditegakkan yaitu kurangnya pengetahuan tentang manfaat dari mobilisasi dini, kurangnya pengetahuan tentang komplikasi yang dapat terjadi pada ibu post sectio caesarea.

c. Langkah III: Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial.

Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnose/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ini

8 bidan dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah potensial yang dapat terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi. (Tajmiati, dkk, 2016).

Adapun masalah potensial post section caesarea yaitu syok, terbukanya luka operasi eviserasi, distensi perut, infeksi puerperal, gangguan dan infeksi pada aluran kemih.

- d. Langkah IV: Mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi

Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter umum atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan klien yang dihadapi pasien. Setelah bidan merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga merumuskan tindakan segera atau emergency untuk segera ditangani serta menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau bersifat rujukan. (Tajmiati, dkk, 2016).

Perlunya tindakan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn

atau dokter umum untuk memantau penyembuhan luka.

e. Langkah V: Intervensi atau rencana tindakan asuhan

Pada langkah ini kita merencanakan asuhan secara menyeluruh yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan penatalaksanaan terhadap masalah atau diagnosa yang telah teridentifikasi atau diantisipasi dari masalah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya untuk apa yang sudah teridentifikasi dari masalah atau kondisi klien saja tetapi bisa terjadi sebagai kerangka pedoman antisipasi terhadap klien yang bisa terjadi nantinya seperti memberi konseling dan apakah perlu merujuk jika ada masalah-masalah yang tidak dapat ditangani. (Tajmiati,dkk, 2016).

Tindakan yang diambil untuk ibu post sectio caesarea yaitu memberikan asuhan tentang mobilisasi dini, dukungan, penyuluhan tentang cara merawat luka, dan serta memperhatikan personal hygienenya.

f. Langkah VI: Implementasi

Pada langkah ini rencana asuhan penyuluhan seperti yang telah diuraikan pada langkah ini dilaksanakan secara aman dan efisien. Perencanaan ini dibuat dan dilaksanakan seluruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh dokter atau tim kesehatan lainnya. Walaupun bidan tidak melakukan tindakan segera, bidan tetap

bertanggung jawab dan mengarahkan pelaksanaannya. Dalam kondisi ini bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam penatalaksanaan asuhan bagi klien adalah tetap bertanggung jawab terhadap perencanaan asuhan dan penatalaksanaan rencana asuhan yang menyeluruh. (Tajmiati, dkk, 2016).

Implementasi yang diberikan kepada klien yaitu menjelaskan hasil pemeriksaan dan hal-hal yang dianggap penting untuk dijelaskan kepada pasien agar ibu mengetahui perkembangan kondisinya dan bayinya. Jelaskan cara-cara merawat luka dan mobilisasi dini.

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ke efektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam diagnose dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang efektif dalam pelaksanaannya.

Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan hasil dari pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan serta ber-orientasi pada proses klinis karena proses penatalaksanaan tersebut berlangsung

di klinik dan keberhasilan penatalaksanaan tergantung pada klien dan situasi klinik. (Tajmiati, dkk, 2016).

Pada tahapan evaluasi merupakan pengkajian ulang hasil asuhan yang telah diberikan untuk menilai ke efektifan tindakan yang diberikan. Untuk menilai efektif atau tidakkah tindakan yang diberikan dapat dilihat dari keadaan ibunya.

#### ***E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)***

Pendokumentasian SOAP adalah metode pendokumentasian yang sederhana namun mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan yang jelas dan logis. Menurut Varney SOAP merupakan kerangka pikir seorang bidan yang sistematis dalam melakukan asuhan dan manajemen kebidanan. (Handayani, 2017).

##### **1. Subjektif (S)**

Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien, atau ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhan yang dirasakan yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan langsung yang akan berhubungan dengan diagnosis (Handayani, 2017).

##### **2. Objektif (O)**

Data objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi atau hasil pemeriksaan fisik, atau hasil pemeriksaan laboratorium, rekam catatan medik, dan informasi dari keluarga yang dimasukkan dalam data objektif sebagai data penunjang

(Handayani, 2017).

### 3. Assessment (A)

Langkah selanjutnya adalah analisis atau assessment. Langkah ini merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi atau kesimpulan dari data subjektif dan objektif. Karena keadaan klien yang setiap saat bisa mengalami perubahan dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif. Dalam analisis menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan klien. Analisis data adalah melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan mencakup diagnosis, masalah kebidanan, dan kebutuhan (Handayani, 2017).

### 4. Planning (P)

Perencanaan atau penatalaksanaan adalah keseluruhan yang mencatat tindakan yang sudah dilakukan seperti tindakan antisipasi, tindakan segera, tindakan komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi atau follow up, serta rujukan. Tujuan penatalaksanaan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesehatannya (Handayani, 2017).



**BAB III**  
**STUDI KASUS**  
**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN**  
**NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA**  
**DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR**  
**TANGGAL 6 OKTOBER 2021**

No. Register : 06xxx

Tanggal Masuk Rumah Sakit : 5 Oktober 2021 Jam : 17.45 Wita

Tanggal Operasi : 6 Oktober 2021 Jam : 07.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 6 Oktober 2021 Jam : 10.05 Wita

Nama Pengkaji : Ainun Nadia

**LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**A. Identitas istri/ suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’

Umur : 30 Tahun / 40 Tahun

Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun

Suku : Makassar/ Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : PNS /Wiraswasta

Alamat :Topejawa

## B. Data biologis

### 1. Keluhan Utama

Ibu mengeluh mulai merasakan nyeri pada luka bekas operasi sectio caesarea dan merasa pusing jika membuka mata.

### 2. Riwayat Keluhan Utama

- a. Nyeri yang dirasakan timbul pasca dilakukan operasi sectio caesarea pada tanggal 6 Oktober 2021 jam 09.10 wita.
- b. Sifat nyeri yang rasakan menetap dan lokasinya pada abdomen bagian luka operasi sectio caesarea.
- c. Ibu merasakan pusing saat membuka matanya.
- d. Ibu merasa cemas dengan keadaannya.

## C. Riwayat kesehatan yang lalu dan riwayat kesehatan keluarga

1. Ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi, jantung, dan penyakitlainnya.
2. Ibu tidak memiliki penyakit hepatitis, HIV serta penyakit menular lainnya.
3. Ibu memiliki riwayat diabetes melitus gestasional.
4. Ibu memiliki riwayat operasi sectio caesarea sebelumnya dan operasilaparotomi.
5. Ibu tidak memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan dan alkohol.

6. Ibu tidak ada riwayat alergi.
7. Ibu tidak ada riwayat penyakit turunan keluarga

#### D. Riwayat reproduksi

##### 1. Riwayat menstruasi

- a. Menearche : Umur 14 tahun
- b. Siklus Haid : 28-30 hari
- c. Lamanya : 3-5 hari
- d. Disminorhea : dirasakan pada haid hari pertama dan kedua

##### 2. Riwayat Obstetric

- a. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang keenam dan empat kali keguguran.
- b. Ibu menikah di umur 22 tahun.

##### 3. Riwayat Gynekologi

- a. Ibu pernah mengalami kista ovarium sebelumnya dan menjalani operasi laparatomi.
- b. Ibu tidak pernah menderita penyakit infeksi pada organ reproduksi.
- c. Ibu tidak pernah menderita penyakit pada kelamin.

##### 4. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor K<sub>b</sub> sebelumnya.

#### E. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

##### 1. Kebutuhan nutrisi

Sebelum hamil ibu makan 3 kali sehari porsi sedang dengan menunasi, sayur, lauk. Minum 6-8 kali gelas air putih setiap hari dan segelas teh dipagi hari. Ibu juga rajin mengkonsumsi buah-buahan. Selama hamil ibu makan 3-5 kali sehari dengan porsi nasi sedikit, lauk dan sayur lebih banyak. Minum air putih 6-8 gelas perhari, dan 1 gelas susu hamil perharinya. Ibu juga rajin mengkonsumsi buah-buahan.

##### 2. Eliminasi

Sebelum hamil kebiasaan BAB setiap hari 1 kali, dan BAK 3-5 kali. Setelah 2 jam post sectio caesarea keteter masi terpasang dengan jumlah urine  $\pm 150$  ml di dalam urine bag dan setelah keluar dari ruangan operasi ibu belum BAB.

##### 3. Istirahat

Kebiasaan ibu tidur disiang hari 1-2 jam dan di malam hari 6-8 jam. 2 jam post sectio caesarea ibu belum bisa tidur.

#### F. Riwayat sosial budaya, sosial, ekonomi, dan spiritual

1. Ibu adalah wanita karir dan mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya.
2. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.

3. Suami dan keluarga senang dengan kelahiran bayinya.
4. Ibu tidak pernah memperlakukan jenis kelamin anaknya.
5. Ibu dan keluarga selalu berdoa dan berzikir agar keadaan ibu dan bayinya selalu diberikan kesehatan.
6. Hubungan ibu dengan keluarga serta tetangga terjalin dengan baik.
7. Riwayat ekonomi ibu dan keluarga diatas rata-rata, penghasilan suami  $\pm 5$  juta perbulan, dan penghasilan ibu  $\pm 6$  juta perbulannya.

#### G. Riwayat ANC

1. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang keenam dan empat keguguran.
2. HPHT: 23 Januari 2021
3. HTP: 30 Oktober 2021
4. Pemeriksaan ANC 6 kali di tempat praktik dokter
5. Ibu mengkonsumsi tablet Fe sebanyak  $\pm 90$  butir selama kehamilan
6. Ibu mendapatkan imunisasi TT 2 kali pada kehamilan 6 bulan dan 7 bulan.
7. Selama kehamilan ibu, ibu tidak pernah mengalami mual muntah berlebihan, nyeri perut hebat, perdarahan, dan tanda bahaya kehamilan lainnya.

#### H. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

1. Kehamilan pertama pada tahun 2015 ibu mengalami abortus pada usia kehamilan 3 bulan.
2. Kehamilan kedua pada tahun 2016, kehamilan aterm, jenis persalinan sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1ditolong oleh dokter spesialis, keadaan bayi hidup, lahir dengan jenis kelamin laki-laki dengan PBL: 48cm dan BBL: 2900 gram. Masa nifas berjalan dengan normal.
3. Kehamilan ketiga pada tahun 2017 ibu mengalami abortus pada usia kehamilan 3 bulan.
4. Kehamilan keempat pada tahun 2018 ibu mengalami abortus pada usia kehamilan 1 bulan.
5. Kehamilan kelima pada tahun 2018 ibu mengalami abortus pada usia`kehamilan 4 bulan.
6. Kehamilan sekarang pada tahun 2021, persalinan sectio caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1ditolong oleh dokter spesialis, keadaan bayi hidup, lahir dengan jenis kelamin laki-laki, BBL: 3400 gram, PBL: 49Ccm. Sedang dalam perlangsungan masa nifas.

#### I. Riwayat persalinan sekarang

1. Ibu masuk rumah sakit pada tanggal 5 Oktober 2021, jam 17.45 wita dengan rujukan dari klinik dokter spesialis obgyn. Dengan diagnosa

GVI PIIAIV , aterm, rencana sectio caesarea.

2. Ibu menjalani operasi sectio caesarea pada tanggal 6 Oktober 2021 jam 07.05 wita sampai jam 08.05 wita dengan anastesi spinal. Bayi lahir dengan jenis kelamin laki-laki, BBL: 3400 gram, PBL: 49 cm, dan apgar score 8/10.

J. Pemeriksaan terfokus post sectio caesarea setelah 2jam

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis

3. TTV

TD : 110/70 mmHg

N : 78 x/menit

S : 36°C

P : 18 x/menit

4. Pemeriksaan head to toe

a. Wajah

Tidak ada oedema, wajah tampak pucat dan meringis

b. Mata

Konjungtiva merah muda, sklera putih.

c. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar limfe, kelenjar thyroid, dan vena jugularis.

d. Payudara

Simetris kiri kanan, puting susu menonjol dan terbentuk, tampak hyperpigmentasi areolla mammae, tidak ada massa dan nyeri tekan, air susu belum keluar.

e. Abdomen

Tampak linea nigra, terdapat luka bekas bekas operasi yang masih di tutup menggunakan kasa steril.

f. Genitalia

Terdapat pengeluaran lochea rubra, tidak berbau, terpasang keteter tetap.

g. Anus

Tidak ada hemoroid.

h. Eksteremitas atas

Simetris kiri kanan, terpasang infus dextrose

i. Eksteremitas bawah

Simetris kiri kanan, tidak ada oedema dan varises.



## 5. Pemeriksaan penunjang

Pemeriksaan laboratorium 2 jam post sectio caesarea tanggal 6 Oktober 2021.

HB= 10gr %

### LANGKAH II. INTERPRETASI DATA DASAR / MASALAH AKTUAL

Diagnosa : P<sub>IIAIV</sub> Post Sectio Caesarea 2 Jam Post Partum

Masalah aktual : Nyeri luka jahitan post sectio caesarea

#### 1. PIIAVI Post sectio caesarea Data subjektif:

- Ibu melahirkan anak kedua secara sectio caesarea pada tanggal 06 Oktober 2021 jam 07.42 wita setelah empat kali keguguran.

#### Data objektif:

- Pengkajian tanggal 06 Oktober 2021, jam 10.05 wita.
- PIIAIV
- Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat.
- Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
- Pengeluaran lochia rubra.

#### Analisa dan interpretasi data:

Ibu mulai operasi pada tanggal 06 Oktober 2021, jam 07.05 wita dan selesai pada jam 08.05 wita. Yang artinya ibu berada pada masa nifas post sectio caesarea 2 jam.

Dalam waktu 12 jam, TFU mencapai lebih 1 cm diatas umbilicus. Dalam beberapa hari kemudian, perubahan involusi berlangsung cepat. Fundus turun kira-kira 1-2 cm setiap 24 jam (Fitriahadi, 2018).

Lochia rubra keluar pada hari pertama sampai hari ke-4 masa postpartum. Cairan yang keluar berwarna merah karena terisi darah segar, jaringan sisa- sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi), dan meconium (Fitriahadi, 2018).

## 2. Nyeri luka post sectio caesarea

Data subjektif:

- Ibu merasa nyeri pada luka bekas operasinya.
- Nyeri semakin dirasakan saat ibu bergerak.
- Ibu belum terlalu bisa menggerakkan tungkai bagian bawahnya.

Data objektif:

- Ekspresi wajah ibu tampak meringis.
- Luka operasi tertutup kasa steril pada abdomen.
- Tingkat nyeri sedang (di ukur menggunakan visual analogue berada pada angka 3).

Analisa dan interpretasi data:

Defenisi nyeri menurut *International Asociation For The Study Of Pain* (IASP) merupakan suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara potensial dan aktual.

Konsep lama menyatakan bahwa proses nyeri hanya bergantung pada jalur nyeri saja dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang di dapatkan (Nurjannah, dkk, 2020).



Gambar 4.1 *visual analogue scale* (VAS) sebagai alat ukur nyeri.

### 3. Kecemasan

Data subjektif:

- Ibu mengeluh pusinsg saat membuka mata.
- Ibu merasa cemas dengan keadaannya.

Data objektif:

- Ekspresi ibu tampak meringis saat membuka mata.

Analisa dan interpretasi data:

Kecemasan yang pasien rasakan yaitu nyeri luka post sectio caesarea, harus bergantung kepada orang lain bahkan ancaman kematian. Dampak terjadinya kecemasan setelah operasi dikaitkan dengan takutnya pasien dengan peningkatan rasa nyeri, peningkatan masa rawat inap dirumah sakit, dan pikiran-oikiran negative pada ibu. (Rahmawati, dkk,2017).

### LANGKAH III. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial: Antisipasi terjadinya infeksi

Data subjektif:

- Ibu mengeluh nyeri pada luka bekas operasi.
- Ibu dioperasi pada tanggal 06 Oktober 2021, jam 07.05 wita.

Data objektif:

- Ibu merasakan nyeri pada luka bekas operasi.
- Tampak luka bekas operasi tertutup kain kasa.
- Tanda-tanda vital

Tekanan darah :110/70 mmHg

Nadi :80 x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernafasan :18 x/menit

Analisa dan interpretasi data:

Perawatan luka merupakan tindakan untuk merawat luka dan luka operasi merupakan luka yang bersih sehingga mudah untuk perawatannya, namun jika salah dalam merawat maka akan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu pastikan anda tidak salah dalam merawat luka operasi, melakukan pembalutan dengan tujuan mencegah infeksi silang (masuk melalui luka) dan mempercepat proses penyembuhan luka (Nurjannah,

dkk, 2020: 215-217).

#### **LANGKAH IV. TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

Pada kasus nyeri luka jahitan post sectio caesarea diperlukan tindakan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian obat-obatan yaitu injeksi *Ceftriaxone* 1 gr secara intravena yang bertujuan untuk mengobati dan mencegah terjadinya infeksi bakteri, injeks *Traneksamat* 500 mg secara intravena yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pendarahan, *Paracetamol* oral 1 kaplet yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri, dan injeksi *Dexketoproven* 50 mg secara intravena yang bertujuan untuk meredakan rasa nyeri.

#### **LANGKAH V. RENCANA TINDAKAN**

Tanggal: 06 Oktober 2021                      jam:10.10 wita

##### **A. Tujuan**

1. Post sectio caesarea 2jam pertama berlangsung normal.
2. Kecemasan pada ibu teratasi.
3. Nyeri luka post sectio caesarea dapat teratasi atau berkurang.
4. Tidak terjadi infeksi pada luka bekas sectio caesarea.
5. Proses involusio uteri berjalan normal.
6. Proses laktasi berjalan lancar.

## B. Kriteria

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal:
  - Tekanan darah : Systole 100-130 mmHg  
Diastole 70-90 mmHg
  - Nadi : 60-90 x/menit
  - Suhu : 36,5°C – 37,5 °C
  - Pernafasan : 16-24x/menit.
3. Keluhan nyeri berkurang.
4. Ekspresi wajah ibu tidak meringis.
5. Tidak ada tanda-tanda infeksi yaitu bengkak, merah, panas, dan bernanah.
6. Proses involusio uteri berlangsung normal yang ditandai dengan:
  - a. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
  - b. Lochia rubra dan tidak berbau busuk.
  - c. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat (turun 1cm setiap hari).
8. Proses laktasi berjalan normal
  - a. ASI ibu lancar.
  - b. Ibu dapat menyusui sesering mungkin secara ondemend sesuai dengan kebutuhan bayinya.

- c. Saat bayi menyusu, bayi mengisap dan menelan dengan baik.
- d. Payudara ibu terasa kosong saat bayi selesai menyusu.

C. Rencana tindakan asuhan kebidanan

1. Mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan.

Rasional:

Mencegah terjadinya infeksi silang.

2. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya.

Rasional:

Untuk menciptakan hubungan yang baik dengan ibu.

3. Observasi tanda-tanda vital:

Rasional:

Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu.

4. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia.

Rasional:

- a. TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusi berjalan normal atau tidak. Normal TFU berkurang 1cm setiap hari dan teraba keras dan bundar.
- b. Kontraksi uterus untuk mengetahui apakah uterus berkontraksi dengan baik atau tidak. Apabila uterus tidak berkontraksi dengan

baik atau kurang maka dapat menyebabkan perdarahan dan memperlambat proses involusio.

- c. Involusi yang kurang baik menyebabkan terjadinya infeksi sehingga lochia mengalami perubahan warna, bau, banyaknya, serta perpanjangan pengeluaran lochia.

5. Menjelaskan pada ibu penyebab nyeri.

Rasional:

Dengan penjelasan mengenai penyebab nyeri diharapkan ibu dapat mengerti dan beradaptasi dengan nyeri tersebut sehingga ibu mau bekerja sama dalam proses perawatannya.

6. Bimbing ibu untuk melakukan relaksasi dan mobilisasi dini.

Rasional:

Relaksasi dan mobilisasi dini merupakan salah satu upaya untuk mengalihkan perhatian ibu terhadap nyeri yang ibu rasakan.

Relaksasi juga dapat meningkatkan suplay O<sub>2</sub> yang masuk kedalam tubuh ibu sehingga dapat mengurangi nyeri yang timbul.

7. Menganjurkan pada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi, bergizi, mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin A, C, dan D.

Rasional:

Membantu dalam proses penyembuhan luka dan pemulihan ibu.



8. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.

Rasional:

Istirahat yang cukup dapat membuat otot-otot dan otak relaksasi setelah proses operasi sehingga tenaga dan stamina ibu kembali membaik.

9. Observasi pemberian cairan infus dextrose yang dicampur dengan oxytocin 2 ampul.

Rasional:

Untuk merangsang kontraksi agar tidak terjadi pendarahan.

10. Observasi pengeluaran urine pada urine bag.

Rasional:

Untuk mengetahui keseimbangan cairan dalam tubuh serta kandung kemih yang penuh dapat menimbulkan rasa tidak nyaman dan nyeri pada ibu.

11. Memberikan konseling kepada ibu tentang pentingnya pentingnya menjaga personal hygiene dan rutin mengganti pembalut minimal 3kali sehari atau jika basah atau penuh.

Rasional:

Agar ibu terhindar dari infeksi dan ibu merasa nyaman.

## LANGKAH VI. IMPLEMENTASI

Tanggal: 6 Oktober 2021

jam: 10.15 wita

1. Mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dibawah air mengalir.

Hasil:

Telah dilakukan.

2. Mengucapkan selamat kepada ibu.

Hasil:

Terlaksanan dan ibu merasa senang.

3. Mengobservasi tanda-tanda vital.

Hasil:

Tanda-tanda vital dalam batas normal:

Tekanan darah: 110/70 mmHg

Nadi : 80 x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernafasan : 18 x/menit

4. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia ibu.

Hasil:

TFU ibu 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), pengeluaran lochia rubra dan tidak berbau.

5. Menjelaskan penyebab nyeri bahwa nyeri diakibatkan oleh terputusnya jaringan otot dan rangsangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi. Dengan adanya luka ini maka merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.

Hasil:

Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

6. Mengajarkan ibu untuk mobilisasi dini dengan latihan menggerakkan tungkai bagian bawah.

Hasil:

Ibu mengerti dan mulai menggerakkan kakinya.

7. Anjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, bergizi, mengandung protein, karbohidrat, dan vitamin karena sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan luka.

Hasil:

Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

8. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dengan tidur siang 1-2 jam, dan tidur di malam hari 7-8 jam sehari.

Hasil:

Ibu mengerti.

9. mengobservasi cairan infus dextrose yang dicampur dengan oxytosin 2 ampul yaitu 28 tetes/ menit.

Hasil:

Ibu merasa lebih baik.

10. Observasi pengeluaran urine pada urine bag.

Hasil:

Sebanyak 120 ml urine yang tertampung dalam urine bag.

11. Memberikan penjelasan kepada ibu pentingnya menjaga personal hygiene dan rutin mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau jika pembalut sudah penuh atau basah.

Hasil:

Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

#### **LANGKAH VII. EVALUASI**

Tanggal: 6 Oktober 2021      jam: 10.25 wita

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernafasan : 18x/menit

3. Ibu merasa pusing saat membuka mata, dan mulai merasakan nyeri padaluka bekas operasinya.
4. Kecemasan pada ibu teratasi.
5. Nyeri luka jahitan post sectio caesarea pada ibu berkurang.
6. Tidak terdapat tanda-tanda infeksi.
7. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba kerasdan bundar.
8. ASI belum keluar.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
 NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
 DI RSIA SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
 TANGGAL 6 OKTOBER 2021**

No. Register : 06xxx

Tanggal Masuk Rumah Sakit : 5 Oktober 2021 Jam : 17.45 Wita

Tanggal Operasi : 6 Oktober 2021 Jam : 07.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 6 Oktober 2021 Jam : 10.05 Wita

**Identitas Istri/ Suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’

Umur : 30 Tahun / 40 Tahun

Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : S1 / S1

Pekerjaan : PNS / Wiraswasta

Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu melahirkan anak kedua secara sectio caesarea pada tanggal 06 Oktober 2021 jam 07.42 wita setelah empat kali keguguran.
2. Ibu merasa nyeri pada luka bekas operasinya.

3. Nyeri semakin dirasakan saat ibu bergerak.
4. Ibu belum terlalu bisa menggerakkan tungkai bagian bawahnya.
5. Ibu mengeluh pusing saat membuka mata.
6. Ibu merasa cemas dengan keadaannya.

### Data Objektif (S)

1. Keadaan ibu baik.
2. Ekspresi wajah ibu tampak meringis.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital:

Tekanan darah :110/70 mmHg

Nadi :80 x/menit

Suhu :36.6 °C

Pernafasan :18 x/menit

4. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat.
5. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
6. Pengeluaran lochia rubra.
7. Luka bekas operasi tertutup kasa steril pada bagian abdomen.
8. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 3, yaitu ekspresi wajah ibu datar dan merintih menahan nyeri.

**Assesment (A)**

PIIAIV, Post sectio caesarea 2 jam yang lalu.

**Planning (P)**

Tanggal 6 Oktober 2021      jam:10.15 wita

1. Mencuci tangan 6 langkah dengan sabun dibawah air mengalir.
2. Mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya dan menciptakan hubungan yang baik dengan ibu.
3. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu,keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu TD: 110/70 mmHg, N:80 x/menit, S: 36.6 °C, P:18 x/menit.
4. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu yaitu 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik, teraba keras da bundar.
5. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri, bahwa nyeri yang dirasakan akibat terputusnya jaringan otot dan rangsangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi. Dengan adanya luka ini maka merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul nyeri.
6. Menganjurkan kepada ibu untuk mobilisasi dini dengan menggerakkan tungkai bagian bawahnya.
7. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, protein, karbohidrat, dan vitamin karena sangat baik untuk proses penyembuhan luka.



8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.
9. Mengobservasi cairan infus dextrose yang dicampur dengan 2 ampul oxytosine.
10. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir, mengingat Allah, dan berdoa untuk keselamatan ibu dan bayinya.
11. Observasi pengeluaran urine pada urine bag yaitu 120 ml urine yang tertampung dalam urine bag.
12. Menjelaskan kepada ibu untuk pentingnya menjaga kebersihan personal hygiene dan rutin mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau jika basah atau penuh.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA 8 JAM  
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
TANGGAL 6 OKTOBER 2021**

Tanggal Masuk Rumah Sakit	: 5 Oktober 2021	Jam	: 17.45 Wita
Tanggal Operasi	: 6 Oktober 2021	Jam	: 07.05 Wita
Tanggal Kunjungan	: 6 Oktober 2021	Jam	: 16.10 Wita
Tanggal Pengkajian	: 6 Oktober 2021	Jam	: 16.15 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama	:Ny. ‘H’	/ TN. ‘A’
Umur	:30 Tahun	/ 40 Tahun
Nikah/ Lamanya	:1x/±7 Tahun	/ 1x/7 Tahun
Suku	:Makassar	/ Makassar
Agama	:Islam	/ Islam
Pendidikan	:S1	/ S1
Pekerjaan	:PNS	/Wiraswasta
Alamat	:Topejawa	

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu merasa luka bekas operasi masih nyeri saat bergerak.
2. Ibu sudah bergerak miring kekanan dan kekiri.
3. Ibu merasa masih sedikit pusing saat membuka mata.

4. Asi ibu belum ada.

### Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Luka bekas operasi masi tertutup kasa steril.
3. Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak.
4. ASI (-).
5. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
6. Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau.
7. Tinggi fundus uteri 2jari dibawah pusat.
8. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah: 110/70mmHg

Nadi : 78x/menit

Suhu : 36,5°C

Pernafasan : 20x/menit

9. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 2, yaitu ibu sudah dapat tersenyum tapi masi menahan nyeri.

### Assessment (A)

P<sub>II</sub>A<sub>IV</sub>, Post Sectio Caesarea 8 jam yang lalu.

**Planning (P)**


Tanggal 6 Oktober 2021

jam: 16.20 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu terkait keadaannya. Keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 78x/menit, suhu: 36,5°C, pernafasan 20x/menit.
2. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu: 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik dan teraba keras dan bundar, pengeluaran lochea rubra.
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.
4. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi kacang-kacangan, sayuran hijau, biji-bijian yang bertujuan untuk menambah produksi ASI.
5. Menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan payudara untuk merangsang pengeluaran ASI.
6. Menjelaskan pada ibu penyebab timbulnya nyeri akibat putus komunitas jaringan otot.
7. Memberikan support dan dukungan pada ibu untuk senantiasa berdoa dan meminta perlindungan kepada Allah swt untuk kesehatannya dan bayinya.
8. Menganjurkan ibu untuk miring kekanan dan kekiri untuk mencegah terjadinya thrombosis dan tromboemboli.
9. Mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan

oleh dokter yaitu paracetamol 3x1 dan ketoprofen 3x1

10. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA 12 JAM  
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
TANGGAL 6 OKTOBER 2021**

Tanggal Masuk Rumah Sakit : 5 Oktober 2021	Jam : 17.45 Wita
Tanggal Operasi : 6 Oktober 2021	Jam : 07.05 Wita
Tanggal Kunjungan : 6 Oktober 2021	Jam : 20.10 Wita
Tanggal Pengkajian : 6 Oktober 2021	Jam : 20.15 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama	:Ny. ‘H’ / TN. “A”
Umur	:30 Tahun / 40 Tahun
Nikah/ Lamanya	:1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun
Suku	:Makassar / Makassar
Agama	:Islam / Islam
Pendidikan	:S1 / S1
Pekerjaan	:PNS /Wiraswasta
Alamat	:Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu masih merasakan sedikit nyeri pada luka bekas operasi terutama pada saat ibu bergerak.
2. Ibu sudah tidak merasa pusing.

3. Ibu sudah mulai bisa merawat bayinya dibantu oleh suami.
4. Ibu sudah mulai berjalan sendiri.
5. ASI ibu belum ada.
6. Ibu mengatakan terpasang obat duogesic patch pada bagian dada.

#### Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis dan ekspresi wajah ibu nampak senang.
3. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
4. Tampak pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau.
5. ASI (-)
6. Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat.
7. Tanda-tanda vital:

Tekanan darah : 110/70mmHg

Nadi : 80 x/menit

Suhu : 36,6°C

Pernafasan : 21x/menit

8. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 2, yaitu ibu sudah dapat tersenyum tapi raut wajahnya terlihat masi menahan nyeri.

**Assessment (A)**

P<sub>IIA</sub>IV, Post Sectio Caesarea 12 jam yang lalu.

**Planning (P)**

Tanggal: 6 Oktober 2021


jam: 20.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami terkait keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 x/menit, pernafasan 21x/menit, dan suhu 36,6°C.
2. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu yaitu 2 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.
4. Menganjurkan pada ibu untuk melakukan perawatan payudara, dan menjelaskan manfaat dari perawatan payudara.
5. menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemand atau setiap 2jam sekali atau sesuai kebutuhan.
6. Mengobservasi pengeluaran urine yang tertampung dalam urine bag.
7. Menjelaskan kepada ibu pentingnya personal hygiene. Mengganti pembalut minimal 3 kali sehari dan mengganti pakaian jika basah atau lembab.
8. Mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan



oleh dokter yaitu paracetamol 3x1 dan ketoprofen 3x1.

9. Mengajarkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir dan berdoa meminta perlindungan dari Allah untuk kesehatan ibu dan bayinya.
10. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN NYERI  
LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA HARI KE 1  
DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
TANGGAL 7 OKTOBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Masuk Rumah Sakit : 5 Oktober 2021                      Jam : 17.45 Wita

Tanggal Operasi : 6 Oktober 2021                                      Jam : 07.05 Wita

Tanggal Kunjungan : 7 Oktober 2021                                  Jam : 09.10 Wita

Tanggal Pengkajian : 7 Oktober 2021                                 Jam : 09.15 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama :Ny. ‘H’ / TN. “A”

Umur :30 Tahun / 40 Tahun Nikah/

Lamanya :1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun

Suku :Makassar / Makassar

Agama :Islam / Islam

Pendidikan :S1 / S1

Pekerjaan :PNS /Wiraswasta

Alamat :Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu masih merasakan sedikit nyeri pada luka bekas operasi terutama padasaat ibu bergerak.
2. Ibu mengatakan infusnya dibuka 24 jam setelah operasi.
3. ASI ibu belum ada.
4. Ibu sudah BAB
5. Ibu sudah mandi pagi dan membersihkan dirinya.
6. Ibu sudah bisa merawat bayinya dibantu oleh keluarga dan suami.
7. Ibu mengatakan telah diberikan terapi obat dulcolax, dan rofiden melaluianus.
8. Ibu mengatakan masih terpasang obat durogesic patch pada bagian dada.

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis. Ekspresi wajah ceria dan senang.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital.

Tekanan darah: 110/80 mmHg

Nadi : 82 x/menit

Suhu : 36,6 °C

Pernafasan : 19 x/menit

4. Tingkat nyeri diukur menggunakan visual analogue barada pada angka 1, yaitu ibu sudah tersenyum tapi raut wajahnya masih terlihat menahan nyeri.
5. Observasi tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat.
6. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
7. Pengeluaran lochea rubra.
8. ASI (-)

#### **Assessment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea hari I (Pertama).

#### **Planning (P)**

Tanggal: 7 Oktober 2021 jam: 09.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan suami dan suami tentang keadaan ibu dan bayinya. Tanda-tanda vital yaitu tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 82 x/menit, suhu 36,6 °C, pernafasan 19 x/menit.
2. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu yaitu 3 jari dibawah pusat. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.
4. Memberikan penjelasan kepada ibu pentingnya mobilisasi dini dalam proses penyembuhan.

5. Melakukan perawatan payudara pada ibu yang bertujuan untuk merangsang kelenjar-kelenjar puting susu sehingga ASI menjadi lancar.
6. Memberikan dukungan dan support kepada ibu dan senantiasa berdoa meminta perlindungan dari Allah swt untuk kesehatannya serta bayinya.
7. Menjelaskan kepada ibu pentingnya personal hygiene. Mengganti pembalut minimal 3 kali sehari dan mengganti pakaian jika basah atau lembab.
8. Mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter yaitu lactamam 3x1 berfungsi untuk membantu produksi ASI, ifalmin 3x2 berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan, membantu proses penyembuhan luka, dan memelihara kesehatan tubuh, serta analtram 3x1 untuk menangani nyeri yang dirasakan oleh ibu.
9. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan dan mengatasi nyeri.
10. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayur-sayuran dan vitamin.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN NYERI  
LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA HARI KE II  
DI RSIA SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR  
TANGGAL 8 OKTOBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Masuk Rumah Sakit	: 5 Oktober 2021	Jam	: 17.45 Wita
Tanggal Operasi	: 6 Oktober 2021	Jam	: 07.05 Wita
Tanggal Kunjungan	: 8 Oktober 2021	Jam	: 08.00 Wita
Tanggal Pengkajian	: 8 Oktober 2021	Jam	: 08.10 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama	:Ny. ‘H’	/ TN. ‘A’
Umur	:30 Tahun	/ 40 Tahun Nikah/
Lamanya	:1x/±7 Tahun	/ 1x/7 Tahun
Suku	:Makassar	/ Makassar
Agama	:Islam	/ Islam
Pendidikan	:S1	/ S1
Pekerjaan	:PNS	/Wiraswasta
Alamat	:Topejawa	

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu sudah tidak merasakan nyeri kecuali saat melakukan aktivitas berat.
2. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas ringan dan mengurus bayinya.
3. ASI ibu belum ada.
4. Ibu mengatakan masih terpasang obat durosic patch pada bagian dada.

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis dan ekspresi wajah tampak senang.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - Tekanan darah : 110/80 mmHg
  - Nadi : 78 x/menit
  - Suhu : 36,5 °C
  - Pernafasan : 20 x/menit
4. Observasi tinggi fundus uteri ibu 3 jari dibawah pusat.
5. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
6. Pengeluaran lochea rubra.
7. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi dan luka masi tertutup kasa.
8. ASI (-).

9. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 1, ibu sudah tersenyum tapi raut wajahnya masih terlihat menahan nyeri saat bergerak.

### **Assessment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea hari ke II (kedua).

### **Planning (P)**

Tanggal: 8 Oktober 2021                      jam 08.25 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga tentang keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 78 x/menit, suhu: 36,5 °C, pernafasan: 20 x/menit.
2. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu yaitu 3 jari dibawah pusat.
3. Melakukan perawatan payudara kepada ibu untuk merangsang produksi ASI.
4. Menganjurkan ibu untuk minum banyak air putih untuk meningkatkan produksi ASI.
5. Memberikan support dan dukungan pada ibu.
6. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdoa, mengingat Allah swt dan meminta perlindungan dari Allah untuk kesehatan ibu dan bayinya.
7. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.



8. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan pola makan dan banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan serat.
9. Menganjurkan ibu untuk banyak mengkonsumsi sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, gandum atau oats yang bertujuan untuk menambah produksi ASI.
10. Menjelaskan kepada ibu pentingnya personal hygiene. Mengganti pembalut minimal 3 kali sehari dan mengganti pakaian jika basah atau lembab.
11. Mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diberikan oleh dokter yaitu lactamam 3x1, ifalmin 3x2, dan analtram 3x1.
12. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup untuk mempercepat proses pemulihan, dan mengatasi nyeri.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
 NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
 1 MINGGU POST PARTUM DI RUMAH KLIEN  
 TANGGAL 13 OKTOBER 2021  
 (SOAP)**

Tanggal Kunjungan : 13 Oktober 2021 Jam : 11.20 Wita

Tanggal Pengkajian : 13 Oktober 2021 Jam : 1 1.35 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama :Ny. ‘H’ / TN. “A”  
 Umur :30 Tahun / 40 Tahun  
 Nikah/ Lamanya :1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
 Suku :Makassar / Makassar  
 Agama :Islam / Islam  
 Pendidikan :S1 / S1  
 Pekerjaan :PNS /Wiraswasta  
 Alamat :Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu sudah tidak merasakan nyeri ketika batuk atau bersin.
2. Ibu telah melakukan kontrol ke klinik dan mengganti perban padatanggal 10 Oktober 2021.
3. Ibu mengatakan luka bekas operasinya dan luka bekas jahitannya sudah

mulai kering.

4. Ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri, serta melakukan aktivitas ringan lainnya.
5. Ibu mengatakan masih sangat hati-hati saat bergerak dan jalan karena takut jahitannya terlepas.
6. Ibu menggunakan mikrolax karena belum BAB selama 3 hari.
7. ASI ibu sudah keluar sejak hari keempat setelah operasi.
8. Ibu mengatakan sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan.
9. Ibu mengatakan akan kembali mengganti perbannya pada tanggal 15 Oktober 2021.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis, ekspresi wajah ibu cerah dan terlihat bahagia.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital

Tekanan darah: 110/70 mmHg

Nadi : 78 x/menit

Suhu : 36,6 °C

Pernafasan : 21 x/menit

4. Observasi tinggi fundus uteri ibu yaitu pertengahan antara pusat dan symphysis.

5. Pengeluaran lochea serosa dengan warna kuning kecoklatan.
6. Tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi.
7. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 1,yaitu yaitu ibu sudah tersenyum tetapi masih merintih ketika bergerak.

### **Assesment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 1 minggu post partum.


### **Planning (P)**

Tanggal: 13 Oktober 2021 jam: 11.45 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah: 110/70 mmHg, nadi: 78 x/menit, suhu: 36,6 °C, pernafasan: 21 x/menit.
2. Mengobservasi tinggi fundus uteri ibu yaitu pertengahan antara pusat dan symphisis.
3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.
4. Memberikan dukungan dan support kepada ibu.
5. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir, berdoa, dan mengingat Allah, serta meminta pertolongan kepada Allah agar Ibu dan bayinyaselalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Allah swt.
6. Menganjurkan ibu untuk banyak makan makanan yang bergizi seperti

sayur-sayuran dan vitamin. makanan bergizi penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka dan pemulihan kesehatan ibu.

7. Mengingatkan ibu untuk memperhatikan kebersihan diri dan bayinya serta menghindari aktivitas berat.
8. Mengingatkan ibu untuk rutin mengganti perban agar tidak terjadi infeksi.
9. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.
10. Memberitahu kepada ibu tentang tanda-tanda bahaya pada bayi, dan perawatan bayi seperti memandikan, menjemur, dan perawatan tali pusat.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
 NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
 10 HARI POST PARTUM SECARA ONLINE (WA)  
 TANGGAL 16 OKTOBER 2021  
 (SOAP)**

Tanggal Pengkajian : 16 Oktober 2021 Jam : 15.10 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H” / TN. “A”  
 Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
 Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : S1 / S1  
 Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
 Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu telah melakukan kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan lukabekas operasinya.
2. Ibu sudah melepas perbannya, dan sudah tidak memakai perban lagi padaluka bekas operasinya.
3. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0,ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri lagi.

4. Luka bekas operasi ibu sudah membaik dan jahitan sudah kering.
5. Ibu sudah bergerak dan melakukan aktivitas fisik ringan.
6. BAB ibu sudah lancar dan tidak ada masalah.
7. Ibu mengatakan pengeluaran darah berwarna coklat kekuningan dan bercampur lendir.
8. ASI ibu lancar dan bayi menyusu dengan baik.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Ekspresi wajah tampak cerah dan bahagia.

#### **Assesment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 10 hari post partum.

#### **Planning (P)**

Tanggal: 16 Oktober 2021                      jam: 15.12 wita

1. Memberikan support dan dukungan kepada ibu.
2. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya darah dari jalan lahir karena terjadinya involusi uteri atau proses kembalinya uterus ke keadaan seperti semula sebelum hamil.
3. Menganjurkan ibu untuk banyak makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan vitamin. makanan bergizi penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka dan pemulihan kesehatan ibu.

4. Mengingatkan ibu untuk memperhatikan kebersihan dirinya seperti mengganti pembalut jika penuh atau lembab, mandi 2 kali sehari, menyikat gigi, dan mengganti pakaian dalam.
5. Mengingatkan ibu untuk tidak melakukan aktivitas berat karena luka bekas operasinya belum benar-benar sembuh.
6. Menganjurkan ibu untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat jika merasa ada tanda-tanda infeksi atau kelainan pada luka bekas operasinya.
7. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemand atau sesering mungkin, atau sesuai kebutuhan bayi.
8. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan keadaan bayinya, menjelaskan tanda-tanda bahaya bayi baru lahir dan segera membawa bayinya kefasilitas kesehatan terdekat jika terjadi salah satu dari tanda bahaya tersebut.
9. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir dan berdoa untuk kesehatan ibu dan bayinya serta selalu dalam lindungan Allah swt.
10. Menganjurkan ibu untuk istirahat dan tidur yang cukup.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
2 MINGGU POST PARTUM SECARA ONLINE (WA)  
TANGGAL 20 OKTOBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Pengkajian : 20 Oktober 2021 Jam : 15.20 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’  
Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : S1 / S1  
Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya dan keadaan lukanya sudah mengering.
2. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0,yaitu ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri.
3. Ibu sudah bisa melakukan aktivitas fisik ringan.

4. BAB dan BAK ibu baik dan tidak ada masalah.
5. Ibu rutin menyusui bayinya, dan berusaha untuk tetap memberikan bayinya ASI eksklusif.
6. Ibu mengatakan pengeluaran darah hanya bercak-bercak.
7. Ibu rutin mrngganti pembalut dan menjaga kebersihan lukanya.

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia.

**Assesment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 2 minggu post partum.

**Planning (P)**

Tanggal: 20 Oktober 2021                      jam: 15.13 wita

1. Memberikan support dan dukungan kepada ibu.
2. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak mengingat Allah swt, berdzikir dan berdoa untuk kesehatan ibu dan bayinya serta selalu dalam lindungan Allah swt.
3. Menganjurkan ibu untuk banyak makan makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran dan vitamin. makanan bergizi penting dalam mempercepat proses penyembuhan luka dan pemulihan kesehatan ibu.
4. Mengingatkan ibu untuk memperhatikan kebersihan diri dan bayinya serta

menghindari aktivitas berat.

5. Mengajukan ibu untuk mengatur jadwal istirahatnya supaya ibu tidak kelelahan, dan apakah istirahatnya sudah cukup.
6. Memastikan ibu masih memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, dan apakah ASI ibu lancar.
7. Memberikan informasi kepada ibu tentang kapan ibu dapat mulai melakukan hubungan seksual, yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan 2 jari atau lebih ibu tidak merasakan sakit.
8. Menyarankan ibu untuk ber-KB, dan alat kontrasepsi apa yang akan ibu gunakan.
9. Menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi kepada ibu.
10. Mengajukan ibu untuk istirahat dan tidur yang cukup.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
3 MINGGU POST PARTUM SECARA ONLINE (WA)  
TANGGAL 27 OKTOBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Pengkajian : 20 Oktober 2021 Jam : 15.20 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H” / TN. “A”  
Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : S1 / S1  
Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu sudah bisa memasak, mencuci, menyapu, dan melakukan aktivitas fisikringan lainnya.
2. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0,yaitu ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri.
3. BAB dan BAK ibu baik, dan tidak ada keluhan.

4. Ibu rutin menyusui bayinya dan tidak memberikan bantuan susu formula.
5. Ibu mengatakan pengeluaran darah hanya bercak-bercak.
6. Ibu rutin mengganti pembalut dan menjaga kebersihan tubuhnya.
7. Ibu belum memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi manapun.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia.

#### **Assesment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 3 minggu post partum.

#### **Planning (P)**

Tanggal: 27 Oktober 2021                      jam: 10.47 wita

1. Memberikan support dan dukungan kepada ibu.
2. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak mengingat Allah swt dengan berdzikir, dan berdoa untuk kesehatan ibu dan bayinya serta selalu dalam lindungan Allah swt.
3. Mengingatkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya dan bayinya.
4. Menganjurkan ibu untuk tidak mengerjakan pekerjaan berat karena luka bekas operasinya belum benar-benar sembuh.
5. Menjelaskan pada ibu pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung tinggi serat, vitamin, dan protein yang yang membantu dalam

proses penyembuhan luka.

6. Menganjurkan ibu untuk mengatur jadwal istirahatnya agar ibu tidak kelelahan.
7. Menyarankan ibu untuk mulai mendiskusikan dengan suaminya alat kontrasepsi apa yang akan ibu gunakan.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
4 MINGGU POST PARTUM SECARA ONLINE (WA)  
TANGGAL 3 NOVEMBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Pengkajian : 3 November 2021 Jam : 15.45 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’  
Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : S1 / S1  
Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya, keadaan lukanya sudah kering dan tidak ada tanda-tanda infeksi.
2. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0, yaitu ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri.
3. Ibu sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara bertahap dan

mulai merawat bayinya sendiri walaupun terkadang dibantu oleh suami.

4. Putting susu ibu sedikit nyeri saat menyusui bayinya.
5. BAB dan BAK ibu baik dan tidak ada keluhan.
6. Ibu rutin menyusui bayinya dan berusaha untuk tetap memberika ASI eksklusif tanpa bantuan susu formula.
7. Ibu mengatakan pengeluaran darah sisa sedikit bercak-bercak.
8. Ibu rutin mengganti pembalut dan menjaga kebersihan dirinya.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia.

#### **Assesment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 4 minggu post partum.

#### **Planning (P)**

Tanggal 3 November 2021 jam: 15.48 wita

1. Memberikan support dan dukungan kepada ibu.
2. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir dan mengingat Allah swt, serta berdoa untuk kesehatan ibu dan bayinya.
3. Mengingatkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya dan bayinya.
4. Menjelaskan pada ibu pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung tinggi serat, vitamin, dan protein.



5. Mengajukan ibu untuk mengatur jadwal istirahatnya agar ibu tidak kelelahan.
6. Menjelaskan kepada ibu cara menyusui yang baik dan benar.
7. Menyarankan ibu untuk memperhatikan cara menyusu bayinya. Apakah bayi menyusu yang baik dan benar atau tidak.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
5 MINGGU POST PARTUM SECARA ONLINE (WA)  
TANGGAL 10 NOVEMBER 2021  
(SOAP)**

Tanggal Pengkajian : 10 November 2021 Jam : 20.15 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’  
Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : S1 / S1  
Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu sudah mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan merawat bayinya sendiri walaupun terkadang dibantu oleh suami.
2. Tingkat nyeri di ukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0,yaitu ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri.
3. Ibu sudah tidak merasakan nyeri pada putting susunya saat menyusui banyinya.

4. Ibu rutin menyusui bayinya dan berusaha untuk tidak memberikan bantuansusu formula.
5. Ibu mengatakan pengeluaran darah sudah tidak ada, tetapi sisa lendir dengan sedikit bercak.
6. BAB dan BAK ibu baik dan tidak ada keluhan.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Ekspresi wajah ibu tampak senang dan bahagia.

#### **Assesment (A)**


PIIAIV, Post Sectio Caesarea 5 minggu post partum.

#### **Planning (P)**

Tanggal: 10 November 2021 jam: 20.17 wita

1. Memberikan support dan dukungan kepada ibu.
2. Mengajarkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir dan berdoa untuk kesehatan ibu dan bayinya serta selalu dalam lindungan Allah swt.
3. Mengingatkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya dan bayinya.
4. Menjelaskan pada ibu pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung tinggi serat, vitamin, dan protein.
5. Mengajarkan ibu untuk mengatur jadwal istirahatnya agar ibu tidak kelelahan.

6. Mengajarkan ibu untuk selalu memperhatikan posisi bayinya saat menyusui.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “H” DENGAN  
 NYERI LUKA JAHITAN POST SECTIO CAESAREA  
 6 MINGGU POST PARTUM DI RUMAH KLIEN  
 TANGGAL 17 NOVEMBER 2021  
 (SOAP)**

Tanggal Kunjungan : 17 November 2021 Jam : 15.20 Wita

Tanggal Pengkajian : 17 November 2021 Jam : 15.25 Wita

**Identitas Istri/Suami**

Nama : Ny. ‘H’ / TN. ‘A’  
 Umur : 30 Tahun / 40 Tahun  
 Nikah/ Lamanya : 1x/±7 Tahun / 1x/7 Tahun  
 Suku : Makassar / Makassar  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : S1 / S1  
 Pekerjaan : PNS /Wiraswasta  
 Alamat : Topejawa

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi, dan telah dibicarakan dengan suami.
2. Ibu sudah melakukan pekerjaan rumah tangga tetapi masih menghindari pekerjaan yang berat.

3. Ibu menyusui bayinya sesering mungkin atau saat bayi rewel, dan tidak memberikan bantuan susu formula.
4. Ibu mengatakan sudah tidak ada pengeluaran darah atau bercak pada daerah kewanitaannya.
5. BAB dan BAK ibu baik dan tidak ada keluhan.

#### **Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran composmentis dan ekspresi wajah cerah.
3. Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - Tekanan darah: 110/80 mmHg
  - Nadi : 81 x/menit
  - Suhu : 36,6 °C
  - Pernafasan : 22 x/menit
4. Tingkat nyeri diukur menggunakan visual analogue barada pada angka 0, yaitu ibu sudah tertawa lepas dan tidak merasakan nyeri lagi.
5. Observasi tinggi fundus uteri ibu tidak teraba.
6. Pengeluaran lochea sudah tidak ada.
7. Luka sudah kering dan tidak ada infeksi.

**Assessment (A)**

PIIAIV, Post Sectio Caesarea 6 minggu post partum.

**Planning (P)**

Tanggal: 17 November 2021

jam: 15.28 wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu terkait keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital yaitu tekanan darah: 110/80 mmHg, nadi: 81 x/menit, suhu: 36,6 °C, nadi: 22 x/menit.
2. Mengobservasi TFU ibu tidak ada, dan pengeluaran lochea sudah tidakada.
3. Memberikan dukungan dan support kepada ibu dan keluarga.
4. Menganjurkan ibu untuk banyak-banyak berdzikir, dan berdoa kepada Allah swt untuk kesehatan ibu dan bayinya.
5. Menjelaskan pada ibu pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengandung tinggi serat, vitamin, dan protein.
6. Mengingatkan ibu untuk memperhatikan kebersihan dirinya dan bayinya.
7. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memperhatikan kesehatan dirinya dengan istirahat yang cukup.
8. Menjelaskan pada ibu kapan ibu dapat melakukan hubungan seksual kembali jika dimasukkan 2 jari atau lebih pada vagina ibu dan ibu sudah tidak merasakan nyeri.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara konsep kasus dan teori dasar dengan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “H” dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar tanggal 6 Oktober 2021-17 November 2021.

Untuk memudahkan dalam menguraikan kesenjangan antara teori dan studi kasus, maka penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah varney dan soap sebagai berikut:

#### **Langkah I. Identifikasi Data Dasar**

Pada langkah ini kita harus mengumpulkan data atau semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan cara anamnesa, pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan tanda- tanda vital, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan penunjang. (Tajmiati, dkk, 2016).

Data yang diperoleh untuk kasus post sectio caesarea dilakukan dengan cara mengumpulkan data lengkap dari pasien dengan menilai keadaan pasien melalui anamnesa, informasi dari keluarga, dan pemeriksaan fisik.

Berdasarkan data subjektif dan objektif yang penulis temukan padakasus Ny. “H” umur 30 tahun, PIIAIV, post sectio caesarea 2 jam lalu di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar pada tanggal 6 Oktober 2021. Ibu mengatakan mulai merasakan nyeri pada luka jahitan operasi sectio caesarea, sifat nyeri yang



dirasakan menetap pada bagian luka jahitan post sectio caesarea, ibu merasa pusing dengan keadaannya, dan merasa cemas dengan keadaannya.

Ibu mengatakan ini adalah kehamilan ke enam dan empat kali keguguran. Ibu tidak menderita penyakit hipertensi, jantung, hepatitis, serta penyakit menular lainnya. Ibu memiliki riwayat diabetes mellitus gestasional dan riwayat operasi sectio caesarea sebelumnya. Ibu tidak memiliki riwayat ketergantungan obat-obatan, alkohol, serta tidak ada riwayat alergi. Ibu tidak memiliki penyakit menular dan turunan dari keluarga. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB sebelumnya.

Secara fisik tindakan sectio caesarea menyebabkan nyeri pada abdomen yang berasal dari luka operasi. Persalinan sectio caesarea memiliki tingkat nyeri lebih tinggi sekitar 27,3% dibandingkan dengan persalinan normal yang hanya sekitar 9%. Umumnya tingkat nyeri yang dirasakan dominan tinggi pada hari pertama post operasi section caesarea. Secara psikologis tindakan sectio caesarea berdampak terhadap rasa takut, cemas terhadap nyeri yang dirasakan setelah analgetik hilang. Nyeri dapat diatasi dengan penatalaksanaan nyeri. Tujuan penatalaksanaan nyeri untuk meringankan atau mengurangi rasa nyeri. (Utami, 2016).

Menurut penelitian Zulhaedah tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh dari data rekam medik di RSIA Pertiwi Makassar tahun 2016 diperoleh jumlah ibu yang melakukan persalinan sectio caesarea yaitu sebanyak 259 ibu dimana prevalensinya sebesar 0,1% sama dengan tingkat kasus ibu nifas dengan riwayat sectio caesarea. (Zulhaedah, 2016).

Nyeri akut pasca operasi masi menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia.hampir 50% pasien pasca operasi mengalami nyeri yang berujung terhadap peningkatan kejadiannyeri kronik dan penurunan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Nyeri yang berdasar atas *international association for the study of pain* (IASP) adalah sensori tidak nyaman dan pengalaman emosional yang sangat berhubungan dengan potensial kerusakan jaringan atau terdapat kerusakan jaringan yang nyata. Nyeri umumnya dapat hilang dengansendirinya namun jika respon nyeri tersebut tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan perubahan mnjadi nyeri kronik. Nyeri harus dinilai dengan benar agar dapat di tangani secara efektif. Standar umum yang digunakan adalah penilaian pasien itu sendiri yang dilakukan secara rutin setelah operasi menggunakan sistem skoring 0-10, dinilai dengan 0 tidak nyeri, dan 10 merupakan nyeri yang paling berat. Kunci utama keberhasilan control nyeri adalah evaluasi ulang skala nyeri pasien secara berkala untuk meminimalkan kemungkinan terapi nyeri tang tidakdiketahui. (Prabandari, dkk, 2018)

Pada kunjungan pertama yang dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan hasil pemeriksaan dengan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu TD: 110/70 mmHg, N: 78 x/ menit, S: 36°C, P: 18 x/menit, ekspresi wajah ibu tampak cemas dan meringis dan tidak ada oedema, tampak hyperpigmentasi aroella mammae, air susu belum keluar, terdapat pengeluaran lochea rubra yang tidak berbau, terpasang keteter tetap, terpasang infus dextrose, tidak ada oedema dan varises. Pemeriksaan

laboratorium 2 jam post sectio caesarea di dapatkan Hb ibu 10 gr %.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ibu merasa luka bekas operasinya masih nyeri saat bergerak, masih merasakan sedikit pusing saat membuka mata, ASI belum ada, ekspresi wajah tampak meringis saat bergerak, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochea rubra tidak berbau, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pemeriksaan tanda-tanda vital dengan TD: 110/70 mmHg, N:78 x/menit, S: 36.5 °C, P: 20 x/menit.

Pada pemeriksaan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan ibu baik, keasadaran composmentis dan ekspresi wajah ibu tampak senang, masih merasakan sedikit nyeri pada luka bekas operasi terutama pada saat bergerak, sudah tidak merasakan pusing, sudah mulai bisa merawat bayinya dibantu oleh suami, sudah mulai berjalan sendiri, ASI belum ada, terpasang obat duogesic patch pada bagian dada ibu, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tampak pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pemeriksaan tanda- tanda vital yaitu TD: 110/70 mmHg, N: 80 x/menit, S: 36.6°C, P: 21 x/menit.

Pemeriksaan keempat di RSIA Sitti Khadijah 1 keadaan umum ibu baik, keasadrn composmentis dan ekspresi wajah ibu tampak senang, ibu masi merasakan sedikit nyeri pada luka jahitan bekas operasinya, infus ibu sudah dibuka 24 jam post section caesarea, ASI ibu belum ada, ibu sudah BAB, ibu sudah mandi dan membersihkan dirinya, ibu sudah bisa merawatbayinya dibantu oleh suami dan keluarga, ibu telah diberikan terapi obat dulcolax dan roviden

melalui anus, pada dada ibu masih terpasang obat deurogesic patch, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 82 x/menit, S: 36.6°C, P: 19 x/menit, tinggi fundus uteri ibu 3 jari dibawah pusat, kontraksi baik teraba keras dan bundar, dan pengeluaran lochia rubra.

Pada kunjungan kelima di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis dan ibu tampak senang, ibu sudah tidak merasakan nyeri kecuali saat melakukan aktivitas berat, ibu sudah mampu melakukan aktivitas ringan dan mengurus bayinya, ASI ibu belum ada, pada bagian dada ibu masih terpasang obat duogesic patch, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 78 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20 x/menit, tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra, tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi dan luka masih tertutup kasa.

Pada kunjungan keenam di rumah klien keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ibu sudah tidak merasakan nyeri ketika batuk dan bersin, ibu telah kontrol ulang ke klinik dan mengganti perban pada tanggal 10 Oktober 2021, luka bekas operasi dan luka bekas jahitan sudah mulai kering, ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri serta sudah dapat melakukan aktivitas ringan lainnya, ibu masih sangat hati-hati saat bergerak dan berjalan karena takut jahitannya terlepas, ibu menggunakan mikrolax karena susah BAB selama 3 hari, ASI ibu sudah keluar sejak empat hari post sectio caesarea, ibu sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan, ibu akan kembali mengganti perbannya pada tanggal 15 Oktober 2021, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/70

mmHg, N: 78 x/menit, S: 36.6°C, P: 21 x/menit, tinggi fundus uteri ibu yaitu pertengahan antara pusat dan symphysis, pengeluaran lochia serosa berwarna kuning kecoklatan, dan tidak ada tanda-tanda infeksi.

Pada kunjungan ketujuh dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak cerah dan bahagia, ibu telah melakukan kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya, ibu sudah melepas perbannya dan sudah tidak menggunakan perban lagi, luka bekas operasi ibu sudah membaik dan luka bekas operasi sudah kering, ibu sudah dapat melakukan aktivitas ringan, BAB ibu sudah lancar dan tidak ada masalah, pengeluaran darah berwarna coklat kekuningan dan bercampur lendir.

Pada kunjungan kedelapan dilakukan kunjungan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia, ibu telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya dan keadaan lukanya sudah mengering, BAB dan BAK ibu tidak ada masalah, ibu rutin menyusui bayinya dan berusaha untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, ibu mengatakan pengeluaran darah sisa bercak, ibu rutin mengganti pembalut dan menjaga kebersihan lukanya.

Kunjungan kesembilan dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak senang dan bahagia, ibu sudah bisa memasak, mencuci, menyapu, dan melakukan aktivitas ringan lainnya.

Pengeluaran darah ibu sisa bercak, dan ibu memutuskan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi manapun.

Kunjungan kesepuluh dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia, puting susu ibu sedikit nyeri saat menyusui bayinya, ibu mengatakan pengeluaran darah sisa sedikit bercak.

Kunjungan kesebelas dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak senang dan bahagia, ibu sudah tidak merasakan nyeri pada puting susunya saat menyusui bayinya, sudah tidak ada pengeluaran darah hanya lendir dan sedikit bercak.

Kunjungan kedua belas dirumah klien pada tanggal 17 November 2021 yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis dan ibu tampak senang, ibu tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi dan telah membicarakannya dengan suami, ibu melakukan pekerjaan rumah tangga dan masih menghindari pekerjaan yang berat, ibu menyusui bayinya sesering mungkin atau saat bayi rewel dan tidak memberikan bantuan susuformula, sudah tidak ada pengeluaran darah atau bercak pada daerah kewanitaannya, dan ibu tidak ada keluhan. Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 81 x/menit, S:36.6°C, P: 22 x/menit, tinggi fundus uteri ibu sudah tidak teraba, sudah tidak ada pengeluaran lochia, luka sudah kering dan tidak ada infeksi.

Berdasarkan uraian diatas ada persamaan gejala dan keluhan anantara teori dan kasus sehingga penulis tidak menemukan hambatan karena pada saat pengumpulan data yang dilakukan pasien, dokter, perawat, dan bidan yang ada di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar bersedia memberikan data atau informasi yang ada hubungannya dengan perawatan yang diberikan kepada klien sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

Berdasarkan hasil uraian yang dijelaskan pada konsep dasar yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

## **Langkah II. Interpretasi Data Dasar/ Masalah Aktual**

Berdasarkan dalam konsep dan teori dalam menegakkan suatu diagnosa/ masalah kebidanan harus berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan yang di dukung dan di tunjang oleh beberapa data subjektif dan data objektif.

Diagnosa aktual yang di identifikasi pada Ny. "H" PIIAIV post sectio caesarea 2 jam post partum dengan nyeri luka jahitan.

Berdasarkan data yang diperoleh masalah aktual adalah ibu dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea dimana penegakan diagnosa didapat dari data subjektif yaitu ibu yaitu ibu merasa nyeri pada luka bekas operasinya, nyeri semakin dirasakan ibu saat ibu bergerak, dan ibu belum terlalu bisa menggerakkan tungkai bagian bawahnya. Juga di dukung dari data objektif yaitu ekspresi wajah ibu tampak meringis, luka bekas operasi tertutup kasa steril pada abdomen, dilihat dari visual analogue tingkat nyeri yang dirasakan ibu berada pada angka 3 yaitu nyeri sedang.

Pada kasus Ny."H" data yang di dapatkan salah satu faktor penyebab nyeri yaitu adanya rangsangan pada ujung-ujung saraf di permukaan kulit. Adanya kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Intensitas dan penentuan tingkat nyeri sangat penting dikarenakan menyangkut jenis pengobatan yang sesuai dan sebainya diberikan terutama pada terapi farmakologis.

Defenisi nyeri menurut *International Asociation For The Study Of Pain* (IASP) merupakan suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara potensial dan aktual. Konsep lama menyatakan bahwa proses nyeri hanya bergantung pada jalur nyeri saja dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang di dapatkan. Intensitas dan penentuan tipe nyeri sangat penting dikarenakan menyangkut jenis pengobatan yang sesuai yang sebaiknya diberikan terutama pada terapi farmakologis. Namun ada beberapa alat ukur yang sudah umum dipakai untuk mengukur intensitas nyeri adalah *visual analogue scale* (VAS) atau *Numeric Pain Slace* (NPS). Pada tindakan post sectio caesarea meninggalkan sayatan pada kulit abdomen dan mengakibatkan terputusnya jaringan yang di insisi. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya zat kimia yang berupa histamine, bradikinin, kalium dan sustansi P. Zat kimia ini yang dibawa serabut saraf delta A dan C yang berperan membawa transmisi nyeri dari medula spinalis menuju thalamus, kemudian transmisi nyeri tersebut dilanjutkan menuju korteks serebal dan otak akan mempersepsikan nyeri yang mengakibatkan pasien merasakan nyeri pada daerah insisi saat efek anestesi hilang. (Nurjannah,dkk,2020).



Syok juga sering terjadi pada pasien post section caesarea. Peristiwa ini terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat sel-sel jaringan tidak mendapat zat-zat makanan dan O<sub>2</sub> dengan akibat terjadi kematiannya. Penyebab-penyebab syok adalah: hemoragi merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan bila terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik, atau kombinasi antara berbagai sebab tersebut. Gejala-gejalanya ialah nadi dan pernafasan meningkat, tensi menurun, oliguri, penderita gelisah, eksteremitas dan muka dingin, serta warna kulit keabu-abuan. Dalam hal ini sangat penting untuk membuat diagnosis sedini mungkin yang dikenal dengan sistem peringatan dini (early warning system), karena jika terlambat, perubahannya sudah tidak dapat dipengaruhi lagi. (Nurjannah,dkk,2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yaitu ibu mengalami nyeri pada luka jahitan post sectio caesarea. Yang menjadi penentu diagnosa ibu mengalami nyeri yaitu ekspresi wajah ibu yang tampak meringis dan adanya luka bekas operasi pada bagian abdomen yang menandakan adanya jaringan yang terputus. Dengan hal tersebut secara garis besar tampak adanya perasamaan antara teori dan tidak ada kesenjangan dengan diagnosis aktual yang ditegakkan sehingga memudahkan pemberian tindakan selanjutnya.

### **Langkah III. Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial**

Dalam merumuskan masalah potensial bidan akan melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya. Pada langkah ketiga ini penulis mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis yang telah diidentifikasi.

Pada langkah ini kita akan mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnose/ masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dapat dilakukan pencegahan. Pada langkah ini 8 bidan dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah potensial tidak hanya merumuskan masalah potensial yang dapat terjadi tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi penanganan agar masalah atau diagnosa potensial tidak terjadi. (Tajmiati, dkk, 2016).

Masalah potensial yang bisa timbul pada kasus ibu nifas dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea adalah infeksi. Pencegahan infeksi, atau aseptik adalah istilah umum yang banyak digunakan dalam perawatankesehatan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan segala upaya yang dilakukan tenaga medis untuk mencegah masuknya mikro organisme kedalam tubuh dan menyebabkan infeksi. Teknik aseptik adalah sebuah prosedur yang lebih aman untuk pencegahan infeksi bagi ibu, bayi baru lahir, dan tenaga medis serta berpengaruh dalam mengurangi jumlah atau pembuangan semua mikro organisme yang ada pada kulit, jaringan, dan instrumen kedingkat yang aman. Adapun praktik pencegahan infeksi yang dapat mencegah atau mengurangi mikro organisme berpindah dari satu individu ke individu lain yaitu mencuci

tangan, memakai sarung tangan dan alat pelindung diri lainnya, menggunakan teknik asesis dan asptik, memproses alat bekas pakai, menangani alat-alat kesehatan yang tajam, menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan termasuk pengelolaan sampah medis secara benar. (Nadyah, 2014).

Syok juga sering terjadi pada pasien post section caesarea. Peristiwa ini terjadi karena insufisiensi akut dari sistem sirkulasi dengan akibat sel-sel jaringan tidak mendapat zat-zat makanan dan O<sub>2</sub> dengan akibat terjadinya kematiannya. Penyebab-penyebab syok adalah: hemoragi merupakan penyebab terbanyak dan harus selalu dipikirkan bila terjadi pada 24 jam pertama pascabedah, sepsis, neurogenik dan kardiogenik, atau kombinasi antara berbagai sebab tersebut. Gejala-gejalanya ialah nadi dan pernafasan meningkat, tensi menurun, oliguri, penderita gelisah, eksteremitas dan muka dingin, serta warna kulit keabu-abuan. Dalam hal ini sangat penting untuk membuat diagnosis sedini mungkin yang dikenal dengan sistem peringatan dini (early warning system), karena jika terlambat, perubahannya sudah tidak dapat dipengaruhi lagi. (Nurjannah,dkk,2020).

Jika nyeri luka jahitan post sectio caesarea tidak ditangani dengan baik maka akan mengarah pada kasus potensial yang bisa timbul yaitu infeksi, dan syok pada ibu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian Ny. "H" tidak ditemukan kesenjangan masalah potensial antara teori dengan yang ditemukan pada kasus Ny. "H".

#### **Langkah IV. Tindakan Segera / Kolaborasi**

Adanya tindakan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi obat-obatan.

Pada langkah ini bidan akan mengidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn atau dokter umum atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien atau pasien. Bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/ kebutuhan klien yang dihadapi pasien. Setelah bidan merumuskan tindakan untuk mengantisipasi diagnosa atau masalah potensial pada langkah sebelumnya, bidan juga merumuskan tindakan segera atau emergency untuk segera ditangani serta menentukan tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau bersifat rujukan. (Tajmiati, dkk, 2016).

Tindakan yang diberikan pada Ny. "H" yaitu dengan pemberian obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Pada langkah ini tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan praktek dalam menetapkan tindakan segera yaitu kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn.

#### **Langkah V. Rencana Tindakan**

Perencanaan disusun berdasarkan diagnosa kebidanan, melaksanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan pada langkah sebelumnya. Keputusan yang diambil dikembangkan dalam asuhan yang menyeluruh harus rasional dan tepat berdasarkan teori dan pengetahuan yang up to date dan setiap asuhan yang akan

diberikan tidak lepas dari persetujuan pasien, bidan/ dokter.

Penatalaksanaan awal yang dilakukan yaitu menilai tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu kemudian menyusun rencana tindakan untuk mengantisipasi atau mengurangi kadar nyeri yang dirasakan. Menyarankan ibu untuk mobilisasi dengan mulai menggerakkan tungkai bagian bawahnya, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, serat tinggi, dan bergizi, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter.

Pada kunjungan pertama yang diberikan kepada Ny. "H" di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar yaitu dengan mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan tindakan, mengucapkan selamat kepada ibu atas kelahiran bayinya, observasi tanda-tanda vital, observasi tinggi fundus uteri ibu, kontraksi, dan pengeluaran lochia ibu, menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri, bombing ibu untuk melakukan mobilisasi dini, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin, serat tinggi, dan bergizi, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, mengobservasi pemberian cairan infus dextrose yang dicampur dengan oxytosin 2 ampul, mengobservasi pengeluaran urine pada urine bag, dan memberikan konseling kepada ibu tentang pentingnya menjaga personal hygiene dan kebersihan dirinya.

Nyeri akut pasca operasi masi menjadi permasalahan dalam pelayanan kesehatan di seluruh dunia.hampir 50% pasien pasca operasi mengalami nyeri yang berujung terhadap peningkatan kejadiannyeri kronik dan penurunan kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan. Nyeri yang berdasar atas

*international association for the study of pain* (IASP) adalah sensori tidak nyaman dan pengalaman emosional yang sangat berhubungan dengan potensial kerusakan jaringan atau terdapat kerusakan jaringan yang nyata. Nyeri umumnya dapat hilang dengansendirinya namun jika respon nyeri tersebut tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan perubahan menjadi nyeri kronik. Nyeri harus dinilai dengan benar agar dapat di tangani secara efektif. Standar umum yang digunakan adalah penilaian pasien itu sendiri yang dilakukan secara rutin setelah operasi menggunakan sistem skoring 0-10, dinilai dengan 0 tidak nyeri, dan 10 merupakan nyeri yang paling berat. Kunci utama keberhasilan control nyeri adalah evaluasi ulang skala nyeri pasien secara berkala untuk meminimalkan kemungkinan terapi nyeri yang tidak diketahui. (Prabandari, dkk, 2018)

Pemantauan lanjutan harus dilakukan terhadap Ny. "H" untuk memastikan konseling dan terapi yang diberikan benar dilaksanakan sesuai dengan anjuran bidan/ dokter.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengobservasi tinggi fundus uteri, mengobservasi pengeluaran lochia, menjelaskan penyebab timbulnya nyeri.

Pada kunjungan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar rencana asuhan pemeriksaan fisik terfokus, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu, mengobservasi tinggi fundus uteri, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya secara ondemmen, menjelaskan pentingnya personal hygiene, mengingatkan ibu

untuk mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter, dan istirahat yang cukup.

Pada kunjungan keempat di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, mengobservasi tinggi fundus uteri ibu, mengobservasi lochia rubra, mengobservasi kontraksi, mengingatkan ibu untuk rutin mengkonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter, menganjurkan pada ibu untuk istirahat yang cukup, menganjurkan ibu untuk memperhatikan pola makan dan mengkonsumsi makanan bergizi seperti sayuran dan vitamin.

Pada kunjungan kelima di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, mengobservasi tinggi fundus uteri ibu, mengobservasi lochia, mengobservasi kontraksi uterus, menganjurkan ibu untuk memperhatikan pola makan, menjelaskan pentingnya personal hygiene, mengingatkan ibu untuk mengkonsumsi obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup.

Pada kunjungan keenam di rumah klien dilakukan rencana tindakan yaitu pemeriksaan tanda-tanda vital, mengobservasi tinggi fundus uteri, mengobservasi kontraksi uterus, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, mengingatkan kembali ibu untuk menjaga kebersihan dirinya, mengingatkan pada ibu untuk mengganti perban agar tidak terjadi infeksi.

Kunjungan ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas dilakukan secara online pada ibu dengan rencana tindakan asuhan pemberian edukasi dan konseling kepada ibu serta mengingatkan kembali ibu untuk menjaga kebersihan dirinya, pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, menyarankan pada ibu untuk memperhatikan cara menyusui bayinya dan menjelaskan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar.

Kunjungan kedua belas dirumah klien dilakukan rencana tindakan asuhan kebidanan yaitu pemeriksaat terfokus, pemeriksaan tanda-tanda vital, mengobservasi tinggi fundus uteri, memberikan dukungan dan support kepada ibu, pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi,serta pentingnya menjaga kebersihan diri dan bayinya serta menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi.

Berdasarkan uraian dan rencana tindakan yang disusun berdasarkan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan Ny. "H" dengan kasus nyeri luka jahitan post sectio caesarea. Dilakukan kunjungan dan evaluasi setelah diberikan terapi obat-obatan, konseling makanan yang bergizi, memberikan dukungan dan support, mengingatkan untuk istirahat yang cukup, mengingatkan pada ibu untuk menjaga kebersihan dirinya,menjelaskan pada ibu cara menyusui yang baik dan benar, dan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi. Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/ masalah aktual dan potensial. Berdasarkan uraian tidak ada kesenjangan antara teori dengan tinjauan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus dilahan praktek.



## Langkah VI. Implementasi

Pada langkah ini pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan pada ibu nifas post sectio caesarea dilakukan sesuai asuhan menyeluruh.

Berdasarkan anamnesa yang dilakukan pada Ny. "H" di dapatkan hasil pada pemeriksaan yang dilakukan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar didapatkan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/70 mmHg, N: 78 x/menit, S: 36°C, P: 18 x/menit dengan ekspresi wajah ibu yang tampak meringis, tidak ada oedema dan cloasma gravidarum, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada pembesaran kelenjar limfe, thyroid, dan vena jugularis, puting susu menonjol, tampak hyperpigmentasi aroella mammae, air susu belum keluar, terdapat pengeluaran lochia dan tidak berbau, tidak ada hemoroid, terdapat infus dextrose, pemeriksaan laboratorium 2 jam post sectio caesarea di dapatkan HB= 10 gr%.

Pada kunjungan kedua di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, ibu merasa luka bekas operasinya masih nyeri saat bergerak, ibu masih merasakan sedikit pusing saat membuka mata, ASI ibu belum ada, ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochea rubra tidak berbau, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pemeriksaan tanda-tanda vital dengan TD: 110/70 mmHg, N:78 x/menit, S: 36.5 °C, P: 20 x/menit.

Pada pemeriksaan ketiga di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan ibu baik, keasadaran composmentis dan ekspresi wajah ibu tampak senang, ibu

masih merasakan sedikit nyeri pada luka bekas operasi terutama pada saat ibu bergerak, ibu sudah tidak merasakan pusing, ibu sudah mulai bisa merawat bayinya dibantu oleh suami, ibu sudah mulai berjalan sendiri, ASI ibu belum ada, terpasang obat durosic patch pada bagian dada ibu, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tampak pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pemeriksaan tanda- tanda vital yaitu TD: 110/70 mmHg, N: 80 x/menit, S: 36.6°C, P: 21 x/menit.

Pemeriksaan keempat di RSIA Sitti Khadijah 1 keadaan umum ibu baik, keasdran composmentis dan ekspresi wajah ibu tampak senang, ibu masi merasakan sedikit nyeri pada luka jahitan bekas operasinya, infus ibu sudah dibuka 24 jam post section caesarea, ASI ibu belum ada, ibu sudah BAB, ibu sudah mandi dan membersihkan dirinya, ibu sudah bisa merawat bayinya dibantu oleh suami dan keluarga, ibu telah diberikan terapi obat dulcolax dan roviden melalui anus, pada dada ibu masih terpasang obat deurogesic patch, pemeriksaan tana-tanda vital ibu yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 82 x/menit, S: 36.6°C, P: 19 x/menit, tinggi fundus uteri ibu 3 jari dibawah pusat, kontraksi baik teraba keras dan bundar, dan pengeluaran lochia rubra.

Pada kunjungan kelima di RSIA Sitti Khadijah 1 hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik, keasadaran composmentis dan ibu tampak senang, ibu sudah tidak merasakan nyeri kecuali saat melakukan aktivitas berat, ibu sudah mampu melakukan aktivitas ringan dan mengurus bayinya, ASI ibu belum ada, pada bagian dada ibu masih terpasang obat durosic patch, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 78 x/menit, S: 36,5 °C, P: 20

x/menit, tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, pengeluaran lochia rubra, tidak ada tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi dan luka masih tertutup kasa.

Pada kunjungan keenam di rumah klien keadaan umum ibu baik, keasadaran composmentis, ibu sudah tidak merasakan nyeri ketika batuk dan bersin, ibu telah kontrol ulang ke klinik dan mengganti perban pada tanggal 10 Oktober 2021, luka bekas operasi dan luka bekas jahitan sudah mulai kering, ibu sudah bergerak dan berjalan sendiri serta sudah dapat melakukan aktivitas ringan lainnya, ibu masih sangat hati-hati saat bergerak dan berjalan karena takut jahitannya terlepas, ibu menggunakan mikrolax karena susah BAB selama 3 hari, ASI ibu sudah keluar sejak empat hari post sectio caesarea, ibu sudah tidak mengkonsumsi obat-obatan, ibu akan kembali mengganti perbannya pada tanggal 15 Oktober 2021, pemeriksaan tanda-tanda vital ibu yaitu TD: 110/70 mmHg, N: 78 x/menit, S: 36.6°C, P: 21 x/menit, tinggi fundus uteri ibu yaitu pertengahan antara pusat dan symphysis, pengeluaran lochia serosa berwarna kuning kecoklatan, dan tidak ada tanda-tanda infeksi.

Pada kunjungan ketujuh dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak cerah dan bahagia, ibu telah melakukan kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya, ibu sudah melepas perbannya dan sudah tidak menggunakan perban lagi, luka bekas operasi ibu sudah membaik dan lukabekas operasi sudah kering, ibu sudah dapat melakukan aktivitas ringan, BAB ibu sudah lancar dan tidak ada masalah,

pengeluaran darah berwarna coklat kekuningan dan bercampur lendir.

Pada kunjungan kedelapan dilakukan kunjungan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia, ibu telah kontrol ulang ke klinik untuk memeriksakan luka bekas operasinya dan keadaan lukanya sudah mengering, BAB dan BAK ibu tidak ada masalah, ibu rutin menyusui bayinya dan berusaha untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, ibu mengatakan pengeluaran darah sisa bercak, ibu rutin mengganti pembalut dan menjaga kebersihan lukanya.

Kunjungan kesembilan dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak senang dan bahagia, ibu sudah bisa memasak, mencuci, menyapu, dan melakukan aktivitas ringan lainnya. Pengeluaran darah ibu sisa bercak, dan ibu memutuskan untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi manapun.

Kunjungan kesepuluh dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan umum ibu baik, ekspresi wajah ibu terlihat senang dan bahagia, puting susu ibu sedikit nyeri saat menyusui bayinya, ibu mengatakan pengeluaran darah sisa sedikit bercak.

Kunjungan kesebelas dilakukan secara online dengan melakukan pemantauan kepada ibu tentang perubahan apa saja yang dirasakan. Keadaan

umum ibu baik, ekspresi wajah ibu tampak senang dan bahagia, ibu sudah tidak merasakan nyeri pada puting susunya saat menyusui bayinya, sudah tidak ada pengeluaran darah hanya lendir dan sedikit bercak.

Kunjungan kedua belas dirumah klien pada tanggal 17 November 2021 yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis dan ibu tampak senang, ibu tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi dan telah membicarakannya dengan suami, ibu melakukan pekerjaan rumah tangga dan masih menghindari pekerjaan yang berat, ibu menyusui bayinya sesering mungkin atau saat bayi rewel dan tidak memberikan bantuan susuformula, sudah tidak ada pengeluaran darah atau bercak pada daerah kewanitaan, dan ibu tidak ada keluhan. Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu TD: 110/80 mmHg, N: 81 x/menit, S:36.6°C, P: 22 x/menit, tinggi fundus uteri ibu sudah tidak teraba, sudah tidak ada pengeluaran lochia, luka sudah kering dan tidak ada infeksi.

Pada kasus Ny. "H" dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea, pada kasus ini diagnosa ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan, anamnesa, dan observasi. Perencanaan asuhan dan penatalaksanaan seluruhnya dilaksanakan dengan baik, dan sedikit hambatan karena 5 kunjungan tidak dilakukan secara langsung melainkan secara online dan tidak dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Namun kerja sama dan penerimaan, dan keterbukaan pasien terhadap setiap pertanyaan yang diberikan memudahkan bagi penulis serta sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan asuhan di RSIA Sitti Khadijah 1 memberikan akses yang baik dan ilmu yang lebih dan sangat bermanfaat dalam menangani klien serta dalam pelaksanaan tindakan

asuhan kebidanan penulis tidak mendapat hambatan yang besar karena seluruh tindakan yang dilakukan sesuai atau berorientasi pada kebutuhan pasien.

### **Langkah VII. Evaluasi**

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah sudah benar, apakah terpenuhi sesuai dengan yang telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang efektif dalam pelaksanaannya.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi ke efektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam diagnose dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang efektif dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah proses penatalaksanaan umumnya merupakan hasil dari pengkajian yang memperjelas proses pemikiran yang mempengaruhi tindakan serta ber-orientasi pada proses klinis karena proses penatalaksanaan tersebut berlangsung di klinik dan keberhasilan penatalaksanaan tergantung pada klien dan situasi klinik. (Tajmiati, dkk, 2016).

Setelah melakukan asuhan, hasil evaluasi yang di dapatkan yaitu pada pelaksanaan evaluasi 6 Oktober – 17 November 2021 pada Ny. “H” dimana masa nifas berlangsung normal, keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal, tingkat nyeri yang dirasakan ibu dapat diatasi setelah diberikan asuhan pemberian terapi obat-

obatan, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, serta melakukan mobilisasi dini, dan makan makanan yang bergizi, tidak mengerjakan aktivitas berat, dan menjaga kebersihan dirinya dan bayinya. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny. "H" berhasil dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu yaitu rasa nyeri berkurang bahkan teratasi. Keluhan-keluhan ibu teratasi dan masa nifas berlangsung normal.

Kasus Ny. "H" dari hasil evaluasi terfokus kepada penurunan tingkat nyeri yang dirasakan oleh ibu dengan cara memberikan terapi obat-obatan, menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini dan istirahat yang cukup dan kadar nyeri yang dirasakan ibu berkurang bahkan teratasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan asuhan kebidanan yang telah dilakukan dan pembahasan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny “H”, dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 menggunakan metode 7 langkah varney yang dimulai dari pengumpulan data awal sampai dengan evaluasi dan penulis dapat memperoleh kesimpulan.

1. Pengkajian telah dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data melalui teknik wawancara dan pemeriksaan fisik maupun penunjang. Data yang diperoleh dari data subjektif terkhusus pada keluhan utama ibu yaitu ibu merasa pusing saat membuka mata, merasakan nyeri pada luka bekas sectio caesarea, ibu tidak sulit BAB, dan ibu merasa cemas dengan keadaannya. Data objektif yang diperoleh yaitu keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, dan nyeri luka luka yang dirasakan ibu pada saat pemeriksaan terakhir ibu sudah tidak merasakan nyeri dan luka bekas operasi sudah sembuh.
2. Perumusan diagnosa/ masalah aktual telah dilakukan pada Ny. “H” di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021 dengan cara mengumpulkan data dari data subjektif, dan objektif sehingga diperoleh diagnosa kebidanan pada Ny. “H” dengan nyeri luka jahitan post sectio caesarea.
3. Perumusan diagnosa/ masalah potensial telah dilakukan pada Ny. “H”



dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021 yaitu antisipasi terjadinya infeksi pada luka bekas sectio caesarea.

4. Untuk tindakan segera atau kolaborasi telah diidentifikasi pada Ny. "H" dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021 yaitu dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis Obgyn dalam pemberian obat-obatan pereda rasa nyeri.
5. Rencana tindakan asuhan kebidanan telah ditetapkan pada Ny "H" dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021 dengan hasil yang direncanakan berdasarkan dengan diagnosa/ masalah aktual dan potensial yang dapat terjadi.
6. Tindakan asuhan yang telah direncanakan telah dilaksanakan pada Ny. "H" dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah tahun 2021 dengan hasil semua tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
7. Mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada Ny. "H" dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 tahun 2021 dengan asuhan yang telah diberikan berhasil dengan kurangnya tingkat nyeri dan kecemasan pada ibu.

## **B. SARAN**

### 1. Untuk bidan

Untuk bidan disarankan dapat lebih berperan dalam menurunkan angka kejadian sectio caesarea dengan memberikan konsling ANC untuk mempersiapkan persalinan dan kemungkinan komplikasi. Menciptakan komunikasi yang baik antara petugas professional yang lain seperti dokter, perawat, dan sesama bidan agar proses berjalan dengan mudah.

### 2. Saran untuk rumah sakit

Pelayanan di RSIA Sitti Khadijah 1 Makassar sudah sangat bagus dan memuaskan namun disarankan untuk meningkatkan pelayanan pada bagian pemantauan pasien post sectio caesarea agar jika pasien mengalami kelainan post sectio caesarea dapat segera diatasi.

### 3. Untuk institusi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi mahasiswa lain dan di harapkan pula kepada institusi untuk menambah referensi terkait nyeri luka post sectio caesarea agar lebih mudah dalam mempelajari dan memahami tentang sectio caesarea.

### 4. Untuk pasien

Klien/ pasien diharapkan dapat meningkatkan khususnya tentang mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat, menjaga kebersihan dirinya agar ibu terhindar dari infeksi dan lukanya cepat sembuh dan kering.

## Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan terjemahnya. Kementrian Agama RI. 2018
- Eriyani, Theresia, dkk. “ Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea” . Jurnal Buletin Media Informasi Kesehatan 14, no.2 (2018).
- Ferinawati, Hartati, “Hubungan Mobilisasi Dini Post Sectio Caesarea dengan Penyembuhan Luka Operasi di RSUD Avicenna Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen” . Journal of Healthcare Technology and Medicine 5, no.2 (2019).
- Fitrihadi, Enny, Utami. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Nifas Beserta Daftar Tilik*. Yogyakarta : Unisa, 2018.
- Kemenkes RI. Sekretariat Jendral. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2016, Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. 2017.
- Nadyah. *Kegawat daruratan Neonatal, Anak, dan Maternal*.Cat. Pertama : Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Nadyah. *Pengelolaan Limbah Medis Dan Pencegahan Infeksi Dalam Praktek Kebidanan*. Cat. Pertama : Makassar : Alauddin University Press, 2014.
- Nurjannah, Nunung Siti, dkk. *Asuhan Kebidanan Post Partum Dilengkapi Dengan Asuhan Kebidanan Post sectio Caesarea*. Bandung : PT Refika Aditama, 2020.

- Prabandari, Dita Aryanti, dkk. “Efektivitas Analgetik 24 jam Pasca Operasi Elektif di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung Tahun 2017” *Jurnal Anestesi Perioperatif* 6. No.2 (2018).
- Prawihardjo, Sarwono . *Ilmu Kebidanan*. Cet. Kelima : Jakarta : PT Bina Pustaka, 2018.
- Profil Kesehatan RSIA Sitti Khadijah 1. Angka Kejadian Pertus Sectio Caesarea. 2021.
- Rahmadhani Raully. *Problematika Kesehatan Wanita*. Cet. Pertama : Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Rahmawati, Primasuri, dkk. “Pengaruh Progressive Muscle Relaxation Terhadap Kecemasan Ibu Pre Operasi Sectio Caesarea Di Ruang Bersalin” *NurseLine Journal* 2. No.2 (2017).
- Sa’adah, Nailatus, Ashif az Zafi. “ Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam”. *Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no.1 (2020).
- Setiawati , Dewi. *Fisio-Patologi Kehamilan, Persalinan Dan Kasih Sayang Universal, Bagaimana proses Setetes Sperma Menjadi Makhluk Hidup Baru..* Cet. Pertama : Gowa ; Alauddin University Press, 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al Qur’an vol. 13*. Jakarta: Lantera Hati, 2002.
- Sukma , Febi, dkk. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakarta : Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2017.

Tajmiati, Atik, dkk. *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan : Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan*. Jakarta : Pusdik SDM Kesehatan, 2016.

Utami, Sri. “Efektivitas Aroma Terapi Bitter Orange Terhadap Nyeri Post Partum Sectio Caesarea”. *Jurnal Of Public Health* 5, no.4 (2016).

Wahyuningsih, Heni Puji. *Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. Cet. Pertama; Jakarta selatan : Pusdik SDM Kesehatan 2018.

Zulhaedah, Marlia. “ Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Post Sectio Caesarea Terhadap Perawatan Luka Ibu Post Sectio Caesarea di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2016 “. *Jurnal Ilmiah Media Bidan* 2, no.2 (2017).



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)  
"SITTI KHADIJAH 1"  
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**  
Jl. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119  
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 968 /DiklatRS/IV.6.AU/F/14 42 /20 21

Makassar, 5 - 11 Agustus 14 H

Lamp :

20 M

Hal : **Pengambilan Data** Penelitian  
Kepada Yth,  
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang  
Rokam. Medis  
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : .. Aminun Nadia ..  
No. Telp : .. 085145230647 ..  
N I M : .. 70490118034 ..  
Program Studi : .. D III Kebidanan ..  
Institusi : .. UIN ALAUDDIN MAKASSAR ..  
Judul Penelitian : .. Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Post ~~Secio~~  
Partum Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1 ..  
Tanggal Penelitian : .. 5 Agustus 2021 .. 11 Agustus 2021 ..

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.  
Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat,  
  


Tembusan :  
1. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21635/S.01/PTSP/2021  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Direktur RSIA Sitti Khadijah I Makassar

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3529/FKIK/PP.00.9/09/2021 tanggal 24 September 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : AINUN NADIA  
 Nomor Pokok : 70400118034  
 Program Studi : Kebidanan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(D3)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU NIFAS POST SECTIO CAESAREA DI RSIA SITTI KHADIJAH 1 TAHUN 2021 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 September s/d 15 November 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 29 September 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19620624 199303 1 003

Temusan Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. Penerima

SIMPAS PTSP 29-09-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936





**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)  
"SITTI KHADIJAH 1"  
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**  
JL. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119  
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1334/DiklatRS//TV.6.AU/A/1413/2021

Makassar, 14 H  
14 Oktober 2021M

Lamp :

Hal : Pengambilan Data Penelitian

Kepada Yth,  
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang  
Ruang Rawat, Nipus

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : Awwan Nade .....  
No. Telp : 082347240189 .....  
N I M : 70400118034 .....  
Program Studi : D III Kebidanan .....  
Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR .....  
Judul Penelitian : Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Nyas dengan Nyeri Luka Jahitan Part. Sectio Caesarea .....  
Tanggal Penelitian : 5 Oktober 2021 s/d 5 November 2021

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diklat  
  
(Zaenal Paharuddin, SKM., M.Kes)  
NRP. 861201064

Tembusan :

1. Arsip.



PERSETUJUAN PENELITIAN

*Inform Consent*

Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Judul penelitian: "Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas

Dengan Nyeri Luka Jahitan Post Sectio Caesarea di RSIA Sitti Khadijah 1".

Penelitian : Ainun Nadia

Nim : 70400118034

Saya percaya yang saya informasikan akan dijaga kerahasiaannya.

Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia berperan serta dan penelitian.

Makassar,

Peneliti



Ainun Nadia

70400118034

Responden



Harunul Wansa . S.pd

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Peneliti

Nama : Ainun Nadia  
Nim : 70400118034  
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 1 Februari 2001  
Suku : Bugis  
Agama : Islam  
Alamat : Kolasa, Desa Kampala, Kec. Sinjai Timur, Kab.  
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan  
Nama Orang tua  
a. Ayah : Syuaib Antong  
b. Ibu : Mia Abdullah

### B. Riwayat Pendidikan

SDN 194 Kolasa : 2006-2012  
SMPN 1 Sinjai Timur : 2012-2015  
SMAN 1 Sinjai Timur : 2015-2018  
UIN Alauddin Makassar : 2018-2022