

**Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan
Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah
Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tugas Akhir Ners

Oleh:

A.M.ABD WAHAB BR., S.Kep

NIM : 70900120044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

**Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan
Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah
Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa**



Tugas Akhir Ners

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

A.M.ABD WAHAB BR., S.Kep

NIM : 70900120044

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : A.M.ABD WAHAB.BR, S.Kep
Nim : 70900120044
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 18 November 1998
Prodi : Profesi Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Alauddin II Mamoa Va No.10

Judul Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum



Makassar, 25 Januari 2022

Penyusun

A.M.ABD WAHAB.BR.S.Kep
NIM: 70900120044

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa" yang disusun oleh A.M.ABD WAHAB.BR, NIM: 70900120044, Mahasiswa Jurusan Profesi Ners pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 28 Januari 2022
28 Muharram 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Patimah, S.Kep.,Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Mutaharah, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr.H.Muhammad Irham S.Th.I., M.Th.I	(.....)
Pembimbing I	: Nurhidayah, S.Kep, Ns., M.Kep	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Arbianingsih, S.Kep,Ns,M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah swt. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Salawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa”, ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dr. dr.Syatirah,Sp.,A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Dr. Patima,S.Kep.,Ns., M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Nurhidayah,S,Kep.,Ns., M.Kep selaku pembimbing 1 dan ibu
5. Dr.Arbianingsih,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk penyusunan tugas akhir ini
6. Muthaharah, S.Kep, Ns., M.Kep Selaku Penguji 1 dan bapak
7. Dr. H. Muhammad Irham S.Th.I.,M.Th.I Selaku penguji II
8. Seluruh Ibu dan Bapak Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
9. Kepada kedua Orang Tua tercinta yang menjadi sumber inspirasi terbesar dan semangat hidup menggapai cita. Ayahanda Burhanuddin & Ibunda Nur Baya atas kasih sayang, arahan, serta nasehatnya yang tak henti-hentinya dalam

menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi hingga sampai dititik ini.

10. Rekan Mahasiswa(i) Program Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Oleh karena itu, besar harapan penulis atas kontribusinya baik berupa saran dan kritikan yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang. Akhirnya kepada Allah swt jualah penulis memohon do'a dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian masyarakat.



Gowa, 25 Januari 2022

A.M.ABD WAHAB.BR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSRTAK

Nama : A.M.ABD. WAHAB.BR
NIM : 70900120044
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa

Latar Belakang : Preeklamsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang terjadi karena tekanan darah terlalu tinggi semasa mengandung bayi. Data kasus rujukan di Puskesmas Gowa periode Januari – Februari paling banyak adalah kejadian preeklamsia. Nyeri berdasarkan *International Association for the Study of Pain (IASP)* adalah sensori tidak nyaman dan pengalaman emosional yang sangat berhubungan dengan potensial kerusakan jaringan atau terdapat kerusakan jaringan yang nyata. Tindakan nonfarmakologis yang dapat diberikan pada pasien yang mengalami nyeri akut salah satunya adalah dengan melakukan Terapi Murottal Surah Maryam. **Tujuan:** Melaksanakan Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa”. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan pemeriksaan fisik. **Hasil** Analisis menunjukkan yaitu terdapat diagnosis Nyeri akut salah satu intervensi yang dapat diberikan pada ibu preeklamsia dengan nyeri akut adalah pemberian Terapi Surah Maryam selama tiga hari didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat nyeri secepat perlahan. Hari pertama klien mengatakan nnyerinya berkurang, hari kedua nyeri kembali dan pada hari ketiga nyeri turgent kembali dengan secara perlahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi murottal surah Maryam efektif dalam menurunkan tingkat nyeri yang dengan diagnosis medis Preeklamsia. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil evaluasi pada studi

kasus yang dilakukan dapat memberikan respon berupa ketenangan emosional, dan relaksasi sehingga pasien mampu mengontrol nyeri yang dirasakan.

Kata Kunci : Preemklamsia, Nyeri, Murottal, Surah Maryam



ABSTRACT

Name : A.M.ABD. WAHAB.BR
ID Number : 70900120044
Title : *Analysis of Nursing Care in Preeclampsia Mothers with Acute Pain Using Murottal Surah Therapeutic Interventions Maryam at Bajeng Health Center, Gowa Regency*

Background: Preeclampsia is a complication of pregnancy that occurs because blood pressure is too high during pregnancy. The data on referral cases at the Gowa Public Health Center for the period January - February was the most incidence of preeclampsia. Pain based on the International Association for the Study of Pain (IASP) is an uncomfortable sensory and emotional experience that is closely related to potential tissue damage or there is real tissue damage. Murottal Surah Maryam. **Objective** To carry out an analysis of nursing care for women with preeclampsia with acute pain using Surah Maryam's Murottal Therapy Intervention at the Bajeng Health Center, Gowa Regency". **Method** used is a case study with data collection techniques through observation, interviews and physical examination. **Results** The analysis shows that there is a diagnosis of acute pain. One of the interventions that can be given to preeclampsia mothers with acute pain is the administration of Surah Maryam Therapy for 3 days. The first day the client said the pain was reduced, the second day the pain returned and on the third day the pain came back slowly. So it can be concluded that the provision of murottal Surah Maryam therapy is effective in reducing the level of pain associated with the medical diagnosis of Preeclampsia. **Conclusion** Based on the results of the evaluation in the case studies carried out can provide a response in the form of emotional calm, and relaxation so that patients are able to control the pain they feel.

Keywords: Preeclampsia, Pain, Murottal, Surah Maryam

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK (Indonesia)	vii
ABSTRAK (Inggris)	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Umum,Dan Tujuan Khusus.....	6
D. Manfaat Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>Medis</i>	9
B. Konsep Keperawatan.....	10
D. <i>Evidence Based Practice in Nursing</i> (EBPN).....	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Rancangan Studi Kasus.....	35
B. Subjek Studi Kasus	36
C. Fokus Studi Kasus	37
D. Instrumen Studi Kasus	37
E. Prosedur Pengambilan Data.....	38
F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data.....	38
G. Analisis Data dan Penyajian Data	39
H. Etika Studi Kasus	39
BAB IV LAPORAN KASUS	40
A. Pengkajian	40
B. Diagnosa Keperawatan.....	40
C. Intervensi Keperawatan.....	41
D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan.....	41
BAB V ANALISA KASUS	57
A. Analisis Intervensi.....	58
B. Keterbatasan.....	60

BAB VI PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
Lampiran.....	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Intervensi Konsep Keperawatan

Tabel 2.1 Analisa Data

Tabel 2.2 Intervensi Asuhan Keperawatan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama dua dekade terakhir, angka kematian ibu di Indonesia masih relatif tinggi, berkisar sekitar 300 per 100.000 kelahiran. Pemerintah menargetkan angka tersebut diturunkan menjadi 183 per 100.000 kelahiran pada 202 . Namun, Atashendartini Habsjah, aktivis Persatuan Wanita Indonesia Peduli (GPPI), khawatir angka tersebut tidak akan terpenuhi. Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting derajat kesehatan masyarakat. WHO menjelaskan bahwa dari 99% kematian ibu yang terjadi di negara berkembang, sekitar 830 wanita meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan persalinan di seluruh dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) hingga kurang dari 70 per 100/00 kelahiran. Komplikasi yang dapat menyebabkan 75% dari seluruh kematian ibu adalah perdarahan hebat setelah melahirkan, infeksi, tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre-eklampsia dan eklampsia), dan aborsi yang tidak aman (WHO, 2019).

Preeklampsia adalah salah satu komplikasi kehamilan yang terjadi karena tekanan darah terlalu tinggi semasa mengandung bayi. Sedangkan eklampsia adalah komplikasi lanjut dari preeklampsia berupa gejala kejang, sakit kepala, penurunan produksi air seni, dan beberapa kondisi medis lain. Penyebab kematian langsung pertama ibu di Indonesia didominasi oleh perdarahan pasca persalinan, dan infeksi (GKIA, 2016). Dan penyebab kematian ibu kedua di

dunia khususnya preeklamsia, menurut (Zhang, Ming MD, 2020) menjelaskan bahwa angka preeklamsia di dunia adalah 2,37,6%, rata-rata 5%. WHO memperkirakan bahwa 76.000 kematian ibu setiap tahun, sesuai dengan 16 kematian ibu di seluruh dunia, terutama terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Preeklamsia adalah gangguan kehamilan dan multisistem yang berhubungan dengan hipertensi dan proteinuria atau proteinuria tinggi yang terjadi sekitar minggu ke-20 kehamilan (Rahmaeni, 2020).

Perawatan kehamilan memiliki dampak besar pada kehamilan Anda dan keselamatan bayi Anda yang belum lahir. Wanita yang rutin mengunjungi fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan sehat dan melahirkan bayi yang sehat. Sementara itu, perempuan dengan kesehatan yang buruk lebih rentan terhadap kematian bayi. Melalui pemeriksaan kehamilan, peluang pendidikan dan promosi kesehatan bagi ibu hamil khususnya dapat lebih terwujud. Fungsi dukungan dan komunikasi ANC tidak hanya menurunkan AKI tetapi juga meningkatkan kualitas hidup ibu dan janin (Kemenkes, 2020).

Tingginya angka kematian ibu terkait dengan penyebab langsung yaitu kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh kesehatan ibu saat kehamilan dan persalinan, sedangkan penyebab tidak langsungnya dipengaruhi oleh empat terlalu dan tiga terlambat. Kondisi “4T” atau Tingginya angka kematian ibu antara lain dipicu oleh 4 kondisi kehamilan yang tidak ideal biasa yang disebut empat terlalu masih menjadi suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan secara tuntas, yaitu terlalu tua untuk hamil, terlalu muda untuk hamil, terlalu banyak jumlah anak, dan terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari dua tahun. Dan

dipengaruhi oleh 3T terlambat yaitu terlambat mengenali tanda bahaya persalinan dan mengambil keputusan, terlambat dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan terlambat ditangani oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Selain hal tersebut di atas ibu melahirkan mengalami kematian karena perdarahan, eklamsia, infeksi dan aborsi. Empat faktor ini merupakan 70 persen penyebab yang menimbulkan kematian Ibu. (Sulaiman Endang Sutisna, 2021)

Di Indonesia, prevalensi preeklamsia sekitar 1,8% 18%. Preeklamsia dan eklamsia merupakan penyebab kematian kedua di Indonesia dengan angka 26,9% pada tahun 2012 dan terus meningkat pada tahun 2013 menjadi 27,1% (Diaz, 2019). Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), AKI 2012 meningkat 350/100.000 kelahiran hidup dari 288/100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu di Indonesia adalah perdarahan 39%, preeklamsia/eklamsia 2 %, infeksi 7%, partus lama 5%, lainnya 5 aborsi 33%, (Risnah et al., 2021)

Menurut Wang dan Wang, (2020) menjelaskan faktor penyebab terjadinya preeklamsia yaitu kehamilan atau kehamilan pertama, multigravitasi tinggi atau kehamilan lebih dari 5 kali, patologi obesitas atau biasa disebut obesitas, riwayat hipertensi, dan usia. Salah satu gejalanya adalah sakit kepala atau sakit kepala. Ibu berusia di atas 35 tahun berhubungan dengan angka preeklamsia/eklamsia, sedangkan angka preeklamsia juga berhubungan dengan ibu dengan status sosial ekonomi rendah (Fikar Ahmad et al. 2019). Penelitian (Bilano et al., 201), menunjukkan bahwa pendapatan rendah dan sedang ibu hamil dikaitkan dengan tingkat preeklamsia/eklamsia. Secara umum, ibu dengan pendidikan tinggi dan

pendidikan rendah sama-sama berisiko mengalami preeklamsia (van Middendorp et al., 2013). Faktor lain berdasarkan penelitian (Nur dan Arifuddin, 2017) mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi prevalensi preeklamsia adalah primigravida, antenatal care, dan obesitas. Ibu dengan Primigravida 5,5 kali lebih mungkin untuk mengalami preeklamsia. Ibu yang obesitas memiliki kemungkinan 5,6 kali lebih besar terkena penyakit ini dibandingkan ibu dengan berat badan normal.

Menurut International Association for the Study of Pain (IASP), nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak nyaman yang berkaitan erat dengan potensi kerusakan jaringan atau kerusakan jaringan yang sebenarnya. Nyeri akut sendiri dikaitkan dengan rantai perilaku dan biokimiawi yang diawali dengan kerusakan jaringan (Meissner et al., 2015).

Salah satu tindakan nonfarmakologis yang dapat diterapkan pada pasien sakit kepala atau nyeri akut adalah dengan melakukan terapi Murottal Surat Maryam.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 23:

مَنْسِيًّا نَسِيًّا وَكُنْتُ هَذَا قَبْلَ مِتُّ يَلِيَّتِي لَتْ قَا ۖ النَّخْلَةَ جِدْعٌ إِلَىٰ ضُنَّ الْمَخَا جَاءَهَا قَا

Terjemahan :

"Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."(QS. Maryam 19: Ayat 23)

Tafsir Al-Misbah :

“Rasa sakit hendak melahirkan memaksa Maryam untuk bersandar dan menutup dirinya pada pangkal pohon kurma. Iya membayangkan kemungkinan sikap ingkar keluarganya terhadap kelahiran anaknya kelak. Iyapun berharap cepat meninggal dunia supaya kejadian ini tidak lagi berarti dan cepat dilupakan.(Tafsir QS.Maryam (19):23 Muhammad Quraish Shihab).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti dkk. (2019) Khasiat Terapi Murottal Al-Qur'an untuk Pereda Nyeri atau Khasiat Terapi "Murottal Al-Qur'an" menghasilkan pengukuran skala nyeri setelah dilakukan terapi Murottal Al -Al-Qur'an diketahui dapat menurunkan nyeri dominan menggunakan skala nyeri rangkap tiga, yaitu orang (50,0%). Dapat disimpulkan bahwa terapi Al-Quran memiliki efek analgesik. Terapi murottal Al-Quran merupakan salah satu jenis musik yang memberikan efek positif bagi pendengarnya. Dengan rahmat terapi ini dapat mengurangi hormon stres, mengaktifkan endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks dan mengalihkan perhatian dari rasa takut, cemas dan stres, meningkatkan kimia tubuh, sehingga tubuh mengurangi tekanan darah dan memperlambat pernapasan, detak jantung. , denyut nadi dan aktivitas gelombang otak (Sholeh, 2015).

Konsisten dengan penggunaan hegemoni keperawatan berdasarkan teori tenang, Kolcaba memiliki tiga kategori dengan tujuan masing-masing, yaitu standar kenyamanan yang ditujukan untuk menjaga lingkungan dan pemantauan nyeri, pelatihan untuk membimbing pelanggan sehingga rasa sakit yang mereka

keluhkan dapat dikurangi. , misalnya menggunakan recovery planning, yang memberikan informasi dan pengetahuan mengenai proses penyembuhan dan makanan yang menenangkan jiwa yang bertujuan untuk memberikan diet seimbang dengan makan dan minum pelanggan (Risnah, 2018). Berdasarkan data (Dinas Kesehatan Provinsi Sul Sel, 2017) menunjukkan bahwa preeklamsia merupakan penyebab kematian ibu nomor dua di Sulawesi Selatan, angka kejadian preeklamsia pada ibu hamil pada tahun 2015 sebanyak 68 orang, pada tahun 2016 sebanyak 78 orang dan pada tahun 2017 meningkat. hingga 96 orang. Jumlah kematian di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebanyak 103 orang dengan angka kematian ibu hamil 28 orang (17,6%), persalinan 7 orang (8,3%) dan ibu nifas sebanyak 0 orang (35,1%). Dan penyebab kematian ibu adalah eklampsia 68%, perdarahan 30% infeksi %. Data kasus rujukan di Puskesmas Gowa periode Januari-Februari terutama untuk kejadian preeklamsia, baik preeklamsia (preeklampsia ringan/PER) maupun preeklamsia berat dibandingkan (PEB). Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil berisiko tinggi mengalami preeklamsia di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

Berdasarkan dari data tersebut, maka penulis tertarik memberikan intervensi tentang ‘Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa’

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Umum dan Khusus

1. Tujuan Umum

“Analisis Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa”.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis pengkajian pada Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Pada Ny R Dengan Masalah Nyeri Akut Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- b. Menganalisis diagnosis keperawatan pada Ny R Dengan Masalah Nyeri Akut Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- c. Menganalisis intervensi keperawatan Ny R Dengan Masalah Nyeri Akut Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.
- d. Menganalisis implementasi keperawatan pada Ny R Dengan Masalah Nyeri Akut Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa
- e. Asuhan Keperawatan Pada Ibu Preeklamsia Dengan Nyeri Akut Menggunakan Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien Preeklamsi dengan masalah nyeri menggunakan Terapi Surah Maryam di wilayah kerja Puskesmas bajeng.

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi Terapi Surah Maryam dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien Preeklamsi dengan masalah nyeri menggunakan intervensi surah Maryam pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

1. Defenisi Preeklamsia

Preeklamsia, atau lebih dikenal sebagai hipertensi gestasional (PIH) kehamilan atau toksemia kehamilan, ditandai dengan peningkatan tekanan darah, edema, dan bahkan proteinuria. Biasanya preeklamsia biasanya terjadi pada wanita dengan usia kehamilan 20 minggu atau lebih atau setiap 3 bulan tergantung kehamilan, pada usia kehamilan 37 minggu, preeklamsia biasanya terjadi sampai minggu pertama setelah melahirkan. Preeklamsia memiliki dua tahap, preeklamsia ringan sampai berat, yang terus terjadi pada eklampsia (Lalenoh, 2018).

Terkait masalah dalam kehamilan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam QS. Maryam/ 21:

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّفْضِيًّا

Terjemahnya:

Dia (Jibril) berkata, "Demikianlah." Tuhanmu berfirman, "Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu tanda (kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan."(QS. Maryam 19: Ayat 21). (Kementerian Agama, 2016).

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 23:

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا

Terjemahan :

"Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."(QS. Maryam 19: Ayat 23)

Ibnu Juraij mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al-Mugirah ibnu Utbah ibnu Abdullah As-Saqafi yang mendengar Ibnu Abbas berkata saat ditanya mengenai kandungan Maryam, bahwa begitu Maryam mengandung, langsung melahirkan dalam waktu yang singkat.

2. Etiologi

Preeklamsia adalah penyakit spesifik kehamilan tanpa etiologi yang jelas (Wang, W., & Wang, 2020), dengan beberapa faktor risiko preeklamsia

- a. Kehamilan atau kehamilan pertama, berdasarkan teori imunologi, terjadi preeklamsia pada awal kehamilan. karena pada primigravida pembentukan antibodi mencegah.
- b. Janin besar atau janin lebih dari 5 kali berisiko tinggi mengalami preeklamsia karena organ dalam rahim tidak elastis dan mengalami banyak perubahan terutama pembuluh darah.
- c. Obesitas, umumnya dikenal sebagai obesitas, dikaitkan dengan kehamilan seperti diabetes.
- d. Riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi kronis pada ibu hamil memudahkan eksaserbasi preeklamsia karena pembuluh darah ibu sudah mengalami vasokonstriksi sebelum minggu ke-20.
- e. Usia, ibu hamil di atas usia 35 tahun rentan terhadap masalah kesehatan, salah satunya adalah preeklamsia. Akibat perubahan jaringan rahim dan

jalan lahir yang tidak fleksibel serta pembuluh darah yang disebabkan oleh peningkatan tekanan darah.

3. Klasifikasi Preeklamsi

Klasifikasi preeklamsia terbagi dua menurut (Pertiwi, 2015), Yaitu :

a. Preeklamsia Ringan

- 1) 140/90mmHg diukur dengan posisi ibu berbaring terlentang
- 2) Adanya pembengkakan kaki, muka, jari tangan serta berat badan naik 1kg lebih tiap minggunya
- 3) Proteinuria kuantitatif $>0,3$ gram/L , dan kualitatif (+1 dan +2) di kateter urin

b. Preeklamsia Berat

- 1) Tekanan darah $>160/100$ mmHg
- 2) Terdapat proteinuria >5 gram/L
- 3) Urine kurang (Oliguria) dari 500 cc/24Jam
- 4) Serebral terganggu, visus terganggu, nyeri pada epigastium
- 5) Adanya pembengkakan/edema paru
- 6) Timbul keluhan subjektif, seperti: nyeri, gangguan penglihatan dan sakit kepala.

4. Patofisiologi

Menurut (Lalenoh, 2018) Patofisiologi preeklampsia terdapat beberapa teori yang berkaitan antara lain:

a. Teori kelainan pada vaskularisasi plasenta.

Arteri uterina dan ovarika mensuplai darah ke plasenta dan uterus. kemudian keduanya akan memasuki meometer berupa arteri akuarium, cabang arteri radial dapat ditempatkan. Dengan demikian, arteri aferen akan memasuki endometrium sebagai anggota arteri basilaris berdasarkan cabang arteri spiralis. Pada kehamilan normal, trofoblas sering menginfiltrasi lapisan otot arteri spiralis. Somatoblas juga memasuki arteri spiralis, mengakibatkan dilatasi jaringan basal dan pembesaran lumen duktus spiralis. Lumen arteri torsi menyebabkan vasodilatasi dan ketegangan, yang menurunkan tekanan darah, mengurangi resistensi pembuluh darah, dan bahkan dapat meningkatkan aliran darah ke kontraksi uterus.

Tekanan darah tinggi selama kehamilan berarti bahwa tidak ada pengambilalihan sel trofoblas yang relatif lengkap yang mensuplai lapisan otot arteri spiralis agar tetap kaku dan kaku, sehingga tidak dapat meregang, dan vasodilatasi karena lumen spiral. arteri sendiri. Hal ini menyebabkan lumen arteri torsi menyempit, mengurangi aliran darah ke rahim, menyebabkan kekurangan oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh dan mengurangi aliran darah ke plasenta. (Lalenoh, 2018).

b. Teori sirkulasi darah berkurang pada plasenta, radikal bebas dan disfungsi endotel

Penurunan sirkulasi darah yang dialami oleh plasenta dan relatif kurangnya oksigen dalam jaringan untuk mempertahankan fungsi tubuh akan menimbulkan radikal bebas atau senyawa pengoksidasi. Radikal bebas adalah senyawa yang menerima elektron, atom atau molekul yang memiliki elektron tetapi tidak memiliki pasangan. Iskemia plasenta dapat membentuk oksidan penting yaitu radikal hidroksil yang bersifat toksik terutama pada membran endotel pembuluh darah untuk perlindungan dalam tubuh normal yaitu produksi oksidasi (Lalenoh, 2018). dideklarasikan menggunakan "Toxemia". Radikal hidroksil ini dapat merusak membran yang menyimpan asam lemak tak jenuh untuk membentuk peroksida lemak. Peroksida lemak dapat menghancurkan protein sel endotel serta nukleus. Pre-eklampsia telah diperiksa untuk tingkat oksidan yang lebih spesifik yang meningkatkan peroksidasi lipid, sementara antioksidan misalnya vitamin yang larut dalam lemak pada pre-eklampsia berkurang yang mengarah untuk mengontrol tingkat oksidasi lipid peroksida yang tinggi. Lemak peroksida, seperti oksidan yang sangat beracun, bersirkulasi dalam darah ke seluruh tubuh tetapi merusak membran sel endotel. Membran sel endotel sangat rentan terhadap peroksida lipid yang relatif berlemak. Ini berhubungan langsung dengan penggunaan aliran darah dan mengandung banyak asam lemak tak jenuh. Lemak peroksida bersentuhan dengan sel endotel, sel endotel rusak, dan

membran sel endotel itu sendiri juga mulai rusak. Kerusakan ini menyebabkan gangguan fungsi endotel bahkan kerusakan struktur sel endotel secara keseluruhan.

c. Teori pembenaran imunologik ibu dan janin

Ibu mendapat manfaat dari kehamilan normal, respon imunnya tidak lagi menolak adanya konsepsi. Ada human leukocyte antigen (HLA) protein G, yang berperan sangat penting dalam mengatur respons imun seseorang, menolak produksi janin yang tidak lengkap (plasenta). Dengan adanya HLA, infiltrasi sel trofoblas ke dalam jaringan selang dapat terjadi. Pada wanita dengan preeklamsia, plasenta mengalami penurunan HLA. Penurunan terjadi di daerah desidua plasenta, pada saat itu trofoblas sudah terlambat untuk mencapai desidua. Dengan demikian, tingkat infiltrasi trofoblas mengarah ke jaringan lunak, yang juga rapuh dan rentan terhadap dilatasi arteri spiralis. Produksi sitokin yang dirangsang oleh HLA memfasilitasi munculnya respon inflamasi (Lalenoh, 2018).

d. Teori penyesuaian kardiovaskuler

Ibu hamil normal, pembuluh darah tahan panas. Refraktori adalah pembuluh darah yang tidak peka terhadap adanya denyut nadi bahan vasokonstriktor, sehingga diharapkan respon vasokonstriktor terhadap kadar vasokonstriktor tinggi. Pada ibu hamil normal, prostaglandin diproduksi di sel endotel yang melindungi pembuluh darah dari refrakter terhadap vasopresor (Lalenoh, 2018).

Dalam ASD, bagaimanapun, indeks bias hilang ke vasopresor, bahkan meningkatkan sensitivitas terhadap vasopresor. resistensi refraktori pembuluh darah, hilangnya bahan penekan, sehingga membuat pembuluh darah sensitif terhadap bahan penekan (Lalenoh, 2018).

e. Teori stimulus inflamasi

Teori ini didasarkan pada konsep proses inflamasi di mana pelepasan puing-puing trofoblas vaskular adalah stimulus utama. Seorang wanita hamil normal memiliki jumlah debris trofoblas yang normal, karena respon inflamasi dalam batas normal dan plasenta melepaskan debris trofoblas ke dalam trofoblas dan residu nekrotik, residu dari stres oksidatif reaktif. Benda asing menyebabkan proses inflamasi. Berbeda dengan penggunaan proses apoptosis atau kematian sel pada ibu hamil dengan preeklamsia, produksi debris apoptosis dan sel trofoblas nekrotik meningkat sehingga menyebabkan peningkatan stres oksidatif (Lalenoh, 2018).

5. Manifestasi Klinis

(J.Y Jhonson,2014) menyampaikan macam manifestasi klinis

Preeklamsi antara lain :

- a. Spasme pembuluh darah ibu, sirkulasi dan nutrisi yang buruk dapat mengakibatkan kelahiran dengan berat badan dan kelahiran prematur.
- b. Mengalami hipertensi diberbagai level.
- c. Protein dalam urin berkisar +1 hingga +4.

- d. Gejala neurologi seperti pandangan kabur, sakit kepala dan hiper refleksia mungkin akan terjadi.
- e. Berpotensi gagal hati.
- f. Kemungkinan akan mengalami nyeri di kuadran kanan atas.
- g. Meningkatnya enzim hati.
- h. Jumlah trombosit turun

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan Bagi (Pratiwi, 2017) penatalaksanaan pada preeklampsia adalah sebagai berikut :

- a. Tirah Baring, miring ke satu posisi.
- b. Monitor tanda vital, refleks dan DJJ.
- c. Diet tinggi kalori, tinggi protein, rendah karbohidrat lemak dan garam.
- d. Pemenuhan kebutuhan cairan : Jika jumlah urine < 30 ml/jam pemberian cairan infus Ringer Laktat 60-125 ml/jam.
- e. Pemberian obat sedative, anti hipertensi dan diuretik.
- f. Monitor keadaan janin (Aminoscopy, Ultrasografi). Monitor tanda-tanda kelahiran persiapan kelahiran dengan induksi partus pada usia kehamilan diatas 37 minggu.

7. Pemeriksaan Penunjang

Menurut (Saifuddin, 2016) Pemeriksaan Laboratorium Preeklampsia adalah antara lain:

- a. Pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin menurun kadar normal Hb pada ibu yang sedang hamil 12-14 gram%, peningkatan hemaktrosit (dengan

nilai 37-43 vol%), dan trombosit mengalami penurunan (dengan nilai 150.000-450.000/mm³).

- b. Tes urin, yang ditemukan proteinuria
- c. Tes fungsi hati, Bilirubin.
- d. Tes asam urat, peningkatan asam urat (N = 2,4-2,7 mg/dl)
- e. Ultrasonografi, dan Kardiografi dan Radiologi


8. Komplikasi

Nuryaningsih dan Fatimah, (2017), menyampaikan macam komplikasi yang mungkin terjadi akibat hipertensi saat kehamilan pada ibu dan janin.

Pada ibu :

- a. Eklamsia.
- b. Pre-eklampsia berat.
- c. Solusio plasenta.
- d. Kelainan ginjal.
- e. Perdarahan subkapsula hepar.
- f. Kelainan pembekuan darah.
- g. Sindrom HELLP (hemolisis, elevated, liver, enzymes, dan low platellet count).
- h. Ablasio retina

9. Penyimpangan KDM



B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Konsep Teori Keperawatan yang terkait

Teori keperawatan terkait menggunakan perkara nyeri akut dalam pasien preeklamsia keliru satunya merupakan Teori comfort. Dikembangkan lebih lanjut pada tahun 1990 oleh Katharine Kolcaba, teori kenyamanan merupakan teori mid-range, karena memiliki konsep dan proposisi yang terbatas, memiliki tingkat abstraksi yang rendah, dan mudah diterapkan dalam pelayanan kontrol keperawatan. Teori ini menekankan perdamaian sebagai kebutuhan semua manusia. Kenyamanan adalah kebutuhan dalam rentang yang luas dari penyakit hingga kesehatan, dan ketenangan adalah ritus peralihan terakhir berdasarkan perawatan perawat terhadap pasien (Risnah & Muh Irwan, 2021).

Kolcaba berpendapat bahwa ketenangan adalah konsep yang memiliki interaksi yang kuat dengan ilmu keperawatan. Perawat meyakinkan pasien dan keluarga mereka melalui penggunaan yang kuat dari orientasi pengukuran ketenangan. Hubungan antara hegemoni menggunakan teori lanjutan pemberian pereda nyeri pada keluhan pasien menggunakan tindakan keperawatan terapeutik murottal untuk meredakan nyeri akut pada pasien dengan menekan nilai-nilai islami.

Teori Kolcaba termasuk pada middle range theory. Menurut Kolcaba, teori ketenangan sebagai galat satu pilihan teori keperawatan yg bisa diaplikasikan eksklusif pada lapangan lantaran bersifat universal & nir terhalang budaya yg dimiliki sang setiap masyarakat. Hal ini mengakibatkan

teori ketenangan sanggup dimodifikasi seluas-luasnya sinkron kebutuhan klien masing-masing (Kadek Cahya Utami, 2016)

2. Pengkajian Keperawatan

a. Riwayat: Identitas ibu hamil meliputi: Inisial, TTL/Umur, Pendidikan Terakhir, Suku, Pekerjaan, Agama dan Alamat Tempat Tinggal.

b. Data riwayat penyakit ibu : riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit, riwayat penyakit genetik.

c. Pemeriksaan fisik

1) Kondisi umum: Ibu dengan preeklamsia sering merasa lelah.

2) Pengukuran Tanda-Tanda Vital

3) Kepala: Kepala tidak bersih dan banyak berketombe dan ibu preeklamsia mengeluh sakit kepala.

4) Wajah: Ibu mengalami preeklamsia, wajah tampak bengkak/hematoma

5) Mata: Ibu mengalami preeklamsia, penglihatan kabur dan konjungtiva iskemik

6) Mulut: Ibu mengalami preeklamsia, selaput lendir bibir basah dan bibir mulut memiliki pembuluh darah bengkak di gusi, yang dapat menyebabkan pembengkakan dan pendarahan

7) Dada: Paru-paru, jantung, preeklamsia dekomposisi jantung

8) Payudara: payudara bengkak, kencang dan padat, areola gelap dan puting menonjol

9) Perut: mual dan muntah karena nyeri epigastrium

- 10) Pemeriksaan kehamilan: ibu hamil dengan preeklamsia Gerakan janin lemah dan detak jantung tidak teratur
 - 11) Ekstrem: pembengkakan kaki dan jari (Karjatin, 2016).
3. Diagnosis Keperawatan
- a. Nyeri akut
 - b. Pola nafa tidak efektif
 - c. Deficit pengetahuan
 - d. Resiko cedera pada janin (SDKI DPP PPNI, 2019)



4. Intervensi Keperawatan (Tim Pokja SIKI DPP PPNI, 2019)

No.	Diagnosa	Tujuan	Intervensi	Rasional
a.	Nyeri akut	Setelah dilakukan tindakan, klien dapat mengalami pereda nyeri dengan kriteria <i>outcome</i> : 1. Keluhan pereda nyeri 2. Tekanan darah normal 3. Denyut jantung normal (SLKI, 2019a)	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan lokasi nyeri, waktu onset, kualitas, frekuensi 2. Penentuan skala nyeri pada ibu hamil 3. Penentuan respon nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang dapat mengurangi nyeri dan memperburuk nyeri 5. Identifikasi pengetahuan ibu hamil dan bertanya tentang nyeri 6. Menentukan pengaruh budaya dalam mengobati nyeri jika terjadi 7. Monitoring/Monitoring keberhasilan terapi komplementer pada ibu hamil jika memungkinkan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teknik nonfarmakologi selalu diterapkan pada ibu dengan preeklamsia untuk meredakan nyeri ibu (misalnya terapi musik, hipnosis, imajinasi terbimbing, aromaterapi, TENS, terapi pijat, akupresur, terapi bermain, dan terapi panas/dingin). 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat mengetahui lokasi nyeri, waktu timbulnya nyeri dan frekuensi nyeri 2. Dapat mengetahui skala nyeri yang terjadi pada ibu hamil 3. Dapat mengetahui jika ada nyeri non verbal 4. Dapat mengetahui hal yang dapat memperingan dan memperberat nyeri 5. Dapat mengetahui pengetahuan ibu hamil dengan keluhan yang terjadi pada dirinya 6. Dapat mengetahui pengaruh budaya dalam menangani nyeri 7. Dapat mengetahui tingkat keberhasilan terapi komplementer <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk melepaskan tegangan emosional dan otot atau mengurangi rasa nyeri

			<p>2. Mempertahankan kontrol lingkungan dapat memperburuk nyeri pada ibu hamil (misalnya, cahaya, kebisingan, dan panas) ambient)</p> <p>3. Memfasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan kepada ibu hamil apa penyebab nyeri, menstruasi, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan kepada ibu hamil strategi manajemen nyeri 3. Penyuluhan pemantauan nyeri toksik 4. Penyuluhan tentang penggunaan analgesik yang tepat 5. Bimbingan non- teknik farmakologi untuk meredakan nyeri pada ibu hamil. <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dalam penggunaan analgesik pada ibu hamil, bila perlu. (SIKI, 2018a) 	<p>2. Untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan</p> <p>3. Untuk relaksasi mengurangi nyeri</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat memahami dari pemicu timbulnya nyeri 2. Dapat menerapkan strategi untuk meredakan nyeri 3. Melakukan pemantauan terjadinya nyeri secara mandiri 4. Untuk mengurangi nyeri secara farmakologi 5. Untuk melepaskan tegangan emosional dan otot atau mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi nyeri secara farmakologi
--	--	--	--	---

b.	Pola nafas tidak efektif	<p>Setelah asuhan keperawatan diberikan, pasien akan kembali menampilkan pola nafas efektif dengan kriteria <i>outcome</i> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman nafas normal 2. Frekuensi nafas normal 3. Tekanan darah normal (SLKI, 2019b) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lanjutkan pantau pola pernapasan ibu (dimulai dengan kedalaman, upaya dan frekuensi pernapasan) 2. Lanjutkan pemantauan untuk suara pernapasan tambahan (mis., mengi, napas serak) serak 3. Lanjutkan memantau sputum (warna, aroma dan kuantitas) <p>Trapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Patenkan perawatan jalan napas dengan <i>chin rest</i> dan <i>head tilt</i> (jika ragu) Jika ada kecurigaan cedera cambuk, lakukan manipulasi rahang) 2. Tempatkan ibu dalam semi-ayam atau Fowler posisi 3. Berikan minuman hangat 4. Jika ada lendir, aspirasi selama 15 detik 5. Berikan oksigen (O₂), jika perlu <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari cara ibu hamil dapat menggunakan teknik batuk yang efektif <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dalam pengelolaan ekspektoran, ekspektoran dan bronkodilator, jika diperlukan. (SIKI, 2018b). 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau pola nafas yang terjadi pada ibu hamil 2. Memantau bila ada bunyi nafas tambahan 3. Memantau dari hasil pemeriksaan sputum <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau patenan dari jalan napas 2. Memosisikan ibu hamil dengan posisi yang nyaman 3. Memberikan minuman hangat pada ibu hamil 4. Melakukan penghisapan lender bila terdapat lendir 5. Bila Nampak sesak, diberikan oksigen <p>Edukasi</p>
----	--------------------------	--	--	--

				<p>1. Membantu melakukan tehnik batu yang efektif</p> <p>Kolaborasi</p> <p>1. Memberikan pemberian ekspektora, mukolitik dan bronkodilator bila dibutuhkan.</p>
c.	Defisit pengetahuan	<p>Setelah pemberian tindakan keperawatan, diharapkan klien menunjukkan peningkatan pengetahuan dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengetahuan agar mengurangi risiko cedera 2. Meningkatkan pengetahuan untuk perilaku yang berisiko tinggi 3. meningkatkan pengetahuan untuk mencegah <p>(SLKI, 2019b)</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui kesiapan dan penerimaan ibu hamil terhadap informasi 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menurunkan atau meningkatkan pengetahuan tentang pencegahan preeklamsia <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan materi pendidikan dan komunikasi kesehatan ibu hamil 2. Waktu saat penyuluhan kesehatan akan dilakukan dengan kesepakatan bersama 3. Beri kesempatan ibu hamil untuk bertanya <p>Edukasi</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau kesiapan ibu hamil dalam menerima informasi 2. Memantau faktor – faktor yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai pencegahan preeklampsia <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan materi edukasi yang akan diberikan 2. Melakukan kontrak waktu dengan pasien agar dapat mempersiapkan diri untuk menerima edukasi 3. Memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya mengenai hal yang diberikan

			<p>1. Jelaskan kemungkinan faktor risiko preeklamsia pada ibu hamil (SIKI, 2018b)</p>	<p>Edukasi</p> <p>1. Menyampaikan resiko yang terjadi pada ibu hamil dengan preeklampsia</p>
d.	Resiko cedera pada janin	<p>Setelah dilakukan asuhan keperawatan diharapkan klien tidak memiliki resiko membahayakan janin dengan hasil sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada perdarahan 2. Tekanan darah normal 3. Kebiasaan tidur dan istirahat yang baik 4. Denyut jantung normal (SLKI , 2019b) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tentukan status obstetri 2. Tentukan riwayat obstetri 3. Tentukan penggunaan obat, diet dan merokok 4. Identifikasi tes kehamilan sebelumnya 5. Periksa denyut jantung janin dalam 1 menit 6. Pantau denyut jantung janin 7. Pantau tanda-tanda vital ibu <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisikan pasien 2. Lakukan manuver Leopold untuk menemukan janin 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui status obstetric pada ibu hamil 2. Untuk mengetahui Riwayat obstetric pada ibu hamil 3. Dapat mengetahui Riwayat penggunaan obat diet dan merokok 4. Mengetahui Riwayat pemeriksaan kehamilan sebelumnya 5. Untuk mengetahui apakah denyut jantung janin normal atau tidak 6. Selalu memantau monitor denyut jantung janin apabila ada kelainan 7. Memantau tanda tanda vital ibu hamil <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memposisikan pasien dengan nyaman 2. Untuk mengetahui posisi janin dalam kandungan

			Edukasi <ol style="list-style-type: none">1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan janin mekanis ibu2. Setelah itu, berikan informasi kepada ibu dari tindak lanjut, bila perlu(SIKI, 2018b)	Edukasi <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan pemahaman mengenai tujuan dan prosedur dalam melakukan pemantauan janin ibu2. Menyampaikan informasi setelah dilakukan prosedur pemantauan janin ibu
--	--	--	--	--

5. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan merupakan serangkaian aktivitas yg dilakukan sang perawat buat membantu klien menurut perkara status kesehatan yg dihadapi ke status kesehatan yg lebih baik yg mendeskripsikan kriteria output yg diharapkan (Potter & Perry, 2018).

selama & selesainya pelaksanaan tindakan, dan menilai data yg baru. Kegiatan dalam pelaksanaan meliputi pengumpulan data berkelanjutan, observasi respon selama dan sesudah pelaksanaan tindakan, serta menilai data yang baru.

6. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi adalah evaluasi hasil dan proses. Hasil menentukan tingkat keberhasilan yang dicapai sebagai hasil dari tindakan. Audit proses menentukan apakah ada kekurangan pada setiap tahapan proses mulai dari penilaian, diagnosis, perencanaan, tindakan, hingga proses evaluasi itu sendiri (Purba, 2019).

Pada tahap ini, masalahnya adalah untuk membandingkan perilaku pelanggan sebelum dan sesudah implementasi. Ini melibatkan kemampuan klien dengan TSG untuk beradaptasi dan mencegah terulangnya masalah yang dialami. Pada preeklamsia, klien dapat menilai kemampuannya dalam mengatasi masalah yang dialami, yang meliputi semua aspek baik dimensi psikologis maupun sosial (Hidayati, 2016).

C. *Evidence Based Nursing (EBN)*

Untuk mengatasi nyeri terdapat beberapa Intervensi/tindakan yang dapat dilakukan, Salah satu diantaranya adalah dengan pemberian terapi murottal efektif dalam penanganan nyeri akut.

1. Pengertian

Terapi murottal merupakan salah satu bentuk keperawatan, dalam hal ini perawat mengajarkan klien tindakan terapeutik dengan mendengarkan ayat Al Quran, Terapi murottal Al Quran adalah terapi membaca kitab suci. Hasilnya adalah ayat-ayat Alquran dalam hitungan menit atau jam yang memberikan efek positif bagi tubuh mereka (Arif Hendra, 2020). Terapi Murottal menggunakan media Alquran (mendengar atau membaca) untuk membantu meningkatkan perubahan fisiologis dan psikologis tertentu (Yuliati Melyana, 2018). Wanita muslimah yang sedang hamil sebaiknya mendengarkan Al Quran secara rutin sebagai salah satu cara stimulasi eksternal bagi janin. Saat memasuki kehamilan, Anda harus selalu mendengarkan surah eksklusif Al-Qur'an, termasuk surah Maryam.

Surah Maryam adalah surah yang sering dibaca untuk ibu hamil. Nama surat ini menggunakan Surah Maryam karena upaya Maryam untuk melewati kehamilan yang tidak diberikan oleh siapa pun, hinaan dari masyarakat sekitar setelah kelahiran putranya, dan kekuatan iman yang diberikan. pelajaran. Tujuan membaca surah, selain ibadah (tabarruk) juga untuk memohon kebaikan saat membaca Al-Qur'an (Setiowati Wiulin & Asnita Nurul, 2020).

Murattal Al-Qur'an Surah Maryam termasuk upaya mengingat Allah, dianggap mampu menjadi intervensi nonfarmakologi dalam mengurangi tingkat nyeri dan bahkan menghilangkan rasa nyeri secara perlahan. Dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah SWT berfirman :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah!, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram”. (Kementerian Agama, 2016).

2. Tujuan

Selain mampu mengurangi intensitas nyeri, terapi Al-Qur'an menawarkan manfaat dan obat yang efektif bagi mereka yang menderita kecemasan, putus asa, kecemasan, meningkatkan perasaan relaksasi dan transisi, mengalihkan perhatian dari rasa takut dan stres. kemosistem untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan gelombang otak (Arif Hendra, 2020).

Perubahan ini menunjukkan penurunan ketegangan saraf refleks yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan kadar darah di kulit, disertai dengan penurunan denyut jantung. Terapi Membaca Al-Quran terbukti memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sel-sel dalam tubuh dengan mengubah getaran suara menjadi gelombang yang ditangkap oleh

tubuh, sehingga mengurangi rangsangan reseptor rasa sakit bagi otak untuk mensekresikan opioid endogen alami. Opiat ini memiliki efek permanen dalam memblokir reseptor nyeri (Arif Hendra, 2020)

3. .Indikasi

Menurunkan tingkat nyeri pada pasien ANC

4. Kontraindikasi

Tidak ada

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Terapi Murattal

a. Observasi

- 1) Identifikasi aspek-aspek yang perlu dimodifikasi atau dipertahankan
- 2) Identifikasi area fokus dalam terapi

b. Terapeutik

- 1) Tempatkan di lokasi dan lingkungan yang nyaman
- 2) Putar rekaman prasetel
- 3) Pastikan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien

c. Edukasi

- 1) Jelaskan tujuan dan manfaat terapi
- 2) Anjurkan memusatkan pikiran pada lantunan ayat Al-Qur'an
(Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 2018).

Prosedur pemberian

- a. Jelaskan kepada pasien serta keluarga terkait dengan tujuan dan prosedur tindakan yang akan diberikan

- b. Mempersiapkan alat alat yang akan digunakan
 - c. Periksa P,Q,R,S,T sebelum melakukan/Memberikan Terapi murottal
 - d. Jaga privasi klien, gunakan sampiran
 - e. Anjurkan klien mendengarkan secara mandiri, lalu tutupi dengan selimut/sarung
 - f. Nyalakan audio Hp, selanjutnya berikan tahu, kedua jelaskan dan kedua pangkal paha. Kemudian lanjutkan dengan menyeka bagian perut dan dada, atau seluruh badan.
 - g. Jelaskan kepada pasien serta keluarga jika tindakan telah selesai
6. Kriteria evaluasi
- a. Nyeri berkurang setelah dilakukan pemberian terapi surah Maryam
7. Artikel Utama & Pendukung
- a. Artikel Utama (Wirna Hildayati, Siti Hasanah, Evi Kurniawati, Pengaruh Murottal Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Ibu Bersalin Kala 1 Fase Aktif Di RSUD Dr. Syainoel Abidin, 2021, Midwivery Care Journal)
 - b. Artikel Pendukung (Nur Kholidahzia1 , Iis Tri Utami , dan Nur Alfi Fauziah , Rini Wahyuni4 Pengaruh Murottal Surat Maryam Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Bersalin Kala 1 Fase Aktif, 2021, Jurnal Maternitas Aisyah, Jaman Aisyah)
 - c. Artikel Pendukung (Zulkahfi, Ilham, Nila Kurnia Safitri, Pengaruh Terapi Murottal Al Quran Surah Maryam Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil Trimester Iii Di Wilayah Kerja Puskesmas Meninting, 2020, Jurnal Prima)

- d. Artikel Pendukung (Nur Rakhmawati, Yunita Wuland, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pre Eklamsia Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Banyuanyar Surakarta Meninting, 2021, Jurnal Kesehatan Madani Medika)
- e. Artikel Pendukung ((Winasih, Ni Luh Sri, Armini, Ni Wayan, Surati, Gusti Ayu, Gambaran Ibu Bersalin Dengan Preeklampsia Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Meninting, 2020, Jurnal Ilmiah Kebidanan)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah studi kasus. Menurut Nursalam (2017) penelitian studi kasus adalah langkah-langkah dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan informasi atau cara pemecahan dalam sebuah masalah yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah studi kasus dengan Deskriptif observasional. Penelitian studi kasus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah keperawatan dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi yang dibatasi oleh waktu dan tempat serta kasus yang dipelajari berupa peristiwa aktivitas atau individu (Sugiyono 2017)

B. Subjek Studi Kasus

Adapun subyek kasus penelitian dalam studi kasus ini adalah kasus Preeklamsia. Kasus ini diangkat karena merupakan salah satu masalah yang sering terjadi pada ibu hamil, Dengan kriteria:

1. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria yang harus dipenuhi setiap anggota populasi yang akan dijadikan sampel.

- a. Klien yang bersedia menjadi subyek penelitian.
- b. Klien ANC dengan diagnosa Medis Preeklamsi.
- c. Klien dengan diagnosis keperawatan nyeri.

d. Klien yang menjalani rawat jalan di Puskesmas Bajeng.

2. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah kriteria atau cirri-ciri anggota populasi yang tidak bisa dijadikan sebagai sampel penelitian (Hidayat 2017).

- a. Klien yang tidak mempunyai kelainan, atau penyakit.
- b. Klien yang mempunyai penyakit yang berbeda

C. Fokus Studi Kasus

Focus studi kasus pada penelitian ini adalah Respon ibu hamil terhadap Intervensi Terapi Murottal Surah Maryam Di Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa”Dengan Masalah Nyeri.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen penelitian diartikan sebagai alat dalam mengukur fenomena alam ataupun sosial yang akan diamati. Dalam penelitian studi kasus ini instrumen yang digunakan adalah format asuhan keperawatan yang digunakan dalam membuat asuhan keperawatan, dan handphone yang digunakan untuk memutar lantunan ayat suci AL-QUR-AN Surah Maryam

E. Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian dalam studi kasus ini terdiri dari beberapa tahap antara lain:

1. Persiapan
 - a. Peneliti mengajukan judul terkait studi kasus yang akan diteliti dan mengajukan intervensi berbasis *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) kepada dosen yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing
 - b. Peneliti melakukan koordinasi kepada KTU dan Penanggung jawab ANC di puskesmas bajeng untuk menjelaskan prosedur penelitian yang dilakukan
 - c. Peneliti menjelaskan ke pasien maupun keluarga terkait perlakuan atau intervensi yang akan dilakukan

- d. Peneliti menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan dalam melakukan penelitian seperti handphone berisi audio Surah Maryam

2. Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala kasus yang dijadikan subyek penelitian untuk diselidiki (Hidayat 2017). Yang akan dilakukan diobservasi dalam penelitian ini adalah tanda-tanda dan gejala, dan masalah keperawatan yang ada pada pasien dan bagaimana proses penanganan nyeri dengan menggunakan intervensi terapi surah maryam.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

3. Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah Prodi Prodi Profesi Ners Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

F. Tempat Dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Hasil penelitian ini dilakukan di Puskesmas Bajeng tepatnya dibagian Poli ANC dan penelitian ini telah dilakukan pada Tanggal 08 Juni 2021.

G. Analisis Dan Penyajian Data

Penyajian informasi muka produk tulis Akhir ini disajikan bagian dalam wujud tekstual/alkisah. Penyajian informasi tekstual/alkisah menakhlikkan

penyajian informasi bagian dalam wujud perkataan-perkataan atau huruf kepada membentangkan himpunan informasi yang diperoleh.

H. Etika Penelitian

Etika penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. *Informed Consent*

Formulir persetujuan ini diberikan kepada orang tua responden untuk diteliti. Formulir informed consent harus dilampirkan pada nama penelitian dan kepentingan penelitian. Jika subjek atau orang tua responden menolak, peneliti tidak boleh memaksa dan harus menghormati hak responden demi kenyamanan responden.

2. *Anomity*

Peneliti melindungi hak dan privasi responden, tidak menggunakan nama responden dan menjaga kerahasiaan responden, peneliti hanya menggunakan inisial sebagai identitas, peneliti tidak akan memberikan nama responden. Jawaban pada tabel adalah huruf pertama sampel nama (A)

3. *Confidentiality*

Kerahasiaan tanggapan dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, tidak termasuk data yang diperlukan untuk peneliti tidak akan disajikan. Pada saat hasil dan kuesioner yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kecemasan responden melalui orang tua akan musnah setelah presentasi hasil. .

4. *Beneficence* (Manfaat)

Dalam suatu penelitian perlu dicapai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat pada umumnya dan subyek penelitian pada khususnya.

5. *Non maleficence*

Prinsip ini merupakan kewajiban untuk tidak merugikan responden penelitian. Responden berhak untuk secara sukarela memutuskan berpartisipasi dalam penelitian tanpa risiko merugikan penelitian



BAB IV
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian Keperawatan

1. Data Umum Klien

- a. Inisial klien : Ny R
- b. Usia : 31 Tahun
- c. Status perkawinan : Kawin
- d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- e. Pendidikan : SMP
- f. Riwayat kehamilan dan persalinan lalu : Tidak ada
- g. Riwayat Ginekologi
- h. Masalah Ginekologi : tidak ada
- i. Riwayat KB : Klien mengatakan tidak menggunakan KB

2. Riwayat kehamilan saat ini:

- a. HPHT : 20 Juni 2020
- b. Taksiran Partus : 27, Maret 2022
- c. BB sebelum hamil : 60 Kg
- d. TD sebelum hamil : 120/60 mmHg

TD	BB/TB	Letak/Presentasi	DJJ	Usia	Keluhan
		Janin		Gestasi	
140/80 mmHg	65 Kg/165 Cm	LI : Bokong LII : PUKI LIII : Kepala LIV : BAP	144x/i	29 Minggu	Nyeri

3. Data Umum Kesehatan saat ini

- a. Status Obstetrik : G1 P0 A0
- b. Keluhan utama : Klien mengatakan dua minggu terakhir merasakan nyeri kepala.

- c. Keadaan umum : Baik
- d. Kesadaran : Composmentis, E4 V5 M6 = 15
- e. BB/TB : 65 Kg/165 cm, terjadi peningkatan berat badan sesudah hamil sebanyak 5 Kg.

f. Tanda-tanda Vital:

TD: 140/80 mmHg

N : 88 x/i

P : 24 x/i

S : 36,7 °celcius

4. Kepala-Leher

- a. Kepala: Kepala dalam keadaan baik, kulit kepala bersih dan lembab, tidak ada bintil, luka, iritasi atau benjolan, merata, rambut tebal dan sakit kepala..
- b. Lokasi nyeri : Pasien mengeluh nyeri pada kepala belakang
- c. Gambaran nyeri : Pasien mengatakan nyeri seperti tegang
- d. Skala nyeri : Saat mengukur rasa nyeri, Perawat akan meminta Pasien untuk memilih angka dari 0-10, dengan penjabaran sebagai berikut: Angka 0 artinya tidak nyeri, Angka 1-3 nyeri ringan, Angka 4-6 nyeri sedang, Angka 7-10 nyeri berat. Nyeri yang dirasakan pasien yaitu skala 4 (Ringan).

- e. Durasi : Pasien mengatakan nyeri kurang lebih 3 menit ketika timbul
- f. Respon emosional : Pasien mengatakan dirinya tidak cemas saat nyeri muncul
- g. Cara mengatasi nyeri : Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyak urut mengelus lokasi nyeri
- h. Mata : Alis dan mata tampak simetris, alis bergerak simetris saat diangkat, tidak ada cairan abnormal dari mata. Sklera mata berwarna putih susu, konjungtiva berwarna merah cerah. Pupil mata menyempit saat menerima cahaya.
- i. Hidung : Tidak ada cairan dari hidung, tidak ada pernapasan melalui lubang hidung. Tidak teraba massa, tidak ada deviasi hidung, tidak teraba bengkak, nyeri.
- j. Mulut : warna bibir pucat, lesi tidak terlihat, gigi tidak lengkap, 2 gigi berlubang, karang gigi tidak terlihat dan gusi bengkak. Lidah tampak bergerak bebas, tanpa bengkak dan tanpa nanah.
- k. Telinga : mampu mendengar, tidak mengeluh nyeri.
- l. Leher : tidak tampak massa, pembengkakan atau kaku leher. Tidak teraba pembesaran kelenjar limfer, tidak teraba kelenjar tiroid.
- m. Masalah Khusus : Nyeri Akut

5. Dada

- a. Jantung : tidak tampak adanya lesi, S1 S2 terdengar, hasil perkusi pekak.
 - b. Dada : tidak tampak adanya nodul, massa atau luka, dinding dada bergerak simetris, tidak ada penggunaan otot bantu napas. Tidak ada fraktur, dan tidak teraba nyeri. Hasil perkusi normal pada paru abdomen. Tidak terdengar suara napas tambahan.
 - c. Payudara : Penampilan simetris, areola mammae tampak hitam, massa, lesi atau nodul tidak terlihat dan teraba. Tidak ada benjolan atau bengkak.
 - d. Puting payudara : kedua putingnya menonjol, customer bilang ASInya belum keluar. Tidak ada volume abnormal atau produksi cairan. Masalah khusus:
6. Abdomen
- a. TFU : 23 cm
 - b. Leopold I : Bokong
 - c. Leopold II : PUKI
 - d. Leopold III : Kepala
 - e. Leopold IV : BAP
 - f. Linea Nigra : terdapat linea nigra dan ada striae.
Masalah Khusus :-
 - g. Perineum Genital : klien mengatakan tidak ditemukan lesi, tidak ada hemorroid dan tidak ada keputihan.

7. Ekstremitas

- a. Ekstremitas atas: tidak ada spastisitas, tidak ada tremor, tidak ada deformitas, tidak ada edema, jumlah jari normal 5 jari, kulit lembab, kuku merah dan berjalan kurang dari 2 detik. Kekuatan otot ipsilateral ekstremitas bawah 5 – 5 mampu menahan efek gravitasi dan tahanan maksimal.
- b. Ekstremitas bawah : tidak ada spastisitas, tidak ada tremor, tidak ada deformitas, tidak ada oedema, jumlah jari normal 5, kulit lembab, kuku merah dan bersih, kurang dari 2 detik. Kekuatan otot pada kedua sisi ekstremitas bawah sama yaitu 55. Star reflex :Masalah Khusus:-

8. Eleminasi

- a. Urin : Pasien menyampaikan terkadang kurang lebih 4-7 kali
- b. Fekal : Pasien mengatakan terkadang 1 atau 2 kali

Masalah khusus:-

9. Mobilisasi dan Latihan

- a. Tingkat mobilisasi : Pasien dapat bergerak dengan baik
- b. Latihan/senam : Pasien mengatakan rutin berjalan dipagi dan disore hari.

Masalah khusus: -

10. Nutrisi dan cairan

- a. Asupan nutrisi : Pasien berkata pola makannya baik, kadang sering menambah makan karena lapar, pola makan pasien selama hamil tiga kali sehari
- b. Asupan cairan : Pasien mengatakan sering meminum air putih, kurang lebih dua botol air le mineral 1,5 liter perhari.

Masalah khusus:-

11. Keadaan mental

- a. Adaptasi psikologis : Pasien berkata merasa senang terhadap kehamilannya.
- b. Penerimaan kehamilan : Pasien mengatakan menerima kehamilannya sekarang dan selalu menerima saran untuk kesehatan bayinya.
- c. Persiapan persalinan : Pasien mengatakan persiapan yang dilakukan yaitu rencana tempat melahirkan dipuskesmas Bajeng, dan pengetahuan tentang tanda-tanda melahirkan.
- d. Obat-obatan yang dikonsumsi : klien mengatakan tablet Fe, Bcom Tab, Kalsium Lactat 2x1.

ANALISA DATA

NO	Sign/Simptom/Data	Etiologi/Penyebab	Problem/ Masalah Keperawatan
1.	<p>DS :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 'klien mengatakan merasa nyeri pada perut bagian bawah'. b. 'Pasien mengatakan nyeri seperti tegang' c. 'Nyeri skala 4 (Ringan)' d. 'Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih Tiga menit ketika timbul' e. 'Pasien mengatakan ia tidak cemas saat nyeri' f. 'Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyak mengelus lokasi nyeri' <p>DO :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. TD: 140/80 mmHg N : 88 x/i P : 24 x/i S : 36,7° celcius 	<p>Kerusakan vaskuler pembuluh darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Aktivitas epineprin dan 'netepineprin</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>'vasokonstriksi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>'peningkatan tekanan darah</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>'Gangguan Sirkulasi ke Otak</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>'Resistensi pembuluh darah otak'</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Somatik Sensori</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>'Nyeri diperepsikan'</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nyeri Kepala'</p>	<p>'Nyeri, Akut'</p>

B. Diagnosis Keperawatan

1. Nyeri Akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vesikuler ditandai dengan Nyeri kepala
2. Data Subjektif :
 - a. klien mengatakan merasa nyeri pada Perut bagian bawah.
 - b. Pasien mengatakan nyeri seperti tegan'
 - c. 'Nyeri skala 4 (;Ringan)
 - d. 'Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih tiga menit ketika timbul
 - e. Pasien mengatakan ia tidak cemas saat nyeri
 - f. Pasien mengatakan jika nyeri iya menaruh minyak''
3. Data Objektif :

TD	: 140/80 mmHg
N	: 88x/i
P	: 24x/i
S	: 36,7 ° Celcius

C. Intervensi Keperawatan

keperawatan yang dilakukan pada kasus nyeri pada ibu hamil adalah pemberian terapi murottal surah Maryam. Surah Maryam ini memiliki makna rasa sakit yang dirasakan Maryam dalam mengandung sampai melahirkan Nabi Isa, dengan rahmat tuhan melalui perantara Jibril Maryam diberikan perintah oleh allah yang terdapat dalam ayat ini. Maka dengan itu ayat ini menjadi intervensi terapi murottal surah Maryam dipuskesmas bajeng kabupaten gowa.

INTERVENSI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : Ny. R
UMUR KLIEN : 31 tahun

Ruangan : Puskesmas Bajeng

No	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan	Rasional
1.	Nyeri Akut berkenaan dengan meningkatnya tekanan vesikuler ditandai dengan DS : a. Pasien menyampaikan merasa nyeri pada bagian Perut bagian bawah. b. Pasien mengatakan nyeri seperti tegang”. c. Nyeri skala 4 (Ringan)”	Setelah diberikan tindakan’ keperawatan satu kali dua puluh empat Jam diharapkan Nyeri menurun dengan kriteri hasil : 1. Keluhan nyeri berkurang (SLKI, 2019	Terapi Surah Maryam Observasi a. Identifikasi aspek yang akan diubah ,dipertahankan atau ditingkatkan. b. Identifikasi aspek yang akan difokuskan dalam tindakan terapi Terapeutik 1. Posisikan dalam posisi nyaman 2. Putar rekaman yang telah sediakan	Observasi a. Untuk menentukan tindakan terapi yang diberikan b. Untuk memfokuskan terapi yang akan diberikan Terapeutik a. Untuk memberikan posisi nyaman b. Untuk memastikan rekaman yang akan didengarkan

<p>d. Pasien mengatakan nyeri terasa kurang lebih 3 menit ketika timbul</p> <p>e. Pasien mengatakan ia tidak cemas saat nyeri</p> <p>f. Pasien mengatakan jika nyeri ia menaruh minyakurut/balsem</p> <p>DO :</p> <p>b. TD : 140/80 mmHg</p> <p>N : 88 x/i</p> <p>P : 24 x/i</p> <p>S : 36,7 celcius</p>		<p>3. Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tujuan terapi 2. Anjurkan memusatkan pikiran saat lantunan ayat Al-Qur'an Surah Maryam diputar 	<p>c. Untuk memastikan volume tidak mengganggu kenyamanan pasien</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk melindungi pendengaran pasien b. Untuk dapat memahami tindakan yang aka diberikan c. Untuk memfokuskan dan memberikan perhatian pada pasien
--	--	--	--

D. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : Ny. R

UMUR KLIEN : 31 tahun

No	No. DX	Hari, Tgl./ Jam	Implementasi	Nama Jelas
	Nyeri Akut berhubungan dengan peningkatan tekanan vesikuler ditandai dengan	Senin, 07 /Juni / 2021 09.12 – 09.41	Terapi Surah Maryam Observasi 1. Identifikasi aspek yang akan dimodifikasi atau dipertahankan Hasil: aspek yang akan dimodifikasi adalah aspek psikologis pasien yang berhubungan dengan kenyamanan pasien dan nyeri autisme yang dialami pasien. 2. dentifikasi aspek yang menjadi fokus dalam terapi Hasil: Aspek yang menjadi fokus dalam terapi fertilitas yang akan dilakukan adalah aspek relaksasi dan pereda nyeri. Terapeutik 1. Mengubah posisi klien dalam posisi dan lingkungan yang nyaman Hasil : Klien mengikuti perubahan posisi yang dilakukan, klien merasa nyaman dengan posisi duduk. 2. Putar rekaman yang telah ditetapkan Hasil : Klien memilih surat Maryam, klien mendengarkan dengan fokus dan penuh penghayatan 3. Volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien	Wahab

			<p>Hasil : Klien mengatur sendiri volume di Handphone nya.</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tujuan terapi dilakukan Hasil : Pasien mengamati penjelasan yang diberikan, dan mempercayai bahwa Al-Qur'an sebagai sumber solusi dari permasalahan yang ada, sekalipun itu mengenai kesehatan. 2. Mengajukan memusatkan pikiran pada lantunan ayat suci Al-Qur'an Hasil : Pasien mengikuti anjuran yang diberikan dan mengatakan siap mengulangi di rumahnya. 	
		<p>Selasa 08/ Juni / 2021 09:50 WITA</p> <p>10.15 WITA</p>	<p>Terapi Surah Maryam</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi aspek yang akan diubah atau dipertahankan Hasil : aspek yang akan diubah adalah psikologis pasien terkait dengan kenyamanan pasien dan nyeri akut yang pasien alami. 2. Mengidentifikasi aspek yang akan difokuskan dalam terapi Hasil : klien mengatakan masih merasakan nyeri pada bagian kepala. <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah posisi pasien dan memberikan lingkungan yang nyaman 	<p>Wahab</p>

			<p>Hasil :Pasien mengikuti perubahan posisi yang dilakukan, yaitu dengan duduk.</p> <p>2. Putar rekaman yang telah ditetapkan Hasil : Pasien memutar surah Maryam, klien mendengar sambil mengikuti dengan perlahan.</p> <p>3. Yakinkan volume yang digunakan sesuai dengan keinginan pasien Hasil : Pasien mengatur sendiri volume di Handphone nya.</p>	
--	--	--	---	--

D. Evaluasi Keperawatan

EVALUASI KEPERAWATAN

NAMA KLIEN : Ny. R
UMUR KLIEN : 31 tahun

No	Hari, Tgl./ Jam	Evaluasi	Nama Jelas
	Senin, 07 /Juni / 2021 09.12 – 09.41	S : Klien mengikuti anjuran yang diberikan dan siap mengulangi di rumahnya. O : Klien tampak memahami penyampaian A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Edukasi 1. Posisikan dalam posisi nyaman 2. Putar rekaman yang telah ditetapkan dan volume yang digunakan sesuai dengan kenyamanan pasien	Wahab
	Senin 07/ Juni / 2021 09:50 WITA	S: Klien mengatakan senang mendengar lantunan ayat suci al-quran, walaupun kadang nyeri masih sedikit dirasakan. O : klien mampu melakukan dengan baik A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Edukasi 1. menganjurkan untuk mengulangi kembali.	Wahab Putar rekaman yang telah

	<p>Selas 08/ Juni / 2021 09:00 WITA</p>	<p>S : Pasien mengikuti anjuran yang diberikan dan akan mengulangi di rumahnya nanti. O : Pasien tampak memahami A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Edukasi 1. Terapkan pada lingkungan yang nyaman 2. Putar rekaman yang telah ditetapkan dan volume yang digunakan sesuai dengan kenyamanan pasien.</p>	<p>Wahab</p>
	<p>Selasa 08/ Juni / 2021 09:50 WITA</p>	<p>S: Pasien mengatakan senang mendengar lantunan suara ayat suci al-quran, walaupun kadang nyeri masih ada. O : pasien mampu melakukan dengan baik A : Masalah belum teratasi P : Lanjutkan intervensi Edukasi 1. menganjurkan untuk mengulangi kembali.</p>	<p>Wahab</p>
	<p>Rabu 09/ Juni / 2021 09:10 WITA</p>	<p>S : Pasien mengikuti anjuran yang diberikan dan akan mengulangi di rumahnya O : Pasien memahami A : Masalah teratasi P : Intervensi Dihentikan Edukasi 1. Lakukan terapi apabila nyeri muncul kembali 2. Ikuti alur tindakan sesuai yang telah diajarkan</p>	<p>Wahab</p>
	<p>Rabu 09/ Juni / 2021 10:00 WITA</p>	<p>S: Klien mengatakan senang mendengar pengajiannya, Nyeripun perlahan berhenti.</p>	

		<p>O : Pasien mampu melakukan dengan baik A : Masalah Teratasi P : Hentikan intervensi Edukasi 1. menganjurkan pasien untuk mengulangi kembali apabila nyeri muncul</p>	<p>Wahab</p>
--	--	---	--------------



BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian Keperawatan

Dalam hal laporan akhir perawat dilakukan pengkajian pada tanggal 7 Juni 2021 di rumah Ny R, kunjungan antenatal care (ANC) pasien di Bajeng Medical Center Kabupaten Gowa, disimpulkan Hasil evaluasi Ny R adalah 31 tahun menggunakan HPHT pada tanggal 20 Juni 2020, berat sebelum hamil 60 Kg, TFU: 23 cm, Léopold I: Bokong, Léopold II: PUKA, Léopold III: Kepala, Léopold IV : BAP. Pelanggan mengatakan bahwa ia telah sakit kepala selama 2 minggu sekarang dan pasien tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Riwayat obstetri pasien adalah G1P0A0, pasien melaporkan bahwa ini adalah kehamilan pertama.

Hasil pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum pasien baik, fisik dan kooperatif, Berat Badan : 65 Kg, TB : 165 cm, TD : 1 0/80 mmHg, N : 88 x/i, P : 2 x/i, S : 36,7 ° C. Pasien melaporkan sakit kepala. Lokasi nyeri di belakang kepala, nyeri seperti tegang menggunakan skala nyeri (ringan). Kasus Ms. R. secara teoritis adalah penyebab priigravida. Primigravida adalah ibu hamil yang pertama kali. Peningkatan tekanan darah ditemukan pada priigravida dibandingkan dengan multigravida, terutama pada primata muda. Primigravida berada pada peningkatan risiko terkena tekanan darah tinggi selama kehamilan karena ini adalah paparan pertama mereka terhadap virus koroid. Hal ini terjadi karena pada wanita, proses imunologi untuk pembentukan HLAG-mediated blocking antibody terhadap antigen plasenta belum terbentuk secara sempurna, sehingga engraftment trofoblas ke dalam jaringan ibu terganggu (Dian Pratiwi, 2020).

2. Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis muncul adalah nyeri. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berhubungan dengan kerusakan atau fungsi jaringan yang sebenarnya. Hasil wawancara dengan beberapa bidan menunjukkan bahwa ibu hamil dengan preeklamsia biasanya tidak mengalami hipertensi saat antenatal care (ANC), tetapi mengalami perdarahan mendadak. Tekanan meningkat selama atau menjelang akhir trimester. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu R tentang tanda dan gejala antara lain menyatakan bahwa dalam dua minggu terakhir sering mengalami sakit kepala, selain itu Ibu R mengatakan kehamilan ini merupakan kehamilan pertama.

3. Analisis Intervensi Keperawatan

Tindakan keperawatan yang dilakukan dalam pengkajian nyeri akut adalah terapi enigmatic surah Maryam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sang (Arif Hendra, 2020) menunjukkan bahwa penggunaan terapi murotal surah Maryam mengaktifkan sel-sel tubuh dengan memperbaharui getaran suara berupa penangkapan gelombang otot, sehingga mengurangi rangsangan reseptor nyeri. , otak mengeluarkan opioid endogen alami. . Opiat ini memiliki efek permanen dalam memblokir reseptor rasa sakit. Arif mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa penurunan skala nyeri ini mungkin disebabkan oleh efek analgesik sedatif yang memberikan respon berupa perasaan nyaman dan relaksasi yang memungkinkan pasien untuk mengontrol diri jika terjadi ketidaknyamanan, sehingga mengakibatkan

penurunan respon nyeri. Penelitian Sang (Nani Mulyani, 2019) menemukan bahwa terapi huruf Maryam efektif dalam mengurangi rasa sakit. Namun hype yang diberikan oleh keluhan nyeri pasien tidak mempan karena waktu yang diberikan hanya satu hari.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian (Nani Mulyani, 2019) yang menjelaskan bahwa pemberian terapi murotal yang efektif yang diberikan selama kurang lebih 3 hari dapat terjadi karena jeda waktu yang relatif singkat. Pada penelitian ini diberikan perlakuan selama tiga hari berturut-turut. Ada dua sesi setiap hari dan waktu perawatan untuk setiap sesi adalah 30 menit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penurunan skala nyeri antara sesi pertama dan kedua tidak signifikan pada hari ke1, namun mengalami penurunan nyeri yang signifikan hanya pada hari ke2 dan ke3 persawahan. Surah Maryam adalah Surah ke19 dalam Alquran dan termasuk dalam Surah Makiya karena memiliki total 98 puisi dan hampir semua puisi diturunkan sebelum migrasi Nabi Muhammad. Surat ini disebut Mariam karena sebagian besar isinya menggambarkan Mariam dari Bani Israel dan keluarganya. Dalam ayat 1621, Mariam dikatakan sebagai seorang wanita yang membela kehormatannya dan mencoba untuk menjauh dari laki-laki dan banyak anak-anak Israel. Karena kepribadiannya yang mulia, Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk mengumumkan bahwa dia telah terpilih menjadi ibunda Nabi Isa. Mengerjakan. Dia belum pernah disentuh oleh seorang pria. (Rahman Mukhlis M, 2020)

4. Analisis Implementasi Keperawatan

Pemberian Terapi Surah Maryam di lakukan selama 3 hari pada tanggal 07-09 Juli 2021 di Puskesmas Bajeng didapatkan hasil:

- a. Perlakuan 1: Tanggal 07 Juli 2021, Sebelum dilakukan pemberian tindakan terlebih dahulu evaluasi perasaan dan keluhan pasien dikaji atau ditanyakan. Di dapatkan hasil pasien mengeluh badannya terasa nyeri pada bagian pinggang sampai punggung, suhu tubuh 37,2⁰C, badan terasa pegal-pegal. Setelah dilakukan tindakan Terapi Surah Maryam dievaluasi kembali , didapatkan hasil nyeri klien berkurang, dibuktikan dengan hasil P,Q,R,S ditabel pengkajian dan implementasi studi kasus di bagian pengkajian.
- b. Perlakuan ke Dua: Tanggal 08 Juli 2021, Sebelum dilakukan tindakan Terapi Surah Maryam kembali dilakukan evaluasi perasaan dan keluhan dan didapatkan hasil pasien mengatakan bahwa nyerinya mulai berkurang,. Setelah diberikan tindakan terapi surah Maryam terjadi penurunan tingkat yang signifikan tidak seperti sebelumnya.
- c. Perlakuan ke tiga: Pada tanggal 09 Juli 2021 Sebelum dilakukan tindakan Terapi Surah Maryam kembali dilakukan evaluasi perasaan dan keluhan dan didapatkan hasil pasien mengatakan bahwa nyerinya berkurang saat dilakukan terapi surah maryam. Setelah diberikan tindakan intervensi terjadi penurunan nyeri signifikan dan perlahan mendekati normal.

Dalam Tafsir Al-Mishbah karya (Shihab, 2002) Dalam Firman-Nya: *“inkuntum muqinin” jika kamu orang-orang yang yakin*, dipahami oleh

sementara ulama dalam arti: “Jika kamu meyakini jawabanku ini, maka kamu akan mengetahui bahwa kerajaan Fir'aun yang dibangga-banggakannya hanya terbatas dalam satu wilayah saja di muka bumi. Itu sangat tak pantas disejajarkan dengan kerajaan Tuhan Penguasa dan Pengendali alam raya.”. Memahami kalimat tersebut dalam arti: “Jika kamu menyandang sifat-sifat orang-orang yang yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip agama. serta pembenaran yang penuh tentang keyakinan, maka pastilah kamu mengetahui hal ini, dan bahwa tidak ada jawaban lebih tepat dari apa yang kusampaikan, karena alam raya ini berubah-ubah, dan tentu saja ada kekuatan yang mengubah-ubahnya.”(Shihab, 2002)

5. Analisis Evaluasi Keperawatan

Selama pemberian intervensi Terapi Surah Maryam selama 3 hari didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan tingkat nyeri secepat perlahan. Hari pertama klien mengatakan nyerinya berkurang ,hari kedua nyeri kembali dan pada hari ketiga nyeri turung kembali dengan secara perlahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi murottal surah Maryam efektif dalam menurunkan tingkat nyeri yang dengan diagnosis medis Preeklamsi.

B. Analisis Intervensi EBP

Terapi murottal menggunakan media Al-Qur'an (didengar atau dibaca) untuk membantu mendorong perubahan tertentu dalam tubuh baik secara fisiologis maupun psikologis. Al-Qur'an adalah pengobatan yang memuat segala macam aktivitas dan data yang dibutuhkan untuk mengobati berbagai gangguan pada sel-sel tubuh

Mendengarkan Murottal Al-Quran dapat berdampak pada Kecerdasan Emosional (EQ), Kecerdasan Kecerdasan (IQ) dan Kecerdasan Spiritual (SQ) seseorang. Mendengarkan musik murottal menenangkan dan merilekskan orang serta membantu menurunkan tekanan darah (Yuliani, Widyawati, Rahayu, Widiastuti dan Rusmini, 2018).

Quran sebagai pereda nyeri juga telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Penelitian dilakukan oleh (Aini D, 2017). Menggunakan hegemoni pembacaan Quran 10 menit terperinci menunjukkan bahwa 16 dari 31 pasien mengalami pengurangan berbagai skala nyeri. Memang, saat membaca Al-Qur'an, jenis saraf tertentu yang aktif, yaitu saraf yang membaca, mengungkapkan dan mendengar ayat-ayat yang dilantunkan, mengurangi rangsangan menyakitkan yang dikirimkan ke otak.

Menurut tafsir Al-Misbah, dikatakan bahwa orang-orang yang mendapat hidayah Allah dan kembali kepada hidayah-Nya, diklaim adalah orang-orang yang beriman dan jiwanya tenteram setelah bimbang dan bimbang sebelumnya. Kedamaian yang mekar di dada mereka adalah karena dzikir, yaitu mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an, menarik isinya dan penerbitnya. Benar-benar perlu diingat bahwa dengan hanya berdzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, misalnya dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan meminta bukti lagi dan bagi mereka itu adalah kehidupan yang bahagia di dunia dan di masa depan dan juga bagi mereka tempat yang baik untuk kembali, yaitu surga (Shihab, 201)

Sebagaimana dijelaskan oleh Tafsir Al-Mishbah, dapat dipahami bahwa upaya mengingat Allah seperti membaca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an dapat membuat kita tenang, tentram dan tentram. Begitu pula pada orang yang sedang sakit, jika mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an akan merasakan ketenangan dan kedamaian, terbukti dari penelitian (Ariska, 2018) yang menyatakan bahwa membaca Murattal Al-Qur'an merupakan salah satu rangkaian ibadah yang harus dilakukan. menunjukkan keimanan kepada Allah SWT. Karena iman akan membawa kenyamanan bagi jiwa, kedamaian batin, ketenangan dan kemuliaan. Murattal Al-Qur'an yang dilakukan dengan kerendahan hati, ketelitian, kasih sayang dan kesinambungan dapat membawa respon emosional yang positif (berpikir positif) dan motivasi positif dan efektif, efektif menghilangkan rasa sakit.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak dapat melakukan pengukuran nyeri selain P,Q, R, S, T kepada pasien, Dan evaluasi dilakukan tatap muka secara langsung dengan pasien hanya dilakukan sekali dan hari ke dua dan ke tiga dilakukan dengan komunikasi telfon seluler.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan hegemoni terapi murottal surah Maryam pada kasus nyeri akut bisa disimpulkan bahwa manfaat terapi murottal Surah Maryam menaruh respon berupa ketenangan emosional, dan relaksasi sebagai akibatnya pasien sanggup mengontrol nyeri yg dirasakan.

B. Saran

1. Bagi profesi keperawatan, draft akhir 1. ini menjadi acuan tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan maternitas.
2. Untuk pelayanan persalinan dengan pertolongan, tugas akhir ini merupakan tambahan atau kontribusi terhadap pelayanan persalinan prenatal sebagai bagian dari upaya peningkatan pencegahan tekanan darah kehamilan dan preeklamsia.
3. Bagi institusi pendidikan diharapkan dapat dijadikan acuan tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang tidak sedang dalam pengobatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hendra. (Pada 2020). Efikasi terapi murtal terhadap skor nyeri kepala pada klien traumatic brain injury di RSUD dr. Margono Soekarno dan RS Banyumas. 2006–2009..
- Ariska, MD (2018). Pendekatan spiritual untuk mengatasi kecemasan pada lansia.
- Bilano, V. L., Ota, E., Ganchimeg, T., Mori, R., & Souza, J. P. (2014). Risk factors of pre-eclampsia/eclampsia and its adverse outcomes in low- and middle-income countries: a WHO secondary analysis. *PloS One*, 9(3). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0091198>
- Dian Pratiwi. (Pada 2020). Faktor ibu mempengaruhi prevalensi preeklamsia selama kehamilan. *Majalah Utama Medika*, 02 02.
- Diaz, H. R. (2019). *Abraham, C. & Shanley E. 1997. Psikologi Sosial untuk Perawat. Jakarta: Buku kedokteran EGC. Adnani, H. 2011. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Nuha Medika. Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta. Atipah. 2016. Faktor yang Berpengaruh terhadap Minat Masyarakat dalam Keikutsertaan Program Jamkesda di Desa Banjarlor Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Skripsi, Universitas Negeri Semarang. Azwar, S. 2012. Reliabilitas dan Validitas. Ed.*
- Dinas Kesehatan Provinsi Sul - Sel. (2017). *PK-2017*.
- Fikar Ahmad, Z., Surya Indah Nurdin, S., Kesehatan Masyarakat, J., Olahraga dan Kesehatan, F., Negeri Gorontalo, U., Studi Kebidanan, P., Ilmu Kesehatan, F., & Muhammadiyah Gorontalo, U. (2019). FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMSI DI RSIA SITI KHADIJAH GORONTALO. *Akademika*, 8(2), 150–162. <https://journal.umgo.ac.id/index.php/akademika/article/view/408>
- JY Johnson. (201). Perawat kebidanan. Yogyakarta: Rumah Penerbit Rapha. Karjatin, A. (2016).
- Keperawatan Maternitas: Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (Pada 2020). Menyelesaikan Revisi KIA 2020 (hal. 16).
- Lalenoh, DC (2018a). Eklampsia dan eklampsia berat: manajemen anestesi perioperatif (edisi pertama). Menerbitkan. Lalenoh, DC (2018b).

- Eklampsia dan eklampsia berat: manajemen anestesi perioperatif (edisi pertama). Yogyakarta: Bahasa Inggris yang Dalam.
- Nani Mulyani. (2019). *Perbedaan Pengaruh Terapi Murottal selama 15 Menit dan 25 Menit terhadap Penurunan Skala Nyeri pada Pasien Kanker Pasca Bedah*. 1(1), 77–88.
- Nur, A. F., & Arifuddin, A. (2017). FAKTOR RISIKO KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI RSUD ANUTAPURA KOTA PALU. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 3(2), 69–75. <https://doi.org/10.22487/HTJ.V3I2.55>
- Hendra. (Pada 2020). Kemanjuran terapi murottal pada skor sakit kepala pada pasien cedera otak traumatis di Rumah Sakit GS. dr. Margono Soekarno dan RS Banyumas. 2006–2009 ..Ariska, MD (2018).
- Pendekatan spiritual untuk manajemen kecemasan pada orang tua. Bilano, V.L., Ota, E., Ganchimeg, T., Mori, R. dan Souza, J. P. (201).
- Faktor risiko preeklampsia/eklampsia dan efek sampingnya di negara berpenghasilan rendah dan menengah: analisis sekunder WHO. PLoS Satu, 9 (3). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0091198>Dian Pratiwi. (Pada 2020).
- Faktor ibu mempengaruhi prevalensi preeklampsia selama kehamilan. *Majalah Utama Medika*, 02 02. Diaz, H.R. (2019).
- Abraham, C. dan Shanley E. 1997. Psikologi Sosial untuk Perawat. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Adnani, H. 2011. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Nuha Medis.
- Arikunto, S. 2010. Proses penelitian: pendekatan praktis. Jakarta: PT Rineka Cipta. Atipah. 2016.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk mengikuti program Jamkesda di Desa Banjarlor, Kecamatan Banjarharjo, Ibukota Brebes. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.
- Azwar,S.2012.Reliabilitas dan Validitas. d.Kantor Provinsi de la santé de Sul Sel. (2017). PK2017.
- Fikar Ahmad, Z., Surya Indah Nurdin, S., Kesehatan Masyarakat, J., Olah Raga dan Kesehatan, F., Negeri Gorontalo, U., Penelitian Kebidanan, P., Ilmu Kesehatan, F. dan Muhammadiyah Gorontalo, U . .2019.

- Risnah dan Muh Irwan. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan* (Musdalifah, Ed.). Alauddin University Press.
- Risnah, R. (2018). *Sejarah, Teori dan Model Keperawatan*.
- Risnah, R., Yustilawati, E., & Agrevita, A. (2021). EVIDENCE BASED NURSING TERAPI MUROTTAL PADA KLIEN PREEKLAMPSIA POST SECTIO CAESAREA. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan Nasional*, 3(2). <http://journal.unas.ac.id/health/article/view/1373>
- Saifuddin, A. B. (2016). *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan Neonatal*. Jakarta: YBP-SP.
- Setiowati Wiulin, & Asnita Nurul. (2020). PENGARUH TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN SURAH MARYAM TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA IBU HAMIL TRIMESTER III /. <https://www.jurnal-kesehatan.id/index.php/JDAB/article/view/169/145>
- Shihab, M. Q. (2014). *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol IV, Vol VII*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, Moh. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sholeh, Moh. (2015). *Agama sebagai Terapi: Telaah menuju ilmu kedokteran holistik*. pustaka pelajar.
- SIKI. (2018a). *Standar Intevensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- SIKI. (2018b). *Standar Intevensi Keperawatan Indonesia : Definisi dan Tindakan Keperawatan* (Edisi 1). DPP PPNI.
- SLKI. (2019a). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI.
- SLKI. (2019b). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia : Defenisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*. DPP PPNI.
- Sulaiman Endang Sutisna. (2021). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN: Teori dan Implementasi - Endang Sutisna Sulaiman - Google Buku*.
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qOpIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA374&dq=Sulaeman.+Pemberdayaan+Ma+syarakat+di+Bidang+Kesehatan+Teori+dan+Implementasi.+Gajah+Mada+University+Press,+Yogyakarta>

arta,+2012&ots=qKY5reXX2d&sig=h_VLfc3mkhBjU1huKnMQQVppkwY
&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat PPNI.

van Middendorp, D., Asbroek, A. T., Bio, F. Y., Edusei, A., Meijjer, L., Newton, S., & Agyemang, C. (2013). Rural and urban differences in blood pressure and pregnancy-induced hypertension among pregnant women in Ghana. *Globalization and Health*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1744-8603-9-59/TABLES/2>

Wang, W., & Wang, Y. (2020). *Nomogram-based Prediction of Pre-eclampsia in First Trimester of Gestation. Pregnancy Hypertension*.

Wang, W., & Wang, Y. (2020). *Nomogram-based Prediction of Pre-eclampsia in First Trimester of Gestation. Pregnancy Hypertension*.

WHO. (2019). *World health statistics 2019: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. L'IV Com Sàrl, Switzerland.

Yuliati Melyana. (2018). *Terapi Murottal Sebagai Upaya Menurunkan Kecemasan Dan Tekanan Darah Pada Ibu Hamil Dengan Preeklampsia : Literature Review Dilengkapi Studi Kasus*. 8(2), 79–98.

Zhang, Ming MD, P. (2020). *Preeclampsia Among African American Pregnant Women: An Update on Prevalence, Complications, Etiology, and Biomarkers. Obstetrical and Gynecological Survey*, 75, 10.

Referensi: <https://tafsirweb.com/5067-surat-maryam-ayat-21.html>

<http://belajartafsiralquran.blogspot.com/2016/06/19-surah-maryam-ayat-1-98.html>

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



A.M.ABD WAHAB.BR, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 18 November 1998. Anak Pertama dari lima bersaudara pasangan Drs Burhanuddin S.Pdi.,M.H dan Dra Nurbaya S.Pdi. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jalan alauddin 2, Manuruki 2 Mamoa 5a Makassar. Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 176 Sinjai Selatan pada tahun 2010. Pada tahun selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah menengah pertama (MTS) Hidayatullah Lopi dan tamat pada tahun 2013, pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan menengah atas (SMA) Negeri 1 Sinjai Tengah dan tamat pada tahun 2016 dan kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan pada Program Studi Keperawatan kemudian Peneliti menyelesaikan kuliah strata 1 (S1) pada tahun 2021 dan melanjutkan pendidikan Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) dan dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah pada 28 Januari 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R