

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL  
PADA NY “D” DENGAN ANEMIA DI RSIA  
SITTI KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TANGGAL 18 JANUARI - 28 JANUARI 2022**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Pendidikan  
Ahli madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan  
Pada Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :  
FATMAH JUNIA SARI BAHASOAN  
70400118033**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2021**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmah Junia Sari Bahasoan

NIM : 70400118033

Tempat/Tgl.lahir : Makassar, 02 Juni 2000

Jurusan/Fakultas : DIII Kebidanan/Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa, Maret 2022

Penulis

FATMAH JUNIA SARI BAHASOAN

NIM: 70400118033

### PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fatmah Junia Sari Bahasoan  
Nim : 70400118033  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "D" Dengan Anemia Di RSIA Siti Khadijah I Muhammadiyah Makassar  
Tanggal 18 Januari – 28 Januari 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada seminar ujian Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Semesta, Desember 2021

Pembimbing I



Zelna Yuri Andryani, S.ST., M.Keb  
NIP: 198903282019032018

Pembimbing II




Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kea  
NIP: 198007012006042002

### PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Intronatal Pada Ny "D" Dengan Anemia Di RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar Pada Tanggal 18 Januari – 28 Januari 2022". Yang disusun oleh Fatmah Junia Sari Bahasoan Nim : 70400118033, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 18 Maret 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Maret 2022  
15 Sya'ban 1443 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(  )
Sekretaris	: Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb	(  )
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(  )
Pembimbing II	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(  )
Penguji I	: Firdayanti, S.Si.T., M.Keb	(  )
Penguji II	: Dra. Hj. Hartini, M. Hi	(  )

Diketahui oleh:

  
Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

   
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘Alamin puji syukur penulis haturkan kepada Allah swt, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Anemia DI RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar Tanggal 18 Januari-28 Januari 2022.** Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulis maupun dari penyajiannya. Oleh karena itu saran, masukan, dan kritik yang bersifat membangun sangat dibutuhkan oleh penulis guna memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang ada dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

Terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini karena terdapat bantuan dari berbagai pihak yang terlibat, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus

pembimbing II karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah

3. Ibunda Firdayanti, S.ST.,M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar sekaligus sebagai penguji I karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah
4. Ibunda Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST.,M.Keb selaku sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar.
5. Ibunda Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku pembimbing I karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dan penyusunan karya tulis ilmiah
6. Ibunda Dra. Hj. Hartini, M. Hi selaku penguji II karya tulis ilmiah yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan karya tulis ilmiah
7. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini berlangsung.

8. Kepada Di rektur RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
9. Kepada kedua orang tua saya, Ayahanda tercinta Abdulrahman Bahasoan dan Ibunda tercinta Agustini serta saudara-saudaraku tercinta Kakak saya sakinah, kembaran saya Fatimah, dan adik saya Rati yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, bimbingan dan mendukung setiap perjalanan menuju cara membahagikan kalian.
10. Kepada seluruh teman-teman kebidanan angkatan 2018 terkhusus hena, nengsi, tika, umrah, rini, santi, ikki dan putri yang selalu memberikan dukungan, semangat dan memberikan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
11. Kepada semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak Amiin.

*Akhirul Kalam*, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang DIII Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu

penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.


Samata-Gowa, Maret 2022

Penulis



FATMAH JUNIA SARI BAHASOAN

NIM: 70400118033




## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan .....	6
C. Tujuan Penulisan .....	6
D. Manfaat Penulisan .....	8
E. Metode Penulisan .....	9
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Konsep Dasar Persalinan.....	12
1. Pengertian Persalinan .....	12
2. Jenis-Jenis Persalinan .....	16
3. Tujuan Asuhan Persalinan.....	19
4. Penyebab Terjadinya Persalinan .....	20
5. Tanda-Tanda Persalinan.....	23
6. Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	27
7. Tahapan Persalinan .....	34


8. Mekanisme Persalinan.....	37
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Anemia.....</b>	<b>44</b>
1. Defenisi Anemia.....	44
2. Patofisiologi Anemia.....	45
3. Tanda Dan Gejala Anemia .....	48
4. Klasifikasi Anemia.....	48
5. Faktor Penyebab Anemia .....	51
6. Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Anemia .....	52
<b>C. Tinjauan Khusus Tentang Anemia Persalinan .....</b>	<b>54</b>
1. Patofisiologi Anemia Persalinan .....	54
2. Tanda Dan Gejala Anemia Persalinan .....	55
3. Dampak Anemia Pada Persalinan .....	56
4. Penatalaksanaan Anemia Pada Persalinan .....	59
<b>D. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Anemia Pada Persalinan .....</b>	<b>61</b>
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan .....	61
2. Tujuan Utama Asuhan Kebidanan .....	62
3. Tahapan Manajemen Kebidanan.....	62
4. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan .....	71
<b>BAB III STUDI KASUS .....</b>	<b>73</b>
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.....	73
B. Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	93
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>138</b>
A. Kala I.....	138
B. Kala II.....	149
C. Kala III .....	154
D. Kala IV .....	158
E. Kunjungan Nifas .....	162

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>169</b>
A. Kesimpulan .....	169
B. Saran.....	170
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>172</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: bidang hodge .....	28
Gambar 2 : jenis panggul .....	28
Gambar 3 : syclitismus .....	38
Gambar 4: asynclitismus .....	38
Gambar 5 : asynclitismus posterior .....	38
Gambar 6 : kepala fleksi .....	40
Gambar 7 : putaran paksi dalam .....	41
Gambar 8 : fleksi, defleksi, ekstensi .....	42
Gambar 9 : putaran paksi luar .....	43
Gambar 10 : ekspulsi .....	43
Gambar 11 : partograf .....	57



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Dokumentasi saat dilakukan asuhan
- Lampiran II : Surat permohonan pengajuan kode etik kepada komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Lampiran III : Surat keterangan layak etik dari komite etik penelitian kesehatan FKIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Lampiran IV : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Povinsi Sulawesi Selatan kepada RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- Lampiran VI : Surat melakukan penelitian pada RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

**Fatmah Junia Sari Bahasoan, 7040011833**

**Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani**

**Pembimbing II : Syatirah**

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “D” Di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar Tanggal 18 Januari - 28 Januari 2022”

---

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin hematokrit dan jumlah eritrosit di bawah nilai normal. Pembagian dari anemia dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: anemia ringan bila kadar Hb < 10gr/dl, anemia sedang bila kadar Hb 7-8 gr/dl, dan anemia berat bila kadar Hb <6 gr/dl.

WHO menyatakan bahwa anemia merupakan penyebab penting dari kematian ibu saat hamil maupun melahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase kematian ibu saat ibu melahirkan akibat anemia adalah 70% dan sekitar 19,7% akibat hal lain. Pentingnya melakukan asuhan yang tepat dan tingginya kasus anemia pada persalinan. Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan intranatal dengan anemia pada ibu di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar sesuai dengan kebutuhan dan wewenang bidan, menggunakan metode manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny “D”, menunjukkan bahwa kala I, kala II, III, dan IV berlangsung dengan normal dan baik. Bayi lahir normal dengan kondisi yang baik.

Kesimpulan dari studi kasus dengan melakukan pengkajian berupa anamnesis dan pemantauan pada ibu intranatal dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tanggal 18 Januari - 28 Januari 2022, telah dilakukan pengkajian, analisa, dan pendokumentasian terkait semua tindakan yang telah dilakukan dengan hasil tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

**Kata Kunci : Persalinan, Anemia, 7 Langkah Varney**

## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, 2020

Fatmah Junia Sari Bahasoan, 7040011833

Supervisor I : Zélna Yani Andreyani

Supervisor II : Syatirah

The Intranatal Midwifery Care Management for Mrs "D" at RSLA Siti Khadijah I of Muhammadiyah Makassar from January 18<sup>th</sup> to January 28<sup>th</sup> 2022

Anemia is a condition in which a decrease in the hemoglobin and hematocrit levels occurs. As a result, the number of erythrocytes is below normal. The anemia could be divided into three categories, namely: mild anemia when the Hb level is <10 g/dl; moderate anemia when the Hb level is 7-8 g/dl; and severe anemia when the Hb level is <6 g/dl.

WHO announced that anemia was considered to be the major cause of maternal mortality during pregnancy and childbirth delivery. The findings of previous research showed that the percentage of maternal mortality during childbirth because of anemia was 70%, while there were only about 19.7% of cases due to other reasons. Therefore, based on the aforementioned problem, it is essential to conduct proper treatment in dealing with the high occurrences of anemia in childbirth. The purpose of this study was to investigate and provide intranatal midwifery care management on a pregnant patient with anemia at RSLA Siti Khadijah I of Muhammadiyah Makassar. The research was conducted in accordance with health and midwifery standards by using the 7-stages of Vamey midwifery care management and SOAP documentation procedure.

The findings of this study indicated that despite the anemia problem faced by Mrs. "D", the delivery from the stage I to IV was considered to be running well and normal without any complications. Moreover, the newborn was also in good and healthy condition.

This study concluded that the treatment of the patient was well conducted where the anamnesis and regular monitoring were carried out from January 18<sup>th</sup> to January 28<sup>th</sup> 2022. Furthermore, the assessment, analysis, and documentation related to all actions and treatment were documented. Hence, it could be suggested that the findings of this research were in line with previous theories.

Key Words: Delivery, Anemia, 7-stages of Vamey



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persalinan adalah suatu proses yang normal tetapi jika tidak dikelola dengan tepat dapat menjadi abnormal. Masih banyak para ibu hamil yang mengalami komplikasi saat persalinan. Karena tingkat kesehatan ibu, kurang pemahaman ibu tentang kehamilan, dan kurang pemahaman ibu tentang pemeriksaan kehamilan yang mengakibatkan saat persalinan mengalami komplikasi atau penyulit. Komplikasi itu sendiri dapat mengancam nyawa ibu dan janin saat persalinan berlangsung. Jika kehamilan anemia tidak dapat teratasi dengan baik akan mengakibatkan komplikasi pada proses persalinan (Latifah et al., 2017).

Salah satu indikator pembangunan dibidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi Hasil Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tercatat angka kematian ibu (AKI) meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 350/100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian ibu terbanyak didominasi perdarahan (31,79%), hipertensi dalam kehamilan (24,62%), infeksi (5,54%), partus lama (4,74%) dan abortus (1,09%), serta penyebab lain-lain (32,22%) cukup besar, termasuk dalamnya penyebab penyakit non obstetrik (Latifah et al., 2017).

Anemia dalam bahasa Yunani yang berarti tanpa darah, adalah penyakit kurang darah yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) dan sel darah merah (eritrosit) lebih rendah dibandingkan normal. Anemia merupakan salah satu kelainan darah yang umum. Anemia untuk pria dapat dikatakan jika kadar hemoglobin kurang dari 13,5 gram/100dl dan untuk wanita sebagai hemoglobin kurang dari 12,0 gram/100ml. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar <10,5 gr% pada trimester II, anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan karena pada kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan dalam dan sumsum tulang (Latifah et al., 2017).

Anemia defisiensi zat besi lebih cenderung berlangsung di negara yang sedang berkembang daripada negara yang sudah maju. Sekitar 35-75% orang di negara berkembang mengalami anemia jenis ini, sedangkan prevalensi di negara maju hanya sekitar 8-14%. Adapun prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika sebesar 57,1%, Asia 48,2%, Eropa 25,1% dan Amerika 24,1%. WHO menyatakan bahwa anemia merupakan penyebab penting dari kematian ibu saat hamil maupun melahirkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kematian ibu saat ibu melahirkan akibat anemia adalah 70% dan sekitar 19,7% akibat hal lain (WHO, 2015).

Anemia pada ibu hamil disebabkan beberapa hal antara lain karena kekurangan zat gizi dalam makanan yang dikonsumsi dan terjadi pengenceran darah atau *hemodilisis*. Anemia yang sering terjadi adalah defisiensi zat besi

pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya (Rahmawati et al., 2016).

Anemia ini dapat disebabkan oleh kekurangan bermacam nutrisi penting dalam pembentukan hemoglobin. Defisiensi zat besi yang umum terjadi di dunia merupakan penyebab utama terjadinya anemia gizi (Retnorini et al., 2017).

Jumlah kematian ibu tahun 2016 yang dilaporkan terdiri dari kematian ibu hamil 47 orang (30,71%), kematian ibu bersalin 44 orang (27,45%) dan kematian ibu nifas 62 orang (40,52%). (Profile Dinas Kesehatan SulSel, 2017). Jumlah anemia pada Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar 28,1%. Pemberian tablet Fe di Sulawesi Selatan yaitu pemberian Fe 1 (90 tablet) sebesar 97,40% dan Fe 3 (90 tablet) sebesar 89,57%. Pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah ibu hamil dengan anemia sebesar 47,8% (Dinas Kesehatan Sulsel, 2017).

Anemia diketahui berkaitan dengan banyak faktor, seperti status sosial ekonomi yang buruk, pola makan yang buruk dari segi kuantitas dan kualitasnya kurang sehat, kurangnya kesadaran gizi, dan tingginya tingkat penyakit menular. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanarayana tahun 2016 dimana anemia lebih banyak ditemukan pada keluarga dibawah garis kemiskinan (59,4%) dibandingkan dengan keluarga diatas garis kemiskinan (5,4%). Timbulnya anemia yang terjadi pada saat masa kanak-kanak apabila tidak ditangani akan merosot kemasa remaja pada anak perempuan, dan apabila masih tidak tertangani akan berlangsung ke masa kehamilan dan akan berakibat fatal

pada masa persalinan. Pada wanita hamil anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan ini adalah gangguan kekurangan nutrisi yang paling umum terjadi di Indonesia (Suryanarayana et al., 2016).

Anemia dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan karena hemoglobin yang membawa oksigen ke jaringan tubuh tidak cukup untuk membawa pasokan oksigen dalam jaringan sehingga banyak jaringan dan organ dalam tubuh akhirnya dapat terganggu. Anemia dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk kelelahan dan stress pada organ tubuh. Sebagaimana hasil penelitian yang dikemukakan Ratna dalam Nurmawati dimana ibu dengan anemia 63,5% dapat menyebabkan persalinan lama (Nurmawati et al., 2019).

Anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan, resiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian prenatal. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Larumpa tahun 2017, menjelaskan terdapat hubungan antara anemia pada ibu hamil dengan kejadian partus prematur menunjukkan nilai sebesar (39,6%). Perdarahan antepartum dan postpartum lebih sering dijumpai pada wanita yang menderita anemia dan lebih sering berakibat fatal yang disebabkan oleh karena wanita yang anemia tidak dapat menoleransi kehilangan darah. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayah tahun 2018 dimana ibu hamil yang mengalami anemia berisiko 4,35 kali lebih besar mengalami perdarahan postpartum. Sedangkan kita ketahui, bahwa pada perempuan bersalin dapat mengeluarkan darah yang cukup banyak selama proses kelahiran bayi dan setelah

kelahiran plasenta. Dampak anemia dapat bervariasi dari keluhan yang sangat ringan hingga terjadinya gangguan lainnya, berupa: gangguan selama kehamilan (abortus, partus immature atau prematur), gangguan proses persalinan (inersia, atonia, partus lama, perdarahan atonis), gangguan pada masa nifas (sub involusi rahim, daya tahan terhadap infeksi dan stress, kurang produksi ASI rendah), dan gangguan pada janin (abortus, dismaturitas, mikrosomia, BBLR, kematian perinatal, bahkan kelainan bawaan) (Rahyani, 2020).

Penanggulangan atau pencegahannya yang dapat dilakukan, keluarga dan anggota keluarga yang resiko menderita anemia harus mendapat makanan yang cukup bergizi, pengobatan penyakit infeksi yang memperbesar resiko anemia, penyediaan pelayanan yang mudah dijangkau oleh keluarga yang memerlukan dan tersedianya tablet tambah darah dalam jumlah yang sesuai. Penelitian ini didukung oleh Tanzuha tahun 2016 dimana ibu hamil dengan status gizi KEK (kurang energi kronis) berpeluang 1,975 kali (95%) untuk mengalami anemia, dibandingkan ibu hamil dengan status gizi normal (Parulian et al., 2016).

Namun, pada anemia berat resiko untuk terjadi ibu dan bayi akan semakin besar. Oleh karena itu, direkomendasikan pemeriksaan darah lengkap di awal kehamilan untuk mencegah terjadinya dampak buruk anemia pada persalinan dan nifas (Wirahartari et al., 2019).

Berdasarkan rekam medik di Rumah Sakit Ibu Dan Anak Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar menunjukkan jumlah persalinan dengan anemia pada

periode 2020 dimulai dari Januari-Desember terdapat 235 kasus persalinan dengan anemia pada persalinan.

Banyaknya hal yang harus diperhatikan saat proses persalinan menjadi acuan untuk melakukan perawatan yang tepat. Penanganan ibu bersalin dengan anemia yang tepat akan memperkecil resiko kelainan atau bahkan kematian pada ibu bersalin. Selain itu penanganan yang benar dapat memastikan semua proses dalam batas normal yang dapat membantu menurunkan resiko patologi sehingga tujuan menurunkan angka kematian ibu dapat tercapai. Pentingnya melakukan asuhan yang tepat dan tingginya kasus anemia pada persalinan yang terjadi di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar membuat penulis tertarik untuk mengambil judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Anemia“ dilihat dari hasil tinjauan buku, jurnal dan referensi lainnya.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup karya tulis ilmiah ini meliputi manajemen asuhan kebidanan intranatal pada ibu dengan anemia pada persalinan.

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny  
“X“ dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar

## 2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakan Pengumpulan data dasar, pengkajian pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- b. Dirumuskan identifikasi diagnosa/masalah aktual pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- c. Dapat mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial yang kemungkinan timbulnya pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- d. Diidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- e. Ditetapkan penyusunan dan perumusan rencana tindakan asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- f. Dilaksanakan Tindakan asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar
- g. dievaluasikannya efektivitas tindakan yang telah dilakukan pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "X" dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar

- h. Dilakukan pendokumentasian hasil pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “X” dengan anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat bagi penulis**

- a. Penulisan dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru dalam pemberian asuhan kebidanan terhadap klien dengan anemia dalam persalinan.
- b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir Program Studi D3 kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

##### **2. Manfaat Bagi Pembaca**

Dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca tentang anemia dalam persalinan.

##### **3. Manfaat Bagi Institusi**

Sebagai literatur dan referensi bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah berikutnya.

##### **4. Manfaat Bagi Praktisi**

Sebagai sumber informasi supaya dapat mengurangi mortalitas dan morbiditas pada persalinan dan memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada klien dengan penerapan manajemen asuhan kebidanan dengan anemia pada persalinan.

## **E. Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

### **1. Studi Kepustakaan**

Membaca dan mempelajari berbagai buku, jurnal penelitian dan literatur yang berkaitan dengan anemia dalam persalinan dan partus lama sebagai dasar teoritis yang digunakan pada pembahasan proposal ini.

### **2. Studi Kasus**

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan langkah yang meliputi: Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

### **3. Studi Dokumentasi**

Studi yang mempelajari status klien, baik yang bersumber dari catatan buku status pasien seperti catatan dokter atau bidan.

### **4. Diskusi**

Melakukan diskusi dengan ibu dan keluarga, diskusi dengan dosen pembimbing lahan dan juga pembimbing institusi yang membantu untuk penyusunan Karya Tulis Ilmiah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini adalah: pada bab 1 pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.


Pada bab II yaitu tinjauan teoritis, akan menguraikan tentang tinjauan umum tentang persalinan normal, anemia, tinjauan islam yang berhubungan dengan manajemen asuhan persalinan, dan manajemen asuhan kebidanan dengan anemia pada persalinan, serta pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan dengan anemia pada persalinan.

Pada bab III yaitu study kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi dasar, identifikasi diagnosa/ masalah aktual, identifikasi diagnosa/ masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi rencana tindakan dan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Pada bab IV yaitu pembahasan akan membahas tentang perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan serta praktek yang dilakukan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar Dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan anemia pada persalinan.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan, saran dan semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan. Kemudian

selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat literature ilmiah yang dijadikan rujukan dalam penulisan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Persalinan Normal**

##### **1. Pengertian Persalinan**

- a. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup diluar uterus melalui vagina ke dunia luar. Persalinan normal atau persalinan spontan adalah bila bayi lahir dengan letak belakang kepala tanpa melalui alat-alat atau pertolongan istimewa serta tidak melukai ibu dan bayi, dan umumnya berlangsung dalam kurung dari 24 jam (Wiknjosastro dalam Oktarina, 2016).
- b. Persalinan adalah suatu proses yang dimulai dengan adanya kontraksi uterus yang menyebabkan terjadinya dilatasi progresif dari serviks, kelahiran bayi, kelahiran plasenta dan proses tersebut merupakan proses alamiah (Rohani dalam Oktarina, 2016).
- c. Persalinan adalah rangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibunya, dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Yuni & Widy, 2018).
- d. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi (bayi dan plasenta) secara alami, yang dimulai dengan adanya kontraksi yang adekuat pada uterus, pembukaan dan penipisan serviks (Widiastini, 2018).
- e. Persalinan merupakan proses membuka dan menipisnya serviks dan janin turun ke dalam jalan lahir kemudian berakhir dengan pengeluaran

bayi yang cukup bulan atau hampir cukup bulan atau dapat hidup diluar kandungan atau disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau bukan jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Mutmainnah, 2017).

- f. Persalinan normal merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi yang hidup didalam uterus melalui vagina ke dunia luar yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu) dengan ditandai adanya kontraksi uterus yang menyebabkan penipisan, dilatasi pada serviks, akhirnya mendorong janin keluar melalui jalan lahir dengan presentasi belakang kepala tanpa menggunakan alat bantu (lahir secara spontan) serta tidak ditemukan komplikasi pada ibu dan janin (Indah et al., 2019).

Sedangkan dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang dapat menjelaskan tentang kejadian manusia yang umum terkait dengan tanda-tanda adanya allah, kebesaran dan kekuasaan-Nya. Dalam QS. Al-hajj/22;5.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

Terjemahannya:

“Dalam tafsir al-Misbah ayat diatas menyatakan bahwa: “Hai semua manusia, seandainya kamu memiliki keraguan terhadap keniscayaan hari kebangkitan serta kekuasaan kami untuk menghidupkan manusia setelah meninggalkan dunia ini, maka camkanlah penjelasan kami ini; sesungguhnya kamu tadinya tidak pernah ada di pentas wujud ini, lalu kami dengan kuasa kami menjadikanmu yakni orang tua kamu adam, dari tanah kemudian kamu selakuanaku cucu adam kami jadikan dari *muftah yakni* setetes mani itu kami jadikan *alaqah* setelah bertemu dengan induk telur yang melekat kuat di dinding rahim”.

Kemudian alaqah itu mengalami proses dalam rahim menjadi *mudhghah yakni* sesuatu yang berupa serikat daging kecil yang dapat dikunyah, ada *mudhghah yang* sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses sampai lahir menjadi manusia sempurna, dan ada juga yang tidak sempurna kejadiannya proses ini kami kemukakan agar kami jelaskan kekuasaan kami menciptakan dari tiada menjadi ada, dan dan menjadi hidup, sekaligus menjadi bukti kekuasaan kami membangkitkan kamu setelah mati. Bukankah perpindahan tanah yang mati *nurhfah* sampai akhirnya menjadi bayi yang segar bugar adalah bukti yang tidak dapat diragukan tentang terjadinya peralihan mati menjadi hidup (Al-Misbah, 2002: 154–157).

Kemudian Allah SWT mengeluarkan kamu berdasarkan kekuasaan dan ilmunya dari perut ibu kamu sedang tadinya kamu tidak wujud, demikian juga dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika dia mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui apapun yang ada disekeliling kamu dan dia memberikan bagi kamu pendengaran,

penglihatan dan hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan tujuan Allah SWT menganugerahkannya kepada kamu (Shihab M. Quraish, 2009: 672).

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Q.S An- Nahl:16/78 tentang proses persalinan

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ  
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur”.

Ayat ini mengatakan bahwa sebagaimana Allah SWT mengeluarkan kamu berdasarkan kuasa dan ilmunya dari perut ibu-ibu kamu sedang tadinya kamu tidak berwujud, demikian juga dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika dia mengeluarkan kamu dari ibu-ibu kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun yang ada di sekeliling kamu dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan dan aneka hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah SWT menganugerahkannya kepada kamu (Shihab M. Quraish, 2009).

## 2. Jenis–Jenis Persalinan

Jenis-jenis persalinan terbagi atas dua kategori yaitu,yang pertama berdasarkan bentuk terjadinya dan yang kedua berdasarkan lama kehamilan dan berat janin. Jenis persalinan berdasarkan bentuk terbagi atas 4, yaitu:

### a. Persalinan spontan

Persalinan spontan adalah proses persalinan lewat vagina yang berlangsung tanpa menggunakan alat atau metode apapun dan obat tertentu, baik itu induksi, vakum atau metode lainnya. Persalinan spontan hanya benar-benar mengandalkan tenaga dan usaha ibu untuk mendorong keluarnya bayi.Persalinan spontan dapat dilakukan dengan presentasi belakang kepala (kepala janin lahir terlebih dahulu) maupun presentasi bokong (sungsang).

### b. Persalinan normal

Persalinan normal (eutotia) adalah proses kelahiran janin pada kehamilan cukup bulan (aterm: 37-42 minggu), pada janin letak memanjang presentasi belakang yang disusul dengan pengeluaran plasenta dan seluruh proses kelahiran ini berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam tanpa tindakan pertolongan buatan dan tanpa komplikasi.

### c. Persalinan anjuran (induksi)

Persalinan anjuran adalah persalinan yang baru dapat berlangsung setelah permulaannya dianjurkan dengan sesuatu perbuatan atau

tindakan, misalnya dengan pemecahan ketuban, pemberian oksitosin dan lain-lain.

d. Persalinan tindakan

Persalinan tindakan adalah persalinan yang tidak dapat berjalan normal secara spontan atau tidak berjalan sendiri, oleh karena terdapat indikasi adanya penyulit persalinan sehingga persalinan dilakukan dengan memberikan tindakan menggunakan alat bantu (Sulfianti, 2020).

Jenis persalinan menurut lama kehamilan dan berat janin terbagi atas 6 jenis, yaitu:

a. Abortus

- 1) Eastman: terputusnya kehamilan, fetus belum sanggup hidup diluar uterus, berat janin 400-1000 gram, umur kehamilan kurang dari 28 minggu.
- 2) Jefcoat: pengeluaran hasil konsepsi kurang dari umur kehamilan 28 minggu, fetus belum viable by law (belum sesuai usianya).
- 3) Holmer: terputusnya kehamilan kurang dari umur kehamilan 16 minggu, proses plasenta belum selesai.
- 4) Obstetris: pengeluaran buah kehamilan sebelum kehamilan 22 minggu atau bayi dengan berat badan kurang dari 500 gram(Sulfianti, 2020).

b. Persalinan immaturus

Persalinan sebelum umur kehamilan 22 minggu sampai 28 minggu dengan berat janin kurang dari 500-999 gram.

c. Persalinan prematuritas

Persalinan sebelum umur hamil 28 minggu sampai 36 minggu dengan berat janin kurang dari 1000-2499 gram.

d. Persalinan aterm

Persalinan antara umur hamil 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat badan janin diatas 2500 gram.

e. Persalinan serotinus

Kehamilan serotinus atau postrem merupakan kehamilan yang berlangsung selama 42 minggu atau lebih terhitung sejak awal periode haid yang diikuti oleh ovulasi 2 minggu kemudian. Meskipun kehamilan posterem ini mungkin mencakup 10 persen dari seluruh kehamilan, sebagian diantaranya mungkin tidak benar-benar postterm, tetapi lebih disebabkan oleh kekeliruan dalam memperkirakan usia gestasional. Kemudian kehamilan serotinus.

f. Persalinan presipitatus

Persalinan berlangsung cepat kurang dari 3 jam (Sulfianti, 2020).

Jenis persalinan ini menurut pandangan islam dalam Al-Qur'an surah Ar-rad ayat 8, sebagai berikut:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahannya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ (Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan) apakah ia laki-laki atau perempuan, dan apakah kandungan itu berisi satu atau kembar dan lain sebagainya (tafsir jalalain).

Usai membeberkan bukti-bukti kemahakuasaan-Nya, pada ayat berikut Allah menjelaskan betapa luas ilmu yang dimiliki-Nya. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan berupa janin, baik terkait jenis kelaminnya, berat badan, maupun tinggi badannya kelak semenjak dalam kandungan. Allah juga mengetahui batas usia dan rezeki janin tersebut ketika kelak ia lahir dan tumbuh. Allah pun mengetahui apa yang kurang sempurna dari janin itu dan apa yang bertambah sehingga janin itu tumbuh dan berkembang dalam rahim. Dan segala sesuatu, baik yang ada dalam kandungan maupun tidak, pasti ada ukuran di sisi-Nya.

### 3. Tujuan Asuhan Persalinan

- a. Tujuan asuhan persalinan secara umum adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan, dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan asuhan sayang ibu.
- b. Tujuan khusus asuhan persalinan adalah:
  - 1) Melindungi keselamatan ibu dan BBL

- 2) Memberikan dukungan persalinan normal, mendeteksi dan penatalaksanaan komplikasi tepat waktu
- 3) Memberikan dukungan secara cepat, bereaksi terhadap kebutuhan ibu, pasangan dan keluarga selama persalinan dan kelahiran bayi (Yulianti & Sam, 2019).

#### **4. Penyebab Terjadinya Persalinan**

Selama kehamilan, dalam tubuh wanita hamil terdapat dua hormon yang dominan antara lain:

a. Estrogen

Estrogen merupakan hormon yang berfungsi meningkatkan sensitivitas otot rahim, sehingga memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan rangsangan mekanis.

b. Progesteron

Hormon progesteron berfungsi menurunkan sensitivitas otot rahim, sehingga menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, prostaglandin dan rangsangan mekanis yang menyebabkan otot rahim dan otot polos mengalami relaksasi (Widiastini, 2018).

Pada kehamilan, hormon estrogen dan progesteron berada dalam keadaan seimbang, sehingga kehamilan dapat dipertahankan. Perubahan keseimbangan hormon estrogen dan progesteron menyebabkan hormon

oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofisis pars posterior memicu timbulnya kontraksi yang disebut dengan *Braxton Hicks*.

Oksitosin diduga bekerja sama dengan prostaglandin yang kadarnya mulai meningkat pada usia kehamilan 15 minggu. Selain itu, faktor gizi ibu hamil dan keregangan otot rahim dapat memberikan pengaruh penting terjadinya kontraksi otot rahim.

Otot polos uterus mulai menunjukkan aktivitas kontraksi secara terkoordinasi, diselingi dengan periode relaksasi dan mencapai puncaknya menjelang persalinan serta secara berangsur-angsur menghilang pada periode postpartum. Namun mekanisme pasti yang memicu terjadinya persalinan belum diketahui, sehingga menimbulkan beberapa teori yang berkaitan dengan mulainya persalinan (Widiastini, 2018).

### **Teori Penyebab Terjadinya Persalinan**

#### a. Teori Keregangan Rahim

Otot rahim mempunyai kemampuan meregang dalam batas tertentu, setelah melewati batas tersebut rahim akan mengalami kontraksi yang memicu terjadinya persalinan. Contoh, pada kehamilan ganda, sering terjadi kontraksi pada peregangan tertentu, sehingga terjadi persalinan lebih awal (prematuur) (Widiastini, 2018).

#### b. Teori Penurunan Hormon Progesteron

Produksi hormon progesteron mengalami penurunan pada 1-2 minggu menjelang persalinan, yang menyebabkan otot rahim menjadi lebih

sensitif terhadap oksitosin dan prostaglandin sehingga terjadi kontraksi dan persalinan dapat dimulai (Widiastini, 2018).

c. Teori Oksitosin Internal

Saat umur kehamilan bertambah tua, konsentrasi progesteron mengalami penurunan, dan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofisis pars posterior meningkatkan aktivitasnya dalam merangsang terjadinya kontraksi, sehingga memicu terjadinya persalinan.

d. Teori Prostaglandin

Prostaglandin dihasilkan oleh desidua, meningkat sejak usia kehamilan 15 minggu. Peningkatan kadar prostaglandin dapat memicu kontraksi otot rahim saat kehamilan sehingga dapat menimbulkan persalinan (Widiastini, 2018)

e. Teori Hipotalamus-Pituitari dan Glandula Suprarenalis

1) Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anensefalus sering terjadi kelambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus. Teori ini dikemukakan oleh Linggin di tahun 1973.

2) Malpar pada tahun 1933 melakukan percobaan dengan mengangkat otak (yang didalamnya terdapat hipotalamus dan kelenjar pituitari) kelinci, hasilnya kehamilan kelinci tersebut berlangsung lebih lama.

3) Glandula suprarenal merupakan pemicu terjadinya persalinan

f. Teori Iritasi Mekanik

Pada bagian belakang serviks terdapat ganglion servikale (fleksus frankenhouse). Bila ganglion ini bergeser dan tertekan, misalnya oleh bagian terbawah janin, akan menimbulkan kontraksi yang menyebabkan terjadinya persalinan (Widiastini, 2018).

g. Teori Plasenta Menjadi Tua

Plasenta yang menjadi semakin tua seiring bertambahnya usia kehamilan akan menyebabkan menurunnya kadar estrogen dan progesteron. Hormon progesteron bekerja dengan cara merelaksasikan otot-otot polos, sehingga dengan penurunan kadar progesteron menyebabkan otot polos rahim lebih sensitif terhadap oksitosin, dan otot rahim mulai berkontraksi (Batbual, 2021).

## 5. Tanda-Tanda Persalinan

### a. Tanda bahwa persalinan sudah dekat

#### 1) Lightening

Menjelang minggu ke-36, tanda pada primigravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan oleh kontraksi braxton hicks, ketegangan dinding perut, ketegangan ligamentum rotundum, dan gaya berat janin di mana kepala ke arah bawah. Masuknya bayi ke pintu atas panggul menyebabkan ibu merasakan:

- a) Ringan di bagian atas dan rasa sakitnya berkurang
- b) Bagian bawah perut ibu terasa penuh dan mengganjal

- c) Terjadinya kesulitan saat berjalan
- d) Sering kencing (Mutmainnah, 2017)

2) Terjadinya his permulaan

Makin tua kehamilan, pengeluaran estrogen dan progesteron juga makin berkurang sehingga produksi oksitosin meningkat, dengan demikian dapat menimbulkan kontraksi yang lebih sering.

His permulaan (his palsu). Sifat his palsu, antara lain:

- a) Rasa nyeri ringan dibagian bawah
- b) Datangnya tidak teratur
- c) Tidak ada perubahan pada serviks atau tidak ada tanda-tanda kemajuan persalinan
- d) Durasinya pendek
- e) Tidak bertambah bila beraktivitas (Mutmainnah, 2017).

**b. Tanda-tanda timbulnya persalinan**

1) Terjadinya his persalinan

His (kontraksi rahim yang dapat diraba dan menimbulkan rasa nyeri di perut serta dapat menimbulkan pembukaan serviks kontraksi rahim), dimulai pada 2 *face maker* yang letaknya dekat cornu uteri.

His yang menimbulkan pembukaan serviks dengan kecepatan tertentu disebut his efektif. His efektif mempunyai sifat adanya dominan kontraksi uterus pada fundus uteri (*fundal dominance*), kondisi berlangsung secara sinkron dan harmonis. Kondisi ini juga menyebabkan adanya intensitas kontraksi yang maksimal diantara

dua kontraksi, irama yang teratur dan frekuensi yang kian sering, lama his berkisar 45-60 detik.

Pengaruh his dapat menimbulkan dinding menjadi tebal pada korpus uteri, isthmus uteri menjadi teregang dan menipis, kanalis servikalis mengalami effacement dan pembukaan. His persalinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Pinggang terasa sakit dan menjalar ke depan.
  - b) Sifat his teratur, interval semakin pendek, dan kekuatan semakin besar.
  - c) Terjadi perubahan pada serviks.
  - d) Jika pasien menambah aktivitasnya, misalnya dengan berjalan maka kekuatan hisnya akan bertambah (Mutmainnah, 2017).
- 2) Keluarnya lendir bercampur darah

Lendir berasal dari pembukaan, yang menyebabkan lepasnya lendir berasal dari kanalis servikalis. Dengan pengeluaran darah disebabkan robeknya pembuluh darah waktu serviks membuka.

- 3) Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya

Sebagian ibu hamil mengeluarkan air ketuban akibat pecahnya selaput ketuban. Jika ketuban sudah pecah maka ditargetkan persalinan dapat berlangsung dalam 24 jam. Namun apabila tidak tercapai maka persalinan harus diakhiri dengan tindakan tertentu, misalnya ekstraksi vakum atau section caesaria.

#### 4) Dilatasi dan *effacement*

Dilatasi adalah terbukanya kanalis servikalis secara berangsur-angsur akibat pengaruh his. *Effacement* adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis yang semula panjangnya 1-2 cm menjadi hilang sama sekali sehingga hanya tinggal ostium yang tipis, seperti kertas (Mutmainnah, 2017).

Berdasarkan uraian teori diatas islam juga memiliki pandangan yang sesuai dengan teori tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT tentang his yang membantu dalam proses persalinan dalam QS. Maryam 19:23

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا  
مَّنْسِيًّا

Terjemahannya:

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.”

Dapat disimpulkan bahwa, kata al-ma'had berasal dari kata al-makhdh yaitu gerakan yang sangat keras. Dari sini kata tersebut dapat dipahami sebagai rasa sakit yang terjadi sebelum melahirkan anak. Ayat ini memberikan gambaran besar kebesaran Allah SWT dengan memberikan rasa sakit yang luar biasa untuk membantu kelahiran bayi. Rasa sakit tersebut dalam ilmu kesehatan disebut sebagai His dalam

persalinan yang dirasakan oleh setiap perempuan yang akan melahirkan. His terjadi karena adanya kontraksi yang kuat sehingga mendorong janin kebawah menyebabkan terbukanya serviks. His yang disertai pengeluaran lendir dan darah menjadi tanda dimulainya persalinan.

## 6. Faktor yang mempengaruhi persalinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu:


### a. Passage

Passage atau faktor jalan lahir dibagi atas:

#### 1) Rangka Panggul/Ukuran Panggul

- a) Tulang panggul
- b) Artikulasi
- c) Ruang panggul
- d) Pintu panggul
- e) Sumbu panggul
- f) Bidang-bidang

Bidang hodge I: jarak antara promontorium dan pinggir atas simfisis, sejajar dengan PAP. Bidang hodge II: sejajar dengan PAP, melewati pinggir bawah simfisis. Bidang hodge III: sejajar dengan PAP, melewati spina ischiadica. Bidang hodge IV: sejajar dengan PAP, melewati ujung coccygeus.




Gambar 1: Bidang Hodge

Sumber: buku keperawatan maternitas, 2020

- g) Ukuran-ukuran panggul
- h) Inklinasi pelvis (miring panggul)
- i) Jenis panggul

Ginekoid: paling ideal, bulat 45%, android:panggul pria,segitiga 15%, anthropoid: agak lonjong seperti telur 35%, platypelloid: picak, menyempit arah muka belakang 5% (Diana, 2019).



Gambar 2: Jenis Panggul

Sumber: Buku Asuhan Prenatal, 2018

## 2) Jalan Lahir Lunak/ Otot-Otot Dasar Panggul

Jalan lahir lunak yang berperan dalam persalinan adalah SBR, serviks uteri, dan vagina. Disamping itu otot-otot, jaringan ikat dan ligamen yang menyokong alat-alat urogenital juga sangat berperan dalam persalinan. (Diana, 2019).

### b. Power

Adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. Kekuatan yang mendorong janin keluar dalam persalinan ialah his, kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligament, dengan kerja sama yang baik dan sempurna.

#### 1) His (kontraksi uterus)

Adalah kontraksi uterus karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna dengan sifat-sifat: kontraksi simetris, fundus dominan, kemudian diikuti relaksasi. Pada saat kontraksi otot-otot rahim menguncup sehingga menjadi tebal dan lebih pendek. Kavum uteri menjadi lebih kecil mendorong janin dan kantung amnion ke arah bawah rahim dan serviks. Sifat-sifatnya lain dari his yaitu: involuntary, intermittent, terasa sakit, terkoordinasi dan simetris. Dalam melakukan observasi pada ibu bersalin, hal-hal yang harus diperhatikan dari his adalah:

- a) Frekuensi his: jumlah his dalam waktu tertentu biasanya permenit atau per 10 menit.
- b) Intensitas his: kekuatan his (adekuat atau lemah)

- c) Durasi (lama his): lamanya setiap his berlangsung dan ditentukan dengan detik, misalnya 50 detik.
- d) Interval his: jarak antara his yang satu dengan his berikutnya, misalnya his datang 2-3 menit.
- e) Datangnya his: apakah sering, teratur atau tidak (Diana, 2019).

Terdapat perubahan-perubahan yang diakibatkan karena adanya his, yaitu:

- a) Pada uterus dan serviks: uterus teraba keras atau padat karena kontraksi. Serviks tidak mempunyai otot-otot yang banyak, sehingga setiap muncul his maka terjadi pendataran (effacement) dan pembukaan (dilatasi) dari serviks.
- b) Pada ibu: rasa nyeri karena iskemia rahim dan kontraksi rahim, terdapat pula kenaikan nadi dan tekanan darah.
- c) Pada janin: pertukaran oksigen pada sirkulasi uteroplasenta kurang sehingga timbul hipoksia janin. Denyut jantung janin lambat dan kurang jelas didengar karena adanya iskemia fisiologis. Kalau betul-betul terjadi hipoksia yang agak lama, misalnya pada kontraksi tetanik (kontraksi yang terjadi terus-menerus tanpa jeda), maka terjadi gawat janin asfiksia dengan denyut jantung janin di atas 160 per menit dan tidak teratur (Diana, 2019).

## **2) Tenaga mengejan**

Setelah pembukaan lengkap dan setelah ketuban pecah tenaga yang mendorong anak keluar selain his, terutama disebabkan oleh kontraksi otot-otot dinding perut yang mengakibatkan peninggian tekanan intra abdominal. Saat kepala sampai pada dasar panggul, timbul suatu refleks yang mengakibatkan ibu menutup glotisnya, mengontraksikan otot-otot perutnya menekan diafragmanya kebawah. Tanpa tenaga mengejan ini anak tidak dapat lahir, Tenaga mengejan ini juga melahirkan plasenta setelah plasenta lepas dari dinding rahim (Diana, 2019).

### c. Passenger

Faktor lain yang berpengaruh terhadap persalinan adalah:

#### a) Sikap (habitus)

Menunjukkan hubungan bagian-bagian janin dengan sumbu janin. Janin umumnya dalam sikap fleksi dimana kepala, tulang punggung, dan kaki dalam keadaan fleksi, lengan bersilang di dada.

#### b) Letak (situs)

Adalah bagian sumbu janin berada terhadap sumbu ibu misalnya letak lintang di mana sumbu janin tegak lurus pada sumbu ibu.

#### c) Presentasi

Dipakai untuk menentukan bagian janin yang ada di bagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pada pemeriksaan dalam. Presentasi dapat terbagi atas bagian terbawah janin dan posisi janin (Diana, 2019).

#### d. Psikis Ibu

Ada satu hal yang sangat positif jika suami bisa ikut hadir saat proses kelahiran. Kehadiran suami ini walau hanya sekedar menemani, memegang tangan istri dan membisikkan kata-kata penghibur, akan memberikan dorongan kekuatan mental ekstra bagi istri. Walaupun tak dapat mengurangi rasa sakit, tetapi kekuatan mental yang diperoleh istri akan membuatnya lebih kuat menahan sakit, yang pada akhirnya akan mempermudah proses kelahiran (Diana, 2019).

#### e. Penolong

Penolong persalinan berpengaruh terhadap proses persalinan karena penolong sebagai instruktur saat proses persalinan berlangsung. Ada aspek yang harus dijalankan penolong saat proses persalinan yang dikenal dengan lima benang merah dalam asuhan persalinan dan kelahiran bayi yaitu: membuat keputusan klinik, asuhan sayang ibu dan bayi, pencegahan infeksi, pencatatan (rekam medik) asuhan persalinan dan rujukan (Diana, 2019).

Dalam kondisi inilah peran bidan dibutuhkan dalam membantu proses persalinan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat QS. Al-Ma'idah ayat 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”

Ayat diatas menjelaskan tentang saling tolong-menolong dalam melakukan hal-hal kebaikan, yakni segala bentuk dan macam-macam hal yang membawa keselamatan bagi duniawi dan ukhrawi, walaupun orang tersebut tidak seiman. Jangan menolong untuk berbuat dosa atau pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah SWT.

Pada saat akan melahirkan seorang ibu akan merasakan sakit yang luar biasa yaitu nyeri tembus ke belakang yang dimulai dari awalnya kontraksi sampai lahirnya bayi bahkan sampai masa nifasnya. Hal inilah, bidan sangat berperan penting untuk memberikan asuhan yang dapat membantu ibu mulai dari proses kehamilan, persalinan dan nifasnya. Oleh karena itu, bidan harus memberikan asuhan yang komprehensif sesuai dengan kompetensi bidan.

Terdapat beberapa hadist yang juga menjelaskan tentang manfaat untuk saling tolong-menolong yaitu:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالسِّرِّ يَسَّرَ اللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Terjemahannya:

"Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

## 7. Tahapan Persalinan

Tahapan persalinan dibagi menjadi 4 fase atau kala, yaitu:

### a. Kala I

Kala I disebut juga dengan kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Pada permulaan his, kala pembukaan berlangsung tidak begitu kuat sehingga parturien masih dapat berjalan-jalan. Proses pembukaan serviks sebagai akibat his dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

#### 1) Fase laten

Berlangsung selama 8 jam. Pembukaan terjadi sangat lambat sampai mencapai ukuran diameter 3 cm.

#### 2) Fase aktif, dibagi dalam 3 fase, yaitu:

- a) Fase akselerasi, dalam waktu 2 jam pembukaan 3 cm tadi menjadi 4 cm.
- b) Fase dilatasi maksimal, dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
- c) Fase deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali. Dalam waktu 2 jam pembukaan dari 9cm menjadi lengkap.

Fase-fase tersebut dijumpai pada primigravida. Pada multigravida dapat terjadi demikian, tetapi fase laten, fase aktif, dan fase deselerasi terjadi lebih pendek. Mekanisme pembukaan serviks berbeda antara primi dan multigravida. Kala I selesai apabila pembukaan serviks telah lengkap. Pada primigravida kala I berlangsung kira-kira 12 jam, sedangkan pada multigravida kira-kira 7 jam (Oktarina, 2016).

#### **b. Kala II**

Kala II disebut juga dengan kala pengeluaran. Gejala utama dari kala II adalah:

- 1) His semakin kuat, dengan interval 2 sampai 3 menit dengan durasi 50 detik sampai 100 detik.
- 2) Menjelang akhir I ketuban pecah yang ditandai dengan pengeluaran cairan secara mendadak
- 3) Ketuban pecah pada pembukaan mendeteksi lengkap diikuti keinginan mengejan, karena tertekan ny fleksus frankenhauser.
- 4) Kedua kekuatan, his dan mengejan lebih mendorong kepala bayi sehingga terjadi: kepala membuka pintu, subocciput bertindak

sebagai hipomoglion berturut-turut lahir ubun-ubun besar, dahi hidung dan muka serta kepala seluruhnya.

- 5) Kepala lahir seluruhnya dan diikuti oleh putaran paksi luar, yaitu penyesuaian kepala pada punggung
- 6) Setelah putaran paksi luar berlangsung, maka persalinan bayi ditolong dengan jalan:
  - a) Kepala dipegang pada os occiput dan dibawah dagu, ditarik cunam kebawah, untuk melahirkan bahu belakang
  - b) Setelah kedua bahu lahir, ketiak ditarik untuk melahirkan sisa badan bayi
  - c) Bayi lahir diikuti oleh air ketuban (Oktarina, 2016).

**c. Kala III**

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan lahirnya bayi, sudah mulai pelepasan plasentanya pada lapisan nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim. Lepasnya plasenta sudah dapat diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda:

- 1) Uterus menjadi bundar
- 2) Uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim
- 3) Tali pusat bertambah panjang
- 4) Terjadi perdarahan

Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan pada fundus uteri. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir (Oktarina, 2016).

**d. Kala IV**

Kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan adalah: pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus dan perdarahan (Oktarina, 2016).

**8. Mekanisme Persalinan**

Pada persalinan normal terdapat beberapa mekanisme yang dialami oleh ibu bersalin. Mekanisme tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Masuknya Kepala Janin Dalam PAP**

Masuknya kepala dalam PAP terutama pada primigravida terjadi pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Namun pada multipara biasanya terjadi pada permulaan persalinan. Proses tersebut biasanya dengan sutura sagitalis melintang menyesuaikan dengan letak punggung. Pada saat itu kepala dalam posisi fleksi ringan. Jika sutura sagitalis dalam diameter anteroposterior dari PAP, maka masuknya kepala akan menjadi sulit karena menempati ukuran terkecil dari PA. Jika sutura sagitalis pada posisi tengah di jalan lahir yaitu tepat di antara simfisis dan promontorium, maka dikatakan dalam posisi "*synclitismus*" pada posisi *synclitismus os parietale* depan dan belakang sama tingginya.


Jika sutura sagitalis agak kedepan mendekati simpisis atau agak kebelakang mendekati promontorium, maka yang kita hadapi adalah posisi “*asynclitismus*”. *Acynclitismus posterior* adalah posisi sutura sagitalis mendakati simpisis dan *os parietal belakang* lebih rendah dari os parietal depan. *Acynclitismus anterior* adalah posisi sutura sagitalis mendekati promontorium sehingga os parietale depan lebih rendah dari os parietal belakang. Saat kepala masuk PAP biasanya dalam posisi asynclitismus posterior ringan, sedangkan dalam kepala janin masuk PAP akan terfiksasi yang disebut dengan *engagement* (Fitriana & Nurwiandani, 2018).



Gambar 3: Syclitismus



gambar 4: Asynclitismus



Gambar 5: Asynclitismus Posterior

Sumber: Buku Asuhan Persalinan, 2018


#### b. Majunya Kepala Janin

Pada primigravida majunya kepala terjadi setelah kepala masuk kedalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala II. Pada

multigravida majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul terjadi bersamaan. Majunya kepala bersamaan dengan gerakan-gerakan lain, yaitu fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Majunya kepala janin ini disebabkan tekanan cairan intrauterin, tekanan langsung oleh fundus uteri oleh bokong, kekuatan mengejan, melurusnya badan bayi oleh perubahan bentuk rahim (Fitriana & Nurwiandani, 2018).

c. Fleksi

Fleksi kepala janin memasuki ruang panggul dengan ukuran yang paling kecil yaitu dengan diameter *suboccipito bregmatikus* (9,5 cm) menggantikan *subiccipito frontalis* (11 cm). Fleksi disebabkan karena janin didorong maju dan sebaliknya mendapat tahanan dari pinggir PAP, serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Akibat adanya dorongan diatas kepala janin menjadi fleksi karena moment yang menimbulkan fleksi lebih besar daripada momen yang menimbulkan defleksi. Sampai di dasar panggul kepala janin berada dalam posisi fleksi maksimal. Kepala turun menemui diafragma pelvis yang berjalan dari belakang atas ke bawah depan. Akibat kombinasi elastisitas, diafragma pelvis dan tekanan intrauterin maka kepala mengadakan rotasi yang disebut sebagai putaran paksi dalam (Fitriana & Nurwiandani, 2018).




Gambar 6: Kepala Fleksi  
Sumber: Buku Asuhan Persalinan, 2018

#### d. Putaran Paksi Dalam

Putaran paksi dalam adalah pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa, sehingga bagian terendah dari bagian depan memutar ke depan dan ke bawah simpisi. Pada presentasi belakang pada bagian kepala terendah, biasanya daerah ubun-ubun kecil dan bagian ini akan memutar ke depan ke bawah simpisis. Putaran paksi dalam mutlak diperlukan untuk kelahiran kepala. Karena putaran Paksi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk jalan lahir khususnya dengan bentuk bidang tengah dan pintu bawah panggul. Putaran paksi dalam terjadi bersamaan dengan majunya kepala dan tidak terjadi sebelum kepala sampai di Hodge III, kadang-kadang baru terjadi setelah kepala sampai di dasar panggul. Sebab-sebab terjadinya putaran paksi dalam, adalah sebagai berikut:

- 1) Pada letak fleksi, bagian kepala merupakan bagian terendah dari kepala.

- 2) Bagian terendah dari kepala mencari tahanan yang paling sedikit terdapat sebelah depan atas dimana terdapat *hiatus genitalis* antara *muskulus levator ani* kiri dan kanan.
- 3) Ukuran terbesar dari bidang tengah panggul ialah diameter *anteroposterior* (Fitriana & Nurwiandani, 2018).



Gambar 7: Putaran Paksi Dalam

Sumber: Buku Asuhan Persalinan, 2018

e. Ekstensi

Setelah putaran paksi dalam selesai dan kepala sampai di dasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan di atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk dapat melewati pintu bawah panggul. Rotasi UUK akan berputar ke arah depan, sehingga didasar panggul UUK berada di bawah simpisis, dengan suboksiput sebagai hipomoklion kepala

mengadakan gerakan defleksi untuk dapat dilahirkan. Saat ada his vulva akan lebih membuka dan kepala janin makin tampak.

Perineum menjadi makin lebar dan tipis, anus membuka dinding rektum. Kekuatan his dan kekuatan mengejan, maka berturut-turut tampak *bregmatikus*, dahi, muka, dan akhirnya dagu dengan gerakan ekstensi. Sesudah kepala lahir, kepala akan segera berotasi (berputar), disebut putaran paksi luar (Fitriana & Nurwiandani, 2018).



Gambar 8: Fleksi, Defleksi, Ekstensi

Sumber: Buku Asuhan Persalinan, 2018

f. Putaran paksi luar

Putaran paksi luar adalah gerakan kembali sebelum putaran paksi dalam terjadi, untuk menyesuaikan kedudukan kepala dengan punggung janin. Bahu melintasi PAP dalam posisi miring. Di dalam rongga panggul bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilaluinya hingga di dasar panggul. Apabila kepala telah dilahirkan, bahu akan berada dalam posisi depan belakang. Selanjutnya, dilahirkan bahu depan terlebih dulu baru kemudian bahu

belakang, kemudian bayi lahir seluruhnya (Fitriana & Nurwiandani, 2018).



Gambar 9: Putaran Paksi Luar

Sumber: Buku Asuhan Persalinan, 2018

g. Ekspulsi

Setelah kepala melakukan putaran paksi luar sesuai arah punggung dilakukan pengeluaran anak dengan gerakan biparietal sampai tampak  $\frac{1}{4}$  bahu ke arah anterior dan posterior dan badan bayi keluar dengan sanggah susur (Syaiful & Lilis Fatmawati, 2020).



Gambar 10: Ekspulsi

Sumber: Buku Asuhan Pada Ibu Bersalinan, 2020

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anemia**

### **1. Definisi Anemia**

- a. Anemia adalah keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin. Kadar Hb normal adalah 12-16% dari sel darah merah. Jumlah sel darah merah normal 5 juta/mm<sup>3</sup>. Pada penderita anemia, kadar Hb kurang dari normal (Soebroto, 2020).
- b. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah (yang berfungsi membawa oksigen) mengalami penurunan untuk memenuhi kebutuhan fisiologi tubuh. Kebutuhan fisiologis spesifik bervariasi pada manusia dan bergantung pada usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, dan tahap kehamilan (Nurbadriyah, 2019).
- c. Anemia adalah suatu kondisi dimana terjadi penurunan kadar hemoglobin (Hb) atau sel darah merah (eritrosit) sehingga menyebabkan penurunan kapasitas sel darah merah dalam membawa oksigen (Azwar, 2021).
- d. Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin hematokrit dan jumlah eritrosit di bawah nilai normal. Pembagian dari anemia dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: anemia ringan bila kadar Hb < 10 gr/dl, anemia sedang bila kadar Hb 7-8 gr/dl, dan anemia berat bila kadar Hb <6 gr/dl (Rahyani, 2020)
- e. Anemia adalah suatu keadaan tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah dibanding nilai normal. Anemia biasanya

disebut juga kurang darah tepatnya adalah kekurangan jumlah sel darah merah (eritrosit) (Taufiq, 2020).

- f. Anemia adalah penurunan kadar hemoglobin yang tidak normal yaitu memiliki kurang dari 11 gr/dl selama kehamilan yang terjadi pada trimester 1 dan ke 3, dan kurang dari 10 gr/dl selama postpartum dan trimester 2 (Retnorini et al., 2017).
- g. Anemia yang terjadi dalam kehamilan merupakan kondisi saat ibu hamil memiliki kadar Hb dibawah 11,95 gr% pada trimester I dan III, atau memiliki kadar Hb kurang dari 10,5 gr% pada trimester II. Terdapat perbedaan antara wanita dewasa dan wanita hamil karena terjadi hemodilusi, terutama terjadi pada trimester II (Andriani, 2016).
- h. Anemia merupakan suatu penyakit dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal. Anemia pada kehamilan adalah ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 11 gr/dl (Apriani et al., 2020).

## **2. Patofisiologi Anemia**

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Rendahnya kapasitas darah untuk membawa oksigen memicu kompensasi tubuh dengan memicu jantung meningkatkan curah jantung. Jantung yang terus-menerus dipacu bekerja keras dapat mengakibatkan

gagal jantung dan komplikasi lain seperti preeklamsia (Parulian et al., 2016).

Dalam kehamilan terjadi peningkatan volume plasma darah sehingga terjadi hipervolemia. Akan tetapi bertambahnya sel-sel darah merah lebih sedikit dibandingkan dengan peningkatan volume plasma sehingga terjadi pengenceran darah (hemodelusi). Pertambahan volume darah tersebut berbanding sebagai berikut: plasma 30%, sel darah 18%, dan hemoglobin 19%. Keadaan tersebut disebut sebagai anemia fisiologi atau pseudoanemia (Parulian et al., 2016)

Pengenceran darah yang terjadi pada wanita hamil dianggap sebagai penyesuaian fisiologi bermanfaat karena: (1) hemodilusi meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih berat dalam kehamilan. Hidremia menyebabkan cardiac output (jumlah volume darah yang dipompa jantung dalam satu menit) meningkatkan kerja jantung diperingan bila viskositas darah menjadi rendah, resistensi perifer berkurang sehingga tekanan darah tidak naik, (2) mengurangi hilangnya zat besi pada waktu terjadinya kehilangan darah pasca persalinan. Bertambahnya volume darah dalam kehamilan dimulai sejak umur kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya pada kehamilan 32-36 minggu (Parulian et al., 2016).

Kebutuhan ibu hamil terhadap energi, vitamin maupun mineral meningkat sesuai dengan perubahan fisiologis ibu terutama pada akhir trimester kedua selama terjadi proses hemodilusi yang menyebabkan

terjadinya peningkatan volume darah dan mempengaruhi kontraksi hemoglobin darah (Parulian et al., 2016).

Adaptasi fisiologis sistem kardiovaskuler pada ibu hamil yaitu terjadi perubahan berupa peningkatan curah jantung, meningkatnya stroke volume, aliran darah dan volume darah. Akibat kerja jantung yang meningkat untuk memenuhi sirkulasi darah ibu dan janin, jantung mengalami hipertrofi. Keadaan ini kembali normal setelah bayi lahir. Peningkatan curah jantung dimana volume darah yang dipompakan oleh ventrikel selama 1 menit. Peningkatan curah jantung terjadi bulan ke 3 kehamilan. Perubahan ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan darah baik untuk ibu maupun untuk janinnya (Parulian et al., 2016).

Pada kehamilan trimester ke-2 terjadi peningkatan curah jantung 40% tetapi pada trimester ke-3 terjadi penurunan curah jantung sebesar 35-39, di atas curah jantung sebelum hamil karena adanya penekanan vena cava inferior. Terjadi peningkatan stroke volume yaitu darah yang dipompakan oleh ventrikel setiap kali denyutan. Pada primigravida terjadi peningkatan 25% di atas sebelum hamil sedangkan pada multigravida lebih dari 38% (Parulian et al., 2016)

Peningkatan aliran darah dan volume darah terjadi selama kehamilan, mulai 10-12 minggu kehamilan dan secara progresif sampai dengan umur kehamilan 30-34 minggu. Volume darah meningkat kira-kira 1500 ml, normal terjadi peningkatan 8,5%-9,0% dari berat badan.

Penurunan darah yang cepat terjadi pada saat persalinan dan volume darah akan kembali normal pada minggu 4-6 post partum. Tekanan darah arteri bervariasi sesuai umur, tingkat aktivitas, dan ada atau tidaknya masalah kesehatan. Pasien dengan anemia kecenderungan terjadi penurunan tekanan darah (Parulian et al., 2016).

### **3. Tanda dan Gejala**

Tanda dan gejala anemia, yaitu Letih, sering mengantuk, pusing, lemah, nyeri kepala, kulit pucat, luka pada lidah, konjungtiva pucat, bantalan kuku pucat, tidak ada nafsu makan, mual dan muntah (Pamungkas et al., 2014).

Pada anemia sedang tanda dan gejala yang dapat dirasakan, yaitu: Kelemahan, kurang energi dan kelelahan. Sedangkan pada anemia berat tanda dan gejala yang dapat dirasakan, yaitu: jantung berdebar, takikardia, sesak nafas, dekompensasi kordis, gagal jantung (Pujiastutik et al., 2019).

### **4. Klasifikasi Anemia**

Klasifikasi anemia pada ibu hamil terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

#### **a. Anemia Defisiensi Zat Besi**

Anemia defisiensi besi adalah merupakan jenis anemia yang terbanyak di dunia, terutama pada negara miskin dan negara yang berkembang. Anemia defisiensi besi merupakan gejala kronis dengan

keadaan hipokromik (konsentrasi hemoglobin berkurang) (Wulandari, 2015).

Kurangnya besi berpengaruh dalam pembentukan hemoglobin, sehingga konsentrasinya dalam sel darah merah berkurang. Hal ini akan mengakibatkan tidak adekuatnya pengangkutan oksigen keseluruh jaringan tubuh. Etiologi anemia defisiensi besi adalah:

- 1) Ketidakseimbangan pola makan dalam mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dengan kebutuhan di dalam tubuh.
- 2) Gangguan absorpsi besi pada usus dapat disebabkan oleh karena infeksi peradangan, neoplasma pada gaster, duodenum maupun jejunum.
- 3) Kebutuhan sel darah merah meningkat pada saat hamil dan menyusui. Kebutuhan besi sangat besar sehingga memerlukan asupan-asupan yang sangat besar pula. Pada anamnesa didapatkan seperti: cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang dan keluhan muntah pada hamil muda. Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu trimester I dan III. Hasil pemeriksaan Hb dapat digolongkan sebagai berikut:
  - a) Hb 11 gr% : tidak anemia
  - b) Hb 9-10 gr% : anemia ringan
  - c) Hb 7-8 gr% : anemia sedang
  - d) Hb <7 gr% : anemia berat

b. Anemia Megaloblastik

Anemia megaloblastik adalah anemia karena kerusakan sintesis DNA yang mengakibatkan tidak sempurnanya sel darah merah. Anemia ini disebabkan karena kurangnya asam folat, umumnya terkait dengan anemia defisiensi zat besi, jarang dijumpai kasus anemia megaloblastik saja (Wulandari, 2015).

c. Anemia Hipoplastik

Anemia pada wanita hamil yang disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah baru, dinamakan anemia hipoplastik dalam kehamilan. Penyebab terjadinya anemia hipoplastik sampai sekarang belum diketahui secara jelas, kecuali yang disebabkan oleh sepsis, sinar rontgen, racun atau obat-obatan, dalam hal terakhir anemia dianggap hanya sebagai komplikasi kehamilan (Wulandari, 2015).

d. Anemia Hemolitik

Anemia Hemolitik disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik sukar menjadi hamil, sebab apabila ia hamil maka anemianya akan menjadi lebih berat. Sebaliknya mungkin kehamilan dapat menyebabkan krisis hemolitik pada wanita yang sebelumnya tidak mengalami anemia (Wulandari, 2015).

e. Anemia-Anemia Lain

Seorang wanita yang menderita anemia, misalnya berbagai jenis anemia hemolitik, herediter atau yang diperoleh seperti anemia karena malaria, cacing tambang, penyakit ginjal menahun, penyakit hati, tuberculosis, syphilis, tumor ganas, dan lain sebagainya, dapat menjadi hamil. Dalam hal ini anemianya menjadi lebih berat dan mempunyai pengaruh tidak baik terhadap ibu dalam masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas serta bagi anak dalam kandungannya (Wulandari, 2015).

## 5. Faktor Penyebab Anemia

Beberapa penyebab anemia, yaitu:

- a. Zat besi yang masuk melalui makanan tidak mencukupi kebutuhan.
- b. Meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi, terutama ibu hamil, masa tumbuh kembang pada remaja
- c. Meningkatnya volume plasma yang tidak sebanding dengan peningkatan volume sel darah merah. Ketidaksesuaian antara kenaikan volume plasma dan eritrosit paling sering terjadi pada kehamilan trimester kedua.
- d. Penyakit kronis seperti: tuberculosis dan infeksi lainnya.
- e. Perdarahan yang disebabkan oleh infeksi cacing tambang, malaria, haid yang berlebihan dan melahirkan.
- f. Anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan, karena saat hamil kebutuhan zat-zat makanan bertambah untuk memproduksi sel darah

merah yang lebih banyak untuk ibu dan janin yang dikandungnya, dan pada saat hamil terjadi perubahan-perubahan dalam darah dan sumsum tulang.

- g. Umumnya anemia selama kehamilan tergolong ringan dan mudah ditangani jika ditemukan pada kondisi dini. Namun, dapat menjadi berbahaya bagi ibu dan janinnya, apabila lama tidak ketahuan dan tidak diobati. Sehingga penting periksa kehamilan secara rutin.
- h. Konsentrasi hemoglobin lebih rendah pada pertengahan kehamilan, pada awal kehamilan dan kembali menjadi aterm, kadar hemoglobin pada sebagian besar wanita sehat yang memiliki cadangan besi adalah 11 gr/dl atau lebih.
- i. Pada masa kehamilan terjadi penambahan volume darah (hydremia atau hemodilusi), akan tetapi bertambahnya sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah.
- j. Pengenceran darah dianggap sebagai penyesuaian diri secara fisiologi dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita (Simbolon et al., 2018).

## **6. Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Anemia**

### **a. Pendidikan Ibu**

Tingkat pendidikan yang tinggi memudahkan ibu hamil dalam menerima informasi kesehatan khususnya bidang gizi, namun apabila tidak menerapkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari tidak akan dapat merubah kondisi kesehatan seseorang. Tingkat pendidikan

mempunyai hubungan dengan tingkat kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah menerima konsep hidup sehat secara mandiri, kreatif, dan berkesinambungan. Tingkat pendidikan ikut menentukan atau mempengaruhi mudah tidaknya seseorang menerima suatu pengetahuan, semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan lebih mudah menerima informasi gizi. Biasanya seorang ibu hamil yang berpendidikan tinggi dapat menyeimbangkan pola konsumsinya. Apabila pola konsumsinya sesuai maka asupan zat gizi yang diperoleh akan tercukupi, sehingga kemungkinan besar bisa terhindar dari masalah anemia. Rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil dapat mengakibatkan keterbatasan dalam upaya menangani masalah gizi dan kesehatan keluarga dan mempengaruhi penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang zat besi (Fe) menjadi terbatas dan berdampak pada terjadinya defisiensi zat besi (Hasnidar, 2020).

b. Status Gizi

Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan asupan gizi. Penyerapan zat besi dapat terjadi di lambung dan usus bagian atas yang masih bersuasana asam. Tubuh akan memanfaatkan zat besi yang berasal dari makanan namun tergantung dari tingkat absorpsinya. Zat besi yang terdapat dalam bahan hewani dapat diabsorpsi sebanyak 20-30% sedangkan zat besi yang berasal dari makanan tumbuh-tumbuhan hanya sekitar 5% (Hasnidar, 2020).

c. Pemeriksaan Kehamilan (Kunjungan ANC)

Salah satu tujuan pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah untuk mengenal dan menangani penyakit yang menyertai kehamilan, sehingga saat ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan maka ibu hamil akan mendapatkan penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan seperti penyuluhan gizi dan makanan serta mendapatkan tablet tambah darah yang akan memperkecil terjadinya anemia (Guspaneza & Martha, 2019).

d. Kepatuhan Mengonsumsi Suplemen Zat Besi

Mengonsumsi tablet zat besi secara baik diharapkan memberi peluang terhindarnya ibu hamil dari anemia. Ibu hamil sangat memerlukan untuk mengonsumsi tablet Fe, karena dapat membantu menanggulangi anemia gizi besi yang diberikan kepada ibu hamil. Ibu hamil yang cenderung tidak mengonsumsi tablet Fe yang cukup cenderung untuk mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil yang rajin mengonsumsi tablet Fe yang cukup (Guspaneza & Martha, 2019).

## C. Tinjauan Khusus Tentang Anemia Persalinan

### 1. Patofisiologi Anemia Persalinan

Peningkatan aliran darah dan volume darah terjadi selama kehamilan, mulai 10-12 minggu kehamilan dan secara progresif sampai dengan umur kehamilan 30-34 minggu. Penurunan darah yang cepat terjadi

saat persalinan karena pada saat persalinan akan banyak kehilangan darah dan perlu tambahan zat besi sebanyak 300 sampai 350 mg. Pada saat persalinan ibu hamil membutuhkan banyak zat besi bahkan dua kali lipat dari kondisi sebelum hamil.

Menurunnya hemoglobin dalam darah menyebabkan berkurangnya kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Kadar hemoglobin pada ibu hamil yang kurang dari 11,0 g/dl akan membuat kontraksi otot rahim lemah ketika persalinan berlangsung (inersia uteri), menyebabkan masa persalinan memanjang (partus lama) dengan bahaya perdarahan atau infeksi serta hipoksia pada janin. Keadaan tersebut merupakan faktor-faktor yang meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu anak (Hanifah, 2019).

## **2. Tanda Dan Gejala Anemia Persalinan**

Terdapat beberapa tanda dan gejala klinis yang tampak atau dapat dilihat untuk ibu bersalin dengan anemia, yaitu:

- a. Cepat lelah
- b. Lemah
- c. Letih
- d. Lesu
- e. Muka tidak tampak cerah
- f. Kinerja tubuh buruk

Pada waktu persalinan dibutuhkan kadar hemoglobin yang optimal untuk menghadapi proses persalinan. Kadar hemoglobin dalam darah bagi

ibu inpartu sangat berpengaruh terhadap keadaan tubuh ibu agar tidak lelah dan letih sedangkan pada kala II persalinan ibu sangat membutuhkan kekuatan untuk mengejan (Andriani, 2016).

### 3. Dampak Anemia Pada Persalinan

Dampak anemia pada persalinan/inpartu akan menyebabkan: gangguan his baik primer maupun sekunder, janin akan lahir dengan anemia, persalinan dengan melakukan tindakan karena ibu mudah lelah. Pengaruh anemia terhadap persalinan yaitu:

#### a. Gangguan his kekuatan mengejan

His (tenaga) yang tidak normal, baik kekuatan maupun sifatnya, sehingga dapat menghambat kelancaran persalinan dan tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan persalinan macet. Dalam persalinan diperlukan his normal yang memiliki sifat kontraksi otot rahim mulai dari salah satu tanduk rahim, fundal dominan menjalar keseluruhan otot rahim, kekuatannya seperti memeras isi rahim, dan rahim yang telah berkontraksi tidak kembali ke panjang semula sehingga terjadi retraksi dan pembentukan segmen bawah rahim (Retno Rini et al., 2017).

Dengan adanya kejadian anemia akan mengakibatkan kelainan his dengan kekuatan yang lemah atau tidak adekuat untuk melakukan pembukaan serviks atau mendorong janin keluar. Kelainan ini biasa


disebut dengan *inersia uteri hipotonik*. Inersia uteri hipotonik ini terbagi atas 2 yaitu:

1) Inersia uteri primer

Terjadi pada permulaan fase laten. Sejak awal telah terjadi his yang tidak adekuat (kelemahan his yang timbul sejak dari permulaan persalinan dimulai).

2) Inersia uteri sekunder

Terjadi pada fase aktif kala I atau kala II. Permulaan his baik, kemudian pada keadaan selanjutnya terdapat gangguan dan kemudian melemah.



Gambar 11: Partograf

Sumber: <https://docplayer.info>

Pada partograf untuk menyatakan lamanya kontraksi dibagi atas 3, dimana: kotak yang diberi titik-titik menyatakan lama kontraksi  $\leq 20$  detik, kotak yang diberi garis-garis sesuai pada gambar diatas menyatakan lama kontraksi 20-40 detik, sedangkan kotak yang diberi isian penuh menyatakan lamanya kontraksi  $\geq 40$  detik.

b. Pada kala I dapat berlangsung sangat lama dan terjadi partus lama

- c. Pada kala II terjadi partus lama sehingga dapat melelahkan karena ibu yang telah capek. Pada kala ini apabila terjadi partus lama sering memerlukan tindakan dan operasi kebidanan. Sedangkan pada bayi dapat terjadi asfiksia, fistula, sepsis puerperalis, bahkan sampai pada kematian janin.
- d. Pada kala III (kala uri) dapat diikuti retensio plasenta, postpartum hemoragik karena atonia uteri.
- e. Pada kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder, atonia uteri dan ruptur uteri (Retno Rini et al., 2017).

Ibu yang mengalami anemia saat menjelang proses persalinan harus tetap sabar dan berpikiran positif bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah SWT, sebagaimana firman Allah QS. Al-Anbiya/21:83

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾

Terjemahannya: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.”

Sabar menjadi hal yang penting dalam melewati proses melahirkan. Dengan hati yang sabar, ibu dan keluarga dapat menguatkan diri sendiri untuk terus berusaha dan melakukan yang terbaik dalam melewati segala bentuk ujian yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam islam, terdapat keutamaan sikap sabar yang bisa didapatkan oleh orang yang menerapkannya. Dimana Allah SWT akan memberikan kemuliaan bagi

hambanya yang dapat menghadapi setiap ujian dengan penuh kesabaran. Sikap sabar juga dapat mendorong setiap orang untuk terus bertawakal kepada Allah, berusaha dan berserah diri hanya kepada Allah SWT.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda:

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

Terjemahannya:

"Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya. Dan tidaklah seseorang dianugerahkan (oleh Allah Subhanahu wa ta'ala) pemberian yang lebih baik dan lebih luas (keutamaannya) daripada (sifat) sabar." (HR Al Bukhari).

#### 4. Penatalaksanaan Anemia Pada Persalinan

- a. Melakukan transfusi darah
- b. Pemberian kortikosteroid
- c. Pemberian eritropoetin
- d. Pemberian suplemen besi, vitamin B12, vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan (Hasdianah, 2016).

Setiap ibu yang akan melahirkan akan mengalami cobaan yang begitu berat dengan rasa nyeri yang dirasakan saat dimulainya tanda persalinan. Oleh karena itu Allah SWT mengabadikan perjuangan seorang wanita (ibu) selama kehamilan dan persalinannya, sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Luqman/31:14



memberikan nilai dari perjuangan ibu yang meninggal pada saat melahirkan sebagai mati *syahid*.

#### **D. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan Anemia Pada persalinan**

##### **1. Pengertian Manajemen Asuhan kebidanan**

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan bidan dalam menerapkan suatu metode proses berfikir logis untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisa, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, agar menguntungkan kedua belah pihak baik pihak klien atau pihak pemberi asuhan. Oleh karena itu, pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan terhadap ibu dan anak yang khusus dilakukan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga, dan masyarakat.

Sedangkan asuhan kebidanan adalah penerapan dan fungsi kegiatan yang menjadi tanggung jawab bidan dalam memberikan pelayanan klien yang mempunyai kebutuhan atas masalah dalam bidang kesehatan ibu dan anak pada masa remaja, pra konsepsi, kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, periode maternal, klimakterium serta menopause, bayi baru lahir, bayi, balita dan anak pra sekolah.

Proses manajemen ini terdiri dari 7 langkah berurutan dimana setiap langkah disempurnakan secara periodik, proses ini dimulai dari pengumpulan data dasar dan berakhir dengan evaluasi. Dengan adanya

proses manajemen asuhan kebidanan ini maka akan mempermudah untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi masalah selanjutnya, merencanakan dan melaksanakan suatu asuhan yang aman dan efektif.

## **2. Tujuan utama asuhan kebidanan**

Tujuan utama asuhan kebidanan adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi dalam mengurangi kesakitan dan kematian. Asuhan kebidanan berfokus untuk melakukan pencegahan, promosi kesehatan yang bersifat holistik diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor, dan pendidikan berpusat pada perempuan, asuhan yang berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter, serta menghormati pilihan yang dipilih kline (Surachmindari,2013).

## **3. Tahapan manajemen kebidanan**

Manajemen asuhan kebidanan menurut varney (7 langkah), meliputi:

### **a. Langkah I: pengumpulan data/analisa data awal**

Pada tahap ini semua informasi dikumpulkan secara lengkap dan akurat dari sumber yang berhubungan dengan kondisi klien. Tahap ini sangat penting karena merupakan langkah awal untuk menentukan langkah yang akan dilakukan berikutnya sehingga kelengkapan data harus sesuai dengan kasus yang dihadapi dan akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap

selanjutnya. Data dapat berupa data subjektif dan data objektif yang dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:

- 1) Anamnesa dengan tanya jawab untuk memperoleh biodata meliputi: riwayat menstruasi, riwayat kesehatan, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, nifas, riwayat KB, riwayat Pemenuhan untuk kebutuhan dasar, data sosial, ekonomi, psikologi, spiritual serta pengetahuan klien meliputi: HPHT, pergerakan janin yang dirasakan, umur kehamilannya, sakit perut tembus kebelakang yang dirasakan sejak kapan dan adanya pelepasan lendir dan darah.
- 2) Pemeriksaan fisik meliputi: pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan klien yang dilakukan secara inspeksi, palpasi, auskultasi dan perkusi meliputi: Leopold I (mengetahui TFU, usia kehamilan, dan bagian yang berada di atas fundus), Leopold II (mengetahui bagian janin yang berada di sisi kiri dan kanan perut ibu), Leopold III (mengetahui bagian terendah janin), Leopold IV (mengetahui sejauh mana bagian terendah janin masuk ke PAP) dan auskultasi dengan menggunakan linex atau doppler untuk mendengar bunyi denyut jantung janin.
- 3) Pemeriksaan penunjang meliputi: pemeriksaan laboratorium (HB, albumin, reduksi), ultrasonografi (USG), dan catatan terbaru sebelumnya.

Tahap ini menjadi langkah yang akan menentukan langkah berikutnya dengan kelengkapan data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Adapun beberapa keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien yang mengalami anemia dalam persalinan yaitu: ibu merasa lelah, lemah, dan pucat. Secara klinis dapat dilihat dengan tubuh yang pucat dan tampak pasien mulai lemah. Dan untuk memastikan pasien yang mengidap anemia maka dilakukan pemeriksaan hemoglobin dan pemeriksaan darah tepi. Pemeriksaan hemoglobin dengan spektrofotometri merupakan standar.

Selain hal di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu kondisi psikologi ibu yang bisa menjadi faktor terjadinya anemia pada persalinan. Seperti adanya konflik yang terjadi antara ibu dan suami, keluarga, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah ekonomi dan pekerjaan, ketakutan dalam menghadapi persalinan dengan baik, serta adanya ketakutan dan kekhawatiran yang tinggi dalam menghadapi tanggungjawab sebagai seorang ibu. Oleh karena itu, ibu sangat membutuhkan support dari orang sekitarnya baik dari bidan, suami maupun keluarga agar ibu tidak menjadi cemas dan khawatir dengan kondisinya dan selalu mengingatkan kepada ibu untuk senantiasa mengingat Allah SWT dengan memperbanyak doa dan dzikir agar dimudahkan dalam persalinan.

b. Langkah II: interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi atas data-data yang telah dikumpulkan. Sehingga dapat merumuskan diagnosa dan masalah yang spesifik.

Ibu hamil dapat dikatakan anemia setelah ditegangkan dengan menggunakan pemeriksaan penunjang yang memiliki hasil kadar hemoglobin atau darah merah kurang dari 11 gr%. Menurut world health organization (WHO) anemia pada ibu hamil adalah kondisi ibu dengan kadar Hb 11 gr%. Ibu hamil dengan anemia sangat bervariasi yaitu: tidak anemia Hb 11 gr%, anemia ringan: Hb 9-10 gr%, anemia sedang: Hb 7-8 gr%, dan anemia berat: Hb <7 gr%.

Bidan harus mampu mengenali tanda dan gejala dari anemia pada persalinan yang didapat dari data yang telah dikumpulkan agar asuhan dapat dilakukan dengan sesuai, kolaborasi dan komprehensif terhadap ibu. Setiap asuhan atau tindakan yang diberikan hendaklah untuk selalu berdoa kepada Allah agar semua asuhan yang diberikan dapat meringankan keluhan ibu sehingga ibu dapat merasa lebih baik dan masalah anemianya dapat teratasi.

c. Langkah III: identifikasi diagnosa atau masalah potensial

Langkah ini mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang lain berdasarkan beberapa masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila mungkin

diberikan pencegahan. Sambil mengamati klien, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi. Langkah ini sangat penting dalam melakukan asuhan yang aman. Selain itu bidan dapat memberikan pemahaman kepada ibu dan keluarga bahwa kehamilan dan persalinan adalah anugrah dari Allah swt, tindakan ini juga dapat membantu ibu dalam mengurangi stress dan menghasilkan kepercayaan sehingga ibu mampu menghadapi dan bersabar dengan kondisinya.

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada ibu yang mengalami anemia persalinan yaitu: gangguan pada his atau kekuatan mengejan sehingga terjadi partus lama, kala I dapat berlangsung lama sehingga dapat membuat ibu lelah dan sering memerlukan tindakan operasi, kala III dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan post partum akibat atonia uteri, kala IV dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri.

d. Langkah IV: tindakan segera/kolaborasi/rujukan

Pada langkah ini seorang bidan menetapkan dan mengidentifikasi kebutuhan terhadap klien berupa tindakan segera, melakukan konsultasi, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien, pada langkah ini bidan juga harus melakukan tindakan emergency untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan setelah diagnosa dan masalah ditegakkan.

Dalam kasus anemia dalam persalinan tindakan segera yang dilakukan bidan adalah dengan pemasangan infus cairan RL 20 tpm yang berguna untuk memperbaiki keadaan lemah dan melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk mengantisipasi komplikasi-komplikasi terhadap ibu dan janin, menganjurkan ibu untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah swt. Serta tidak menjadikan keluhannya saat ini menjadi beban sehingga tidak semakin memperburuk kondisi ibu.

Tindakan rujukan yang dilakukan pada kala I persalinan apabila ditemukan penyulit. Tindakan rujukan yang dilakukan pada kala II persalinan apabila ditemukan penyulit seperti kala II memanjang. Rujukan yang dilakukan saat kala III persalinan yaitu jika terdapat retensio plasenta. Sedangkan rujukan pada kala IV dilakukan jika terdapat perdarahan dan robekan sampai pada derajat tiga atau empat (JNPK–KR, 2017).

e. Langkah V: intervensi (rencana tindakan)

Melakukan perencanaan secara menyeluruh dan rasional terhadap masalah sesuai dengan langkah yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana asuhan yang diberikan harus oleh bidan harus disetujui oleh pasien dan pihak keluarga untuk menentukan apakah tindakan yang telah direncanakan bersedia untuk dijalankan atau tidak. Rencana asuhan persalinan dengan anemia yaitu:

- 1) Merencanakan pendekatan terapeutik terhadap ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan dan berserah diri kepada Allah swt. Dengan memperbanyak doa, dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Qur'an agar ibu tidak terlalu stress dan agar ibu tidak terlalu fokus terhadap kondisinya.
- 2) Merencanakan untuk melakukan pemantauan Djj, nadi, dan his setiap 30 menit dan tekanan darah, suhu setiap 2-4 jam bertujuan untuk memastikan semuanya dalam batas normal.
- 3) Merencanakan pemantauan kemajuan persalinan pada ibu anemia dalam persalinan kemungkinan terjadinya gangguan his tidak adekuat, partus lama, retensio plasenta, perdarahan postpartum dan atonia uteri.
- 4) Merencanakan pemasangan cairan intravena (intravenous fluid) sebagai upaya pencegahan untuk pasien yang memiliki kondisi tidak stabil dan pemberian obat melalui intravena.
- 5) Merencanakan pemberian oksitosin yang sesuai dengan anjuran yang diberikan dokter jika kemajuan peningkatan kontraksi secara teratur
- 6) Merencanakan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan yang dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat anemia dalam persalinan.

f. Langkah VI: implementasi asuhan kebidanan

Melaksanakan rencana tindakan serta efisiensi dan menjamin rasa aman klien. Implementasi dapat dikerjakan keseluruhan oleh bidan atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Bidan harus melakukan tindakan yang efisien bertujuan untuk mengurangi waktu perawatan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan yang telah dilakukan terhadap klien.

Pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, pelaksanaan pada ibu anemia pada persalinan dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi, rencana asuhan persalinan pada ibu dengan anemia pada persalinan, yaitu:

- 1) Melaksanakan pendekatan terapeutik terhadap ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan dan berserah diri kepada Allah swt. Dengan memperbanyak doa, dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan ayat suci Al-Qur'an agar ibu tidak terlalu stress dan agar ibu tidak terlalu fokus terhadap kondisinya.
- 2) Melaksanakan untuk melakukan pemantauan Djj, nadi, dan his setiap 30 menit dan tekanan darah, suhu setiap 2-4 jam bertujuan untuk memastikan semuanya dalam batas normal.
- 3) Melaksanakan pemantauan kemajuan persalinan pada ibu anemia dalam persalinan kemungkinan terjadinya gangguan his

tidak adekuat, partus lama, retensio plasenta, perdarahan postpartum dan atonia uteri.

- 4) Melaksanakan pemasangan cairan intravena (intravenous fluid) sebagai upaya pencegahan untuk pasien yang memiliki kondisi tidak stabil dan pemberian obat melalui intravena.
- 5) Melaksanakan pemberian oksitosin yang sesuai dengan anjuran yang diberikan dokter jika kemajuan peningkatan kontraksi secara teratur.
- 6) Melaksanakan asuhan persalinan sesuai APN, asuhan yang dilakukan untuk mencegah komplikasi lain akibat anemia dalam persalinan.

g. Langkah VII: Evaluasi

Langkah terakhir dalam manajemen kebidanan yaitu melakukan evaluasi keefektifan dari perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah akan benar-benar terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi dalam diagnosa dan masalah. Rencana dikatakan telah efektif jika benar-benar efektif dalam pelaksanaannya dan terdapat perubahan setelah diberikannya asuhan. Setelah dilakukan asuhan persalinan dengan anemia pada persalinan, hasilnya ibu dan keadaan bayinya baik dalam keadaan normal, persalinan dapat berjalan lancar sesuai dengan asuhan yang telah diberikan. Setelah dilakukannya asuhan persalinan dengan anemia pada ibu, masalah/komplikasi pada

ibu dapat teratasi dan ibu serta bayinya dalam keadaan umum baik dan normal.

#### **4. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan**

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan pasien dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan.

Pendokumentasian atau pencatatan manajemen kebidanan diterapkan dengan metode SOAP. Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah-langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir dalam memberikan asuhan secara menyeluruh. SOAP (subjektif, objektif, assessment, planning).

##### **a. S (subjektif)**

Subjektif menggambarkan dokumentasi hasil pengumpulan data pasien yang diperoleh melalui anamnesa atau wawancara sebagai langkah I varney.

##### **b. O(objektif)**

Objektif adalah pendokumentasian dari data hasil observasi melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium).


##### **c. A (assessment)**

Assesment adalah pendokumentasian berdasarkan data yang terkumpul kemudian di buat kesimpulan yang meliputi diagnosa,

antisipasi atau masalah potensial tentang anemia dalam persalinan yang disertai partus lama.

**d. P (planning)**

Planning adalah rencana tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi serta konseling untuk tindakan lanjut.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL**  
**PADA NY”D”DENGAN ANEMIA**  
**DI RSIA SITTI KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**TANGGAL 18 JANUARI 2022**

Nomor register : 11xxxx  
Tanggal masuk rumah sakit : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
Tanggal pengkajian : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
Tanggal partus : 19 Januari 2022 jam : 23.11 wita  
Nama pengkaji : Fatmah Junia Sari Bahasoan

**KALA I**

**A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
Umur : 25 tahun / 25 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Bulukumba / Ujung pandang  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMA  
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
Alamat : Abd dg. Sirua No. 312/40

2. Anamnesa (data subjektif)

a. Alasan utama ibu masuk

Ibu mengeluh nyeri perut tembus kebelakang yang disertai pelepasan lendir dan darah.

b. Riwayat keluhan utama

1) Ibu merasakan nyeri perut tembus kebelakang disertai pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 18 Januari 2021 pukul 08.00 WITA

- 2) Sifat nyeri hilang timbul dan tidak ada pengeluaran air ketuban dari jalan lahir
  - 3) Usaha klien untuk mengatasi keluhannya dengan menarik dan menghembuskan nafas sambil dibantu oleh suami dengan mengelus punggungnya
  - 4) Ibu mengeluh sedikit pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya
  - 5) Ibu mengeluh badannya terasa berat atau lelah
3. Riwayat menstruasi
- a. Menarche : 14 tahun
  - b. Siklus : 28-30 hari
  - c. Lamanya : 6-7 hari
  - d. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari
  - e. Teratur tidak teratur : teratur
  - f. Sifat darah : encer
  - g. Dysmenorrhea : tidak ada
4. Riwayat perkawinan
- Ibu menikah satu kali dengan tuan Tn "M" pada tahun 2020, saat Ny "D" berusia 25 tahun dan Tn "M" berusia 25 tahun
5. Riwayat Kehamilan Yang Lalu
- a. Ibu mengatakan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya karena preeklamsia
  - b. Ibu mengatakan usia kandungannya saat keguguran yaitu 15 minggu
6. Riwayat kehamilan yang sekarang
- a. Ibu mengatakan ini kehamilan yang kedua dan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya
  - b. Hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2021
  - c. Hari taksiran persalinan tanggal 12 Januari 2022
  - d. Menurut ibu kehamilan  $\pm 9$  bulan
  - e. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil.
  - f. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang

- g. Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali di RSIA sitti khadijah I muhammadiyah makassar
- 1) Tri Semester I : 2 kali
  - 2) Trimester II : 2 kali
  - 3) Trimester III : 3 kal
- h. Ibu mendapatkan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT) sebanyak 2 kali yaitu :
- 1) TT I pada tanggal 11 Mei 2021
  - 2) TT 2 pada tanggal 14 Juni 2021
- i. Keluhan-keluhan
- 1) Tri Semester I : ibu mengalami mual dan muntah di pagi hari
  - 2) Trimester II : tidak ada keluhan
  - 3) Trimester III : sering kencing dan nyeri perut bagian bawah
- j. Selama hamil ibu jarang mengkonsumsi tablet Fe 1x1 yang diberikan bidan
7. Riwayat Kesehatan Yang Lalu
- a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma, dan pernah hipertensi gestasional
  - b. Tidak ada riwayat penyakit menular tuberkulosis, malaria, hipertensi, dan penyakit menular seksual
  - c. Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan
  - d. Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.
8. Riwayat kesehatan Yang sekarang
- a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes mellitus, asma, dan hipertensi
  - b. Tidak ada riwayat penyakit menular tuberkulosis, malaria, hipertensi, dan penyakit menular seksual
  - c. Tidak ada riwayat alergi makanan maupun obat-obatan
  - d. Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

9. Riwayat penyakit keluarga

Di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

10. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

- a. Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami
- b. Hubungan ibu dan suami, keluarga maupun tetangga baik.
- c. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.
- d. Ibu rajin beribadah dan berdo'a untuk kelancaran persalinannya

11. Riwayat kb

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB apapun

12. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

a. Riwayat nutrisi

Kebiasaan :

- 1) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- 2) Frekuensi : 3 kali sehari
- 3) Kebutuhan minuman : 6-8 gelas per hari

Selama Inpartu :

Ibu tetap makan tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

b. Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan :

- 1) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amniok
- 2) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

- 1) BAK : Ibu BAK ke kamar mandi dengan ditemani suami/ keluarga/ atau mahasiswa
- 2) Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 06.00 WITA)

c. Personal Hygiene

Kebiasaan :

- 1) Mandi : 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi

- 2) Sikat gigi : 2 kali sehari (setelah makan dan sebelum tidur)  
dengan menggunakan pasta gigi
- 3) Keramas : 3 kali seminggu menggunakan shampoo
- 4) Ganti pakaian : 2 kali sehari

Selama inpartu :

Ibu belum mandi dan sikat gigi pada pagi hari

d. Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan :

Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu :

Ibu tidur namun sering terbangun

13. Pemeriksaan fisik (DO)

- a. Keadaan umum lemah
- b. Kesadaran *compos mentis*
- c. Hari taksiran persalinan tanggal 12 Januari 2022
- d. Usia gestasi 41 minggu 1 hari
- e. Tanda-tanda vital

Tekanan darah : 110/80 mmhg

Suhu:36,7°C

Nadi : 80x/i

Pernapasan: 24x/i

- f. Tinggi badan :149 cm
- g. Berat badan sebelum hamil : 50 kg
- h. Berat badan sekarang : 64 kg
- i. Lingkar lengan atas (lila) : 28 cm
- j. Pemeriksaan fisik ( *head to toe* )

1) Kepala

Inspeksi : Kepala bersih, tidak ada ketombe, rambut hitam dan lurus

Palpasi : tidak ada massa, tidak mudah rontok, dan tidak ada nyeri tekan

## 2) Wajah

Inspeksi : tampak pucat, tidak oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : tidak ada oedema dan nyeri tekan

## 3) Mata

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva pucat, sklera putih (tidak ikterus)

## 4) Hidung

Inspeksi : lubang hidung simetris kiri dan kanan, bersih, tidak ada pengeluaran secret

Palpasi : tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan dan tidak adanya polip

## 5) Mulut dan gigi

Inspeksi : bersih, bibir merah muda dan tidak pecah-pecah, tidak ada caries, tidak ada gigi yang lubang, tidak ada stomatitis dan gusi tidak berdarah

## 6) Telinga

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen dan peradangan

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

## 7) Leher

Inspeksi : tidak ada kelainan

Palpasi : tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar limfe dan vena jugularis.

## 8) Payudara

Inspeksi : payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola mammae.

Palpasi : tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan

## 9) Abdomen

Inspeksi : Nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan,  
Nampak striae livide dan linea nigra, tidak ada bekas luka

Operasi

Palpasi : Leopold I : 2 jrbpx 32 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 4/5

Lingkar perut : 108 cm

Taksiran berat janin :  $87 \times 35 = 3456$  gram

Auskultasi : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit.

His : 1x 10 menit durasi 5-10 detik

#### 10) Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varices, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan

Pemeriksaan dalam

*Vagina toucher* (VT) I tanggal 18 Januari 2022 Jam 11.00 Wita

a) Vulva Dan Vagina : Normal

b) Portio : tebal

c) Pembukaan : 1 cm

d) Air ketuban : Utuh

e) Presentase : UUK lintang Kanan

f) Penurunan : Hodge I

g) Penumbungan : Tidak Ada

h) Molase : Tidak Ada

i) Kesan panggul : Normal

j) Pelepasan : Lendir dan Darah

## 11) Anus

Inspeksi : tidak ada hemoroid

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan

## 12) Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : pergerakan aktif, tidak ada varises, dan kuku pucat

Palpasi : tidak ada oedema

## 13) Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

- a) WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
- b) RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
- c) HGB : 8.5 g/dl
- d) HCT : 30.0L%
- e) MCV : 76.9L [fl]
- f) MCH : 21.8 pg
- g) MCHC : 28.3L [g/dl]
- h) Albumin : Negatif
- i) Reduksi : Negatif
- j) Hbsag : Negatif
- k) Golongan Darah: A

**B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL**

GIIPOAI, gestasi 41 minggu 1 hari, intrauterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu lemah dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan anemia

## 1. GPA :GIIPOAI

DS : Ibu mengatakan ini adalah kehamilannya yang kedua dan sebelumnya ibu pernah mengalami keguguran.

DO : Nampak linea nigra dan striae livid, terdapat denyut jantung janin, dan pada saat palpasi teraba bagian-bagian janin.

Analisa dan interpretasi data :

Tanda-tanda pasti kehamilan

- a. Gerakan janin dapat dilihat /dirasa/diraba, juga bagian-bagian janin

b. Denyut jantung janin.

- 1) Didengar dengan *stetoskop-monoral Laennec*
- 2) Dicatat dan didengar alat *Doppler*
- 3) Dicatat dengan *feto-eloktro kardiogram*
- 4) Dilihat pada *ultrasonografi (USG)*

c. Terlihat tulang-tulang janin dalam foto *rontgen* (Enny, 2017)

2. Gestasi 41 minggu 1 hari

DS : Hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2021

DO : Pemeriksaan Leopold I, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah *processus xiphoideus*. Dan hari taksiran persalinan tanggal: 12 Januari 2022 berdasarkan rumus Neagle.

Analisa dan interpretasi data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus Neagle, mulai dari hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2022 sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 41 minggu 1 hari (prawihardjo. 2018:279)

3. Situs Memanjang

DS : Ibu mengatakan janin bergerak kuat pada bagian sebelah kiri perut ibu

DO : Pada palpasi leopold didapatkan hasil

Leopold I : 2 jrbpx 32 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 4/5

Lingkar perut : 108 cm

Taksiran berat janin :  $87 \times 35 = 3456$  gram

Auskultasi : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit.

#### Analisis dan interpretasi data

Dengan teraba bagian besar janin yaitu bokong pada fundus ibu dan kepala pada bagian terendah, DJJ terdengar jelas, kuat pada kuadran kanan bawah perut ibu dan gerakan janin yang dirasakan pada salah satu perut ibu menunjukkan bahwa sumbu panjang janin sejajar dengan sumbu panjang ibu (Prawirohardjo, 2014)

#### 4. Intrauterine

DS : Ibu merasakan janinnya bergerak dengan kuat dan ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilan.

DO : Ibu tidak merasakan nyeri ketika dipalpasi, TFU sesuai umur kehamilan, pada palpasi Leopold teraba bagian-bagian kecil pada janin.

#### Analisa dan interpretasi data

Pembesaran perut sesuai usia kehamilan, janin dapat teraba saat palpasi serta tidak ada nyeri perut yang hebat dan tidak ada nyeri tekan, hal ini menandakan kehamilan kehamilan ibu intrauterin (prawirohardjo,2014).

#### 5. Tunggal

DS : Ibu mengatakan pergerakan janinya lebih sering di sebelah kanan perut ibu

DO : Palpasi abdomen :

Leopold I : 2 jrbpx 32 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 4/5

Lingkar perut : 108 cm

Taksiran berat janin :  $87 \times 35 = 3456$  gram

Auskultasi : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit.

#### Analisa dan interpretasi data

Di Dalam kehamilan, janin dikatakan tunggal jika pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan. Saat palpasi teraba satu kepala dan satu punggung, sedangkan auskultasi denyut jantung janin terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri bawah perut ibu (Baety, 2012 :10-11)

#### 6. Hidup

DS : Ibu merasakan pergerakan janinya..kali dalam sehari

DO : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit.

#### Analisa dan interpretasi data

Adanya gerakan janin dan DJJ, merupakan tanda bahwa janin hidup, janin dalam keadaan sehat, bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120-160 kali permenit, selain itu tanda hidup juga dapat dilihat dari pergerakan janin yang dirasakan kuat satu kali per jam atau lebih dari 10 kali perhari dan pembesaran uterus menandakan janin hidup dan bertumbuh (prawirohardjo,2014:285).

#### 7. Keadaan ibu lemah

DS : Ibu mengeluh pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya  
Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah

DO : Tanda-tanda vital dalam batas normal, dengan konjungtiva pucat, sklera putih dan tidak ikterus serta tidak ada edema dan nyeri tekan, kuku berwarna pucat. Dengan pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin 8.5 gr/dl.

#### Analisis dan interpretasi data

Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil pemeriksaan dimana terdapat adanya tanda dan gejala anemia seperti ibu merasa lelah dan letih dengan konjungtiva pucat dan hasil pemeriksaan hemoglobin 8,5 gr/dl.

#### 8. Keadaan janin baik

- DS : Ibu merasakan pergerakan janin kuat pada kuadran kiri  
 DO : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit dan teratur

#### Analisa dan interpretasi data

Pergerakan janin yang kuat dan sering, serta denyut jantung janin (DJJ) yang terdengar jelas, kuat dengan frekuensi 143 x/menit dan teratur, menandakan keadaan janin dalam keadaan baik, dimana dinilai dari normal DJJ yaitu 120-160 x/menit (Prawirohardjo, 2014).

#### 9. Inpartu kala I fase laten dengan Anemia

- DS : Ibu mengatakan nyeri perut tembus kebelakang yang dirasakan sejak tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.00 WITA dan ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dan darah pada hari yang sama

Ibu mengeluh merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya (masih mampu berjalan)

Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah

- DO : Tampak pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.00 WITA, kontraksi 1 x dalam 10 menit durasi 5 detik.

konjungtiva pucat, sklera putih, tidak ikterus dan kuku berwarna pucat. Dengan pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin 8.5 gr/dl.

Hasil pemeriksaan dalam tanggal 18 Januari 2022 Jam 11.00 Wita

- 1) Vulva Dan Vagina : Normal
- 2) Portio : Tebal
- 3) Pembukaan : 1 cm
- 4) Ketuban : Jernih
- 5) Presentase : Kepala
- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Molase : Tidak Ada

- 8) Penumbungan : Tidak Ada  
 9) Kesan panggul : Normal  
 10) Pelepasan : Lendir dan Darah

Analisa dan interpretasi data

- a. Dilatasi serviks 1-3 cm merupakan fase laten (Nugroho.2012:247).
- b. Ditemukannya tanda dan gejala klinis yang dapat dilihat untuk ibu bersalin anemia yaitu pusing dan merasa lelah (Andriani, 2016).
- c. Pemeriksaan didapatkan konjungtiva konjungtiva pucat, sklera putih dan tidak ikterus.
- d. Kuku berwarna pucat (Pamungkas et al., 2016).
- e. Dengan pemeriksaan laboratorium yaitu hemoglobin 8.5 gr/dl.

### **C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL**

Potensial terjadinya partus dengan tindakan

DS : Ibu mengatakan kepalanya pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya  
 Ibu mengeluh badanya terasa berat atau lelah

DO : Pada pemeriksaan fisik tampak konjungtiva dan kuku pucat. Sedangkan pemeriksaan Penunjang laboratorium dengan hemoglobin 8,5 g/dL.

Analisis dan Interpretasi Data

Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Kadar hemoglobin pada ibu hamil yang kurang dari 11,0 g/dl akan membuat kontraksi otot rahim lemah ketika persalinan berlangsung (inersia uteri), menyebabkan masa persalinan memanjang (partus lama) dengan bahaya perdarahan atau infeksi serta hipoksia pada janin. Keadaan tersebut merupakan faktor-faktor yang meningkatkan angka kesakitan dan kematian ibu anak (Hanifah, 2019).

Kadar hemoglobin dalam darah bagi ibu inpartu sangat berpengaruh terhadap keadaan tubuh ibu agar tidak lelah dan letih sedangkan pada kala II persalinan ibu sangat membutuhkan kekuatan untuk mengejan (Andriani, 2016).

#### **D. LANGKAH IV : IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

1. Kolaborasi dengan dokter obgyn untuk pemasangan infus RL 500 ml dan pemberian drip oksitosin ½ ampul dalam 500 ml RL dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit, dan dipertahankan pada tetesan 40.

Rasional: obat oksitosin untuk membantu rahim berkontraksi dan untuk meningkatkan kekuatan kontraksi rahim sedangkan cairan RL dapat membantu ibu menjaga tingkat kecukupan cairan dalam tubuhnya.

2. Pemasangan misoprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional: untuk pematangan serviks dan mempercepat kelahiran bayi

#### **E. LANGKAH V : RENCANA TINDAKAN**

1. Masalah aktual : perlangsungan kala I fase laten anemia
2. Masalah potensial : perlangsungan terjadinya partus dengan tindakan
3. Tujuan :
  - a. kala II berlangsung normal
  - b. keadaan ibu dan janin baik.
4. Criteria
  - a. Kontraksi uterus adekuat
  - b. His kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik
  - c. Fase aktif tidak lebih dari 12 jam (batas fase aktif untuk persalinan pertama kali)
  - d. Primipara tidak lebih dari 13 jam.
  - e. DJJ dalam batas normal (120-160 kali per menit).
  - f. Kondisi ibu dalam keadaan baik ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal

- 1) Tekanan darah
  - a) Systole 100-200 mmHg
  - b) Diastole 60-90 mmHg
- 2) Suhu normal 36,5°C-37,5°C
- 3) Nadi normal 60-100x/menit

5. Rencana tindakan

- a. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga

Rasional : agar ibu dan keluarga mengetahui tentang keadaan ibu sehingga keluarga dapat memberikan dukungan yang akan membuat ibu lebih tenang dan sabar dalam menghadapi persalinannya

- b. Anjurkan untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin

Rasional : Kandung kemih yang penuh akan menyebabkan berkurangnya kontraksi, mencegah penekanan pada vena cava inferior oleh uterus yang membesar dan menghalangi penurunan kepala bayi.

- c. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam (kecuali nadi setiap 30 menit)

Rasional : observasi tanda-tanda vital untuk memantau keadaan ibu tetap dalam batas normal

- d. Observasi DJJ setiap 30 menit

Rasional : observasi DJJ untuk memantau keadaan janin tetap dalam batas normal.

- e. Observasi *vagina toucher* (VT) control tiap 2/4 jam, atau jika ada indikasi, bersihkan vulva dengan kapas savlon sebelum melakukan pemeriksaan dalam untuk mencegah infeksi.

Rasional : untuk memantau kemajuan persalinan

- f. Observasi his setiap 30 menit

Rasional : untuk memantau his sehingga dapat memastikan his dalam batas normal

- g. Ajarkan teknik relaksasi pada saat kontraksi dengan menganjurkan ibu untuk menarik nafas melalui hidung dan menghembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup.

Rasional : untuk mengurangi rasa sakit akibat kontraksi

- h. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit dan misoprostol 1/8 tab pervaginam

Rasional : pemberian infus membantu untuk mengganti cairan ibu yang hilang selama proses persalinan dan pemasangan misoprostol dapat membantu pematangan serviks/dilatasi serviks

- i. Beri intake minum dan makan pada ibu

Rasional : agar ibu memiliki tenaga pada saat meneran

- j. Anjurkan keluarga untuk tetap senantiasa sholat dan berdoa serta anjurkan ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.

Rasional : agar ibu senantiasa berserah diri dan bertawakal kepada allah SWT

- k. Dokumentasikan hasil pemantauan kala I dalam partograf

Rasional : merupakan standarisasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan dan membantu menilai kemajuan persalinan sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan keputusan Klinik.

## **F. LANGKAH VI : PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal: 18 Januari 2022

Jam : 11.00 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Menganjurkan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
3. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap jam (kecuali nadi setiap 30 menit), DJJ dan his tiap 1 jam pada kala 1 fase laten dan tiap 30 menit pada kala fase aktif, kecuali jika ada indikasi dilakukan tiap 30 menit.

Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Suhu	DJJ	Pernapasan	His
11:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,8°C	143 x/i	20 x/i	1x10 (5")
12:00	120/80 mmhg	82 x/i	36,8°C	146 x/i	20 x/i	1x10 (5")
13:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	150 x/i	20 x/i	1x10 (5")
14:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	148 x/i	20 x/i	1x10 (5")
15:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
16:00	120/80 mmhg	74 x/i	36,8°C	145 x/i	20 x/i	1x10 (5")
17:00	120/80 mmhg	72 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
18:00	120/80 mmhg	76 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
19:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
20:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	142 x/i	20 x/i	1x10 (5")
21:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	148 x/i	20 x/i	1x10 (5")
22:00	120/80 mmhg	71 x/i	36,8°C	139 x/i	20 x/i	1x10 (5")
23:00	120/80 mmhg	75 x/i	36,8°C	138 x/i	20 x/i	1x10 (5")
0:00	120/80 mmhg	77 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
1:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	142 x/i	20 x/i	1x10 (5")
2:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5")
3:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
4:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
5:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	143 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
6:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,8°C	138 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
7:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	142 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
8:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	142 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
9:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
10:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	130 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
11:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
12:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	140 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
13:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	143 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
14:00	120/80 mmhg	85 x/i	36,7°C	144 x/i	20 x/i	2x10 (15-20")
15:00	120/80 mmhg	83 x/i	36,7°C	138 x/i	20 x/i	3x10 (15-20")

16:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	3x10 (15-20")
17:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	140 x/i	20 x/i	3x10 (15-20")

Sember Data : Primer

4. Mengobservasi vagina toucher (VT) II tanggal, 19 Januari, jam 18.00

WITA

- a. Vulva dan vagina : Normal
- b. Portio : Tipis
- c. Pembukaan : 4 cm
- d. Ketuban : Utuh
- e. Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang
- f. Penurunan :Hodge II
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir dan darah

5. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital 18.00 Wita (kecuali nadi setiap 30 menit), DJJ dan His

Waktu	tekanan Darah	Nadi	suhu	DJJ	Perna pasan	his
18:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,6°C	145 x/i	22 x/i	3x10 (15-20")
18:30		82 x/i		145 x/i		3x10 (15-20")
19:00		83 x/i		139 x/i		3x10 (20-25")
19:30		85 x/i		143 x/i		3x10 (20-25")
20:00		85 x/i		140 x/i		3x10 (30-35")
20:30		80 x/i		141 x/i		3x10 (30-35")
21:00		81 x/i		143 x/i		3x10 (30-35")
21:30		82 x/i		145 x/i		3x10 (35-40")
22:00	120/80 mmhg	82 x/i	36,6°C	142 x/i	22 x/i	3x10 (35-40")
22:30		81 x/i		145 x/i		3x10 (40-45")
23:00		81 x/i		146 x/i		3x10 (40-45")

Sember Data : Primer

6. Mengobservasi vagina toucher (VT) III tanggal, 19 Januari 2022, jam 22.00 WITA

- a. Vulva dan vagina : Normal
- b. Portio : Melesap
- c. Pembukaan : 9 Cm (Lengkap)
- d. Ketuban : Jernih
- e. Presentasi : Uzun-Uzun Depan
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir Dan Darah

Mengobservasi vagina toucher (VT) IV tanggal, 19 Januari 2022, jam 23.11 WITA

- a. Vulva dan vagina : Normal
- b. Portio : Melesap
- c. Pembukaan : 10 Cm (Lengkap)
- d. Ketuban : Jernih
- e. Presentasi : Uzun-Uzun Depan
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

7. Mengajarkan kepada ibu teknik relaksasi yaitu menarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup

8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit dan misoprostol 1/8 tab pervaginam,

9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

10. Menganjurkan keluarga untuk tetap senantiasa sholat dan berdoa serta anjurkan ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.

11. Mencatat dalam partograf

#### G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN

Tanggal: 18 Januari 2022

Jam : 11.00 WITA

1. Keadaan ibu dan janin baik dan di tandai dengan :
  - a. Tanda-tanda vital dalam batas normal
    - a) Tekanan darah : 120/80 mmHg
    - b) Suhu : 35.6°C (axilla)
    - c) Nadi : 80 kali permenit
    - d) Pernapasan : 24 Kali per menit
  - b. DJJ 130 kali per menit terdengar jelas kuat dan teratur
2. Kala I fase aktif di tandai dengan :
  - a. His yang adekuat 5x10 kali dalam 10 menit dengan durasi 45-50 detik
  - b. Adanya tekanan pada anus, rektum, dan vagina, perineum menonjol
  - c. Dinding vagiba licin, portio tidak teraba, pembukaan lengkap 10 cm, dan penurunan kepala hodge IV UUK depan, air ketuban jernih dan tidak ada molase.
3. Tidak ada tanda-tanda infeksi
4. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL  
PADA NY”D” DENGAN ANEMIA DI RSIA SITTI KHADIJAH I  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TANGGAL 18 JANUARI 2022**

Nomor register : 11xxx  
 Tanggal masuk : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
 Tanggal pengkajian : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
 Tanggal partus : 19 Januari 2022 jam : 23.11 wita  
 Nama pengkaji : Fatmah Junia Sari Bahasoan

**KALA I**

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
 Umur : 25 tahun / 25 tahun  
 Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
 Suku : Bulukumba / Ujung Pandang  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
 Alamat : Abd dg. Sirua No. 312/40

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu merasa mules dan nyeri perut tembus kebelakang disertai pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 18 Januari 2021 pukul 08.00 WITA
2. Sifat nyeri hilang timbul dan tidak ada pengeluaran air ketuban dari jalan lahir
3. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan yang kedua dan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya
4. Ibu mengatakan haid terakhirnya tanggal 05 April 2021
5. Ibu mengatakan usia kehamilan  $\pm 9$  bulan

6. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil.
7. Ibu merasakan pergerakan janinnya kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang
8. Ibu tidak pernah menderita penyakit asma, DM, hipertensi, jantung dan penyakit lainnya
9. Ibu mengeluh sedikit pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya
10. Ibu mengeluh badannya terasa berat atau lelah

#### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum lemah
2. Kesadaran *compos mentis*
3. HTP : 12 Januari 2022
4. Gestasi : 41 minggu 1 hari
5. Pemeriksaan antropometri
  - a. BB : Sebelum hamil : 50 kg  
Sekarang : 64 kg
  - b. TB : 149 cm
  - c. LILA : 28 cm
6. Tanda-tanda vital
  - a. TD : 110/80 mmHg
  - b. N : 80x/i
  - c. S : 36,7°C
  - d. P : 24x/i
7. Pemeriksaan fisik terfokus
  - a. Wajah
 

Inspeksi : Tampak pucat, tidak oedema pada wajah, ekspresi wajah tampak meringis setiap kali bergerak

Palpasi : Tidak ada oedema dan nyeri tekan
  - b. Mata
 

Inspeksi : Simetris kiri dan kanan, kelopak mata tidak bengkak, konjungtiva pucat, sklera putih (tidak ikterus)

## c. Payudara

Inspeksi : Payudara simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi areola mammae.

Palpasi : Tidak teraba adanya massa, kolostrum ada saat di pencet, tidak ada nyeri tekan

## d. Abdomen

Inspeksi : Nampak pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, Nampak striae livide dan linea nigra, tidak ada bekas luka

## Operasi

Palpasi : Leopold I : 2 jrbpx 32 cm, bokong

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 4/5

Lingkar perut : 108 cm

Taksiran berat janin :  $87 \times 35 = 3456$  gram

Auskultasi : Denyut jantung janin (DJJ) terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan Bawah perut ibu dengan frekuensi 143 kali permenit.

His : 1x 10 menit durasi 5-10 detik

## e. Genitalia

Inspeksi : tidak ada kelainan, tidak ada varices, tidak ada pembesaran kelenjar bartholini, nampak pelepasan lendir bercampur dengan air ketuban

Palpasi : tidak ada benjolan, tidak ada oedema, dan tidak ada nyeri tekan

## Pemeriksaan dalam

*Vagina toucher* (VT) I tanggal 18 Januari 2022 Jam 11.00 Wita

1) Vulva Dan Vagina : Normal

2) Portio : tebal

3) Pembukaan : 1 cm

4) Air ketuban : Utuh

- 5) Presentase : UUK lintang Kanan
- 6) Penurunan : Hodge I
- 7) Penumbungan : Tidak Ada
- 8) Molase : Tidak Ada
- 9) Kesan panggul : Normal
- 10) Pelepasan : Lendir dan Darah

f. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah)

- 1) WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
- 2) RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
- 3) HGB : 8.5 g/dl
- 4) HCT : 30.0L%
- 5) MCV : 76.9L [fl]
- 6) MCH : 21.8 pg
- 7) MCHC : 28.3L [g/dl]
- 8) Albumin : Negatif
- 9) Reduksi : Negatif
- 10) Hbsag : Negatif
- 11) Golongan Darah: A

**ASSESSMENT (A)**

GIPOAI, gestasi 41 minggu 1 hari, intrauterin, situs memanjang, tunggal, hidup, keadaan ibu lemah dan janin baik, inpartu kala I fase laten dengan anemia

**PLANNING (P)**

Tanggal: 18 Januari 2022

Jam : 11.00 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan keluarga
2. Menganjurkan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih sesering mungkin
3. Mengobservasi tanda-tanda vital setiap jam (kecuali nadi setiap 30 menit), DJJ dan his tiap 1 jam pada kala 1 fase laten dan tiap 30 menit pada kala fase aktif, kecuali jika ada indikasi dilakukan tiap 30 menit.

Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Suhu	DJJ	Pernapasan	His
11:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,8°C	143 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
12:00	120/80 mmhg	82 x/i	36,8°C	146 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
13:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	150 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
14:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	148 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
15:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
16:00	120/80 mmhg	74 x/i	36,8°C	145 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
17:00	120/80 mmhg	72 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
18:00	120/80 mmhg	76 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
19:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
20:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	142 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
21:00	120/80 mmhg	70 x/i	36,8°C	148 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
22:00	120/80 mmhg	71 x/i	36,8°C	139 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
23:00	120/80 mmhg	75 x/i	36,8°C	138 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
0:00	120/80 mmhg	77 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
1:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	142 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
2:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	1x10 (5'')
3:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,8°C	140 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
4:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
5:00	120/80 mmhg	79 x/i	36,8°C	143 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
6:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,8°C	138 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
7:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	142 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
8:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	142 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
9:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
10:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	130 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
11:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
12:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	140 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
13:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	143 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
14:00	120/80 mmhg	85 x/i	36,7°C	144 x/i	20 x/i	2x10 (15-20'')
15:00	120/80 mmhg	83 x/i	36,7°C	138 x/i	20 x/i	3x10 (15-20'')

16:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	139 x/i	20 x/i	3x10 (15-20")
17:00	120/80 mmhg	84 x/i	36,7°C	140 x/i	20 x/i	3x10 (15-20")

Sember Data : Primer

4. Mengobservasi vagina toucher (VT) II tanggal, 19 Januari, jam 18.00 WITA

- Vulva dan vagina : Normal  
 Portio : Tipis  
 Pembukaan : 4 cm  
 Ketuban : Utuh  
 Presentasi : ubun-ubun kecil kanan lintang  
 Penurunan :Hodge II  
 Molase : Tidak Ada  
 Penumbungan : Tidak Ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir dan darah

5. Melanjutkan pemantauan tanda-tanda vital setiap jam 18.00 Wita (kecuali nadin setiap 30 menit), DJJ dan His

Waktu	tekanan Darah	Nadi	suhu	DJJ	Perna pasan	his
18:00	120/80 mmhg	80 x/i	36,6°C	145 x/i	22 x/i	3x10 (15-20")
18:30		82 x/i		145 x/i		3x10 (15-20")
19:00		83 x/i		139 x/i		3x10 (20-25")
19:30		85 x/i		143 x/i		3x10 (20-25")
20:00		85 x/i		140 x/i		3x10 (30-35")
20:30		80 x/i		141 x/i		3x10 (30-35")
21:00		81 x/i		143 x/i		3x10 (30-35")
21:30		82 x/i		145 x/i		3x10 (35-40")
22:00	120/80 mmhg	82 x/i	36,6°C	142 x/i	22 x/i	3x10 (35-40")
22:30		81 x/i		145 x/i		3x10 (40-45")
23:00		81 x/i		146 x/i		3x10 (40-45")

Sember Data : Primer

6. Mengobservasi vagina toucher (VT) III tanggal, 19 Januari 2022, jam 22.00

WITA

- a. Vulva dan vagina : Normal
- b. Portio : Melesap
- c. Pembukaan : 9 Cm (Lengkap)
- d. Ketuban : Jernih
- e. Presentasi : Ubus-Ubus Depan
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir Dan Darah

Mengobservasi vagina toucher (VT) IV tanggal, 19 Januari 2022, jam 23.11

WITA

- a. Vulva dan vagina : Normal
- b. Portio : Melesap
- c. Pembukaan : 10 Cm (Lengkap)
- d. Ketuban : Jernih
- e. Presentasi : Ubus-Ubus Depan
- f. Penurunan : Hodge IV
- g. Molase : Tidak Ada
- h. Penumbungan : Tidak Ada
- i. Kesan panggul : Normal
- j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

7. Mengajarkan kepada ibu teknik relaksasi yaitu menarik nafas melalui hidung dan hembuskan melalui mulut seperti sedang meniup-niup

8. Berkolaborasi dengan dokter obgyn untuk penatalaksanaan pemberian infus RL 28 tetes per menit dan misoprostol 1/8 tab pervaginam,

9. Memberi makan dan minum jika tidak ada his

10. Menganjurkan keluarga untuk tetap senantiasa sholat dan berdoa serta anjurkan ibu untuk selalu berdoa untuk kelancaran persalinan dan juga untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin.
11. Mencatat dalam partograf

## **KALA II**

### **DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan sakitnya semakin kuat dan sering
2. Ibu mengatakan ada dorongan yang kuat untuk meneran
3. Ibu mengatakan ada tekanan pada anus atau ingin BAB dan rasa ingin meneran
4. Ibu mengatakan adanya pengeluaran air ketuban dari jalan lahir

### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Perineum menonjol
2. Vulva dan anus membuka
3. His 3 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik
4. DJJ terdengar jelas pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 146 x/i menit dan teratur
5. VT tanggal 19 Januari 2022, jam 23.11 WITA

Vulva dan vagina : Normal  
 Portio : Melesap  
 Pembukaan : 10 Cm (Lengkap)  
 Ketuban : Jernih  
 Presentasi : Uzun-Uzun Depan  
 Penurunan : Hodge IV  
 Molase : Tidak Ada  
 Penumbungan : Tidak Ada  
 Kesan panggul : Normal  
 Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban

### **ASSESSMENT (A)**

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah potensial : potensial terjadinya partus terlantar  
potensial terjadinya perdarahan intrapartum  
potensial terjadi asfiksia neonatorum

### **PLANNING (P)**

Tanggal 19 Januari 2022

Jam : 23.11 WITA

1. Melihat adanya tanda dan gejala kala II  
(dorongan kuat untuk meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol, vulva dan anus membuka)
2. Menyiapkan alat dan bahan persalinan
  - a. Partus set
    - 1) Klem kocher
    - 2) ½ kocher
    - 3) Gunting tali pusat
    - 4) Gunting episiotomy
    - 5) Penjepit tali pusat
    - 6) Kateter
    - 7) Kasa
    - 8) Handscoon
  - b. Hecting set
    - 1). Naadle voerder
    - 2). Pinset anatomi
    - 3). Jarum
    - 4). Catgut
    - 5). Gunting benang
    - 6). Kasa
  - c. Air DTT
  - d. Kapas DTT
  - e. Larutan clorin
  - f. Tempat sampah
  - g. Tensimeter
  - h. Stetoskop

- i. Deele
- j. Dopler
- k. Underped
- l. Obat
  - 1). Cairan infus
  - 2). Oksitosin
  - 3). Lidocaine
  - 4). Salep mata
  - 5). Vit.k
  - 6). HbO
3. Memakai celemek
4. Memastikan tangan tidak memakai perhiasan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
5. Memakai handscoon
6. Mempersiapkan oksitosin 1 ampul 10 IU dengan satu tangan
7. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas savlon
8. Melakaukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan sudah lengkap tanggal 19 Januari 2022, jam 23.11 WITA
  - a. Vulva dan vagina : Normal
  - b. Protio : Melesap
  - c. Pembukaan : 10 Cm (Lengkap)
  - d. Ketuban : Jernih
  - e. Presentasi : Uzun-Uzun Depan
  - f. Penurunan :Hodge Iv
  - g. Molase : Tidak Ada
  - h. Penumbungan : Tidak Ada
  - i. Kesan Panggul : Normal
  - j. Pelepasan : Lendir, Darah Dan Air Ketuban
9. Mencelupkan hanscoon secara terbalik ke dalam larutan klorin 0,5%
10. Mendengar DJJ setelah uterus tidak berkontraksi

11. Memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan ibu dan janin baik
12. Meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu yang baik untuk meneran serta mengajurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa berdoa dan berzikir agar persalinannya dilancarkan
13. Melakukan pimpinan meneran jika ada kontraksi atau his
14. Membantu ibu untuk mengambil posisi yang nyaman
15. Menganjurkan ibu untuk miring ke kiri apabila belum ingin mengejan dan meneran pada puncak his.
16. Memasang handuk bersih diatas perut ibu jika terlihat kepala janin membuka vulva 5-6 cm
17. Meletakkan underpad di bawah bokong ibu
18. Membuka bak partus
19. Memakai handscoon steril pada kedua tangan
20. Memimpin persalinan dengan melindungi perineum
21. Memeriksa adanya lilitan tali pusat
22. Menunggu kepala bayi melakukan putaran paksi luar
23. Meletakkan tangan secara biparietal dengan hati-hati, gerakan tangan kerut bawah untuk melahirkan bahu anterior dan gerakan tangan kearah atas untuk melahirkan bahu posterior
24. Melahirkan kepala leher dan bahu dengan sanggah susur
25. Melahirkan badan bayi dengan menelusuri punggung ke arah bokong sampai tungkai bawah dan menyelipkan jari telunjuk diantara kedua kaki.  
Hasil : bayi lahir spontan tanggal 19 Januari 2022, pukul : 23.45 wita, BB : 3400 gram, PB : 49 cm.
26. Menjepit tali pusat
27. Memotong tali pusat
28. Meletakkan bayi diatas perut ibu lalu lakukan penilaian sepintas dan menilai *apgar score* pada menit pertama dan menit kelima  
Hasil : a. bayi menangis kuat, dan bernapas tanpa kesulitan  
b. badan bayi kemerah-merahan dan bergerak aktif

penilaian *apgar score* yang dilakukan oleh bidan

**Tabel 3.3 penilaian *apgar score***

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Bayi biru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Refleks pada ekstremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (Pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah *APGAR score* :8/10

Sumber data sekunder

29. Mengeringkan seluruh badan bayi dengan kain bersih dan kering

30. Menilai skala ballard bayi

Hasil : kulit 2, lanugo 3, daris plantar 2, payudara 3, mata telinga 2, genitalia 3, sikap tubuh 3, pergelangan tangan 4, lekol lengan 3, sudut popital 4, tanda selempang 4, tumit ke kuping 3. Skor 37 dengan taksiran usia gestasi 38-40 minggu.

**KALA III****DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan nyeri perut
2. Ibu mengatakan merasa lelah setelah bersalin
3. Ibu mengatakan senang dengan kelahiran bayinya
4. Ibu senantiasa berdoa dan berdzikir agar keadaannya dan bayi tetap sehat

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Bayi lahir spontan pada tanggal 19 Januari 2022, pukul : 23.45 wita, BB : 3400 gram, PB : 49 cm dan A/S : 8/10
2. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
3. TFU teraba setinggi pusat
4. Tampak semburan darah tiba-tiba
5. Plasenta belum terlepas
6. Tampak tali pusat di depan vulva
7. Perdarahan  $\pm$ 100 cc

**ASSESSMENT (A)**

Perlangsungan kala III

**PLANNING (P)**

Tanggal 19 Januari 2022

Jam 23.45 WITA


31. Memeriksa fundus uteri untuk memastikan janin tunggal
32. Memberitahu ibu akan disuntik oxytocin
33. Menyuntikkan oxytocin 10 IU pada 1/3 anterolateral paha ibu
34. Memindahkan klem tali pusat hingga 5-6 cm dari depan vulva
35. Meletakkan tangan kiri di atas symphysis menahan bagian uterus dan tangan kanan memegang klem.
36. Meregangkan tali pusat saat uterus berkontraksi dengan tangan kanan dan tangan kiri mendorong uterus ke arah dorso cranial
37. Meregangkan tali pusat ke arah atas dan ke bawah
38. Menjemput plasenta dengan kedua tangan jika plasenta sudah tampak di depan vulva
39. Melahirkan plasenta dengan memutar searah jarum jam

Hasil: plasenta lahir jam 23.50 WITA

40. Memeriksa apakah plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap

41. Memeriksa adanya robekan jalan lahir

Hasil: terdapat ruptur pada perineum dengan tingkat II dan telah dilakukan teknik penjahitan dengan teknik jelujur.



**KALA IV****DATA SUBJEKTIF (S)**

Ibu mengatakan lelah setelah melahirkan

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Kala III berlangsung  $\pm 5$  menit
2. Plasenta lahir lengkap pukul 23.50 WITA
3. TFU setinggi pusat
4. Kontraksi uterus teraba keras dan bundar
5. Perdarahan  $\pm 100$  cc
6. Pemeriksaan TTV
  - a. TD : 120/70 mmHg
  - b. N : 81 x/i
  - c. S : 36,5 °C
  - d. P : 24 x/i
7. Terdapat laserasi tingkat II

**ASSESSMENT (A)**

Perlangsungan kala IV

**PLANNING (P)**

Tanggal 20 Januari 2022

Jam: 00.05 WITA

41. Memeriksa kontraksi uterus dan robekan jalan lahir
42. Membiarkan bayi tetap melakukan IMD selama 1 jam
43. Melakukan penimbangan dan pengukuran pada bayi baru lahir, berikan salep mata dan vitamin K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

Hasil: BB : 3400 gram

PB : 49 cm

LK : 33 cm

LD : 34 cm

LP : 32 cm

Vit K telah diberikan di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM

45. Memberikan imunisasi hepatitis B di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM 1 jam setelah pemberian vitamin K

46. Melakukan pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit pada 1 jam pertama, dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua.

**Tabel 3.4. Pemantauan kontraksi uterus dan kandung kemih**

Waktu	Kontraksi uterus	Kandung kemih
00.05 WITA	Baik	kosong
00.20 WITA	Baik	kosong
00.35 WITA	Baik	kosong
0050 WITA	Baik	kosong
01.20 WITA	Baik	kosong
01.50 WITA	Baik	kosong

Sember Data : Primer

47. Melakukan pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua

**Tabel 3.5. Pemantauan tinggi fundus uteri dan perdarahan**

waktu	Tinggi fundus uteri	Pendarahan
00.05 WITA	Setinggi pusat	±20 cc
00.20 WITA	Setinggi pusat	±10 cc
00.35 WITA	Setinggi pusat	±10 cc
0050 WITA	Setinggi pusat	±5 cc
01.20 WITA	Setinggi pusat	±5 cc
01.50 WITA	Setinggi pusat	±5 cc

Sember Data : Primer

48. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga cara melakukan masase dan menilai kontraksi
49. Melakukan pemantauan tekanan darah dan nadi setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan tiap 30 menit pada 1 jam kedua, serta memantau suhu 1 kali pada jam pertama dan 1 kali pada jam kedua

**Tabel 3.6. Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu**

Waktu	Tekanan darah	Nadin	Suhu
00.05 WITA	120/70 mmHg	81x/i	36,5°C

00.20 WITA	120/80 mmHg	80x/i	
00.35 WITA	110/60 mmHg	80x/i	
0050 WITA	110/70 mmHg	79x/i	
01.20 WITA	110/60 mmHg	82x/i	36,5°C
01.50 WITA	110/60 mmHg	80x/i	

Sember Data : Primer

50. Menilai pernapasan dan suhu tubuh bayi

Hasil : bayi bernapas baik yaitu 50 x/menit dan suhu 36,5 OC

51. Merendam alat dalam larutan clorin 0,5 % selama 10 menit

52. Membuang bahan-bahan yang terkontaminasi

53. Membersihkan badan ibu dari sisa darah, lendir dan air ketuban dengan air DTT

54. Memastikan ibu merasa nyaman serta memberitahu keluarga untuk memberikan makan dan minum kepada ibu

55. Mendekontaminasi tempat tidur dengan larutan clorin 0,5 %

56. Membersihkan handscoon dengan larutan clorin 0,5 % secara terbalik

57. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir

58. Melengkapi partograf.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN  
BAYI BARU LAHIR PADA NY”K“ DENGAN BCB/PBK/SMK  
DI RSIA SITTI KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TANGGAL 19 JANUARI 2022**

Nomor register : 11xxx  
 Tanggal lahir : 19 Januari 2022 jam : 23.45 wita  
 Tanggal pengkajian : 19 Januari 2022 jam : 23.45 wita  
 Nama pengkaji : Fatmah Junia Sari Bahasoan

**IDENTITAS BAYI**

Nama : bayi Ny “D”  
 Tempat, tanggal lahir : di RSIA sitti khadijah I muhammadiyah Makassar,  
 tanggal 19 Januari 2022  
 Umur : 0 hari  
 Anak ke : 1  
 Jenis kelamin : Laki-laki

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
 Umur : 25 tahun / 25 tahun  
 Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
 Suku : Bulukumba / Ujung Pandang  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
 Alamat : Abd dg. Sirua No. 312/40

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu melahirkan di RSIA sitti khadijah I muhammadiyah Makassar, tanggal 19 Januari 2022 jam 23.45 WITA
2. Hari pertama haid terakhir ibu tanggal 05 April 2021
3. Usia kehamilan pada saat melahirkan  $\pm$  9 bulan

4. Ibu pertama kali menyusui bayinya sejak dilahirkan yaitu IMD yang dibantu oleh Bidan
5. Persalinan spontan/tanpa alat dan tidak ada penyulit
6. Ini merupakan anak pertama

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum bayi baik
2. Gestasi kehamilan pada saat melahirkan yaitu 41 minggu 2 hari
3. Penilaian sepintas segera menangis, bernapas dalam baik, kulit kemerahan segera setelah lahir
4. Penilaian Apgar score

**Tabel 3.7. Pemantauan tekanan darah, nadi dan suhu**

Yang dinilai	Nilai 0	Nilai 1	Nilai 2	Menit 1	Menit 5
<i>Appearance</i> (warna kulit)	Bayi Biru, pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh badan kemerahan	1	2
<i>Pulse</i> (denyut jantung)	Tidak ada	<100x/i	>100x/i	2	2
<i>Grimace</i> (refleks)	Tidak ada	Merintih	Batuk bersin	2	2
<i>Activity</i> (tonus otot)	Tidak ada	Refleks pada ekstremitas	Bergerak aktif	1	2
<i>Respiratory</i> (Pernapasan)	Tidak ada	Lambat, tidak teratur	Menangis kuat	2	2

Jumlah APGAR score :8/10

Sumber Data : Primer

5. Pemeriksaan Antropometri  
Berat badan : 3400 gram

- Panjang badan :49 cm
- Lingkar kepala : 33 cm
- Lingkar dada : 34 cm
- Lingkar perut : 32 cm
- Lila : 11.5 cm
6. Pemeriksaan tanda-tanda vital
- HR : 140x/i
- Pernapasan : 44x/i
- Suhu : 36,9°C
7. Pemeriksaan fisik
- a. Kulit : warna kulit kemerahan dan tidak ikterus
  - b. Kepala : distribusi rambut di puncak kepala, tidak ada massa
  - c. Wajah : mata segaris dengan telinga, mulut di garis tengah wajah dan simetris
  - d. Telinga : posisi telinga berada di garis lurus dengan mata, kulit tidak kendur, pembentukan tulang rawan terbentuk dengan baik dan kokoh
  - e. Hidung : posisi di garis telinga, bernapas melalui hidung
  - f. Mulut : bentuk dan ukuran proporsional dengan wajah, bibir berwarna merah muda dan lembab, palatum utuh, lidah di garis tengah, refleks menghisap serta refleks *rooting* ada
  - g. Leher : simetris, tyroid di garis tengah, tidak ada pembesaran pada vena jugularis
  - h. Dada : gerakan dinding dada simetris, frekuensi napas 50x/i, suara napas jernih frekuensi jantung 142x/i
  - i. Payudara : jarak antara puting pada garis sejajar tanpa ada puting tambahan
  - j. Abdomen : abdomen bundar dan simetris, tampak tali pusat yang dijepit dengan penjepit tali pusat, abdomen lunak tidak ada massa dan bising usus ada
  - k. Genitalia : tampak labia minora, labia mayora dan clitoris

- l. Anus : tampak lubang anus
- m. Ekstremitas : simetris, jari kaki dan jari tangan lengkap
- 8. Pemeriksaan refleks
  - a. Refleks *Moro* (+) : ada respon saat dikejutkan
  - b. Refleks *Rooting*(+) : ada respon mencari puting
  - c. Refleks *sucking*(+) : ada respon ingin menghisap
  - d. Refleks *Grafs/Plantar* : ada respon ingin menggenggam
  - e. Refleks *Planta* (+): ada respon ketika bagian bawah disentuh
  - f. Refleks *Babinski* (+) : ada respon ketika disentuh, menarik ke dalam
- 9. Eliminasi
  - BAB : mekonium
  - BAK : positif

#### ASSESSMENT (A)

Bayi Ny”D” dengan BCB/SMK/SPT, segera menangis

#### PLANNING (P)

Tanggal 19 Januari 2022

Jam 23.45 WITA

1. Menjelaskan pada ibu bahwa keadaan bayi dalam keadaan baik  
Hasil : ibu mengerti
2. Mengeringkan bayi dan mengganti sarung basah dengan sarung yang kering  
Hasil : tindakan telah dilakukan
3. Membedong bayi dengan kain bersih dan kering agar bayi tidak kedinginan  
Hasil : tindakan telah dilakukan
4. Menganjurkan ibu untuk memberikan Asi eksklusif pada bayinya selama 6 bulan dan tidak memberikan makanan tambahan selain Asi.  
Hasil : ibu bersedia melakukannya
5. Menjelaskan manfaat Asi yaitu:
  - a. Asi kaya akan zat penting yang dibutuhkan oleh bayi seperti DHA,AA, omega 6, laktosa, protein, lactobacillus, vitamin A,

colostrum, lemak yang semuanya dalam takaran dan komposisi yang pas untuk bayi

- b. Asi memberikan kekebalan tubuh yang optimal pada bayi
- c. Asi tidak basi dan selalu higienis serta segar
- d. Sebagai sarana mendekatkan ibu dan bayi

Hasil : ibu mengerti

6. Mengajarkan kepada ibu cara perawatan tali pusat

- a. Membersihkan dengan kasa steril yang dibasahi air matang di mulai dari pangkal tali pusat dan biarkan terbuka, dan tidak boleh diberi salep, bedak, minyak dengan betadin
- b. Usahakan popok atau celana bayi tidak mengenai tali pusat agar tali pusat cepat kering dan tidak iritasi

Hasil : ibu mengerti

7. Menjelaskan pada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya bayi baru lahir

- a. Pernapasan  $<30x/i$  atau  $>60x/i$
- b. Suhu tubuh bayi  $<36,5^{[2]}$  atau  $>37,5^{[2]}$
- c. Bayi, biru, pucat dan memar
- d. Rewel dan muntah
- e. Tali pusat merah, bengkak, serta keluar cairan busuk bernanah
- f. Tidak BAB selama 3 hari, tinja merah
- g. Kejang dan menggigil

Hasil : ibu dan keluarga mengerti

8. Meminta izin kepada ibu untuk memberikan salep mata, vit K di 1/3 lateral paha kiri bayi secara IM<sup>(90°)</sup>

Hasil : ibu memberi izin dan bayi telah diberikan salep mata dan vit K

9. Setelah 1 jam pemberian vit K beritahu ibu bahwa bayinya akan di imunisasi Hbo di 1/3 lateral paha kanan bayi secara IM<sup>(90°)</sup>

Hasil : ibu bersedia dan bayi telah mendapat imunisasi Hbo

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL  
CARE PADA NY”D” 1 JAM SETELAH MASA NIFAS DENGAN  
NYERI ABDOMEN DI RSIA SITTI KHADIJAH I  
MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TANGGAL 20 JANUARI 2022**

Nomor register : 11xxxx  
 Tanggal masuk rumah sakit : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
 Tanggal partus : 19 Januari 2022 jam : 23.11 wita  
 Tanggal pengkajian : 20 Januari 2022 jam : 02.50 wita  
 Nama pengkaji : Fatmah Junia Sari Bahasoan

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
 Umur : 25 tahun / 25 tahun  
 Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
 Suku :Bulumkumba / Ujung pandang  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
 Alamat :Abd dg. Sirua No. 312/40

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengeluh nyeri abdomen setelah melahirkan sejak 3 jam yang lalu
2. Ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 23.11 WITA
3. Hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2021
4. Ibu mengatakan ini kehamilannya yang kedua dan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya
5. Ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang di bantu oleh bidan
6. Ibu belum BAB dan sudah BAK
7. Ibu tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi, DM, jantung dan penyakit serius lainnya.

8. Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitas

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum lemah
2. Kesadaran compos mentis
3. Pemeriksaan TTV

Tekanan darah : 100/60 mmHg      suhu : 36.8<sup>o</sup>

Nadin : 80 x/l      pernapasan : 22 x/i

4. Pemeriksaan fisik
  - a. Wajah : tampak pucat, tidak ada oedema, tidak ada nyeri tekan
  - b. Mata : simetris, selera putih dan konjungtiva pucat
  - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
  - d. Payudara : simetris, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mammae, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan, dan pengeluaran Asi saat puting dipencet
  - e. Abdomen : tidak ada bekas operasi, tinggi fundus uteri 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih ibu kosong
  - f. Genitalia : tampak jahitan perineum, tampak pengeluaran darah ±100 cc, ibu masih memakai popok, tidak ada oedema, tidak ada varises, tidak ada tanda-tanda infeksi
  - g. Anus : tidak ada hemoroid
  - h. Ekstremitas: terpasang infus di tangan sebelah kiri ibu, tidak ada oedema, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan.
5. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah) pada tanggal 18 Januari 2022  
Jam 11.05 WITA
  - a. WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
  - b. RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
  - c. HGB : 8.5 g/dl

- d. HCT : 30.0L%
- e. MCV : 76.9L [fl]
- f. MCH : 21.8 pg
- g. MCHC : 28.3L [g/dl]
- h. Albumin : Negatif
- i. Reduksi : Negatif
- j. Hbsag : Negatif
- k. Golongan Darah: A

#### **ASSESSMENT (A)**

Ny "D" P1A1 postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen

#### **PLANNING (P)**

Tanggal : 20 Januari 2022

Jam 02.50 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri abdomen, yaitu pada saat hamil rahim membesar sesuai ukuran janin yang dikandung, saat bayi lahir maka perlahan-lahan rahim akan menyusut dan mengecil hingga sebesar buah pir kecil. Proses kembalinya ke bentuk semula dari rahim ini, maka disertai dengan rasa kram di perut yang disebut dengan kontraksi, uterus segera mengecil dan pembuluh darah yang terbuka saat plasenta terlepas akan segera menutup kembali sehingga tidak terjadi pendarahan. Nyeri perut seperti ini akan semakin terasa saat menyusui, ibu tidak perlu cemas karena adanya rangsangan hisapan bayi maka keluarlah hormone oksitosin yang membantu kontraksi uterus, menggunakan gurita yang nyaman, lakukan relaksasi nafas bila nyeri atau kram muncul  
 Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia melakukannya
2. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan diatas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu teraba keras dan bundar  
 Hasil : ibu dan keluarga mengerti dengan penjelasn yang diberikan oleh bidan

3. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu karena ibu mengalami anemia yaitu kadar hemoglobin dalam darah berkurang yang mengakibatkan ibu pusing, pucat dan kelelahan

Hasil : ibu mengerti

4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini agar memperlancar pengeluaran lochea, mengurangi infeksi, mempercepat involusi uteri serta memperlancar peredaran darah.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin agar produksi asi lancar dan bayi mendapatkan asupan nutrisi. Sedangkan bagi ibu dapat merangsang keluarnya hormon oksitosin yang dapat membantu rahim berkontraksi sehingga mengurangi resiko perdarahan setelah melahirkan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Memberikan konseling tentang

- a. Nutrisi

Gizi yang dibutuhkan ibu yaitu makanan sehat dan seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, kalsium seperti yang terkandung dalam nasi, daging, ikan, telur, tempe, tahu, buah-buahan, kacang-kacangan dan banyak mengkonsumsi air putih untuk memperbanyak produksi Asi

- b. Personal hygiene

Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi, menggosok gigi, minimal 2 kali sehari, mengganti celana dalam setiap kali lembab atau basah dan rajin mengganti pembalut

- c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat cukup yaitu tidur siang 2 jam, dan malam 6-8 jam

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya


7. Menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi
  - a. Kondom merupakan selubung tipis dari karet yang berguna sebagai sarung penis yang sedang ereksi selama berhubungan dan menghalangi sperma masuk ke vagina yang membantu mencegah kehamilan, adapun kekurangannya yaitu dapat bocor yang dapat menyebabkan fungsi tidak efektif.
  - b. Implant yaitu alat kontrasepsi berbentuk batil batang kecil yang dipasang di lengan atas yang berfungsi untuk mencegah kehamilan dan aman bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya menstruasi tidak teratur, tidak dapat digunakan penderita DM dan osteoporosis, dapat memicu iritasi serta rasa tidak nyaman di area lengan yang dipasang.
  - c. IUD/alat kontrasepsi dalam rahim adalah alat kontrasepsi yang pasang didalam rahim untuk menunda kehamilan dan menjaga jarak kehamilan dan menjamin perlindungan jangka panjang, terutama bagi ibu yang menyusui, adapun kekurangannya yaitu aliran menstruasi, bercak berulang, kemungkinan mengalami sakit punggung.
  - d. Suntik 3 bulan merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan menyuntikan hormon progesteron pada bokong ibu atau pada lengan atas ibu setiap 3 bulan sekali, adapun kekurangannya penggunaan jangka panjang menurunkan kepadatan tulang
  - e. Pil KB merupakan langkah pencegahan kehamilan dengan mengkonsumsi rutin pil KB, adapun kekurangannya dapat menyebabkan bercak diantara menstruasi, mual, muntah, sakit kepala, dan tidak cocok dengan wanita pelupa.

Hasil : ibu mengerti dan belum menentukan kontrasepsi yang diinginkan dan ingin berdiskusi terlebih dahulu bersama suami.

7. Mengajarkan keluarga untuk senantiasa melaksanakan sholat lima waktu  
Hasil : keluarga bersedia melakukannya
8. Mengajarkan ibu untuk menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa Allah

Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL  
CARE PADA NY”D” 5 JAM SETELAH MASA NIFAS DENGAN  
KELUHAN ADA RASA MULES DI RSIA SITTI  
KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
TANGGAL 20 JANUARI 2022**

Nomor register : 11xxxx  
 Tanggal masuk rumah sakit : 18 Januari 2022 jam : 11.00 wita  
 Tanggal partus : 19 Januari 2022 jam : 23.11 wita  
 Tanggal pengkajian : 20 Januari 2022 jam : 06.50 wita  
 Nama pengkaji : Fatmah Junia Sari Bahasoan

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
 Umur : 25 tahun / 25 tahun  
 Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
 Suku :Bulumkumba / Ujung pandang  
 Agama : Islam / Islam  
 Pendidikan : SMA / SMA  
 Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
 Alamat :Abd dg. Sirua No. 312/40

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. ibu mengatakan melahirkan 5 jam yang lalu tanggal 19 januari 2022 jam 23.11 wita
2. Ibu belum BAB dan sudah BAK
3. Ibu mengatakan perut masih mule-mules
4. Ibu mengatakan ASI sudah lancar
5. Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitas

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum lemah

2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
  - a. TD : 110/60 mmHg
  - b. N : 80 x/menit
  - c. S : 36,8 0C
  - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan fisik
  - a. Wajah : tidak tampak pucat, tidak ada kloasma, tidak oedema, tidak nyeri tekan
  - b. Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva pucat
  - c. Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
  - d. Payudara : simetris, terdapat hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI sudah keluar
  - e. Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU 1 jbr pst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.
  - f. Genitalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, masih memakai pembalut, perdarahan  $\pm 70$  cc dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi.
5. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah) pada tanggal 18 Januari 2022  
Jam 11.05 WITA
  - a. WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
  - b. RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
  - c. HGB : 8.5 g/dl
  - d. HCT : 30.0L%
  - e. MCV : 76.9L [fl]
  - f. MCH : 21.8 pg
  - g. MCHC : 28.3L [g/dl]

- h. Albumin : Negatif
- i. Reduksi : Negatif
- j. Hbsag : Negatif
- k. Golongan Darah: A

### **ASSESSMENT (A)**

P1A1 postpartum hari pertama

### **PLANNING (P)**

Tanggal : 20 Januari 2022

Jam 06.50 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja  
Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu penyebab keluhan yang dirasakan ibu adalah hal yang fisiologis pada ibu masa nifas. Rasa mulas diakibatkan dari kontraksi uterus untuk mencegah perdarahan selain itu selama masa nifas juga akan terjadi peningkatan suhu tubuh, sedikit pusing dan lemas yang diakibatkan karena kelelahan. Luka jahitan pada luka perineum akan sembuh dengan sendirinya selama 6-7 hari jika tidak ada tanda-tanda infeksi.  
Hasil: ibu mengerti penyebab nyeri yang dirasakan
3. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu karena ibu mengalami anemia yaitu kadar hemoglobin dalam darah berkurang yang mengakibatkan ibu pusing, pucat dan kelelahan  
Hasil : ibu mengerti
4. Mengajarkan ibu dan keluarga cara melakukan masase uterus yaitu dengan meletakkan satu tangan di atas perut ibu, lalu tekan dan putar secara terus menerus searah jarum jam sampai perut ibu terasa keras dan bundar.  
Hasil :Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia melakukannya.
5. Mengajarkan ibu banyak minum 8 gelas/hari untuk membantu memperbanyak produksi ASI dan menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti nasi, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, telur, tempe, tahu, daging, ikan laut.  
Hasil : ibu sudah mengerti

6. Memberikan ibu KIE tentang ASI eksklusif yaitu
  - a. Memberikan ASI saja selama 6 bulan tanpa makanan tambahan.
  - b. Sumber kekebalan bagi bayi untuk mencegah bibit-bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh bayi
  - c. Untuk mencegah alergi pada bayi

Hasil : ibu sudah mengerti

7. Mengajarkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu minimal 8 jam/hari. Istirahat yang cukup dapat menambah energi ibu selama menyusui dan mengurangi anemia yang ibu alami.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

8. Mengajarkan ibu untuk melakukan perawatan payudara yaitu:
  - a. Sebelum melakukan perawatan payudara dibersihkan terlebih dahulu
  - b. Gunakan baby oil atau minyak kelapa pada kapas, kemudian putting dibersihkan.
  - c. Tempelkan kedua telapak tangan diantara kedua payudara ibu.
  - d. Pengurutan dimulai kearah atas, ke samping, lalu ke arah bawah.
  - e. Dalam pengurutan posisi tangan kiri ke arah sisi kiri, telapak tangan ke arah sisi kanan, pengurutan diteruskan ke arah bawah, kesamping selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan kemudian kedua tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali.
  - f. Setelah itu bersihkan payudara terlama bekas minyak
  - g. Anjurkan ibu untuk menggunakan bra yang dapat menyanggah payudara.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

9. Memberitahu ibu tanda-tanda bahaya pada masa nifas
  - a. Perdarahan postpartum
  - b. Lochea berbau busuk
  - c. Sub-involusi uterus
  - d. Nyeri pada perut dan panggul
  - e. Pusing dan lemas yang berlebihan

- f. Demam
- g. Penyulit dalam menyusui
- h. Infeksi pada luka perineum

Hasil : ibu sudah mengerti

10. Mengajarkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya.

11. Mengajarkan ibu senam nifas yaitu sikap tubuh terlentang, kedua kaki lurus kedepan, angkat kedua tangan lurus ke atas sampai kedua telapak tangan bertemu, turunkan perlahan sampai kedua tangan terbuka lebar hingga sejajar dengan bahu, lakukan gerakan dengan mantap sehingga terasa otot sekitar tangan dan bahu terasa kencang.

Hasil : ibu mengerti.dan bersedia melakukannya

12. Meangajarkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan berdoa dan melakukan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL  
CARE HARI KE DUA PADA NY”D” DENGAN  
PERAWATAN TALI PUSAT DI RUMAH IBU  
TANGGAL 21 JANUARI 2022**

**KUNJUNGAN NIFAS KE I**

Tempat : Rumah Ny “D”  
Tanggal : 21 Januari 2022  
Jam : 17.05 WITA

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama : Ny “Dewi” / Tn “Ansary”  
Umur : 25 tahun / 25 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Bulumkumba / Ujung pandang  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMA / SMA  
Pekerjaan : IRT / Karyawan Swasta  
Alamat : Abd dg. Sirua No. 312/40

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 2 hari yang lalu tanggal 19 Januari 2022 jam 23.11 WITA
2. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari
3. ASI sudah lancar.
4. Ibu merasa pusing nya telah berkurang tapi badan ibu masih terasa berat atau lelah
5. Ibu mengkonsumsi tablet Fe

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV

- a. TD : 110/70 mmHg
  - b. N : 80 x/menit
  - c. S : 36,6 0C
  - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan Fisik terfokus
- Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan
- Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva pucat
- Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe
- Payudara : simetris, terdapat hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
- Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- Genitalia : tidak terdapat jahitan pada perineum , tampak pengeluaran lochea rubra, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi
5. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah) pada tanggal 18 Januari 2022  
Jam 11.05 WITA
- a. WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
  - b. RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
  - c. HGB : 8.5 g/dl
  - d. HCT : 30.0L%
  - e. MCV : 76.9L [fl]
  - f. MCH : 21.8 pg
  - g. MCHC : 28.3L [g/dl]
  - h. Albumin : Negatif
  - i. Reduksi : Negatif
  - j. Hbsag : Negatif
  - k. Golongan Darah: A

**ASSESSMENT (A)**

P1A1 2 hari postpartum

**PLANNING (P)**

Tanggal 21 Januari 2022


Jam 17.05 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja  
Hasil : ibu mengerti
2. Memberitahu ibu dan keluarga bahwa keadaan ibu karena ibu mengalami anemia yaitu kadar hemoglobin dalam darah berkurang yang mengakibatkan ibu pusing, pucat dan kelelahan  
Hasil : ibu mengerti
3. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :
  - a. Biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka dan tetap dijaga kebersihannya.
  - b. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat
  - c. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)Hasil : ibu sudah mengerti
4. Memberikan HE (health education) pada Ibu tentang
  - a. Menjaga personal hygiene yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi
  - b. Istirahat yang cukup. Jika durasi tidur kurang dari waktu ideal, hal ini akan menyebabkan proses pembaharuan sel-sel tersebut akan berjalan secara tidak maksimal dan akan mengganggu proses pembuatan hemoglobin sehingga jumlah hemoglobin yang diproduksi tidak akan mencukupi kebutuhan tubuh.
  - c. Mengonsumsi makanan yang bergizi. Kebutuhan kalori, protein dapat diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan dan susu. Zat besi yang diperlukan setiap hari dapat diperoleh dari daging, hati, telur dan

kedelai. Kebutuhan asam folat (vitamin B) dan vitamin C dapat diperoleh dari misalnya jus jeruk, brokoli, dan juga roti.

- d. Tablet fe yang berisi 60 mg besi dan 250 mg asam folat (1x1) dan vitamin C (1x1), tablet fe penting dalam pemenuhan zat besi dan cara mengkonsumsi yang benar juga akan mempengaruhi proses penyerapan zat besi.

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL  
CARE HARI KE TIGA PADA NY”D” DENGAN  
TINJA BERWARNA HITAM DI RUMAH IBU  
TANGGAL 22 JANUARI 2022**

**KUNJUNGAN NIFAS KE II**

Tempat : Rumah Ny “D”  
Tanggal : 22 Januari 2022  
Jam : 14.00 WITA

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 3 hari yang lalu tanggal 19 Januari 2022 jam 23.11 WITA
2. Ibu tidak merasa pusing dan lelah
3. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari
4. Ibu mengatakan susah BAB dan feses berwarna kehitaman
5. BAK 4-5 kali sehari
6. Ibu masih mengkonsumsi tablet Fe
7. ASI sudah lancar.

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
  - a. TD : 110/80 mmHg
  - b. N : 80 x/menit
  - c. S : 36,6°C
  - d. P : 20x/menit
4. Pemeriksaan Fisik terfokus

Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan

Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda

Leher : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar tiroid dan limfe

- Payudara : simetris, terdapat hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ASI lancar
- Abdomen : tidak ada luka bekas operasi, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- Genitalia : tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, masih memakai pembalut, dan tidak terdapat tanda-tanda infeksi

5. Pemeriksaan laboratorium (sampel darah) pada tanggal 18 Januari 2022  
Jam 11.05 WITA

- a. WBC :  $8.4 \times 10^3/\mu\text{L}$
- b. RBC :  $3.90 \times 10^6/\mu\text{L}$
- c. HGB : 8.5 g/dl
- d. HCT : 30.0L%
- e. MCV : 76.9L [fl]
- f. MCH : 21.8 pg
- g. MCHC : 28.3L [g/dl]
- h. Albumin : Negatif
- i. Reduksi : Negatif
- j. Hbsag : Negatif
- k. Golongan Darah: A

**ASSESSMENT (A)**

P1A1 3 hari postpartum

**PLANNING (P)**

Tanggal 22 Januari 2022

Jam 13.00 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja  
Hasil : ibu mengerti
2. Menjelaskan kepada ibu bahwa warna tinja yang lebih gelap dari kondisi normal yang disebabkan karena mengkonsumsi tablet tambah darah atau

Fe, bukan merupakan sesuatu yang berbahaya. Justru ini menunjukkan bahwa tubuh mampu menyerap zat besi dengan baik.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan tidak cemas lagi dengan keadaannya

3. Menjelaskan cara mengkonsumsi tablet Fe yaitu:
  - a. Minum tablet tambah darah dengan air putih, jangan minum dengan teh, susu, kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang.
  - b. Kadang dapat terjadi gejala ringan yang tidak membahayakan seperti perut terasa tidak enak, mual, susah buang air besar, dan tinja berwarna hitam.
  - c. Untuk mengurangi gejala sampingan, minum Tablet tambah darah setelah makan malam menjelang tidur. Lebih baik minum tablet tambah darah disertai makan buah buahan seperti pisang, pepaya, jeruk dan lain- lain.
  - d. Tablet tambah darah tidak menyebabkan tekanan darah tinggi atau kebanyakan darah.
  - e. Simpan tablet tambah darah di tempat kering, terhindar dari sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Setelah dibuka harus ditutup rapat. Tablet tambah darah yang berubah warna jangan diminum (warna asli adalah warna darah/merah)

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Memberikan konseling kepada ibu tentang perawatan tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari, yakni :
  - a. Biarkan tali pusat dalam keadaan terbuka dan tetap dijaga kebersihannya.
  - b. Jangan membiarkan bayi bersentuhan dengan benda dingin, dan tetap menjaga lingkungan sekitar bayi tetap hangat
  - c. Mengganti popok bayi tiap kali basah (setelah BAB/BAK)

Hasil : ibu sudah mengerti

5. Mengajarkan ibu cara perawatan metode kanguru
  - a. Letakkan bayi dengan posisi tegak diantara payudara ibu, kontak kulit dada ke dada
  - b. Kepala bayi menghadap ke samping dengan posisi sedikit menengadah supaya jalan napas terbuka dan kontak mata dengan ibu
  - c. Panggul bayi seperti posisi katak
  - d. Ikat dengan kain dibawah telinga bayi, ikatan yang kencang di bagian punggung sedangkan bagian perut dilonggarkan supaya bayi dapat bernapas dengan baik

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk minum setiap kali menyusui dan tetap meminum tablet zat besi untuk menambahkan zat gizi setidaknya 40 hari pasca postpartum.

Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya yaitu dengan mengganti celana dalam atau pembalut jika penuh, gunakan air bersih tiap kali BAB/BAK untuk mencegah infeksi

Hasil : ibu bersedia melakukannya

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL  
CARE HARI KE DELAPAN PADA NY”D” DENGAN  
SULIT TIDUR DI RUMAH IBU  
TANGGAL 28 JANUARI 2022**

**KUNJUNGAN NIFAS KE III**

Tempat : Rumah Ny “D”  
Tanggal : 28 Januari 2022  
Jam : 14.10 WITA

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan melahirkan 1 minggu yang lalu tanggal 19 Januari 2022 jam 23.11 WITA
2. Ibu tidak merasa pusing dan lelah
3. Ibu mengatakan BAB 1 kali sehari
4. Ibu mengatakan BABnya lancar dan feses tidak berwarna hitam lagi
5. BAK 5-6 kali sehari.
6. Ibu mengatakan tidak ada nyeri perut dan sekarang darah nifas ibu berwarna kuning keputihan.
7. Ibu masih mengkonsumsi tablet Fe

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Pemeriksaan TTV
  - a. TD : 120/80 mmHg
  - b. N : 80 x/menit
  - c. S : 36,5°C
  - d. P : 20 x/menit
4. Pemeriksaan fisik terfokus

Wajah : tidak pucat, tidak oedema, tidak nyeri tekan

Mata : simetris, sclera putih, konjungtiva merah muda

- Payudara : simetris, terdapat hiperpigmentasi pada areola mammae, puting susu menonjol, tidak ada benjolan, tidak nyeri tekan, ada pengeluaran ASI
- Abdomen : tidak ada luka bekas, TFU pertengahan symphysis dan pusat, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik.
- Genitalia : terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea serosa, tidak oedema, tidak ada varices
- Ekstremitas : simetris, tidak oedema, tidak ada varices, tidak nyeri tekan

5. Pemeriksaan sampel darah pada tanggal 28 Januari 2022 Jam 14.10 WITA

- a. HB : 11,5 g/dl

**ASSESSMENT (A)**

P1A1 postpartum hari ke delapan

**PLANNING (P)**

Tanggal 28 Januari 2022

Jam: 14.10 WITA

1. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan ibu baik-baik saja  
Hasil : ibu mengerti
2. Menganjurkan ibu untuk berdiskusi dengan suami tentang pembagian waktu atau bergantian dengan suami mengurus bayi. Menganjurkan tidur saat bayi tertidur dengan memilih waktu yang sama dengan jam tidur bayi yaitu ketika siang hari atau jam tidur yang awal pada malam. Saat bayi susah tidur, cobalah untuk menggendong dan biarkan bayi tidur dalam gendongan. Ini juga dapat dilakukan oleh ayah. Berbagi tugas penting agar ibu punya waktu untuk dirinya sendiri. Orang tua baru perlu berbagi beban mental. Ibu sebaiknya memberi pasangan kesempatan mempelajari apa yang perlu dilakukan untuk membantu tumbuh kembang bayi.  
Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya
3. Menjelaskan beberapa peran suami kepada ibu dan suami, yaitu:
  - a. Membantu pekerjaan rumah tangga

Membantu melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, atau bahkan memasak agar ibu tidak kewalahan mengurus segalanya seorang diri

b. Membantu merawat bayi

Membantu untuk mengganti popok bayi, memandikan, menggendong, atau menidurkannya dengan nyanyian.

c. Mengobrol dengan istri

Luangkan waktu untuk berbicara dengan istri.

d. Tunjukkan kasih sayang

Membantu menjaga keharmonisan antara ibu dan suami

Hasil: Ibu dan suami mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI sesering mungkin kepada bayinya

Hasil : ibu sudah mengerti

5. Menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk pemulihan rahim dan menjaga kualitas produksi ASI

Hasil : ibu bersedia melakukannya

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Hasil : ibu bersedia melakukannya

7. Memberikan konseling tentang :

- a. Personal hygiene
- b. Perawatan payudara
- c. Posisi dan teknik menyusui bayi yang benar
- d. Posisi menyendawakan bayi setelah menyusui

Hasil : ibu sudah mengerti


8. Meanganjurkan ibu dan keluarga untuk tetap senantiasa melaksanakan shalat lima waktu

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

9. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal 6 bulan tanpa makanan tambahan selain ASI dan menjelaskan bahwa

Allah Swt telah memerintahkan seorang ibu untuk menyusui bayinya selama 2 tahun sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah :233

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan tentang kesenjangan dan kesesuaian antara teori dan hasil studi yang telah dilakukan pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny”D” dengan kasus anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tanggal 18 Januari 2022. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan tindakan yang direncanakan sesuai dengan rasional yang relevan sehingga dapat dianalisis secara teoritis untuk memudahkan dalam memahami kesenjangan dan kesesuaian yang terjadi pada kasus anemia pada persalinan.

Pembahasan akan diuraikan secara narasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu: pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah aktual. Merumuskan diagnosa atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan dan mengevaluasi asuhan kebidanan yang telah diberikan.

#### **A. KALA I**

##### **1. Langkah I : Identifikasi Data Dasar**

Teori mengatakan bahwa langkah I dilakukan dengan cara mengumpulkan data dasar sebagai bahan untuk mengevaluasi pasien secara lengkap untuk dapat menentukan tentang normalnya kehamilan tersebut. Rencana yang rasional untuk memantau persalinan dapat ditegakkan berdasarkan kepentingan ibu dan janin. Jika tidak ditemukan kelainan pada ibu maka kehamilan ibu dalam keadaan normal.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny”D” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 wita dengan keluhan sakit perut tembus kebelakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul, selain itu terdapat keluhan lain yang menyertai ibu yaitu ibu mengeluh pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya dan merasa badannya berat atau lelah. Ibu mengatakan ini kehamilan kedua dan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya, hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2021, ibu mengatakan usia kehamilan sekarang  $\pm 9$  bulan, ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil, pergerakan janin kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 kali di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya namun memiliki riwayat penyakit hipertensi gestasional pada kehamilan pertamanya. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB apapun.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyebutkan tanda-tanda persalinan meliputi terjadinya his persalinan yang belum terlalu kuat sehingga ibu masih dapat berjalan-jalan. Secara teori dapat dijelaskan bahwa his adalah kontraksi rahim yang dapat diraba dan menimbulkan rasa nyeri di perut serta dapat menimbulkan pembukaan serviks kontraksi rahim. Keluarnya lendir bercampur darah, lendir berasal dari pembukaan sedangkan darah berasal dari robeknya pembuluh darah waktu serviks

membuka. Kadang-kadang ketuban pecah dengan sendirinya. Kemudian dilatasi dan effacement, dilatasi adalah membukanya kanalis servikalis sedangkan effacement adalah pendataran atau pemendekan kanalis servikalis (Mutmainnah, 2017).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan ibu lemah, kesadaran compos mentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold 1 tfu 2 jrbpx, 32 cm, teraba bokong, Leopold II Puka, Leopold II Kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ dalam batas normal, lingkaran perut 87 cm, taksiran berat janin 3456 gram, his 1x10 menit durasi 5-10 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 wita didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge I, moulage ), penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Selanjutnya dilakukan observasi denyut jantung janin, dan his setiap 30 menit dan observasi kemajuan persalinan setiap 4 jam pada kala I.

Menurunnya hemoglobin dalam darah menyebabkan berkurangnya kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Kadar hemoglobin pada ibu hamil yang kurang akan membuat kontraksi otot rahim lemah ketika persalinan berlangsung sehingga menyebabkan persalinan lama (Hanifa, 2019). Pada waktu persalinan dibutuhkan kadar hemoglobin yang optimal untuk

menghadapi proses persalinan. Kadar hemoglobin dalam darah bagi ibu inpartu sangat berpengaruh terhadap keadaan tubuh ibu agar tidak lelah dan letih (Andriani, 2016). Pada kasus Ny”D” dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kadar Hb: 8,5 gr/dl dan konjungtiva dan kuku tampak pucat.

Selain itu pemberian support dan memperhatikan kondisi psikologi ibu agar ibu tidak menjadi cemas pada keadaannya dan menganjurkan agar senantiasa mengingat Allah swt yaitu dengan memperbanyak doa, dzikir agar dimudahkan dalam persalinannya.

## 2. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Berdasarkan data subjektif dan objektif pada kasus Ny”D” didapatkan diagnosis inpartu kala 1 fase laten dengan anemia sedang.

Sesuai dengan teori penentuan fase laten berdasarkan pembukaan serviks, dimana fase laten dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap kurang dari 1-3 cm dan fase aktif dimulai sejak pembukaan serviks 4-0 cm dan pada umumnya frekuensi dan lama kontraksi uterus meningkat (Oktarina, 2016).

Anemia merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin hematokrit dan jumlah eritrosit dibawah nilai normal. Pembagian dari anemia dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu: anemia ringan bila kadar Hb < 10g/dl, anemia sedang bila kadar Hb 7-8 gr/dl, dan anemia berat bila kada Hb <6 gr/dl (rahyani, 2020). Penurunan darah yang cepat terjadi pada saat persalinan karena pada saat persalinan akan banyak

kehilangan darah dan perlu tambahan zat besi sebanyak 300 sampai 350 mg. Menurunnya hemoglobin dalam darah menyebabkan berkurangnya kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Kadar hemoglobin pada ibu hamil yang kurang akan membuat kontraksi otot rahim lemah ketika persalinan berlangsung sehingga menyebabkan persalinan lama (Hanifa, 2019). Pada waktu persalinan dibutuhkan kadar hemoglobin yang optimal untuk menghadapi proses persalinan. Kadar hemoglobin dalam darah bagi ibu inpartu sangat berpengaruh terhadap keadaan tubuh ibu agar tidak lelah dan letih (Andriani, 2016).

Dampak anemia pada persalinan yaitu terjadi gangguan his kekuatan mengejan baik inersia uteri primer maupun inersia uteri sekunder. Pada kala I berlangsung lama dan terjadi partus lama. Pada kala II terjadi partus lama sehingga menyebabkan memerlukan tindakan dan operasi kebidanan, dapat terjadi asfiksia, fistula, sepsis puerperalis, bahkan sampai pada kematian janin. Pada kala III dapat diikuti retensio plasenta, postpartum hemoragik karena atonia uteri. Pada kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder, atonia uteri dan rupture uteri (Retno Rini et al., 2017).

Diagnosis anemia pada persalinan ditegakkan dengan pemeriksaan fisik yang menunjukkan keadaan umum ibu lemah, konjungtiva dan kuku pucat, dilakukan pemeriksaan laboratorium hemoglobin 8,5 gr/dl yang kurang dari batas normalnya.

Bidan harus mampu mengenali tanda dan gejala dari anemia pada persalinan agar dapat melakukan asuhan kebidanan yang sesuai, kolaborasi dan komprehensif terhadap ibu. Dalam melakukan asuhan hendaklah selalu berdoa kepada Allah SWT agar asuhan yang diberikan dapat meringankan keluhan ibu sehingga ibu dapat merasa lebih baik.

### 3. Langkah III : Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial

Teori mengatakan masalah potensial yang dapat terjadi pada kasus anemia dalam persalinan yaitu Potensial terjadinya partus dengan tindakan. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi dimana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu dan janin menjadi berkurang. Kadar hemoglobin pada ibu hamil yang kurang dari 11,0 g/dl akan membuat kontraksi otot rahim lemah ketika persalinan berlangsung (inersia uteri) (Hanifah, 2019). Pada kala II terjadi partus lama sehingga menyebabkan memerlukan tindakan dan operasi kebidanan, dapat terjadi asfiksia, fistula, sepsis puerperalis, bahkan sampai pada kematian janin. Pada kala III dapat diikuti retensio plasenta, postpartum hemoragik karena atonia uteri. Pada kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder, atonia uteri dan ruptur uteri (Retno Rini et al., 2017).

Berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny'D' didapatkan data yang menunjukkan terjadinya partus lama dengan kontraksi uterus yang melemah dan keadaan ibu lemah.

Sambil mengamati klien, bidan bersiap-siap apabila terjadi masalah potensial. Selain itu bidan dapat memberikan pemahaman kepada ibu bahwa kehamilan dan persalinan adalah anugrah dari Allah swt. Sehingga ibu dapat bersabar dalam menghadapi keluhan yang dirasakannya.

4. Langkah IV : Identifikasi Perlunya tindakan segera/Kolaborasi

Tindakan ini dilakukan jika ditemukan adanya diagnosa potensial atau masalah emergency sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny'D' ditemukan adanya data yang mendukung yaitu dari pemeriksaan fisik dan laboratorium untuk dilakukan tindakan segera untuk pemasangan infus RL 500 ml dan pemberian drip oksitosin  $\frac{1}{2}$  ampul dalam 500 ml RL dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit, dan dipertahankan pada tetesan 40. Sedangkan tindakan kolaborasi dengan dokter obgyn Pemasangan misoprostol  $\frac{1}{8}$  tab pervaginam. Menganjurkan ibu untuk beristighfar dan berdoa kepada Allah swt. Serta tidak menjadikan keluhannya saat ini menjadi beban sehingga tidak semakin memperburuk kondisi ibu.

5. Langkah V : Rencana Tindakan

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh dimana asuhan ini ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jika terdapat diagnosa potensial maka dilakukan rencana asuhan sesuai dengan diagnosa.

Merencanakan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih

mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan memperbanyak berzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-quran agar ibu lebih tenang dan tidak terllu memfokuskan pikirannya dengan kondisinya saat ini.

Berdasarkan teori asuhan anemia pada persalinan yaitu pemantauan terhadap ibu dan kesejahteraan janin, pemantauan kontraksi, melakukan transfusi darah, pemberian kortikosteroid, pemberian eritropoetin, pemberian suplemen besi, vitamin B12, vitamin-vitamin dan mineral yang dibutuhkan (Hasdianah, 2016).

Dalam penanganan anemia pada persalinan yang perlu diperhatikan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi tekanan darah dan suhu yang diukur setiap 4 jam, pemantauan keadaan janin dengan memantau denyut jantung, nadi dan kontraksi tiap 30 menit. Pemberian oksitosin yang bertujuan untuk memperbaiki kontraksi uterus.

#### 6. Langkah VI : Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya. Rencana tindakan dibuat sesuai dengan teori yaitu memasang infus RL 500 ml dan pemberian drip oksitosin ½ ampuls dalam 500 ml RL dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit, memantau tekanan darah dan suhu setiap 4 jam, memantau DJJ, nadi dan his setiap 30 menit serta memantau kemajuan persalinan setiap 2-4 jam.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny'D' didapatkan telah diberikan pendekatan terapeutik kepada ibu dan keluarga dengan memberikan motivasi dan dukungan emosional dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. Dengan memperbanyak dzikir, istigfar, membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-quran agar ibu lebih tenang dan tidak terlalu khawatir dengan kondisinya saat ini.

Pemasangan infus RL 500 ml dan pemberian drip oksitosin  $\frac{1}{2}$  ampul dalam 500 ml RL dengan 8 tetes pada 30 menit pertama dinaikkan 4 tetes tiap 30 menit, pemantauan DJJ, nadi dan his setiap 1 jam dimulai pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 wita, dilakukan pemeriksaan pertama pukul 11.00 wita didapatkan pembukaan 1 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge I, pelepasan lendir dan darah. Dilanjutkan pemantauan DJJ, nadi dan his.

Melakukan VT II tanggal 19 Januari 2022 pukul 18.00 wita dengan his rata-rata 3 kali 10 menit dengan durasi rata-rata 15-20 detik, dengan DJJ rata-rata 139-146 x/menit, serta nadi ibu rata-rata 80-85 x/menit. Pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada jam 18.00 wita didapatkan pembukaan 4 cm, ketuban utuh, hodge II, dengan presentasi kepala UUK kanan lintang. Data ini dimasukkan kedalam pemantauan partograf dan sudah menandakan ibu pada inpartu kala I fase aktif.

Selanjutnya pemantauan kembali VT III dilakukan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 22.00 wita dengan his rata-rata 3 kali 10 dengan durasi 35-40 detik, DJJ 142 kali permenit, nadi 82 kali permenit. Kemudian VT

IV dilakukan pada tanggal 19 Januari pukul 23.11 wita, dengan his rata-rata 3 kali 10 menit dengan durasi rata-rata 40-45 detik, dengan DJJ rata-rata 139-146 x/menit, serta nadi ibu rata-rata 80-85 x/menit. Pemeriksaan dalam dilakukan pada pukul 23.11 wita didapatkan pembukaan 10 cm (lengkap), jernih, hodge VI, dengan presentasi kepala UUK kanan lintang dan ibu siap untuk dipimpin bersalin. Hal ini menandakan tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktik.

#### 7. Langkah VII : Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny”D” didapatkan data inpartu kala I fase aktif dengan pembukaan lengkap pada pukul 23.11 wita, ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran, perasaan ingin BAB, djj terdengar kuat dan teratur dengan frekuensi 142x/I, his 3x10 40-45 detik, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

Hasil evaluasi didapatkan bahwa pembukaan sudah lengkap pada pukul 23.11 wita, perlangsungan kala I dengan anemia.

#### 8. Pendokumentasian

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny”D” didapatkan bahwa ibu masuk pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 wita dengan keluhan sakit perut tembus kebelakang disertai pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 18 Januari 2022 pukul 08.00 wita sampai sekarang dan sifatnya hilang timbul, selain

itu terdapat keluhan lain yang menyertai ibu yaitu ibu mengeluh pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya dan merasa badannya berat atau lelah. Ibu mengatakan ini kehamilan kedua dan pernah keguguran pada kehamilan pertamanya, hari pertama haid terakhir tanggal 05 April 2021, ibu mengatakan usia kehamilan sekarang  $\pm 9$  bulan, ibu tidak pernah merasakan nyeri perut hebat selama hamil, pergerakan janin kuat dirasakan pada perut sebelah kanan dan dirasakan sampai sekarang. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 7 kali di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar, tidak memiliki riwayat penyakit menular dan menurun dalam keluarganya namun memiliki riwayat penyakit hipertensi gestasional pada kehamilan pertamanya. Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB apapun.

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan ibu lemah, kesadaran compos mentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan Leopold 1 tfu 2 jrbpx, 32 cm, teraba bokong, Leopold II Puka, Leopold II Kepala, Leopold IV bergerak dalam panggul (BDP) 4/5. Keadaan janin baik ditandai dengan DJJ dalam batas normal, lingkaran perut 87 cm, taksiran berat janin 3456 gram, his 1x10 menit durasi 5-10 detik. Hasil pemeriksaan dalam pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 11.00 wita didapatkan keadaan vulva dan vagina tidak ada kelainan, portio tebal, pembukaan 1 cm, ketuban utuh, presentasi uuk kanan lintang, penurunan hodge I, moulage ), penumbungan tidak ada, kesan panggul normal, pelepasan lendir dan darah. Selanjutnya dilakukan

observasi denyut jantung janin, dan his setiap 30 menit dan observasi kemajuan persalinan setiap 4 jam pada kala I. serta pemeriksaan Hb: 8,5 gr/dl.

Assessment yaitu hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif. Berdasarkan asuhan kebidanan terhadap Ny”D” ditegaskan diagnosa GIZI P0 AI, gestasi 41-42 minggu, situs memanjang, intrauterine, tunggal, hidup, keadaan ibu lemah dan janin baik, kala I fase laten dengan anemia.

Planning menggambarkan pendokumentasian untuk rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan assessment yang didapatkan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny”D” telah dilakukan intervensi dan Implementasi sesuai dengan teori dengan hasil evaluasi inpartu kala I fase aktif dengan anemia dan pembukaan 10 cm pada pukul 23.11 wita, ibu mempunyai dorongan kuat untuk meneran, terasa ingin BAB dengan his 3x10 dengan durasi 40-45 detik, djj dalam batas normal, serta tanda-tanda vital dalam batas normal.

## **B. KALA II**

### **1. Langkah I**

Pengkajian adalah mengumpulkan informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan pasien. Dan untuk memperoleh informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan anamnesis.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan data subjektif ibu merasakan adanya dorongan yang kuat untuk meneran dan ibu merasa ingin BAB. Sedangkan data objektif yang didapatkan perineum menonjol, vulva, vagina dan anus membuka. Djj dalam batas normal, his 3 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik, pemeriksaan dalam pada pukul 23:11 WITA didapatkan pembukaan 10 cm, ketuban jernih, presentasi untuk depan, penurunan hodge IV, molage 0, pelepasan air ketuban dan darah.

Teori mengatakan tanda gejala kala II, yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum dan atau vaginanya, perineum menonjol, vulva, vagina dan sfingter ani membuka, meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah (Nurasiah dkk, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

## 2. Langkah II

Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan data dari hasil pengkajian yang sudah ada yang akhirnya ditegakkan diagnosa dalam ruang lingkup praktek kebidanan.

Berdasarkan teori perlangsungan kala II dapat ditegakkan jika didapatkan tanda gejala kala II, yaitu ibu merasakan ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi, ibu merasakan ada peningkatan pada rektum/vagina, perineum tampak menonjol, vulva vagina spingterani

membuka, meningkatnya pengeluaran lendir dan darah (Oktarina, 2016:14).

Pada kasus Ny “D” didapatkan tanda gejala kala II, yaitu ibu mengatakan sakit perut semakin kuat dan sering, ibu ingin BAB, perineum tampak menonjol, vulva, vagina dan anus membuka, kontraksi uterus 4 kali dalam 10 menit durasi 40-45 detik, djj dalam batas normal, pembukaan serviks lengkap (10 cm). Berdasarkan tanda dan gejala dapat ditegakkan ibu sedang dalam perlangsungan kala II.

Diagnosa kala II dapat ditegakkan atas dasar hasil pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina atau kepala janin sudah tampak di vulva dengan diameter 5-6 cm.

### 3. Langkah III

Berdasarkan data yang ditemukan pada kasus Ny “D” tidak ditemukan indikasi atau masalah potensial. Dan ditinjau dengan teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses kala II berlangsung normal dengan bayi lahir lengkap pada bayi lahir pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.45 berjenis kelamin laki-laki dengan Apgar Skor 8/10.

### 4. Langkah IV

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny “D” tidak terdapat indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegakkan. Dan

ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa perlangsungan kala II berlangsung normal dan tidak ada penyulit.

#### 5. Langkah V

Berdasarkan teori intervensi yang dilakukan terhadap persalinan dengan anemia pada persalinan, yaitu dengan melihat tanda gejala kala II, siapkan alat pertolongan persalinan, pastikan pembukaan lengkap, periksa keadaan janin, siapkan ibu dan keluarga untuk membantu proses persalinan, letakkan handuk bersih diatas perut ibu dan dibawah bokong ibu, pimpin persalinan jika kepala sudah terlihat membuka vulva 5-10 cm, lindungi perineum dan menahan kepala terjadi ekstensi maksimal, periksa lilitan tali pusat, tunggu kepala bayi untuk melakukan putaran paksi luar, kemudian dilanjutkan dengan melahirkan bahu depan dan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir, dilanjutkan dengan sanggah susur untuk melahirkan badan bayi keseluruhan, setelah bayi lahir jepit dan potong tali pusat, lakukan penilaian sepintas dan lakukan persalinan ballard score oleh bidan.

Pada kasus Ny "R" intervensi sesuai dengan teori yang ada hal ini menunjukkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

#### 6. Langkah VI

Implementasi dilakukan pada kasus Ny "D" sesuai dengan intervensi, berdasarkan data yang didapatkan pada kasus tersebut bahwa pembukaan lengkap pada pukul 23.11 WITA, ketuban jernih, presentasi

untuk depan, penurunan hodge IV, molage 0, pelepasan air ketuban dan darah.

Semua alat dan obat-obatan telah disiapkan dan pimpinan persalinan dilakukan pada pukul 23.11 WITA, bayi lahir pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.45 WITA bayi lahir segera menangis, ekstremitas biru, bernapas dengan baik dan gerakan aktif. Bayi laki-laki dengan berat badan lahir 3400 gram, panjang badan 49 cm. Nilai ballard score 37 taksiran umur kehamilan 41-42 minggu.

#### 7. Langkah VII

Pada kasus Ny “D” kala II berlangsung dengan normal, yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.45 WITA segera menangis, dengan berat badan lahir 3400 gram, panjang badan 49 cm, jenis kelamin laki-laki, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

#### 8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang mencakup data yang didapatkan dari pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “D” didapatkan bahwa ibu merasa adanya dorongan yang kuat untuk meneran, sakit perut tembus belakang terasa semakin kuat dan perasaan ingin BAB.

Data objektif mencakup data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit durasi 45-50 detik, djj

dalam batas normal, tampak perineum menonjol, vulva vagina dan anus membuka, pada pemeriksaan dalam yang dilakukan pada pukul 23:11 WITA didapatkan pembukaan lengkap, presentasi uuk depan penurunan hodge IV, mileage tidak ada, pelepasan air ketuban dan darah.

Assessment merupakan hasil analisis dari data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi masalah potensial dan perlunya tindakan segera. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “R” didapatkan assessment perlangsungan kala II.

Planning meliputi tindakan asuhan atau implementasi dan evaluasi dari tindakan yang telah diberikan berdasarkan assesment yang ditegaskan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “D” tindakan asuhan yang dilakukan sesuai dengan teori yang ada sehingga mendapatkan hasil evaluasi kala II berlangsung dengan normal, yaitu bayi lahir spontan pada bayi lahir pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.45 WITA bayi lahir segera menangis, ekstremitas biru, bernapas dengan baik dan gerakan aktif. Bayi laki-laki dengan berat badan lahir 3400 gram, panjang badan 49 cm. tanggal 05 Juli 2018 pukul 12:25 WITA jenis kelamin laki-laki, tinggi fundus uteri setinggi pusat.

### **C. KALA III**

#### **1. Langkah I**

Setelah kala II, kontraksi uterus berhenti sekitar 5-10 menit. Dengan lahirnya bayi, sudah mulai pelepasan plasentanya pada lapisan nitabusch, karena sifat retraksi otot rahim. Lepasnya plasenta sudah dapat

diperkirakan dengan memperhatikan tanda-tanda yaitu uterus menjadi bundar, uterus terdorong ke atas karena plasenta dilepas ke segmen bawah rahim, tali pusat bertambah panjang, terjadi perdarahan. Melahirkan plasenta dilakukan dengan dorongan ringan pada fundus uteri. Biasanya plasenta lepas dalam 6 sampai 15 menit setelah bayi lahir (Oktarina, 2016).

Pada kasus Ny “D” didapatkan ibu merasakan nyeri perut bagian bawah, dari data objektif didapatkan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat dan tali pusat bertambah panjang.

Perasat Strassman, mengatakan bahwa untuk mengetahui plasenta terlepas dengan cara meregangkan atau menarik sedikit tali pusat dengan menggunakan tangan kanan, dan tangan kiri ngetok-ngetok fundus uteri dan merasakan apakah ada getaran yang ditimbulkan dari gerakan tangan kiri, jika terasa ada getaran berarti plasenta sudah terlepas.

Perasat Klein, melakukan perasat ini, minta pasien untuk meneran, jika tali pusat tampak turun atau bertambah panjang berarti plasenta telah terlepas. Perasat Manuaba, perasat ini dilakukan dengan cara tangan kiri memegang uterus pada segmen bawah rahim, sedangkan tangan kanan memegang dan mengencangkan tali pusat, kedua tangan ditarik berlawanan. Jika tarikan terasa ringan dan tali pusat memanjang berarti plasenta telah lepas (Walyani, 2015).

## 2. Langkah II

Berdasarkan teori kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny"D" berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan ditegaskan diagnosis perlangsungan kala III.

## 3. Langkah III

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny"D" tidak ditemukan adanya indikasi atau masalah potensial yang dapat ditegaskan, dan ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit yang menyertai.

## 4. Langkah IV

Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny"D" tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi. Ditinjau dari teori berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan bahwa proses pengeluaran plasenta dapat berlangsung normal.

## 5. Langkah V

Berdasarkan diagnosis pada kasus Ny"D" tindakan yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan intervensi yang sesuai yaitu dengan pemberian oksitosin, peregangan tali pusat dan masase uterus. Pemberian oksitosin dilakukan dalam waktu satu menit pertama setelah bayi lahir, namun sebelum pemberian oksitosin hal yang harus diperhatikan adalah

memastikan tidak ada bayi lain di dalam uterus. Setelah itu suntikkan oksitosin secara IM pada sepertiga bagian atas paha bagian luar yang bertujuan untuk membantu pelepasan plasenta dan mengurangi kehilangan darah.

#### 6. Langkah VI

Pada Ny "D" dilakukan implementasi berdasarkan teori yaitu melakukan pemberian oksitosin secara IM, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta lahir dilakukan masase uterus. Proses pelepasan dan pengeluaran plasenta terjadi secara normal dan tidak ada penyulit, dimana plasenta lahir 10 menit setelah bayi lahir yaitu jam 23.50 WITA, plasenta lahir lengkap dengan kotiledon dan selaput ketuban utuh, perdarahan kurang lebih 100 cc.

#### 7. Langkah VII

Dari implementasi yang telah dilakukan pada kasus Ny"D" didapatkan hasil pemeriksaan ibu dalam keadaan normal yang ditandai dengan uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek yang dilakukan.

#### 8. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP yang meliputi data subjektif, pendokumentasian hasil pengumpulan data pasien melalui anamnesis, pada kasus Ny "D" didapatkan bahwa ibu merasakan nyeri perut bagian bawah.

Objektif yaitu dari hasil pemeriksaan fisik pasien dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny”D” didapatkan hasil pemeriksaan tampak ada semburan darah secara tiba-tiba, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan tali pusat bertambah panjang.

Assessment merupakan hasil analisis data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi diagnosa/masalah, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera, pada kasus Ny”D” didapatkan assessment perlangsungan kala III.

Planning merupakan hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan. Pada kasus Ny “D” telah dilakukannya tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal, plasenta lahir lengkap pada pukul 23.50 WITA, kontraksi baik teraba keras dan bundar, TFU 1 jari di bawah pusat, dengan perdarahan kurang lebih 100 cc.

#### **D. KALA IV**

##### **1. Langkah I**

Pada kasus Ny “D” didapatkan data subjektif ibu merasa lelah setelah persalinannya dan data objektif kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat, plasenta lahir lengkap, ttv dalam batas normal.

Berdasarkan teori kala IV dimaksudkan untuk melakukan observasi karena perdarahan postpartum paling sering terjadi pada 2 jam pertama. Observasi yang dilakukan adalah: pemeriksaan tanda-tanda vital, kontraksi uterus dan perdarahan (Oktarina, 2016).

## 2. Langkah II

Berdasarkan data subjektif dan objektif yang didapatkan pada kasus Ny“D” maka diagnosis yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV, hal ini dengan teori bahwa plasenta lahir lengkap jam 23.50 WITA dan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal.

## 3. Langkah III

Pada kasus Ny “D” masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan post partum.

## 4. Langkah IV

Berdasarkan diagnosis yang ditegakkan tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera atau tindakan kolaborasi, hal ini sesuai dengan teori berdasarkan data yang didapatkan bahwa kala III berlangsung normal, kontraksi uterus baik, serta tanda- tanda vital dalam batas normal.

## 5. Langkah V

Pada kasus Ny“ D” intervensi yang dilakukan pada kala ini yakni pemantauan tanda –tanda vital ibu, pemantauan perdarahan, kontraksi uterus, kandung kemih dan tinggi fundus uteri. Pemantauan dilakukan setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua,

serta mengukur suhu tubuh ibu, setelah pemantauan kala IV selesai, ibu dipindahkan keruangan nifas.

Teori mengingatkan sebagian besar kematian ibu pada periode pasca persalinan terjadi pada 6 jam pertama setelah persalinan, kematian itu disebabkan oleh infeksi, perdarahan dan eklampsia. Oleh karena itu, pemantauan selama 2 jam pertama post partum sangat penting (Saleha, 2013).

#### 6. Langkah VI

Setelah intervensi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah implementasi sesuai dengan teori. Berdasarkan data yang didapatkan pada kasus Ny "D" implementasi yang dilakukan yaitu memantau tanda- tanda ibu selama 4 kali setiap 15 menit yaitu mulai jam 00.05 WITA sampai 00.50 WITA didapatkan tekanan darah ibu dalam batas normal, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, kandung kemih kosong serta perdarahan kurang lebih 20-5 cc, selanjutnya melakukan pemantauan 2 kali setiap 30 menit yaitu pada jam 01.20 WITA sampai 01.50 WITA didapatkan tekanan darah dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, serta perdarahan kurang lebih 5 cc. Keadaan bayi baik dengan pernapasan serta suhu dalam batas normal, serta mendokumentasikan hasil pemantauan dalam partograf. Selanjutnya ibu dipindahkan ke ruang nifas.

## 7. Langkah VII

Pada kasus Ny “D” didapatkan bahwa kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat, kandung kemih kosong, jumlah perdarahan kurang lebih 100 cc, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kala IV berlangsung normal dan tidak ada penyulit serta tidak ada kesenjangan antara teori dengan praktek.

## 8. Pendokumentasian SOAP.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis, berdasarkan kasus Ny “D” didapatkan bahwa ibu merasa kelelahan setelah persalinannya.

Objektif merupakan hasil dari pemeriksaan fisik dan hasil dari pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan, didapatkan data kala III berlangsung normal berlangsung kurang lebih 5 menit, plasenta dengan kotiledon dengan selaput ketuban utuh, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat dengan tanda vital ibu dalam batas normal.

Asesmen hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi, berdasarkan kasus Ny “D” maka assessment yang ditegakan adalah perlangsungan kala IV.

Planning meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan

implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

### **E. Kunjungan Nifas**

#### **1. Kunjungan Nifas I tanggal 20 Januari 2022, pukul 02.50 wita**

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan bahwa ibu mengeluh nyeri pada abdomen sejak 3 jam yang lalu , ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 23.11 WITA dengan jenis kelamin laki-laki, ibu pertama kali menyusui bayinya saat IMD yang dibantu oleh bidan, ibu belum BAB dan sudah BAK, Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu lemah, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU 1 jrbst, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra  $\pm$  100 cc, tidak ada tanda-tanda infeksi, konjungtiva dan kuku pucat, dan terpasang infus RL 24 tetes/menit di lengan sebelah kiri ibu. Pemeriksaan penunjang Hb: 8,5 gr/dl.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan assessment Ny “D” PIAI postpartum hari pertama dengan nyeri abdomen.

Planning yaitu pendokumentasian yang menjelaskan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Pada kasus Ny “D” telah dilakukan intervensi dan evaluasi seperti telah dijelaskan kepada ibu penyebab nyeri, telah diajarkan cara masase uterus, telah melakukan mobilisasi dini, menjelaskan keadaan ibu karena anemia telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif, telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah menjelaskan kepada ibu tentang kontrasepsi, dan dianjurkan keluarga untuk senantiasa sholat, berdoa dan berzikir kepada Allah swt.

2. Kunjungan nifas II tanggal 20 Januari 2022, pukul 06.50 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan bahwa ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 23.11 WITA , ibu sudah BAB dan sudah BAK, Ibu mengatakan perut masih mules-mules, ASI sudah lancar, Ibu mengeluh badan terasa berat atau lelah dan merasa pusing namun tidak mengganggu aktivitasnya.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu lemah, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU 1 jrbst, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra  $\pm 70$  cc, tidak ada tanda-tanda infeksi, dan konjungtiva berwarna pucat. Pemeriksaan penunjang Hb: 8,5 gr/dl.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "D" didapatkan assessment Ny "D" PIAI postpartum hari pertama.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Pada kasus Ny "D" telah dijelaskan tentang keadaannya, dijelaskan penyebab mule-mules, menginformasikan kepada keluarga bahwa ibu dalam keadaan anemia, diajarkan cara masase uterus, berikan KIE tentang ASI eksklusif, anjurkan istirahat yang cukup, ajarkan cara perawatan payudara, beritahu tanda-bahaya masa nifas, anjurkan menjaga kebersihannya, anjurkan ibu dan keluarga untuk berdoa dan berzikir serta sholat lima waktu.

3. Kunjungan nifas III tanggal 21 Januari 2022, pukul 17.05 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan bahwa ibu melahirkan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar pada tanggal 19 Januari 2022 pada pukul 23.11 WITA, ibu BAB 1 kali sehari dan BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar, Ibu merasa pusing nya telah berkurang tapi badan ibu masih terasa berat atau lelah, dan Ibu mengkonsumsi tablet Fe.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU pertengahan simfisis, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran rubra, tidak ada tanda-tanda infeksi. Pemeriksaan penunjang Hb: 8,5 gr/dl.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan assessment Ny “D” PIAI postpartum hari ke 2.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Pada kasus Ny “D” telah diajarkan cara perawatan tali pusat, telah diajarkan cara perawatan metode kanguru, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif dan sesering mungkin, telah diberikan konseling health education.

4. Kunjungan nifas IV tanggal 22 Januari 2022, pukul 14.00 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan bahwa ibu melahirkan 3 hari yang lalu tanggal 19 Januari 2022 jam 23.11 WITA, ibu tidak merasa pusing dan lelah, ibu BAB 1 kali sehari, ibu mengeluh sulit BAB dan feses berwarna hitam, BAK 4-5 kali sehari, ibu masih mengkonsumsi tablet Fe, ASI sudah lancar.

Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU pertengahan simfisis dan pusat, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “D” didapatkan assessment Ny “D” PIAI postpartum hari ke tiga.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Pada kasus Ny “D” telah jelaskan kepada ibu tentang warna tinja selama mengkonsumsi tablet Fe, jelaskan cara mengkonsumsi tablet Fe, diajarkan cara perawatan tali pusat, telah

diajarkan cara perawatan metode kanguru, diberikan konseling pendidikan kesehatan.

5. Kunjungan nifas V tanggal 28 Januari 2022, pukul 14.10 WITA

Pendokumentasian SOAP terdiri dari data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien.


Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "D" didapatkan bahwa ibu melahirkan 8 hari yang lalu tanggal 19 Januari 2022 jam 23.11 WITA, ibu tidak merasa pusing dan lelah, ibu BAB 1 kali sehari, lancar dan tidak berwarna hitam lagi, BAK 4-5 kali sehari, ASI sudah lancar, ibu masih mengonsumsi tablet Fe.

6. Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran compos mentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI saat payudara dipencet, TFU tidak teraba, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran serosa, tidak ada tanda-tanda infeksi. Pemeriksaan sampel darah pada tanggal 28 Januari 2022 Jam 14.10 WITA, HB : 11,5 g/dl

Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny "D" didapatkan assessment Ny "D" PIAI postpartum hari ke 8.

Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang didapatkan. Pada kasus Ny "D", telah anjurkan ibu

berdiskusi dengan suami tentang pembagian tugas, jelaskan peran suami, anjurkan untuk tetap memberikan asi, anjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, anjurkan istirahat yang cukup, konseling pendidikan kesehatan, menganjurkan keluarga untuk selalu melaksanakan sholat lima waktu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah melakukan studi kasus pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan intranatal maka dapat menarik kesimpulan yaitu :

#### **A. Kesimpulan**

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Pada kasus Ny.“D” didapatkan data dasar dengan Hemoglobin 8,5 gr/dL.
2. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/ masalah aktual pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022 Ny. “D” masuk dengan tanda dan gejala inpartu dan keluhan lain yang menyertai pusing namun tidak mengganggu aktivitas dan merasa berat atau lelah.
3. Telah dilakukan pengidentifikasian diagnosa/ masalah potensial pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022 diantisipasi terjadinya partus lama. Pada kala II terjadi partus lama sehingga menyebabkan memerlukan tindakan dan operasi kebidanan, dapat terjadi asfiksia, fistula, sepsis puerperalis, bahkan sampai pada kematian janin. Pada kala III dapat diikuti retensio plasenta, postpartum hemoragik karena atonia uteri. Pada

kala IV dapat terjadi perdarahan post partum sekunder, atonia uteri dan rupture uteri

4. Telah dilakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Kolaborasi dilakukan bersama dokter obgyn untuk tindakan pencegahan
5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Intervensi dilakukan dengan pemantauan persalinan dengan partograf, pemberian infus RL drips oksitosin ½ ampul dalam 500 ml, perencanaan persalinan dengan hati-hati.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “D” dengan anemia pada persalinan persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Telah dilakukan sesuai dengan intervensi, pada bayi lahir pada tanggal 19 Januari 2022 pukul 23.45 wita berjenis kelamin laki-laki, BB : 3400 gram, PB : 49 cm dan A/S : 8/10
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “R” dengan anemia pada persalinan di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar tahun 2022. Kondisi ibu baik dan tidak terjadi perdarahan post partum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan tingkat resiko yang dapat disebabkan oleh anemia pada persalinan maka penulis menyarankan :

1. Saran untuk bidan

Bidan dapat mengidentifikasi lebih awal tanda-tanda anemia secara dini untuk dapat dilakukannya penanganan tindakan segera sehingga dapat mencegah berlanjutnya anemia ke masa persalinan dan nifas.

2. Saran untuk RS

Meningkatkan mutu pelayanan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan anemia secara optimal.

3. Saran untuk institusi

Menambah referensi buku tentang anemia dalam persalinan sehingga dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai anemia serta dapat mengetahui pelaksanaan asuhan kebidanan untuk pemecahan masalah anemia dengan persalinan.

4. Saran untuk pasien

Pasien diharapkan lebih meningkatkan pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas bagi penderita anemia dengan rajin mengikuti penyuluhan dan meningkatkan gizi untuk memperbaiki keadaan anemia yang dideritanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Misbah. (2002). *No Title*. 154–157.
- Andriani, R. A. D. (2016). *Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Inpartu Kala II Lama di BPM Ny. Suhariyati Surabaya*. 9 No. 1.
- Apriani, A., Firdayanti, F., & Inayah Sari, J. (2020). Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny”R” Usia Kehamilan 30-34 Minggu Dengan Anemia Ringan Di Puskesmas Bontomarannu Gowa Tanggal 24 Juli-23 Agustus 2019. *Jurnal Midwifery*, 2(2), 71–77. <https://doi.org/10.24252/jm.v2i2a3>
- Azwar. (2021). *Terapi Non Farmakologi Untuk Pasien Anemia*. Pustaka Taman Ilmu.
- Batball, B. (2021). *Hypnobirthing Dalam Persalinan Konsep Dan Aplikasi*. Literasi Nusantara.
- Diana, S. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Cv Oase Group.
- Dinas Kesehatan Sulsel. (2017). *No Title*.
- Fitriana, Y., & Purwandani, W. (2018). *Asuhan Persalinan Konsep persalinan Secara Komprehensif Dalam Asuhan Kebidanan*. Pustaka Baru Press.
- Guspaneza, E., & Martha, E. (2019). Analisis Faktor Penyebab Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Indonesia (Analisis Data Sdki 2017). *Oktober*, 5(2), 399–406. <http://www.ejournal.unmuha.ac.id/index.php/JKMA/article/view/735>
- Hasdianah, S. (2016). *Patologi Dan Patofisiologi Penyakit*. Nuha Medika.
- Hasnidar. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil di Kelurahan Macanang Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Watampone*. 5(1), 34–39.
- Indah, I., Firdayanti, F., & Nadyah, N. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “N” dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018. *Jurnal Midwifery*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.24252/jmw.v1i1.7531>
- JNPK–KR. (2017). *Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal: Asuhan Esensial, Pencegahan dan Penanggulangan Segera Komplikasi Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. JNPK-KR, POGI, IBI, IDAI, USAID.
- Latifah, U., Sulastri, & Agustina, T. A. (2017). Hubungan Antara Anemia pada Ibu Bersalin dengan Inpartu Kala I Lama di RSUD Dr. M Ashari Kota Pematang. *Jurnal Harapan Ibu Pekalongan*, 1(1), 1–6.
- Mutmainnah, J. D. (2017). *Asuhan Persalinan Normal Dan Bayi Baru Lahir*. Cv. Andi Offset.
- Nur Badriah, W. D. (2019). *Anemia Defisiensi Besi*. Cv Budi Utama.
- Nurmawati, Saleha, S., & Nadyah. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny “R” Gestasi 38-40 Minggu Dengan Anemia Persalinan DI RSUD Syekh Yusuf Tanggal 05 Juli 2018. *Jurnal Midwifery*, 1 No.1.
- Oktarina, M. (2016). *Buku Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Deepublish.
- Pamungkas, S., Wahyuni, & Dayaningsih, S. (2014). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tablet Penambah Darah dengan Kejadian


- Anemia di Puskesmas Sragen. *Indonesian Journal on Medical Science*, 1(2), 1–10.
- Parulian, I., Rosslyn, T., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Widya, J. I. (2016). Strategi dalam penanggulangan pencegahan anemia pada kehamilan. *Jurnal Ilmiah Widya*, 3(3), 1–9.
- Pujiastuti, Y. E., Refina, R. C., Firdausi, A., & Yuliana, E. T. (2019). Sosialisasi Anemia Kehamilan pada Ibu Hamil Trimester II dan III. *Journal of Community Engagement in Health*, 2(2), 1–4. <https://doi.org/10.30994/jceh.v2i2.18>
- Rahmawati, R., Umar, S., & Meti. (2016). Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. *Media Kebidanan*, 27–32.
- Rahyani, N. K. Y. (2020). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Patologi Bagi Bidan*. Andi.
- Retno Rini, D. L., Sri, W., & Masini. (2017). Pengaruh Pemberian Tablet Fe Dan Sari Kacang Hijau. *Jurnal Kebidanan*, 6(12), 8–16.
- Shihab M. Quraish. (2009). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an, Vol.12*. Lentera Hati.
- Simbolon, D., Jumiyati, & Rahmadi. (2018). *Pencegahan Dan Penanggulangan Kurang Energi Kronik (KEK) Dan anemia Pada Ibu Hamil*. Cv Budi Utama.
- Soebroto, I. (2020). *Cara Mudah Mengatasi Problem Anemia*. Desa Pustaka Indonesia.
- Sulfianti, D. (2020). *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Kita Menulis.
- Suryanarayana, R., Santhuram, A., Chandrappa, M., Shivajirao, P., & Rangappa, S. (2016). Prevalence of anemia among pregnant women in the rural population of Kolar district. *International Journal of Medical Science and Public Health*, 5(3), 454. <https://doi.org/10.5455/ijmsph.2016.2307201575>
- Syaiful, Y., & Lilis Fatmawati. (2020). *Asuhan Keperawatan Pada Ibu Bersalin*. Cv Jakad Media Publishing.
- Taufiq, Z. dkk. (2020). *Aku Sehat Tanpa Anemia Buku Saku Anemia Untuk Remaja Putri*. Wonderland Publisher.
- WHO. (2015). *No Title*.
- Widiastini, L. . (2018). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin Dan Bayi Baru Lahir*. In Media.
- Wirahartari, L. M., Herawati, S., & Wande, N. (2019). Gambaran Indeks Eritrosit Anemia Pada Ibu Hamil Di RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016. *Jurnal Medika*, 8(5), 2597–8012. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum>
- Wulandari, P. (2015). Honey To Prevent Iron Deficiency Anemia in Pregnancy. *J Majority* /, 4, 90. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/556>
- Yulianti, N., & Sam, K. (2019). *Bahan Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Cendekia Publisher.
- Yuni, & Widy. (2018). *Asuhan Persalinan Konsep Persalinan Secara Komprehensif Dalam Asuhan Kebidanan*. Pustaka Baru Press.

## DOKUMENTASI STUDI KASUS

### Dokumentasi hari pertama di ruang persalinan



### Dokumentasi postnatal care hari kedua



**Dokumentasi Post natal care hari ketiga**



**Dokumentasi Post natal care hari ketiga**





DEPARTEMEN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
 Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata - Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

**PARTOGRAF**

No. Register: 

--	--	--	--	--	--




 Nama Ibu: Mj Dewi Umur: 37 th G<sup>0</sup> P.0 A.1  
 No. Pendaftaran: 

--	--	--	--	--	--

 Tanggal: 18-01-2012 Jam: 8.00 WIB Alamat: Kel. 40.1720  
 Kalsien pasang: 


--	--	--	--	--	--

 Sejak jam: 3.30 WITA , mulai sejak jam: 08.00 WITA 10.04.10



Distensi Uterus: 

--	--	--	--	--	--



Suhu: 

--	--	--	--	--	--

Perolehan Berat: 

--	--	--	--	--	--

  
 Perolehan Volume: 

--	--	--	--	--	--





ALAUDDIN

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I, Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar

Kampus II, Jalan H.M. Yasin Limpo, No. 33, Ransang Pelong-Gowa (0411) 841179 Fax 0411-8221400 Gowa

Website: [rik.uin-alauddin.ac.id](http://rik.uin-alauddin.ac.id)

Nomor : B-4355/ Un.06/FKIK/PP.00.9/12/2021  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 20 Desember 2021

Kepada Yth :  
 Ketua Tim Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar  
 Di  
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Fatmah Junia Sari Bahasoan  
 N I M : 70400118033  
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Anemia di RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar Tahun 2021."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andriyani, S.ST., M.Keb  
 2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak ucapkan terimakasih.

Wassalam

Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastiti Handayani

Tembusan :  
 -Dekan FKIK UINAM



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.048/KEPK/FKIK/1/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : FATMAH JUNIA SARI BAHASOAN  
 Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL DENGAN ANEMIA DI RSIA SITI  
 KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR"**

**"MANAGEMENT OF INTRANATAL MIDWIFERY CARE WITH ANEMIA AT RSIA SITI KHADIJAH I  
 MUHAMMADIYAH MAKASSAR"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Penceritaan Behar dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bajakan/Exploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan yang mengacu pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Value, 3) Exploitable Assessment and Benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023  
 This declaration of ethics applies during the period January 5, 2022 until January 5, 2023

January 5, 2022



Chairman and Chairperson,

*(Signature)*  
 Dr. W. Syarifuddin, Sp.A., M.Kes





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 25372/5.01/PTSP/2022  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
 Direktur RSIA Siti Khadijah I Makassar

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-67/FKK/PP.00.9/01/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>FATMAH JUNIA SARI BAHASOAN</b>
Nomor Pokok	: 70400118033
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(D3)
Alamat	: J. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah, dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL DENGAN ANEMIA DI RSIA SITI KHADIJAH I MUHAMMADIYAH MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 12 Januari s/d 27 Februari 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini diandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberitikan di Makassar  
 Pada tanggal : 12 Januari 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19620624 199303 1 003

Terselaku Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,  
 2. Persepsi

SPM/PTSP/01-01-2022



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://dimaq.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231





**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)  
"SITTI KHADIJAH 1"  
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**

Jl. P. K. KARIMUN, 17, BIL. 4011, BOPING, DISTRIK 321114, KABUPATEN BONTOLINGGARA, MAKASSAR  
TEL: 0812 52494111 FAX: 0812 52494114 www.rsiacabangmakassar.com



Nomor: 134 /DiklatRS/IV.6/AU/F/1401 / 2022

Makassar, 17-01-2022 H  
20 M

Lamp :

Hd : Pengambilan Data **Penelitian**  
Kepada Yth,  
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang  
Rumah Muhammadiyah

di  
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama	Ferridar juma sadi Buntakawati
No. Telp	08774895060
NIM	700011044
Program Studi	Pa. Kebidanan
Institusi	UM KAMPUNG MANGGAR
Judul Penelitian	MANAJEMEN KLINIK BERTARIFAN POTENSIAL DENGAN MENYERVIS IFA SITI KHADIJAH 1 MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

Tanggal Penelitian: SEBELA 10 JANUARI 2022 Hd 25 Januari 2022

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diharapkan banyak TERIMA KASIH dengan  
iringan do'a Jazakomullahu Khairatun Jazil.

Wahitubi Taqib Wal Haqiyah  
Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hikmah,  
  
Kep. Sek. RSIA

Gembusan  
L. Anip

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas

Nama : Fatmah Junia Sari Bahasoan  
Nim : 70400118033  
TempatTanggalLahir : Makassar, 02 Juni 2000  
Suku : Ambon  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Sehe-Bandar Angin  
Nama Orang Tua  
Ayah : Abdulrahman Bahasoan  
Ibu : Agustini

### B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006 – 2012 SD Alhilal 2 Namlea
2. Tahun 2012 – 2015 SMP Negeri 5 Namlea
3. Tahun 2015 – 2018 SMA negeri 2 Buru
4. Tahun 2018 – 2022 UIN Alauddin Makassar