


**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN KANKER SERVIKS
DENGAN ANSIETAS MENGGUNAKAN RELAKSASI BENSON
DI RUANG PINANG RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

FINA EKAWATI

NIM.70900121006

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN KANKER SERVIKS
DENGAN ANSIETAS MENGGUNAKAN RELAKSASI BENSON
DI RUANG PINANG RSUP DR. WAHIDIN
SUDIROHUSODO MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FINA EKAWATI

NIM.70900121006

**PROGRAM STUDI PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fina Ekawati, S. Kep
NIM : 70900121006
Tempat/Tgl. Lahir : Takalar, 25 November 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Maternitas
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Soreang Alluka, Desa Jipang
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Juni 2022

Penyusun,

Fina Ekawati


NIM: 70900121006

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Fina Ekawati, NIM: 70900121006, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 27 Juni 2022



Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing I



Nurul Fadhillah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar", yang disusun oleh Fina Ekawati, NIM: 70900121006, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M, bertepatan dengan 01 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Gowa, Kamis 30 Juni 2022 M.
01 Dzulhijjah 1443 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes
Sekretaris : Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep
Munaqisy I : Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep
Munaqisy II : Dr. Muhaemin, S.Ag., M. Th.I., M.Ed
Pembimbing I : Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing II: Nurul Fadhillah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M. Kes.
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur atas rahmat Allah swt. sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar” dapat terselesaikan dengan baik dan tidak lupa pula penulis persembahkan shalawat serta salam kepada Rasulullah saw. serta kepada para sahabat dan pengikutnya. Adapun tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memperoleh gelar Ners dari Program Studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak oleh karenanya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang besar serta penghargaan kepada semua pihak, semoga Allah dapat membalas bantuan yang diberikan dengan pahala yang setimpal. Ucapan terima kasih saya persembahkan kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD serta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan
3. Dr. Patima, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua Program Studi profesi Ners dan Syisnawati, S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris Program Studi

Profesi Ners, serta Dosen pengajar, bagian Tata Usaha dan Akademik bersama Staf yang selalu membagikan ilmunya serta memberikan bantuan, baik dalam proses pengurusan administrasi maupun proses penyusunan karya tulis ilmiah

4. Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I dan Nurul Fadhilah Gani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dan motivasi dari awal penulisan karya tulis ilmiah hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
5. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep selaku penguji I dan Dr. Muhaemin, S.Ag., M. Th.I., M.Ed selaku penguji II yang telah sabar meluangkan pikiran dan waktunya serta memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga penulis dapat menghasilkan karya yang mumpuni
6. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Firdaus dan Ibunda tersayang Jumriani yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menjalani studi.
7. Kepada teman-teman seperjuangan, khususnya para sahabat dan teman sekelompok bimbingan yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang turut serta membantu dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, namun penulis tidak dapat ucapkan secara satu persatu. Semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan dari berbagai pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu

penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah swt. Sekian dan terima kasih.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul	i
Halaman Sampul	i
Halaman Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v-vii
Daftar Isi	viii-ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Halaman Abstrak (Indonesia)	xii
Halaman Abstrak (Inggris)	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7-44
2.1 Konsep Medis	7-15
2.2 Konsep Asuhan Keperawatan	15-38
2.3 <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	38-44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45-48
3.1 Rancangan Studi Kasus	45
3.2 Subyek Studi Kasus.....	45
3.3 Fokus Studi Kasus	45
3.4 Instrumen Studi Kasus	46
3.5 Prosedur Pengambilan Data	46
3.6 Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi	47

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	47
3.8 Etika Studi kasus	47
BAB IV LAPORAN KASUS	49-86
4.1 Asuhan Keperawatan.....	49-86
BAB V PEMBAHASAN	87-101
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	87-99
5.2 Analisis <i>Evidence Based Practice In Nursing</i>	99-101
BAB VI PENUTUP	102-103
6.1 Kesimpulan	102
6.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
Lampiran 1: Pathway	110
Lampiran 2: Jurnal Rujukan Utama	112
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup	113



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Uterus dan serviks	7
Gambar 2.2. Gambaran kanker serviks	8
Gambar 2.3. Proses terjadinya kanker serviks	10
Gambar 2.5. Kerangka Kerja Konseptual pada Teori Kenyamanan	15



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Stadium Kanker Serviks	9
Tabel 4.1. Pengkajian Gangguan Sistem Reproduksi (GSR).....	49-56
Tabel 4.2. Analisa Data	57-60
Tabel 4.3. Diagnosis Keperawatan	60-61
Tabel 4.4. Intervensi Keperawatan	62-79
Tabel 4.5. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Pasien 1	70-78
Tabel 4.6. Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Pasien 2	78-86



ABSTRAK

Nama : Fina Ekawati

Nim : 70900121006

Judul : Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar

Latar belakang: Berdasarkan *International Agency for Research on Cancer (IARC)*, kanker serviks menempati urutan kedua dari seluruh kanker pada perempuan di dunia dengan insidensi 6,5% dan jumlah kematian 7,7% (WHO, 2020). Keluhan fisik utama pada pasien yang duga kanker serviks yaitu keputihan, gatal dan keluarnya darah dari vagina saat menstruasi. Sedangkan masalah psikologis utama yang muncul pada pasien kanker serviks adalah ansietas. Penanganan terhadap kecemasan bisa dilakukan baik secara farmakologi dan non farmakologi. Terapi farmakologi seperti pengobatan medikamentosa sedangkan terapi nonfarmakologi yang bisa diberikan untuk mengurangi gejala kecemasan yaitu relaksasi benson dan dzikir. **Tujuan** penulisan adalah melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas di ruang pinang RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan menggunakan kombinasi relaksasi benson dan dzikir. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Instrument pengumpulan data menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan Gangguan Sistem Reproduksi (GSR) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan intervensi relaksasi benson sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di ruangan pinang RSUP Wahidin Sudirohusodo yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2021. Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. **Hasil:** Setelah diberikan relaksasi benson dan dzikir, kedua pasien mengalami penurunan gejala ansietas dimana pasien 1 dan 2 tampak lebih tenang setelah pemberian intervensi. **Kesimpulan dan Saran:** Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan relaksasi benson 1 kali dalam sehari, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dapat menurunkan ansietas ringan setelah pemberian, hal ini mengindikasikan bahwa relaksasi benson efektif dilakukan dalam membantu menurunkan gejala ansietas pasien. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar menerapkan relaksasi benson secara terus-menerus dan teratur untuk memperoleh hasil yang optimal.

Kata Kunci: Kanker Serviks, Ansietas, Relaksasi Benson

ABSTRAK

Nama : Fina Ekawati

Nim : 70900121006

Judul : *Analysis of Nursing Care in Cervical Cancer Patients with Anxiety Using a Benson Relaxation in the Pinang Room, Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar*

Background: Cancer (IARC), cervical cancer ranks second of all cancers in women in the world with an incidence of 6.5% and a mortality rate of 7.7% (WHO, 2020). The main physical complaints in patients who suspect cervical cancer are vaginal discharge, itching and bleeding from the vagina during menstruation. Meanwhile, the main psychological problem that arises in cervical cancer patients is anxiety. Handling of anxiety can be done both pharmacologically and non-pharmacologically. Pharmacological therapy such as medical treatment while non-pharmacological therapy that can be given to reduce anxiety symptoms is benson relaxation and dhikr. **The purpose** of writing is to carry out nursing care for cervical cancer patients with anxiety in the areca nut room, Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar by using a combination of Benson relaxation and dhikr. **The method** used is a case study with a nursing care approach involving 2 respondents. Data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. The data collection instrument used a nursing care assessment format for Reproductive System Disorders (GSR) and Standard Operating Procedures (SOP) in conducting Benson relaxation interventions according to applicable regulations. This research was conducted in the areca nut room of Wahidin Sudirohusodo Hospital which was held for 3 days, namely on 15-17 December 2021. Data analysis and data presentation in the case study were presented textually with facts included in the text and narrative. **Results:** After being given Benson relaxation and dhikr, both patients experienced a decrease in anxiety symptoms where patients 1 and 2 seemed calmer after the intervention. **Conclusions and Suggestions:** Based on the results of the case evaluation conducted, it was stated that the application of Benson relaxation once a day, according to a set schedule, can reduce anxiety after administration, this indicates that Benson relaxation is effective in helping to reduce the patient's anxiety symptoms. Suggestions for further researchers, is to apply benson relaxation continuously and regularly to obtain optimal results.

Keywords: Cervical Cancer, Anxiety, Benson Relaxation

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit kanker adalah masalah kesehatan yang penting bagi wanita di seluruh dunia termasuk di Negara berkembang seperti Indonesia. Kanker serviks dan kanker payudara memiliki kontribusi tertinggi terhadap kejadian kanker pada perempuan Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tindakan penapisan efektif yang dilakukan dalam mendeteksi kanker stadium dini (Kemenkes, 2020).

Kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada serviks atau leher rahim yang disebabkan oleh infeksi *Human Papilloma Virus* (HPV). *International Agency for Research on Cancer* (IARC) menyebutkan bahwa kanker serviks menempati urutan kedua dari semua kanker pada perempuan di dunia dengan insidensi 6,5% dan jumlah kematian 7,7%. Sedangkan kanker payudara menempati urutan pertama dengan insidensi 24,5% dan jumlah kematian 15,5% (WHO, 2020). Hal ini sejalan dengan data Globacon (2020) bahwa kejadian kanker pada perempuan Indonesia yaitu kanker payudara dengan insidensi 15,7% dan jumlah kematian 30,8% diikuti kanker serviks dengan insidensi 8% dan jumlah kematian 17,2%. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa kanker yang paling banyak menyerang masyarakat saat ini salah satunya adalah kanker leher rahim (serviks) yakni sebanyak 460 penderita pada tahun 2019 (Dinkes Sul-Sel, 2019).

Kanker serviks dapat mengakibatkan kematian apabila tidak segera ditangani karena kegawatdaruratannya. Perdarahan pada vagina, nyeri panggul, keputihan, vagina berbau busuk, dan sakit saat buang air kecil merupakan kegawatdaruratan yang paling sering terjadi pada pasien kanker serviks. Dari kondisi tersebut dapat mengakibatkan gangguan kecemasan karena dampak psikologis dari penyakit yang

diderita yaitu cemas dan depresi di semua tahap penyakit yang dimulai dari timbulnya gejala pertama, saat didiagnosis, selama pengobatan dan perawatan paliatif, sampai masa pemulihan sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk kematian. Kondisi ini menimbulkan dampak emosi negatif, kecemasan pada penderita, dan ketakutan akan kematian (Binka *et al.*, 2020).

Masalah keperawatan psikologis yang muncul pada pasien kanker serviks menurut Brunner & Suddarth (2011) yaitu ansietas, rasa takut mengenai seksualitas, defisit pengetahuan, nyeri, dan gangguan citra tubuh. Kecemasan merupakan salah satu respon psikologis pada pasien yang mengalami bedah mayor. Kecemasan tersebut dapat bersifat ringan, sedang, berat sampai panik tergantung masing-masing individu (Satriana & Feriani, 2020). Kemoterapi pada pasien kanker serviks juga menimbulkan dampak psikologis di antaranya adalah kecemasan, sering marah, stress, dan kehilangan kepercayaan diri, serta merasa bahwa dirinya menjadi beban keluarga. Selain itu, pasien juga dapat kehilangan pekerjaan, menarik diri, perubahan peran contohnya seorang ibu tidak dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal, stigma masyarakat juga mengatakan bahwa kanker serviks adalah penyakit yang berbahaya dan mematikan. Semua dampak tersebut dapat mengganggu kesehatan pasien sehingga menimbulkan kecemasan bagi pasien.

Kecemasan, kegelisahan dan ketakutan akan selalu terjadi pada diri manusia yang datangnya dari Allah swt. semata-mata untuk menguji hambanya sesuai dalam firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 155 yang berbunyi:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَارِثِ وَبَشِيرٍ
الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar (Q.S: al-Baqarah/2:155).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa selama hayat masih dikandung badan, kita tidak akan lepas dari ujian dan cobaan. Bentuk ujian dan cobaan tersebut yaitu kecemasan, kegelisahan, kekurangan harta, dan ketakutan agar kita selalu mengingat kepada-Nya. Dan hendaklah sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, dan mereka diberikan kemudahan dalam menghadapi cobaan tersebut karena dengan cobaan itulah cara Allah agar manusia selalu mendekatkan diri kepada-Nya (Shihab, 2009).

Kecemasan yang tidak teratasi akan menimbulkan berbagai dampak di antaranya adalah penurunan kualitas hidup, cenderung memiliki penilaian negatif tentang makna hidup, perubahan emosional meliputi depresi kronis serta gangguan psikosa (Friedman, 2008). Perasaan cemas yang dirasakan oleh pasien kanker serviks akan berdampak buruk pada proses pengobatan dan rehabilitasi secara medis maupun psikologis (Pratiwi *et al.*, 2017). Dalam kasus ini, pasien membutuhkan asuhan keperawatan secara holistik mencakup aspek fisiologis, sosiologis, psikologis, dan spiritual. Pemenuhan kebutuhan holistik seperti memberikan nutrisi yang cukup pada pasien, menguatkan mental pasien dalam mengatasi gangguan psikologis pasien karena kebanyakan perempuan merasa tidak siap secara mental menghadapi vonis kanker serviks, sehingga banyak di antara mereka menutup diri sampai larut dalam kesedihan bahkan depresi. Psikoterapi bagi pasien kanker serviks juga dapat menurunkan stress, meningkatkan kualitas hidup dan waktu bertahan hidup pasien kanker (Wahyuni, 2014).

Penanganan ansietas bisa dilakukan baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis. Terapi farmakologis meliputi penggunaan obat medikamentosa seperti benzodiazepine dan non-benzodiazepine. Sedangkan terapi nonfarmakologi yang dapat diberikan adalah distraksi dan terapi relaksasi. Beberapa terapi relaksasi yang dapat digunakan untuk menurunkan ansietas diantaranya adalah relaksasi napas dalam, relaksasi otot progresif, relaksasi visualisasi, relaksasi kesadaran indera, pijat relaksasi, Tai Chi, tertawa, yoga, mencoba jalan kaki, dan relaksasi benson (Anonim,

2017). Relaksasi Benson adalah gabungan antara teknik relaksasi dan keyakinan yang dianut pasien. Relaksasi benson akan menghambat aktifitas saraf simpatik yang dapat menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh dan kemudian otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan yang nyaman dan tenang. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Apriyanti (2018), dimana dari hasil uji statistik menggunakan independent t-test diperoleh nilai p sebesar 0,004 (p value <0,05), yang artinya kecemasan pada pasien kanker serviks dengan menggunakan relaksasi benson efektif untuk mengurangi kegelisahan.

Laporan data rekam medik RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, jumlah pasien kanker serviks mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 tercatat jumlah pasien sebanyak 1275, dan pada tahun 2014 sebanyak 2576 pasien, kemudian pada tahun 2015 sebanyak 2515 pasien, selanjutnya pada tahun 2016 (Januari-Juni) sebanyak 701 pasien dimana rawat jalan sebanyak 429 pasien, dan rawat inap sebanyak 272 pasien (Laporan RSUP Wahidin Sudirohusodo, 2016).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 26 desember di ruang pinang RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan hasil wawancara dan observasi pada 2 orang pasien yang menderita kanker serviks, 1 orang mengatakan merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi, tampak gelisah, tampak tegang, dan mengeluh pusing, sedangkan 1 orang lainnya mengalami hal yang sama ditambah dengan gejala muka tampak pucat, dan suara bergetar. Selain itu, dari hasil observasi perawat hanya memenuhi kebutuhan biologis pasien. Sedangkan tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan secara holistik yaitu biologis, psikologis, sosial, dan spiritual (Rutami & Setiawan 2012).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti merasa bahwa kecemasan pada penderita kanker serviks perlu diatasi sehingga peneliti mencoba memberikan terapi relaksasi Benson untuk mengetahui “bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson di ruang pinang RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo?

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson di ruang pinang RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson di ruang pinang RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengkajian keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas.
- b. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas.
- c. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas.
- d. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas.
- e. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas.
- f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan analisis asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson.

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian intervensi EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan relaksasi benson pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.



BAB II


TINJAUAN TEORI

2.1 Konsep Medis

2.1.1 Definisi

Kanker ialah pertumbuhan sel-sel tubuh di luar kendali dan membuat sel-sel baru dan mendesak sel-sel normal sehingga menimbulkan masalah pada organ tempat kanker tumbuh (*American Cancer Society, 2016*). Serviks merupakan bagian bawah rahim dengan bentuk selinder yang terhubung dengan vagina. Serviks terdiri dari 2 bagian yaitu endoserviks dan ekstroserviks. Endoserviks di lapisi oleh epitelium kolumnar dan ektoerviks dilapisi epitel skuamosa dimana kedua kelenjar ini bertemu pada *Scuamocolumnar Junction* (SCJ) (*Bermudez et al., 2015*).

Kanker leher Rahim (kanker serviks) adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher Rahim/serviks (bagian terendah dari Rahim yang menempel pada puncak vagina, kanker srviks biasanya menyerang Wanita berusia 35-55 tahun. Kanker leher rahim ini juga terjadi pada serviks uterus, suatu daerah pada organ reproduksi Wanita yang merupakan pintu masuk kearah rahim yang terletak antara rahim (uterus) dengan liang senggama (vagina). Kanker ini berkembang secara bertahap, tetapi progresif (*Ahmad, 2017*).



Gambar 2.1 Uterus & serviks

Sumber: *The Anatomy & Physiology Learning System* (Applegate, 2011)

2.1.2 Etiologi

Menurut Nurarif & Kusuma (2016), terdapat beberapa faktor risiko terjadinya kanker serviks, yaitu:

- a. Melakukan hubungan seks pertama pada usia dini (dibawah 18 tahun)
- b. *Human Papilloma Virus* (HPV), yaitu virus penyebab kutil genetalis (*Kandiloma akuminata*) yang ditularkan lewat hubungan seks. Varian yang sangat berbahaya yaitu HPV tipe 16, 18, 45, dan 56.
- c. Melakukan hubungan seks pertama pada usia dini (dibawah 18 tahun)
- d. Berganti-ganti pasangan seks dan pernah menikah dengan perempuan yang menderita kanker serviks
- e. Infeksi klamidia atau infeksi herpes genetalis menahun
- f. Penggunaan pil KB
- g. Sistem kekebalan tubuh yang terganggu
- h. Pemakaian *Diethylstilbestrol* (DES) untuk mencegah keguguran pada wanita hamil
- i. Merokok (tembakau dapat memengaruhi kemampuan tubuh melawan infeksi HPV pada serviks dan merusak sistem kekebalan tubuh)
- j. Tingkat ekonomi rendah sehingga tidak mampu melakukan pemeriksaan pap smear secara rutin

2.1.3 Klasifikasi

Klasifikasi kanker serviks dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.2 Gambaran kanker serviks

Sumber : Cervical Cancer (Garza *et al.*, 2017)

Menurut *The International Federation Of Gynecology and Obstetrics* (FIGO) (Jhingran & Rodriguez, 2017), stadium kanker serviks adalah sebagai berikut:


Tabel 2.1 Stadium Kanker Serviks

Stadium	Deskripsi
0	Karsinoma in situ
I	Karsinoma serviks benar-benar terbatas di uterus (mengabaikan ekstensi ke korpus uteri)
IA	Karsinoma invansive yang hanya diidentifikasi secara mikroskopis. Kedalaman invansi maksimum 5 mm dan tidak lebih lebar dari 7mm
IA1	Invasi stroma sedalam ≤ 3 mm dan seluas ≤ 7 mm
IA2	Invasi stroma sedalam > 3 mm namun < 5 mm dan seluas ≤ 7 mm
IB	Lesi klinis terbatas pada serviks, atau lesi praklinis lebih besar dari stadium IA
IB1	Lesi klinis berukuran ≤ 4 cm
IB2	Lesi klinis berukuran > 4 cm
II	Karsinoma meluas di luar rahim, tetapi tidak meluas ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina
IIA	Keterlibatan hingga 2/3 bagian atas vagina. Tidak ada keterlibatan parametrium
IIA1	Lesi yang terlihat secara klinis ≤ 4 cm
IIA2	Lesi klinis terlihat > 4 cm
IIB	Nampak invasi ke parametrium
III	Tumor meluas ke dinding samping pelvis. Pada pemeriksaan dubur, tidak ada ruang bebas antara tumor dan dinding samping pelvis. Tumor melibatkan sepertiga bawah vagina dan atau hidronefrosis atau kerusakan ginjal yang diketahui bukan karena penyebab lain
IIIA	Tumor melibatkan sepertiga bagian bawah vagina, tanpa ekstensi ke dinding pelvis
IIIB	Perluasan ke dinding samping pelvis atau hidronefrosis atau ginjal yang tidak berfungsi
IV	Karsinoma telah meluas ke pelvis yang sebenarnya atau secara klinis melibatkan mukosa kandung kemih dan atau rectum
IVA	Menyebar ke mukosa kandung kemih, menyebar keluar panggul kecil
IVB	Menyebar ke organ yang jauh

2.1.4 Patofisiologi

Perjalanan penyakit kanker leher rahim merupakan salah satu model karsinogenesis yang melalui tahapan atau multistep, dimulai dari karsinogenesis awal sampai terjadinya perubahan morfologi hingga menjadi kanker invasif. Perkembangan kanker invasif berawal dari terjadinya lesi 15 neoplastik pada lapisan epitel serviks, dimulai dari *Neoplasia Intraepitel Serviks* (NIS) 1, NIS 2, NIS 3 atau Karsinoma *In Situ* (KIS). Selanjutnya setelah menembus membran basalis akan berkembang menjadi karsinoma mikroinvasif dan invasif (Kemenkes, 2017).

Faktor risiko terbesar pada kanker serviks yaitu infeksi HPV yang ditularkan melalui hubungan seks. Faktor lain dalam perkembangan kanker serviks yaitu aktifitas seksual di usia dini, jumlah pasangan seks yang meningkat, merokok, paritas tinggi, dan status ekonomi rendah (Price & Wilson, 2012). Karsinoma sel skuamosa biasanya muncul pada taut epitel skuamosa dan epitel kubus mukosa endoserviks (persambungan skuamokolumnar atau zona transformasi). Di zona transformasi ini menunjukkan tidak normalnya sel prgresif yang berakhir sebagai karsinoma servikal invasif. Dysplasia servikal dan karsinoma *in situ* mendahului karsinoma invasif. Karsinoma serviks terjadi jika tumor menginvasi epitelium masuk ke dalam stroma serviks. Kanker serviks menyebar luas ke dalam jaringan para servikal secara langsung. Pertumbuhan ini menyebabkan lesi bisa dilihat dan terlibat progresif pada jaringan servikal. Karsinoma invasive bisa meluas ke dinding vagina, rongga endometrium, dan ligamentum kardinale. Menyebar ke kelenjar getah bening dan pembuluh darah mengakibatkan metastase ke bagian tubuh yang jauh (Jannah, 2019). Perjalanan kanker serviks secara singkat dapat dilihat pada gambar 2.3



Gambar 2.3 Proses terjadinya kanker serviks

Sumber : Panduan Penatalaksanaan Kanker Serviks (Kemenkes, 2017)

Perkembangan kanker serviks dimulai dari NIS 1, NIS 2, dan NIS 3 atau karsinoma *in situ* pada lapisan epitel serviks kemudian menembus membrane basalis dan menjadi karsinoma mikroinvasif dan invasif.

2.1.5 Manifestasi Klinis

Menurut Jhingran & Rodriguez (2017), gejala umum kanker serviks, yaitu:

- a. Terdapat nyeri panggul saat pemeriksaan panggul atau pada saat berhubungan seksual
- b. Perdarahan abnormal pada vagina

Hal ini dapat terjadi sesudah melakukan seks vagina, setelah menopause, perdarahan dan bercak di antara periode menstruasi, periode menstruasi yang lebih banyak dan lebih lama dari biasanya serta perdarahan setelah pemeriksaan panggul.

- c. Terdapat nyeri panggul saat pemeriksaan panggul atau pada saat berhubungan seksual
- d. Trias seperti *back pain*, gagal ginjal, edema tungkai adalah tanda kanker serviks stadium lanjut dengan keterlibatan dinding panggul yang luas
- e. Keputihan

Cairan yang keluar mungkin terjadi diantara menstruasi atau setelah menopause, mengandung darah dan berbau busuk.

2.1.6 Penatalaksanaan

Penatalaksanaan kanker serviks dibagi menjadi 2 yaitu tatalaksana lesi pra kanker dan tatalaksana kanker serviks invasif:

- a. Tatalaksana Lesi Pra kanker

Terapi NIS dengan Destruksi Lokal dimana metode ini ditujukan untuk destruksi lokal lapisan epitel serviks dengan kelainan lesi pra kanker digantikan dengan epitel skuamosa yang baru (Kemenkes, 2017).

- 1) Krioterapi

Menurut Shetty & Trimble (2013), bahwa krioterapi digunakan dalam mengobati lesi kecil dibagian ekstoserviks dengan metode *freezing* sekurang-kurangnya 20°C selama 6 menit menggunakan gas Co2 atau N2O. Mekanisme kerusakan bioseluler terjadi karena:

- a) Status umum sistem mikrovaskuler
- b) Gangguan konsentrasi elektrolit di dalam sel
- c) Sel-sel mengalami dehidrasi dan mengkerut
- d) Syok termal dan denaturasi kompleks lipid protein

2) Elektrokauter

Metode ini memanfaatkan alat radiofrekuensi atau elektrokauter dalam melakukan eksisi *Loop diathermy* terhadap lesi pra kanker pada zona transformasi (Kemenkes, 2017).

3) *Loop Electrosurgical Excisional Prosedure (LEEP)*

Metode ini memanfaatkan kawat halus dalam memotong lesi kecil dan besar dari serviks. Loop tertempel pada alat genggam yang melekat pada generator listrik elektrosurgical dalam pengaturan pemotongan (Shetty & Trimble, 2013).

4) Laser

Light amplification by stimulation emission of radiation adalah suatu muatan listrik yang dilepaskan dalam suatu tabung yang berisi campuran gas nitrogen, gas helium, dan gas CO₂ sehingga bisa menghasilkan sinar laser dengan panjang gelombang 10,6μ (Kemenkes, 2017).

5) Diatermi Elektrokoagulasi

Metode ini bisa menghilangkan jaringan lebih luas dan lebih efektif dibandingkan dengan elektrokauter, namun harus dilakukan dengan anastesi umum. Prosedur ini memungkinkan menghilangkan jaringan serviks sampai kedalaman 1 cm, tetapi fisiologi serviks bisa dipengaruhi apabila lesi tersebut sangat luas (Kemenkes, 2017).

b. Tatalaksana Kanker Serviks Invasif

1) Histerektomi

Prosedur ini dilakukan apabila hasil skrining dan tes diagnostik memperlihatkan bahwa penyakit masih tetap ada sesudah dilakukan

perawatan dalam menghilangkan kanker serviks, terutama pada perempuan yang sudah melewati masa subur. Tindakan ini melibatkan pengangkatan uterus dan serviks dengan atau tanpa ovarium dan tuba yang bisa dilakukan melalui rute vagina, rute abdominal dengan sayatan vertikal, atau dengan pendekatan laparaskopi (Shetty & Trimble, 2013).

2) Konisasi (*Cold knife conization*)

Tindakan ini biasanya disarankan untuk lesi dimana tingkat endoserviks penyakit tidak terlihat, hasil pemeriksaan terlihat adenokarsinoma in situ atau kemungkinan maligna, atau ada perbedaan signifikan antara hasil biopsi dengan sitologi yang diarahkan secara kolposposal negatif (Shetty & Trimble, 2013).

3) Ajuvan Radioterapi atau Kemoradiasi

Prosedur ini dilakukan apabila ada faktor risiko yaitu kelenjar getah bening, metastase parametrium. Jika batas sayatan tidak bebas tumor maka radiasi eksterna dilanjutkan dengan brakhiterapi (Kemenkes, 2017).

2.1.7 Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan diagnostik pada kanker serviks yaitu inspeksi, biopsi serviks, kolposkopi, rektoskopi, sistoskopi, BNO-IVP, *ultrasonography*, *bone scan* dan foto toraks, MRI atau CT scan, PET scan. Pemeriksaan rektoskopi dan sistoskopi dilakukan hanya pada kasus dengan stadium IB2 atau lebih (Kemenkes, 2019). Biasanya pada tahap pra invasif kanker serviks belum terdapat gejala dan telah diderita kurang lebih selama 10-15 tahun. Pada tahap awal, kanker bisa terdeteksi melalui skrining, tetapi sebagian perempuan dengan kesadaran rendah dalam melakukan pemeriksaan seperti pap smear ataupun inspeksi visual dengan asam asetat. Hal ini didukung oleh penelitian (Wuriningsih, 2016), bahwa dari 171 perempuan yang mengetahui tentang kanker serviks, hanya 42 perempuan (24,5%) yang melakukan deteksi dini.

a. Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA)

IVA adalah pemeriksaan serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang setelah memulas serviks dengan larutan asetat 3-5%. Jika sesudah pulasan terjadi perubahan warna asam asetat menjadi bercak putih, maka kemungkinan ada kelainan tahap pra kanker serviks sedangkan jika tidak terjadi perubahan warna berarti dianggap tidak ada infeksi pada serviks. Keuntungan IVA adalah biayanya yang murah.

b. Tes Pap Smear

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai deteksi dini munculnya lesi pra kanker serviks. Prosedurnya dilakukan dengan cepat, tidak sakit, hasil akurat, dan biayanya terjangkau. Pemeriksaan ini dilakukan saat perempuan tidak sedang menstruasi. Waktu terbaik untuk skrining yaitu antara 10 dan 20 hari sesudah hari pertama masa menstruasi. Dua hari sebelum pemeriksaan, tidak dianjurkan untuk memakai pembersih vagina, karena dapat menyembunyikan atau menghilangkan sel-sel yang abnormal.

2.1.8 Komplikasi

Beberapa komplikasi yang dapat terjadi akibat kanker serviks yaitu:

- a. Terjadi penggumpalan darah diakibatkan kanker menekan pembuluh darah dipanggul
- b. Dapat terjadi kejang karena kanker menyebar ke otak
- c. Limfedema (pembengkakan tungkai karena penyumbatan pembuluh getah bening oleh kanker)
- d. Nyeri hebat dikarenakan kanker menyebar ke ujung saraf, tulang, dan otot
- e. Kanker yang menyebar ke vagina, usus, dan kandung kemih dapat menyebabkan perdarahan
- f. Dapat terjadi hidronefrosis atau penumpukan urin pada ginjal sehingga dapat menyebabkan gagal ginjal
- g. Dapat terjadi fistula antara vagina dan kandung kemih atau vagina dan rektum


Sedangkan menurut *National Health Service* (2018), komplikasi yang dapat terjadi akibat pengobatan kanker serviks antara lain:

- a. Tidak dapat mempunyai anak akibat histerektomi, inkontinensia urine, dan vagina kering
- b. Rambut rontok, diare, dan gagal ginjal akibat kemoterapi
- c. Menopause akibat radioterapi, infertilitas, dan penyempitan vagina
- d. Penyempitan vagina, infertilitas, dan menopause dini akibat radioterapi

2.2 Konsep Asuhan Keperawatan

2.2.1 Konsep Teori Keperawatan yang Terkait

Kenyamanan ialah pengalaman diterima oleh seseorang dari suatu intervensi dimana hal ini didapatkan apabila kebutuhan biopsikospiritual terpenuhi (Peterson & Bredow, 2010). Konsep teori ini meliputi pentingnya kenyamanan, kebutuhan kenyamanan, variable intervensi, intervensi kenyamanan, integritas institusional, dan perilaku pencari kesehatan. Menurut Kolcaba (2012), semua hal tersebut digambarkan dalam kerangka konseptual berikut ini:



Gambar 2.5 Kerangka Kerja Konseptual pada Teori Kenyamanan

Keseluruhan konsep tersebut terkait dengan klien dan keluarga. Teori Kolcaba terdiri dari 3 tipe yaitu *relief* (kondisi pasien yang memerlukan penanganan spesifik dan segera, kemudian yang kedua adalah *ease* (kondisi tenang atau kepuasan hati dari klien yang terjadi karena hilangnya

ketidaknyamanan fisik yang dirasakan di semua kebutuhan, dan yang terakhir adalah *transcendence* (keadaan seseorang yang mampu mengatasi masalah dari ketidaknyamanan yang terjadi).

Kolcaba memandang kenyamanan sebagai kebutuhan dasar individu yang bersifat utuh atau holistik. Kenyamanan fisik berkaitan dengan mekanisme homeostatis dan sensasi tubuh, seperti penurunan kemampuan tubuh dalam merespon prosedur invasif ataupun penyakit. Berbagai alternatif yang diberikan dalam memenuhi kebutuhan fisik yaitu merubah posisi, memberikan obat, kompres dingin atau hangat, *backrub*, dan sentuhan terapeutik. Kenyamanan psikospiritual berhubungan dengan keharmonisan hati dan ketenangan jiwa, yang dilakukan dengan memfasilitasi kebutuhan sosialisasi dan interaksi klien dengan orang-orang terdekat selama perawatan dan pelibatan keluarga secara aktif dalam proses kesembuhan klien.

Kebutuhan kenyamanan sosiokultural terkait dengan hubungan interpersonal, keluarga dan masyarakat, seperti perawatan yang sesuai dengan budaya klien dan kebutuhan terhadap informasi kepulangan (*discharge planning*). Adapun cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi kebutuhan sosiokultural yaitu menciptakan hubungan terapeutik dengan klien, memfasilitasi kerja tim yang mengatasi kemungkinan adanya konflik antara proses penyembuhan dengan budaya lain, mendorong klien dalam mengekspresikan perasaannya, dan menghargai hak-hak klien tanpa memandang status sosial atau budaya. Dan kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kenyamanan lingkungan yang dapat dilakukan dengan memberikan lingkungan yang aman bagi klien, menjaga kerapian dan kebersihan lingkungan, membatasi pengunjung dan terapi saat klien istirahat (Kolcaba, 2012).

2.2.2 Pengkajian Keperawatan

a. Identitas pasien

Seperti nama, umur, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama, asal suku bangsa, pendidikan, nomor rekam medik, tanggal masuk rumah sakit, nama dan pekerjaan orang tua.

b. Identitas penanggung jawab

Meliputi nama, umur, pekerjaan dan hubungan dengan pasien.

c. Riwayat kesehatan

1) Keluhan utama

Keluhan utama biasanya seperti perdarahan intra servikal disertai keputihan yang seperti air dan berbau (Padila, 2015). Sedangkan keluhan utama pada pasien post kemoterapi yaitu tidak nafsu makan, mual muntah berlebihan, anemia.

2) Riwayat kesehatan sekarang

Biasanya pada pasien dengan stadium awal tidak mengalami keluhan mengganggu, keluhan akan dirasakan pada stadium 3 atau 4 yang merupakan stadium akhir seperti perdarahan sesudah melakukan hubungan seks, nyeri panggul, nyeri disekitar vagina, dan keputihan berbau busuk. Sedangkan pada pasien post kemoterapi yaitu tidak nafsu makan mual muntah berlebihan, anemia.

3) Riwayat kesehatan dahulu

Biasanya memiliki riwayat penyakit HIV/AIDS atau penyakit keputihan (Ariani, 2015).

4) Riwayat kesehatan keluarga

Biasanya faktor yang paling berpengaruh adalah faktor genetik sehingga keluarga yang mempunyai riwayat penyakit kanker di dalam keluarganya berisiko tinggi mengalami kanker serviks

dibandingkan dengan keluarga yang tidak ada riwayat di dalam keluarganya.

c. Riwayat Obstetri

1) Riwayat kehamilan dan persalinan

Yaitu mengkaji kehamilan dan anak yang hidup, karena kanker serviks ditemukan paling banyak pada wanita dengan jumlah partus yang tinggi, jadi semakin sering partus maka kemungkinan mengalami karsinoma serviks juga semakin besar (Aspiani, 2017).

2) Keluhan haid

Yaitu mengkaji tentang riwayat haid pertama kali (menarche) dan haid terakhir karena kanker serviks tidak pernah ditemukan sebelum menarche dan mengalami atropi pada masa menopause. Perdarahan yang terjadi diantara siklus haid serta siklus menstruasi yang tidak teratur merupakan tanda dan gejala kanker serviks.

d. Riwayat kebiasaan sehari-hari

Biasanya meliputi pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur, nutrisi, aktivitas sehari-hari dan eliminasi (Padila, 2015). Sedangkan pada pasien post kemoterapi biasanya akan kehilangan nafsu makan, gangguan pola tidur, sampai kelelahan.

e. Riwayat psikososial

Biasanya terkait dengan harapan terhadap pengobatan yang akan dijalani, hubungan klien dengan suami atau keluarga dan penerimaan pasien terhadap penyakitnya. Kaji konsep diri pasien seperti gambaran diri, identitas, dan peran. Kaji juga respon non verbal pasien, dan keluhan pasien yang merasa menyusahkan orang lain atau merasa tidak berguna.

f. Pemeriksaan fisik, meliputi :

- 1) Keadaan umum: Biasanya pasien kanker serviks post kemoterapi dalam keadaan sadar namun lemah dengan tanda-tanda vital 120/80 mmHg.
- 2) Kepala: Biasanya pada pasien kanker serviks post kemoterapi mengalami rambut rontok dan mudah tercabut.
- 3) Mata: Biasanya pada pasien kanker serviks post kemoterapi mengalami skelera ikterik dan konjungtiva anemis.
- 4) Leher: Biasanya pada pasien kanker serviks post kemoterapi tidak ada kelainan
- 5) Thoraks dan Abdomen: Biasanya pada pasien kanker serviks post kemoterapi tidak ada kelainan
- 6) Genetalia: Biasanya pada pasien kanker serviks mengalami peradangan, keputihan, sekret berlebihan, lesi dan perdarahan (Brunner & Suddarth, 2015). Sedangkan pada pasien post kemoterapi biasanya mengalami perdarahan pervaginam
- 7) Ekstermitas: Biasanya pada pasien kanker serviks dengan stadium lanjut tidak mengalami edema dan nyeri (Brunner & Suddarth, 2015). Pada pasien post kemoterapi biasanya mengalami kebas pada tangan dan kaki atau kesemutan.

g. Pemeriksaan penunjang.

- 1) Pemeriksaan hematologi

Biasanya pada pasien kanker srviks post kemoterapi mengalami anemia karena penurunan hemoglobin dimana nilai normalnya berkisar antara 12-16 gr/dl.

2.2.3 Diagnosis Keperawatan

a. Masalah Keperawatan: Ansietas

Definisi: Kondisi emosi dan pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik akibat antisipasi yang

memungkinkan individu melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Merasa bingung 2. Merasa khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi 3. Sulit berkonsentrasi	1. Tampak gelisah 2. Tampak tegang 3. Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Mengeluh pusing 2. Anoreksia 3. Palpitasi 4. Merasa tidak berdaya	1. Frekuensi napas meningkat 2. Frekuensi nadi meningkat 3. Tekanan darah meningkat 4. Diaforesis 5. Tremor 6. Muka tampak pucat 7. Suara bergetar 8. Kontak mata buruk 9. Sering berkemih 10. Berorientasi pada masa lalu

Penyebab

- 1) Krisis situasional
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi
- 3) Krisis maturasional
- 4) Ancaman terhadap konsep diri
- 5) Ancaman terhadap kematian
- 6) Kekhawatiran mengalami kegagalan
- 7) Disfungsi sistem keluarga
- 8) Hubungan orang tua-anak tidak memuaskan
- 9) Faktor keturunan (temperamen mudah teragitasi sejak lahir)
- 10) Penyalahgunaan zat
- 11) Terpapar bahaya lingkungan (mis. toksin, polutan dan lain-lain)
- 12) Kurang terpapar informasi

b. Masalah: Nyeri Kronis

Definisi: Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif 1. Mengeluh nyeri 2. Merasa depresi (tertekan)	Objektif 1. Tampak meringis 2. Gelisah 3. Tidak mampu menuntaskan aktivitas
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1. Merasa takut mengalami cedera berulang	Objektif 1. Bersikap protektif (mis. posisi menghindari nyeri) 2. Waspada 3. Pola tidur berubah 4. Anoreksi 5. Fokus menyendiri 6. Berfokus pada diri sendiri

Penyebab

- 1) Kondisi muskuluskeletal kronis
- 2) Penekanan saraf
- 3) Kerusakan sistem saraf
- 4) Infiltrasi tumor
- 5) Gangguan imunitas (mis. neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster)
- 6) Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator, dan reseptor)
- 7) Gangguan fungsi metabolik
- 8) Peningkatan indeks massa tubuh
- 9) Riwayat posisi kerja statis
- 10) Kondisi pasca trauma
- 11) Riwayat penganiayaan (mis. fisik, psikologis, seksual)

- 12) Tekanan emosional
- 13) Riwayat penyalahgunaan obat/zat
- c. Masalah Keperawatan: Perfusi Perifer Tidak Efektif

Definisi: Penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif 1. Pengisian kapiler >3 detik 2. Nadi perifer menurun atau tidak teraba 3. Akral terasa dingin 4. Warna kulit pucat 5. Turgor kulit menurun
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1. Parastesia 2. Nyeri ekstremitas (klaudikasi intermiten)	Objektif 1. Edema 2. Penyembuhan luka lambat 3. Indeks ankle-brachial < 0,90 4. Bruit femoral.

Penyebab

- 1) Hiperglikemia
- 2) Peningkatan tekanan darah
- 3) Penurunan konsentrasi hemoglobin
- 4) Penurunan aliran arteri dan/atau vena
- 5) Kekurangan volume cairan
- 6) Kurang terpapar informasi tentang faktor pemberat (mis. merokok, gaya hidup monoton, trauma, obesitas, asupan garam, imobilitas)
- 7) Kurang aktivitas fisik
- 8) Kurang terpapar informasi tentang proses penyakit (mis. diabetes melitus, hiperlipidemia)
- d. Masalah: Gangguan Eliminasi urine

Definisi: Disfungsi eliminasi urin.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif 1. Desakan berkemih 2. Urine menetes (<i>dribbling</i>) 3. Sering buang air besar 4. Nokturia 5. Mengompol 6. Enuresis	Objektif 1. Distensi kandung kemih 2. Berkemih tidak tuntas (<i>hesitancy</i>) 3. Volume residu urine meningkat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif (tidak tersedia)

Penyebab

- 1) Iritasi kandung kemih
 - 2) Penurunan kapasitas kandung kemih
 - 3) Efek tindakan medis dan diagnostik (mis. operasi ginjal, operasi saluran kemih, dan obat-obatan)
 - 4) Penurunan kemampuan menyadari tanda-tanda gangguan kandung kemih
 - 5) Ketidakmampuan mengakses toilet (mis. imobilisasi)
 - 6) Kelemahan otot pelvis
 - 7) Imaturitas (pada anak usia < 3 tahun)
 - 8) Hambatan lingkungan
 - 9) *Outlet* kandung kemih tidak lengkap (mis. anomali saluran kemih kongenital)
 - 10) Ketidakmampuan mengkomunikasikan kebutuhan eliminasi
- e. Masalah: Gangguan Mobilitas Fisik

Definisi: Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstermitas secara mandiri.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif Mengeluh sulit menggerakkan ekstermitas	Objektif 1. Kekuatan otot menurun 2. Rentang gerak (ROM) menurun

Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Nyeri saat bergerak 2. Enggan melakukan pergerakan 3. Merasa cemas saat bergerak	1. Sendi kaku 2. Gerakan tidak terkordinasi 3. Gerakan terbatas 4. Fisik lemah

Penyebab

- 1) Perubahan metabolisme
 - 2) Penurunan kendali otot
 - 3) Kerusakan integritas struktur tulang
 - 4) Ketidakbugaran fisik
 - 5) Keterlambatan perkembangan
 - 6) Kontraktur
 - 7) Kekakuan sendi
 - 8) Malnutrisi
 - 9) Indeks masa tubuh diatas persentil ke 75 sesuai usia
 - 10) Nyeri
 - 11) Kecemasan
 - 12) Efek agen farmakologis
 - 13) Program pembatasan gerak
 - 14) Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
 - 15) Gangguan muskuloskeletal
 - 16) Gangguan neuromuscular
 - 17) Gangguan melakukan pergerakan
 - 18) Gangguan sensoripersepsi
 - 19) Gangguan kognitif
- f. Masalah: Defisit Nutrisi
- Definisi: Asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolisme.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif 1. Berat badan menurun minimal 10% di bawah rentang ideal
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif 1. Cepat kenyang setelah makan 2. Kran/nyeri abdomen 3. Nafsu makan menurun	Objektif 1. Bising usus hiperaktif 2. Otot pengunyah lemah 3. Otot menelan lemah 4. Membran mukosa pucat 5. Sariawan 6. Serum albumin turun 7. Rambut rontok berlebihan 8. Diare

Penyebab

- 1) Peningkatan kebutuhan metabolisme
 - 2) Ketidakmampuan menelan makanan
 - 3) Ketidakmampuan mencerna makanan
 - 4) Ketidakmampuan mengabsorpsi nutrisi
 - 5) Faktor psikologis (mis. stress, keengganan untuk makan)
 - 6) Faktor ekonomi (mis. finansial tidak mencukupi)
- g. Masalah: Gangguan Integritas Kulit/Jaringan
- Definisi: Kerusakan kulit (dermis dan/atau epidermis) atau jaringan (membran mukosa, kornea, fascia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan/atau ligament).

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif 1. Kerusakan jaringan dan/atau lapisan kulit
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif (tidak tersedia)	Objektif 1. Nyeri 2. Perdarahan 3. Kemerahan 4. Hematoma

Penyebab

- 1) Perubahan status nutrisi (kelebihan atau kekurangan)
 - 2) Perubahan sirkulasi
 - 3) Penurunan mobilitas
 - 4) Kelebihan atau kekurangan volume cairan
 - 5) Suhu lingkungan yang ekstrim
 - 6) Efek samping terapi radiasi
 - 7) Perubahan hormonal
 - 8) Perubahan pigmentasi
 - 9) Neuropati perifer
 - 10) Proses penuaan
 - 11) Kelembapan
 - 12) Neuropati perifer
 - 13) Kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/melindungi integrasi jaringan
 - 14) Bahan kimia iritatif
 - 15) Faktor mekanis (mis.penekanan pada tonjolan tulang, gesekan) atau faktor elektrik (elektrodiatermi, energi listrik bertegangan tinggi)
- h. Masalah Keperawatan: Harga Diri Rendah

Definisi: Evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan klien sebagai respon terhadap situasi saat ini.

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Menilai diri negative (mis. tidak berguna, tidak tertolong) 2. Merasa malu/bersalah 3. Melebih-lebihkan penilaian negative tentang diri sendiri 4. Menolak penilaian positif tentang diri sendiri	1. Berbicara pelan dan lirih 2. menolak berinteraksi dengan orang lain 3. Berjalan menunduk 4. Postur tubuh menunduk

Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Sulit berkonsentrasi	1. Kontak mata kurang 2. Lesu dan tidak bergairah 3. Pasif 4. Tidak mampu membuat keputusan

Penyebab

- 1) Perubahan peran social
 - 2) Perubahan pada citra tubuh
 - 3) Riwayat penolakan
 - 4) Riwayat kehilangan
 - 5) Transisi perkembangan
 - 6) Kegagalan hidup berulang
 - 7) Perilaku tidak konsisten dengan nilai
 - 8) Ketidakadekuatan pemahaman
- i. Masalah Keperawatan: Risiko Infeksi
- Definisi: Berisiko mengalami peningkatan organisme patogenik.

Faktor Risiko

- 1) Efek prosedur invasif
- 2) Penyakit kronis (misalnya diabetes mellitus)
- 3) Malnutrisi
- 4) Perubahan sekresi pH
- 5) Peningkatan paparan organisme patogen lingkungan
- 6) Penurunan kerja siliaris
- 7) Penurunan hemoglobin
- 8) Gangguan peristaltik
- 9) Ketuban pecah sebelum waktunya
- 10) Ketuban pecah lama
- 11) Kerusakan integritas kulit
- 12) Statis cairan tubuh

- 13) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh primer
- 14) Vaksinasi tidak adekuat
- 15) Merokok
- 16) Ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder
- 17) Leukopenia
- 18) Supresi respon inflamasi
- 19) Immonusupresi
- 20) Leukopenia

Kondisi Klinis Terkait

- 1) Tindakan invasif
- 2) AIDS
- 3) Diabetes mellitus
- 4) Luka bakar
- 5) Gangguan fungsi hati
- 6) Gagal ginjal
- 7) Leukositopenia
- 8) Lymphedema
- 9) Imunosupresi
- 10) Kanker
- 11) Kondisi penggunaan terapi steroid
- 12) Ketuban pecah sebelum waktunya (KPSW)
- 13) Penyakit paru obstruksi kronis
- 14) Penyalahgunaan obat

2.2.4 Intervensi Keperawatan

a. Masalah Keperawatan: Ansietas

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan Kriteria hasil:

- 1) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun
- 2) Perilaku gelisah menurun

- 3) Perilaku tegang menurun
- 4) Frekuensi nadi membaik
- 5) Frekuensi pernapasan membaik
- 6) Frekuensi nadi membaik
- 7) Tekanan darah membaik
- 8) Kontak mata membaik
- 9) Pola tidur membaik

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif - Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Monitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman - Gunakan pakaian longgar - Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi - Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih - Anjurkan mengambil posisi nyaman - Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi - Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih - Demonstrasikan dan latih tehnik relaksasi 	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan tehnik relaksasi tersebut - Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan - Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi - Agar klien lebih mudah bergerak - Untuk memberikan perasaan tenang pada klien <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi - Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan - Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi - Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan - Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan - Untuk memudahkan klien melakukan intervensi

b. Masalah Keperawatan: Nyeri Kronis

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan Kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis menurun
- 3) Gelisah menurun
- 4) Sikap protektif menurun
- 5) Tekanan darah membaik
- 6) Kesulitan tidur menurun
- 7) Pola tidur membaik
- 8) Pola napas membaik
- 9) Frekuensi nadi membaik
- 10) Berfokus pada diri sendiri menurun
- 11) Menarik diri menurun
- 12) Perasaan depresi (tertekan) menurun

Intervensi	Rasional
Manajemen Nyeri Observasi <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri - Identifikasi skala nyeri - Identifikasi respon nyeri non verbal - Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri -Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri -Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup -Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan -Monitor efek samping analgetik Teraupetik <ul style="list-style-type: none"> - Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis.TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin) -Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) -Fasilitasi istirahat dan tidur -Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri 	Manajemen Nyeri Observasi <ul style="list-style-type: none"> -Untuk mengetahui keadaan umum klien - Untuk memudahkan tindakan selanjutnya - Untuk memudahkan dalam pemberian intervensi - Untuk memudahkan dilakukan intervensi -Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri -Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari -Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan -Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik Teraupetik <ul style="list-style-type: none"> -Untuk membantu menurunkan nyeri -Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri - Mengoptimalkan pasien untuk istirahat -Untuk menentukan strategi meredakan nyeri Edukasi <ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien -Meningkatkan pengetahuan klien - Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri

<p>dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri - Jelaskan strategi meredakan nyeri - Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri - Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu 	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri
--	--

c. Masalah Keperawatan: Perfusi Perifer Tidak Efektif

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan Kriteria hasil:

- 1) Denyut nadi perifer meningkat
- 2) Turgor kulit membaik
- 3) Pengisian kapiler membaik
- 4) Warna kulit pucat menurun
- 5) Pengisian kapiler membaik

Intervensi	Rasional
<p>Perawatan Sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periksa sirkulasi perifer (mis, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu) - Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis, diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) - Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan pencegahan infeksi - Lakukan hidrasi <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat - Ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi - Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. sakit yang tidak hilang saat istirahat) 	<p>Perawatan Sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui perubahan perfusi jaringan perifer klien - Untuk mengetahui penyebab gangguan sirkulasi pada klien - Perubahan perfusi jaringan perifer dimulai dari ekstermitas <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mencegah penularan mikroorganisme - Hidrasi atau pemenuhan kebutuhan cairan tubuh dapat membantu metabolisme tubuh <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah komplikasi dekubitus - Untuk memperbaiki sirkulasi - Sirkulasi perifer dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit sehingga harus segera dilaporkan

d. Masalah Keperawatan: Gangguan Eliminasi Urine

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan eliminasi urine membaik dengan Kriteria hasil:

- 1) Sensasi berkemih meningkat
- 2) Frekuensi BAK membaik
- 3) Distensi kandung kemih menurun
- 4) Karakteristik urine membaik
- 5) Disuria menurun

Intervensi Keperawatan	Rasional
<p>Manajemen eliminasi urine</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi tanda dan gejala retensi atau inkontinensia urine - Identifikasi faktor yang menyebabkan retensi atau inkontinensia urine - Monitor eliminasi urine (mis. frekuensi, konsistensi, aroma, volume, dan warna) <p>Teraupetik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Catat waktu-waktu dan haluaran berkemih - Batasi asupan cairan bila perlu - Ambil sampel urine tengah (midstream) atau kultur <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajarkan tanda dan gejala infeksi saluran kemih - Ajarkan mengukur asupan cairan dan haluaran urine - Ajarkan mengambil spesimen urine midstream - Ajarkan mengenali tanda berkemih dan waktu yang tepat untuk berkemih - Ajarkan terapi modalitas penggunaan otot-otot panggul/berkemih - Anjurkan minum yang cukup, jika tidak ada kontraindikasi - Anjurkan mengurangi minum menjelang tidur <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kolaborasi pemberian obat supositoria uretra 	<p>Manajemen eliminasi urine</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui tanda dan gejala retensi urin - Mengetahui penyebab dari retensi urine - Mengetahui pola eliminasi pasien, mengetahui adanya komplikasi seperti infeksi dan perdarahan <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui haluaran urin, untuk menghitung balance cairan - Batasi asupan cairan misalnya pada pasien gagal ginjal kronik - Mengetahui kultur urine <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencegah terjadinya komplikasi - Mengetahui output dan input cairan pasien - Untuk pemeriksaan urine - Untuk mengembalikan fungsi kandung kemih ke keadaan normal atau ke fungsi optimal dengan latihan terstruktur - Mengatasi inkontinensia atau retensi urine - Mencukupi kebutuhan cairan pasien - Mencegah terbangun dari tidur karena keinginan berkemih yang dapat menyebabkan gangguan tidur <p>Kolaborasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai alternatif dari obat-obatan oral

e. Masalah Keperawatan: Gangguan Mobilitas Fisik

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan Kriteria hasil:

- 1) Kekuatan otot cukup meningkat
- 2) Kaku sendi menurun
- 3) Pergerakan ekstremitas meningkat
- 4) Rentang gerak (ROM) meningkat
- 5) Kecemasan menurun
- 6) Kelemahan fisik menurun
- 7) Gerakan tidak terkoordinasi menurun
- 8) Nyeri menurun
- 9) Gerakan terbatas menurun

Intervensi	Rasional
<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya - Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan - Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi - Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. pagar tempat tidur) - Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu -Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi - Anjurkan melakukan mobilisasi dini -Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi) 	<p>Dukungan Mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <ul style="list-style-type: none"> -Untuk mengetahui faktor penyebab keterbatasan gerak -Menentukan batas gerakan yang akan dilakukan -Mengetahui perkembangan klien -Mengetahui perkembangan klien <p>Terapeutik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membantu pasien agar mudah dalam melakukan aktivitas - Gerakan tubuh aktif atau pasif untuk mempertahankan atau memperbaiki fleksibilitas sendi - Membantu pasien agar mudah dalam melakukan aktivitas <p>Edukasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pemahaman mengenai manfaat tindakan yang akan dilakukan - Untuk meminimalkan kekakuan sendi - Ambulasi dini baik bagi sirkulasi, pemulihan peristaltik usus, dan mempercepat proses penyembuhan luka

f. Masalah Keperawatan: Defisit Nutrisi

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan status nutrisi membaik dengan Kriteria hasil:

- 1) Porsi yang dihabiskan meningkat
- 2) Kekuatan otot menelan meningkat
- 3) Kekuatan otot pengunyah meningkat
- 4) Serum albumin meningkat
- 5) Verbalisasi keinginan untuk meningkatkan nutrisi meningkat
- 6) Pengetahuan tentang standar asupan nutrisi yang tepat meningkat
- 7) Pengetahuan tentang makanan yang sehat meningkat
- 8) Pengetahuan tentang pilihan makanan meningkat
- 9) Nyeri abdomen menurun
- 10) Sikap terhadap makanan/minuman sesuai dengan tujuan kesehatan meningkat
- 11) Penyiapan dan penyimpanan minuman yang aman meningkat
- 12) Penyiapan dan penyimpanan makanan yang aman meningkat
- 13) Perasaan cepat kenyang menurun
- 14) Frekuensi makan membaik
- 15) Indeks Massa Tubuh (IMT) membaik
- 16) Berat badan membaik

Intervensi	Rasional
Manajemen Nutrisi Observasi -Identifikasi status nutrisi -Identifikasi makanan yang disukai -Monitor asupan makanan -Monitor berat badan Terapeutik -Lakukan oral hygiene sebelum makan, jika perlu -Sajikan makanan secara menarik dan suhu yang sesuai -Berikan makanan tinggi serat untuk mencegah konstipasi -Berikan makanan tinggi kalori dan	Manajemen Nutrisi Observasi -Pengkajian penting dilakukan untuk mengetahui status nutrisi klien sehingga dapat menentukan intervensi yang diberikan -Untuk dapat berselera dalam makanan -Untuk mengetahui asupan makanan klien -Untuk mengetahui BB yang ideal untuk klien Terapeutik -Untuk meningkatkan nafsu makan -Agar pasien lebih lahap dalam memakan makanannya

tinggi protein Edukasi -Anjurkan posisi duduk, jika mampu Kolaborasi -Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrient yang dibutuhkan, jika perlu	-Untuk mencegah konstipasi -Agar kalori dan protein pasien terpenuhi Edukasi -Untuk memudahkan proses makan Kolaborasi -Agar nutrisi pasien terpenuhi dengan baik dengan mengkonsultasikan dengan ahli gizi
---	--

g. Masalah: Gangguan Integritas Kulit/Jaringan

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan integritas kulit dan jaringan meningkat dengan Kriteria hasil:

- 1) Elastisitas meningkat
- 2) Kerusakan lapisan kulit menurun
- 3) Kerusakan jaringan menurun
- 4) Kemerahan menurun
- 5) Pigmentasi abnormal menurun
- 6) Suhu kulit membaik
- 7) Tekstur membaik
- 8) Sensasi membaik
- 9) Pertumbuhan rambut membaik
- 10) Nyeri menurun
- 11) Jaringan parut menurun
- 12) Nekrosis menurun

Intervensi Keperawatan	Rasional
Perawatan Integritas Kulit Observasi -Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit (misal perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan ekstrem, penurunan mobilitas) Terapeutik -Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring - Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering -Gunakan produk berbahan ringan/alami dan hipoalergik pada kulit sensitif -Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering	Perawatan Integritas Kulit Observasi -Untuk mengetahui penyebab dari masalah gangguan integritas kulit pasien Terapeutik -Untuk mencegah terjadinya ulkus -Untuk melembapkan kulit -Tekstur lunak dan lembut saat bersentuhan dengan kulit -Agar kulit tidak semakin kering Edukasi -Untuk menjaga kelembapan kulit -Untuk menjaga elastisitas dan

Edukasi -Anjurkan menggunakan pelembap -Anjurkan minum air yang cukup -Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi -Anjurkan meningkatkan asupan buah dan sayur -Anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrem -Anjurkan mandi dan menggunakan sabun secukupnya	kelembapan kulit -Untuk menjaga kesehatan kulit -Untuk menjaga asupan vitamin -Menjaga kelembapan kulit -Meminimalkan penggunaan bahan kimia pada kulit untuk mencegah iritasi
--	--

h. Masalah: Harga Diri Rendah

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan harga diri meningkat dengan Kriteria hasil:

- 1) Penilaian positif meningkat
- 2) Perasaan bersalah menurun
- 3) Perasaan malu menurun
- 4) Kontak mata meningkat

Intervensi Keperawatan	Rasional
Promosi Harga Diri Observasi - Identifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri - Monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri - Monitor tingkat harga diri setiap waktu, sesuai kebutuhan Terapeutik - Motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri - Diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri - Diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah - Fasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan harga diri Edukasi - Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki - Anjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain - Latih pernyataan/kemampuan positif diri - Latih meningkatkan kepercayaan pada kemampuan dalam menangani situasi	Promosi Harga Diri Observasi - Sebagai acuan dalam penyusunan intervensi tanpa melupakan budaya pasien - Untuk mengidentifikasi harga diri pasien - Untuk mengetahui tingkat harga diri pasien Terapeutik - Pemberian motivasi mendorong klien untuk menemukan semangat - Untuk mengetahui pengalaman menyenangkan klien sebagai acuan dalam meningkatkan harga diri pasien - Untuk mengetahui alasan pasien mengkritik dirinya - Aktivitas yang sesuai dengan kemampuan pasien dapat meningkatkan harga diri pasien Edukasi - Untuk mengetahui kekuatan dan kemampuan pasien sebagai acuan dalam intervensi - Untuk meningkatkan harga diri pasien saat berbicara dengan orang lain - Agar pasien terbiasa menghargai setiap kemampuannya

i. Masalah Keperawatan: Risiko Infeksi

Tujuan: Setelah dilakukan intervensi selama ...x... jam, diharapkan infeksi dapat dikontrol dengan Kriteria hasil:

- 1) Kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko meningkat
- 2) Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko meningkat
- 3) Kemampuan menghindari faktor risiko meningkat
- 4) Kemampuan melakukan strategi kontrol risiko meningkat
- 5) Kemampuan mengenali perubahan status kesehatan meningkat
- 6) Pemantauan perubahan status kesehatan

Intervensi Keperawatan	Rasional
Pencegahan Infeksi Observasi - Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Terapeutik -Batasi jumlah pengunjung -Berikan perawatan kulit pada edema -Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien -Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Edukasi -Jelaskan tanda dan gejala infeksi -Anjurkan cara mencuci tangan dengan benar -Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi -Anjurkan meningkatkan status nutrisi -Anjurkan meningkatkan asupan cairan Kolaborasi -Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu	Pencegahan Infeksi Observasi -Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi Terapeutik -Mengurangi kontaminasi bakteri -Meringankan gejala edema -Untuk mengurangi kontaminasi silang -Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular Edukasi -Agar pasien dan keluarga pasien dapat memahami tanda dan gejala infeksi -Untuk menumbuhkan perilaku cuci tangan yang baik dan benar -Memeriksa tepi luka terhadap ada tidaknya epitelisasi dan/atau kontraksi -Untuk membantu mempercepat epitalisasi -Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh Kolaborasi -Untuk merangsang kekebalan tubuh

2.2.5 Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah pengelolaan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan (Setiadi, 2012). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan rencana keperawatan diantaranya: Intervensi dilaksanakan sesuai dengan rencana setelah dilakukan validasi, keterampilan interpersonal, teknikal dan intelektual dilakukan

dengan cermat dan efisien pada situasi yang tepat, keamanan fisik dan psikologis klien dilindungi serta dokumentasi intervensi dan respon pasien (Dermawan, 2012). Pada tahap implementasi ini merupakan aplikasi secara kongkrit dari rencana intervensi yang telah dibuat untuk mengatasi masalah kesehatan dan perawatan yang muncul pada pasien.

2.2.6 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan (Dermawan, 2012). Evaluasi berfokus pada ketepatan perawatan yang diberikan dan kemajuan pasien atau kemunduran pasien terhadap hasil yang diharapkan. Evaluasi merupakan proses yang interaktif dan kontinu karena setiap tindakan keperawatan dilakukan, respon klien dicatat dan dievaluasi dalam hubungannya dengan hasil yang diharapkan. Kemudian berdasarkan respon klien, direvisi intervensi keperawatan atau hasil yang diperlukan. Ada dua komponen untuk mengevaluasi kualitas tindakan keperawatan, yaitu:

a. Proses (sumatif)

Fokus evaluasi proses adalah aktivitas dari proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan tindakan keperawatan. Evaluasi proses harus dilakukan sesudah perencanaan keperawatan, dilaksanakan untuk membantu keefektifan terhadap tindakan.

b. Hasil (formatif)

Fokus evaluasi hasil adalah perubahan perilaku atau status kesehatan pasien pada akhir tindakan keperawatan.

2.3 Evidence Based Practice in Nursing

2.3.1 Definisi

Relaksasi merupakan prosedur yang digunakan dalam membantu individu dalam menghadapi kondisi yang penuh stress. Relaksasi benson adalah pengembangan dari respon relaksasi yang dikembangkan oleh Benson, yang

menggabungkan antara relaksasi dan keyakinan agama yang dianut. Jadi, relaksasi benson ialah pengembangan metode respon relaksasi pernapasan dengan melibatkan faktor keyakinan pasien, yang dapat membantu pasien dalam mencapai kesehatan dan kesejahteraan yang lebih tinggi (Benson dalam Purwanto, 2008). Relaksasi Benson merupakan teknik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh pasien, dan formula kata-kata/zikir atau kalimat tertentu yang dibaca berulang-ulang dengan melibatkan unsur keimanan dan keyakinan akan menimbulkan respon relaksasi yang lebih kuat dibandingkan dengan hanya relaksasi tanpa melibatkan unsur keyakinan pasien tersebut (Ernawati, 2021).

Dzikir adalah solusi terbaik, iman kepada Allah yang mampu menyembuhkan gangguan kecemasan dan gangguan kejiwaan lainnya dengan memberikan rasa tenang dan aman pada jiwa seseorang, hendaklah dengan berdzikir kepada Allah swt. karena sesungguhnya dengan berdzikir dapat membuat seseorang dapat menghadirkan Tuhan dalam pikiran, perilaku dan sebagainya. Al-Qur'an menegaskan dalam Q.S. ar-Ra'd/13:28 yang berbunyi:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang percaya dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah menjadi tenteram (Q.S: ar-Ra'd/13:28)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kegelisahan, kecemasan, dan ketakutan berasal dari Allah yang sengaja diciptakan untuk kita sebagai ujian hidup. Tetapi, banyak yang tidak memahami makna kegelisahan dan kecemasan tersebut, padahal kegelisahan, keresahan, dan ketakutan sebenarnya adalah karunia dan nikmat Allah bagi orang-orang yang beriman, artinya keresahan yang tengah menggerogoti hati adalah bukti kasih sayang Allah pada hambanya agar senantiasa mengingatkannya dengan membaca al-Qur'an, berdzikir, dan sebagainya dan kemudian hati akan menjadi tentram. Sesungguhnya hati tidak akan tenang

bila tidak mengingat dan merenungkan kuasa dan kebesaran Allah, dengan selalu mengharapkan keridaan-Nya (Shihab, 2009).

2.3.2 Tujuan

Menurut Purwanto (2016) tujuan relaksasi secara umum adalah untuk mengendurkan ketegangan, yaitu pertama-tama jasmaniah yang pada akhirnya mengakibatkan mengendurnya ketegangan jiwa. Saat pasien dalam keadaan rileks terjadi penurunan hormon kortisol dan adrenalin serta peningkatan hormon endorfin dan serotonin. Peningkatan hormon endorfin dan serotonin berefek pada respon fisiologis pasien yang ditunjukkan dengan perasaan pasien menjadi lebih tenang, tidak khawatir, terjadi penurunan detak jantung pasien, penurunan denyut nadi, tidak gelisah dan lain sebagainya.

2.3.3 Indikasi

Pasien yang mengalami kecemasan

2.3.4 Kontraindikasi

Responden sedang menggunakan obat anti-depresan atau penenang, seperti obat diazepam atau sejenis lainnya (Ernawati, 2021).

2.3.5 Ptosedur pemberian dan rasionalisasi

Menurut Solehati & Kosasih (2015) dalam Marhamah & Ramadhanty (2021) bahwa pelaksanaan teknik relaksasi benson menurut yaitu dengan membentuk suasana sekitar tenang, menghindari dari kebisingan, serta memposisikan tubuh senyaman mungkin. Menarik nafas dalam melalui hidung dan jaga mulut tetap tertutup hitungan sampai 3 tahan selama inspirasi bersama membaca kalimat-kalimat sesuai keyakinan misalnya yang beragama islam membaca istigfar. Teknik ini dilakukan sebanyak 5-7 kali.

Relaksasi Benson yang menggabungkan relaksasi dan zikir (dalam Islam) atau doa sesuai dengan keyakinan pasien memberikan efek saling menguatkan untuk menimbulkan ketenangan dan pada saat yang sama dapat menekan sensasi nyeri. Benson dapat mengurangi kecemasan dan nyeri karena dilakukan dengan memperhatikan; suasana tenang, posisi baring atau duduk yang nyaman sikap

pasrah/pasif, keterlibatan mental. Kondisi yang ditunjang ke 4 hal tersebut sangat menunjang pasien untuk merasa nyaman (Ernawati, 2021).

Sedangkan langkah-langkah dalam teknik relaksasi Benson Inayati (2012) adalah:

a. Fase Orientasi

- 1) Berikan salam
- 2) Perkenalkan diri
- 3) Identifikasi pasien
- 4) Kontrak waktu
- 5) Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien, berikan *informed consent*.

b. Fase kerja

- 1) Langkah pertama: Pilih kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan pasien. Anjurkan pasien untuk memilih ungkapan yang memiliki arti khusus seperti tenang dan lain-lain. Dalam penelitian ini, menggunakan *subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar*.
- 2) Langkah kedua: Atur posisi yang nyaman. Pengaturan posisi dapat dilakukan dengan cara duduk, berlutut atau tiduran selama tidak mengganggu pikiran pasien
- 3) Langkah ketiga: Pejamkan mata sewajarnya. Tindakan dilakukan dengan wajar dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga
- 4) Langkah keempat: Lemaskan otot-otot tubuh. Lemaskan semua otot pada tubuh pasien dari kaki, betis, paha dan perut. Memutar kepala dan mengangkat bahu dapat dilakukan untuk melemaskan otot bagian kepala, leher dan bahu. Ulurkan tangan, kemudian kendurkan dan biarkan terkulai di samping tubuh

- 5) Langkah kelima: Mulai dengan bernapas yang lambat dan wajar, serta mengucapkan dalam hati satu kata atau kalimat sesuai keyakinan pasien, kalimat yang digunakan berupa kalimat pilihan pasien. Tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut secara perlahan sambil mengucapkan kata yang telah dipilih dan diulang-ulang saat mengeluarkan nafas. Sambil terus melakukan langkah nomor 5 ini, lemaskan seluruh tubuh disertai dengan sikap pasrah
- 6) Langkah keenam: pertahankan sikap pasif. Anjurkan pasien untuk tidak mempedulikan berbagai macam pikiran yang mengganggu konsentrasi pasien
- 7) Langkah ketujuh: lakukan teknik relaksasi dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan dalam waktu 10-20 menit. Pasien diperbolehkan membuka mata untuk melihat waktu tetapi jangan menggunakan alarm. Bila sudah selesai tetap berbaring atau duduk dengan tenang selama beberapa menit, mula-mula mata terpejam dan sesudah itu mata terbuka.

c. Fase Terminasi

- 1) Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan
- 2) Evaluasi tindakan
- 3) Beri *reinforcement* positif pada pasien.

2.3.6 Kriteria evaluasi

Kriteria evaluasi pada relaksasi benson adalah tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah dan tegang menurun, frekuensi pernapasan, nadi, dan tekanan darah menurun, pucat menurun, konsentrasi membaik, dan perasaan keberdayaan membaik (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017).

2.3.7 Artikel utama dan Pendukung

- a. Artikel utama
 - 1) Penulis: Yenny Safitri, Erlinawati, Fitri Apriyanti
 - 2) Tahun: 2018
 - 3) Judul: Perbandingan Relaksasi Benson dan Relaksasi Kesadaran Indera Terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Kanker Serviks di RSUD Bangkinang Tahun 2018
 - 4) Sumber: Portal Garuda
- b. Artikel pendukung
 - 1) Penulis: Yenny Safitri
 - 2) Tahun: 2017
 - 3) Judul: *The influence of benson relaxation towards the level of anxiety in cervical cancer patients in inpatient ward of camar iii at general hospital of arifin achmad pekanbaru 2015*
 - 4) Sumber: *Google Scholar*
- c. Artikel pendukung
 - 1) Penulis: Claudius, Kevin & Hany Wihardja
 - 2) Tahun: 2022
 - 3) Judul: Efektivitas Relaksasi Benson dan Teknik *Guided Imagery* Terhadap Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis: Studi Literatur
 - 4) Sumber: *Google Scholar*
- d. Artikel pendukung
 - 1) Penulis: Eska Dwi Prajayanti, Irma Mustika Sari
 - 2) Tahun: 2017
 - 3) Judul: Relaksasi *Benson* Mempengaruhi Aspek Psikologis pada Kualitas Hidup Pasien Pasca Kemoterapi *Ca Mamae*
 - 4) Sumber: *Google Scholar*

e. Artikel pendukung

- 1) Penulis: Jek Amidos Pardede, Irvandy Tarigan
- 2) Tahun: 2020
- 3) Judul: *The Anxiety Level of Mother Presectio Caesar with Benson's Relaxation Therapy*
- 4) Sumber: *Google Scholar*

f. Artikel pendukung

- 5) Penulis: Mery Adriyana
- 6) Tahun: 2021
- 7) Judul: Perbedaan Efektivitas Terapi Zikir dan Relaksasi Napas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien *Pre Sectio Caesarea*
- 8) Sumber: *Google Scholar*



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Pada karya tulis ini jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan dengan melibatkan 2 responden. Menurut Nursalam (2016) studi kasus adalah penelitian yang mencakup pengkajian bertujuan memberikan gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat maupun karakter yang ada dari suatu kasus, dengan kata lain bahwa studi kasus memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. Penelitian dalam metode studi kasus ini dilakukan secara mendalam terhadap suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh klien dengan cara sistematis.

3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini yaitu:

3.2.1 Kriteria Inklusi

- a. Responden berada ditempat pada saat penelitian
- b. Tidak mengalami gangguan pendengaran
- c. Bersedia menjadi responden
- d. Pasien kanker serviks yang berobat

3.2.2 Kriteria Eksklusi

Responden sedang menggunakan obat anti-depresan atau penenang, seperti obat diazepam atau sejenis lainnya.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan intervensi relaksasi benson.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah format asuhan keperawatan GSR (Gangguan Sistem Reproduksi), pengukuran derajat ansietas berdasarkan tanda dan gejala dalam buku SDKI, serta alat perlindungan diri berupa handscoon dan masker, alat pemeriksaan fisik berupa stetoskop, tensi meter, termometer, timbangan, *penlight*, dan arloji dengan detik.

- 3.4.1 Format pengkajian keperawatan terdiri dari: data umum pasien, masalah utama, pengkajian seksualitas, makanan dan cairan, eliminasi, aktivitas/istirahat, hygiene, sirkulasi, nyeri/ketidaknyamanan, pernapasan, interaksi sosial, integritas ego, neurosensoris, keamanan, penyuluhan dan pembelajaran, pemeriksaan diagnostik, terapi dan pengobatan. Pada pengkajian kebutuhan pasien menggunakan SDKI berdasarkan gejala yang ditemukan dari pasien.
- 3.4.2 Format analisa data terdiri dari: data, etiologi, dan masalah.
- 3.4.3 Format diagnosis keperawatan terdiri dari: diagnosa keperawatan
- 3.4.4 Format rencana asuhan keperawatan terdiri dari: diagnosis keperawatan, luaran keperawatan menggunakan SLKI, rencana intervensi menggunakan SIKI, dan rasional menggunakan dongoes dan artikel.
- 3.4.5 Format implementasi dan evaluasi keperawatan terdiri dari: hari dan tanggal, nomor diagnosis keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi.

3.5 Prosedur Pengambilan Data

- 3.5.1 Persiapan
Persiapan dengan konsultasi kasus
- 3.5.2 Pengumpulan data
Pengumpulan data dengan wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi
- 3.5.3 Penyusunan Laporan
Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah

3.6 Tempat dan waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian ini dilakukan di ruangan Pinang GSR RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 15-17 Desember 2021.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data dan penyajian data pada studi kasus disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan didalam teks dan bersifat naratif. Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi keperawatan. Data yang sudah diperoleh dari hasil pengkajian melalui proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian dimasukkan ke dalam tabel analisa data untuk merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, selanjutnya menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian intervensi relaksasi benson pada pasien, penyajian data disajikan dalam bentuk narasi yaitu menjelaskan hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

3.8 Etika Studi Kasus

Dalam proses penelitian ini menggunakan pertimbangan etik. Pertimbangan etik digunakan untuk mencegah munculnya masalah etik selama penelitian berlangsung, untuk itu peneliti berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah yang muncul. Terdapat 3 (tiga) prinsip etik umum yang diterapkan untuk mengatasi masalah etik yaitu *non maleficence* dan *beneficence, respect to person*, serta *justice* (Polit & Beck, 2012).

3.8.1 *Non Maleficence* dan *Beneficence*

a. Nilai Ilmiah

Pada penelitian ini tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek dalam penelitian ini, karena intervensi dilakukan oleh pasien secara mandiri sambil didampingi oleh peneliti.

b. Manfaat

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini akan memperoleh manfaat secara langsung yaitu akan menjadi rileks dan tenang, dan akan memperoleh manfaat jangka panjang karena telah mengetahui cara dalam mengurangi kecemasan. Selain itu dapat menjadi acuan petugas kesehatan dalam memberikan intervensi relaksasi benson terhadap ansietas pasien kanker serviks.

3.8.2 *Respect For Person*

a. *Informed Consent*/Penjelasan Sebelum Penelitian (PSP)

Responden diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan sebelum dilaksanakan penelitian. Responden memiliki hak penuh untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden. Pada *Informed Consent* dicantumkan bahwa pada data diperoleh hanya untuk mengembangkan ilmu.

b. Rahasia (*Privacy*)

Responden memiliki hak meminta bahwa data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Nama responden tidak dicantumkan pada lembar pengumpulan data, hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan responden. Hanya data tertentu saja yang dicantumkan sebagai hasil penelitian. Identitas responden pada karya tulis ilmiah ini hanya menggunakan inisial nama saja.

3.8.3 *Justice*

Dalam penelitian ini responden diperlakukan secara adil tanpa membedakan antara satu responden dengan responden lainnya.

BAB IV

LAPORAN KASUS

1.1 Asuhan Keperawatan

1.1.1 Pengkajian Keperawatan

Tabel 4.1 Pengkajian Gangguan Sistem Reproduksi (GSR)

Pengkajian	Pasien 1	Pasien 2
Data Umum	<ul style="list-style-type: none">- No. Reg : 950518- Inisial : Ny.R- Umur: 28 tahun- Alamat : Gorontalo Limboto- Tgl masuk RS : 07 desember 2021- Tgl pengkajian : 14 desember 2021- Diagnosa medis : Carcinoma Serviks	<ul style="list-style-type: none">- No. Reg : 950036- Inisial : Ny.N- Umur: 50 tahun- Alamat : Dusun Pamulukang Barat, Mamuju- Tgl masuk RS : 23 Oktober 2021- Tgl pengkajian : 13 desember 2021- Diagnosa medis : Neoplasma ovarium kistik suspek ganas + Carcinoma Serviks
Masalah Utama	<ul style="list-style-type: none">- Keluhan utama : Klien mengatakan ada rasa nyeri disertai pengeluaran darah pervaginam- Riwayat keluhan utama :- Mulai timbulnya : pada bulan Mei 2021- Sifat keluhan : hilang timbul- Lokasi keluhan : perut bagian bawah- Faktor pencetus : Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan dan saat berhubungan intim- Keluhan lain : mudah lelah- Pengaruh keluhan terhadap aktivitas/fungsi tubuh : Lemas, dan klien mengatakan aktivitas seksual berubah- Usaha klien untuk mengatasinya: Hanya bisa tidur di tempat tidur	<ul style="list-style-type: none">- Keluhan utama : Klien mengatakan ada rasa nyeri disertai pengeluaran darah pervaginam- Riwayat keluhan utama :- Mulai timbulnya : pada bulan Maret 2021- Sifat keluhan : hilang timbul- Lokasi keluhan : perut bagian bawah- Faktor pencetus : Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan- Keluhan lain : mudah lelah, dan perut semakin membesar- Pengaruh keluhan terhadap aktivitas/fungsi tubuh : Pasien mengatakan dirinya lemas dan lemah- Usaha klien untuk mengatasinya : Hanya bisa tidur di tempat tidur dan berobat ke Rumah Sakit dan sesekali berdzikir
Pengkajian Fisik		
Seksualitas	Subyektif : <ul style="list-style-type: none">- Usia menarche: 14 tahun	Subyektif : <ul style="list-style-type: none">- Usia menarche: 14 tahun

	<ul style="list-style-type: none"> - Siklus haid: 30 hari - Durasi haid: 7 hari √ Dismenorea - Metode kontrasepsi terakhir : IUD - Rabas pervagina : warna : Merah segar, Jumlah: <20 cc, Berapa lama: Tidak menentu - Status obstetri : P : 2 A : 0 - Riwayat persalinan : Term penuh : Ya Prematur : ---Multiple : --- - Riwayat persalinan terakhir: Tahun: 2017 tempat : Rumah sakit - Lama gestasi : 39 minggu lama persalinan : 1-2 jam - Jenis persalinan : Operasi Caesar - Berat badan bayi : 3.15 Kg - Komplikasi maternal/bayi : Tidak ada - Lain-lain: Pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim, pasien mengatakan aktivitas seksual berubah <p>Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAP smear terakhir (tgl dan hasil): - - Tes serologi (tgl dan hasil) : - 	<ul style="list-style-type: none"> - Siklus haid: 28 hari - Durasi haid: 5 hari √ Dismenorea - Metode kontrasepsi terakhir : Pil - Rabas pervagina : warna : Merah segar, Jumlah: <20 cc, Berapa lama: Tidak menentu - Status obstetri : P : 3 A : 0 - Riwayat persalinan : Term penuh : Ya Prematur : --- Multiple : --- - Riwayat persalinan terakhir :Tahun : 2003 tempat : Rumah sakit - Lama gestasi : 39 minggu lama persalinan : 1-2 jam - Jenis persalinan : Normal - Berat badan bayi : 3.0 Kg - Komplikasi maternal/bayi : Tidak ada <p>Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PAP smear terakhir (tgl dan hasil): - - Tes serologi (tgl dan hasil) : -
<p>Makanan & Cairan</p>	<p>Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masukan oral 4 jam terakhir : Nasi, lauk pauk, air mineral, buah - Mual/muntah: Tidak ada Nafsu makan: baik Masalah mengunyah : Tidak ada masalah - Pola makan : Teratur, Frekuensi : 3 x/hari - Konsumsi cairan : 1000 cc/hari <p>Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BB: 55 kg - TB : 148 cm - Turgor kulit : Elastis - Membran mukosa mulut : Kering - Kebutuhan cairan : 1650 cc 	<p>Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masukan oral 4 jam terakhir : Nasi, lauk pauk, air, buah - Mual/muntah: Tidak ada Nafsu makan: baik Masalah mengunyah : Tidak ada masalah - Pola makan : Teratur, Frekuensi : 3 x/hari - Konsumsi cairan : 700 cc/hari <p>Obyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BB: 45 kg - TB : 145 cm - Turgor kulit : Tidak elastis - Membran mukosa mulut : Kering - Kebutuhan cairan : 1350 cc

Eliminasi	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Defekasi : 1x dalam 4 hari - Penggunaan Laksatif :Tidak ada - Waktu Defekasi terakhir : 06.00 pagi Rabu/12/2021 - Frekuensi berkemih : Terpasang selang nefrostomi - Karakter urin : berwarna merah - Nyeri/rasa terbakar/kesulitan berkemih : Tidak ada - Riwayat penyakit ginjal : Pasien terdiagnosa CKD - Penyakit kandung kemih : Tidak ada - Penggunaan Diuretik : Tidak ada <p><u>Obyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan kateter : Nampak terpasang selang nefrostomi dengan jumlah urine \pm500/hari - Bising usus : Normal 16x/menit - Karakter urine : Berwarna merah - Konsistensi feces : Sedikit cair Warna Feces : Kuning - Haemoroid :Tidak ada - Palpasi Kandung kemih (teraba/tidak teraba) : - 	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi Defekasi : 1x dalam 5 hari - Penggunaan Laksatif :Tidak ada - Waktu Defekasi terakhir : 06.00 pagi Selasa/12/2021 - Frekuensi berkemih : Terpasang kateter urin - Karakter urin : berwarna kuning pucat - Nyeri/rasa terbakar/kesulitan berkemih : Tidak ada - Riwayat penyakit ginjal : Tidak ada - Penyakit kandung kemih : Tidak ada - Penggunaan Diuretik : Tidak ada <p><u>Obyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan kateter : Nampak terpasang kateter dengan jumlah urine \pm400/hari - Bising usus : Normal 13x/menit - Karakter urine : Berwarna kuning pucat - Konsistensi feces : Sedikit cair Warna Feces : Kuning - Haemoroid :Tidak ada - Palpasi Kandung kemih (teraba/tidak teraba) : --
Aktivitas/Istirahat	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan : Guru - Hobby : Memasak - Tidur malam (jam) : Klien mengatakan tidurnya biasa pada pukul 10 malam dan terbangun subuh. - Tidur siang (jam) : Klien mengatakan tidur siangnya tidak menentu - Lain-lain: Pasien mengeluh badannya terasa lemas, Pasien mengatakan dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh keluarga <p><u>Obyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status neurologis : Composmentis - GCS : 15 (E4M6V5) - Pengkajian Neuromuskuler : 	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga - Hobby : Memasak - Tidur malam (jam) : Klien mengatakan tidurnya biasa pada pukul 22:00 atau 23:00 dan terbangun subuh. - Tidur siang (jam) : Klien mengatakan tidur siangnya tidak menentu <p><u>Obyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status neurologis : Composmentis - GCS : 15 (E4M6V5) - Pengkajian Neuromuskuler : - Muscle Stretch refleks (Bisep/trisep/brachioradialis/patela/axilles) : Normal - Rentang pergerakan sendi (ROM) : Aktif, Pasien mengeluh badannya terasa lemas

	<ul style="list-style-type: none"> - Muscle Stretch refleks (Bisep/trisep/brachioradialis/patela/axiles) : Normal - Rentang pergerakan sendi (ROM) : aktif - Derajat kekuatan otot: $\begin{array}{r} 5 \ \ 5 \\ \hline 5 \ \ 5 \end{array}$ - Kuku (warna) :Merah muda - Tekstur:Normal - Membran Mukosa :Normal - Konjungtiva : Tidak anemis - Sklera : Putih 	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat kekuatan otot: $\begin{array}{r} 5 \ \ 5 \\ \hline 5 \ \ 5 \end{array}$ - Kuku (warna) :Merah muda - Tekstur:Normal - Membran Mukosa :Normal - Konjungtiva: Anemis - Sklera: Putih dan tidak ikterik - Lain-lain: Pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur, Terdapat asites pada perut pasien, Pasien tampak kesulitan melakukan pergerakan, Skor <i>Barthel index</i>: 9 (Ketergantungan sedang)
Hygiene	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan rambut (frekuensi) : Klien mengatakan dia keramas 1 kali selama di rumah sakit. - Kebersihan badan : Pasien mengatakan mandi 1 kali sehari dan saat tidak dapat ke toilet ia hanya membersihkan badannya dengan tissue basah. - Kebersihan gigi/mulut : Klien mengatakan menggosok gigi secara teratur tiap pagi. - Kebersihan kuku tangan dan kaki : Klien mengatakan memotong kuku jika terlihat panjang <p><u>Objektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara berpakaian : Pakaian klien tampak bersih - Kondisi kulit kepala: Bersih 	<p><u>Subyektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebersihan rambut (frekuensi) : Klien mengatakan dia keramas 1 kali selama di rumah sakit. - Kebersihan badan : Pasien mengatakan badannya dibersihkan oleh anaknya dengan tissue basah setiap hari - Kebersihan gigi/mulut : Klien mengatakan menggosok gigi 2 kali selama di rumah sakit - Kebersihan kuku tangan dan kaki: Klien mengatakan memotong kuku jika terlihat panjang. <p><u>Objektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cara berpakaian : Pakaian klien tampak bersih - Kondisi kulit kepala: Bersih
Sirkulasi	<p><u>Subyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat penyakit jantung : Tidak ada - Riwayat demam reumatik : Tidak ada <p><u>Objektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekanan darah : 115/65 - Nadi : 89x/menit - Distensi vena jugularis (ada/tidak ada) : Tidak ada - Bunyi jantung : Terdengar S1 dan S2 dengan kesan normal - Frekuensi : 89x/menit - Irama (teratur/tidak teratur) : Teratur 	<p><u>Subyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat penyakit jantung : Tidak ada - Riwayat demam reumatik : Tidak ada <p><u>Objektif :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tekanan darah : 121/83 - Nadi : 93 x/i - Distensi vena jugularis (ada/tidak ada): Tidak ada - Bunyi jantung : Terdengar S1 dan S2 dengan kesan normal - Frekuensi : 93x/menit - Irama (teratur/tidak teratur) : Teratur - Kualitas (kuat/lemah/Rub/Murmur) :

	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas (kuat/lemah/Rub/Murmur): Kuat 	Kuat
Ekstermitas	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu (hangat/akral dingin) : Teraba hangat - Suhu: 36,9°C - CRT : <2 detik - Varises (ada/tidak ada) : Tidak ada - Tampak balutan untuk persiapan cimino 	<ul style="list-style-type: none"> - Suhu (hangat/akral dingin) : Teraba dingin, kulit pucat - Suhu: 37°C - CRT : 2 detik - Varises (ada/tidak ada): Tidak ada
Nyeri/ Ketidaknyamanan	<p>Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi : Klien mengatakan lokasi nyeri perut bagian bawah - Intensitas (skala 0-10): 4 NRS - Frekuensi : Hilang timbul - Durasi : Klien mengatakan 1 menit - Faktor pencetus : Klien mengatakan saat melakukan pergerakan dan saat berhubungan intim - Cara mengatasi : Klien mengatakan hanya tidur ditempat tidur. - Faktor yang berhubungan: Terdapat kanker serviks - Lain-lain: Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu <p>Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajah meringis - Melindungi area yang sakit 	<p>Subyektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klien mengatakan ada rasa nyeri - Lokasi : Klien mengatakan lokasi nyeri perut bagian bawah - Intensitas (skala 0-10): 5 NRS - Frekuensi : Hilang timbul - Durasi : Klien mengatakan 1 menit - Faktor pencetus: Klien mengatakan saat melakukan pergerakan - Cara mengatasi : Klien mengatakan hanya tidur ditempat tidur dan beribad ke RS dan sesekali berdzikir - Faktor yang berhubungan: Terdapat kanker serviks - Lain-lain: Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu <p>Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wajah meringis - Melindungi area yang sakit
Pernapasan	<p>Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi : 18x / menit - Irama napas: Vesikuler - Karakteristik sputum : Terdapat sputum kental 	<p>Objektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi : 22x / menit - Irama napas: Vesikuler - Karakteristik sputum : Tidak terdapat sputum
Interaksi sosial	<p>Subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satus pernikahan : Menikah - Lama pernikahan : 9 tahun - Tinggal serumah dengan : Suami dan anak <p>Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi verbal/nonverbal dengan orang terdekat : Pasien tampak kooperatif saat berkomunikasi, komunikasi dengan ayah dan suaminya terjalin baik. 	<p>Subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satus pernikahan : Menikah - Lama pernikahan : 19 tahun - Tinggal serumah dengan : Suami, dan kedua anaknya <p>Objektif</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi verbal/nonverbal dengan orang terdekat : Pasien tampak kooperatif saat berkomunikasi, komunikasi dengan anak-anaknya terjalin baik.

<p>Integritas Ego</p>	<p><u>Subyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kehamilan : Tidak ada - Perasaan klien/keluarga tentang penyakit : Klien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala. Pasien mengatakan sesekali merasa pusing - Status hubungan : Klien mengatakan suami dan ayahnya serta anaknya menjadi orang terdekatnya. - Masalah keuangan : -- - Cara mengatasi stres : Sesekali membuka Handphone <p><u>Obyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status emosional (cemas,apatis, dll) : Cemas - Respon fisiologis yang teramati: Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya, Pasien tampak cemas dan merasa sedih - Agama : Islam - Muncul perasaan (tidak berdaya, putus asa, tidak mampu) : Pasien selalu semangat untuk sembuh dari penyakitnya. 	<p><u>Subyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan kehamilan : Tidak ada - Perasaan klien/keluarga tentang penyakit : Pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang, ia berharap bisa cepat sembuh, Pasien juga sesekali mengatakan apakah dia bisa sembuh. Pasien mengatakan sesekali merasa pusing - Status hubungan : Baik - Masalah keuangan : Tidak ada - Cara mengatasi stres : Berdzikir <p><u>Obyektif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Status emosional (cemas,apatis, dll) : cemas - Respon fisiologis yang teramati: Pasien tampak bingung, Pasien tampak gelisah, Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya, Pasien tampak tegang, Pasien tampak cemas dan merasa sedih, Pasien sesekali berteriak secara tiba-tiba di ruangnya - Agama : Islam - Muncul perasaan (tidak berdaya, putus asa, tidak mampu) : -
<p>Neurosensori</p>	<p><u>Subyektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusing (ada/tidak ada): Klien mengatakan terkadang merasa pusing - Kesemutan/kebas/kelembaban (lokasi) : Tidak ada 	<p><u>Subyektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pusing (ada/tidak ada): Klien mengatakan terkadang merasa pusing - Kesemutan/kebas/kelembaban (lokasi) : Tidak ada
<p>Keamanan</p>	<p><u>Subyektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergi/sensitivitas : Ikan kering - Penyakit masa kanak-kanak : tidak ada - Riwayat imunisasi : tidak ada - Infeksi virus terakhir : tidak ada - Binatang peliharaan dirumah : Kucing - Masalah obstetrik sebelumnya : Tidak ada - Jarak waktu kehamilan terakhir : 4 tahun 	<p><u>Subyektif:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Alergi/sensitivitas : Tidak ada - Penyakit masa kanak-kanak : tidak ada - Riwayat imunisasi : tidak ada - Infeksi virus terakhir : tidak ada - Binatang peliharaan dirumah : Tidak ada - Masalah obstetrik sebelumnya : Tidak ada - Jarak waktu kehamilan terakhir : 3 tahun - Riwayat kecelakaan : Tidak ada

	<ul style="list-style-type: none"> - Riwayat kecelakaan : Tidak ada - Fraktur dislokasi : Tidak ada - Pembesaran kelenjar : Tidak ada <p>Obyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integritas kulit : Nampak bercak-bercak hitam dipermukaan kulit terutama di bagian perut, tangan, dada pasien. - Cara berjalan : Berjalan normal - Lain-lain: Tampak terpasang selang nefrostomi, Tampak Terpasang selang nefrostomi, Tampak terpasang infus, Tampak balutan untuk persiapan cimino 	<ul style="list-style-type: none"> - Fraktur dislokasi : Tidak ada - Pembesaran kelenjar : Tidak ada <p>Obyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integritas kulit : menurun - Cara berjalan : tidak stabil karena perut pasien yang membesar - Lain-lain: Tampak terpasang infuse, tampak terpasang kateter urine 																																						
Penyuluhan & Pembelajaran	<p>Subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahasa dominan: Bahasa Indonesia - Pendidikan terakhir : Diploma - Pekerjaan suami : Brimob - Faktor penyakit dari keluarga : Tidak ada - Sumber pendidikan tentang penyakit : Dokter, perawat, bidan - Pertimbangan rencana pulang: -- - Tanggal informasi diambil : 15 Desember 2021 - Pertimbangan rencana pulang : Tanggal perkiraan pulang : Belum ada - Ketersediaan sumber kesehatan terdekat : Rumah sakit 	<p>Subyektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahasa dominan : Bahasa daerah - Pendidikan terakhir : SMP - Pekerjaan suami : Petani - Faktor penyakit dari keluarga : Tidak ada - Sumber pendidikan tentang penyakit : Dokter, perawat, bidan - Pertimbangan rencana pulang: -- - Tanggal informasi diambil : 15 Desember 2021 - Pertimbangan rencana pulang : Tanggal perkiraan pulang : Belum ada - Ketersediaan sumber kesehatan terdekat : Rumah sakit 																																						
Pemeriksaan Diagnostik																																								
<p>Pasien 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - USG: Kesan: Massa pada segmen bawah rahim - Pemeriksaan Lab <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tanggal dan Pemeriksaan</th> <th>Test</th> <th>Hasil</th> <th>Hasil Normal</th> <th>Alasan untuk nilai abnormal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8" style="text-align: center; vertical-align: middle;">11/12/2021 Hematologi</td> <td style="text-align: center;">RBC</td> <td style="text-align: center;">2.82</td> <td style="text-align: center;">3.80-5.80</td> <td style="text-align: center;">Anemia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HGB</td> <td style="text-align: center;">8.3</td> <td style="text-align: center;">11.5-16.0 gr/dL</td> <td style="text-align: center;">Anemia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HCT</td> <td style="text-align: center;">26,2</td> <td style="text-align: center;">80-100 %</td> <td style="text-align: center;">Anemia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PLT</td> <td style="text-align: center;">299</td> <td style="text-align: center;">150-500 10³/uL</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PCT</td> <td style="text-align: center;">0.223</td> <td style="text-align: center;">0.150-0.500</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PDW</td> <td style="text-align: center;">10.3</td> <td style="text-align: center;">11.0-18.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">WBC</td> <td style="text-align: center;">11.7</td> <td style="text-align: center;">4.0- 10.0 10³/uL</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NEU</td> <td style="text-align: center;">84.8</td> <td style="text-align: center;">52.0-75.0</td> <td style="text-align: center;">Neutrofilia</td> </tr> </tbody> </table>			Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal	11/12/2021 Hematologi	RBC	2.82	3.80-5.80	Anemia	HGB	8.3	11.5-16.0 gr/dL	Anemia	HCT	26,2	80-100 %	Anemia	PLT	299	150-500 10 ³ /uL		PCT	0.223	0.150-0.500		PDW	10.3	11.0-18.0		WBC	11.7	4.0- 10.0 10 ³ /uL		NEU	84.8	52.0-75.0	Neutrofilia
Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal																																				
11/12/2021 Hematologi	RBC	2.82	3.80-5.80	Anemia																																				
	HGB	8.3	11.5-16.0 gr/dL	Anemia																																				
	HCT	26,2	80-100 %	Anemia																																				
	PLT	299	150-500 10 ³ /uL																																					
	PCT	0.223	0.150-0.500																																					
	PDW	10.3	11.0-18.0																																					
	WBC	11.7	4.0- 10.0 10 ³ /uL																																					
	NEU	84.8	52.0-75.0	Neutrofilia																																				

	LYM	7.0	20.0-40.0	Limfositopenia
	LIC	2.8	0.0-3.0	
09/12/2021 Urine	Ureum	293	10-50 mg/dl	
	Kreatinin	4,7	L(<1,3),P(<1,1) Mg/dl	
	Natrium	129	126-145 Mmol/l	
	Kalium	4,0	3,5- 5,1 mmol/l	

Pasien 2

- MSCT scan abdomen:

Kesan:

Massa complex ovarium bilateral

Hydronephrosis bilateral grade III (SFU system)

Hematometra

Asites

Gambaran tumor metastasis ke paru

- Pemeriksaan Lab

Tanggal dan Pemeriksaan	Test	Hasil	Hasil Normal	Alasan untuk nilai abnormal
12/12/2021 Hematologi	RBC	4.00	3.80-5.80	
	HGB	11.3	11.5-16.0 gr/dL	Anemia
	HCT	36	80-100 %	Anemia
	WBC	19.7	4.0- 10.0 10 ³ /uL	
09/12/2021 Urinalisa	Warna	Kuning	Kuning muda	
	pH	6.0	4.5-6.0	
	Bj	1.012	1.005-1.036	

Terapi & Pengobatan

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Radioterapi - Hemodialisis 3 kali seminggu - Ceftriaxone 1 gr/12 jam/IV - Asam tranesamat I ampul/8 jam/IV - Ketorolac 30 mg/IV jika perlu - Nephrosteril IV/250 cc | <ul style="list-style-type: none"> - Fentanyl 20 mg/IV - Paracetamol 500 mg/Oral - Amlodipin 12,5 mg/Oral - Neurobion 1 ampul/IV - Ceftriaxone 1 g/IV - Metamizole 10 mg/IV |
|--|---|

Tabel 4.2 Analisa Data

No.	Data	Etiologi	Masalah Keperawatan
1.	<p>Pasien 1 DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan ada rasa nyeri disertai pengeluaran darah pervaginam - Pasien mengatakan lokasi nyeri peut bagian bawah. - Skala Nyeri : 4 NRS - Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit - Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu - Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan dan berhubungan intim - Cara mengatasi: Pasien mengatakan hanya Tidur ditempat tidur <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak wajah meringis - Tampak melindungi area yang sakit - Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C 	<p>Lesi pada serviks ↓ Terjadi proses metaplastik ↓ Penyebaran tumor ↓ Pelvis ↓ Penekanan saraf lumbosakrali ↓ Stimulus ↓ Ditangkap reseptor nyeri ↓ Nyeri Kronis</p>	Nyeri Kronis
2.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim - Pasien mengatakan aktivitas seksual berubah <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - USG: Massa pada segmen bawah rahim 	<p>Lesi pada serviks ↓ Tumor ↓ Eksolitik ↓ Kea rah lumen vagina ↓ Massa proliferasi ↓ Nefrosis jaringan ↓ Keputihan, bau busuk ↓ Pola seksual berubah ↓ Disfungsi seksual</p>	Disfungsi Seksual
3.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala 	<p>Kurang informasi ↓ Kurang pengetahuan ↓ Ansietas</p>	Ansietas

	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya - Pasien tampak cemas dan merasa sedih - Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C 		
4.	<p>Faktor Risiko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak Terpasang selang nefrostomi - Tampak terpasang infus - Tampak balutan untuk persiapan cimino - Urine warna merah - RBC: 2.82 - HGB : 8.3 gr/dL - HCT: 26.2 % - LYM: 7.0 - Ureum 293 mg/dl - Creatinin 4,7 mg/dl 	<p>Efek prosedur invasive</p> <p>↓</p> <p>Proteksi kurang</p> <p>↓</p> <p>Invasi bakteri</p> <p>↓</p> <p>Risiko Infeksi</p>	Risiko Infeksi
1.	<p>Pasien 2</p> <p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan ada rasa nyeri - Pasien mengatakan lokasi nyeri perut bagian bawah. - Skala Nyeri : 5 NRS - Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit - Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu - Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan - Cara mengatasi: Hanya bisa tidur di tempat tidur dan berobat ke Rumah Sakit dan sesekali berdzikir <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampak wajah meringis - Tampak melindungi area yang sakit - Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C 	<p>Lesi pada serviks</p> <p>↓</p> <p>Terjadi proses metaplastik</p> <p>↓</p> <p>Penyebaran tumor</p> <p>↓</p> <p>Pelvis</p> <p>↓</p> <p>Peenekanan saraf lumbosakrali</p> <p>↓</p> <p>Stimulus</p> <p>↓</p> <p>Ditangkap reseptor nyeri</p> <p>↓</p> <p>Nyeri Kronis</p>	Nyeri Kronis

2.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengeluh badannya terasa lemas - Pasien mengatakan dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh keluarga <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna kulit pucat - Pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur - Terdapat asites pada perut pasien - Pasien tampak kesulitan melakukan pergerakan - Skor <i>Barthel index</i>: 9 (Ketergantungan sedang) - Akral teraba dingin - CRT: 2 detik - RBC: 2.82 - HGB : 8.3 gr/dL - HCT: 26.2 % - Turgor kulit menurun dan tidak elastis - Derajat kekuatan otot: $\begin{array}{r} 5 \quad \quad 5 \\ \hline 5 \quad \quad 5 \end{array}$ 	<p>Penurunan konsentrasi hemoglobin ↓ Perdarahan ↓ Anemia ↓ Curah jantung menurun ↓ Sirkulasi ke jaringan menurun ↓ Perfusi perifer tidak efektif</p>	Perfusi perifer tidak efektif
3.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala - Pasien sesekali mengatakan apakah dia bisa sembuh - Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien tampak bingung - Pasien tampak gelisah - Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya - Pasien tampak tegang - Pasien tampak cemas dan merasa sedih - Pasien sesekali berteriak secara tiba-tiba di ruangnya - Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C 	<p>Kurang informasi & Ancaman terhadap kematian ↓ Kurang pengetahuan ↓ Ansietas</p>	Ansietas

4.	Faktor Risiko: - Tampak terpasang infus - Tampak terpasang kateter urine - WBC 19.7 10 ³ /uL - HGB 11.3 gr/dL - HCT 36 %	Efek prosedur invasive ↓ Proteksi kurang ↓ Invasi bakteri ↓ Risiko Infeksi	Risiko Infeksi
----	---	--	----------------

1.1.2 Diagnosis Keperawatan

Tabel 4.3 Diagnosis Keperawatan

Pasien 1	Pasien 2
<p>1. Nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf dibuktikan dengan: DS: a. Pasien mengatakan ada rasa nyeri disertai pengeluaran darah pervaginam b. Pasien menngatakan lokasi nyeri peut bagian bawah. c. Skala Nyeri : 4 NRS d. Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit e. Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu f. Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan dan berhubungan intim g. Cara mengatasi: Pasien mengatakan hanya Tidur ditempat tidur DO: a. Tampak wajah meringis b. Tampak melindungi area yang sakit c. Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C</p> <p>2. Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit) dibuktikan dengan: DS: a. Pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim b. Pasien mengatakan aktivitas seksual berubah DO: a. USG: Massa pada segmen bawah rahim</p> <p>3. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan:</p>	<p>1. Nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf dibuktikan dengan: DS: a. Pasien mengatakan ada rasa nyeri b. Pasien menngatakan lokasi nyeri peut bagian bawah. c. Skala Nyeri : 5 NRS d. Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit e. Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu f. Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan g. Cara mengatasi: Hanya bisa tidur di tempat tidur dan berobat ke Rumah Sakit dan sesekali berdzikir DO: a. Tampak wajah meringis b. Tampak melindungi area yang sakit c. Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C</p> <p>2. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan Penurunan konsentrasi hemoglobin dibuktikan dengan: DS: a. Pasien mengeluh badannya terasa lemas b. Pasien mengatakan dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh keluarga DO: a. Warna kulit pucat b. Pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur c. Terdapat asites pada perut pasien d. Pasien tampak kesulitan melakukan pergerakan e. Skor <i>Barthel index</i>: 9 (Ketergantungan</p>

<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya Pasien tampak cemas dan merasa sedih Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C <p>4. Risiko Infeksi dibuktikan dengan faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak Terpasang selang nefrostomi Tampak terpasang infus Tampak balutan untuk persiapan cimino Urine warna merah RBC: 2.82 HGB : 8.3 gr/dL HCT: 26.2 % LYM: 7.0 Ureum 293 mg/dl Creatinin 4,7 mg/dl 	<p>sedang)</p> <ol style="list-style-type: none"> Akral teraba dingin CRT 2 detik RBC: 2.82 HGB : 8.3 gr/dL HCT: 26.2 % Turgor kulit menurun dan tidak elastis Derajat kekuatan otot: $\begin{array}{r} 5 \overline{) 5} \\ 5 \overline{) 5} \end{array}$ <p>3. Ansietas berhubungan dengan Ancaman terhadap kematian dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala Pasien sesekali mengatakan apakah dia bisa sembuh Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak bingung Pasien tampak gelisah Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya Pasien tampak tegang Pasien tampak cemas dan merasa sedih Pasien sesekali berteriak secara tiba-tiba di ruangnya Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C <p>4. Risiko Infeksi dibuktikan dengan faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak terpasang infus Tampak terpasang kateter urine WBC 19.7 10³/uL HGB 11.3 gr/dL HCT 36 %
---	---

1.1.3 Intervensi Keperawatan

Tabel 4.4 Intervensi Keperawatan

No.	Diagnosis Keperawatan	Luaran	Rencana Intervensi	Rasional
Pasien 1				
1.	<p>Nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan ada rasa nyeri disertai pengeluaran darah pervaginam Pasien menngatakan lokasi nyeri peut bagian bawah. Skala Nyeri : 4 NRS Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan dan berhubungan intim Cara mengatasi: Pasien mengatakan hanya Tidur ditempat tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak wajah meringis Tampak melindungi area yang sakit 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keluhan nyeri menurun Meringis menurun Sikap protektif menurun 	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Identifikasi skala nyeri Identifikasi respon nyeri non verbal Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan Monitor efek samping analgetik <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis.TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Fasilitasi istirahat dan tidur Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui keadaan umum klien Untuk memudahkan tindakan selanjutnya Untuk memudahkan dalam pemberian intervensi Untuk memudahkan dilakukan intervensi Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk membantu menurunkan nyeri Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri Mengoptimalkan pasien untuk istirahat Untuk menentukan strategi meredakan nyeri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan kesehatan dapat

	<p>c. Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C</p>		<p>meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <p>m. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p> <p>n. Jelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>o. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p> <p>Kolaborasi</p> <p>q. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu</p>	<p>meningkatkan pemahaman klien</p> <p>n. Meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>o. Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>Kolaborasi</p> <p>q. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri</p>
2.	<p>Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit) dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <p>a. Pasien mengatakan nyeri saat berhubungan intim</p> <p>b. Pasien mengatakan aktivitas seksual berubah</p> <p>DO:</p> <p>a. USG: Massa pada segmen bawah rahim</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan fungsi seksual membaik dengan Kriteria hasil:</p> <p>a. Keluhan nyeri saat berhubungan seksual menurun</p> <p>b. Keluhan aktivitas seksual berubah menurun</p>	<p>Konseling seksualitas</p> <p>Observasi</p> <p>a. Identifikasi tingkat pengetahuan, masalah system reproduksi, masalah seksualitas dan penyakit menular seksual</p> <p>b. Identifikasi disfungsi seksual dan kemungkinan penyebab</p> <p>c. Monitor stress, depresi, dan penyebab disfungsi seksual</p> <p>Terapeutik</p> <p>d. Berikan pujian terhadap perilaku yang benar</p> <p>e. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual</p> <p>Edukasi</p> <p>f. Jelaskan efek penyakit dan pengobatan terhadap disfungsi seksual</p> <p>Kolaborasi</p> <p>g. Kolaborasi dengan spesialis seksologi, jika perlu</p>	<p>Observasi</p> <p>a. Mengetahui tingkat pengetahuan, masalah system reproduksi, seksualitas dan penyakit menular klien</p> <p>b. Mengetahui disfungsi seksual klien</p> <p>c. Mengetahui apabila pasien mengalami stress, depresi, dan penyebab disfungsi seksual pada pasien</p> <p>Terapeutik</p> <p>d. Memberikan pujian dapat membuat hati pasien menjadi senang</p> <p>e. Agar pasangan pasien dapat mencurahkan isi hatinya</p> <p>Edukasi</p> <p>f. Agar keluarga dan pasien dapat mengetahui efek dari pengobatan yang diberikan</p> <p>Kolaborasi</p> <p>g. Kolaborasi lebih lanjut untuk menentikan Tindakan lanjut</p>

3.	<p>Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya Pasien tampak cemas dan merasa sedih Tanda-tanda vital: Tekanan darah 115/65, Nadi 89, Pernapasan 18, Suhu 36,9°C 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun Perilaku gelisah menurun Keluhan pusing menurun 	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Periksa tekanan darah, frekuensi nadi, suhu dan ketegangan otot sebelum dan sesudah latihan Monitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan suhu ruang dan pencahayaan yang nyaman Gunakan pakaian longgar Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (Relaksasi Benson) Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Anjurkan mengambil posisi nyaman Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi Agar klien lebih mudah bergerak Untuk memberikan perasaan tenang pada klien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan Untuk memudahkan klien melakukan intervensi
----	---	---	---	---

4.	<p>Risiko Infeksi dibuktikan dengan faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak Terpasang selang nefrostomi Tampak terpasang infus Tampak balutan untuk persiapan cimino Urine warna merah RBC: 2.82 HGB : 8.3 gr/dL HCT: 26.2 % LYM: 7.0 Ureum 293 mg/dl Creatinin 4,7 mg/dl 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kadar sel darah putih membaik Kultur urine membaik 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Batasi jumlah pengunjung Berikan perawatan kulit pada edema Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tanda dan gejala infeksi Anjurkan cara mencuci tangan dengan benar Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi Anjurkan meningkatkan status nutrisi Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengurangi kontaminasi bakteri Meringankan gejala edema Untuk mengurangi kontaminasi silang Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar pasien dan keluarga pasien dapat memahami tanda dan gejala infeksi Untuk menumbuhkan perilaku cuci tangan yang baik dan benar Memeriksa tepi luka terhadap ada tidaknya epitelisasi dan/atau kontraksi Untuk membantu mempercepat epitalisasi Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk merangsang kekebalan tubuh
Pasien 2				
1.	<p>Nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan ada 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui keadaan umum klien Untuk memudahkan tindakan

	<p>rasa nyeri</p> <p>b. Pasien menngatakan lokasi nyeri peut bagian bawah.</p> <p>c. Skala Nyeri : 5 NRS</p> <p>d. Durasi nyeri: Pasien mengatakan 1 menit</p> <p>e. Nyeri sudah dirasakan kurang lebih sejak 9 bulan yang lalu</p> <p>f. Faktor pencetus: Pasien mengatakan saat melakukan pergerakan</p> <p>g. Cara mengatasi: Hanya bisa tidur di tempat tidur dan berobat ke Rumah Sakit dan sesekali berdzikir</p> <p>DO:</p> <p>a. Tampak wajah meringis</p> <p>b. Tampak melindungi area yang sakit</p> <p>c. Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C</p>	<p>dengan Kriteria hasil:</p> <p>a. Keluhan nyeri menurun</p> <p>b. Meringis menurun</p> <p>c. Sikap protektif menurun</p>	<p>b. Identifikasi skala nyeri</p> <p>c. Identifikasi respon nyeri non verbal</p> <p>d. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri</p> <p>e. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</p> <p>f. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</p> <p>g. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p> <p>h. Monitor efek samping analgetik</p> <p>Teraupetik</p> <p>i. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis.TENS, hypnosis, akupresur, terapi music, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin</p> <p>j. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</p> <p>k. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>l. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <p>m. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</p> <p>n. Jelaskan strategi meredakan nyeri</p> <p>o. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri</p>	<p>selanjutnya</p> <p>c. Untuk memudahkan dalam pemberian intervensi</p> <p>d. Untuk memudahkan dilakukan intervensi</p> <p>e. Mengetahui persepsi klien mengenai nyeri</p> <p>f. Mengetahui sejauh mana nyeri mempengaruhi kualitas hidup klien khususnya aktivitas sehari-hari</p> <p>g. Memantau sejauh mana keberhasilan terapi yang diberikan</p> <p>h. Untuk mengetahui efek samping pemberian analgetik</p> <p>Teraupetik</p> <p>i. Untuk membantu menurunkan nyeri</p> <p>j. Untuk menghindari terjadinya memperberat nyeri</p> <p>k. Mengoptimalkan pasien untuk istirahat</p> <p>l. Untuk menentukan strategi meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <p>m. Pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman klien</p> <p>n. Meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>o. Klien paham cara memonitor nyeri secara mandiri</p> <p>p. Membantu klien mengurangi nyeri dan meningkatkan pengetahuan klien</p> <p>Kolaborasi</p> <p>q. Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri</p>
--	--	--	--	--

			Kolaborasi q. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	
2.	Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dibuktikan dengan: DS: a. Pasien mengeluh badannya terasa lemas b. Pasien mengatakan dalam melakukan aktivitasnya dibantu oleh keluarga DO: a. Pasien hanya dapat berbaring di tempat tidur b. Terdapat asites pada perut pasien c. Pasien tampak kesulitan melakukan pergerakan d. Skor <i>Barthel index</i> : 9 (Ketergantungan sedang) e. Akral teraba dingin f. RBC: 2.82 g. HGB : 8.3 gr/dL h. HCT: 26.2 % i. CRT: 2 detik j. Turgor kulit menurun dan tidak elastis k. Warna kulit pucat	Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan perfusi perifer meningkat dengan Kriteria hasil: a. Warna kulit pucat menurun b. Akral membaik c. Turgor kulit membaik	Perawatan Sirkulasi Observasi a. Periksa sirkulasi perifer (mis, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu) b. Identifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis, diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) c. Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas Terapeutik d. Lakukan hidrasi Edukasi e. Anjurkan Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat f. Ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi g. Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. sakit yang tidak hilang saat istirahat)	Observasi a. Untuk mengetahui perubahan perfusi jaringan perifer klien b. Untuk mengetahui penyebab gangguan sirkulasi pada klien c. Perubahan perfusi jaringan perifer dimulai dari ekstermitas Terapeutik d. Hidrasi atau pemenuhan kebutuhan cairan tubuh dapat membantu metabolisme tubuh Edukasi e. Mencegah komplikasi dekubitus f. Untuk memperbaiki sirkulasi g. Sirkulasi perifer dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit sehingga harus segera dilaporkan

	<p>1. Derajat kekuatan otot:</p> $\begin{array}{r l} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$			
3.	<p>Ansietas berhubungan dengan Ancaman terhadap kematian dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala Pasien sesekali mengatakan apakah dia bisa sembuh Pasien mengatakan terkadang merasa pusing <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak bingung Pasien tampak gelisah Pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya Pasien tampak tegang Pasien tampak cemas dan merasa sedih Pasien sesekali berteriak secara tiba-tiba di ruangnya Tanda-tanda vital: Tekanan darah 121/83, Nadi 93, Pernapasan 22, Suhu 37°C 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat ansietas menurun dengan Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun Perilaku gelisah menurun Perilaku tegang menurun Keluhan pusing menurun 	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Monitor respon terhadap terapi relaksasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Gunakan pakaian longgar Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi (Relaksasi Benson) Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Anjurkan mengambil posisi nyaman Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik yang dipilih Demonstrasikan dan latih tehnik 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika klien mengalami penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu, maka klien akan sulit melakukan teknik relaksasi tersebut Untuk mengetahui apakah ada perubahan yang baik pada otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Untuk membandingkan perasaan sebelum dan setelah terapi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk memberikan perasaan yang tenang dan nyaman pada saat klien sedang latihan terapi relaksasi Agar klien lebih mudah bergerak Untuk memberikan perasaan tenang pada klien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk memberikan informasi terkait tindakan jenis relaksasi Agar klien memahami terkait intervensi yang akan dilakukan Untuk memberikan rasa nyaman pada saat diberikan intervensi Sebagai penunjang agar bisa merasakan ketenangan Untuk membuat pasien mudah mengingat dan menerapkan intervensi yang diberikan

			relaksasi	1. Untuk memudahkan klien melakukan intervensi
4.	<p>Risiko Infeksi dibuktikan dengan faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tampak terpasang infus Tampak terpasang kateter urine WBC $19.7 \times 10^3/uL$ HGB 11.3 gr/dL HCT 36 % 	<p>Setelah dilakukan intervensi selama 3x24 jam, diharapkan tingkat infeksi menurun dengan Kriteria Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kadar sel darah putih membaik Kultur urine membaik 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Batasi jumlah pengunjung Berikan perawatan kulit pada edema Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan tanda dan gejala infeksi Anjurkan cara mencuci tangan dengan benar Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi Anjurkan meningkatkan status nutrisi Anjurkan meningkatkan asupan cairan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Kolaborasi pemberian imunisasi, jika perlu 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengetahui tanda dan gejala terjadinya infeksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengurangi kontaminasi bakteri Meringankan gejala edema Untuk mengurangi kontaminasi silang Mengurangi risiko infeksi pasca-prosedur dan untuk meminimalkan paparan dari penyedia layanan kesehatan untuk mikroorganisme yang berpotensi menular <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar pasien dan keluarga pasien dapat memahami tanda dan gejala infeksi Untuk menumbuhkan perilaku cuci tangan yang baik dan benar Memeriksa tepi luka terhadap ada tidaknya epitelisasi dan/atau kontraksi Untuk membantu mempercepat epitalisasi Menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk merangsang kekebalan tubuh

1.1.4 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Tabel 4.5 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Pasien 1

HARI/TANGGAL/ JAM	NO.DIAGNOSIS	IMPLEMENTASI	EVALUASI
Kamis, 17 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi skala nyeri dengan menanyakan apakah pasien dalam skala nyeri ringan, sedang, atau berat Hasil: Skala nyeri 4 NRS Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak meringis dan melindungi area yang sakit Menanyakan kepada pasien tentang apa yang memperberat dan memperingan nyeri pasien Hasil: Pasien mengatakan nyerinya bertambah ketika bergerak dan berkurang ketika tidur <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengontrol suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil: Pasien tampak nyaman dan tenang Membantu pasien istirahat dan tidur Hasil: Pasien tampak nyaman <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajarkan teknik distraksi dan relaksasi napas dalam Hasil: pasien tampak rileks setelah diberikan teknik distraksi dan relaksasi napas dalam <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian injeksi Ketorolac I ampul/IV jam 07.00 Hasil: Setelah 1 jam pemberian Ketorolac I ampul/IV nyeri pasien berkurang 	<p>S: Pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah berkurang</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skala nyeri 3 NRS Pasien tampak gelisah TTV : TD : I20/70 N : 80 kali/menit R : 20 kali/menit S : 36,7c <p>A: Masalah Nyeri kronis belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi skala nyeri Identifikasi respon nyeri non verbal Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Fasilitasi istirahat dan tidur Kolaborasi pemberian analgetik

	2 (Disfungsi Seksual)	<p>Konseling Seksual</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi tingkat pengetahuan, masalah system reproduksi, masalah seksualitas dan penyakit menular seksual Hasil: Pasien mengatakan karena penyakitnya dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual Memonitor stress, depresi, dan penyebab disfungsi seksual Hasil: Pasien mengatakan nyeri saat melakukan hubungan seksual, sehingga pasien dan pasangan sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual sejak beberapa minggu terakhir <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kesempatan klien untuk mengungkapkan masalah disfungsi seksualnya Hasil: Pasien tampak sedih namun pasien mengatakan lega menceritakan masalahnya <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberi edukasi tentang efek pengobatan dan penyakit terhadap disfungsi seksual Hasil: Pasien tampak paham dengan penjelasan perawat 	<p>S : Klien mengatakan semenjak dia sakit kanker dia sudah melakukan hubungan intim</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> TTV : TD : 120/70 N : 80 kali/menit R : 20 kali/menit S : 36,7c <p>A : Disfungsi seksual belum teratasi</p> <p>P : Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor stress , depresi, dan penyebab disfungsi seksual Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual Jelaskan efek penyakit dan pengobatan terhadap disfungsi seksual
	3 (Ansietas)	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 	<p>S: Pasien mengatakan khawatir akan penyakitnya yang tak kunjung sembuh</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak gelisah Pasien tampak sesekali menghembuskan napas panjang <p>A: Masalah Ansietas belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain

		<p>Hasil: Pasien tampak nyaman dan rileks</p> <p>Edukasi</p> <p>3. Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi Hasil: Pasien dan keluarga paham tentang tujuan dan manfaat diberikannya Relaksasi Benson</p> <p>4. Menjelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Hasil: Pasien setuju dengan intervensi Benson yang dipilih</p> <p>5. Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil: pasien tampak nyaman dengan posisi setengah duduk</p> <p>6. Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi Hasil: Perawat memperagakan teknik relaksasi benson</p> <p>7. Membimbing melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien Hasil: Pasien melakukan relaksasi benson sesuai yang didemonstrasikan</p>	<p>yang mengganggu kemampuan kognitif</p> <p>2. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan</p> <p>3. Monitor respon terhadap terapi relaksasi</p> <p>4. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman</p> <p>5. Gunakan pakaian longgar</p> <p>6. Anjurkan mengambil posisi nyaman</p> <p>7. Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik relaksasi benson yang diberikan</p>
	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: Tidak ada tanda dan gejala infeksi lokal, S: 36,9°C</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganismenya</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan cara mencuci tangan dengan benar</p>	<p>S : Klien mengatakan kencing masih berwarna merah</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Masih terpasang selang nefrotomi Urine tampak berwarna merah S: 36,9°C <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Batasi jumlah pengunjung Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Anjurkan meningkatkan

		<p>Hasil: penyebaran bakteri atau mikroorganisme tidak terjadi</p> <p>5. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 07:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>asupan cairan</p> <p>5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line</p>
Jumat, 18 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi skala nyeri dengan menanyakan apakah pasien dalam skala nyeri ringan, sedang, atau berat Hasil: Skala nyeri 3 NRS</p> <p>2. Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak gelisah</p> <p>Teraupetik</p> <p>3. Mengontrol suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil: Pasien tampak nyaman dan tenang</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Mendampingi pasien dalam mengulang kembali teknik distraksi dan relaksasi napas dalam</p> <p>5. Hasil: pasien tampak rileks setelah melakukan teknik distraksi dan relaksasi napas dalam</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Pemberian injeksi Ketorolac I ampul/IV jam 19:00 Hasil: Setelah 1 jam pemberian Ketorolac I ampul/IV nyeri pasien berkurang</p>	<p>S: Pasien mengeluh nyeri</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skala nyeri 3 NRS Pasien tampak gelisah N: 90 x/i <p>A: Masalah Nyeri kronis belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi skala nyeri Identifikasi respon nyeri non verbal Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Fasilitasi istirahat dan tidur Kolaborasi pemberian analgetik
	2 (Disfungsi Seksual)	<p>Konseling Seksual</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor stress, depresi, dan penyebab disfungsi</p>	<p>S : Pasien mengatakan semenjak kanker, dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual dan</p>

		<p>seksual Hasil: Pasien mengatakan semenjak kanker, dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual dan pasien sudah pasrah</p> <p>Edukasi</p> <p>2. Memberi edukasi tentang efek pengobatan dan penyakit terhadap disfungsi seksual Hasil: Pasien tampak paham dengan penjelasan perawat</p>	<p>pasien sudah pasrah</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TTV : TD : 110/70 N : 75 kali/menit R : 20 kali/menit S : 36,5c <p>A : Disfungsi seksual belum teratasi P : Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor stress, depresi, dan penyebab disfungsi seksual 2. Berikan kesempatan kepada pasangan untuk menceritakan permasalahan seksual 3. Jelaskan efek penyakit dan pengobatan terhadap disfungsi seksual
	<p>3 (Ansietas)</p>	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pasien tampak nyaman dan rileks <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengajarkan mengambil posisi nyaman Hasil: pasien tampak nyaman dengan posisi duduk 4. Membimbing kembali melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien 	<p>S: Keluhan pasien tentang penyakitnya sudah berkurang</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak lebih tenang namun masih sedikit gelisah 2. Pasien tampak sesekali menghembuskan napas panjang <p>A: Masalah Ansietas teratasi sebagian P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif 2. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan

		<p>Hasil: Pasien melakukan relaksasi benson sesuai yang didemonstrasikan perawat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Monitor respon terhadap terapi relaksasi 4. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 5. Gunakan pakaian longgar 6. Anjurkan mengambil posisi nyaman 7. Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik relaksasi benson yang diberikan
	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: S: 36,7°C <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganismenya 3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 19:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi 	<p>S : Klien mengatakan kencing masih berwarna merah</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terpasang selang nefrotomi 2. Urine tampak berwarna merah 3. S: 36,7°C <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line

Sabtu, 17 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi skala nyeri dengan menanyakan apakah pasien dalam skala nyeri ringan, sedang, atau berat Hasil: Skala nyeri 3 NRS Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak gelisah dan sesekali meringis <p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengontrol suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil: Pasien tampak nyaman dan tenang <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menganjurkan pasien untuk mengulang kembali teknik distraksi dan relaksasi napas dalam yang telah diajarkan Hasil: pasien tampak rileks setelah melakukan teknik distraksi dan relaksasi napas dalam <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian injeksi Ketorolac I ampul/IV jam 07.00 Hasil: Setelah 1 jam pemberian Ketorolac I ampul/IV nyeri pasien berkurang 	<p>S :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah berkurang Pasien mengatakan jika nyeri ia melakukan relaksasi napas dalam Pasien mampu mendemonstrasikan relaksasi napas dalam dengan tepat <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak tenang TTV : TD : 120/80 N : 80 kali/menit R : 18 kali/menit S : 36,5°C <p>A : Nyeri Kronis teratasi P : Intervensi dihentikan</p>
	2 (Disfungsi Seksual)	<p>Konseling Seksual</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memonitor stress, depresi, dan penyebab disfungsi seksual Hasil: Pasien mengatakan semenjak kanker, dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual dan pasien sudah pasrah. Selain itu suami juga mengatakan akan selalu mendukung pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberi edukasi tentang efek pengobatan dan penyakit terhadap disfungsi seksual Hasil: Pasien tampak paham dengan penjelasan perawat 	<p>S : Pasien mengatakan semenjak kanker, dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual dan pasien sudah pasrah. Selain itu suami juga mengatakan akan selalu mendukung pasien</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak tenang Pasien tampak pasrah <p>A : Disfungsi seksual teratasi sebagian P : Pertahankan intervensi</p>

	3 (Ansietas)	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pasien tampak nyaman dan rileks</p> <p>Edukasi</p> <p>3. Mengajarkan mengambil posisi nyaman Hasil: pasien tampak nyaman dengan posisi duduk</p> <p>4. Membimbing kembali melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien Hasil: Pasien melakukan relaksasi benson sesuai yang didemonstrasikan perawat</p>	<p>S :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan merasa agak lega dan tenang setelah mendengarkan penjelasan tentang penyakitnya 2. Pasien mengatakan akan menganggap penyakitnya ini sebagai cobaan yang dapat menggugurkan dosanya <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak mulai ceria saat diajak bicara 2. Pasien tampak tenang 3. Pasien tampak menceritakan beberapa pengalaman hidupnya <p>A : Ansietas teratasi P : Intervensi dihentikan</p>
	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: S: 36,5°C</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p>	<p>S : Klien mengatakan warna kencingnya sudah tidak terlalu merah</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terpasang selang nefrotomi 2. S: 36,5°C <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien

		<p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>5. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 07:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan</p> <p>5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line</p>
--	--	--	---

Tabel 4.6 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan Pasien 2

HARI/TANGGAL/ JAM	NO.DIAGNOSIS	IMPLEMENTASI	EVALUASI
Kamis, 17 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi skala nyeri dengan menanyakan apakah pasien dalam skala nyeri ringan, sedang, atau berat Hasil: Skala nyeri 5 NRS</p> <p>2. Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak meringis dan melindungi area yang sakit</p> <p>3. Menanyakan kepada pasien tentang apa yang memperberat dan memperingan nyeri pasien Hasil: Pasien mengatakan nyerinya bertambah ketika bergerak dan berkurang ketika berdzikir</p> <p>Teraupetik</p> <p>4. Mengontrol suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil: Pasien tampak nyaman dan tenang</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Menganjurkan keluarga untuk memperdengarkan murottal pada pasien Hasil: pasien tampak rileks setelah</p>	<p>S: Pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Skala nyeri 4 NRS Pasien tampak gelisah Pasien tampak meringis dan sesekali berteriak TTV : TD : I25/80 N : 87 kali/menit R : 20 kali/menit S : 36,9c <p>A: Masalah Nyeri kronis belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi skala nyeri Identifikasi respon nyeri non verbal Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) Fasilitasi istirahat dan tidur

		<p>diperdengarkan murottal surah Ar-Rahman</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Pemberian Fentanyl 20 mg/IV jam 07:00 Hasil: Setelah 1 jam pemberian Fentanyl 20 mg/IV nyeri pasien berkurang</p>	5. Kolaborasi pemberian analgetik
	2 (Perfusi perifer tidak efektif)	<p>Perawatan Sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memeriksa sirkulasi perifer (mis, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu) Hasil: nadi perifer teraba, CRT 2 detik, warna kulit pucat, akral teraba dingin</p> <p>2. Mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi (mis, diabetes, perokok, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi) Hasil: tidak ditemukan faktor risiko pada klien</p> <p>3. Memonitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas Hasil: Tidak terdapat panas, kemerahan, nyeri, dan bengkak pada ekstermitas</p> <p>Terapeutik</p> <p>4. Melakukan hidrasi Hasil: setelah pemasangan cairan intavena dan memenuhi kebutuhan oral pasien, sirkulasi pasien mulai membaik</p> <p>Edukasi</p> <p>5. Menganjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat Hasil: setelah penggunaan pelembat, kulit pasien tampak lebih lembab</p> <p>6. Menginformasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. sakit yang tidak hilang saat istirahat) Hasil: pasien dan keluarga mengerti tentang penjelasan perawat</p>	<p>S: Pasien mengatakan badannya terasa lemas</p> <p>O: pasien tampak lemas, integritas kulit mulai membaik, warna kulit pucat mulai menurun, CRT 2 detik</p> <p>A: Masalah perfusi perifer teratasi sebagian</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa sirkulasi perifer (mis, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu) 2. Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas 3. Lakukan hidrasi 4. Anjurkan Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat 5. Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. sakit yang tidak hilang saat istirahat)

	3 (Ansietas)	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pasien tampak nyaman dan rileks <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi Hasil: Pasien dan keluarga paham tentang tujuan dan manfaat diberikannya Relaksasi Benson Menjelaskan secara rinci intervensi yang dipilih Hasil: Pasien setuju dengan intervensi Benson yang dipilih Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil: pasien tampak nyaman dengan posisi setengah duduk Demonstrasikan dan latih teknik relaksasi Hasil: Perawat memperagakan teknik relaksasi benson Membimbing melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien Hasil: Pasien melakukan relaksasi benson sesuai yang didemonstrasikan 	<p>S:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan takut tidak sembuh Pasien mengatakan cemas karena perutnya semakin membesar <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak gelisah <p>A: Masalah Ansietas belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan Monitor respon terhadap terapi relaksasi Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Gunakan pakaian longgar Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama Anjurkan mengambil posisi nyaman Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik relaksasi benson yang diberikan
--	--------------	--	--

	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: Tidak ada tanda dan gejala infeksi lokal, S: 37°C</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme, yang menjaga hanya kedua anak perempuannya</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan cara mencuci tangan dengan benar Hasil: penyebaran bakteri atau mikroorganisme tidak terjadi</p> <p>5. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>6. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 07:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak terpasang kateter urine 2. Tampak terpasang infuse 3. S: 37,0°C <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line
Jumat, 18 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi skala nyeri dengan menanyakan apakah pasien dalam skala nyeri ringan, sedang, atau berat Hasil: Skala nyeri 5 NRS</p>	<p>S: Pasien mengeluh nyeri</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skala nyeri 4 NRS 2. Pasien tampak gelisah 3. N: 80 x/i <p>A: Masalah Nyeri kronis belum teratasi</p>


		<p>2. Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak meringis dan sesekali berteriak meraung</p> <p>Teraupetik</p> <p>3. Mengontrol suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan yang dapat memperberat rasa nyeri Hasil: Pasien tampak nyaman dan tenang</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan keluarga untuk kembali memperdengarkan murottal pada pasien Hasil: pasien tampak rileks setelah diperdengarkan murottal surah Ar-Rahman</p> <p>Kolaborasi</p> <p>5. Pemberian Fentanyl 20 mg/IV jam 19:00 Hasil: Setelah 1 jam pemberian Fentanyl 20 mg/IV nyeri pasien berkurang</p>	<p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi skala nyeri 2. Identifikasi respon nyeri non verbal 3. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 4. Fasilitasi istirahat dan tidur 5. Kolaborasi pemberian analgetik
	<p>2 (Perfusi perifer tidak efektif)</p>	<p>Perawatan Sirkulasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa sirkulasi perifer (mis, nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu) Hasil: nadi perifer teraba, CRT 1 detik, akral teraba hangat 2. Memonitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas Hasil: Tidak terdapat panas, kemerahan, nyeri, dan bengkak pada ekstermitas <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan hidrasi Hasil: setelah memenuhi kebutuhan oral pasien sebanyak ±1350 cc, sirkulasi pasien membaik <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menganjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat Hasil: setelah penggunaan pelembat, kulit pasien tampak lebih lembab 	<p>S: Pasien mengatakan badannya sudah tidak lemas</p> <p>O: pasien tampak duduk sendiri tanpa bantuan, CRT 1 detik, kulit tidak terlihat pucat, akral teraba hangat, turgor kulit membaik dan elastis</p> <p>A: Masalah perfusi perifer tidak efektif teratasi</p> <p>P: Intervensi dihentikan</p>

		<p>5. Menginformasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan (mis. sakit yang tidak hilang saat istirahat) Hasil: pasien dan keluarga mengerti tentang penjelasan perawat</p>	
	3 (Ansietas)	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah tetapi tidak sulit berkonsentrasi sehingga terapi relaksasi bisa diberikan</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman Hasil: Pasien tampak nyaman dan rileks</p> <p>Edukasi</p> <p>3. Menganjurkan mengambil posisi nyaman Hasil: pasien tampak nyaman dengan posisi duduk</p> <p>4. Membimbing kembali melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien Hasil: Pasien melakukan relaksasi benson sesuai yang didemonstrasikan perawat</p>	<p>S: Pasien mengatakan cemas karena perutnya semakin membesar</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak sedikit lebih tenang 2. Pasien mampu melakukan teknik relaksasi benson dengan benar <p>A: Masalah Ansietas belum teratasi</p> <p>P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif 2. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah dan suhu sebelum dan sesudah latihan 3. Monitor respon terhadap terapi relaksasi 4. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman 5. Gunakan pakaian longgar 6. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama 7. Anjurkan mengambil posisi nyaman

			8. Anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi 9. Anjurkan sering mengulangi atau melatih tehnik relaksasi benson yang diberikan
	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: S: 36,5°C</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme, yang menjaga hanya kedua anaknya perempuannya</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat dan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>5. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 19:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>S : -</p> <p>O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak terpasang kateter urine 2. Tampak terpasang infuse 3. S: 36,5°C <p>A : Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan 5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line
Sabtu, 17 Desember 2021	1 (Nyeri Kronis)	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengamati ekspresi pasien Hasil: Pasien tampak meringis dan sesekali</p>	<p>S: Sulit dikaji</p> <p>O:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak meringis 2. Pasien tampak gelisah

		<p>berteriak meraung dan mengamuk</p> <p>Edukasi</p> <p>2. Menganjurkan keluarga untuk kembali mendengarkan murottal pada pasien Hasil: pasien tampak lebih tenang setelah diperdengarkan murottal surah Ar-Rahman</p>	<p>3. Pasien tampak sesekali berteriak meraung dan mengamuk</p> <p>A: Masalah Nyeri kronis belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi skala nyeri 2. Identifikasi respon nyeri non verbal 3. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 4. Fasilitasi istirahat dan tidur 5. Kolaborasi pemberian analgetik
	3 (Ansietas)	<p>Terapi Relaksasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif Hasil: Pasien tampak gelisah, sesekali berteriak, dan mengamuk sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan terapi</p>	Sulit dikaji
	4 (Risiko Infeksi)	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil: S: 36,6°C</p> <p>Terapeutik</p> <p>2. Membatasi jumlah penjaga pasien yaitu hanya 2 orang Hasil: tidak terjadi penyebaran mikroorganisme, yang menjaga hanya kedua anaknya perempuannya</p> <p>3. Mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil: tidak terjadi infeksi silang antara perawat</p>	<p>S : - O :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak terpasang kateter urine 2. Tampak terpasang infuse 3. S: 36,6°C 4. Keluarga mampu mendemonstrasikan cuci tangan yang benar <p>A : Risiko Infeksi teratasi sebagian P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Cuci tangan sebelum dan

		<p>dan pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>4. Menganjurkan keluarga untuk meningkatkan pemberian minum kepada pasien Hasil: Mengurangi risiko infeksi dengan asupan cairan yang cukup</p> <p>Kolaborasi</p> <p>5. Memberikan Ceftriaxone 1 gr melalui IV line pukul 07:00 WITA Hasil: setelah pemberian ceftriaxone 1 gr, infeksi bakteri tidak terjadi</p>	<p>sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>4. Anjurkan meningkatkan asupan cairan</p> <p>5. Pemberian Ceftriaxone /12 jam melalui IV line</p>
--	--	--	---



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian Keperawatan

Pengkajian adalah proses pengumpulan data maupun informasi baik subjektif maupun objektif seperti wawancara dengan pasien dan keluarga, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik serta peninjauan informasi riwayat pasien di buku rekam medis. Selain mengumpulkan data aktual, perawat juga mengumpulkan kekuatan yaitu untuk mengidentifikasi peluang promosi kesehatan dan risiko yaitu untuk mencegah penyakit atau potensi masalah yang dapat ditunda (Nurarif, 2015). Pengkajian keperawatan individu dilakukan fokus pada keluhan yang dialami pasien dan pemeriksaan fisik, pengkajian keluhan pasien dilakukan dengan cara wawancara sedangkan pemeriksaan fisik dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi (Teli, 2018).

Menurut peneliti, perbedaan usia pada pasien 1 dan 2 menjadi faktor penting dalam terjadinya kanker serviks. Kanker serviks paling banyak terjadi pada usia lanjut, dimana risiko terjadinya kanker menjadi 2 kali lipat di usia 35-60 tahun. Hal ini dipengaruhi karena sistem imun menurun seiring bertambahnya usia serta meningkatnya dan bertambah lamanya pemaparan oleh karsinogen.

Pada pengkajian psikososial yaitu integritas ego ditemukan bahwa kedua pasien mengalami masalah ansietas. Pasien 1 mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala. Keluhan objektifnya yaitu pasien tampak sering bertanya tentang penyakitnya, pasien tampak cemas dan merasa sedih, pasien mengatakan terkadang merasa pusing sedangkan pada pasien 2 mengatakan merasa cemas dengan kondisi penyakitnya, pasien berharap segera pulih seperti sedia kala, pasien sesekali mengatakan apakah dia bisa sembuh, pasien mengatakan terkadang merasa pusing. Keluhan

objektifnya yaitu pasien tampak bingung, tampak gelisah, sering bertanya tentang penyakitnya, tampak tegang, tampak cemas dan merasa sedih, sesekali berteriak secara tiba-tiba di ruangannya.

Berdasarkan pendapat peneliti terhadap kesamaan antara kasus yang ditemukan dengan teori pada pasien kanker serviks dengan masalah keperawatan ansietas. Hal ini sejalan dengan teori Aspiani (2017) yang mengatakan bahwa tidak sedikit pasien dengan diagnosa kanker serviks merasa cemas akan penyakit yang diderita. Rasa cemas dapat terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang penyakit, ancaman kematian, dan stigma masyarakat yang menganggap bahwa kanker serviks tidak dapat diobati dan merupakan penyakit yang mematikan. Menurut peneliti wanita dengan kanker serviks stadium lanjut on kemoterapi ataupun radioterapi akan mengalami kecemasan terakut dengan kesembuhannya sehingga peningkatan kualitas hidup pasien sangat penting dilakukan sesuai dengan fakta dan teori yang ada.

Selanjutnya pada pengkajian kenyamanan/nyeri ditemukan bahwa pada kedua pasien mengalami nyeri kronis. Berdasarkan pendapat penulis terhadap kesamaan antara kasus peneliti temukan dengan teori yang dikemukakan pada pasien kanker serviks dengan masalah nyeri kronis dengan gejala yang hampir sama Price & Wilson (2012) megemukakan bahwa bersamaan dengan tumbuhnya tumor, gejala yang muncul selanjutnya adalah nyeri punggung bagian bawah atau nyeri tungkai akibat penekanan saraf lumbosakralis, frekuensi berkemih yang sering dan mendesak, hematuri atau perdarahan rectum. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah nyeri dan perfusi perifer tidak efektif saling berhubungan satu sama lain pada pasien kanker serviks.

Begitupun pada pengkajian proteksi dan keamanan ditemukan bahwa kedua pasien berisiko mengalami masalah infeksi. Menurut penulis kondisi penyakit yang diderita pasien risiko infeksi sangat rentan terjadi. Terdapat kesamaan fakta dengan teori yang dikemukakan pada diagnosa risiko infeksi. Selanjutnya pada pengkajian seksual ditemukan bahwa pasien 1 mengalami

masalah disfungsi seksual dimana pasien mengeluh pola seksualnya berubah. Hal ini sejalan studi yang dilakukan oleh Sarafino & Smith (2012) ditemukan bahwa pada pasien kanker serviks biasanya terjadi penurunan hasrat seksual, ketidakmampuan mencapai orgasme, dan rasa sakit yang diderita saat berhubungan berpengaruh terhadap kepuasan seksual (Sa'adati, 2021).

Maka kesimpulan peneliti mengenai keluhan subjektif serta objektif yang terjadi pada pasien kanker serviks dengan teori menurut beberapa penelitian sesuai antara teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pada kedua klien hampir keseluruhan sesuai dengan teori. Beberapa gejala yang timbul pada kedua klien hampir sama.

5.1.2 Analisis Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinis tentang respon klien terhadap proses kehidupan yang dialaminya baik yang berlangsung maupun masalah kesehatan aktual maupun potensial (PPNI, 2017). Menurut asuhan keperawatan berdasarkan diagnosa medis dalam (Price & Wilson, 2012; Smeltzer, 2015; Ariani, 2015) terdapat 9 diagnosa keperawatan yang muncul pada kasus kanker serviks yaitu nyeri kronis, gangguan integritas kulit, gangguan eliminasi urin, gangguan mobilitas fisik, defisit nutrisi, perfusi perifer tidak efektif, ansietas, harga diri rendah, dan resiko infeksi.

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 5 diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien 1 dan pasien 2. Pada pasien 1 yaitu nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit), Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Sedangkan pada pasien 2 terdapat perbedaan di diagnosa keperawatan kedua dan ketiga yaitu Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan dan Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap penyakit.

Berikut pembahasan diagnosa yang muncul sesuai teori pada kasus pasien 1 dan 2 yaitu :

a. Nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf

Kedua pasien mengeluh nyeri, yang membedakan antara pasien satu dan 2 adalah skala nyerinya saja. Pada kanker serviks nyeri disebabkan karena faktor biologis dari penekanan sel saraf karena massa tumor atau dari sel kanker. Hal ini disebabkan karena diagnosa medis kanker stadium II, tumor telah menyebar di luar uterus tetapi belum mengenai dinding panggul atau sepertiga distal (bawah) vagina.

Diagnosis keperawatan yang ditetapkan oleh peneliti adalah nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiwoyo (2013) bahwa penderita dengan nyeri kanker bisa mengalami nyeri akut, intermiten, atau kronik pada berbagai stadium penyakitnya. Terbanyak adalah nyeri yang berhubungan dengan kanker bersifat kronik (Halim & Khayati, 2020). Jadi, menurut analisis peneliti terdapat kesesuaian antara hasil studi kasus dengan teori. Pada studi kasus pasien 1 dan 2 muncul diagnosis keperawatan nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf.

b. Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit)

Dalam buku SDKI (2017) pada diagnosis keperawatan disfungsi seksual, tanda dan gejala dari data subjektif yaitu pasien mengungkapkan aktivitas seksual berubah, mengungkapkan eksitasi seksual berubah, merasa hubungan seksual tidak memuaskan, mengungkapkan peran seksual berubah, mengeluarkan hasrat seksual menurun, mengungkapkan fungsi seksual berubah, dan mengeluh nyeri saat berhubungan seksual (dyspareunia). Berdasarkan data hasil pengkajian tentang aktivitas ditemukan bahwa pada pasien satu mengalami masalah disfungsi seksual. Pasien 1 mengatakan nyeri saat berhubungan intim, pasien juga mengatakan aktivitas seksual berubah. Dan pada pemeriksaan USG: Massa pada segmen bawah rahim.

Menurut analisa peneliti terdapat kesenjangan antara hasil studi kasus dengan teori. Pada studi kasus pasien 2 muncul diagnosa keperawatan yang berbeda dari 9 diagnosa keperawatan menurut teori yaitu disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit).

- c. Perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin

Perfusi perifer tidak efektif pada pasien 2 disebabkan karena adanya penurunan hemoglobin dan perdarahan. Hasil pemeriksaan hemoglobin pasien 2 yaitu 11.3 gr/dl. Brunner & Suddarth (2013), mengemukakan bahwa pada pasien kanker serviks mengalami perdarahan dan lesi, peradangan, keputihan, sekret berlebihan, dan dilakukan pemeriksaan hematologi karena pasien kanker serviks post kemoterapi biasanya mengalami anemia dimana nilai normal hemoglobin adalah 12-16 gr/dl. Jadi, menurut analisa peneliti terdapat kesesuaian antara hasil studi kasus dengan teori.

- d. Ansietas

Dalam buku SDKI (2017), pada diagnosis keperawatan ansietas, tanda dan gejala terdiri atas data subjektif diantaranya pasien merasa khawatir dengan akibat yang akan dihadapi, pasien merasa bingung, sulit berkonsentrasi, palpitasi, anoreksia, merasa tidak berdaya, dan mengeluh pusing, sedangkan data objektif yaitu pasien tampak tegang, gelisah, frekuensi tekanan darah, nadi dan napas meningkat, sulit tidur, tremor, diaphoresis, suara bergetar, muka tampak pucat, sering berkemih, berorientasi pada masa lalu, dan kontak mata buruk.

Diagnosis keperawatan ini muncul karena kedua pasien merasa cemas terhadap kondisi penyakit yang diderita pasien dikarenakan pasien lelah untuk keluar masuk rumah sakit. Pada pasien 1 mengalami ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi sedangkan pada pasien 2

mengalami ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap kematian. Menurut analisa penulis terdapat kesesuaian antara hasil studi kasus dengan teori.

Kecemasan ini biasanya berhubungan harapan terhadap pengobatan yang akan dijalani, hubungan klien dengan suami atau keluarga dan penerimaan pasien terhadap penyakitnya. Kaji konsep diri pasien seperti gambaran diri, identitas, dan peran. Kaji juga respon non verbal pasien, dan keluhan pasien yang merasa menyusahakan orang lain atau merasan tidak berguna (Reeder *et al.*, 2013).

Menurut peneliti tingkat kecemasan pasien dilihat dari lama, dan pengalaman pasien memiliki penyakit kanker serviks. Hal ini terlihat dari derajat cemas kedua pasien di mana pasien kedua derajat cemasnya lebih tinggi berdasarkan data yang telah diperoleh dimana data pada pasien 2 lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bovero *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa ansietas kanker dalam kelompok tinggi. Di mana ansietas dapat dipengaruhi oleh gangguan diri, penerimaan, usia dan tingkat pendidikan.

e. Risiko Infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasive

Menurut hasil analisa peneliti muncul masalah keperawatan risiko infeksi pada pasien 1 ditemukan dari diagnosa medis pasien menunjukkan kanker serviks stadium II dan pasien kedua menunjukkan kanker serviks stadium IIIB dari pemeriksaan laboratorium. Menurut stadium kanker serviks menurut (FIGO) (Jhingran & Rodriguez, 2017), kanker serviks stadium II yaitu karsinoma meluas di luar rahim, tetapi tidak meluas ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina. Sedangkan kanker serviks stadium IIIB yaitu perluasan ke dinding samping pelvis atau hidronefrosis atau ginjal yang tidak berfungsi.

5.1.3 Analisis Intervensi Keperawatan

Perencanaan keperawatan pada pasien 1 dan 2 disusun menggunakan buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia dimana perencanaan ini baru dapat disusun apabila data yang telah terkumpul sudah dianalisis dan diprioritaskan. Perencanaan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan pasien dengan tahap tindakan dimulai dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi.

Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan nyeri kronis berdasarkan buku SIKI (2018) yaitu manajemen nyeri. Pasien yang masih merasa nyeri dan tidak mampu beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan apabila efek dari analgetik hilang sehingga dibutuhkan terapi non-farmakologis (Fitrianingrum, 2018). Berdasarkan studi kasus pasien 1 dan 2, semua intervensi pada diagnosis keperawatan nyeri kronis dapat dilakukan pada kedua pasien dan tidak ditemukan adanya perbedaan. Tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018) diharapkan masalah nyeri kronis teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun, gelisah menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun.

Selanjutnya, intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan disfungsi seksual berdasarkan SIKI (2018) yaitu yaitu konseling seksual. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh bahwa penanganan yang dapat diberikan kepada pasien kanker yang mengalami disfungsi seksual yaitu berupa konseling (Usman & Lakadjo, 2018). Tujuan asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018), diharapkan masalah disfungsi seksual teratasi dengan kriteria hasil keluhan aktivitas seksual berubah menurun, dan keluhan nyeri saat berhubungan seksual menurun.

Perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien kedua dengan masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif yaitu perawatan sirkulasi sesuai SIKI (2018) sedangkan tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan perfusi meningkat dengan kriteria hasil warna kulit pucat menurun, CRT membaik, akral membaik, dan turgor kulit membaik. Sedangkan asuhan

keperawatan yang akan dilakukan pada pasien pertama dan kedua dengan masalah keperawatan risiko infeksi yaitu pencegahan infeksi berdasarkan SIKI (2018) sedangkan tujuan dari asuhan keperawatan diharapkan tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil kadar sel darah putih membaik, kultur urine membaik.

Dan yang terakhir perencanaan asuhan keperawatan yang akan dilakukan pada pasien 1 dan 2 dengan masalah keperawatan ansietas yaitu terapi relaksasi berdasarkan SIKI (2018). Intervensi yang dapat dilakukan pada diagnosa keperawatan ansietas adalah monitor tanda-tanda ansietas, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan ciptakan suasana yang terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, dengarkan dengan penuh perhatian, pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, anjurkan keluarga agar tetap bersama pasien, informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis, dan latih teknik relaksasi. Berdasarkan studi kasus pada pasien satu dan dua intervensi utama yang digunakan bukanlah reduksi ansietas melainkan terapi relaksasi. Dan tujuan dari asuhan keperawatan berdasarkan SLKI (2018) diharapkan ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku tegang menurun, perilaku gelisah menurun, dan keluhan pusing menurun.

5.1.4 Analisis Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien 1 dan 2 dilakukan diwaktu yang sama yaitu pada pasien pertama dilakukan tiga hari perawatan pada tanggal 17-19 Desember 2021 di ruang perawatan Pinang GSR RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan sesuai dengan masalah keperawatan yang ditemukan pada kedua pasien.

Berdasarkan perencanaan yang dibuat peneliti melakukan tindakan keperawatan yang telah disusun sebelumnya untuk mengatasi masalah pada pasien 1 dan 2 yaitu melakukan manajemen nyeri. Tindakan mandiri yang diberikan perawat adalah relaksasi napas dalam. Relaksasi napas dalam menjadi terapi nonfarmakologi yang dipilih oleh penulis. Hal ini di dukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Megawahyuni *et al.* (2018) yang menunjukkan bahwa relaksasi nafas dalam dengan teknik meniup balon memiliki pengaruh terhadap perubahan skala nyeri pasca operasi seksio sesarea di RSIA Bahagia Makassar. Tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah disfungsi seksual pada pasien 1 adalah melakukan konseling seksual dengan pasien dan suami pasien. Tidak semua intervensi yang disusun pada rencana keperawatan dilakukan oleh penulis karena adanya beberapa pertimbangan seperti situasi dan kondisi pasien.

Kemudian tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif yaitu memeriksa sirkulasi perifer, mengidentifikasi faktor risiko gangguan sirkulasi, melakukan hidrasi, menganjurkan untuk melakukan perawatan kulit yang tepat, dan menginformasikan kepada keluarga tentang tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan. Dan untuk tindakan utama yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah risiko infeksi pasien 1 dan 2 yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah bertemu dengan pasien dan lingkungan pasien,

Dan yang terakhir, tindakan keperawatan yang dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan pada masalah ansietas pasien 1 dan 2 yaitu mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif, menciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman, menjelaskan tujuan, manfaat, batasan dan jenis relaksasi, menjelaskan secara rinci intervensi yang dipilih, menganjurkan mengambil posisi nyaman, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi, membimbing melakukan terapi Relaksasi Benson pada pasien.

Pada hari pertama, pasien 1 dan 2 diberikan intervensi relaksasi benson selama kurang lebih 15 menit dengan cara peneliti memeragakan relaksasi benson terlebih dahulu kemudian membimbing pasien sampai akhirnya pasien dapat mendemonstrasikannya sendiri dengan benar. Setelah pemberian relaksasi benson, pasien 1 dan 2 tampak nyaman dan rileks. Selanjutnya pada hari kedua pemberian intervensi, pasien 1 dan 2 kembali dibimbing dalam melakukan relaksasi benson selama 15 menit dan setelah pemberian pasien tampak lebih tenang dan rileks. Dan pada hari ketiga, hanya pasien 1 yang memungkinkan diberikan intervensi dikarenakan pasien 2 tampak sulit berkonsentrasi. Pemberian intervensi pada pasien 1 kembali dilakukan selama kurang lebih 15 menit dan setelah pemberian pasien merasa lebih tenang dan tampak rileks.

Berdasarkan studi kasus pada pasien semua intervensi terapi relaksasi yang telah disusun dilakukan pada pasien.

5.1.5 Analisis Evaluasi Keperawatan

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah nyeri kronis yang didapatkan dari pasien satu adalah pasien mengatakan nyeri perut bagian bawah berkurang, pasien mengatakan jika nyeri ia melakukan relaksasi napas dalam, pasien juga mampu mendemonstrasikan relaksasi napas dalam dengan tepat. Pasien nampak tenang TTV : TD : 120/80, N: 80 kali/menit, R: 18 kali/menit, S: 36,5°C. Sedangkan pada pasien dua keluhan subjektif pasien sulit dikaji karena pasien mulai mengalami gejala halusinasi dan perilaku kekerasan, data objektifnya yaitu pasien tampak meringis, pasien tampak gelisah, dan pasien tampak sesekali berteriak meraung dan mengamuk.

Berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah disfungsi seksual yang didapatkan dari pasien satu adalah pasien mengatakan semenjak kanker, dia sudah tidak pernah melakukan hubungan seksual dan pasien sudah pasrah. Selain itu suami juga mengatakan akan selalu mendukung pasien. Pasien tampak tenang, pasien tampak pasrah. Kemudian berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah perfusi perifer tidak efektif yang didapatkan dari

pasien 2 adalah pasien mengatakan badannya sudah tidak lemas, CRT 1 detik, kulit tidak tampak pucat, akral teraba hangat. Dan berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah risiko infeksi yang didapatkan dari pasien satu dan dua adalah pasien mengatakan warna kencingnya sudah tidak terlalu merah. Masih terpasang selang nefrotomi, S: 36,5°C. Sedangkan pasien 2 tampak terpasang kateter urine, tampak terpasang infuse, S: 36,6°C.

Selanjutnya berdasarkan hasil studi kasus evaluasi sumatif terkait masalah ansietas yang didapatkan dari pasien 1 dan 2 adalah pasien mengatakan merasa agak lega dan tenang setelah mendengarkan penjelasan tentang penyakitnya, pasien juga mengatakan akan menganggap penyakitnya ini sebagai cobaan yang dapat menggugurkan dosanya. Pasien tampak mulai ceria saat diajak bicara, klien juga menceritakan beberapa pengalaman hidupnya. Sedangkan pasien 2 karena pemberian intervensi yang tidak terlaksana sehingga tidak ada evaluasi di hari terakhir implementasi.

Pada hari pertama pemberian intervensi pasien 1 mengatakan khawatir dengan penyakitnya yang tak kunjung sembuh, pasien tampak gelisah dan sesekali menghembuskan napas panjang, sedangkan pada pasien 2 mengatakan takut tidak sembuh dan mengatakan cemas karena perutnya yang semakin membesar akibat penyakit. Dan pada hari kedua pemberian intervensi, keluhan pasien 1 tentang penyakitnya sudah berkurang, pasien tampak lebih tenang walaupun sedikit gelisah, dan sesekali pasien tampak menghembuskan napas panjang sedangkan pasien 2 mengatakan masih cemas dengan perutnya yang semakin membesar, namun pasien tampak lebih tenang dari hari sebelumnya dan mampu melakukan relaksasi benson dengan benar. Dan pada hari ketiga atau hari terakhir pemberian intervensi, pasien 1 mengatakan merasa agak lega dan tenang setelah mendengarkan penjelasan tentang penyakitnya dan pasien mengatakan akan menganggap penyakitnya ini sebagai cobaan yang dapat menggugurkan dosanya. Pasien tampak mulai ceria saat diajak bicara, tampak tenang, dan menceritakan beberapa pengalaman hidupnya sedangkan pada pasien 2 dikarenakan intervensi

tidak dilakukan karena kondisi pasien yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga peneliti juga tidak mendapatkan hasil evaluasi sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah ansietas pada pasien 2 tidak teratasi.

Pada pasien 2 masalah ansietas tidak teratasi dikarenakan karena beberapa faktor yang memengaruhi, pertama adalah usia, dimana usia pasien 2 adalah 50 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2021) bahwa orang dengan usia >40 tahun lebih banyak yang mengalami kecemasan, hasil temuan ini sesuai dengan penelitian Ma *et al.* (2020) yang melaporkan bahwa pasien dengan usia >60 tahun rentan terhadap kecemasan dan hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Wen (2019) yang menyebutkan bahwa pasien kanker yang lanjut usia sering memiliki penyakit kronis sehingga rentan terhadap kecemasan dan depresi. Selain itu, pasien 2 tingkat pendidikannya lebih rendah dari pasien 1 yaitu hanya tamat SMP. Menurut Yunitasari (2012) menyatakan bahwa faktor tingkat pendidikan merupakan faktor yang lebih dominan dibanding faktor lain untuk mempengaruhi kecemasan. Menurut asumsi peneliti, tingkat kecemasan berat pasien dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya yang rendah. Karena kurangnya pengetahuan informasi tentang penyakit-penyakit dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan berdampak terkena penyakit menjadi tinggi. Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin ringan tingkat keemasannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yang (2021) yang menyebutkan orang dengan pendidikan dasar lebih banyak mengalami kecemasan, sejalan dengan penelitian Manuel (2016) yang menyatakan bahwa orang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki frekuensi kecemasan yang lebih tinggi. Faktor lain yang memengaruhi kecemasan pasien 2 adalah stadium penyakitnya lebih tinggi dibanding pasien 1. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yang, 2021) didapatkan data bahwa pasien kanker stadium IV mengalami kecemasan yang lebih tinggi, sesuai dengan penelitian Massicotte *et al.* (2021) yang menyebutkan pasien kanker dengan stadium lanjut sering mengalami kecemasan dan depresi karena khawatir

akan perkembangan kanker, metastasis dan efek pengobatan yang tidak memuaskan.

Sehingga peneliti berasumsi bahwa kombinasi relaksasi benson efektif dalam menurunkan kecemasan selama pemberian intervensi 1 kali selama 3 hari. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfikrie *et al.* (2020) yang mengatakan bahwa ada pengaruh terapi benson terhadap penurunan skala kecemasan pasien yang diterapkan pada 30 responden dengan waktu penerapan 3 hari dan durasi penerapan selama 15 menit.

5.2 Analisis Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan intervensi relaksasi benson. Tanda dan gejala yang terjadi pada pasien kanker serviks juga mempengaruhi gangguan emosional pasien. Penderita kanker merasa sebagai ancaman baru dan penyakit yang pada akhirnya tidak ada. Penolakan, penerimaan, dan kecemasan adalah reaksi emosional yang normal dari pasien dan orang-orang terdekat ketika dihadapkan dengan diagnosis yang buruk. Berawal dari putus asa, tidak lagi melihat cahaya terang, menimbulkan ketidakpercayaan dan penyangkalan (Sjamsuhidajat & Jong, 2004). Terapi untuk kanker serviks biasanya diberikan dalam bentuk pembedahan dan pengobatan. Pembedahan seperti histerektomi dan radiasi. Sedangkan pengobatan berupa kemoterapi (Benson & Pernoll, 2008). Perawatan farmakologis dengan pembedahan dan perawatan obat-obatan dapat menjadi beban dan ancaman tertentu. Reaksi seperti tidak berdaya, putus asa, cemas, depresif atau memberontak dapat mendominasi sehingga efek gejala tambahan dan komplikasi lebih mengganggu (Sjamsuhidajat & Jong, 2004).

Kecemasan yang parah akan mempengaruhi kerja sistem saraf manusia yaitu hipotalamus yang mengontrol dan mengatur sistem saraf otonom. Dalam kondisi cemas, sistem saraf akan mengeluarkan norepinefrin melalui sekresi ujung saraf yang berhubungan langsung dengan ujung organ yang dituju. Akibatnya terjadi peningkatan denyut jantung, terjadi vasokonstriksi perifer yang mengakibatkan

peningkatan tekanan darah. Peningkatan glukosa darah, pupil akan melebar, dan aktivitas mental akan meningkat. Rasa kesiapan menjadi lebih besar (Smeltzer & Bare, 2001). Salah satu terapi yang dapat menurunkan kecemasan adalah relaksasi Benson Benson. Relaksasi Benson adalah teknik relaksasi yang dipadukan dengan keyakinan yang dimiliki oleh pasien. Benson & Proctor (2000) menjelaskan bahwa relaksasi Benson akan menghambat aktivitas saraf simpatis yang dapat menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh dan kemudian otot menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman.

Hal tersebut sejalan dengan teori Kolcaba yang mengedepankan kenyamanan sebagai kebutuhan semua manusia. Kenyamanan ialah kebutuhan yang diperlukan pada rentang sakit hingga sehat dan kenyamanan merupakan label tahap akhir dari tindakan terapeutik perawat kepada pasien. Kolcaba memandang bahwa kenyamanan merupakan kebutuhan dasar seorang individu yang bersifat holistik, meliputi kenyamanan fisik, psikospiritual, sosiokultural, lingkungan. Dalam menyelesaikan masalah ansietas klien, penulis membantu memberikan kenyamanan psikospiritual pada pasien 1 dan 2 di mana kenyamanan psikospiritual dikaitkan dengan keharmonisan hati dan ketenangan jiwa, yang dapat difasilitasi dengan memfasilitasi kebutuhan interaksi dan sosialisasi klien dengan orang-orang terdekat selama perawatan dan melibatkan keluarga secara aktif dalam proses kesembuhan klien.

Berdasarkan hasil penelitian Safitri *et al.* (2018) menunjukkan bahwa responden yang diberikan relaksasi benson selama 15 menit menjadi lebih nyaman dan tenang sehingga kecemasan menurun. Hal ini dikarenakan relaksasi benson menghambat aktivitas saraf simpatik yang mengarah pada pengurangan oksigen oleh tubuh yang selanjutnya akan membuat otot-otot menjadi rileks dan menimbulkan perasaan yang nyaman dan tenang. Selain itu, relaksasi Benson berfokus pada kata-kata atau kalimat tertentu yang diucapkan berulang kali dengan irama teratur dan dengan sikap yang pasrah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai pasien sehingga kecemasan dapat dikurangi (Benson & Proctor, 2000).

Sehingga peneliti berasumsi bahwa relaksasi benson dapat digunakan untuk menurunkan kecemasan dengan menggunakan metode yang sederhana namun memberi efek atau pengaruh yang sangat bagus bagi kualitas hidup pasien. Pemahaman agama yang benar dapat menyelesaikan kecemasan pada diri seseorang. Allah menegaskan dalam (QS. al-Anfal/ 9:10) yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

□

Terjemahnya :

Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Anfal /9:10).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hanya Allah yang memberikan kebaikan dan ketenangan di bumi supaya kita tahu betapa kuasanya Allah sebagai pemilik kebaikan dan ketentraman jiwa apabila kita terus mengingat dan memujinya melalui dzikir, karena dengan dzikir maka kita akan menjadi tenang begitu pula dengan cemas semua yang kita alami bersumber dari Allah untuk itulah mendekatkan diri dengan berzikir insya Allah kecemasan, keraguan, rasa takut akan hilang (Shihab, 2009).

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan pada karya tulis ini yaitu intervensi relaksasi benson memerlukan pengulangan intervensi kepada pasien agar pemberian intervensi lebih optimal dalam mengatasi masalah ansietas pasien.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Pengkajian Keperawatan

Pada pengkajian kenyamanan/nyeri ditemukan bahwa pada kedua pasien mengalami nyeri kronis. Pengkajian psikososial yaitu integritas ego ditemukan bahwa kedua pasien mengalami masalah ansietas. Begitupun pada pengkajian proteksi dan keamanan ditemukan bahwa kedua pasien berisiko mengalami masalah infeksi. Pada pengkajian seksual ditemukan bahwa pasien satu mengalami masalah disfungsi seksual. Sedangkan pasien dua tidak mengalami disfungsi seksual akan tetapi pada pengkajian keadaan umum ditemukan bahwa pada pasien dua mengalami masalah perfusi perifer tidak efektif.

6.1.2 Diagnosis Keperawatan

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 5 diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien 1 dan pasien 2. Pada pasien 1 yaitu nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf, Disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit), Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi, dan Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Sedangkan pada pasien 2 terdapat perbedaan di diagnosa keperawatan kedua dan ketiga yaitu Perfusi perifer berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin dan Ansietas berhubungan dengan ancaman terhadap penyakit.

6.1.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan untuk diagnosis nyeri kronis berhubungan dengan penekanan saraf adalah manajemen nyeri, untuk diagnosis disfungsi seksual berhubungan dengan perubahan fungsi/struktur tubuh (proses penyakit) diberikan konseling seksual, untuk diagnosis perfusi perifer tidak efektif diberikan

perawatan sirkulasi, untuk diagnosis ansietas diberikan terapi relaksasi, dan untuk diagnosis risiko infeksi diberikan pencegahan infeksi.

6.1.4 Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan pada pasien 1 dan 2 dilakukan diwaktu yang sama yaitu pada pasien pertama dilakukan tiga hari perawatan pada tanggal 17-19 Desember 2021 diruang perawatan Pinang GSR RS Wahidin Sudirohusodo Makassar. Implementasi dilakukan sesuai dengan intervensi yang telah disusun berdasarkan SIKI dan SLKI.

6.1.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi pada pasien 1 masalah ansietas teratasi, sedangkan pada pasien 2 masalah ansietas tidak teratasi yang disebabkan karena faktor usia, tingkat pendidikan, dan stadium penyakit.

6.1.6 Intervensi EBP

Pada kasus ini, asuhan keperawatan pada pasien kanker serviks dengan ansietas menggunakan intervensi relaksasi benson. Relaksasi Benson adalah teknik relaksasi yang dipadukan dengan keyakinan yang dimiliki oleh pasien. Dalam menyelesaikan masalah ansietas klien, penulis membantu memberikan kenyamanan psikospiritual pada pasien 1 dan 2 dimana kenyamanan psikospiritual dikaitkan dengan keharmonisan hati dan ketenangan jiwa.

6.2 Saran

6.2.1 Bagi Mahasiswa

Sebelum melakukan terapi relaksasi benson ini baiknya, lingkungan sekitar klien di perhatikan agar ketika terapi tersebut berlangsung tidak ada kebisingan yang dapat mengganggu.

6.2.2 Bagi Perawat

Penerapan teknik relaksasi benson dapat dilakukan secara terus menerus pada pasien yang mengalami kecemasan karena dapat mengurangi gejala kecemasan yang dirasakan oleh klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikrie, F., Dkk. (2020). Pengaruh Relaksasi Napas Dalam Terhadap Kecemasan pada Pasien Gagal Ginjal Krnois yang Menjalani Hemodialisa. *Borneo Nursing Journal*, 2(2). 1-8.
- Ahmad, M. (2017) 'Persepsi Tentang Kanker Serviks, Promosi Kesehatan, Motivasi Sehat Terhadap Perilaku Pencegahan Kanker Serviks Pada Bidan Di Wilayah Depok', *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16, pp. 32–41.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI.
- American Cancer Society. (2016). Cervical Cancer Causes, Risk Factors, and Prevention Risk Factors. *American Cancer Society*.
- Andriyana, M. (2021). Perbedaan Efektivitas Terapi Zikir dan Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Pre Sectio Caesarea. *Jurnal Ilmiah Karya Kesehata*, 2(1).
- Applegate, E. M. (2011) *The Anatomy And Physiology Learning System*. 4th edn. United States of America: Saunders Elsevier.
- Ariani, S. (2015). *STOP! KANKER*. Yogyakarta. Istana Media.
- Aspiani, R. Y. (2017). *Buku Ajar Asuhan Keperawatan Maternitas*. Jakarta: TIM.
- Benson, H., & Proctor, W. (2008). *Dasar-dasar Respon Relaksasi*. Bandung: Kafa.
- Benson, R. C., & Pernoll, M.L. (2008). *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC.
- Bermudez, A., Bhatla, N. and Leung, E. (2015) '*Cancer of the cervix uteri*', *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. Elsevier B.V., 131, pp. S88–S95. doi: 10.1016/j.ijgo.2015.06.004.
- Binka, C. Doku, D.T., & Asare, K.A. (2017). *Experiences of cervical cancer patients in rural Ghana: An exploratory study*. *PLOS one*, 12(10),12.
- Bovero, A., dkk. (2019). *The Spirituality in End-of-Life Cancer Patients to Relation to Anxiety, Depression, Coping Strategies and Daily Spiritual Experiences: A Cross-Sectional Study*. *Journal of Religion and Health*
- Brunner & Suddarth. (2011). *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC.
- Brunner & Suddarth. (2013). *Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Volume 2*. Jakarta: EGC.
- Brunner and Suddarth. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Edisi 8 Volume 2*. Jakarta: EGC.

- Dermawan, D. (2012). *Proses Keperawatan: Penerapan Konsep dan Kerangka Kerja*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Dinkes Profil Sulawesi selatan <http://www.dinkes.go.id/> htm (diakses pada tanggal 15 Juni 2022).
- Ernawati, R. (2021) 'Penerapan Relaksasi Autogenik dan Relaksasi Benson Terhadap Nyeri Pasien Fraktur', 11(1), p. 13.
- Friedman, M.M. (2008). *Keperawatan Keluarga*: Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Garza-salazar, J. G. De, Morales-Vasquez, F. and Meneses-Garcia, A. (2017) *Cervical Cancer. Switzerland: Springer International Publishing Switzerland*.
- Globocan. (2020). International agency for research on cancer (IARC) 2021. Estimated number of deaths in 2020 worldwide, Indonesia, female, all ages. https://gco.iarc.fr/today/onlineanalysispie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900_360&key=total&sex=2&cancer=39&type=1&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=0&include_nmssc=0&include_nmssc_other=1&half_pie=0&donut=0#collapse-by_country.%20Diakses%2029%20Juni%202021.
- Halim, A.R. dan Khayati, N. (2020) 'Pengaruh Hipnoterapi Lima Jari Terhadap Penurunan Skala Nyeri Pada Pasien Kanker Serviks', *Ners Muda*, 1(3), p. 159. doi:10.26714/nm.v1i3.6211.
- Inayati, N. (2012). Pengaruh Teknik Relaksasi Benson Terhadap Tingkat Depresi Lanjut Usia Awal (Early Old Age) Umur 60-70 Tahun di Upt Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jember. Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember.
- Jannah, Widya F. (2019). Gambaran Kesejahteraan Psikologis pada Penderita Kanker Payudara di Surabaya. Diakses pada 16 Juni 2022 di <http://lib.unair.ac.id>
- Jhingran, A. and Rodriguez, A. M. (2017) 'Neoplasms of the cervix', pp. 1–28. doi: 10.1002/9781119000822.hfcm103.
- Kemenkes (2017) *Profil Kesehatan Indonesia 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes RI. (2019). Hari Kanker Sedunia 2019. <https://www.kemkes.go.id/article/view/19020100003/hari-kanker-sedunia-2019.html>
- Kemenkes RI (2020). *Cara Mendeteksi Dini Kanker Leher Rahim Direktorat. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular*. Jakarta.

- Kevin, C. & Wihardja, H. (2022) 'Efektivitas Relaksasi Benson dan Teknik Guided Imagery Terhadap Kecemasan Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialisis: Studi Literatur', 4, p. 10.
- Kolcaba, K. T. D. 2012. *Comfort Theory a Unifying Framework in Enhance Practice Environment. The Jurnal of Nursing Administration.*
- Laporan RSUP Wahidin Sudirohusodo. 2016. Laporan RSUP Wahidin Sudirohusodo. Makassar: RSUP Wahidin Sudirohusodo.
- Ma *et al.* (2020). Covid-19 and Diabetic. China: Departemen of Medicine and Therapeutics.
- Marhamah, E. & Ramadhanty, A. (2021) 'Literature Review : Teknik Relaksasi Benson Terhadap Kadar Gula Darah pada Diabetes Melitus', p. 13.
- Massicotte V, et al. (2021). *COVID-19 Pandemic Stressor and Psychological Symptoms in Breast Cancer Patients.*
- Megawahyuni, A., Hasnah, Azhar, M.U. (2018) 'Pengaruh Relaksasi Nafas Dalam dengan Teknik Meniup Balon Terhadap Perubahan Skala Nyeri Pasca Operasi Seksio Sesarea di RSIA Bahagia Makassar', *Jurnal Kesehatan*, 11(1), pp. 51–60. doi:10.24252/kesehatan.v11i1.5028.
- Nasution, Sabilah T. (2021). Gambaran Tingkat Kecemasan Pasien Kanker yang Menjalani Radioterapi: Telaah Sistematis. Diakses pada 27 Juni 2022.
- National Health Service* (2018). Health A to Z. Cervical Cancer.
- Nurarif, A. H., & Kusuma, H. (2015). *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa Medis & NANDA NIC-NOC Jilid 1*. Jogjakarta: Medication
- Nursalam. (2016). Manajemen Keperawatan. Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: Salemba Medika.
- Padila (2015). *Asuhan Keperawatan Maternitas II*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Pardede, J.A. & Tarigan, I. (2020) 'The Anxiety Level of Mother Presectio Caesar with Benson's Relaxation Therapy', *Jendela Nursing Journal*, 4(1), pp. 20–28. doi:10.31983/jnj.v4i1.5801.
- Peterson, S., & Bredow, T.S. (2010). *Middle Range Thories. Application to Nursing Research*. Philadelphia: Lippincott Willian & Wilkins.
- Polit & Bect. (2012). Resource Manual for Nursing Research. Generating and Assessing Evidance for Nursing Practice Ninth Edition. USA: Lippincott.
- PPNI. 2016. "Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia". Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. 2018. "Standar Intervensi Keperawatan Indonesia". Edisi 1. Cetakan 2. Jakarta: DPP PPNI.

- PPNI. 2018. “*Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan*”. Edisi 1. Jakarta: DPP PPNI.
- Prajayanti, E.D. & Sari, I.M. (2017) ‘Relaksasi Benson Mempengaruhi Aspek Psikologis pada Kualitas Hidup Pasien Pasca Kemoterapi Ca Mammae’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 13(2). doi:10.26753/jikk.v13i2.212.
- Pratiwi, S. R., Widiyanti, E., & Solehati, T. (2017). Gambaran Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kecemasan Pasien Kanker Payudara dalam Menjalani Kemoterapi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 3(2), 167.
- Price & Wilson. (2012). *Patofisiologi Konsep Klinis Proses-proses Penyakit*, Edisi 6. Jakarta: EGC.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Reeder, D. (2013). *Keperawatan Maternitas Kesehatan Wanita, Bayi & Keluarga, Edisi 18 Volume 1*. Jakarta: EGC.
- Rutami & Setiawan. (2012). Pelaksanaan Proses Pengkajian Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUP H. Adam Malik Medan. *Jurnal Keperawatan Holistik*, 1(1), 52-57.
- Sa’adati, Y. (2021) ‘Identifikasi Hubungan Kausal dari Faktor-Faktor Disfungsi Seksual pada Wanita Penderita Kanker di Indonesia’, p. 119.
- Safitri, Y. (2017) ‘The Influence of Benson Relaxation Towards The Level of Anxiety in Cervical Cancer Patients in Inpatient Ward of Camar III at General Hospital of Arifin Achmad Pekanbaru 2015’, *Jurnal Ners*, 1(1). doi:10.31004/jn.v1i1.96.
- Safitri, Y. and Apriyanti, F. (2018) ‘Perbandingan Relaksasi Benson dan Relaksasi Kesadaran Indera Terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Kanker Serviks di RSUD Bangkinang Tahun 2018’, p. 11.
- Sarafino, E.P., & Smith, T.W (2012). *Health Psuchology: Biopsocosocial Interactions* (7th ed). New York; John Wiley & Sons, Inc.
- Satriana & Feriani, P. (2020). Efektivitas Teknik Relaksasi Benson dan Terapi Genggam Jari Terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Laparatomi di Ruang Mawar RSUD A. Wahab Sjahrani. 1(3), 1731-1737.
- Setiadi. (2012). *Konsep dan Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan Edisi 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shetty, M. K. and Trimble, E. L. (2013) ‘Breast and gynecological cancers: An integrated approach for screening and early diagnosis in developing countries’, *Breast and Gynecological Cancers: An Integrated Approach for*


- Screening and Early Diagnosis in Developing Countries, pp. 1–360. doi: 10.1007/978-1-4614-1876-4.
- Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sjamsuhidajat & Wim, de Jong (ed). (2004). *Buku Ajar Ilmu Bedah*. Jakarta: EGC.
- Smeltzer & Bare. (2001). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* Brunner & Suddarth. Alih Bahasa: Agung Waluyo, Edisi 8. Jakarta: EGC.
- Smeltzer & Bare. (2012). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* Brunner & Suddarth (Ed.8, Vol.1,2). Jakarta: EGC.
- Solehati, T., & Kosasih. (2015). *Konsep & Aplikasi Relaksasi dalam Keperawatan Maternitas*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwiyoga, I. K. (2017). *Penanganan Nyeri pada Kanker Serviks Stadium Lanjut*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, hal 1-12.
- Teli, Margareta. (2018). *Pedoman Asuhan Keperawatan Komunitas*. Kupang: Lima Bintang.
- Usman, I., & Lakadjo, M. (2018). *Sex Counseling Untuk Mengatasi Disfungsi Seksual Dalam Hubungan Seks Pasangan Suami-Istri. Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Di Perguruan Tinggi, April 2018*, 1–11.
- Wahyuni, Nurul S. (2014). *Dokumentasi Keperawatan*. Ponorogo: UNMUH Ponorogo Press.
- Wen S., Dkk. (2019). *The Risk Factors for Depression in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy: A Sistematic Review*.
- WHO. (2020). International agency for research on cancer (IARC) 2021. Estimated number of deaths in 2020 worldwide, female, all ages. https://gco.iarc.fr/today/online-analysispie?v=2020&mode=cancer&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=2&cancer=39&type=1&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmssc=1&include_nmssc_other=1&half_pie=0&donut=0
- Wuriningsih, Apriliani Y. (2016). *Potret Asuhan Keperawatan Maternitas pada Klien dengan Kanker Serviks Melalui Pendekatan Konservasi dan Efikasi Diri*. *Jurnal Keperawatan dan Pemikiran Ilmiah*. 2(6). 1-11.
- Yang Liping, Yang J, He J, Zhou Y, Zhang Y, Sun B, Gao J, Qian L. *Analysis of Anxiety and Depression Status in Patients Undergoing Radiotherapy During the COVID-19 Epidemic*. *Frontiers in Psychiatry*. 2021. Vol 12. Page 2268. DOI 10.3389/fpsy.2021.771621. ISSN=1664-0640.


Yunitasari, L. N. (2012). Hubungan Beberapa Faktor Demografi dengan Tingkat Kecemasan Pasien Pasca Diagnosis Kanker di RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Medica Hospitalia* Vol 1, 127-129.



LAMPIRAN

A. Pathway





M A K A S A D

Gambar 2.4 WOC Kanker Serviks (Price & Wilson, 2012; Smeltzer, 2015; Ariani, 2015)

B. Jurnal Rujukan Utama



Jurnal Ners Volume 2 Nomor 1 Tahun 2018 Halaman 18 – 27
JURNAL NERS
Research & Learning in Nursing Science
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>



PERBANDINGAN RELAKSASI BENSON DAN RELAKSASI KESADARAN INDERA TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA PASIEN KANKER SERVIKS DI RSUD BANGKINANG TAHUN 2018

Yenny Safitri¹, Erlinawati², Fitri Apriyanti³

yennysafitri37@yahoo.co.id

Dosen FIK Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Abstrak

Beberapa therapy relaksasi yang dapat digunakan oleh pasien dalam menurunkan kecemasan seperti relaksasi benson dan relaksasi kesadaran indera, dimana proses ini akan menghambat aktifitas saraf simpatik yang akan menurunkan konsumsi oksigen oleh tubuh dan selanjutnya otot-otot tubuh menjadi relaks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Penelitian ini menggunakan desain penelitian *quasi eksperiment*, dengan pendekatan *pretest-posttest design with control group*, dengan teknik sampel *accidental sampling* maka ditetapkan 10 orang sebagai sampel kasus dan 10 orang sebagai sampel kontrol. Untuk pengukuran kecemasan pada relaksasi benson dan relaksasi kesadaran indera dilakukan sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan dengan menggunakan skala *Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)* dengan intervensi diberikan selama 1 minggu. Penelitian dilakukan mulai dari pra terapi, terapi, pasca terapi, dan follow-up. Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *t independent*. Berdasarkan hasil penelitian, relaksasi kesadaran indera lebih efektif mengurangi kecemasan dibandingkan dengan relaksasi benson dengan *p Value* 0,00 , 0,005. Oleh karena itu, dianjurkan kepada pihak rumah sakit untuk dapat menerapkan relaksasi ini sebagai alternatif dalam penurunan tingkat kecemasan pada pasien dengan kanker serviks atau tidak yang disertai dengan komplikasi.

kata kunci : kanker serviks, relaksasi benson, dan relaksasi kesadaran indera.

✉Corresponding author :
Address : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang
Email : yennysafitri37@yahoo.co.id
Phone : 085265460467

C. Daftar Riwayat Hidup



Penulis Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Asuhan Keperawatan pada Pasien Kanker Serviks dengan Ansietas Menggunakan Intervensi Relaksasi Benson di Ruang Pinang RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo” bernama lengkap Fina Ekawati, Nim: 70900121006, putri pertama dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Firdaus dan Ibunda Jumriani yang lahir pada tanggal 25 November 1999 di Takalar.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa pada tahun 2005-2011 yakni di SDN Alluka, selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2014 penulis menempuh pendidikan di SMP N 1 Takalar, selanjutnya pada tahun 2014 sampai 2017 penulis melanjutkan pendidikan di SMA N 3 Takalar, dan pada tahun 2017 itu juga penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Selama menyangang sebagai mahasiswa penulis memasuki beberapa organisasi, yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan dan Himpunan Pelajar Masiswa Takalar.

Fina 9/8/22

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

1 %
PUBLICATIONS

11 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.poltekkes-kaltim.ac.id Internet Source	6%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
3	es.scribd.com Internet Source	2%
4	repository.unair.ac.id Internet Source	2%
5	doku.pub Internet Source	2%
6	pdfcoffee.com Internet Source	1%
7	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
8	stikespanakkukang.ac.id Internet Source	1%
9	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%

DOKUMENTASI



Gambar 1 Pemberian Relaksasi Benson pada Pasien 1



Gambar 2 Pemberian Relaksasi Benson pada Pasien 2