

**SKRINING VIRTUAL SENYAWA-SENYAWA DARI BEBERAPA
TANAMAN YANG ADA DI INDONESIA SEBAGAI
ANTI MALARIA DAN ANTI TUBERKULOSIS**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :
Iffah Kholifah Umamity
70100113054

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Iffah Kholifah Umamity
NIM : 70100113054
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon/26 September 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo
Judul Penelitian : Skrining Virtual Senyawa-Senyawa dari Beberapa
Tanaman yang Ada di Indonesia sebagai Anti Malaria
dan Anti Tuberkulosis

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Agustus 2017

Penyusun



Iffah Kholifah Umamity

NIM: 70100113054

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Skrining Virtual Senyawa-Senyawa dari Beberapa Tanaman yang Ada di Indonesia sebagai Anti Malaria dan Anti Tuberkulosis**" yang disusun oleh **Iffah Kholifah Umamity**, NIM: **70100113054**, mahasiswa jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin, 15 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqa'idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji Kompetensi	: Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji Agama	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A.	(.....)



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.
NIP.19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan sebaik-baik nikmat iman dan islam, serta nikmat akal dan pikiran, juga limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat.

Skripsi dengan judul “Skrining Virtual Senyawa-Senyawa dari Beberapa Tanaman yang Ada di Indonesia Sebagai Anti Malaria dan Anti Tuberkulosis” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd. Chalik Umamity dan Ibunda Umi Rahawarin yang tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingannya.

Untuk saudara(i)ku tercinta Eva Zulfitriani, Nabila Mawarni, Naimah Sari Ridhayati, Idah Kholidah, Ayu Rahmiyati, Annisa Adila, Muhammad Syaifullah, dan Muhammad Arif Syafa'at, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingan, serta dukungannya kepada penulis. Tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah diberikan. Kalian adalah semangat terbesar

bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku ketua jurusan dan Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku sekretaris jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing akademik.
8. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. Selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis, dan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Semoga Allah Swt. membalas bantuan bapak dan ibu dengan pahala bahkan hal yang lebih baik, di dunia dan akhirat.
9. Ibu Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si., Apt. Selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan saran dan kritiknya demi perbaikan dan kelengkapan skripsi

ini, serta Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan pengarahan sekaligus bimbingan terhadap kelengkapan dan perbaikan khususnya tinjauan agama skripsi ini.

10. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah Swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
11. Teman-teman seperjuangan “Pak Salam Squad” Ammah, Kiah, Dilah, Dhiba, Nurwa, Anwar, Faris, Amir, Ihsan, Ari, dan Dayat. Terima kasih untuk kebersamaan dan semangatnya hingga akhir.
12. Sahabat-sahabat terbaik, Nurul, Dila, dan Rahmat Pakay, untuk setiap doa dan motivasinya.
13. Saudara-saudara seperjuangan angkatan 2013 “Farbion” yang telah banyak membantu dan telah berjuang bersama dari awal hingga akhir.
14. Kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Aamiin Ya Rabbal Alaamiin.

Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 15 Agustus 2017

Penyusun



Iffah Kholifah Umamity

NIM: 70100113054

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1. Definisi Operasional.....	6
2. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian.....	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Malaria	13
1. Etiologi	13

2. Siklus Hidup Plasmodium Penyebab Malaria	13
3. Klasifikasi Obat Anti Malaria.....	15
4. Mekanisme Kerja Senyawa Antimalaria	17
5. Target Terapi Malaria.....	20
B. Tuberkulosis.....	21
1. Etiologi	21
2. Penularan	22
3. Mekanisme Kerja Obat-obat Anti Tuberkulosis dan Resistensinya	23
4. Target Terapi Tuberkulosis	31
C. Skrining Virtual.....	31
D. Penambatan Molekuler.....	33
E. Pemograman Penambatan Molekuler	35
1. Hyperchem.....	35
2. Protein Data Bank.....	35
3. MOE (<i>Molecular Operating Environment</i>).....	36
F. Tinjauan Islam	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	41
1. Waktu Penelitian.....	41
2. Lokasi Penelitian	41
C. Pendekatan Penelitian	41
D. Perangkat Penelitian.....	41
E. Prosedur Kerja.....	42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Malaria	49
B. Tuberkulosis	54
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
KEPUSTAKAAN	81
LAMPIRAN	82
RIWAYAT HIDUP	83



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Siklus hidup Plasmodium penyebab malaria	14
Gambar 2 Struktur senyawa artemisin	17
Gambar 3 Struktur senyawa klorokuin	18
Gambar 4 Struktur senyawa isoniazid.....	23
Gambar 5 Struktur senyawa rifampin	25
Gambar 6 Struktur senyawa etambutol.....	26
Gambar 7 Struktur senyawa streptomisin.....	27
Gambar 8 Struktur senyawa pirazinamida.....	28
Gambar 9 Struktur senyawa etionamida	29
Gambar 10 Struktur senyawa sikloserin	29
Gambar 11 Jendela mesin pencari jurnal	42
Gambar 12 Jendela <i>Hyperchem</i>	43
Gambar 13 Panel <i>database</i> senyawa pada MOE	44
Gambar 14 Panel optimasi <i>Forcefield</i> MMFF94x menggunakan program MOE	44
Gambar 15 Panel pencarian konformasi	45
Gambar 16 Panel <i>Superpose</i>	46
Gambar 17 Panel <i>Pharmacophore Query Editor</i>	47
Gambar 18 Panel <i>Pharmacophore Search</i> untuk skrining virtual	47
Gambar 19 Panel simulasi <i>Docking</i>	48
Gambar 20 a. Fitur farmakofor <i>1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase</i> (Dxr); b. Fitur farmakofor pada literatur	54
Gambar 21 Interaksi Ligan RF7 dengan protein DXR 4Y6R.....	54
Gambar 22 Fitur farmakofor <i>Thymidilate synthase</i> (ThyX)	61

Gambar 23 Ligan *Thymidilate synthase* (ThyX) pada literatur 61
Gambar 24 Interaksi ligan FAD dengan protein ThyX 2AF6..... 62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Kerja 87



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Interaksi ligan dengan protein <i>1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase</i> (Dxr)	50
Tabel 2	Senyawa <i>hits</i> dengan reseptor Dxr.....	56
Tabel 3	Hasil <i>docking</i> senyawa <i>hits</i> pada reseptor <i>1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase</i> (Dxr).....	57
Tabel 4	Interaksi ligan dengan protein <i>Thymidylate Synthase</i> (ThyX).....	59
Tabel 5	Senyawa <i>hits</i> dengan reseptor <i>Thymidilate synthase</i> (ThyX)	62
Tabel 6	Hasil <i>docking</i> senyawa <i>hits</i> dengan reseptor <i>Thymidilate synthase</i> (ThyX).....	73

ABSTRAK

Nama : Iffah Kholifah Umamity

NIM : 70100113054

Judul Skripsi : **Skrining Virtual Senyawa-Senyawa dari Beberapa Tanaman yang Ada di Indonesia Sebagai Anti Malaria dan Anti Tuberkulosis**

Penyakit malaria dan tuberkulosis saat ini merupakan masalah penyakit infeksi yang mematikan di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pencarian senyawa baru anti malaria dan anti tuberkulosis dapat dilakukan terutama dari tanaman. Indonesia merupakan negara urutan kedua di dunia yang memiliki lebih dari 38.000 spesies tanaman dan sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai agen anti malaria dan anti tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan senyawa yang berpotensi sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia. Prosedur dimulai dengan mencari senyawa tanaman dari mesin pencari jurnal seperti *Springer link*, *Pubmed*, *Science Direct*. Senyawa yang telah didapat digambar menggunakan pemodelan molekul pada perangkat lunak *Hyperchem* dan optimasi struktur molekul menggunakan metode *Forcefield MMFF94x* pada perangkat lunak MOE. Pembuatan fitur farmakofor dilakukan dengan mengunduh protein *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr)* untuk anti malaria, dan *Thymidilate synthase (ThyX)* untuk anti tuberkulosis pada *Protein Data Bank*. Fitur farmakofor ditentukan berdasarkan literatur dengan melihat kecocokan pengikatannya dengan reseptor. Setelah itu, dilakukan Skrining virtual berdasarkan ligan dengan menggunakan perangkat lunak MOE. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh senyawa-senyawa yang paling baik diantara 4815 senyawa yang dilihat dari sisi kecocokan pada *query farmakofor* sebagai anti malaria yaitu *Lecithin* dari tanaman Jelatang (*Urtica dioica* L.) dan anti tuberkulosis yaitu *Ajugose*, *Lantanose A*, *Lantanose B*, *Stachyose*, *Verbascose*, *Theveside* dari tanaman Tembelekan (*Lantana camara* L.); *Carthamin*, *Anhydrosafflor yellow B*, *Hydroxysafflor yellow A*, *Saffloquinoside A*, *Safflor yellow B* dari tanaman Kesumba (*Carthamus tinctorius*); *Parameritannin A-1*, *Cinnamtannin B-1*, *Aesculitannin B*, *Proanthocyanidin A* dari tanaman Kayu Rapet (*Parameria laevigata*); *Acetyljujuboside B* dari tanaman Bidara Cina (*Zizyphus jujuba*); *Bruceoside A* dari tanaman Buah Makasar (*Brucea javanica*); *Melittoside* dari tanaman Daun Sendok (*Plantago major*); *1,2,3,4,6-pentagalloylglucose*, *Gemin D*, *Woodfordin C* dari Bunga Sidawayah (*Woodfordia fruticosa*); *Narcissoside* dari tanaman Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.); *Rubrofusarin-6-β-gentiobioside* dari tanaman Ketapang Kecil (*Cassia tora*).

Kata kunci: Skrining virtual, Tanaman Indonesia, Malaria, Tuberkulosis.

ABSTRACT

Nama : Iffah Kholifah Umamity

NIM : 70100113054

Judul Skripsi : **Virtual Screening of Compounds from Some Plants in Indonesia as Anti Malaria and Anti Tuberculosis**

Malaria and tuberculosis is a deadly infectious disease problem in the world, not exception Indonesia. The search for new anti-malarial and anti-tuberculosis compounds can be done primarily from plants. Indonesia is the second most populous country in the world with more than 38,000 plant species and has the potential to be developed as an anti-malaria and anti-tuberculosis agent. This study aims to find potentially anti-malarial and anti-tuberculosis compounds from several plants in Indonesia. The procedure begins by searching for plant compounds from search engine journals such as *Springer links*, *Pubmed*, *Science Direct*. The compounds that have been obtained are drawn using molecular modeling in *Hyperchem* software and molecular structure optimization using the *Forcefield MMFF94x* method in MOE software. Pharmacofor features were performed by downloading *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr)* protein for anti malaria, and *Thymidilate synthase (ThyX)* for anti-tuberculosis in Protein Data Bank. The pharmacofor features are determined on the basis of the literature by looking at their binding fit with the receptor. After that, Virtual Screening is based on ligands using MOE software. Based on the results of the research, the best compounds among 4815 compounds seen from the compatibility side of the farmakofor query as anti malaria is *Lecithin* from Jelatang (*Urtica dioica* L.) and anti-tuberculosis are *Ajugose*, *Lantanose A*, *Lantanose B*, *Stachyose*, *Verbascose*, *Theveside* from Lantana plant (*Lantana camara* L.); *Carthamin*, *Anhydrosafflor yellow B*, *Hydroxysafflor yellow A*, *Saffloquinoside A*, *Safflor yellow B* from Kesumba plant (*Carthamus tinctorius*); *Parameritannin A-1*, *Cinnamtannin B-1*, *Aesculitannin B*, *Proanthocyanidin A* from Rapet Wood (*Parameria laevigata*); *Acetyljujuboside B* from Jujuba plant (*Zizyphus jujuba*); *Bruceoside A* from Makasar fruit plant (*Brucea javanica*); *Melittoside* from Plantago plant (*Plantago major*); *1,2,3,4,6-pentagalloylglucose*, *Gemin D*, *Woodfordin C* from Sidawayah flower (*Woodfordia fruticosa*); *Narcissoside* from Noni plant (*Morinda citrifolia* L.); *Rubrofusarin-6- β -gentiobioside* from the Small Ketapang plant (*Cassia tora*).

Keywords: Virtual Screening, Indonesian Plants, Malaria, Tuberculosis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit malaria dan tuberkulosis saat ini merupakan masalah global yang mendunia, tidak terkecuali Indonesia. Komitmen global pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan upaya pemberantasan malaria dan tuberkulosis ke dalam salah satu tujuan bersama yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030 melalui tujuan ketiga yaitu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia, dimana target 3.3 dengan tegas dikatakan “Pada 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya” (World Health Organization, 2016).

Malaria merupakan penyakit infeksi yang bersifat endemik di dunia. Pada tahun 2015, diperkirakan terjadi 212 juta kasus malaria di seluruh dunia. Kebanyakan kasus pada tahun 2015 terjadi di bagian Afrika (90%), diikuti oleh bagian Asia Selatan-Timur (7%) dan bagian Mediterania Timur (2%). Indonesia termasuk ke dalam negara endemik malaria 2016 (World Health Organization, 2016). Berdasarkan endemisitas malaria di kabupaten/kota terlihat penurunan jumlah yang sangat tajam pada daerah endemis tinggi dari 17,4% pada tahun 2011 menjadi 8,8% pada tahun 2015. Dan daerah endemis sedang juga menurun dari 18,6% tahun 2011 menjadi 17% pada tahun 2015, serta daerah endemis rendah juga mengalami penurunan yang tajam dari 42,8% pada tahun 2011 menjadi 28,8% pada tahun 2015. Sebaliknya daerah bebas malaria mengalami peningkatan dari 21,5% pada tahun 2011 menjadi 45,4% pada tahun 2015. Lima provinsi dengan Angka Kesakitan Malaria (*Annual Paracite*

Incidence/API) per 1.000 penduduk tertinggi yaitu Papua (31,93), Papua Barat (31,29), Nusa Tenggara Timur (7,04), Maluku (5,81), dan Maluku Utara (2,77). Sedangkan provinsi yang tidak terdapat API yaitu Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur (Sekretariat Jenderal Kemenkes RI, 2016).

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang mematikan. WHO melaporkan dalam *Global Tuberculosis Report* tahun 2016, diperkirakan adanya 10,4 juta kasus baru (kejadian) tuberkulosis di seluruh dunia, dimana 5,9 juta (56%) adalah laki-laki, 3,5 juta (34%) perempuan dan 1,0 juta (10%) anak-anak. Adapun penderita HIV terhitung 1,2 juta (11%) dari semua kasus TB baru. Enam negara yang terhitung untuk 60% kasus baru yaitu India, Indonesia, Cina, Nigeria, Pakistan dan Afrika Selatan. Kemajuan global bergantung pada peningkatan pencegahan dan asuhan TB pada negara-negara ini (World Health Organization, 2016). Di Indonesia, pada tahun 2015 ditemukan jumlah kasus tuberkulosis sebanyak 330.910 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2014 yang sebesar 324.539 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di provinsi dengan jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut sebesar 38% dari jumlah seluruh kasus baru di Indonesia (Sekretariat Jenderal Kemenkes RI, 2016).

Pengobatan dari kedua penyakit di atas, telah mengalami resistensi terhadap terapi lini pertama sehingga menjadi tantangan besar untuk pengendalian penyakit tersebut. Resistensi obat malaria dan tuberkulosis (TB) merupakan masalah kesehatan utama global (Chansuda Wongsrichanalai, 2010).

Resistensi obat malaria terjadi terhadap beberapa regimen obat utama termasuk turunan artemisinin yang merupakan benteng utama pengobatan kemoterapi

malaria, maka sebuah strategi terapeutik baru dan maju perlu diterapkan untuk menahan dan mengurangi penyebaran resistensi (Kumar, 2017). Strain *Plasmodium falciparum* yang resisten terhadap Artemisinin telah muncul dan menyebar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi efikasi pengobatan. Sebelumnya, resistensi terhadap dua anti-malaria utama, klorokuin dan sulfadoksin-pirimetamin (SP), muncul di Asia Tenggara dan menyebar ke Afrika, menunjukkan bahwa penyebaran resistensi artemisinin mungkin terjadi (Slater, Jamie T. Griffin, & Okell, 2016).

Resistensi yang terjadi pada tuberkulosis terdiri atas dua tipe penting yang telah diidentifikasi, yaitu TB-MDR (*Multi-Drug Resistant*), yang resisten terhadap kedua obat lini pertama pengobatan TB standar, isoniazid dan rifampisin; dan TB-XDR (*Extensively Drug Resistant*), yang resisten terhadap isoniazid, rifampisin, setidaknya satu fluoroquinolon, dan salah satu pengobatan injeksi lini kedua (amikasin, kapreomicin, kanamisin). Secara global, 3,3% persen kasus TB baru adalah TB-MDR. Proporsi ini jauh lebih tinggi (20%) di antara pasien yang sebelumnya pernah menerima pengobatan TB. Pada tahun 2014, terdapat 480.000 kasus baru TB-MDR di seluruh dunia (Manjelievskaiiaa, Erckb, Pirachab, & Schragar, 2016).

Masalah resistensi pada kedua penyakit ini turut berkontribusi dalam meningkatnya kesulitan pengobatan dan pengontrolan penyakit. Untuk itu dibutuhkan pengembangan dari senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis yang baru dan poten serta efek samping yang kurang. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode komputasi (*in silico*).

Selama dua dekade terakhir metode komputasi (*in silico*) telah menurunkan beban biaya dan eksperimental dari proses penemuan obat baru. Metode *in silico* ini saling melengkapi dan dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam metode *in vitro* dan *in vivo* untuk menguji hipotesis farmakologis (Kortagere, Lill, & Kerrigan, 2012). Diperkirakan bahwa siklus penemuan obat, dari identifikasi senyawa penuntun sampai uji klinis, dapat memakan waktu 14 tahun dengan biaya 800 juta dolar AS. Pada awal 1990-an, perkembangan pesat di bidang kimia kombinatorial dan teknologi skrining virtual dapat mempercepat proses penemuan obat yang memungkinkan sejumlah besar senyawa disintesis dan diskriminasi dalam waktu singkat (Rahman, Karim, Ahsan, Khalipha, Chowdhury, & Saifuzzaman, 2012).

Skrining virtual, juga disebut skrining *in silico*, merupakan cabang baru dari kimia medisinal yang merupakan metode cepat dan hemat biaya untuk skrining secara komputasi dari suatu *database* untuk menemukan obat baru. Skrining virtual menggunakan metode berbasis komputasi untuk menemukan ligan baru berdasarkan struktur biologis (Vyas, Jain, Jain, & Gupta, 2008). Salah satu metode yang digunakan dalam proses skrining virtual adalah dengan menggunakan teknik penyaringan berbasis ligan yang berfokus pada perbandingan analisis kemiripan molekuler senyawa dengan bagian yang diketahui dan tidak diketahui, terlepas dari metode algoritma yang digunakan melalui simulasi penambatan molekuler atau *docking*. Skrining virtual dapat dilakukan sekaligus terhadap ribuan senyawa dalam suatu *database*, termasuk senyawa-senyawa yang terdapat pada tanaman.

Indonesia dikenal sebagai negara *Mega-diversity* karena kaya akan keanekaragaman, termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Untuk keanekaragaman tumbuhan, Indonesia merupakan negara urutan kedua di dunia, yang

memiliki lebih dari 38.000 spesis (55% endemik) (Amason, 2005). Sekitar 7.000 spesis diakui sebagai tumbuhan obat, dengan 950 diketahui memiliki sifat obat; 283 spesis terdaftar, dikultur dan digunakan oleh industri obat tradisional, dan 250 lainnya dipanen langsung dari hutan sebagai bahan mentah oleh industri tersebut. Hanya sekitar 187 spesis yang digunakan sebagai bahan dasar oleh industri obat tradisional (Bermawie, 2004). Kekayaan tumbuhan yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadi potensi yang besar untuk dapat dikembangkan dalam pencarian obat-obat baru termasuk obat anti malaria dan anti tuberkulosis.

Salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. adalah penciptaan berbagai jenis tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut dalam meningkatkan kesehatan manusia dimana khasiatnya dapat mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit, dalam hal ini sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa syukur dan yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti bermaksud untuk menemukan senyawa yang berpotensi sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia menggunakan metode komputasi. Senyawa-senyawa diskriminasi dengan melihat kecocokannya pada fitur farmakofor yang dilihat berdasarkan pengikatannya dengan protein *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr) untuk anti malaria, dan *Thymidilate synthase* (ThyX) untuk anti tuberkulosis menggunakan perangkat lunak MOE 2009.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah senyawa kimia yang berkhasiat sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis?
2. Apakah tanaman yang memiliki kandungan senyawa sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Skrining Virtual didefinisikan sebagai proses evaluasi secara otomatis terhadap kumpulan data senyawa yang sangat besar menggunakan bantuan program komputer yang bertujuan untuk menemukan dan mengidentifikasi senyawa yang baru dan mempunyai aktivitas yang poten terhadap target yang dituju. Virtual skrining bertujuan untuk menemukan senyawa asal tanaman yang hit atau memiliki fitur kimia yang mirip dengan fitur farmakofor (Mohan, Gibbs, Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 2005).

Farmakofor merupakan posisi geometrik tiga dimensi dari gugus yang terdapat di dalam suatu ligan yang membentuk suatu pola yang unik dan dapat dikenali oleh reseptor secara spesifik yang bertanggung jawab terhadap proses pengikatan ligan dengan suatu reseptor dan aktivitas reseptor tersebut (Mohan, Gibbs, Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 2005).

Penambatan molekuler atau *molecular docking* adalah prosedur komputasional yang digunakan untuk memprediksikan ikatan non-kovalen makromolekul, lebih sering, sebuah molekul besar (reseptor) dan sebuah molekul kecil (ligan) secara efisien, dimulai dari struktur-struktur yang tidak saling berikatan, struktur yang ditemukan dari simulasi dinamika molekul, *homology modeling*, dll.

Tujuan dari *molecular docking* adalah untuk memprediksikan konformasi ikatan dan afinitas pengikatan (Yanuar, 2012).

Database tanaman, merupakan kumpulan data struktur tiga dimensi senyawa-senyawa kimia dari beberapa tanaman obat di Indonesia yang dibuat berdasarkan *Materia Medika Indonesia*, *Farmakope Herbal Indonesia* dan tanaman-tanaman endemik di Indonesia.

Protein Data Bank (PDB) merupakan tempat penampungan data struktur 3D dari protein dan asam nukleat. Situs PDB dapat diakses pada alamat <http://www.pdb.org> oleh seluruh pengguna internet seluruh dunia secara gratis (Yanuar, 2012).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Melakukan skrining virtual senyawa-senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia berdasarkan kesesuaian dengan fitur farmakofor, dan mengamati interaksi yang terjadi antara senyawa-senyawa tersebut terhadap situs pengikatan protein-protein target, serta mengevaluasi hasil skrining virtual secara *in silico*.

D. Kajian Pustaka

1. Dalam jurnal penelitian “*Virtual Screening Techniques to Probe the Antimalarial Activity of Some Traditionally Used Phytochemicals*” (Shibi, Aswathya, Jisha, Masand, & Gajbhiye, 2016) melaporkan sebuah pendekatan baru dimana skrining virtual dari 292 fitokimia unik yang ada dalam 72 ramuan tradisional penting, yang digunakan untuk menemukan inhibitor *plasmepsin-2* dan *falcipain-2* untuk aktivitas antimalaria terhadap *P. falciparum*. Skrining awal molekul yang dipilih oleh model algoritma *Random*

Forest dari Weka menggunakan dataset *bioassay* AID 504850 dan AID 2302 menyaring 120 dari total 292 fitokimia yang aktif terhadap target. *Toxtree scan* memperingatkan 21 senyawa karsinogenik maupun mutagenik dan dengan demikian dikeluarkan dari analisis lebih lanjut. Dari 99 senyawa yang tersisa, hanya 46 senyawa yang memberikan kemiripan obat sesuai kriteria aturan lima Lipinski. Dari sepuluh target obat antimalaria, hanya dua protein target seperti 3BPF dan 3PNR *falcipain-2* dan 1PFZ dan 2BJU dari *plasmepsin-2* yang dipilih sebagai target. Potensi pengikatan dari 46 senyawa terpilih ke sisi aktif dari keempat target ini dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak MOE. Konformasi *docking* dan interaksi dengan residu kantong pengikatan protein target diketahui dengan analisis 'Ligplot'. Telah ditemukan bahwa 8 senyawa adalah inhibitor ganda *falcipain-2* dan *plasmepsin-2*, dengan energi pengikatan terbaik. Senyawa 117 (*6aR, 12aS*)-*12a-Hydroxy-9-methoxy-2,3-dimethyle-enedioxy-8-prenylrotenone* (*Usaratenoid C*) yang ada pada tanaman *Millettia usaramensis* menunjukkan skor *docking* molekul maksimum.

Penelitian diatas menggunakan 72 tanaman yang telah diketahui memiliki khasiat sebagai anti malaria secara tradisional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui khasiat anti malaria dan anti tuberkulosis dari tanaman yang ada di Indonesia.

2. Dalam jurnal penelitian yang berjudul “*Identification of Novel PfdHODH Inhibitors as Antimalarial Agents via Pharmacophore-Based Virtual Screening Followed by Molecular Docking and In Vivo Antimalarial Activity*” (Vyasa, Qureshi, Ghatea, Patel, & Dalai, 2016), menggambarkan skrining

virtual berbasis farmakofor yang dikombinasikan dengan studi *docking* dan evaluasi biologis sebagai strategi rasional untuk mengidentifikasi senyawa baru sebagai agen antimalaria. Model farmakofor ditentukan dari inhibitor *PfDHODH* yang diketahui menggunakan modul GALAHAD dengan nilai IC50 berkisar antara 0,033 μM sampai 142 μM . Model farmakofor terbaik terdiri dari tiga ikatan hidrogen akseptor, satu ikatan hidrogen donor dan satu fitur hidrofobik. Model farmakofor divalidasi melalui karakteristik operasi penerima dan metode penilaian *Günere-Henry*. Model farmakofor terbaik sebagai kueri penelusuran 3D ditelusuri pada *database* IBS. Beberapa senyawa dengan struktur yang berbeda (perancah) diambil sebagai molekul hit. Di antara senyawa-senyawa ini, yang memiliki nilai QFIT lebih dari 81 di-*docking* pada enzim *PfDHODH* untuk mengeksplorasi lebih jauh jenis pengikatan senyawa ini. Farmakokinetik dan toksisitas diprediksi secara *In silico* untuk molekul terbaik. Akhirnya, hasil hit yang teridentifikasi dievaluasi secara *in vivo* untuk aktivitas antimalaria pada alat penghambat parasit. Hit yang dilaporkan di sini menunjukkan potensi yang baik untuk menjadi agen antimalaria baru.

Penelitian di atas melakukan skrining virtual berbasis farmakofor untuk mengidentifikasi senyawa baru sebagai agen antimalaria menggunakan protein *PfDHODH*. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan protein yang selektif yaitu *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr).

3. Dalam jurnal penelitian “*In Silico Discovery and Virtual Screening of Multi-Target Inhibitors for Proteins in Mycobacterium tuberculosis*”, oleh Speck-Planche A, Kleandrova VV, Luan F, Cordeiro MN tahun 2012, telah

dilakukan penelitian tentang pencarian obat baru untuk tuberkulosis (TB). Daerah aktif untuk pencarian terapi anti-TB baru berkaitan dengan penggunaan pendekatan komputasi berdasarkan kemoinformatika dan/atau bioinformatika menuju penemuan agen anti-TB baru dan ampuh. Peneliti memperkenalkan pendekatan kemo-bioinformatika pertama dengan mengembangkan multi-target (mt) QSAR Model diskriminan, untuk desain *in silico* dan skrining virtual agen anti-TB terhadap enam protein di *Mycobacterium tuberculosis* (MTB). Model mt-QSAR dikembangkan dengan menggunakan *database* besar dan heterogen dari senyawa-senyawa dan deskriptor substruktural. Model dengan benar diklasifikasikan lebih dari 90% dari senyawa aktif dan tidak aktif dari keduanya, pelatihan dan seri prediksi. Beberapa fragmen yang diambil dari molekul dan kontribusi mereka untuk kegiatan anti-TB melalui penghambatan enam protein, dihitung. Beberapa fragmen diidentifikasi bertanggung jawab untuk aktivitas anti-TB dan entitas molekul baru yang dirancang dari fragmen dengan kontribusi positif, yang sangat disarankan sebagai agen anti-TB baru (Speck-Planche, Kleandrova, Luan, & Cordeiro, 2012).

Penelitian di atas melakukan pencarian obat baru untuk tuberkulosis dengan mengidentifikasi protein yang bertanggung jawab untuk aktivitas anti-TB serta menjalankan skrining virtual terhadap multi-target. Penelitian yang akan dilakukan pencarian obat baru untuk tuberkulosis dengan cara menjalankan skrining virtual terhadap target anti tuberkulosis yang selektif.

4. Dalam jurnal penelitian "*Identification of Promising DNA Gyrase Inhibitors for Tuberculosis Using Pharmacophore-Based Virtual Screening, Molecular*

Docking and Molecular Dynamics Studies” (Islam & Pillay, 2017) dilakukan pencarian senyawa inhibitor DNA *GyrB* yang potensial dengan menggunakan skrining virtual berbasis farmakofor diikuti dengan pendekatan *docking* molekuler dan simulasi dinamika molekuler. Untuk penelitian ini, satu set dari 248 inhibitor DNA *GyrB* dikumpulkan dari literatur dan model farmakofor yang telah divalidasi dengan baik dihasilkan. Model farmakofor terbaik menjelaskan bahwa masing-masing dari ikatan hidrogen akseptor dan hidrofobitas sangat penting untuk penghambatan DNA *GyrB*. Hasil statistik yang baik dari model farmakofor menunjukkan bahwa model tersebut bersifat kuat di alam. Skrining virtual dari *database* molekuler menyatakan tiga molekul sebagai agen antimikobakteri yang potensial. Senyawa akhir yang telah diskining dievaluasi dalam studi simulasi *docking* molekuler dan dinamika molekuler. Dalam studi dinamika molekuler, nilai RMSD dan RMSF yang tidak diragukan lagi menjelaskan bahwa senyawa yang disaring membentuk kompleks yang stabil dengan DNA *GyrB*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa senyawa yang diidentifikasi mungkin memiliki potensi untuk pengobatan TB.

Penelitian di atas melakukan skrining virtual berbasis farmakofor untuk mengidentifikasi senyawa baru sebagai agen anti tuberkulosis menggunakan protein DNA *GyrB*. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan protein yang selektif yaitu *Thymidilate synthase* (ThyX).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menentukan senyawa kimia yang berkhasiat sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis.
- b. Menentukan tanaman yang memiliki kandungan senyawa sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai kemampuan senyawa-senyawa yang ada pada tanaman-tanaman di Indonesia sebagai senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis, serta membantu dalam memberi informasi pada penemuan obat anti malaria dan anti tuberkulosis baru.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Malaria*

1. Etiologi


Malaria disebabkan oleh parasit sporozoa plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *anopheles* betina infeksius. Sebagian besar nyamuk *anopheles* akan menggigit pada waktu senja atau malam hari, pada beberapa jenis nyamuk puncak gigitan adalah tengah malam sampai fajar (Widoyono, 2011).

Plasmodium akan mengalami dua siklus. Siklus aseksual (skizogoni) terjadi pada tubuh manusia, sedangkan siklus seksual (sporogoni) terjadi pada nyamuk. Siklus seksual dimulai dengan bersatunya gamet jantan dan betina untuk membentuk ookinet dalam perut nyamuk. Ookinet akan menembus dinding lambung untuk membentuk kista di selaput luar lambung nyamuk. Waktu yang diperlukan sampai pada proses ini adalah 8-35 hari, tergantung dari situasi lingkungan dan jenis parasitnya. Pada tempat inilah kista akan membentuk ribuan sporozoit yang terlepas kemudian tersebar ke seluruh organ nyamuk termasuk kelenjar ludah nyamuk. Pada kelenjar inilah sporozoit menjadi matang dan siap ditularkan bila nyamuk menggigit manusia (Widoyono, 2011).

2. Siklus Hidup Plasmodium Penyebab Malaria

Manusia yang tergigit nyamuk infeksius akan mengalami gejala sesuai dengan jumlah sporozoit, kualitas plasmodium, dan daya tahan tubuhnya. Sporozoit akan memulai stadium eksoeritrositer dengan masuk ke sel hati. Di hati sporozoit matang menjadi skizon yang akan pecah dan melepaskan merozoit jaringan. Merozoit akan memasuki aliran darah dan menginfeksi eritrosit untuk memulai siklus eritrositer.

Merozoit dalam eritrosit akan mengalami perubahan morfologi yaitu: merozoit → bentuk cincin → trofozoit → merozoit. Proses perubahan ini memerlukan waktu 2-3 hari. Di antara merozoit-merozoit tersebut akan ada yang berkembang membentuk gametosit untuk kembali memulai siklus seksual menjadi mikrogamet (jantan) dan makrogamet (betina). Eritrosit yang terinfeksi biasanya pecah yang bermanifestasi pada gejala klinis. Jika ada nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi ini, maka gametosit yang ada pada darah manusia akan terhisap oleh nyamuk. Dengan demikian, siklus seksual pada nyamuk dimulai, demikian seterusnya penularan malaria. Masa inkubasi malaria sekitar 7-30 hari tergantung spesiesnya. *P. falciparum* memerlukan waktu 7-14 hari, *P. vivax* dan *P. ovale* 8-14 hari, sedangkan *P. malariae* memerlukan waktu 7-30 hari (Widoyono, 2011).



Gambar 1 Siklus hidup Plasmodium penyebab malaria

Dalam tahapan siklus Plasmodium dapat berlangsung keadaan-keadaan berikut (Soedarto, 2011):

- a. Siklus preeritrositik: periode mulai dari masuknya parasit ke dalam darah sampai merozoit dilepaskan oleh skizon hati, dan menginfeksi eritrosit.
- b. Periode prepaten: waktu antara terjadinya infeksi dan ditemukannya parasit di dalam darah perifer.
- c. Masa inkubasi: waktu antara terjadinya infeksi dengan mulai terlihatnya gejala penyakit.
- d. Siklus eksoeritrositik: siklus yang terjadi sesudah merozoit terbentuk di skizon hepatic, merozoit menginfeksi ulang sel hati dan terulangnya kembali skizogoni.
- e. Siklus eritrositik: waktu yang berlangsung mulai masuknya merozoit ke dalam eritrosit, terjadinya reproduksi aseksual di dalam eritrosit, dan pecahnya eritrosit yang melepaskan lebih banyak merozoit.
- f. Demam paroksimal: serangan demam yang berulang pada malaria akibat pecahnya skizon matang dan masuknya merozoit ke dalam aliran darah.
- g. Rekuren: kambuhnya malaria sesudah beberapa bulan tanpa gejala.

3. Klasifikasi Obat Anti Malaria

Obat anti malaria dapat dikelompokkan atas dua golongan, yaitu alkaloid alami, misalnya kina dan antimalaria sintetis. Obat antimalaria sintetis adalah 9-aminoakridin (mepakrin) misalnya atabrin, kuinakrin, 4-aminokuinolin (klorokuin, amodiakuin), 8-aminokuinolin (primakuin, pamakuin), biguanid (proguanil, klorproguanil) dan pirimidin (pirimetamin).

Obat anti malaria dapat juga diklasifikasi berdasarkan aktivitas antimalariannya dan pada strukturnya (Soedarto, 2011):


- a. Gametositosida. Obat-obat ini membunuh bentuk seksual parasit yang ada dalam darah sehingga dapat mencegah penularan infeksi parasit ke nyamuk. Klorokuin dan kuinin mempunyai aktivitas terhadap *P. vivax* dan *P. malariae*. Primakuin memiliki kemampuan gametositosida dalam memberantas semua jenis plasmodium termasuk *P. falciparum*.
- b. Sporontosida. Obat-obat ini menghambat perkembangan ookista yang ada di dalam tubuh nyamuk sehingga menghentikan penularan malaria. Primakuin dan kloroguanid termasuk obat golongan ini.
- c. Skizontisida jaringan untuk pencegahan. Obat-obat ini bekerja pada plasmodium bentuk jaringan primer yang sesudah berkembang di dalam sel hati akan berkembang menjadi bentuk atau stadium eritrositik. Dengan menghambat stadium ini perkembangan selanjutnya tidak terjadi. Tetapi karena sukar menduga adanya infeksi sebelum tampak gejala klinik, maka terapi pencegahan ini sukar dilakukan. Obat anti malaria yang bekerja terhadap skizon jaringan adalah primetamin dan primakuin.
- d. Skizontisida untuk mencegah kekambuhan (*relapse*). Primetamin dan primakuin yang termasuk golongan ini bekerja terhadap hipnozoit dari *P. vivax* dan *P. ovale* yang ada di sel-sel hati yang menjadi penyebab terjadinya kekambuhan pada malaria vivax dan malaria ovale.
- e. Skizontisida darah. Obat-obat ini bekerja pada bentuk parasit plasmodium yang ada di dalam darah, sehingga akan menghentikan serangan klinis malaria. Obat-

obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah klorokuin, kuinin, meflokuin, halofantrin, pirimetamin, sulfadoksin, sulfon, tetrasiklin, dan lainnya.

4. Mekanisme Kerja Senyawa Antimalaria

a. Artemisin dan turunannya (Hardman & Limbird, 2012)

Artemisin adalah suatu endoperoksida lakton seskuiterpen yang berasal dari rumput liar *qing hao* (*Artemisia annua*), yang juga disebut *sweet wormwood* atau *annual wormwood*. Pada tahun 1972, para ilmuwan Cina telah mengekstraksi dan mengkristalisasi bahan antimalaria utama, *qinghaosu*, yang saat ini dikenal dengan artemisin. Mereka mensintesis 3 turunan artemisin yang potensi antimalarianya lebih besar daripada artemisin itu sendiri, yaitu dihidroartemisin, suatu produk tereduksi; artemeter, suatu metil ester larut-minyak; dan artesunat, garam hemisuksinat dihidroartemisin yang larut air.




Gambar 2 Struktur senyawa artemisin

Aktivitas Antiparasit. Gugus endoperoksida dibutuhkan untuk aktivitas antimalaria senyawa-senyawa artemisin, sedangkan substitusi pada gugus karbonil lakton meningkatkan potensi secara cepat terhadap tahap-tahap aseksual eritrositik *P. vivax* dan galur-galur *P. falciparum* yang peka-klorokuin, resisten-klorokuin, dan resisten-multiobat. Potensi obat-obat ini secara *in vivo* adalah 10-100 kali lebih besar

daripada potensi obat-obat antimalaria lainnya. Obat-obat ini memiliki aktivitas gametosid, tetapi tidak berpengaruh terhadap bentuk laten ataupun bentuk primer parasit di jaringan. Dengan demikian, senyawa-senyawa artemisin tidak berguna untuk kemoprofilaksis ataupun untuk mencegah kekambuhan malaria vivax. Model kerja artemisin saat ini meliputi dua tahap. Tahap pertama, besi hem intraparasit pada eritrosit yang terinfeksi mengatalisis pemutusan jembatan endoperoksida. Tahap ini diikuti dengan penataan ulang intramolekular untuk menghasilkan radikal-radikal berpusat-karbon yang diubah secara kovalen dan merusak protein-protein malaria yang spesifik.

b. Klorokuin dan Turunannya (Hardman & Limbird, 2012)

Klorokuin adalah salah satu senyawa dari kelompok besar 4-aminokuinolin yang diteliti sebagai bagian program kerjasama ekstensif penelitian antimalaria di Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Dimulai pada tahun 1943, ribuan senyawa ini telah disintesis dan diuji aktivitasnya. Klorokuin pada akhirnya terbukti paling menjanjikan dan diluncurkan untuk uji lapangan. Klorokuin sangat mirip dengan 8-aminokuinolin, yaitu primakuin dan pentakuin, yang sudah lama tidak digunakan lagi.



Gambar 3 Struktur senyawa klorokuin

Mekanisme kerja antimalaria klorokuin dan antimalaria kuinolin lainnya serta resistensi terhadap obat-obat tersebut. Parasit malaria aseksual tumbuh subur di eritrosit inang dengan mencerna hemoglobin di vakuola makanannya yang bersifat asam, suatu proses yang menghasilkan radikal-radikal bebas dan hem (feriprotoporfirin IX) sebagai produk samping yang sangat reaktif. Setelah proses nukleasi dengan protein-protein kaya-histidin dan mungkin juga dengan bantuan lipid, hem berpolimerisasi menjadi pigmen malaria yang tidak larut dan tidak reaktif yang disebut hemozoin. Skizontosid darah kuinolin yang berperilaku seperti basa lemah terkonsentrasi di vakuola makanan plasmodium yang peka, tempat senyawa ini meningkatkan pH, menghambat aktivitas perioksidatif hem, dan mengganggu polimerisasi non-enzimatiknya menjadi hemozoin. Kegagalan menginaktivasi hem tersebut menyebabkan terbunuhnya parasit-parasit tersebut melalui kerusakan oksidatif pada membran, protease-protease pencernaan, dan mungkin melalui biomolekul-biomolekul kritis lainnya. Di antara berbagai mekanisme yang mungkin untuk kerja kuinolin-kuinolin malaria, penghambatan polimerisasi hem tampaknya sangat penting.

Resistensi intrinsik bentuk aseksual eritrositik *P. falciparum* terhadap antimalaria kuinolin, terutama klorokuin, berkembang lambat tetapi saat ini umum terjadi di seluruh dunia terutama di daerah tempat obat-obat antimalaria digunakan secara luas. Resistensi terhadap antimalaria kuinolin mungkin melibatkan banyak mekanisme di bawah kendali multigen kompleks.

5. Target Terapi Malaria

Obat anti malaria yang ada dirancang berdasarkan perbedaan metabolisme parasit malaria dengan inangnya. Jalur utama *P. falciparum*, seperti metabolisme asam nukleat, detoksifikasi heme, stres oksidatif dan biosintesis asam lemak diketahui menjadi target rancangan obat antimalaria. Meskipun sebagian besar digunakan selama lebih dari beberapa dekade, namun penggunaannya sekarang terbatas karena munculnya resistensi (Nigussie, Beyene, Shah, & Belew, 2015).

Munculnya resistensi obat terhadap obat antimalaria yang ada telah menciptakan kebutuhan untuk memprediksi target baru serta turunan yang berasal dari molekul asli dengan aktivitas yang lebih baik terhadap target obat yang divalidasi. Parasit malaria memiliki apikoplas mirip plastid pada tanaman. Untuk mengatasi masalah malaria falciparum, jalur metabolisme pada apikoplas parasit telah digunakan sebagai target obat antimalaria (Qidwai, Jamal, Khan, & Sharma, 2014)

Apikoplas adalah organel khusus yang mempertahankan fungsi spesifik tertentu seperti sintesis asam lemak, isoprenoid, heme dan biogenesis *cluster* besi-sulfur yang juga terdapat pada bakteri, tanaman, dan parasit apikomplexan namun tidak terdapat pada manusia. Oleh karena itu, sintesis asam lemak dan sintesis prekursor isoprenoid adalah target potensial untuk obat antibiotik yang ada karena fungsi ini jelas bersifat bakteri (Nigussie, Beyene, Shah, & Belew, 2015).

Isoprenoid adalah kelompok senyawa yang paling beragam secara kimia hadir dalam semua organisme dan memiliki peran penting dalam struktur membran, kimia redoks, siklus reproduksi, regulasi pertumbuhan, transduksi sinyal dan mekanisme pertahanan. Isopentenil pirofosfat (IPP) adalah prekursor umum yang diperlukan untuk biosintesa isoprenoid, yang terjadi melalui jalur *mevalonate* (MVA) atau *mevalonate-independent* (MEP). Organisme seperti mamalia dan jamur menggunakan

jalur MVA untuk biosintesis isoprenoid, sementara banyak bakteri, ganggang hijau, dan tanaman yang lebih tinggi menggunakan jalur MEP alternatif. Karena peran penting yang dimainkan oleh isoprenoid dalam kelangsungan hidup organisme, langkah sintesis yang terlibat dalam biosintesis isoprenoid dapat ditargetkan dalam rancangan obat antimalaria (Goble, Adendorff, Beer, Stephens, & Blatch, 2010).

Jalur MEP terdiri dari tujuh enzimatis. Langkah-langkah, yang dimulai dengan pembentukan *1-deoksi-D-xylulose-5-phosphate* (DXP) melalui kondensasi piruvat dan gliseraldehida. Langkah selanjutnya dikatalisis oleh reduktoisomerase *1-deoksi-D-xilulosa-5-fosfat* (DXR) dan melibatkan penataan ulang intramolekul dan pengurangan NNP yang bergantung NADPH ke MEP (*2-C-methyl-erythritol4-fosfat*) (Goble, Adendorff, Beer, Stephens, & Blatch, 2010).

B. Tuberkulosis

1. Etiologi

Penyebab penyakit tuberkulosis adalah bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dan *Mycobacterium bovis*. Kuman tersebut mempunyai ukuran 0,5-4 mikron x 0,3-0,6 mikron dengan bentuk batang tipis, lurus atau agak bengkok, bergranular atau tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar tebal yang terdiri dari lipid (terutama asam mikolat) (Widoyono, 2011).

Pada organisme prokariotik, basil tuberkulum merupakan sel yang sederhana. Bakteri ini berbentuk batang yang dikelilingi oleh berlapis-lapis dinding sel yang mengandung asam *myolic*. Pada bagian dalam dinding sel terdapat membran sel sebuah lipid *bilayer* yang mengontrol apa yang masuk dan keluar pada bakteri. Basil tuberkulum tidak membentuk kapsul, menghasilkan flagela, atau membentuk spora. Mereka tidak menghasilkan racun atau enzim lain yang biasanya terkait pada proses

penularan penyakit. Organisme ini merusak inangnya dengan perubahan dinding sel. Dinding sel pada organisme ini berisi tidak hanya peptidoglikan, kompleks karbohidrat, seperti halnya bakteri lain, tetap juga mengandung lipid besar yang disebut asam *myolic* (Finer, 2003).

Lipid ini memberikan lapisan yang melindungi organisme dari bahan kimia, banyak antibiotik, dan antibodi (protein pelindung yang dihasilkan oleh tubuh manusia). Asam *myolic* juga membuat bakteri resisten terhadap pengeringan. Hal ini memungkinkan organisme untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama dalam sputum kering. Kebutuhan akan oksigen ini menjelaskan mengapa bakteri basil berkembang sangat baik di paru-paru (Finer, 2003).

2. Penularan

Penyakit tuberkulosis yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* ditularkan melalui udara (*droplet nuclei*) saat seorang pasien TB batuk dan percikan ludah yang mengandung bakteri tersebut terhirup oleh orang lain saat bernapas. Bila penderita batuk, bersin, atau berbicara saat berhadapan dengan orang lain, basil tuberkulosis tersembur dan tehisap ke dalam paru orang sehat. Masa inkubasinya selama 3-6 bulan (Widoyono, 2011). Meskipun tuberkulosis utamanya menyerang paru-paru, organ lain juga dapat dipengaruhi. Contohnya, jika sistem imun lemah, infeksi dapat menyebar dari paru-paru ke organ-organ tubuh lainnya (Roach & Scherer, 2003).

Resiko terinfeksi berhubungan dengan lama dan kualitas paparan dengan sumber infeksi dan tidak berhubungan dengan faktor genetik dan faktor pejamu lainnya. Resiko tertinggi berkembangnya penyakit yaitu pada anak berusia di bawah 3 tahun, resiko rendah pada masa kanak-kanak, dan meningkat lagi pada masa


remaja, desa muda, dan usia lanjut. Bakteri masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain melalui peredaran darah, pembuluh limfe, atau langsung ke organ terdekatnya (Widoyono, 2011).

Setiap satu BTA positif akan menularkan kepada 10-15 orang lainnya, sehingga kemungkinan setiap kontak untuk tertular TB adalah 17%. Hasil studi lainnya melaporkan bahwa kontak terdekat (misalnya keluarga serumah) akan dua kali lebih beresiko dibandingkan kontak biasa (tidak serumah) (Widoyono, 2011).

3. Mekanisme Kerja Obat-obat Anti Tuberkulosis dan Resistensinya

a. Isoniazid (Hardman & Limbird, 2012)

Isoniazid (hidrazid asam isonikotinat) masih dianggap sebagai obat utama untuk kemoterapi tuberkulosis, dan semua pasien dengan penyakit yang disebabkan oleh galur basil tuberkulosis yang peka isoniazid diberi obat ini jika mereka dapat menoleransinya.



Gambar 4 Struktur senyawa isoniazid

Isoniazid bersifat bakteriostatik untuk basil yang istirahat, tetapi bakterisid bagi mikroorganisme yang sedang membelah dengan cepat. Isoniazid sangat efektif untuk pengobatan tuberkulosis yang diinduksi secara eksperimen pada hewan dan


jauh lebih unggul daripada streptomisin. Berbeda dengan streptomisin, isoniazid dapat menembus sel dengan mudah dan sama efektifnya terhadap basil yang tumbuh di dalam sel maupun yang tumbuh dalam media kultur.

Takayama dan kawan-kawan (1975) termasuk yang menyatakan bahwa kerja utama isoniazid adalah menghambat biosintesis asam-asam mikolat, yaitu unsur-unsur penting pada dinding sel mikobakteri. Mekanisme kerja isoniazid bersifat kompleks, disertai pemetaan resistensi terhadap mutasi pada sedikitnya lima gen yang berbeda (*katG*, *inhA*, *ahpC*, *kasA*, dan *ndh*). Sebagian besar bukti menunjuk *inhA* sebagai target utama obat. Gen *inhA* mengkodekan *enoil-ACP reduktase* pada asam lemak sintase II yang mengubah asam-asam lemak Δ^2 -tak jenuh menjadi asam lemak jenuh pada jalur untuk biosintesis asam mikolat. Karena asam mikolat merupakan kekhasan mikobakteri, kerja ini menjelaskan tingginya tingkat selektivitas aktivitas antimikroba isoniazid. Paparan isoniazid mengakibatkan hilangnya sifat tahan asam dan penurunan jumlah lipid yang dapat terekstraksi-metanol pada mikroorganisme tersebut.

Resistensi bakteri. Jika basil tuberkulosis ditumbuhkan secara *in vitro* dalam konsentrasi isoniazid yang kian meningkat, mutan-mutan yang resisten terhadap obat ini dapat dipilih dengan mudah, sekalipun jika obat tersebut terdapat dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Mekanisme resistensi isoniazid yang paling umum adalah mutasi pada katalase-peroksidase yang menurunkan aktivitasnya, mencegah konversi isoniazid *prodrug* menjadi metabolit aktifnya (Blanchard, 1996). Mekanisme resistensi lain terkait dengan *missense mutation* (mutasi yang mengubah kodon sehingga mengodekan asam amino yang berbeda) di dalam gen *inhA* mikobakteri yang terlibat dalam biosintesis asam mikolat.

b. Rifampin (Hardman & Limbird, 2012)

Golongan rifamisin (rifampin, rifabutin, rifapentin) adalah suatu kelompok antibiotik makrosiklik kompleks dengan struktur yang serupa, yang dihasilkan oleh *Streptomyces mediterranei*; rifampin adalah turunan semisintesis dari salah satu golongan rifampisin yaitu Rifampisin B.



Gambar 5 Struktur senyawa rifampin


Rifampin menghambat sebagian besar bakteri gram-positif serta banyak mikroorganisme gram negatif. Rifampin menghambat RNA polimerase yang tergantung-DNA pada mikobakteri dan mikroorganisme lain dengan cara membentuk suatu kompleks obat-enzim yang stabil, mengakibatkan supresi pada awal pembentukan rantai (tetapi tidak pada pemanjangan rantai) saat sintesis RNA. Secara lebih spesifik, subunit β pada kompleks ini merupakan tempat kerja obat ini, ataupun rifampin hanya berikatan dengan holoenzim. RNA polimerase nukleus dari berbagai sel eukariotik tidak mengikat rifampin, dan dengan demikian sintesis RNA tidak

terpengaruh. Meskipun rifampin dapat menghambat sintesis RNA di mitokondria mamalia, dibutuhkan konsentrasi obat yang jauh lebih tinggi daripada untuk penghambatan enzim bakteri. Konsentrasi antibiotik rifamisin yang tinggi juga menghambat RNA polimerase yang tergantung-DNA dan transkriptase balik pada virus. Rifampin bersifat bakterisida untuk mikroorganisme intraseluler maupun ekstraseluler.

Mikroorganisme dapat mengembangkan resistensi terhadap rifampin dengan cepat secara *in vitro* melalui proses satu langkah. Dalam kebanyakan kasus, resistensi disebabkan oleh mutasi antara kodon 507 dan 533 pada gen *rpoB* polimerase. Hal yang sama juga terjadi secara *in vivo*; oleh karena itu, antibiotik ini tidak boleh digunakan sebagai obat tunggal pada kemoterapi tuberkulosis.

c. Etambutol (Hardman & Limbird, 2012)


Etambutol adalah suatu senyawa yang larut dalam air dan stabil pada suhu panas. Hampir semua galur *M. tuberculosis* dan *M. kansasii* serta sejumlah galur kompleks *M. avium* peka terhadap etambutol. Kepekaan organisme nontuberkulosis lain bervariasi. Etambutol tidak berefek terhadap bakteri lain. Obat ini menekan pertumbuhan kebanyakan basil tuberkulosis yang resisten-isoniazid dan yang resisten-streptomisin. Resistensi terhadap etambutol berkembang sangat lambat secara *in vivo*.



Gambar 6 Struktur senyawa etambutol

Mikobakteri dapat menyerap etambutol dengan cepat apabila obat ini ditambahkan pada kultur yang berada pada fase pertumbuhan eksponensial. Namun, pertumbuhan tidak mengalami penghambatan yang berarti sebelum kira-kira 24 jam; obat ini bersifat tuberkulostatik. Etambutol memblok *arabinosil transferase* yang terlibat dalam biosintesis dinding sel. Resistensi bakteri terhadap obat ini berkembang secara *in vivo* melalui perubahan asam amino tunggal pada gen *embA* jika etambutol diberikan tanpa adanya obat efektif lain.

d. Streptomisin (Hardman & Limbird, 2012)



Gambar 7 Struktur senyawa streptomisin

Streptomisin bersifat bakterisida untuk basil tuberkulosis *in vitro*. Konsentrasi hanya 0,4 µg/ml dapat menghambat pertumbuhan. Kebanyakan galur *M. tuberculosis* peka terhadap 10 µg/ml. Aktivitas streptomisin *in vivo* pada dasarnya supresif. Jika antibiotik ini diberikan kepada hewan percobaan sebelum inokulasi dengan bakteri tuberkulosis, perkembangan penyakit tidak dicegah. Infeksi berlanjut sampai mekanisme imunologis hewan memberikan respon. Adanya mikroorganisme hidup di

dalam abses dan nodus-nodus limfe regional mendukung konsep yang menyatakan bahwa aktivitas streptomisin *in vivo* adalah menekan dan bukan memberantas basil tuberkulosis. Sifat streptomisin ini mungkin terkait dengan pengamatan bahwa obat ini tidak dapat masuk dengan mudah ke dalam sel-sel hidup, sehingga tidak dapat membunuh mikroba intraseluler.

Resistensi bakteri. Populasi besar semua galur basil tuberkulosis mencakup sejumlah sel yang sangat resisten terhadap streptomisin karena telah bermutasi. Namun, resistensi primer terhadap antibiotik ini hanya ditemukan pada 2% hingga 3% isolat *M. tuberculosis*.


e. Pirazinamida (Hardman & Limbird, 2012)



Gambar 8 Struktur senyawa pirazinamida

Pirazinamida adalah analog pirazin sintesis dari nikotinamida. Pirazinamida menunjukkan aktivitas bakterisida *in vitro* hanya pada pH yang sedikit asam. Pada pH asam, aktivitasnya ideal karena *M. tuberculosis* terletak di suatu fagosom asam di dalam makrofag. Basil tuberkulosis di dalam monosit secara *in vitro* dihambat atau dimatikan oleh obat ini. Resistensi berkembang dengan cepat apabila pirazinamida diberikan sebagai obat tunggal. Sasaran pirazinamida tampaknya adalah gen asam lemak sintase I mikobakteri yang terlibat dalam biosintesis asam mikolat.


f. Etionamida (Hardman & Limbird, 2012)



Gambar 9 Struktur senyawa etionamida

Multiplikasi *M. tuberculosis* ditekan oleh konsentrasi etionamida yang berkisar dari 0 sampai 2 $\mu\text{g/ml}$. Resistensi dapat berkembang dengan cepat secara *in vitro*. Konsentrasi 10 $\mu\text{g/ml}$ atau kurang akan menghambat sekitar 75% mikobakteri fotokromogenik, sementara mikobakteri skotokromogen lebih resisten. Etionamida sangat efektif pada pengobatan tuberkulosis eksperimental pada hewan, walaupun aktivitasnya sangat bervariasi tergantung pada hewan model yang dipelajari.

g. Sikloserin (Hardman & Limbird, 2012)



Gambar 10 Struktur senyawa sikloserin

Sikloserin adalah suatu antibiotik spektrum luas yang dihasilkan oleh *Streptococcus orchidaceus*. Sikloserin menghambat *M. tuberculosis* pada konsentrasi 5 sampai 20 µg/ml *in vitro*. Tidak ada resistensi silang antara sikloserin dan obat tuberkulostatik lain. Walaupun antibiotik ini efektif dalam infeksi eksperimental yang disebabkan oleh mikroorganisme lain, pada penelitian *in vitro* tidak tampak supresi pertumbuhan pada kultur yang dibuat dalam media konvensional yang mengandung *D-alanin*; asam amino ini memblokir aktivitas antibakteri sikloserin. Kedua senyawa ini adalah analog struktural, dan sikloserin menghambat reaksi-reaksi yang melibatkan *D-alanin* dalam sintesis dinding sel bakteri.

h. Obat-obat lain (Hardman & Limbird, 2012)

Obat-obat yang dikelompokkan pada bagian ini memiliki beberapa kesamaan. Semua obat ini adalah obat “pilihan kedua” yang hanya disebabkan mikroorganisme resisten oleh mikobakteri nontuberkulosis. Obat-obat ini harus diberikan secara parenteral serta memiliki farmakokinetika dan toksisitas yang sama.

Kanamisin, suatu aminoglikosida yang menghambat pertumbuhan *M. tuberculosis in vitro* pada konsentrasi 10 µg/ml atau kurang. Amikasin, juga adalah suatu aminoglikosida. Obat ini sangat aktif terhadap beberapa spesies mikobakteri dan berperan dalam pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikobakteri nontuberkulosis. Kapreomisin, adalah suatu peptida siklik antimikobakteri yang dihasilkan oleh *Streptococcus capreolus*. Resistensi bakteri terhadap kapreomisin berkembang jika obat ini diberikan tunggal.

4. Target Terapi Tuberkulosis

Ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi pengobatan baru untuk tuberkulosis (TB), penyakit menular utama yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb), yang menghasilkan 1,5 juta kematian setiap tahunnya. Telah ditargetkan dua enzim esensial dalam organisme ini yang menjanjikan sebagai terapi antibakteri dan dilaporkan dihambat oleh *naphthoquinones*. ThyX adalah sintesis timidilat penting yang secara mekanis dan struktural tidak terkait dengan enzim manusia (Djaout, et al., 2016).

Thymidylate synthase (TS) enzim mengkatalisis biosintesis *deoxythymidine monophosphate* (DTMP atau timidilat), dan sangat penting untuk replikasi dan perbaikan DNA. Dua jenis protein TS yang berbeda telah dijelaskan (ThyA dan ThyX), yang memiliki mekanisme enzimatik dan struktur yang tidak terkait. *Mycobacteria* tidak biasa karena mereka mengkodekan baik *thyA* dan *thyx*, dan signifikansi biologis dari hal ini belum dipahami. *Mycobacterium tuberculosis* ThyX dianggap penting dan target obat potensial (Fivian-Hughes, Houghton, & Davis, 2012).

C. *Skrining Virtual*

Skrining virtual (*virtual screening*) didefinisikan sebagai proses evaluasi secara otomatis terhadap kumpulan data senyawa yang sangat besar menggunakan bantuan program komputer. Tujuan dari *virtual screening* adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi senyawa yang baru (*novel*) dan mempunyai aktivitas poten terhadap target yang dituju. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan *virtual screening* ditunjukkan dengan ditemukannya senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang baru dan menarik. *Hit rate* yang rendah yang terdiri atas senyawa-senyawa dengan

kerangka struktur yang baru dan menarik lebih disukai daripada *hit rate* yang tinggi tetapi berisi senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang telah diketahui (Mohan, Gibbs, Cummings, Jaeger, & DesJarlais, 2005).

Virtual screening berusaha merasionalkan pemilihan senyawa hingga seminimal mungkin kandidat untuk evaluasi eksperimen. *Virtual screening* telah menjadi pembangun disiplin ilmu komputasi pada penelitian farmasetik. Pengembangan dan penggunaan metode komputasi untuk menelusuri berjuta-juta senyawa virtual dan memprioritaskan sejumlah kecil kandidat untuk diujikan juga menarik dari sudut pandang akademik. Oleh karena itu, terdapat ketertarikan pada metode *virtual screening*, diantaranya (Abraham, 2003).

1. Skrining *In silico* berbasis ligan

Terdapat beragam metode *virtual screening* berbasis ligan. Berdasarkan tingkat kecanggihan, biaya komputasi utama, semua tergantung pada jenis informasi struktural yang digunakan. Pada semua kasus, umumnya diperoleh pengayaan signifikan pada pilihan acak dari molekul dalam *database*. Setelah prosedur pencarian, molekul dengan skor tertinggi dapat diprioritaskan untuk pengujian eksperimental. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencarian kesamaan memiliki sisi yang lebih murah dan lebih sesuai, semua molekul dalam *database* dapat di *scoring* melalui persamaan dengan satu atau beberapa ligan bioaktif dan kemudian di-*ranking* untuk menampilkan probabilitas penurunan dari bentuk aktif. Salah satu pendekatan yang paling sukses dalam hal ini adalah penggunaan *self-organizing* jaringan neural yang dapat menghasilkan proyeksi data set besar yang digambarkan dalam ruang dimensi tinggi. Hasil pemetaan *self-organizing* dapat digunakan dalam banyak aplikasi dalam proses penemuan obat, seperti untuk

menganalisis perpustakaan kombinatorial untuk kesamaan dan keragamannya dan untuk memilih deskriptor hubungan struktur-aktivitas. Teckrentup *et al* telah menggunakan metode ini untuk menganalisis satu set dari 5513 senyawa yang mengandung 185 hit yang teridentifikasi (*hit rate* 3.4%) (Abraham, 2003).

2. Skrining *In silico* berbasis struktur

Virtual screening berbasis struktur dari molekul 3D telah berhasil diterapkan untuk menemukan hit baru dalam desain berbasis struktur. Krier *et. al* telah mengoptimasi inhibitor *phosphodiesterase-4* menggunakan *docking* molekul dari perpustakaan kombinatorial. Barecca *et al* menggunakan generasi farmakofor 3D berbasis struktur dan *searching database* multi konformasional bersama dengan *docking* molekul untuk mengidentifikasi perancah baru dari HIV-1 *Non-Nucleoside Reverse Transcriptase inhibitors* (NNRTIs). Rollinger *et. al*, menggunakan pendekatan yang sama untuk menemukan inhibitor asetilkolin esterase dari *database* 3D senyawa alami. Wang dan rekan telah menemukan sebuah inhibitor transporter dopamin yang baru dan memiliki potensi melalui *searching* farmakofor 3D *database* dan modifikasi *subsequent* senyawa kimia sebagaimana inhibitor pada *Tritrichomonas Fetus Hypoxanthine-Guaninexanthine Phosphoribosyltransferase* (HGXPRT) (Abraham, 2003).

D. Penambatan Molekuler

Penambatan molekuler adalah prosedur komputasional yang digunakan untuk memprediksikan ikatan non-kovalen makromolekul, lebih sering, sebuah molekul besar (reseptor) dan sebuah molekul kecil (ligan) secara efisien, dimulai dari struktur-struktur yang tidak saling berikatan, struktur yang ditemukan dari simulasi dinamika

molekul, *homology modeling*, dll. Tujuan dari Penambatan molekuler adalah untuk memprediksikan konformasi ikatan dan afinitas pengikatan (Yanuar, 2012).

Penambatan molekuler adalah penggunaan komputerisasi dalam memasang suatu molekul kecil pada reseptor (bagian ini sering didefinisikan sebagai sisi aktif dari enzim) melalui representasi yang dihasilkan komputerisasi, yang diikuti oleh evaluasi struktur molekul dalam hal ini yaitu bentuk dan karakteristiknya seperti parameter elektrostatik (Abraham, 2003).

Dalam bidang pemodelan molekul, Penambatan molekuler adalah metode untuk memprediksi orientasi yang lebih diutamakan dari suatu molekul ketika terikat satu sama lain untuk membentuk kompleks yang stabil. Informasi tentang orientasi ini dapat digunakan untuk memprediksi kekuatan hubungan atau afinitas ikatan antara dua molekul yang digunakan misalnya fungsi penilaian. Hubungan antara molekul biologis yang relevan seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid memainkan peran sentral dalam transduksi sinyal. Selanjutnya, orientasi relatif dari dua pasangan yang berinteraksi dapat mempengaruhi jenis sinyal yang dihasilkan. Oleh karena itu *docking* berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang dihasilkan. *Docking* sering digunakan untuk memprediksi orientasi ikatan kandidat obat bermolekul kecil terhadap target proteinnya untuk memprediksi afinitas dan aktivitas molekul kecil. Maka *docking* memainkan peran penting dalam desain obat secara rasional (Mukesh & Rakesh, 2011).

Prediksi pengikatan molekul kecil pada protein penting karena data tersebut digunakan untuk *screening database virtual* molekul mirip obat untuk menemukan senyawa penuntun untuk mengembangkan obat selanjutnya. *Docking* juga dapat

digunakan untuk mencoba memprediksi konformasi ikatan dari pengikat yang diketahui, ketika percobaan seluruh struktur tidak tersedia (Yanuar, 2012).

Untuk melakukan skrining penambatan, syarat pertama adalah struktur protein yang dikehendaki. Biasanya struktur telah ditentukan dengan menggunakan teknik biofisik seperti kristalografi sinar-x, atau spektroskopi NMR. Struktur protein dan basis data ligan yang potensial ini berfungsi sebagai input untuk program *docking*. Keberhasilan program *docking* tergantung pada dua komponen: pencarian algoritma dan fungsi *scoring* (Mukesh & Rakesh, 2011).

E. Pemograman Penambatan Molekuler

1. Hyperchem

Program *HyperChem*, merupakan program kimia aplikasi 32 bit, yang dikembangkan oleh *HyperCube Inc*. *HyperChem* merupakan program yang handal dari pemodelan molekul yang telah diakui mudah digunakan, fleksibel dan berkualitas. Dengan menggunakan visualisasi dan animasi tiga dimensi hasil perhitungan kimia kuantum, mekanika dan dinamika molekular, menjadikan *HyperChem* terasa sangat mudah digunakan dibandingkan dengan program kimia kuantum yang lain. Program Kimia menyediakan fasilitas pembuatan model tiga dimensi (3D), perhitungan mekanika molekular dan mekanika kuantum (semiempiris dan *abinitio*). Disamping itu tersedia pula *database* dan program simulasi Monte Carlo dan *molecular dynamics* (MD) (Pranowo & Hetadi, 2011).

2. Protein Data Bank

Protein data bank (PDB; <http://www.pdb.org>) merupakan kumpulan arsip tunggal mengenai data struktural makromolekul biologi dari seluruh dunia. Penentuan struktur molekul protein yang terdapat berkas PDB diperoleh dengan menggunakan

data eksperimen. Data eksperimen ini berasal dari kristalografi sinar-x atau spektroskopi *Nuclear Magnetic Resonance* (NMR). Kemudian dilakukan proses dengan program komputer untuk membuat molekul yang paling sesuai dengan data eksperimen (Berman, et al., 2000). PDB merupakan tempat penampungan data struktur 3D dari protein dan asam nukleat. Situs PDB dapat diakses pada alamat <http://www.pdb.org> oleh seluruh pengguna internet seluruh dunia secara gratis (Yanuar, 2012).

3. MOE (Molecular Operating Environment)

MOE (*Molecular Operating Environment*) adalah platform pemodelan yang dikembangkan oleh *Chemical Computing Group*. Platform ini memungkinkan akses ke berbagai set alat komputasi mulai dari bioinformatika, pemodelan protein, desain berbasis struktur untuk persepsi farmakofor. Semua aplikasi ini telah terintegrasi dengan menggunakan *Scientific Vector Language* (SLV). Permasalahan utama dalam pemanfaatan komputer adalah keberadaan aplikasi kimia komputasi yang memadai dan lengkap. Salah satu aplikasi kimia komputasi yang cukup memadai untuk penemuan obat adalah *Molecular Operating Environment* (MOE) (Chemical Computing Grup, 2017).

F. Tinjauan Islam

Kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan telah banyak dilakukan. Salah satu diantaranya menjelaskan khasiat tumbuh-tumbuhan untuk mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit. Pembuktian terhadap ayat-ayat tersebut pun telah banyak dilakukan dan hasilnya juga menakjubkan. Tak sedikit tumbuh-tumbuhan yang terbukti memiliki potensi yang luar biasa. Penelitian lebih mendalam mulai dilakukan untuk mendapatkan khasiat

lain dari berbagai tumbuhan. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan terdapat berbagai jenis tumbuhan yang berbeda-beda. Keragaman jenis tersebut menjadikan tumbuhan memiliki berbagai potensi yang berbeda satu sama lain.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. Asy-syuara ayat 7:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama, 2017)

Dalam kitab Tafsir al-Mishbah (2002), dijelaskan bahwa ayat ini membuktikan melalui uraiannya keniscayaan ke-Esaan Allah Swt karena aneka tumbuhan yang terhampar di persada bumi sedemikian banyak dan bermanfaat lagi berbeda-beda jenis rasa dan warna, namun keadaannya konsisten (Shihab, 2002).

Selain itu, dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 99:

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami mengeluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengutai tangkai-tangkai yang menjulang, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikanpulah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman” (Kementrian Agama, 2017).

Ayat ini merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah Swt. Ayat-ayat yang lalu mengarahkan manusia agar memandang sekelilingnya supaya di dapat

sampai pada kesimpulan bahwa Allah Swt Maha Esa dan kehadiran hari kiamat adalah keniscayaan. Pada ayat-ayat yang lalu dipaparkan hal-hal yang terbentang di bumi, seperti pertumbuhan pada biji dan benih, atau yang berkaitan dengan langit, seperti matahari dan bulan serta dampak peredarannya yang menghasilkan antara lain malam dan siang, selanjutnya dipaparkan juga tentang manusia, asal-usul dan kehadirannya di bumi (Shihab, 2002).

Pada ayat ini mengurai kumpulan hal-hal yang disebut sebelumnya, bermula dengan menegaskan bahwa *Dan Dia* juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak *dari langit, lalu Kami*, yakni Allah, *mengeluarkan* yakni menumbuhkan *disebabkan olehnya*, yakni akibat turunnya air itu, *segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan darinya*, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, *tanaman yang menghijau* (Shihab, 2002).

Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya, ditegaskan lebih jauh bahwa *Kami keluarkan darinya*, yakni dari tanaman yang menghijau itu, *butir yang saling bertumpuk*, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya satu biji atau benih (Shihab, 2002).

Masih dalam pembahasan kitab ini, di bagian akhir ayat ini disebutkan: *perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya*. Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2002).

Menurut Jamaluddin Mahran dalam bukunya Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan & Obat-obatan, bahwa ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah yang menurunkan hujan dari awan, lantas mengeluarkan tumbuhan dari berbagai jenis,

menumbuhkan tanaman, lalu mengistimewakan salah satu organ tubuhnya yakni daun untuk menjadi piranti penghasil zat hijau yang penting untuk memasak bahan makanan. Perhatikanlah keteraturan dan keindahan buahnya, bagaimana ia diciptakan sampai matangnya, bagaimana ia disempurnakan bentuknya yang beraneka (Mahran, 2005).

Dari tafsiran-tafsiran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagai manusia sangat penting untuk memperhatikan alam yang ada, khususnya tumbuh-tumbuhan. Dengan memperhatikan tumbuh-tumbuhan, maka dapat dipahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian harus disadari bahwa tumbuh-tumbuhan yang telah diciptakan oleh Allah tentunya memiliki banyak manfaat bagi manusia, sehingga selain mengamati secara sederhana, hendaknya dilakukan pengembangan terhadap pengamatan-pengamatan dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya dengan meneliti manfaat dari tumbuh-tumbuhan tersebut dalam meningkatkan kesehatan manusia dimana khasiatnya dapat mencegah atau mengobati berbagai jenis penyakit, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa syukur dan yakin akan tanda-tanda kekuasaan Allah Swt.

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلَهُ مَنْ جَهْلَهُ

Artinya:

(Hadist) dari Abdullah berkata, telah bersabda Rasulullah saw. “Sesungguhnya Allah Swt. tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali dia menurunkan pula

penyembuhannya. Penyembuhan diketahui oleh orang yang ingin mengetahui dan tidak diketahui bagi orang yang bodoh” (Baqi, 2012).

Oleh karena itu, Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu pelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif yaitu melakukan skrining virtual terhadap senyawa-senyawa dari beberapa tanaman yang ada di Indonesia yang berpotensi sebagai senyawa anti malaria dan anti tuberkulosis.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Juli 2017

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Komputer Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasari dengan pendekatan pra eksperimen dengan sistem komputasi, yaitu penelitian yang hanya menggunakan kelompok studi tanpa menggunakan kelompok kontrol serta pengambilan responden tidak dilakukan randomisasi, variabel-variabel terkait secara otomatis akan ditentukan dengan *software* program komputer yang telah berkembang saat ini.

D. Perangkat Penelitian

1. Perangkat Keras Penelitian

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat keras berupa satu set laptop dengan spesifikasi: Processor tipe premium Core™ i3.

2. Perangkat Lunak Penelitian

Perangkat Lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat lunak sistem operasi *Windows 8*, *Hyperchem* dan *MOE (Molecular Operating Environment)*.


3. Sumber Data Penelitian

Data penelitian yaitu tanaman-tanaman Indonesia diambil dari buku *Materia Medika Indonesia* volume 1-6 dan *Farmakope Herbal Indonesia*. Senyawa-senyawa tanaman dicari pada mesin pencari jurnal seperti *Science direct*, *Pubmed*, dan *Springer Link*. Protein yang digunakan diunduh dari situs *RCSB.PDB*.

E. Prosedur Kerja

1. Penelusuran senyawa dari pustaka

Sejumlah 225 tanaman diambil dari buku *Farmakope Herbal Indonesia* dan *Materia Medika Indonesia*. Selanjutnya dicari senyawa-senyawa yang terkandung pada tanaman-tanaman tersebut menggunakan mesin pencari jurnal seperti *Springer Link*, *Pubmed*, dan *Science Direct*.




Gambar 11 Jendela mesin pencari jurnal

2. Skrinng Virtual

a. Preparasi senyawa

1) Pemodelan struktur molekul


Pemodelan struktur senyawa dibuat dengan menggunakan program *HyperChem*. Pembuatan model molekul terdiri atas pemilihan atom, jenis ikatan dan muatan total dari molekul uji. Struktur tiga dimensi (3D) setiap senyawa disimpan dalam format ekstensi *.hin.



Gambar 12 Jendela *Hyperchem*

2) Membuat *database* senyawa


Senyawa-senyawa yang telah digambar dibuka pada jendela MOE, kemudian disimpan sebagai *database* dengan format *.mbd.



Gambar 13 Panel *database* senyawa pada MOE

3) Optimasi ligan


Struktur senyawa dioptimasi dengan perangkat lunak MOE menggunakan metode *Forcefield* MMFF94x. Optimasi struktur geometri bertujuan untuk memperoleh konformasi struktur yang lebih stabil. Urutan perintah pada program MOE yaitu *Compute>Energy minimize*, diatur gradien menjadi 0.001. selanjutnya, tekan OK untuk memulai optimasi. File yang telah dioptimasi disimpan dalam format ekstensi *.mol.



Gambar 14 Panel optimasi *Forcefield* MMFF94x menggunakan program MOE

4) Pencarian Konformasi


Senyawa-senyawa yang telah dioptimasi selanjutnya dilakukan pencarian konformasi untuk didapatkan bentuk-bentuk konformasi senyawa.



Gambar 15 Panel pencarian konformasi

b. Preparasi protein.


Protein diunduh dari situs RCSB.PDB dalam format *.pdb. *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr) untuk anti malaria, dan *Thymidilate synthase* (ThyX) untuk anti tuberkulosis. Seluruh struktur protein dan ligan kemudian dibuka pada Jendela MOE dan disejajarkan sehingga rantai yang memiliki struktur yang sama akan bergerak bersama-sama sebagai satu unit. Dengan cara ini kompleks protein-ligan dapat disejajarkan. Setelah ligan dan protein disejajarkan, file kemudian disimpan sebagai *database*.



Gambar 16 Panel *Superpose*

c. Penentuan Fitur Farmakofor

Query Pharmacopore dibuat dengan menggunakan senyawa obat yang dianggap mampu terikat dengan protein yang akan digunakan hingga dijadikan sebagai penuntun. Setelah senyawa penuntun terbuka pada jendela MOE, *Pharmacopore Query Editor* dibuka dengan perintah *MOE> File> New> Pharmacopore Query*. Skema anotasi farmakofor otomatis membuat *query pharmacopore*, sehingga pada jendela MOE akan terlihat fitur-fitur farmakofor yang terdapat pada senyawa penuntun. Titik anotasi yang sesuai dengan hasil penelitian interaksi ligan reseptor dan SAR dipilih untuk menjadi fitur farmakofor.



Gambar 17 Panel *Pharmacophore Query Editor*

d. Menjalankan skrining virtual


Tujuan skrining virtual adalah untuk memperoleh senyawa-senyawa yang *hits* antara senyawa-senyawa dari *database* yang telah dibuat dengan fitur farmakofor yang diperoleh. Skrining virtual dilakukan dengan perintah `MOE> Compute> Pharmacophore> Search` hingga diperoleh senyawa *hits*.



Gambar 18 Panel *Pharmacophore Search* untuk skrining virtual

e. Penambatan Molekul

Senyawa *hits* yang diperoleh, kemudian di-*docking*. Teknik *docking* molekul memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan obat potensial (ligan) ke situs reseptor. Protein dan senyawa uji yang akan di-*docking* harus dipreparasi terlebih dahulu dengan cara dilakukan protonasi untuk menambahkan muatan atom dan hidrogen pada molekul. Struktur protein yang digunakan adalah struktur 4Y6R untuk antimalaria, dan 2A6F untuk anti tuberkulosis. Tahap selanjutnya adalah *docking* senyawa-senyawa uji dengan perintah *MOE>Compute>Simulations>Dock*.



Gambar 19 Panel simulasi *Docking*

3. Evaluasi

Senyawa yang telah di-*docking*, dievaluasi dengan melihat Posisi *docking* terbaik yang dipilih berdasarkan interaksi ligan dan reseptor yang paling mirip dengan ligan alami dan memiliki skor (S) yang paling rendah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. *Malaria*




Skринing virtual merupakan suatu proses evaluasi secara otomatis terhadap kumpulan data senyawa yang besar menggunakan bantuan program komputer. Tujuan dari skринing virtual adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi senyawa yang baru dan mempunyai aktivitas poten terhadap target yang dituju. Oleh karena itu, salah satu keberhasilan skринing virtual ditunjukkan dengan ditemukannya senyawa-senyawa dengan kerangka struktur yang baru dan menarik. Pada penelitian ini, digunakan 4815 senyawa dari 225 tanaman Indonesia.




Farmakofor merupakan gugus-gugus yang diyakini bertanggung jawab terhadap aktivitas obat. Untuk pencarian senyawa anti malaria digunakan 11 struktur kristal protein *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr) yang di download dari situs RCSB.PDB. Protein yang digunakan yaitu 5JMW, 5JO0, 5JBI, 5JC1, 5JMP, 5JNL, 5JAZ, 4Y6R, 4Y6S, 4Y67, dan 4Y6P. Interaksi ligan dengan protein-protein tersebut dapat dilihat pada tabel 1.




Penentuan fitur farmakofor berdasarkan literatur (Chofor, et al., 2015) yaitu bergantung pada gugus fosfonat, hidroxinamat, dan fenil sehingga diperoleh 3 fitur farmakofor. Ketiga fitur farmakofor tersebut masing-masing sebagai gugus akseptor proton (F1:Acc), gugus anionik atom & akseptor proton (F2:Ani&Acc), gugus *aromatic center*, akseptor proton (F3:Aro/Acc).


Tabel 1 Interaksi ligan dengan protein *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr)*

No.	Kode Ligan	Kode Protein	Interaksi dengan Asam Amino									IC ₅₀	EC ₅₀	KI	Aktivitas
			Ser 270	Ser 306	Ser 269	Lys 312	Asn 311	Ser 232	Asp 231	Asp 359	Glu 233				
1	L50 	5JMW										0.175 (0.129 – 0.237)	1.04 (0.6 – 1.8)	1.4± 1.2	Antagonis
2	L56 	5J00										0.05 (0.043 – 0.049)	10.40 (2.8 – 388.3)	10.9 ±4.5	Antagonis


3	6J8 	5JBI								0.12 (0.096 – 0.142)	1.18 (0.4– 3.3)	3.8± 2.5	Antagonis
4	6J8 	5JC1								0.15 (0.137 – 0.154)	0.97 (0.62– 1.5)	7.8± 3.7	Antagonis
5	LC7 	5JMP								0.067 (0.057 – 0.078)	2.00 (1.1– 3.7)	5.7± 4.4	Antagonis

6	L54 	5JNL								0.27 (0.248 – 0.295)	7.33 (0.9– 59.6)	45.7 ±21. 3	Antagonis
7	LC5 	5JAZ								0.28 (0.272 – 0.298)	13.91 (4.3– 45.5)	49.3 ±18. 9	Antagonis
8	RF7 	4Y6R								3.3 ± 0.17			Antagonis

9	48S 	4Y6S									9.3 ± 0.75			Antagonis
10	RC5 	4Y67									0.117 ± 0.012	0.843 ± 0.163		Antagonis
11	R77 	4Y6P									0.069 ± 0.005	6.67 ± 1.48		Antagonis



Gambar 20 a. Fitur farmakofor *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr); b. Fitur farmakofor pada literatur




Gambar 21 Interaksi Ligan RF7 dengan protein DXR 4Y6R

Skринing virtual dilakukan terhadap 4815 senyawa yang berasal dari 225 tanaman Indonesia. Dari proses tersebut diperoleh 1 senyawa yang *hits* dengan fitur farmakofor Dxr yaitu *Lecithin* yang berasal dari tanaman Jelatang (*Urtica dioica* L.).

Urtica dioica L. yang biasa dikenal dengan jelatang atau jelatang menyengat adalah tanaman yang sering digunakan sebagai pengobatan. Tanaman ini termasuk dalam famili *Urticaceae* dan terdapat di daerah beriklim sedang di Asia, Amerika, dan Eropa. Bahan baku jelatang seperti ramuan (*Urticae herba*), daun (*Urticae folium*), dan akar (*Urticae radix*) direkomendasikan sebagai pengobatan tambahan untuk banyak penyakit dan ini adalah salah satu tanaman yang paling populer yang digunakan dalam terapi tradisional baik monoterapi maupun kombinasi karena merupakan tanaman yang kaya akan sumber mineral (zat besi, mangan, potasium, kalsium), klorofil, asam amino, lesitin, karotenoid, dan vitamin serta flavonoid, tanin, sterol, asam lemak, polisakarida, dan lektin. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa *Urtica dioica* L. memiliki sifat antioksidan, anti-inflamasi, anti-maag, antikanker, antimikroba, kardiovaskular, dan hepatoprotektif (Gutowska, et al., 2014). Secara etnomedisinal, negara meksiko menggunakan tanaman ini sebagai pengobatan malaria (Bhuwan Chandra Joshi, 2014).

Tabel 2 Senyawa *hits* dengan reseptor Dxr


Protein Reseptor	Senyawa <i>Hits</i>	Tanaman
1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase (Dxr)	<p data-bbox="553 447 667 478"><i>Lecithin</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Lecithin, a phospholipid. It consists of a glycerol backbone esterified to two fatty acid chains and a phosphate group linked to a choline head group. The structure is shown in a vertical orientation with a color gradient from purple at the top to yellow at the bottom.</p>	<p data-bbox="1049 447 1279 520">Jelatang (<i>Urtica dioica</i> L.)</p>  <p>The image is a photograph of the Urtica dioica plant, commonly known as stinging nettle. It shows several green, serrated leaves with prominent veins and a central stem.</p>

Teknik *docking* molekuler memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan obat potensial (ligan) ke situs reseptor. Sifat atom dan gugus fungsi dari struktur obat memungkinkan kita untuk menyelidiki pengikatan ligan ke situs target. Hasil *docking* yang didapatkan yaitu untuk *Lecithin* mengikat residu Ser232, Asp231, dan Glu232.

Penambatan molekuler yaitu melihat kecocokan ligan atau senyawa yang *hits* pada reseptor berdasarkan nilai skor (S) yang rendah dan interaksi dengan residu protein. *Docking* berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang dihasilkan. Hasil *docking* memprediksi orientasi ikatan senyawa *hits* terhadap target

proteinnya yang menggambarkan afinitas dan aktivitas dari senyawa *hits* tersebut. Senyawa *hits* yang diperoleh memiliki sisi pengikatan yang hampir mirip dengan ligan alami, sehingga menunjukkan potensi sebagai inhibitor *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr) sebagai anti malaria.

Tabel 3 Hasil *docking* senyawa *hits* pada reseptor *1-deoxy-D-xylulose 5-phosphate reductoisomerase* (Dxr)

Senyawa	Entry	Docking Score (S) (kkal/mol)	Residu asam amino yang terikat
<p><i>Lecithin</i></p> 	11	-1.818	Ser232 Asp231 Glu232



B. Tuberkulosis



Pencarian senyawa anti tuberkulosis menggunakan 4 struktur kristal protein *Thymidilate synthase* (ThyX) yang diunduh dari situs RCSB.PDB. Terdapat 4 struktur kristal kompleks *Thymidilate synthase* (ThyX) yaitu 2AF6, 2GQ2, 3GWC, dan 3HZG. Interaksi ligan dengan protein-protein tersebut dapat dilihat pada tabel 4.


Dari kompleks ligan-protein tersebut diperoleh fitur farmakofor seperti pada gambar 21. Farmakofor merupakan gugus-gugus yang diyakini bertanggung jawab terhadap aktivitas obat.

Penentuan fitur farmakofor berdasarkan literatur (Sampathkumar, Turley, Rhie, Sibley, Hol, & Ulmer, 2005) yaitu bergantung pada gugus fosfat, cincin adenosin, cincin ribosa, cincin nikotinamid, cincin pirofosfat, karboxinamida, cincin isoalloxazin, dan adenin sehingga diperoleh 8 fitur farmakofor. Kedelapan fitur farmakofor tersebut masing-masing sebagai gugus akseptor proton (F1:Acc); gugus donor proton, akseptor proton (F2:Don/Acc); gugus donor proton, akseptor proton (F3:Don/Acc); gugus donor proton, akseptor proton (F4:Don/Acc); gugus akseptor proton (F5:Acc); gugus akseptor proton (F6:Acc); gugus *aromatic center*, akseptor proton, donor proton (F7:Aro/Acc/Don); gugus *aromatic center*, *Pi ring center*, akseptor proton, donor proton (F7:Aro/Pir/Acc/Don).


Tabel 4 Interaksi ligan dengan protein *Thymidylate Synthase* (ThyX)

No.	Kode Ligan	Kode Protein	Interaksi dengan Asam Amino								IC ₅₀	EC ₅₀	KI	Aktivitas
			Arg 95	Arg 97	Arg 190	Gln 103	Ser 71	His 96	His 194	Asn 188				
1	FAD 	2af6									-	-	-	Antagonis
2	NAP 	2gq2									-	-	-	Antagonis


3	FAD 	3gwc									-	-	-	Antagonis
4	FAD 	3hzg									-	-	-	Antagonis



Gambar 22 Fitur farmakofor *Thymidilate synthase* (ThyX)



Gambar 23 Ligan *Thymidilate synthase* (ThyX) pada literatur








Gambar 24 Interaksi ligan FAD dengan protein ThyX 2AF6




Skринing virtual dilakukan terhadap 4815 senyawa yang berasal dari 225 tanaman Indonesia. Dari proses tersebut diperoleh 23 senyawa yang *hits* dengan fitur farmakofor ThyX yang dapat dilihat pada tabel 5.



Tabel 5 Senyawa *hits* dengan reseptor *Thymidilate synthase* (ThyX)


Protein Reseptor	Senyawa <i>Hits</i>	Tanaman
<i>Thymidilate synthase</i> (ThyX)	<p>Ajugose</p> 	<p>Tembelekan (<i>Lantana camara</i> L.)</p> 





	<p><i>Lantanose A</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Lantanose A, a complex oligosaccharide. It consists of a central core of four pyranose rings linked together, with several additional pyranose rings attached to the periphery via glycosidic bonds. The structure is highly branched and complex.</p>	
	<p><i>Lantanose B</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Lantanose B, another complex oligosaccharide. It features a central core of four pyranose rings, with several additional pyranose rings attached to the periphery. The structure is highly branched and complex, similar to Lantanose A but with a different arrangement of substituents.</p>	
	<p><i>Stachyose</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Stachyose, a tetrasaccharide. It consists of a central core of four pyranose rings (galactose, glucose, galactose, and glucose) linked together, with several additional pyranose rings attached to the periphery via glycosidic bonds. The structure is highly branched and complex.</p>	

	<p><i>Verbascose</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Verbascose, a complex polyphenolic compound. It consists of a central flavone core with multiple hydroxyl groups and several long, branched side chains, some of which are highlighted in red.</p>	
	<p><i>Theveside</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Theveside, a flavone glycoside. It features a flavone core with a hydroxyl group and a side chain that includes a glucose moiety, highlighted in red.</p>	
	<p><i>Carthamin</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Carthamin, a flavone glycoside. It has a flavone core with a hydroxyl group and a side chain containing a glucose moiety, highlighted in red.</p>	<p>Kesumba (<i>Carthamus tinctorius</i>)</p>  <p>A photograph of a Kesumba flower, which is a member of the Asteraceae family. The flower is bright yellow with a red center and is surrounded by green leaves.</p>
	<p>Anhydrosafflor yellow B</p>  <p>The image shows the chemical structure of Anhydrosafflor yellow B, a complex polyphenolic compound. It features a flavone core with multiple hydroxyl groups and several long, branched side chains, some of which are highlighted in red.</p>	

	<p><i>Hydroxysafflor yellow A</i></p>  <p>The chemical structure of Hydroxysafflor yellow A is a complex polycyclic molecule. It features a central chromone-like core with multiple hydroxyl groups (red) and a long, branched side chain. The side chain includes a phenyl ring at the end, which is substituted with a hydroxyl group.</p>	
	<p><i>Saffloquinoside A</i></p>  <p>The chemical structure of Saffloquinoside A is a complex polycyclic molecule. It features a central chromone-like core with multiple hydroxyl groups (red) and a long, branched side chain. The side chain includes a phenyl ring at the end, which is substituted with a hydroxyl group.</p>	
	<p><i>Safflor yellow B</i></p>  <p>The chemical structure of Safflor yellow B is a complex polycyclic molecule. It features a central chromone-like core with multiple hydroxyl groups (red) and a long, branched side chain. The side chain includes a phenyl ring at the end, which is substituted with a hydroxyl group.</p>	
	<p><i>Parameritannin A-1</i></p>  <p>The chemical structure of Parameritannin A-1 is a complex polycyclic molecule. It features a central chromone-like core with multiple hydroxyl groups (red) and a long, branched side chain. The side chain includes a phenyl ring at the end, which is substituted with a hydroxyl group.</p>	<p>Kayu rapet (<i>Parameria laevigata</i>)</p>  <p>A photograph of the plant Kayu rapet (<i>Parameria laevigata</i>). The image shows a branch with several large, dark green, glossy leaves and a cluster of small, white flowers.</p>

	<p><i>Cinnamtannin B-1</i></p> 	
	<p><i>Aesculitannin B</i></p> 	
	<p><i>Proanthocyanidin A</i></p> 	

	<p><i>Acetyljujuboside B</i></p> 	<p>Bidara cina (<i>Zizyphus Jujuba</i>)</p> 
	<p><i>Bruceoside A</i></p> 	<p>Buah makasar (<i>Brucea javanica</i>)</p> 
	<p><i>Melittoside</i></p> 	<p>Daun sendok (<i>Plantago major</i>)</p> 

	<p><i>1,2,3,4,6-pentagalloylglucose</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of 1,2,3,4,6-pentagalloylglucose, a polyphenolic compound consisting of a central glucose molecule with five galloyl groups attached at the 1, 2, 3, 4, and 6 positions.</p>	<p>Bunga sidawayah (<i>Woodfordia fruticosa</i>)</p>  <p>The photograph shows the Bunga sidawayah plant, characterized by its green, lanceolate leaves and clusters of bright orange flowers.</p>
	<p><i>Gemin D</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Gemin D, a complex polyphenolic compound with multiple galloyl units.</p>	
	<p><i>Woodfordin C</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Woodfordin C, a complex polyphenolic compound with multiple galloyl units.</p>	
	<p><i>Narcissoside</i></p>  <p>The image shows the chemical structure of Narcissoside, a complex polyphenolic compound with multiple galloyl units.</p>	<p>Mengkudu (<i>Morinda citrifolia</i> L.)</p>  <p>The photograph shows the Mengkudu plant, characterized by its large, dark green, ovate leaves and clusters of small, white flowers.</p>

	<p><i>Rubrofusarin-6-β-gentiobioside</i></p> 	<p>Ketapang kecil (<i>Cassia tora</i>)</p> 
--	--	--

Tembelean (*Lantana camara* L.) adalah salah satu tanaman yang diklaim mengobati tuberkulosis. Tembelean merupakan semak yang termasuk dalam famili *Verbanaceae*. Berbagai penggunaannya telah dilaporkan, yaitu terutama digunakan sebagai obat herbal untuk pengobatan kanker, cacar air, campak, asma, bisul, pembengkakan, eksim, tumor, tekanan darah tinggi, demam berdarah, infeksi, tetanus, rematik, dan malaria. Senyawa kimia yang diisolasi dari ekstrak daun *L. camara* dilaporkan menunjukkan aktivitas antimikroba, fungisida, insektisida dan nematisida. Selanjutnya dilaporkan bahwa *verbacoside*, senyawa yang diisolasi dari ekstrak lantana telah terbukti memiliki aktivitas immunosupresif antioksidan dan anti-imunologi (Kirimuhuzya, Waako, Joloba, & Odyek, 2009).

Kesumba (*Carthamus tinctorius*) merupakan anggota keluarga *Asteraceae*, terkenal memiliki banyak efek seperti antikoagulan, vasodilator, antioksidan, immunosupresan, dan neuroprotektor. Tanaman kesumba telah terbukti dengan penelitian memiliki efek antibakteri. Perlu diketahui bahwa tanaman kesumba baik

melawan osteoklas, penyakit tulang lainnya dan efektif membunuh bakteri (Salem, et al., 2014).

Kayu rapet (*Parameria laevigata*) di Indonesia secara tradisional digunakan sebagai obat anti-ulkus atau anti-diare dan untuk mengobati luka. Kulit kayu yang dimaserasi dalam bentuk minyak juga digunakan secara internal untuk tuberkulosis (K, Watanabe, Endang, Umar, & Satake, 2001).

Bidara cina (*Zizyphus Jujuba*) biasa disebut *Red date* termasuk famili *Rhamnaceae* dan ditemukan terutama di daerah subtropis ke daerah tropis. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa *Z. jujube* (*Rhamnaceae*) mengandung khasiat antimikroba kuat (Ahmad, Khan, Bashir, Azam, & Hussain, 2011).

Buah makasar (*Brucea javanica*), ekstrak buahnya telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengobati disentri dan diare. Sejumlah penelitian *in vitro* telah menunjukkan aktivitas antibakteri dari ekstrak tanaman ini terhadap bakteri patogen manusia seperti *Shigella*, *Salmonella* dan *Vibrio cholerae* sp (Sornwatana, Roytrakul, Wetprasit, & Ratanapo, 2013).

Daun sendok (*Plantago major*) telah digunakan untuk berbagai tujuan pengobatan di seluruh dunia. Aktivitas biologis dari daun dan bijinya adalah penyembuhan luka, antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antibiotik lemah, immunomodulasi, antiulserogenik, antihipertensi, antileukemia, antikarsinogenik, antiviral, serta antikandidal (Zubair, 2010).

Bunga sidawayah (*Woodfordia fruticosa*) memiliki banyak peran etno-botani sebagai obat tradisional, seperti menyembuhkan gangguan usus, disentri, diare, bisul, dan penyakit menular lainnya, selain mengobati rematik. Tanaman ini bisa menyembuhkan ulkus peptik yang diinduksi oleh *Helicobacter pylori*. Penelitian

mengkonfirmasi adanya senyawa antimikroba terapeutik yang manjur pada fraksi *n-butanol* dari ekstrak daun *W. fruticosa* untuk pengendalian bakteri patogen MDR (Dubey, Patnaik, & Padhy, 2014).

Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.) adalah tanaman biasa dari wilayah Indo-pasifik dan tumbuh di seluruh wilayah kepulauan nusantara. Tanaman ini memiliki banyak kegunaan sebagai obat tradisional, termasuk sebagai pengobatan disentri, mulas, penyakit hati dan sebagai antidiabetes. Degener menggambarkan penggunaan ramuan yang mengandung buah matang *M. citrifolia* (noni) sebagai obat terkenal melawan tuberkulosis. Penelitian laboratorium telah menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri (Saludes, Garson, Franzblau, & Aguinaldo, 2002).

Ketapang kecil (*Cassia tora*). Daun dan biji *Cassia tora* (Keluarga *Caesalpinaceae*) digunakan dalam pengobatan kusta, cacing cincin, perut kembung, kolik, dispepsia, konstipasi, batuk, bronkitis dan kelainan jantung pada sistem pengobatan *Ayurvedic*. Ekstrak biji juga ditemukan memiliki efek antibakteri karena unsur fenoliknya (Mazumder, Lahkar, Sahay, Oraon, Mazumder, & Pattnaik, 2005).

Teknik *docking* molekul memungkinkan kita untuk mengevaluasi kecocokan obat potensial (ligan) ke situs reseptor. Sifat atom dan gugus fungsi dari struktur obat memungkinkan kita untuk menyelidiki pengikatan ligan ke situs target.



Hasil *docking* yang didapatkan yaitu, *Ajugose* mengikat residu Arg97Arg190, Arg199, His194, Tyr44; *Lantanose A* mengikat residu Arg95, Arg107, Arg190, Arg199, Ser71; *Lantanose B* mengikat residu Asn188, Arg97, His194, Arg190, His98; *Stachyose* mengikat residu Arg95, Arg107, Ser105; *Verbascose* mengikat residu Arg95, Arg199, Arg87, Arg172, Gln103; *Theveside* mengikat residu Arg95,




Arg199, Ser71; *Carthamin* mengikat residu Arg95, Arg190, Arg107, Ser105, Ser71, Tyr44, His194; *Anhydrosafflor yellow B* mengikat residu Arg190, His194, Arg97, His96, Arg95; *Hydroxysafflor yellow A* mengikat residu Arg95, Ser105, Ser71, Gln103; *Saffloquinoside A* mengikat residu Arg97, Arg190, His96; *Safflor yellow B* mengikat residu Arg190, His96, Ser71, Arg97; *Parameritannin A-1* mengikat residu Arg199, His194, Ser71, Gln103, Tyr44; *Cinnamtannin B-1* mengikat residu Arg97, Arg107, Arg199, Ser71, Tyr44; *Aesculitannin B* mengikat residu Arg190, Arg97, His194; *Proanthocyanidin A* mengikat residu Asn188, His98, Arg190, Arg97, His194, Ser71; *Acetyljuguboside B* mengikat residu Arg97, Arg190, His96; *Bruceoside A* mengikat residu Ser71, Arg87, Arg172, Gln106; *Melittoside* mengikat residu Arg95, Arg199, Gln103, Ser71; *1,2,3,4,6-pentagalloylglucose* mengikat residu Arg97, Arg190, His194; *Gemin D* mengikat residu Arg95, Arg107, Gln103; *Woodfordin C* mengikat residu His194, Arg190, Arg97, Ser71; *Narcissoside* mengikat residu; dan *Rubrofusarin-6- β -gentiobioside* mengikat residu Arg95, Arg190, Ser71 yang dibandingkan dengan ligan-ligan alami yang mengikat residu Arg87, Arg95, Arg57, Arg97, Arg190, Arg107, Arg199, Arg172, Gln103, Gln106, Ser71, Ser105, His96, His194, Tyr44, dan Asn188.



Evaluasi dari hasil *docking* yaitu melihat kecocokan ligan atau senyawa yang *hits* pada reseptor berdasarkan nilai skor (S) yang rendah dan interaksi dengan residu protein. *Docking* berguna untuk memprediksi baik kekuatan dan jenis sinyal yang dihasilkan. Hasil *docking* memprediksi orientasi ikatan senyawa *hits* terhadap target proteinnya yang menggambarkan afinitas dan aktivitas dari senyawa *hits* tersebut. Senyawa *hits* yang diperoleh memiliki sisi pengikatan yang hampir mirip dengan




ligan alami, sehingga menunjukkan potensi pada inhibitor *Thymidilate synthase* (ThyX) sebagai anti tuberkulosis.




Tabel 6 Hasil *docking* senyawa *hits* dengan reseptor *Thymidilate synthase* (ThyX)




Senyawa	Entry	<i>Docking Score</i> (S) (kkal/mol)	Residu asam amino yang terikat
<p><i>Ajugose</i></p> 	1	-14.9315	Arg97 Arg190 Arg199 His194 Tyr44
<p><i>Lantanose A</i></p> 	11	-13.0645	Arg95 Arg107 Arg190 Arg199 Ser71




<p><i>Lantanose B</i></p> 	21	-9.3500	Asn188 Arg97 His194 Arg190 His98
<p><i>Proanthocyanidin A</i></p> 	31	-14.2368	Asn188 His98 Arg190 Arg97 His194 Ser71
<p><i>Stachyose</i></p> 	41	-13.6349	Arg95 Arg107 Ser105




<p><i>Theveside</i></p> 	52	-11.4690	Arg95 Arg199 Ser71
<p><i>Verbascose</i></p> 	61	-13.7374	Arg95 Arg199 Arg87 Arg172 Gln103
<p><i>Acetyljuguboside B</i></p>			

<p><i>Aesculitannin B</i></p> 	82	-11.8115	Arg190 Arg97 His194
<p><i>Anhydrosafflor yellow B</i></p> 	91	-11.7663	Arg190 His194 Arg97 His96 Arg95 Asn188
<p><i>Bruceoside A</i></p> 	103	-9.9145	Ser71 Arg87 Arg172 Gln106

<p><i>Carthamin</i></p> 	113	-9.3877	Arg95 Arg190 Arg107 Ser105 Ser71 Tyr44 His194
<p><i>Cinnamtannin B-1</i></p> 	124	-12.3311	Arg97 Arg107 Arg199 Ser71 Tyr44
<p><i>Melittoside</i></p> 	135	-12.0187	Arg95 Arg199 Gln103 Ser71

<p><i>Parameritannin A-1</i></p> 	147	-3.7777	Arg199 His194 Ser71 Gln103 Tyr44
<p><i>1,2,3,4,6-pentagalloylglucose</i></p> 	174	-10.2296	Arg97 Arg190 His194
<p><i>Gemin D</i></p> 	182	-15.0203	Arg95 Arg107 Gln103

<p><i>Narcissoside</i></p> 	191	-13.4909	Arg97 Arg190 Ser71
<p><i>Rubrofusarin-6-β-gentiobioside</i></p> 	201	-13.0481	Arg95 Arg190 Ser71
<p><i>Hydroxysafflor yellow A</i></p> 	221	-13.6068	Arg95 Ser105 Ser71 Gln103

<p><i>Saffloquinoside A</i></p>  <p>The image shows the molecular docking of Saffloquinoside A. The ligand is represented by a stick model with a semi-transparent surface. It is bound to a protein's active site, with several amino acid residues highlighted in blue and purple circles. These residues are numbered, including Arg97, Arg190, and His96. The binding is stabilized by various interactions, including hydrogen bonds and hydrophobic contacts.</p>	232	-12.7320	Arg97 Arg190 His96
<p><i>Safflor yellow B</i></p>  <p>The image shows the molecular docking of Safflor yellow B. The ligand is a large, complex polycyclic molecule shown as a stick model. It is docked into the protein's binding pocket, with residues Arg190, His96, Ser71, and Arg97 highlighted in blue and purple circles. The binding is characterized by multiple hydrogen bonds and hydrophobic interactions.</p>	242	-6.5468	Arg190 His96 Ser71 Arg97
<p><i>Woodfordin C</i></p>  <p>The image shows the molecular docking of Woodfordin C. The ligand is a complex polycyclic molecule shown as a stick model. It is docked into the protein's binding pocket, with residues His194, Arg190, Arg97, and Ser71 highlighted in blue and purple circles. The binding is stabilized by a network of hydrogen bonds and hydrophobic interactions.</p>	251	-2.1575	His194 Arg190 Arg97 Ser71

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Senyawa kimia yang berpotensi sebagai anti malaria adalah *Lecithin*, sedangkan senyawa kimia yang berpotensi sebagai anti tuberkulosis adalah *Ajugose*, *Lantanose A*, *Lantanose B*, *Stachyose*, *Verbascose*, *Theveside*, *Carthamin*, *Anhydrosafflor yellow B*, *Hydroxysafflor yellow A*, *Saffloquinoid A*, *Safflor yellow B*, *Parameritannin A-1*, *Cinnamtannin B-1*, *Aesculitannin B*, *Proanthocyanidin A*, *Acetyljujuboside B*, *Bruceoside A*, *Melittoside*, *1,2,3,4,6-pentagalloylglucose*, *Gemin D*, *Woodfordin C*, *Narcissoside*, dan *Rubrofusarin-6-β-gentiobioside*.
2. Tanaman yang berpotensi sebagai anti malaria adalah Jelatang (*Urtica dioica* L.), sedangkan tanaman yang berpotensi sebagai anti tuberkulosis adalah Tembelean (*Lantana camara* L.), Kesumba (*Carthamus tinctorius*), Kayu rapet (*Parameria laevigata*), Bidara cina (*Zizyphus jujuba*), Buah makasar (*Brucea javanica*), Daun sendok (*Plantago major*), Bunga sidawayah (*Woodfordia fruticosa*), Mengkudu (*Morinda citrifolia* L.), dan Ketapang kecil (*Cassia tora*).

B. Saran

Diharapkan penelitian ini dapat diuji lebih lanjut baik secara *in vitro* maupun *in vivo* untuk melihat aktivitas dari senyawa tanaman-tanaman tersebut yang berkhasiat sebagai anti malaria dan anti tuberkulosis.

KEPUSTAKAAN

- Abraham, D. J. (2003). *Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 6th Edition Volume 1*. Virginia: Willey Interscience.
- Agama, Kementrian. (2017). Al-Qur'an dan Terjemahan.
- Ahmad, B., Khan, I., Bashir, S., Azam, S., & Hussain, F. (2011). *Screening of Zizyphus jujuba for Antibacterial, Phytotoxic and Haemagglutination Activities*. Pharma Biotech Research, 2514-2519.
- Amason, J. T. (2005). *Biodiversity and Health*. Canada: NRC Research Press.
- Baqi, M. F. (2012). Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan Muslim.
- Berman, H. M., Westbrook, J., Feng, Z., Gilliland, G., Bhat, T., Weissig, H., et al. (2000). *The Protein Data Bank*. Nucleic Acid Research.
- Bermawie, N. (2004). *Inventory and Documentation of Medicinal Plants in Indonesia*. Medicinal Plants Research in Asia.
- Bhuwan Chandra Joshi, M. M. (2014). *Pharmacognostical Review of Urtica dioica L.* International Journal of Green Pharmacy.
- Chansuda Wongsrichanalai, J. K. (2010). *Extensive Drug Resistance in Malaria and Tuberculosis*. Perspective Emerging Infectious Diseases Volume 16.
- Chemical Computing Grup. (2017). Retrieved April 7, 2017, from <http://www.chemcomp.com>
- Chofor, R., Sooriyaarachchi, S., Risseeuw, M. D., Bergfors, T., Pouyez, J., Johny, C., et al. (2015). *Synthesis and Bioactivity of β -Substituted Fosmidomycin Analogues Targeting 1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate Reductoisomerase*. Journal of Medicinal Chemistry.
- Djaout, K., Singh, V., Boum3, Y., Katawera, V., Becker, H. F., Bush, N. G., et al. (2016). *Predictive Modeling Targets Thymidylate Synthase ThyX in Mycobacterium tuberculosis*. Scientific Reports.

- Dubey, D., Patnaik, R., & Padhy, R. N. (2014). *In Vitro Antibacterial Activity, Gas Chromatography–Mass Spectrometry Analysis of Woodfordia fruticosa Kurz. Leaf Extract and Host Toxicity Testing With In Vitro Culture Lymphocytes from Human Umbilical Cord Blood*. *Osong Public Health and Research Perspectives*, 298-312.
- Finer, K. R. (2003). *Tuberculosis*. New York: Infobase Publishing.
- Fivian-Hughes, A. S., Houghton, J., & Davis, E. O. (2012). *Mycobacterium tuberculosis Thymidylate Synthase Gene ThyX is Essential and Potentially Bifunctional, While ThyA Deletion Confers Resistance to P-Aminosalicylic Acid*. *Microbiology*.
- Goble, J. L., Adendorff, M. R., Beer, T. A., Stephens, L. L., & Blatch, G. L. (2010). *The Malarial Drug Target Plasmodium falciparum 1-Deoxy-D-Xylulose-5-Phosphate Reductoisomerase (PfDXR): Development of A 3-D Model for Identification of Novel, Structural and Functional Features and for Inhibitor Screening*. *Protein & Peptide Letters*.
- Gutowska, I., Jakubczyk, K., Dec, K., Baranowska-Bosiacka, I., Drozd, A., Janda, K., et al. (2014). *Effect of The Extract from Nettle (Urtica Dioica L.) Fruit Cluster on The Synthesis of Pro-Inflammatory Agents in Hepatocytes Treated with Fluoride*. *Research Report Fluoride*, 109–118.
- Hardman, J. G., & Limbird, L. E. (2012). *Goodman & Gilman Dasar Farmakologi Terapi Volume 10*. Jakarta: EGC.
- Islam, M. A., & Pillay, T. S. (2017). *Identification of Promising DNA GyrB Inhibitors for Tuberculosis Using Pharmacophore-Based Virtual Screening, Molecular Docking and Molecular Dynamics Studies*. *Chemical Biology & Drug Design*.
- K, K., Watanabe, Endang, Umar, & Satake. (2001). *Studies on The Constituents of Bark of Parameria laevigata Moldenke*. *Chemical Pharmacy Bulletin*, 551-557.
- Kirimuhuzya, C., Waako, P., Joloba, M., & Odyek, O. (2009). *The Anti-Mycobacterial Activity of Lantana camara A Plant Traditionally Used to Treat Symptoms of Tuberculosis in South-Western Uganda*. *African Health Science*, 40-45.


- Kortagere, S., Lill, M., & Kerrigan, J. (2012). *Role of Computational Methods in Pharmaceutical Sciences, Computational Toxicology Volume I*. Humana Press.
- Kumar, S. C. (2017). *Drug Resistance in Malaria*. Drug Resistance in Bacteria, Fungi, Malaria, and Cancer.
- Mahran, J. (2005). *Al-Qur'an Bertutur Tentang Makanan dan Obat-obatan*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Manjeliévskaiia, J., Erckb, D., Pirachab, S., & Schrager, L. (2016). *Drug-Resistant TB: Deadly, Costly and In Need of A Vaccine*. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.
- Mazumder, A., Lahkar, V., Sahay, J., Oraon, A., Mazumder, R., & Pattnaik, A. K. (2005). *Pharmacognostical Studies on The Leaves of Cassia tora Linn.* . Ancient Science of Life, 835.
- Mohan, V., Gibbs, A. C., Cummings, M. D., Jaeger, E. P., & DesJarlais, R. L. (2005). *Docking: Successes and Challenges*. Current Pharmaceutical Design.
- Mukesh, B., & Rakesh, K. (2011). *Molecular Docking: A Review*. International Journal of Research in Ayurveda & Pharmacy.
- Nigussie, D., Beyene, T., Shah, N. A., & Belew, S. (2015). *New Targets in Malaria Parasite Chemotherapy: A Review*. Malaria Control & Elimination.
- Pranowo, H. D., & Hetadi, A. K. (2011). *Pengantar Kimia Komputasi*. Bandung: Lubuk Agung.
- Qidwai, T., Jamal, F., Khan, M. Y., & Sharma, B. (2014). *Exploring Drug Targets in Isoprenoid Biosynthetic Pathway for Plasmodium falciparum*. Biochemistry Research International.
- Rahman, M. M., Karim, M. R., Ahsan, M. Q., Khalipha, A. B., Chowdhury, M. R., & Saifuzzaman, M. (2012). *Use of Computer in Drug Design and Drug Discovery: A Review*. International Journal of Pharmaceutical and Life Sciences.
- Roach, S. S., & Scherer, J. C. (2003). *Introductory Clinical Pharmacology Edition 7*. Baltimore: Lippincott William & Wilkins.

- Salem, N., Msaada, K., Elkahoui, S., Mangano, G., Azaeiz, S., Slimen, I. B., et al. (2014). *Evaluation of Antibacterial, Antifungal, and Antioxidant Activities of Safflower Natural Dyes During Flowering*. Biomed Research.
- Saludes, J. P., Garson, M. J., Franzblau, S. G., & Aguinaldo, A. M. (2002). *Antitubercular Constituents from The Hexane Fraction of Morinda citrifolia Linn. (Rubiaceae)*. Phytotherapy Research, 683-685.
- Sampathkumar, P., Turley, S., Rhie, H. G., Sibley, C. H., Hol, W. G., & Ulmer, J. E. (2005). *Structure of The Mycobacterium tuberculosis Flavin Dependent Thymidylate Synthase (MtbThyX) at 2.0 Å Resolution*. Journal Molecular Biology.
- Sekretariat Jenderal Kemenkes RI. (2016). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Shibi, I. G., Aswathya, L., Jisha, R. S., Masand, V. H., & Gajbhiye, J. M. (2016). *Virtual Screening Techniques to Probe The Antimalarial Activity of Some Traditionally Used Phytochemicals*. Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasin Al-Qur'an Volume 3*. Jakarta: Lentera Hati.
- Slater, H. C., Jamie T. Griffin, A. C., & Okell, L. C. (2016). *Assessing the Potential Impact of Artemisinin and Partner Drug Resistance in Sub-Saharan Africa*. (S. e. al, Ed.) Malaria Journal.
- Soedarto. (2011). *Malaria*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Sornwatana, T., Roytrakul, S., Wetprasit, N., & Ratanapo, S. (2013). *Brucin, An Antibacterial Peptide Derived from Fruit Protein of Fructus Bruceae, Brucea javanica (L.) Merr.* Letters in Applied Microbiology, 129-136.
- Speck-Planche, A., Kleandrova, V. V., Luan, F., & Cordeiro, M. N. (2012). *In Silico Discovery and Virtual Screening of Multi-Target Inhibitors for Proteins in Mycobacterium tuberculosis*. Combinational Chemistry & High Throughput Screening.
- Vyas, V., Jain, A., Jain, A., & Gupta, A. (2008). *Virtual Screening: A Fast Tool for Drug Design*. Sci Pharm., 333-360.

- Vyasa, V. K., Qureshi, G., Ghatea, M., Patel, H., & Dalai, S. (2016). *Identification of Novel PfDHODH Inhibitors as Antimalarial Agents via Pharmacophore-Based Virtual Screening Followed by Molecular Docking and In Vivo Antimalarial Activity*. SAR and QSAR in Environmental Research.
- Widoyono. (2011). *Penyakit Tropis: Epidemiologi, Penularan, Pencegahan & Pemberantasannya Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga.
- World Health Organization. (2016). *Global Tuberculosis Report*. Geneva: <http://www.who.int>.
- World Health Organization. (2016). *World Health Statistics 2016: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals*. Geneva: <http://www.who.int/>.
- World Health Organization. (2016). *World Malaria Report*. Geneva: <http://www.who.int/malaria>.
- Yanuar, A. (2012). *Penambatan Molekular: Praktek dan Aplikasi Virtual Screening*. Depok: Fakultas Farmasi UI.
- Zubair, M. (2010). *Genetic and Environmental Effects on Polyphenols in Platago Major*. Introductory Paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Kerja



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Iffah Kholifah Umamity adalah nama lengkap dari gadis yang biasa disapa Iffah oleh keluarga dan teman-temannya. Ia lahir di Ambon, 26 September 1995. Dia adalah anak ke-empat dari sembilan bersaudara yang lahir dari pasangan Abd. Chalik Umamity dan Umi Rahawarin.

Dia memulai pendidikannya di bangku sekolah dasar pada tahun 2001 di SDN 79 Ambon dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2007. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Ambon dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun itu juga, dia melanjutkan pendidikannya di bangku sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ambon dan selesai pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan sekolahnya di bangku SMA, dia kemudian melanjutkan pendidikannya ditingkat strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R