

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PATOLOGI
DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II
(Literature Review)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Meraih Gelar Ahli Madya Diploma
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan**

**Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar**

**Oleh:
MELINDA
NIM:70400117023**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melinda
Nim : 70400117023
TTL : Barru, 19 Oktober 1999
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Tanpucinae, Kecamatan Tanete Riaja, Desa Lompo
Tengah, Kab. Barru
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Patologi
Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II (*Literature
Riview*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Mei 2021

Penulis

MELINDA
NIM: 70400117023

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Melinda
Nim : 70400117023
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Patologi
Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II Pada
(*Literature Review*)

Karya Tulis Ilmiah (KTI) telah di periksa dan di setuju oleh pembimbing untuk di ajukan dalam Seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 27 September
2021

Pembimbing I



**Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb
M.Kes**
NIP : 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Dr. dr. Svatihah, Sp.A.,

NIP : 19800701 200604 2 002

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan kebidanan Antenatal Patologi Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II (Literature Review)**”. Yang disusun oleh **Melinda Nim: 70400117023**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 27 September 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 27 September 2021
20 Safar 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Nurfaizah S ST, M. Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Sabir Mandin, M.Ag	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahumma Shalli'Ala Muhammad Wa'Ala Ali Muhammad

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang sederhana ini dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Patologi Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II ini masih ”** penulis menyadari karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi menyempurnakan hasil kerja tugas akhir ini agar menjadi jauh lebih baik

Maka itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan trimakasi kepada :

1. Kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Masse dan ibu saya tersayang Indare yang telah mndoakan dan ndukung serta mencurahkan ksih sayang yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan keberhasilan saya di dunia akhirat.
2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, MA,Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar
3. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes Sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibunda Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb Selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Makassar.
5. Ibunda Dr.HJ.Sitti Saleh,S.Si.T.,SKM.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu, membimbing dan memberikan

saran yang membangun dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literature Review*)

6. Ibunda Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (*Literatur review*)
7. Ibunda Nurfaiza Alza, S.ST.,M.Keb selaku penguji I yang telah memberikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang membangun guna untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.
8. Ayahanda Dr. Sabir Maidin, M.Ag selaku penguji II yang telah senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitanya dengan islam.
9. Segenap dosen terkhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan para staf akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan proposal ini berlangsung.
10. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat dan masukan untuk kebaikan penulis sendiri. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berpendidikan.
11. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu mensupport sayadan saudari-saudari seperjuangan Aviditas Kebidanan 2017 yang membuat bangku perkuliahan lebih berwarna.
12. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan proposal ini.

Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Amiin.

Samata, 15 mei 2020

Penulis

MELINDA

70400117023



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KETERANGAN KEASLIAN KTI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan penulisan	9
D. Manfaat Penulisan	11
E. Metode Penulisan	12
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	14
1. Pengertian.....	14
2. Tanda Tidak Pasti Hamil.....	14
3. Tanda Pasti Hamil.....	15
4. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan.....	16
5. Perubahan Psikologi pada Kehamilan.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Penyebab	22
3. Faktor Predisposisi	22
4. Faktor Predisposisi	23
5. Gejala Hiperemesis Gravidarum	25
6. Patologi	26
7. Patofisiologi	26

8. Diagnosis.....	27
9. Komplikasi	28
10. Penatalaksanaan	29
11. Kompetensi Bidan pada Hiperemesis Gravidarum	31
C. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	31
1. Pengertian.....	31
2. Penyebab Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	32
3. Faktor Predisposisi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	34
4. Gejala Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	35
5. Patologi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	35
6. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	36
7. Diagnosis Hiperemesis Gravidarum Tingkat II	36
8. Komplikasi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	37
9. Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	38
D. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan	39
E. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Kebidanan.....	41
1. Pengertian	41
2. Tahapan Manajemen Kebidanan Hiperemesis Gravidarum	41
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)	45
BAB III TELUSURAN EVIDANCE BASED LEARNING	47
A. Matriks Langkah I: Identifikasi Data Dasar.....	47
B. Matriks Langkah II: Identifikasi Masalah Aktual.....	52
C. Matriks Langkah III: Identifikasi Masalah Masalah Potensial	58
D. Matriks Langkah IV: Tindakan Segera (<i>Emergency</i>), Konsultasi, Kolaborasi dan Rujukan	63
E. Matriks Langkah V: Rencana Tindakan	69
F. Matriks Langkah VI: Implementasi/ Pelaksanaan Asuhan	75
G. Matriks Langkah VII: Evaluasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA	90

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, 2021

Nama : Melinda
NIM : 70400117023
Pembimbing 1 : Dj. Hj. Sitti Saleh, S.Si.T.SKM.M.Keb
Pembimbing 2 : Dr. dr. Syatirah, Sp.A.M.Kes
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Patologi
Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II (*Literatur Review*)

Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu menderita hiperemesis gravidarum jika seorang ibu memuntahkan segala yang di makan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang diuresis kurang dan timbul aseton dalam kencing. Mual dan muntah pada kehamilan biasanya dimulai pada kehamilan minggu ke-9 sampai ke-10, memberat pada minggu ke-11 sampai ke-13 dan berakhir pada minggu ke-12 sampai ke-14. Hanya pada 1-10% kehamilan gejala berlanjut melewati minggu ke-20 sampai ke-22. Pada 0,3-2% kehamilan terjadi hiperemesis gravidarum yang menyebabkan ibu harus ditata laksana dengan rawat inap.

Literatur review ini bertujuan untuk melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan 7 langkah menurut Helen Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Berdasarkan hasil dari referensi bahwa tindakan yang dilakukan yaitu memberikan cairan parenteral yang cukup elektrolit karbohidrat dan protein engan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2 sampai 3 liter perhari. Bila perlu ditambahkan kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C bila ada kekurangan protein, dapat memberikan pila asam amino secara intravena. Terapi dehidrasi merupakan kunci dari terapi dehidrasi. Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan memberikan larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya cairan diganti dengan cairan dekstrosa 5% dalam cairan saline 0,45%. Sebagai cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstrosa 55 atau 10% dengan RL yakni 2;1 dengan jumlah tetesan 40 per menit.

Kesimpulan dari hasil literatur review yang didapat dari 70 sumber, yaitu didapatkannya hasil asuhan pada ibu preeklamsia keadaan umum ibu membaik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan dalam batas normal.

Kata kunci : Antenatal Care, Hiperemesis Gravidarum Tingkat II, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, 2021

Name : Melinda
Reg. Number : 70400117023
Supervisor 1 : Dj. Hj. Sitti Saleh, S.Si.T.SKMM.MKeb
Supervisor 2 : Dr. dr. Syatirah, Sp.A.MKes
Title : Management of Pathology Antenatal Obstetrics with the Case of Hyperemesis Gravidarum Level II (*A Literature Review*)

Hyperemesis gravidarum is a health issue often found during gestational period signified by a severe and excessive nausea and vomiting. Once a mother experiences an excessive nausea and vomiting, she will probably lose her weight. In addition, a mother will also suffer from acetone and skin dryness. Nausea and vomiting in pregnancy usually begins in the 9th to 10th weeks of gestational period. It would mostly become worse in 11th to 13th weeks. In general, the issues would end in the 12th to 14th weeks. The data shows that rarely do pregnancy's symptoms persist to be more the 20th to 22nd week. The proportion has been only around 1-10%. For the cases of hyperemesis gravidarum, they were found on 0.3-2% of pregnancies in which patients should be well treated in a hospital.

The methodological approach used in this research was literature review. The major purpose was to conduct research on the issue related to hyperemesis gravidarum. The research was conducted based on the 7-stages of Varney and SOAP documentation procedures.

Based on the research data analysis from various different references, it could be noticed that the treatments that could be given to patients with hyperemesis gravidarum were in the forms of providing adequate parenteral fluids as well as administering protein electrolytes with 5% of glucose dissolved into 2 to 3 liters of physiologist saline. In addition, other important potions such as potassium, B complex vitamin, C vitamin, protein, and amino acid pills could be further given depending on the condition of patients. Dehydration therapy could also be the key in enhancing patients' condition. Initial fluid administration could also be given in the forms of 2L RL solvent for approximately 3-5 hours. The fluid should further be replaced with 5% of dextrose dissolved in 0.45% of saline. The RL dextrose ratio of 2:1 could be implemented with 40 drops per minute to be given to patients.

The findings of this research were the results of the analysis on 70 references. It could be concluded that with appropriate treatments and medication, patients with the case of hyperemesis gravidarum could be cured. The major examination that could be taken to confirm the status of patients is by checking the vital signs such as blood pressure, pulse, temperature and respiration.

Key words: Antenatal Care, Hyperemesis Gravidarum Level II, 7-stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kesehatan dan kelangsungan hidup ibu dan bayi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu, anak, keluarga, dan masyarakat. Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar bagi negara-negara berkembang. Negara miskin, sekitar 20-50% kematian wanita usia subur disebabkan hal yang berkaitan dengan kehamilan. Selain itu hal yang paling sering terjadi adalah beberapa ibu hamil mengalami komplikasi pada saat kehamilan. (salmah.2016).

Menurut World Health Organization (WHO) 2013. Jumlah kejadian hipremesis gravidarum mencapai 12, 5% dari jumlah seluruh kehamilan didunia. Mual dan muntah dapat mengganggu dan membuat ketidakseimbangan cairan pada jaringan ginjal dan hati menjadi nekrosis. Sedangkan hiperemesis gravidarum di Indonesia adalah 14,8%

Untuk itu perlu penekanan yang lebih rinci bahwa kehamilan sangat menentukan kualitas generasi berikutnya. setiap ibu hamil akan menghadapi risiko yang bisa mengancam berlangsungnya kehamilan. salah satu tanda bahaya kehamilan yang mengancam kesejahteraan ibu dan janin adalah kasus hiperemesis gravidarum yang sering ditemukan pada awal kahamilan seorang wanita. Jika tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi kelangsungan hidup janin (Salmah, 2016).

Federasi obstetrik ginekologi internasional mendefinisikan kehamilan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum lalu di lanjutkan dengan nidasi dan implantasi. bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional.

Mual dan muntah terjadi pada 60-80% primigravida dan 40-60% multigravida. 1 diantara 1000 kehamilan, gejala-gejala ini menjadi lebih berat. Perasaan mual disebabkan oleh meningkatnya kadar hormon estrogen dan *Human Corionic Gonadotropin* (HCG) dalam serum. Pengaruh fisiologik kenaikan hormone ini belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat pengosongan labung yang berkurang. Penyesuaian terjadi pada kebanyakan wanita hamil, meskipun demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-bulan (Rahmi Fitria, 2017).

Pada umumnya 80-90% kehamilan akan berlangsung normal dan hanya 10-12% kehamilan yang disertai dengan penyakit atau perkembangan menjadi kehamilan yang disertai dengan penyakit atau berkembang menjadi kehamilan patologis. salah satu yang sering terjadi pada ibu hamil akibat langsung dari kehamilan adalah mual dan muntah. *Nausea* (mual) dan *emesis* (muntah) pada umumnya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, dan kadang-kadang disertai oleh emesis. Keadaan ini lazim disebut dengan morning sickness. Kondisi morning sickness ini merupakan salah satu gejala paling awal dalam kehamilan yang terjadi pada trimester I dan trimester ke II, tapi juga dapat berlangsung sampai 4 bulan kehamilan (Rukiah, Y, 2016).

Menurut WHO sebagai badan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang menangani masalah bidang kesehatan, mengatakan bahwa hiperemesis gravidarum terjadi di seluruh dunia, diantaranya negara-negara benua Amerika dengan angka kejadian yang beragam yaitu mulai 0,5-2%, sebanyak 0,35 di Swedia, 0,5% di California, 0,8% di Canada, 10,8% di China, 0,9 di Norwegia, 2,2% di Pakistan, dan 1,9% di Turki. Sedangkan angka kejadian hiperemesis gravidarum di Indonesia adalah mulai dari 1-3% dari seluruh kehamilan. Perbandingan insidensi secara umumnya yaitu 4:1000. World Health Organization (WHO) memperkirakan lebih dari 585.000 ibu pertahun meninggal pada saat hamil yaitu pada tahun 1996. Kehamilan merupakan hal fisiologis tapi setiap saat dapat menghadapi berbagai resiko komplikasi yang mengancam ibu dan janin (Maria Christina 2014).

Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering kita jumpai pada kehamilan muda dan dikemukakan oleh 50% dari wanita yang hamil, terutama ditemukan pada primigravida, kehamilan ganda dan molahidatidosa. Tetapi kalau seorang ibu memuntahkan segala apa yang akan dimakan dan diminum hingga berat badan sangat turun, turgor kulit kurang, diurase kurang dan timbul acetone dalam air kencing, maka keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum dan memerlukan perawatan di rumah sakit (Pudiastuti, 2017).

Menurut Prawirohardjo (2016) mengatakan bahwa jika seorang ibu hamil mengalami mual dan muntah berlebihan maka akan menyebabkan terjadinya penurunan berat badan turgor kulit kurang dan timbul acetone dalam

urine. Selain itu juga akan terjadi dehidrasi yang dapat meningkatkan kesakitan ibu hamil.

Hiperemesis gravidarum tingkat II merupakan pengaruh fisiologik hormon estrogen mengakibatkan adanya perasaan mual yang terjadi pada trimester pertama mungkin karena adanya pengosongan pada lambung, dan hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi, karena oksidasi lemak yang tidak sempurna maka terjadilah ketosis dan aseton dalam darah. selain itu juga dapat menyebabkan terjadinya abortus, partus prematur, BBLR dan bahkan kematian pada ibu (Saifuddin, AB. 2016).

Muntah yang terus menerus pada kehamilan disertai dengan kurang minum yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi. Jika terus berlanjut pasien dapat mengalami syok, dehidrasi yang berkepanjangan juga menghambat tumbuh kembang janin, selain dehidrasi akibat lain mual muntah yang persisten adalah gangguan keseimbangan elektrolit seperti penurunan kadar natrium klor dan kalsium sehingga terjadi keadaan alkalosis metabolik hipokloremik disertai hiponatremia dan hipokalemia (Gunawan, K. dkk. 2018).

Hiperemesis gravidarum yang berat juga dapat membuat pasien tidak dapat makan atau minum sama sekali, sehingga cadangan karbohidrat dalam tubuh ibu akan habis terpakai untuk pemenuhan kebutuhan energi jaringan. Akibatnya, lemak akan dioksidasi. namun, lemak tidak dapat dioksidasi

dengan sempurna dan terjadi penumpukan asam aseton-asetip, asam hidroksibutirik, dan aseton, sehingga menyebabkan ketosis. Selain itu perempuan hamil dengan hiperemesis gravidarum dan kenaikan berat badan dalam kehamilan yang berkurang (<7 kg) memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kecil untuk masa kehamilan, premature (Gunawan, K. dkk. 2018).

Asuhan pada pasien hiperemesis gravidarum sangat penting karena hiperemesis gravidarum merupakan salah satu penyebab angka kematian ibu dan menyebabkan berbagai komplikasi sekitar 12% dari jumlah kunjungan kehamilan. Hal ini terjadi karena jika kondisi ibu yang mual dan muntah terus menerus dapat mengakibatkan terganggunya asupan nutrisi ibu dan janin. Selain itu kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan karena muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan *ekstraseluler* dan *plasma* berkurang. Selain itu dehidrasi menyebabkan jumlah zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan tertimbunnya zat metabolik yang *toksik*. sehingga dapat mengganggu transport nutrisi dan oksigen ke janin, hal inilah yang dapat menyebabkan partus prematur, abortus, BBLR dan bahkan kematian ibu (Saifuddin, AB. 2016).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam *literature review* adalah manajemen asuhan kebidanan antenatal patologi dengan hiperemesis gravidarum tingkat II.

C. Tujuan penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Tujuan utama

Mampu menyusun *literature review* dan mengetahui penatalaksanaan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat II melalui pendekatan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan wilayah kerja bidan

2. Tujuan khusus

Adapun tujuan penulisan *literature review* asuhan kebidanan pada ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat II.

- a. Didapatkannya data Subjektif dan data Objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang hiperemesis gravidarum tingkat II
- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnosis dari berbagai referensi tentang hiperemesis gravidarum tingkat II
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang biasa timbul dari berbagai referensi pada hiperemesis gravidarum tingkat II
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penanganannya dengan hiperemesis gravidarum tingkat II
- e. Didapatkannya simpulan dari berbagai referensi tentang intervensi apa saja/penatalaksanaan yang tepat pada hiperemesis gravidarum tingkat II
- f. Didapatkannya penjelasan adanya intervensi yang tidak dilanjutkan ke implementasi asuhan hiperemesis gravidarum Tingkat II

- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada hiperemesis gravidarum Tingkat II

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan pada kasus ini adalah:

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir program diploma Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber informasi, menambah pengetahuan serta sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

3. Manfaat bagi Institusi

Diharapkan *Literature Review* ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan karya Tulis ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan preeklamsia berat. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang manajemen asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan preeklamsia berat.

5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ibu bersalin dengan preeklamsia berat.

E. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan hiperemesis gravidarum Tingkat II.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan untuk menulis karya tulis ilmiah ini yaitu:

Pada bab I yaitu pendahuluan, akan menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

Pada bab II yaitu tinjauan teori, akan menguraikan mengenai tinjauan umum kehamilan, tinjauan khusus tentang hiperemesis gravidarum, proses manajemen asuhan kebidanan hingga pendokumentasian asuhan kebidanan.

Pada bab III yaitu telusuran *Evidence Based Learning*, akan menguraikan tentang matriks 7 langkah varney, langkah I identifikasi data dasar, langkah II diagnosa aktual, langkah III diagnosa potensial, langkah IV

tindakan segera dan kolaborasi, langkah V rencana tindakan, langkah VI pentalaksanaan dan langkah VII evaluasi.

Pada bab IV yaitu pembahasan, akan membahas hasil *Evidence Based Learning* 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran refrensi. Serta komplikasi kebidanan mengenai hieremesis gravidarum.

Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat dan literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian

- a. Masa kehamilan mulai dari kosepsi sampai lahirnya janin, dimana lamanya lahir normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi (Saifuddin, AB. 2016)
- b. Kehamilan adalah masa di mana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya (Bartini, 2017).
- c. Kehamilan adalah perubahan keadaan relatif baru, khususnya bagi wanita yang baru pertama kali mengalaminya. Pada masa ini terjadi perubahan fisik yang mempengaruhi gerakan maupun aktivitas wanita tersebut sehari-hari (Salmah, 2016).
- d. Proses kehamilan yang dimulai dari konsepsi, yang terjadi karena adanya pertemuan ovum dengan inti spermatozoa yang terjadi pada ampularis tuba, hal ini terjadi setelah melakukan hubungan seksual pada masa subur (Manuaba, 2016).

2. Tanda Tidak Pasti Hamil

- a. Amenorhea: keadaan ini dimana seorang yang telah kawin mengeluh terlambat haid, bahkan dia tidak haid maka pikirkan dia hamil.

- b. Mual dan muntah: merupakan gejala umum, mulai dari rasa tidak enak sampai muntah yang berkepanjangan dalam kedokteran biasa dikenal sebagai "*Morning Sickness*" karena munculnya sering pada pagi hari.
- c. Sering kencing: hal ini disebabkan karena desakan uterus yang semakin membesar dan tarikan oleh uterus ke kranial.
- d. Konstipasi: ini terjadi karena efek relaksasi hormon progesteron atau dapat juga karena perubahan pola makan.
- e. Perubahan pada payudara: akibat stimulasi prolaktin payudara tampak besar dan keras.
- f. Perubahan pada uterus: akan tampak ukuran yang semakin besar karena adanya pertumbuhan janin yang semakin besar (Salmah, 2016).

3. Tanda Pasti Hamil

Indikator pasti hamil adalah penemuan-penemuan keberadaan janin secara jelas dan hal ini tidak dapat dijelaskan dengan kondisi kesehatan yang lain.

a. Denyut Jantung Janin (DJJ)

Dapat didengar dengan stetoskop lenec pada minggu 17-18. Pada orang gemuk, lebih lambat. dengan stetoskop *ultrasonic* (Doppler), DJJ dapat didengarkan lebih awal lagi, sekitar minggu ke-12.

b. Palpasi

Harus ditentukan adalah outline janin. biasanya menjadi jelas setelah minggu ke-22. gerakan janin dapat dirasakan dengan jelas setelah minggu ke 24 (Salmah, 2016).

4. Perubahan Fisiologis pada Kehamilan

Uterus: Terus akan berkembang sampai ke xifisternum, ini diakibatkan pertumbuhan janin yang semakin membesar. ukuran pada kehamilan cukup bulan: 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc, berat uterus naik secara luar biasa dari 30 gram menjadi 1000 gram pada akhir kehamilan (40 pekan). posisi rahim dalam kehamilan, pada permulaan, kehamilan dalam letak artefleksi atau retrofleksi, pada 4 bulan, kehamilan rahim, tetap berada dalam rongga pelvis, setelah itu mulai memasuki rongga, perut yang dalam pembesarannya dapat sampai mencapai batas hati.

Rahim yang hamil biasanya mobile bisa lebih mengisi rongga abdomen kanan atau kiri, Serta pertumbuhan rahim tidak sama kesemua arah, tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat didaerah implanisasi plasenta, sehingga rahim bentuknya tidak sama yang disebut tanda, piskacek. Jantung: meningkatnya beban kerja jantung menyebabkan otot jantung mengalami hipertropi akibat penbesaran uterus yang menekan jantung ke atas.

Metabolisme terjadi peningkatan pola makan, perubahan yang terjadi karena adanya human plasenta *lactogen* ini menjadikan glukosa siap diserap oleh tubuh digunakan untuk. Metabolisme basal naik sebesar 15% sampai 20% dari semula, terutama pada trisemester I. Keseimbangan asam basa mengalami penurunan disebabkan hemodulasi darah dan kebutuhan mineral yang diperlukan janin. Kebutuhan protein wanita hamil

makin tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Perkembangan organ kehamilan dan persiapan laktasi. Dalam makanan diperlukan protein tinggi sekitar $\frac{1}{2}$ gr/kg BB atau sebutir telur ayam sehari. Kebutuhan kalori didapat dari karbohidrat, lemak dan protein. kebutuhan zat mineral untuk ibu hamil: kalsium 1,5 gram setiap hari 30-40 gram untuk pembentukan tulang janin Fosfor, rata-rata gram dalam sehari.

Sistem pernapasan pada kehamilan juga terdapat perubahan sistem pernapasan untuk dapat memenuhi kebutuhan oksigen disamping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang makin membesar pada umur kehamilan 32 minggu sebagai kompensasi terjadinya desakan rahim dan kebutuhan oksigen meningkat (Saifuddin, AB. 2016).

Sistem pencernaan (*Traktus Digestivus*) pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan enak (*Nausea*), akibat kadar hormone estrogen yang meningkat. tonus otot-otot traktus digestivus menurun, sehingga morbiditas seluruh traktus digestivus juga berkurang. vagina pembuluh darah dinding vagina bertambah, hingga warna selaputnya membiru (tanda Chadwick). kekenyalan vagina bertambah. getah dalam vagina biasanya bertambah dalam kehamilan, reaksinya asam pH 3,5-6,0 yang disebabkan terbentuknya acidum lactisum sebagai hasil penghancuran glycogen yang berada dalam sel-sel epitel vagina oleh bacil-bacil *doderlein* reaksi asam ini bersifat bakterisida (Saifuddin, AB. 2016).

5. Perubahan Psikologi pada Kehamilan

Selama hamil kebanyakan wanita mengalami perubahan psikologis dan emosional, sering kali kita mendengar seorang wanita mengatakan betapa bahagianya jika tahu dirinya hamil, karena dia akan menjadi seorang ibu. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu:

a. Trimester I

Trimester pertama sering dikatakan sebagai masa penentuan untuk membuktikan bahwa wanita dalam keadaan hamil, wanita akan mencari-cari tanda-tanda bahwa dia benar hamil. Dia akan merenungkan dirinya, munculnya kebingungan keadaan dirinya, adanya kekhawatiran tentang cara perawatan anaknya. Berkurangnya gairah seks, berat badan yang bertambah membuat wanita jadi kurang percaya diri.

b. Trimester II

Trimester ini biasa disebut pancaran kesehatan dimana ibu akan tampak lebih segar dan sehat, ibu merasa senang dengan adanya gerakan janinnya yang dirasakan, gairah seks meningkat, ketertarikan akan aktifitas yang terfokus pada kehamilan, kelahiran, dan persiapan memiliki peran baru menjadi orang tua.

c. Trimester III

Trimester ini sering disebut periode penantian, ibu dan keluarga menanti kelahiran bayinya, merasa gelisah jika bayinya tidak lahir tepat waktu dan jika bayinya cacat, persiapan untuk bayinya semakin

matang, wanita pada fase ini mengalami proses berduka seperti terpisahnya bayinya dengan dirinya dan hidup bayinya kelak, ibu membutuhkan perhatian yang lebih dari suaminya

B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum

1. Pengertian

- a. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari – hari karena umumnya menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi (Mochtar, 2016).
- b. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada wanita hamil sehingga mengganggu pekerjaan sehari – hari dan keadaan umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi (Marmi, 2015).
- c. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada ibu hamil, seorang ibu menderita hiperemesis gravidarum jika seorang ibu memuntahkan segala yang di makan dan diminumnya hingga berat badan ibu sangat turun, turgor kulit kurang diuresis kurang dan timbul aseton dalam kencing (Rukiyah, 2016).
- d. Mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering kita jumpai pada kehamilan muda dan dikemukakan oleh 50% dari wanita yang hamil, terutama dikemukakan pada primigravida. Tetapi kalau seorang ibu memuntahkan segala apa yang akan dimakan dan diminum hingga berat badan sangat turun, turgor kulit kurang, diuresis kurang dan timbul *aceton* dalam air kencing, maka keadaan ini disebut hiperemesis

gravidarum dan memerlukan perawatan di rumah sakit (Pudiastuti, 2017)

2. Penyebab

- a. Pada tubuh wanita yang hamil terjadi perubahan–perubahan yang cukup besar yang mungkin merusak keseimbangan dalam badan. Misalnya saja yang dapat menyebabkan mual dan muntah ialah masuknya bagian *villus* ke dalam peredaran darah ibu
- b. Faktor organik, karena masuknya *vili khoriales* dalam sirkulasi maternal dan perubahan metabolisme
- c. Frekuensi yang tinggi pada mola hidatidosa dan kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormon memegang peranan karena pada kedua keadaan tersebut hormon khorionik gonadotropin dibentuk berlebihan
- d. Faktor endokrin lain, diabetes, hipertiroid (Marmi, 2015).

3. Faktor Predisposisi

Beberapa faktor predisposisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor Adaptasi dan Hormonal

Pada wanita hamil yang kekurangan darah, lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida dan overdistensi rahim pada kehamilan ganda dan mola hidatidosa. Sebagian kecil primigravida belum mampu beradaptasi terhadap hormon estrogen, sedangkan pada hamil ganda dan mola hidatidosa,

jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi dan menyebabkan terjadi hiperemesis gravidarum (Saifuddin, 2016).

b. Faktor Psikologis

Hubungan faktor psikologis dengan kejadian hiperemesis gravidarum belum jelas. Besar kemungkinan bahwa wanita yang menolak hamil, takut kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan dengan suami dan sebagainya, diduga dapat menjadi faktor kejadian Hiperemesis Gravidarum. Dengan perubahan suasana dengan masuk rumah sakit frekuensi muntahnya dapat berkurang dan berangsur sembuh (Saifuddin, 2016).

c. Faktor Alergi

Pada kehamilan, dimana terjadi invasi jaringan vili korialis yang masuk ke dalam peredaran darah ibu, maka faktor alergi dianggap dapat menyebabkan kejadian hiperemesis gravidarum.

4. Faktor Predisposisi

Menurut berat ringannya gejala hiperemesis gravidarum dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu:

a. Tingkatan I:

Muntah terus menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita, ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium. Nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit mengurang, lidah mengering dan mata cekung (Prawirohardjo, S. 2016).

b. Tingkatan II:

- 1) Penderita tampak lebih lemah dan apatis, turgor kulit lebih berkurang, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit *ikterus*. Berat badan menurun dan mata menjadi cekung, tensi rendah, *hemokonsentrasi*, *oliguri* dan *konstipasi*. *Aseton* dapat tercium dalam hawa pernapasan, karena mempunyai aroma yang khas dapat pula ditemukan dalam kencing

c. Tingkatan III:

- 1) Dehidrasi makin berat, adapun derajat dehidrasi menurut WHO:

Tabel 2.1
Tabel derajat dehidrasi menurut WHO

Yang dinilai	Skor		
	1	2	3
Keadaan Umum	Baik, sadar	Gelisah	Tidak sadar
Mata	Biasa	Cekung	Sangat cekung
Air mata	Ada	Tidak ada	Tidak ada
Mulut	Biasa	Kering	Sangat kering
Rasa Haus	Tidak haus	Haus, ingin minum banyak	Malas minum atau tidak bisa minum
Pernapasan	< 30 x/menit	30-40 x/menit	> 40 x/menit
Turgor	Baik	Kurang	Jelek
Nadi	< 120 x/menit	120-140 x/menit	> 140 x/menit

Sumber : Saifuddin (2016)

Keterangan

Skor: 6 : Tanpa dehidrasi

7 – 12 : Dehidrasi ringan-sedang

≥ 13 : Dehidrasi berat

- 1) Mual muntah berhenti
- 2) Terjadi perubahan pada esophagus
- 3) Gangguan fungsi hati
- 4) Gangguan kesadaran
- 5) Gangguan saraf (gangguan mental)

5. Gejala Hiperemesis Gravidarum

Setiap ibu hamil gejalanya tidak sama tetapi yang paling sering dirasakan adalah mual dan muntah yang berlebihan yaitu 10 kali, bahkan bisa setiap jam atau lebih dalam sehari. Penurunan berat badan >5% dari berat badan ibu hamil sebelum hamil, dehidrasi, nafsu makan tidak ada, lemah, nyeri epigastrium, oliguri, obstipasi, lidah kering dan tampak kotor, mata ikterus, tekanan darah menurun, kulit pucat dan urine yang dikeluarkan ibu hamil memiliki warna kuning pekat. Kondisi ini juga bisa terjadi jika si ibu tidak buang air kecil selama 6 jam terakhir, nafsu makan dan merasa lemas (Saminem, 2017)

6. Patologi

Wanita yang meninggal akibat hiperemesis gravidarum menunjukkan kelainan-kelainan pada berbagai alat dalam tubuh, yaitu:

- a. Hati: pada hiperemesis gravidarum tanpa komplikasi ditemukan degenerasi lemak tanpa nekrosis, kelainan lemak ini tidak menyebabkan kematian dan dianggap sebagai akibat muntah yang terus-menerus.
- b. Jantung: jantung menjadi lebih kecil dari biasanya dan beratnya atrofi ini sejalan dengan lamanya penyakit,
- c. Otak: kadang terdapat bercak perdarahan pada otak dan kelainan, dapat pula dijumpai adanya dilatasi pembuluh kapiler.
- d. Ginjal: ginjal tampak pucat dan degenerasi lemak dapat pula ditemukan pada tubuli kontorti (Winkjosastro, 2017).

7. Patofisiologi

Patofisiologi hiperemesis belum diketahui pasti, teori yang paling umum digunakan karena adanya pengaruh berbagai hormon kehamilan. Namun dari patofisiologi mual dan muntah kita dapat mengetahui penyebab timbulnya muntah.


Muntah merupakan cara traktus gastrointestinal mengosongkan isinya, ketika semua bagian atas gastrointestinal teriritasi secara luas atau sangat terstimulasi menyebabkan suatu rangsangan khusus yang kuat untuk muntah. Sinyal sensorik mual dan muntah dikordinasikan di pusat muntah pada medula batang otak oleh saraf aferen vagal dan aferen simpatis.

Gerakan muntah atau vomitus dikendalikan oleh dua pusat medularis yang berbeda seperti yang terlihat pada gambar 2.2 mengenai hubungan persarafan pusat muntah yaitu :

- a. Pusat vomitus di bagian dorsal retikulum lateralis,
- b. Kemoreseptor Trigger Zone di daerah postrema dasar ventrikulus keempat.

Setiap orang memiliki ambang yang sangat berbeda terhadap berbagai stimulus pada pusat vomitusnya. Pusat muntah mengontrol dan mengintegrasikan kerja emesis. Pusat muntah ini menerima rangsangan aferen dari traktus gastrointestinal dan bagian lain dari tubuh, dari batang otak yang lebih tinggi dan pusat korteks, terutama aparatus labirin, dan dari zona pencetus kemoreseptor.

Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ) atau zona pencetus kemoreseptor dengan sendirinya tidak mampu menimbulkan gerakan vomitus, aktivasi zona ini lebih memberikan impuls eferen pada pusat vomitus medularis yang selanjutnya akan memulai emesis. CTZ merupakan kemoreseptor emetik yang dapat diaktivasi oleh berbagai stimulus seperti penggunaan obat-obat tertentu termasuk apomorfina dan morfin, toksin, bakteri, dan abnormalitas metabolik yang merangsang kemoreseptor hingga mencetuskan muntah.



Gambar 2.2 Hubungan persarafan pusat muntah, beberapa inti sensorik, motorik dan kontrol.

Sumber: <https://images.app.goo.gl/36bdsggLLZDP3UHU7>

Impuls motorik yang menyebabkan muntah di transmisikan dari pusat muntah melalui jalur saraf kranialis V, VII, IX, X dan XII melalui saraf vagus dan simpatis. Lintasan eferen yang penting pada vomitus adalah nervus frenikus (pada diafragma), nervus spinalis (pada muskulatur interkostalis dan abdominalis) dan serabut saraf eferen viseral dalam nervus vagus (pada laring, faring, esofagus, dan lambung). Pusat muntah berlokasi dekat pusat medula lain yang mengatur fungsi respirasi, vasomotor dan autonomik yang dapat terkena pada proses muntah. Ketika pusat muntah sudah cukup terangsang akan timbul efek :

- a. Bernafas dalam .
- b. Terangkatnya tulang hioid dan laring untuk mendorong sfingter krikoesofagus terbuka.

- c. Tertutupnya glotis.
- d. Terangkatnya palatum mole untuk menutup nares posterior.
- e. Berikutnya timbul kontraksi yang kuat dari otot abdomen yang dapat menimbulkan tekan intragastrik yang meninggi. Akhirnya sfingter esofagus mengalami relaksasi, sehingga memungkinkan pengeluaran isi lambung. (Diane Marlin,2015).

8. Diagnosis

Diagnosis hiperemesis gravidarum ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum. adapun penyakit yang dapat menyebabkan muntah yaitu hepatitis, tumor serebri (Winkjosastro, 2017).

Keluhan muntah yang berat dan persisten tidak selalu menandakan hiperemesis gravidarum. Penyebab-penyebab lain seperti penyakit gastrointestinal, pielonefritis dan dan penyakit metabolic perlu di ekslusi. Satu indikator sederhana yang berguina adalah awitan mual muntah pada hiperemesis gravidarum biasanya dimulai dalam 8 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Karena itu pada trimester kedua dan ketiga menurunkan kemungkinan hiperemesis gravidarum. Demam, nyeri perut atau sakit kepala juga bukan merupakan gejala khas hiperemesis gravidarum. pemeriksaan ultrasonogravi perlu dilakukan untuk mendeteksi kehamilan ganda dan mola hidatidosa. Selain itu untuk menegakkan diagnosis hiperemesis gravidarum yaitu:

- a. Amenore yang disertai muntah hebat (segala yang dimakan dan diminum akan dimuntahkan), pekerjaan sehari-hari akan terganggu, dan haus hebat.
- b. Fungsi vital: nadi meningkat 100 kali per menit, tekanan darah menurun pada keadaan berat, subfebril dan gangguan kesadaran (apatis-koma).
- c. Fisik : dehidrasi, keadaan berat, kulit pucat, ikterus, sinusis, berat badan menurun, persio lunak pada vagina touche, uterus besar sesuai besarnya kehamilan.
- d. Laboratorium: kenaikan relatif hemoglobin dan hematokrit, *shif to the left*, badan keton dan proteinuria.

9. Komplikasi

- a. Bagi wanita hamil

Jika tidak diobati, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi berat, gagal ginjal, mielinolisis pontine pusat, koagulopati, atrofi, mallory-weiss sindrom, hipoglikemia, sakit kuning, kekurangan gizi, ensefalopati wernicke, pneumomediastinum, rhabdomyolysis, deconditioning, avulsion limpa, dan vasospasms arteri serebral. Depresi merupakan komplikasi sekunder umum HCG (*Human Chorionic Gonadotropin*). Pada kesempatan langka seorang wanita dapat meninggal karena hiperemesis.

- b. Bagi janin

Bayi dari wanita dengan hiperemesis berat yang mendapatkan kurang dari 7 kg (15,4 lb) selama kehamilan cenderung perkembangan

janin terhambat, berat lahir rendah, kecil untuk usia kehamilan, dan lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang terpenuhi baik untuk ibu maupun janin. Sebaliknya, bayi dari wanita dengan hiperemesis yang memiliki keuntungan kehamilan berat lebih dari 7 kg muncul mirip sebagai bayi dari kehamilan tanpa komplikasi.

10. Penatalaksanaan

Tatalaksana hiperemesis gravidarum sangat beragam tergantung dari beratnya gejala yang terjadi. Tatalaksana dini dapat berpengaruh baik pada pasien. Ketika menatalaksana ibu dengan HCG (*Human Chorionic Gonadotropin*), pencegahan serta koreksi kekurangan nutrisi adalah prioritas utama agar ibu dan bayi tetap dalam keadaan sehat. Pasien dapat dirawat karena mual dan muntah yang berlebihan disertai koreksi untuk gangguan elektrolit dan cairan. Pemberian nutrisi oral (melalui mulut) dapat diberikan pada pasien secara perlahan-lahan, dimulai dengan makanan cair, kemudian meningkat menjadi makanan padat dalam porsi kecil yang kaya akan karbohidrat. Apabila keluhan dan gejala tidak mengurang maka diperlukan :

a. Obat – obatan

Tabel 2. Obat-obatan untuk Tata Laksana Mual dan Muntah dalam Kehamilan.

FDA kepanjangan dari Food and Drug Administration. Kategori obat menurut FDA adalah sebagai berikut: A, berdasarkan studi kontrol tidak didapatkan risiko; B, tidak terbukti berisiko untuk manusia; C,

risiko tidak dapat disingkirkan; D, terbukti berisiko; dan X, kontraindikasi pada kehamilan.

Agen	Dosis Oral	Efek Sedang	Kategori Obat (FDA)	Keterangan
Vitamin B6 (piridoksin)	10-25 mg Setiap 8 jam		A	Vitamin B6 atau kombinasi vitamin B6-antihistamin direkomendasikan sebagai terapi ini per tama.
Kombinasi vitamin B6-doxylamine	Piridoksin, 10-25 mg setiap 8 jam; doxy- Sedasi A B6-doxylamine lamine, 25 mg sebelum tidur, 12,5 mg pada pagi hari jika dibutuhkan ditambah 12,5 mg pada siang hari jika dibutuhkan	Sedasi	A	
Antihistamin		Sedasi		
Doxylamine	12,5-25 mg setiap 8 jam		A	
Diphenhydramine	25-50 mg setiap 8 jam		B	
Meclizine	25 mg setiap jam		B	
Hydroxyzine	50 mg setiap 4-6 jam		C	
Dimenhydrinate	50-100 mg setiap 4-6 jam		B	
Phenothiazine		Gejala ekstrasiramidal, sedasi		
Promethazine	25 mg setiap 4-6 jam		C	Kerusakan jaringan berat dengan pemberian intravena: lebih disarankan pemberian oral,rectal atau intramuskular
Prochlorperazine Antagonis dopamine	5-10 mg setiap 6 jam		C	
Metoclopramide	10 mg setiap 6 jam	Tardive dyskinesia	B	Pemberian obat lebih dari 12 minggu meningkatkan risiko Tardiva dyskinesia
Antagonis reseptor Serotonin		Konstipasi,diare, sakit kepala, <i>fatigue</i>		
Ondansetron Glukokortikoid	4-8 mg setiap jam		B	Jangan digunakan sebelum usia gestasi 10 minggu; durasi

				mkasimum terapi 6 minggu untuk membatasi efek samping serius
Metilprednison	16 mg setiap 8 jam selama 3 hari, kemudian dosis ditentukan selama 2 minggu	Sedikit meningkatkan risiko bibir sumbing jika digunakan sebelum 10 minggu usia gestasi	C	
Ekstrak jahe	125-250 mg setiap jam	Refluks, <i>heartburn</i>	C	

Sumber : Kevin Gunawan, J Indon Med Assoc, Volum: 61, Nomor: 11, November 2011

- b. Anti emetik (pada keadan lebih berat) : disiklomin hidrokloride atau khlorpromasin. Penanganan hiperemesis gravidarum yang lebih berat perlu dikelola di rumah sakit.
- c. Isolasi
- 1) Penderita disendirikan dalam kamar yang tenang, tetapi cerah dan peredaran udara yang baik.
 - 2) Catat cairan yang keluar masuk.
 - 3) Hanya dokter dan perawat yang boleh masuk ke dalam kamar penderita, sampai muntah berhenti dan penderita mau makan
 - 4) Tidak diberikan makanan/minuman dan selama 24 jam. kadang – kadang dengan isolasi saja gejala – gejala akan berkurang atau hilang tanpa pengobatan.
- d. Terapi psikologi
- 1) Perlu diyakinkan kepada penderita bahwa penyakit dapat disembuhka
 - 2) Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan
 - 3) Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik
- e. Cairan parenteral

- 1) Cairan yang cukup elektrolit, karbohidrat dan protein dengan glukose 5% dalam cairan fisiologis (2 – 3 liter/hari)
- 2) Dapat ditambah kalium, dan vitamin (vitamin B kompleks, Vitamin C
- 3) Bila kekurangan protein dapat diberikan asam amino secara intravena
- 4) Bila dalam 24 jam penderita tidak muntah dan keadaan umum membaik dapat diberikan minuman dan lambat laun makanan yang tidak cair. Dengan penanganan diatas, pada umumnya gejala akan berkurang dan keadaan akan bertambah baik (Saifuddin, 2016).

11. Kompetensi Bidan pada Hiperemesis Gravidarum

- a. Melakukan pemeriksaan pada pasien hiperemesis gravidarum
- b. Menetapkan tingkat hiperemesis gravidarum dan masalah potensial yang dapat terjadi.
- c. Memberikan asuhan dengan :
 1. Memberitahukan ibu bahwa penyakit yang dialaminya dapat disembuhkan.
 2. Memberitahu ibu bahwa dia akan di infuse cairan dekstrose 10% atau 5% : RL = 2:1 dengan 28 tetes/menit.
 3. Memberikan vitamin B, dan anti muntah
 4. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering
 5. Menganjurkan ibu untuk makan yang tinggi karbohidrat dan protein seperti nasi, roti, kacang-kacangan.

6. Mengajarkan ibu banyak mengonsumsi buah dan sayur
 7. Mengajarkan ibu untuk istirahat dan rileks.
- d. Melakukan evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan asuhan
 - e. Melakukan pendokumentasian

C. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

1. Pengertian

- a. Hiperemesis gravidarum tingkat II sendiri adalah mual dan muntah hebat dalam masa kehamilan yang dapat menyebabkan kekurangan cairan, penurunan berat badan, atau gangguan elektrolit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan membahayakan janin di dalam kandungan (Saifuddin, 2016).
- b. Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah mual muntah yang terjadi tidak wajar pada 60-80% primigravida, dan 40-60% pada multigravida yang terjadi karena peningkatan kadar estrogen dan sangat mengganggu aktifitas (Wiknjosastro, 2017).
- c. Hiperemesis gravidarum tingkat II mual dan muntah berlebihan selama masa kehamilan. Muntah yang membahayakan ini melebihi muntah normal yang berlangsung sehubungan dengan penurunan berat badan (Varney H, 2016).
- d. Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah rasa mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil antara periode pertama dan kedua terlambat haid. Kejadian dari hiperemesis ini mencapai 50-70% yang diakibatkan

adanya perubahan hormon estrogen dan pengaruh psikologis (Salmah, 2016).

2. Penyebab Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida dan over distensi rahim pada hamil ganda dan hamil mola hidatidosa. Sebagian kecil primigravida belum mampu beradaptasi terhadap hormon estrogen dan khorionik gonadotropin, sedangkan pada hamil ganda dan mola hidatidosa, jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi dan menyebabkan terjadi hiperemesis gravidarum itu.

Faktor predisposisi yang sering dikemukakan adalah primigravida, mola hidatidosa dan kehamilan ganda. Frekuensi yang tinggi pada mola hidatidosa dan kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormon memegang peranan, karena pada kedua keadaan tersebut hormon Chorionik gonadotropin dibentuk berlebihan (Saifuddin, 2016).

- a. Level hormon β -hCG yang tinggi. Hormon ini meningkat cepat pada triwulan pertama kehamilan dan dapat memicu bagian dari otak yang mengontrol mual dan muntah.
- b. Perubahan saluran pencernaan selama kehamilan, saluran cerna terdesak karena memberikan ruang untuk perkembangan janin. Hal ini dapat berakibat refluks asam (keluarnya asam dari lambung ke

tenggorokan) dan lambung bekerja lebih lambat menyerap makanan sehingga menyebabkan mual dan muntah.

- c. Faktor psikologis. Stress dan kecemasan dapat memicu terjadinya *morning sickness*.
- d. Diet tinggi lemak. Risiko hiperemesis gravidarum meningkat sebanyak 5 kali untuk setiap penambahan 15 g lemak jenuh setiap harinya.
- e. *Helicobacter pylori*. Penelitian melaporkan bahwa 90% kasus kehamilan dengan hiperemesis gravidarum juga terinfeksi dengan bakteri ini, yang dapat menyebabkan luka pada lambung (Saifuddin, 2016).

3. Faktor Predisposisi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

a. Faktor Adaptasi dan Hormonal

Pada wanita hamil yang kekurangan darah, lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida dan overdistensi rahim pada kehamilan ganda dan mola hidatidosa. Sebagian kecil primigravida belum mampu beradaptasi terhadap hormon estrogen, sedangkan pada hamil ganda dan mola hidatidosa, jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi dan menyebabkan terjadi hiperemesis gravidarum (Saifuddin, 2016).

b. Faktor Psikologis

Hubungan faktor psikologis dengan kejadian hiperemesis gravidarum belum jelas. Besar kemungkinan bahwa wanita yang

menolak hamil, takut kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan dengan suami dan sebagainya, diduga dapat menjadi faktor kejadian hiperemesis gravidarum. dengan perubahan suasana dengan masuk rumah sakit frekuensi muntahnya dapat berkurang dan berangsur sembuh (Saifuddin, 2016).

c. Faktor Alergi

Pada kehamilan, dimana terjadi invasi jaringan vili korialis yang masuk ke dalam peredaran darah ibu, maka faktor alergi dianggap dapat menyebabkan kejadian hiperemesis gravidarum.

4. Gejala Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Gejala hiperemesis gravidarum tingkat II yaitu terjadinya mual muntah terus menerus menyebabkan penderita lemah, tidak mau makan, berat badan turun dan nyeri pada epigastrium, denyut nadi meningkat, tekanan darah turun, turgor kulit kurang, lidah kering, serta mata cekung sehingga menyebabkan mual muntah (Prawirohardjo, S. 2016).

5. Patologi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Wanita meninggal akibat hiperemesis gravidarum menunjukkan kelainan-kelainan pada berbagai alat dalam tubuh, yaitu:

a. Hati

Hiperemesis gravidarum tanpa komplikasi ditemukan degenerasi lemak tanpa nekrosis, kelainan lemak ini tidak menyebabkan kematian dan dianggap sebagai akibat muntah yang terus-menerus.

b. Jantung

Jantung menjadi lebih kecil dari biasanya dan beratnya atrofi ini sejalan dengan lamanya penyakit,

c. Otak

Kadang terdapat bercak perdarahan pada otak dan kelainan, dapat pula dijumpai adanya dilatasi pembuluh kapiler.

d. Ginjal

Ginjal tampak pucat dan degenerasi lemak dapat pula ditemukan pada tubuli kontorti (Saifuddin, 2016).

6. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Pengaruh fisiologik hormon estrogen mengakibatkan adanya perasaan mual yang terjadi pada trimester pertama mungkin karena adanya pengosongan pada lambung. Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi, karena oksidasi lemak yang tidak sempurna terjadilah ketosis dalam darah. kekurangan cairan yang diminum dapat menyebabkan kehilangan cairan, bila terjadi terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstrakuler dan plasma berkurang.

Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung dengan akibat perdarahan gastro intestinal. hiperemesis gravidarum ini menyebabkan natrium dan klorida darah turun, sehingga jumlah zat makanan dan

oksigen ke jaringan tubuh berkurang dapat merusak hati dan dapat terjadi robekan pada selaput esophagus dan lambung dan terjadi perdarahan gastrointestinal. (Saifuddin, 2016).

7. Diagnosis Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Diagnosis hiperemesis gravidarum harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah yang terus-menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum. Keluhan muntah yang berat dan persisten tidak selalu menandakan hiperemesis gravidarum. Penyebab-penyebab lain seperti penyakit gastrointestinal, pielonefritis dan penyakit metabolik perlu di eksklusi. Satu indikator sederhana yang berguna adalah awitan mual muntah pada hiperemesis gravidarum biasanya dimulai dalam 8 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Karena itu pada trimester kedua dan ketiga menurunkan kemungkinan hiperemesis gravidarum. Demam, nyeri perut atau sakit kepala juga bukan merupakan gejala khas hiperemesis gravidarum. pemeriksaan ultrasonografi perlu dilakukan untuk mendeteksi kehamilan ganda dan mola hidatidosa. Selain itu untuk menegaskan diagnosis hiperemesis gravidarum yaitu:

- a. Amenore yang disertai muntah hebat (segala yang dimakan dan diminum akan dimuntahkan), pekerjaan sehari-hari akan terganggu, dan haus hebat.
- b. Fungsi vital: nadi meningkat 100 kali per menit, tekanan darah menurun pada keadaan berat, subfebril dan gangguan kesadaran (apatis-koma).

- c. Fisik: dehidrasi, keadaan berat, kulit pucat, ikterus, sinosis, berat badan menurun, porsio lunak pada vagina touche, uterus besar sesuai besarnya kehamilan.
- d. Laboratorium: kenaikan relatif hemoglobin dan hematokrit, *shif to the left*, badan keton dan proteinuria. (Saifuddin, 2016).

8. Komplikasi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

- a. Bagi wanita hamil

Jika tidak diobati, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi berat, gagal ginjal, mielinolisis pontine pusat, koagulopati, atrofi, *Mallory-Weiss* sindrom, hipoglikemia, sakit kuning, kekurangan gizi, ensefalopati Wernicke, pneumomediastinum, rhabdomyolysis, deconditioning, avulsion limpa, dan vasospasms arteri serebral. Depresi merupakan komplikasi sekunder umum HG. Pada kesempatan langka seorang wanita dapat meninggal karena hiperemesis.

- b. Bagi janin

Bayi dari wanita dengan hiperemesis berat yang mendapatkan kurang dari 7 kg (15,4 lb) selama kehamilan cenderung perkembangan janin terhambat, berat lahir rendah, kecil untuk usia kehamilan, dan lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Hal ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang terpenuhi baik untuk ibu maupun janin. Sebaliknya, bayi dari wanita dengan hiperemesis yang memiliki keuntungan kehamilan berat lebih dari 7 kg muncul mirip sebagai bayi dari kehamilan tanpa komplikasi (Saifuddin, 2016).

9. Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Tatalaksana hiperemesis gravidarum sangat beragam tergantung dari beratnya gejala yang terjadi. Tatalaksana dini dapat berpengaruh baik pada pasien. Ketika menatalaksana ibu dengan *Human Chorionic Gonadotropin*, pencegahan serta koreksi kekurangan nutrisi adalah prioritas utama agar ibu dan bayi tetap dalam keadaan sehat. Pasien dapat dirawat karena mual dan muntah yang berlebihan disertai koreksi untuk gangguan elektrolit dan cairan. Pemberian nutrisi oral (melalui mulut) dapat diberikan pada pasien secara perlahan-lahan, dimulai dengan makanan cair, kemudian meningkat menjadi makanan padat dalam porsi kecil yang kaya akan karbohidrat.

a. Penatalaksanaan hiperemesis tingkat II :

- 1) Makan dalam jumlah atau porsi sedikit tapi sering.
- 2) Hindari makan yang berminyak dan berbau lemak.
- 3) Makan makanan dan minuman yang disajikan jangan terlalu panas ataupun dingin.
- 4) Makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein yang dapat membantu mengatasi rasa mual karena dapat menetralkan asam lambung.
- 5) Banyak mengonsumsi buah dan sayuran sebagai pemenuhan kebutuhan nutrisi yang hilang.
- 6) Kurangi pekerjaan yang berat dan yakinkan ibu bahwa penyakit ini dapat disembuhkan.

- 7) Beri vitamin B1 dan B6 untuk mengurangi mual dan muntah.
 - 8) Istirahat dan rileks akan membantu mengatasi rasa mual dan muntah
- (Kusmiyati, Y. dkk. 2018)

D. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan

Kemajuan yang dicapai dalam embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuatan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan sehingga dia merobek rahim dimana ia berdempet dan memakannya sehingga darah mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang didalam kolam darh ibu yang kaya dengan seripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandung dengan lahap memakannya.

Masa-masa kehamilan adalah masa yang cukup menegangkan bagi calon ibu baru. Ada rasa takut, khawatir, resah, meski bercampur dengan bahagia karena menanti sang buah hati. Terlebih lagi setelah memasuki masa-masa persalinan. Ketegangan dan kekhawatiran biasanya semakin meningkat. Karena itulah, Islam memberikan tuntunan bagi para ibu hamil. Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya seorang wanita hamil diperlakukan. Apa saja hak mereka, dan tentu saja kewajiban suami terhadap pasangannya yang sedang mengandung anaknya tersebut. Kewajiban semua pihaklah untuk peduli terhadap masalah tersebut :

Berikut ayat yang berhubungan dengan kehamilan.

Qur'an Surah Al-Mu'minun: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

12. Dan Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.

Quraish shibab dalam penafsirannya menjelaskan bahwa ayat-ayat yang lalu menjelaskan keberuntungan orang-orang mukmin dengan berbagai sifat mereka yang terpuji, kini ayat-ayat diatas menjelaskan proses kejadian manusia. Penjelasan tentang proses terjadinya manusia yang begitu mengagungkan membuktikan perlunya beriman kepada Allah sang pencipta serta mengikuti perilaku-perilaku orang-orang mukmin yang disebut ayat-ayat klompok pertama. Hal itulah yang dapat memberikan kesempurnaan hidup dunia dan akhirat.

Kemudian firman Allah dalam Q.S. As-Sajdah:7-9

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ
مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ ۗ وَجَعَلَ لَكُمُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

7. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.
8. kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina.
9. kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.

E. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Kebidanan

1. Pengertian

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah (Varney, 2016).

2. Tahapan Manajemen Kebidanan Hiperemesis Gravidarum

a. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Pada langkah pertama, dilakukan pengkajian melalui pengumpulan semua data dasar yaitu Pada langkah pertama ini dikumpulkan semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua

sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara:

- 1) Anamnesis, adapun data yang kita dapatkan untuk pasien dengan hyperemesis gravidarum tingkat I yaitu terjadinya mual muntah terus menerus dapat menyebabkan penderita lemah, tidak mau makan, nyeri pada epigastrium.
- 2) Pemeriksaan fisik dilakukan yaitu berat badan mengalami penurunan, denyut nadi meningkat dan tekanan darah menurun. tekanan darah turun, turgor kulit kurang, lidah kering, serta mata cekung

b. Langkah II: Interpretasi Diagnosa / Masalah Aktual

Pada langkah ini, dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosis atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang dikumpulkan akan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosis yang spesifik. Istilah masalah dan diagnosis digunakan karena beberapa masalah tidak dapat diselesaikan, seperti diagnosis, tetapi membutuhkan penanganan yang dituangkan ke dalam rencana asuhan terhadap klien (Saminen, 2013).

- 1) Diagnosa : Hyperemesis Gravidarum Tingkat II
- 2) Masalah aktual : Gangguan nutrisi dan dehidrasi.

c. Langkah III: Identifikasi Diagnosis Atau Masalah Potensial

Pada langkah ini, bidan mengidentifikasi masalah dan diagnosis yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, jika kemungkinan dilakukan pencegahan. Sambil mengamati kondisi klien,

bidan diharapkan dapat bersiap jika diagnosis atau masalah potensial benar-benar terjadi dilakukan asuhan secara aman. Identifikasi diagnosis masalah potensial yaitu potensial terjadinya dehidrasi berat, dan potensial terjadinya pertumbuhan janin terhambat karena kurangnya asupan nutrisi ke bayi karena ibu tidak makan. Jika tidak mendapatkan penanganan yang adekuat, hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi berat, gagal ginjal, mielinolisis pontine pusat, koagulopati, atrofi, *mallory-weiss* sindrom, hipoglikemia, sakit kuning, kekurangan gizi, ensefalopati *wernicke*, pneumomediastinum, rhabdomyolysis, deconditioning, avulsion limpa, dan vasospasms arteri serebral. Depresi merupakan komplikasi sekunder umum HG. Pada kesempatan langka seorang wanita dapat meninggal karena hiperemesis

d. Langkah IV: Tindakan Segera (*Emergency*)

Konsultasi, Kolaborasi dan Rujukan Bidan mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan/atau konsultasi atau penanganan bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien. Langkah keempat mencerminkan kesinambungan proses manajemen kebidanan. Manajemen bukan hanya selama asuhan primer periodik atau kunjungan prenatal, tetapi juga selama wanita tersebut dalam persalinan

e. Langkah V: Intervensi/Rencana Tindakan

Pada langkah ini, direncanakan asuhan menyeluruh yang ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosis atau masalah yang telah diidentifikasi

atau diantisipasi. Pada langkah ini, informasi atau data yang tidak lengkap dapat dilangkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan. Setiap rencana asuhan harus disetujui oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan secara efektif.

f. Langkah VI: Implementasi/ Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini rencana tindakan menyeluruh yang diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dapat dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian dilakukan klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ketika bidan berkolaborasi dengan dokter untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab terhadap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan menghemat waktu dan biaya serta meningkatkan mutu asuhan klien

g. Langkah VII: Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan bantuan yang diidentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika pelaksanaannya efektif, sedang sebagian yang lain belum efektif. Mengingat proses manajemen asuhan ini merupakan

suatu kontinum, perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi mengapa proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan tersebut.

Langkah proses manajemen pada umumnya merupakan pengkajian yang memperjelas proses pemikiran dan mempengaruhi tindakan serta orientasi proses klinis karena proses manajemen tersebut berlangsung di dalam situasi klinis dan dua langkah terakhir bergantung pada klien dan situasi klinis, tidak mungkin proses manajemen ini dievaluasi dalam tulisan saja.

Evaluasi dalam hal ini hasil dari asuhan yang diberikan pada ibu meliputi keadaan ibu terhadap hiperemesis tingkat I yang dialaminya dan juga memperhatikan keadaan janin yang ada dalam kandungan ibu. Dan pada langkah inilah dapat dilihat apakah hiperemesis ibu teratasi atau tidak.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Dokumentasi merupakan catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, serta respon pasien terhadap semua kegiatan yang dilakukan, asuhan itu harus dicatat dengan benar, jelas, logis, sehingga dapat mengomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan telah dilakukan secara sistematis, dalam bentuk SOAP, yaitu:

a) Subjektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah I Varney..

b) Objektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan penunjang, untuk mendukung asuhan yang akan dan telah diberikan sebagai langkah I Varney.

c) Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif

d) Planning

Menggambarkan pendokumentasian hasil perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian asuhan yang telah diberikan sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney.



BAB III

TELUSURAN EVIDENCE BASED LEARNING

A. Matriks Langkah I : Identifikasi Data Dasar

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Hubungan Sikap Ibu Hamil Terhadap Hiperemesis Gravidarum Tingkat Sedang Di Ruang Kasuari Rsu Anutapura Palu	Wayan Wirawan	2017	Hubungan sikap ibu hamil terhadap kejadian hyperemesis gravidarum	Ada hubungan antara sikap ibu hamil terhadap hiperemesis gravidarum tingkat sedang, dilanjutkan dengan regresi sederhana yang berarti mempunyai pengaruh sikap ibu hamil terhadap hiperemesis gravidarum	Sampel yang digunakan dalam penelitian ini kurang.	Kelemahan dari penelitian ini adalah ibu menggunakan penelitian <i>cross sectional study</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2020).
2	Diagnosis dan Tata laksana Hiperemesis Gravidarum	Gunawan, Samuel, dan Dwiana	2011	Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia.	Beberapa faktor yang berhubungan dengan hiperemesis gravidarum antara lain riwayat hiperemesis gravidarum sebelumnya, berat badan yang berlebih, kehamilan ganda, penyakit trofoblast, nuliparitas dan merokok. Faktor biologis yang paling berperan adalah perubahan kadar hormon	Parameter laboratorium yang perlu dinilai adalah keseimbangan asam basa dan elektrolit.	Lebih memahami mengenai Etiologi dan patogenesis emesis dan hiperemesis gravidarum berkaitan erat dengan etiologi dan patogenesis mual dan muntah pada kehamilan	Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh surianti (2017).

					selama kehamilan.			
3	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil	Kristina Paskana	2020	Hubungan paritas dengan hiperemesis gravidarum	Menggunakan bahasa yang baku sehingga mudah untuk dipahami.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertje Salome Umboh (2014).		
4	Faktot-faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum di RSUD Muhammadiyah metro	Fitri,septiani, dan herlina	2017	Faktor penyebab hiperemesis gravidarum	Faktor penyebab hiperemesis gravidarum adalah kehamilan multiparah dan umur ibu <20 tahun dan >35 tahun selain itu terjadi pada usia khamilan 12 – 16 minggu pertama. Pada primipara disebabkan karena factor psikologis ibu hamil masih belum siap dengan kehamilannya. Sedangkan pada multipara disebabkan karena kondisi psikologis ibu terganggu akibat kehamilan yang tidak diinnginkan, kecemasan dan rasa bersalah saat mereka tidak mampu merawat anak yang lain secara	Kpnseling dan edukasi kepada ibu hamil perlu dilakukan mengenai kehamilan serta anjuran diet makan untuk mencegah terjadinya komplikasi lainnya	Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan analitik kolerasi dan rancangan case control	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh usain (2014)

					adekuat.			
5	Penerapan alup presur pada titik P6 terhadap emesis gravidarum pada ibu trimester 1	Mariza dan lia	2019	Patofisiologi emesis gravidarum	Patofisiologi emesis gravidarum dapat disebabkan karena peningkatan hormone HCG dapat menjadi factor mual dan munth. Peningkatan kadar hormone progesterone meningkatkan otot polos pada system gastrointestinal mengalami rileksasi sehingga motilitas menurun dan lambung menjadi kosong	Jumlah sample dalam penelitian ini kurang	Penelitian ini menggunakan theknik kuantitatif praeksperimental dengan pendekatan wandgrup pretes-postes desain	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh mayasari (2013)
6	Hubungan Hiperemesis Gravidarum dengan Usia Ibu, Usia Gestasi, Paritas, dan Pekerjaan pada Pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang	Inthan Atika	2016	Faktor Risiko kejadian hyperemesis gravidarum	Faktor risiko usia ibu merupakan factor yang paling sering dikaitkan dengan hyperemesis gravidarum karena berhubungan dengan kondisi psikologi ibu hamil. Ibu dengan usia <20 tahun atau >35 tahun merupakan usia berisiko bagi ibu hamil. Gestasi juga merupakan faktor risio hyperemesis gravidarum. Kemudian paritas, pekerjaan yang berhubungan dengan kondisi social ekonomi yang	Sampel yang digunakan kurang	Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian analitik dengan desain cross sectional.	Perbandingan dalam penelitian ini adalah penelitian Kristina dengan penelitian sekarang memiliki metode penelitian yang berbeda

					mempengaruhi pola asupan makanan, aktivitas dan stress pada ibu hamil.			
7	Kejadian hyperemesis gravidarum ditinjau dari riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal saat prakonsepsi di BPM Kusmawati Surabaya	Anggasari	2016	Faktor penyebab terjadinya hyperemesis gravidarum	Faktor penyebab terjadinya hyperemesis gravidarum pada ibu hamil, antara lain kelelahan, janin wanita, mual muntah pada kehamilan yang sebelumnya, penggunaan pil kontrasepsi saat prakonsepsi, mual premenstruasi, stress, cemas dan takut.	Tidak ada kekurangan pada jurnal tersebut	Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik dengan pendekatan cross sectional dengan melakukan pengamatan data variable independen dan variable dependen secara bersamaan dalam waktu yang sama.	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tiran (2009)
8	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis gravidarum di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang	Sarianti	2017	hubungan antara kehamilan ganda dengan hiperemesis gravidarum.	Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara kehamilan ganda dengan hiperemesis gravidarum. Hal ini dikarenakan ibu hamil dengan kehamilan ganda, kadar hormon estrogen dan Hcg (human Chorionic gonadotropin) meningkat sehingga mual muntah pada	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional dengan rancangan penelitian Retrospektif	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Samuel, dan Dwiana (2011).

					kehamilan ini meningkat dibandingkan dengan kehamilan janin tunggal			
9	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa	Hertje Salome Umboh	2014	Faktor yang berhubungan dengan kejadian hyperemesis gravidarum	Hasil penelitian menunjukkan uji statistik bahwa umur, pendidikan, paritas dan jarak kehamilan berhubungan dengan dengan kejadian <i>Hiperemesis Gravidarum</i>	Institusi pendidikan juga dapat makin mendorong penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan <i>Hiperemesis Gravidarum</i> agar mempertimbangkan faktor lainnya selain yang sudah diangkat lewat penelitian ini	Penelitian menggunakan teknik penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Retrospektif study.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina Paskana (2020).
10	Efektifitas pemberian seduhan jahe terhadap frekuensi hiperemesis gravidarum trimester 1	Dewi, fahrini, azhari, dan mika	2020	Mual muntah yang terjadi pada kehamilan	Mual muntah yang terjadi pada kehamilan disebabkan karena terjadinya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesterone yang diproduksi oleh HCG dalam serum dari plasenta. Frekuensi terjadinya mual muntah tidak hanya dipagi hari melainkan bisa terjadi disiang bahkan hingga dimalam hari. Wanita hamil	Usia seseorang dapat mempengaruhi mual dan munta, semakin tua usia seseorang maka semakin jarang mengalami mual muntah	Penelitian ini menggunakan desain quasi eksperimen dengan rancangan wandrup pretes postes	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hutaheyan (2013)

					mengalami mual muntah pada trimester pertama frekuensi mual munta pada primipara lebih tinggi dari pada multipara.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--



B. Matriks Langkah II : Identifikasi Masalah Aktual

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Hiperemesis gravidarum di RSUD Muhammadiyah Metro	Fitri Muriyasari	2017	Faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan umur, paritas, dan usia kehamilan dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada usia kehamilan. Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, terjadi gangguan elektrolit ketosis, dehidrasi, penurunan berat badan sebesar 5%	Penelitian ini hanya menggunakan variabel paritas	Institusi pendidikan juga dapat makin mendorong penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan <i>Hiperemesis Gravidarum</i> agar mempertimbangkan faktor lainnya selain yang sudah diangkat lewat penelitian ini	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrianti (2018).
2	Gambaran Keton Urin Primigravida Trimester 1 dengan Hiperemesis Gravidarum di Rs Islam Sitti Maryam Manado	Nunung, Arthur, dan Rambert.	2019	Gejala umum hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum ditandai dengan mual, muntah, susah makan dan rasa lemas pada badan. Hal tersebut mengganggu metabolisme tubuh	Perlunya penelitian lanjutan dengan meningkatkan jumlah sampel penelitian guna menghindari terjadinya bias	Penelitian ini menggunakan studi deskriptif observasional dengan desain potong lintang	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2020)

						dalam penelitian		
3	Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "S" dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RS TNI Angkatan Laut Jala Ammari pada Tanggal 27 Mei-18 Juli 2018	Evi susanti	2011	Penegakan diagnosis hyperemesis gravidarum	Penegakan diagnosis hyperemesis gravidarum dimulai dengan menegakkan diagnosis kehamilan terlebih dahulu. Pada anamnesa dapat ditemukan keluhan amenorea serta mual dan muntah berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan obstetrik dapat dilakukan untuk menemukan tanda-tanda kehamilan, yakni uterus yang besarnya sesuai usia kehamilan dengan konsistensi lunak dan serviks yang livid. Pemeriksaan penunjang kadar Beta-HCG dalam urine pagi hari dapat membantu menegakkan diagnosis	Tidak ada kelemahan pada jurnal tersebut	Menggunakan bahasa yang baku serta mudah untuk dipahami	Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Inthan (2016).

					kehamilan.			
4	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis gravidarum di RSUD Dr. Drajat Prawiranegara Kabupaten serang	Sarianti	2017	Gejala hyperemesis gravidarum	Keluhan mual dan muntah terjadi pada 60-40 % multigravida. Satu diantara seribu kehamilan gejala-gejala ini menjadi lebih berat.	Penelitian ini memiliki variabel lebih dari satu variabel	Penelitian ini menggunakan teknik penelitian <i>cross sectional study</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2020)
5	Hubungan Paritas Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil	Kristina Paskana	2020	Gejala yang timbul dari hyperemesis gravidarum	Ibu hamil biasanya dapat dikatakan mengalami hiperemesis gravidarum jika mengalami muntah beberapa kali dalam sehari, atau selalu muntah setiap kali makan atau minum, atau jika berat badan turun. Biasanya kondisi ini terjadi pada sekitar minggu ke empat dan ke tujuh, dan berangsur membaik pada minggu ke- 14 dan 16 kehamilan	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Bahasa yang digunakan baku sehingga mudah dipahami.	Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nunung (2019).
6	Diagnosis Dan Penatalaksanaan	Widayana, Wayan,	2014	Manifestasi klinik pada	Manifestasi klinik pada hiperemesis	Keluhan mual muntah dapat	Penelitian ini menggunakan	Penelitian ini sejalan dengan

	Hiperemesis Gravidarum	Ketut		hyperemesis gravidarum tingkat II	gravidarum yaitu penderita tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit tampak menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu naik dan mata sedikit ikterus. Berat badan dan tensi turun, mata cekung, hemokonsentrasi, oliguria, dan kontipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan, karena mempunyai aroma yang khas	mempengaruhi keadaan ibu sampai mengganggu aktivitas sehari-hari.	teknik penelitian <i>cross sectional study</i>	penelitian yang dilakukan oleh Inthan (2016).
7	Hubungan umur dan paritas ibu hamil dengan kejadian Hiperemesis gravidarum	Asrianti Safitri Muchtar	2018	Tanda dan gejala hyperemesis gravidarum berdasarkan keluhan ibu	Mual dan muntah yang dialami ibu begitu hebat. Semua yang dimakan dan diminum ibu dimuntahkan sehingga memengaruhi keadaan umum dan pekerjaan sehari-hari ibu. Mual biasanya terjadi pada pagi hari, tetapi dapat pula timbul	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Teknik pengambilan sampel kasus dilakukan dengan total sampling dan sampel kontrol dilakukan secara system random sampling.	Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh triana (2017).

					setiap saat dan malam hari			
8	Diagnosis dan Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum	Widyana, Wayan, dan Ketut	2014	Mendiagnosis hiperemesis gravidarum	Diagnosis hiperemesis gravidarum ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Pada pemeriksaan fisik memperhatikan keadaan umum pasien, TTV, tanda dehidrasi dan UK. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah darah lengkap, gula darah, elektrolit dan USG.	Tidak menyebutkan teknik penelitian yang digunakan	Penggunaan bahasa yang baku serta mudah dipahami oleh pembaca	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Samuel, dan Dwiana
9	Hubungan Hiperemesis Gravidarum dengan Usia Ibu, Usia Gestasi, Paritas, dan Pekerjaan pada Pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Moh.	Inthan Atika	2016	Gejala hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berat selama kehamilan yang dapat menyebabkan berbagai gangguan keseimbangan tubuh ibu sehingga dapat	Tidak ada kelemahan pada jurnal tersebut	Penggunaan bahasa yang lebih baku sehingga mudah dipahami	Perbandingan dalam penelitian ini adalah penelitian Kristina dengan penelitian sekarang memiliki metode

	Hoesin Palembang				mengganggu tumbuh kembang janin. Etiologi hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti.			penelitian yang berbeda
10	Hubungan Sikap Ibu Hamil Terhadap Hyperemesis Gravidarum Tingkat Sedang Di Ruang Kasuari Rsu Anutapura Palu	Wayan Wirawan	2017	Distribusi sikap ibu terhadap hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum tingkat sedang yang dialami sang calon ibu, oleh sebab itu faktor kedewasaan seseorang berhubungan dengan kemampuannya dalam mengatasi kondisi yang dialami tingkat sedang.	Penelitian ini memiliki variabel sikap ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum	Teknik penelitian yang digunakan <i>cross sectional study</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fitri (2017).

C. Matriks Langkah III : Identifikasi Masalah Masalah Potensial

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Tingkat hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester I Di kabupaten kendal	Triana Arisdiani	2020	Masalah potensial dari hiperemesis gravidarum	Keadaan dari hiperemesis gravidarum dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, atau defisiensi nutrisi bahkan akan membahayakan ibu dan janinnya.	Penelitian ini hanya menggunakan variabel paritas	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Inthan (2016).
2	Hubungan Hiperemesis Gravidarum dengan Usia Ibu, Usia Gestasi, Paritas, dan Pekerjaan pada Pasien Rawat Inap di RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang	Inthan Atika	2016	Akibat yang dapat ditimbulkan dari hiperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berat selama kehamilan yang dapat menyebabkan berbagai gangguan keseimbangan tubuh ibu sehingga dapat mengganggu tumbuh kembang janin.	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Data diolah dengan SPSS untuk selanjutnya dilakukan analisis hubungan antara usia ibu, usia gestasi, paritas, dan pekerjaan terhadap hiperemesis gravidarum dengan uji komparatif <i>Chi Square</i> .	Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Triana (2020).

3	Efektifitas Pemberian Aoma Terapi Lavender Dalam Menurunkan Rasa Mual dan muntah pada pasien hyperemesis gravidarum	Ratih, Misrawati, dan Reni	2011	Diagnosa potensial dari hyperemesis gravidarum	Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan karena muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida darah dan air kemih turun. Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lender esophagus dan lambung. Keadaan umum yang lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat suhu meningkat dan tekanan darah menurun.	Penelitian lebih dikembangkan dengan variable yang aplikatif seperti pengobatan-pengobatan komplementer	Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dimana pengambilan sampel didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elfanny Sumai
4	Faktor-faktor yang berhubungan	Elfanny Sumai	2014	Masalah potensial yang ditimbulkan	Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan sehingga	Jumlah sampel yang digunakan kurang	Metode dalam penelitian ini adalah metode	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

	dengan kejadian <i>Hiperemesis gravidarum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara			dari hyperemesis gravidarum	menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari dan bahkan dapat membahayakan hidup ibu hamil. Hiperemesis gravidarum yang tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat pula menyebabkan kematian pada Ibu hamil . Untuk itu perlu adanya pengawasan dan penanganan yang baik bagi ibu hamil.		penelitian <i>cross sectional</i> dengan rancangan penelitian <i>Retrospektif</i>	dilakukan oleh Salome (2014).
5	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa	Hertje Salome	2014	Dampak jangka panjang yang diakibatkan dari hyperemesis gravidarum	Dampak <i>Hiperemesis Gravidarum</i> yaitu dehidrasi yang menimbulkan konsumsi O ₂ menurun, gangguan fungsi liver dan terjadi <i>Icterus</i> , terjadi perdarahan pada <i>Parenkim liver</i> sehingga menyebabkan gangguan fungsi umum alat-alat vital dan menimbulkan kematian	Institusi pendidikan juga dapat makin mendorong penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Hiperemesis Gravidarum agar mempertimbangkan faktor lainnya selain yang sudah diangkat lewat penelitian ini Jenis penelitian	Menggunakan teknik penelitian <i>deskriptif analitik</i> dengan pendekatan <i>Retrospektif study</i> . Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh ibu hamil dengan <i>Hiperemesis Gravidarum</i> yang tercatat dalam buku register tahun 2011 – 2013 di	Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Evi Susanti (2018).

							Puskesmas Tompas	
6	Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny "S" dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RS TNI Angkatan Laut Jala Ammari pada Tanggal 27 Mei-18 Juli 2018	Evi Susanti	2018	Dampak hyperemesis gravidarum terhadap janin	Hiperemesis gravidarum tidak hanya berdampak pada ibu, tapi juga berdampak pada janinnya. Seperti abortus, bayi berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir. Selain itu, kejadian pertumbuhan janin terhambat (Intrauterine Growth Retardation/IUGR) meningkat pada wanita hamil dengan hiperemesis gravidarum	data diolah dengan menggunakan 7 langkah varney	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hertje Salome (2014).
7	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Tingkat Ii Pada Ibu Hamil Di Puskesmas	Mustar	2020	Komplikasi hyperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum merupakan komplikasi mual muntah pada hamil muda, bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan gangguan aktifitas sehari-hari	Kelemahan dari penelitian ini adalah untuk hanya menggunakan uji chi square.	Kelebihan dari penelitian ini adalah terdapat lebih dari satu variabel	Perbandingan dalam penelitian ini adalah masih membutuhkan analisis mendalam tentang faktor apa saja yang berhubungan dengan

	Taretta Kecamatan Amali							hyperemesis gravidarum
8	Kejadian hyperemesis gravidarum ditinjau dari riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal saat prakonsepsi di BPM Kusmawati Surabaya	Anggasari	2016	Akibat dari hyperemesis gravidarum jika tidak tertangani dengan baik	Hiperemesis gravidarum yang menetap akan mengalami dehidrasi yang dapat berakibat fatal dan terjadi kerusakan organ hati dan ginjal, sedangkan pertumbuhan janin juga akan terganggu akibat dari kekurangan nutrisi yang akan berdampak kematian.	Sampel yang digunakan sedikit	Dapat mengetahui akibat dari hyperemesis gravidarum.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yng dilakukanoleh
9	Diagnosis dan Tata Laksana Hiperemesis gravidarum	Gunawan, Samuel, Dwiana	2011	Komplikasi yang dapat timbul akibat dari hyperemesis gravidarum	Muntah yang terus menerus disertai dengan kurang minum yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrai. Jika terus berlanjut, pasien dapat mengalami syok serta dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin. Selain itu, akibat lain muntah yang persisten adalah gangguan keseimbangan elektrolit seperti penurunan kadar	Tidak ada kelemahan pada jurnal tersebut	Pengunaan bahasa yang baku dan juga mudah dipahami	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana (2020).

					natrium, klor dan kalium, sehingga terjadi keadaan alkalosis metabolic hipokloremik disertai hiponatremia dan hypokalemia			
10	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Hiperemesis gravidarum di RSUD Muhammadiyah Metro	Fitri Muriyasari	2017	Akibat yang ditimbulkan dari hyperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, terjadi gangguan elektrolit ketosis, dehidrasi, penurunan berat badan sebesar 5%	Jumlah sampel yang digunakann kurang	Dapat mengetahui akibat dari hyperemesis gravidrum	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustar (2020).

D. Matriks Langkah IV : Tindakan Segera (*Emergency*), Konsultasi, Kolaborasi dan Rujukan

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Efektifitas Pemberian Aroma Terapi Lavender Dalam Menurunkan Rasa Mual dan Muntah Pada Pasien Hiperemesis Gravidarum	Ratih, Misrawati, dan Reni.	201	Tindakan segera pada pasien hiperemesis gravidarum	Tindakan emergensi dan kolaborasi yaitu pasien dirawat dengan pemberian terapi cairan glukosa dan elektrolit, dan vitamin secara intravena intake oral awalnya dibatasi, bertahap.	Jumlah sampel yang digunakan sedikit	Alat pengumpulan data digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat rasa mual responden dilakukan dengan teknik wawancara langsung dan penggunaan lembar observasi untuk mengetahui karakteristik responden.	Penatalaksanaan pemberian cairan dalam penelitian ini sejalan dengan tatalaksana yang dilakukan oleh Widayana,dkk (2014).
2	Diagnosis dan Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum	Widayana, Wayan, Ketut	2014	Tindakan dalam mengatasi dehidrasi pada hiperemesis gravidarum	Pemberian cairan untuk mengatasi dehidrasi harus memperhitungkan secara cermat. Memberikan cairan parental yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3	Tidak ada kelemahan pada jurnal tersebut	Prognosis hiperemesis gravidarum sangat memuaskan dengan penanganan yang baik	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumai (2014)

					liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C, dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein.			
3	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian <i>Hiperemesis gravidarum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara	Elfanny Sumai	2014	Penanganan hyperemesis gravidarum	Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari dan bahkan dapat membahayakan hidup ibu hamil. Hiperemesis gravidarum yang tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat pula menyebabkan kematian pada Ibu hamil. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan penanganan yang baik bagi Ibu hamil.	Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain	Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian <i>cross sectional</i> dengan rancangan penelitian <i>Retrospektif</i>	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayana (2014)
4	Manajemen asuhan kebidanan antenatal pada nyonya s dengan	Evi susanti, firdayanti, nadya	2019	Tindakan emergensi pada kasus hyperemesis gravidarum	Hyperemesis gravidarum dapat menjadi kasus yang membutuhkan tindakan segera jika ibu mengalami	Tidak ada kekurangan pada jurnal tersebut	Cairan ini berfungsi untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan	Penatalaksanaan pemberian cairan dalam penelitian ini sejalan dengan

	hyperemesis gravidarum tingkat II di RSTNI angkatan laut jalan amari pada tanggal 27 mei sampai 18 juli 2018	haruna			dehidrasi. Pemasangan infus dengan cairan RL 28 tpm dengan injeksi ranitidine 1 amp/iv/8 jam, kemudian injeksi ondansetron satu 1 amp per iv/8 jam, kemudian dripsneorobion 1 amp/24 jam, 28 tpm.		karbohidrat dan elektrolit pada keadaan infusiasi asupan makanan peroral	tatalaksana yang dilakukan oleh Salome (2014).
5	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa	<i>Hertje Salome Umboh</i>	2014	Penatalaksanaan tindakan pemberian cairan	Terapi dehidrasi merupakan kunci dari terapi dehidrasi. Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan pemberian larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya cairan diganti dengan cairan dekstrosa 5% dalam cairan saline 0,45%. Sebagai cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstrosa 55 atau 10% dengan RL yakni 2:1 dengan jumlah tetesan 40 per menit	Institusi pendidikan juga dapat makin mendorong penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan <i>Hiperemesis Gravidarum</i> agar mempertimbangkan faktor lainnya selain yang sudah diangkat lewat penelitian ini	Jenis penelitian merupakan penelitian <i>deskriptif analitik</i> dengan pendekatan <i>Retrospektif study</i> .	Penatalaksanaan pemberian cairan dalam penelitian ini sejalan dengan tatalaksana yang dilakukan oleh Evi,dkk (2018).
6	Asuhan	Yulianti	2019	Tindakan kolaborasi	Tindakan kolaborasi	Tetap perlu	Studi kasus ini	Penelitian ini

	keperawatan pada pasien hyperemesis gravidarum dengan penerapan pemberian air rebusan jahe untuk mengurangi mual muntah	dan eka		dengan ahli gizi	dengan ahli gizi sangat membantu untuk bias mengetahui kebutuhan kalori yang dibutuhkan sehingga klien tidak mengalami kekurangan kalori yang berlebihan dan tidak terjadi kelemahan fisik, juga dapat menentukan zat gizi yang sesuai dengan diperlukan untuk ibu hamil.	diperhatikan dosis pemberiannya, yaitu tidak perlu berlebihan atau terlalu banyak	menggunakan desain deskriptif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi	sejalan dengan penelitian yang dilakukan hidayati (2019)
7	Asuhan keperawatan pada klien dengan hyperemesis gravidarum	Rumiari	2017	Tindakan kolaborasi dengan dokter dilakukan untuk memberikan terapi farmakologi untuk mengurangi mual	Tindakan kolaboratif dengan dokter dilakukan untuk memberikan terapi farmakologi pengurang mual, juga memberikan terapi cairan untuk pencegahan maupun dehidrasi akibat pengeluaran yang banyak melalui muntah	Jumlah sampel yang dilakukan dalam penelitian ini sedikit	Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laura (2019)
8	Manajemen dan pendokumentasian asuhan kebidanan ibu hamil pada ibu Ny" W" hyperemesis	rahayu	2015	Tindakan asuhan yang diberikan pada pasien hyperemesis gravidarum	Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan cairan parenteral yang cukup elektrolit karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam	Tidak ada kelemahan ditemukan pada jurnal tersebut	Penggunaan bahasa yang baku sehingga mudah dipahami	Pemberian cairan dalam penelitian ini sejalan dengan tatalaksana yang dilakukan oleh Evi,dkk (2018).

	gravidarum tingkat II di puskesmas dana				fisiologi sebanyak 2 sampai 3 liter perhari. Bila perlu ditambah kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C. bila ada kekurangan protein, dapat diberikan pula asam amino secara intravena			
9	Asuhan Pada Ibu Hamil Trimester I Dengan Hyperemesis Gravidarum Tingkat I	Marliana dan Tita	2016	Tindakan segera dan kolaborasi pada ibu hamil dengan hyperemesis gravidarum	Tindakan segera yang harus dilakukan pada kasus hyperemesis gravidarum yaitu memperbaiki keadaan umum ibu dengan pemasangan infus dan terapi intravena.	Tidak terdapat kelemahan dalam referensi terkait	Dapat memberi penjelasan tentang penanganan hyperemesis gravidarum secara rinci	Hiperemesis dapat di bedakan menjadi tiga yaitu hyperemesis tingkat I, II, dan hyperemesis tingkat III
10	Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ny "S" Dengan Hyperemesis Gravidarum Tingkat II Di RS TNI Angkatan Laut Jala Ammari	Evi Susanti, Firdyan ti, Nadyah Haruna	2019	Tindakan Emergency Kolaborasi Dan Hyperemesis Gravidarum	Tindakan yang dilakukan pada kasus hyperemesis gravidarum adalah pemberian cairan RE dan menganjurkan ibu perbanyak zikir dan berdoa agar tidak terlalu cemas dengan kondisinya saat ini.	Tidak memberitahu doa atau ayat yang akan di lafazkan ibu	Pemberian cairan dijelaskan secara baik sehingga mudah untuk dipahami.	Penelitian ini menggunakan pendekatan 7 langkah varnay.

E. Matriks Langkah V : Rencana Tindakan

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Diagnosis dan tatalaksana hyperemesis gravidarum	Gunawan, Samuel, Dwiana	2011	Tatalaksana awal pada penderita hyperemesis gravidarum	Tata laksana awal dan utama untuk mual dan muntah tanpa komplikasi adalah istirahat dan menghindari makanan yang memicu mual seperti makanan pedas, makanan yang berlemak, atau suplemen besi. Perubahan pola diet yang sederhana seperti makan sedikit tapi sering. Manajemen stress juga dapat berperan dalam menurunkan gejala mual.	Tidak ada kelemahan pada jurnal tersebut	Menggunakan bahasa yang baku dan mudah untuk dipahami	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mustar (2020)
2	Penerapan akupresur pada titik P6 terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1	Mariza dan lia	2019	Pencegahan terhadap emesis gravidarum	Pencegahan pada emesis gravidarum dengan cara menganjurkan makan dengan jumlah kecil tetapi lebih sering, anjurkan minum the hangat dan biscuit, roti kering, selain itu ibu juga diharapkan untuk tidak mengkonsumsi susu	Kekurangan mual dan muntah merupakan keluhan yang umum terjadi pada kehamilan mudah	Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi institusi kesehatan tentang penanganan emesis gravidarum dengan menggunakan pijat	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rumiati (2019)

					ataupun makanan yang mengandung lemak, karena akan meningkatkan ransangan muntah selain itu penanganan itu dengan memberikan pijatan akupresur pada titik Pc 6, juga efektif dengan menekan bagian tiga jari dibawah pergelangan tangan, ibu dianjurkan untuk berbaring dengan posisi nyaman mungkin.		akupresur itu.	
3	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Tingkat II Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Taretta Kecamatan Amali	Mustar	2020	Penatalaksanaan dengan menggunakan metode akupresur	Penatalaksanaan mual dan muntah yang paling sering dilakukan adalah dengan memberikan minuman hangat dan menyegarkan akan tetapi tidak sedikit ibu yang menolak. Salah satu pendekatan nonfarmakologi yang biasa diberikan adalah dengan akupresur	Tidak ditemukan kelemahan pada jurnal tersebut	Penelitian ini menggunakan instrument kuisioner indeks erhaodes dan lembar operasi, tindakan tersebut sesuai dengan standar operasional prosedural	Penelitian ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2013)
4	Efektifitas konsumsi air teh kombinasi dengan air jahe	Wardani Kusuma Rahayu	2020	Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum farmakologi dan	Dalam penatalaksanaan hiperemesis gravidarum terdapat farmakologi yaitu suplemen multivitamin,	Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15	Penelitian ini menggunakan teknik kuasi eksperimental	Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fitriani (2013) dimana

	terhadap hiperemesis gravidarum diwilyah kerja puskesmas rawat nginap sidomulyo pecan baru			non farmakologi	bantihistamin, dopamine antagonis, serotonin antaginis, kortikosteroid, vitamin B1 dan B6 sedangkan terapi nonfarmakologi yaitu makan dalam jumlah sedikit tapi sering, makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, sewaktu bangun tidur jangan langsung terburu-buru terbangun tetapi duduk dahulu dan baru perlahan berdiri bangun, hindari makanan yang berlemak, berminyak, minum yang cukup, pengobatan tradisional yaitu air tebu kombinasi dengan air jahe dan istirahat.	responden pada desain	kelompok interpersi	mual dan muntah dalam kehamilan dapat menurunkan kemampuan dan stamina ibu hamil sehingga disarankan untuk mengkonsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe.
5	Efektivitas Pemberian Seduhan Jahe Terhadap Frekuensi Emesis Gravidarum Trimester 1	Dewi, Fahriani, dan Mika	2020	Perencanaan dengan memberikan terapi non farmakologi.	Mengatasi mual dan muntah selama masa kehamilan dapat dilakukan melalui tindakan farmakologi maupun non farmakologi. Tindakan non farmakologinyang biasa	Mual muntah menyebabkan penurunan nafsu dan terjadi keseimbangan elektrolit dengan kalium, kalsium,	Penelitian ini menggunakan desain Quasi eksperimen dengan rancangan one group pretest-posttest	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017)

					disarankan yaitu dianjurkan untuk mengkonsumsi jahe dalam bentuk teh jahe, teknik relaksasi, dan aromaterapi.	dan natrium		
6	Keadaan pengaruh akupuntur dan vitamin B6 terhadap penurunan inensitas mual muntah pada emesis gravidarum	Munjiah,tita , herman, farid, akbar, dan ahmad	2015	Interfensi dengan menggunakan tehnik akupuntur dan vitamin B6	Bergam tehnik dan farmakologis untuk mengurangi rasa mual dan muntah antara lain pemberian terapi jahe, akupresur, aromaterapi, dan akupuntur.akupuntur adalah salah satu tehnik pengobatan komplementer yang sering dilakukan murah dan aman	Defisiensi fitamin B6 menyebabkan kadar serotonin rendah sehingga saraf panca indera akan semakin sensitive yang menyebabkan ibu mudah mual muntah	Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga dikembangkan beberapa cara untuk engulangi rasa mual dalam kehamilan. Akupuntur efektif dalam mengobati mual muntah dalam kehamilan.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh carson (2000)
7	Pengaruh pemberian aroma terapi ginger oil terhadap hyperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1 diklinik makmur jaya tahun 2019	Tiara dan aisa	2019	Efektifitas pemberian aroma terapi ginger oil	Terapi nonfarmakologi dapat dilakukan dengan cara pengaturan diet,dukungan emosional, akupuntur dan jahe. Aromateraai jahe memberikan ragam efek bagi penghirupnya karena mempunyai efek menyegarkan, membloker	Jumlah sample yang dignakan kurang	Terapi pelengkap nonfarmakologi noninstruktif, noninfaksif, mursh, sederhana, efektif dan tanpa efek samping yang merugikan	Hasil penelitian ini didukung oleh teori hernani (2017)

					reflek muntah, melancarkan peredaran darah serta membuat syaraf-syaraf bekerja dgn baik.			
8	Asuhan gizi pada hyperemesis gravidarum	rini	2021	Penatalaksanaan pada ibu degan hyperemesis gravidarum	Penatalaksanaan pada ibu dengan hyperemesis gravidarum dapat dilakukan dimulai dengan memberikan informasi bahwa mual dan muntah dapat menjadi gejala kehamilan yang fisiologis dan dapat hilang sendiri setelah kehamilan berlangsung beberapa bulan. Diberikan vitamin dan anti histamine atau antimimetik seperti disikolamin hidrokloride pada keadaan yang lebih berat. Melakukan isolasi dan pemberian terapi psikologis serta anjuran diet	Kesiapan ibu dalam menghadapi kehamilan juga berdampak pada tingkat stres ibu menghadapi kehamilan.	Diet untuk penderita hyperemesis dilakukan secara bertahap dan mengambil komposisi zat gizi yang dibutuhkan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2020).
9	Pengaruh pemberian jahe emprit dalam mengurangi hyperemesis	ginting	2020	Pencegahan hyperemesis gravidarum	Prinsip pencegahan hyperemesis gravidarum dapat diberikan dengan konseling tentang kehamilan dan peslinan	Pada beberapa wanita mungkin dapat membuat mereka ggangguan persepsi, ketidak	Penggunaan bahasa yang baku sehingga mudah untuk dipahami	Pencegahan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

	gravidarum pada ibu hamil di klinik nana Diana kota medan tahun 2019				sebagai suatu proses yang fisiologi, menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering, makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan, menghindari kekurangan karbohidrat merupakan factor penting, dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula.	percayaan mengenai ketakutan nyata akan meningkatnya tangguang jawab.		Anggasari (2016).
10	Kejadian hyperemesis gravidarum ditinjau dari riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal saat pra konsepsi di BPM Kusmawati Surabaya	Anggasari	2016	Pencegahan hyperemesis gravidarum	Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum perlu dilaksanakan diantaranya dengan mengatasi kecemasan ibu dengan memberikan konseling tentang kehamilan dan persalinan sebagai proses yang alami dan normal. Memberikan konsep bahwa mual muntah merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan	Jumlah sampel digunakan sedikit.	Jenis penelitian yang digunakan yaitu analitik, dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian ini sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariza (2019).

					<p>memasuki usia 20 minggu. Memberikan kenyamanan emosional yang akan sangat membantu ibu dalam mengatasi keluhannya. Jika memperburuk gejala yang ada menyebabkan ibu mengalami dehidrasi, anjurkan ibu untuk bed rest ttal dengan asupan nutrisi dan cairan tetap terjaga, ibu makan sedikit tapi sering, menghindari makanan berminyak dan berbau.</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

F. Matriks Langkah VI : Implementasi/ Pelaksanaan Asuhan

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Diagnosis dan penatalaksanaan hipeesis gravidarum	Widayana, wayan, ketut	2014	Pemberia terapi obat pada kasus hyperemesis gravidarum	Pada pasien hyperemesis gravidarum tingkat 2 dan 3 harus dilakukan rawat nginap dirumah sakit, dan dilakukan penanganan yaitu memberikan obat-obatan diantaranya suplemen vitamin B1 dan B6. Pemberian antihistamin yang dianjurkan adalah doxylamine dan dipendyramine. Pemberian dopamine antagonis yang dianjurkan diantaranya prochlorperazine, promethazine, dan metocloperamide. Pemberian serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetran.	Pemberian kortikosteroid masih kontropersial karena dikatakan pemberian pada kehamilan trimester 1 dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan cacat bawaan	Penelitian ini memiliki variabel sikap ibu hamil dengan hyperemesis gravidarum	Penelitian ini sejalan dengan peneltian yang dilakukan oleh Munjiah,dkk (2015).
2	Perbedaan pengaruh akupuntur dan	Munjiah, tita, herman, akbar, dan	2015	Penatalaksana an pada pasien hyperemesis	Pada pasien dengan hyperemesis gravidarum tingkat II dan III harus	Pemberian kortikosteroid masih kontroversial	Dapat mengetahui tatalaksana pemberian obat dan	Penatalaksanaan dalam penelitian ini sejalan dengan

	<p>vitamin B6 terhadap penurunan intensitas mual muntah pada hyperemesis gravidarum</p>	ahmad		<p>gravidarum</p>	<p>dilakukan rawat inap dirumah sakit, dan dilakukan penanganan yaitu dengan memberikan obat-obatan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti pyridoxine. Anti histamine yang dianjurkan adalah doxylamine dipendyramine. Serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetron</p>	<p>karena dikatakan pemberian pada kehamilan trimester pertama dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan cacat bawaan.</p>	<p>cairan pada pasien hyperemesis gravidarum</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Widayana,dkk (2014)</p>
3	<p>Efektifitas Konsumsi Air Tebu Kombinasi Dengan Air Jahe Terhadap Hiperemesis Gravidarum Di Wilayah Kerja Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo</p>	<p>Wardani Kusuma Rahayu</p>	2020	<p>Intervensi dengan anjuran mengkonsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe</p>	<p>Mual muntah yang berlebihan dapat menyebabkan ibu hamil memperburuk keadaan ibu dan janin. Maka dari itu dianjurkan untuk mengonsumsi 100 ml air tebu kombinasi dengan 10 ml air jahe yang diminum 3 kali sehari selama 4 hari</p>	<p>Tidak ada kelemahan yang ditemukan pada jurnal tersebut</p>	<p>Ada perbedaan signifikan frekuensi hyperemesis gravidarum sebelum dan sesudah mengonsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe</p>	<p>Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisnur (2016).</p>

	Pekanbaru				untuk mengurangi mual muntah yang terkandung didalam zat-zat aktif seperti asam suksinat, minyak atsiri, gingerol untuk meredakan perut menjadi lebih nyaman dan hangat			
4	Mengkaji pengaruh pemberian lemon terhadap emesis gravidarum	susiloningtis	2021	Mengatasi hyperemesis gravidarum dengan lemon	Akup resur dan aroma terapi merupakan salah satu terapi nonfarmakologis yang dapat digunakan sebagai intervensi untuk mengatasi mual dan muntah. Arom terapi dapat digunakan oleh ibu hamil untuk mengurangi rasa mual, muntah, dan koping.	Metode literature manca Negara ditelusuri melalui sarana media elektronik dengan penutup kata kunci	Minyak esensial aroma terapi dapat mengatasi keluhan fisik dan psikis seperti ketenangan, kesegaran, bahkan bias membantu ibu hamil mengatasi mual.	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh serli (2016) mengenai efek aroma terapi lemon pada intensitas mual dan muntah pada pasien dengan gagal ginjal kronis menjalani hemodialisis.
5	Mengkaji pemberian lemon terhadap emesis gravidarum	Susilonigtias dan suhartina	2021	Penanganan hiperemesis gravidarum	Penanganan mual muntah tergantung pada tingkat keparahan gejala yang dirasakan. Pengobatan yang dapat dilakukan farmkologis dan nonfarmakologis. Farmakologis dapat	Sebian besar belum tepat dalam melakukan pengobatan hermal/alamia	Dari hasil literatur rewi yang telah dipaparkan dengan didapatkan hasil adanya pengaruh pemberian aroma terapi lemon terhadap emesis	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh khadijah (2019)

					<p>dilakukan dengan cara pemberian antiemetik, antihistamin, antikolinergi dan kortikosteroid sedangkan terapi nonfarmakologi dapat dilakukan dengan cara pengaturan diet, dukungan emosional, akupunktur, perubahan hidup, istirahat, tidur dan dengan pemberian pengobatan herbal/alamia seperti jahe maupun papaverin</p>		<p>gravidarum</p>	
6	<p>Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian <i>Hiperemesis gravidarum</i> di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>Elfanny Sumai</p>	<p>2014</p>	<p>Penatalaksanaan pemberian obat dan cairan pada pasien hyperemesis gravidarum.</p>	<p>Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan pemberian larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya, cairan diganti dengan cairan dekstrosa 5% dalam cairan 0.45% sebagai alternatifnya cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstrosa 5% atau 10% dengan RL yakni 2:1 dengan jumlah tetesan 40 per menit. Selain</p>	<p>Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain</p>	<p>Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian <i>cross sectional</i> dengan rancangan penelitian <i>Retrospektif</i></p>	<p>Penatalaksanaan dalam penelitian ini sejalan dengan penatalaksanaan yang dilakukan oleh Wardani (2020).</p>

					<p>pemberian cairan tersebut, ditambahkan juga dengan pemberian vitamin seperti vitamin B1 secara intravena dengan dosis 100mg yang dilarutkan ke dalam 100 cc NaCl 0,9% sampai tiga hari kedepan.</p>			
7	<p>Tingkat hiperemesis gravidarum pada ibu hamil trimester I Di kabupaten kendal</p>	<p>Triana Arisdiani</p>	<p>2020</p>	<p>Pemberian edukasi dan promosi kesehatan</p>	<p>Edukasi dan promosi kesehatan perlu diberikan pada pasien mencakup seluruh kondisinya, termasuk penyebab, gejala dan tanda klinis, komplikasi yang mungkin akan dialami, prognosis, hingga tatalaksana yang akan diberikan. Risiko dan keuntungan terapi yang akan diberikan harus di informasikan kepada pasien, termasuk risiko bagi janin walaupun kecil sekali kemungkinannya jika tidak mendesak atau sangat terpaksa, sebaiknya terapi obat-obatan dihindari selama 10</p>	<p>Penelitian ini hanya menggunakan variabel paritas</p>	<p>Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel lain</p>	<p>Penelitian ini sejalan dengsn penelitian yang dilakukan oleh Susilonigtias dan suhartina (2021).</p>

					minggu awal kehamilan. Edukasi pasien untuk menghindari pemicu mual dan muntah. Pasien juga perlu edukasi untuk memodifikasi diet			
8	Aktivitas Pemberian Jahe Terhadap Frekuensi Emesis Gravidarum Trimester 1	Dewi, Fahriani, dan Mika.	2014	Efektifitas pemberian seduhan jahe	Mual dan muntah pada kehamilan yang dapat dikontrol biasanya bersifat ringan dan merupakan kondisi yang dapat dikontrol sesuai kondisi ibu hamil. Namun bila tidak ditangani mual muntah akan bertambah berat menjadi hyperemesis gravidarum. Mengatasi mual muntah selama kehamilan dapat dilakukan melalui tindakan farmakologi dan non farmakologi yang biasa disarankan oleh tenaga kesehatan seperti menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi jahe dalam bentuk teh jahe, teknik relaksasi, dan	Sebagian besar responden pada penelitian ini dalam usia reproduksi sehat 920-35 (tahun) yang mengalami mual muntah. Usia seseorang dapat mempengaruhi mual dan muntah.	Jahe sekurangnya mengandung 19 komponen yang berguna bagi tubuh yang salah satunya ginerol yaitu senyawa paling utama dan telah terbukti memiliki aktivitas antiemetik (anti muntah) yang manjur dengan bersifat memblok serotonin, yaitu senyawa kimia pembawa pesan. Senyawa ini menyebabkan perut berkontraksi sehingga apabila diblok maka otot-otot saluran	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofi'ah (2017) tentang efektivitas mengonsumsi jahe dan sereh dalam mengatasi morning sickness.

					aromaterapi.		pencernaan akan mengendor dan melemah sehingga rasa mual banyak berkurang.	
9	Factor – factor yang berhubungan dengan kejadian hyperemesis gravidarum di RSUD muhammadia metro	Fitri, septiani, dan herlina	2017	Upaya menurunkan angka kejadian hyperemesis gravidarum	Upaya menurunkan angka kejadian hiperemis gravidarum pada kehamilan primipara, pencegahan yang dapat dilakukan dengan memberikan pembekalan kelas ibu hamil pada ibu primipara, menjelaskan pada ibu tentang perubahan fisik padan psikologis saat hamil, persiapan menjadi orang tua, dan menjelaskan pada ibu tanda bahaya kehamilan terutama hyperemesis gravidarum. Sedangkan pada ibu mutipara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjarak keturunan menggunakan kontrasepsi sampai ibu	Tidak ada kelemahan pada urnal tersebut	Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan menelitian selanjutnya dan meneliti factor lain yang belum diteliti berkaitan dengan hyperemesis gravidarum	Perbandingan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh tiran (2009)

					siap kembali untuk hamil.			
10	Efektifitas pemberian seduhan jahe Merah terhadap frekuensi hiperemesis gravidarum	Fahran	2019	Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum	<p>Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum perlu dilaksanakan diantaranya dengan mengatasi kecemasan ibu dengan memberikan konseling tentang kehamilan dan persalinan sebagai proses yang alami dan normal. Memberikan konsep bahwa mual muntah merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan memasuki usia 20 minggu. Memberikan kenyamanan emosional yang akan sangat membantu ibu dalam mengatasi keluhananya. Jika memperburuk gejala yang ada menyebabkan ibu mengalami dehidrasi, anjurkan ibu untuk bed rest ttal dengan asupan nutrisi dan cairan tetap</p>	Kelemahan dari penelitian ini adalah ibu menggunakan penelitian <i>cross sectional study</i>	Penelitian ini memiliki variabel lebih dari satu variabel	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fitri (2017)

				terjaga, ibu makan sedikit tapi sering, menghindari makanan berminyak dan berbau			
--	--	--	--	--	--	--	--



G. Matriks Langkah VII : Evaluasi

No	Judul	Oleh	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1	Diagnosis Dan Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum	Widayana, Wayan, dan Ketut	2014	Hiperemesis gravidarum yang terjadi akan sangat mempengaruhi aktifitas ibu hamil sehari-hari. Selain dapat mengganggu aktivitas, hiperemesis dapat mengakibatkan penurunan berat badan ibu sebanyak 50% serta dapat menyebabkan terganggunya fungsi alat-alat vital di dalam tubuh yang dapat berakibat kematian	Pemberian anti bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamine dan mempengaruhi sitem vestibular, menurunkan rangsangan dipusat muntah. Metocloperamide meningkatkan kekuatan spincter esophagus bagian bawah dan menurunkan transit time pada saluran cerna. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan rangsangan pusat muntah di medula.	Penyebab hyperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti	Dapat mengetahui indikasi dari obat hyperemesis gravidarum	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ari (2015)
2	Perbedaan pengaruh akupunktur dan vitamin B6	Munjiah, tita, herman, akbar, dan	2015	Evaluasi hasil akupunktur dan vitamin B6 terhadap penurunan	Hasil Penelitian ini menunjukkan dari 34 respon dan kelompok akupunktur yang	Akupunktur masih jarang digunakan untuk mengobati mual muntah dalam	Analisis bifariat yang dilakukan pada penelitin ini adalah uji kai	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

	terhadap penurunan intensitas muntah pada hyperemesis gravidarum	ahmad		intensitas muntah pada hyperemesis gravidarum	mengalami mual muntah kategori berat berdasarkan skor PUQE dan mengalami penurunan menjadi mual muntah ringan dalam 64,7%, serta tidak ada yang mengalami mual muntah berat, sedangkan 32 responden dan kelompok vitamin B6 yang mengalami penurunan mual muntah ringan sebesar 40,6% dan masih terdapat responden yang mengalami mual muntah berat	kehamilan.	kuadrat.	anne (2010)
3	Aktivitas Pemberian Jahe Terhadap Frekuensi Emesis Gravidarum Trimester 1	Dewi, Fahriani, dan Mika.	2014	Evaluasi efektivitas pemberian seduhan jahe dalam mengatasi mual muntah	Hasil penelitian menunjukkan adanya efektivitas pemberian seduhan jahe dalam mengurangi frekuensi emesis pada ibu hamil trimester 1	Sebagian besar responden pada penelitian ini dalam usia reproduksi sehat 920-35 (tahun) yang mengalami mual muntah. Usia seseorang dapat mempengaruhi mual dan muntah.	Jahe bekerja menghambat reseptor serotonin dan menimbulkan efek antiemetic pada system gastrointestinal dan system susunan saraf.	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rofi'ah (2017) tentang efektivitas mengkonsumsi jahe dan serih dalam mengatasi morning

								sickness.
4	Efektifitas konsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe terhadap hyperemesis gravidarum diwilyah puskesmas rawat inap sudomulyo pecan baru	Wardani kusuma rahayu	2020	Efektifitas pemberian air tebu kombinsi dengan air jahe terhadap hyperemesis gravidarum	Hasil penelitian ini mendapat penjelasan bahwa konsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe dapat menurunkan mual muntah pada ibu hamil trimester pertama tanpa efek samping.	Jumlah sample yang digunakan kurang	Ada perbedaan yang signifikan frekuensi hyperemesis gravidarum terhadap ibu hamil sebelum dan sesudah mengkonsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe	Penelitian ini sejalan dengan teori lisnor (2016) bahwa sumber energy instan bagi ibu hamil untuk mengurangi mual muntah salah satunya terdapat dalam air tebu kombinasi dengan air jahe.
5	Efektifitas pemberian seduhan jahe Merah terhadap frekuensi hiperemesis gravidarum	Fahran	2019	Evaluasi pemberian seduhan jahe dalam mengatasi hyperemesis gravidarum	Hasil dari distribusi emesis sebelum dan sesudah pemberian jahe seduh hasil penelitian menunjukkan adanya selisih penurunan rata-rata frekuensi mual dan muntah sebelum dan sesudah diberikan seduhan jahe sebesar 4,50 dan nilai P value = 0,000- yang artinya pemberia seduhan jahe efektif dalam mengurangi	Populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 responden	Analisis data menggunakan uji Wilcoxon sign rank	Penelitian ini sejalan dengan teori Ramadan (2013)

					frekuensi mual dan muntah pada ibu hamil			
6	Mengkaji pengaruh pemberian lemon terhadap emesis gravidarum	Susilonong tias dan suhartina	2021	Evaluasi pemberian lemon terapi lemon dalam mengurangi mual muntah	Berdasarkan analisa yang telah dilakukan bahwa penggunaan aroma terapi lemon efektif untuk mengurangi mual muntah pada kehamilan (hyperemesis gravidarum)	Sebaiknya data base yang digunakan sehingga biasa mendapatkan artikel yang lebih banyak dan baik.	Hasil penelitian menunjukkan skala mual dan muntah ibu hamil trimester 1 sebelum pemberian aroma terapi mean + SD 23,33 + 3,913 sedangkan setelah pemberin aroma terapi mean + SD 13,67 + 4,071	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (rinata 2017)
7	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa	<i>Hertje Salome Umboh</i>	2014	Evaluasi pemberian cairan intravena	Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan pemeberian larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya cairan diganti dengan cairan dekstrosa 5% dalam cairan saline 0,45%. Sebagai cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstrosa 55 atau 10% dengan RL yakni 2:1 dengan jumlah tetesan 40 per menit. Pemberian	Jika muntah sangat hebat, pasien disarankan untuk dipuaskan terlebih dahulu selama 24-48 jam.	Jenis penelitian merupakan penelitian <i>deskriptif analitik Retrospektif study</i> .	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayana, dkk (2014).

					thiamin ini penting untuk mencegah terjadinya ensefalopati Wernicke.			
8	Efektifitas aroma terapi lemon	Siti rofiah, widatuning sih, dan tuti	2019	Efektifitas pemberian aroma terapi lemon dalam mengurangi mual muntah	Tingkat emesis gravidarum sebelum diberikan aroma terapi lemon pada rentang skor 3 sampai 23. Tidak ada perbedaan efektifitas aroma terapi lemon diantara 3 klompok dalam mengatasi emesis gravidarum, namun jika dianalisa pada masing-masing kelompok diperoleh hasil bahwa aroma terapi lemon dosis 0,2 dan 0,3 efektif dalam mengatasi emesis gravidarum.	Tidak ada kekurangan dalam jurnal tersebut	Aroma terpi leman efektif dalam mengurangi mual muntah, minyak esensial lemon merupakan salah satu minyak herbal yang paling banyak digunakan dan aman bagi kehamilan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sari (2013)
9	Pengaruh Sirup Jahe Merah Terhadap Penurunan Hiperemesis Gravidarum Grade I pada ibu hamil di Plupuh	Suparmi, dan Rita	2018	Evaluasi pemberian sirup jahe dalam mengatasi hyperemesis gravidarum	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pemberian sirup jahe selama 10 hari kepada reponden sangat aman, dan hasilnya sangat memuaskan dimana terjadi penurunan gejala mual muntah yang	Belum banyak dilakukan suatu penelian dengan pemberian ekstrak jahe	Penelitian ini menggunakan teknik Quasi experiment dengan non equivalent pretest-postest with control group, pengambilan	Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianti (2014).A

	Sragen				signifikan pada ibu hamil.		sampel kuota sampling sebanyak 60 subjek	
10	Penerapan aroma terapi oil tepermin pada Ny”L” dengan hyperemesis gravidarum	anisa	2019	Evaluasi pemberian aroma terapi peprmin	Pemberian aroma terapi esensial oil pepermin efektif terhadap penurunan frekuensi mual dan muntah pda ibu hamil trimester 1 dimana setelah 7 hari pemberia terapi menggunakan aroma esensial oil pepermin terjadi penurunan frekuensi mual muntah pad ibu hamil	Ferbalisasi kebingungan menurun	Aroma terapi menggunakan tindakan terapeutik dengan menggunakan minyak esensial yang bermanfaat untuk meningkatkan keadaan fisik dan fikologis sehingga menjadi lebih baik	Cara pemberian aroma terapi ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan santi (2013)

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telah Evidence Based Asuhan 7 Langkah Vrnay Berdasarkan Hasil Penulisan Referensi

1. Langkah 1 : Identifikasi Data Dasar

Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi pada awal kehamilan. Keluhan muntah kadang-kadang begitu hebat dimana segala apa yang dimakan dan diminum dimuntahkan sehingga dapat mempengaruhi keadaan umum dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, berat badan menurun, dehidrasi dan terdapat aseton dalam urine bahkan seperti gejala penyakit apendisitis, pielitis dan sebagainya (Fitri; 2017).

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari sehingga keadaan umumnya menjadi buruk karena terjadi dehidrasi. Hiperemesis Gravidarum juga dikatakan mual muntah yang berlebihan (< 10 kali / hari) sehingga dapat mengganggu pekerjaan sehari-hari dan keadaan umum ibu menjadi buruk (Sarianti; 2017).

Ibu hamil biasanya dapat dikatakan mengalami hiperemesis gravidarum jika mengalami muntah beberapa kali dalam sehari, atau selalu muntah setiap kali makan atau minum, atau jika berat badan turun. Biasanya kondisi ini terjadi pada sekitar minggu ke empat dan ke tujuh, dan berangsur membaik pada minggu ke14

dan 16 kehamilan (Atalya, 2018). Sementara menurut Amiruddin (2012) dalam artikel Ummi Aiman, mual muntah secara berlebihan yang terjadi lebih dari 10 kali selama 24 jam disebut hiperemesis gravidarum. Pada kasus HEG cadangan karbohidrat dan lemak habis untuk energi. Hal tersebut dapat menyebabkan dehidrasi pada ibu hamil yang akan mempengaruhi tumbuh kembang janin (Kristina Paskana; 2020).

Pada ibu hamil yang mengalami keluhan mual dan muntah. Keluhan ini biasanya disertai dengan hipersalivasi, sakit kepala, perut kembung, dan rasa lemah pada badan. Keluhan-keluhan ini secara umum dikenal sebagai “morning sickness.” (Gunawan; 2011).

Faktor risiko usia ibu merupakan faktor risiko yang paling sering dikaitkan pada hiperemesis gravidarum karena berhubungan dengan kondisi psikologis ibu hamil. Literatur menyebutkan bahwa ibu dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun lebih sering mengalami hiperemesis gravidarum dimana usia ibu yang kurang dari 20 tahun belum siap secara mental dan psikis untuk menjalani kehamilan dan usia lebih dari 35 tahun merupakan usia berisiko bagi ibu hamil. Usia kehamilan juga merupakan faktor risiko hiperemesis gravidarum, yaitu berhubungan dengan kadar hormon korionik gonadotropin, esterogen, dan progesteron dalam darah ibu (Inthan Atika; 2016).

Kadar hormon korionik gonadotropin dalam darah mencapai puncaknya pada kehamilan trimester I. Oleh karena itu, mual dan muntah lebih sering terjadi pada trimester I, akan tetapi pada beberapa kasus ada yang berlanjut hingga trimester akhir. Faktor risiko paritas juga sering dihubungkan, beberapa literatur menyebutkan mual muntah dalam kehamilan dan hiperemesis gravidarum banyak terjadi pada nullipara. Faktor risiko lain adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi yang mempengaruhi pola makan, aktivitas, dan stress pada ibu hamil (Inthan Atika; 2016).

Faktor yang dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum ini secara pasti belum diketahui. Ada beberapa faktor yang diduga dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum pada ibu hamil yaitu ibu hamil anak pertama (primigravida), hamil dengan riwayat molahidatidosa serta hamil kembar/ganda (Inthan Atika; 2016).

Patofisiologi Emesis gravidarum dapat disebabkan karena peningkatan Hormone Chorionic Gonodhotropin (HCG) dapat menjadi faktor mual dan muntah. Peningkatan kadar hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas menurun dan lambung menjadi kosong (Mariza; 2019).

Faktor penyebab terjadinya Hiperemesis Gravidarum pada ibu hamil, antara lain kelelahan, janinwanita, mual muntah pada

kehamilan sebelumnya, penggunaan pil kontrasepsi saat prakonsepsi, mual premenstruasi, stress cemas, dan takut). Mual dan muntah selama kehamilan biasanya disebabkan oleh perubahan dalam sistem endokrin yang terjadi selama kehamilan, terutama disebabkan karena tingginya fluktuasi HCG (Human Chorionic Gonadotropin), khususnya periode mual muntah gestasional karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG (Human Chorionic Gonadotropin) dalam serum. Pengaruh Fisiologik kenaikan hormon ini belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat atau pengosongan lambung yang berkurang. Pada umumnya wanita dapat menyesuaikan dengan keadaan ini, meskipun demikian gejala mual dan muntah yang berat dapat berlangsung sampai empat bulan (Anggasari; 2016).

Kehamilan diusia kurang 20 tahun dan diatas 35 tahun dapat menyebabkan Hiperemesis karena pada kehamilan diusia kurang 20 secara biologis belum optimal emosinya, cenderung labil, mentalnya belum matang sehingga mudah mengalami keguncangan yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan zat-zat gizi selama kehamilanya. sedangkan pada usia 35 tahun terkait dengan kemunduran dan penurunan daya tahan tubuh serta berbagai penyakit yang sering menimpa di usia ini (Hertje Salome Umboh; 2014).

Mual muntah yang terjadi pada kehamilan disebabkan karena terjadinya peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh Human Chorionic Gonadotropine (HCG) dalam serum dari plasenta. Frekuensi terjadinya mual muntah (morning sickness) tidak hanya di pagi hari melainkan bisa terjadi di siang bahkan hingga malam hari (Aritonang and Evanawy, 2010). Hampir 50-90% wanita hamil mengalami mual muntah pada trimester pertama. Frekuensi mual muntah pada primipara terjadi 60-80% dan pada multipara terjadi 40-60% (Dewi, Fahrini, Azhari dan Mika ; 2020).

2. Langkah II : Identifikasi Masalah Aktual

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan selama masa kehamilan. Seringnya muntah dan berkurangnya nafsu makan menyebabkan penderita tidak mendapatkan asupan makanan dengan baik dan kadar glukosa di dalam darah menjadi rendah, akhirnya tubuh akan menggunakan lemak sebagai bahan pengganti karbohidrat dalam proses pembentukan energi yang menyebabkan peningkatan produksi keton yang dapat terdeteksi di darah maupun urin (Nunung, Arthur dan Rambert; 2019).

Diagnosis didasarkan pada tanda dan gejala yang dialami ibu. Untuk mendiagnosis hiperemesis gravidarum (HEG) tidak sukar. Karena didasarkan pada kondisi mual dan muntah secara terus

menerus sehingga mempengaruhi keadaan umum dan mengganggu (Evi susanti; 2011).

Hiperemesis gravidarum ditandai dengan mual, muntah, susah makan dan rasa lemah pada badan. Hal ini mengganggu metabolisme tubuh dan menyebabkan komplikasi serta dehidrasi, hipokalemi, penurunan berat badan dan ketonuria. Pada kehamilan, hiperemesis gravidarum merupakan mual muntah yang berlebihan sehingga akan menyebabkan penurunan berat badan hingga lebih dari 5%, dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Pada keadaan ini tubuh akan memetabolisme lemak sehingga terjadi peningkatan kadar keton dalam darah (ketosis) yang dapat menghabiskan cadangan basa tubuh dan menyebabkan asidosis serta keton dalam urin (ketonuria). Pada beberapa kasus dapat menyebabkan kematian janin atau bahkan kematian ibu. oleh sebab itu diperlukannya pemeriksaan ketonuria untuk mendeteksi adanya keton dalam urin sehingga wanita hamil dapat mengontrol nutrisi agar tidak terjadi gangguan pada janin maupun pada ibu sendiri (Nunung, Arthur dan Rambert; 2019).

Pada ibu yang primigravida belum mampu beradaptasi dengan hormon estrogen dan khorionik gonadotropin. Peningkatan hormon ini membuat kadar asam lambung meningkat, hingga muncullah keluhan rasa mual. Keluhan ini biasanya muncul di pagi hari saat perut ibu dalam keadaan kosong karena terjadi

peningkatan asam lambung, kadar gula dalam darah menurun sehingga pusing, lemas dan mual bisa terjadi. Janin memproduksi hormon khorionik gonadotropin yang merangsang indung telur untuk terus meningkat selama kehamilan sehingga berpengaruh terhadap melambatnya gerakan dan mengendurkan otot-otot pada sistem pencernaan, agar gizi makanan yang ibu konsumsi bisa lebih banyak di serap oleh bayi. Otot polos pada area rahim dan katup antara perut dan kerongkongan juga ikut mengendur, sehingga memicu meningkatnya asam lambung (Triana Indrayani; 2017).

Pada ibu hamil primigravida sering mengalami hiperemesis gravidarum hal ini disebabkan ibu belum mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan peningkatan kadar hormon estrogen dan HCG yang dapat memberikan efek mual dan muntah pada ibu. Peningkatan hormone estrogen dan HCG akibat system saraf menyebabkan mual dan muntah pada ibu hamil. Keluhan mual dan muntah biasanya terjadi pada pagi hari saat perut kosong dan terjai peningkatan asam lambung (Kristina dan Vevi; 2020).

Hiperemesis gravidarum terjadi pada primipara karena faktor psikologis ibu yang belum siap pada kehamilannya dan masih menyesuaikan diri untuk menjadi orang tua baru. Keadaan ini dapat menimbulkan perubahan emosi sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pengeluaran histamin oleh

lambung. Kadar histamin berlebih dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya hiperemesis gravidarum. Sedangkan pada multipara, disebabkan karena trauma melahirkan, rasa takut tidak mampu merawat anak yang lain dan perhatian terhadap kehamilan tidak adekuat. Keadaan ini juga memicu terjadinya perubahan emosi sehingga dapat meningkatkan produksi histamin pada lambung. Kadar histamin berlebih dapat meningkatkan produksi asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya mual dan muntah (Fitri, dkk; 2017).

3. Langkah III : Identifikasi Masalah Potensial

Hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan wanita hamil, namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir (Triana Arisdiani; 2020).

Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan karena muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida darah dan air kemih turun. Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung yang disebut Sindroma Mallory-Weiss sebagai akibat perdarahan gastrointestinal (Ratih Misrawati dan Reni; 2011).

Keadaan umum lebih parah, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat tekanan darah menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan syaraf yang dikenal sebagai Wernicke ensefalopati, dengan gejala : nistagmus, diplopia dan perubahan mental, keadaan ini adalah akibat sangat kekurangan zat makanan, termasuk vitamin B kompleks, timbulnya ikterus menunjukkan adanya payah hati. Pada tingkatan ini juga terjadi perdarahan dari esophagus, lambung, dan retina (Ratih Misrawati dan Reni; 2011).

Hiperemesis Gravidarum yang mual muntah berlebihan sehingga menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari dan bahkan dapat membahayakan hidup ibu hamil. Hiperemesis Gravidarum juga yaitu mual dan muntah yang berat sehingga menyebabkan pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum Ibu menjadi buruk Mual dan muntah. Penyakit ini biasanya dapat membatasi diri, namun pada tingkatan yang berat dapat mengancam jiwa ibu dan janin (Elfanny Sumai; 2014)

Dampak Hiperemesis Gravidarum yaitu dehidrasi yang menimbulkan konsumsi O₂ menurun, gangguan fungsi liver dan terjadi Ikterus, terjadi perdarahan pada Parenkim liver sehingga menyebabkan gangguan fungsi umum alat-alat vital dan menimbulkan kematian (Herje Salome; 2014).

Dampak dari hiperemesis gravidarum dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah, penurunan berat badan (5% dari berat badan awal), dehidrasi, ketosis, gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa esofagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal (Evi Susanti; 2018).

Hiperemesis gravidarum tidak hanya berdampak pada ibu, tapi juga berdampak pada janinnya. Seperti abortus, bayi berat lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir. Selain itu, kejadian pertumbuhan janin terhambat (Intrauterine Growth Retardation/IUGR) meningkat pada wanita hamil dengan hiperemesis gravidarum (Ardani, 2013). Jika ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum dibiarkan begitu saja, maka kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil menjadi tidak terpenuhi. Jika kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi, dapat mengganggu kesehatan dan aktifitas ibu hamil. Padahal, nutrisi mempunyai peran penting dalam kehamilan. Terutama pada kesehatan ibu dan pertumbuhan janinnya agar tetap sehat (Evi Susanti; 2018).

komplikasi mual dan muntah pada hamil muda, bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak seimbang elektrolit dengan alkalosis hipokloremik. Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis

terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tak sempurna, terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam asetonasetik, asam hidroksi butirik aseton dalam darah (Mustar; 2020).

Hiperemesis gravidarum yang menetap akan mengalami dehidrasi yang berakibat pada kerusakan organ hati dan ginjal. Pada keadaan yang parah perlu perawatan khusus karena hiperemesis gravidarum ini menyebabkan perubahan bahkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, defisiensi nutrisi, gangguan liver. Sementara pertumbuhan janin akan terganggu akibat ibu kekurangan nutrisi kemudian akan berdampak pada kematian (Anggasari; 2016).

Komplikasi yang dapat terjadi adalah ketonuria, dehidrasi, hipokalemia dan penurunan berat badan lebih dari 3 kg atau 5% berat badan. Muntah yang terus-menerus disertai dengan kurang minum yang berkepanjangan dapat menyebabkan dehidrasi. Jika terus berlanjut, pasien dapat mengalami syok. Dehidrasi yang berkepanjangan juga menghambat tumbuh kembang janin. Oleh karena itu, pada pemeriksaan fisik harus dicari apakah terdapat abnormalitas tanda-tanda vital, seperti peningkatan frekuensi nadi (>100 kali per menit), penurunan tekanan darah, kondisi subfebris, dan penurunan kesadaran. Selanjutnya dalam pemeriksaan fisis lengkap dapat dicari tanda-tanda dehidrasi, kulit tampak pucat dan sianosis (Gunawan Samuel dan Dwiana; 2011).

Selain dehidrasi, akibat lain muntah yang persisten adalah gangguan keseimbangan elektrolit seperti penurunan kadar natrium, klor dan kalium, sehingga terjadi keadaan alkalosis metabolik hipokloremik disertai hiponatremia hipokalemia. Hiperemesis gravidarum yang berat juga dapat membuat pasien tidak dapat makan atau minum sama sekali, sehingga cadangan karbohidrat dalam tubuh ibu akan habis terpakai untuk pemenuhan kebutuhan energi jaringan. Akibatnya, lemak akan dioksidasi. Namun, lemak tidak dapat dioksidasi dengan sempurna dan terjadi penumpukan asam aseton-asetik, asam hidroksibutirik, dan aseton, sehingga menyebabkan ketosis (Gunawan Samuel dan Dwiana; 2011).

Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, terjadi gangguan elektrolit ketosis, dehidrasi, penurunan berat badan sebesar 5% (Manuaba dkk,2016) 7 . Dan juga dapat menimbulkan gangguan fungsi umum alat-alat vital dan menimbulkan kematian (Fitri Muriyasari; 2017).

4. Langkah IV : Tindakan Segera dan Kolaborasi

Tindakan emergensi dan kolaborasi yaitu pasien dirawat dengan pemberian terapi cairan glukosa dan elektrolit, dan vitamin secara intravena intake oral awalnya dibatasi, bertahap (Ratih, Misrawati dan Reni; 2011).

Pada kasus hiperemesis gravidarum, jenis dehidrasi yang terjadi termasuk dalam dehidrasi karena kehilangan cairan (pure dehydration). Maka tindakan yang dilakukan adalah rehidrasi yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang ke volume normal, osmolaritas yang efektif dan komposisi cairan yang tepat untuk keseimbangan asam basa. Pemberian cairan untuk dehidrasi harus memperhitungkan secara cermat berdasarkan: berapa jumlah cairan yang diperlukan, defisit natrium, defisit kalium dan ada tidaknya asidosis. Berikan cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C, dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein (Widayana, Wayan dan ketut; 2014).

Hiperemesis gravidarum yang tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat pula menyebabkan kematian pada Ibu hamil .. Untuk itu perlu adanya pengawasan dan penanganan yang baik bagi Ibu hamil. Pemberian terapi yang baik jarang sekali menyebabkan kematian atau melakukan abortus therapeuticus yang sering menjadi alternatif untuk mengakhiri kehamilan dengan mempertimbangkan ibu atau bayi. Penilaian maju mundurnya pasien ialah adanya aceton dan acidura diaceticum dalam urine dan berat badan (Elfanny Sumai; 2014).

Hiperemesis gravidarum dapat menjadi kasus yang membutuhkan tindakan segera jika ibu mengalami dehidrasi. Namun, jika ibu belum mengalami dehidrasi, yang biasa dilakukan adalah memasang infus RL 28 tpm. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Selain itu, menganjurkan ibu agar tetap berdoa kepada Allah SWT dan banyak berdzikir. Ini juga dapat membantu ibu agar tidak terlalu cemas dalam menghadapi keluhannya. Setelah dilakukan pemasangan infus dengan cairan RL 28 tpm, maka selanjutnya memberikan cairan dan obat-obatan sesuai hasil kolaborasi dengan dokter, yakni: Mengganti cairan RL menjadi cairan Ka-en MG 3 40 tpm. Ka-en MG 3 ini mengandung natrium, kalium, klorida, lactate, dan glukosa. Cairan ini berfungsi untuk membantu pengobatan ketidakseimbangan karbohidrat dan elektrolit pada keadaan infusensi asupan makanan per oral, prosedur pembedahan, dan neonatologi (Evi susanti; 2019).

Terapi dehidrasi merupakan kunci dari terapi dehidrasi. Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan memberikan larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya cairan diganti dengan cairan dekstroza 5% dalam cairan saline 0,45%. Sebagai cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstroza 55 atau 10% dengan RL yakni 2;1 dengan jumlah tetesan 40 per menit (Hertje Salome Umboh; 2014).

Tindakan kolaborasi dengan ahli gizi sangat membantu untuk bisa mengetahui kebutuhan kalori yang dibutuhkan sehingga klien tidak mengalami kekurangan kalori yang berlebihan dan tidak terjadi kelemahan fisik, juga dapat menentukan zat gizi yang sesuai dengan diperlukan untuk ibu hamil (Yulianti dan Eka; 2019).

Tindakan kolaborasi dengan dokter dilakukan untuk memberikan terapi farmakologi pengurang mual, juga memberikan terapi cairan untuk pencegahan maupun dehidrasi akibat pengeluaran yang banyak melalui muntah (Rumiari; 2015).

Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan cairan parenteral yang cukup elektrolit karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2 sampai 3 liter perhari. Bila perlu ditambahkan kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C. Bila ada kekurangan protein, dapat memberikan pula asam amino secara intravena (Rahayu; 2015).

5. Langkah V : Rencana Tindakan

hiperemesis gravidarum jalur pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah, berat ringannya depleksi nutrisi dan penerimaan penderita terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya bila memungkinkan saluran cerna harus digunakan. Bila peroral menemui hambatan dicoba untuk menggunakan nasogastric tube (NGT). Saluran cerna mempunyai banyak keuntungan misalnya dapat mengabsorpsi banyak nutrien, adanya

mekanisme defensif untuk menanggulangi infeksi dan toksin. Selain itu dengan masuknya sari makanan ke hati melalui saluran porta ikut menjaga pengaturan homeostasis nutrisi.

Bila penderita sudah dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak, hindari suplementasi besi untuk sementara, hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Pemberian diet diperhitungkan jumlah kebutuhan basal kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kkal perharinya (Gunawan Samuel, Dwiana; 2011).

Pencegahan terhadap emesis gravidarum dengan cara menganjurkan makan dengan jumlah kecil tetapi lebih sering, anjurkan minum teh hangat dan biskuit, roti kering, selain itu ibu juga diharapkan untuk tidak mengkonsumsi susu secara berlebihan ataupun makanan yang mengandung lemak, karena akan meningkatkan rangsangan muntah. Selain itu penanganan dengan memberikan pijatan akupresur pada titik Pc 6, dirasa sangat efektif, ibu hanya perlu menekan bagian 3 jari dibawah pergelangan tangan, dengan cara ibu dianjurkan untuk duduk, atau berbaring dengan posisi nyaman mungkin, ibu dapat mengulang kembali jika ibu merasa nyaman dan rileks (Mariza dan Lia; 2019).

Dalam penatalaksanaan hiperemesis gravidarum terdapat therapy farmakologi, yaitu : suplemen multivitamin, bantihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, kortikosteroid, vitamin B1 dan B6. Sedangkan therapy nonfarmakologi yaitu makan dalam jumlah sedikit tapi sering, makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, sewaktu bangun tidur jangan langsung terburu-buru terbangun tetapi duduk dahulu dan baru perlahan berdiri bangun, Hindari makanan yang berlemak, berminyak, minum yang cukup, pengobatan tradisional yaitu air tebu kombinasi dengan air jahe dan istirahat (wardani Kusuma Rahayu; 2020).

Mual dan muntah pada kehamilan biasanya diatasi dengan pemberian terapi farmakologi yaitu pemberian piridoksin (vitamin B6). Akan tetapi mual muntah juga dapat diatasi secara non farmakologi atau terapi komplementer antara lain dengan tanaman herbal atau tradisional yang bisa dilakukan dan mudah di dapatkan seperti jahe, daun peppermint, lemon, dll. Oleh karena itu selain, mengkonsumsi obat- obatan untuk mengatasi mual muntah, para ibu hamil dapat mencoba berbagai ramuan tradisional seperti jahe dengan cara diseduh.

Kandungan jahe yang terdapat pada minyak atsiri Zingiberena (zingirona), zingiberol, bilena, kurkumen, gingerol, flandrena, memiliki resin pahit yang dapat memblokir serotonin yaitu suatu neurotransmitter yang disintesis pada neuron-neuron

serotonergis dalam sistim syaraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan, akibatnya kerja otot-otot saluran pencernaan mengendur dan melemah kemudian menimbulkan perasaan nyaman dalam perut, sehingga mual dan muntah dapat berkurang (Dewi, Fahriani dan Mika; 2020).

Selain cara farmakologis dengan pemberian obat-obatan anti mual seperti vitamin B6, ada juga teknik non-farmakologis yang sering digunakan untuk menghilangkan rasa mual. Beragam teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa mual dan muntah antara lain pemberian terapi; jahe, akupresur, aromaterapi, dan akupunktur. Akupunktur adalah salah satu teknik pengobatan komplementer yang sering dilakukan, murah, dan aman. Beberapa penelitian menunjukkan akupunktur efektif dalam mengobati mual muntah dalam kehamilan (Munjiah, Tita, Herman, Farid, Akbar dan Ahmad; 2015).

Pengobatan dapat dilakukan dengan cara farmakologi maupun non farmakologi. Terapi farmakologi dilakukan dengan pemberian antiemetik, antihistamin, anti-kolinergik dan kortikosteroid. Terapi nonfarmakologi dapat dilakukan dengan cara pengaturan diet, dukungan emosional, akupuntur dan jahe. Aromaterapi jahe memberikan ragam efek bagi penghirupnya karena mempunyai efek menyegarkan, memblokir reflek muntah,

melancarkan peredaran darah serta membuat syaraf-syaraf bekerja dengan baik (Tiara dan Aisah; 2019).

Memberitahukan ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum akibat stress psikologis adalah obat sedatif seperti phenobarbital. Dapat juga diberikan vitamin seperti vitamin B yang berfungsi mempertahankan kesehatan syaraf jantung dan otot serta meningkatkan perbaikan dan pertumbuhan sel. Lalu diberikan pula antihistamin atau antimimetik seperti disiklomin hidrokloride pada keadaan yang lebih berat untuk kondisi mualnya. Lalu untuk mual dan muntahnya dapat diberikan vitamin B6. Melakukan isolasi dan pemberian terapi psikologis serta anjuran diet

Cairan dapat diberikan dalam keadaan darurat sehingga keadaan dehidrasi dapat diatasi. Cairan pengganti yang diberikan adalah glukosa 5% sampai 10% dengan keuntungan dapat mengganti cairan yang hilang dan berfungsi sebagai sumber energi sehingga terjadi perubahan metabolisme dari lemak menjadi protein menuju kearah pemecahan glukosa. Cairan tersebut dapat ditambah vitamin C, B kompleks, atau kalium yang diperlukan untuk kelancaran metabolisme (Rini ; 2021).

Perinsip pencegahan hiperemesis gravidarum dapat diberikan dengan konseling tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologi, menganjurkan mengubah makanan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering, makanan

yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan, menghindari kekurangan karbohidrat merupakan factor penting, dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula (Ginting ; 2020).

6. Langkah VI : penatalaksanaan

Pada pasien hyperemesis gravidarum tingkat 2 dan 3 harus dilaksn rawat nginap dirumah sakit, dan dilakukan penanganan yaitu memberikan obat-obatan diantaranya suplemen vitamin B1 dan B6. Pemberian antihistamin yang dianjurkan adalah doxylamine dan dipendyramine. Pemberian dopamine antagonis yang dianjurkan diantaranya prochlorperazine, promethazine, dan metocloperamide. Pemberian serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetran (Widayana, Wayan, Ketut: 2014).

Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum terdapat therapy farmakologi, yaitu : suplemen multivitamin, bantihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, kortikosteroid, vitamin B1 dan B6 (Widana, 2017). Sedangkan therapy nonfarmakologi yaitu : Makan dalam jumlah sedikit tapi sering, makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, sewaktu bangun tidur jangan langsung terburu-buru terbangun tetapi duduk dahulu dan baru perlahan berdiri bangun, Hindari makanan yang berlemak, berminyak, minum yang cukup, pengobatan tradisional: air tebu

kombinasi dengan air jahe dan istirahat (Wardayani Kusuma Rahayu : 2020).

Penanganan mual muntah tergantung pada tingkat keparahan gejala yang dirasakan. Pengobatan dapat menggunakan terapi farmakologis maupun non farmakologis. Terapi farmakologis dapat dilakukan dengan cara pemberian antiemetik, antihistamin, antikolinergik dan kortikosteroid. Sedangkan terapi non farmakologis dapat dilakukan dengan cara pengaturan diet, dukungan emosional, akupunktur, perubahan pola hidup, istirahat, tidur dan dengan pemberian pengobatan herbal/ alamiah seperti jahe maupun peppermint. menggunakan terapi farmakologis sudah tepat namun sebagian besar belum tepat dalam melakukan pengobatan herbal/ alamiah.

Cara mengatasi mual muntah pada saat hamil dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dapat melalui tindakan farmakologis dan non farmakologis. Tindakan non farmakologis biasanya dianjurkan oleh petugas kesehatan seperti mendorong ibu hamil untuk melakukan aromaterapi. Salah satu aromaterapi yang dapat digunakan untuk mengurangi mual muntah saat hamil yaitu aromaterapi lemon karena lemon memiliki bahan yang dapat membunuh bakteri meningococcus (meningococcus), bakteri tifus, memiliki efek antijamur dan efektif untuk menetralkan bau tidak sedap, serta menghasilkan anticemas, antidepresi, anti stres, serta

untuk mengangkat dan memfokuskan pikiran. Kesimpulan penelitian yaitu berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penggunaan aromaterapi lemon efektif untuk mengurangi mual muntah pada ibu hamil (Susilonigtias dan Suhartina ; 2021).

Mual dan muntah pada kehamilan biasanya diatasi dengan pemberian terapi farmakologi yaitu pemberian piridoksin (vitamin B6). Akan tetapi mual muntah juga dapat diatasi secara non farmakologi atau terapi komplementer antara lain dengan tanaman herbal atau tradisional yang bisa dilakukan dan mudah di dapatkan seperti jahe, daun peppermint, lemon, dll. Oleh karena itu selain mengkonsumsi obat- obatan untuk mengatasi mual muntah, para ibu hamil dapat mencoba berbagai ramuan tradisional seperti jahe dengan cara diseduh.

Kandungan jahe yang terdapat pada minyak atsiri Zingiberena (zingirona), zingiberol, bilena, kurkumen, gingerol, flandrena, memiliki resin pahit yang dapat memblokir serotonin yaitu suatu neurotransmitter yang disintesis pada neuron-neuron serotonergis dalam sistem syaraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan, akibatnya kerja otot-otot saluran pencernaan mengendur dan melemah kemudian menimbulkan perasaan nyaman dalam perut, sehingga mual dan muntah dapat berkurang (Dewi, Fahriani, dan Mika ; 2014).

Pencegahan terhadap hyperemesis gravidarum perlu dilaksanakan diantaranya dengan mengatasi kecemasan ibu dengan memberikan konseling terhadap kehamilan dan persalinan sebagai proses yang alami dan normal. Konsep bahwa mual muntah merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan 20 minggu. Memberikan kenyamanan emosional yang akan sangat membantu ibu dalam mengatasi keluhannya. Jika memperburuk gejala yang ada penyebabnya ibu mengalami dehidrasi, anjurkan ibu untuk bed rest total dengan asupan nutrisi dan cairan tetap terjaga, menganjurkan ibu makan sedikit tapi sering, menghindari makanan berminyak dan berbau (Farhan ; 2019).

7. Langkah VII : Evaluasi

Mual dan muntah pada kehamilan biasanya diatasi dengan pemberian terapi farmakologi yaitu pemberian piridoksin (vitamin B6). Akan tetapi mual muntah juga dapat diatasi secara non farmakologi atau terapi komplementer antara lain dengan tanaman herbal atau tradisional yang bisa dilakukan dan mudah di dapatkan seperti jahe, daun peppermint, lemon, dan lain-lain. Oleh karena itu selain, mengkonsumsi obat- obatan untuk mengatasi mual muntah, para ibu hamil dapat mencoba berbagai ramuan tradisional seperti jahe dengan cara diseduh. Khasiat jahe sebagai anti-muntah tidak hanya digunakan untuk penderita gastritis, tetapi juga sudah

digunakan pada ibu hamil, karena jahe dianggap mempunyai efek samping yang lebih ringan dibanding obat-obat anti muntah (Dewi Aprilia,dkk; 2020).

Dalam penatalaksanaan hiperemesis gravidarum terdapat therapy farmakologi, yaitu suplemen multivitamin, bantihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, kortikosteroid, vitamin B1 dan B6. Sedangkan therapy nonfarmakologi yaitu makan dalam jumlah sedikit tapi sering, makan makanan yang tinggi karbohidrat dan protein, sewaktu bangun tidur jangan langsung terburu-buru terbangun tetapi duduk dahulu dan baru perlahan berdiri bangun, hindari makanan yang berlemak, berminyak, minum yang cukup, pengobatan tradisional yaitu air tebu kombinasi dengan air jahe dan istirahat. Air tebu kombinasi dengan 10 ml air jahe yang diminum 3 kali sehari selama 4 hari untuk mengurangi mual muntah yang terkandung di dalam zat-zat aktif seperti asam suksinat, minyak atsiri, gingerol untuk meredakan perut menjadi lebih nyaman dan hangat (Rahayu; 2020).

Pemberian pyridoxin cukup efektif dalam mengatasi keluhan mual dan muntah. Anti histamin yang dianjurkan adalah 8 doxylamine dan dipendyramine. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rangsangan di pusat muntah. Pemberian serotonin

antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetron. Ondansetron biasanya diberikan pada pasien hiperemesis gravidarum yang tidak membaik setelah diberikan obat-obatan yang lain (Ary, dkk; 2014).

Akupresur dan aromaterapi merupakan salah satu terapi non farmakologis jenis terapi yang dapat digunakan sebagai intervensi untuk mengatasi mual dan muntah. Aroma terapi lemon memiliki bahan yang dapat membunuh bakteri meningokokus (meningococcus), bakteri tifus, memiliki efek antijamur dan efektif untuk menetralkan bau tidak sedap, serta menghasilkan anti cemas, antidepresi, anti stres, serta untuk mengangkat dan memfokuskan pikiran. Aromaterapi memberikan berbagai efek untuk inhaler, seperti ketenangan, kesegaran, bahkan bisa membantu ibu hamil mengatasi mual. Minyak esensial aromaterapi dapat mengatasi keluhan fisik dan psikis. Beberapa jenis minyak esensial dapat digunakan sebagai aromaterapi, antara lain peppermint, spearmint, lemon dan jahe (Susiloningtyas & Siti Suhartinah; 2021).

Pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku terhadap pola hidup dalam memotivasi untuk siap berperan serta dalam perubahan kesehatan. Rendahnya pendidikan seseorang makin sedikit keinginan untuk memanfaatkan pelayanan

kesehatan, dan sebaliknya makin tingginya pendidikan seseorang, makin mudah untuk menerima informasi dan memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. Pendidikan merupakan faktor predisposisi adalah faktor yang ada dalam individu seperti pengetahuan, sikap terhadap kesehatan serta tingkat pendidikan. Dimana untuk berperilaku kesehatan misalnya pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil diperlukan pengetahuan tentang manfaat periksa hamil, baik bagi kesehatan ibu sendiri maupun bagi janinnya (Hertje Salome, dkk; 2014).

B. Implikasi Kebidanan

Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi pada awal kehamilan. Keluhan muntah kadang-kadang begitu hebat dimana segala apa yang dimakan dan diminum dimuntahkan sehingga dapat mempengaruhi keadaan umum dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, berat badan menurun, dehidrasi dan terdapat aseton dalam urine bahkan seperti gejala penyakit apendisitis, pielitis dan sebagainya. Pada ibu hamil yang mengalami keluhan mual dan muntah. Keluhan ini biasanya disertai dengan hipersalivasi, sakit kepala, perut kembung, dan rasa lemah pada badan.

Hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan wanita hamil, namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat bayi lahir rendah,

kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir. Hiperemesis gravidarum yang menetap akan mengalami dehidrasi yang berakibat pada kerusakan organ hati dan ginjal. Pada keadaan yang parah perlu perawatan khusus karena hiperemesis gravidarum ini menyebabkan perubahan bahkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, defisiensi nutrisi, gangguan liver. Sementara pertumbuhan janin akan terganggu akibat ibu kekurangan nutrisi kemudian akan berdampak pada kematian.

Pada kasus hiperemesis gravidarum, jenis dehidrasi yang terjadi termasuk dalam dehidrasi karena kehilangan cairan (pure dehydration). Maka tindakan yang dilakukan adalah rehidrasi yaitu mengganti cairan tubuh yang hilang ke volume normal, osmolaritas yang efektif dan komposisi cairan yang tepat untuk keseimbangan asam basa. Pemberian cairan untuk dehidrasi harus memperhitungkan secara cermat berdasarkan berapa jumlah cairan yang diperlukan, defisit natrium, defisit kalium dan ada tidaknya asidosis. Berikan cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologis sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C, dapat diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein. Tindakan kolaborasi dengan dokter dilakukan untuk memberikan terapi farmakologi pengurang mual, juga

memberikan terapi cairan untuk pencegahan maupun dehidrasi akibat pengeluaran yang banyak melalui muntah.

Mual dan muntah pada kehamilan biasanya diatasi dengan pemberian terapi farmakologi yaitu pemberian piridoksin (vitamin B6). Akan tetapi mual muntah juga dapat diatasi secara non farmakologi atau terapi komplementer antara lain dengan tanaman herbal atau tradisional yang bisa dilakukan dan mudah di dapatkan seperti jahe, daun peppermint, lemon, dll. Oleh karena itu selain, mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi mual muntah, para ibu hamil dapat mencoba berbagai ramuan tradisional seperti jahe dengan cara diseduh.

Perinsip pencegahan hiperemesis gravidarum dapat diberikan dengan konseling tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologi, dianjurkan mengubah makanan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering, makanan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan, menghindari kekurangan karbohidrat merupakan factor penting, dianjurkan makanan yang banyak mengandung gula.

Pemberian pyridoxin cukup efektif dalam mengatasi keluhan mual dan muntah. Anti histamin yang dianjurkan adalah 8 doxylamine dan dipendyramine. Pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular,

menurunkan rangsangan di pusat muntah. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula. Serotonin antagonis yang dianjurkan adalah ondansetron. Ondansetron biasanya diberikan pada pasien hiperemesis gravidarum yang tidak membaik setelah diberikan obat-obatan yang lain.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan penulisan literature review pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum serta menghubungkan dengan teori dan avoidance based maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

Berdasarkan referensi, maka untuk melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dengan mendapatkan data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala, faktor penyebab berbagai referensi tentang ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah muntah yang terjadi pada awal kehamilan. Keluhan muntah kadang-kadang begitu hebat dimana segala apa yang dimakan dan diminum dimuntahkan sehingga dapat mempengaruhi keadaan umum dan mengganggu pekerjaan sehari-hari, berat badan menurun, dehidrasi dan terdapat aseton dalam urine bahkan seperti gejala penyakit apendisitis, pielitis dan sebagainya. Pada ibu hamil yang mengalami keluhan mual dan muntah. Keluhan ini biasanya disertai dengan hipersalivasi, sakit kepala, perut kembung, dan rasa lemah pada badan.

Hiperemesis gravidarum yang menetap akan mengalami dehidrasi yang berakibat pada kerusakan organ hati dan ginjal. Pada keadaan yang parah perlu perawatan khusus karena hiperemesis gravidarum ini menyebabkan perubahan bahkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, defisiensi nutrisi, gangguan liver. Sementara pertumbuhan janin

akan terganggu akibat ibu kekurangan nutrisi kemudian akan berdampak pada kematian.

Tindakan yang dilakukan yaitu memberikan cairan parenteral yang cukup elektrolit karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan garam fisiologi sebanyak 2 sampai 3 liter perhari. Bila perlu ditambahkan kalium dan vitamin, khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C bila ada kekurangan protein, dapat memberikan pula asam amino secara intravena. Terapi dehidrasi merupakan kunci dari terapi dehidrasi. Pemberian cairan awal dapat dilakukan dengan memberikan larutan RL 2L selama 3-5 jam. Selanjutnya cairan diganti dengan cairan dekstrosa 5% dalam cairan saline 0,45%. Sebagai cairan yang diberikan dapat berupa perbandingan dekstrosa 55 atau 10% dengan RL yakni 2:1 dengan jumlah tetesan 40 per menit.

Bila penderita sudah dapat makan peroral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dalam porsi kecil namun sering, diet tinggi karbohidrat, rendah protein dan rendah lemak, hindari suplementasi besi untuk sementara, hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Pemberian diet diperhitungkan jumlah kebutuhan basal kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kkal perharinya.

Pencegahan terhadap emesis gravidarum dengan cara menganjurkan makan dengan jumlah kecil tetapi lebih sering, anjurkan minum teh hangat dan biskuit, roti kering, selain itu ibu juga diharapkan untuk tidak mengonsumsi susu secara berlebihan ataupun makanan yang mengandung

lemak, karena akan meningkatkan rangasangan muntah. Selain itu peanganan dengan memberikan pijatan akupresur pada titik Pc 6, dirasa sangat efektif, ibu hanya perlu menekan bagian 3 jari dibawah pergelangan tangan, dengan cara ibu dianjurkan untuk duduk, atau berbaring dengan posisi nyaman mungkin, ibu dapat mengulang kembali jika ibu merasa nyaman dan rileks.

B. Saran

1. Bagi Tenaga Kesehatan

- a. Hiperemesis gravidarum dapat berujung pada komplikasi yang lebih berat baik pada ibu ataupun pada janinnya jika tidak tertangani dengan baik dan cepat. Sebagai tenaga kesehatan senantiasa dituntut untuk tetap berusaha dalam menanggulangi hiperemesis gravidarum pada ibu hamil dengan melakukan tindakan asuhan sesuai standar operasional kerja.
- b. Tenaga kesehatan khususnya bidan, senantiasa selalu mengupdate perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu kebidanan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembacanya dan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam melakukan asuhan. Dapat memberikan gambaran dan panduan praktik dalam asuhan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum.

DAFTAR PUSTAKA

- Andria. *Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hiperemesis Gravidarum di RS Umum Daerah Rokan Hulu*. Jurnal Matrnity dan Neonatal, Vol 2 No 3 ; 2017.
- Ana Mariza, Lia Ayuningtias. *Penerapan akupresur pada titik P6 terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1*. Jurnal Kesehatan, Vol 13 No.3 ;2019
- Annisa Dinah Nurbaity, Aryu Candra, Deny Yudi Fitranti. *faktor risiko hiperemesis gravidarum pada ibu hamil di semarang*. Journal of Nutrition College, Vol 8, No3 ;2019
- Ary Widayana, I Wayan Megadhana, Ketut Putera Kemara. *Diagnosis dan penatalaksanaan hiperemesis gravidarum*
- Astaria Br Ginting. *Pengaruh pemberian jahe emrit dalam mengurangi hyperemesis gravidarum pada ibu hamil di klonik nana doana kota medan tahun 2019*. Jurnal stindo professional, Vol VI No 4 ;2020
- Asrianti Safitri Muchtar. *hubungan umur dan paritas ibu hamil dengan kejadian hyperemesis gravidarum*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis Vol 12 No6 ;2018
- Bartini. *Kemitraan Bidan dan BKKBN dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta : IBI ; 2017.
- Bunga Tiara Carolin , Aisah Hairul Ummah. *Pengaruh Pemberian Aromaterapi Ginger Oil (Zingiberofficinale) Terhadap Emesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I Di Klinik Makmur Jaya*. Jurnal Kesehatan Qamarul Huda, Vol 7, No1 ; 2019
- Dr. Dewi Setiawati, S.Ked. 2011. *Buku saku Dasar-Dasar Obstetri*. Makassar.
- Desvita Angraini Wulandari, Is Hadri Utomo. *Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Karanganyar*. Jurnal wacana public, Vol 1 No 3 ; 2017.
- Dewi Aprilia Ningsih, Metha Fahriani, Melly Azhari, Mika Oktarina. *efektivitas pemberian seduhan jahe terhadap frekuensi emesis gravidarum trimester i*. Jurnal SMART Kebidanan Vol. 7, No.1 ;2020
- Evi susanti, Firdayanti, Nadyah haruna. *Manajemen auhan Kebidanan Antenatal pada Ny”S” dengan Hiveremesis Gravidarum Tingkat II di RS TNI Angkatan Laut Jala Ammari pada Tanggal 27 Mei 2018*, Jurnal Midwifery , Vol 1 No 2 ; 2019.
- Elfanny Sumai, Femmy Keintjem, Iyam Manueke. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Hiperemesis gravidarum di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sam Ratulangi Tondano Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Ilmiah Bidan Vol 2 No 1 ;2014
- Fitri Muryasari, Ranny Septiani, Herlina. *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum di RSU Muhammadiyah Metro*. Jurnal Kesehatan Metro Sai, Vol X No ; 2017
- Fitri Muriyasari, Ranny Septiani, dan Herlina. *faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum di rsu muhammadiyah metro*. Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai Vol X No 1 ;2017

- Hertje Salome Umboh, Telly Mamuaya, Freike S.N.Lumy . *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di Puskesmas Tompaso Kabupaten Minahasa*. Jurnal Ilmiah Bidan Vol2 No2 ;2014
- Inthan Atika, Hedrians kusuma putra, Siti hildani Thaib. *Hubungan Hiperemesis Gravidarum dengan usia ibu, usia gestasi, paritas, dan pekerjaan pada pasien rawat inap diRSUP DR.Moh Haesin Palembang*. Jurnal kedokteran dan kesehatan, Vol 3 No 3 ;2016
- Imtihanul Munjjah,Tita Husnitawati Madjid, Herry Herman, Farid Husin, Ieva Baniasih Akbar, Ahmad Rizal. *Perbedaan Pengaruh Akupunktur dan Vitamin B6 terhadap Penurunan Intensitas Mual Muntah pada Emesis Gravidarum Berat*. IJEMC, Volume 2 No.2 ; 2015
- Kristina Paskana, Vevi Gusnidarsih. *hubungan paritas dengan kejadian hiperemesis gravidarum pada ibu hamil*. jurnal asuhan ibu & anak;2020
- Kevin Gunawan, Paul Samuel Kris Manengkei, Dwiana Ocviyanti. Jurnal Indon Med Assoc, Volum: 61, No 11 ;2011
- Maria Christina Endang Sukartiningsih. *Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Kehamilan Dengan Keteraturan Melaksanakan Antenatal Care di PKM Pembantudauh Denpasar Tahun 2014*, Jurnal Midwifery Medical, Vol 1, No 1 ISS N : 2406-8179, ; 2014.
- Mailinda Purwanti, Netty Etalia Brahmama, Wisnu Hidayat. *faktor risiko umur, gravida, status gizi dan kehamilan ganda dengan kejadian hiperemesis gravidarum (studi kasus kontrol di rsud aceh tamiang)*. Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan Vol. 3, No. 2 ;2019
- Mustar, Indriyani. *faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum tingkat ii pada ibu hamil di puskesmas taretta kecamatan amali*. Jurnal Kebidanan Vokasional Vol 5 No1 ;2020
- Nunung Karmila, Arthur E. Mongan, Gladys M. Rambert. *Gambaran Keton Urin pada Primigravida Trimester I dengan Hiperemesis Gravidarum di RS Islam Sitti Maryam Manado*. Jurnal e-Biomedik (eBm), Vol 7, No 1 ;2019
- Ni Putu Ayu Widiyari ,I Gusti Made Surya Chandra Trapika. *Pola pemberian terapi mual dan muntah pada ibu hamil oleh dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta bidan di kota Denpasar*. Jurnal JURNAL MEDIKA, VOL 6 NO 5 ;2017
- Nora Rahmanindar, Evi Zulfiana, Riska Arsita Harnawati. *Akupresur Dalam Mengurangi Hiperemesis Kehamilan*. Jurnal Ilmiah Kebidanan, Vol. 8, No. 1 ;2021
- Ratih Pratiwi, Misrawati2, Reni Zulfitri. *efektifitas pemberian aroma terapi lavender dalam menurunkan rasa mual dan muntah pada pasien hiperemesis gravidarum*. Jurnal Ners Indonesia, Vol 2 No 1 ;2011
- Rahmi Fitria. *Pengalaman ibu dengan Hiperemesis gravidarum di Rumah Bersalin Sehat Bondar Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu*,Jurnal Matrinity and Neonatal, Vol 2 No 2 ; 2017.
- Rukiah, Y; dkk. *Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta : trans Info Media ; 2016

- Rosmiati. *Hubungan Hiperemesis terhadap Stress Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo*. <http://journal.ildikti9.id/CPHJ/index> Vol 2, No.1, ;2020
- Rahayu Kusuma Wardani. *efektifitas konsumsi air tebu kombinasi dengan air jahe terhadap hiperemesis gravidarum di wilayah kerja puskesmas rawat inap sidomulyo pekanbaru*. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Sciences)* <http://jurnal.alinsyirah.ac.id/index.php/kebidanan> Vol 9, No 1, ;2020
- Rizki Muji lestari, Melisa Frisilia, Faridah. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Keluarga Dengan Sikap Dalam Penanganan Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I Di UPT Puskesmas Pahandut Palangka Raya Tahun 2017*. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* Vol 11 No.1 ;2020
- Rini DA. *asuhan gizi pada hiperemesis gravidarum*. *jnh (Journal of Nutrition and Health)* Vol.9 No.1 ;2021
- Sitti saleha, S.Si.T, S.KM,M.Keb. 2009. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: selemba medika.
- Salmah, dkk. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta : EGC ; 2016
- Saifuddin, A.B. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Puastaka Sarwono Praworoharjo ;2016 Kesehatan, Vol. 9 No. 1 ;2016
- Syarifah. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum pada Ibu Hamil yang Dirawat di Rumah Sakit Gumawang Belitang OKU Timur*. Tahun 2012
- Selvi Puspan Sari , Udin Sabarudin , Siti Sugih Hartiningsih , Hidayat Wijayanegara, Herri S Sastramihardja , Ma'mun Sutisna. *Perbandingan Pengaruh Inhalasi Aromaterapi Lemon dan Vitamin B6 Terhadap Penurunan Frekuensi Emesis Gravidarum pada Ibu Primigravida Trimester I*. *JSK*, Vol 5 No 1 ;2019
- Susiloningtyas dan Siti Suhartinah. *mengkaji pengaruh pemberian lemon terhadap emesis gravidarum*. *Jurnal Health Sains*: p-ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398, Vol. 2 No. 4 ;2021
- Siti Rofi'ah, Sri Widatiningsih, Tuti Sukini. *Efektivitas Aromaterapi Lemon untuk Mengatasi Emesis Gravidarum*. , jurnal kebidanan, e-ISSN 2621-2870, p-ISSN 2089-7669
- St. Subriani. *Hubungan Mola hidatidosa dan Gemelli Terhadap Hiperemesis Gravidarum di RSUD Haji Makassar Tahun 2018*. *Jurnal Kesehatan Delima* Vol.2, No.1 ;2018
- Syahril Syamsuddin, Hariati Lestari dan Andi Faisal Fachlevy. *Hubungan Antara Gastritis, Stres, dan Dukungan Suami Pasien dengan Sindrom Hiperemesis Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*, Vol. 2, No. 2, ;2018
- Triana Indrayani. *faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum di rsud dr. drajat prawiranegara kabupaten serang tahun*

2017. *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya*, Vol 4, No 1 ;2018

Varney. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta : EGC ; 2016.

Prawiroharjo. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Puataka ; 2016.

Yulistiana. *Hubungan Pengetahun Ibu dan Dukungan Suami Pada Ibu Hamil Terhadap Ketergantungan ANC di PKM Wates Lampung Tengah Tahun 2014*. *Jurnal Kebidanan*, Vol 1 No 2 ; 2015.

Yasi Anggasari. *kejadian Hiperemesis Gravidarum ditinjau dari riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal saat pra konsepsi di BPM Kusmawati Surabaya*. *Jurnal Ilmiah*



RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Melinda
Nim : 70400117023
TTL : Barru, 19 oktober 1999
Suku : Bugis
Agama : Islam
Alamat : Lompo Tengah Kec. Tnete Riaja kab. Barru

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Masse
Umur : 52 Tahun
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Islam
Nama Ibu : Indare
Umur : 42 tahun
Pendidikan : SD
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2016-2011 SD NEGERI SIKAPA
2. Tahun 2011-2014 SMP NEGERI 2 TANETE RIAJA
3. Tahun 2014-2017 SMA NEGERI 3 BARRU
4. Tahun 2017-2022 Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu

Kesehatan UIN

Alauddin Makassar

