

**HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN RISIKO KEJADIAN
HIPERTENSI PADA *SECURITY* DI KAMPUS
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD RICHZAN

NIM: 70300118034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Di Kampus UIN Alauddin Makassar*" yang disusun oleh Muhammad Richzan, NIM: 70300118034, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 18 Agustus 2022 M
24 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hasnah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Wahdariah, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Irham, S.Thl., M.Thl	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kepada Allah swt. atas berkat rahmat, hidayah, dan karunianya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Di Kampus UIN Alauddin Makassar*”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap ada banyak manfaat yang dapat diambil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua bapak saya Munir dan ibu saya Rukmini atas penjagaanya, doanya dan segala hal yang baik yang menghantarkan penulis ke tahap ini. Juga tidak lupa ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, yang telah mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. Prof. Dr. H. Wahyuddin Naro, M.Hum. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag. selaku wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar atas kesempatan yang diberikan pada penulis untuk menimba ilmu, pengalaman, dan mengasah skill penulis dikampus UIN

Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes. selaku dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, serta wakil dekan I, II, dan III atas semua ilmu, petunjuk, dan nasihat nya selama penulis menempuh perjalanan menuntut ilmu di UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Muh. Anwar Hafid S.Kep., Ns., M.Kes. selaku ketua jurusan keperawatan, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sebagai dosen pembimbing I, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Eny Sutria S.Kep., Ns., M.Kes. selaku dosen pembimbing II, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
5. Wahdaniah S.kep., Ns., M.Kes. selaku dosen penguji I dan Dr. H. Muhammad Irham, S.Th.I., M.Th.I selaku dosen Penguji II, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
6. Seluruh dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya dosen jurusan keperawatan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Terimakasih kepada satuan pengamanan (*security*) di kampus UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya yang telah menerima untuk pengambilan data awal, dan juga diperbolehkan dengan sangat hangat untuk melakukan penelitian.
8. Saudara-saudara kami, atas doa, bimbingan, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini. Untuk orang terhebatku Ibu dan ayah saya, kakak

saya yang senantiasa mendukung saya sampai sejauh ini.

9. Keluarga besar universitas islam negeri alauddin makassar, khususnya teman-teman seperjuangan kami jurusan keperawatan angkatan 2018 (F18rosa), atas semua dukungan, semangat, Serta kerjasamanya.
10. Kepada kakak-kakak senior, adik-adik dan teman-teman dari segala pihak yang turut membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas nasihat, kritik, saran, dan petunjuk yang telah diberikan pada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan yang mungkin saja terjadi. Menyadari skripsi ini tidak luput dari sebagai kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Allah swt. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang kesehatan dan penerapan dilapangan serta bisa dikembangkan lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 27 Juni 2022 M

Penulis,

Muhammad Richzan

NIM: 70300118034

DAFTAR ISI

SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1-14
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	7
D. Definisi Operasional	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15-51
A. Tinjauan Umum Hipertensi	15
B. Tinjauan Umum Kualitas Tidur	33
C. Kerangka Teori	48
D. Kerangka Konsep	49
E. Kerangka Kerja Penelitian	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52-62
A. Desain Penelitian	52
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	52
C. Populasi Dan Sampel	53
E. Instrumen Penelitian	55
F. Metode Pengumpulan Data	58
G. Pengolaan Data	59
H. Analisa Data	61

	I. Etika Penelitian.....	61
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64-85
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
	B. Hasil Penelitian	66
	C. Pembahasan.....	71
	D. Keterbatasan Penelitian	84
	E. Rekomendasi	85
BAB	V PENUTUP.....	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran	86
	KEPUSTAKAAN.....	88
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	107



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Definisi Operasional	7
Tabel 1.2	Kajian Pustaka	9
Tabel 3.1	Distribusi Pertanyaan Kuesioner PSQI.....	56
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin dan Riwayat Merokok	67
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Kualitas Tidur pada <i>Security</i> di Kampus UIN Alauddin Makassar Makassar	68
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Tekanan Darah pada <i>Security</i> di Kampus UIN Alauddin Makassar Makassar	69
Tabel 4.5	Hasil Analisis Data Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada <i>Security</i> di Kampus UIN Alauddin Makassar.....	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	49
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	49



ABSTRAK

Nama : Muhammad Richzan

Nim : 70300118034

Judul : Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada Security di Kampus UIN Alauddin Makassar.

Security merupakan petugas keamanan yang menerapkan kerja *shift* dengan sistem penjadwalan pada periode tertentu. Salah satu risiko sistem kerja *shift* adalah berubahnya irama sirkadian pada pekerja. Perubahan sirkadian dapat menyebabkan gangguan tidur dan berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan kejadian risiko hipertensi pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar. Desain penelitian ini adalah penelitian *Kuantitatif observasional analitik* dengan pendekatan *case control*. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar. Analisa data menggunakan uji statistik *Chi square*. Pengumpulan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner *Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI)* untuk mengukur tekanan darah menggunakan alat *sphygmomanometer Aneroid* dan Stetoskop

Hasil penelitian menunjukkan dari 42 responden terdapat kualitas tidur buruk pada *security* yang hipertensi sebanyak 28 responden (96,5%), dan kualitas tidur baik sebanyak 1 responden (3,4%). Untuk *security* yang tidak hipertensi didapatkan kualitas tidur buruk pada sebanyak 8 responden (61,5%) dan kualitas tidur baik 4 responden (38,5%). Dan dari hasil kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar menggunakan spss dengan uji *Chi square* diperoleh *p-value* sebesar 0,007 dengan taraf signifikan $<0,05$. Nilai *p-value* 0,007 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 diterima H_0 ditolak, didapatkan kekuatan hubungan sebesar OR:7,000.

Kesimpulan dari penelitian ini yakni ada hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi dengan kekuatan hubungan 7 kali berisiko terhadap kejadian hipertensi Pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.

Kata Kunci : Hipertensi, Kualitas Tidur, *security*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hipertensi adalah suatu kondisi ketika terjadi tekanan darah meningkat di atas ambang batas normal. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*), batas tekanan darah yang dianggap normal adalah kurang dari 130/85 mmHg. Bila tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan atau diastolik ≥ 90 mmHg dinyatakan hipertensi. (World Health Organization, 2019)

Berdasarkan data WHO tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah penderita hipertensi dewasa diseluruh Dunia pada tahun 2000 adalah 957-987 juta orang. Prevalensinya diduga akan semakin meningkat setiap tahunnya, sampai mencapai angka 1,56 milyar (60% dari populasi dewasa dunia) pada tahun 2025. Proporsi meningkat sejalan dengan bertambahnya usia, yaitu satu dari sepuluh pada usia 20-an dan 30-an sampai lima dari sepuluh orang berusia 50-an. Saat ini hipertensi masih menjadi masalah global di dunia, dimana WHO menempatkan hipertensi sebagai penyebab kematian nomor tiga di dunia (WHO, 2015). (Kemenkes RI, 2019)

Prevalensi hipertensi secara Global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Pada Wilayah Afrika mempunyai prevalensi hipertensi sangat tinggi sebesar 27% sedangkan di Wilayah Amerika Serikat WHO memiliki prevalensi hipertensi yang terendah (18%). Tinjauan tren saat ini menunjukkan bahwa jumlah orang dewasa dengan hipertensi meningkat dari 594 juta pada tahun 1975 menjadi 1,13 miliar pada tahun 2015, dengan peningkatan yang terjadi terutama di

Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan faktor risiko hipertensi pada populasi ini. (Kemenkes RI, 2019)

Di Asia, tercatat 38,4 juta penderita hipertensi pada tahun 2000 dan diprediksikan menjadi 67,4 juta orang pada tahun 2025. Sedangkan Asia Tenggara berada di posisi ke-3 tertinggi dengan prevalensi sebesar sebesar 25% dari total penduduk. Prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran pada Riskesdas tahun 2018 menyebutkan bahwa Indonesia mencapai 34,11% (Kemenkes RI, 2019).

Di Indonesia, mencapai 17,21% dari populasi penduduk dan kebanyakan belum terdeteksi. Menurut *National Basic Health Survey* prevalensi hipertensi di Indonesia adalah 8,7% pada kelompok usia 15 - 24 tahun, pada kelompok usia 25 - 34 tahun adalah 14,7%, kelompok umur 35 - 44 tahun 24,8% usia 45 – 54 tahun 35,6%, usia 55 – 64 tahun 45,9% untuk usia 65 - 74 tahun 57,6% sedangkan diatas dari 75 tahun adalah 63,8%, dengan prevalensi hipertensi yang tinggi, tidak disadari bahwa jumlahnya bisa lebih tinggi lagi. Hal ini terjadi karena hipertensi dan komplikasinya, jumlahnya jauh lebih rendah daripada hipertensi yang asimtomatik (Riskesdas, 2018).

Pada tahun 2018 terdapat data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan jumlah penderita hipertensi sebanyak 142.571 orang dengan rincian yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 54.749 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 87.882 orang. Sementara itu, data dinas kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018, prevalensi Kabupaten tertinggi penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi penduduk umur ≥ 18 tahun di Sulawesi Selatan, yaitu

kabupaten Selayar 30,57%, Bulukumba 33,28%, Jeneponto 28,86% dan Kabupaten Gowa 31,92% (Riskesdas, 2018).

Prevalensi di Provinsi Sulawesi Selatan, kejadian prevalensi tekanan darah tinggi yang terukur pun cukup besar, yakni sebesar 34,11% ataupun se-pertiga bagian dari banyaknya masyarakat di Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan hipertensi urutan ketiga dari 10 penyakit yang ada di Makassar angka kejadian kasus hipertensi tidak jauh berbeda, yakni 29,97%. Angka Riskesdas tahun 2018 juga menyampaikan kejadian angka prevalensi tekanan darah tinggi (hipertensi) sebesar 33,72% untuk masyarakat pedesaan (Riskesdas, 2018).

Gangguan tidur juga dapat berpengaruh terhadap tekanan darah pada individu. Tekanan darah naik ketika seseorang kurang tidur, dan jika ini terus berlanjut dapat menyebabkan ke hipertensi (Martini, 2018). Kriteria hipertensi yang digunakan untuk karakterisasi kasus mengacu pada kriteria diagnostik JNC VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg (Martini, 2018).

Prevalensi gangguan pemenuhan kebutuhan tidur pada orang dewasa, terdiri dari sekitar 60% dari kelompok orang dewasa, keluhan mengalami kesulitan tidur sebanyak 40%, sering terbangun di malam hari sebanyak 10% dan sisanya gangguan pemenuhan tidur lain (Amir, 2016). Berdasarkan *Journal Circulation*, gangguan tidur dan gangguan bernapas saat tidur (*sleep apnea*) dapat mewakili kontributor potensial untuk inisiasi dan perkembangan penyakit kardiovaskular. Hasil data epidemiologi (2015), didapatkan bahwa prevalensi gangguan kualitas tidur pada dewasa di Indonesia sekitar 49% atau 9,3 juta

dewasa. Dipulau Jawa dan Bali prevalensi gangguan kualitas tidur juga cukup tinggi sekitar 44% dari jumlah dewasa. Di Jawa Timur 45% dari jumlah dewasa mengalami gangguan tidur di malam hari (Erizka Yulinda, 2017).

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan antara kualitas tidur dengan meningkatnya risiko hipertensi. Peneliti bernama Wang (2015) mengatakan tidur yang tidak kurang dilaporkan memiliki keterkaitan terhadap meningkatnya prevalensi hipertensi dan aktivitas sistem saraf simpatis. Namun, tidur yang berlebih juga dapat memberikan dampak risiko meningkatnya tekanan darah (Martini, 2018). Penelitian oleh Martini bahkan menyebutkan bahwa kualitas tidur memiliki pengaruh yang lebih tinggi dalam menyebabkan hipertensi daripada faktor lainnya seperti jenis kelamin dan usia. Pola tidur yang buruk disebutkan memiliki risiko menderita hipertensi 9,022 kali lebih tinggi dari pada orang dengan pola tidur yang baik (Martini, 2018). Dilihat dari penelitian Wasim di India pada tahun 2014 mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan hipertensi melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan etnik.

Satpam (*security*) adalah singkatan dari satuan pengamanan atau suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh berbagai instansi yang melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelenggarakan sistem keamanan atau perlindungan di lingkungan kerjanya. Petugas *security* yang menerapkan kerja *shift* dengan sistem penjadwalan pada periode. Salah satu risiko kerja *shift* mengakibatkan berubahnya irama sirkadian pada pekerja. Perubahan irama sirkadian dapat menyebabkan gangguan tidur dan berpengaruh terhadap kejadian

hipertensi. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Begani, RK kepada satpam (*security*) yang menggunakan sistem kerja *shift* menunjukkan bahwa gangguan tidur (52%) adalah dampak yang paling umum dan masalah lainnya yakni kelelahan (22%), di ikuti oleh stress (19%), dan gangguan nafsu makan (11%). Namun penelitian tersebut belum banyak dilakukan di indonesia. Sudah sepatutnya kita perhatian lebih diberikan kepada pekerja *shift* sebagai prospek yang sangat penting dalam kesehatan.(Erizka Yulinda, 2017). Menurut Fiona (2021) mengatakan bahwa sebanyak 94 orang satpam/*security* yang bekerja *shift* merasa memiliki kualitas tidur yang rendah selama adanya *shift* malam. Sebanyak 56 orang penjaga satuan pengamanan kerja *shift* dilaporkan memiliki waktu tidur 3-5 jam dalam sehari (Febby, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berjumlah 13 orang *security* di di Kampus UIN Alauddin Makassar. Dari 13 orang *security* ada 6 orang yang mengalami gangguan tidur. *Security* mengatakan bahwa pekerjaannya yang menggunakan sistem kerja *shift*, ada yang kerja *shift* pagi 12 jam dan malam 12 jam. Oleh karena itu dari hasil laporan satpam/*security* mengatakan bahwa yang ditimbulkan berupa masalah pola tidurnya. Gejala yang ditimbulkan berupa sulit untuk memulai tidur (Insomnia), lelah atau capek dan merasakan pusing. Sebagian *Security* juga mengatakan bahwa waktu tidurnya 3-5 jam sehari, hal ini sangat jauh dari waktu tidur normal yang dianjurkan bagi kesehatan yaitu 7-8 jam dalam sehari. Hasil pengukuran Tekanan Darah dilakukan peneliti sebanyak 13 orang *security* didapatkan hasil tekanan darah *security* sebanyak 7 orang mengalami hipertensi dengan tekanan darah 130/85 mmHg – 160/90 mmHg.

Data yang berkunjung ke poliklinik di UIN Alauddin Makassar sepanjang tahun 2014 diperoleh data dengan persentase 38,2% dari jenis penyakit yang ada adalah pasien penderita hipertensi. Rata-rata untuk penderita hipertensi adalah usia produktif termasuk pekerja Satpam/*security* (Rahmadhani, 2014). Kampus UIN Alauddin Makassar adalah salah satu lembaga yang senantiasa berusaha meningkatkan mutu pendidikan bangsa, yang berperan penting adalah tenaga pengajarnya (dosen) yang berkualitas dan juga sistem keamanan yang baik (Eriana, 2017).

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang dilakukan dan di cantumkan, dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan pendapat mengenai ada atau tidak terkait hubungan kualitas tidur terhadap tekanan darah tinggi. Serta masih diperlukan penelitian mengenai hubungan kualitas tidur dengan kejadian hipertensi karena masih kurangnya penelitian mengenai hal tersebut di Indonesia. Pekerjaan yang banyak di masyarakat dan notabane memiliki pengaruh kualitas tidur pekerjaanya adalah pekerjaan seorang satuan pengamanan (*security*) yang memiliki pekerjaan sistem *shift*. Selain itu, studi tentang kualitas tidur terhadap *Security* sebelumnya belum pernah dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada *Security* dii Kampus UIN Alauddin Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : “adakah Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada *Security* Kerja Kampus UIN Alauddin Makassar ?”

C. Hipotesis

1. Ho: Tidak terdapat hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar.
2. Ha: Terdapat hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar.

D. Definisi Operasional

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Hasil Ukur	Alat Ukur	Skala
Variabel Independen Kualitas Tidur	Kualitas Tidur adalah kebiasaan individu terhadap tidur yang baik dan buruk selama 1 minggu terakhir yang berbagai komponen diantaranya adalah: penilaian subjektif lama tidur, gangguan tidur, penilaian laten tidur, disfungsi tidur pada siang hari, menilai efisiensi istirahat tidur.	Setiap jawaban dari 7 komponen pertanyaan kuesioner nantinya akan diinterpretasikan ke dalam skala jawaban 0-3 lalu dijumlahkan. Total skor jawaban akan mengindikasikan kualitas tidur seseorang. - Total skor ≤ 5 mengindikasikan Kualitas tidur baik. - Total skor > 5 mengindikasikan Kualitas tidur buruk. (Ratih, 2017)	Kuesioner <i>Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)</i>	Ordinal

Variabel Dependen Hipertensi	Nilai tekanan darah pada <i>Security</i> di Kampus UIN Alauddin Makassar	Nilai tekanan darah sistolik dan diastolik. - Tidak hipertensi jika <120 dan <80 mmHg) - Hipertensi (Pre Hipertensi 130-139 mmHg dan 80-89 mmHg, Hipertensi tingkat 1 \geq 140-159 mmHg dan 90-99 mmHg.(JNC, 2014, Nita Septiana, 2019)	Stetoskop dan <i>sphygomomanometer Aneroid</i> dalam satuan mmHg	Ordinal
--	--	--	--	---------

E. Kajian Pustaka

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Risiko Hipertensi (<i>Poor Sleep Pattern Increases Risk of Hypertension</i>). (2018)	Santi martini, shofa roshifani, fanni marzela.	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui suatu korelasi perilaku tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko kejadian hipertensi.	menggunakan metode yang bersifat analitik.	Pola tidur paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan hipertensi dibandingkan dengan variabel lain yaitu usia dan jenis kelamin. Tak hanya itu, orang dengan pola tidur buruk memiliki kemungkinan 9.022 kali lebih besar mengalami tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang pola tidurnya buruk. tidur	Yang membedakan dari penelitian saya adalah bagian Desain penelitian menggunakan case control sedangkan dipenelitian saya menggunakan desain cross sectional.

					nyenyak.	
2	Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Pada Pasien Prehipertensi Puskesmas Tarogong Garut (2019)	Umar sumarna, udin rosidin, bambang aditya nugraha	Tujuannya penelitian ini adalah untuk memutuskan sifat istirahat tidur pasien dengan tekanan darah prehipertensi	Metode deskriptif korelatif, yaitu mencari hubungan antara dua variabel dengan rancangan <i>cross sectional study</i> .	terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan tekanan darah dengan pValue = 0,047, artinya semakin buruk kualitas tidur seseorang, semakin tinggi pula tekanan darahnya. Maka disarankan supaya responden memperbaiki kualitas tidurnya karena peningkatan tekanan darah setiap saat selalu mengancam akibat kualitas tidur buruk.	Yang membedakan dari penelitian saya adalah Variabel penelitian ini berfokus pada pasien prehipertensi, sedangkan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah risiko kejadian hipertensi
3	Risiko Hipertensi Pada Orang Dengan Pola Tidur Buruk (Studi di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya) (2018)	Shofa roshifanni	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola tidur dengan kejadian hipertensi dan mengidentifikasi faktor risiko hipertensi pada orang yang	Menggunakan metode analitik yang mencoba menggali bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi tanpa memberikan perlakuan atau intervensi pada subyek penelitian. Ada	Ada hubungan antara desain istirahat tidur responden dengan kejadian hipertensi di Puskesmas Tanah Kalikewall Surabaya $p = 0,000$ ($p < a$). Koefisien koneksi $r = 0,446$ benar-benar	Yang membedakan dari penelitian saya adalah Penelitian ini berfokus pada tidur baik dan buruk. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Kualitas tidur dengan kejadian hipertensi di kampus UIN Alauddin Makassar.

			mempunyai pola tidur buruk di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya.	hubungan antara	bermaksud bahwa ada hubungan kritis hubungan yang kuat antara desain istirahat tidur responden dan terjadinya hipertensi di Puskesmas Tanah Kalikewall Surabaya.	
4	Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Pelajar Kelas 2 SMA Negeri 10 Padang. (2017)	Mohd lutfi, syaiful azmi, erkadius	penelitian untuk menentukan hubungan antara kualitas tidur dengan tekanan darah pada pelajar kelas 2 SMA negeri 10 padang. (2017)	Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik dengan desain <i>crosssectional</i> . Sampel penelitian ini adalah 153 orang siswa kelas 2 SMA Negeri 10 Padang yang termasuk kriteria inklusi dan eklusi.	Hasil penelitian didapatkan rata-rata tekanan darah sistolik sebesar 114,28 mmHg dan diastolik sebesar 73.13 mmHg. Artinya rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik pada penelitian ini lebih tinggi daripada penelitian Angkat (2009), dengan responden dengan umur 15-17 tahun yang memiliki rata-rata tekanan darah sistolik dan diastolik sebesar 110,25 mmHg dan 72,14 mmHg. Terdapat hubungan antara kualitas tidur	Yang membedakan dari penelitian saya adalah dibagian metode penelitian yang digunakan daimana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif observasional analitik

					dengan tekanan darah pada pelajar kelas 2 di SMA Negeri 10 Padang.	
5	Hubungan Pola Tidur Dengan Hipertensi Pada Lansia Di Panti Jompo Welas Asih Singaparna Kabupaten Tasikmalaya . (2021)	Mamay sugiharti, lina marlina, rifki purnama	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran hubungan antara pola istirahat tidur dengan hipertensi pada lansia di Panti Welas Asih Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif korelasional, yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dan menelaah hubungan antara dua variabel pada suatu situasi atau kelompok subjek	Terdapat hubungan yang sangat besar antara pola istirahat tidur dengan hipertensi pada lansia di Panti Welas Asih Singaparna Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2020 dengan nilai p 0,000.	Penelitian ini berfokus pada lansia panti jompo sedangkan dalam penelitian ini usia produktif yang masih kerja sebagai security di kampus UIN Alauddin Makassar dan desain penelitian yang berbeda dimana penelitian ini menggunakan deskriptif korelasional sedangkan penelitian saya menggunakan kuantitatif observasional analitik

6	<p>Hubungan Kualitas Tidur dan Pola Makan (<i>diet dash</i>) dengan Kejadianpenyakit Hipertensi pada Usia Dewasa Muda di Puskesmas simbarwarin gin kecamatan trimurjo kabupaten Lampung tengah provinsi lampung (2021)</p>	<p>Shelly novitri,Toni Prasetya,Ika artini</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dan pola makan (<i>diet dash</i>) dengan kejadian penyakit hipertensi pada usia dewasa muda di Puskesmas Simbarwarin gin kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, provinsi lampung</p>	<p>Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah Teknik pengujian ini sampel pada penelitian menggunakan <i>accidental sampling</i> pada responden di Puskesmas Simbarwarin gin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, provinsi lampung</p>	<p>maka hasilnya dapat dianggap bahwa sebagian besar desain lainnya responden <8 jam ke atas sebanyak 35 orang (60,3%), sebagian besar pola makan tidak sesuai sebanyak 39 orang (67,2%), dan sebagian besar responden memiliki hipertensi derajat 1 ke atas sebanyak 37 orang (63,8%)</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pola makan pada asien hipertensi sedangkan penenltian berfkous pada pola tidur dengan risiko kejadian hipertensi</p>
7	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pijorkoling Kecamatan Padangsidim puan Tenggara Kota Padangsidim puan (2021)</p>	<p>Seri hafni, razia begum suroyo, jitasari tarigan sibero, zuraidah nasution, mayang wulan.</p>	<p>Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Pijorkoling Kecamatan Padangsidim puan Tenggara Kota</p>	<p>menggunakan metode campuran (<i>Mixed Method</i>), yaitu metode yang memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam hal metodologi (seperti dalam tahap pengumpulan data), dan kajian model</p>	<p>Hasil penetian ini adalah Tidak ada pengaruh antara orientasi, riwayat keturunan/hipertensi, kebiasaan merokok, penyakit penyerta (diabetes mellitus), kelebihan berat badan, terhadap</p>	<p>Dalam penelitian ini mencari faktor faktor kejadian hipertensi sedangkan penelitian ini berfokus pada hubungan pola tidur dengan kejadian hipertensi pada security di kampus UIN Alauddin Makassar.</p>

			Padangsidimpuan.	campuran memadukan dua pendekatan dalam semua tahapan proses penelitian.	kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan. Ada pengaruh antara penggunaan makanan pedas 1 kali/hari, kecenderungan praktik, dan pola istirahat terhadap kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Pijorkoling Kecamatan Padang Sidimpuan Kota Padangsidim	
--	--	--	------------------	--	---	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada *Security* Di Kampus UIN Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a) Diketuinya kualitas tidur pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.
- b) Diketuinya tekanan darah pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.
- c) Diketuinya hubungan kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada *Security* di kampus UIN Alauddin Makassar.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti Meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dalam melaksanakan penelitian yang sejenis.

2. Bagi Institusi

- a. Sebagai bahan penambahan karya ilmiah pada bagian ilmu kesehatan.
- b. Menambah informasi dan wawasan keperawatan tentang risiko kejadian hipertensi.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber informasi dan motivasi bagi para warga terkhusus bagi pelajar untuk menurunkan mengatasi risiko kejadian hipertensi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hipertensi

1. Definisi Hipertensi

Tekanan darah adalah kekuatan atau tekanan peredaran (sirkulasi) darah yang diberikan terhadap dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung (pembuluh arteri) ke seluruh tubuh. Tekanan darah adalah penekanan pada darah secara paksa yang ditujukan untuk melawan dari dinding pembuluh. Oleh karena itu di katakan hipertensi karena kondisi peredaran darah terlalu tinggi (AHA, 2016).

Hipertensi merupakan perumpamaan dari tekanan yang berlebihan bagi darah untuk melewati dinding pembuluh darah(AHA, 2016). Hipertensi adalah suatu keadaan yang dialami oleh seorang pasien dengan peningkatan tekanan darah di atas ambang normal, baik tekanan darah sistolik maupun diastolik. Di Indonesia, hipertensi merupakan penyebab kematian ketiga setelah stroke,dan tuberchulosis (Ayukhaliza, 2020).

Yang dimaksud hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam kondisi cukup istirahat/tenang. meningkatnya tekanan darah yang berlangsung dalam jangka waktu lama (persisten) dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal (gagal ginjal), jantung (penyakit jantung koroner) dan otak (menyebabkan stroke) jika tidak dikenali sejak dini dan mendapatkan penanganan yang baik. Banyak

penderita hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus bertambah. Untuk itu, diperlukan dukungan semua pihak, baik dari spesialis dari berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, maupun daerah setempat diperlukan agar hipertensi dapat dikendalikan (Kemenkes RI, 2019).

2. Fisiologi Tekanan Darah

Dua penentu mendasar tekanan darah pembuluh darah rata-rata adalah curah jantung dan resistensi perifer total. Curah jantung merupakan volume darah yang dipompa oleh tiap ventrikel per menit dan dipengaruhi oleh volume sekuncup (volume darah yang dipompa oleh setiap ventrikel psetiap detik) dan frekuensi jantung. Resistensi merupakan ukuran hambatan terhadap aliran darah melalui suatu pembuluh yang ditimbulkan oleh friksi antara cairan yang mengalir dan dinding pembuluh darah yang stationer. Resistensi bergantung pada tiga faktor yaitu, viskositas (kekentalan) darah, panjang pembuluh, dan jari-jari pembuluh. Tekanan arteri rata-rata secara terus menerus diperiksa oleh baroreseptor yang diperantarai secara otonom dan mempengaruhi jantung dan pembuluh darah untuk menyesuaikan curah jantung dan resistensi perifer total untuk mengembalikan tekanan peredaran darah ke normal. Reseptor terpenting yang berperan dalam yang konsisten adalah sinus karotikus dan baroreseptor aorta (Inun M, 2016).

3. Etiologi Hipertensi

Adapun klasifikasi hipertensi, yakni:

- a. Hipertensi Primer/Hipertensi Esensial

Hipertensi dengan penyebab tidak diketahui (idiopatik), meskipun dikaitkan dengan kombinasi faktor gaya hidup seperti kurang bergerak (inaktivitas) dan diet makan. Terjadi pada sekitar 90% pasien dengan hipertensi.

b. Hipertensi Sekunder/Hipertensi Non Esensial

Hipertensi dengan penyebab diketahui. Pada sekitar 5-10% penderita hipertensi, penyebabnya adalah penyakit ginjal. Pada sekitar 1-2%, pengaruhnya adalah masalah hormonal atau memakai obat-obat tertentu (misalnya pil Kontrasepsi) (Kemenkes RI, 2015).

Bagi kebanyakan besar pasien dengan hipertensi, alasannya belum diketahui. Ini diklasifikasikan sebagai hipertensi primer atau esensial. Sebagian kecil pasien memiliki penyebab spesifik darah tinggi yang diklasifikasikan sebagai hipertensi sekunder. Lebih dari 90% pasien dengan hipertensi memiliki esensial. Hipertensi esensial tidak dapat dipulihkan, namun dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat (perubahan gaya hidup dan penggunaan resep obat-obatan). Faktor hereditas mungkin berperan penting dalam peningkatan hipertensi primer/esensial. Hipertensi akan berkembang secara perlahan di tahun-tahun berikutnya. Dibawah dari 10% pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder disebabkan oleh kondisi penyakit atau obat-obatan. Mengendalikan kondisi medis yang mendasarinya. Penyebab hipertensi sekunder paling umum, hipertensi dikaitkan dengan masalah penyakit ginjal seperti ginjal kronis (PGK) (CDC, 2020).

4. Patofisiologi Hipertensi

Sebab terjadinya hipertensi dapat dilihat dari tekanan darah arteri sistemik yang adalah hasil perkalian total resistensi/ tahanan perifer dengan curah jantung (cardiac output). Hasil Cardiac Output didapatkan melalui perkalian antara stroke volume (volume darah yang dipompa dari ventrikel jantung) dengan heart rate (denyut jantung). Isi sekuncup jantung sendiri dipengaruhi oleh preload, afterload, dan kontraktilitas miokardium (Muh Anwar, 2015).

Preload merupakan derajat peregangan serabut miokardium segera sebelum kontraksi. Peregangan serabut miokardium bergantung pada volume darah yang meregangkan ventrikel pada akhir-diastolik. Aliran balik darah vena ke jantung menentukan volume akhir diastolik ventrikel. Mengalami Peningkatan aliran balik vena meningkatkan volume akhir-diastolik ventrikel, yang kemudian memperkuat peregangan serabut miokardium. Mekanisme Frank-Starling menyatakan bahwa dalam batas fisiologis, apabila semakin besar peregangan serabut miokardium pada akhir-diastolik, maka semakin besar kekuatan kontraksi pada saat diastolik (Muh Anwar, 2015).

Afterload dapat didefinisikan sebagai tegangan serabut miokardium yang harus terbentuk untuk kontraksi dan pemompaan darah. Faktor-faktor yang mempengaruhi afterload dapat dijelaskan dalam versi sederhana persamaan Laplace yang menunjukkan bila tekanan intraventrikel meningkat, maka akan terjadi peningkatan tegangan dinding ventrikel. Persamaan ini juga menunjukkan hubungan timbal balik antara tegangan dinding dengan ketebalan dinding

ventrikel, tegangan dinding ventrikel menurun bila ketebalan dinding ventrikel meningkat.

Kontraktilitas adalah penentu ketiga pada volume sekuncup. Kontraktilitas merupakan perubahan kekuatan kontraksi yang terbentuk tanpa tergantung pada perubahan panjang serabut miokardium. Peningkatan kontraktilitas merupakan hasil intensifikasi hubungan jembatan penghubung pada sarkomer.

Hipertensi juga dimulai dengan atherosclerosis dan gangguan struktur anatomi pembuluh darah peripher yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah. Kekakuan pembuluh darah disertai dengan penyempitan dan kemungkinan pembesaran plaque yang menghambat gangguan peredaran darah peripher. Kekakuan dan kelambanan aliran darah menyebabkan beban jantung bertambah berat yang akhirnya dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang akhirnya memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam system sirkulasi darah (Bustan M.N, 2016).

5. Manifestasi Klinis Hipertensi

Hipertensi sulit dideteksi oleh seseorang sebab hipertensi tidak memiliki tanda/ gejala khusus. Gejala-gejala yang mudah untuk diamati seperti terjadi pada gejala ringan yaitu pusing atau sakit kepala, cemas, wajah tampak kemerahan, tengkuk terasa pegal, telinga berdengung, sulit tidur, sesak napas, rasa berat di tengkuk, mudah lelah, mata berkunang-kunang, mimisan (keluar darah di hidung dan cepat marah (emosional) (Ignatavicus, 2017). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضِّ

Terjemahnya:

Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) dengan (selalu mengalahkan lawannya dalam) pergulatan (perkelahian), tetapi tidak lain orang kuat (yang sebenarnya) adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah” (HR Al-Bukhari) (Imam An-nawawi, 2010).

Selain itu, hipertensi memiliki tanda klinis yang dapat terjadi, diantaranya adalah (Smeltzer S.C, 2015):

- a) Pemeriksaan fisik dapat mendeteksi bahwa tidak ada abnormalitas lain selain tekanan darah tinggi.
- b) Perubahan yang terjadi pada retina disertai hemoragi, eksudat, penyempitan arteriol, dan bintik katun-wol (cotton-wool spots) (infarksi kecil), dan papiledema bisa terlihat pada penderita hipertensi berat.
- c) Gejala biasanya mengindikasikan kerusakan vaskular yang saling berhubungan dengan sistem organ yang dialiri pembuluh darah yang terganggu.
- d) Dampak yang sering terjadi yaitu penyakit arteri koroner dengan angina atau infark miokardium.
- e) Terjadi Hipertrofi ventrikel kiri dan selanjutnya akan terjadi gagal jantung.
- f) Perubahan patologis bisa terjadi di ginjal (nokturia, peningkatan BUN, serta kadar kreatinin).
- g) Terjadi gangguan serebrovaskular (stroke atau serangan iskemik transien [TIA] yaitu perubahan yang terjadi pada penglihatan atau kemampuan

bicara, pening, kelemahan, jatuh mendadak atau hemiplegia transien atau permanen (Smeltzer S.C, 2015).

6. Faktor-Faktor Risiko Hipertensi

a. Faktor Risiko Hipertensi yang Tidak Dapat Dimodifikasi/ tida dirubah :

1) Usia

Semakin bertambah usia seseorang, maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk menderita hipertensi. Seiring, bertambahnya usia, pembuluh darah secara bertahap terus kehilangan elastisitasnya sehingga mampu memicu pada peningkatan tekanan darah (AHA), 2016). Terdapat satu gejala yang khas pada tekanan darah seiring bertambahnya usia karena risiko hipertensi menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, kebutuhan perawatan hipertensi kepada orang yang lebih tua juga berbeda. Salah satu studi menunjukkan prevalensi hipertensi pada orang dewasa di Afrika sekitar dua hingga empat kali lebih banyak dari pada orang remaja (Weber, 2019).

2) Jenis Kelamin

Secara klinis tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari tekanan darah pada anak laki-laki dan perempuan. Setelah pubertas pria cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi. Setelah menopause, wanita cenderung memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan pria dengan usia yang sama (Potter, P.A & Perry, 2010).

3) Riwayat Keluarga

Individu yang memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, beresiko tinggi terkena penyakit hipertensi. Faktor genetik ini tidak dapat dikontrol, jika memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi. Jika orang tua atau kerabat dekat memiliki tekanan darah tinggi, risiko menderita hipertensi semakin meningkat (AHA, 2016).

Salah satu penelitian di wilayah Miyun, China menunjukkan bahwa seseorang dengan riwayat keluarga hipertensi empat kali lebih berisiko mendorong hipertensi (Liu et al., 2015). Riwayat klinis keluarga juga menyediakan informasi mengenai risiko kondisi langka yang disebabkan adanya mutasi gen (NIH, 2020).

4) Etnis

Ada perbedaan tekanan darah pada orang yang kulit hitam dan kulit putih. Peningkatan hipertensi antara orang yang berkulit hitam belum diketahui penyebabnya, tetapi peningkatan tersebut terkait dengan dikaitkan dengan kadar renin yang lebih rendah, sensitivitas yang lebih berperan terhadap vasopressin, asupan garam yang tinggi, dan tingginya stress lingkungan (M.Black Joyco, 2014).

b. Faktor Resiko Hipertensi dapat dimodifikasi/ Yang Dapat Dirubah :

1) Stress

Stress merupakan kondisi yang paling sering dialami oleh setiap orang. Stress meningkatkan resistensi vaskuler perifer dan hasil kardiovaskular serta menstimulasi aktivitas system saraf simpatis. Pada

saat stres, tubuh akan merasakan ketidaknyamanan emosional. Ketika stress, tubuh merespon dengan melepaskan hormon kortisol dan adrenalin ke dalam darah. Kemudian, sebuah respons psikopatologis, “melawan atau lari (*figh or fligh*)” di prakarsai dalam tubuh. (M.Black Joyco, 2014)

2) Diabetes

Diabetes mampu mempercepat aterosklerosis dan menyebabkan hipertensi karena kerusakan pada pembuluh darah (Elsevier,2014). Diabetes dapat menyebabkan tertumpuknya gula di dalam darah sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah yang akan berujung pada risiko penyakit jantung (CDC,2020). Resistensi insulin adalah salah satu alasan paling umum untuk hipertensi pada pasien diabetes.(CDC, 2020)

3) Obesitas

Obesitas atau kelebihan berat badan adalah masalah malnutrisi yang sangat sering didapat di beberapa negara berkembang. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa obesitas berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (Dua et al., 2014). Obesitas bisa menyebabkan beberapa mekanisme dalam tubuh yang berkontribusi dalam peningkatan tekanan darah. Mekanisme tersebut adalah dislipidemia dan aterosklerosis kelebihan berat badan mampu memberikan beban besar pada jantung serta sistem peredaran darah yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Hal ini juga dapat terjadi peningkatan risiko terjadinya hipertensi. (AHA, 2016)

4) Konsumsi Natrium (Sodium)

Salah satu variabel penting yang diperlukan tubuh adalah natrium (sodium). Natrium adalah nutrisi esensial yang diperlukan untuk mengimangi plasma darah, keseimbangan asam basa, transmisi saraf impuls dan normalisasi fungsi sel (Prihatini S, 2016). Kelebihan Natrium berkaitan dengan peningkatan tekanan darah. Penyalur utama konsumsi sodium sangat bergantung pada budaya dan kebiasaan konsumsi pangan di masyarakat. WHO menyarankan konsumsi natrium untuk orang dewasa dengan batas dua gram/hari (setara dengan lima gram garam setiap hari). Penggunaan natrium yang tinggi dan peningkatan tekanan darah berkaitan dengan penyimpanan air dalam tubuh, perlawanan sistem perifer, perubahan gerakan simpatetik serta modulasi saraf autonom dan sistem peredaran darah (Andera Grillo, 2019).

5) Merokok

Salah satu variabel penyebab risiko hipertensi yaitu merokok. Merokok bisa membahayakan pembuluh darah serta menyebabkan menebal dan berkembang lebih sempit/kecil. Hal ini juga membuat jantung menjadi berdetak lebih cepat dan meningkatkan tekanan darah (CDC, 2018). Tercatat lebih dari 5000 komponen bahan senyawa kimia dalam rokok. Banyak di antaranya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Seperti karbon monoksida dan nikotin dalam rokok. Karbon monoksida adalah gas tidak aman yang dihirup saat merokok. Gas karbon monoksida masuk ke dalam paru-paru dan dipindahkan ke sistem sirkulasi. Karbon monoksida

dapat mengurangi berapa banyak oksigen dalam sel darah merah. Ini juga meningkatkan jumlah kolesterol yang disimpan di lapisan arteri. Semakin lama, arteri semakin mengeras dan menyebabkan hipertensi. (AHA), 2016)

6) Mengonsumsi Minuman Alkohol Berlebih

Minum alkohol yang berlebihan berpotensi meningkatkan tekanan peredaran darah secara drastis. Minuman keras (Alkohol) dapat menyebabkan dampak yang sama dengan karbon dioksida yang keduanya dapat meningkatkan keasaman darah menjadi kental serta jantung dipaksa untuk memompa. Tidak hanya itu, minum alkohol dapat mempengaruhi pada perkembangan produksi hormon kortisol dalam darah sehingga pergerakan rennin-angiotensin aldosteron system (RAAS) mengalami peningkatan dan membuat tekanan darah meningkat. (Jayanti I , Wiradnyani NK, 2017)

7) Aktivitas Fisik

Pada saat seseorang tidak melakukan pergerakan fisik yang cukup sebagai pelengkap dari gaya hidupnya akan meningkatkan tekanan darah tinggi. Aktivitas fisik yang tepat sangat baik untuk kesehatan jantung dan sistem peredaran darah (AHA), 2016). Latihan fisik didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara terencana dan teratur seperti berlari, berjalan kaki, push up, peregangan, ekstensi, dan lain-lain. Olahraga memiliki arti berupa pergerakan fisik yang terstruktur dan terencana mengikuti regulasi yang berlaku. Ini tidak hanya direncanakan untuk alasan kesehatan tetapi

untuk memperoleh prestasi. Contoh adalah sepak bola, bulu tangkis, basket-ball, renang dan lain-lain (Kemenkes RI, 2015).

8) Kualitas Tidur

Tekanan darah dapat terjadi karena beberapa faktor risiko yaitu keturunan keluarga, kebiasaan hidup yang buruk, pola makan yang kurang baik dan waktu atau kualitas tidur yang buruk. Dalam kondisi gangguan tidur, tubuh cenderung memiliki tingkat metabolisme yang tinggi, sehingga membutuhkan begitu banyak glukosa sebagai bahan bakar pembentuk energi. Kortisol mengakomodasi kebutuhan glukosa yang meningkat. Tekanan darah dan denyut kardiovaskular biasanya menunjukkan beragam diurnal. Selama tidur, nokturnal dip terjadi di kedua tekanan darah dan detak jantung, yang tetap rendah hingga bangun.

Gangguan tidur dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan peningkatan rata-rata tekanan darah dalam rentang waktu 24 jam. Dengan cara ini, kebiasaan pembatasan tidur dapat menyebabkan peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis yang berkepanjangan. Kualitas tidur yang buruk dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas simpatis dan peningkatan rata-rata tekanan darah dan heart rate selama 24 jam. Oleh karena itu, kebiasaan batasan tidur yang mengakibatkan gangguan tidur, dan dapat menyebabkan peningkatan gerakan sistem saraf simpatik yang berkepanjangan (Gangwsich Al, 2015).

9) Komplikasi

Hipertensi dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi antara lain kerusakan jantung dan stroke, dan gagal ginjal (Triyanto, 2014).

7. Klasifikasi Tekanan Darah

Berdasarkan petunjuk hipertensi American College of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) tahun 2017, tekanan darah dikelompokkan menjadi normal, meningkat (elevated), hipertensi stadium 1 dan 2. Klasifikasi hipertensi stadium 1 diubah dari sebelumnya karena data risiko penyakit jantung dengan sistol/diastol, perubahan gaya hidup untuk menurunkan tekanan darah, dan studi acak terkontrol mengenai obat-obatan antihipertensi. Risiko penyakit jantung meningkat progresif pada tekanan darah 130-139/85-89 mmHg dibandingkan dengan <120/80 mmHg.4 Indonesia sampai saat ini masih mengacu pada kriteria hipertensi dari Joint National Committee (JNC) VII. Berdasarkan petunjuk hipertensi JNC VII tahun 2003, tekanan darah diklasifikasikan menjadi tidak hipertensi atau normal, prehipertensi, hipertensi stadium 1 dan 2. (Adrian dan Tommy, 2019).

Pengelompokan tekanan darah pada orang dewasa (18 tahun dan lebih tua) didasarkan pada rata-rata dua atau lebih yang diukur dengan benar. Jika tekanan darah sistolik dan nilai tekanan darah diastolik jatuh ke dalam kategori yang berbeda, klasifikasi keseluruhan ditentukan berdasarkan pada lebih tinggi dari dua tekanan darah. Tekanan darahnya diklasifikasikan menjadi satu dari empat kategori: normal, prehipertensi, hipertensi tahap 1 dan hipertensi tahap 2. Prehipertensi tidak dianggap penyakit, tetapi mengidentifikasi mereka yang

cenderung berkembang ke tahap 1 atau tahap 2 hipertensi di masa depan. (JNC 8, 2015)

Tabel klasifikasi data tabel Tekanan Darah sistolik dan diastolik :

Klasifikasi Tekanan Darah	Tekanan Darah Sistolik (mmHg)	Tekanan Darah Diastolik (mmHg)
Normal	<120	Dan <80
Prehipertensi	130-139	Atau 80-89
Hipertensi tingkat 1	140-159	Atau 90-99
Hipertensi tingkat 2	≥ 160	Atau ≥ 100

(Klasifikasi hipertensi menurut JNC VIII Sumber : (*American Heart Association* (AHA), 2016)

8. Lokasi Pemeriksaan Tekanan Darah

Pemeriksaan tekanan darah umumnya pada lengan tangan dengan menggunakan jalur arteri brakhialis dan stetoskop standar. Penilaian tekanan darah pada paha dengan menggunakan arteri popliteal biasanya diindikasikan pada situasi di bawah ini: (Audrey, Berman dkk. 2009).

- a. Tekanan darah tidak dapat diukur pada kedua lengan (misalnya, karena luka bakar, trauma atau mastektomi bilateral).
- b. Tekanan darah disatu sisi paha harus dibandingkan dengan paha di sisi lainnya.
- c. Manset tekanan darah terlalu lebar untuk eksremitas atas.

9. Metode Pengukuran Tekanan Darah

Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Metode Palpasi (Metode, Riva Rocci)

Manset dipasang ketat dan sempurna pada lengan atas. Saluran karet dari manset kemudian dihubungkan dengan manometer. Sekarang rabah arteri radialis pada pergelangan tangan dan naikkan tekanan dalam manset dengan memompa sampai denyut nadi (arteri radialis) tidak teraba lagi. Tekanan dalam manset kemudian diturunkan secara perlahan-lahan dengan memutar tombol pada pompa dengan kecepatan kira-kira 3 mm/ detik. Saat dimana denyut arteri radialis teraba kembali menunjukkan tekanan darah sistolik. Metode palpasi harus dilakukan sebelum melakukan metode auskultasi untuk menentukan tinggi tekanan yang normal.

b. Metode Auskultasi

Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang spesialis Rusia yaitu Korotkoff pada tahun 1905. Tekanan darah sistolik dan diastolik dapat diukur dengan metode ini yaitu dengan mendengar (mengauskultasi) bunyi yang timbul pada arteri brakhialis yang disebut suara korotkoff. Suara ini timbul disebabkan timbulnya aliran dalam arteri yang disebabkan oleh penekanan manset pada arteri tersebut. Dalam cara auskultasi ini, harus diperhatikan jarak antara manset dan tempat meletakkan stetoskop, paling kurang 5 cm. Pertama-tama sentuh arteri brakhialis untuk mengetahui dimana harus meletakkan stetoskop, kemudian pompa manset sehingga tekanannya melebihi tekanan sistolik (yang telah diketahui dari metode palpasi). Turunkan tekanan manset perlahan-lahan sambil meletakkan stetoskop di atas arteri brakhialis pada siku. Mula-mula tidak terdengar bunyi kemudian akan terdengar bunyi mengetuk yaitu ketika darah mulai melewati arteri yang tertekan oleh manset sehingga terjadilah turbulensi.

Suara yang terdengar disebut bunyi korotkoff dan dapat dibagi dalam lima tahap yang tertentu:

Tahap I : timbulnya dengan tiba-tiba suatu bunyi mengetuk yang jelas dan makin lama makin keras sewaktu tekanan menurun 10-14 mmHg berikutnya, ini disebut juga nada letupan.

Tahap II : bunyi berubah kualitasnya menjadi bising selama penurunan tekanan 15-20 mmHg.

Tahap III: bunyi sedikit berubah dalam kualitas tetapi menjadi lebih jelas tekanan 5-7 mmHg berikutnya.

Tahap IV: bunyi (melemah) selama penurunan 5-6 mmHg berikutnya. Setelah itu bunyi menghilang.

Tahap V : dimana suaranya menghilang.

Awal tahap I adalah dimana bunyi pertama terdengar merupakan tekanan sistolik. Permulaan tahap IV atau V merupakan tekanan diastolik, dengan perbedaan sebagai berikut : tahap IV terjadi pada tekanan 7-10 mmHg lebih tinggi daripada tekanan diastolik intra-pembuluh darah yang diukur secara langsung. Tahap V terjadi pada tekanan yang sangat mendekati tekanan diastolik intra-pembuluh darah pada keadaan istirahat. (Mukhlis, 2018)

10. Cara Pengukuran Tekanan Darah

Tekanan darah arteri dapat diukur secara langsung (invasif) dan tidak langsung (tidak invasif). Metode non-invasif adalah metode yang paling sering dilakukan. Metode ini memerlukan spigmomanometer jarum dan stetoskop. Pengukuran tekanan darah secara tidak langsung dengan menggunakan auskultasi

dan palpasi, auskultasi merupakan teknik yang paling sering dilakukan. Langkah-langkah mengukur tekanan darah menurut (Potter, P.A & Perry, 2010), sebagai berikut :

- a) Kaji tempat yang terbaik untuk mengukur tekanan darah.
- b) Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan antara lain, spigmomanometer aneroid, stetoskop, pena serta lembar catatan tanda vital atau formulir pencatatan.
- c) Mengatur posisi klien duduk atau berbaring dan menjelaskan prosedur kepada klien.
- d) Menggulung lengan baju klien pada bagian atas lengan. Mempalpasi arteri brachial. Meletakkan manset 2,5-3 cm di atas nadi brachial (ruang antekubital). Dengan manset masih kempis, pasang manset dengan rata dan pas disekeliling lengan atas memastikan bahwa manometer diposisikan secara vertikal sejajar mata. Pengamat tidak boleh lebih jauh dari 1 m.
- e) Palpasi arteri radialis atau brakialis dengan ujung jari dari satu tangan sambil mengembungkan manset dengan cepat sampai tekanan 30 mmHg di atas titik dimana denyut nadi tidak teraba. Dengan perlahan keluarkan angin manset dan catat titik dimana denyut nadi muncul lagi. Mengempiskan manset dan tunggu selama 30 menit.
- f) Meletakkan *earpieces* stetoskop pada telinga dan pastikan bunyi jelas, tidak *muffed*. Mengetahui lokasi arteri brakhialis dan letakkan bel atau

diafragma *chestpiece* di atasnya. Usahakan untuk tidak membiarkan *chestpiece* menyentuh lengan baju atau pakaian klien.

- g) Kembangkan manset 30 mmHg di atas tekanan sistolik yang dirabah. Dengan perlahan lepaskan dan biarkan jarum turun dengan kecepatan 2 sampai 3 mmHg per-detik.
- h) Catat titik pada manometer saat suara jelas yang pertama terdengar sebagai tekanan sistolik. Lanjutkan mengempiskan manset, catat titik pada manometer sampai 2 mmHg terdekat dimana bunyi tersebut hilang sebagai tekanan diastolik.
- i) Bantu klien untuk kembali keposisi yang sesuai kenyamanannya dan menutup kembali lengan atas.

B. Tinjauan Umum Kualitas Tidur

1. Definisi Tidur

Istirahat/Tidur merupakan kondisi tidak sadar yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya aktivitas yang kecil, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi penurunan respons terhadap rangsangan dari luar. Tidur adalah suatu keadaan berulang, teratur, mudah reversibel yang ditandai dengan kondisi relatif tidak bergerak dan tingginya peningkatan ambang respon terhadap stimulus eksternal dibandingkan dengan keadaan sadar (Sadock, 2014).

Tidur dapat dikatakan istirahat adalah suatu keadaan tidak sadar yakni individu dapat dibangunkan oleh sesuatu atau sensoris yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang, dengan ciri adanya kegiatan yang minim, memiliki kesadaran yang beragam, terdapat perubahan fisiologis dan terjadi berkurangnya respons terhadap rangsangan dari luar (Hidayat, 2015).

Dalam Al-Qur'an juga di jelaskan tentang diciptakannya malam untuk istirahat yaitu dalam QS al-Qaṣaṣ/28: 73.

وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

dan adalah karena rahmat-nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-nya (Kemenag RI, 2022).

Berdasarkan tafsir dari kementerian agama RI dikatakan bahwa adalah karena rahmat-nya yang mencakup segala sesuatu, Dia jadikan untukmu malam dan siang secara bergantian. Dengan keduanya Allah menganugerahkan kepada kamu banyak manfaat. Dia menjadikan malam gelap gulita agar kamu beristirahat pada malam hari setelah sepanjang hari kamu bekerja sehingga memerlukan istirahat. dan Dia jadikan siang terang benderang agar kamu bersungguh-sungguh mencari sebagian karunia-nya pada siang hari yang terang itu, dan juga agar kamu bersyukur kepada-nya atas segala nikmat yang dianugerahkan-nya kepadamu (Kemenag RI, 2022).

2. Fisiologi Tidur

Pengaturan pusat/inti aktivitas kesiapan dan tidur terletak dalam mesencephalon dan dibagian pons. Selain itu, *reticular activating system* (RAS) dapat memberikan rangsangan visual, pendengaran nyeri dan perabaan juga dapat menerima stimulasi dari korteks serebri termasuk rangsangan emosi dan proses pikir. Dalam keadaan sadar, neuron dalam RAS akan melepaskan katekolamin seperti norepinefrin. Saat tidur, ini mungkin disebabkan adanya pelepasan serum serotonin dari sel-sel khusus yang terletak di pons dan batang otak tengah, yakni *bulbar synchronizing regional* (BSR), sedangkan bangun bergantung pada keseimbangan implus yang diterima oleh pusat otak dan sistem limbik. (Hidayat, 2015)

Keadaan jaga atau bangun sangat dipengaruhi oleh sistem Ascending Reticular Activity System (ARAS). Bila aktivitas ARAS ini meningkat orang tersebut dalam keadaan sadar. Aktivitas ARAS menurun, orang tersebut akan dalam keadaan tidur. Aktivitas ARAS ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter seperti sistem serotoninergik, noradrenergic, dan kolinergik. (Czeisler C, 2013)

3. Tahapan Tidur

Sejak adanya alat EEG (*Electroencephalograph*), maka aktivitas-aktivitas di dalam otak dapat direkam dalam suatu grafik. Alat ini juga dapat memperlihatkan fluktuasi energi (gelombang otak) pada kertas grafik. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan bantuan alat *elektroensefalogram* (EEG), *elektro-okulogram* (EOG), dan *elektromiogram* (EMG) diketahui ada dua fase tidur, yaitu gerakan mata tidak cepat (*non-rapid eye movement-NREM*) dan gerakan mata cepat (*rapid eye movement-REM*). (Kozier, 2013)

1. Tidur REM (Rapid Eye Movement-REM)

Tidur REM biasanya kembali terjadi sekitar setiap 90 menit dan berlangsung selama 5 sampai 30 menit. Tidur REM tidak setenang tidur NREM dan mimpi paling sering terjadi selama tidur REM. (Kozier, 2013)

2. Tidur NREM (Non-Rapid Eye Movement-NREM)

Tidur NREM juga disebut sebagai tidur gelombang lambat karena gelombang otak orang yang sedang tidur lebih lambat dibandingkan gelombang alfa dan beta orang yang sedang bangun atau terjaga (Kozier, 2013). Tidur NREM terbagi atas menjadi empat tahap :

- a) Tahap satu : Tahap tidur yang sangat ringan.
- b) Tahap dua : Tahap tidur ringan dan selama tahap ini proses tubuh terus menerus menurun.
- c) Tahap tiga : Denyut jantung dan frekuensi pernapasan, serta tubuh lain, terus menurun karena dominasi sistem saraf parasimpatik. Seseorang yang tidur menjadi lebih sulit bangun
- d) Tahap empat : Menandai tidur yang dalam, disebut tidur delta. Denyut jantung dan frekuensi pernapasan orang yang tidur menurun sebesar 20% sampai 30% dibandingkan denyut jantung dan frekuensi pernapasan selama terjaga (Kozier, 2013).

4. Siklus Tidur

Selama tidur individu, melalui fase tidur NREM dan REM, siklus komplet biasanya berlangsung sekitar 1,5 jam pada orang dewasa. Dalam siklus tidur pertama, orang yang tidur melalui ketiga tahap pertama tidur NREM dalam total waktu 20 sampai 30 menit. Kemudian, tahap IV dapat berlangsung sekitar 30 menit. Setelah tahap IV NREM, tidur kembali ke tahap III dan II sekitar 20 menit. Setelah itu, terjadi tahap rem pertama, yang berlangsung sekitar 10 menit, melengkapi siklus tidur pertama. Orang tidur biasanya mengalami empat sampai enam siklus tidur selama 7-8 jam. Orang tidur yang dibangunkan di tahap manapun harus memulai tahap I tidur NREM yang baru dan berlanjut ke seluruh fase tidur REM (Kozier, 2013).

5. Fungsi Tidur

Fungsi dan tujuan tidur tidak diketahui secara jelas, tetapi diketahui bahwa tidur dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan mental, emosional, kesehatan, mengurangi stres pada paru, kardiovaskuler, endokrin, dan lainlainnya. Energi disimpan selama tidur, sehingga dapat diarahkan kembali pada fungsi seluler yang penting. Secara umum dapat dua efek fisiologis dari tidur yaitu pertama, efek pada sistem saraf yang diperkirakan dapat memulihkan kepekaan normal dan keseimbangan di antara berbagai susunan saraf dan dampak pada struktur tubuh dengan memulihkan kesegaran dan fungsi dalam organ tubuh karena selama tidur terjadi penurunan. (Hidayat, 2015). Ada beberapa fungsi dari tidur antara lain :

a) Memelihara Fungsi Jantung

Tidur adalah waktu atau periode perbaikan dan persiapan untuk periode jaga berikutnya. Selama istirahat NREM, fungsi biologis menurun. Laju denyut jantung normal pada orang dewasa sehat sepanjang hari rata-rata 70 hingga 80 denyut permenit atau lebih rendah jika individu berada pada denyut jantung kondisi fisik yang sempurna (Potter, P.A & Perry, 2012).

b) Pembaruan Sel

Istirahat diperlukan untuk memperbaiki proses biologis secara rutin. Selama tidur gelombang rendah dalam NREM tahap empat, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan manusia untuk memperbaiki dan memperbarui sel epitel dan khusus seperti otak. Peran hormon pertumbuhan yang umum sebagai suatu promotor sintesis protein adalah terbatas dikarenakan pelepasannya tidak

berhubungan dengan kadar glukosa darah dan asam amino. Penelitian lain menunjukkan bahwa sintesis protein dan pembagian sel untuk pembaharuan jaringan seperti pada kulit, sumsum tulang, mukosa lambung, atau otak terjadi selama istirahat dan tidur. Tidur NREM menjadi sangat penting terutama pada anak-anak yang mengalami lebih banyak fase tidur 4 (Potter & Perry, 2012).

c) Penyimpanan Energi

Menurut teori lain tentang kegunaan tidur adalah bahwa tubuh menyimpan energi selama istirahat. Otot rangka berelaksi secara progresif dan tidak adanya kontraksi otot menyimpan energi kimia untuk proses seluler. Tidur REM penting untuk pemulihan kognitif. Tidur REM dihubungkan dengan perubahan dalam aliran darah serebral, peningkatan aktivitas kortisol, peningkatan konsumsi oksigen dan pelepasan epinefrin. Hubungan ini dapat membantu pemeliharaan memori dan pembelajaran. Selama tidur, otak menyimpan informasi tentang aktivitas hari tersebut (Potter, P.A & Perry, 2012).

6. Hukum Tidur Menurut Islam

a. Tidur Sebelum Melaksanakan Shalat Isya

Anjuran ini bersifat antisipasif, jika anda tidur sebelum melaksanakan shalat isya dikhawatirkan akan berlanjut, akibatnya tidak menjalankan kewajiban itu akan mendapatkan dosa besar. selain anjuran untuk tetap melaksanakan shalat isya terlebih dahulu sebaiknya jangan terbiasa tidur terlalu malam, karena hal itu akan mengganggu kesehatan, daya tahan tubuh menjadi lemah, dan mengganggu keseimbangan sel-sel tubuh(Nor Kholis Raefani, 2014).

Diriwayatkan dari Abi Barzah, beliau berkata:

كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

Terjemahnya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum shalat ‘Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya.” (HR Bukhari)

Ibnu Baththal rahimahullah menjelaskan, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak suka begadang setelah shalat ‘Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan shalat malam dan khawatir jika sampai luput dari shalat shubuh berjama’ah. ‘Umar bin Al Khottob sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah shalat Isya, beliau mengatakan, “Apakah kalian sekarang begadang di awal malam, nanti di akhir malam tertidur lelap.” (Syarh al-Bukhari, Ibnu Baththal, 3:278).

b. Tidur Sesudah Subuh

Menurut Ibnu al-Qayyim, bagi orang-orang saleh sangat memakruhkan tidur pada waktu setelah melaksanakan shalat subuh, yakni antara waktu subuh dengan terbitnya matahari. Sebab waktu itu merupakan waktu yang memiliki keutamaan untuk melakukan aktivitas ibadah, menjadi waktu yang luar biasa untuk mencari sesuatu yang berguna dan meraih pahala dari Allah swt. Bagi orang-orang yang sholeh mereka selalu membiasakan diri untuk menahan kantuk dan melaksanakan aktivitas setelah menjalankan shalat subuh, walaupun sebelumnya, sepanjang malam mereka tidak tidur toleran untuk tidur hingga matahari terbit. karena bagi mereka itu adalah awal hari dan sekaligus jalan menuju kesuksesan(Nor Kholis Raefani, 2014).

c. Tidur di Sore Hari

Menurut Syekh Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, seorang ulama terkemuka yang juga peneliti muslim tersebut, penemuan tersebut menegaskan menguatkan tentang mempersoalkan kebiasaan tidur sore menjelang malam. Istirahat menjelang malam adalah tidur yang melinglungkan yang dimaksudkan Al-mawardi adalah keadaan yang tidak nyaman saat terbangun dari tidur sore, terutama berkaitan dengan kepala pusing, bingung tidak enak badan dan sebagainya, apabila waktu yang baik untuk tidur adalah di malam dan siang hari, maka diluar dua waktu itu, tidur tidak baik untuk dilakukan. Tidur di sore hari yaitu setelah ashar, hingga senja hari atau menjelang waktu maghrib bisa mempengaruhi seseorang, terutama pada akal nya (Nor Kholis Raefani, 2014).

Rasulullah saw. bersabda :

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Terjemahnya:

Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya; kesehatan dan waktu luang (HR Al-Bukhari) (Imam An-nawawi, 2010).

Hadits di atas mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga kesejahteraan kita, karena disadari atau tidak, kedua hal ini seringkali diabaikan. Menurut Ibn Al-Qayyim, menjaga kesehatan dengan cara terbaik untuk mengelola makanan dan minuman, penutup, ventilasi udara, waktu tidur, dan waktu istirahat.

7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Tidur

Kualitas dan kuantitas tidur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kualitas tersebut dapat menunjukkan adanya kemampuan individu untuk tidur dan memperoleh jumlah istirahat sesuai dengan kebutuhannya. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah sebagai berikut :

a. Penyakit

Suatu penyakit dapat mempengaruhi kebutuhan tidur seseorang. Banyak penyakit yang memperbesar kebutuhan untuk tidur, misalnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi (infeksi limpa) akan membutuhkan lebih banyak waktu tidur untuk kelelahan. Berbagai kondisi sakit juga membuat pasien kurang tidur, bahkan tidak bisa istirahat (Hidayat, 2015).

b. Umur

Umur merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi tidur dan kebutuhan tidur seseorang. Kebutuhan tidur berkurang seiring bertambahnya usia. Kebutuhan tidur anak-anak tidak sama dengan kebutuhan tidur orang dewasa. Kebutuhan tidur orang dewasa juga tidak sama dengan lanjut usia (Magfirah, 2017).

c. Keletihan

Keletihan karena aktivitas/gerakan yang tinggi dapat membutuhkan lebih banyak tidur untuk menjaga keseimbangan energi yang telah dikeluarkan. Hal tersebut terlihat pada seseorang yang telah melakukan kegiatan dan mencapai kelelahan. Maka, orang tersebut akan lebih cepat untuk dapat tidur karena tahap tidurnya dipersingkat (Hidayat A, 2015).

d. Stres Psikologis

Keadaan mental dapat terjadi pada seseorang akibat ketegangan jiwa. Hal ini terlihat ketika seseorang yang memiliki masalah psikologis/metal seperti masalah kegelisahan sehingga sulit untuk tidur (Hidayat A, 2015).

e. Kualitas tidur

Kebiasaan tidur pada siang hari mempengaruhi kualitas tidur seseorang di malam hari Pola-pola tidur siang berlebihan dapat mempengaruhi keterjagaan, kualitas tidur, penampilan kerja, kecelakaan saat mengemudi, dan masalah perilaku emosional (Magfirah, 2017).

f. Lingkungan

Lingkungan dapat meningkatkan atau menghalangi seseorang untuk tidur. Pada lingkungan bersih, suhu dingin, suasana yang tidak gaduh (tenang), dan penerangan yang tidak terlalu terang akan membuat seseorang tersebut tertidur dengan nyenyak, begitupun sebaliknya jika kotor, bersuhu panas, suasana yang ramai dan penerangan yang sangat terang, dapat mempengaruhi kualitas tidurnya (Magfirah, 2017).

g. Stimulus dan alkohol

Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman tertentu dapat merangsang Sistem Saraf Pusat (SSP) sehingga dapat mengganggu kebutuhan istirahat tidur. Sementara mengonsumsi minuman alkohol yang berlebihan dapat mengganggu siklus tidur REM (Magfirah, 2017).

h. Merokok

Nikotin yang terkandung dalam rokok memiliki efek merangsang pada tubuh. Oleh karena itu, perokok sering kali kesulitan untuk beristirahat tidur dan mudah terbangun di waktu malam hari (Magfirah, 2017).

8. Gangguan Tidur

Gangguan tidur dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Insomnia

Sulit tidur (Insomnia) adalah masalah gangguan tidur yang kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur pada waktu malam hari). Ini akan menjadi gangguan jangka pendek jika berakhir hanya dalam waktu beberapa malam, namun akan menjadi kronik jika sampai berbulan-bulan atau semakin lama. Insomnia sementara dapat disebabkan oleh stress, perasaan yang terlalu gembira, atau perubahan pola tidur selama melakukan perjalanan. Pola tidur akan kembali normal ketika rutinitas kegiatan kembali beraktivitas seperti biasa. Sulit tidur kronik mungkin disebabkan karena medikasi, perilaku atau masalah mental (Agustin D, 2017).

b) Hipersomnia

Hipersomnia merupakan kebalikan dari kesulitan untuk tidur (insomnia), yaitu terjadi kelebihan waktu istirahat tidur, terutama pada siang hari (Kozier, 2010). Hipersomnia dapat disebabkan oleh kondisi medis, seperti adanya kerusakan pada sistem saraf pusat, gangguan metabolik (asidosis diabetik dan hipotiroidisme). Seseorang tertidur selama 8-12 jam dan mengalami kesulitan

untuk bangun di pagi hari (dikenal sebagai tidur dengan keadaan mabuk/sakit kepala). (Agustin D, 2017)

c) Gangguan Irama Sirkadian

Menurut Craven dan Hirnle (2000), masalah gangguan tidur pada irama sirkadian terjadi karena tidak kesesuaian manajemen waktu tidur seseorang dengan pola normal tidur sirkadiannya. Seperti seorang individu tidak dapat tidur ketika orang tersebut berharap untuk ingin tidur, ataupun pada saat membutuhkan tidur. Sebaliknya, seseorang mengantuk di saat waktu yang tidak diinginkan. Tanda waktu biologis sirkadian ini dikendalikan oleh bagian otak yang disebut Suprachiasmatic Nucleus (SCN), yaitu sel pada hipotalamus yang merespon cahaya (terang) dan sinyal gelap (malam). Sinyal SCN akan dikirimkan ke bagian otak lain yang mengontrol hormon, suhu tubuh, dan fungsi lain yang berperan dalam proses mengantuk dan terjaga. Hormon yang paling penting terhadap ritme sirkadian yang memengaruhi tidur adalah hormon melatonin (menyebabkan rasa kantuk dan menurunkan suhu) dan kortisol (membentuk glukosa dan mengaktifkan anti dan antiinflamasi dalam tubuh). Jam Biologis Sirkadianstress Melatonin biasanya mulai diproduksi tubuh sekitar pukul 08.00-09.00 pada malam hari dan berhenti sekitar 07.00--08.00 pada pagi hari. Tingkat melatonin tertinggi terjadi pada tengah malam, sehingga pada periode ini seseorang biasanya mengalami istirahat *deep sleep* atau tahapan non-REM (Magfirah, 2017).

d) Deprivasi Tidur

Deprivasi tidur merupakan kurangnya tidur pada waktu tertentu atau waktu istirahat tidur yang tidak ideal. Kurang tidur dapat disebabkan oleh

penyakit, stress emosional, penggunaan obat, gangguan lingkungan dan keberagaman waktu tidur yang terkait dengan waktu kerja. Seorang individu yang bekerja dengan waktu kerja yang panjang dan jam kegiatan menjurus mengalami deprivasi tidur. Kurang tidur melibatkan berkurangnya kuantitas dan kualitas tidur dan tidak konsisten dengan waktu tidur. Ketika pola istirahat tidur mengalami masalah maka akan terjadi modifikasi ritme tidur normal (Gryglewska, 2015).

e) Parasomnia

Parasomnia adalah sebagai suatu kegiatan yang normal di saat seseorang sadar tetapi akan menjadi abnormal jika kegiatan tersebut muncul di saat seseorang sedang tertidur. Masalah istirahat tidur ini lebih umum terjadi pada anak-anak daripada orang dewasa, aktivitas tersebut meliputi somnambulisme (*sleepwalking*), terjaga malam, mimpi buruk, enuresis nocturnal (mengompol), dan gemeretak gigi (*Bruxsims*) (Gryglewska, 2015).

f) Sleep Apnea

Sleep apnea adalah suatu kondisi dimana seseorang akan berhenti bernapas dalam jangka waktu yang singkat selama istirahat atau tidur. Ada tiga tipe sleep apnea: obstruktif, sentral dan mixedcomplex. Apnea obstruktif disebabkan oleh jaringan halus yang berelaksasi, dimana membuat sebagian sampai seluruhnya tersumbat di saluran napas. Sindrom sleep apnea obstruktif merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi dan penyakit kardiovaskuler lainnya (Agustin D, 2017).

9. Kualitas Tidur

Kualitas tidur itu subjektif dan sering ditentukan oleh perasaan energik atau tidak setelah bangun tidur (Kozier, 2013). Kualitas tidur merupakan suatu kondisi yang dialami seseorang untuk mendapatkan kesegaran dan kesehatan saat terbangun dari istirahat tidurnya. Kebutuhan tidur seseorang dianggap baik apabila tidak menunjukkan gejala-gejala kurang tidur dan tidak mengalami masalah dalam istirahat tidurnya (Hidayat, 2015).

Menurut (Asmadi,2013) untuk mengetahui kualitas tidur dapat dilihat dari 7 komponen yakni :

a) Kualitas Tidur Subjektif

Penilaian subjektif diri sendiri terhadap kualitas tidur yang dimiliki, adanya perasaan terganggu dan tidak nyaman pada diri sendiri berperan terhadap evaluasi kualitas tidur.

b) Latensi Tidur

Beberapa banyak waktu yang dibutuhkan sehingga seseorang untuk tertidur, ini berkaitan dengan frekuensi tidur seseorang.

c) Efisiensi Tidur

Didapatkan melalui tingkat kebutuhan tidur manusia, dengan menilai jam tidur seseorang dan waktu tidur seseorang, lama tidur sehingga dapat disimpulkan apakah sudah tercukupi atau tidak.

d) Penggunaan Obat Tidur

Obat tidur istirahat dapat menunjukkan seberapa parah gangguan tidur yang dialami, karena penggunaan obat tidur di apabila orang tersebut sudah sangat terganggu pola tidurnya dan obat tidur dianggap perlu untuk membantu istirahat tidurnya.

e) Gangguan Tidur

Seperti adanya menngorok, gangguan pergerakan sering terganggu dan mimpi buruk dapat mempengaruhi proses tidur seseorang.

f) Durasi Tidur

Dilihat dari jam waktu mulai tidur sampai jam waktu terbangun, waktu tidur yang tidak terpenuhi akan menyebabkan kualitas istirahat tidur kurang baik.

g) Daytime

Dysfunction atau adanya gangguan pada kegiatan sehari-hari disebabkan oleh rasa kantuk.


10. Cara Pengukuran Kualitas Tidur

Beberapa hasil riset telah dilaksanakan untuk pengukuran kualitas tidur. Busyee et al. (1989) melakukan pengukuran kualitas tidur dengan memakai sebuah instrumen *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI). PSQI adalah instrumen yang berhasil/efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur. Instrumen PSQI dibuat berdasarkan pengukuran kualitas tidur responden dengan rentang tidur satu minggu terakhir. Aspek-aspek yang dinilai dalam bentuk pertanyaan dan masing-masing memiliki penilaian sesuai dengan prinsip standar baku. Validitas penelitian PSQI sudah dilakukan uji kebakuan instrumen.

Instrumen ini menghasilkan 7 skor yang sudah sesuai dengan ruang atau area yang disebutkan sebelumnya. Tiap komponen pertanyaanya nilainya berkisar antara 0 (tidak ada masalah) sampai 3 (masalah tinggi). Nilai setiap komponen kemudian dijumlahkan menjadi score dunia antara 0-21. Skor ≤ 5 = baik, >5 = buruk. PSQI memiliki konsistensi internal dan koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) 0,83 untuk 7 bagian pertanyaan.

C. Kerangka Teori

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat tentang Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada *Security* di kampus UIN Alauddin Makassar, serta kajian pustaka yang telah di paparkan, maka peneliti menentukan Kualitas tidur variabel bebas, dan hipertensi sebagai variabel terikat.




Bagan 2.1 kerangka Teori

Sumber : (AHA 2016, NIH, 2020, Elsevier 2014, Gangwisch 2015, Hidayat 2015)

D. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan landasan berfikir yang dikembangkan berdasarkan hipotesis yang ada. Kerangka konsep memberikan gambaran sederhana tentang landasan berfikir penelitian dengan menunjukkan variabel-variabel penelitian dan keterkaitan antara variabel (Sugiyono, 2018)


Kerangka konsep dari penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah Kualitas tidur pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar sedangkan variabel terikat dari penelitian ini adalah Hipertensi pada *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar.



Bagan 2.2 kerangka konsep

Keterangan :


 : Variabel Independen

 : Variabel Dependen

 : Variabel Perancu (Tidak di teliti)

 : Penghubung

E. Kerangka Kerja Penelitian



Kerangka Kerja Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada *Security* di Kampus UIN Alauddin Makassar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan dan berperan sebagai acuan atau penuntun penelitian yang dijadikan pedoman atau penelitian pada seluruh proses penelitian (Nursalam, 2016).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian *Kuantitatif Observasional Analitik* yang ditujukan untuk melakukan pengujian hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Nursalam, 2016). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Case Control* digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan faktor risiko terhadap terjadinya efek dengan pendekatan retrospektif. (Notoatmodjo, 2018). Pada studi *Case Control* sekelompok kasus (hipertensi) dibandingkan dengan kelompok kontrol (Tidak Hipertensi). Kemudian ingin diketahui kekuatan hubungan suatu faktor risiko tertentu terhadap terjadinya efek yang diteliti.

Pada penelitian ini akan menganalisis hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada *Security* di Kampus UIN Alauddin Makassar).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampus UIN Alauddin Makassar. Waktu penelitian bulan Juni tahun 2022.

C. Populasi Dan Sampel

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah semua komponen atau bagian yang terdiri atas item obyek/subyek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk memilih dipelajari yang kemudian dapat dicapai penetapannya (Imas, M., & T, 2018). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh *Security* di Kampus UIN Alauddin Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab pengelola data *security* di Kampus UIN Alauddin Makassar, didapatkan data *security* berjumlah 48 orang.

2) Sampel Penelitian

Sampel adalah beberapa bagian dari jumlah dan ciri yang dimiliki oleh populasi yang secara pasti diteliti selanjutnya ditarik ketetapanannya (Imas, M., & T, 2018). Sampel adalah sebagian dari populasi yang bisa dijangkau dan dilibatkan pada penelitian dengan menjadi sampel (Nursalam, 2016).

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah ciri yang digunakan sebagai saringan pada bagian populasi yang nantinya jadi sasaran namun telah sesuai dengan ciri yang ditentukan, memiliki kesesuaian pada apa yang diteliti (Imas, M., & T, 2018). Kriteria inklusi pada sampel penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Security* yang berkerja masih aktif di kampus UIN alauddin Makassar.

2. Bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan setelah penjelasan (*informed consent*).
3. Usia 25 tahun sampai 60 tahun dan lama bekerja minimal 1 tahun.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah ciri yang dapat dimanfaatkan dalam mengdropout sampel pada ciri yang sudah ditentukan dapat pula dijelaskan dengan di bawah ini adalah alasan sebuah populasi tidak menjadi sampel penelitian (Imas, M., & T, 2018). Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Security* sakit.
3. *Security* yang konsumsi obat anti hipertensi.
4. Peserta mengundurkan diri.

c. Penentuan Besar Sampel

Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus *slovin* (Notoatmodjo, 2018) Tentang statistika Keperawatan. Adapun rumus *slovin* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan :

N = Besar populasi

n = Besar sample

d = Tingkat signifikasi (d= 0,05)

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{48}{1 + 48(0,05)}$$

$$n = \frac{48}{1 + 48(0,0025)}$$

$$n = \frac{48}{1 + 0,12}$$

$$n = \frac{48}{1,12}$$

$$n = 42 \text{ responden}$$

Jadi responden dalam penelitian ini sejumlah 42 orang.

D. Teknik Sampling

Teknik Sampling merupakan proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk mewakili populasi. Penelitian ini memakai *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penetapan sampel sesuai dengan yang diinginkan peneliti, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya (Sugiyono, 2018).

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena alam ataupun sosial yang di observasi dan berisi daftar pernyataan atau pertanyaan yang telah di susun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab oleh responden (Sugiyono, 2018).

Instrumen dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI) yang dibuat oleh Dr. Daniel J. Buysse dan tim dari

University of Pittsburg's Western Psychiatric Institute and Clinic. Kuesioner yang disusun terdiri dari 2 bagian. Bagian awal berisi data informasi umum dan bagian kedua kuesioner berisi pertanyaan mengenai kualitas tidur yang dialami pekerja satuan keamanan (*security*) di Kampus UIN Alauddin Makassar. Kuesioner mengkaji 7 komponen dalam kualitas tidur yaitu kualitas tidur subjektif, sleep latensi, durasi tidur, gangguan tidur, efisiensi kebiasaan tidur, penggunaan obat tidur, dan disfungsi tidur pada siang hari. Pengukuran setiap dimensi tersebar dalam beberapa pertanyaan dan penilaian sesuai prinsip standar.

Alat ukur tekanan darah dalam penelitian ini adalah menggunakan *sphygomomanometer aneroid* dalam satuan mmHg dan stetoskop dengan merk *One Med*. Tata cara pemeriksaan terkanan darah dilaksanakan pasca didapatkan hasil dari pengisian kuesioner tersebut.

Tabel Distribusi Pertanyaan Kuesioner *Pittsburgh Sleep Quality Index* (PSQI)

Komponen kualitas Tidur				
No	Komponen Pertanyaan	No.pertanyaan	Penilaian Jawaban	score
1	Kualitas tidur subjektif	9	Sangat baik	0
			Baik	1
			Kurang baik	2
			Sangat buruk	3
2	Latensi Tidur (waktu yang dibutuhkan untuk memulai tidur)	5a	0	0
			1-2	1
			3-4	2
			4-6	3
		2	<15 menit	0
			16-30 menit	1
	31-60 m	2		

			enit	3
			>60 menit	
3	Durasi Tidur (lamanya tidur)	4	>7 jam	0
			6-7 jam	1
			5-6 jam	2
			<5 jam	3
4	Efisiensi Kebiasaan Tidur	1,3 dan 4	>85%	0
			75-84%	1
			65%-74%	2
			65%	3
5	Gangguan tidur	5b,5c	0	0
		5d,5e	1-9	1
		5f,5g	10-18	2
		5h,5i,5j	19-27	3
6	Penggunaan Obat Tidur	6	0	0
			1	1
			2	2
			>3	3
7	Disfungsi siang hari	7 dan 8	0	0
			1-2	1
			3-4	2
			5-6	3
	Score keseluruhan komponen		No item. 1+2+3+4+5+6+7	0-21

- Pengembangan Kuesioner

Untuk mengukur variabel penelitian, peneliti mendapatkan kuesioner baku berasal dari *Pittsburgh University* yang bernama *PSQI* Atau *Pittsburgh Sleep Quality Index* dengan nilai validitas yang di dapat dari uji *Cronbach Alfa* yaitu

0,83. Kuesioner PSQI tersebut dikonfirmasi terjemahnya ke pusat legalitas atau kuesioner baku.

F. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

1. Data primer merupakan informasi yang didapatkan pada responden ataupun subjek yang diteliti, informasi yang diperoleh diperoleh di kuesioner yang diisi oleh responden.
2. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari dokumentasi dan sumber lain, dari kampus UIN Alauddin Makassar.

b. Prosedur Pengolahan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian (Nursalam, 2016). Dalam melaksanakan penelitian ini, adapun tata cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengurus perizinan dan persetujuan kepada pihak bagian security di kampus UIN Alauddin Makassar
2. Tentukan responden penelitian sesuai kriteria berdasarkan data informasi dari pihak security di kampus UIN Alauddin Makassar.
3. Memberikan penjelasan tujuan penelitian, jika responden sudah mengerti serta setuju responden diminta menandatangani lembar (*informed concent*).

4. Meminta atau menanyakan tentang karakter responden dengan melakukan pengisian lembar identitas yang mencakup nama, umur, nomor telepon, jenis kelamin dan alamat.
5. Lakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan tekanan darah dilaksanakan dengan posisi duduk di kursi dan dilengan kiri.
6. Berikan lembar kuesioner PSQI untuk responden selanjutnya diisi, maksimal waktu untuk mengisi 5-10 menit.
7. Pasca responden menyelesaikan proses pengisian jawaban, peneliti lakukan pengecekan berulang jika ada pertanyaan yang terlewat/belum terjawab.

G. Pengolaan Data

Pada penelitian ini pengolahan informasi data dilaksanakan menggunakan software statistik, Menurut Nugroho (2012). Pengolahan informasi data meliputi :

1. Editing

Hasil penelitian dari lapangan harus dilakukan perubahan (*editing*) terlebih dahulu. Pada umumnya, *editing* adalah tindakan untuk memeriksa dan memperbaiki. Jika ada data yang belum lengkap, dilakukan memungkinkan perlu pengambilan data ulang untuk menyelesaikan data-data informasi tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan, maka data yang tidak lengkap tersebut tidak diolah atau dimasukkan data pengolahan (Nugroho, 2012). Yang termasuk :

- a. Memeriksa secara lengkap identitas yang di isi.
- b. Memeriksa tiap kekurangandata yang di isi.

2. *Coding*

Melakukan pengkodean yang diharapkan bermaksud agar data-data tersebut mempermudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data yang disederhanakan dengan membiarkan tanda-tanda/kode berupa angka atau alphabet pada nomor daftar kuesioner, dan nomor variabel.

3. *Data entry*

Proses data yang dilakukan oleh peneliti adalah memasukkan data yang telah dikumpulkan ke dalam master tabel atau data base komputer, kemudian membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan membuat tabel kontingensi. Proses ini memberi informasi data dalam bentuk kode ke dalam computer program.

4. *Scoring*

Pemberian skor adalah untuk dtentukan skor/nilai untuk setiap item pertanyaan dan tentukan nilai terendah dan tertinggi. Tahap ini diselesaikan setelah menetapkan kode responden dan jawaban atau hasil pengamatan, sehingga setiap jawaban responden atau hasil pengamatan dapat diberi skor.

a. Skor kualitas tidur : 0-21

b. Skor tingkat tekanan darah : Tekanan darah sistolik : 0-300 mmHg

Tekanan darah diastolik : 0-120 mmHg

5. *Cleaning*

Pembersih data adalah dengan cara mengecek variabel data, apakah sudah sesuai atau ada kekeliruan. Ini dilakukan apabila semua data responden sudah selesai dimasukkan, perlu dicek kembali untuk melihat kemungkinan adanya

kesalahan dalam pengkodean, tidak lengkap data. Kemudian akan dilakukan pembetulan atau pengoreksian data kembali.

H. Analisa Data

Analisa data adalah pengelompokkan data berdasarkan karakteristik responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti menggunakan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan (Sugiyono, 2018).

1. Analisa Univariat

Analisis data univariat dipakai peneliti memiliki tujuan agar bisa memahami atau menggambarkan karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2018). Karakteristik responden yakni nama, usia, jenis kelamin, merokok, kegiatan di luar.

2. Analisa Bivariat

Analisa data bivariat merupakan penguraian yang dilakukan terhadap dua faktor yang dianggap keterkaitan atau berkorelasi (Notoatmojo, 2013). Analisa akan dilakukan di program *SPSS* for laptop, menggunakan uji *chi square*. Pada penelitian tersebut analisa bivariat dilakukan agar diketahui korelasi antara kualitas tidur dengan risiko kejadian Hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makasaar.

I. Etika Penelitian

Etika penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, oleh sebab itu sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin ke bidang keperawatan. Penelitian ini hanya melibatkan responden yang mau terlibat saja secara sadar bukan adanya paksaan. Penelitian ini telah lulus uji komite etik

dan Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar dengan nomor etik: No.C.93/KEPK/FKIK/IV/2022. Prinsip-prinsip etik dalam melakukan penelitian ini gunanya untuk melindungi responden dari berbagai kekhawatiran dan dampak yang timbul selama kegiatan penelitian (Imas, M., & T, 2018) yaitu:

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)

Informed consent adalah bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan ke responden sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar responden mengerti maksud dan tujuan penelitian, jika responden tidak bersedia maka peneliti harus menghormati hak-hak responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Anonymity merupakan tindakan untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan menuliskan nama responden, sehingga pada kuesioner responden hanya akan dimintam untuk memberikan kode/inisial yang merupakan huruf awalan dari nama responden. Contoh (N).

3. *Beneficence* (manfaat)

Didalam sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian jika subjek penelitian mengetahui kualitas tidur dan tekanan darah yang mereka alami. Maka subjek dapat mencegah risiko kejadian hipertensi.

4. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Dimana peneliti tidak memberikan informasi mengenai identitas dan

kerahasiaan responden. Namun peneliti hanya menggunakan coding sebagai pengganti dari identitas responden. Dengan kata lain, informasi yang telah didapatkan oleh peneliti tidak akan tersebar ke orang lain dan hanya di pergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini hanya menggunakan inisial nama dalam menjaga merahasiaan responden.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah perguruan tinggi negeri yang dinaungi Kementerian Agama Islam terbesar di kawasan Indonesia Timur yang terletak di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa Kel. Romang Polong atau yang lebih sering disebut Samata. Perguruan tinggi Islam yang mengawali nama IAIN Alauddin yang terletak di Jl. Sultan Alauddin Makassar dan kini telah menjadi perguruan tinggi atau Universitas dengan jumlah mahasiswa yang setiap tahunnya semakin berkembang secara pesat dan hal itu yang mendorong pemerintah untuk menjadikan perguruan tinggi islam tersebut menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sekarang biasanya disingkat atau disebut UINAM.

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Kampus UIN Alauddin Makassar yang letaknya di samata Kabupaten Gowa biasa disebut dengan kampus II Samata Gowa Kel. Romang Polong dan juga ada kampus I letaknya di jalan sultan alauddin, dengan luas ± 34.000 m² dengan jumlah gedung perkuliahan yang terdiri dari delapan Fakultas, dimana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri memiliki luas wilayah 1.057,18 m² yang terdiri dari empat gedung perkuliahan dan memiliki lima jurusan.

2. Suasana Di Kampus UIN Alauddin Makassar

Dengan konsep bangunan yang bergaya arsitek mesir, area kampus UIN Alauddin Makassar nampak indah, sejuk dan megah dengan balutan cat warna

coklat muda dengan tatanan gedung yang berdiri rapih dan tinggi di lingkungan yang banyak pepohonan yang indah dan hijau.

3. Sarana dan prasarana

Sarana juga prasarana kampus UIN Alauddin Makassar lengkap dimana memiliki gedung-gedung seperti Auditorium, Masjid, Gedung Fakultas, Gedung Kesenian, Aula, Parkiran dan lain-lain. Serta memiliki satuan pengamanan yang bagus seperti Satpam (*Security*).

4. Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar

a. VISI

Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.

b. MISI

Lalu untuk misionya sendiri yaitu:

1. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan traadisi keilmuan.

5. Tujuan

1. Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya potensi insane yang kuat dengan pertimbangan kearifan lokal.
2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis intelektualegrasi keilmuan.
3. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang islami.
4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga local, nasioal, dan internasional.

B. Hasil Penelitian

Penelitian mengenai korelasi kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar telah dilakukan pada bulan Juni 2022. Responden pada riset ini yaitu *security* di kampus UIN Alauddin Makassar dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Jenis penelitian tersebut memiliki rancangan dalam bentuk penelitian Kuantitatif Deskriptif dengan pendekatan *Case Control*.

a. Analisa Univariat

Analisis univariat dimanfaatkan dalam menggambarkan ciri tiap variabel penelitian. Hasil analisis univariat pada penelitian ini mendeskripsikan tentang ciri responden yang meliputi umur, jenis kelamin dan kualitas tidurnya.

1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Usia dan jenis kelamin dan Riwayat Merokok pada security di kampus UIN Alauddin Makassar.

Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat dilihat berdasarkan usia, jenis kelamin dan riwayat merokok yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Distribusi Karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin dan Riwayat Merokok pada security di kampus UIN Alauddin Makassar

Karakteristik	Frekuensi (n)	Presentase (%)
Usia		
17-25	1	2,4
26-35	8	19,0
36-45	21	50,0
46-57	12	28,6
Jenis Kelamin		
Laki-laki	40	95,2
Perempuan	2	4,8
Riwayat Merokok		
Merokok	27	64,3
Tidak Merokok	15	35,7

Sumber: Data Primer 2022

Tabel 4.1 pada tabel usia menunjukkan bahwa usia terbanyak adalah dengan rentang 36-45 tahun yakni sebanyak 21 orang (50,0%). Berdasarkan tabel jenis kelamin *security* di kampus UIN Alauddin Makassar di atas didapatkan didominasi oleh laki-laki sebanyak 40 orang

(95,2%). Berdasarkan tabel riwayat merokok *security* di kampus UIN Alauddin Makassar diatas didapatkan sebanyak 27 orang yang merokok (64,3%).

2. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kualitas tidur pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.

Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat dilihat berdasarkan kualitas tidurnya yang uraikan pada tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 4.3
Karakteristik frekuensi responden berdasarkan kualitas tidur pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar

Kualitas Tidur	Jumlah (n)	Persentase %
Buruk	36	85,7
Baik	6	14,3
Total	42	100

Sumber: Data Primer 2022

Tabel 4.3 di atas didapatkan bahwa kualitas tidur *security* di kampus UIN Alauddin Makassar sebagian besar didominasi oleh kualitas tidur buruk sebanyak 36 orang (85,7%), sedangkan untuk kualitas tidur baik sebanyak 6 orang (14,3%).

3. Distribusi frekuensi responden berdasarkan Tekanan Darah pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar

Di bawah ini merupakan ciri responden yang telah diteliti dapat dilihat berdasarkan kejadian risiko hipertensi yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Karakteristik frekuensi responden berdasarkan tekanan darah pada
security kampus UIN Alauddin Makassar

Kategori hipertensi	Jumlah (n)	Persentase %
Tidak Hipertensi	13	31,0
Hipertensi	29	69,0
Total	42	100,0

Sumber: Data Primer 2022

Tabel 4.4 diatas didapatkan *security* di kampus UIN Alauddin Makassar yang risiko kejadian hipertensi 29 orang (69,0%), sedangkan yang tidak hipertensi ada 13 orang (31,0%). Persentase responden yang hipertensi termasuk angka relative besar untuk diperhatikan karena dapat berisiko terjadinya gangguan kesehatan lainnya yang mematikan.

Apabila dirinci berdasarkan klasifikasi tekanan darah menurut (JNC 8, 2015) maka dapat dilihat tabel sebagai berikut.

Kategori	Jumlah (n)
Normal atau tidak hipertensi (<120 dan <80)	13
Prehipertensi (130-139 atau 80-89)	10
Hipertensi derajat 1 (140-159 atau 90-99)	19

Berdasarkan tekanan darah sebagian besar responden termasuk dalam kelompok hipertensi derajat 1 yaitu 19 orang dan dilihat jumlah responden yang prehipertensi 10 orang. Namun apabila dengan jumlah responden yang hipertensi dan prehipertensi maka sebagian besar *security* di kampus UIN Alauddin Makassar yang mengalami risiko kejadian hipertensi yaitu sebanyak 29 orang. Menurut Joint National Comitte Prehipertensi tidak

dianggap penyakit, tetapi mengidentifikasi mereka yang cenderung berkembang ke fase 1 atau fase 2 kelompok hipertensi (JNC 8, 2015).

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besaran kekuatan hubungan antara dua variabel yakni hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN alauddin Makassar.

Hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.

Tabel 4.5
Hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar.

Kualitas Tidur	Tekanan Darah				Total	OR (95% CI)	p-value
	Hipertensi		Tidak hipertensi				
	n	%	n	%			
Buruk	28	96,6	8	61,5	100	7,000	
Baik	1	3,4	5	38,5	100	(1,078-45,437)	0,007
Jumlah	29		13		42		

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan responden yang memiliki kualitas tidur buruk lebih banyak pada kelompok hipertensi (96,6%) daripada yang tidak hipertensi (61,5%). Hasil uji *chi square* di dapatkan nilai signifikan *Fisher Exact Test* dengan *p-value* 0,007 taraf signifikan $<0,05$. Sehingga H_a diterima H_o ditolak, menunjukkan terdapat hubungan bermakna antara kualitas tidur dengan kejadian hipertensi, dengan Data OR (*Odds ratio*) sebesar 7,000. Berdasarkan Hasil OR (*Odss ratio*) dimana menunjukkan kekuatan hubungan kualitas tidur 7 kali berisiko untuk mengalami kejadian hipertensi dengan *CI*(95% 1,078-45,437).

C. Pembahasan

Jenis penelitian ini dikelola dalam bentuk penelitian *Kuantitatif* dengan menggunakan pendekatan *Case control* untuk mengetahui kekuatan hubungan antara kualitas tidur dengan hipertensi pada *security*. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 juni - 27 juni 2022 di Kampus UIN Alauddin Makassar. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 48 *Security*. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan cara *Purposive Sampling*, dimana *security* yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini dan dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 42 orang, sebab yang lain masuk dalam kriteria eksklusi (mengundurkan diri sebagai responden dan sakit). Responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan responden dengan jenis kelamin perempuan, di karenakan jumlah laki-laki pada pekerjaan *security* lebih banyak dari pada perempuan.

Dari penelitian ini didapatkan nilai signifikansi Nilai *p-value* 0,007. tabel yang digunakan adalah 2x2 atau variabel dependen terdiri atas 2 kategori. Maka didapatkan hasil OR (*odds ratio*) adalah 7,000 dengan Confidence Interval (95% 1,078-45,437). yang berarti ini merupakan sebuah faktor resiko. Kualitas tidur yang baik dapat mencegah kejadian hipertensi. Dalam perancangan penelitian ini setelah mendapatkan beberapa jumlah responden yang termasuk dalam kriteria inklusi maka responden diminta untuk mengisi kuesioner kualitas tidur lalu diperiksa tekanan darahnya dengan dua kali pengukuran. Pada tahap awal seluruh responden mendapatkan lembar kuesioner kualitas tidur (PSQI) dan setelah pengisian kuesioner selesai, peneliti akan membagi responden menjadi dua kategorisasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Kategori/kelompok pertama adalah

kelompok yang memiliki kualitas tidur yang baik dan kategori/kelompok ke dua adalah yang memiliki kualitas tidur buruk, setelah itu peneliti akan melakukan pemeriksaan tekanan darah, sehingga diperoleh hasil tekanan darah dari yang memiliki kualitas tidur yang baik dan kualitas tidur yang buruk. Setelah informasi hasil penelitian dikumpulkan, Kemudian dilakukan editing data dan diolah memakai aplikasi program *SPSS 25* dan hasil pengolahan datanya dimasukkan ke dalam tabel frekuensi juga pendistribusian.

1. Karakteristik Responden

Distribusi frekuensi usia pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar didapatkan dengan rentang usia 36-45 tahun sebanyak 21 orang (50,0%). Menurut (Roshifanni, 2017) secara umum, individu yang berisiko mengalami hipertensi adalah orang - orang yang berusia 40 tahun keatas, dikarenakan pada usia tersebut arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku sehingga tidak dapat berkembang saat jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Oleh sebab itu, pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh darah yang sempit dari pada biasanya sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah. Fenomena yang terjadi saat ini adalah orang pada usia muda sudah menderita hipertensi, sebagian besar hipertensi terjadi pada usia 25–45 tahun dan sekitar 20% terjadi pada orang usia di bawah 20 tahun dan diatas 50 tahun (Roshifanni, 2017). Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh kowalski, (2014) menyatakan bahwa tekanan darah tinggi lebih umum di dapatkan pada usia dewasa muda sampai lanjut usia, hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan kelompok usia yang mulai mengalami penurunan daya tahan tubuh, penurunan fungsi fisik

dan menurunnya kemampuan fungsi syaraf sehingga metabolisme tubuh tidak maksimal lagi. Peningkatan tekanan peredaran darah yang berkaitan dengan usia paling mendekati dengan adanya perubahan arteri secara struktural khususnya terhadap arteri atau pembuluh darah besar yang mengalami kekakuan. Hal ini tersebut diketahui dari berbagai jenis hasil riset terkait erat dengan penyakit kardiovaskular yang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Semua bukti menyatakan bahwa penurunan kejadian penyakit kardiovaskular sejalan dengan peningkatan pengobatan pada hipertensi. Patofisiologis lain yang berkontribusi pada peningkatan tekanan darah berdasarkan usia adalah akibat penurunan refleksi baroreseptor, peningkatan aktivitas saraf simpatis, serta adanya gangguan pencernaan natrium (Pinto, 2013).

Distribusi frekuensi pada jenis kelamin *security* di kampus UIN Alauddin Makassar didapatkan bahwa didominasi oleh laki-laki sebanyak 40 orang (95,2%). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusdiana mengatakan Jenis kelamin dengan peningkatan tekanan darah pada pasien hipertensi pasien yang berjenis kelamin laki-laki mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah ringan sebanyak 18 orang 22,8% dan sebagian responden yang berjenis kelamin perempuan mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah ringan sebanyak 30,4%. Dalam (Suryati, 2012), menyatakan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih besar untuk terkena/risiko hipertensi karena dalam mengatasi masalah atau stres di tempat kerja, laki-laki cenderung lebih emosi, dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tenang seperti yang dilakukan oleh perempuan. Angka istirahat jantung dan indeks kardiak pada pria lebih rendah dan tekanan arteri nya lebih

tinggi jika dibandingkan dengan perempuan premenopause pada level tekanan arteri yang sama. Respons setelah melakukan latihan beban dengan kenaikan tekanan darah arteri juga lebih besar pada pria (Rusdiana, 2019). Fakta tersebut sesuai dengan penjelasan dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa 1 dari 4 laki-laki mengalami risiko kejadian hipertensi, dan 1 dari 5 wanita mengalami hipertensi yang artinya jenis kelamin laki-laki lebih berisiko mengalami hipertensi dibandingkan perempuan (WHO, 2019). Laki-laki berisiko 2.3 kali cenderung lebih besar mengalami peningkatan tekanan darah sistolik dibandingkan perempuan (Kemenkes RI, 2019). Fakta terkini dari suatu penelitian sudah mengenali sebagian mungkin mekanisme kenaikan tekanan darah yang berkaitan dengan jenis kelamin. Perihal ini berkaitan dengan akibat dari peran yang berbeda pada sistem imun laki-laki serta perempuan. Profil imun anti-inflammatory yang kuat pada perempuan bisa berfungsi untuk membatasi peningkatan tekanan darah. Sebaliknya pada laki-laki, profil imun tersebut cenderung lebih lemah sehingga jadi celah untuk terbentuknya mekanisme kenaikan tekanan darah (Gillis & Sullivan, 2016).

Distribusi frekuensi Riwayat Merokok, didapatkan *security* yang merokok 27 orang (64,3%) dan yang tidak merokok sebanyak 15 orang (35,7%). Penyakit Hipertensi dapat disebabkan oleh cara dan kebiasaan hidup seseorang, salah satunya adalah kebiasaan merokok. Merokok adalah bagian kehidupan individu dan salah satu kebiasaan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang merokok bisa dengan siapa saja seperti pria, wanita, remaja, kaya, miskin dan tidak ada pengecualian. Merokok adalah bagian kehidupan individu. Dimana

dari segi kesehatan, tidak ada satu individu yang setuju atau melihat manfaat yang dikandungnya dan tidak mudah menurunkan dan menghilangkannya, oleh sebab itu gaya hidup ini menarik sebagai suatu masalah kondisi kesehatan dan dipandang sebagai faktor terkena risiko kejadian hipertensi.(Irene Megawati Umbas, 2019). Karbon monoksida dapat mengurangi berapa banyak oksigen dalam sel-sel darah merah. Ini juga meningkatkan jumlah kolesterol yang disimpan di lapisan dalam pembuluh darah. Semakin panjang waktunya, pembuluh darah arteri semakin mengeras dan menyebabkan hipertensi. (AHA, 2016)

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi Hipertensi diantaranya sebagai berikut:

Riwayat Keluarga, Salah satu riset di daerah Miyun, China menunjukkan bahwa seseorang dengan riwayat keluarga hipertensi empat kali lebih berisiko mengalami hipertensi (Liu et al., 2015). Riwayat kesehatan keluarga juga memberikan informasi tentang risiko keadaan yang tidak biasanya disebabkan adanya suatu mutasi/perubahan genetic. Meskipun demikian, memiliki latar belakang keluarga dengan riwayat hipertensi belum menjamin secara pasti juga mengalami hipertensi. Namun, pola keturunan penyakit hipertensi tidak diketahui secara pasti.(NIH, 2020). Etnis, Ada perbedaan tekanan darah pada orang yang berkulit hitam dan putih. Peningkatan prevalensi hipertensi antara individu yang berkulit hitam belum jelas kepastiannya, tetapi peningkatannya dikaitkan dengan kadar renin yang lebih rendah, sensitivitas yang lebih besar terhadap vasopressin, dan tingginya stress lingkungan (M.Black Joyco, 2014). Stress merupakan kondisi

yang paling sering di alami oleh setiap orang. Stress meningkatkan kekuatan vaskuler perifer dan curah jantung serta menstimulasi aktivitas system saraf simpatis. ketika saat stres, tubuh akan merasakan tekanan yang mendalam atau ketidaknyamanan emosional yang dapat dikendalikan. Stres adalah kondisi yang sering terjadi yang dialami oleh manusia. Namun jika tingkat stres berlebihan akan mempengaruhi pada peningkatan tekanan darah pada individu yang mengalami stres yang berat (AHA, 2014). Pada saat hormon adrenalin yang meningkat ketika stress terjadi, berakibat pada proses memompa darah yang dilakukan oleh jantung. Jantung akan memompa darah secara lebih cepat sehingga menyebabkan peningkatan sirkulasi dalam darah sehingga menyebabkan naiknya tekanan darah (M.Black Joyco, 2014). Diabetes, dapat mempercepat aterosklerosis serta menyebabkan hipertensi karena rusaknya atau bermasalah pada pembuluh darah (Elsevier, 2014). Diabetes dapat menyebabkan tertumpuknya gula di dalam darah sehingga akibatnya terjadi peningkatan tekanan peredaran darah yang akan memicu pada resiko penyakit kardiovaskular. Resistensi insulin adalah salah satu yang dapat faktor pemicu paling umum tekanan darah tinggi pada orang yang menderita penyakit diabetes. (CDC, 2020)

Berdasarkan distribusi kualitas tidur *security* di wilayah kerja kampus UIN Alauddin Makassar didapatkan sebanyak 36 orang (85,7%) dengan kualitas buruk. Berdasarkan asumsi peneliti, responden yang memiliki kualitas tidur buruk karena berkaitan dengan sulit untuk memulai tidur atau insomnia karena pengaruh kerja *shift* malam. Hasil wawancara dengan responden bahwa mereka merasakan kantuk di siang hari pada saat bekerja, sulit memulai tidur di malam hari. Juga

bahwa mereka kurang tidur, terbangun di malam hari, dimana waktu tidurnya rata-rata 3-5 jam di malam hari. Seseorang yang mengalami insomnia mudah cemas atau stress sehingga bisa menimbulkan kekambuhan hipertensi. Namun pada penelitian ini masih ada responden yang mengalami kualitas tidur baik hal ini dikarenakan responden tidak merasakan gejala 1 minggu terakhir seperti tidak sering terbangun di malam hari, selama tidur tidak sering terbangun untuk pergi ke kamar mandi dan walaupun kurang tidur masih dapat beraktivitas dengan semangat. Penelitian dari Fiona (2021) mengatakan bahwa sebanyak 94 orang *security* yang bekerja dengan sistem *shift* memiliki kualitas tidur yang buruk selama adanya *shift* malam, *security shift* mengatakan mereka memiliki waktu tidur 3-5 jam dalam sehari.

Berdasarkan teori faktor yang mempengaruhi kualitas istirahat tidur yaitu penyakit, kelelahan, stres psikologis/mental, nutrisi, obat, lingkungan, usia dan gaya hidup. Kualitas tidur yang buruk merupakan salah satu faktor penyebab risiko hipertensi pada orang dewasa. Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan masalah gangguan metabolisme dan endokrin yang dapat berkontribusi menyebabkan gangguan kardiovaskular. Hal ini didasarkan dengan teori bahwa kualitas tidur adalah ukuran dimana seseorang dapat kemudahan dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur, kualitas tidur seseorang dapat digambarkan dengan lama waktu tidur, dan keluhan yang dirasakan saat tidur ataupun sehabis bangun tidur (Kozier, 2013). Kualitas tidur yang buruk dapat mengubah tekanan hormon stress kortisol dan

sistem saraf simpatik, sehingga dapat terjadi peningkatan tekanan darah (Martini, 2018).

2. Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Di Kampus UIN Alauddin Makassar

Hasil analisis bivariat menggunakan uji *chi-square* memiliki taraf nilai signifikansi 0,05 sehingga didapatkan nilai *p-value fisher exact test* sebesar 0,007 dimana nilai *p-value* < 0,05 artinya hipotesis diterima yang berarti terdapat hubungan bermakna antara kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di wilayah kerja kampus UIN Alauddin Makassar. kekuatan hubungan kualitas tidur sebesar nilai OR 7,000 kali berisiko kejadian hipertensi.

Dari hasil penelitian didapatkan kualitas tidur buruk pada responden hipertensi sebanyak 29 responden (96,6%) dan yang kualitas tidurnya baik ada 1 responden (3,4%). Berdasarkan asumsi peneliti responden yang memiliki kualitas tidur buruk berkaitan dengan sulit untuk tidur, dimana seseorang kesukaran dalam memulai atau mempertahankan tidur ketika *shift* malam, seseorang yang mengalami insomnia mudah cemas atau stres sehingga bisa menimbulkan risiko kejadian hipertensi. Hal ini sesuai dengan teori bahwa Kualitas tidur yang tidak baik akan memudahkan terjadinya risiko hipertensi, karena kualitas tidur yang buruk dapat mengubah hormon stres kortisol dan sistem saraf simpatik, sehingga terjadi peningkatan tekanan darah (Hafiez Amanda, 2017). Dalam hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh oleh (Rusdiana, 2019) dimana hasil penelitiannya memiliki 79 responden Penelitian ini menyatakan ada hubungan kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah dengan *p-value*

0,000. kualitas tidur dengan peningkatan tekanan darah yaitu pasien dengan kualitas tidur buruk mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah sedang sebanyak 24,1%, sedangkan pasien dengan kualitas tidur baik mayoritas mengalami peningkatan tekanan darah ringan sebanyak (40,5) (Rusdiana, 2019). Kualitas tidur buruk bisa di sebabkan bukan hanya karena hipertensi tetapi bisa karena beberapa faktor yaitu lingkungan yang tidak mendukung, stress dan pekerjaan. Kualitas tidur yang buruk, selain berpengaruh pada naiknya tekanan darah juga dapat mempengaruhi status kesehatan jangka panjang seperti meningkatnya indeks masa tubuh dan depresi pada orang dewasa.(Wulaningsih, 2019). Penelitian oleh Melizza, dkk (2020) menyatakan kualitas tidur yang buruk atau tidak mencukupi kurang dari 7 jam/malam pada seseorang berhubungan dengan peningkatan tekanan darah. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Liu et al (2016) menyatakan bahwa sebagian besar gangguan tidur dialami oleh penderita hipertensi dibandingkan seseorang yang memiliki tekanan darah normal, hal tersebut dipengaruhi saat tidur terjadi peningkatan aktivitas saraf simpatik terhadap pembuluh darah yang meningkatkan detak jantung dan terjadinya peningkatan tekanan darah. Selain itu tidur yang tidak normal, mengalami masalah dan kebiasaan tidur dapat menjadikan stres fisik, psikososial dan peningkatan aktivitas saraf simpatik sehingga meningkatkan detak jantung.

Hal ini sesuai dengan teori (Gangwisch, 2015) menyatakan bahwa apabila terjadi waktu tidur akan secara akut menaikkan tekanan darah dan mengaktivasi sistem saraf simpatis yang dalam jangka waktu lama hal tersebut akan memicu terjadinya hipertensi, bahwa pada saat seseorang mengalami tidur, maka

hipotalamus akan mengaktifkan sumbu yakni *medulla adrenal sympatic* dan *Hipotalamic pituitary Adrenal axis* (HPA-axis). Ketika stressor datang disebabkan oleh gangguan tidur, maka hormone epinefrin dan norepinefrin disekresikan oleh kelenjar medula adrenal dan efek dari perangsangannya yaitu langsung pada organ-organ spesifik seperti pembuluh darah dan jantung. Kedua hormone tersebut langsung membuat pembuluh darah setiap jaringan akan mengalami vasokonstriksi sehingga membuat tahanan perifer meningkat yang demikian dapat meningkatkan tekanan darah. (Gangwisch, 2015)

Allah swt. berfirman dalam QS Asy-syu'ara'/26 :80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي ۝

Terjemahnya :

“dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.” (Kementerian Agama RI, 2022)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. yang menyembuhkan manusia apabila dia sakit. Allah swt. berkuasa menyembuhkan penyakit penyakit apa saja yang diderita seseorang. Meskipun begitu, manusia juga mencari tahu cara untuk kesembuhanya. Imam Jamaluddin al-Qasimi dalam tafsirnya menguraikan bahwa ayat ini menggambarkan tata susila seseorang seorang hamba Allah swt. kepada khaliknya. Karena penyakit itu kadang-kadang akibat perbuatan manusia itu sendiri. Semisal disebabkan oleh pelanggaran terhadap norma-norma kesehatan, atau polah hidup sehari-hari, bahwa serangan penyakit terhadap tubuh tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya yang berhak menyembuhkan penyakit adalah Allah semata. Bila orang sakit merasakan demikian waktu dia menderit sakit, maka dia

akan menikmati setelah sembuh dari penyakit tersebut. Kebanyakan manusia terserang penyakit disebabkan kurang memperhatikan norma-norma kesehatan yang berlaku (Kementrian Agama RI, 2022). Makna hal itu berarti jika aku menderita sakit maka tidak ada seorangpun yang kuasa menyembuhkanku selainnya sesuai takdirnya yang dikarenakan oleh sebab yang menyampaikannya (Katsir, 2005). Dikaitkan dengan hasil penelitian, maka risiko kejadian hipertensi pada kualitas tidur yang terjadi pada responden, maka itu dikembalikan kepada yang maha menyembuhkan. Sebagai peneliti, kami hanya wasilah dan harus diyakinkan kembali kepada orang yang menjadi responden bahwa kesembuhan itu semata-mata dari dari-nya.

Menurut penelitian dari P Bansil, dkk yang berjudul *Association Between sleep disorders and hypertension* berdasarkan kesimpulan dari NHANES tahun 2005-2008 menyatakan bahwa tidur merupakan hal yang sangat penting untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan dan tanda vital yang penting. Mereka melaporkan bahwa prevalensi hipertensi adalah 30.2% mengalami gangguan tidur, 7.5%, dan 33.0% mengalami durasi tidur yang pendek serta 52.1% melaporkan adanya kualitas tidur yang buruk.

Menurut hasil riset Izawa, S et al yang meneliti tentang kadar kortisol dalam darah akan meningkat, kadar kortisol mengalami peningkatan yang akan mengaktifasi sistem simpatis dan akan berperan pada kenaikan tekanan darah. Pada hasil riset Javaheri, S et al, terdapat hubungan antara kualitas tidur yang terganggu terhadap kejadian hipertensi pada remaja, Pada penelitian ini terdapat hubungan dengan nilai $p\text{-value} = 0,001$, yang berarti membuktikan bahwa

gangguan kualitas tidur secara terus menerus akan menyebabkan perubahan fisiologis tubuh dimana sistem keseimbangan antara pengaturan sistem saraf simpatis dan parasimpatis terganggu, peningkatan sistem simpatis tersebut berperan dalam peningkatan tekanan darah pada pasien tersebut dan sebaliknya aktifitas parasimpatis akan menurunkan tekanan darah. Penelitian tersebut mendukung kepada penelitian sebelumnya yaitu terdapat hubungan antara kualitas tidur yang terganggu terhadap angka kejadian hipertensi. Tidur di dalam tubuh manusia diatur oleh pusat kesadaran yang ada di medulla batang otak, dan melibatkan hormonal yang diatur oleh hormon kortisol yang sangat berperan pada irama sirkadian manusia (Javaheri *et al.*, 2015). Sesuai yang dikemukakan Chen *et al* (2015) menyatakan bahwa adanya hubungan kualitas tidur yang buruk dengan terjadinya peningkatan tekanan dara, yang disebabkan karena semakin lama kualitas tidur buruk dialami seseorang maka berpengaruh pada peningkatan aktivitas saraf simpatis akibatnya seseorang menjadi stress dan berakibat naiknya tekanan darah.

Hubungan antara tidur dengan hipertensi terjadi akibat aktivitas simpatis pada pembuluh darah, seseorang akan mengalami perubahan curah jantung yang tidak signifikan di malam hari. Penurunan pada resistansi pembuluh darah perifer menyebabkan penurunan nokturnal normal pada tekanan arteri. Aktivitas simpatis tidur meningkat secara signifikan dan sangat bervariasi selama pergerakan mata yang cepat (REM) dibandingkan dengan waktu bangun tidur. Tekanan darah mendekati tingkat terjaga selama komponen phasic REM, dan sensitivitas baru meningkat selama tidur. Namun, kondisi demikian lebih efektif untuk

meningkatkan buffer pada tekanan darah selama episode REM terjadi pada akhir periode tidur dari pada malam sebelumnya. Tidur yang tidak normal terlibat dalam patogenesis non-dipping pre-hipertensi dan kemudian pada gangguan hipertensi pada kualitas tidur menyebabkan hipertensi (Martini, 2018).

Penelitian di Malaysia menunjukkan kejadian hipertensi pada pekerja *shift* sebesar 22,4% sedangkan pada pekerja *nonshift* sebesar 4,2%. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian irama sirkadian pada pekerja shift. Pada irama sirkadian tubuh manusia, tekanan darah mencapai puncaknya pada siang hari dan mengalami penurunan pada malam hari (Sinaga, 2021). Pemenuhan kebutuhan istirahat tidur memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi, hal ini merupakan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh (Winarni & Hartanto pada tahun 2016) dimana dinyatakan Kondisi demikian terjadi karena tidur dapat memberikan pengaruh terhadap sistem saraf dan organ tubuh manusia yang lain secara fisiologis. Ada beberapa komponen dalam tubuh termasuk sistem saraf yang telah digunakan untuk melaksanakan berbagai aktivitas, untuk memulihkan maka diperlukan tidur sebagai istirahat. Tidur juga berfungsi dalam proses sintesis protein, secara psikologis sendiri dan juga tidur sangat penting karena seseorang yang memiliki jumlah jam istirahat/tidur yang tidak cukup maka akan cenderung menjadi secara cepat marah atau emosional, konsentrasinya buruk dan juga mengalami kesulitan dalam membuat suatu keputusan (Novitri, 2021).

Dalam Alqur'an juga menjelaskan QS Āli 'Imrān/3 :134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. (Kemenag RI, 2022).

Makna dari kandungan ayat ini adalah mereka orang yang terus-menerus berinfak di jalan Allah swt. baik di waktu lapang, mempunyai kelebihan harta setelah kebutuhannya terpenuhi, maupun sempit, yaitu tidak memiliki kelebihan, dan orang-orang yang menahan amarahnya akibat faktor apa pun yang memancing kemarahan dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan akan sangat terpuji orang yang mampu berbuat baik terhadap orang yang pernah berbuat salah atau jahat kepadanya, karena Allah swt. mencintai, melimpahkan rahmat-nya tiada henti kepada orang yang berbuat kebaikan (Kemenag RI, 2022).

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yakni:

1. Sulitnya untuk mengumpulkan responden karena *security* kampus UIN Alauddin Makaasar memiliki *shift* kerja dan juga respondennya sedikit.
2. Dalam penelitian ini hanya berfokus pada variabel kualitas tidur dengan tekanan darah.
3. Kuesioner penelitian yang digunakan kurang dipahami responden sehingga peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjelaskan kepada responden.

E. Rekomendasi

Pada penelitian ini hanya berfokus pada variabel kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi maka, diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti menambahkan variabel-variabel lainnya dan menambahkan intervensi tentang masalah untuk orang yang mengalami kejadian hipertensi.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Kualitas pada *security* pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar didapatkan mengalami kualitas tidur sebanyak 36 orang (85,7%) sedangkan yang kualitas tidur baik sebanyak 6 orang (14,3%)
2. *Security* di kampus UIN Alauddin Makassar yang berisiko kejadian hipertensi sebanyak 29 orang (69,0%)
3. Terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada *security* di kampus UIN Alauddin Makassar

B. *Saran*

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya dapat lebih menambahkan jumlah respondennya, dan juga menambahkan variabel lainnya, memberikan penelitian intervensi yang tepat untuk mengatasi kejadian hipertensi.
2. Bagi Instansi Pendidikan
Penelitian yang telah dilakukan diharapkan mampu memberi kontribusi dan ilmu yang baik seperti memperluas wawasan dan ilmu perihal strategi dalam mengatasi risiko kejadian hipertensi.
3. Bagi Petugas Kesehatan dan Keperawatan
Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi tenaga kesehatan agar dapat merencanakan asuhan keperawatan yang tepat dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

4. Bagi Responden dan Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengatur gaya hidup, pola istirahat dan Kualitas tidur mengingat bahwa hal tersebut jika dianggap sepele akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan dikemudian hari.



KEPUSTAKAAN

- (AHA), A. H. A. (2016), *Managing Stress to Control High Blood Pressure*. Available at: <https://www.heart.org/En/Healthtopics/High-Blood-Pressure/Changes-You-Can-Make-to-Manage-High-Bloodpressure/Managing-Stress-to-Control-High-Blood-Pressur>.
- Agustin D (2017) *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Tidur pada Pekerja Shift di PT Krakatua Tirta Industri Cilegon*. Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia.
- Al, G. et (2015) 'Americans Journal', *Sleep Duration dan Risk for Hypertension in Woman: Results from The Nurses' Health Study.*, 20 No.7, pp. 903–9011.
- Amir (2013) *Gangguan Tidur Pada Lansia Cermin Dunia Kedokteran*. Jakarta: FKUI.
- Andera Grillo, Lucia Salvi, Paolo Caruzzi, Paolo Salvi, Gianfranco Parati (2019), *Sodium Intake and Hypertension*, 9. doi: 10.3390/nu11091970.
- Asmadi (2013) *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Ayukhaliza (2020) *Faktor risiko hipertensi di wilayah pesisir (studi pada wilayah kerja upkd puskesmas tanjung tiram. skripsi*.
- Bustan M.N (2016) *Epodemologi Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2020) 'No Title', *High Blood Pressure. Know Your Risk for High Blood Pressure. Centers for Disease Control and Prevention*. Available at: https://www.cdc.gov/Bloodpressure/Risk_factors.Htm.
- Czeisler C, K. S. (2013) *The Human Circadian Timing System and Sleep-Wake regulation*. 3rd edn. Edited by sleep medicine. London: WB Saunders.
- Erizka Yulinda (2017), *Hubungan Shift Kerja Dengan Terjadinya Kelelahan Pada Security Sun PLAZA MEDAN*. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/14551-ID-hubungan-shift-kerja-dengan-terjadinya-kelelahan-pada-security-sun-plaza-medan-t.pdf>.

- Febby, F. R. (2021), *Perbedaan Kualitas Tidur Satpam Shift Dan Karyawan Parkir Non Shift Universitas Muhammadiyah Surakarta Disusun*. Available at: http://eprints.ums.ac.id/92493/2/NASKAH_PUBLIKASI.pdf.
- Gangwisch, J. . (2013) 'Sleep Duration dan Risk for Hypertension in Woman: Results from The Nurses' Health Study', *American Journal of Hypertension*, 26.
- Gryglewska, J. . (2015) *Consequences of Sleep Deprivation*. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*. 9th edn. Edited by G. A. . and J. E. Hall. Jakarta: EGC.
- Hafiez Amanda (2017) 'Hubungan Kualitas Tidur Dengan Tingkat Kekambuhan Hipertensi Pada Lansia Di Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang', *Nursing News*, vol 3 no.3.
- Hidayat, A. (2015) *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika.
- Ignatavicus, W. & R. (2017) *No Title, medical surgical: concepts for interprofesional collaborative care (9ted)*. St.louis: Elsevier Inc.
- Imas, M., & T, N. A. (2018) *Bahan ajar rekam medis dan informasi kesehatan (rmik) metodologi penelitian kesehatan*. Kementrian kesehatan republik indonesia.
- Inun M (2016) *Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswi Program Studi S1 Fisioterapi Angkatan 2013 dan 2014, Hubungan Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah Pada Mahasiswi Program Studi S1 Fisioterapi Angkatan 2013 dan 2014*. makassar: Universitas Hasanuddin.
- Imam an-nawawi (2010) *Syarah Shahih Muslim*. 5th edn. jakarta: Pustaka Azzam.
- Irene Megawati Umbas (2019) 'Hubungan Antara Merokok Dengan Hipertensi di Puskesmas Kawangan', *Jurnal Keperawatan*, 7 no.1.
- Javaheri, S. *et al.* (2008) 'Sleep Quality and Elevated Blood Pressure in Adolescents', *Circulation*, 118(10), pp. 1034–1040. doi:

10.1161/CIRCULATIONAHA.108.766410.

- Jayanti I , Wiradny ani NK, A. (2017), *.Hubungan Pola Konsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kejadian Hipertensi Pada Tenaga Kerja Pariwisata di Kelurahan Legian. Jurnal Gizi Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6 NO 1, pp. 65–70. Available at: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jgi/article/viewFile> ;2017.
- Joint National Commite 8 (JNC 8) (2015) *Hypertension the Silent Killer*. Available at: http://cdn.ymaws.com/www.aparx.org/resource/resmgr/CEs/CE_Hypertension_e_Silent_K.pdf.
- Katsir (2005) *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir Jilid VI)*, terj. M. Abdul Ghoffar. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'I.
- Kementerian Agama (Kemenag) (2022) *Qur'an Kementrian agama*. Elevated from Kementrian Agama website: <https://quran.kemenag.go.id/>
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia. (2019) *Hipertensi Si Pembunuh Senyap*. Available at: <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-hipertensi-si-pembunuh-senyap.pdf>.
- Kementerian kesehatan Republik Indonesia (2015) 'No Title', in *Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan, Republik Indonesia*.
- Kozier, B. (2013) *Fundamental Keperawatan : Konsep , Proses, & Praktik*. 7th edn. Jakarta: Selemba Medika.
- M.BLACK JOYCO, J. H. H. (2014) *Keperawatan Medikal Bedah (8th ed.)*. ELSEVIER,CV.
- Magfirah (2017), *Hubungan antara Kualitas Tidur dengan Tekanan Darah pada Mahasiswi Program Studi S1 Fisioterapi angkatan 2013 dan 2014 di Universitas Hasanuddin*, (skripsi. Program Studi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar 2016).
- Martini (2018) '*Pola Tidur Buru Meningkatkan Risiko Hipertensi*', *jurnal MKMI*, 14. Available at: <https://core.ac.uk/download/pdf/230424069.pdf>.
- Muh Anwar (2015), *The Role of Angiotensin Converting Enzim Gene on The Fitness Level And Dynamica Of Response The Heart Rate And Blood Pressure Loading Test On Athletes*. Disertasi.

- NIH (2020) '*Hypertension - Genetics Home Reference. NIH U.S. National Library of Medicine. Retrieved from*'. Available at: <https://ghr.nlm.nih.gov/primer/inheritance/familyhistory>.
- Notoatmodjo (2018) *Metodologi Penelitian Kesehatan. Edisi Kedua*. Jakarta: Rinneka Cipta dika.
- Nursalam (2016) *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Selemba Medika.
- Novitri, S., Prasetya, T. and Artini, I. (2021) '*Hubungan Kualitas Tidur Dan Pola Makan (Diet Dash) Dengan Kejadian Penyakit Hipertensi Pada Usia Dewasa Muda Di Puskesmas Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*', *Jurnal Medika Malahayati*, 5(3), pp. 154–162. doi: 10.33024/jmm.v5i3.4208.
- Nor Kholish Reefani (2014) *Pola Hidup dan Tidur Sehat Ala Rasulullah Saw*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pinto, E. (2013) '*Blood Pressure and Ageing. Postgrad Med J*', 83, pp. 109–114. Available at: <https://doi.org/doi:10.1136/pgmj.2006.048371>.
- Potter, P.A & Perry, A. . (2010) *Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik*. 7th edn. Jakarta: Selemba Medika.
- Potter, P.A & Perry, A. . (2010) *Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik Volume 1*. 7th edn. Jakarta: Selemba Medika.
- Prihatini S, P. D. & J. E. (2016) '*asupan natrium penduduk indonesia : Analisis data survei konsumsi individu (SKMI)*', *asupan natrium penduduk indonesia : Analisis data survei konsumsi individu (SKMI)*, 1, pp. 15–24.
- Rahmadhani, R. (2014) '*Analisis hubungan kadar kolestrol total dan (Riskesdas), R. kesehatan dasar (2018) 'No Title', (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018)*. Available at: http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil Riskesdas 18.pdf.
- lingkar perut dengan kejadian hipertensi pada pegawai Uin Alauddin Makasssar*, 7.
- Roshifanni, S. and Timur, J. (2017) '*(Studi di Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya)*', (December 2016), pp. 408–419. doi: 10.20473/jbe.v4i3.

- Rusdiana (2019) 'Hubungan Kualitas Tidur Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Guntung Payung', *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, vol.4. Available at: <https://journal.stikessuakainsan.ac.id/index.php/jksi/article/view/182>.
- Sadock, K. (2014) *Buku Ajar Psikiatri Klinis. 2nd ed. Buku Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Smeltzer S.C (2015), *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC.
- Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabetha CV.
- Suryati (2012) 'Faktor Risiko Hipertensi. Jurnal Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.'
- Triyanto, E. (2014) *Pelayanan Keperawatan bagi Penderita Hipertensi Secara Terpadu*. Yogyakarta: graha ilmu.
- Wahyu Ikhwan Nanda Mukhlis (2018) , *Pengaruh paparan kebisingan akut terhadap tekanan darah dan denyut nadi pada pekerja pabrik kayu PT MerokokJember,(skripsi)*. Available at: [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/85615/WAHYU IKHWAN NANDA MUKHLISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/85615/WAHYU%20IKHWAN%20NANDA%20MUKHLISH.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
- Weber,M.(2019), *clinical practice guidelines for the management of hypertension in the community a statement by the american society of hypertension and the international society hypertension . the journal of clinical hypertension*, 16 No 1.
- World Health Organization (2019), (Hypertension). Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension>.
- Wulaningsih, I., Suryant, H. and Darah, T. (2019) 'Correlation Of Sleeping Quality With Blood Pressure In Elderly In The Continuous Social Service Unit Of Pucang Gading Age , Semarang City', 1(2), pp. 70–77.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, light green emblem. It features a central shield with a yellow and red design, surrounded by a stylized archway and a base. The word "LAMPIRAN" is written in bold, black, serif capital letters across the center of the logo.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 1

LEMBAR PERNYATAAN PENELITI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Richzan
NIM : 70300118034
Alamat : Jl. Karaeng Makkawari
No. Telepon : 085394185953

Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, bermaksud akan melaksanakan penelitian dengan judul "**Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security di Kampus UIN Alauddin Makassar**". Penelitian ini merupakan bagian persyaratan untuk program pendidikan sarjana saya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang dapat merugikan bagi responden. Responden penelitian hanya akan mengisi lembar kuesioner yang membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit untuk proses pengisiannya. Kerahasiaan semua informasi akan terjaga dan dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian semata. Untuk itu saya memohon kesediaannya menjadi responden dalam penelitian saya. Atas kesediaannya sebagai responden saya ucapkan terima kasih.

Gowa, 28 April 2022

Peneliti,

Muhammad Richzan

Lampiran 2 :**LEMBAR PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN (PSP)
(INFORMED CONSENT)**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Usia :

No. Hp :

Alamat :

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai penelitian tentang Hubungan Kualitas Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security Di Kampus Uin Alauddin Makassar. dengan ini saya menyatakan **BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA** (coret yang tidak perlu) untuk ikut serta berpartisipasi dengan menjadi subjek penelitian. Dengan pernyataan persetujuan ini saya perbuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan.

Samata,.....,.....2022

Yang membuat
pernyataan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 3 : Kuesioner Penelitian

The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) Hubungan Kualitas Tidur dengan Risiko Kejadian Hipertensi pada Pada Security di Kampus UIN Alauddin Makassar

PETUNNJK UMUM :

1. Isi setiap pertanyaan dengan jelas dan lengkap.
2. Untuk setiap soal pilihan berilah tanda centang (√) pada tempat yang sudah disediakan.
3. Untuk soal isian, jawaban ditulis ditempat yang telah disediakan.
4. Jika saudara ingin mengganti jawaban, coret jawabann awal.
5. Jika ada hal yang kurang jelas, saudara bisa menanyakan kepada peneliti.

I. Pengkajian Identitas Responden

Nama Inisial Responden:

Umur :

Jenis Kelamin : pria wanita

Riwayat Merokok : iya tidak

II. Indeks Kualitas Tidur Pittsburgh

Pertanyaan berikut ini berhubungan dengan kebiasaan tidur hanya selama 1 minggu terakhir saja. Jawaban anda harus menunjukkan pengulangan yang paling tepat dari sebagian siang dan malam hari pada minggu lalu. Saya berharap anda menjawab semua pertanyaan **nomor 1-4** jawaban dengan angka, sedangkan dimana untuk pertanyaan **5-9 cukup dengan tanda (√)** pada salah satu kolom pilihan jawaban.

1. Selama satu minggu terakhir ,Pada jam berapa anda biasanya tidur malam?
.....
2. Selama satu minggu terakhir, Berapa lama anda biasanya baru bisa tertidur tiap malam?
.....
3. Selama satu minggu terakhir, Pada jam berapa anda biasanya bangun pagi ?
.....
4. Selama satu minggu terakhir, Berapa lama anda tidur di malam hari ?
.....

5	Seberapa sering masalah-masalah dibawah ini yang mengganggu tidur anda?	Tidak Pernah (0)	1x seminggu (1)	2x seminggu (2)	≥3x seminggu (3)
A	Tidak mampu tertidur selama 30 menit sejak berbaring				
B	Terbangun terlalu malam atau terlalu dini				
C	Terbangun untuk ke kamar mandi				
D	Tidak mampu bernafas denganleluasa				
E	Batuk atau mengorok				
F	Kedinginan dimalam hari				
G	Kepanasan dimalam hari				
H	Mimpi buruk				
I	Merasa nyeri				

J	Alasan lain jelaskan:				
6	Seberapa sering anda menggunakan obat tidur				
7	Seberapa sering anda mengantuk ketika melakukan aktivitas di siang hari				
		Tidak ada antusias (0)	Kecil (1)	Sedang (2)	Besar (3)
8	Seberapa besar antusias anda ingin menyelesaikan masalah yang dihadapi				
		Sangat baik (0)	Baik (1)	Kurang (2)	Sangat kurang (3)
9	Bagaimana kualitas tidur anda selama seminggu yang lalu				

Hasil :

1. Jumlah score :
2. Tekanan darah : Sistolik.....mmHg
Diastolik.....mmHg

Lampiran 6: Hasil Uji SPSS

Frequency Table

		Usia			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	17-25	1	2,4	2,4	2,4
	26-35	8	19,0	19,0	21,4
	36-45	21	50,0	50,0	71,4
	46-58	12	28,6	28,6	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	laki-laki	40	95,2	95,2	95,2
	perempuan	2	4,8	4,8	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

		Riwayat merokok			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	merokok	27	64,3	64,3	64,3
	tidak merokok	15	35,7	35,7	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

		Kualitas Tidur			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	buruk	36	85,7	85,7	85,7
	baik	6	14,3	14,3	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

		TD			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Hipertensi	29	69,0	69,0	69,0
	Tidak hipertensi	13	31,0	31,0	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

Kualitas Tidur * Tekanan Darah Crosstabulation

		TD			
			Hipertensi	Tidak hipertensi	Total
Kualitas Tidur	buruk	Count	28	8	36
		% within TD	96,6%	61,5%	85,7%
	baik	Count	1	5	6
		% within TD	3,4%	38,5%	14,3%
Total		Count	29	13	42
		% within TD	100,0%	100,0%	100,0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8,987 ^a	1	,003		
Continuity Correction ^b	6,355	1	,012		
Likelihood Ratio	8,427	1	,004		
Fisher's Exact Test				,007	,007
Linear-by-Linear Association	8,773	1	,003		
N of Valid Cases	42				

a. cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,86.


b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kualitas Tidur (buruk / baik)	7,000	1,078	45,437
For cohort TD = Hipertensi	2,333	,743	7,332
For cohort TD = Tidak hipertensi	,333	,145	,767
N of Valid Cases	42		



Lampiran 7 : surat keterangan layak Etik


KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No. C.93/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Muhammad Richan
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title
**"Hubungan kualitas tidur dengan risiko kejadian hipertensi pada security di wilayah kerja
 Kampus UIN Alauddin Makassar"**


***"The Relationship Between Sleep Quality And The Risk Of Hypertension In Security In The
 Working Area Of The UIN Alauddin Makassar Campus"***

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Emah, 3) Pemerataan Betsin dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.


Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 08/06/2022, sampai dengan tanggal 08/06/2023.

This declaration of ethics applies during the period 06/08/2022 until 06/08/2023

June 8, 2022
 Professor and Chairperson,

 Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 12: Surat pengambilan data awal


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 41 Makassar
 Kampus II : Arah. H.M. Yusuf Limpo No. 35 Komang Polongyobwa (P411) 841879 Fax. (0411) 8221400
 Email: fak.un-alauddin.ac.id

Nomor : B-5774 /Un.06/FKIK/PP.00.9/02/2022 Gowa, 2 Februari 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth :
Kepala Bagian Security UIN Alauddin Makassar
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Muhammad Richzan
 NIM : 70300118034
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Keperawatan
 Semester : VII (Tujuh)
 Data : Jumlah Populasi Security

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :


"Hubungan Pola Tidur Dengan Risiko Kejadian Hipertensi Pada Security di Wilayah Kerja Kampus UIN Alauddin Makassar"

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk meminjamkan Laboratorium.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.


Wassalam

s.d. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Wakil Dekan Bidang Akademik


 Gemy Nadiyah Handayani

Tembusan:
 - Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)

Lampiran 13: Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 21 Juni 2022

Kepada Yth.
 Wilayah Kerja Kampus UIN Alauddin Makassar

Nomor : 503/710/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 3345/S.01/PTSP/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RICHZAN**
 Tempat/Tanggal Lahir : **Manti / 17 Juli 2001**
 Nomor Pokok : **70300118054**
 Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
 Program Studi : **Keperawatan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
 Alamat : **Jl. Karang Makassar**


Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lemban di wilayah/terpadu Bopok/Ibu yang berjudul **"HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN RISIKO KEJADIAN HIPERTENSI PADA SECURITY DI WILAYAH KERJA KAMPUS UIN ALAUDDIN MAKASSAR"**

Selama : **17 Juni 2022 s/d 17 Juni 2022**
 Pengikat :

Selubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Meneksi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.




Ditandatangani secara elektronik oleh :

BUPATI GOWA
REPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
W. INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos.M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 NIP : 25721025 198303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

1. Dokumen ini diterbitkan secara elektronik (tidak terdapat tanda tangan fisik) yang menjadi tanggung jawab Pustakan
2. Dokumen ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum apabila yang diterbitkan oleh 0107-01021



Bupati
Wilayah Kerja
Kampus UIN Alauddin Makassar

Lampiran 14 : Surat izin Penelitian Dari Kampus UIN Alauddin Makassar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I - Jalan Sultan Alauddin No. 53 Makassar
 ex II - Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400
 Website : www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-1501 /Lh.06/PP.07/06/2022 Gowa, 20 Juni 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Biro Adm. Umum, Perencanaan & Keuangan UIN Alauddin Makassar
 Di
 Gowa

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 3385/S.01/PTSP/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

N a m a : MUHAMMAD RICHZAN
Nomor Pokok : 70300118034
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : J. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa

Disetujui dan diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi :

"HUBUNGAN KUALITAS TIDUR DENGAN RESIKO KEJADIAN HIPERTENSI PADA SECURITY DI WILAYAH KERJA KAMPUS UIN ALAUDDIN MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Juni sampai dengan 17 Juli 2022

Sehubungan maksud tersebut, dimohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi fasilitas dan informasi serta data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam



H. Masruki Barton
 Rektor UIN Alauddin Makassar
 Kepala Biro AAKK

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kedokteran UIN Alauddin Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 15: Dokumentasi penelitian



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi bernama lengkap Muhammad Richzan, merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari bapak Munir dan ibu Rukmini. Penulis dilahirkan di Mambi, Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 17 Juli 2001. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN 001 Mambi pada tahun 2006-2011, selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Mambi pada tahun 2012-2015, selanjutnya penulis menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Polewali Mandar pada tahun 2015-2018. Setelah menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan strata (S1) Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama Menempuh pendidikan di kampus penulis juga aktif di lembaga internal kampus yaitu HMJ Keperawatan sebagai sebagai anggota Divisi Informasi dan Komunikasi 2019-2020. Dengan usaha dan do'a mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar sarjana Keperawatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR