

**HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA
DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD SADDAM

NIM: 70600118025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saddam
NIM : 70600118025
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 02 September 1998
Jurusan : Pendidikan Dokter
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Kaballangang, Pinrang
Judul : Hubungan Antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar”.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Agustus 2022

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
MAKASSAR



Muhammad Saddam

NIM: 70600118025

PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN

JUDUL : HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI
RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL
KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA KEDOKTERAN

MAKASSAR, 12 AGUSTUS 2022

PEMBIMBING 1



dr. Saharuddin, M.Kes.

PEMBIMBING 2



dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Antara Kecemasan Dengan Kejadian Preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar**” yang disusun oleh Muhamad Saddam, NIM 70600118025, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 12 Agustus 2022
16 Muharram, 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. (.....)

Sekretaris : Dr. dr. Rosdianah, M.Kes. (.....)


Pembimbing I : dr. Saharuddin, M.Kes. (.....)

Pembimbing II: dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes. (.....)

Penguji I : dr. Rini Fitriani, M.Kes. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. M. Galib, M., M.Ag. (.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. berkat petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “**Hubungan Antara Kecemasan Dengan Kejadian Preeklamsia Di RSKD Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar**”. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan proposal ini terdapat banyak kekurangan, namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan proposal ini dan berharap semoga apa yang telah ditulis dalam proposal ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Selesaiannya penyusunan proposal ini tidak lepas dari bimbingan dari berbagai pihak dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan segenap rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada kedua orang tua yaitu H. Mustari dan Hj. Andi Muni dan seluruh rekan saya yang ikut berperan dalam membantu penyusunan proposal ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, rasa hormat dan penghargaan atas segala bantuan dan dukungannya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
3. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto, M.Kes., Sp.JP selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah


memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

4. Ayahanda dr. Saharuddin, M.Kes. selaku pembimbing I dan dr. Purnamaniswaty Yunus, M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
5. Penguji I dan penguji II, yang telah meluangkan waktunya terkait perbaikan penyusunan skripsi baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang tepat.
6. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penyusun.
7. Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar beserta seluruh staf rumah sakit yang telah membantu.
8. Sahabat-sahabat yang selalu memotivasi, dan memberi dorongan demi terselesaikannya proposal ini.
9. Teman-teman F18RON3KTIN angkatan 2018.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan proposal ini, penulis menghanturkan doa kepada Allah Swt. Semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam penyelesaian proposal ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 17 Agustus 2022



Muhammad Saddam

NIM 70600118025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERETUJUAN UJIAN HASIL.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7

E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	12
G. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Konsep Dasar Preeklamsia.....	14
B. Kecemasan	20
C. Hubungan Kecemasan Dengan Preeklamsia.....	25
D. Kerangka Teori.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Desain Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	34
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	34
E. Cara Pengumpulan Data	35
F. Instrumen Penelitian	36

G. Kerangka Konsep	37
H. Kerangka Kerja.....	38
I. Langkah Pengolahan Data	39
J. Analisis Data	40
K. Etika Penelitian.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hasil.....	42
B. Pembahasan.....	47
C. Keterbatasan Penelitian.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	10
Tabel 4.1 Tabel Karakteristik Data Ibu di Rumah Sakit Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2022.....	43
Tabel 4.2 Hubungan Antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklamsia di Rumah Sakit Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2022.....	46



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori	33
Bagan 3.1 Kerangka Konsep	37
Bagan 3.2 Kerangka Kerja.....	38
Bagan 4.1 Distribusi Frekuensi Kecemasan Pada Preeklamsia.....	43
Bagan 4.2 Distribusi Frekuensi Kecemasan Pada Tidak Preeklamsia.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Layak Etik.....	60
Lampiran 2 Surat izin Penelitian.....	61
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	62
Lampiran 4 Surat Selesai Penelitian.....	63
Lampiran 5 Hasil Pengolahan Data SPSS.....	64
Lampiran 6 Persetujuan <i>Informed Consent</i>	68
Lampiran 7 Kuesioner Penelitian.....	69



Hubungan Antara Kecemasan Dengan Kejadian Preeklamsia
Muhammad Saddam¹, Saharuddin², Purnamaniswaty Yunus³, Rini Fitriani⁴,
M. Galib⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: muhsaddamm@gmail.com

Telp: 085342415772

ABSTRAK

Latar belakang: Preeklamsia masih menjadi tiga besar penyebab kematian ibu dalam bidang obstetri. Preeklamsia menduduki peringkat dua sebagai penyebab kematian langsung pada ibu hamil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecemasan merupakan unsur kejiwaan yang menggambarkan perasaan, keadaan emosional yang dimiliki oleh seseorang pada saat menghadapi kenyataan atau kejadian dalam hidupnya. Hal ini meningkatkan eksresi hormon vasoaktif atau *neuroendokrin* lainnya yang dapat meningkatkan risiko hipertensi dan juga memicu perubahan pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya preeklamsia.

Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analitik korelatif, dengan pendekatan cross-sectional dengan jumlah sampel 93 responden (1:2) yang dikumpulkan secara Purposive sampling.

Hasil: Hasil uji statistik diperoleh $P\text{-value} \leq 0,05$ dan $PR = 4,646$ (95% CI 1,824-7,288).

Kesimpulan: Pada penelitian ini terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

Kata kunci: Kecemasan; preeklamsia

The Relationship Between Anxiety and Occurrences of Preeclampsia at Makassar Regional Hospital of Mother and Child

Muhammad Saddam¹, Saharuddin², Purnamaniswaty Yunus³, Rini Fitriani⁴, M. Galib⁵

^{1,2,3,4,5} Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
E-mail : ¹muhsaddamm@gmail.com

Abstract

Preeclampsia is currency in the top three as the major cause of maternal death in obstetrics. Preeclampsia even ranks second as a direct cause of death in pregnant women, and this number gradually grows every year. Anxiety is a psychological aspect that describes the emotions of a person characterized by feelings of tension and worried thoughts, especially in facing the life's problems. This feeling of anxiety may increase the excretion of vasoactive hormones or neuroendocrine hormones that might increase the risk of hypertension and trigger changes in blood vessels which may cause preeclampsia. The major purpose of this study was to examine the relationship between anxiety and occurrences of preeclampsia. The methodological approach used in this research was correlative analytic by using a cross sectional approach. The samples of this research consisted of 93 respondents (1:2) selected by a purposive sampling method. The results of the statistical data revealed that P value 0.05 and PR = 4.646 (95% CI 1.824-7.288). This study concluded that there was a significant relationship between anxiety and occurrences of preeclampsia at Makassar Regional Hospital of Mother and Child.

Key words: Anxiety, Preeclampsia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan satu dari sekian indikator kesuksesan pelayanan di suatu negara. Tiap harinya, terdapat kurang lebih 830 wanita yang meninggal disebabkan oleh masalah yang dapat dicegah berkaitan dengan kehamilan dan persalinan. 99% di seluruh kematian ibu terjadi pada negara yang berkembang. Terdapat kurang lebih 830 wanita meninggal karena komplikasi kehamilan atau persalinan di seluruh dunia setiap harinya. Diantara target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ialah untuk mengurangi rasio kematian ibu yang melakukan persalinan secara global menjadi dibawah dari 70 per 100.000 kelahiran, dengan harapan tidak ada lagi negara yang memiliki angka kematian diatas dari dua kali rata-rata global. Komplikasi utama yang mengakibatkan hampir 75% keseluruhan kematian ibu adalah perdarahan hebat sesudah persalinan seperti adanya infeksi, tekanan darah yang tinggi selama kehamilan (preeklamsia dan eklamsia), komplikasi karena persalinan, serta aborsi yang tidak sesuai prosedur. (WHO, 2018).

Preeklamsia menjadi penyebab ke tiga besar kematian ibu dalam bidang obstetri. Preeklamsia berada pada peringkat dua sebagai alasan kematian langsung pada ibu hamil dan mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada beberapa penelitian, kematian ibu karena preeklamsia disebabkan oleh adanya faktor risiko seperti umur ibu, jumlah paritas, jarak kehamilan, kehamilan multi/ ganda, riwayat preeklamsia sebelumnya, riwayat keturunan, riwayat penyakit sebelumnya diantaranya diabetes, hipertensi dan penyakit ginjal juga beberapa faktor seperti keadaan status sosial ekonomi, riwayat pemeriksaan ANC dan perasaan cemas. (Purwati dan Alfi Noviyana, 2020).

Terdapat lebih dari 4 juta ibu hamil mengalami preeklamsia setiap tahunnya. Setiap tahun, diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 70.000 wanita meninggal disebabkan oleh

preeklamsia serta 500.000 bayi meninggal. Preeklamsia merupakan penyebab 15– 20% kematian ibu hamil di seluruh dunia serta penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada janin (Raghupathy, 2013).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, kematian pada ibu hamil di tahun 2018 yang tercatat terdapat sebanyak 139 ibu atau 92.28 per 100.000 kelahiran hidup. Yang terdiri dari kematian pada ibu hamil sebanyak 23 ibu (16,55%), kematian ibu bersalin sebanyak 47 (33,81%), dan kematian pada ibu nifas sebanyak 69 orang (49,64%). (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020).

Adapun jumlah kematian ibu tahun 2019 yang dilaporkan sebanyak 144 orang atau 94.29 per 100.000 kelahiran hidup dan diantaranya terdapat 41 ibu yang meninggal disebabkan karena preeklamsia/eklampsia. Terdiri dari kematian ibu hamil 31 orang (22%), kematian ibu bersalin 36 orang (25%), kematian ibu nifas 77 orang (53%). (Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020).

Data yang didapatkan dari Rekam Medik RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar pada tahun 2019 jumlah ibu hamil yang dirawat diruangan nifas sebanyak 958 dan yang terdiagnosa preeklamsia sebanyak 67 orang dan pada tahun 2020 jumlah ibu hamil yang dirawat di ruangan nifas sebanyak 1176 orang dan yang terdiagnosa preeklamsia sebanyak 59 orang, (Rekam Medik RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar).

Kecemasan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya preeklamsia, kecemasan ialah sensasi takut yang terus menerus tapi hanya sebatas perasaan saja dan tidak nyata. Gejala cemas berbeda-beda setiap orang. Adapun gejalanya yaitu gelisah, pusing, dada berdebar, tremor/gemetar dan sebagainya. Kecemasan dapat dirasakan oleh setiap orang apabila mengalami tekanan atau perasasan mendalam yang menyebabkan masalah psikiatri dan dapat meningkat dalam kurun waktu yang lama (Purwati dan Alfi Noviyana, 2020).

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa ibu hamil dengan gangguan kecemasan berkaitan dengan peningkatan risiko mengalami preeklamsia. Depresi atau kecemasan antenatal meningkatkan eksresi hormon vasoaktif atau neuroendokrin lainnya yang dapat meningkatkan risiko hipertensi dan juga memicu perubahan pembuluh darah dan

peningkatan resistensi arteri uterine yang mana hal tersebut ditemukan pada kasus preeklamsia (Purwati and Alfi Noviyana, 2020).

Upaya untuk meminimalkan kematian ibu yang diakibatkan preeklamsia adalah dengan cara Antenatal care (ANC) secara rutin. Tenaga kesehatan melakukan deteksi dini pada ibu hamil melalui ANC terpadu dan memberikan informasi pada ibu hamil agar selalu rutin dalam melakukan ANC. Diharapkan tanda gejala preeklamsia diketahui sedini mungkin sehingga kematian akibat preeklamsia dapat menurun (Purwati and Alfi Noviyana, 2020).

Dalam Q.S. Ar-Rad ayat 8 Allah SWT berfirman:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ (الرعد/13: 8)

Artinya: “Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.”

Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 6 ialah membuktikan kekuasaan Allah tentang kandungan. Allah membentuk sperma untuk membuahi ovum yang kemudian akan menempel di dinding rahim yang membentuk jenis kelamin, berat badan dan bentuk dari janin. Allah juga mengetahui apa yang kurang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran.

Dalam Q.S. Al-A'raf Ayat 189 Allah SWT juga berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ قَلَمًا أَنْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهِ رَبِّهَمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشُّكْرَيْنِ ۝ (الاعراف/7: 189)

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari jenis yang

satu, dan dari jenis yang satu itu diciptakan pasangannya, maka hiduplah mereka berpasangan pria-wanita (suami-isteri) dan tenteramlah dia dengan isterinya itu. Hidup berpasangan suami-isteri merupakan tuntutan kodrati manusia rohaniyah dan jasmaniah. Bila seseorang telah mencapai usia dewasa, timbullah keinginan untuk hidup berpasangan sebagai suami-isteri, dan dia akan mengalami keguncangan batin apabila keinginan itu tidak tercapai. Sebab dalam berpasangan suami-isteri itulah terwujud ketenteraman. Ketenteraman tidak akan terwujud dalam diri manusia diluar hidup berpasangan suami-isteri. Maka tujuan kehadiran seorang isteri pada seorang laki-laki di dalam agama Islam ialah menciptakan hidup berpasangan itu sendiri. Islam mensyariatkan manusia agar mereka hidup berpasangan suami-isteri, karena dalam situasi hidup demikian itu manusia menemukan ketenteraman dan kebahagiaan rohaniyah dan jasmaniah.

Bila kedua suami-isteri itu berkumpul, mulailah isterinya mengandung benih. Saat permulaan dari pertumbuhan benih itu terasa ringan. Pertama-tama terhentinya haid dan selanjutnya benih itu terus berproses, perlahan-lahan. Maka ketika kandungannya mulai berat, ibu-bapak memanjatkan doa kepada Allah agar keduanya dianugerahi anak yang saleh, sempurna jasmani, berbudi luhur, cakap melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia. Kedua, isteri itu berjanji akan mewajibkan atas dirinya sendiri untuk bersyukur kepada Allah karena menerima nikmat itu dengan perkataan, perbuatan dan keyakinan.

Dalam QS. As-Saffat Ayat 100 Allah SWT berfirman :

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ١٠٠ (الصَّافَّاتِ/37: 100)

Artinya : “ Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang shalih.”

Ayat ini mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim dalam perantauan memohon kepada Tuhan agar dianugerahi seorang anak yang saleh dan taat serta dapat menolongnya dalam menyampaikan dakwah dan mendampingi dalam perjalanan dan menjadi kawan dalam kesepian.

Kehadiran anak itu sebagai pengganti dari keluarga dan kaumnya yang ditinggalkannya. Permohonan Nabi Ibrahim ini diperkenankan oleh Allah. KEPADANYA disampaikan berita gembira bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang

anak laki-laki yang punya sifat sangat sabar.

Sifat sabar itu muncul pada waktu balig. Karena pada masa kanak-kanak sedikit sekali didapati sifat-sifat seperti sabar, tabah, dan lapang dada. Anak remaja itu ialah Ismail, anak laki-laki pertama dari Ibrahim, ibunya bernama Hajar istri kedua dari Ibrahim. Putra kedua ialah Ishak, lahir kemudian sesudah Ismail dari istri pertama Ibrahim yaitu Sarah. (Kementrian Agama RI)

Telah ditemukan di atas bahwa salah satu akibat terjadinya morbiditas dan mortalitas ibu disebabkan karena preeklamsia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Hubungan Antara Kecemasan Dengan Kejadian Preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar”. Dan apabila terdapat kasus preeklamsia yang disebabkan oleh kecemasan pada ibu hamil perlu adanya kewaspadaan untuk terjadinya eklamsia sehingga kita dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil akibat preeklamsia.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

C. Hipotesis

1. Hipotesis nol (H_0)

Tidak ada hubungan kecemasan dengan kejadian preeklamsia pada di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

2. Hipotesis alternatif (H_a)

Terdapat hubungan kecemasan dengan kejadian preeklamsia pada di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.



D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional


NO	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Kecemasan	Perasaan khawatir pada diri seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.	Kuesioner Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)	Cemas : Skor ≥ 14 Tidak cemas : Skor < 14	Nominal

Tabel 1.1. Definisi Operasional (lanjutan)

NO	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Dependen					
2.	Preeklamsia	Hipertensi yang timbul setelah usia kehamilan 20 minggu disertai dengan proteinuria.	Melihat status dan biodata pasien pada rekam medis.	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data rekam medis dengan diagnosis Preeklamsia dan Preeklamsia berat. • Seluruh diagnosis Preeklamsia dan Preeklamsia Berat akan dikategorikan sebagai Preeklamsia 	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar untuk mengetahui Hubungan antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dengan dengan melihat satu rekam medik pasien yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dan kemudian melakukan pengisian kuesioner.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2. Kajian Pustaka

NO	Peneliti	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
1.	(KARA and NAZİK, 2021)	Effects of anxiety and social support levels on the prenatal attachment of pregnant women with preeclampsia	Jenis penelitian ini adalah case control	Jumlah sampel yang digunakan 101 Preeklamsia dan 210 control	Data dikumpulkan dengan menggunakan formulir informasi pribadi, Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS), State-Trait Anxiety Inventory (SAI-TAI), dan Prenatal Attachment Inventory (PAI).	Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu hamil preeklamsia mengalami lebih banyak kecemasan dan membutuhkan lebih banyak dukungan sosial.

NO	Peneliti	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
2.	Alfi Noviyana dan Purwati (2020)	Hubungan Kecemasan dan Kejadian Pre Eklamsia di RSUD dr. R. Goeteng Tarunadibrata Purbalingga	Jenis penelitian ini adalah analitik korelatif dengan desain <i>case control</i> .	36 Sampel	Kuesioner dan data rekam medis	Tidak ada hubungan secara statistik antara kecemasan dan kejadian preeklamsia di RSUD Goeteng Tarunadibrata Purbalingga
3.	(Kordi <i>et al.</i> , 2017)	Anxiety during Pregnancy and Preeclampsia: A Case-Control Study	Jenis penelitian ini adalah analitik obeservasional dengan desain <i>case control</i> .	Jumlah sampel 150 ibu yang preeklamsia dan 150 ibu dengan diagnosis normal	Kuesioner dan data rekam medis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemasan meningkatkan risiko terjadinya preeklamsia.
4.	Lidya Amal Huda, dkk. (2020)	The Relationship Family Emotional Support With Anxiety of Preeclamsia Pregnant Mother	Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan korelasional dengan rancangan	Jumlah sampel sebanyak 57 ibu hamil preeklamsia.	Menggunakan kuisisioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecemasan pada ibu hamil preeklamsia sebagian besar mengalami kecemasan ringan.

NO	Peneliti	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
			cross-sectional.			

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan yang ada tentang kejadian preeklamsia dalam kehamilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti tentang hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia, serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

b. Bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi tempat penelitian

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program upaya pencegahan preeklamsia.

3. Manfaat Komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang kecemasan dan preeklamsia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Preeklamsia

1. Definisi Preeklamsia

Preeklamsia adalah timbulnya tekanan darah tinggi (hipertensi) yang disertai dengan adanya protein dalam air kemih (proteinuria) dan edema yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu sampai dengan akhir minggu pertama setelah melahirkan (Saito, 2018). Preeklamsia adalah komplikasi kehamilan dan merupakan salah satu penyebab utama dari kesakitan dan kematian ibu hamil di Indonesia. Preeklamsia ditandai dengan peningkatan tekanan darah (hipertensi), ditemukannya protein dan albumin dalam urine dan edema. Preeklamsia dapat terjadi pada sekitar 3% sampai 5% (Tolinggi, Mantulangi and Nuryani, 2018).

2. Klasifikasi Preeklamsia

Klasifikasi preeklamsia terbaru tidak lagi membagi ke dua bagian yaitu 'ringan' dan 'berat', namun dibagi menjadi preeklamsia 'disertai gejala berat' (*with severe features*) dan 'tanpa disertai gejala berat' (*without severe features*). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan pada seluruh kasus preeklamsia yang dapat memburuk kapan saja. Selanjutnya preeklamsia tanpa disertai gejala berat disebut sebagai PE, sedangkan preeklamsia dengan gejala berat disebut sebagai preeklamsia berat (PEB) (Akbar dkk, 2020).

Disebut PEB jika tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg, tekanan darah diastolik ≥ 110 mmHg, serum kreatinin $>1,1$ mg/dl, terdapat edema paru, kadar trombosit $< 100.000/uL$ dan terjadi peningkatan fungsi hati (lebih dari dua kali normal) serta keluhan nyeri kepala, gangguan penglihatan dan nyeri ulu hati (Akbar dkk, 2020).

Prediksi ideal untuk terjadinya PE belum didapatkan, namun didapatkan beberapa faktor risiko yang meningkatkan insiden PE (riwayat PE dari pasien maupun keluarga, riwayat penyakit hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit

ginjal, trombofilia, systemic lupus erythematosus (SLE), obesitas, umur ≥ 35 tahun, kehamilan kembar). Beberapa prediksi PE dapat dilakukan menggunakan pemeriksaan sederhana seperti roll over test (ROT) > 15 mmHg, mean arterial pressure (MAP) > 90 hingga pemeriksaan Doppler velocimetry (DV) arteri uterina (peningkatan resistensi lebih 0,7 dan atau adanya notching) dan juga penggunaan biomarker angiogenesis, seperti Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A), *soluble Fms like tyrosine kinase* (sFlt) dan *Placental Growth Factor* (PlGF) (Akbar dkk, 2020).

3. Etiologi Preeklamsia

Sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab preeklamsia, namun dari beberapa teori menjelaskan bahwa penyebab dari preeklamsia diantaranya ialah; adanya kehamilan ganda, meningkatnya frekuensi pada kehamilan primigraviditas, terjadinya mola hidatidosa, obesitas pada ibu hamil, usia ibu hamil yang kurang dari 18 tahun dan usia ibu hamil lebih dari 35 tahun. Sedangkan teori lain juga menyebutkan bahwa preeklamsia disebabkan karena beberapa kelainan yang disebut juga dengan *the diseases of theory*. Adapun teori-teori tersebut antara lain:

a. Peran Prostaglandin dan Tromboksan

Hormon yang dikeluarkan akan menimbulkan efek perlawanan pada tubuh, seperti organ tubuh yang kekurangan zat asam, akan terjadi penimbunan zat pembeku darah dan pembuluh darah menyempit sehingga menyebabkan meningkatnya tekanan darah (Sukarni, 2013).

b. Peran Faktor Imunologis

Terjadinya pembentukan *blocking antibodies* terhadap antigen plasenta tidak sempurna sehingga pada kasus preeklamsia sering terjadi pada primigravida dan tidak muncul lagi di kehamilan berikutnya (Sukarni, 2013).

c. Peran Faktor Genetik

Terdapat faktor risiko pada anak dari ibu yang mengalami preeklamsia dan peranan Renin Angiotensin Aldosteron System (RAAS) yang berperan dalam faktor genetik, sehingga dilakukan pemantauan fungsi ginjal lewat protein urin dan fungsi hati dengan mengontrol menu makanan sehari-hari (Sukarni, 2013).

4. Faktor Risiko Preeklamsia

Menurut Lalage (2013) Ada beberapa faktor risiko preeklamsia yaitu; Nuliparitas, diabetes, riwayat preeklamsia sebelumnya, usia ibu kurang dari 15 tahun atau lebih dari 35 tahun, riwayat preeklamsia dalam keluarga, hipertensi kronik, penyakit ginjal kronik, kehamilan kembar, sindrom antibodi antifosfolipid, penyakit vascular kolagen, kegemukan dan, kurang gizi.

5. Dampak Preeklamsia

Pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia akan rentang berdampak terjadinya gangguan fisik dan gangguan psikologis. Ibu hamil dengan preeklamsia biasanya akan mengalami gangguan fisik dengan keluhan seperti pusing, nyeri pada epigastrium serta seringnya terjadi pembengkakan (edema) di sekitar area ekstremitas atas dan bawah bahkan sampai ke wajah, jika sudah terlalu parah akan mengalami gangguan penglihatan. Sehingga dari beberapa gangguan fisik yang dialami dapat membuat ibu hamil mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan merasa khawatir yang berlebihan, mudah marah, mudah tersinggung dan sering mengalami ketakutan yang berlebihan karna takut mati, takut berpisah dengan bayi dan ketakutan akan ketidakmampuan untuk mengatasi masalah. (Rudiyanti & Erike, 2017).

6. Patofisiologi Preeklamsia

Preeklamsia memiliki patofisiologi yang sangat kompleks, namun pada umumnya terdapat dua tahapan terjadinya preeklamsia yaitu, dengan plasenta abnormal (penurunan perfusi plasenta) kemungkinan hal tersebut disebabkan karena implantasi abnormal dan adanya perkembangan abnormal dari pembuluh darah plasenta. Pada kasus perkembangan plasenta normal ditandai dengan invasi arteri spiralis uterus desidua dan miometrium oleh sitotrofoblas yang sangat besar.

Hal tersebut dapat mengubah pembuluh uterus dari kecil kemudian menjadi bertahan sesuai dengan kapasitas caliber yang tinggi. Perubahan ini yang akan meningkatkan aliran darah uterus yang dibutuhkan untuk mempertahankan janin pada masa kehamilan. Selain itu juga terjadinya peningkatan tekanan oksigen, yang merangsang sitorofoblas dan mengadopsi fenotip adhesi pada permukaan endotel.

Pada kejadian preeklamsia menunjukkan keadaan yang abnormal. Karena invasi arteri yang terbatas pada desidua superficial, yang membuat segmen miometrium menjadi sempit dan tidak berair. Hal tersebut dapat menyebabkan ibu hamil kekurangan suplai darah, yang dapat menyebabkan hipoksia pada janin yang dapat berkepanjangan dan pembentukan pembuluh darah plasenta yang menyimpang. Jika tekanan oksigen tidak berubah maka endolisasi gagal terjadi.

Pada tahap kedua terjadi disfungsi endotel yang dikaitkan dengan protein antiangiogenik. Ketidakseimbangan pada faktor-faktor angiogenik yang menjadi perantara antara plasenta abnormal yang terjadi pada tahap kedua ini. Protein antiangiogenik yang disebut tirosin kinase yang larut dalam (sFlt-1) dan memblokir reseptor transmembran untuk faktor pertumbuhan endotel vascular (VEGF) dan menghambat pertumbuhan plasenta (PlGF). Konsentrasi sFlt-1 yang tinggi ditunjukkan pada kejadian preeklamsia dan hal tersebut dikaitkan dengan penurunan konsentrasi VEGF dan PlGF dalam darah. Sehingga secara klinis, tindakan ini disebut sebagai peningkatan tekanan darah dan proteinuria dengan melibatkan sistem multiorgan. (Uzan dkk, 2011).

7. Manifestasi Klinis Preeklamsia

Menurut Reeder dkk (2011) menyebutkan bahwa ada beberapa ciri-ciri terjadinya preeklamsia, yaitu.

- a. Terjadinya hipertensi (tekanan darah tinggi), terjadinya tekanan darah antara 140/90 mmHg yang dianggap sebagai salah satu gejala awal pada wanita hamil.
- b. Proteinuria (protein dalam urin), proteinuria yang dikeluarkan antara 300 mg atau lebih yang dikeluarkan dalam urin selama 24 jam.

- c. Kenaikan berat badan, hal ini dinilai dari terjadinya kenaikan berat badan yang berlebihan, dalam seminggu peningkatan BB normal adalah 0,5 kg tetapi jika dalam seminggu BB naik mencapai 1 kg maka kemungkinan dapat dicurigai terjadinya preeklamsia.
- d. Sakit kepala yang tidak bisa sembuh jika diberikan analgesik biasa
- e. Edema (pembengkakan), terjadinya pembengkakan pada area tangan, lengan wajah dan kaki
- f. Gangguan penglihatan, pandangan kabur atau terdapat bintik-bintik
- g. Mengalami kebingungan atau disorientasi
- h. Mual muntah yang terjadi kembali setelah pertengahan kehamilan
- i. Nyeri pada epigastrium, merupakan keluhan yang sering ditemukan pada PEB, hal tersebut disebabkan adanya tekanan pada kapsula hepar akibat edema atau perdarahan.
- j. mengalami sesak napas bisa dikarenakan adanya edema paru (kelebihan cairan di paru-paru)

8. Diagnosis Preeklamsia

Kriteria diagnosis preeklamsia meliputi tekanan darah tinggi (hipertensi) dinilai dari tingkat diastolik dan sistolik masing-masing mencapai tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan diastolik ≥ 90 mmHg dengan selisih pengukuran 4 jam, saat usia kehamilan setelah 20 minggu, sedangkan dalam hitungan menit dapat dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik ≥ 160 mmHg dan diastolik ≥ 110 mmHg. Untuk kriteria diagnosis proteinuria yaitu ≥ 300 mg/ 24 jam atau protein yang diukur dengan kreatinin dalam urin yaitu ≥ 3.0 mg/dL. Terjadi edema paru, peningkatan fungsi hati > 2 kali dan trombosit > 100.000 , terdapat gangguan serebral atau penglihatan. Tes darah bisa jadi salah satu diagnosis pendukung dengan mengukur kadar protein yang biasa disebut faktor pertumbuhan plasenta (PIGF), jika kadar PIGF ibu hamil tinggi maka kemungkinan besar ibu hamil tidak

mengalami preeklamsia, tetapi jika kadar PIGF rendah maka bisa kemungkinan mengalami preeklamsia dengan dilakukan tes lebih lanjut (American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013).

9. Komplikasi Preeklamsia

Preeklamsia dapat melibatkan komplikasi pada seluruh organ:

- a. Maternal: HELLP *syndrome*, gagal ginjal, solusio plasenta, gagal liver, edema paru, perdarahan otak, progresifitas menjadi eklamsia.
- b. Janin: pertumbuhan janin terhambat, kematian pada janin, dan persalinan preterm. (Akbar dkk, 2020)

10. Penatalaksanaan Preeklamsia

Pada penderita preeklamsia, kehamilan dapat terjadi sampai 37 minggu dan kemudian dilakukan persalinan. Preeklamsia dengan gambaran klinis berat, pasien yang dilakukan rawat inap, pencegahan dilakukan dengan pemberian MgSO₄, pemberian antihipertensi bila tekanan >160/110 mmHg. Terminasi kehamilan tergantung dari usia kehamilan. Pada kehamilan < 24 minggu, dipertimbangkan untuk tidak diteruskan kehamilannya mengingat perawatan janin membutuhkan waktu lama yang mungkin akan mempengaruhi kondisi ibunya. Pada usia kehamilan 28 minggu atau lebih, dilakukan perawatan konservatif dengan pemberian maturasi paru dengan deksametason 16 mg dan ulangan selang 24 jam dengan dosis yang sama. Dilakukan pengakhiran kehamilan bila ada pemburukan atau bila usia kehamilan > 34 minggu. Pada usia kehamilan > 34 minggu dapat dilakukan pengakhiran kehamilan setelah stabilisasi ibu (Akbar dkk, 2020).

Upaya untuk meminimalkan kematian ibu yang diakibatkan preeklamsia adalah dengan cara Antenatal care (ANC) secara rutin. Tenaga kesehatan melakukan deteksi dini pada ibu hamil melalui ANC terpadu dan memberikan informasi pada ibu hamil agar selalu rutin dalam melakukan ANC. Diharapkan tanda gejala preeklamsia diketahui sedini mungkin sehingga kematian akibat preeklamsia dapat menurun (Noviyana, 2020).

11. Prognosis Preeklamsia

Jika tidak disertai pemburukan pada organ-organ, prognosis baik. PE memiliki efek jangka panjang baik terhadap ibu maupun janin, seperti terjadinya hipertensi kronis, PE pada kehamilan selanjutnya, diabetes melitus dan kelainan kardiovaskular pada ibu serta gangguan autisme dan beberapa kelainan kongenital seperti hipospadia dan mikrosefali yang berhubungan dengan *Intrauterine Growth Restriction* (IUGR) janin (Akbar dkk, 2020).

B. Kecemasan

1. Definisi Kecemasan

Kecemasan diartikan sebagai perasaan khawatir atau gelisah mengenai sesuatu hasil yang tidak pasti yang mempengaruhi atau menyebabkan depresi (Kajdy and Feduniw, 2020).

Merujuk DSM V, gangguan kecemasan merupakan kekuatan yang tidak terkontrol, berlebihan dan kronis disertai berbagai gejala yang disebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan atau menimbulkan stres nyata pada seseorang. Kecemasan tersebut terjadi terus menerus (relasi interpersonal, kesehatan, keuangan *daily hassles*) bahkan mengenai hal-hal kecil (American Psychiatric Association, 2013).

2. Tingkat Kecemasan

Menurut (American Psychiatric Association, 2013), tingkat kecemasan dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu sebagai berikut.

a. Kecemasan Ringan

Tingkat kecemasan ringan adalah cemas yang normal yang biasa menjadi

bagian di kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian, tetapi seseorang masih mampu mengendalikan masalah.

b. Kecemasan Sedang

Tingkat kecemasan sedang biasanya terjadi jika seseorang memusatkan hal-hal yang penting ditandai dengan perhatian menurun, penyelesaian masalah menurun, tidak sabar, mudah tersinggung, ketegangan otot, tanda-tanda vital meningkat, mulai berkeringat, sering mondar-mandir, sering berkemih dan sakit kepala.

c. Kecemasan Berat

Tingkat kecemasan berat ditandai dengan kurangnya persepsi seseorang yang cenderung memusatkan perhatian pada sesuatu yang spesifik, dan tidak dapat berpikir tentang hal yang lain.

d. Panik

Tingkat panik dari suatu kecemasan berhubungan dengan ketakutan karena seseorang mengalami kehilangan kendali. Seseorang yang mengalami panik tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan arahan. Panik melibatkan gangguan kepribadian misalnya terjadi peningkatan aktivitas motorik,

menurunnya kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, persepsi yang menyimpang dan kehilangan pemikiran yang tidak dapat rasional.

3. Faktor yang memengaruhi kecemasan

Faktor yang memengaruhi kecemasan dibagi menjadi dua yaitu, faktor predisposisi dan faktor presitipasi.

a. Faktor predisposisi

Faktor predisposisi biasa juga disebut dengan faktor pencetus atau penyebab utama timbulnya gangguan pada seseorang (Azizah, 2011). Faktor ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu.

1. Faktor biologis

Faktor ini menunjukkan bahwa regulasi otak berhubungan dengan aktivitas neurotransmitter gamma-aminobutyric acid (GABA), yang memiliki peranan dalam aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme biologis sehingga menyebabkan kondisi kecemasan. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan akan memiliki penurunan anti kecemasan yang berasal dari reseptor GABA, yang dapat membuat seseorang lebih sensitif terhadap kecemasan hingga mengalami kepanikan.

2. Faktor Psikologis

Dari segi psikoanalitik dapat dikatakan bahwa kecemasan adalah terjadinya masalah emosional yang melibatkan dua elemen keperibadian yaitu id dan superego pada seseorang. Id adalah dorongan insting dan impuls, sedangkan superego dikendalikan oleh norma budaya yang dimiliki individu dan dapat mencerminkan hati nurani individu tersebut. Dari segi interpersonal kecemasan terjadi karena adanya perasaan takut dan penolakan secara interpersonal. Sehingga jika seseorang mengalami harga diri rendah akan mudah mengalami

kecemasan berat. Dari segi pandangan perilaku menunjukkan kecemasan yang menjadi pusat frustrasi yang mengakibatkan segala sesuatu yang mengganggu akan dapat memengaruhi pencapaian seseorang. Dalam hal ini seseorang akan sering menunjukkan kecemasan dalam hidupnya.

3. Sosial budaya

Terjadinya kecemasan pada diri seseorang juga berkaitan dengan sosial dan budaya, seperti keadaan ekonomi dan latar belakang pendidikan.

b. Faktor Presipitasi

Merupakan suatu stimulus yang dipersiapkan individu sebagai tantangan bagi individu itu sendiri. Atau biasa disebut sebagai faktor yang memperparah atau memperberat suatu keadaan (Azizah, 2011). Faktor presipitasi dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu ancaman integritas fisik dan ancaman terhadap sistem diri.

a. Ancaman integritas fisik mengakibatkan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, karena terjadinya ketidakmampuan pada fisiologis seseorang. Ancaman ini dipengaruhi oleh dua sumber yaitu sumber internal dan eksternal. Sumber internal seperti; terjadinya kegagalan mekanisme fisiologis sistem imun, perubahan biologis normal dan regulasi suhu tubuh. Sedangkan sumber eksternal seperti; terpaparnya tubuh terhadap infeksi dari virus dan bakteri, polusi lingkungan, kekurangan nutrisi dan terjadinya kecelakaan.

b. Ancaman terhadap sistem diri merupakan ancaman yang melibatkan bahaya identitas, harga diri dan fungsi sosial seseorang yang terintegrasi. Ancaman ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu, internal seperti; munculnya kesulitan dalam penyesuaian peran diri pada situasi baru, kesulitan dalam berhubungan secara interpersonal di

lingkungan keluarga dan lingkungan kerja. Sedangkan sumber eksternal seperti; merasakan kehilangan orang yang dicintai bisa karena terjadinya perceraian dan terjadinya perubahan dalam status pekerjaan. (Stuart, 2013).

4. Jenis Gangguan Kecemasan

Kecemasan terdiri dari dua jenis yaitu kecemasan normal dan kecemasan patologis. Kecemasan normal merupakan suatu perasaan yang sering dialami setiap orang. Cemas dalam batas normal ini juga merupakan respon bawaan dalam menghadapi ancaman yang membahayakan keselamatan dan dapat menimbulkan gangguan kognitif (khawatir) serta gangguan somatik (jantung berdebar-debar, berkeringat, gemetar, kedinginan, dll) (Mozo, 2017).

Kecemasan patologis terjadi jika kecemasan bersifat menetap dan menyebabkan gangguan secara fisik sehingga dapat mengganggu aktivitas seseorang. Kecemasan patologis ini terjadi karena seseorang tidak mampu lagi mengendalikan atau mengatasi situasi lingkungan sekitarnya (Mozo, 2017).

5. Etiologi Kecemasan

Menurut Sadock (2007) Terdapat tiga teori psikologi yang menyebutkan tentang penyebab dari kecemasan, yaitu:

a. Teori psikoanalitik

Kecemasan sebagai tanda adanya bahaya yang tidak disadari. Kecemasan dipandang sebagai hasil konflik psikis antara keinginan yang agresif atau dorongan seksual yang tidak disadari dengan ancaman yang datang secara bersamaan dari superego atau kenyataan eksternal. Sebagai respon terhadap sinyal ini, ego menciptakan mekanisme pertahanan untuk mencegah pikiran atau perasaan yang tidak dapat diterima keluar ke alam sadar.

b. Teori perilaku

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan merupakan respon yang dapat dikondisikan sesuai dengan adanya stimulus yang spesifik berasal dari

lingkungan. Individu menerima rangsangan stimulus tertentu sebagai stimulus yang tidak disukai, sehingga menyebabkan kecemasan. Setelah terjadi berulang-ulang akhirnya akan menjadi kebiasaan untuk menghindari stimulus tersebut.

c. Teori eksistensial

Teori ini memberikan model-model dari kecemasan secara menyeluruh, di mana tidak ada stimulus yang dapat diidentifikasi untuk perasaan cemas yang bersifat kronik. Konsep inti dari teori ini adalah bahwa orang mengalami perasaan hidup dalam dunia yang tanpa tujuan. Kecemasan merupakan respon terhadap persepsi kehampaan tersebut.

Ditinjau dari aspek biologis, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi penyebab dari kecemasan, antara lain:

1) Sistem saraf otonom

Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan gejala-gejala tertentu seperti: kardiovaskuler (misalnya takikardi), muskuler (misalnya nyeri kepala), gastrointestinal (misalnya diare), dan respirasi (misalnya takipneu).

Sistem saraf otonom pada pasien dengan gangguan kecemasan, terutama gangguan panik, menunjukkan peningkatan tonus simpatik, beradaptasi lambat terhadap stimulus yang berulang, dan beradaptasi secara berlebihan terhadap stimulus dengan intensitas sedang.

2) Neurotransmitter

Ada tiga neurotransmitter utama yang berkaitan dengan kecemasan berdasarkan penelitian pada binatang dan respon terhadap terapi obat, yaitu:

a. Norepinefrin

Gejala-gejala kronik yang dialami oleh pasien dengan kecemasan, misalnya serangan panik, insomnia, ketakutan, dan peningkatan aktivitas otonomik, ditandai dengan peningkatan fungsi noradrenergik. Teori umum tentang peranan epinefrin dalam gangguan kecemasan adalah bahwa pasien mungkin memiliki

sistem noradrenergik yang tidak teregulasi dengan baik disertai ledakan aktivitas pada saat-saat tertentu.

b. Serotonin

Penelitian terhadap fungsi 5-hydroxytryptamine (5-HT) dalam gangguan kecemasan memberikan hasil yang berbeda-beda sehingga pola abnormalitasnya belum dapat dijelaskan.

c. Gamma-aminobutyric acid (GABA)

Peranan GABA dalam gangguan kecemasan didukung kuat oleh efikasi benzodiazepin yang tidak diragukan lagi dalam mengatasi gangguan kecemasan. Obat-obatan tersebut meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABA tipe A.

Para peneliti berhipotesis bahwa beberapa pasien dengan gangguan kecemasan memiliki reseptor GABA tipe A yang abnormal, meskipun hubungan langsung di antara keduanya belum dapat dijelaskan.

6. Tanda dan Gejala Kecemasan

Terdapat beberapa tanda dan gejala yang muncul pada pasien dengan kecemasan, diantaranya yaitu :

- a. Mengalami firasat buruk, perasaan khawatir, cemas dan mudah bingung karena takut akan pikirannya sendiri.
- b. Mengalami gangguan konsentrasi dan daya ingat.
- c. Mengalami gangguan pola tidur dan sering mengalami mimpi yang menakutkan.
- d. Mudah gelisah, sering mengalami ketegangan dan gampang terkejut.
- e. Jika berada dalam keramaian, akan mudah takut karena seseorang tersebut sendirian.
- f. Mengalami keluhan somatik seperti sesak napas, sakit kepala, pendengaran

berdenging, dan mengeluhkan rasa sakit pada tulang belakang dan otot-ototnya (Livia Prajogo and Yudiarso, 2021).


7. Patofisiologi Kecemasan

Neurotransmitter adalah pembawa pesan kimiawi di otak yang mengatur perasaan dan pikiran seseorang. Masalah kecemasan terkait dengan fungsi pembawa pesan di otak yang terkait dengan ketidakseimbangan neurotransmitter atau kimia otak. Paparan stressor menghasilkan stimulus pada sistem saraf pusat yang selanjutnya akan menstimulasi sistem kelenjar sebagai respon fisiologis tubuh baik secara keseluruhan maupun lokal. Tiga neurotransmitter utama yang terkait dengan kecemasan berdasarkan penelitian adalah norepinephrine (NE), serotonin, dan gamma-aminobutyric (GABA). Sistem norepinefrin sebagai reseptor terhadap respon dengan neurotransmitter ke struktur otak lain yang terkait dengan kecemasan, yaitu amigdala, hipocampus, dan korteks serebral (berpikir, menafsirkan, dan merencanakan). Disregulasi serotonin akan berperan dalam kecemasan seseorang yang pernah mengalami gangguan hipersensitivitas reseptor 5-HT. Aktivitas gamma-aminobutyric neurotransmitter (GABA), mengontrol aktivitas neuron di bagian otak yang bertanggung jawab atas terjadinya suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, individu merespon stres dimana situasi tersebut akan dihadapkan pada berbagai kecemasan (*anxiety*) yang selalu dalam respon berkisar dari ringan, sedang, berat hingga panik (Stuart, 2012).

Kecemasan dapat diekspresikan secara langsung melalui perubahan fisiologis, perilaku, kognitif dan efektif melalui munculnya gejala atau mekanisme sebagai upaya melawan kecemasan. Respon fisiologis pada kardiovaskuler adalah

palpitasi, palpitasi, tekanan darah tinggi, pingsan. Pada sistem pernapasan akan menyebabkan napas cepat, sesak napas, rasa tercekik, tekanan pada dada. Pada sistem neuromuskular termasuk mata berkedip, tremor, ketegangan wajah, kaki goyah, gerakan canggung, dan kelemahan umum. Pada kulit akan menyebabkan wajah pucat, berkeringat di sekujur tubuh, wajah memerah dan panas dingin. Sedangkan respon perilaku berupa kecemasan, ketegangan fisik, tremor, kurang koordinasi dan bicara cepat. Respon kognitif yang ditimbulkan adalah gangguan perhatian, konsentrasi yang buruk, kebingungan, ketakutan akan cedera atau kematian dan mimpi buruk. Respon afektif yang ditimbulkan adalah kecemasan, ketegangan, ketakutan, frustrasi, mati rasa dan ketidakberdayaan (*American Psychiatric Association, 2013*).





(Yu, 2013)

8. Alat Ukur Kecemasan

a. Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kecemasan ibu hamil preeklamsia yaitu Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) pertama kali dikemukakan oleh Max Hamilton tahun 1959 dan dikembangkan oleh Maslim (2013). Instrumen terdiri dari 14 pertanyaan terkait mencakup Perasaan cemas, ketegangan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan kecerdasan, perasaan depresi (murung), gejala somatik/fisik (otot), gejala somatik/fisik (sensorik), gejala kardiovaskuler, gejala respiratory (pernapasan), gejala gastrointestinal (pencernaan), gejala urogenital (perkemihan dan kelamin), gejala autonomi, tingkah laku (sikap). Dengan empat skala likert dan masing-masing skala likert diberi nilai 0,1,2,3 dan 4 yaitu skor 0 (tidak ada gejala atau keluhan); 1 (gejala ringan); 2 (gejala sedang); 3 (gejala berat); 4 (gejala berat sekali). Skala HARS merupakan skala baku yang memiliki validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan korelasi Product moment dengan nilai validitas 0,93. Sedangkan uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach didapatkan nilai 0,97 (Meranti, 2015).

b. Depression Anxiety Stress Scale (DASS)

DASS merupakan kuesioner yang berisi 42 pertanyaan yang digunakan untuk mengukur tiga emosi negative, yaitu depresi, kecemasan, dan stress. Kuesioner DASS bagian depresi berfokus pada rendahnya motivasi, kepercayaan diri, dan suasana hati yang buruk/tidak baik. Apabila DASS bagian kecemasan berfokus pada panik, ketakutan, dan gairah fisik. Apabila DASS bagian stress berfokus pada ketegangan dan sifat mudah tersinggung (Parkitny dan McAuley, 2010) Kemudian skor dalam kuesioner ini yaitu antara lain :

1. Nilai 0 = tidak sesuai sama sekali, atau tidak pernah

2. Nilai 1 = sesuai dengan saya untuk beberapa derajat atau kadang-kadang
3. Nilai 2 = sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu atau sering
4. Nilai 3 = sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali

Kemudian, dari 42 pertanyaan akan dijumlahkan, dan hasil skornya tersebut derajat kecemasan akan diketahui, antara lain :

1. Total nilai 0-7 = tidak ada kecemasan
2. Total nilai 8-9 = kecemasan ringan
3. Total nilai 10-14 = kecemasan sedang
4. Total nilai 15-19 = kecemasan berat
5. Total nilai 20< = kecemasan berat sekali.

9. Islam memandang kecemasan

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

“Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya.” (HR. Al-Bukhari no. 5642 dan Muslim no. 2573) (An-Nawawi, 2015)

Dalam QS. Al-Baqarah: 250 Allah SWT juga berfirman:

رَبَّنَا أفرغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Ya Rabb kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir”

Umat Islam diharuskan bersabar dalam melewati cobaan dan ujian yang silih berganti berdatangan, termasuk pada saat menghadapi kehamilan. Doa diatas

merupakan doa untuk meminta kesabaran kepada Allah SWT. Setiap muslim dapat berdoa memohon kesabaran dan keikhlasan hati dalam menjalani kehidupan. Misalnya, saat menghadapi kehamilan. Doa minta ketabahan ini bertujuan agar tidak menghadapi masalah dengan hati kacau, emosi, marah, dan kehilangan kendali. Sebab marah hanya dapat memperburuk masalah.

C. Hubungan Kecemasan Dengan Preeklamsia


Ibu hamil yang mengalami kecemasan dan stress dapat menyebabkan tekanan darah naik. Perasaan cemas dapat mengakibatkan peningkatan aktivitas system saraf simpatis, perubahan tekanan darah, denyut jantung, pernafasan dengan warna kulit dan apabila tidak segera diatasi maka akan meningkatkan rasa khawatir, tegang, takut dan stress. Tekanan darah tinggi atau hipertensi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki berat lahir rendah, bahkan kematian.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya Preeklamsia pada ibu hamil adalah kecemasan. Penelitian yang sama yang menyertakan variabel anxiety (kecemasan) sebagai salah satu faktor risiko dari kejadian preeklamsia pada ibu hamil mendapatkan hasil variabel kecemasan ini berkorelasi dengan kejadian preeklamsia pada ibu hamil dan bahkan beberapa penelitian mendapatkan OR (odds ratio)/ RR (relatives risk) bernilai tinggi. Kecemasan adalah merupakan respon individu terhadap suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kecemasan pada suami istri yang berkaitan dengan kelahiran termasuk dalam tingkat kecemasan sedang (Isworo, 2012).



A. Kerangka Berpikir

1. Kerangka Teori



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini, desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Desain analitik cross sectional merupakan penelitian yang mempelajari korelasi antara sebab (independen) dengan akibat (dependen) dengan proses pengumpulan data dilakukan bersamaan secara serentak dalam satu waktu (Masturoh, 2018).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu Maret-Juni 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pertiwi Makassar tahun 2021 yaitu sebanyak 1346.

2. Sampel

Sampel yang dipakai pada penelitian ini adalah sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel minimal dihitung dengan rumus besar Slovin, dengan rumus :

$$n = \frac{n}{1+N (d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

(d)² = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan (10%=0,1)

Besar populasi 1346 responden, maka dapat di tentukan besar sampel

adalah:

$$n = \frac{1346}{1 + 641(0.1^2)}$$

$$n = 93,08$$

$$n = 93 \text{ sampel}$$

Berdasarkan perhitungan jumlah diatas, maka ditentukan jumlah sampel preeklamsia dan tidak preeklamsia dengan perbandingan 1:2 dengan jumlah sampel 93 responden yaitu 31 responden preeklamsia dan 62 responden tidak preeklamsia.

D. TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* dengan jenis *Puposive sampling* dimana penentuan sampel disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi berdasarkan tujuan penelitian.

1. Kriteria Inklusi

- a. Ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar
- b. Umur kehamilan ≥ 20 minggu
- c. Rekam medik Lengkap
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bersedia mengikuti

penelitian dengan mengisi *Informed Consent*

2. Kriteria Eksklusi

- a. Riwayat penyakit hipertensi kronis
- b. Kehamilan ganda
- c. Riwayat penyakit ginjal

E. CARA PENGUMPULAN DATA

1. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan cara melihat data rekam medik di Rumah Sakit yaitu data pasien yang mengalami preeklamsia.

2. Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara memberika kuestioner kepada responden yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari data rekam medik.

F. INSTRUMEN PENELITIAN


1. Rekam Medis

Penelitian ini di lakukan menggunakan data rekam medik di Rumah Sakit yaitu data pasien yang mengalami preeklamsia.


2. Instrumen Kecemasan

Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) dikemukakan oleh Max Hamilton tahun 1959 dan dikembangkan oleh Sativa (2018). Instrumen terdiri dari 14 pertanyaan mencakup Perasaan cemas, ketegangan, ketakutan, gangguan tidur, gangguan kecerdasan, perasaan depresi (murung), gejala somatik/fisik (otot), gejala somatik/fisik (sensorik), gejala kardiovaskuler, gejala respiratory (pernapasan), gejala gastrointestinal (pencernaan), gejala urogenital (perkemihan dan kelamin), gejala autonomi, tikah laku (sikap). Dengan empat skala likert dan masing-masing skala likert diberi nilai 0,1,2,3 dan 4 yaitu skor 0 (tidak ada gejala atau keluhan); 1 (gejala ringan); 2 (gejala sedang); 3 (gejala berat); 4 (gejala berat sekali. Dengan nilai kecemasan 14-20 kecemasan ringan, 21-27 kecemasan sedang, 28-41 kecemasan berat, 42-56 kecemasan berat.

G. Kerangka Konsep



H. ALUR PENELITIAN



I. LANGKAH PENGOLAHAN DATA

1. Penyunting Data (editing)

Peneliti akan memeriksa setiap data rekam medis pasien dengan riwayat preeklamsia

2. Pengkodean (coding)

Pengkodean data dilakukan dengan memberikan tanda atau kode pada hasil data rekam medik dengan riwayat preeklamsia yang diambil sesuai dengan kriteria inklusi

3. Entri Data

Entri data dilakukan dengan cara memasukkan setiap data yang di ambil ke dalam program komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana.

4. Tabulasi (Tabulating)

Data dimasukkan dalam bentuk tabel untuk menganalisis data sesuai tujuan penelitian

5. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan cara mencari makna hubungan antara variabel yang telah di teliti dan ditulis dalam bentuk narasi.

J. ANALISIS DATA

1. Analisis Univariat

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan masing-masing frekuensi distribusi, berupa gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan variabel independen.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan menggunakan uji Chi Square untuk menguji hubungan atau pengaruh dari dua variabel kategorik dan mengukur kuatnya hubungan antara kedua variabel.

Rumus uji *Chi Square* :

$$x^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Keterangan :

x^2 : chi square

O: frekuensi observasi

E: frekuensi harapan

K. ETIK PENELITIAN

Dalam melakukan sebuah penelitian wajib mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun prinsip-prinsip etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Respect for the person

Menghormati segala harkat martabat manusia sebagai pribadi yang mempunyai kebebasan berkehendak atau memilih dan bertanggung jawab terhadap keputusannya sendiri

2. Beneficence dan nonmaleficence

Berkewajiban untuk membantu orang lain dengan dengan berbuat baik dan tidak merugikan siapapun

3. Justice

Obyek penelitian berhak menerima perlakuan yang benar dan layak serta manfaat yang seimbang, peneliti tidak boleh mengambil kesempatan dan keuntungan dari ketidakmampuan masyarakat



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Penelitian ini dilaksanakan di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar dari Tahun 2021-2022. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian analitik dengan pendekatan *Cross Sectional*. Jumlah populasi seluruh ibu hamil yaitu sebanyak 1346, pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive sampling dengan jumlah 93 sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan perbandingan 1:2 yaitu 31 responden preeklamsia dan 62 responden tidak preeklamsia.

Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian sebagai berikut:



1. Analisis Univariat

Tabel 4.1, Tabel Karakteristik Data Ibu di Rumah Sakit Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2022

Karakteristik	n	%
Usia Ibu		
< 20 Tahun	4	4.3
20-35 Tahun	71	76.3
>35 Tahun	18	19.4
Pendidikan		
SD	13	14.0
SMP	43	46.2
SMA	13	14.0
S1	24	25.8
Pekerjaan		
IRT	56	60.2
Wirausaha	16	17.2
PNS	21	22.6
Jarak Kehamilan		
< 2 tahun	44	47.3
≥ 2 tahun	49	52.7
Paritas		
Primipara	42	45.2
Multipara	49	52.7
Abortus		
Ya	12	12.9
Tidak	81	87.1
Total	93	100.0

Sumber : Data Sekunder 2022

Berdasarkan tabel 4.1, Karakteristik data, didapatkan distribusi data usia pada < 20 tahun yakni sebanyak 4 responden (4,3%), ibu berusia 20-35 tahun sebanyak 71 responden (76,3%), dan ibu dengan usia > 35 tahun sebanyak 18 responden (19,4%).


Distribusi data riwayat pendidikan pada Ibu dengan pendidikan SD sebanyak 13 responden (14,0%) , SMP sebanyak 43 responden (46,2%), SMA sebanyak 13 responden (14,0%) dan ibu dengan pendidikan S1 sebanyak 24 responden (25.8%).

Distribusi data pekerjaan pada Ibu yakni Ibu IRT sebanyak 56 responden (60,2%), sebagai wirausaha sebanyak 16 responden (17,2%), dan ibu yang bekerja sebagai PNS sebanyak 21 responden (22,6%).

Distribusi data jarak kehamilan pada Ibu yakni < 2 tahun sebanyak 44 responden (47,3%) dan \geq 2 tahun sebanyak 49 responden (52,7%).

Distribusi data riwayat paritas pada Ibu yakni primipara sebanyak 42 responden (45,2%) dan multipara sebanyak 49 responden (52,7%).


Distribusi data riwayat abortus pada Ibu dengan riwayat abortus sebanyak 12 responden (12,9%) dan riwayat tidak abortus sebanyak 81 responden (87.1%).



Bagan 4.1, Distribusi Frekuensi Kecemasan Pada Preeklamsia

Dari bagan 4.1 di atas terdapat keterangan karakteristik variabel preeklamsia.

Dari jumlah sampel sebanyak 31 (100%), terdapat 23 (74,2%) ibu hamil yang mengalami kecemasan dengan status preeklamsia dan 8 (25,8%) Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan dengan status preeklamsia.



Bagan 4.2, Distribusi Frekuensi Kecemasan Pada Tidak Preeklamsia

Dari bagan 4.2 di atas terdapat keterangan karakteristik variabel preeklamsia. Dari jumlah sampel sebanyak 62 (100%), terdapat 18 (29,0%) ibu hamil yang mengalami kecemasan dengan status tidak preeklamsia dan 44 (71,0%) Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan dengan status tidak preeklamsia.

ALAUDDIN
MAKASSAR

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.2 Hubungan Antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklamsia di Rumah Sakit Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2022

Kecemasan	Preeklamsia				Total		PR 95% CI	<i>P-value</i>
	Ya		Tidak					
	n	%	n	%	n	%		
Cemas	23	56.1	18	43.9	41	100	4,646	
Tidak Cemas	8	15.4	44	84.6	52	100		0,000
Total	31	33.3	62	66.7	93	100		

Sumber : Data Sekunder dan Data Primer 2022

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2, didapatkan bahwa Ibu hamil yang mengalami kecemasan lebih banyak pada Ibu hamil preeklamsia sebanyak 23 responden (56.1%) dibandingkan dengan Ibu hamil yang tidak mengalami preeklamsia sebanyak 18 responden (43.9 %). Sedangkan Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan pada Ibu hamil preeklamsia sebanyak 8 responden (15.4%) dan Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan pada ibu yang tidak preeklamsia sebanyak 44 responden (84.6%).

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia ($P \text{ value} \leq 0,05$). Hasil perhitungan Prevalence Ratio (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami kecemasan berisiko 4,646 kali mengalami kejadian preeklamsia (95% CI 1,824-7,288).

B. Pembahasan

Berdasarkan sampel yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan perbandingan 1:2 terdapat 31 (33.3%) orang yang mengalami preeklamsia dan 62 (66.7%) yang tidak preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar tahun 2022.

Ibu hamil preeklamsia mempunyai kecemasan tinggi dalam menghadapi persalinan, dikarenakan risiko yang besar yang akan dihadapi oleh dirinya maupun bayi yang dilahirkan. Kondisi tersebut akan bertambah sulit jika ibu hamil preeklamsia memiliki perasaan-perasaan yang mengancam seperti munculnya perasaan khawatir yang berlebihan, kecemasan dalam menghadapi kelahiran, ketidakpahaman mengenai apa yang akan terjadi di waktu persalinannya. Gejala-gejala tersebut akan mempengaruhi kondisi ibu hamil preeklamsia baik secara fisik maupun psikis.

Tingginya kasus preeklamsia dalam penelitian ini juga dipengaruhi oleh status RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar yang merupakan salah satu rumah sakit rujukan tertinggi yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang baik agar ibu hamil dapat mendeteksi lebih dini gejala preeklamsia, sehingga ibu hamil dapat segera mencari pertolongan bila merasakan gejala preeklamsia.

Diharapkan seiring bertambahnya pengetahuan yang dimiliki oleh ibu, ibu akan memeriksakan kehamilannya lebih teratur sesuai standar pemeriksaan ANC yang mengalami peningkatan dari yang dulunya dianjurkan minimal 4 x selama kehamilan, sekarang menjadi minimal 6 kali selama kehamilan agar resiko terjadinya preeklamsia dapat terdeteksi sedini mungkin dan dapat dilakukan penanganan segera. (Rosyida, 2019)

Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat 31 responden ibu hamil yang mengalami preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar terdapat 23 (74,2%) ibu hamil yang mengalami kecemasan dan 8 (25,8%) Ibu hamil yang tidak mengalami kecemasan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardianti,dkk (2018) yang berjudul “Kecemasan, Riwayat Preeklampsia dan

Kejadian Preeklampsia pada Ibu Hamil Multigravida” bahwa didapatkan hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklampsia pada ibu hamil dengan hasil uji statistik *Chi-Square* didapatkan hasil $r = 0,00 < \alpha = 0,05$.

Pada penelitian diatas, ibu hamil dengan kecemasan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah usia yang terlalu muda atau usia yang terlalu tua, tingkat pendidikan rendah, jumlah paritas, dan pekerjaan. Usia yang terlalu muda dapat menyebabkan belum matangnya keadaan psikis dari ibu. Usia yang terlalu tua dapat menyebabkan ibu merasa cemas karena ibu akan merasa bahwa kemampuan dan tenaga ibu untuk melahirkan akan berkurang atau tidak maksimal.

Pada hasil penelitian, tingkat kecemasan responden dalam kehamilan yang paling tinggi adalah responden yang mengalami preeklampsia yaitu sebanyak 23 (74,2%) orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yang mengalami preeklampsia, penyebab kecemasan dan ketakutan yang terjadi diantaranya ialah : kecemasan terhadap diri sendiri yang seperti: takut akan kematian, takut berpisah dengan bayi yang dikandung, cemas terhadap kesehatan, khawatir terhadap rasa nyeri pada saat persalinan, terdapat kemungkinan komplikasi saat hamil atau pada saat bersalin, cemas tidak segera mendapat bantuan dan perawatan saat persalinan.

Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rudiyaniti Novita dengan penelitian yang berjudul “Tingkat Kecemasan pada Ibu Hamil dengan Kejadian Preeklampsia di Sebuah RS Provinsi Lampung” dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan tingkat kecemasan pada ibu hamil dengan kejadian preeklampsia $P Value = 0.005$

Ibu hamil dengan kecemasan dapat menyebabkan tekanan darahnya bertambah. Preeklampsia pada ibu yang hamil dapat mengakibatkan bayi yang dikandung akan memiliki berat lahir yang rendah, bahkan mengalami kematian. Bayi dalam rahim dapat merasakan dan merespon apa yang sedang dirasakan ibunya, diantaranya pada detak jantung ibu, semakin cepat detak jantung pada ibu, semakin cepat juga pergerakan janin didalam rahim.

Ibu hamil yang mengalami kecemasan dapat meningkatkan frekuensi detak jantung, dan ibu hamil yang mengalami hipertensi memiliki perasaan khawatir yang

tinggi karena senantiasa berpikir tentang bagaimana kelangsungan hidup janin sampai masa persalinan.(Yulita, 2018)

Kecemasan merupakan sebuah emosi dan pengalaman yang bersifat subjektif dari setiap individu. Artinya, kecemasan adalah suatu kondisi yang membuat seseorang tidak nyaman dan terbagi dalam beberapa tingkatan. Jadi, cemas berhubungan dengan perasaan yang tidak pasti dan keadaan yang tidak berdaya. (Muyasaroh, 2020)

Kelainan pada sistem pengolah pusat konflik dapat mengakibatkan peningkatan kadar hormon katekolamin, yang tidak hanya menimbulkan gejala somatik dan afektif kecemasan, tapi juga mengakibatkan peningkatan resistensi pada pembuluh darah perifer dan tekanan darah. (Anggraeni, 2018)

Saat hamil, terjadi peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan gangguan perasaan dan membuat ibu cepat lelah sehingga memberikan efek cemas pada ibu hamil. Hormon adrenalin juga mengalami peningkatan sehingga menimbulkan disregulasi biokimia tubuh sehingga terdapat ketegangan pada fisik ibu hamil seperti cepat marah, mudah gelisah, tidak mampu berkonsentrasi, dan mengalami kecemasan. (Wulandari, dkk. 2019)

Perubahan pada keadaan psikologis pada kehamilan mengharuskan ibu hamil agar dapat membiasakan diri, kecemasan merupakan bentuk dari adaptasi psikis tersebut, tapi jika berlangsung dengan jangka waktu yang lama maka akan menyebabkan stres yang berlebihan bahkan menjadi depresi. Pada ibu hamil yang mengalami kecemasan dapat meningkatkan tekanan darahnya. Pada kecemasan terjadi sekresi hormon adrenalin yang berlebihan hingga mengakibatkan tekanan darah tinggi. (Donsu, 2017)

Terdapat respon fisiologis yang muncul ketika seseorang mengalami keemasan yaitu, terdapat napas pendek, meningkatnya denyut nadi dan tekanan darah, wajah yang berkerut dan bibir yang bergetar. Pada respon kognitif didapatkan lapang persepsi melebar, dapat menerima rangsangan yang kompleks dan masih dapat fokus serta menjelaskan situasi. Sedangkan pada respon perilaku dan emosi yang didapatkan gemetar halus pada tangan, tidak dapat duduk dengan tenang, serta kadang suara meninggi. (Anggraeni, 2018)

Aspek religius sangat penting dalam mengatasi bagaimana seseorang dapat menerima segala sesuatu yang menimpanya, baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Jika seseorang memiliki keyakinan dengan agamanya dan Tuhannya, maka seseorang tersebut akan lebih dapat menerima dengan lapang dada apa yang menimpa pada kehidupannya. Salah satu bentuk religius adalah kebiasaan berzikir, saat ibu hamil membiasakan diri untuk berzikir maka ibu hamil akan merasa dekat dengan Allah SWT, hal tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan aman semakin meningkat sehingga kecemasan yang dirasakan ibu hamil akan jauh lebih berkurang. (Rahman, 2020)

Kecemasan merupakan situasi kejiwaan yang hampir selalu dirasakan oleh setiap individu. Hal tersebut muncul jika seseorang mendapati persoalan yang berat atau situasi yang membuat tidak tenang, sehingga timbulnya, gelisah, panik, bingung, dan ketidaktentraman jiwa. Jika ibu senantiasa melakukan zikir, ibu akan merasa dirinya dekat dengan Tuhan, merasa dalam penjagaan dan lindungan-Nya, kalimat zikir yang digunakan yaitu kalimat istigfar : *astagfirullahaladzim* (saya memohon ampunan kepada Allah yang maha agung) dan salawat. Kalimat zikir tersebut dapat dibaca berulang – ulang dengan maksud dan tujuan sebagai proses pembelajaran serta melatih untuk membangun koneksi demi meraih rida dan cinta dari sang pencipta. (Rahman, 2020)


Jika dipandang dari segi kesehatan jiwa, doa dan zikir memiliki unsur psikoterapeutik yang mendalam. Terapi psikoreligius juga memiliki kekuatan spritual atau kerohanian yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan optimisme serta menstabilkan kesehatan jiwa raga. Rasulullah SAW, dalam sabdanya:

مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

“Barang siapa yang sering melakukan istigfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan di setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitan dan memberinya rejeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka” (HR. Abu Daud Ibnu Majah dan Ahmad)

C. Keterbatasan Penelitian

Saat penelitian ini dilaksanakan peneliti mengalami beberapa keterbatasan dan hambatan yaitu: Pada saat penelitian dilakukan, ada beberapa responden yang tidak kooperatif, seperti meninggalkan proses pengisian kuesioner di waktu yang telah ditentukan sehingga memakan waktu yang cukup lama pada saat dilakukan pengisian kuesioner kembali. Penelitian ini juga mengambil data dari berkas rekam medik sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat dalam rekam medik.



BAB V

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar adalah sebagai berikut :

- a. Sebagian besar responden memiliki usia 20-35 Tahun yaitu 71 orang (81.7 %), pendidikan terakhir ibu hamil yang paling banyak yaitu 43 orang (46,2%), Pekerjaan ibu hamil paling banyak tidak bekerja/ibu rumah tangga yaitu 56 orang (60,2%), paritas ibu hamil preeklamsia paling banyak multipara 49 orang (52,7%) , semua responden ibu hamil preeklamsia menikah, dan sebagian besar tidak ada riwayat abortus 81 orang (87,1%).
- b. Responden yang mengalami preeklamsia lebih banyak mengalami kecemasan yaitu 23 (56,1%) dibanding responden yang tidak mengalami preeklamsia 18 (43.9%).
- c. Ada hubungan antara kecemasan dengan kejadian preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar

2. Saran

a. Ibu Hamil

Bagi ibu hamil disarankan agar melakukan ANC secara rutin paling sedikit 6 kali selama kehamilannya, hal tersebut dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kehamilan ibu, sehingga kesehatan ibu dan janin dapat terkontrol dengan baik.

b. Tenaga Kesehatan


Bagi tenaga kesehatan diharapkan lebih meningkatkan informasi terkait dengan kesehatan seputar kehamilan pada ibu hamil.

c. Penelitian yang lain

Untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan jumlah populasi yang berbeda misalnya pada ibu hamil dengan status paritas

primigravida atau multigravida dengan populasi lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih bervariasi.

Disarankan juga bagi peneliti yang menggunakan kuesioner HARS sebagai alat penelitian pada saat pengisian kuesioner sebaiknya responden di dampingi karena beberapa isi pertanyaan dari kuesioner tidak menggunakan bahasa umum (bahasa medis) atau tidak dimengerti orang awam.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. I. A., Tjokroprawiro, B. A., & Hendarto, H. (2020). *Obstetri Praktis Komprehensif* (Vol. 1). Airlangga University Press.
- Al-Jauziyyah, I. I. Q. (2020) *Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib*. Bethsaida, Janiwarty., dan Pieter, Herri Zan. (2013). *Pendidikan Psikologi American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG)*. 2013. *Hypertension in Pregnancy*. Washington DC: Women Health Care Physicians.
- American Psychiatric Association. (2013). '*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*', American Psychiatric Publishing: Washington.
- An-Nawawi, I. (2015) *Riyadhus Shalihin*. Pustaka Al-Kautsar. Bidan. Yogyakarta: Rapha Publishing
- Corwin, Elizabeth J., 2000. Bab 11. Sistem Kardiovaskular. Dalam *Buku Saku Patofisiologi*. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC, pp. 358-9
- Cunningham, FG.,(2013). *Obstetri Williams (Williams Obstetri)* . Jakarta : EGC Departemen Agama RI. (2012). '*Al – Quran dan Terjemahannya*'. Departemen Agama RI: Jakarta.
- Dewi Nadia Nurhasanah, Indriani, 2016, *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Preeklamsia pda Ibu Hamil di RSUD Penembahan Senopati Bantul*, Naskah Publikasi Karya Tulis Ilmiah, Universitas Aisyiyah Yogyakarta diakses tanggal 15 Oktober 2021
- Elsevier. *Terjemahan oleh Keliat*. 2016. *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart*. Edisi 1. Jakarta: Elsevier.
- Faridah Kusumawati, H. Y. (2011) *Buku Ajar Keperawatan Jiwa*. Jakarta.
- Hardianti FA, Mairo QKN. *Kecemasan, Riwayat Preeklampsia dan Kejadian Preeklampsia Pada Ibu Hamil Multigravida*. *J Appl Nurs (Jurnal Keperawatan Ter*. 2018;4(1):21.
- Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. *Journal of Physiotherapy*. 65: 204.
- Kajdy, A. and Feduniw (2020) '*Risk factors for anxiety and depression among*

- pregnant women during the COVID-19 pandemic: A web-based cross-sectional survey', *Medicine*, 99(30), p. e21279. doi: 10.1097/MD.00000000000021279.
- KARA, P. and NAZİK, E. (2021) 'Effects of anxiety and social support levels on
- Kemenkes RI. 2015. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
- Kordi, M. *et al.* (2017) 'Anxiety during pregnancy and preeclampsia: a case - control study', *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 5(1), pp. 814–820. doi: 10.22038/jmrh.2016.7881.
- Kusmiyati, Yuni, dkk. 2009. Hubungan kecemasan dengan hipertensi.
- Lalage, Z. 2013. Menghadapi Kehamilan Beresiko Tinggi. Edisi 1. Klaten: Abata Press.
- Lalenoh, D. C. 2018. Preeklamsia Berat dan Eklampsia: Tatalaksana Anestesia Perioperatif. Edisi Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Livia Prajogo, S. and Yudiarso, A. (2021) 'Metaanalisis Efektivitas Acceptance and Commitment Therapy untuk Menangani Gangguan Kecemasan Umum', *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 26(1), pp. 85–100. doi: 10.20885/psikologika.vol26.iss1.art5.
- Manuaba (2012) Pengantar Kuliah Obstetri. Jakarta: EGC.
- Masturoh, I. (2018) Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. MENENTUKAN KECEMASAN PADA HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale), Universitas Muhammadiyah Jember.
- Muyasaroh H. Kajian Jenis Kecemasan Masyarakat Cilacap dalam menghadapi Pandemi Covid 19. LP2M UNUGHA Cilacap [Internet]. 2020;3. Available from: <http://repository.unugha.ac.id/id/eprint/858>
- Meranti, D, (2015). IMPLEMENTASI METODE BAYESIAN DALAM
- Mozo, B.S, (2017). 'Journal of Chemical Information and Modeling'. Jakarta.
- Noviyana, A. (2020). Studi Kualitatif: Kecemasan pada Penderita Preeklamsia. *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 10(1), 23-27.
- Novriani, Wira., dan Sari, Febria Syafyu. (2017). Dukungan Keluarga dengan


- Kecemasan Menjelang Persalinan Trimester III. *Jurnal Ipteks Terapan*, Vol. 11, No. 1, Maret 2017, ISSN: 1979-9292\
- Nurbaedah Wa Ode Sitti (2011) Gambaran Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester II Dalam Menghadapi Persalinan di Wilayah Kerja Puskesmas Katobu.
- Nursal, D. G. A., Tamela, P., & Fitriyeni, F. (2017). Faktor Risiko Kejadian Preeklamsia pada Ibu Hamil di Rsup Dr. M. Djamil Padang Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1), 38-44.
- Parkitny, L dan McAuley, J. 2010. The Depression Anxiety Stress Scale (DASS).
- Prawirohardjo, S. (2018) *Ilmu kandungan*. Edisi keti. PT Bina Pustaka.
- Purwati and Alfi Noviyana (2020) ‘Studi Kualitatif: Kecemasan Pada Penderita Preeklamsia’, *Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan*, 10(1), pp. 23–27. doi: 10.47701/infokes.v10i1.844.
- Pebriani Pongmanda, Hendra Yulita Y. Hubungan Status Gizi Dan Stress Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Lepo-Lepo Kota Kendari Tahun 2018. 2018. 89 p.
- Qiu, C. et al. (2009) ‘Preeclampsia risk in relation to maternal mood and anxiety disorders diagnosed before or during early pregnancy’, *American Journal of Hypertension*, 22(4), pp. 397–402. doi: 10.1038/ajh.2008.366.
- Rahman, A. (2020) ‘Terapi Dzikir Dalam Islam Terhadap Tingkat Kecemasan Pada Ibu Hamil’, *Jurnal Tarbawi*, 5(1), p. 76.
- Reeder, S.J., L.L. Martin, D.K. Griffin. 2003. *Maternity Nursing: Family, Newborn, and Women’s Health Care*, 18th Ed. USA: Lippincott-Raven. Terjemahan oleh Y. Afiyanti. 2011. *Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi, dan Keluarga*. Edisi 18. Jakarta: EGC.
- Rengganis, I., Kedokteran, F. and Maret, U. S. (2010) ‘digilib . uns . ac . id’.
- Rohmaningsih, N., & Fitrikasari, A. (2013). Hubungan antara Kualitas Tidur dengan Tingkat Kecemasan Studi pada Mahasiswa/i Angkatan 2011 Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine Diponegoro University).
- Rudiyanti, N., Erike, R. 2017. Tingkat Kecemasan pada Ibu

- Hamil dengan Kejadian Pre Eklampsia di Sebuah RS Provinsi Lampung. *Jurnal Keperawatan. Lampung* : 13(2).
- Rosyida, D. A. C. (2019). Pengaruh Edukasi Metode Wish and Care Program Terhadap Perilaku Deteksi Dini Kanker Serviks. *Embrio*, 11(1), 8–16. <https://doi.org/10.36456/embrio.v11i1.1843>
- Saito, S. 2018. *Preeklamsia: Basic, Genomic, and Clinical*. Japan: Springer.
- Stuart, G.W. 2013. *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Singapore:
- Shihab, M. Q. (2012) *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sukarni, I. dan W.P. 2013. *Buku Ajar Maternitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- T Kurki, V Hiilesmaa, R Raitasalo, H Mattila, O. Y. (2010) ‘Depression and anxiety in early pregnancy and risk for preeclampsia’, 95(4), pp. 487–490.
- the prenatal attachment of pregnant women with preeclampsia’, *Cukurova Medical Journal*, 46(3), pp. 889–896. doi: 10.17826/cumj.894664.
- Tolinggi, S., Mantulangi, K. and Nuryani (2018) ‘Kejadian Preeklamsia dan Faktor Risiko yang Mempengaruhinya Preeclampsia Incidence and Its Related Risk Factors’, *Gorontalo Journal of Public Health*, 1(2), pp. 85–91.
- Triasani, D. and Hikmawati, R. (2016) ‘Hubungan Kecemasan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Preeklamsia Di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung’, *Jurnal Ilmiah Bidan*, 1(3), pp. 14–18. Available at: <https://ejournal.ibi.or.id/index.php/jib/article/view/13>.
- Trisani D, Hikmawati R. 2016. Hubungan Kecemasan Ibu Hamil Terhadap Kejadian Pre Eklamsia di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah. Vol I(3) : 14-18*
- Uzan, J., M. Carbonnel, O. Piconne, R. Asmar, dan J.M. Ayoubi. 2011. *Preeclampsia: Pathophysiology, diagnosis, and management. Vascular Health and Risk Management*. 7: 467-474
- WHO 2018 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- Wibowo B., Rachimhadi T., 2006. *Preeklamsia dan Eklampsia, dalam : Ilmu Kebidanan. Edisi III*. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, pp. 281-99

Wulandari, P., Sofitamia, A. and Kustriyani, M. (2019) 'The Effect of Guided Imagery to The Level of Anxiety of Trimester III Pregnant Woman in The Working Area of Mijen Health Center in Semarang City', *Media Keperawatan Indonesia*, 2(1), p. 29. doi: 10.26714/mki.2.1.2019.29-37.

Yogyakarta:Fitramaya.

Yu, Y. (2013) 'Patogenesis Kecemasan', *The Calgary Guide to Understanding Disease*.



Lampiran 1

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.238/KEPK/FKIK/IV/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol prepared by

Pencetus utama
Principal Investigator : Muhammad Saddam

Nama Institusi
Name of the Institution : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

"Hubungan Antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar"

"The Relationship of Anxiety with the Incidence of Preeclampsia in RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards: 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2023.

This declaration of ethics applies during the period April 14th, 2022 until 14th, 2023.

April 14th, 2022

Chair and Chairperson.



Syofiani, Sp.A., M.Kes

M A K A S S A R

Lampiran 2



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://slmap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **603/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi
Perihal : **izin penelitian** Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar Nomor: B-1726/Un.06/FKIK/PP.00.9/4/2022 tanggal 27 April 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **MUHAMMAD SADDAM**
Nomor Pokok : **70600118025**
Program Studi : **Pendidikan Dokter**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Palong-Gowa**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

*** HUBUNGAN ANTARA KECEMASAN DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR ***

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Mei s/d 09 Juni 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN




Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan FKIK UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Paringgal.

Lampiran 3





Lampiran 4



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jalan Jend. Sudirman No. 14 Telepon (0411) 3616134 Fax. 3612242
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/1574/RSKDP.1/VI/2022

Plt. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Saddam
NIM : 70600118025
Program Studi : S-1 Pendidikan Dokter
Kampus : Universitas Islam Negeri Alauddin

Telah melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan pada tanggal 09 April s/d 09 Juni 2022 di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi dengan judul "*Hubungan Antara Kecemasan dengan Kejadian Preeklampsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar*".
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Juni 2022

Plt. DIREKTUR,



drg. Andi Rukwati Ningsih, M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19691026 200502 2 002

Lampiran 5

```

a
  /BARCHART PERCENT
  /ORDER=ANALYSIS.

```

Frequencies

Notes

Output Created	16-JUN-2022 21:13:39	
Comments		
Input	Data	E:\Proposal Fix\SPSS\uji data 2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	93
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=Usia Pendidikan Pekerjaan Jarak_Kehamilan Paritas Abortus /BARCHART PERCENT /ORDER=ANALYSIS.	
Resources	Processor Time	00:00:02,36
	Elapsed Time	00:00:00,83

Statistics

		Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jarak_Kehamilan	Paritas	Abortus
N	Valid	93	93	93	93	93	93
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

M A K A S S A R

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<20 Tahun	4	4.3	4.3	4.3
	20-35 Tahun	71	76.3	76.3	80.6
	>35 Tahun	18	19.4	19.4	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	13	14.0	14.0	14.0
	SMP	43	46.2	46.2	60.2
	SMA	13	14.0	14.0	74.2
	S1	24	25.8	25.8	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	56	60.2	60.2	60.2
	Wirasaha	16	17.2	17.2	77.4
	PNS	21	22.6	22.6	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

Jarak_Kehamilan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 2 Tahun	44	47.3	47.3	47.3
	2 tahun	49	52.7	52.7	100.0
	Total	93	100.0	100.0	

ALAUDDIN
MAKASSAR

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kecemasan * Preeklampsia	93	100.0%	0	0.0%	93	100.0%

Kecemasan * Preeklampsia Crosstabulation

			Preeklampsia		Total
			Ya	Tidak	
Kecemasan	Cemas	Count	23	18	41
		% within Kecemasan	56.1%	43.9%	100.0%
	Tidak Cemas	Count	8	44	52
		% within Kecemasan	15.4%	84.6%	100.0%
Total		Count	31	62	93
		% within Kecemasan	33.3%	66.7%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.095 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	15.316	1	.000		
Likelihood Ratio	17.515	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	16.916	1	.000		
N of Valid Cases	93				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.67.

b. Computed only for a 2x2 table

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kecemasan (Cemas / Tidak Cemas)	7.028	2.655	18.606
For cohort Preeklampsia = Ya	3.646	1.824	7.288
For cohort Preeklampsia = Tidak	.519	.360	.747
N of Valid Cases	93		

Statistics

		Variabel_Preeklampsia	Cemas
N	Valid	31	31
	Missing	0	0

Frequency Table

Variabel_Preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Preeklampsia	31	100.0	100.0	100.0

Cemas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Cemas	23	74.2	74.2	74.2
	Tidak Cemas	8	25.8	25.8	100.0
Total		31	100.0	100.0	

Variabel_Tidak_Preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Preeklampsia	62	100.0	100.0	100.0

Cemas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak Cemas	44	71.0	71.0	71.0
	Cemas	18	29.0	29.0	100.0
Total		62	100.0	100.0	

Lampiran 5

LEMBAR PERSETUJUAN INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Alamat :

Pekerjaan :

Setelah mendapatkan keterangan yang cukup dari peneliti serta menyadari manfaat dari penelitian tersebut di bawah ini yang berjudul:

“Hubungan Antara Kecemasan Dengan Kejadian Preeklamsia di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar”

Dengan sukarela dan tanpa paksaan menyetujui untuk ikut serta dalam penelitian ini. Apabila suatu saat merasa dirugikan dalam bentuk apapun, berhak membatalkan persetujuan ini serta berhak untuk mengundurkan diri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya

Makassar, 2022

Mengetahui,

Yang menyatakan

Penanggung jawab penelitian

Responden Penelitian

() ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 6

Hamilton Rating Scale For Anxiety

(HARS)HAMILTON RATING SCALE FOR ANXIETY(HARS)

Nomor Responden :

Nama Responden :

Tanggal Pemeriksaan :

Skor : 0 = tidak ada
1 = ringan
2 = sedang
3 = berat
4 = berat sekali

Total Skor : < 14 = tidak ada kecemasan
14 – 20 = kecemasan ringan
21 – 27 = kecemasan sedang
28 – 41 = kecemasan berat
42 – 56 = kecemasan berat sekali

No	Pertanyaan	0	1	2	3	4
1	Perasaan Ansietas - Cemas - Firasat Buruk - Takut Akan Pikiran Sendiri - Mudah Tersinggung					
2	Ketegangan - Merasa Tegang - Lesu - Tak Bisa Istirahat Tenang - Mudah Terkejut - Mudah Menangis - Gemetar - Gelisah					
3	Ketakutan - Pada Gelap - Pada Orang Asing - Ditinggal Sendiri - Pada Binatang Besar - Pada Keramaian Lalu Lintas - Pada Kerumunan Orang Banyak					
4	Gangguan Tidur - Sukar Tidur - Terbangun Malam Hari - Tidak Nyenyak - Bangun dengan Lesu - Banyak Mimpi-Mimpi - Mimpi Buruk - Mimpi Menakutkan					
5	Gangguan Kecerdasan - Sukar Konsentrasi - Daya Ingat Buruk					
6	Perasaan Depresi - Hilangnya Minat - Berkurangnya Kesenangan Pada Hobi - Sedih - Bangun Dini Hari - Perasaan Berubah-Ubah Sepanjang Hari					
7	Gejala Somatik (Otot) - Sakit dan Nyeri di Otot-Otot - Kaku - Kedutan Otot - Gigi Gemerutuk - Suara Tidak Stabil					

8	Gejala Somatik (Sensorik) - Sensasi telinga berdenging - Penglihatan Kabur - Muka Merah atau Pucat - Merasa Lemah - Perasaan ditusuk-Tusuk					
9	Gejala Kardiovaskuler - Takikardia - Berdebar - Nyeri di Dada - Perasaan Lesu/Lemas Seperti Mau Pingsan					
10	Gejala Respiratori - Rasa Tertekan atau Sempit di Dada - Perasaan Tercekik - Sering Menarik Napas - Napas Pendek/Sesak					
11	Gejala Gastrointestinal - Sulit Menelan - Perut Melilit - Gangguan Pencernaan - Nyeri Sebelum dan Sesudah Makan - Perasaan Terbakar di Perut - Rasa Penuh atau Kembung - Mual - Muntah - Kehilangan Berat Badan - Sukar Buang Air Besar (Konstipasi)					
12	Gejala Urogenital - Sering Buang Air Kecil - Tidak Dapat Menahan Air Seni - Amenorrhoe - Menorrhagia					
13	Gejala Otonom - Mulut Kering - Muka Merah - Mudah Berkeringat - Pusing, Sakit Kepala - Bulu-Bulu Berdiri					
14	Tingkah Laku Pada Wawancara - Gelisah - Tidak Tenang - Jari Gemetar - Kerut Kening - Muka Tegang - Tonus Otot Meningkatkan - Napas Pendek dan Cepat - Muka Merah					

Skor Total =

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Muhammad Saddam
2. NIM : 70600118025
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Kaballangang, Pinrang.
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Mustari
 - b. Ibu : Andi Muni

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN : 39 Batri
2. SMP : MTs Al- Badar Parepare
3. SMA : MA Al-Badar Parepare
4. S1 : Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ALAUDDIN
MAKASSAR