


**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN
ABORTUS IMMINENS
TAHUN 2020
(Literatur Review)**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**



Oleh :
NUR ANJANI
NIM : 70400117052

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Anjani

Nim : 70400117052

TTL : Lanta, 13 April 1999

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Perintis, Makassar

Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Abortus Imminens.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Perintis-Makassar, 16 Oktober 2021

Penulis

Nur Anjani
70400117052

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Anjani

Nim : 70400117052


Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Abortus Imminens


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Gowa-Samata 11 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Zelfa Yuni Andryani, S.ST., M.Keb
NIP : 198903282 019032 2 018


dr. Andi Tihardimanto K. S.Ked., M.Kes
NIP : 198530707 200912 2 004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Abortus Imminens (Literatur Review)**”. Yang disusun oleh **Nur Anjani** Nim: **70400117052**, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mahdya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 10 Maret 2022

4 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT., M.Keb	(.....)
Pembimbing I	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing II	: dr. Andi Tihardimanto K., M.Kes	(.....)
Penguji I	: Dr. Hj. Siti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Sohrah, M. Ag	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul “**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Abortus Imminens**” dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu, masukan, kritik, serta saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada.

Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M. A. Ph.D., selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Aalauddin Makassar.
2. Kepada ibu Dr. dr. Sya'rah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Firdayanti, S.SiT., M.Keb, selaku Ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alaluddin Makassar.
4. Ibu Anieq Mumthi'ah Alkautsar, S.ST., M.Keb, selaku Sekertaris Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Ibu Zelna Yuni Andriani, S.ST., M.Keb, selaku Pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktunya demi membimbing, membantu, serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan laporan tugas akhir.
6. Bapak dr. Andi Tihardimanto K., M.Kes, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan watkunya demi membantu membimbing serta

memberikan saran yang membangun dalam penyusunan laporan tugas akhir.

7. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb, selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk perbaikan karya tulis ilmiah (*Literatur Review*) ini.
8. Ibu Dr. Hj. Sohras, M. Ag, selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah (*Literatur Review*) ini.
9. Dosen-dosen dan staf Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan kebidanan, menyelesaikan pendidikan hingga selesainya karya tulis ilmiah ini.
10. Orang tua tercinta Ibunda Masnah dan Ayahanda Makasau yang senantiasa memberikan dukungan material dan moral serta do'a yang tak henti-hentinya.
11. Mahasiswa seangkatan tahun 2017 Jurusan Kebidanan serta teman yang lain di luar sana yang telah memberikan dorongan berupa semangat dan memberikan saran serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik ini secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Perintis-Makassar, 16 Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	4
D. Tujuan Penulisan.....	4
E. Manfaat Penulisan.....	5
F. Metode Penulisan.....	6
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Kehamilan.....	9
1. Pengertian Kehamilan.....	9
2. Tanda dan Gejala Kehamilan.....	12
3. Perubahan Anatomi dan Fisiologi Pada ibu hami.....	16
4. Tanda Bahaya Pada Kehamilan	17
5. Etiologi Kehamilan.....	18
6. Komplikasi Kehamilan.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Abortus	20
1. Pengertian Abortus.....	20
2. Macam-Macam Abortus.....	22
3. Etiologi	23
4. Faktor Resiko Abortus.....	27
5. Patofisiologi	27

6. Diagnosis.....	27
7. Tatalaksana Umum.....	28
8. Komplikasi	28
C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Imminens	29
1. Pengertian Abortus Imminens	29
2. Tanda dan Gejala Abortus Imminens.....	30
3. Etiologi Abortus Imminens.....	30
4. Diagnosis.....	30
5. Penanganan Abortus Imminens	31
6. Komplikasi Abortus Imminens	31
D. Manajemen Asuhan Kebidanan.....	31
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan	31
2. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan	32
BAB III TELUSURAN <i>EVIDANCE BASED LEARNING</i>.....	43
A. Matriks Langkah I.....	43
B. Matriks Langkah II.....	54
C. Matriks Langkah III.....	65
D. Matriks Langkah IV.....	76
E. Matriks Langkah V.....	87
F. Matriks Langkah VI.....	98
G. Matriks Langkah VII.....	115
BAB IV PEMBAHASAN.....	126
A. Pembahasan Hasil Telah <i>Evidence Based</i> Asuhan 7 Langkah Varney berdasarkan Hasil Penelitian Referensi.....	126
B. Implikasi Kebidanan.....	153
BAB V PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	158

ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATUR REVIEW, NOVEMBER 2021**

Nama : Nur Anjani
Nim : 70400117052
Pembimbing I : Zelna Yuni Andriani
Pembimbing II : Andi Tihardimanto K.
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Abortus Imminens (*Literatur Review*)

Abortus imminens didefinisikan gangguan kehamilan yang kerap datang ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup.

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan literatur review dengan mengumpulkan berbagai referensi baik dari buku, jurnal nasional maupun jurnal internasional melalui pendekatan 7 langkah Varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Dari hasil telah berbagai sumber diagnosa abortus imminens ditegaskan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang lengkap dengan melihat terjadinya perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan positif. Masalah yang akan terjadi jika abortus imminens dibiarkan akan terjadi perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus dan kematian. Selain itu berdasarkan kondisi dan kebutuhan ibu dimana dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemberian terapi obat.

Kesimpulan dari literatur review ini yaitu tergantung dari penyebab abortus imminens serta kondisi pasien, jika dilakukan pendekatan dan tatalaksana yang cepat, tepat dan sesuai maka dari hasil evaluasi didapatkan keadaan balita lebih baik tanpa adanya penyulit serta masalah atau komplikasi yang akan terjadi. Peran bidan dalam penanganan abortus adalah sebagai penolong kegawat daruratan yaitu kolaborasi.

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan pada Antenatal, Abortus Imminens, 7 langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
LITERATURE REVIEW, NOVEMBER 2021

Name : Nur Anjani
Reg. Number : 70400117052
Supervisor I : Zelna Yuni Andriani
Supervisor II : dr. Andi Tihardimanto K., M.Kes
Title : Antenatal Midwifery Care Management with the Case of Abortus Imminens (*A Literature Review*)

Imminent Abortion is defined as a pregnancy disorder that often occurs during the gestational age of 20 weeks characterized by blood spots in which the condition of the fetus is alive.

The methodological approach used in this research was a literature review. The main research data were taken from books, national and international journals, and other related documents. The research was conducted based on the 7 stages of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

Based on the analysis of this research, it was apparent that in the case of imminent abortion, a complete physical examination is needed in order to understand the condition of patients. There are several signs and symptoms that could be recognized namely the occurrence of bleeding through the external uterine ostium, the unwell feeling of the patient, and the enlargement of the uterus. Moreover, the condition of cervix is yet to be opened, while the pregnancy test is positive. With those symptoms, patients should be given treatments to avoid several problems such as bleeding, perforation, infection, shock, tetanus and even death. In addition, depending on the condition and needs of the patient, collaboration with obgyn specialists is mostly needed to provide the patient with a drug therapy.

This research concludes that the occurrences of imminent abortus could be identified with several symptoms. Once it is identified, appropriate treatments and medication should be given to the patient. Based on the analysis from the research, it is apparent that no particular complication would be found as long as the treatments are well conducted. Furthermore, a collaboration between midwives and obgyn specialists are highly needed.

Key Words: Antenatal Midwifery Care Management, Imminent Abortus, 7 stages of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan upaya kesehatan ibu, di antaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI). AKI adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2016 dalam Ardenela, 2018).

Menurut data *World Health Organization* (WHO), angka kematian ibu didunia pada tahun 2015 adalah 216 per 100.000 kelahiran hidup atau diperkirakan jumlah kematian ibu adalah 303.000 kematian dengan jumlah tertinggi berada di negara berkembang yaitu sebesar 302.000 kematian. Angka kematian ibu di negara berkembang 20 kali tinggi dibandingkan angka kematian ibu di negara maju yaitu 239 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan di negara maju hanya 12 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 (WHO, 2015 dalam Rahayu, dkk: 2018).

Menurut data WHO, angka kematian ibu karena abortus masih sebanyak 15-50 % kematian. Tingkat abortus lebih tinggi di daerah berkembang daripada daerah maju. WHO memperkirakan terdapat sekitar 4,2 juta kejadian abortus setiap tahun di Asia Tenggara yaitu 1,3 juta di Vietnam dan Singapura, antara 750.000 sampai 1,5 juta di Indonesia, 155.000 sampai 750.000 di Filipina dan 300.000 sampai 900.000 di Thailand di perkirakan kasus abortus di Indonesia mencapai 2,3 juta kasus setiap tahunnya (WHO, 2016 dalam Citra, 2019).

Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2015 angka kematian ibu (AKI) di Indonesia sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Salah satu penyumbang tingginya angka kematian ibu secara nasional adalah angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah

sebesar 111,16 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, yang diikuti pula dengan tingginya angka kematian ibu (AKI) di Kota Semarang yang pada tahun 2016 yaitu 121,5 per 100.000 kelahiran hidup.(SDKI, 2015 dalam Pandori, dkk. 2018).

Di akhir 2015, *Millenium Development Goals* (MDGs) berakhir dan digantikan dengan kerangka pembangunan yang baru yakni *sustainableDevelopmentGoals* (SDGs) yang disahkan di akhir bulan september 2015. SDGs menargetkan AKI 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target tersebut sangat jauh dibandingkan dengan hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (Kemenkes, 2016 dalam Ardenela, 2018).

Kemudian target SDGs untuk AKB sebesar 12/1000 kelahiran hidup di tahun 2030. Padahal berdasarkan data SUPAS tahun 2015, AKB baru mencapai 22,23/1000 kelahiran hidup. Berdasarkan angka ini maka secara kasar dapat diperhitungkan perkiraan angka kematian bayi (AKB) di Sumatera Utara tahun 2016 yakni 4/1.000 kelahiran hidup (KH) (Kemenkes, 2016 dalam Ardenela, 2018).

Sedangkan data yang diperoleh dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 jumlah abortus sebanyak 120 orang. Tahun 2014 angka kematian ibu sebanyak 13.598 ibu bersalin dan didapatkan kematian ibu sekitar 200 ibu meninggal karena abortus, kematian ibu hamil 22 orang, kematian ibu bersalin 55 orang, sedangkan ibu nifas 41 orang. (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2015 dalam Ruqaiyah, dkk, 2019).

Angka kejadian abortus di Sulawesi Selatan dilaporkan bahwa pada periode januari sampai desember 2013, kasus abortus sebesar 3.499 kasus. Beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya abortus adalah status anemia, paritas, dan usia. (Dinkes Provinsi Sul-Sel, 2013 dalam Sri, dkk. 2013).

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan angka kematian ibu mengalami kenaikan penurunan yaitu pada tahun 2015 sebanyak 149 jiwa, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 156 jiwa,

dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 115 jiwa. (Dinkes, 2017 dalam Rahayu, dkk. 2018).

Distribusi penyebab kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 karena perdarahan yang didalamnya termasuk kasus abortus karena dalam laporan hanya disebutkan perdarahan atau sepsis sebanyak 55 orang (39,85%), infeksi sebanyak 3 orang (2,17%), karena gangguan system peredaran darah sebanyak 2 orang (1,44%), dan karena penyebab lain sebanyak 34 kasus (24,63%). (Profil Dinkes Sul-Sel, 2014 dalam Rosmanengsi, 2017).

Angka kematian ibu di Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 5 jiwa, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 6 jiwa dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yaitu 5 jiwa (Dinkes, 2017). Cakupan kunjungan ibu hamil k1 dan k4 di Sulawesi selatan adalah sebesar 81,31 %. (Kemenkes RI, 2014 dalam Rahayu, dkk. 2018).

Berdasarkan data dari Rekam Medik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, ditemukan data pada tahun 2016 tercatat sebanyak 462 penderita abortus imminens. Pada tahun 2017 sebanyak 600 penderita dan sampai bulan November tahun 2018 tercatat sebanyak 782 penderita abortus imminens yang dirawat jalan dan dirawat inap (Rekam Medik RSU Bhayangkara Makassar).

Salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan ialah terjadinya perdarahan. Perdarahan dapat terjadi pada setiap usia kehamilan, kejadian perdarahan dapat terjadi pada setiap usia kehamilan,. Kejadian perdarahan pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan abortus. Abortus adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau umur kehamilan kurang dari 22 minggu atau buah kehamilan belum mampu untuk hidup diluar kandungan. Perdarahan juga dapat menyebabkan anemia, syok, dan kematian.

Penyebab abortus (*early pregnancy loss*) bervariasi dan sering diperdebatkan. Umumnya lebih dari satu penyebab. Penyebab terbanyak di antaranya yaitu, faktor genetik, kelainan kongenital uterus, autoimun, defek

fase luteal, infeksi, hematologik, dan lingkungan. (Prawirohardjo, 2016: 460-461).

Dalam penanganan abortus, cara-cara yang digunakan meliputi cara-cara yang sesuai dengan protokol medis maupun cara-cara tradisional, yang dilakukan oleh dokter, bidan maupun dukun beranak, baik di kota-kota besar maupun di daerah terpencil.

Dari data di atas, maka terbukti bahwa kasus abortus imminens semakin meningkat dari tahun ke tahun dan komplikasi perdarahan sangat membahayakan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itulah sehingga penulis tertarik untuk menyusun karya tulis ilmiah dengan judul 'Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ibu Hamil Dengan Abortus Imminens Di RSUD Bhayangkara Makassar', karena penanganan secara dini oleh petugas kesehatan sangat diperlukan khususnya sebagai bidan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Abortus Imminens.

D. Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum

Dapat menyusun *Literatur Review* Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Abortus Imminens. Melalui pendekatan dengan menggunakan manajemen kebidanan 7 langkah varney sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Didapatkannya data subjektif dan objektif dari tanda dan gejala dari berbagai referensi tentang abortus imminens.

- b. Didapatkannya hasil rumusan diagnose dari referensi tentang ibu hamil dengan abortus imminens.
- c. Didapatkannya informasi komplikasi yang bisa timbul dari berbagai referensi pada ibu hamil dengan abortus imminens.
- d. Didapatkannya informasi dari berbagai referensi tentang kondisi emergensi yang dapat terjadi serta penangannya pada ibu hamil dengan abortus imminens.
- e. Didapatkannya simpulam dari berbagai intervensi apa saja penatakasanaan yang tepat pada ibu hamil dengan abortus imminens.
- f. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada ibu hamil dengan abortus imminens.
- g. Didapatkannya penjelasan dan simpulan dari berbagai sumber kondisi yang menjadi dasar evaluasi pada ibu hamil dengan abortus imminens.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu persyaratan dan menyelesaikan ujian akhir program diploma kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

3. Manfaat bagi institusi

Diharapkan literatul review ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi institusi pendidikan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis dalam penerapan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens. Penulisan ini juga merupakan pengalaman yang berharga karena dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens.

5. Manfaat bagi pembaca

Sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca tentang Manajemen Asuhan Kebidanan pada ibu hamil dengan abortus imminens.

F. Metode Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, metode yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur, dan media internet yang berhubungan dengan abortus imminens.

2. Studi Kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, dengan 7 langkah meliputi: identifikasi data dasar, identifikasi diagnose atau masalah aktual, identifikasi diagnose atau masalah potensial, tindakan segera atau kolaborasi, rencana asuhan atau intervensi, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi ini dilakukan untuk mempelajari status kesehatan klien, baik yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium dan hasil-hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dibutuhkan dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Pada metode ini penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga klien, petugas kesehatan dan dosen pembimbing baik di lahan maupun institusi yang membantu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

G. Sistematika penulisan

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TINGKATAN

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar belakang
- b. Ruang lingkup
- c. Manfaat penulisan
- d. Metode penulisan
- e. Sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- a. Tinjauan umum tentang kehamilan
- b. Tinjauan umum tentang abortus imminens
- c. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Imminens
- d. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

BAB III TELUSURAN *EVIDANCEBASED LEARNING*

- a. MATRIKS LANGKAH I
- b. MATRIKS LANGKAH II
- c. MATRIKS LANGKAH III
- d. MATRIKS LANGKAH IV
- e. MATRIKS LANGKAH V
- f. MATRIKAS LANGKAH VI
- g. MATRIKS LANGKAH VII

BAB IV PEMBAHASAN

- a. Pembahasan hasil telah *evidence based* asuhan 7 langkah varney berdasarkan hasil penelusuran referensi
- b. Implikasi kebidanan

BAB V PENUTUP

c. KESIMPULAN

d. SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Menurut *Federasi Obstetric Ginekologi Internasional*, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari *spermatozoa* dan *ovum* yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung pada saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, di mana trimester ke satu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke-13 hingga minggu ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40). (Prawirohardjo, 2016: 213).

Masa kehamilan yaitu dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Saifuddin, 2006 dalam Nadyah, 2013).

Kehamilan umumnya berlangsung 40 minggu atau 280 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan aterm ialah usia kehamilan antara 38-42 minggu dan ini merupakan periode terjadinya persalinan normal. (Prawirohardjo, 2016: 685).

Kehamilan merupakan kondisi alamiah yang unik karena meskipun bukan penyakit, tetapi seringkali menyebabkan komplikasi akibat berbagai perubahan anatomik serta fisiologik dalam tubuh ibu. (Prawirohardjo, 2016: 774).

Kehamilan adalah hasil dari sperma dan sel telur. Dalam prosesnya perjalanan sperma untuk menemui sel telur (*ovum*) betul-betul penuh dengan perjuangan. Dari sekitar 20-40 juta sperma dikeluarkan, hanya sedikit yang berhasil mencapai tempat sel telur. Dari jumlah yang sudah

sedikit itu, hanya 1 sperma saja yang bisa membuahi sel telur (Walyani, 2015 dalam Aisah, 2016).

Kehamilan merupakan suatu proses alamiah yang terjadi pada wanita dan bukan proses patologis, tetapi keadaan normal dapat menjadi patologi. Oleh sebab itu dalam melakukan asuhan tidak perlu melakukan intervensi yang tidak perlu kecuali ada indikasi. (Agusti, dkk. 2018:1).

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ يَا رَبِّ عَلَقَةٌ يَا رَبِّ مُضْغَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذْكَرٌ يَارَبِّ أُنْثَى يَا رَبِّ سَعِيدٌ أَمْ سَعِيدٌ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

Artinya:

“Dan Anas bin Malik (moga-moga ridha Allah terlimpah atasnya), dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah Ta’ala menugaskan satu malaikat dalam Rahim seseorang. Malaikat itu berkata; “Wahai Rabb, sekarang baru sperma, wahai Rabb, segumpal darah, wahai Rabb (sekarang jadi) segumpal daging”. Maka bila Allah menghendaki menciptakan janin itu, malaikat itu berkata; “ Wahai Rabb, laki-laki, wahai Rabb (atau) perempuan, Wahai Rabb sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, kapan ajalnya. Demikianlah ditulis ketetapanannya selagi berada di dalam perut ibunya” (H.R. Bukhari, Muslim dan Al-Imam Ahmad).

Dalam hadist yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dan Al-Imam Ahmad ini dijelaskan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang lepas dari penjagaan Allah swt, sampai bagi tiap-tiap anak dalam kandungan sudah sedia malaikat yang menjaga pertumbuhannya, sejak air segumpal (*nutfah*), sampai darah segumpal (*alaqah*), dan sampai daging segumpal (*mudghah*) dan pertumbuhan selanjutnya, akan jadi atau akan gugur dalam kandungan sudah dala ilmu dan ketentuan Allah swt. Bahkan

celaka atau bahagianya, rezeki atau ajalnya, semua sudah tertentu. Hanya kita manusia yang tidak tahu (Al-Maragi, 1994).

Ayat di atas dijelaskan bahwa dalam penciptaan manusia dari *nutfah* yakni setetes mani, kemudian setetes mani menjadi *alaqah* yakni sesuatu yang berdempet di dinding Rahim kemudian *alaqah* itu mengalami proses menjadi *mudhghah* yakni berupa sekerat degung kecil sebesar apa yang dapat dikunyah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ada *mudhghah* yang sempurna kejadiannya sehingga dapat berproses sampai lahir manusia sempurna, dan ada juga tidak sempurna kejadiannya. Makna ayat ini memberikan penjelasan bahwa dalam penciptaan manusia ada yang mengalami proses penciptaan yang tidak sempurna. Sebagaimana kehamilan yang berlangsung dengan normal (selama Sembilan bulan) dan diharapkan lahir normal, sehat sempurna fisiknya. Atas kehendak Allah Swt. Kehamilan bisa berlangsung sebelum sampai pada usia Sembilan bulan melainkan kurang ataupun lebih, lahir dengan sehat atau gugur sebelum dilahirkan.

Dalam al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberikan petunjuk yang perlu kita laksanakan dalam kaitannya dengan ibu hamil dengan abortus ialah (Q. S. Al-Anfal/ 8: 27).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah, bersyukur atas

nikmat yang diberikan, dan juga jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SAW atas amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu seperti halnya yang diberikan amanat atau kepercayaan untuk hamil, berarti Allah menitipkan kepercayaan kepadanya dan merasa aman bahwa sesuatu yang dititipkan itu akan dipelihara olehnya dengan baik. Segala sesuatu yang berada dalam genggamannya manusia adalah amanat Allah Swt. Termasuk keluarga dan anak-anak adalah amanat-Nya. Dalam ayat ini pula ditegaskan bahwa siapa yang mengkhianati amanat berarti mengkhianati Allah dan Rasulnya dan sama halnya mengkhianati dirinya sendiri.

Setelah ayat yang lalu menyebutkan aneka nikmat dan ditutup dengan kewajiban mensyukurinya, di sini orang-orang yang beriman diingatkan agar tidak mengabaikan perintah bersyukur itu dengan menegaskan bahwa: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati yakni mengurangi sedikitpun hak, Allah sehingga mengkhianati-Nya atau tidak mensyukuri-Nya dan jangan mengkhianati Rasulullah Muhammad SWA. Tetapi perkenankanlah serunya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, oleh siapa pun, baik amanat itu amanat orang lain maupun keluarga seperti istri dan anak, muslim ataupun non muslim, sedang kamu mengetahui (Tafsir Al-Misbah, 2009:508).

2. Tanda Dan Gejala Kehamilan

a. Tanda Tidak Pasti

Tanda tidak pasti adalah perubahan –perubahan yang dirasakan oleh ibu subyektif yang timbul selama kehamilan. Yang termasuk tanda pasti adalah:

1) *Amenorrhoe*

Pada wanita sehat dengan haid yang teratur, *amenorrhoe* menandakan kemungkinan kehamilan. Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi.

2) *Nausea* dan *Emesis*

Pada umumnya, *nausea* terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan sampai akhir triwulan pertama dan kadang-kadang disertai oleh muntah.

Nausea sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu, keadaan ini lazim disebut *morning sickness*. Dalam batas tertentu, keadaan ini masih fisiologis, namun bila terlampau sering dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut dengan hiperemesis gravidarum.

3) Mengidam

Sering terjadi pada bulan-bulan pertama dan menghilang dengan makin.

4) Pembesaran payudara

Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktus dan alveoli pada mammae sehingga *glandula montgomery* tampak lebih jelas.

5) Anoreksia

Keadaan ini terjadi pada bulan-bulan pertama tetapi setelah itu nafsu makan akan timbul kembali.

6) Sering buang air kecil

Keadaan ini terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua, umumnya keluhan ini hilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan, gejala ini bisa timbul kembali karena janin mulai masuk ke rongga panggul dan menekan kembali kandung kencing.

7) Obstipasi

Keadaan ini terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormon steroid.

8) Pigmentasi kulit

Keadaan ini terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan pada pipi, hidung dan dahi yang dikenal dengan cloasma gravidarum (topeng kehamilan). Areola mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi lebih hitam dan linea alba. Hal ini terjadi karena pengaruh hormon kortiko steroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

9) Epulis

Epulis merupakan suatu *hipetrofi papilla gingivae* yang sering terjadi pada triwulan pertama.

10) Varises (penekanan vena-vena)

Keadaan ini sering dijumpai pada triwulan terakhir dan terdapat pada daerah genetalis eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis. Pada multigravida, kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, kemudian timbul kembali pada triwulan pertama, kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala pertama kehamilan muda.

b. Tanda Kemungkinan Hamil

Tanda kemungkinan hamil adalah perubahan-perubahan yang diobservasi oleh pemeriksa (bersifat objektif), namun berupa dugaan kehamilan saja. Semakin banyak tandatanda yang didapatkan, semakin besar pula kemungkinan kehamilan. Yang termasuk tanda kemungkinan hamil adalah:

1) Uterus membesar

Pada keadaan ini, terjadi perubahan bentuk, besar dan konsistensi rahim. Pada pemeriksaan dalam, dapat diraba bahwa uterus membesar dan semakin lama semakin bundar bentuknya.

2) Tanda hegar

Konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, terutama daerah ismus. Pada minggu-minggu pertama, ismus uteri mengalami hipertrofi seperti korpus uteri. Hipertrofi ismus pada triwulan pertama mengakibatkan ismus menjadi panjang dan lebih lunak sehingga kalau diletakkan dua jari dalam fornix posterior dan tangan satunya pada dinding perut di atas simpisis maka ismus ini tidak teraba seolah-olah korpus uteri sama sekali terpisah dari uterus.

3) Tanda Chadwick

Hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan agak kebiru-biruan (livide). Warna porsio pun tampak livide. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hormone estrogen.

4) Tanda Piskasek

Uterus mengalami pembesaran, kadang-kadang pembesaran tidak rata tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya. Hal ini menyebabkan uterus membesar ke salah satu jurusan pembesaran tersebut.

5) Tanda Braxton Hicks

Bila uterus dirangsang, akan mudah berkontraksi. Waktu palpasi atau pemeriksaan dalam uterus yang awalnya lunak akan menjadi keras karena berkontraksi. Tanda ini khas untuk uterus dalam masa kehamilan.

6) Goodell sign

Di luar kehamilan konsistensi serviks keras, kerasnya seperti merasakan ujung hidung, dalam kehamilan serviks menjadi lunak pada perabaan selunak vivir atau ujung bawah daun telinga.

7) Reaksi kehamilan positif

Cara khas yang dipakai dengan menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air seni

pertama pada hari. Dengan tes ini, dapat membantu menentukan diagnosa kehamilan sedini mungkin.

c. Tanda Pasti

Tanda pasti adalah tanda-tanda objektif yang didapatkan oleh pemeriksa yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosa pada kehamilan. Yang termasuk tanda pasti kehamilan adalah:

1) Terasa gerakan janin

Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan oleh ibunya pada kehamilan 18 minggu. Sedangkan pada multigravida, dapat dirasakan pada kehamilan 16 minggu karena telah berpengalaman dari kehamilan terdahulu. Pada bulan keempat dan kelima, janin berukuran kecil jika dibandingkan dengan banyaknya air ketuban, maka kalau rahim didorong atau digoyangkan, maka anak melenting di dalam rahim.

2) Teraba bagian-bagian janin

Bagian-bagian janin secara objektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan cara palpasi menurut Leopold pada akhir trimester kedua.

3) Denyut jantung janin

Denyut jantung janin secara objektif dapat diketahui oleh pemeriksa dengan menggunakan:

- a) Fetal electrocardiograph pada kehamilan 12 minggu.
- b) Sistem doppler pada kehamilan 12 minggu.
- c) Stetoskop leanec pada kehamilan 18-20 minggu.

4) Terlihat kerangka janin pada pemeriksaan sinar rontgen.

Dengan menggunakan USG dapat terlihat gambaran janin berupa ukuran kantong janin, panjangnya anin dan diameter bipateralis sehingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan. (Agusti, dkk. 2018: 5-10).

3. Perubahan Anatomi Dan Fisiologi Pada Ibu Hamil

a. Rahim atau uterus

Rahim yang besarnya sejempol atau beratnya 30 gram akan menjadi 1000 gram saat akhir kehamilan.

b. Vagina

Vagina dan vulva akan mengalami peningkatan pembuluh darah karena pengaruh estrogen sehingga tampak makin merah dan kebiru-biruan.

c. Ovarium

Dengan terjadinya kehamilan, indung telur yang akan meneruskan fungsinya sampai terbentuknya plasenta yang sempurna pada umur kehamilan 16 minggu.

d. Payudara

Payudara menjadi lebih besar, *Glandula Montgomery* makin tampak, areola payudara makin *hiperpigmentasi* (menghitam), puting susu makin menonjol.

e. Sirkulasi darah

Sel darah makin meningkat jumlahnya untuk mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim. Serum darah (volume darah) meningkat sebesar 25-30 % sedangkan sel darah bertambah sekitar 20 %.

f. Berat badan ibu hamil berubah

Berat badan ibu hamil akan bertambah antara 6,5 sampai 16,5 kg selama hamil atau terjadi kenaikan berat badan sekitar 0,5 kg/minggu. (Agusti, dkk. 2018: 11-12).

4. Tanda Bahaya Dalam Kehamilan

a. Perdarahan pervaginam

Perdarahan pervaginam dalam kehamilan ada yang bersifat fisiologis maupun patologis. Perdarahan yang bersifat fisiologis terjadi pada awal kehamilan yang terjadi oleh proses implantasi. Sedangkan perdarahan pervaginam yang bersifat patologis ada dua yaitu yang terjadi pada awal kehamilan dan pada masa kehamilan lanjut.

b. Penglihatan/pandangan kabur

Masalah visual yang mengidentifikasi keadaan yang mengancam jiwa adalah perubahan visual mendadak, misalnya penglihatan kabur atau terbayang, melihat bintik-bintik (*spot*) dan berkunang-kunang.

c. Bengkak pada muka dan tangan

Hampir separuh ibu hamil akan mengalami bengkak yang normal pada kaki. Bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius apabila bengkak yang muncul pada muka dan tangan tidak hilang setelah istirahat, disertai sakit kepala hebat, pandangan mata kabur, hal ini merupakan tanda anemia, gagal jantung, atau preeklamsi.

d. Nyeri perut yang hebat

Nyeri abdomen yang mungkin menunjukkan masalah yang mengancam keselamatan jiwa adalah yang hebat, menetap dan tidak hilang setelah beristirahat.

e. Gerakan bayi yang berkurang

Gerakan janin terjadi pada usia kehamilan 20-24 minggu. Bayi harus bergerak paling sedikit 3 kali dalam periode 3 jam. Gerakan janin akan lebih muda terasa jika ibu makan dan minum dengan baik. Ibu hamil perlu melaporkan jika terjadi penurunan atau gerakan yang berhenti. (Agusti, dkk. 2018: 20-22).

5. Etiologi

Suatu kehamilan akan terjadi bila terdapat 5 aspek berikut, yaitu:

a. Ovum

Ovum adalah suatu sel dengan diameter $\pm 0,1$ mm yang terdiri dari suatu nukleus yang terapung-apung dalam vitelus dilingkari oleh zona pellusida oleh kromosom radiata.

b. Spermatozoa

Berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala berbentuk lonjong agak gepeng berisi inti, leher yang menghubungkan kepala dengan bagian

tengah dan ekor yang dapat bergerak sehingga sperma dapat bergerak cepat.

c. Konsepsi

Konsepsi adalah suatu peristiwa penyatuan antara sperma dan ovum di tuba fallopi.

d. Nidasi

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium.

e. Plasentasi

Plasentasi adalah alat yang sangat penting bagi janin yang berguna untuk pertukaran zat antara ibu dan anaknya dan sebaliknya. (Mochtar, 2011 dalam Puji, 2017).

6. Komplikasi

Komplikasi yang mungkin terjadi pada wanita hamil:

a. Perdarahan

Perdarahan dalam kehamilan dibagi menjadi 2, yaitu:

- 1) Perdarahan abortus.
- 2) Perdarahan antepartum. (Pujiningsih, 2010 dalam Meitri, 2018).

b. Hipertensi

1) Pengertian Hipertensi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg atau lebih dan tekanan darah distolic 90 mmHg atau lebih (Darmawansyih, 2014).

2) Faktor-faktor penyebab hipertensi

- a) Usia
- b) Riwayat keluarga
- c) Jenis kelamin
- d) Konsumsi garam yang tinggi
- e) Kegemukan atau makan berlebihan
- f) Kurangnya kontrol kesehatan secara urin

c. Preeklampsia

Preeklampsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, oedema, dan protein urin akibat kehamilan, terutama pada komplikasi primigravida terjadi setelah usia gestasi 30 sampai 40 minggu. Bila terjadi pre eklampsia, gejala yang paling umum adalah sakit kepala, gangguan penglihatan (sering dalam bentuk kilatan cahaya), muntah, nyeri *epigastrium*, dan *oedema* (bengkak). Terkadang preeklampsia bisa berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawa yang disebut eklampsia. (Siwi, 2015 dalam Meitri, 2018).

d. Eklampsia

Eklampsia adalah suatu hipertensi emergensi dan menyebabkan beberapa komplikasi berat, seperti hilangnya penglihatan, pembengkakan otak, kejang tonik klonik atau konvulsi, gagal ginjal, oedema paru, dan koagulasi intravaskular diseminata (gangguan pembekuan darah). (Siwi, 2015 dalam Meitri, 2018)

Kumpulan gejala yang timbul pada wanita hamil bersalin dan dalam ibu nifas yang terdiri dari trias: hipertensi, protein urin, dan oedema yang kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. (Siwi, 2015 dalam Meitri, 2018).

B. Tinjauan Umum Tentang Abortus

1. Pengertian Abortus

Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 g. (Prawirohardjo, 2016: 460).

Abortus adalah pengakhiran kehamilan, baik secara spontan maupun disengaja, sebelum 20 minggu berdasarkan hari pertama haid terakhir. (Leveno, 2015 dalam Ruqaiyah, 2018).

Abortus adalah terancamnya atau keluarnya buah kehamilan baik sebagian maupun keseluruhan pada umur kehamilan lewat dari 20 minggu. (Setiawati, 2013: 189-190).

Dalam proses kehamilan hendaklah orang tua dapat menjaga calon anak mereka dengan sebaik-baiknya sebab anak merupakan titipan sari Allah untuk di rawat dan di jaga dengan sepenuh hati.

Sebagaimana alam firman Allah Swt dalam Q. S. Al-Anfal/8: 28).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَاطُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa harta dan anak-anak adalah suatu ujian dan cobaan, manusia diingatkan jangan sampai lemah dalam menghadapi ujian itu dan jangan sampai mengabaikan ajakan jihad dan tanggung jawab dan amanat. Mengabaikan hal ini adalah khianat kepada Allah dan Rasul serta khianat terhadap diri sendiri, peringatan itu disertai dengan mengingatkan bahwa di sisi Allah terdapat ganjaran yang besar, lebih besar dari pada harta benda dan anak-anak. Karena itu, jangan sampai anak dan harta menjadikan kamu melanggar sehingga kamu mendapat siska maka bersyukur dan berserah dirilah kepada Allah karena sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat besar (Tafsir Al-Misbah, 2009:508).

Q. S. Al-Furqan/25:68.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^٤
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

“dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahhan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alas an) yang benar, dan tidak berzina; dan barang siapa mel;akukan

demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2004).

Setelah menyebutkan sifat-sifat terpuji mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok ketaatan serta sikap moderasi mereka, kini diuraikan keterhindaran mereka dari pokok-pokok kedurhakaan. Ayat di atas menggambarkan sifat ‘*Ibad ar-Rahman* yang berupa kelima, memurnikan Tauhid, serta yang keenam, yaitu tidak melakukan penganiayaan yang berupa pembunuhan dengan mencabut jiwa manusia, serta yang ketujuh tidak juga membunuh secara moral dengan melakukan perzinahan dan pelecehan seksual tetapi mereka mencukupkan diri dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui pernikahan yang sah semata-mata.

Ayat di atas mengatakan: *San*, di samping sifat-sifat terpuji yang di sandang oleh hamba-hamba Allah itu, mereka juga terhindar dari sifat-sifat tercelah. Mereka adalah orang-orang yang memurnikan Tauhid, yang tidak menyembah dan bermohon kepada tuhan yang lain bersama Allah dan di samping itu mereka juga tidak membunuh jiwa manusia yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan haq, yakni sebab yang dibenarkan Allah, misalnya dalam bentuk membela nyawa, qishash, atau peperangan menegakkan kebenaran, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa yang sangat jauh keburukannya itu, niscaya dia menemukan balasan dosa-Nya. Balasan yang diterimanya itu berupa dilipat gandakan untuknya siksa pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya, yakni dalam siksa itu, dalam keadaan terhina (Tafsir Al-Misbah, 2009: 153).

2. Macam-Macam Abortus

Macam-macam abortus antara lain yaitu:

a. Abortus Imminens

Abortus tingkat permulaan dan merupakan ancaman terjadinya abortus, ditandai perdarahan pervaginam, ostium uteri masih tertutup

dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan. (Prawirohardjo, 2016:467).

b. Abortus Insipiens

Abortus yang sedang mengancam yang ditandai dengan serviks telah mendatar dan ostium uteri telah membuka, akan tetapi hasil konsepsi masih dalam kavum uteri dan dalam proses pengeluaran. (Prawirohardjo, 2016: 469).

c. Abortus Inkompletus

Sebagian hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri dan masih ada yang tertinggal. Batasan ini juga masih terpancang pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 gram. (Prawirohardjo, 2016: 469)

d. Abortus Kompletus

Seluruh hasil konsepsi telah keluar dari kavum uteri pada kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat badan kurang dari 500 gram. (Prawirohardjo, 2016: 469).

e. Missed Abortus

Abortus yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih tertahan dalam kandungan. (Prawirohardjo, 2016: 470).

f. Abortus Habitualis

Abortus habitualis ialah abortus spontan yang terjadi 3 kali atau lebih berturut-turut. (Prawirohardjo, 2016: 472).

3. Etiologi

Penyebab abortus (*early pregnancy loss*) bervariasi dan sering diperdebatkan. Umumnya lebih dari satu penyebab.

Penyebab terbanyak di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Penyebab Genetik

Sebagian besar abortus spontan disebabkan oleh kelainan kariotip embrio. Paling sedikit 50 % kejadian abortus pada

trimester pertama merupakan kelainan sitogenetik. Bagaimana pun, gambaran ini belum termasuk kelainan yang disebabkan oleh gangguan gen tunggal (misalnya kelainan mendelian) atau mutasi dari beberapa lokus (misalnya gangguan poligenik atau multifactor) yang tidak terdeteksi dengan pemeriksaan kariotip.

Kelainan sitogenetik embrio biasanya berupa *aneuploidi* dari fertilitas abnormal. Kelainan lain umumnya berhubungan dengan fertilisasi abnormal (*tetraploidi*, *triploidi*). Kelainan ini tidak bisa dihubungkan dengan kelangsungan kehamilan. *Tetraploidi* terjadi 8 % kejadian abortus akibat kelainan kromosom, di mana terjadinya kelainan pada fase sangat awal sebelum proses pembelahan.

Struktur kromosom merupakan kelainan kategori ketiga. Kelainan struktur terjadi pada sekitar 3 % kelainan sitogenetik pada abortus. Ini menunjukkan bahwa kelainan struktur kromosom sering diturunkan dari ibunya. Kelainan struktur kromosom pada pria bisa berdampak pada rendahnya konsentrasi sperma, infertilitas, dan bisa mengurangi peluang kehamilan dari terjadinya keguguran.

Kelainan sering juga berupa gen yang abnormal, mungkin karena adanya mutasi gen yang bisa mengganggu proses implantasi bahkan menyebabkan abortus. Contoh untuk kelainan gen tunggal yang sering menyebabkan abortus berulang adalah *myotonicdystrophy*, yang berupa autosom dominan dengan penetrasi yang tinggi, kelainan ini progresif, dan penyebab abortusnya mungkin karena kombinasi gen yang abnormal dan gangguan fungsi uterus. Kemungkinan juga karena adanya mosaik gonad pada ovarium atau testis. (Prawirohardjo, 2016: 461-462).

b. Penyebab Anatomik

Defek anatomik uterus diketahui sebagai penyebab komplikasi obstetrik, seperti abortus berulang, prematuritas, serta malpresentasi janin. Insiden kelainan bentuk uterus kisar 1/200

sampai 1/600 perempuan. Pada perempuan dengan riwayat abortus, ditemukan anomali uterus pada 27 % pasien.

Penyebab terbanyak abortus karena kelainan anatomik uterus adalah septum uterus (40-8- %), kemudian uterus bikornis atau uterus delfis atau unikornis (10-30 %). Mioma uteri bisa menyebabkan baik infertilitas maupun abortus berulang. Resiko terjadinya antara 10-30 % pada perempuan usia reproduksi. Sebagian besar mioma tidak memberikan gejala, hanya yang berukuran besar atau yang memasuki kavum uteri (*submukosum*) yang akan menimbulkan gangguan. (Prawirohardjo, 2016: 462-463).

c. Penyebab Autoimun

Terdapat hubungan yang nyata antara abortus berulang dan penyakit autoimun. Misalnya, pada *Syndrom Lupus Erythematosus* (SLE) dan *Antihospholipid Antibodies* (aPA). aPA merupakan antibody spesifik yang didapati pada perempuan dengan SLE. Kejadian abortus spontan di antara pasien SLE sekitar 10 %, dibandingkan populasi umum. Bila digabung dengan peluang terjadinya pengakhiran kehamilan trimester 2 dan 3, maka diperkirakan 75 % pasien dengan SLE akan berakhir dengan terhentinya kehamilan. (Prawirohardjo, 2016:463).

d. Penyebab Infeksi

Teori peran mikroba infeksi terhadap kejadian abortus mulai diduga sejak 1917, ketika DeForest dan kawan-kawan melakukan pengamatan kejadian abortus berulang pada perempuan yang ternyata terpapar *brucellosis*. Beberapa jenis organisme tertentu diduga berdampak pada kejadian abortus antara lain:

- 1) Bakteria
 - a) *Listeria monositogenes*

- b) Klamidia trakomatis
 - c) Ureaplasma urealitikum
 - d) Mikoplasma hominis
 - e) Bakterial vaginosis
- 2) Virus
- a) Sitomegalovirus
 - b) Rubela
 - c) Herpes simpleks virus (HSV)
 - d) *Humanimmunodeficiencyvirus* (HIV)
 - e) *Parvovirus*
- 3) Parasit
- a) Toksoplasmosis gondii
 - b) Plasmodium falsiparum
 - c) Spirokaeta
 - d) Treponema pallidum (Prawirohardjo, 2016:464-465).
- e. Faktor Lingkungan
- Diperkirakan 1-10 % malformasi janin akibat dari paparan obat, bahan kimia, atau radiasi dan umumnya berakhir dengan abortus, misalnya paparan terhadap buangan gas anastesi dan tembakau. Sigaret rokok diketahui mengandung ratusan unsur toksik, antara lain nikotin yang telah diketahui mempunyai efek vasoaktif sehingga menghambat sirkulasi uteroplasenta. Karbo monoksida juga menurunkan pasokan oksigen ibu dan janin serta memicu neurotoksin. Dengan adanya gangguan pada system sirkulasi fetoplasenta dapat terjadi gangguan pertumbuhan janin yang berakibat terjadinya abortus. (Prawirohardjo, 2016: 465).
- f. Faktor Hormon
- Ovulasi, implantasi, serta kehamilan dini bergantung pada koordinasi yang baik sistem pengaturan hormon maternal. Oleh karena itu, perlu perhatian langsung terhadap sistem hormon secara

keseluruhan, fase luteal, dan gambaran hormon setelah konsepsi terutama kadar progesteron. (Prawirohardjo, 2016: 465).

g. Faktor Hematologik

Beberapa kasus abortus ditandai dengan defek plasentasi dan adanya mikrotrombi pada pembuluh darah plasenta. Berbagai komponen koagulasi dan fibrinolitik memegang peran penting pada implantasi embrio, invasitropoblas, dan plasentasi. Pada kehamilan terjadi keadaan hiperkoagulasi dikarenakan:

- 1) Peningkatan kadar faktor koagulan
- 2) Penurunan faktor antokoagulan
- 3) Penurunan aktivitas fibrinolitik. (Prawirohardjo, 2016: 466-467).

4. Faktor Resiko Abortus

Banyak faktor yang menyebabkan abortus namun ada 3 faktor utama yaitu faktor ibu, faktor janin, dan faktor plasenta. Faktor ibu yang mempengaruhi terjadinya abortus diantaranya adalah umur, usia kehamilan, pekerjaan dan pendidikan (Halim et al, 2013 dalam Citra, 2019).

5. Patofisiologi

Pada awalnya karena etiologi dan faktor resiko sehingga terjadi perdarahan didalam desidua basalis setelah itu terjadi nekrosis jaringan disekitarnya dan menyebabkan terlepasnya hasil konsepsi baik seluruhnya atau hanya sebagian, oleh karena itu uterus menganggap janin sebagai benda asing, sehingga uterus berkontraksi untuk mengeluarkan hasil konsepsi.

Pada usia kehamilan kurang dari 8 minggu vili koriales belum menembus desidua secara mendalam sehingga hasil konsepsi yang dikeluarkan biasanya komplit atau disebut sebagai abortus komplit. Saat kehamilan sudah mencapai usia 8 samapai 14 minggu vili koriales telah

menembus desidua lebih dalam sehingga hasil konsepsi yang dikeluarkan tidak lengkap dan plasenta tidak dikeluarkan secara sempurna atau disebut dengan abortus inkomplit dan dapat menimbulkan banyak perdarahan, pada kehamilan yang lebih lama sekitar lebih dari 14 minggu sampai kurang dari 20 minggu pengeluaran hasil konsepsi biasanya didahului oleh pecahnya ketuban terlebih dahulu sementara janin masih dalam proses pengeluaran. (Prawirohardjo, 2016).

6. **Diagnosis Abortus**

Abortus dapat diduga bila seorang wanita dalam masa reproduksi mengeluh tentang perdarahan pervaginam setelah mengalami haid terlambat, sering pula terdapat rasa mules,. Kecurigaan tersebut dapat diperkuat dengan ditentukannya kehamilan muda pada pemeriksaan bimanual dang dengan tes kehamilan secara biologis atau imunologi, bila mana hal itu dikerjakan. Harus di perhatikan banyaknya perdarahan, pem,bukaan serviks dan adanya jaringan dalam kavum uterus atau vagina. (Nita, Mustika. 2013:198 dalam Saras, 2017).

7. **Tatalaksana Umum**

Klasifikasi Abortus dan Penanganannya.

Sebelum penanganan sesuai klasifikasinya, abortus memiliki penanganan secara umum antara lain:

- 1) Lakukan penilaian secara cepat mengenai keadaan umum ibu termasuk tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, pernapasan, suhu).
- 2) Pemeriksaan tanda-tanda syok (akral dingin, pucat, takikardi,tekanan sistolik <90 mmHg). Jika terdapat syok, lakukan tatalaksana awal syok. Jika tidak terlihat tanda-tanda syok, tetap pikirkan kemungkinan tersebut saat penolong melakukan evaluasi mengenai kondisi ibu karena kondisinya dapat memburuk dengan cepat.
- 3) Bila terdapat tanda-tanda sepsis atau dugaan abortus dengan komplikasi, berikut kombinasi antibiotika sampai ibu bebas demam untuk 48 jam:
 - 1) Ampisilin 2 g IV/IM kemudian 1 g diberikan setiap 6 jam.

- 2) Gentamicin 5 mg/kgBB IV setiap 24 jam.
- 3) Metronidazol 500 mg IV setiap 8 jam.
- 4) Segera rujuk ibu ke rumah sakit
- 5) Semua ibu yang mengalami abortus perlu mendapat dukungan emosional dan konseling kontrasepsi pasca keguguran. (WHO, 2013 dalam Elisabeth, 2019).

8. Komplikasi Abortus

Komplikasi yang berbahaya pada abortus ialah perdarahan, perforasi, infeksi dan syok, sebagai berikut:

a. Perdarahan

Perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfuse darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya.

b. Perforasi

Perforasi uterus pada kerokan dapat terjadi terutama pada uterus dalam posisi hiperrentro fleksi.

c. Infeksi

Infeksi dalam uterus dan adneksi dapat terjadi dalam setiap abortus tetapi biasanya didapatkan pada abortus inkomplit yang berkaitan erat dengan suatu abortus yang tidak aman.

d. Syok

Syok pada abortus bisa terjadi karena perdarahan (*syok hemoragik*) dan karena infeksi berat. (Walsh, 2008 dalam Hana, 2016).

e. Kematian

Abortus berkontribusi terhadap kematian ibu sekitar 1,5 %. Data tersebut sering kali sembunyi di balik data kematian ibu akibat perdarahan. Data lapangan menunjukkan bahwa sekitar 60 % - 70 % kematian ibu disebabkan oleh perdarahan, dan sekitar kematian ibu, disebabkan oleh perdarahan postpartum. Sekitar 15-20 % kematian disebabkan oleh perdarahan (Irianti, 2014: 77-78 dalam Saras, 2017).

C. Tinjauan Khusus Tentang Abortus Imminens

1. Pengertian Abortus Imminens

Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan dan merupakan ancaman terjadinya abortus, ditandai perdarahan pervaginam, ostium uteri masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik dalam kandungan (Prawirahardjo, 2016).

Abortus imminens adalah abortus ini baru mengancam dan masih ada harapan untuk mempertahankannya. Di diagnosa bila seorang wanita <20 minggu mengeluarkan darah sedikit pervaginam. Perdarahan yang terjadi dapat berlanjut beberapa hari atau dapat berulang, dapat disertai rasa nyeri perut bawah atau punggung bawah (Fadlun & Feryanto, 2011 dalam Sri, 2019).

Abortus imminens adalah terjadinya perdarahan uterus pada kehamilan sebelum usia 20 minggu, janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks (Fauziyah Y, 2012 dalam Fitriana, 2017).

Abortus imminens adalah keadaan dimana perdarahan berasal dari intrauterine yang timbul sebelum umur kehamilan lengkap 20 minggu, dengan atau tanpa kolik uterus, tanpa pengeluaran hasil konsepsi (Maryunani & Puspita, 2013 dalam Ulya, 2017).

2. Tanda Dan Gejala Abortus imminens

- a. Ditandai dengan pengeluaran dari vagina yang mengandung darah, atau perdarahan pervaginam pada trimester pertama kehamilan
- b. Disertai rasa mules, sama dengan ketika menstruasi atau nyeri pinggang bawah
- c. Perdarahan pada abortus imminens seringkali terjadi hanya sedikit, namun hal tersebut berlangsung beberapa hari atau minggu (Maryunani, 2009 dalam Desti, 2019).

3. Etiologi Abortus Imminens

Faktor penyebab terjadinya abortus imminens antara lain:

- a. Penyakit-penyakit ibu seperti infeksi yang menyebabkan demam tinggi karena pneumonia, tifoid, pielitis, rubella, demam malta, dan sebagainya
- b. Kematian fetus dapat disebabkan karena toksin dari ibu atau invasi kuman atau virus pada fetus
- c. Keracunan Pb, nikotin, gas racun, alcohol, dan lain-lain atau ibu yang asfeksia seperti pada dekomposisi kordis, penyakit paru berat, anemia gravis, malnutrisi, avitaminosis dan gangguan metabolisme, hipotiroid, kekurangan vitamin A, C atau E, dan diabetes mellitus (Yakistiran, dkk, 2016 dalam Layla, 2019).

4. Diagnosis Abortus Imminens

- a. Biasanya diawali dengan keluhan perdarahan pervaginam pada umur kehamilan kurang dari 20 minggu
- b. Penderita mengeluh mulas sedikit atau tidak ada keluhan sama sekali kecuali persarahan pervaginam
- c. Ostium uteri masih tertutup besarnya uterus masih sesuai dengan umur kehamilan dan tes kehamilan urin masih positif (Prawirahardjo, 2016).

5. Penanganan Abortus Imminens

- a. Penderita diminta untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan berhenti
- b. Bisa diberikan spasmolitik agar uterus tidak berkontraksi atau diberi tambahan hormone progesterone atau derivatnya untuk mencegah terjadinya abortus
- c. Obat-obatan ini walaupun secara statistik kegunaannya tidak bermakna, tetapi efek psikologis kepada penderita sangat menguntungkan
- d. Penderita boleh dipulangkan setelah tidak terjadi perdarahan dengan pesan khusus tidak boleh berhubungan seksual dulu sampai lebih kurang 2 minggu (Prawirahardjo, 2016).

6. Komplikasi Abortus Imminens

Pada kasus abortus imminens, perdarahan dapat menetap selama beberapa hari sampai minggu dan disertai nyeri di bagian anterior dan ritmik jelas seperti nyeri saat bersalin, nyeri punggung bawah yang menetap disertai perasaan seperti tekanan di panggul, atau rasa tidak nyaman yang tumpul di garis tengah suprasimpisis disertai nyeri tekan di atas uterus. Apapun bentuk nyerinya, kombinasi perdarahan dan nyeri mengisyaratkan prognosis yang buruk bagi kelanjutan kehamilan.

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen adalah mengungkapkan apa yang hendak dikerjakan, kemudian menyelesaikannya. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Sari R N, 2011: 90 dalam Fitriani, 2017).

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan lingkup praktiknya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. Asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah dengan metode pengaturan pemikiran dan tindakan dalam suatu urutan logis baik pasien maupun petugas kesehatan. Proses itu digambarkan dalam arti kata perilaku yang diharapkan dari klinis tersebut. Hal ini digambarkan dengan jelas bahwa setiap langkah yang akan dicapai dalam rangka memberikan asuhan/pelayanan yang aman dan menyeluruh.

Manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan secara sistematis, mulai dari mengumpulkan data, menganalisis data, menegakkan diagnosis kebidanan, menyusun rencana asuhan, melaksanakan rencana asuhan, mengevaluasi keefektifan pelaksanaan rencana asuhan, dan mendokumentasikan asuhan (Mangkuji dkk., 2013: 1-2).

2. Tahapan dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar)

Dalam tahap ini data atau fakta yang dikumpulkan adalah data subjektif dan data objektif dari pasien. Bidan dapat mencatat hasil penemuan data dalam catatan harian sebelum didokumentasikan (Sari R N, 2011: 92 dalam Fitriani, 2017).

1) Biodata

Adalah untuk mengetahui status pasien secara lengkap sesuai dengan sasaran identitas antara lain:

- a) Nama: untuk mengetahui dan mengenal pasien
- b) Umur: untuk mengetahui factor resiko dan tingkat kesuburan
- c) Agama: untuk mengetahui kepercayaan yang dianut oleh pasien
- d) Suku: untuk mengetahui lebih jauh tentang social budaya pasien
- e) Pendidikan: untuk mengetahui tingkat pendidikan yang nantinya penting dalam pemberian konseling, informasi dan edukasi.
- f) Pekerjaan: untuk mengetahui keadaan social ekonomi keluarga
- g) Alamat: untuk mengetahui keadaan social dan budaya di lingkungan tempat tinggal.

2) Data Subjektif

Informasi yang dicatat mencakup identitas, keluhan yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada pasien (*anamnesis*) atau dari keluarga dan tenaga kesehatan (*allo anamnesis*).

a) Alasan masuk

Untuk mengetahui alasan yang membuat pasien datang yang berhubungan dengan abortus Imminens

b) Keluhan utama

Untuk mengetahui masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan masa kehamilan misalnya ada pengeluaran darah dari jalan lahir, pada kasus abortus biasa terjadi yaitu pengeluaran darah dari jalan lahir, badan terasa lemas, nyeri perut dan penglihatan berkunang-kunang.

c) Riwayat penyakit

(1) Riwayat penyakit sekarang

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat penyakit yang diderita pada saat ini yang ada hubungannya dengan keadaannya sekarang.

(2) Riwayat kesehatan yang lalu

Data ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya riwayat atau penyakit akut, kronis seperti jantung, diabetes melitus, hipertensi, yang dapat mempengaruhi pada masa nifas ini

(3) Riwayat kesehatan keluarga

Data ini diperlukan untuk mengetahui apakah dalam keluarga ada yang menderita penyakit menurun seperti asma, hepatitis dan diabetes melitus serta penyakit seperti TBC dan hepatitis.

a) Riwayat menstruasi

Untuk mengetahui menarche, siklus haid, lamanya, jumlah darah yang dikeluarkan dan pernahkan disminore

b) Riwayat perkawinan

Untuk mengetahui status perkawinannya, lama perkawinan, sah atau tidak, sudah berapa kali menikah, dan berapa jumlah anaknya

c) Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas yang lalu

Untuk mengetahui jumlah kehamilan dan kelahiran, riwayat persalinan yaitu jarak antara dua kelahiran,

tempat kelahiran, lamanya melahirkan dan cara melahirkan. Riwayat kelahiran anak mencakup berat badan bayi sewaktu lahir, adakah kelainan bawaan bayi, jenis kelamin bayi, keadaan bayi hidup atau mati saat dilahirkan

d) Riwayat KB

Untuk mengetahui apakah pasien pernah ikut KB dengan kontrasepsi jenis apa, berapa lama adakah keluhan selama menggunakan kontrasepsi serta rencana Kb setelah dikuret dan beralih kontrasepsi apa

e) Riwayat kehamilan sekarang

Untuk mengetahui keadaan kesehatan ibu selama hamil ada atau tidaknya penyakit serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi penyakit tersebut.

Hari pertama haid terakhir serta kapan tafsiran persalinannya

(1) Keluhan-keluhan pada trimester I, II, III

(2) Dimana ibu biasa memeriksakan kehamilannya

(3) Selama hamil berapa kali ibu periksa kehamilan

(4) Penyuluhan yang pernah ibu dapat selama kehamilan berapa seminggu

(5) Imunisasi TT sudah atau belum imunisasi, berapa kali telah dilakukan imunisasi TT selama hamil.

3) Data Objektif

Pencatatan dilakukan dari hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus kebidanan, dan data penunjang yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium (seperti pemeriksaan radio diagnostik atau USG) yang dilakukan sesuai dengan beratnya masalah.

Data yang telah terkumpul diolah, disesuaikan dengan kebutuhan pasien kemudian dilakukan pengolahan data, yaitu

menghubungkan dan menggabungkan data satu dengan yang lainnya sehingga menunjukkan fakta. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk menunjukkan fakta berdasarkan kumpulan data. Data yang telah diolah dianalisis dan hasilnya didokumentasikan.

Pemeriksaan fisik yang dilakukan meliputi:

- a) Keadaan umum: untuk mengetahui keadaan umum ibu apakah baik, sedang buruk, keadaan ibu setelah dianjurkan tirah baring yaitu membaik.
- b) Kesadaran: untuk mengetahui tingkat kesadaran yaitu apakah composmentis, apatis, samnolen atau koma
- c) Tanda-tanda vital
 - (1) Tekana darah: untuk mengetahui atau mengukur batas normal tekanan darah antara sistosik 90-130 mmHg, diastolik 70-90 mmHg. Sedabngkan tekanan darah pada diagnose abortus normal atau menurun
 - (2) Suhu: untuk mengetahui suhu basal pada ibu, suhu badan yang normal 36,5-37,5 °C, sedangkan pada kasus abortus suhu badan normal atau meningkat
 - (3) Nadi: untuk mengetahui denyut jantung nadi pasien. Berdasarkan kasus abortus denyut nadi normal, cepat, kecil dan lambat (Irianti, dkk. 2014:77)
- d) Tinggi badan: untuk mengetahui tinggi badan pasien
- e) Lingkar lengan atas: untuk mengetahui status gizi atas pasien.
- f) Pemeriksaan fisik:
 - (1) Inspeksi
 - (a) Rambut: untuk mengetahui kebersihan rambutnya, kondisi kulit kepala bersih, rontok atau tidak.
 - (b) Wajah: untuk mengetahui keadaan wajah pucat atau tidak, ada oedema atau tidak da nada cloasma gravidarum atau tidak

- (c) Mata: konjungtiva pucat atau tidak, sklera putih atau tidak dan mata cekung atau tidak
- (d) Mulut dan gigi: untuk mengetahui keadaan mulut bersih atau tidak, gusi ada stomatitis atau tidak, ada caries pada gigi atau tidak
- (e) Abdomen: untuk mengetahui ada bekas luka operasi atau tidak. Pada kasus abortus pembesaran uterus sesuai atau lebih kecil dari usia kehamilan
- (f) Vulva: untuk menilai perdarahan pervaginam dengan atau tanpa jaringan hasil konsepsi.
- (g) Anus: untuk mengetahui apakah ada hemoroid

(2) Palpasi

Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara meraba

- (a) Leher: untuk mengetahui ada pembesaran kelenjar tiroid atau kelenjar gondok
- (b) Dada: untuk mengetahui ada benjolan pada payudara atau tidak, ada nyeri tekan atau tidak, ada kelainan bentuk atau tidak, puting susu menonjol
- (c) Abdomen: untuk mengetahui keadaan kontraksi uterus, tinggi fundus uteri berapa jari dibawah pusat
- (d) Genetalia: pemeriksaan pembukaan serviks, inspekulo menilai ada atau tidaknya perdarahan dari kavum uteri, ostium uteri terbuka atau tertutup, ada atau tidaknya jaringan di ostium. *Vagina toucher* (VT) menilai portio masih terbuka atau sudah tertutup, teraba atau tidak jaringan dalam kavum uteri, tidak nyeri adneksa, kavum doglas tidak nyeri (Irianti, dkk. 2014: 77)
- (e) Ekstremitas untuk mengetahui ada tidaknya varices.

g) Data penunjang

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendukung pencegahan diagnose seperti pemeriksaan laboratorium

(hemoglobin, golongan darah, protein urin, glukosa urin, pemeriksaan USG (Jannah. 2013: 203)

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa Masalah dan Kebutuhan)

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan pasien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan. Data yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Berdasarkan atas tanda dan gejala serta hasil pemeriksaan yang telah dilakukan maka ditentukan:

a. Diagnosa kebidanan

Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktik. Pada kasus ini diagnosa kebidanan meliputi: (Mufdillah, et al, 2011: 114 dalam Fitriani, 2017).

1) Data dasar

Data subjektif

Adalah data yang ditetapkan untuk mengetahui keluhan atau masalah yang dirasakan. Data subjektif pada ibu hamil dengan abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap datang ketika usia kehamilannya baru mencapai 20 minggu ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup.

(a) Ibu mengatakan keadaan setelah tirah baring

(b) Ibu mengatakan merasa cemas

2) Data objektif

Data objektif pada kasus abortus imminens adalah :

a) Keadaan umum ibu setelah dilakukan tirah baring adalah sedang

b) Kesadaran ibu setelah dilakukan tirah baring adalah sedang

- c) Tinggi fundu uteri, contohnya:
Sesuai dengan usia kehamilan pasien.
- d) Vital sign, contoh:
TTV: TD: 110/70 mmHg, nadi: 88x/menit, suhu:37,5^oc,
rr:22x/menit.
- e) Banyak perdarahan pervaginam, contohnya:
Darah keluar terus menerus dan bergumpal-gumpal.

3) Masalah

Masalah adalah problem yang dialami ibu tetapi tidak termasuk kedalam kategori standar nomen klatur diagnosa kebidana, misalnya rasa cemas, dan problem ekonomi. Masalah pada pasien abortus imminens adalah perasaan cemas karena adanya perdarahan pervaginam dan nyeri

4) Kebutuhan

Kebutuhan dalam asuhan kebidanan adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisa data. Kebutuhan pada pasien abortus imminens adalah dorongan moral dan memberikan informasi mengenai abortus imminens

c. Langkah III (Merumuskan Diagnosa/Masalah potensial Yang Membutuhkan Antisipasi Masalah Potensial)

Pada langkah ini kita mengidentifikasikan masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati pasien abortus imminens, bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensial ini benar-benar terjadi (Mufdillah et al.2012:117 dalam Fitriani, 2017). Contoh masalah potensial yang terjadi pada pasien abortus imminens adalah potensial terjadinya

cemas karena adanya perdarahan (Pudiastuti, 2012: 57 dalam Fitriani, 2017).

d. Langkah IV (Penetapan Kebutuhan Tindakan Segera) Penanganan pada pasien abortus imminens adalah:

- 1) Pasang infus RL
- 2) Kolaborasi dengan dokter untuk segera pemberian terapi obat

e. Langkah V (Penyusunan Rencana)

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya, langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi (Rukiyah A Y, dkk.2011: 88).

Contoh tindakan yang dilakukan pada pasien abortus imminens adalah:

- 1) Lakukan pendekatan pada pasien dengan komunikasi terapeutik.
- 2) Memberikan penjelasan tentang hasil tindakan.
- 3) Lakukan observasi KU, TTV, KIE dan perdarahan
- 4) Memberikan inform untuk melakukan tindakan tirah baring
- 5) Siapkan pasien dan alat-alat serta obat-obatan
- 6) Pemenuhan kebutuhan cairan dengan pemberian infus.
- 7) Membantu melakukan tindakan tirah baring
- 8) Berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi obat
- 9) Melakukan observasi KU, TTV, KIE dan perdarahan
- 10) Memberikan dukungan psikologis.

3) Langkah VI (Pelaksanaan Asuhan)

Pada langkah VI merupakan tahap pelaksanaan dari semua rencana sebelumnya, baik terhadap masalah pasien maupun diagnosa yang ditegakkan. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh bidan secara mandiri maup berkolaborasi dengan tim kesehatan lainnya (Sari R N, 2012: 96 dalam Fitriani, 2017).

4) Langkah VII (Mengevaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi memenuhi kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosa (Hidayat, dkk. 2008: 79 dalam Fitriani, 2017).

5) Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Dokumentasi merupakan pertanggung-jawaban bidan terhadap apa yang telah dilakukan dalam memberikan pelayanan kebidanan.

Asuhan kebidanan merupakan salah satu penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang mempunyai kebutuhan atau masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, masa persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, keluarga berencana serta kesehatan reproduksi (Chanty, 2015).

Pendokumentasian asuhan kebidanan dilakukan dengan metode dokumentasi Subjektif, Objektif, *Assesment, Planning* (SOAP). SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. Metode ini merupakan inti sari dari proses penatalaksanaan kebidanan guna menyusun dokumentasian asuhan (Mangkuji, 2012 dalam Esrawati, 2018).

1. *S: Subjektif*

Data subjektif (observasi pasien)

Berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhan yang dicatat atau ringkasan yang akan berhubungan langsung dengan diagnosis, data subjektif ini nantinya akan menguatkan diagnosis yang disusun.

2. *O: Objektif*

Data objektif (observasi dan pemeriksaan)

Merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan

laboratorium/pemeriksaan diagnostic lainnya. Cacatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data objektif ini sebagai data penunjang. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis.

3. A: Assesment

Merupakan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Analisis data adalah melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan, mencakup: diagnosis/masalah kebidanan, diagnosis/masalah potensial serta perlunya antisipasi diagnosis/masalah potensial dan tindakan segera.

4. P: Planning

Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data, rencana asuhan ini bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bisa mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu.

BAB III
LITERATUR REVIEW

A. Matriks Langkah I: Interpretasi Data Dasar

Matriks Pengertian dan Tanda Gejala Abortus Imminens

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Resume Medis Pada Kasus Abortus Imminens	Anang Ramadhan, Tri Wardana, Sri Sugiarsi	2017	Pengertian abortus imminens	Abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap datang ketika kehamilann baru mencapai 20	Tidak didapatkan kelemahan pada referensi terkait.	Definisi tentang abortus imminens mudah dipahami.	penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hilmiah et.al., 2019) yang menyatakan bahwa pengertian abortus imminens adanya

					minggu ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup.			perdarahan.
2.	Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus Imminens Di RSUD Labuang Baji Kota Makassar	Nurhijrah, Irma Sri Rejeki, Hilmiah	2019	Pengertian abortus imminens	Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada umur kehamilan <20 minggu.	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi.	Penjelasan mengenai abortus imminens mudah dimengerti.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sugiarsi et.al., 2017) yang menyatakan bahwa pengertian abortus imminens adalah karena adanya perdarahan.
3.	Epidemiologi Kesehatan Reproduksi	Jeini Ester Nelwan	2019	Pengertian abortus imminens	Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan,	Tidak didapatkan kelemahan pada referensi	Penjelasan mengenai abortus imminens	Buku ini sejalan dengan isi buka menurut (Chrisdiono, 2004),

					terjadi perdarahan pervaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim.	terkait.	mudah dimengerti	yang menyatakan bahwa abortus imminens adalah terjadi perdarahan pervaginam, ostium uteri eksternum masih tertutup, dan janin masih baik intrauterin.
4.	Asuhan Kebidanan Pada Ny."N" GIIP ₁₀₀₁ A ₀ Dengan Abortus Imminens Ruang Poli Kandungan RSUD Sumbawa Besar	Desti Haswari, Istiadah Fatmawati, dan Wahyu Anjasari.	2019	Tanda dan gejala abortus imminens	Adanya tanda dan gejala abortus imminens ditandai dengan perdarahan sedikit/bercak, kadang disertai rasa mules/kontraksi,	Jenis penelitian menggunakan penelitian observasional deskriptif	Penjelasan dalam jurnal mudah di pahami dan di baca	Peneliti menjelaskan mortalitas dan morbiditas pada wanita merupakan masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, terutama di

				<p>periksa dalam belum ada pembukaan, palpasi : tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, hasil tes kehamilan (+)/positif</p>			<p>Negara berkembang, seperti di Indonesia Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup.
5.	Gambaran Kejadian Abortus Imminens Berdasarkan Paritas Di RSUD Wonosari Tahun 2012-2013	Idah Rohayah	2015	Kejadian abortus imminens	Hasil penelitian menunjukkan kejadian abortus imminens di RSUD Wonosari tahun 2012-2013 yaitu sebesar 123 dan 128 orang, dan abortus imminens berdasarkan paritas primipara sebesar 46 orang (37,4%) dan 42	Penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan rancangan retrospektif	Populasi yang digunakan berjumlah 251 orang.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Hardjito, 2011) yang menyatakan adanya paritas dengan kejadian abortus imminens.

					orang (37,5%) multipara sebesar 65 orang (52,8%) dan 62 orang (48,4%) dan grande multipara 12 orang (9,8%) dan 18 orang (14,1%).			
6.	Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus Imminens	Nur Sholiha, dan Ira Sukyati.	2019	Etiologi abortus imminens	Pada umumnya abortus imminens disebabkan oleh kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan	Metode penelitian dengan deskripsif naratif	Peneliti menjelaskan dengan baik dan dapat di pahami	Tidak didapatkan variable dalam referensi

					<p>sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini adalah: kelainan kromosom, terutama trisomosa dan monosoma x, lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna, pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan, tembakau dan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

					alkohol, kelainan pada plasenta, kelainan traktus genitalia, mioma uteri dan kelainan Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus Imminens bawaan uterus.			
7.	Laporan Kasus Abortus Imminens Juni 2015 Faktor Resiko, patogenesis, dan Penatalaksanaan	A.A Gde Kiki Sanjaya Dharma.	2015	Etiologi abortus imminens	Mekanisme pasti yang bertanggung jawab atas peristiwa abortus tidak selalu tampak jelas. Kematian janin sering disebabkan	Tidak ada kelemahan dalam jurnal	Pembahasan dalam jurnal mudah dipahami	Tidak didapatkan perbandingan variable dalam referensi.

					oleh abnormalitas pada ovum atau zigot atau oleh penyakit sistemik pada ibu, dan kadang-kadang mungkin juga disebabkan oleh penyakit dari ayahnya.			
8.	Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kejadian Abortus Imminens Pada Ibu Hamil Di Sukadana Kabupaten Utara	Aulia Kusuma	2016	Faktor yang melatarbelakangi kejadian abortus imminens	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil masih rendah mengenai kehamilan, adanya stress	penelitian ini adalah deskriptif kualitatif	menggunakan tehnik wawancara mendalam dengan bantuan pedoman wawancara (interview	kualitas pelayanan (service quality) adalah ukuran seberapa baik dengan harapan pelanggan.

				yang dialami pada saat kehamilan, tindakan yang salah dalam pencegahan infeksi keputihan serta tindakan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di Sukadana Kabupaten Kayong Utara.		guide).		
9.	Perpaduan Pengetahuan Dalam Pencegahan Abortus	Cindy Israeni Ansar	2020	Faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya abortus	Beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya abortus imminens yaitu	Metode yang digunakan adalah deskriptif kuanlitatif	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dipahami	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (putri, 2018) yang dimana adanya

	<p>Imminens Pada Ibu Hamil Suku Bugis-Makassar Di Kota Makassar</p>			<p>imminens</p>	<p>seperti tingginya umur ibu, rendahnya tingkat pendidikan, kurang berat badan dan obesitas, banyaknya paritas dan graviditas, jauhnya jarak kehamilan, adanya riwayat abortus, usia menarche yang terlalu dini, buruknya pola konsumsi, pekerjaan ibu, tidak</p>			<p>hubungan antara pendidikan dengan kejadian abortus imminens.</p>
--	---	--	--	-----------------	--	--	--	---

					dilakukannya pemeriksaan kehamilan, stres dan paparan asap rokok.			
10.	Gambaran Faktor-Faktor Risiko Abortus Imminens Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta Tahun 2013-2014	Karmila Agustina	2015	Faktor resiko abortus imminens	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami abortus imminens tahun 2013-2014 tertinggi pada usia reproduktif 20-35 tahun sebesar 324 orang (134,3%), paritas tertinggi pada multigravida	Jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan retrospektif.	Pengumpulan data menggunakan data sekunder	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Arif, 2014) yang dimana adanya hubungan antara usia dengan kejadian abortus imminens.

					sebesar 324 orang (122,3%), jarak kehamilan tertinggi ≥ 2 tahun sebesar 248 orang (101,6%), dan riwayat abortus tertinggi 1 kali abortus sebesar 49 orang (21%).			
11	Hubungan Antara Umur Dan Paritas Dengan Kejadian Abortus Imminens Di RS.AR Bunda Kota Prabumulih Tahun 2019	Wulan Sari Citra	2019	Penyebab Kejadian abortus imminens	Dari hasil analisa bivariat didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens	Menggunakan metode survey analitik dengan pendekatan cross sectional	Sampel penelitian ini adalah total populasi sebanyak 278 orang.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sutrianty, 2006) yang menunjukkan bahwa ibu dengan dengan paritas 24 menunjukkan

					yaitu faktor umur dimana P. Value = 0,000 lebih kecil dari P. Value= 0,05 dan faktor paritas dimana P.Value = 0,000 lebih kecil dari P.Value= 0,05.			adanya pengaruh paritas ibu dengan kejadian abortus imminens.
12	Usia Reproduksi Tidak Sehat Dan Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Tentara Dokter	Shandra Riestya Prihandini, Wahyu Pujiastuti, Tulus Puji Hastuti	2016	Faktor lain yang mengakibatkan abortus.	Faktor penyebab lain yang mengakibatkan abortus yaitu faktor janin, kelainan genetalia ibu, pengaruh paparan rokok, ketidak cocokan	Tidak dijelaskan hasil penelitian mengenai beberapa faktor penyebab yang di bahas	Mampu mengetahui faktor lain yang menyebabkan abortus.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sinaga, 2012), yang menyatakan adanya hubungan interval kehamilan dengan kejadian abortus.

	Soedjono Magelang.				RH, inkompetensi serviks, kelelahan fisik, dan hubungan seksual, dimana teori yang mendukung hal tersebut sama dan telah diuraikan pada bagian hubungan usia dengan kejadian abortus.	dalam penelitian.		
13	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Abortus Imminens Di	Anindita Dea K.P	2010	Faktor-faktor penyebab abortus imminens	Hasil penelitian menunjukkan terdapat 66,7% (n=28) responden memiliki faktor	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Sampel dalam penelitian ini berjumlah 42 responden yang	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Wulan Citra Sari, 2019), yang

	<p>RSUD Wates Kulon Progo Yogyakarta Tahun 2010.</p>				<p>resiko anemia, 23,8% (n=10) karena pharitas, dan 31,0% (n=13) karena diabetes melitus. Hasil uji bivariat menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara abortus dengan ketiga faktor tersebut. Abortus imminens dengan anemia (p=0,031), abortus imminens dengan pharitas</p>	<p>explanatory dengan pendekatan retrospektif.</p>	<p>mengalami abortus imminens dirawat inap di RSUD Wates.</p>	<p>menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian abortus imminens adalah usia dan paritas.</p>
--	--	--	--	--	---	--	---	--

					(p=0,01), abortus imminens dengan riwayat DM (0,014).			
14	Asuhan Kebidanan Kehamilan Komprehensif	Febriyani, Vedjia Medhyna, Oktavianis, Zuraida, Visti Delvina Rahmi Sari Kasoema, Ainal Mardiah, Nurul Amalina Vittria Meilinda,	2021	Diagnosis abortus imminens	Diagnosis abortus imminens ditentukan karena pada wanita hamil terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum	Tidak menjelaskan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa.	Peneliti mampu mengetahui diagnosis pada abortus imminens	Buku ini sejalan dengan isi buku menurut (Lidia, ddk, 2019) yang menyatakan diagnosis abortus imminens yaitu, perdaraha, mules, pembesar uterus sesuai usia kehamilan, dan tes kehamilan positif.

		Novi Wulan Sari, Resty Noflidaputri Sari Ida Miharti, dan Nina Fitri			membuka, tes kehamilan positif.			
--	--	---	--	--	------------------------------------	--	--	--



B. Matriks Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Faktor Resiko Yang Berhubungan	Sri Wahyuni, Ngadiyono,	2017	hubungan antara usia dengan	ada hubungan usia dengan kejadian abortus imminens di	Tidak lengkapnya informasi	Dari penelitian yang	Penelitian ini sejalan dengan hasil

	Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Ungaran Jawa Tengah	Sri Sumarni		kejadian abortus di RSUD Ungaran Jawa Tengah	RSUD Ungaran Jawa Tengah Tahun 2017.	tentang analisis faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens dengan jelas dan lengkap.	dilakukan didapatkan beberapa yang berhubungan dengan kejadian abortus di RSUD Ungaran Jawa Tengah tahun 2017.	penelitian (Fajria, 2013) yang menyatakan hubungan antara usia dengan kejadian abortus imminens.
2.	Hiperemesis Gravidarum Dan Abortus imminens Pada Kehamilan Trimester Pertama	Dea Lita Barozha, dan Ety Apriliana.	2016	Diagnosa abortus imminens	Diagnosa abortus imminens ditentukan karena pada wanita hamil terjadi pendarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mules sedikit atau	Tidak terdapat kelemahan daam jurnal	Penelitian dalam jurnal mudah dipahami	Dalam penelitian ini peneliti dapat menegakkan diagnosa abortus dilakukan dengan

				<p>sama sekali, uterus membesar sebesar usia kehamilan, serviks belum membuka, dan tes kehamilan positif, yang biasanya terjadi paruh pertama dari kehamilan.</p>			<p>amamnesa, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Dari amamnesa diharapkan diperoleh data tentang keluhan dan faktor resiko abortus imminens, dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang diharapkan</p>
--	--	--	--	---	--	--	---

								didapatkan tanda spesifik untuk abortus imminens.
3.	Faktor Dominan Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus Imminens	Hamidah, Siti Masitoh.	2013	Faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens	Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens di RSUP Ciptomangunkusumo Jakarta Tahun 2012 adalah usia, paritas, usia kehamilan dan riwayat abortus, factor yang dominan terjadinya abortus adalah paritas ≥ 3 .	Jenis penelitian ini menggunakan metode survey observasional secara cross sectional	Sampel adalah semua ibu yang mengalami perdarahan pada kehamilan yang di rawat diruang rawat inap dengan criteria inklusi dan eklusi yang telah ditetapkan.	ibu dengan kejadian abortus imminens. Hasil odds ratio juga menunjukkan bahwa usia ibu merupakan faktor risiko untuk terjadinya abortus
4.	Karakteristik	Debby	2019	Faktor	Ibu yang mengalami	Penelitian ini	Sampel yang	Penelitian ini

	Ibu Hamil Dengan Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan Tahun 2017	Pratiwi, Nurmouli Sitin, dan Lady Aprianis Laowo.		hubungan kejadian abortus imminens	abortus imminens sebanyak 34 orang (39,1%) dan yang mengalami sebanyak 53 orang (60,9%). Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh hasil usia dengan nilai $p(0,003)$, paritas dengan nilai $p(0,004)$, dan pekerjaan dengan nilai $p(0,005)$, ada hubungan karakteristik ibu hamil dengan abortus imminens.	bersifat analitik dengan rancangan penelitian cross sectional	diambil 32 ibu yang mengalami abortus dengan pengolahan data menggunakan uji chi-square.	sejalan dengan hasil penelitian (Nenny, 2015) yang dimana adanya hubungan antara usia, paritas dan pekerjaan ibu dengan kejadian abortus imminens.
5.	Asuhan Kebidanan Pada Ibu	Riski Kusuma Oktavia	2012	Kebutuhan pada abortus imminens	Kebutuhan yang diberikan adalah dorongan moral dan	Jenis penelitian dengan	Teknik pengambilan data antara	Tidak didapatkan variabel

	Hamil Ny. T G ₁ P ₀ A ₀ Dengan Abortus Imminens Di RSUD Sragen Tahun 2012				informasi tentang keadaan yang dialami bahwa abortus imminens adalah suatu kejadian dalam kehamilan dimana kehamilan dapat dipertahankan.	metode deskriptif.	lain data primer, meliputi pemeriksaan fisik, wawancara, serta observasi dan data sekunder, meliputi studi dokumentasi dan studi kepustakaan.	dalam referensi.
6.	Analisis Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian	Fahrul Irayani	2015	Mekanisme terjadinya abortus akibat anemia pada ibu hamil.	Pada bulan 5-6 janin membutuhkan zat besi dan semakin besar jika kandungan zat besi ibu kekurangan maka sel darah merah	tidak menjelaskan cara pencegahan anemia pada ibu hamil	Mampu mengetahui mekanisme abortus akibat anemia dan cara	penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Lisda Widianti,

	Abortus Di RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.			tidak dapat mengantarkan oksigen secara maksimal ke janin sehingga dapat terjadi abortus, kematian janin dalam kandungan atau waktu lahir.	berupa penyuluhan gizi ibu hamil.	pencegahan nya.	2017) yang dimana, adanya hubungan kekurangan zat besi dengan kejadian abortus imminens.	
7.	Hubungan Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus di Ruang Kasuari	Lisda Widianti	2017	Hubungan antara anemia defisiensi pada ibu hamil dengan kejadian abortus.	Hasil uji <i>chi square</i> nilai $p:0,000$ ($p\text{-value} \leq 0,05$ artinya ada hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian abortus diruang nifas RSUD Anutapara Palu.	Tidak melakukan pemeriksaan Hb dan referensi yang digunakan terlalu sedikit.	Mampu mengetahui hubungan anemia defisiensi besi dengan abortus dengan menggunakan	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Altika, 2015) yang dimana adanya hubungan

	Rumah Sakit Umum Anutapara Umum.				<p>Ibu hamil yang mengalami anemia defisiensi besi sangat rentan atau beresiko untuk terjadi abortus. Hal ini disebabkan karena dalam besi kehamilan zat besi berperan sebagai <i>hematopoiesis</i> (pembentukan darah) yaitu dalam sintesa haemoglobin (Hb). Seorang ibu yang dalam masa kehamilannya telah menderita kekurangan zat besi tidak dapat memberi cadangan</p>	<p>populasi semua ibu hamil usia kehamilan <20 minggu yang dirawat diruang nifas pada saat penelitian dilakukan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>Consecutive Sampling</i>, Sampel yang didapatkan</p>	<p>antara anemia dengan kejadian abortus imminens.</p>
--	----------------------------------	--	--	--	---	--	--

				<p>zat besi kepada bayinya dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan pertama. Hal inilah yang menyebabkan bahwa seorang ibu hamil yang mengalami anemia pada usia kehamilan <20 minggu dapat menyebabkan abortus.</p>		<p>sejumlah 46 responden. Analisis bivariat menggunakan uji <i>chi square</i> dengan tingkat kepercayaan 95%.</p>	
8.	<i>A National Survey on Public Perceptions of Miscarriage</i>	Jonah bardos, Daniel Hercz, Jenna Friedenth I,	2015	<p>Penyebab keguguran yang diyakini secara umum termasuk peristiwa stres (76%), mengangkat beban berat objek</p>	<p>Berpatokan pada pelaporan dari pengalaman keguguran yang dialami</p>	<p>Penelitian ini memuat tentang penyebab keguguran secara umum</p>	<p>Tidak didapatkan perbandingan variable dalam referensi</p>

		Stacey A. dan Zev Williams.			(64%), penggunaan alat kontrasepsi sebelumnya (28%), atau kontrasepsi oral (22%).	klien baik perempuan maupun laki-laki yang memenuhi persyaratan yang melaporkan pangannya.	dan dampak psikologis seperti menyalahkan diri sendiri, mengisolasi diri dan yang lainnya.	
9.	Hubungan Anemia Dengan Kejadian Abortus di RSUD DR. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Aryanti Wardiyah	2016	Hubungan anemia dengan kejadian abortus	Dari hasil penelitian adanya hubungan antara anemia dengan kejadian abortus di RSUD Abdul Moeloek Tahun 2014. Anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu	Tidak melakukan penelitian selain anemia seperti faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya abortus seperti	Menjelaskan secara fokus terhadap hubungan anemia dengan abortus.	Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Lisda, 2018) yang dimana adanya hubungan antara anemia

				<p>karena kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen yang dapat mengakibatkan efek tidak langsung pada ibu dan janin antara lain terjadinya abortus.</p>	<p>faktor kelainan ovum, kelainan genitalia ibu, gangguan sirkulasi plasenta, dan antagonis rhesus.</p>	<p>dengan kejadian abortus imminens.</p>
--	--	--	--	--	---	--

10.	Usia Reproduksi Tidak Sehat dan Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus di Rumah Sakit Tentara Dokter Soedjono Magelang.	Shandra Riestya Prihandini, Wahyu Pujiastuti, Tulus Puji Hastuti.	2016	Usia yang beresiko terjadinya abortus	Berdasarkan hasil tabulasi silang, terdapat informasi yang menyatakan jika responden dengan usia beresiko cenderung mengalami resiko abortus karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi saat seorang wanita berada pada usia beresiko. Perempuan dengan usia <20 tahun masih memiliki sisi psikologis yang belum matang, perkembangan otot-otot rahim belum	Tidak adanya upaya promotif mengenai usia beresiko pada ibu hamil.	Mampu mengetahui faktor lain yang menyebabkan abortus.	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Andesia, 2016) yang dimana adanya hubungan antara usia dengan kejadian abortus imminens.
-----	---	---	------	---------------------------------------	---	--	--	--

					<p>cukup baik kekuatan dan kontraksinya, dan sistem hormonal belum terkoordinasi lancar dan belum stabil sedangkan perempuan usia >35 tahun akan disertai dengan penyakit kronis seperti hipertensi, serta sel telur dan kondisi rahim akan mengalami penurunan kesuburannya.</p>			
11	Hubungan Umur dan Paritas dengan	Eka Yuli Handayani	2015	Hubungan paritas, dan umur dengan	Dari hasil penelitian yang dilakukan ibu yang memiliki paritas	Referensi yang digunakan	Mampu mengetahui paritas tinggi	Hasil penelitian ini sejalan

	Kejadian Abortus di RSUD Kabupaten Rokan Hulu.			kejadian abortus.	tinggi atau multipara beresiko terjadinya abortus. Angka kejadian pada hasil penelitian banyak terdapat abortus pada multipara dan semakin tinggi kejadiannya pada grande multipara. Kejadian abortus pada ibu paritas tinggi berkaitan dengan kesehatan ibu karena kurangnya istirahat dan hamil yang terlalu dekat, apabila disertai dengan abortus pada	terlalu sedikit.	beresiko terjadinya abortus seperti multipara dan grande multipara disertai umur yang sudah tidak memungkinkan untuk hamil lagi.	dengan hasil penelitian (Heryanti. 2018) yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara paritas dengan kejadian abortus imminens.
--	--	--	--	-------------------	--	------------------	--	---

					kehamilan sebelumnya.			
--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	--

C. Matriks Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Gambaran Faktor Risiko Abortus Imminens Di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta	Karmila Agustina	2015	Resiko abortus imminens	Faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian ibu yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan. Wanita yang memiliki abortus mempunyai risiko tinggi terjadi abortus mengulang, premature dan bayi berat lahir rendah.	Jenis penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan pendekatan retrospektif	Pengumpulan data menggunakan data sekunder	Penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami abortus imminens tahun 2013-2014 tertinggi pada usia reproduktif 20-35 tahun sebesar 324 orang (134,3%) berdasarkan paritas tertinggi pada multigravida sebesar

								295 orang (122,3%) berdasarkan jarak kehamilan tertinggi ≥ 2 tahun sebesar 248 orang (101,6%) berdasarkan riwayat abortus tertinggi 1 kali abortus sebesar 49 orang (21%).
2.	Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus Imminens	Nur Sholiha, dan Ira Sukyati	2019	.komplikasi abortus imminens	Abortus imminens dapat berakhir pada abortus inkomplet yang memiliki komplikasi dapat mengancam keselamatan ibu karena perdarahan, perforasi, infeksi dan syok.	Metode penelitian dengan deskriptif naratif.	Peneliti menjelaskan dengan baik dan mudah dimengerti.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Lu'lul Maghni Amalia dan Sayono, 2015) yang menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan.
3.	Penyakit Ibu Terhadap	Layla Fadhilah	2019	Komplikasi abortus	Komplikasi abortus imminens berupa perdarahan atau infeksi	Jenis penelitian ini	Sampel dalam penelitian ini	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

	Kejadian Abortus Imminens Di Rumah Sakit Uum Daerah Kota Padangsidimpuan	Rangkuti, Sri Rahayu Sanusi, dan Delfi Lutan.		imminens yang dapat menyebabkan kematian.	bersifat studi observasional dengan desain penelitian case control.	berjumlah 100 dengan kriteria inklusi dan enklusi yang telah ditetapkan. Metode analisis data yang digunakan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat dengan <i>chi square</i> . Berdasarkan hasil penelitian	(Ira Sukyati dan Nur Sholiha , 2019) yang menyatakan komplikasi yang bisa terjadi pada kasus abortus imminens yaitu perdarahan dan infeksi.
--	--	---	--	---	---	--	---



							menunjukkan terdapat pengaruh penyakit ibu) $p=0,0001$) OR = 26,0 (95% CI 8,79 – 76,8) dengan kejadian abortus imminens.	
4.	Faktor Resiko Kejadian Abortus (Studi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang).	Lu'lul Maghni Amalia dan Sayono.	2015	Komplikasi Abortus Imminens.	Komplikasi abortus adalah perdarahan (<i>hemorrhage</i>), perforasi, infeksi dan tetanus, dan syok. Komplikasi abortus yang dapat menyebabkan kematian ibu antara lain karena perdarahan yang terjadi pada ibu dapat menyebabkan	Tidak dijelaskan cara penanganan komplikasi infeksi abortus imminens.	Metode penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan <i>case control</i> .	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Ira Sukyati dan Nur Sholiha, 2019) yang menyatakan komplikasi yang bisa terjadi pada kasus abortus imminens yaitu

					anemia, sehingga dapat memberikan resiko kematian. Infeksi juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami abortus dan dapat menyebabkan sepsis, sehingga dapat berakibat kematian pada ibu.			perdarahan, perforesi, infeksi dan syok.
5.	Faktor Resiko yang Berhubungan dengan Kejadian Abortus di RSUD Ungaran Jawa Tengah.	Sri Wahyuni, Ngadiyono, dan Sri Sumarni.	2017	Komplikasi abortus imminens	Kejadian abortus yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi dan dapat menyebabkan komplikasi kematian. Komplikasi abortus yang dapat menyebabkan kematian ibu antara lain karena perdarahan dan infeksi. Perdarahan yang terjadi selama abortus dapat mengakibatkan pasien menderita anemia, sehingga dapat meningkatkan resiko	Tidak didapaknya komplikasi selain dari yang telah dijelaskan.	Dapat mengetahui komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil yang mengalami abortus imminens. Referensi yang digunakan lumayan	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Lu'lul Maghni Amalia dan Sayono, 2015) yang menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan.

					kematian ibu.		banyak dan <i>update.</i>	
6.	Hubungan Antara Umur dan Paritas dengan Kejadian Abortus Imminens di RS.AR Bunda Kota Prabumulih Tahun 2019	Wulan Citra Sari	2019	Komplikasi abortus imminens	Kejadian abortus sangat berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan wanita terutama jika dilakukan secara sembarang oleh tenaga yang tidak terlatih. Jumlah kejadian abortus yang dialami oleh wanita baik disengaja maupun tidak disengaja dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup memprihatikan, sebagai konsekuensinya jumlah kematian ibu mengalami peningkatan akibat komplikasi dari pada abortus yaitu perdarahan terus-menerus serta	Tidak dijelaskan cara penanganan komplikasi abortus imminens.	Dapat mengetahui komplikasi yang bisa terjadi pada ibu hamil yang mengalami abortus imminens.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sri Wahyuni, Ngadiyono, dan Sri Sumarni, 2017), menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan dan infeksi.

					infeksi pada jalan lahir.			
7.	Gambaran Karakteristik Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Umum Umi Barokah Boyolali.	Laili Maratus Sholihah	2018	Komplikasi abortus imminens	Kejadian abortus yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi dan dapat menyebabkan komplikasi kematian. Komplikasi abortus yang dapat menyebabkan kematian ibu antara lain karena perdarahan dan infeksi. Perdarahan yang terjadi selama abortus dapat mengakibatkan pasien menderita anemia, sehingga dapat meningkatkan resiko kematian ibu.	Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan <i>retrospektif</i> .	Populasi dalam penelitian ini adalah ibu yang mengalami <i>abortus</i> di Rumah Sakit Umum Umi Barokah Boyolali berdasarkan data rekam medik dengan diagnosa medis abortus pada Oktober 2016-Oktober 2017 sebanyak	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sri Wahyuni, Ngadiyono, dan Sri Sumarni, 2017), menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan dan infeksi.

							45 responden. Penentuan jumlah sampel menggunakan checklist. Analisis data dengan univariat.	
8.	Gambaran Kejadian Abortus Di RSUD Wonosari Tahun 2012-2013.	Dewi Sartika	2015	Komplikasi abortus imminens	Komplikasi yang ditimbulkan oleh abortus berupa perdarahan atau infeksi yang dapat menyebabkan kematian, itulah sebabnya kematian ibu yang disebabkan oleh abortus sering tidak muncul dalam laporan kematian, tapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis.	Penelitian ini menggunakan deskriptif dan rancangan retrospektif.	Besar populasi sebesar 575 orang. Pengumpulan data menggunakan rekam medik. Analisis data menggunakan analisis univariat dan	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Laili Maratus Sholihah, 2017), menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan dan infeksi.

							pengolahan data menggunakan program komputer.	
9.	Karakteristik Ibu Yang Mengalami Abortus Di Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kahyangan Yog yakarta Tahun 2019.	Sri Riningsih	2019	Komplikasi abortus imminens	Komplikasi yang terjadi pada abortus yang disebabkan adalah perdarahan dapat diatasi dengan pengosongan uterus dari sisa-sisa hasil konsepsi dan jika perlu pemberian transfusi darah. Kematian karena perdarahan dapat terjadi apabila pertolongan tidak diberikan pada waktunya. Infeksi kadang-kadang sampai terjadi sepsis, infeksi dari tuba dapat menimbulkan kemandulan. Faal ginjal rusak	Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>observational</i>	Dalam penelitian ini mampu mengetahui komplikasi abortus imminens serta penjelasannya.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dewi Sartika, 2015), menyatakan bahwa komplikasi yang disebabkan abortus imminens yakni perdarahan dan infeksi.

					<p>disebabkan karena infeksi dan syok. Pada pasien dengan abortus diurese selalu harus diperhatikan. Pengobatan ialah dengan pembatasan cairan dengan pengobatan infeksi. Syok bakterial terjadi syok yang berat rupa-rupanya oleh toksin-toksin. Pengobatannya ialah dengan pemberian antibiotika, cairan <i>corticosteroid</i> dan haperin. Perforasi ini terjadi karena curratage atau karena abortus kriminalis.</p>			
10.	Hubungan Antara Kejadian Abortus Dengan Usia	Johan Nafis Raden	2009	Komplikasi abortus imminens	<p>Komplikasi meliputi perdarahan (hemorrhage), perforasi sering terjadi sewaktu diatasi dan kuretase dilakukan oleh tangan yang tidak ahli</p>	Tidak didapatkannya komplikasi selain dari yang telah	Jenis penelitian ini adalah obsrvasional analisis dan	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sri Riningsih, 2015), menyatakan bahwa komplikasi yang

	Ibu Hamil Di RSUD dr. Moewardi Surakarta Pada Tahun 2008.				seperti bidan dan dukun, infeksi, syok pada abortus dapat disebabkan oleh perdarahan yang banyak disebut syok hemoragik dan infeksi berat atau sepsis disebut syok septik atau endoseptik.	dijelaskan.	desain penelitian cross sectional.	disebabkan abortus imminens yakni perdarahan, infeksi, perforasi dan syok.
--	---	--	--	--	--	-------------	------------------------------------	--



D. Matriks Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Hubungan Antara Kejadian Abortus Dengan Usia Ibu Hamil Di RSUD dr. Moewardi Surakarta Pada Tahun 2008.	Johan Nafis Raden	2009	Penanganan abortus imminens	Beberapa penanganan abortus imminens yaitu istirahat baring, tidur berbaring merupakan unsur yang dalam pengobatan, fenobarbital 3x30 mg sehari dapat diberikan untuk menenangkan pasien.	Jenis penelitian ini adalah obsrvasional analisis dan desain penelitian cross sectional.	Dalam penelitian ini mampu mengetahui penanganan pada kasus abortus imminens.	Tidak didapatkan variable pada referensi.
2.	Gambaran Kejadian Abortus Di RSUD Wonosari Tahun 2012-2013.	Dewi Sartika	2015	Upaya pencegahan abortus berulang pada pasien telah mengalami	Upaya pencegahan agar tidak terjadi abortus berulang pada pasien yang mengalami abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma,	Penelitian ini menggunakan deskriptif dan rancangan retrospektif.	Dalam penelitian ini mampu menjelaskan pencegahan terjadinya	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Karmila Agustina, 2015) yang menyatakan bahwa pencegahan pada

				<p>abortus</p> <p>Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui pengambilan darah. Abortus juga dapat dicegah dengan ANC terpadu antara lain memberikan pelayanan konseling dan kesehatan termasuk penyakit dan kehamilan yang berlangsung sehat, melakukan deteksi dini masalah penyakit dan penyulit/komplikasi proses kehamilan serta melibatkan ibu dan keluarga terutama suami dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan</p>		<p>abortus berulang.</p> <p>kasus abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui pengambilan darah.</p>
--	--	--	--	--	--	--

				<p>persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.</p> <p>Upaya pencegahan kejadian abortus juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai 4 T (terlalu muda untuk menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil dan terlalu banyak untuk melahirkan).</p>			
3.	Karakteristik Ibu Yang Mengalami Abortus Di Rumah Sakit Khusus Ibu Anak Kahyangan Yogyakarta Tahun	Sri Riningsih	2019	<p>Penanganan Abortus mengancam. pada abortus Abortus belum terjadi imminens sehingga kehamilan dapat dipertahankan dengan cara tirah baring, gunakan preparat progesterone,</p>	<p>Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan</p>	<p>Dalam penelitian ini mampu menjelaskan dignosis pada kasus abortus</p>	<p>Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Johan Nafis Raden, 2009) yang menyatakan bahwa penanganan</p>

	2019.				tidak berhubungan badan, evaluasi secara berkala dengan USG untuk melihat perkembangan janin.	pendekatan <i>observational</i> .	imminens.	pada abortus imminens yaitu dengan baring.
4.	Gambatan Kejadian Abortus Imminens Berdasarkan Paritas Di RSUD Wonosari Tahun 2012-2013.	Ida Rohayah	2015	Upaya pencegahan abortus	Upaya pencegahan agar tidak terjadi abortus berulang pada pasien yang mengalami abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma, Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui pengambilan darah. Abortus juga dapat dicegah dengan ANC terpadu antara lain memberikan pelayanan konseling dan kesehatan termasuk	Penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan rancangan retrospektif.	penelitian ini mampu menjelaskan pencegahan abortus.	nelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dewi Sartika, 2015) yang menyatakan upaya pencegahan abortus yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai 4 T (terlalu muda untuk menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil dan terlalu banyak

				<p>penyakit dan kehamilan yang berlangsung sehat, melakukan deteksi dini masalah penyakit dan penyulit/komplikasi proses kehamilan serta melibatkan ibu dan keluarga terutama suami dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi.</p> <p>Upaya pencegahan kejadian abortus juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai 4 T (terlalu muda untuk</p>			untuk melahirkan).
--	--	--	--	--	--	--	--------------------

					menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil dan terlalu banyak untuk melahirkan.x			
5.	Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Patologi Pada Ny.T Umur 28 Tahun G ₂ P ₁ A ₀ Hamil 8 Minggu Dengan Abortus Imminens Di RSU Assalam Gemolong Sragen.	Grevita Nur Mawarni Adi	2017	Penatalaksanaan pasien abortus imminens	Penatalaksanaan pasien abortus imminens yaitu dengan istirahat baring, pemeriksaan ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup, jangan melakukan aktifitas fisik berlebihan atau hubungan seksual, beri terapi obat: penenang penobarbital 3x30 ml gram, valium (apabila pasien gelisah), anti perdarahan: adona, transamin, vitamin B	Jenis laporan studi kasus dengan metode <i>deskriptif</i>	Dalam penelitian ini mampu menjelaskan komplikasi kehamilan yang bisa saja terjadi pada trimester awal.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Johan Nafis Raden, 2009) yang menyatakan bahwa penanganan pada abortus imminens yaitu dengan baring dan terapi penobarbital 3x30 ml gram.

					komplek, hormonal: progesteron 10 mg sehari untuk terapi substitusi dan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim (misalnya: gestanon, dhupaston, anti kontraksi rahim: duvadilan, papaverin, dan observasi perdarahan.			
6.	Gambaran Sikap Ibu Hamil Dalam Mencegah Keguguran	Sunarti, Sri Winarni dan Andre W.	2016	Pencegahan abortus	Berdasarkan hasil penelitian terhadap ibu hamil mengenai sikap dalam mencegah keguguran pada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan rutin di UPTD Kesehatan Sananwetan Kota Blitar	Tidak adanya penjelasan mengenai pencegahan dengan memantau gizi maupun perilaku hidup sehat.	Mampu mengetahui kemampuan ibu hamil dalam pencegahan abortus.	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Andesia, 2016) yang dimana salah satu cara mencegah abortus pada ibu hamil yaitu dengan melakukan pemeriksaan atau

					<p>sebanyak 53,3% memiliki sikap positif, dan 46,7% memiliki sikap statistik. Sikap positif ibu dalam mencegah keguguran di pengaruhi oleh pengalaman ibu dalam mendapat informasi pencegahan keguguran serta sebagian ibu yang pernah mengalami keguguran memiliki sikap statistik yang dikarenakan kurang pengetahuan tentang mencegah keguguran.</p>			kunjungan rutin di pelayanan kesehatan.
7.	<i>Women's Experiences of Miscarriage in the</i>	Danae Lariviere Bastien,	2019	Perawatan darurat untuk mengurangi	Pengalaman keguguran merupakan fenomena yang kompleks	Penelitian ini berfokus terhadap	Dari penelitian ini didapatkan perawatan	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian

	<i>Emergency Department.v</i>	Francine deMontigny dan Chantal Verdon.		efek fisik dan psikologis pada individu, pasangan, dan keluarga.	dipengaruhi oleh banyak faktor. Perawat darurat dapat meningkatkan perawatan darurat untuk wanita yang mengalami keguguran dengan mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang akurat dan memadai untuk mengurangi efek fisik dan psikologis pada individu, pasangan dan keluarga.	pengalaman pengalaman keguguran dan psikologis klien dan tidak melakukan penanganan medis.	darurat untuk mengurangi efek fisik dan psikologis pada klien.	(Chowdhury & Hussain, 2020), yang menyatakan bahwa untuk penatalaksanaan kehamilan dan medis, wanita harus diberi nasehat.
8.	Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny. M G2P1A0 Dengan Abortus Imminens Di RSUD	Irfi Ulimaz Risyani	2013	Kebutuhan terhadap tindakan segera pada kasus abortus	Kebutuhan tindakan segera yang dilakukan pada kasus abortus imminens adalah melakukan kolaborasi dengan dokter SpOG	Metode penelitian yang digunakan adalah	Dalam referensi ini didapatkan beberapa cara pengobatan	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Grevita Nur Mawarni Adi, 2017) yang dimana

	Karanganyar			imminens	dalam pemberian terapi, meliputi pemberian cairan infus, antibiotik dan pemberian obat anti perdarahan.	observasional deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	abortus imminens.	penatalaksanaan yang digunakan dalam penanganan abortus imminens yaitu dengan pemberian terapi obat anti perdarahan.
9.	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Abortus Di Puskesmas Malintang Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017-2018.	Meiliana Nasution	2018	Penatalaksanaan pada abortus imminens	Pada abortus imminens bila kehamilan dirasa masih bisa dipertahankan maka cukup dilakukan rebah (<i>bed rest</i>) dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim.	Desain penelitian ini adalah penelitian survei analitik.	Populasi dalam penelitian adalah seluruh ibu aborsi yang berkunjung sebanyak 52 orang. Sampel diambil dari bulan januari sampai	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Grevita Nur Mawarni Adi, 2017) penatalaksanaan pada kasus abortus imminens yaitu dengan istirahat baring dan pemberian obat untuk mengurangi

							september 2018. Sehingga jumlah sampel nerjumlah 52 orang.	kerentanan otot-otot rahim.
10.	Refocusing Problem Ibu Hamil	Inna Sholicha Fitriani	2020	Tindakan yang dilakukan pada kasus abortus imminens.	Tindakan yang paling tepat dalam upaya penanganan secara konservatif pada abortus imminens yaitu tidak dianjurkan berhubungan inti, selama minimal 2 minggu setelah perdarahan berhenti, bed rest total, tidak melakukan aktifitas yang berat, pemberian obat penenang (fenobarbital 3x30 mg dengan preparat hematinic	Tidak ada kelemahan dalam referensi ini.	Dalam buku ini mampu menjelaskan terjadinya komplikasi abortus imminens.	Buku ini sejalan dengan hasil penelitian (Meiliana Nasution, 2018), penatalaksanaan pada kasus abortus imminens yaitu dengan istirahat baring dan pemberian obat-obatan.

					seperti sulfas ferosus 600-1000 mg), menjaga dan melakukan diet protein dan mengkonsumsi vitamin C, observasi kondisi keadaan umum dengan memeriksa tanda-tanda vital, anjurkan untuk menjaga personal hygiene bagian genitalia, dengan membersihkan vulva minimal 2x sehari dengan cairan antiseptic.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

E. Matriks Langkah V: Perencanaan

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Perbedaan Efektivitas	Helmie Yeni	2015	Perbedaan pemberian	Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata	Desain penelitian ini	Populasi adalah ibu	Penelitian ini sejalan sejalan dengan hasil

	<p>Pemberian MgSO₄ Drip Dengan Duvadilan Drip Terhadap Penanganan Perdarahan Pada Kasus Abortus Imminens.</p>			<p>MgSO₄ Drip dengan Duvadilan Drip</p>	<p>waktu yang diperlukan untuk penanganan perdarahan pada kasus abortus imminens yang diberi terapi Duvadilan Drip adalah 21,0 jam. Sedangkan untuk rata-rata waktu yang diperlukan untuk penanganan perdarahan pada kasus abortus imminens yang diberi terapi MgSO₄ Drip adalah 38,5 jam. Hasil uji statistik didapatkan nilai $p = 0,020$, berarti pada $\alpha = 5\%$ Ho ditolak, bahwa ada perbedaan antara pemberian MgSO₄ Drip dengan Duvadilan Drip</p>	<p>adalah penelitian eksperimental .</p>	<p>dengan perdarahan pada kasus abortus imminens di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo pada Mei sampai Juni 2015 yaitu sebanyak 4 orang ibu. Sampel total populasi sebanyak 4 responden.</p>	<p>penelitian (Kansaria, 2006), yang menunjukkan ada perbedaan antra penggunaan Duvadilan Drip dengan MgSO₄.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---	---

					terhadap perdarahan pada kasus abortus imminens di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2015, dimana Duvadilan Drip lebih efektif dibandingkan dengan MgSO ₄ Drip.			
2.	Hubungan Umur dan Paritas Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Kabupaten Rokan Hulu	Eka Yuli Handayani	2015	Hubungan antara umur dan paritas terhadap kejadian abortusan pencegahannya	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan ada hubungan antara umur dan paritas terhadap kejadian abortus. Disarankan pada wanita untuk hamil pada usia subur (20-35 tahun) agar alat reproduksi berkembang dengan sempurna. Dan untuk menjarangkan kehamilan	Tidak ada cara mengatasi ataupun penanganan mengenai abortus.	Mampu mengetahui pencegahan abortus dengan menyarankan ibu untuk hamil pada usia subur (20-35 tahun).	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Heryanti, 2018) yang dimana menyarankan kepada wanita untuk hamil pada usia subur (20-35 tahun) agar alat reproduksi berkembang dengan sempurna. Dan untuk

					dengan jarak anak 2 tahun agar tidak terjadi abortus.			menjarangkan kehamilan dengan jarak anak 2 tahun agar tidak terjadi abortus
3.	Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Patologi Pada Ny.T Umur 28 Tahun G ₂ P ₁ A ₀ Hamil 8 Minggu Dengan Abortus Imminens Di RSU Assalam Gemolong Sragen.	Grevita Nur Mawarni Adi	2017	penanganan perdarahan abortus imminens dengan pemberian terapi obat-obatan.	Ibu hamil dengan abortus imminens terapi obat yang diberikan yaitu Preabor 50 mg 3x1, Asam mefenamat 500 mg 3x1, Asam folat 400 mg 2x1 dan infuse RL 20 tpm.	Jenis laporan studi kasus dengan deskriptif.	Peneliti mampu menjelaskan jenis obat dan dosis yang diberikan pada kasus abortus imminens	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irfi Ulimaz Risyani, 2013) yang menyatakan bahwa dalam penanganan kasus abortus imminens harus dilakukan kolaborasi dengan dokter SpOG.
4.	Profil Peresepan Tokolitik Pada Pasien Abortus Imminens Dan	Sri Wuryaningsih	2019	Dosis pemberian obat MgSO ₄ pada kasus abortus	Magnesium menurunkan frekuensi depolarisasi otot polos, berkompetisi dengan kalsium untuk	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Peneliti mampu menjelaskan beberapa	Tidak didapatkan variabel dalam referensi.

	Persalinan Prematur Di Klinik Obsgyn RS Muhammadiyah Lamongan.			imminens.	masuk dalam sel channel kalsium sehingga akan terjadi relaksasi. MgSO ₄ secara parenteral dengan dosis awal 4-6 gram iv dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus. Bila terjadi efek toksik berikan kalsium glukonas 1 gram secara IV perlahan-lahan.	dengan menggunakan data Medical Record	mekanisme kerja obat.	
5.	Asuhan Kebidanan Pada Ny. " N " GIIP _{1001A0} Dengan Abortus Imminens Poli Kandungan RSUD Sumbawa Besar.	Desti Haswari, Istiadah Fatmawati, dan Wahyu Anjasari.	2019	Pengkajian awal	Intervensi yang dilakukan yaitu mengkaji sumber dan sifat nyeri dengan menanyakan pada klien bagaimana yang dirasakan nyeri, kapan waktunya, nyeri yang dirasakan	Tidak menjelaskan cara pengukuran tingkatan nyeri.	Teknik pengumpulan data primer yaitu pemeriksaan fisik, wawancara,	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (grevita Nur Mawarni Adi, 2017), yang dimana mengkaji informasi mengenai keadaan pasien.

					seperti apa. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital.		dan observasi, serta data sekunder yang meliputi studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.	
6.	Laporan Kasus Abortus Imminens Juni 2015 Faktor Resiko, Patogenesis, Dan Penatalaksanaan	A.A Gde Kiki Sanjaya Dharma	2015	Penanganan abortum imminens dengan memberikan medikamentosa dan monitoring vital sign	pada kasus ini pada saat pasien datang ke rumah sakit keadaan umum stabil, dan tidak didapatkan tanda-tanda syok. Oleh karena pada pemeriksaan fisik tidak teraba massa jaringan dan perdarahan berhenti setelah dilakukan observasi selanjutnya diberikan medikamentosa berupa tokolitik dan	Tidak disebutkan metode penelitian dan referensi yang digunakan dalam penelitian ini terlalu sedikit.	Peneliti ini mampu menjelaskan dosis obat yang diberikan pada kasus abortus imminens.	Tidak didapatkan variable dalam referensi.

					<p>vitamin dan sangat penting juga selama kehamilan untuk monitoring vital sign untuk mengetahui dan menghindari komplikasi yang terjadi. Keadaan pasien stabil dan diberikan pengobatan Isoxsuprine dan allylesterenol untuk mempertahankan kondisi. Tidak disebutkan metode penelitian uterus yang mana berperan dalam menjaga kandungan dan asam mefenamat untuk analgetik.</p>			
7.	Efektivitas Penggunaan MgSO4	Nurhikma A, Elly	2017	Efektifitas MgSO4	Hasil penelitian ini adalah dari 32 pasien yang	Jenis penelitian ini	Penelitian ini mudah	Penelitian ini sejalan dengan hasil

	<p>Sebagai Tokolitik Pada Ancaman Persalinan Prematur Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo.</p>	<p>Wahyudin, Nasruddin AM.</p>			<p>mendapat terapi MgSO₄ , 2 orang yang berhasil menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada pemberian terapi ke 2 tanpa kontraksi, 21 pasien yang berhasil menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada pemberian terapi ke 3 tanpa kontraksi, 6 paasien yang berhasil menunda persalinan dengan penurunan kontraksi tersisa 1x10 menit (15-20 detik) dan 5 pasien yang berhasil menunda persalinan dengan penurunan</p>	<p>merupakan penelitian observasional dengan mengikuti rancangan deskriptif analitik dan pengambilan data secara prospektif.</p>	<p>dipahami.</p>	<p>penelitian (Helmie, 2015) yang menyatakan bahwa MgSO₄ adalah salah satu cara untuk penanganan abortus imminens.</p>
--	---	--	--	--	---	--	------------------	---

					kontraksi tersisa 1x10 menit (10-15 detik) masing-masing pada pemberian terapi ke 3, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas MgSO ₄ dalam menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam adalah sebesar 71,87%.			
8.	Perbandingan Antara Pemberian Progesteron vaginal Dan Allylestrenol Oral Pada Penanganan Abortus Imminens.	Umar Dhani, Ova Emilia,dan Risanto.	2015	Perbandingan antara pemberian progesteron vaginal dan allylestrenol oral pada penanganan	Dari hasil penelitian kejadian abortus pada kelompok progesteron vaginal adalah 23,3% dibanding, 37,9% pada kelompok <i>allylestrenol</i> oral (RR=0,61; 95% CI 0,27-1,36). Lama bertahan	Referensi yang digunakan terlalu sedikit dan tidak dijelaskannya kondisi pasien yang	Penelitian ini merupakan <i>Random Clinical Trial</i> dengan subyek penelitian ibu hamil 8-16 minggu,	Tidak didapatkan variable dalam referensi.

				abortus imminens.	pada kelompok progesteron vaginal rata-rata 16,57 hari dibanding rata-rata 9,82 hari pada kelompok <i>allylestrenol</i> oral (beda rata-rata 6,75 hari; 95% CI 2,30-11,20).	mengalami abortus imminens yang akan diberikan progesteron vaginal maupun <i>allylestrenol</i> oral.	terdiagnosis abortus imminens, kadar hemoglobin > 10 g/dL, dan janin hidup.	
9.	Hubungan Usia Ibu Dengan Kejadian Abortus di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta.	Dini Sudi Umayah	2009	Penanganan abortus imminens.	Penanganan yang dilakukan pada abortus imminens yaitu dengan tidur berbaring merupakan unsur penting dalam pengobatan, karena menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan menggunakan	Peneliti mampu menjelaskan penanganan kasus abortus imminens dengan penjabarannya.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian(Sri Riningsih; 2019), yang menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu

					berkurangnya rangsangan mekanik, dan pemeriksaan USG dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup.	rancangan penelitian <i>retrospektif</i> .		dengan tirah baring dan pemeriksaan USG.
10.	Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Tanda Bahaya Selama Kehamilan Di Klinik Romauli Tahun 2019.	Calvin Natalia Laia	2019	Penanganan abortus imminens	Penanganan abortus imminens bisa dengan istirahat baring karena menyebabkan peningkatan aliran darah ke uterus, dan pemberian fenobarbital 3x30 mg untuk menenangkan penderita	Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Johan Nafis Raden, 2009), yang menyatakan bahwa penanganan pada abortus imminens yaitu dengan istirahat baring dan pemberian fenobarbital.

F. Matriks Langkah VI: Implementasi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Profil Peresepan Tokolitik Pada Pasien Abortus Imminens Dan Persalinan Prematur Di Klinik Obsgyn RS Muhammadiyah Lamongan.	Sri Wuryaningsih	2019	Pengenalan MgSO ₄ Untuk pengobatan abortus imminens	Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis yang cocok untuk diberikan pada ibu hamil yang mengalami abortus imminens. Dengan demikian, MgSO ₄ 4-6 gram IV dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus. Ini adalah dosis yang dipilih untuk penelitian ini, karena	Pengenalan MgSO ₄ Untuk pengobatan abortus imminens	Dalam referensi ini didapatkan beberapa cara pengobatan abortus imminens dan dosisnya.	Tidak didapatkan variable dalam referensi

					dosis ini telah terbukti dapat ditoleransi dengan baik untuk memperpanjang fase laten persalinan prematur antara 24-48 jam.			
2.	Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal	Didien Ika Setyarini, M.Keb dan Suprapti, SST., M.Kes	2016	Penatalaksanaan abortus imminens	Tidak perlu pengobatan khusus atau tirah baring total, jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual, perdarahan berhenti, lakukan asuhan antenatal seperti biasa. Lakukan penilaian jika perdarahan terjadi lagi, perdarahan terus	tidak dapat menjelaskan penanganan abortus imminens secara rinci	Mampu mengetahui penanganan pada kasus abortus imminens.	Tidak didapatkan variable dalam referensi.

				<p>berlangsung: nilai kondisi janin (uji kehamilan/USG).</p> <p>Lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain.</p> <p>Perdarahan berlanjut, khususnya jika ditemui uterus yang lebih besar dari yang diharapkan, mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau mola, tidak perlu terapi hormonal (estrogen dan progestin) atau tokolitik (seperti salbutamol atau indometasis) karena obat-obat ini tidak</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					dapat mencegah abortus.			
3.	Abortus Imminens: Upaya Pencegahan, Pemeriksaan, dan Penatalaksanaan.	Nur Ilhaini Sucipto	2013	Presentase penggunaan tirah baring pada kasus abortus imminens.	Tirah baring merupakan unsur penting dalam pengobatan abortus imminens karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanik. Pada suatu penelitian, 1228 dari 1279 (96%) dokter umum meresepkan istirahat pada perdarahan hebat yang terjadi pada awal kehamilan, meskipun	Tidak dapat menjelaskan pengobatan abortus imminens secara rinci.	Mampu mengetahui penanganan pada kasus abortus imminens.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Johan Nafis Raden, 2009), yang menyatakan bahwa penanganan pada abortus imminens yaitu dengan istirahat baring.

				<p>hanya delapan dari mereka yang merasa hal tersebut perlu, dan hanya satu dari tiga orang yang yakin hal tersebut bekerja baik.</p> <p>Sebuah penelitian <i>randommised controlled trial</i> (RCT) tentang efek tirah baring pada abortus imminens menyebutkan bahwa 61 wanita hamil yang mengalami perdarahan pada usia kehamilan kurang dari delapan minggu yang viabel, secara acak diberi</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>perlakuan berbeda yaitu injeksi Hcg, plasebo atau tirah baring. Presentase terjadinya keguguran dari ketiga perlakuan tersebut masing-masing 30%, 48%, dan 75%. Dalam sebuah penelitian retrospektif pada 226 wanita yang dirawat di RS dengan keluhan akibat kehamilannya dan abortus imminens, 16% dari 146 wanita yang melakukan tirah baring mengalami keguguran, dibandingkan dengan</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

					seperlima wanita yang tidak melakukan tirah baring. Sebaliknya, sebuah studi kohort observasional terbaru dari 230 wanita dengan abortus imminens yang direkomendasikan tirah baring menunjukkan bahwa 9,9% mengalami keguguran dan 23,3% baik-baik saja (p=0,03).			
4.	Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Dewi Sartika	Desyanti Laharu	2017	Penatalaksanaan abortus imminens	Istirahat baring, pemberian sedativa misalnya fenobarbital 3x30 mg/hari papaverin 3x40	Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik	Jumlah populasi sebanyak 3.036 orang dan sampel sebanyak 194	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian(Sri Riningsih; 2019), yang menyatakan

	Tahun 2016.				mg/hari, observasi perdarahan, jika perdarahan berhenti/ menetap nilai viabilitas janin dengan tes urin atau USG, jika reaksi kehamilan dua berturut-turut negative maka sebaiknya uterus dikosongkan (kuret).	dengan pendekatan case control.	orang yang diambil dengan menggunakan sistematik random sampling.	bahwa penanganan yang dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu dengan tirah baring dan pemeriksaan USG.
5.	Pola Penggunaan Obat Pada Kelainan Kehamilan Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Yogyakarta Tahun	Erna Fitriyani	2005	Penatalaksanaan pada abortus imminens	Posisi pasien berbaring agar aliran darah ke uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, periksa denyut nadi dan suhu badan dua kali sehari bila pasien tidak panas dan tiap empat jam bila	Penelitian ini bersifat <i>deskriptif non analitik</i> dengan metode pengumpulan data secara <i>retrospektif</i> .	Pengambilan data pada penelitian ini secara populasi	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Grevita Nur Mawarni Adi, 2017, yang menyatakan bahwa penanganan pada abortus imminens

	2003.			<p>pasien panas, tes kehamilan, jika hasil negatif berarti janin sudah mati.</p> <p>Pemeriksaan USG untuk menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat penenang, biasanya fenobarbital 3x30 mg, diet tinggi protein dan tambahan vitamin C.</p> <p>Bersihkan vulva minimal dua kali sehari dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi terutama saat masih mengeluarkan cairan</p>			<p>yaitu dengan baring, pemberian obat penenang dan pemeriksaan USG.</p>
--	-------	--	--	---	--	--	--

					coklat.			
6.	Buku Ajar Perdarahan Pada Kehamilan Trimester 1	Dr. Ratna Dewi Puspita Sari, S.Ked., Sp.OG, dan Dr. Arif Yudho Prabowo, S.Ked.	2018	Penatalaksanaan abortus imminens.	Istirahat baring agar aliran darah ke uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, progesteron 10 mg sehari untuk terapi substansi dan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim, tes kehamilan dapat dilakukan. Bilahasil negatif, mungkin janin sudah mati, pemeriksaan USG untuk menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat penenang,	Tidak didapatkan kelemahan pada referensi terkait.	Peneliti mampu menjelaskan penanganan abortus imminens	Buku ini sejalan dengan hasil penelitian (Erna Fitriyani, 2005), yang menyatakan bahwa penanganan yang dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu dengan istirahat baring, tes kehamilan, pemberian obat penenang, dan pemeriksaan USG.

					biasanya fenobarbita 3x30 mg, dan pasien tidak boleh berhubungan seksual dulu sampai lebih kurang 2 minggu.			
7.	Buku Ajar Obstetri Dan Ginekologi	Lidia Aditama Putri, SST., M.K.M dan Siti Mudlikah, SST., M.Kes	2019	Penatalaksanaan abortus imminens	Apabila ada tanda dan gejala klinis yang menunjukkan ibu mengalami abortus imminens, maka kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus. Adapun penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan	Tidak dapat menjelaskan dosis obat yang diberikan pada ibu abortus imminens.	Mampu menjelaskan penatalaksanaan abortus imminens.	Buku ini sejalan dengan buku menurut (Sulaiman, dkk, 2005), yang menyatakan bahwa penanganan abortus imminens yaitu dengan tirah baring dan pemberian hormon progesteron.

					<p>untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan ibu, berikan obat spasmotilik untuk meredakan kontraksi (nyeri) perut yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama ± 2 minggu atau selama</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					trimester pertama kehamilan.			
8.	Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi: Edisi 2	Prof. Sulaiman Sastrawinata, dr. SpOG(K), Prof. Dr. Djamhoer Martaadisoebrata, dr. MSPH. SpOG(K), dan Prof. Dr. Firman F. Wirakusumah, dr. SpOG(k)	2005	Pengelolaan pada kasus abortus imminens.	Bila kehamilan utuh, ada tanda kehidupan janin, yaitu: <i>best red</i> selama 3x24 jam dan pemberian preparat progesteron bila ada indikasi (bila kadar <5-10 nanogram), dan bila hasil USG meragukan, ulangi pemeriksaan USG 1-2 minggu, kemudian bila hasil USG tidak baik, evakuasi.	tidak dapat menjelaskan penatalaksanaan abortus imminens secara rinci.	Mampu mengetahui dasar diagnosis abortus imminens secara klinis.	Buku ini sejalan dengan buku menurut (Lidia, dkk, 2019) yang menyatakan bahwa penanganan EPI abortus imminens yaitu dengan tirah baring dan pemberian hormon progesteron.
9.	Solusi Problem Persalinan	Dra. Dini Kasdu, M. Kes	2007	Penanganan abortus imminens	Penanganannya, dengan pemeriksaan USG untuk	Tidak dapat kelemahan	Peneliti mampu menjelaskan penanganan	Buku ini sejalan dengan buku menurut (Sulaiman,

				<p>menentukan janin masih hidup atau tidak. Jika masih ada harapan, janin dapat dipertahankan.</p> <p>Biasanya, ibu diminta untuk beristiahat, yaitu dengan tidur berbaring. Cara ini dapat menambah aliran darah ke rahim dan berkurangnya rangsang mekanik. Seminggu kemudian, lakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi janin. Jika kondisinya semakin baik, berikan obat-obatan pada ibu</p>	<p>dalam referensi terkait.</p>	<p>pada abortus imminens.</p>	<p>dkk, 2005), yang menyatakan bahwa penanganan abortus imminens yaitu dengan tirah baring, pemberian hormon progesteron dan pemeriksaan USG.</p>
--	--	--	--	--	---------------------------------	-------------------------------	---

					<p>untuk mempertahankan janinnya. Misalnya, dengan pemberian hormon progesteron jika penyebabnya karena kekurangan hormon progesteron. Namun, jika karena faktor lain, pemberian hormon ini tidak banyak manfaatnya.</p>			
10.	Prosedur Tetap Obstetri dan Ginekologi	Dr. Chrisdiono M. Achadiat, Sp.OG	2004	Penanganan abortus imminens	<p>Istirahat baring yang merupakan unsur terpenting karena menyebabkan peningkatan aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik,</p>	penulis tidak menjelaskan penanganan abortus secara rinci.	Mampu mengetahui penanganan abortus imminens.	Buku ini sejalan dengan buku menurut (Dini, 2007), yang menyatakan bahwa penanganan abortus imminens yaitu dengan tirah

					dan fenobarbital 3x30 mg dapat diberikan untuk menenangkan penderita.			baring.
11.	Asuhan Kebidanan Kehamilan Komprehensif	Febriyani, Vedjia Medhyna, Oktavianis, Zuraida, Visti Delvina Rahmi Sari Kasoema, Ainal Mardiah, Nurul Amalina Vittria Meilinda, Novi Wulan Sari, Resty Noflidaputri Sari Ida Miharti, dan Nina Fitri	2021	Penanganan abortus imminens	Penanganan abortus imminens yaitu tirah baring. Tidur berbaring merupakan unsur penting dalam pengobatan, karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanik, anjurkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan atau melakukan hubungan	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi terkait.	Mampu mengetahui penanganan abortus imminens dengan penjelasannya.	Buku ini sejalan dengan isi buku (Lidia, dkk, 2019), yang menyatakan bahwa penanganan abortus imminens yaitu dengan tirah baring, dan pemberian hormon progesteron.

				<p>seksual, tenang pemberian hormon progesteron pada abortus imminens belum ada persesuain faham, pemeriksaan ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup, macam dan lamanya perdarahan menentukan pronogsis kelangsungan kehamilan, bila perdarahan berhenti: melakukan asuhan antenatal terjadwal dan penilaian ulang bila</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>terjadi perdarahan terus berlangsung: nilai kondisi janin. lakukan konfirmasi</p> <p>kemungkinan adanya penyebab lain pada fasilitas terbatas, pemantauan hanya dilakukan melalui gejala klinik dan hasil pemeriksaan ginekologik.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

G. Matriks Langkah VII: Evaluasi

No	Judul Referensi	Oleh (Sebutkan Nama)	Tahun	General Idea	Hasil	Kelemahan	Kelebihan	Perbandingan
1.	Asuhan Kebidanan Ibu Hamil Pada Ny.	Irfi Ulimaz Risyani	2013	Evaluasi keadaan tanda-	Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan	Tidak adanya rekomendasi	Penjelasan mengenai	Penelitian ini sejalan dengan hasil

	M G2P1A0 Dengan Abortus Imminens Di RSUD Karanganyar			tanda vital dan keadaan pasien setelah tindakan	pervaginam, dan tirah baring setiap 30 menit selama 2 jam. Lakukan pemeriksaan USG untuk menilai kondisi janin. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan pemberian injeksi amoxicillin 1 gr/IV setiap 8 jam dan injeksi kalnex 1 ampul/IV setiap 12 jam selama 24 jam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan pulang.	metode atau penanganan baru dan masih sama dengan metode sebelumnya	penanganan abortus imminens serta evaluasi setelah tindakan mudah dipahami.	penelitian (Nur Sholiha dan Ira Sukyati, 2019), yang menyatakan evaluasi tanda vital, dan perdarahan.
2.	Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus	Nur Sholiha, dan Ira	2019	Evaluasi keadaan tanda vital pasien	Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, hemoglobin,	Tidak didapatkan kelemahan	Dapat mengetahui evaluasi pasca	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irfa

	Imminens.	Sukyati		setelah tindakan	nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus, intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb >8 gr/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang.	pada referensi	tindakan abortus imminens.	Ulimaz Risyani, 2013), yang menyatakan evaluasi tanda vital, dan perdarahan.
3.	Abortus Imminens: Upaya pencegahan, pemeriksaan, dan Penatalaksanaan.	Nur Ilhaini Sucipto	2013	Studi kohort observasional	dari 230 wanita dengan abortus imminens yang direkomendasikan tirah baring menunjukkan bahwa 9,9% mengalami keguguran dan 23,3%	Pembahasan yang terlalu berbelit-belit dan tidak fokus kepada satu	Mampu mengetahui pencegahan abortus imminens.	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Irfi Ulimaz Risyani, 2013), yang menyatakan tirah

				<p>ditangani dengan tirah baring.</p> <p>baik-baik saja)$p=0,03$). Lamanya perdarahan vagina, ukuran hematoma dan usia kehamilan saat diagnosis tidak mempengaruhi tingkat terjadinya keguguran. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa istirahat dapat mempengaruhi jalannya kehamilan, membatasi aktivitas selama beberapa hari dapat membantu wanita merasa lebih aman, sehingga memberikan pengaruh emosional. Dosisnya 24-48 jam diikuti dengan tidak melakukan aktivitas berat,</p>	pembahasan.		baring.
--	--	--	--	---	-------------	--	---------

					namun tidak perlu membatasi aktivitas ringan sehari-hari.			
4.	Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny "F" Yang Mengalami Abortus Imminens Dengan Masalah Keperawatan Intoleransi Aktivitas Di Ruang Rawat Nuri Rumh Sakit Bhayangkara Makassar Tahun 2019	Nur Indah	2019	Evaluasi keperawatan	Mengevaluasi tanda-tanda vital, kondisi pasien apa masih melakukan tirah baring, nyeri akut, dan perdarahan pervaginam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan pulang.	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi.	Mampu mengetahui kondisi ibu dan penanganannya	Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nur Sholiha, dan Ira Sukyati, 2019), yang menyatakan evaluasi tanda vital, dan perdarahan dan tirah baring.
5.	Laporan Kasus Abortus Imminens Juni 2015 Faktor	A.A Gde Kiki Sanjaya	2015	Cara menghindari terjadinya	KIE merupakan hal yang sangat penting didalam kasus ini dimana yang	Tidak menjelaskan metode	Dalam penelitian ini menjelaskan	Tidak didapatkan variable dalam referensi.

	Resiko, Patogenesis, Dan Penatalaksanaan	Dharma		abortus imminens	<p>harus dititik beratkan adalah tentang diagnosis penyakitnya, tindakan apa yang dilakukan penyakitnya tersebut, komplikasi apa yang dapat terjadi, rencana monitoring kehamilan yang (persiapan untuk faktor anatomi dan psikologis ibu), kontrol atau evaluasi terhadap tindakan (febris nyeri) dan yang tidak kalah pentingnya adalah mencari penyebab abortus (untuk persiapan kehamilan berikutnya), disamping itu juga terhadap faktor sosial</p>	penelitian.	diagnosis abortus imminens	
--	--	--------	--	---------------------	--	-------------	----------------------------------	--

					dimana harapan masih bisa hamil lagi, prognosis abortus yang berulang atau tidak.			
6.	Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Kejadian Abortus Imminens Pada Ibu Hamil Di Sukadana	Aulia Kusuma	2016	Cara menghindari abortus imminens.	Disarankan pada ibu hamil lebih menjaga kesehatan, mengatur pola makan, menghindari stress, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, melakukan bedrest, tidak melakukan aktivitas fisik yang berlebihan.	Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Dalam penelitian ini menjelaskan faktor-faktor terjadinya abortus imminens.	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nur Dinda, 2019) yang dimana salah satu cara mencegah abortus imminens pada ibu hamil yaitu dengan melakukan tirah baring.
7.	Faktor Yang Berhubungan Denga Kejadian Abortus Immines Di RSUD Labung	Nurhijrah, Imna Sri Rejeki, dan Hilmiah	2019	Cara mencegah terjadinya abortus.	Cara utama untuk mencegah terjadinya abortus yaitu dengan peningkatan minat mengetahui informasi	Tidak didapatkan penjelasan mengenai penyakit yang	Dalam penelitian ini menjelaskan faktor hubungan	Tidak didapatkan variable dalam referensi.

	Baji Kota Makassar.				tentang kesehatan pada kehamilan, penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan. Selain itu dapat diberikan pendidikan kesehatan pada ibu dengan umur yang beresiko (<20 dan >35 tahun) saat hamil.	menyertai	terjadinya abortus imminens.	
8.	Tentang Hubungan Umur Dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Primigravida di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta Tahun 2012	Erpiyana, dan Suratini	2013	Mencegah terjadinya abortus.	Diharapkan pada pihak yang terkait untuk melakukan pelatihan agar dapat mencegah terjadinya abortus seperti memberikan penyuluhan mengenai faktor-faktor resiko penyebab abortus.	Desain penelitian ini adalah deskriptif korelasional dengan pendekatan retrospektif	Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dengan sampel 68 orang.	Tidak didapatkan variable dalam referensi.
9.	Penyakit Ibu	Layla	2019	Cara mencegah	Seorang perempuan hamil	Jenis	Metode	Penelitian ini sejalan

	<p>Terhadap Kejadian Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang Sidempuan.</p>	<p>Fadhilah Rangkuti, Sri Rahayu Sanusi, dan Delfi Lutan</p>		<p>terjadinya abortus imminens</p>	<p>harus menjaga asupan gizinya dengan makan makanan yang bergizi tinggi dengan diet seimbang dan selalu menjaga berat badan ibu sehingga terkontrol dan tidak mengalami tekanan darah tinggi. Seorang perempuan hamil juga sebaiknya tetap melakukan olahraga ringan yang sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi seperti berenang dan berjalan kaki. Adapun saran-saran kepada ibu hamil dengan atau tanpa resiko tinggi sebaiknya</p>	<p>penelitian ini bersifat studi <i>analitik observasional</i> dengan <i>desain penelitian case control</i>.</p>	<p>analisis data yang digunakan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat dengan <i>chi-square</i>.</p>	<p>dengan hasil penelitian (Nurhijrah, Imna Sri Rejeki, dan Hilmiah, 2019) yang menyatakan untuk mencegah terjadinya abortus dengan memberikan informasi tentang kesehatan pada kehamilan, penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan.</p>
--	---	--	--	------------------------------------	--	--	---	---

					<p>memelihara kesehatan agar tidak sakit, melakukan kontrol hamil secara teratur baik itu kepada bidan maupun dokter kandungan dan pemeriksaan secara teratur setiap bulan dapat mencegah hal-hal yang membahayakan bagi ibu dan bayi. Bagi petugas kesehatan khususnya bidan diharapkan agar lebih meningkatkan ilmu dan keterampilan agar dapat mendeteksi sedini mungkin terjadinya abortus imminens sehingga komplikasi dapat diatasi</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					dengan baik dan dapat memberikan penyuluhan atau konseling kepada ibu hamil mengenai abortus imminens.			
10.	Buku Ajar Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal	Ani Triana, S.S.T., M. Kes, Ika Putri Damayanti, S.S.T., M. Kes, Rita Afni, S.S.T., M. Kes, dan Juli Selvi Yanti, S.S.T., M. Kes	2015	Evaluasi abortus imminens	Tirah baring sedikitnya 2-3 hari (setidaknya dirawat inap), pantang senggama, setekah tirah baring 3 hari, evaluasi ulang diagnosis, bila masih abortus imminens tirah baring dilanjutkan, dan mobilisasi bertahap (duduk-berdiri-berjalan) dimulai apabila diyakini tidak ada perdarahan pervaginam 24 jam.	Tidak didapatkan kelemahan dalam referensi.	Mampu menjelaskan evaluasi pada kasus abortus imminens.	Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nur Dinda, 2019) yang dimana salah satu cara mencegah abortus imminens pada ibu hamil yaitu dengan melakukan tirah baring.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pembahasan Hasil Telah *Evidence Based* Asuhan 7 Langkah Varney

berdasarkan hasil penelusuran referensi yang telah dirampung pada matriks sebelumnya maka didapatkan hasil asuhan 7 langkah varney yang akan dijelaskan pada pembahasan ini:

1. Langkah I: Interpretasi Data Dasar

Dari hasil penelitian yang dilakukan, banyak pendapat yang didapatkan tentang gizi kurang pada balita, yaitu:

Referensi 1: Pengertian abortus imminens menurut (Sugiarsi et.al., 2017), abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap datang ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup. Persamaannya yaitu adanya darah. Perbedaannya penelitian lebih menjelaskan keadaan janin yang masih hidup.

Referensi 2: Pengertian abortus imminens menurut (Indah, 2019), abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada umur kehamilan <20 minggu. Persamaannya, abortus imminens merupakan salah satu komplikasi pada kehamilan yang pada umumnya dapat menimbulkan perdarahan dan nyeri pada perut. Perbedaannya, terjadinya abortus imminens menimbulkan nyeri pada bagian perut.

Referensi 3: Menurut (Haswari et.al., 2019) tanda dan gejala abortus imminens antara lain yaitu perdarahan sedikit/bercak, kadang disertai rasa mules/kontraksi, periksa dalam belum ada pembukaan, palpasi tinggi fundus uteri sesuai usia kehamilan, hasil tes kehamilan (+)/positif. Persamaannya yaitu abortus imminens ditandai dengan perdarahan dan belum ada pembukaan. Perbedaannya yaitu hasil tes kehamilan pada abortus imminens perlu diketahui dalam mengetahui apakah ibu masih hamil atau tidak.

Referensi 4: menurut (Rohayah, 2015) kejadian abortus imminens di RSUD Wonosari tahun 2012-2013 yaitu sebesar 123 dan 128 orang, dan abortus imminens berdasarkan paritas primipara sebesar 46 orang (37,4%) dan 42 orang (37,5%) multipara sebesar 65 orang (52,8%) dan 62 orang (48,4%) dan grande multipara 12 orang (9,8%) dan 18 orang (14,1%). Persamaannya di mana ada hubungan yang signifikan antara paritas dan abortus imminens di RSUD Wonosari. Perbedaannya populasi yang dijelaskan secara detail.

Referensi 5: menurut (Fitriyani, 2005) etiologi abortus imminens pada umumnya disebabkan oleh kelainan pertumbuhan hasil konsepsi, biasanya menyebabkan abortus pada kehamilan sebelum usia 8 minggu. Faktor yang menyebabkan kelainan ini adalah: kelainan kromosom, terutama trisomia dan monosomia, lingkungan sekitar tempat implantasi kurang sempurna, pengaruh teratogen akibat radiasi, virus, obat-obatan, tembakau dan alkohol, kelainan pada plasenta, kelainan traktus genitalia, mioma uteri dan kelainan Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus Imminens bawaan uterus. Persamaannya yaitu abortus imminens disebabkan oleh kelainan kromosom, obat-

obatan dan lingkungan sekitar. Perbedaannya yaitu kelainan asuhan keperawatan pada ibu dengan abortus imminens bawaan uterus.

Referensi 6: menurut (Dharma, 2015) penyebab terjadinya abortus imminens Mekanisme pasti yang bertanggung jawab atas peristiwa abortus tidak selalu tampak jelas. Kematian janin sering disebabkan oleh abnormalitas pada ovum atau zigot atau oleh penyakit sistemik pada ibu, dan kadang-kadang mungkin juga disebabkan oleh penyakit dari ayahnya. Perkembangan zigot yang abnormal, faktor maternal: infeksi, penyakit-penyakit kronis yang melemahkan, pengaruh endokrin, nutrisi, obat-obatan dan toksin lingkungan, faktor-faktor imunologis, gamet yang menua, laparotomi, trauma fisik dan trauma emosional, kelainan uterus, inkompetensi serviks, faktor paternal: faktor fetal dan faktor plasenta. Persamaannya yaitu disebabkan oleh faktor plasenta. Perbedaannya yaitu disebabkan oleh penyakit dari ayahnya.

Referensi 7: penelitian (Kusuma, 2016) menyatakan faktor yang melatarbelakangi kejadian abortus imminens yaitu menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil masih rendah mengenai kehamilan, adanya stress yang dialami pada saat kehamilan, tindakan yang salah dalam pencegahan infeksi keputihan serta tindakan pelayanan kesehatan yang kurang memadai di Sukadana Kabupaten Kayong Utara. Persamaannya adanya stres yang dialami pada saat kehamilan. Perbedaannya peneliti menjelaskan cara mengatasi faktor yang melatarbelakangi kejadian abortus imminens.

Referensi 8: penelitian (Ansar, 2020) menyatakan faktor risiko yang menyebabkan terjadinya abortus imminens yaitu seperti tingginya umur ibu, rendahnya tingkat pendidikan, kurang berat badan dan obesitas, banyaknya paritas dan graviditas, jauhnya

jarak kehamilan, adanya riwayat abortus, usia menarche yang terlalu dini, buruknya pola konsumsi, pekerjaan ibu, tidak dilakukannya pemeriksaan kehamilan, stres dan paparan asap rokok. Persamaannya kurangnya perhatian terhadap ibu yang memiliki faktor resiko abortus imminens. Perbedaannya kurangnya kesadaran ibu dalam memeriksakan diri di pelayanan kesehatan.

Referensi 9: menurut penelitian (Agustina, 2015) yang menyatakan faktor resiko yang paling dominan sebagai penyebab abortus imminens dari hasil penelitian ibu dengan umur berisiko ≤ 20 atau ≥ 35 tahun. Persamaannya dimana ada hubungan signifikan antara umur dan abortus imminens di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta. Perbedaannya tidak menjelaskan cara mengatasi faktor resiko abortus imminens.

Referensi 10: penelitian (Sari, 2019) menyatakan Dari hasil analisa bivariat didapatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens yaitu faktor umur dimana P. Value = 0,000 lebih kecil dari P. Value= 0,05 dan faktor paritas dimana P.Value = 0,000 lebih kecil dari P.Value= 0,05. Persamaannya yaitu usia <20 sampai >35 tahun lebih rentan mengalami abortus imminens. Perbedaannya yaitu masih banyaknya ibu hamil dengan usia yang beresiko.

Referensi 11: penelitian (Shandra et.al., 2016) menyatakan faktor penyebab lain yang mengakibatkan abortus yaitu faktor janin, kelainan genetalia ibu, pengaruh paparan rokok, ketidakcocokan RH, inkompetensi serviks, kelelahan fisik dan hubungan seksual, dimana teori yang mendukung hal tersebut sama dan telah diuraikan pada bagian hubungan usia dengan kejadian abortus. Persamaannya yaitu perlunya istirahat yang cukup dalam masa kehamilan utamanya lingkungan yang sehat. Perbedaannya

yakni tidak dijelaskannya mengenai cara pencegahan dari beberapa faktor resiko seperti pendidikan kesehatan dengan PHBS.

Referensi 12: penelitian (Anindita, 2011), menyatakan faktor penyebab abortus imminens pada ibu pada anemia tinggi berkaitan dengan kesehatan ibu karena kurangnya istirahat. Persamaannya peneliti menjelaskan beberapa faktor penyebab abortus imminens. Perbedaannya kurangnya informasi yang diperoleh sehingga banyak ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan *antenatal*, karena pemeriksaan *antenatal* juga berguna untuk memantau atau mendeteksi komplikasi *obstetric* yang ada secara dini.

Referensi 13: menurut penelitian (Febriyani et.al., 2021), menyatakan adapun diagnosa yang didapatkan pada klien dengan abortus imminens yaitu terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan positif. Persamaannya yaitu terjadinya perdarahan, perut terasa sedikit mules dan pada pemeriksaan tes kehamilan urine masih menunjukkan hasil positif. Perbedaannya kurangnya pendekatan kepada klien mengenai perdarahan atau komplikasi yang bisa terjadi pada kehamilan muda.

Referensi 14: pengertian aboortus imminens menurut (Jeini, 2019), Abortus imminens adalah abortus tingkat permulaan, terjadi perdarahan pervaginam, sedangkan jalan lahir masih tertutup dan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim. Persamaannya yaitu sebagian tingkat permulaan suatu abortus. Perbedaannya peneliti menjelaskan keadaan hasil konsepsi masih baik di dalam rahim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian yang didapatkan menyatakan bahwa abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada

umur kehamilan <20 minggu sehingga menimbulkan perdarahan dan nyeri pada bagian perut. Adapun diagnosa yang bisa kita dapatkan dari abortus imminens yaitu terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan positif.

Adapun faktor hubungan terjadinya abortus imminens yaitu umur, paritas, interval kehamilan, riwayat abortus, anemia, penyakit ibu, infeksi, kelainan genitalis ibu, faktor janin, pengaruh paparan rokok, ketidakcocokan RH, inkompetensi serviks, kelelahan fisik dan hubungan seksual.

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Referensi 1: menurut (Wahyuni et.al., 2017), menyatakan adanya hubungan antara usia dengan kejadian abortus imminens. Pengaruh usia terhadap kehamilan dapat menyebabkan resiko terjadinya abortus imminens, karena usia pada saat kehamilan <20 minggu dapat mengakibatkan efek yang buruk baik pada ibu maupun pada janin. Persamaannya yaitu usia <20 sampai >35 tahun lebih rentan mengalami abortus imminens. Perbedaannya yaitu tidak lengkapnya informasi tentang analisis faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens dengan jelas dan lengkap.

Referensi 2: menurut (Barozha et.al., 2016), Diagnosa abortus imminens ditentukan karena pada wanita hamil terjadi pendarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar usia kehamilan, serviks belum membuka, dan tes kehamilan positif, yang biasanya terjadi paruh pertama dari kehamilan. Persamaannya yaitu terjadinya perdarahan melalui ostium uteri eksternum disertai mules sedikit. Perbedaannya peneliti menjelaskan abortus biasanya terjadi paruh pertama dari kehamilan.

- Referensi 3: penelitian (Hamidah et.al., 2013), yang dimana didapatkan hasil bahwa umur, paritas, pendidikan, usia kehamilan, dan riwayat abortus dengan kejadian abortus imminens, sehingga analisis multivariate menyatakan bahwa paritas >3 beresiko 6,9 > besar dibandingkan paritas 1-3. Usia <20 dan >35 tahun beresiko 4 kali > besar dibandingkan usia 20-35 tahun, riwayat abortus beresiko 4,2 kali > besar dari ibu yang tidak memiliki riwayat abortus. Persamaannya yaitu perlunya pendidikan kesehatan disertai pendekatan pada ibu mengenai usia produktif. Perbedaannya yaitu sampel yang diambil semua ibu yang mengalami perdarahan pada kehamilan.
- Referensi 4: penelitian (Pratiwi, 2019) menyatakan analisis bivariat berdasarkan hasil *uji Chi-square* diperoleh hasil usia $\rho(0,003) < \alpha(0,05)$, paritas $\rho(0,004) < \alpha(0,05)$, pekerjaan $\rho(0,005) < (0,05)$, artinya ada hubungan karakteristik ibu hamil dengan abortus imminens di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan Tahun 2017. Persamaannya kurangnya perhatian petugas kesehatan terutama bidan agar memberikan informasi atau penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil tentang komplikasi atau tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan cara mengatasi faktor resiko terjadi abortus imminens.
- Referensi 5: menurut (Oktavia, 2012) kebutuhan pada abortus imminens yaitu diberikan dorongan moral dan informasi tentang keadaan yang dialami bahwa abortus imminens adalah suatu kejadian dalam kehamilan dimana kehamilan dapat dipertahankan. Persamaannya kurangnya perhatian yang didapatkan oleh klien. Perbedaannya peneliti menjelaskan juga keadaan kehamilan.
- Referensi 6: Penelitian (Fahrul, 2015), menyatakan pada bulan 5-6 janin membutuhkan zat besi yang semakin besar jika kandungan zat besi ibu kurang maka sel darah merah tidak dapat mengantarkan

oksigen ke janin sehingga dapat terjadi abortus, kematian janin dalam kandungan atau waktu lahir. Persamaannya yaitu pentingnya zat besi dalam mendukung perkembangan janin dan kesehatan ibu. Perbedaannya yaitu kurangnya perhatian ibu hamil dalam mengonsumsi tablet Fe.

Referensi 7: Penelitian (Lisda, 2017), menyatakan adanya hubungan antara anemia defisiensi besi dengan kejadian abortus. Hal ini disebabkan karena dalam kehamilan zat besi berperan sebagai *hematopoiesis* (pembentukan darah) yaitu dalam sintesa (Hb). Seorang ibu yang dalam masa kehamilannya telah menderita kekurangan zat besi tidak dapat memberi cadangan zat besi kepada bayinya dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan pertama. Hal inilah yang menyebabkan bahwa seorang ibu hamil yang mengalami anemia pada usia kehamilan <20 minggu dapat menyebabkan abortus. Persamaannya kekurangan zat besi pada ibu hamil dapat menyebabkan kekurangan asupan gizi ke janin.

Referensi 8: penelitian (Shandra et.al., 2016), menyatakan jika responden dengan usia beresiko cenderung mengalami resiko abortus karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi saat seorang wanita berada pada usia beresiko. Perempuan dengan usia <20 tahun masih memiliki sisi psikologis yang belum matang, perkembangan otot-otot rahim belum cukup baik kekuatan dan kontraksinya, dan sistem hormonal belum terkoordinasi lancar dan belum stabil sedangkan perempuan usia >35 tahun akan disertai dengan penyakit kronis seperti hipertensi, serta sel telur dan kondisi rahim akan mengalami penurunan kesuburan.. persamaannya itu usia mempengaruhi fungsi organ reproduksi termasuk otot-otot rahim. Perbedaannya, kurangnya pengetahuan setiap individu mengenai usia reproduktif.

Referensi 9: menurut penelitian (Jonah et.al., 2015), menyatakan penyebab keguguran yang diyakini secara umum termasuk peristiwa stres,

mengangkat beban berat, penggunaan alat kontrasepsi sebelumnya atau kontrasepsi oral. Persamaannya yakni penyebab keguguran secara umum dan dampak psikologis seperti menyalahkan diri sendiri, mengisolasi diri dan yang lainnya. Perbedaannya yakni berpatokan pada pelaporan dari pengalaman keguguran yang dialami klien baik perempuan maupun laki-laki yang memenuhi persyaratan yang melaporkan pangannya.

Referensi 10: penelitian (Aryanti, 2016), menyatakan adanya hubungan antara anemia dengan kejadian abortus imminens. Anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu karena kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen yang dapat mengakibatkan efek tidak langsung pada ibu dan janin antara lain terjadinya abortus. Persamaannya yaitu hemoglobin pada dasarnya berfungsi sebagai pembawa oksigen keseluruhan tubuh, tepatnya untuk organ dan jaringan tubuh. Perbedaannya yakni tidak dilakukannya penelitian selain anemia seperti faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya abortus seperti faktor kelainan ovum, kelainan genitalia ibu, gangguan sirkulasi plasenta dan antagonis rhesus.

Referensi 11: penelitian (Eka, 2015), menyatakan ibu yang memiliki paritas tinggi atau multipara beresiko terjadinya abortus. Angka kejadian pada hasil penelitian banyak terdapat abortus pada multipara da semakin tinggi kejadiannya pada grande multipara. Kejadian abortus pada ibu paritas tinggi berkaitan dengan kesehatan ibu karena kurangnya istirahat dan hamil yang terlalu dekat, apabila disertai dengan abortus pada kehamilan sebelumnya. Persamaannya yaitu kurangnya istirahat dapat menyebabkan kelelahan fisik begitu pula dengan hamil dengan paritas multipara maka tenaga yang diperoleh akan semakin menurun diakibatkan kehamilan yang terlalu dekat. Perbedaannya paritas tinggi berisiko terjadinya abortus imminens seperti multipara dan

grande multipara disertai umur yang sudah tidak memungkinkan untuk hamil.

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang penyebab abortus imminens dapat disimpulkan bahwa abortus imminens paling banyak disebabkan oleh usia ibu, paritas, riwayat abortus dan anemia defisiensi zat besi.

3. Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial

Referensi 1: penelitian (Agustina, 2015), Faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian ibu yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan. Wanita yang memiliki abortus mempunyai risiko tinggi terjadi abortus mengulang, premature dan bayi berat lahir rendah. Persamaannya kurangnya kesadaran ibu dalam menjarak kehamilan. Perbedaannya peneliti menjelaskan ibu akan melahirkan premature dan bayi berat lahir rendah.

Referensi 2: penelitian (Sukyati et.al., 2019), yang menyatakan bahwa komplikasi dari abortus imminens yaitu perdarahan, perforasi, infeksi dan syok. Persamaannya yakni terjadinya abortus yang disebabkan oleh perdarahan yang dapat beresiko terjadinya komplikasi perdarahan yang berkepanjangan. Perbedaannya kurangnya perhatian terhadap komplikasi kehamilan.

Referensi 3: penelitian (Lutan et.al., 2019), menyatakan bahwa komplikasi yang bisa terjadi pada abortus imminens yaitu berupa perdarahan atau infeksi yang dapat menyebabkan kematian. Persamaannya yakni terjadinya perdarahan pada ibu maka dibutuhkan tindakan oleh tenaga kesehatan. Perbedaannya pada penelitian ini dirincikan dengan menyertakan penyebab komplikasi abortus imminens.

Referensi 4: penelitian (Lu'lul & Sayono, 2015), menyatakan bahwa komplikasi pada abortus imminens yang bisa terjadi adalah

perdarahan (*hemorrhage*), perforesi, infeksi dan tetanus, dan syok. Komplikasi abortus yang dapat menyebabkan kematian ibu antara lain karena perdarahan dan infeksi. Persamaannya yakni perdarahan yang terjadi pada ibu dapat menyebabkan anemia, sehingga dapat memberikan kematian. Perbedaannya infeksi juga dapat terjadi pada pasien yang mengalami abortus dan dapat menyebabkan sepsis, sehingga dapat berakibat kematian pada ibu.

- Referensi 5: penelitian (Wahyuni et.al., 2017), komplikasi yang bisa terjadi pada abortus imminens yaitu, perdarahan dan infeksi. Persamaannya adalah Perdarahan yang terjadi selama abortus dapat mengakibatkan pasien menderita anemia, sehingga dapat meningkatkan resiko kematian ibu.
- Referensi 6: penelitian (Sari, 2019), komplikasi abortus imminens yang sering terjadi yaitu perdarahan dan infeksi. Persamaannya yakni dengan terjadinya abortus imminens sebaiknya keluarga pasien secepatnya membawa ibu ke pelayanan kesehatan untuk meminimalisir terjadinya komplikasi. Perbedaannya salah satu penghambat cepat tidaknya penanganan disebabkan oleh jarak rumah dengan pelayanan kesehatan yang jauh.
- Referensi 7: penelitian (Sholihah, 2018), komplikasi aortus imminens yang bisa terjadi adalah perdarahan dan infeksi. Persamaannya yaitu perlunya pencegahan komplikasi kehamilan dengan pemeriksaan rutin antenatal. Perbedaannya dampak dari kurangnya perhatian pemeriksaan secara rutin mengaibatkan komplkasi kehamilan.
- Referensi 8: penelitian (Sartika, 2015) menyatakan bahwa komplikasi yang berbahaya pada abortus imminens adalah perdarahan dan infeksi. Persamaannya adalah peneliti menyertakan penyebab dari komplikasi abortus imminens. Perbedaannya kematian ibu yang disebabkan oleh abortus sering tidak muncul dalam laporan kematian, tapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis.

Referensi 9: penelitian (Riningsih, 2019), menyatakan kejadian abortus yang terjadi dapat menimbulkan komplikasi dan dapat menyebabkan kematian. Komplikasi yang dapat menyebabkan kematian ibu antara lain perdarahan dan infeksi. Persamaannya yaitu salah satu jenis abortus spontan yang menyebabkan perdarahan.

Referensi 10: penelitian (Johan, 2009), menyatakan bahwa komplikasi pada abortus imminens yang bisa terjadi adalah perdarahan, infeksi, syok dan kematian. Persamaannya adalah perlunya informasi kesehatan kepada ibu mengenai komplikasi yang bisa terjadi akibat abortus imminens. Perbedaannya yaitu masih banaknya ibu yang tergolong dalam ibu hamil dengan resiko tinggi.

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus abortus imminens dapat menyebabkan komplikasi antara lain perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus dan kematian.

4. Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi

Referensi 1: Penelitian (Johan, 2009), penanganan abortus imminens yaitu istirahat baring, tidur berbaring merupakan unsur yang dalam pengobatan, fenobarbital 3x30 mg sehari dapat diberikan untuk menenangkan pasien. Persamaannya istirahat baring karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik. Perbedaannya diberikan fenobarbital 3x30 mg sehari jika pasien mengalami kejang.

Referensi 2: penelitian (Sartika, 2015), menyatakan upaya pencegahan agar tidak terjadi abortus berulang pada pasien yang mengalami abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma, Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui pengambilan darah. Abortus juga dapat dicegah dengan ANC terpadu antara lain memberikan pelayanan konseling dan kesehatan termasuk penyakit dan kehamilan yang berlangsung sehat, melakukan deteksi dini masalah penyakit dan penyulit/komplikasi proses kehamilan serta melibatkan ibu dan

keluarga terutama suami dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu hamil, menyiapkan persalinan dan kesiagaan bila terjadi penyulit/komplikasi. Upaya pencegahan kejadian abortus juga dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai 4 T (terlalu muda untuk menikah, terlalu tua untuk hamil, terlalu sering untuk hamil dan terlalu banyak untuk melahirkan). Persamaannya yaitu perlunya pemeriksaan ANC secara rutin pada ibu hamil yang mengalami abortus. Perbedaannya kurangnya kesadaran ibu dalam menjaga kesehatan dan gizi ibu.

- Referensi 3: menurut penelitian (Riningsih, 2019), menyatakan untuk penanganan abortus imminens yaitu tirah baring. Persamaannya yaitu dalam kejadian abortus imminens dalam kehamilan dapat dipertahankan dengan tirah baring. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan cara menggunakan preparat progesteron.
- Referensi 4: menurut penelitian (Rohayah, 2015), menyatakan upaya pencegahan abortus yaitu dianjurkan melakukan pemeriksaan Toxoplasma, Rubella Cytomegalovirus, dan Herpes Virus (TORCH) melalui pengambilan darah. Persamaannya yaitu dilakukan pemeriksaan TORCH untuk mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan hasil pemeriksaan.
- Referensi 5: penelitian (Grevita, 2017) yang menyatakan penatalaksanaan abortus imminens yaitu dengan istirahat baring, pemeriksaan ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup, jangan melakukan aktifitas fisik berlebihan atau hubungan seksual, beri terapi obat: penenang penobarbital 3x30 ml gram, valium (apabila pasien gelisah), anti perdarahan: adona, transamin, vitamin B kompleks, hormonal: progesteron 10 mg sehari untuk terapi substitusi dan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim (misalnya: gestanon, dhupaston, anti kontraksi

rahim: duvadilan, papaverin, dan observasi perdarahan. Persamaannya yaitu selama masa kehamilan maka perlu dilakukannya pemeriksaan USG untuk pemantauan perkembangan janin. Perbedaannya yakni masih banyaknya ibu yang kurang sadar akan pentingnya pemeriksaan USG.

Referensi 6: Penelitian (Sunarti et.al., 2019), menyatakan bahwa sikap positif ibu dalam mencegah keguguran pada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan rutin dipengaruhi oleh penguasaan ibu dalam mendapat informasi pencegahan keguguran serta sebagian ibu yang pernah mengalami keguguran memiliki sikap yang dikarenakan kurang pengetahuan tentang mencegah keguguran. Persamaannya adalah pengalaman ibu mendapatkan informasi tentang pendidikan kesehatan dan upaya mencegah keguguran sangat mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janin. Perbedaannya yakni rendahnya tingkat pendidikan dapat berdampak pada ibu hamil dengan resiko tinggi.

Referensi 7: Penelitian (Danae et.al., 2019), pengalaman keguguran merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Perawat darurat meningkatkan perawatan darurat untuk wanita yang mengalami keguguran dengan mendengarkan kekhawatiran mereka dan memberikan informasi yang akurat dan memadai untuk mengurangi efek fisik dan psikologis pada individu, pasangan dan keluarga. Persamaannya adalah dengan adanya pengalaman keguguran maka ibu akan semakin berhati-hati dalam upaya menjaga kesehatan diri dan janin sedangkan perbedaannya tak sedikit ibu yang mengalami pengalaman keguguran malah merasakan trauma pada kehamilan selanjutnya.

Referensi 8: Penelitian (Irfi, 2013), menyatakan tindakan segera yang dilakukan pada abortus imminens yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter SpOG dalam pemberian terapi, meliputi pemberian cairan infus, antibiotik dan pemberian obat anti

perdarahan. Persamaannya adalah pemberian cairan infus untuk menggantikan cairan tubuh atau darah yang hilang akibat perdarahan. Perbedaannya yaitu tidak dijelaskannya jenis cairan yang berguna sebagai pengganti cairan tubuh.

Referensi 9: Penelitian (Meiliana, 2018), menyatakan penatalaksanaan pada abortus imminens bila kehamilan dirasa masih bisa dipertahankan maka cukup dilakukan rebah (*bed rest*) dan diberikan obat-obatan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim. Persamaannya yaitu masih tetap dianjurkan untuk *bed rest* dan diberikan obat-obatan. Perbedaannya peneliti tidak menjelaskan jenis-jenis obat dan dosis yang diberikan pada ibu hamil dengan abortus imminens.

Referensi 10: Menurut penelitian (Fitriani, 2010), menyatakan tindakan yang dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu tidak dianjurkan berhubungan inti selama minimal 2 minggu setelah perdarahan berhenti, *bed rest* total, tidak melakukan aktifitas yang berat, pemberian obat penenang (fenobarbital 3x30 mg dengan preparat hematinic seperti sufas ferosus 600-1000 mg), menjaga dan melakukan diet protein dan mengkonsumsi vitamin C, observasi kondisi keadaan umum dengan memeriksa tanda-tanda vital, anjurkan untuk menjaga personal hygiene bagian genitalia, dengan membersihkan vulva minimal 2x sehari dengan cairan antiseptic. Persamaannya adalah pemantauan pada pasien untuk mengetahui perkembangan dari tindakan yang diberikan. Perbedaannya adalah tidak dijelaskannya mengenai perkembangan setelah dilakukan penatalaksanaan.

Dari banyaknya penelitian yang membahas tindakan segera pada abortus imminens maka dapat disimpulkan bahwa tindakan segera yang bisa dilakukan pada kasus abortus imminens yaitu *bed rest* total, pemberian terapi meliputi pemberian cairan infus, antibiotik dan pemberian obat anti perdarahan kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn.

Selain itu untuk mencegah terjadinya komplikasi kehamilan seperti abortus imminens ini dianjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan mendeteksi dini kondisi janin dan mendapatkan informasi kesehatan terkait kesehatan ibu.

5. Langkah V: Intervensi atau Perencanaan

Referensi 1: Penelitian (Helnie, 2015), menyatakan dari Hasil penelitian didapatkan bahwa rata-rata waktu yang diperlukan untuk penanganan perdarahan pada kasus abortus imminens yang diberi terapi Duvadilan Drip adalah 21,0 jam. Sedangkan untuk rata-rata waktu yang diperlukan untuk penanganan perdarahan pada kasus abortus imminens yang diberi terapi MgSO₄ Drip adalah 38,5 jam. Hasil uji statistik didapatkan nilai p 0,020, berarti pada $\alpha = 5\%$ Ho ditolak, bahwa ada perbedaan antara pemberian MgSO₄ Drip dengan Duvadilan Drip terhadap perdarahan pada kasus abortus imminens di RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2015, dimana Duvadilan Drip lebih efektif dibandingkan dengan MgSO₄ Drip. Persamaannya yaitu sama-sama untuk penanganan perdarahan. Perbedaannya yaitu pada keefektifannya.

Referensi 2: Penelitian (Eka, 2015), menyarankan pada wanita untuk hamil pada usia subur (20-35 tahun) agar alat reproduksi berkembang dengan sempurna dan untuk menjarangkan kehamilan dengan jarak anak 2 tahun agar tidak terjadi abortus. Persamaannya adalah fungsi alat reproduktif berhubungan dengan usia ibu yang dimana disarankan hamil pada usia 20-35 tahun. Perbedaannya yaitu penelitian ini berpatokan dengan rekam medik tanpa melakukan pemeriksaan fisik.

Referensi 3: Penelitian (Grevita, 2017), menyatakan bahwa penanganan perdarahan abortus imminens yaitu dengan pemberian terapi obat-obatan. Obat yang diberikan yaitu Preabor 50 mg 3x1, Asam mefenamat 500 mg 3x1, Asam folat 400 mg 2x1 dan

infuse RL 20 tpm. Persamaannya peneliti lebih menjelaskan jenis obat untuk penanganan perdarahan. Perbedaannya peneliti menjelaskan secara rinci jenis dan dosis obat yang akan diberikan pada kasus abortus imminens.

Referensi 4: menurut penelitian (Sri, 2019), Magnesium menurunkan frekuensi depolarisasi otot polos, berkompetisi dengan kalsium untuk masuk dalam sel channel kalsium sehingga akan terjadi relaksasi. $MgSO_4$ secara parenteral dengan dosis awal 4-6 gram iv dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus. Bila terjadi efek toksik berikan kalsium glukonas 1 gram secara IV perlahan-lahan. Persamaannya yaitu peneliti menjelaskan dosis obat. Perbedaannya peneliti ini lebih menjelaskan mengenai $MgSO_4$ dan dosis yang diberikan.

Referensi 5: Penelitian (Desti et.al., 2019) Intervensi yang dilakukan yaitu mengkaji sumber dan sifat nyeri dengan menanyakan pada klien bagaimana yang dirasakan nyeri, kapan waktunya, nyeri yang dirasakan seperti apa. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital. Persamaannya yaitu nyeri disebabkan oleh kontraksi rahim, padahal belum terjadi pelebaran leher rahim.

Referensi 6: Penelitian (Dharma, 2015), pada kasus ini pada saat pasien datang ke rumah sakit keadaan umum stabil, dan tidak didapatkan tanda-tanda syok. Oleh karena pada pemeriksaan fisik tidak teraba massa jaringan dan perdarahan berhenti setelah dilakukan observasi selanjutnya diberikan medikamentosa berupa tokolitik dan vitamin dan sangat penting juga selama kehamilan untuk monitoring vital sign untuk mengetahui dan menghindari komplikasi yang terjadi. Keadaan pasien stabil dan diberikan pengobatan Isoxsuprine dan allylesterenol untuk mempertahankan kondisi Tidak disebutkan metode penelitian uterus yang mana berperan dalam menjaga kandungan dan asam

mefenamat untuk analgetik. Persamaannya petugas kesehatan melakukan pemantauan kondisi pasien. Perbedaannya yaitu penting monitoring vital sign untuk mengetahui dan menghindari komplikasi yang terjadi pada kehamilan.

Referensi 7: Penelitian (Nurhikma et.al., 2017) Hasil penelitian ini adalah dari 32 pasien yang mendapat terapi MgSO₄ , 2 orang yang berhasil menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada pemberian terapi ke 2 tanpa kontraksi, 21 pasien yang berhasil menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam pada pemberian terapi ke 3 tanpa kontraksi, 6 pasien yang berhasil menunda persalinan dengan penurunan kontraksi tersisa 1x10 menit (15-20 detik) dan 5 pasien yang berhasil menunda persalinan dengan penurunan kontraksi tersisa 1x10 menit (10-15 detik) masing-masing pada pemberian terapi ke 3, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa, efektivitas MgSO₄ dalam menunda persalinan prematur dalam waktu 2x24 jam adalah sebesar 71,87%. Persamaannya masih kurangnya tingkat pendidikan dan kurangnya informasi yang menyebabkan masih banyak ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemeriksaan kehamilan menyebabkan tidak terdeteksinya faktor risiko tinggi yang mungkin dialami mereka.

Referensi 8: Penelitian (Risanto et.al., 2015), menyatakan dari hasil penelitian kejadian abortus pada kelompok progesteron vaginal adalah 23,3% dibanding, 37,9% pada kelompok *allylestrenol* oral (RR=0,61; 95% CI 0,27-1,36). Lama bertahan pada kelompok progesteron vaginal rata-rata 16,57 hari dibanding rata-rata 9,82 hari pada kelompok *allylestrenol* oral (beda rata-rata 6,75 hari; 95% CI 2,30-11,20). Persamaannya adalah penggunaan keduanya sama-sama untuk mempertahankan kehamilan. Perbedaannya adalah efek samping berupa perasaan mual hanya dijumpai pada kelompok *allylestrenol*.

Referensi 9: Penelitian (Dini, 2009), Penanganan yang dilakukan pada abortus imminens yaitu dengan tidur berbaring merupakan unsur penting dalam pengobatan, karena menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik, dan pemeriksaan USG dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup. Persamaannya tidur berbaring karena menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsangan mekanik dan pemeriksaa USG. Perbedaannya peneliti ini hanya menyebutkan beberapa penanganan abortus imminens.

Referensi 10: Penelitian (Calvin, 2019), menyatakan penanganan abortus imminens bisa dengan istirahat baring karena menyebabkan peningkatan aliran darah ke uterus, dan pemberian fenobarbital 3x30 mg untuk menenangkan penderita. Persamaannya yaitu dianjurkan istirahat baring pemberian fenobarbital 3x30 mg.

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan penaganan lebih baiknya kita melakukan pendekatan dengan klien dan keluarga, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, memberikan informasi kepada klien mengenai tindakan apa yang akan kita lakukan dan memberi tahukan jenis obat dan dosis nya sehingga klien dapat memilih metode yang mereka sukai. Selain itu mengkaji sumber dan sifat nyeri kemudian melakukan observasi keadaan umum dan tanda-tanda vital, menjelaskan tentang penyebab nyeri yang dialami klien disebabkan oleh kontraksi rahim, padahal belum terjadi pelebaran leher rahim.

Selain itu banyak juga penelitian yang melakukan intervensi dengan kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi. Setelah penanganan melakukan observasi TTV, KU, perdarahan, KIE.

6. Langkah VI: Implementasi

Referensi 1: Penelitian (Sri, 2019) $MgSO_4$ 4-6 gram IV dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus. Ini adalah dosis yang dipilih untuk penelitian ini, karena

dosis ini telah terbukti dapat ditoleransi dengan baik untuk memperpanjang fase laten persalinan prematur antara 24-48 jam. Persamaannya $MgSO_4$ 4-6 gram IV dalam 20 menit, diikuti 1-4 gram perjam tergantung produksi urine dan kontraksi uterus adalah salah satu dosis yang digunakan dalam penatalaksanaan abortus. Perbedaannya pada penelitian ini adalah tidak adanya penjelasan tata cara pemberian $MgSO_4$.

Referensi 2: Penelitian (Didien & Suprpti, 2016) Tidak perlu pengobatan khusus atau tirah baring total, jangan melakukan aktivitas fisik berlebihan atau hubungan seksual, perdarahan berhenti, lakukan asuhan antenatal seperti biasa. Lakukan penilaian jika perdarahan terjadi lagi, perdarahan terus berlangsung: nilai kondisi janin (uji kehamilan/USG). Lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain. Perdarahan berlanjut, khususnya jika ditemui uterus yang lebih besar dari yang diharapkan, mungkin menunjukkan kehamilan ganda atau mola, tidak perlu terapi hormonal (estrogen dan progesterin) atau tokolitik (seperti salbutamol atau indometasis) karena obat-obat ini tidak dapat mencegah abortus. Persamaannya masih banyaknya kurang kesadaran ibu dalam melakukan pemeriksaan USG. Perbedaannya dalam penelitian ini banyak tindakan dalam penanganan abortus imminens tidak dianjurkan atau dilakukan.

Referensi 3: Penelitian (Sucipto, 2013) dari hasil penelitian dilakukan penanganan dengan menggunakan tirah baring dapat mencegah terjadinya abortus imminens. Persamaannya dengan penanganan tirah baring dapat menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanik. Perbedaannya pada penelitian *randommised controlled trial (RCT)* tentang efek tirah baring pada abortus imminens menyebutkan bahwa 61 wanita hamil yang mengalami perdarahan pada usia kehamilan kurang dari delapan minggu yang viabel.

- Referensi 4: Penelitian (Desyanti, 2017) Istirahat baring, pemberian sedativa misalnya fenobarbital 3x30 mg/hari papaverin 3x40 mg/hari, observasi perdarahan, jika perdarahan berhenti/ menetap nilai viabilitas janin dengan tes urin atau USG, jika reaksi kehamilan dua berturut-turut negative maka sebaiknya uterus dikosongkan (kuret). Persamaannya dalam penelitian ini masih dijelaskan untuk tirah baring dan pemberian terapi obat dalam penanganan abortus imminens. Perbedaannya jika dilakukan pemeriksaan test urin dua kali berturut-turut negatif maka akan dilakukan kuret.
- Referensi 5: Penelitian (Fitriyani, 2005) Posisi pasien berbaring agar aliran darah ke uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, periksa denyut nadi dan suhu badan dua kali sehari bila pasien tidak panas dan tiap empat jam bila pasien panas, tes kehamilan, jika hasil negatif berarti janin sudah mati. Pemeriksaan USG untuk menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat penenang, biasanya fenobarbital 3x30 mg, diet tinggi protein dan tambahan vitamin C. Bersihkan vulva minimal dua kali sehari dengan cairan antiseptik untuk mencegah infeksi terutama saat masih mengeluarkan cairan coklat. Persamaannya adalah pentingnya pemantauan keadaan umum pasien seperti tanda-tanda vital selama perawatan. Perbedaannya penelitian ini tidak menjelaskan mengenai perkembangan pasien.
- Referensi 6: Penelitian (Ratna dkk, 2018) Istirahat baring agar aliran darah ke uterus bertambah dan rangsang mekanik berkurang, progesteron 10 mg sehari untuk terapi substansi dan untuk mengurangi kerentanan otot-otot rahim, tes kehamilan dapat dilakukan. Bila hasil negatif, mungkin janin sudah mati, pemeriksaan USG untuk menentukan apakah janin masih hidup, berikan obat penenang, biasanya fenobarbita 3x30 mg, dan pasien tidak boleh berhubungan seksual dulu sampai lebih kurang 2 minggu.

Persamaannya adalah peneliti mampu menjelaskan penanganan abortus imminens.

Referensi 7: Penelitian (Lidia dkk, 2019) Apabila ada tanda dan gejala klinis yang menunjukkan ibu mengalami abortus imminens, maka kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus. Adapun penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan ibu, berikan obat spasmolitik untuk meredakan kontraksi (nyeri) perut yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama ± 2 minggu atau selama trimester pertama kehamilan. Persamaannya adalah penanganan yang dapat dilakukan yaitu tirah baring karena peneliti menyebutkan kehamilan ibu dapat dipertahankan.

Referensi 8: Penelitian (Sulaiman dkk, 2005) Bila kehamilan utuh, ada tanda kehidupan janin, yaitu: *best red* selama 3x24 jam dan pemberian preparat progesteron bila ada indikasi (bila kadar $< 5-10$ nanogram), dan bila hasil USG meragukan, ulangi pemeriksaan USG 1-2 minggu, kemudian bila hasil USG tidak baik, evakuasi. Persamaannya pentingnya evakuasi untuk mengetahui kondisi perkembangan pasien.

Referensi 9: Penelitian (Dini, 2004) menyatakan bahwa penanganan abortus imminens yaitu dengan pemeriksaan USG untuk menentukan janin masih hidup atau tidak. Jika masih ada harapan, janin dapat dipertahankan. Biasanya, ibu diminta untuk beristirahat, yaitu dengan tidur berbaring. Cara ini dapat menambah aliran darah ke rahim dan berkurangnya rangsang mekanik. Seminggu kemudian, lakukan pemeriksaan untuk melihat kondisi janin. Jika kondisinya semakin baik, berikan obat-obatan pada ibu untuk

mempertahankan janinnya. Misalnya, dengan pemberian hormon progesteron jika penyebabnya karena kekurangan hormon progesteron. Namun, jika karena faktor lain, pemberian hormon ini tidak banyak manfaatnya. Persamaannya yaitu pentingnya pemeriksaan USG karena untuk menentukan janin masih hidup atau tidak. Perbedaannya peneliti menjelaskan juga kekurangan pada pemberian hormon progesteron.

Referensi 10: Penelitian (Febriyani dkk, 2021) Penanganan abortus imminens yaitu istirahat baring. Tidur berbaring merupakan unsur penting dalam pengobatan, karena cara ini menyebabkan bertambahnya aliran darah ke uterus dan berkurangnya rangsang mekanik, anjurkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik secara berlebihan atau melakukan hubungan seksual, tenang pemberian hormon progesteron pada abortus imminens belum ada persesuaian faham, pemeriksaan ultrasonografi penting dilakukan untuk menentukan apakah janin masih hidup, macam dan lamanya perdarahan menentukan pronosis kelangsungan kehamilan, bila perdarahan: berhenti: melakukan asuhan antenatal terjadwal dan penilaian ulang bila terjadi perdarahan terus berlangsung: nilai kondisi janin. lakukan konfirmasi kemungkinan adanya penyebab lain pada fasilitas terbatas, pemantauan hanya dilakukan melalui gejala klinik dan hasil pemeriksaan ginekologik. Persamaannya adalah pemeriksaan antenatal sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan ibu dan bayi. Perbedaannya pemantauan hanya dilakukan melalui gejala klinik dan hasil pemeriksaan ginekologik.

Dari beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penanganan abortus imminens maka dianjurkan untuk tirah baring, pemberian terapi obat, pemeriksaan USG, tidak melakukan hubungan seksual selama ± 2 minggu atau selama trimester pertama kehamilan. Selain itu implementasi yang diberikan yaitu melakukan asuhan kebidanan pada ibu

yaitu dengan pendekatan pada klien dan keluarga, cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan, kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian terapi, observasi TTV, KU, perdarahan, KIE.

7. Langkah VII: Evaluasi

Referensi 1: Penelitian (Irfi, 2013) Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan tirah baring setiap 30 menit selama 2 jam. Lakukan pemeriksaan USG untuk menilai kondisi janin. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan pemberian injeksi amoxicillin 1 gr/IV setiap 8 jam dan injeksi kalnex 1 ampul/IV setiap 12 jam selama 24 jam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah pemantauan pemberian injeksi. Perbedaannya peneliti menyertakan waktu penanganan.

Referensi 2: Penelitian (Sukyati & Sholiha, 2019) Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, hemoglobin, nyeri akut berhubungan dengan kontraksi uterus, intoleransi aktivitas berhubungan dengan tirah baring dan produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam. Periksa kadar hemoglobin setelah 24 jam. Bila hasil pemantauan baik dan kadar Hb >8 gr/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah perdarahan pervaginam dinilai untuk mengetahui tanda dan gejala.

Referensi 3: Penelitian (Sucipto, 2013) dari 230 wanita dengan abortus imminens yang direkomendasikan tirah baring menunjukkan bahwa 9,9% mengalami keguguran dan 23,3% baik-baik saja ($p=0,03$). Lamanya perdarahan vagina, ukuran hematoma dan usia kehamilan saat diagnosis tidak mempengaruhi tingkat terjadinya keguguran. Meskipun tidak ada bukti pasti bahwa istirahat dapat mempengaruhi jalannya kehamilan, membatasi aktivitas selama beberapa hari dapat membantu wanita merasa

lebih aman, sehingga memberikan pengaruh emosional. Dosisnya 24-48 jam diikuti dengan tidak melakukan aktivitas berat, namun tidak perlu membatasi aktivitas ringan sehari-hari. Persamaannya adalah peneliti mampu menjelaskan penanganan abortus imminens. Perbedaannya bahwa penanganan menggunakan tirah baring belum ada bukti pasti bahwa dapat mencegah terjadinya abortus imminens.

Referensi 4: Penelitian (Indah, 2019) Mengevaluasi tanda-tanda vital, kondisi pasien apa masih melakukan tirah baring, nyeri akut, dan perdarahan pervaginam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan pulang. Persamaannya adalah dalam penilaian keadaan ibu bertujuan untuk mengetahui masalah utama seperti nyeri dan perdarahannya teratasi dan tidak terjadi infeksi.

Referensi 5: Penelitian (Dharma, 2015) KIE merupakan hal yang sangat penting didalam kasus ini dimana yang harus dititik beratkan adalah tentang diagnosis penyakitnya, tindakan apa yang dilakukan penyakitnya tersebut, komplikasi apa yang dapat terjadi, rencana monitoring kehamilan yang (persiapan untuk faktor anatomi dan psikologis ibu), kontrol atau evaluasi terhadap tindakan (febris nyeri) dan yang tidak kalah pentingnya adalah mencari penyebab abortus (untuk persiapan kehamilan berikutnya), disamping itu juga terhadap faktor sosial dimana harapan masih bisa hamil lagi, prognosis abortus yang berulang atau tidak. Persamaannya adalah masih banyaknya ibu yang kurang mendapatkan informasi tentang faktor resiko kehamilan. Perbedaannya peneliti menjelaskan faktor sosial bahwa ibu berharap masih bisa hamil.

Referensi 6: Penelitian (Kusuma, 2016) cara menghindari abortus imminens yaitu disarankan pada ibu hamil lebih menjaga kesehatan, mengatur pola makan, menghindari stress, melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, melakukan bedrest, tidak

melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Persamaannya adalah pentingnya pemeriksaan ANC secara teratur untuk mengetahui dan menghindari faktor resiko kehamilan. Perbedaannya adalah penelitian menjelaskan akibat stress yaitu terjadinya akibat perubahan hormon pada ibu hamil tanpa sadar menyebabkan respon fisiologis, respon kognitif dan respon emosi.

Referensi 7: Penelitian (Nurhijrah et.al., 2019) menyatakan cara utama untuk mencegah terjadinya abortus yaitu dengan peningkatan minat mengetahui informasi tentang kesehatan pada kehamilan, penyuluhan tentang tanda bahaya kehamilan. Selain itu dapat diberikan pendidikan kesehatan pada ibu dengan umur yang beresiko (<20 dan >35 tahun) saat hamil. Persamaannya meningkatnya rasa ingin tahu ibu tentang kesehatan pada kehamilan. Perbedaannya yaitu masih banyaknya ibu yang tergolong dalam ibu hamil dengan umur yang beresiko.

Referensi 8: Penelitian (Erpiyana & Suratini, 2019) menyatakan penatalaksanaan abortus imminens yaitu apabila ada tanda dan gejala klinis yang menunjukkan ibu mengalami abortus imminens, maka kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus. Adapun penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan ibu, berikan obat spasmolitik untuk meredakan kontraksi (nyeri) perut yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama ± 2 minggu atau selama trimester pertama kehamilan. Persamaannya yaitu dalam penelitian terdapat beberapa penatalaksanaan abortus imminens.

Referensi 9: Penelitian (Lutan et.al., 2019) menyatakan cara mencegah terjadinya abortus imminens yaitu seorang perempuan hamil

harus menjaga asupan gizinya dengan makan makanan yang bergizi tinggi dengan diet seimbang dan selalu menjaga berat badan ibu sehingga terkontrol dan tidak mengalami tekanan darah tinggi. Seorang perempuan hamil juga sebaiknya tetap melakukan olahraga ringan yang sangat bermanfaat bagi ibu dan bayi seperti berenang dan berjalan kaki. Adapun saran-saran kepada ibu hamil dengan atau tanpa resiko tinggi sebaiknya memelihara kesehatan agar tidak sakit, melakukan kontrol hamil secara teratur baik itu kepada bidan maupun dokter kandungan dan pemeriksaan secara teratur setiap bulan dapat mencegah hal-hal yang membahayakan bagi ibu dan bayi. Bagi petugas kesehatan khususnya bidan diharapkan agar lebih meningkatkan ilmu dan keterampilan agar dapat mendeteksi sedini mungkin terjadinya abortus imminens sehingga komplikasi dapat diatasi dengan baik dan dapat memberikan penyuluhan atau konseling kepada ibu hamil mengenai abortus imminens. Persamaannya yaitu keutamaan makan makanan bergizi tinggi dengan diet seimbang dan selalu menjaga berat badan ibu sehingga terkontrol dan tidak mengalami tekanan darah tinggi. Perbedaannya kurangnya pengetahuan ibu mengenai asupan gizi yang cocok untuk kehamilan.

Referensi 10: Penelitian (Ani dkk, 2015) Tirah baring sedikitnya 2-3 hari (setidaknya dirawat inap), pantang senggama, setekah tirah baring 3 hari, evaluasi ulang diagnosis, bila masih abortus imminens tirah baring dilanjutkan, dan mobilisasi bertahap (duduk-berdiri-berjalan) dimulai apabila diyakini tidak ada perdarahan pervaginam 24 jam. Persamaannya pemantauan penanganan untuk mengetahui perkembangan pasien. Perbedaannya yaitu dianjurkan mobilisasi bertahap (duduk-berdiri-berjalan) apabila diyakini tidak ada perdarahan pervaginam 24 jam.

Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat kita simpulkan bahwa pentingnya kita melakukan evaluasi dengan memeriksa keadaan ibu utamanya kondisi emosional, tanda-tanda vital, melakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan menghubungi petugas laboratorium untuk pemeriksaan patologi laboratorium. Tidak lupa pula memantau perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, reproduksi urin setiap 6 jam selama 24 jam dan infeksi. Bila pemantauan kadar Hb >8 gr/dl, ibu dapat diperbolehkan pulang.

Selain evaluasi tanda-tanda vital dan perdarahan, kita juga evaluasi efek samping dari $MgSO_4$ yakni hilangnya refleks, mual, muntah, denyut jantung lambat, lemah, suhu tubuh rendah hingga di bawah 35^0 c, sakit perut atau diare, wajah merah dan terasa hangat, keringat berlebih. Setelah masalah kecemasan teratasi maka berikan pendidikan kesehatan mengenai cara menghindari terjadinya abortus imminens yaitu dengan pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) secara rutin untuk dapat melakukan deteksi dini dan pemantauan yang intensif bagi ibu hamil dengan resiko tinggi.

B. Implikasi Kebidanan

Abortus imminens adalah perdarahan pervaginam pada umur kehamilan <20 minggu sehingga menimbulkan perdarahan dan nyeri pada bagian perut. Adapun diagnosa yang bisa kita dapatkan dari abortus imminens yaitu terjadi perdarahan melalui ostium uteri eksternum, disertai mules sedikit atau tidak sama sekali, uterus membesar sebesar tuanya kehamilan, serviks belum membuka, tes kehamilan positif.

Adapun faktor resiko terjadinya abortus imminens yaitu, umur, paritas, interval kehamilan, riwayat abortus, anemia, penyakit ibu, infeksi, kelainan genitalis ibu, faktor janin, pengaruh paparan rokok, ketidakcocokan RH, inkompetensi serviks, kelelahan fisik dan hubungan seksual. Selain faktor resiko ada pula penyebab abortus yaitu usia ibu, paritas, riwayat abortus dan anemia defisiensi zat besi.

Komplikasi yang sering terjadi pada kasus abortus imminens yaitu perdarahan, perforasi, infeksi, syok, tetanus, dan kematian. Perdarahan dapat

terjadi pada setiap usia kehamilan. Kejadian perdarahan pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan abortus.

Sebagian besar abortus imminens akan memiliki masalah komplikasi seperti diatas jika tidak ditanganin segera, maka dari itu perlu dilakukan tindakan segera dan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn sesuai kondisi ibu. Kasus abortus imminens perlu dilakukan penilaian tanda-tanda emosional, jika terdapat tanda-tanda emosional maka mengatasi terlebih dahulu dengan pemberian cairan infus kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk mengatur pemberian terapi obat-obatan uterotonika dan antibiotika. Selain itu perlu kita berikan pendidikan kesehatan kepada ibu dengan melakukan kunjungan rutin untuk melakukan pemeriksaan kehamilan yang bertujuan mendeteksi dini kondisi janin dan mendapatkan informasi kesehatan terkait kesehatan ibu.

Asuhan pada kasus abortus imminens dengan melakukan cuci tangan sebelum tindakan kemudian menggunakan $MgSO_4$ dengan dosis sesuai anjuran dokter. Selain itu asuhan pada ibu pasca tindakan yaitu dengan melakukan pendekatan pada klien dan keluarga, cuci tangan dan sesudah tindakan, kolaborasi dengan tim dalam pemberian terapi, observasi TTV, KU, perdarahan, KIE.

Setelah melakukan asuhan pada kasus abortus imminens maka perlu dilakukan evaluasi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Hal-hal yang perlu dievaluasi adalah keadaan ibu utamanya kondisi tanda-tanda vital, perdarahan pervaginam, tanda akut abdomen, produksi urin setiap 6 jam selama 24 jam, infeksi dan kondisi emosional, melakukan pemeriksaan jaringan secara makroskopis dan menghubungi petugas laboratorium untuk pemeriksaan patologi laboratorium.

Selain evaluasi pasca tindakan perlu juga kita evaluasi efek samping dari $MgSO_4$ yakni hilangnya refleks, mual, muntah, denyut jantung lambat, lemah, suhu tubuh rendah hingga di bawah 35^0 c, sakit perut atau diare, wajah merah

dan terasa hangat, keringat berlebih. Setelah masalah kecemasan teratasi maka berikan pendidikan kesehatan mengenai cara menghindari terjadinya abortus imminens yaitu dengan pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*) secara rutin untuk dapat melakukan deteksi dini dan pemantauan yang intensif bagi ibu hamil dengan resiko tinggi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah I: Interpretasi Data Dasar

Abortus imminens adalah gangguan kehamilan yang kerap datang ketika usia kehamilan baru mencapai 20 minggu ditandai dengan bercak darah dan keadaan janin yang tetap hidup.

2. Langkah II: Identifikasi Diagnosa Masalah Aktual

Pengaruh usia terhadap kehamilan dapat menyebabkan resiko terjadinya abortus imminens, karena usia pada kehamilan <20 minggu dapat mengakibatkan efek yang buruk baik pada ibu maupun pada janin.

3. Langkah III: Identifikasi Diagnosa Masalah Potensial

Faktor resiko yang dapat menyebabkan kematian ibu yaitu terlalu muda melahirkan, terlalu sering melahirkan, terlalu rapat jarak melahirkan, wanita yang memiliki abortus mempunyai risiko tinggi terjadi abortus mengulang, premature dan bayi berat lahir rendah.

4. Langkah IV: Tindakan Segera dan Kolaborasi

Penanganan abortus imminens yaitu istirahat baring, tidur berbaring merupakan unsur yang dalam pengobatan, fenobarbital 3x30 mg sehari dapat diberikan untuk menenangkan pasien.

5. Langkah V: Intervensi atau Perencanaan

Menyarankan pada wanita untuk hamil pada usia subur (20-35 tahun) agar alat reproduksi berkembang dengan sempurna dan untuk menjrangkan kehamilan dengan jarak anak 2 tahun agar tidak terjadi abortus.

6. Langkah VI: Implementasi

Apabila ada tanda dan gejala klinis yang menunjukkan ibu mengalami abortus imminens, maka kehamilan ibu masih dapat dipertahankan dan ada harapan bahwa kehamilan masih berlangsung terus. Adapun penatalaksanaan yang dapat dilakukan adalah ibu dianjurkan untuk melakukan tirah baring sampai perdarahan pervaginam berhenti dan nyeri perut telah hilang, berikan obat-obatan hormonal yang mengandung progesteron untuk menguatkan kandungan ibu, berikan obat spasmolitik untuk meredakan kontraksi (nyeri) perut yang dialami ibu, dan ibu dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual selama ± 2 minggu atau selama trimester pertama kehamilan.

7. Langkah VII: Evaluasi

Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan tirah baring setiap 30 menit selama 2 jam. Lakukan pemeriksaan USG untuk menilai kondisi janin. Lakukan evaluasi tanda vital, perdarahan pervaginam, dan pemberian injeksi amoxicillin 1 gr/IV setiap 8 jam dan injeksi kalnex 1 ampul/IV setiap 12 jam selama 24 jam. Bila hasil pemantauan baik ibu dapat diperbolehkan pulang.

B. Saran

1. Bagi tenaga kesehatan
 - a. Abortus imminens seringkali berakhir dengan komplikasi-komplikasi hingga kematian. Sebagai tenaga kesehatan, senantiasa kita dituntut untuk tetap berusaha menyelamatkan ibu dengan melakukan tindakan asuhan secara profesional tanpa adanya rasa ragu agar sesuatu yakni kita kerjakan diberkahi oleh Allah SWT.
 - b. Tenaga kesehatan khususnya bidan, sebaiknya lebih dikembangkan lagi mengenai pengetahuan maupun

keterampilan yang dimiliki sehingga dalam memberikan asuhan untuk penuruna AKI dan AKB lebih optimal.

2. Bagi pembaca

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya dalam memberikan asuhan sesuai *Evidence Based*.



DAFTAR PUSTAKA

- A, N., Wahyudin, E., & AM, N. (2017). Efektivitas Penggunaan MgSO₄ Sebagai Tokolitik Pada Ancaman Persalinan Prematur Di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo. *Majalah Farmasi Dan Farmakologi*, 21(3), 70–74. <https://doi.org/10.20956/mff.v21i3.6858>
- Achadiat, C. M. (2004). *Prosedur Tetap Obstetri dan Ginekologi*. EGC.
- Aditama, P. L., & Mudlikah, S., (2019). *Obstetri dan Ginekologi*. Guepedia.
- Agustina, K., Jenderal, S., & Yani, A. (2015). *T s u* .
- al-Maragi, Ahmad Mustafa. (1994). *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. PT Karya Toha Putra.
- Amalia, L. M., & Sayono. (2015). Risk Factors Incident Abortion (Studies in Islamic Hospital Sultan Agung Semarang). *J. Kesehat. Masy. Indones.*, 10(1), 23–29.
- Anemia, D., Di, S., & Marga, R. B. (2012). *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Nifas Ny. A P I A O Dengan Anemia Sedang Di RB Marga Waluya Surakarta Karya Tulis Ilmiah*.
- Ansar, C. I. (2020). *Perpaduan Pengetahuan Dalam Pencegahan Abortus Imminens Pada Ibu Hamil Suku Bugis-Makassar Di Kota Makassar*. Retrieved from <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1696/>
- Aurelius. (2019). *Sistem Respirasi, Yogyakarta Tahun 2019*.
- Bardos, J., Hercz, D., Friedenthal, J., Missmer, S. A., & Williams, Z. (2015). A national survey on public perceptions of miscarriage. *Obstetrics and Gynecology*, 125(6), 1313–1320. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000859>
- Barozha, D. L., & Apriliana, E. (2016). Hiperemesis Gravidarum dan Abortus Iminens pada Kehamilan Trimester Pertama. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 5(2), 18–21.
- Darmawamsyih. (2014). *Penyakit Kronik Dalam Kehamilan*. Alauddin University Press.
- Ester, N. J. (2019). *Epidemiologi Kesehatan Reproduksi*. Deepublish.
- Febriyeni, dkk. (2021). *Asuhan Kebidanan Kehamilan Komprehensif*. Yayasan Kita Menulis.
- Fitriani, S., Pamungkasari, E. P., & Anon, S. (2020). Correlation between Protein Intake, Parity and Miscarriage History Anemic Pregnant Women in Sukoharjo Regency, Indonesia with Low Birth Weight Incidence:A Case Control Study. *Indian Journal of Public Health Research & Development*,

11(1), 1550. <https://doi.org/10.37506/v11/i1/2020/ijphrd/194066>

- Hamidah, & Masitoh, S. (2013). Faktor dominan yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens. *Jurnal Ilmu & Teknologi Ilmu Kesehatan*, 1(1), 29–33.
- Handayani, E. Y. (2015). Hubungan Umur dan Paritas Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Kabupaten Rokan Hulu. *Kadir, A. Hukum Bisnis Syari'ah Dalam Al-Qur'an, Amzah, Jakarta, 2013 Rozalinda, Ekonomi Islam., 2016, h. 1., 1(6), 249–253.*
- Haswari, D., Fatmawati, I., & Anjasari, W. (2019). *Asuhan Kebidanan Pada Ny. "N" Giip1001 a0 Dengan Abortus Imminens Ruang Poli Kandungan Rsud Sumbawa Besar. I(September), 1–13.*
- Iminens, A., Rsud, D. I., & Kulon, W. (2011). *I yo ta.*
- Irayani, F. (2015). Analisis hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian abortus di RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Kesehatan*, VI(2), 190–200.
- Junistiani, H. H. (2017). *Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat akhir pendidikan Diploma 3 Kebidanan Disusun Oleh:*
- Kasdu, D. (2005). *Problem Persalinan.* Puspa Swara.
- Kejadian, G., Imminens, A., Paritas, B., Rsud, D. I., Tahun, W., Tulis, K., ... Yani, A. (2015). *T s u .*
- Kusuma, A., M.Taufik, & Budiastutik, I. (2016). Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejadian abortus imminens pada ibu hamil di sukadana kabupaten kayong utara. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 1(2), 41–49.
- Larivière-Bastien, D., deMontigny, F., & Verdon, C. (2019). Women's Experiences of Miscarriage in the Emergency Department. *Journal of Emergency Nursing*, 45(6), 670–676. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2019.06.008>
- Matematika, F., Ilmu, D. A. N., & Alam, P. (2005). *Diajukan untuk memerlukan salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi (S . F) Program Studi Farmasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Farida Hayati . M . Sir ^ Pt.*
- Nadyah. (2013). *Kegawatdaruratan Neonatal, Anak dan Maternal.* Alauddin University Press.
- Pecah, K., Di, D., & Pku, R. S. U. (2017). *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kpd Di Rsu Pku Muhammadiyah Bantul Tahun 2016.*
- Pratiwi, D. (2019). Karakteristik Ibu Hamil Dengan Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Mitra Medikamedan Tahun 2017. *Gaster*, 17(1), 1. <https://doi.org/10.30787/gaster.v17i1.329>

- Prihandini, S. R., Pujiastuti, W., & Hastuti, T. P. (2016). Usia Reproduksi Tidak Sehat Dan Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Meningkatkan Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Tentara Dokter Soedjono Magelang. *Jurnal Kebidanan*, 5(10), 47–57.
- Purwaningrum, E. D., & Fibriana, A. I. (2017). Faktor Risiko Kejadian Abortus Spontan. *Public Health Research and Development*, 1(3), 84–94. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>
- Raden, N. J. (2009). *Hubungan Antara Kejadian Abortus dengan Usia Ibu Hamil di RSUD dr. Moewardi Surakarta pada Tahun 2008*. 1–55. Retrieved from <https://eprints.uns.ac.id/10463/1/81432207200905051.pdf>
- Rangkuti, L. F., Sanusi, S. R., & Lutan, D. (2019). Penyakit Ibu Terhadap Kejadian Abortus Imminens Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padangsidempuan. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i1.1793>
- Rejeki, I. S., Kassi, P. B., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Sari, G. (2019). *Faktor yang berhubungan dengan kejadian abortus imminens di rsud labuang baji kota makassar*. XI(2).
- Rochani, S., Sarjana, P., Masyarakat, K., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Maju, I. (2013). *Jurnal Hubungan Pengetahuan , Riwayat Penyakit Terhadap Pencegahan Abortus Imminens Di Rumah Sakit Pusdikkes Jakarta Tahun 2013*. 0–11.
- Sanjaya Dharma, K. (2015). Laporan Kasus Abortus Iminens Juni 2015 Faktor Resiko, Patogenesis, Dan Penatalaksanaan. *Intisari Sains Medis*, 3(1), 44. <https://doi.org/10.1b562/ism.v3i1.65>
- Sartika, D. (2015). *Gambaran Kejadian Abortus di RSUD Wonosari Tahun 2012-2013*.
- Sastrawinata, S., dkk. (2003). *Ilmu Kesehatan Reproduksi: Obstetri Patologi*. EGC.
- setiawati, D. (2013). *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Alauddin University Press.
- Sholihah, L. M. (2018). Gambaran Karakteristik Kejadian Abortus Di Rumah Sakit Umum Umi Barokah Boyolali. *Keperawatan*, 12(2).
- Soliha, N., & Sukyati, I. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Ibu Dengan Abortus Imminens. *Buletin Kesehatan: Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan*, 3(2), 182–196.
- Sucipto, N. I. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 4(80), 4.
- Sunarti, S., Winarni, S., & W., A. (2016). Gambaran Sikap Ibu Hamil dalam Mencegah Keguguran. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and*

- Midwifery*), 3(1), 089–094. <https://doi.org/10.26699/jnk.v3i1.art.p089-094>
- Triana, A, dkk. (2015). *Buku Ajar Kebidanan Kegawatdarruratan Maternal dan Neonatal: Penuntun Belajar*. Deepublish.
- Wahyuni, S., Ngadiyono, & Sumarni, S. (2017). Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Abortus Di RSUD Ungaran Jawa Tengah Sri Wahyuni 1) Ngadiyono 2) Sri Sumarni 3). *Jurnal Kebidanan*, 6(13), 1–11.
- Wardana, A. R. T., & Sugiarsi, S. (2017). Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Resume Medis Pada Kasus Abortus Imminens. *Jurnal Rekam Medis*, XI(2), 1–7. Retrieved from <https://www.ejurnal.stikesmhk.ac.id/index.php/rm/article/view/717>
- Wardiyah, A. (2017). Hubungan Anemia Dengan Kejadian Abortus Di Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. *Jurnal Keperawatan*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.22219/jk.v7i1.3236>
- Widianti, L. (2017). Hubungan Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil dengan Kejadian Abortus di Ruang Kasuari Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. *Jurnal Kesehatan*, 8(1), 36. <https://doi.org/10.26630/jk.v8i1.393>
- Wulan Citra Sari. (2020). 1035325 Hubungan antara Umur dan Paritas dengan Kejadian Abortus Imminens di RS.AR Bunda Kota Prabumulih Tahun 2019. *Jurnal Kebidanan : Jurnal Medical Science Ilmu Kesehatan Akademi Kebidanan Budi Mulia Palembang*, 10(1), 60–65. <https://doi.org/10.35325/kebidanan.v10i1.225>
- Wurnayingsih, S. (2019). *Profil Persepan Tokolitik Pada Pasien Abortus Imminens dan Persalinan Prematur di Klinik Obsgyn RS Muhammadiyah Lamongan*. 53(9), 1689–1699.
- Yasa, I. P. E. K., Aman, I. G. M., & Satriyasa, B. K. (2019). Tingkat Keberhasilan Nifedipin Sebagai Tokolitik Pada Pasien Partus Prematurus Imminens Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *E-Jurnal Medika Udayana*, 8(5), 1–11.
- Yenie, H. (2015). Perbedaan Efektivitas Pemberian MgSO₄ Drip dengan Duvadilan Drip terhadap Penanganan Perdarahan pada Kasus Abortus Imminens. *Jurnal Keperawatan*, XI(2), 324–328.