

**PERBANDINGAN JUMLAH TROMBOSIT TOTAL DAN INDEKS
TROMBOSIT PADA PREEKLAMPSIA RINGAN DAN BERAT DI RSUD
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NUR SYAHRUL RAMADHAN NR

NIM: 70600118014

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syahrul Ramadhan NR
NIM : 70600118014
Tempat/Tgl Lahir : Madatte, 3 Januari 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Manding
Judul : Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Agustus 2022

Penyusun


Nur Syahrul Ramadhan NR
NIM: 70600118014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Nur Syahrul Ramadhan NR, NIM: 70600118014, mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat di RSUD Kabupaten Polewali", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Makassar, 13 Agustus 2022

Pembimbing 1



dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK

Pembimbing 2



dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat di RSUD Kabupaten Polewali", yang disusun oleh Nur Syahrul Ramadhan NR, NIM 70600118014, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari sabtu, 13 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.


Makassar, 13 Agustus 2022
15 Muharam 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp. A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Dr. dr. Rosdianah, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Sitti Musafirah, Sp.KK, FINSDV	(.....)
Penguji II	: Dr. Darsul S. Puyu, M. Ag	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat di RSUD Kabupaten Polewali”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.
2. Kedua orang tua penulis yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
5. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto Sp.JP., M. Kes. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan

ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.

6. dr. Henny Fauziah, M.Kes., Sp.PK. selaku pembimbing I dan dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan pemberian informasi yang lebih aktual.
7. Dr. dr. Sitti Musafirah, Sp.KK, FINS DV dan M.Kes dan Dr. Darsul S. Puyu, M.Ag selaku penguji kompetensi dan penguji integrasi yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk perbaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
9. Teman-teman *F18BRON3KTIN*, *Nopal Tamvan*, dan senior-senior yang telah memberikan *support* dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan atas keterbatasan yang dimiliki penulis, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan agar dapat menjadi suatu tulisan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah swt, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 13 Agustus 2022



Nur Syahrul Ramadhan NR

NIM: 70600118014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR SKEMA	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis.....	4
D. Definisi Operasional.....	5
E. Ruang Lingkup.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II	16
A. Preeklamsia	16
B. Trombosit	24

C. Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit	30
D. Integrasi Keislaman.....	32
E. Kerangka Teori	43
F. Kerangka Konsep	44
BAB III.....	45
A. Desain Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Pengambilan Sampel	46
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Instrumen Penelitian	47
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	47
H. Alur Penelitian	48
I. Etika Penelitian.....	49
BAB IV	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	55
C. Keterbatasan Penelitian	64
BAB V.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 2.1 Faktor Risiko Preeklamsia	17
Tabel 4.1 Distribusi Pasien Preeklamsia ringan Dan Preeklamsia berat	50
Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Usia.....	51
Tabel 4.3 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Pekerjaan	51
Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Pendidikan	52
Tabel 4.5 Distribusi Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Pasien Preeklamsia	53
Tabel 4.6 Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit pada Preeklamsia ringan dan Preeklamsia berat.....	54
Tabel 4.7 Nilai Mean/Mean Rank Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Patogenesis Preeklamsia	188
Gambar 2. 2 Diagram of anchoring villi (AV) at the maternal-fetal interface in normal and preeclamptic pregnancy.....	20
Gambar 2. 3 Plasentasi Abnormal Pada Preeklamsia	211
Gambar 2. 4 Sebuah megakariosit yang sedang membentuk trombosit	25
Gambar 2. 5 Diferensiasi sel induk mieloid dan limfoid menjadi bentuk matangnya serta distribusinya dalam darah dan jaringan ikat.	26
Gambar 2. 6 Pembentukan Sumbat Trombosit	29



DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Kerangka Teori	43
Skema 2.2 Kerangka Konsep	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil analisis SPSS.....	72
Lampiran 2 Berkas Administrasi.....	84
Lampiran 3 Dokumentasi	88



**PERBANDINGAN JUMLAH TROMBOSIT TOTAL DAN INDEKS
TROMBOSIT PADA PREEKLAMPSIA RINGAN DAN PREEKLAMPSIA
BERAT DI RSUD KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**Nur Syahrul Ramadhan NR¹, Henny Fauziah², Jelita Inayah Sari³, Sitti Musafirah⁴,
Darsul S. Puyu⁵**

^{1,2,3,4,5} Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia
Email : ¹syahrulramadhan855@gmail.com

ABSTRAK

Preeklamsia adalah salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu di seluruh dunia. Preeklamsia berdasarkan derajat keparahannya diklasifikasikan menjadi preeklamsia ringan (PE) dan preeklamsia berat (PEB). Parameter trombosit seperti jumlah trombosit total (PLT) dan indeks trombosit meliputi *Platelet Distribution Width* (PDW), *Mean Platelet Volume* (MPV), *Platelet Large Cell Ratio* (PLCR) diyakini dapat menjadi penanda derajat keparahan preeklamsia walaupun hal ini masih diperdebatkan. Tujuan penelitian ini adalah membandingkan jumlah trombosit total dan indeks trombosit pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analitik komparatif, dengan pendekatan *cross sectional* dengan jumlah sampel 201 yang terdiri dari 86 PE dan 115 sampel PEB yang dikumpulkan secara purposive. Hasil uji statistik menggunakan uji t tidak berpasangan dan Mann-Whitney diperoleh perbandingan PE dan PEB untuk nilai PLT ($p = 0,913$), PDW ($p = 0,088$), MPV ($p = 0,181$), dan PLCR ($p = 0,104$). Kesimpulan penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai PLT, PDW, MPV, PLCR pada preeklamsia tanpa gejala berat dan preeklamsia disertai gejala berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

Kata kunci: *Trombosit, Indeks Trombosit, Preeklamsia*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**THE COMPARISON OF THE TOTAL THROMBOCYTE COUNT AND
THROMBOCYTE INDEX IN MILD PREECLAMPSIA AND SEVERE PREECLAMPSIA
AT RSUD POLEWALI OF MANDAR**

*Nur Syahrul Ramadhan NR¹, Henry Fauziah², Jelita Inayah Sari³, Siti Musafrah⁴, Darsul S.
Puryu⁵*

^{1,2,3,4,5} Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences,
Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia
Email: ¹syahrulramadhan855@gmail.com

Preeclampsia is one of the leading causes of maternal morbidity and mortality worldwide. Preeclampsia based on its severity level is classified into mild preeclampsia (PE) and severe preeclampsia (PEB). Platelet parameters such as total platelet count (PLT) and platelet index including Platelet Distribution Width (PDW), Mean Platelet Volume (MPV), and Platelet Large Cell Ratio (PLCR) are believed to be the indications of the severity of preeclampsia. The major purpose of this study was to investigate and compare the total platelet count and platelet index in mild preeclampsia and severe preeclampsia in the general hospital of Polewali Mandar. The methodological approach used in this study was comparative analytical study by using a cross sectional approach. There were 201 samples purposively selected in this study consisting of 86 PE and 115 PEB samples. The results of statistical tests using unpaired t test and Mann-Whitney were obtained showing that the comparative ratios were PE and PEB for the value of PLT ($p = 0.913$), PDW ($p = 0.088$), MPV ($p = 0.181$), and PLCR ($p = 0.104$). This study indicated that there was no significant difference in the values of PLT, PDW, MPV, PLCR in preeclampsia with mild symptoms and preeclampsia with severe symptoms at the general hospital of Polewali Mandar.

Key words: *Thrombocyte, Thrombocyte Index, Preeclampsia*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyakit hipertensi yang terjadi pada kehamilan adalah preeklamsia. Preeklamsia adalah gangguan progresif multisistem pada ibu hamil ditandai dengan gejala yang kompleks termasuk adanya hipertensi/peningkatan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, proteinuria dengan atau tanpa edema patologis. Preeklamsia biasanya terjadi setelah minggu ke-20 kehamilan. Preeklamsia diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahan yakni preeklamsia ringan dan preeklamsia berat (Delmis and Ivanisevoc, 2019).

Berdasarkan data global, preeklamsia adalah salah satu penyebab utama kematian ibu. Preeklamsia menyebabkan lebih dari 50.000 kematian ibu setiap tahun di seluruh dunia serta lebih dari 500.000 kematian janin di seluruh dunia (Karrar and Hong, 2021). *World Health Organization* (WHO) memperkirakan kejadian kasus preeklamsia dengan komplikasi pada negara berkembang tujuh kali lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju (Muhammad, 2021).

Data Preeklamsia di Indonesia sendiri belum ada data yang menyebutkan secara spesifik. Namun tercatat bahwa angka kematian ibu (AKI) paling banyak setelah perdarahan disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan yakni 1066 kasus pada tahun 2019. Angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar 1110 kematian (KEMENKES RI, 2020). Berdasarkan data pada tahun 2011 insiden preeklamsia dengan komplikasi di Indonesia ialah sebesar 128.273 kejadian, yakni sekitar 5,3% dari seluruh populasi ibu bersalin di Indonesia (POGI, 2016). Kemudian sebuah penelitian dilakukan di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa dari 4242 subjek ibu bersalin terdapat 613 pasien dengan komplikasi preeklamsia (Sumampouw, Tendean and Wagey, 2019).

Berdasarkan data pada rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar pasien ibu hamil yang mengalami preeklamsia dan

eklamsia tercatat ada 644 pasien dari tahun 2020 sampai Mei 2022. Dari 644 pasien ibu hamil tersebut, pasien yang mengalami preeklamsia sebanyak 644 (Data Rekam Medis RSUD Kabupaten Polewali Mandar, 2022).

Preeklamsia merupakan salah satu penyulit selama kehamilan yang dapat membuat keadaan ibu hamil menjadi sangat lemah. Keadaan yang lemah ini disebutkan dalam QS. Al-Luqman/31:14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahannya:

“Dan telah Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, dan hanya kepada Ku-lah kembalimu”.

Kemudian kata (وَهْنٌ) *wahnan* dalam ayat ini berarti kelemahan atau kerapuhan. Kata yang digunakan ayat ini mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya.

Diketahui bahwa salah satu teori mengenai patogenesis yang mendasari terjadinya preeklamsia disebabkan oleh kerusakan pada lapisan endotel pembuluh darah maternal. Kerusakan ini akan memicu aktivasi trombosit untuk melakukan mekanisme perbaikan dari pembuluh darah yang rusak. Hal ini bisa dilihat dari kadar trombosit pada pasien preeklamsia yang umumnya memiliki kadar trombosit rendah/trombositopenia (Kee-Hak Lim, 2021).

Dalam keadaan istirahat, struktur trombosit memiliki bentuk yang normal. Namun pada aktivasi trombosit akan menyebabkan perubahan morfologi/bentuk (Downing and Klement, 2012). Perubahan tersebut masih diteliti hingga kini

sebagai *biomarker* dalam mendeteksi berbagai penyakit tromboemboli (Vagdatli *et al.*, 2010).

Terdapat suatu parameter yang dapat memberikan evaluasi sel-sel trombosit secara rinci dalam sirkulasi. Parameter tersebut adalah indeks trombosit (Hubert *et al.*, 2015). Indeks trombosit adalah *biomarker* aktivasi trombosit yang terkait dengan perubahan morfologi dan proliferasi kinetik dari trombosit (Budak, Polat and Huysal, 2016) sehingga aktivasi trombosit dapat diamati secara tidak langsung melalui perubahan indeks trombosit tersebut. Indeks trombosit terdiri dari *Mean Platelet Volume* (MPV), *Platelet Distribution Width* (PDW), *Plateletcrit* (PCT), dan *Platelet – Large Cell Ratio* (P – LCR).

Dalam sebuah penelitian diketahui bahwa nilai MPV dan PDW menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada nilai PLT dan *Plateletcrit* (PCT) tidak menunjukkan korelasi yang signifikan dengan preeklamsia (Thalor *et al.*, 2019). Pada penelitian lain, tidak ada perbedaan signifikan nilai PDW dan MPV antara kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat/kehamilan normal (AlSheeha *et al.*, 2016) serta terdapat perbedaan signifikan nilai PLT, MPV, rasio PC/MPV antara kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat (DoJan *et al.*, 2015).

Seiring banyaknya insiden preeklamsia maka dibutuhkan penanda laboratorium yang dapat digunakan untuk menilai progresivitas dan prognosis maupun derajat keparahan penyakit tersebut. Diagnosis preeklamsia dapat dilihat dari keadaan klinik dan pemeriksaan penunjang. Salah satu pemeriksaan penunjang tersebut adalah pemeriksaan indeks trombosit. Trombosit memiliki peran penting dalam trombosis sehingga parameter trombosit dapat membantu dalam menunjang diagnosis pada kasus-kasus hipertensi. Hanya saja, seringkali interpretasi yang dilakukan hanya berfokus pada parameter jumlah trombosit (PLT), padahal terdapat indeks trombosit yang juga memiliki makna klinis pada berbagai kasus.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Perbandingan Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Pasien Preeklamsia di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana perbandingan Jumlah Trombosit Total (PLT) dan indeks trombosit (PDW, MPV, P-LCR) pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar?

C. Hipotesis

1. Perbandingan PLT pada kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

H_0 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai PLT pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

H_a : terdapat perbedaan signifikan PLT pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

2. Perbandingan indeks MPV pada kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

H_0 : tidak terdapat perbedaan signifikan indeks MPV pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

H_a : terdapat perbedaan signifikan indeks MPV pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

3. Perbandingan indeks PDW pada kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

H_0 : tidak terdapat perbedaan signifikan indeks PDW pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

Ha : terdapat perbedaan signifikan indeks PDW pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

4. Perbandingan indeks PLCR pada kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

H₀: tidak terdapat perbedaan signifikan indeks PLCR pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

Ha : terdapat perbedaan signifikan indeks PLCR pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

D. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara ukur	Hasil ukur	Jenis Data
Variabel Independen					
1	<i>Platelet Total (PLT)</i>	Parameter untuk mengetahui jumlah trombosit total dalam darah.	Data diperoleh dari informasi yang telah dicatat pada rekam medis berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan <i>Hematology analyzer 5 Diff.</i>	a. Trombositopenia: < 150.000/m ³ b. Normal: 150.000/m ³ – 400.000/mm ³ c. Trombositosis: >400.000/mm ³	Numerik
2	<i>Platelet Distribution Width (PDW)</i>	Parameter yang menggambarkan variasi ukuran trombosit yang beredar di sirkulasi. PDW merupakan tanda aktif pelepasan trombosit.	Data diperoleh dari informasi yang telah dicatat pada rekam medis berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan	a. Rendah: <10 fL b. Normal: 10-15 fL c. Tinggi: >15 fL	Numerik

			<i>Hematology analyzer 5 Diff.</i>		
3	<i>Mean Platelet Volume (MPV)</i>	Parameter yang menggambarkan rata-rata ukuran trombosit yang ada di sirkulasi.	Data diperoleh dari informasi yang telah dicatat pada rekam medis berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan <i>Hematology analyzer 5 Diff.</i>	a. Rendah: <9 fL b. Normal: 9-13 fL c. Tinggi: >13 fL	Numerik
4	<i>Platelet Large Cell Ratio (PLCR)</i>	Parameter yang menunjukkan persentase trombosit dengan ukuran yang lebih besar dari trombosit normal.	Data diperoleh dari informasi yang telah dicatat pada rekam medis berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan <i>Hematology analyzer 5 Diff.</i>	a. Rendah: <13% b. Normal: 13-43% c. Tinggi: >43%	Numerik
Variabel Dependen					
1	Preeklamsia	Preeklamsia adalah pasien yang telah terdiagnosis preeklamsia oleh dokter penanggung jawab (DPJP) rumah sakit bagian Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dengan kriteria paling tidak usia kehamilan > 20 minggu	Data diperoleh dari informasi yang telah dicatat pada rekam medis.	a. Preeklamsia Ringan b. Preeklamsia berat	Nominal

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian merupakan rumusan tentang pembatasan masalah yang diteliti beserta penjelasannya, yang meliputi materi/variabel, responden/data, waktu, dan tempat. Hal ini bertujuan agar diperoleh gambaran

tentang fokus penelitian terkait dengan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan (Syahdrajat, 2015).

1. Lingkup keilmuan

Lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah ilmu kandungan dengan penyakit preeklamsia.

2. Lingkup sasaran

Sasaran pada penderita preeklamsia yang ada di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

3. Lingkup waktu

Penelitian ini mulai pada bulan Juni sampai Juli 2022.



F. Kajian Pustaka

Sebagai bahan penguat penelitian, penulis mengutip beberapa penelitian yang relevan:

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

NO	Nama Peneliti	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbedaan
1.	Leticia Gonçalves Freitas, Patrícia Nessler, Flávia Alpoim, Flávia Komatsuzaki, Maria das Graças Carvalho, Luci Maria S Dusse	Preeklampsia: Are platelet count and indices useful for its prognostic?	Untuk menyelidiki apakah jumlah trombosit dan indeks trombosit (rata-rata), MPV, PDW, dan plateletcrit (PCT) dapat memprediksi keparahan dari preeklampsia.	Desain penelitian case-kontrol yang dibagi menjadi 3 kelompok yakni, kelompok 1 (K1) dengan preeklampsia, K2 dengan kehamilan normal, dan K3 dengan wanita yang tidak hamil. Analisis menggunakan analisis ANOVA dan uji t.	Platelet Count (PC) dan Plateletcrit (PCT) lebih rendah pada preeklampsia dibandingkan pada kehamilan normal dan wanita tidak hamil. PDW lebih tinggi pada preeklampsia dibandingkan pada kehamilan normal dan wanita tidak hamil. MPV lebih tinggi pada preeklampsia dibandingkan kehamilan normal dan wanita tidak hamil.	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu PCT dan dependen yaitu kelompok wanita tidak hamil.
2.	Muneera A AlSheeha, Rafi S Alaboudi, Mohammad A Alghasham, Javed Iqbal, Ishag Adam	Platelet count and platelet indices in women with preeclampsia	Untuk membandingkan indeks trombosit, yaitu PC, MPV, PDW, dan rasio PC terhadap MPV pada wanita dengan	Desain case-kontrol dengan analisis uji t dan uji Mann Whitney U	Tidak ada perbedaan yang signifikan terkait PDW dan MPV pada kelompok preeklampsia ringan dan preeklampsia berat. Baik PC maupun rasio	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu rasio PC/MPV. Perbedaan juga pada kelompok

			preeklamsia dibandingkan dengan kelompok kontrol yang sehat.		PC/MPV lebih rendah pada preeklamsia dibandingkan dengan kontrol. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk PC, PDW, MPV, dan rasio PC/MPV pada wanita dengan preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.	yang diteliti yaitu kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.
3.	Priyanka Gogoi, Pallavi Sinha, Bindiya Gupta, Priyanka Firmal, Shalini Rajaram	Neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet indices in pre-eclampsia	Untuk membandingkan rasio neutrophil-to-lymphocyte (NLR), rasio platelet-to-lymphocyte (PLR), dan indeks trombosit antara wanita dengan preeklamsia dan kehamilan normal	Desain cross-sectional dengan analisis uji t Student dan One Way ANOVA.	NLR lebih tinggi pada wanita dengan preeklamsia dibandingkan dengan kelompok kontrol. PLR dan MPV lebih tinggi pada kelompok preeklamsia dibandingkan kelompok kontrol. PC lebih rendah pada wanita preeklamsia dibandingkan dengan kelompok kontrol. Red cell distribution width (RDW) juga lebih tinggi pada kelompok preeklamsia.	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu rasio neutrophil-to-lymphocyte (NLR) dan rasio platelet-to-lymphocyte (PLR)

4	Keziban Doğan, Hakan Guraslan, Mehmet Baki Senturk, Caglar Helvacioğlu, Sevda İdil & Murat Ekin	Can platelet count and platelet indices predict the risk and the prognosis of preeclampsia?	Untuk membandingkan hematokrit (HCT), PC, MPV, PDW, rasio PC/MPV pada preeklamsia ringan, preeklamsia berat dan wanita hamil normal yang sehat untuk dievaluasi apakah parameter ini memiliki signifikansi prediktif dan prognostik dalam menentukan risiko dan tingkat keparahan preeklamsia.	Desain retrospektif case-kontrol dengan menggunakan uji t student, uji Mann-Whitney U, Uji One Way ANOVA, uji Kruskal-Wallis, dan uji Tukey HSD.	Ada perbedaan yang signifikan secara statistik pada PC, MPV, rasio PC/MPV pada preeklamsia maupun kontrol. Tapi tidak ada perbedaan antara preeklamsia ringan dan preeklamsia berat	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu HCT dan rasio PC/MPV. Perbedaan juga pada kelompok yang diteliti yaitu pada penelitian ini terdapat kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.
5	Shaifali Dadhich, Sudesh Agrawal, Monica Soni, Rekha Choudhary, Rashmi Jain, Saroj Sharma,	Predictive Value of Platelet Indices in Development of Preeclampsia	Untuk mengevaluasi hubungan antara perubahan indeks trombosit (PC, MPV, PDW) dan perkembangan preeklamsia	Studi prospektif yang menggunakan 2 kelompok yaitu preeklamsia dan kehamilan normal. Menggunakan uji ANOVA, uji Chi-square, uji t student.	PC menurun secara signifikan pada pasien preeklamsia dibandingkan dengan pasien hamil normal. MPV meningkat secara signifikan pada pasien preeklamsia. PDW meningkat	Perbedaan terletak pada kelompok yang diteliti, penelitian ini terdapat kelompok membedakan preeklamsia ringan dan

	Sharad Lata Saini				secara signifikan pada pasien dengan preeklamsia.	preeklamsia berat.
6	Nitesh Thalor, Kanika Singh, Mukta Pujani, Varsha Chauhan, Charu Agarwal, Rashmi Ahuja	A Correlation Between Platelet Indices and Preeclampsia	mengetahui hubungan antara indeks trombosit yaitu PC, PCT, MPV, dan PDW dengan preeklamsia serta mencoba untuk menilai apakah parameter ini dapat digunakan sebagai penanda untuk diagnosis dini, serta untuk tujuan prognostik penyakit.	Desain <i>case-kontrol</i> dengan Uji Mann-Whitney.	MPV dan PDW menunjukkan perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, dengan korelasi positif yang signifikan dengan peningkatan tekanan darah. PC dan PCT memiliki nilai yang lebih rendah pada preeklamsia dibanding kontrol, namun perbedaan antara kedua kelompok tidak signifikan secara statistik.	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu PCT.
7	Solomon Gebre Bawore, Wondimagegn Adissu, Berhanu Niguse, Yilma Markos Larebo, Nigussie Abebe Ermolo, Lealem	A pattern of platelet indices as a potential marker for prediction of pre-eclampsia among pregnant women attending a Tertiary	Mengetahui pola indeks trombosit pada wanita preeklamsia	Desain <i>case-kontrol</i> dengan menggunakan Uji Mann Whitney U, uji Kruskal-Wallis H, dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji Posthock ditambah	PLT dan PCT signifikan lebih rendah pada wanita hamil preeklamsia dibandingkan wanita hamil normal. Sedangkan MPV dan PDW secara signifikan lebih tinggi pada	Perbedaan terletak pada kelompok yang diteliti, penelitian ini membedakan kelompok preeklamsia berat dan tidak berat.

	Gedefaw	Hospital, Ethiopia: A case-control study		dengan Benforeni.	kelompok preeklamsia dibandingkan kelompok kontrol.	
8	M. Nadeem Safdar Khan, Ahmad Hameed, Adeela Hassan, Jalees Khalid Khan, Sobia Ashraf	Comparison of platelet count, platelet indices and coagulation profile in preeclampsia and normal pregnancy	Untuk membandingkan PC, MPV dan PDW dan profil koagulasi pada preeklamsia dan kehamilan normal.	Desain cross-sectional komparatif dengan uji Chi-square.	Parameter hematologi seperti PC, MPV, PDW, fibrinogen, FDPs dan D-Dimer berbeda pada wanita dengan preeklamsia dibandingkan dengan kehamilan normal tetapi tidak memiliki perbedaan signifikan secara statistik.	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu fibrinogen, FDPs, dan D-Dimer.
9	Mohamed Abdel Razik, Ahmed Mostafa, Sara Taha & Ahmed Salah	Combined Doppler ultrasound and platelet indices for prediction of preeclampsia in high risk pregnancies	Mengevaluasi USG Doppler dan indeks trombosit sebagai prediktor preeklamsia	Studi observasional prospektif dengan uji t Student, uji Chi-square, Uji Z, uji koefisien korelasi Pearson.	MPV dan PDW meningkat secara signifikan dibandingkan wanita hamil normal	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu Ultrasound Doppler.
10	Muzaffer Temur, Fatma Nurgül Taşgöz, Tayfur Çift, Gülçin Serpim, Emin Üstünyurt	Role of platelet indices in prediction of preeclampsia	Membandingkan indeks trombosit pada kehamilan preeklampsia dan normotensif dan untuk menyelidiki	Desain case-kontrol dengan uji Kolmogorov Smirnov dan uji t sampel independen	MPV secara signifikan lebih tinggi pada kelompok preeklampsia dibandingkan dengan kelompok kontrol.	Perbedaan terletak pada variabel independen yaitu rasio PCT/MPV dan PC/MPV.

			penggunaan klinis parameter ini dalam prediksi preeklamsia.			
--	--	--	---	--	--	--



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan Jumlah Trombosit Total (PLT) dan indeks trombosit (PDW, MPV, P-ICR) sebagai penanda derajat keparahan preeklamsia pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.

b. Tujuan Khusus Penelitian

- 1) Mengetahui distribusi dan karakteristik pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
- 2) Mengetahui perbandingan Jumlah Trombosit Total (PLT) pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
- 3) Mengetahui perbandingan MPV pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
- 4) Mengetahui perbandingan PDW pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
- 5) Mengetahui perbandingan P-ICR pada pasien preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang indeks trombosit pada pasien preeklamsia.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset

maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, terutama pada penerapannya dalam menunjang diagnosis preeklamsia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Preeklamsia

1. Definisi

Preeklamsia adalah gangguan progresif multisistem yang ditandai dengan onset baru hipertensi dan proteinuria atau onset baru hipertensi dan disfungsi organ yang signifikan dengan atau tanpa proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu atau postpartum pada pasien yang sebelumnya memiliki riwayat tekanan darah normal (Kee-Hak Lim, 2021).

2. Epidemiologi

Preeklamsia adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu di seluruh dunia (Rana et al., 2019). Dalam suatu tinjauan sistematis, terdapat 4,6% dari kehamilan di seluruh dunia dapat dipersulit oleh preeklamsia. Preeklamsia menyebabkan lebih dari 50.000 kematian ibu tiap tahunnya serta menyebabkan lebih dari 500.000 kematian janin di seluruh dunia (Karrar dan Hong, 2021). WHO memperkirakan kejadian kasus preeklamsia dengan komplikasi tujuh kali lebih tinggi pada negara berkembang daripada di negara maju (Muhammad, 2021). Di Amerika Serikat, penyakit ini menjadi penyebab utama kematian ibu, morbiditas yang parah, perawatan intensif, operasi sesar, dan prematuritas (Rana et al., 2019). Insiden preeklamsia bervariasi di berbagai negara, hal ini karena adanya perbedaan dalam distribusi usia dan proporsi ibu hamil primipara pada populasi masing-masing negara (Kee-Hak Lim, 2021).

Terdapat sekitar 90% kasus preeklamsia terjadi pada periode prematur akhir (≥ 34 sampai < 37 minggu), cukup bulan (≥ 37 sampai < 42 minggu), atau pascapersalinan (≥ 42 minggu) dengan peningkatan risiko morbiditas atau mortalitas yang serius. Kemudian, sekitar 10% kasus preeklamsia pada periode awal (< 34 minggu) berisiko terjadi kelahiran prematur. Hal ini berarti preeklamsia lebih jarang terjadi sebelum kehamilan kurang dari 34 minggu (Kee-Hak Lim, 2021). Dalam jangka waktu yang panjang, pasien dengan

preeklamsia berisiko untuk dapat berkembang menjadi penyakit kardiovaskular maupun ginjal (Rana et al., 2019).

Data preeklamsia di Indonesia sendiri belum ada yang menyebutkan secara spesifik. Namun tercatat bahwa angka kematian ibu (AKI) paling banyak setelah perdarahan disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan yakni 1066 kasus pada tahun 2019. Angka ini meningkat pada tahun 2020 sebesar 1110 kematian (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan data pada tahun 2011 insiden preeklamsia dengan komplikasi di Indonesia ialah sebesar 128.273 kejadian, yakni sekitar 5,3% dari seluruh populasi ibu bersalin di Indonesia (POGI, 2016). Kemudian sebuah penelitian dilakukan di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tahun 2015-2017, menunjukkan bahwa dari 4242 subjek ibu bersalin terdapat 613 pasien dengan komplikasi preeklamsia (Sumampouw, Tendea dan Wagey, 2019).

3. Faktor Risiko

Faktor risiko untuk perkembangan preeklamsia telah dipelajari secara ekstensif. Adapun faktor risiko yang dikutip dari Rana, dkk (2019) sebagai berikut:


Tabel 2.1 Faktor Risiko Preeklamsia

Faktor Risiko Utama
Riwayat preeklamsia sebelumnya (RR, 8,4; 95% CI, 7,1-9,9)
Hipertensi kronis (RR, 5.1; 95% CI, 4.0-6.5)
Diabetes melitus pregestasional (RR, 3,7; 95% CI, 3,1-4,3)
Kehamilan ganda (RR, 2,9; 95% CI, 2,6-3,1)
BMI sebelum hamil >30 (RR, 2,8; 95% CI, 2,6-3,1)
Sindrom antifosfolipid (RR, 2,8; 95% CI, 1,8-4,3)
Faktor Risiko Lainnya
Lupus eritematosus sistemik (RR, 2,5; 95% CI, 1,0-6,3)
Riwayat intrauterine fetal death (IUFD) (RR, 2.4; 95% CI, 1.7-3.4)
BMI sebelum hamil >25 (RR, 2,1; 95% CI, 2,0-2,2)

Nuliparitas (RR, 2.1; 95% CI, 1.9–2.4)
Solusio plasenta sebelumnya (RR, 2.0; 95% CI, 1.4-2.7)
Penggunaan teknologi reproduksi berbantuan (RR, 1,8; 95% CI, 1,6-2,1)
Penyakit ginjal kronis (RR, 1,8; 95% CI, 1,5-2,1)
Usia ibu >35 (RR, 1.2; 95% CI, 1.1-1.3)
Kerentanan genetik (ibu, ayah)
Faktor Risiko Langka
Riwayat keluarga dengan preeklamsia
Trisomi 13 pada fetus

4. Patofisiologi

Preeklamsia pernah disebut "penyakit teori" yang berarti bahwa penyebab preeklamsia tidak sepenuhnya dipahami tetapi berkat upaya penelitian dekade terakhir ini telah menghasilkan terobosan yang dapat membawa lebih dekat kepada kausalitas, meningkatkan diagnosis maupun prediksi, dan mengarah pada pencegahan dan/atau perawatan khusus pada preeklamsia. Adapun teori yang paling memungkinkan menjelaskan tentang hal yang mendasari terjadinya preeklamsia adalah teori abnormalitas plasenta (Preeclampsia Foundation, 2021).



Patofisiologi preeklamsia kemungkinan melibatkan faktor ibu dan janin/plasenta. Pada kehamilan normal, pembuluh darah miometrium dan desidua di tempat implantasi plasenta berubah bentuk sedemikian rupa sehingga bagian terminal arteriol spiralis terbuka lebar untuk menyediakan nutrisi ibu ke janin dan pertukaran oksigen yang optimal. Namun pada preeklamsia, plasentasi dangkal dan kegagalan *remodelling* arteri spiralis (abnormalitas perkembangan pembuluh darah plasenta) pada awal kehamilan menghasilkan aliran darah uteroplasenta yang kurang optimal dan jaringan trofoblas yang relatif hipoksia serta memicu keadaan stres oksidatif yang berlebihan berkembang di plasenta yang pada gilirannya mempengaruhi angiogenesis vili. Seiring bertambahnya usia kehamilan, sel-sel plasenta patologis akan mensekresi molekul toksik yakni faktor antiangiogenik (tirosin kinase-1 seperti fms-like [sFlt-1] dan endoglin) ke dalam sirkulasi ibu yang mengikat faktor pertumbuhan endotel vaskular (VEGF) dan faktor pertumbuhan plasenta (PIGF) yang menyebabkan terjadinya inflamasi secara luas pada vaskular ibu, disfungsi endotel, sehingga menyebabkan hipertensi, proteinuria, dan manifestasi klinis preeklamsia lainnya (Rana *et al.*, 2019). Namun, pemicu perkembangan plasenta yang abnormal dan rangkaian kejadian selanjutnya masih belum diketahui.


a. Perkembangan abnormal plasenta

1) Remodeling abnormal arteri spiralis

Pada kehamilan normal sel-sel sitotrofoblas dari plasenta yang sedang berkembang bermigrasi melalui desidua dan sebagian miometrium untuk menginvasi endotelium maupun tunika media yang sangat berotot dari arteri spiralis ibu. Arteri spiralis adalah cabang terminal dari arteri uterina yang mensuplai darah ke janin/plasenta yang sedang berkembang. Akibatnya, pembuluh darah ini mengalami transformasi dari arteriol otot kecil menjadi pembuluh darah berkapasitas besar dengan resistensi rendah sehingga sangat memudahkan aliran darah ke plasenta dibandingkan dengan daerah lain di rahim. Selama proses invasi vaskular, sitotrofoblas berdiferensiasi dari fenotipe epitel ke fenotipe endotel, suatu proses yang disebut sebagai


"pseudovasculogenesis" atau "mimikri vaskular". Proses remodeling arteri spiralis mungkin dimulai pada akhir trimester pertama dan selesai pada usia kehamilan 18 sampai 20 minggu, meskipun usia kehamilan yang tepat di mana invasi trofoblas arteri ini berhenti tidak jelas.

Pada keadaan patologis sel-sel sitotrofoblas menginfiltrasi bagian desidua arteri spiralis tetapi gagal menembus segmen miometrium. Arteri spiral gagal berkembang menjadi saluran vaskular yang besar dan berkelok-kelok mengakibatkan pembuluh darah tetap sempit yang menyebabkan hipoperfusi plasenta.



Gambar 2. 2 Diagram of anchoring villi (AV) at the maternal-fetal interface in normal and preeclamptic pregnancy

Sumber: (Kee-Hak Lim, 2021)



Gambar 2. 3 Plasentasi Abnormal Pada Preeklamsia
 Sumber: (Kee-Hak Lim, 2021)

Defek yang terbentuk akibat proses plasentasi patologis ini telah dikaitkan dengan perkembangan beberapa keadaan kehamilan yang merugikan termasuk kematian janin trimester kedua, solusio plasenta, preeklamsia dengan pertumbuhan janin terhambat/*intrauterine growth restriction* (IUGR), persalinan prematur, dan ketuban pecah sebelum persalinan (Kee-Hak Lim, 2021).

2) Diferensiasi trofoblas yang rusak

Diferensiasi trofoblas yang rusak adalah salah satu mekanisme yang mungkin bertanggung jawab atas invasi trofoblas yang rusak ke arteri spiral. Selama proses invasi vaskular pada wanita normal,

sitotrofoblas berdiferensiasi dari fenotipe epitel ke fenotipe endotel, suatu proses yang disebut sebagai "pseudovasculogenesis" atau "mimikri vaskular" (panel atas). Pada preeklamsia, sitotrofoblas gagal mengadopsi fenotipe endotel invasif. Sebaliknya, invasi ke arteri spiralis dangkal, dan kalibernya tetap kecil.

3) Hipoperfusi, hipoksia, dan iskemia plasenta

Hipoperfusi mengakibatkan perkembangan plasenta yang abnormal. Hipoperfusi menjadi lebih jelas saat proses kehamilan berlanjut karena pembuluh darah uterus tidak mampu mengakomodasi peningkatan normal aliran darah ke janin/plasenta.

Hipoperfusi, hipoksia, dan iskemia merupakan komponen penting dalam patogenesis preeklamsia dan kemungkinan bertanggung jawab atas produksi molekul toksik yang ketika dilepaskan ke dalam aliran darah ibu akan mengubah fungsi normal sel endotel ibu dan menyebabkan tanda dan gejala sistemik yang khas.

4) Patologi desidua

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan desidua yang gagal pada beberapa pasien dapat menyebabkan penurunan regulasi invasi sitotrofoblas (Garrido-Gomez *et al.*, 2017). Sel desidua dari wanita dengan preeklamsia mengalami penekanan faktor anti-angiogenik yang tidak memadai selama periode implantasi yang dapat menyebabkan implantasi yang dangkal (Sahu *et al.*, 2019).

b. Abnormalitas sistem imun

Faktor imunologis kemungkinan berkontribusi terhadap perkembangan plasenta yang abnormal. Abnormalitas yang terjadi berupa intoleransi sistem imun maternal terhadap alloantigen fetus yang mengandung antigen dari ayah yang dianggap sebagai benda asing (Rana *et al.*, 2019).

c. Faktor genetik

Kontribusi ibu terhadap perkembangan preeklamsia sebagian dapat dijelaskan oleh gen yang dicetak. Dalam sebuah penelitian terhadap saudara perempuan dengan preeklamsia, ditunjukkan bahwa ibu mengalami preeklamsia hanya ketika janin/plasenta mewarisi mutasi missense STOX1 ibu pada 10q22.

Kejadian preeklamsia juga terjadi pada ibu yang mengandung janin dengan trisomi 13 yang sangat meningkat. Kromosom trisomi 13 membawa gen sFlt-1 dan Flt-1 yang berperan dalam pengikatan faktor pertumbuhan endotel vaskular (VEGF) dan faktor pertumbuhan plasenta (PlGF) yang menyebabkan terjadinya inflamasi secara luas pada pembuluh darah ibu.

d. Riwayat penyakit kardiovaskular

Hubungan antara penyakit vaskular yang sudah ada sebelumnya dan kerentanan penyakit ini untuk berkembang menjadi preeklamsia mungkin disebabkan oleh kerusakan sel endotel yang sudah ada sebelumnya. Kerusakan endotel yang sudah ada sebelumnya dapat menjelaskan bahwa wanita yang mengalami preeklamsia juga berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular di kemudian hari.

5. Klasifikasi

Dari gejala-gejala klinik preeklampsia dapat dibagi menjadi preeklampsia ringan dan preeklampsia berat:

1. Preeklamsia ringan

Kriteria untuk mendiagnosis preeklamsia ringan yaitu

(Wiknjastro, 2009) : Tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih yang diukur pada posisi berbaring terlentang atau kenaikan diastolik 15 mmHg atau lebih atau kenaikan sistolik 30 mmHg atau lebih. Cara pengukuran sekurang-kurangnya pada 2 kali pemeriksaan dengan jarak periksa 1 jam,

sebaiknya 6 jam. Kemudian edema umum, kaki, jari tangan, muka, atau kenaikan berat badan 1 kg atau lebih per minggu. Kemudian ada proteinuria kuantitatif 0,3 gr atau lebih per liter, kualitatif +1 atau +2 pada urin kateter.

2. Kriteria diagnosa preeklampsia berat adalah apabila terdapat gejala dan tanda sebagai berikut:

Sistolik > 160 mmHg atau diastolik > 110 mmHg yang terjadi dua kali dalam waktu paling sedikit 6 jam. Kemudian ada proteinuria lebih dari 5 gram dalam urin 24 jam, edema pulmonal, oligouria (<400 ml dalam 24 jam), sakit kepala yang menetap, nyeri epigastrium dan atau kerusakan fungsi hati, trombositopenia, keterbatasan perkembangan intrauterus, peningkatan kadar enzim hati dan atau ikterus, skotoma dan gangguan visus lain, perdarahan retina, dan koma.


B. Trombosit

1. Definisi

Trombosit (*thrombocytes*) atau *platelet* bukanlah sel darah, namun merupakan unsur bentukan darah yang paling kecil dan tidak berinti serta ditemukan di dalam darah semua mamalia. Trombosit merupakan fragmen/keping kecil sel yang dilepaskan dari tepi luar sel terikat-sumsum tulang yang sangat besar yang dikenal sebagai megakariosit. Trombosit terbentuk melalui pelepasan sebagian sitoplasma atau fragmen dari tepi megakariosit yang kemudian disalurkan ke dalam aliran darah. Satu megakariosit biasanya memproduksi sekitar 1000 trombosit. Trombosit pada hakikatnya adalah vesikel yang terlepas yang mengandung sebagian sitoplasma megakariosit yang terbungkus dalam membran plasma (Eroschenko, 2012).


Seperti eritrosit, trombosit melakukan fungsi utamanya di dalam pembuluh darah. Fungsi utama trombosit adalah memantau secara terus menerus sistem vaskular dan mendeteksi setiap kerusakan di lapisan endotel pembuluh darah. Bila lapisan endotel rusak, trombosit menempel pada tempat yang cedera

dan memulai proses kimiawi yang sangat kompleks yang menghasilkan bekuan darah (Sherwood, 2014) (Eroschenko, 2012).



Keping darah/trombosit berukuran sekitar 2 hingga 4 μ m dalam sediaan apus. Pada mikrograf cahaya tampak adanya daerah perifer yang jernih, yaitu hialomer, dan daerah pusat yang gelap, yaitu granulomer. Plasmalema keping darah memiliki beberapa molekul reseptor dan glikokaliks yang relatif tebal yakni 15-20nm (Gartner and Hiatt, 2012).

2. Hematopoiesis



Sel darah memiliki rentang usia terbatas dan sebagai akibatnya mereka secara terus-menerus diganti di tubuh oleh proses yang disebut hemopoiesis (hematopoiesis). Pada proses ini, semua sel darah berasal dari sel induk (pada beberapa referensi disebut juga sel punca) di sumsum tulang merah (medulla ossium rubra). Karena sel induk dapat menghasilkan semua jenis sel darah, sel ini disebut sel induk hematopoietic pluripotent (*Pluripotential hematopoietic stem cell*). Sel induk pluripotent selanjutnya menghasilkan dua turunan yang membentuk sel induk mieloid pluripotent dan sel induk limfoid pluripotent. Sebelum pematangan dan pelepasan ke dalam aliran darah, sel induk dari

masing-masing garis keturunan mengalami beberapa kali pembelahan dan tahap intermedia diferensiasi (Eroschenko, 2012).

Sel induk mieloid (*cellula myeloideus precursoria*) berkembang di sumsum tulang merah dan menghasilkan eritrosit (*erythrocytus*), eosinofil (*eosinophilus*), neutrofil (*neutrophilus*), basophil (*basophilus*), monosit (*monocytus*), dan megakariosit (*megakaryocytus*). Dari sel induk myeloid ini dapat berkembang menjadi megakaryoblastus kemudian berdiferensiasi menjadi promegakaryocytus lalu menjadi metamegakaryocytus kemudian menjadi megakariosit. Megakariosit inilah kemudian pecah menjadi potongan-potongan kecil (*fragmen*) yang disebut dengan trombosit (Eroschenko, 2012). Selanjutnya trombosit akan beredar dalam sirkulasi dengan kadar 150.000 - 300.000/ml dan lama hidup yang normal ialah antara 7 sampai 10 hari (Gartner and Hiatt, 2012).

3. Pengukuran

Nilai normal trombosit bervariasi sesuai metode yang dipakai. Jumlah trombosit normal menurut Daacie adalah $150 - 400 \times 10^9/L$. Menurut metode Rees Ecker jumlah normal trombosit $140 - 340 \times 10^9/L$, bila menggunakan Coulter Counter jumlah normal trombosit $150 - 350 \times 10^9/L$. Kelainan trombosit meliputi kuantitas dan kualitas trombosit. Kelainan kuantitas trombosit diantaranya trombositopeni, trombositosis dan trombositemi. Trombositopenia merupakan berkurangnya jumlah trombosit dibawah normal, yaitu kurang dari $150 \times 10^9/L$. Trombositosis merupakan peningkatan jumlah trombosit pada peredaran darah diatas normal, yaitu lebih dari 400×10^9 . Trombositopenia yaitu peningkatan jumlah trombosit oleh proses ganas, misalnya pada leukemia mielositik kronik jumlah trombosit melebihi $1.000 \times 10^9/L$ (Wirawan, 2006).


4. Peran Trombosit Dalam Hemostasis

Hemostasis adalah penghentian perdarahan dari suatu pembuluh darah yang rusak, yaitu penghentian hemoragia (*hemo* berarti "darah"; *stasis* berarti "mempertahankan"). Untuk terjadinya perdarahan dari suatu pembuluh, dinding

pembuluh harus mengalami kerusakan dan tekanan di bagian dalam pembuluh harus lebih besar daripada tekanan di luarnya untuk memaksa darah keluar dari kerusakan tersebut (Sherwood, 2014).

Kapiler kecil, arteriol, dan venula sering pecah oleh trauma ringan dalam kehidupan sehari-hari; trauma-trauma semacam ini adalah penyebab tersering perdarahan meskipun kita sering bahkan tidak menyadari bahwa telah terjadi kerusakan. Mekanisme hemostatik bawaan tubuh secara normal sudah memadai untuk menambal kerusakan dan menghentikan pengeluaran darah dari pembuluh mikrosirkulasi halus ini (Sherwood, 2014).

Trombosit dalam keadaan normal tidak melekat ke permukaan endotel pembuluh darah yang licin tetapi mereka melekat ke pembuluh darah yang rusak. Ketika permukaan endotel terganggu karena cedera pada pembuluh darah, faktor *von Willebrand* (vWF), suatu protein plasma yang disekresikan oleh megakariosit, trombosit, dan sel endotel serta selalu ada di plasma, melekat ke kolagen yang terpajan. Kolagen adalah protein fibrosa di jaringan ikat di bawah lapisan endotel. faktor *von Willebrand* memiliki tempat perlekatan yang merupakan tempat melekatnya trombosit yang bergerak cepat melalui reseptor permukaan-selnya yang spesifik bagi protein plasma ini. Karena itu, faktor vWF berfungsi sebagai jembatan antara trombosit dan pembuluh darah yang cedera. Perlekatan ini mencegah trombosit untuk tersapu oleh sirkulasi. Lapisan trombosit yang tersumbat ini membentuk dasar dari sumbatan trombosit hemostatik pada tempat yang mengalami kerusakan. Kolagen mengaktifkan ikatan trombosit. Pada keadaan normal trombosit berbentuk seperti cakram dan memiliki permukaan yang halus tetapi trombosit yang teraktivasi dengan cepat mengatur elemen sitoskeletal aktin mereka untuk membentuk prosesus seperti paku, yang membantunya melekat ke kolagen dan trombosit lainnya (Sherwood, 2014).



Gambar 2. 2 Pembentukan Sumbat Trombosit
Sumber: (Sherwood, 2014)

Trombosit yang teraktivasi juga melepaskan beberapa senyawa kimia yang penting dari granula simpanan mereka. Di antara senyawa-senyawa kimia ini adalah adenosin difosfat (ADP) yang menyebabkan permukaan trombosit darah yang terdapat di sekitar mereka menjadi lekat sehingga trombosit tersebut melekat ke lapis pertama gumpalan trombosit dan teraktivasi (Sherwood, 2014).

Trombosit-trombosit yang baru beragregasi ini, melepaskan lebih banyak ADP yang menyebabkan semakin banyak trombosit menumpuk, dan seterusnya; sehingga di tempat kerusakan cepat terbentuk sumbat trombosit melalui mekanisme umpan-balik positif. Proses agregasi ini diperkuat oleh pembentukan parakrin yang serupa prostaglandin yang distimulasi oleh AtP, tromboksan A₂, dari komponen membran plasma trombosit. Tromboksan A₂ merangsang agregasi trombosit secara langsung dan selanjutnya meningkatkannya secara tidak langsung dengan memicu pelepasan lebih banyak AtP dari granula trombosit. Karena itu, pembentukan sumbat trombosit melibatkan tiga kejadian adhesi, aktivasi, dan agregasi yang berurutan dan saling terintegrasi (Sherwood, 2014).

Sumbat trombosit tidak saja secara fisik menambal kerusakan pembuluh, tetapi juga melaksanakan tiga fungsi penting. (1) Kompleks aktin-miosin di

dalam trombosit yang membentuk sumbat tersebut berkontraksi untuk memadatkan dan memperkuat sumbat yang semula longgar.(2) Sumbat trombosit melepaskan beberapa vasokonstriktor kuat yang memicu konstriksi kuat pembuluh yang bersangkutan untuk memperkuat vasospasme awal. (3) Sumbat trombosit membebaskan bahan-bahan kimia lain yang meningkatkan koagulasi darah, yaitu langkah berikut pada hemostasis. Meskipun mekanisme pembentukan sumbat trombosit saja sering sudah cukup untuk menambal robekan-robekan kecil di kapiler dan pembuluh halus lain yang terjadi berkali-kali dalam sehari-hari, lubang yang lebih besar di pembuluh memerlukan pembentukan bekuan darah agar perdarahan dapat dihentikan seluruhnya (Sherwood, 2014).

C. Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit

Indeks trombosit adalah sekumpulan parameter yang digunakan untuk mengukur jumlah, morfologi dan proliferasi trombosit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa indeks trombosit berguna untuk menentukan derajat keparahan dan memprediksi prognosis pasien dengan sakit kritis (Djuang, 2017).

1. *Platelet Total (PLT)*

Penilaian jumlah trombosit penting karena defisiensi atau kerusakan pada fungsinya dapat menyebabkan perdarahan. Jumlah trombosit normal adalah 150.000-400.000 μ /L dari whole blood. Pada pasien dengan trombositopenia berat, akurasi dari perhitungan jumlah trombosit perlu diperhatikan karena jumlah trombosit digunakan untuk menentukan keperluan transfusi trombosit (Djuang, 2017).

Pasien-pasien dengan penyakit kritis yang dirawat di ICU 20 – 40% akan mengalami trombositopenia. Trombositopenia dikenal sebagai faktor risiko independen dari mortalitas pada pasien-pasien ICU, di mana penurunan jumlah trombosit dapat memprediksi suatu *outcome* buruk. Derajat keparahan trombositopenia dikelompokkan ke dalam: ringan 101.000-149.000 μ /L, sedang 51.000-100.000 μ /L, berat 21.000-50.0000 μ /L dan sangat berat \leq 20.000 μ /L.

Hal yang paling dikhawatirkan dari trombositopenia adalah resiko perdarahan (Djuang, 2017). Nilai rujukan *platelet count* (PLT) di RSUD Kabupaten Polewali Mandar ialah 150.000 – 400.000/ μ l.

2. *Mean Platelet Volume* (MPV)

MPV adalah ukuran rata-rata dari trombosit yang dijumpai di dalam darah. MPV memiliki hubungan terbalik dengan jumlah trombosit dan meningkat apabila terdapat banyak trombosit muda di dalam sirkulasi (Djuang, 2017). Dari semua indeks trombosit, perubahan MPV paling banyak diobservasi pada pasien-pasien infeksi, seperti pada apendisitis akut, pankreatitis, endokarditis akut, dan malaria. Di dalam penelitian oleh Gao, ditemukan bahwa MPV tidak akan meningkat pada infeksi lokal atau sepsis dengan kultur darah negatif. Dari temuan tersebut disimpulkan bahwa peningkatan MPV menunjukkan infeksi invasif, sistemik dan tidak terkontrol serta berhubungan derajat keparahan penyakit (Djuang, 2017). Volume trombosit rata-rata (MPV) diketahui meningkat ketika trombosit menjadi aktif dan berubah dari cakram diam menjadi bola yang membengkak. Trombosit besar lebih lengket dan cenderung beragregasi daripada yang kecil. Nilai rujukan *mean platelet volume* (MPV) di RSUD Kabupaten Polewali Mandar ialah 9 – 13 fL.

3. *Platelet Distribution Width* (PDW)

PDW merupakan suatu indikator variasi ukuran trombosit, untuk melihat apakah ukuran trombosit pada darah seragam atau tidak. PDW meningkat selama deplesi trombosit ketika terjadi perubahan trombosit dimana trombosit imatur banyak masuk ke aliran darah dan PDW memiliki tingkah laku yang mirip dengan MPV selama infeksi berat akut (Djuang, 2017). Nilai rujukan PDW di RSUD Kabupaten Polewali Mandar ialah 10 – 18 fL.

4. *Platelet – Large Cell Ratio (P – ICR)*

Platelet large cell ratio merupakan salah satu penanda terjadinya aktivasi trombosit. *Platelet large cell ratio* merupakan proporsi jumlah trombosit yang berukuran lebih dari 12 fL. Ukuran trombosit tergantung pada tingkat pergantian trombosit. Aktivitas sitokin (terutama IL-3 dan IL-6) pada proses perkembangan yang diawali megakariosit berperan penting dalam produksi trombosit yang lebih besar (Lorenza, Arkhaesi and Hardian, 2018). Nilai rujukan *Platelet – Large Cell Ratio (P – LCR)* di RSUD Kabupaten Polewali Mandar ialah 13 – 43 %.

Platelet large cell ratio menandakan bahwa sumsum tulang aktif dan melepaskan trombosit imatur yang tinggi daripada biasanya. Trombosit imatur atau sering disebut *reticulated platelet (retPLTs)* atau *immature platelet fraction (IPF)* merupakan trombosit yang baru saja dilepas oleh megakariosit dan masih mengandung ribonucleic acid (RNA). Trombosit tersebut memiliki ukuran yang lebih besar dan bersifat lebih reaktif dibandingkan dengan trombosit matur. Trombosit imatur disebut *reticulated platelet* disebabkan karena analog dengan retikulosit sel darah merah. *Reticulated platelet* memiliki usia hidup yang lebih pendek (<1hari) dibandingkan trombosit matur yang bertahan hidup 7-10 hari sehingga dapat dijadikan penanda aktivitas megakariopoiesis. *Reticulated platelet* dapat digunakan untuk membedakan kerusakan sumsum tulang dari destruksi perifer dalam trombositopenia. Penelitian sebelumnya didapatkan bahwa dapat digunakan sebagai prediktor awal kesembuhan sumsum tulang setelah kemoterapi dan transplantasi. Peningkatan P-ICR terjadi pada keadaan trombositopenia (Lorenza, Arkhaesi and Hardian, 2018).

D. Integrasi Keislaman

Selama kehamilan, seorang ibu akan mengalami berbagai rintangan dan kesulitan dalam melalui proses kehamilannya. Sesuai dengan firman Allah SWT., pada Q.S Luqman/31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ
فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami.) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) Kembali (Kemenag RI 2019).

Berdasarkan tafsir Al – Misbah, ayat ini seolah menyatakan: “Dan Kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: bersyukurlah kepada-Ku! karena Aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepada-Kulah - tidak kepada selain Aku - kembali kamu semua wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran.

Kemudian kata (وَهْنٌ) *wahnan* dalam ayat ini berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Sementara kata lemah di

dalam Al-Quran biasa memakai *dha'if* biasanya merujuk pada kelemahan karena tua. Boleh jadi kehamilan tidak menjadi berbahaya karena seorang ibu masih dalam usia ideal untuk mengandung. Oleh karenanya sebisa mungkin kehamilan berlangsung pada saat usia idealnya, karena bila kehamilan pada usia ideal saja seorang ibu bisa merasakan lemah apalagi yang sudah tua hal ini berpotensi membuat ibunya semakin tidak kuat.

Dalam ayat ini pula terdapat kalimat *Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.*” Hanya kepada-Ku (kamu) Kembali, yang dimaksud bersyukur disini adalah ibu hamil karena ia pada akhirnya merasakan apa yang dialami oleh orang tuanya dahulu. Dalam surah An-Nahl ayat 78:



وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur” (Kemenag RI 2019).

Dalam Tafsir Al Misbah saat kelahiran Allah mengeluarkan diri seseorang dari dalam perut ibu dalam keadaan tidak mengenal sedikit pun apa yang ada di sekeliling kalian. Kemudian Allah memberi pendengaran, penglihatan dan mata hati sebagai bekal mencari ilmu pengetahuan, agar manusia dapat beriman kepada-Nya atas dasar keyakinan dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Sungguh besar karunia Allah dalam mengatur segala hal di dunia, untuk itu kita perlu bersyukur atas segala hal yang telah diberikan seperti kehidupan, rejeki, maupun hal-hal lainnya.

Jika nabi adam diciptakan lalu diturunkan ke bumi untuk menyembah Allah karena Allah sudah berjasa menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada. Apalagi untuk anak sendiri yang telah dilahirkan oleh orangtuanya lantas ia berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Diketahui bahwa orang tua telah mengasuh kita dan bagaimana susahny mereka siang dan malam,

maka hendaklah kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik dan membalas kebaikan kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman pada surah Al-Isra'/17: 24

.... وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ٢٤

Terjemahnya:

“Dan ucapkanlah: “Wahai Rabbku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”(Kemenag RI 2019).

Siapa yang membalas kebaikan orang tua dengan berbuat baik padanya, maka Allah pun akan membalasnya di hari kiamat kelak (Tafsir Al Qur'an Al-Isra'/11: 53-54). Syaikh As Sa'di berkata, “Hendaklah kita berbuat baik pada kedua orang tua dengan berkata yang lemah lembut, perbuatan yang baik, tawadhu’, selalu memuliakan mereka dan jangan sampai menyakiti mereka dengan perkataan atau perbuatan”. (Taisir Al Karimir Rahman, 648)

Preeklamsia merupakan salah satu bentuk hipertensi. Menurut penelitian, hipertensi pada ibu hamil dapat berhubungan dengan keadaan gizi dan faktor psikologis sang ibu.

Faktor Gizi

Salah satu faktor risiko dari kejadian preeklamsia yakni faktor gizi, maka dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Misalnya dapat mengonsumsi protein pada tingkat normal. Konsumsi protein selama sembilan belas minggu pertama kehamilan dapat mendukung pertumbuhan sel otak bayi. Namun kelebihan protein juga berdampak negatif pada kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan, meski dukungan data untuk hal ini masih terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif Islam Quran surah Al-Maidah :87-88

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

٨٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman (Kemenag RI 2019).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah kata *halal* dalam penggalan kata *ahallallohu* adalah makanan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal, adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Namun, Tidak semua yang ada di dunia otomatis halal dimakan atau digunakan. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakannya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal.

Juga demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik (*thayyibah*). Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik.

Kemudian kata (لَا تَعْتَدُوا) *la ta'tadu*/jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf ta'/ bermakna keterpaksaan, yakni diluar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat, atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *ta'tadu*.

Namun perlu dicatat bahwa larangan ini bukan berarti larangan secara mutlak. Sesekali boleh saja seseorang menghalangi dirinya memakan makanan yang enak atau melakukan aktivitas yang menyenangkan, selama dalam batas-batas yang tidak berlebihan atau selama bukan dimaksudkan sabagai bagian dari ajaran agama, tetapi dalam rangka pendidikan jiwa dan pelatihan menghadapi masa mendatang yang boleh jadi suram. Tentunya lebih boleh lagi menghalangi diri untuk makan makanan yang halal lagi enak, atau melakukan aktivitas halal yang menyenangkan, jika hal tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan atau jiwa seseorang.

Setelah ayat yang 87 melarang mengharamkan apa yang halal, pada ayat 88 ditegaskan perintah memakan yang halal, dan dengan demikian, melalui ayat 87-88 menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktek-praktek keberagaman yang melampaui batas. *Dan makanlah makanan yang halal, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezezikikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah mu'minin, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.*

Melalui firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 87-88, kita diingatkan untuk tetap proposional dalam mengonsumsi, sesuai kebutuhan yang disyaratkan. Bila kita merenungkan surah tersebut, alangkah sempurna dan indahnya Islam. Karena tidak sedikit ibu hamil yang melahap melebihi kebutuhan nutrisi, karena beranggapan makan yang banyak berdampak pada

janin. Padahal ilmu gizi telah memberi takaran, agar kita melampaui batas, sehingga dapat membuat tubuh kian melar.

Secara teoritis, kebutuhan protein bisa dipenuhi dengan mengonsumsi susu, daging, ikan, dan unggas, juga tempe dan tahu. Namun, berbagai riset mengungkapkan mengonsumsi ikan terutama ikan laut, pada masa hamil sangat dianjurkan. Ini karena ikan laut mengandung asam lemak omega 3 yang berperan pada pertumbuhan dan perkembangan sel otak dan proses pengelihan (retina mata) pada janin. Selain itu ikan juga mengandung asam amino esensial yang sangat baik bagi pertumbuhan janin, disamping kandungan vitamin dan mineralnya yang cukup tinggi.

Anjuran berdasarkan hasil riset itu ternyata telah tersurat di Al Quran. Dalam Quran surah al-Nahl: 14 Allah Swt. Berfirman:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا
مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ
فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۴

Terjemahnya :

Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (Kemenag RI 2019)

Menurut Al-Qur'an ikan termasuk makanan yang mengandung gizi terbaik. Dalam penelitian dinyatakan bahwa Ikan mengandung 18 % protein terdiri dari asam-asam amino esensial yang tidak rusak pada waktu pemasakan. Asupan protein juga sangat dibutuhkan dalam tubuh khususnya pada ibu hamil, karena biasanya ibu hamil yang preeklamsia, terdapat manifestasi proteinuria, yang berarti terdapat protein dalam urin. Dalam keadaan normal tidak terdapat protein dalam urin, namun karena terjadi gangguan vaskular di ginjal ibu hamil yang mengalami preeklamsia maka protein yang seharusnya tetap di dalam tubuh malah dikeluarkan melalui urin. Selain itu protein dibutuhkan sebagai zat pembangun dalam tubuh.

Selain beragam zat, ibu hamil pun membutuhkan vitamin A yaitu sekitar 500 IU. Bila ibu mengalami kekurangan vitamin A selama kehamilan dapat menyebabkan bayi prematur dan retardasi pertumbuhan janin serta rendahnya berat bayi saat dilahirkan. Sebaliknya kelebihan vitamin A juga berdampak negatif. Ibu hamil untuk mendapatkan vitamin ini bisa dengan mengonsumsi hati, susu, ikan laut, sayuran dan buah berwarna hijau dan kuning. Kenyataan ini ternyata telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW: "*Berilah makanan wanita-wanita hamil sayuran, karena itu akan membuat anaknya sehat*".

Kajian gizi secara sederhana menyarankan, ibu hamil untuk makan empat sampai lima porsi sehari dengan menu sehat seimbang. Yaitu terdiri atas nasi, laukpauk hewani (daging, ikan, udang, telur, ayam), laukpauk nabati (tahu, tempe), dan sayuran berwarna , serta usahakan untuk mengonsumsi buah-buahan. Dianjurkan pula bagi ibu hamil untuk minum susu antara 2 - 4 gelas sehari. Dari 2 gelas susu menyumbang 15 gr protein, 0,75 gr kalsium dan 160 kkal (skim milk), 320 kkal (*whole milk*).

Konsumsi kafein yang di atas 600 mg sehari dapat mengakibatkan aborsi spontan dan kelahiran prematur. Demikian juga konsumsi minuman beralkohol, akan mengakibatkan terjadinya fetal alcohol syndrome. Berkaitan dengan anjuran ini, terutama pada alkohol, Islam tegas mengharamkannya tak hanya bagi ibu hamil, juga untuk semua pemeluk Islam.

Hal lain yang perlu diperhatikan, ibu hamil harus mendapatkan makanan yang halal dan *thayyib*, dan berasal dari rizki yang halal. Makanan yang halal adalah semua makanan yang disediakan Allah SWT kecuali yang diharamkan seperti bangkai, darah yang memancar, daging babi, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-An'am: 145. Namun terdapat pengecualian untuk binatang yang hidup di air (tawar maupun laut seperti ikan). Begitu juga dengan belalang, walaupun bangkai yang mati dengan sendirinya.

Seperti sabda Nabi Muhammad SAW "Laut itu suci airnya, halal bangkainya." Namun makanan yang halal belum tentu *thayyib*. Dijelaskan pula bahwa yang *thayyib* ialah semua binatang yang tidak menjijikkan. Makanan

yang thayyib adalah makanan yang aman dan sehat. Makanan yang halal dan thayyib tersebut harus pula berasal dari rizki yang halal.

Lalu beliau menggambarkan tentang seseorang yang berjalan jauh (dalam keadaan) kumal dan kotor, menengadahkan kedatangannya ke langit seraya mengiba-iba: "Ya Tuhanku, ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan yang haram pula, maka bagaimana bisa dikabulkan doanya (HR.Muslim). Padahal pada saat kehamilan mutlak diperlukan doa kepada Allah SWT untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan janin. Begitu juga agar kelak bayi yang dilahirkan menjadi anak yang saleh/salehah.

Faktor Psikologis

Kehamilan memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan mental. Kekhawatiran dan ketakutan menyelimuti seorang ibu yang sedang hamil. Terkadang, ibu hamil merasa sangat tertekan. Selain itu, kehamilan itu sendiri bisa membuat stres. Perubahan fisik ibu hamil dimungkinkan bisa mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sedang hamil cenderung tidak stabil emosinya (Nurhayati, 2021).

Al-Quran memberikan solusi untuk menyikapi masalah ini, di antaranya dengan beberapa cara dibawah ini (Safitri, 2022):

- a. Menatap masa depan dengan keimanan, ketaqwaan dan amal saleh

Hal ini terdapat dalam QS:Al-Baqarah/2:277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

Terjemahannya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (KEMENAG RI 2019).

Ayat ini menegaskan tentang perbuatan yang baik, dapat

menghindarkan diri dari perbuatan yang dimurkai Allah. Allah menyebutkan bahwasanya orang yang mempunyai empat macam sifat, yang tersebut dalam ayat ini, tidak ada kekhawatiran atas diri mereka, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala cobaan yang ditimpakan Allah kepadanya (Depag, 2010). Empat macam sifat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Beriman kepada Allah
- b) Mengerjakan amal saleh
- c) Menunaikan salat
- d) Menunaikan zakat (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2010).

b. Senantiasa mengingat Allah

Al-Quran memberikan jalan keluar bagi seseorang yang telah mengalami gangguan psikologi akibat kehamilan, yakni pada fase cemas menjadi sebuah gangguan. Jalan keluar ini merupakan yang dapat menghadirkan rasa tuma'ninah, memberikan perasaan tenang dan tenteram yang mendalam sebagai anugerah Allah (Nasaruddin, 2018). Sebagaimana dalam firmanNya dalam QS: Ar-Rad/13:28 yaitu:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ
الْقُلُوبُ ۚ ٢٨

Terjemahannya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram (KEMENAG RI 2019).


Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat dan menyebut Allah Swt. Maksudnya, hati itu menjadi lebih baik karena bersandar kepada Allah, dan rida Allah sebagai pelindung dan penolong. Dengan mengingat dan menyebut Allah, hati menjadi tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa cemas, gelisah, takut, ataupun

khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya (DEPAG RI 2010).


Menurut Hamka (1995) dalam tafsir *Al-Azhar* ketika mengkaji surah Ar-Rad ayat 28 mengenai dzikir dan kesehatan mental, ia menerangkan bahwa adanya hubungan yang erat antara keimanan dengan dzikir dan hubungan dzikir dengan kesehatan mental. Keimanan merupakan penyebab seseorang senantiasa mengingat Allah atau berdzikir. Dengan keimanan, hati mempunyai pusat ingatan atau menjadi tujuan sebuah ingatan dan hanya dengan mengingat kepada Tuhan (zikrullah) menimbulkan ketenteraman hati. Hingga dengan sendirinya mampu menghilangkan segala macam kegelisahan, rasa putus asa, ketakutan, kecemasan, keragu-raguan dan perasaan duka cita. Dzikir yang menurut Hamka berarti mengingat, kebalikan dzikir adalah *ghaflah* (lupa). Hamka mengartikan asal arti dari dzikir adalah mengingat atau menyebut. Dalam mengingat Allah dalam hati, dapat pula ingatan itu diikrarkan dengan ucapan lidah dengan penuh kesadaran.



E. Kerangka Teori




F. Kerangka Konsep




Keterangan

 : Variabel independen yang diteliti

 : Variabel independen yang tidak diteliti

 : Hubungan yang diteliti

 : Hubungan yang tidak diteliti

 : Variabel dependen

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik komparatif kategorik dengan desain *cross sectional*. Penelitian ini ingin membandingkan hasil laboratorium (PLT, PDW, MPV, P-LCR) antara kelompok preeklamsia ringan dan kelompok preeklamsia berat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah di RSUD Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan yaitu pada bulan Juni 2022.

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam konteks penelitian diartikan sebagai keseluruhan elemen atau satuan yang ingin diteliti (Syahdrajat, 2015). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh ibu yang terdiagnosis mengalami preeklamsia yang tercatat dalam rekam medik RSUD Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 644 pasien.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diperoleh dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili populasinya (Syahdrajat, 2015). Sampel pada penelitian ini terdiri dari 2 kelompok yakni kelompok preeklamsia ringan dan kelompok preeklamsia berat yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Kriteria inklusi pada sampel:

- 1) Ibu hamil yang terdiagnosa preeklamsia berdasarkan data rekam medis di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
- 2) Memiliki data hasil darah rutin di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

Kriteria eksklusi pada sampel:

- 1) Ibu hamil dengan penyakit tiroid, kanker, hipertensi kronik, penyakit ginjal, diabetes mellitus, penyakit liver, kardiovaskular, dan/atau penyakit koagulasi
- 2) Kehamilan kembar
- 3) Ibu hamil dengan riwayat pengobatan anti platelet.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Besar sampel minimal dihitung dengan rumus besar slovin, dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel masing-masing kelompok

N = Jumlah Populasi untuk masing-masing kelompok

d = Tingkat Signifikansi (p)

$$n = \frac{644}{1+644(0,1^2)}$$

n = 86,55 sampel dibulatkan menjadi 86 sampel.

Jadi, jumlah sampel minimal untuk kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat adalah 86 sampel.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari rekam medis RSUD Kabupaten Polewali Mandar berupa data profil dan hasil laboratorium pasien kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rekam medis pasien.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data terdiri dari langkah, yaitu :

a. Editing

Peneliti akan memeriksa setiap rekam medis yang telah didapatkan dengan pasien terdiagnosa preeklamsia.

b. Coding

Kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk bilangan/angka. Kegunaan *coding* adalah mempermudah pada saat analisis data dan juga pada saat entry data.

c. Entri Data

Entri data dilakukan dengan memasukkan setiap data ke program komputer untuk membuat distribusi frekuensi sederhana.

d. Tabulating

Tabulating yaitu kegiatan menyusun data dalam table distribusi frekuensi yang berfungsi untuk meringkas data yang masuk ke dalam table yang telah dipersiapkan sehingga memudahkan dalam proses analisis data.

2. Analisis Data

a. Analisis Univariat

Analisis univariat ditujukan untuk menjelaskan masing-masing frekuensi dan proporsi dari variabel dependen dan variabel independen.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan uji independent sample t test jika memenuhi asumsi normalitas dan homogen. untuk menguji perbandingan antara indeks trombosit pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.

H. Alur Penelitian



Memasukkan informasi dan data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan aplikasi SPSS

||
V

Menyajikan data dalam bentuk tabel dan dijelaskan dalam bentuk narasi

||
V

Membuat kesimpulan hasil penelitian

I. Etika Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian, ada beberapa hal yang terkait dengan etik penelitian yang harus jalankan oleh peneliti, yaitu :

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan data pasien sehingga tidak merasa dirugikan.

Penelitian ini telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KPEK) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Polewali Mandar yang terletak di Jl. Dr. Ratulangi No. 50, Darma, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Penelitian ini melihat perbandingan Jumlah Trombosit Total dan indeks trombosit yaitu PLT, PDW, MPV, P-ICR pada kelompok preeklamsia ringan dan kelompok preeklamsia berat. Dalam mencapai tujuan penelitian maka peneliti melakukan pengambilan data kemudian data dianalisis sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk melihat gambaran distribusi dan karakteristik dari variabel yang diteliti.

Tabel 4.1 Distribusi Pasien Preeklamsia Ringan Dan Preeklamsia Berat

Tingkat Kecemasan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Preeklamsia ringan	86	42,8
Preeklamsia berat	115	57,2
Total	201	100

Sumber : Data Sekunder, tahun 2020-2022

Pada penelitian ini jumlah data yang diteliti setelah dilakukan seleksi sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yaitu 201 sampel yang terdiri dari 86 sampel data untuk kelompok preeklamsia ringan dan 115 sampel data untuk kelompok preeklamsia berat.

Tabel 4.2 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Usia

Variabel penelitian	Preeklamsia ringan		Preeklamsia berat		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Usia	<20 tahun	5	5,8%	4	3,5%	9	4,5%
	20-35 tahun	53	61,6%	72	62,6%	125	62,2%
	>35 tahun	28	32,6%	39	33,9%	67	33,3%
Total	86	100%	115	100%	201	100%	

Sumber: Data Sekunder , tahun 2020-2022

Berdasarkan data di atas usia diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Merujuk pada data yang ada di rekam medis bahwa pada pasien preeklamsia ringan, didapatkan usia pasien termuda yakni 15 tahun sedangkan usia yang tertua 46 tahun dengan usia rata-rata pasien 30,65 tahun serta mayoritas pasien didapatkan berusia diantara 20 – 35 tahun yakni sebanyak 53 (61,6 %) pasien. Kemudian pada pasien preeklamsia berat, didapatkan usia pasien termuda 16 tahun sedangkan usia yang tertua 50 tahun dengan usia rata-rata pasien 31,92 tahun serta mayoritas pasien didapatkan berusia diantara 20 – 35 tahun yakni sebanyak 72 (62,6 %) pasien.

Tabel 4.3 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Pekerjaan

Variabel penelitian	Preeklamsia ringan		Preeklamsia berat		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Pekerjaan	Tidak Bekerja	67	77,9%	92	80%	159	79,1%
	Bekerja	19	22,1%	23	20%	42	20,9%
Total	86	100%	115	100%	201	100%	

Sumber : Data Sekunder , tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.3 status pekerjaan diklasifikasikan menjadi tidak bekerja dan bekerja. Merujuk pada data yang ada di rekam medis yang dimaksud status tidak bekerja adalah ibu rumah tangga (IRT) dan mahasiswa, sementara status bekerja meliputi honorer, pegawai negeri sipil (PNS), aparatur sipil negara (ASN), pengusaha, dan karyawan. Didapatkan bahwa pada pasien preeklamsia ringan, mayoritas status pekerjaan pasien adalah tidak bekerja yakni sebanyak 67 (77,9 %) pasien. Kemudian pada pasien preeklamsia berat status pekerjaan pasien mayoritas tidak bekerja yakni sebanyak 92 (80%) pasien.

Tabel 4.4 Distribusi Karakteristik Pasien Preeklamsia Berdasarkan Pendidikan

Variabel penelitian	Preeklamsia ringan		Preeklamsia berat		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Pendidikan	Tidak sekolah	0	0%	4	3,5%	4	2%
	SD	18	20,9%	29	25,2%	47	23,4%
	SMP	16	18,6%	19	16,5%	35	17,4%
	SMA	22	25,6%	32	27,8%	54	26,9%
	Diploma/Sarjana	30	34,9%	31	27%	61	30,3%
Total	86	100%	115	100%	201	100%	

Sumber : Data Sekunder , tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.3 status pendidikan diklasifikasikan menjadi 4 kelompok yakni tidak sekolah, SD sederajat, SMP sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Didapatkan bahwa pada pasien preeklamsia ringan, mayoritas pasien memiliki status pendidikan diploma/sarjana yakni sebanyak 30 (34,9%). Kemudian pada pasien preeklamsia berat status Pendidikan pasien mayoritas berpendidikan SMA yakni sebanyak 32 (27,8%) pasien.

Tabel 4.5 Distribusi Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit Pada Pasien Preeklamsia

Variabel Penelitian		Preeklamsia ringan		Preeklamsia berat	
		n	%	n	%
PLT	Trombositopenia	0	0%	5	4,3%
	Normal	83	96,5%	102	88,7%
	Trombositosis	3	3,5%	8	7%
PDW	Rendah	32	37,2%	27	23,5%
	Normal	54	62,8%	87	75,7%
	Tinggi	0	0%	1	0,9%
MPV	Rendah	19	22,1%	22	19,1%
	Normal	67	77,9%	90	78,3%
	Tinggi	0	0%	3	2,6%
P-ICR	Rendah	6	7%	3	2,6%
	Normal	80	93%	110	95,7%
	Tinggi	0	0%	2	1,7%

Sumber : Data Sekunder , tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas didapatkan bahwa pada pasien preeklamsia ringan, Sebagian besar pasien dengan jumlah PLT berada pada tingkatan normal yakni sebanyak 83 (96,5%) dengan nilai rerata 271.810 μ l. Berdasarkan nilai PDW, sebagian besar pasien memiliki tingkat PDW normal yakni sebanyak 54 (62,8%) dengan nilai median 10,4 fL. Berdasarkan nilai MPV, Sebagian besar pasien memiliki tingkat MPV normal yakni sebanyak 67 (77,9%) dengan nilai rerata 10.76 fL. Berdasarkan nilai P-ICR, sebagian besar pasien memiliki tingkat P-ICR normal yakni sebanyak 80 (93%) dengan nilai rerata 22,28%.

berdasarkan nilai PLT, sebagian besar pasien dengan tingkat PLT normal yakni sebanyak 102 (88,7%) dengan nilai rerata 271.000 μ l. Berdasarkan nilai PDW, sebagian besar pasien memiliki tingkat PDW normal yakni sebanyak 87 (75,7%) dengan nilai median 10,6 fL. Berdasarkan nilai MPV, sebagian besar

pasien memiliki tingkat PDW normal yakni sebanyak 90 (78,3%) dengan nilai median 9.7 fL. Berdasarkan nilai P-ICR, sebagian besar pasien memiliki tingkat P-ICR normal yakni sebanyak 110 (95,7%) dengan nilai median 23,4%.

Setiap variabel memiliki sebaran datanya masing-masing. Variabel yang memiliki data terdistribusi normal disajikan dalam bentuk rerata sedangkan variabel dengan data tidak terdistribusi normal disajikan dalam bentuk median.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat bertujuan untuk mengetahui perbandingan Jumlah Trombosit Total dan indeks trombosit pada kelompok preeklamsia ringan dan preeklamsia berat.

Tabel 4.6 Perbandingan Jumlah Trombosit Total dan Indeks Trombosit pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat

Variabel Penelitian		Preeklamsia ringan		Preeklamsia berat		<i>p value</i>
		n	%	n	%	
PLT	Rendah	0	0%	5	4,3%	0,913 ^a
	Normal	83	96,5%	102	88,7%	
	Tinggi	3	3,5%	8	7%	
PDW	Rendah	32	37,2%	27	23,5%	0,088 ^b
	Normal	54	62,8%	87	75,7%	
	Tinggi	0	0%	1	0,9%	
MPV	Rendah	19	22,1%	22	19,1%	0,181 ^b
	Normal	67	77,9%	90	78,3%	
	Tinggi	0	0%	3	2,6%	
P-ICR	Rendah	6	7%	3	2,6%	0,104 ^b
	Normal	80	93%	110	95,7%	
	Tinggi	0	0%	2	1,7%	

^a Uji t tidak berpasangan

^b Uji Mann-Whitney

Berdasarkan tabel 4.6. disajikan nilai p untuk setiap variabel indeks trombosit serta Jumlah Trombosit Total yang menunjukkan perbandingan antara

preeklamsia ringan dan preeklamsia berat. Dari data diatas diketahui bahwa, baik variabel Jumlah Trombosit Total maupun nilai indeks trombosit tidak memiliki perbedaan yang signifikan karena memiliki nilai $p > 0,05$.

Tabel 4.7 Nilai *Mean/Mean Rank* Pada Preeklamsia Ringan dan Preeklamsia Berat

Variabel Penelitian		<i>Mean/Mean Rank</i>
PLT	Preeklamsia ringan	271,15
	Preeklamsia berat	272,30
PDW	Preeklamsia ringan	92,90
	Preeklamsia berat	107,06
MPV	Preeklamsia ringan	94,65
	Preeklamsia berat	105,75
P-ICR	Preeklamsia ringan	93,28
	Preeklamsia berat	106,77

Berdasarkan tabel 4.7 didapatkan bahwa Jumlah Trombosit Total dan indeks trombosit antara kelompok preeklamsia ringan dengan kelompok preeklamsia berat memiliki hasil perbandingan nilai mean/mean rank yang sama yaitu *mean/mean rank* pada kelompok preeklamsia berat lebih besar dibanding *mean/mean rank* pada preeklamsia ringan.

B. Pembahasan

Preeklamsia adalah salah satu jenis hipertensi yang terjadi pada kehamilan. Disadur dari Sukarni & Wahyu (2016) saat ini preeklamsia diklasifikasikan menjadi preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan asumsi derajat preeklamsia berat lebih parah dibanding dengan preeklamsia ringan. Kadar trombosit (PLT) dan indeks trombosit (PDW, MPV, P-ICR) diyakini memiliki potensi sebagai penanda derajat keparahan dari preeklamsia. Penelitian ini menganalisis potensi tersebut dengan mencari tahu perbandingan dari kedua klasifikasi preeklamsia.

Data Jumlah Trombosit Total dan indeks trombosit pada rekam medis disajikan dalam bentuk angka sehingga analisis data dilakukan dengan uji

parametrik yakni dilakukan uji normalitas terlebih dahulu, jika sebaran data normal maka uji yang dipakai menggunakan uji t tidak berpasangan. Kemudian jika sebaran data tidak normal, maka dilakukan transformasi data terlebih dahulu lalu dilakukan sekali lagi uji normalitas. Apabila sebaran data masih tidak normal maka dilakukan uji alternatif (non parametrik) yaitu uji Mann-Whitney. Selain melihat nilai p, pada penelitian ini dilihat pula nilai *mean* atau *mean rank* pada setiap variabel untuk melihat kecenderungan kelompok data mana yang lebih besar atau lebih kecil nilai Jumlah Trombosit Total dan indeks trombositnya.

1. Karakteristik Pasien Preeklamsia di RSUD Kabupaten Polewali Mandar

Berdasarkan hasil distribusi pasien preeklamsia di RSUD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 sampai Mei 2022, terdapat sebanyak 201 pasien yang memiliki karakteristik menurut usia, pekerjaan, dan pendidikan. Beberapa karakteristik tersebut diketahui dapat menjadi faktor risiko yang dapat mempengaruhi preeklamsia.

Usia pasien preeklamsia baik ringan maupun berat sebagian besar berusia 20-35 tahun sebanyak 125 (62,2%) dari total 201 pasien sementara sisanya yakni usia <20 tahun dan > 35 tahun berjumlah 76 pasien (37,3%). Hasil ini berbeda dengan teori yang dikutip dari Denantika dkk (2015) bahwa ibu yang sedang hamil pada usia < 20 tahun dan > 35 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia dibandingkan dengan wanita yang hamil pada usia reproduksi (20 – 35 tahun). Ibu yang sedang hamil pada usia < 20 tahun dan > 35 tahun cenderung akan mengalami preeklamsia berat dibandingkan dengan ibu hamil yang berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Ibu hamil pada usia < 20 tahun mempunyai risiko terjadi preeklamsia 3,58 kali lebih besar dibandingkan ibu hamil yang berusia 20-35 tahun. Hal ini terjadi karena fisik dan psikis pada seorang wanita yang usianya terlalu muda belum siap dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Selain itu, ukuran uterus belum mencapai ukuran yang normal untuk kehamilan, sehingga kemungkinan terjadinya gangguan dalam kehamilan seperti preeklamsia menjadi lebih besar. Sementara ibu yang sedang hamil pada usia > 35 tahun mempunyai risiko untuk menderita hipertensi

kronik yang akan berlanjut menjadi *superimposed preeclampsia* ketika sedang hamil serta pada usia ini terjadi proses degeneratif yang mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada pembuluh darah perifer yang bertanggung jawab terhadap perubahan tekanan darah, sehingga lebih rentan mengalami preeklampsia.

Karakteristik pasien preeklampsia berdasarkan pekerjaan baik preeklampsia ringan maupun berat sebagian besar status pekerjaan pasien ialah tidak bekerja dengan jumlah 159 pasien (79,1%). Hasil ini berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa faktor determinan terjadinya preeklampsia salah satunya adalah aktifitas pekerjaan ibu hamil yang dapat mempengaruhi kerja otot dan peredaran darah. Pada ibu hamil, akan terjadi perubahan peredaran darah seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akibat adanya tekanan dari pembesaran rahim. Semakin bertambahnya usia kehamilan akan berdampak pada peningkatan konsekuensi kerja jantung dalam rangka memenuhi kebutuhan selama proses kehamilan. Oleh karenanya pekerjaan tetap dilakukan, namun tidak terlalu berat dan melelahkan seperti pegawai kantor, administrasi perusahaan atau mengajar. Semuanya untuk kelancaran peredaran darah dalam tubuh sehingga mempunyai harapan akan terhindar dari preeklampsia (Mariyana, Jati and Purnami, 2017).

Karakteristik pasien preeklampsia berdasarkan tingkat pendidikan pada preeklampsia ringan lebih banyak pada tingkat pendidikan lanjutan yakni sarjana/diploma sebanyak 30 pasien (34,9%). Sedangkan pada preeklampsia berat sebagian besar status pendidikan pasien ialah SMA dengan jumlah 32 pasien (27,8%). Teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk meningkatkan kepribadian, sehingga proses perubahan perilaku menuju kepada kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia. Hasil penelitian didapatkan bahwa ibu yang pendidikannya tinggi maupun berpendidikan rendah memiliki kesempatan yang sama untuk terkena preeklampsia. Pendidikan secara tidak langsung berpengaruh dalam menentukan dan mengambil sebuah keputusan. Tingginya tingkat pendidikan seorang wanita diharapkan semakin meningkat juga pengetahuan dalam mengantisipasi

kesulitan kehamilan dan persalinan sehingga termotivasi untuk melakukan pengawasan kehamilan secara teratur. Namun, Pendidikan yang dimiliki oleh seseorang belum menjamin untuk menderita atau tidak menderitanya seseorang tersebut pada suatu penyakit tertentu (Hipni, 2019).

2. Perbandingan Jumlah Trombosit Total (PLT) Pada Preeklamsia ringan dan Preeklamsia berat

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan mean pada preeklamsia berat lebih besar daripada preeklamsia ringan yakni $272,3 > 271,15$. Artinya nilai PLT pada preeklamsia berat cenderung lebih besar dibandingkan nilai PLT pada preeklamsia ringan. Namun berdasarkan hasil uji t tidak berpasangan didapatkan nilai p untuk Jumlah Trombosit Total sebesar 0,913 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.05), hal ini menunjukkan secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Jumlah Trombosit Total (PLT) pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan demikian H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Doğan *et al* (2015) di Rumah Sakit Penelitian, Istanbul, Turki dengan jumlah sampel 119 terdiri dari 49 sampel preeklamsia ringan dan 70 sampel preeklamsia berat dengan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah PLT pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan nilai $p = 0,912$. Penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian oleh AlSheeha *et al* (2016) di Rumah Sakit Qassim Arab Saudi dengan jumlah preeklamsia ringan 44 sampel dan preeklamsia berat 16 sampel dengan hasil penelitian tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah PLT pada preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p = 0,3$. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bawore *et al* (2021) dengan masing-masing jumlah sampel preeklamsia ringan dan berat adalah 30 sampel, hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan jumlah PLT pada kelompok preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p = 0,019$.

3. Perbandingan Nilai Indeks Trombosit *Platelet Distribution Width* (PDW) Pada Preeklamsia ringan dan Preeklamsia berat

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan mean rank pada preeklamsia berat lebih besar daripada preeklamsia ringan yakni $107,06 > 92,9$. Artinya nilai PDW pada preeklamsia berat cenderung lebih besar dibandingkan nilai PDW pada preeklamsia ringan. Namun berdasarkan hasil uji Mann-Whitney didapatkan nilai p untuk *Platelet Distribution Width* sebesar 0,088 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.05), hal ini menunjukkan secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai indeks trombosit *platelet distribution width* (PDW) pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan demikian H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Doğan *et al* (2015) di Rumah Sakit Penelitian, Istanbul, Turki dengan jumlah sampel 119 terdiri dari 49 sampel preeklamsia ringan dan 70 sampel preeklamsia berat dengan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai PDW pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan nilai $p = 0,825$. Penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian oleh AlSheeha *et al* (2016) di Rumah Sakit Qassim Arab Saudi dengan jumlah preeklamsia ringan 44 sampel dan preeklamsia berat 16 sampel dengan hasil penelitian tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai PDW pada preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p = 0,688$. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bawore *et al* (2021) dengan masing-masing jumlah sampel preeklamsia ringan dan berat adalah 30 sampel, hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai PDW pada kelompok preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p = 0,018$.

4. Perbandingan Nilai Indeks Trombosit *Mean Platelet Volume* (MPV) Pada Preeklamsia ringan dan Preeklamsia berat

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan mean rank pada preeklamsia berat lebih besar daripada preeklamsia ringan yakni $105,75 > 94,65$. Artinya nilai MPV pada preeklamsia berat cenderung lebih besar dibandingkan nilai MPV pada preeklamsia ringan. Namun berdasarkan hasil uji Mann-Whitney didapatkan nilai p untuk *Mean Platelet Volume* sebesar 0,181 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.05), hal ini menunjukkan secara statistik tidak

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *Mean Platelet Volume* (MPV) pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan demikian H_0 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Dolan *et al* (2015) di Rumah Sakit Penelitian, Istanbul, Turki dengan jumlah sampel 119 terdiri dari 49 sampel preeklamsia ringan dan 70 sampel preeklamsia berat dengan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai MPV pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan nilai $p = 0,545$. Penelitian ini juga sejalan dengan dengan penelitian oleh AlSheeha *et al* (2016) di Rumah Sakit Qassim Arab Saudi dengan jumlah preeklamsia ringan 44 sampel dan preeklamsia berat 16 sampel dengan hasil penelitian tidak terdapat perbedaan yang signifikan nilai MPV pada preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p = 0,575$. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bawore *et al* (2021) dengan masing-masing jumlah sampel preeklamsia ringan dan berat adalah 30 sampel, hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai MPV pada kelompok preeklamsia ringan dan berat dengan nilai $p < 0.001$.

5. Perbandingan Nilai Indeks Trombosit *Platelet Large Cell Ratio* (P-ICR) Pada Preeklamsia ringan dan Preeklamsia berat

Berdasarkan hasil penelitian ini, perbandingan mean rank pada preeklamsia berat lebih besar daripada preeklamsia ringan yakni $106,77 > 93,28$. Artinya nilai P-ICR pada preeklamsia berat cenderung lebih besar dibandingkan nilai P-ICR pada preeklamsia ringan. Namun berdasarkan hasil uji Mann-Whitney didapatkan nilai p untuk nilai P-ICR sebesar 0,104 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.05), hal ini menunjukkan secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai *Platelet Large Cell Ratio* (P-ICR) pada preeklamsia ringan dan preeklamsia berat dengan demikian H_0 diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tesfay *et al* (2019) di Rumah Sakit Khusus Komprehensif Ayder dan Rumah Sakit Umum Mekelle, Ethiopia dengan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai P-ICR pada kelompok preeklamsia ringan, preeklamsia berat, dan kontrol dengan nilai $p < 0.001$.

Secara teori manifestasi preeklamsia seperti edema, proteinuria dan trombositopenia dapat diakibatkan oleh disfungsi endotel secara luas/sistemik. Disfungsi endotel ini dapat mengaktivasi trombosit (Kee-Hak Lim, 2021). Aktivasi trombosit sebagai salah satu tanda kerusakan organ (Mayama *et al.*, 2021). Setelah aktivasi trombosit, sistem koagulasi kemudian akan diaktifkan oleh kontak trombosit dengan endotel yang terluka menyebabkan peningkatan konsumsi serta produksi trombosit di sumsum tulang. Peningkatan penggunaan dan produksi trombosit inilah yang berpengaruh terhadap nilai trombosit total dan indeks trombosit. Indeks trombosit digunakan untuk mengukur fungsi trombosit (AlSheeha *et al.*, 2016).

Jumlah Trombosit Total (PLT) adalah variabel yang mengukur jumlah trombosit di dalam darah. Umumnya PLT akan berkurang ketika terjadi aktivasi trombosit sehingga trombosit yang aktif akan digunakan untuk menambal pembuluh darah yang pecah. Dengan demikian secara teori trombositopenia adalah penanda dari derajat keparahan dari preeklamsia. Namun berdasarkan penelitian Mayama *et al* (2021) trombositopenia bukan merupakan faktor risiko dari keparahan preeklamsia, termasuk hipertensi berat, kerusakan organ, dan disfungsi utero-plasenta. PDW adalah variabel yang memperlihatkan heterogenitas morfologi trombosit dan secara klinis berkaitan dengan aktivasi trombosit. Heterogenitas ini bisa disebabkan oleh produksi trombosit secara aktif di sumsum tulang disebabkan konsumsi trombosit terus menerus dalam darah perifer. Produksi trombosit akan membentuk trombosit muda yang umumnya berukuran lebih besar dibanding ukuran trombosit normal. Trombosit besar biasanya lebih reaktif dibanding trombosit kecil, hal ini menyebabkan peningkatan nilai PDW (Yang *et al.*, 2014). MPV adalah parameter yang menunjukkan volume rata-rata trombosit. Menurut Freitas *et al* (2013) wanita dengan preeklamsia berat memiliki nilai MPV yang jauh lebih tinggi, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya mekanisme pergantian trombosit yang cepat karena konsumsi trombosit secara terus menerus dalam darah kemudian diikuti dengan produksi terus menerus di sumsum tulang belakang. P-ICR adalah parameter indeks trombosit yang menunjukkan persentase jumlah trombosit yang berukuran lebih dari 12 fL dengan nilai normalnya yakni 13-43%. Apabila persentase ukuran trombosit melebihi nilai normalnya hal ini dapat menunjukkan banyaknya ukuran

trombosit yang lebih besar. Ukuran trombosit yang besar selalu dikaitkan dengan adanya trombosit muda yang beredar dalam darah akibat pemakaian trombosit secara terus menerus.

Pada penelitian ini, keempat parameter trombosit yakni PLT, PDW, MPV, dan P-ICR tidak memiliki perbedaan yang signifikan jika dibandingkan antara kelompok preeklamsia berat dan ringan. Keempat parameter trombosit tersebut mayoritas berada dalam rentang normal dan hanya sedikit yang menunjukkan perubahan ke nilai rendah ataupun nilai tinggi. Secara teori, patofisiologi yang mendasari terjadinya manifestasi preeklamsia ialah terjadinya disfungsi endotel yang berpotensi menyebabkan kerusakan organ. Kerusakan organ ini akan memicu perubahan nilai parameter trombosit akibat mekanisme pemakaian dan produksi dari trombosit. Produksi trombosit secara aktif akan membuat ukuran trombosit dalam darah cenderung lebih besar karena diisi oleh trombosit muda. Kemudian pemakaian trombosit akan membuat kadar trombosit di dalam darah berkurang (trombositopenia). Namun tidak selamanya perubahan parameter trombosit ini dapat menandakan kerusakan organ karena pada hasil penelitian lain menunjukkan bahwa parameter trombosit seperti trombositopenia tidak berhubungan dengan gambaran derajat keparahan preeklamsia dan tidak dapat dijadikan sebagai penanda kerusakan organ (Yang *et al.*, 2014) (Mayama *et al.*, 2021).

Salah satu faktor risiko dari kejadian preeklamsia yakni faktor gizi makanan, asupan gizi yang baik dapat memberikan daya tahan tubuh yang baik pula. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Misalnya dapat mengkonsumsi protein pada tingkat normal. Konsumsi protein selama sembilan belas minggu pertama kehamilan dapat mendukung pertumbuhan sel otak bayi. Namun kelebihan protein juga berdampak negatif pada kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan, meski dukungan data untuk hal ini masih terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, perspektif Islam Quran surah Al-Maidah :87-88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ٨٧ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman (Kemenag RI 2019).

Berdasarkan Tafsir Al-Misbah kata *halal* dalam penggalan kata *ahallallohu* adalah makanan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal, adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agamanya. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini.

Juga demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik (*thayyibah*). Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, seperti misalnya pemutusan hubungan. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik.

Kemudian kata (لا تَعْتَدُوا) *la ta'tadu*/jangan melampaui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf ta'/ bermakna keterpaksaan, yakni diluar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat, atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *ta'tadu*.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa keterbatasan seperti:

1. Pada penelitian ini peneliti tidak dapat menilai kerusakan organ pada pasien.
2. Menggunakan data sekunder yang bersumber dari pencatatan pada rekam medis sehingga validitas data sangat bergantung dengan validitas data yang terdapat pada rekam medis.
3. Dalam pengumpulan data diperoleh catatan medis yang tidak lengkap datanya sehingga data tersebut dianggap sebagai *missing cases* dan tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian.
4. Adanya berkas rekam medis yang tidak ditemukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Perbandingan Jumlah Trombosit Total Dan Indeks Trombosit Pada Pasien Preeklamsia Ringan Dan Preeklamsia berat Di RSUD Kabupaten Polewali Mandar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan jumlah PLT pada pasien preeklamsia ringan dan pasien preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
2. Tidak terdapat perbedaan signifikan indeks MPV pada pasien preeklamsia ringan dan pasien preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
3. Tidak terdapat perbedaan signifikan indeks PDW pada pasien preeklamsia ringan dan pasien preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.
4. Tidak terdapat perbedaan signifikan indeks P-ICR pada pasien preeklamsia ringan dan pasien preeklamsia berat di RSUD Kabupaten Polewali Mandar.

B. Saran

Saran yang diajukan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Rumah Sakit

Diharapkan pihak Rumah Sakit untuk meningkatkan sistem pencatatan dalam rekam medis pasien dengan tujuan agar memudahkan peneliti lain kedepannya dalam melakukan penelitian melalui rekam medis.

2. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat menambahkan variasi variabel lain sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan sehingga data yang diperoleh dapat dimanfaatkan menjadi referensi untuk tenaga kesehatan.

Perlu juga dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode yang berbeda misalnya dengan eksperimen langsung agar pencatatan Jumlah Trombosit Total maupun indeks trombosit diharapkan hasilnya yang didapatkan bisa lebih akurat

dan terhindar dari bias data. Selain itu dengan menambahkan sampel yang dapat mendekati jumlah populasi pasien terdiagnosis preeklamsia.

3. Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi mahasiswa atau pembaca untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk menambah referensi kepustakaan.

4. Ibu Hamil

Diharapkan ibu hamil agar dapat aktif mengikuti setiap penyuluhan yang diberikan oleh tenaga kesehatan serta aktif untuk berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan terdekat untuk melakukan konsultasi dengan para dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk meminimalisir terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklamsia.



DAFTAR PUSTAKA

- AlSheeha, M.A. *et al.* (2016) 'Platelet Count and Platelet Indices in Women With Preeclampsia', *Vascular Health and Risk Management*, 12. Available at: <https://doi.org/10.2147/VHRM.S120944>.
- Bawore, S.G. *et al.* (2021) 'A pattern of platelet indices as a potential marker for prediction of pre-eclampsia among pregnant women attending a Tertiary Hospital, Ethiopia: A case-control study', *PLoS ONE*, 16(11 November), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259543>.
- Budak, Y.U., Polat, M. and Huysal, K. (2016) 'The use of platelet indices, plateletcrit, mean platelet volume and platelet distribution width in emergency non-traumatic abdominal surgery: A systematic review', *Biochemia Medica*. Available at: <https://doi.org/10.11613/BM.2016.020>.
- Delmis, J. and Ivanisevoc, M. (2019) 'Preeclampsia', *Gynaecologia et Perinatologia*, 28(1–2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.18597/rcog.2868>.
- Denantika, O., Serudji, J. and Revilla, G. (2015) 'Hubungan Status Gravida dan Usia Ibu terhadap Kejadian Preeklampsia di RSUP Dr. M. Djamil Padang Tahun 2012-2013', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(1), pp. 212–217. Available at: <https://doi.org/10.25077/jka.v4i1.224>.
- Departemen Agama RI (2010) 'Al Qur'an dan Tafsirnya', in *book*.
- Djuang, M.H. (2017) 'Indeks-Indeks Trombosit Sebagai Penilaian Derajat Keparahan Sepsis Bakterial'.
- Dołan, K. *et al.* (2015) 'Can Platelet Count and Platelet Indices Predict The Risk and The Prognosis of Preeclampsia?', *Hypertension in Pregnancy*, 34(4). Available at: <https://doi.org/10.3109/10641955.2015.1060244>.
- Downing, S.R. and Klement, G.L. (2012) 'Isolation and proteomic analysis of platelets by SELDI-TOF MS', *Methods in Molecular Biology*, 818. Available at: https://doi.org/10.1007/978-1-61779-418-6_12.

- Eroschenko, V.P. (2012) *Atlas of Histology with functional correlations*, Lippincott Williams & Wilkins.
- Freitas, L.G. *et al.* (2013) 'Preeclampsia: Are platelet count and indices useful for its prognostic?', *Hematology*, 18(6), pp. 360–364. Available at: <https://doi.org/10.1179/1607845413Y.0000000098>.
- Garrido-Gomez, T. *et al.* (2017) 'Defective decidualization during and after severe preeclampsia reveals a possible maternal contribution to the etiology', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 114(40). Available at: <https://doi.org/10.1073/pnas.1706546114>.
- Gartner, L.P. and Hiatt, J.L. (2012) *Color atlas and text of histology*. Lippincott Williams & Wilkins.
- 'Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222' (2020) *Obstetrics and gynecology*, 135(6). Available at: <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003891>.
- Hipni, R. (2019) 'Hubungan Paritas Dan Pendidikan Ibu Terhadap Kejadian Preeklampsia Di Rsud Idaman Banjarbaru', *Embrio*, 11(1), pp. 23–29. Available at: <https://doi.org/10.36456/embrio.vol11.no1.a1846>.
- Hubert, R.M.E. *et al.* (2015) 'Association of the immature platelet fraction with sepsis diagnosis and severity', *Scientific Reports*, 5. Available at: <https://doi.org/10.1038/srep08019>.
- Karrar, S. and Hong, P.L. (2021) *Preeclampsia*, *StatPearls- NCBI Bookshelf*. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK570611/> (Accessed: 20 March 2022).
- Kee-Hak Lim, P.A.S.A.K. (2021) *Preeclampsia: Pathogenesis - UpToDate*. Available at: https://www.uptodate.com/contents/preeclampsia-pathogenesis?search=preeklamsia&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4 (Accessed: 10 March 2022).

- Kementrian Agama Republik Indonesia (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Lorenza, A., Arkhaesi, N. and Hardian, H. (2018) 'Perbandingan platelet large cell ratio (P-Lcr) pada anak dengan demam dengue dan demam berdarah dengue', *DIPONEGORO MEDICAL JOURNAL (JURNAL KEDOKTERAN DIPONEGORO)*, 7(2), pp. 826–839.
- Mariyana, K., Jati, S.P. and Purnami, C.T. (2017) 'Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Ibu Hamil Preeklamsia Dalam Pemanfaatan Layanan Anc', *Unnes Journal of Public Health*, 6(4), pp. 237–244. Available at: <https://doi.org/10.15294/ujph.v6i4.17736>.
- Mayama, M. *et al.* (2021) 'Mild thrombocytopenia indicating maternal organ damage in pre-eclampsia: a cross-sectional study', *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(1), pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1186/s12884-021-03564-4>.
- Muhammad, R.H. (2021) *Hubungan Skrining Mean Arterial Pressure (MAP) dengan Kejadian Preeklamsia di RSIA Permata Bunda Solok Tahun 2019-2020*. Universitas Andalas.
- Nasaruddin, M.W. (2018) *Gangguan Kecemasan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Pendekatan Psikologi)*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Nurhayati, E. (2021) 'Psikologi Kehamilan Dalam Perspektif Al-qur'an', *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 20(1). Available at: <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i1.20642>.
- POGI (2016) 'PNPK Diagnosis dan Tatalaksana Preeklamsia', pp. 1–48.
- Prabhakara, G. (2010) *Health Statistics (Health Information System), Short Textbook of Preventive and Social Medicine*. Available at: https://doi.org/10.5005/jp/books/11257_5.
- Preeclampsia Foundation (2021) *Cause Of Preeclampsia, The Preeclampsia Foundation*. Available at: <https://www.preeclampsia.org/cause-of-preeclampsia>

(Accessed: 29 March 2022).

- Rana, S. *et al.* (2019) 'Preeclampsia: Pathophysiology, Challenges, and Perspectives', *Circulation Research*, 124(7). Available at: <https://doi.org/10.1161/CIRCRESAHA.118.313276>.
- Safitri, A.N.K. (2022) *ANALISIS FAKTOR RISIKO KECEMASAN IBU HAMIL TRIMESTER III DI RSIA ANANDA MAKASSAR TAHUN 2021*.
- Sahu, M.B. *et al.* (2019) 'Decidual cells from women with preeclampsia exhibit inadequate decidualization and reduced sFlt1 suppression', *Pregnancy Hypertension*, 15. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.preghy.2018.11.003>.
- Sherwood, L. (2014) *Human Physiology: From Cells To Systems*. Cengage learning.
- Sumampouw, C.M., Tendean, H.M.M. and Wagey, F.W. (2019) 'Gambaran Preeklampsia Berat Dan Eklampsia Ditinjau Dari Faktor Risiko di RSUP Prof. DR. R. D. Kandou Manado', *Jurnal Medik dan Rehabilitasi (JMR)*, 1(3).
- Syahdrajat, D.T. (2015) *Panduan Menulis Tugas Akhir Kedokteran & Kesehatan, Prenamedia Group*.
- Tesfay, F. *et al.* (2019) 'Role of platelet parameters in early detection and prediction of severity of preeclampsia: A comparative cross-sectional study at Ayder comprehensive specialized and Mekelle general hospitals, Mekelle, Tigray, Ethiopia', *PLoS ONE*, 14(11), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0225536>.
- Thalor, N. *et al.* (2019) 'A correlation between platelet indices and preeclampsia', *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, 41(2), pp. 129–133. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.htct.2018.08.008>.
- Vagdatli, E. *et al.* (2010) 'Platelet distribution width: A simple, practical and specific marker of activation of coagulation', *Hippokratia*, 14(1).
- Yang, S.W. *et al.* (2014) 'Significance of the platelet distribution width as a severity

marker for the development of preeclampsia', *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*, 175(1), pp. 107–111. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.12.036>.



Lampiran 1 Hasil Analisis SPSS

Statistics

DerajatPreeklamsia		
N	Valid	201
	Missing	0

DerajatPreeklamsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	PE	86	42.8	42.8	42.8
	PEB	115	57.2	57.2	100.0
	Total	201	100.0	100.0	

usiakategorik * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
usiakategorik	< 20	Count	5	4	9
		% within DerajatPreeklamsia	5.8%	3.5%	4.5%
	20-35	Count	53	72	125
		% within DerajatPreeklamsia	61.6%	62.6%	62.2%
	>35	Count	28	39	67
		% within DerajatPreeklamsia	32.6%	33.9%	33.3%
Total		Count	86	115	201
		% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%

usiaPE

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15	1	1.2	1.2	1.2
	17	2	2.3	2.3	3.5
	18	1	1.2	1.2	4.7
	19	1	1.2	1.2	5.8
	20	2	2.3	2.3	8.1
	21	2	2.3	2.3	10.5

22	2	2.3	2.3	12.8
23	3	3.5	3.5	16.3
24	5	5.8	5.8	22.1
25	5	5.8	5.8	27.9
26	1	1.2	1.2	29.1
27	5	5.8	5.8	34.9
28	6	7.0	7.0	41.9
29	5	5.8	5.8	47.7
30	5	5.8	5.8	53.5
31	2	2.3	2.3	55.8
32	2	2.3	2.3	58.1
33	3	3.5	3.5	61.6
34	3	3.5	3.5	65.1
35	2	2.3	2.3	67.4
36	7	8.1	8.1	75.6
37	5	5.8	5.8	81.4
38	3	3.5	3.5	84.9
39	5	5.8	5.8	90.7
40	1	1.2	1.2	91.9
41	3	3.5	3.5	95.3
42	1	1.2	1.2	96.5
46	3	3.5	3.5	100.0
Total	86	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
usiaPE	86	15	46	30.65	7.217
Valid N (listwise)	86				

		usiaPEB			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16	1	.9	.9	.9
	18	3	2.6	2.6	3.5
	20	2	1.7	1.7	5.2

21	4	3.5	3.5	8.7
22	2	1.7	1.7	10.4
23	2	1.7	1.7	12.2
24	2	1.7	1.7	13.9
25	5	4.3	4.3	18.3
26	5	4.3	4.3	22.6
27	6	5.2	5.2	27.8
28	5	4.3	4.3	32.2
29	5	4.3	4.3	36.5
30	3	2.6	2.6	39.1
31	4	3.5	3.5	42.6
32	5	4.3	4.3	47.0
33	9	7.8	7.8	54.8
34	9	7.8	7.8	62.6
35	4	3.5	3.5	66.1
36	9	7.8	7.8	73.9
37	8	7.0	7.0	80.9
38	9	7.8	7.8	88.7
39	1	.9	.9	89.6
40	4	3.5	3.5	93.0
41	1	.9	.9	93.9
42	2	1.7	1.7	95.7
43	1	.9	.9	96.5
45	1	.9	.9	97.4
46	1	.9	.9	98.3
50	2	1.7	1.7	100.0
Total	115	100.0	100.0	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
usiaPEB	115	16	50	31.92	6.812
Valid N (listwise)	115				

Pendidikan * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
Pendidikan	tidak sekolah	Count	0	4	4
		% within DerajatPreeklamsia	0.0%	3.5%	2.0%
	SD	Count	18	29	47
		% within DerajatPreeklamsia	20.9%	25.2%	23.4%
	SMP	Count	16	19	35
		% within DerajatPreeklamsia	18.6%	16.5%	17.4%
	SMA	Count	22	32	54
		% within DerajatPreeklamsia	25.6%	27.8%	26.9%
	Diploma/Sarjana	Count	30	31	61
		% within DerajatPreeklamsia	34.9%	27.0%	30.3%
Total		Count	86	115	201
		% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%

Pekerjaan * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
Pekerjaan	Tidak Bekerja	Count	67	92	159
		% within DerajatPreeklamsia	77.9%	80.0%	79.1%
	Bekerja	Count	19	23	42
		% within DerajatPreeklamsia	22.1%	20.0%	20.9%
Total		Count	86	115	201
		% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pltkategorik * DerajatPreeklamsia	201	100.0%	0	0.0%	201	100.0%
pdwkategorik * DerajatPreeklamsia	201	100.0%	0	0.0%	201	100.0%
mpvkategorik * DerajatPreeklamsia	201	100.0%	0	0.0%	201	100.0%
plcrkategorik * DerajatPreeklamsia	201	100.0%	0	0.0%	201	100.0%

pltkategorik * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
pltkategorik	Rendah	Count	0	5	5
		% within DerajatPreeklamsia	0.0%	4.3%	2.5%
	Normal	Count	83	102	185
		% within DerajatPreeklamsia	96.5%	88.7%	92.0%
	Tinggi	Count	3	8	11
		% within DerajatPreeklamsia	3.5%	7.0%	5.5%
Total	Count	86	115	201	
	% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	

pdwkategorik * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
pdwkategorik	Rendah	Count	32	27	59
		% within DerajatPreeklamsia	37.2%	23.5%	29.4%
	Normal	Count	54	87	141
		% within DerajatPreeklamsia	62.8%	75.7%	70.1%
	Tinggi	Count	0	1	1
		% within DerajatPreeklamsia	0.0%	0.9%	0.5%
Total	Count	86	115	201	
	% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	

mpvkategorik * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
mpvkategorik	Rendah	Count	19	22	41
		% within DerajatPreeklamsia	22.1%	19.1%	20.4%
	Normal	Count	67	90	157
		% within DerajatPreeklamsia	77.9%	78.3%	78.1%
	Tinggi	Count	0	3	3
		% within DerajatPreeklamsia	0.0%	2.6%	1.5%

Total	Count	86	115	201
	% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%

plerkategori * DerajatPreeklamsia Crosstabulation

		DerajatPreeklamsia		Total	
		PE	PEB		
plerkategori	Rendah	Count	6	3	9
		% within DerajatPreeklamsia	7.0%	2.6%	4.5%
	Normal	Count	80	110	190
		% within DerajatPreeklamsia	93.0%	95.7%	94.5%
	Tinggi	Count	0	2	2
		% within DerajatPreeklamsia	0.0%	1.7%	1.0%
Total	Count	86	115	201	
	% within DerajatPreeklamsia	100.0%	100.0%	100.0%	

Tests of Normality

	DerajatPreeklamsia	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PLT	PE	.078	86	.200*	.963	86	.015
	PEB	.055	115	.200*	.985	115	.217
PDW	PE	.117	86	.005	.949	86	.002
	PEB	.131	115	.000	.949	115	.000
MPV	PE	.092	86	.069	.983	86	.304
	PEB	.400	115	.000	.193	115	.000
PLCR	PE	.073	86	.200*	.983	86	.308
	PEB	.109	115	.002	.829	115	.000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Descriptives

		DerajatPreeklamsia	Statistic	Std. Error	
PLT	PE	Mean	271.15	7.114	
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	257.01	
			Upper Bound	285.30	
		5% Trimmed Mean	268.73		
		Median	265.00		
		Variance	4352.906		
		Std. Deviation	65.977		
		Minimum	167		
		Maximum	447		
		Range	280		
		Interquartile Range	86		
		Skewness	.541	.260	
		Kurtosis	-.274	.514	
		PEB	PEB	Mean	272.30
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound			257.72	
	Upper Bound			286.89	
5% Trimmed Mean	270.17				
Median	271.00				
Variance	6233.863				
Std. Deviation	78.955				
Minimum	102				
Maximum	495				
Range	393				
Interquartile Range	102				
Skewness	.403			.226	
Kurtosis	.272			.447	
PDW	PE			Mean	10.760
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	10.358	
			Upper Bound	11.163	
		5% Trimmed Mean	10.662		
		Median	10.400		
		Variance	3.530		
		Std. Deviation	1.8789		
		Minimum	7.3		
		Maximum	16.5		

		Range		9.2	
		Interquartile Range		2.6	
		Skewness		.860	.260
		Kurtosis		.943	.514
	PEB	Mean		11.237	.1959
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	10.849	
		Mean	Upper Bound	11.625	
		5% Trimmed Mean		11.143	
		Median		10.600	
		Variance		4.411	
		Std. Deviation		2.1004	
		Minimum		5.6	
		Maximum		18.2	
		Range		12.6	
		Interquartile Range		2.2	
		Skewness		.804	.226
		Kurtosis		1.131	.447
MPV	PE	Mean		9.601	.0955
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	9.411	
		Mean	Upper Bound	9.791	
		5% Trimmed Mean		9.583	
		Median		9.500	
		Variance		.784	
		Std. Deviation		.8852	
		Minimum		7.8	
		Maximum		11.9	
		Range		4.1	
		Interquartile Range		1.2	
		Skewness		.351	.260
		Kurtosis		-.244	.514
	PEB	Mean		10.496	.5952
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	9.317	
		Mean	Upper Bound	11.675	
		5% Trimmed Mean		9.750	
		Median		9.700	
		Variance		40.737	
		Std. Deviation		6.3825	

		Minimum	8.1	
		Maximum	75.9	
		Range	67.8	
		Interquartile Range	1.1	
		Skewness	9.676	.226
		Kurtosis	99.012	.447
PLCR	PE	Mean	22.285	.6986
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	20.896
		Mean	Upper Bound	23.674
		5% Trimmed Mean	22.162	
		Median	21.500	
		Variance	41.974	
		Std. Deviation	6.4788	
		Minimum	9.3	
		Maximum	39.1	
		Range	29.8	
		Interquartile Range	9.4	
		Skewness	.369	.260
		Kurtosis	-.230	.514
	PEB	Mean	24.118	.7497
		95% Confidence Interval for	Lower Bound	22.633
		Mean	Upper Bound	25.603
		5% Trimmed Mean	23.593	
		Median	23.400	
		Variance	64.629	
		Std. Deviation	8.0392	
		Minimum	11.2	
		Maximum	76.6	
		Range	65.4	
		Interquartile Range	9.0	
		Skewness	2.608	.226
		Kurtosis	14.914	.447

T-Test

Group Statistics

	DerajatPreeklamsia	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
PLT	PE	86	271.15	65.977	7.114
	PEB	115	272.30	78.955	7.363
PDW	PE	86	10.760	1.8789	.2026
	PEB	115	11.237	2.1004	.1959
MPV	PE	86	9.601	.8852	.0955
	PEB	115	10.496	6.3825	.5952
PLCR	PE	86	22.285	6.4788	.6986
	PEB	115	24.118	8.0392	.7497

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper
PLT	Equal variances assumed	1.790	.182	-.110	199	.913	-1.153	10.506	-21.870	19.563
	Equal variances not assumed			-.113	196.506	.910	-1.153	10.238	-21.344	19.038
PDW	Equal variances assumed	.525	.469	-1.665	199	.097	-.4769	.2864	-1.0416	.0878
	Equal variances not assumed			-1.692	192.650	.092	-.4769	.2818	-1.0327	.0789
MPV	Equal variances assumed	2.243	.136	-1.290	199	.199	-.8945	.6936	-2.2622	.4733

Equal variances not assumed			- 1.484	119.834	.140	-.8945	.6028	-2.0880	.2990
PLCR Equal variances assumed	.142	.707	- 1.735	199	.084	-1.8334	1.0568	-3.9173	.2506
Equal variances not assumed			- 1.789	197.853	.075	-1.8334	1.0247	-3.8542	.1874



Mann-Whitney Test

		Ranks		
	DerajatPreeklamsia	N	Mean Rank	Sum of Ranks
PLT	PE	86	99.85	8587.50
	PEB	115	101.86	11713.50
	Total	201		
PDW	PE	86	92.90	7989.50
	PEB	115	107.06	12311.50
	Total	201		
MPV	PE	86	94.65	8140.00
	PEB	115	105.75	12161.00
	Total	201		
PLCR	PE	86	93.28	8022.00
	PEB	115	106.77	12279.00
	Total	201		

Test Statistics ^a				
	PLT	PDW	MPV	PLCR
Mann-Whitney U	4846.500	4248.500	4399.000	4281.000
Wilcoxon W	8587.500	7989.500	8140.000	8022.000
Z	-.241	-1.708	-1.339	-1.627
Asymp. Sig. (2-tailed)	.809	.088	.181	.104

a. Grouping Variabel: DerajatPreeklamsia

Lampiran 2 Berkas Administrasi dan Dokumentasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Tempat: J. J. Sultan Hassanudin No. 51 Makassar
Rencana P. & A.M. Tahun Anggaran: 2019/2020 (Rencana) Penerimaan: 2019/2020 (Penerimaan)

Nomor : B-2022/FAK.DK.LITER/PP/05/03/2022
Lampiran : 1
Hal : 1
Tanggal : 18 Agustus 2022


Revisi
Kepala Dinas Kesehatan Praktek Subespek Saraf
di :
Tempat :
Asisten Akademik W1, W2

Sehubungan dengan permohonan untuk melanjutkan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang terdapat di bawah ini :

Nama	: Nur Syafiq Ramadhani M
NIM	: 20002130124
Jenjang	: Pendidikan Dokter
Judul	: Analisis Model Transmisi Pada Pasien Pre-Infeksi dan Estimasi
Data	: Kesehatan Iku dan Anam

Maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat dibantu untuk pengembalian data.
Demikian, dan bantuan dan kerjasamanya diharapkan terima kasih.


Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Dekan Bidang Akademik
Dung Wastika Wandayana



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Formulir No. 2.6
KEMENTERIAN KESEHATAN

No. SP: _____
Nama SP: _____
Tahun: _____

No	Kategori	KELOMPOK										NON KELOMPOK			TOTAL
		KELOMPOK A					KELOMPOK B					Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah Total	
		Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah MHS				
1	Keperawatan Medikal	11	2	381	13	213	0	220	0	0	3	328	1	329	0
2	Keperawatan	45	13	1352	272	1528	0	1777	0	0	5	264	1	265	0
3	Keperawatan Keperawatan	45	13	1352	272	1528	0	1777	0	0	5	264	1	265	0
4	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	1	10	0	10	0	0	0	1	0	1	0
6	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	25	205	7	236	0	0	0	27	0	27	0
7	Keperawatan	2	0	27	0	27	1	34	0	0	0	2	1	3	0
8	Keperawatan	0	0	18	0	18	2	20	0	0	0	0	0	4	0
9	Keperawatan	37	0	381	214	1328	0	1325	0	0	0	53	0	53	0
10	Keperawatan	4	0	228	80	307	0	307	0	0	0	30	0	30	0
11	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Formulir No. 2.6
KEMENTERIAN KESEHATAN

No. SP: _____
Nama SP: _____
Tahun: _____

No	Kategori	KELOMPOK							NON KELOMPOK			TOTAL			
		KELOMPOK A				KELOMPOK B			Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah Total				
		Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah MHS	Jumlah Kelas	Jumlah MHS	Jumlah MHS							
1	Keperawatan Medikal	11	2	381	13	213	0	220	0	0	3	328	1	329	0
2	Keperawatan	45	13	1352	272	1528	0	1777	0	0	5	264	1	265	0
3	Keperawatan Keperawatan	45	13	1352	272	1528	0	1777	0	0	5	264	1	265	0
4	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	1	10	0	10	0	0	0	1	0	1	0
6	Keperawatan Keperawatan	0	0	0	25	205	7	236	0	0	0	27	0	27	0
7	Keperawatan	2	0	27	0	27	1	34	0	0	0	2	1	3	0
8	Keperawatan	0	0	18	0	18	2	20	0	0	0	0	0	4	0
9	Keperawatan	37	0	381	214	1328	0	1325	0	0	0	53	0	53	0
10	Keperawatan	4	0	228	80	307	0	307	0	0	0	30	0	30	0
11	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Keperawatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lampiran 3 Dokumentasi

HEMATOLOGI			
Hematologi Lengkap			
Barah Retic	H 14.1		$10^{-3}/ul$ 4.0 - 10.0
WBC	L 2.97		$10^6/dl$ 4.20 - 5.40
RBC	L 11.0		g/dl 12.0 - 14.0
Hb	L 31.2		% 34.0 - 45.0
Hct	L 79.6		fl 80.0 - 95.0
MCV	27.7		pg 20.4 - 22.2
MCH	35.3		g/L 32.2 - 35.5
MCHC	256		$10^3/ul$ 150 - 400
PLT	41.8		fl 27 - 54
MPV-PI	14.8		% 10.0 - 15.0
MPV-TV	10.9		fl 10.0 - 14.0
PDW	10.2		fl 8.0 - 13.0
MPV	26.4		% 13.0 - 42.0
P-LCS			
Hitung Janis			
Neutrofil	H 80.3		% 50 - 70
Limfosit	L 10.6		% 20 - 40
Monosit	H 8.7		% 2 - 8
Eosinofil	0.2		% 0 - 4
Basofil	0.2		% 0 - 1
WDRs	12.8		$10^3/ul$
SDR4	1.7		$10^3/ul$

Formulir No. 01
Jurnal Rontgen

No	Anamnesis	RIGEN								KEMERASAN				REMARK	
		Anteroposterior	Lateral	Oblique	AP	PA	Lat	Obliq	Anteroposterior	Lateral	Oblique	Anteroposterior			
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR