

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN RELAKSASI BENSON DI RSUP DR
WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Oleh :

NURHIKMAH

NIM: 70900121008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

**ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA LANSIA YANG
MENGALAMI *IMMOBILITY* DENGAN MASALAH NYERI
MENGUNAKAN RELAKSASI BENSON DI RSUP DR
WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURHIKMAH
NIM: 70900121008

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhikmah
NIM : 70900121008
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 04 Februari 1999
Jurusan/Prodi/Konsentrasi: Keperawatan/Ners/Keperawatan Gerontik
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Bonto-bila 1 No 10 B
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Immobility* Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Relaksasi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI GOWA, 30 Juni 2022

Penyusun,

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Nurhikmah

NIM: 70900121008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara (i) Nurhikmah, S.Kep NIM: 70900121008, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami Immobility Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Terapi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar*”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 27 Juni 2022



Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes
Pembimbing I



Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep
Pembimbing II







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul, “*Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami Immobility Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Relaksasi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar*”, yang disusun oleh Nurhikmah, S.Kep, NIM: 70900121008, mahasiswa program studi profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 M, bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 30 Juni 2022 M.
1 Zulhijjah 1443 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes	()
Sekretaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	()
Munaqisy I	: Rasdianah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom	()
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag	()
Pembimbing I	: Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes	()
Pembimbing II	: Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, Maha Suci Allah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dalam judul penelitian: “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami Immobility Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Terapi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar” sebagai syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ners dari program studi Profesi Ners Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan Salawat kepada nabiullah Muhammad SAW sebagai rahamatanlil’alamin dan uswatun hasanah.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah penulis mengalami banyak kendala dan tantangan, tetapi syukur alhamdulillah semuanya dapat dilalui atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusunan karya tulis ilmiah telah banyak mendapatkan bantuan baik secara moral dan materil, dan dorongan motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak yang terlibat terkhusus kedua orang tua penulis yakni ibunda Sukanriana dan ayahanda Hasanuddin yang tercinta atas doa dan kasih sayangnya. Pada kesempatan ini, izinkan penulis memberikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan beserta jajarannya para wakil rektor lainnya yang sudah memberikan kepada penulis kesempatan ikampus ini untuk menimba ilmu.
2. Dr. dr. Syatira Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku dekan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan beserta wakil dekan lainnya yang telah memberikan sumbangsih dan fasilitas di fakultas.
3. Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kes selaku ketua program studi profesi ners dan Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J selaku sekretaris program studi profesi ners yang telah menerima penulis menjadi bagian dari program studi profesi ners.

4. Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Pembimbing I dan Aidah Fitriani, S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Rasdianah, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Kom selaku Penguji I dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku Penguji II yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan tanggapan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Para dosen dan seluruh staf program studi profesi ners yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam pendidikan.
7. Kepada keluarga besar dan teman-teman seangkatan program profesi ners angkatan XIX yang telah memberikan support, bantuan dan kebersamaan dalam menimba pendidikan.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini yang tak terhingga untuk disebut satu persatu.

Penulis sadar bahwa karya tulis ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. karena itu, penulis berharap kepada pembaca agar diberikan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan karya tulis ilmiah ini agar terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Gowa, 30 Juni 2022

Nurhikmah
70900121008

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL	
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
HALAMAN ABSTRAK (Indonesia)	xiv
HALAMAN ABSTRACT (Inggris)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Teori Sindrom Geriatri.....	5
2.2 Konsep Keperawatan	9
2.3 Pendekatan Teori yang Digunakan	27
2.4 Evidence Based Practice In Nursing	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Studi Kasus.....	33
3.2 Subyek Studi Kasus	33
3.3 Fokus Studi Kasus.....	33
3.4 Instrumen Studi Kasus	33
3.5 Prosedur Pengambilan Data	35
3.6 Tempat/Waktu Pengambilan Data	36
3.7 Analisis Data dan Penyajian Data	36
3.8 Etika Studi Kasus	36
BAB IV LAPORAN KASUS	38
4.1 Pengkajian	38
4.2 Diagnosis.....	63
4.3 Intervensi	65
4.4 Implementasi	70
4.5 Evaluasi.....	70
BAB V PEMBAHASAN	79
5.1 Analisis Asuhan Keperawatan	79

5.2 Analisis Intervensi EBPB	86
5.3 Keterbatasan	90
BAB VI PENUTUP	91
6.1 Kesimpulan	91
6.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN	98




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 5.1 Perubahan skala nyeri	87
---	----



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zš	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
َ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
َـو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
َ... / ِ... / ُ...	<i>fathah dan alif' atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
َـي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
َـو	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). kalau pada kata yang berakhir *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf

konsonan ganda yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf *ي* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

6. kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (هلا)

Kata "Allah" yang didahului partikel hruuf seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

B. Daftar Singkatan

swt.	= <i>subhānahū wa ta 'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhū 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= 'alaihi al-salām
SM	= sebelum masehi
QS.../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Nurhikmah
NIM : 70900121008
Judul : Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Immobility* Dengan Masalah Nyeri Menggunakan Terapi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar

Latar Belakang: sindrom *immobility* pada lansia dengan masalah nyeri dapat membuat pasien menjadi sulit untuk bergerak dan melakukan aktivitas sehari-harinya. Salah satu jenis terapi yang dapat menurunkan nyeri adalah relaksasi benson.

Tujuan untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility* menggunakan terapi benson di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo pada tahun 2022.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan metode studi kasus. Subyek yang digunakan adalah individu/pasien yang sudah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format proses asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan terapi benson, pengakajian pengukuran skala nyeri. Analisis data disajikan secara tekstual dengan fakta-fakta dijadikan dalam bentuk teks dan dijelaskan secara naratif.

Hasil pemberian *relaksasi benson* dilakukan selama 3 hari pada tanggal 28-30 Maret 2022 di Kamar 4 Lantai 2 Lontara 1 Atas Depan RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar dan didapatkan hasil skala nyeri pasien menurun dari 53 menjadi 21.

Kesimpulan berdasarkan hasil evaluasi kasus dinyatakan bahwa relaksasi *benson* efektif menurunkan skala nyeri.

Kata Kunci : *Immobility*, Nyeri, Relaksasi Benson.

UNIVERSITAS NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Name : Nurhikmah
NIM : 70900121008
Title : *Analysis of Nursing Care for the Elderly Who Experienced Immobility With Pain Problems Using Benson Therapy at DR Wahidin Sudirohusodo Hospital Makassar*

Background: *Immobility syndrome in the elderly with pain problems can make it difficult for patients to move and perform daily activities. One type of therapy that can reduce pain is Benson relaxation.*

The purpose: *This study aims to analyze nursing care for the elderly with geriatric immobility syndrome using Benson therapy at Dr. Wahidin Sudirohusodo Hospital in 2022. The research method used is a descriptive approach with a case study method. The subjects used are individuals/clients who have met the inclusion and exclusion criteria. The instruments used in this case study are the format of the nursing care process and Standard Operating Procedures (SOP) in performing Benson therapy, the assessment of pain scale measurements using a Likert scale. Data analysis is presented textually with facts made into text and explained in a narrative manner*

The results *Benson relaxation was given for 3 days on 28-30 March 2022 in Room 4, Floor 2 Lontara 1 Upper Front, RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar and the results showed that the patient's pain scale decreased from 53 to 21.*

The conclusion *based on the results of the case evaluation, it was stated that Benson's relaxation was effective in reducing the pain scale.*

Keywords : *Immobility, Pain, Relaxation Benson.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia akan mengalami keadaan lanjut usia atau biasa dikatakan dengan proses menua (*aging process*) (Miller, 2018). Lanjut usia adalah proses perjalanan hidup paling akhir manusia. Proses ini terjadi secara alamiah dan tidak dapat dihindari maka ini merupakan hal yang patut untuk kita syukuri. Adapula tanda-tanda masa lansia seperti kulit nampak berubah menjadi keriput, fungsi telinga dan mata mulai berkurang, aktivitas sehari-hari mulai menurun, perubahan warna rambut mulai berubah dan sistem pertahanan tubuh mulai menurun (Akbar, 2019).

World Health Organization (WHO), di kawasan Asia Tenggara populasi Lansia sebesar 8% atau sekitar 142 juta jiwa. Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah Lansia mencapai 28,800,000 (11,34%) dari total populasi. Jumlah lansia di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 adalah sebesar 9,92% atau 26,82 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, diperkirakan pada tahun 2050 populasi lansia meningkat 3 kali lipat dari tahun ini. Jumlah lansia di provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 849.960 jiwa (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020). Kota Makassar memiliki jumlah lanjut usia terbanyak kedua di Sulawesi Selatan yaitu sebanyak 79.581 jiwa (Puspitha dkk., 2019).

Penuaan menyebabkan penurunan fungsional organ dan sistem tubuh, salah satunya sistem musculoskeletal seperti penurunan fleksibilitas otot, penurunan kekuatan otot, stabilitas postural yang buruk, perubahan pola jalan, dan adanya nyeri musculoskeletal. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) tahun 2020 ada sekitar 1,71 miliar di orang dunia memiliki masalah pada system musculoskeletal di seluruh dunia. Dengan prevelensi tertinggi yaitu sakit punggung sebanyak 568 juta jiwa, patah tulang sebanyak 436 juta, osteoarthritis sebanyak 343 juta jiwa, nyeri leher sebanyak 222 juta jiwa, amputasi sebanyak 175 juta dan rheumatoid arthritis sebanyak 14 juta orang di seluruh dunia. Berdasarkan data Riskesdes pada tahun 2018 di Indonesia nyeri sendi banyak

terjadi pada usia 55-64 tahun sebesar 15,55%, usia 65-74 tahun sebesar 18,63% dan pada usia <75 sebesar 18,95%. Sedangkan, prevalensi penyakit sendi di Sulawesi selatan sebesar 6,85%, dan menempati urutan ke-27.

Penurunan sistem muskuloskeletal ini dapat dirasakan pada gangguan persendian, terkadang memicu adanya nyeri sehingga penderita sulit untuk melakukan aktivitas dan bergerak dengan nyaman (Malo dkk., 2019). Nyeri adalah rasa ketidaknyamanan yang disebabkan oleh efek dari berbagai penyakit tertentu atau akibat cedera (Andarmoyo, 2013). Penelitian Aisyah (2017) menjabarkan bahwa dampak yang ditimbulkan nyeri pada lansia antara lain : dapat meningkatkan *respirasi rate*, vasokonstriksi perifer, peningkatan gula darah, peningkatan kekuatan otot, menurunnya motilitas, dilatasi pupil, wajah pucat, nafas menjadi cepat, pernyataan verbal seperti menangis, mendengkur, meringis, menggigit bibir, gelisah, imobilisasi, ketegangan otot peningkatan gerakan tangan, menurunnya kontak/interaksi sosial. Disamping itu, lansia akan lebih cenderung memendam rasa nyerinya serta mereka takut jika mengalami penyakit berat ataupun meninggal apabila nyeri diperiksa.

Nyeri yang dirasakan oleh pasien dapat dikurangi dengan dua cara yaitu secara farmakologi dan non farmakologi. Secara farmakologi adalah dengan obat-obatan medis namun terdapat efek samping yang bisa terjadi karena mengkonsumsi obat seperti iritasi pada abdomen, masalah pada jantung, serta kerusakan hati dan ginjal (Singh dkk., 2012). Efek samping obat ini akan memperparah kondisi kesehatan lansia. Oleh karena itu cara nonfarmakologi lebih disarankan karena tidak memiliki efek samping dan lebih aman untuk digunakan. Salah satu cara nonfarmakologi yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri adalah dengan melakukan relaksasi benson.

Relaksasi benson merupakan gabungan antara teknik relaksasi dengan sistem keyakinan individu yang difokuskan pada ungkapan tertentu seperti nama-nama Tuhan atau kata-kata yang memiliki makna menenangkan bagi pasien, teknik ini diucapkan secara berulang-ulang dengan ritme yang teratur dan terbatas pada skala nyeri 4-10 (Benson & Proctor, 2017). Dalam penelitian Arifianto dkk (2019) diungkapkan bahwa penatalaksanaan nyeri non farmakologi

merupakan terapi pelengkap untuk mengurangi nyeri dan bukan sebagai pengganti utama terapi analgetik yang telah diberikan. Diperkuat oleh penelitian (Andari & Santri, 2021) yang menunjukkan bahwa sebelum pemberian intervensi relaksasi benson terdapat 1 responden yang mengalami nyeri berat, 5 responden yang mengalami nyeri sedang dan 1 responden yang mengalami nyeri ringan. Saat setelah pemberian intervensi relaksasi benson 0 responden yang mengalami nyeri berat, 1 responden nyeri sedang dan 6 responden nyeri ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian intervensi relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Sejalan dengan penelitian (Singh dkk., 2012) yang menunjukan bahwa relaksasi benson ini dapat menurunkan skala nyeri berat dan sedang menjadi skala nyeri ringan.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh peneliti di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 28 Maret 2022 di dapatkan data lansia mengeluh nyeri sendi yang mengakibatkan lansia tidak dapat melakukan aktivitas sehari-harinya, *bed rest* serta Nampak meringis dan gelisah. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan relaksasi benson di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Immobility* dengan Masalah Nyeri Menggunakan Relaksasi Benson”?

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan relaksasi benson di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis hasil pengkajian pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*

2. Untuk menganalisis diagnosis keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
3. Untuk menganalisis intervensi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
4. Untuk menganalisis implementasi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
5. Untuk menganalisis evaluasi keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*
6. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility* menggunakan relaksasi benson dengan masalah nyeri

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Karya tulis ilmiah ini diharapkan menjadi bahan referensi dan menambah wawasan keilmuan dalam keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *immobility* dengan masalah nyeri

1.4.2 Manfaat Aplikatif

Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi pemberian EBPN dalam pemberian asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *immobility* dengan masalah nyeri menggunakan relaksasi benson pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan dan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori Lansia dengan Sindrom Geriatri *Immobility*

2.1.1 Definisi

Lanjut usia atau biasa disebut lansia adalah seseorang yang kondisi fisiknya biasanya lemah, kondisi psikis sering merasa kesepian dan ditinggalkan (Purnama, 2009). Lanjut usia merupakan seseorang yang usianya mendekati 65 tahun atau lebih, di usia ini daya pikir dan fisik mulai mengalami penurunan (Taslim & Cahyani, 2020). Sedangkan menurut *World Health Organization*, seseorang dapat disebut lanjut usia jika sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Ketika memasuki fase usia lanjut usia maka akan terjadi proses yang disebut dengan *aging process* atau proses penuaan.

Proses penuaan ini terjadi secara degeneratif yang berakibat terjadi perubahan-perubahan pada diri manusia seperti perubahan fisik, kognitif, perasaan, sosial dan seksual (Azizah, 2011). Salah satu keluhan yang paling umum dijumpai pada lansia adalah nyeri (Pany & Boy, 2019). Seseorang yang berusia lebih dari 50 tahun keatas mempunyai keluhan pada sendi-sendinya, misalnya: linu-linu, pegal, dan kadang-kadang terasa nyeri. Biasanya yang terkena adalah pada persendian jari-jari, tulang punggung, sendi-sendi penahan berat tubuh (lutut dan panggul) (Azizah, 2011). Nyeri dapat menimbulkan dampak yang besar terhadap kualitas hidup seperti menyebabkan penurunan aktivitas, isolasi sosial, gangguan tidur dan depresi (Hamranani, 2018). Pada perubahan yang terjadi dapat membuat lansia mengalami sindrom geriatri yaitu sindrom *immobility*.

Sindrom geriatri merupakan sekumpulan tanda dan gejala dari satu atau beberapa penyakit yang sering dikeluhkan oleh lansia (Nurdiana, 2021). *Immobility* merupakan suatu keadaan tidak dapat melakukan pergerakan atau tirah baring selama 3 hari atau lebih sehingga gerakan

anatomi tubuh menghilang karena perubahan pada fungsi fisiologis (Widiantari, 2019).

Adapun Klasifikasi sindrom geriatri menurut Widiantari (2019): *Immobility* (kurang bergerak), *Instability* (Instabilitas dan Jatuh), *Incontinence* (Inkontinensia Urin dan Alvi), *Inlektual Impairment* (gangguan Intelektual seperti Demensia dan Delirium), *Infection* (Infeksi), *Impairment of hearing, vision and smell* (Gangguan pendengaran, penglihatan, dan penciuman), *Isolasi* (Depresi), *Inanition* (malnutrisi), *Impecunity* (kemiskinan), *Iatrogenic* (penyakit karena pemakaian obat-obatan), *Insomnia* (Sulit tidur), *Immunodeficiency* (Penurunan system kekebalan tubuh), *Impotency* (Impotensi) dan *Impaction* (sulit buang air besar).

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia mulai dari sel darah hingga tersusun menjadi sistem pergerakan/muskuloskeletal QS Al-Mu'minun /23:14 :

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا
الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya :

Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta” (QS Al-Mu'minun/23:14).

Tafsir Quraisih shihab telah dijelaskan bahwa setelah membuahi ovum, sperma itu Kami jadikan darah. Darah itu pun kemudian Kami jadikan sepotong daging yang kemudian Kami bentuk menjadi tulang. Tulang itu lalu Kami balut dengan daging. Setelah itu, Kami menyempurnakan penciptaannya. Akan tetapi, setelah kami tiupkan roh. Betapa Mahatingginya Allah dalam kemahaagungan dan kemahakuasaan-Nya. Tidak ada yang menyerupai-Nya dalam kemampuan mencipta, membentuk dan berkreasi. Dari ayat diatas kita mengetahui bahwa betapa besar kuasa Allah swt yang telah menciptakan kita, mulai dari sel yang

terkecil hingga membentuk tulang sebagai sistem pergerakan yang menjadi struktur utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita.

2.1.2 Etiologi Sindrom Geriatri *Immobility*

Sindrom geriatri *immobility* terjadi karena bermacam-macam faktor seperti seseorang menderita penyakit akut atau penyakit kronik misalnya *reumathoid arthritis*, *osteoarthritis*, kanker tulang, trauma, fraktur, polimalgia dan pseudoclaudication, atau masalah lainnya yang terdapat pada kaki sehingga menyebabkan gangguan mobilisasi pada lansia. Penyebab utama *immobility* adalah nyeri, merasa lemah, kekakuan otot, ketidakseimbangan tubuh dan masalah psikologis, faktor fisik, psikologis dan lingkungan (Nurdiana, 2021).

Faktor resiko lainnya disebabkan karena *osteorritis*, gangguan pada penglihatan, fraktur, hipotensi postural, anemia, stroke, nyeri, demensia, lemah otot, vertigo, keterbatasan ruang lingkup, PPOK, gerak sendi hipotiroid dan sesak napas (Dini, 2013).

2.1.3 Manifestasi Klinis Sindrom Geriatric *Immobility*

Manifestasi klinis sindrom *immobility* (Widiantari, 2019) yaitu :

1. Gangguan imobilisasi permanen
2. Keterbatasan pergerakan
3. Kehilangan daya tahan tubuh
4. Penurunan massa otot
5. Terjadi atrofi
6. Penurunan stabilitas

2.1.4 Pemeriksaan Diagnostik Sindrom Geriatri *Immobility*

Pemeriksaan diagnostik sindrom geriatri *immobility* yang dapat dilakukann yaitu dengan cara melakukan pengkajian atau anamnesis secara menyeluruh, sebagai berikut :

1. Pengkajian pada sistem tubuh yang dilakukan secara menyeluruh, seperti pengkajian pada sistem kardiovaskular, sistem musculoskeletal (gangguan mobilitas, kekakuan sendi, penurunan kekuatan otot, sistem eliminasi (inkontinensia fekal dan inkontinensia urin), sistem saraf

pusat, dan sistem respirasi baik saluran nafas atas maupun saluran nafas bawah

2. Pengkajian yang berhubungan dengan kebiasaan yang membahayakan kesehatan seperti kebiasaan meminum alkohol atau kebiasaan merokok
3. Pengkajian dilingkungan sehari-hari lansia misalnya kondisi rumah tempat tinggal
4. Pengkajian yang berhubungan dengan obat-obatan yang dikonsumsi atau yang pernah dikonsumsi sebelumnya
5. Pengkajian nutrisi
6. Pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang
7. Pemeriksaan penunjang dilakukan biasanya yang sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien, umumnya pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin, EKG, pemeriksaan foto thorax, dan lain sebagainya.

2.1.5 Penatalaksanaan Sindrom Geriatri *Immobility*

Penatalaksanaan sindrom geriatri *immobility* dibagi menjadi dua yaitu dengan cara farmakologis dan nonfarmakologis, sebagai berikut :

1. Farmakologis

Cara yang dapat dilakukan pada pasien yang mengalami sindrom *immobility* adalah dengan cara pemberian antikogulan seperti LDG (Low dose heparin) dan LMWH (low molecular weight heparin) yaitu profilaksis yang efektif untuk pasien gangguan mobilisasi (Stanley & Mickey, 2006).

2. Tatalaksana nonfarmakologis

Salah satu cara nonfarmakologis yang kita lakukan yaitu relaksasi benson secara rutin dan teratur untuk mengurangi rasa nyeri dan memperlancar sirkulasi darah khususnya pada lansia yang mengalami tirah baring lama, hal ini disebabkan karena saat menghirup nafas mendapatkan oksigen yang sangat diperlukan tubuh untuk membersihkan darah dan mencegah kerusakan jaringan otak akibat kekurangan oksigen (hipoksia). Saat tarik nafas panjang otot-otot

dinding perut menekan iga bagian bawah ke arah belakang serta mendorong sekat diafragma ke atas dapat berakibat meninggikan tekanan intra abdominal, sehingga dapat merangsang aliran darah menjadi meningkat keseluruh tubuh terutama organ-organ vital seperti otak, sehingga O₂ tercukupi didalam otak dan tubuh menjadi rileks (Yusliana dkk., 2015).

2.2 Konsep Keperawatan

2.2.1 Pengkajian

Pengkajian keperawatan pada lansia merupakan pengkajian yang dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek biologis, psikologis, social serta spiritual lansia. Data pengkajian dapat diperoleh baik dari data subyektif (data yang didapatkan/disampaikan langsung oleh lansia) data obyektif (data yang perawat dapatkan melalui observasi dan hasil pemeriksaan terhadap pasien (Damanik & Hasan, 2019). Adapun hal-hal yang perlu dikaji pada pengkajian asuhan keperawatan adalah:

1. Data Demografi : Pada data demografi, berisi data-data terkait tentang identitas pasien seperti nama pasien, usia, jenis kelamin, agama, dan alamat pasien. Kemudian berisi tentang jumlah keturunan pasien seperti jumlah anak dan cucu pasien beserta data tentang nama suami/istri dan umurnya.
2. Pengkajian Fisik
Data yang dapat dikaji melalui wawancara yaitu :
 - a. Pandangan lanjut usia terkait kesehatannya
 - b. Kegiatan yang masih mampu dilakukan lanjut usia
 - c. Kebiasaan lansia dalam merawat diri sendiri
 - d. Kekuatan fisik lanjut usia
 - e. Kebiasaan makan, minum. Istirahat/tidur, buang air besar/buang air kecil
 - f. Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia
 - g. Perubahan-perubahan pada fungsi tubuh yang paling bermakna dirasakan

h. Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatannya serta kebiasaannya dalam minum obat

i. Masalah seksual yang dirasakan lansia

Pemeriksaan fisik

Data yang dapat dikaji melalui pemeriksaan inspeksi, auskultasi, palpasi dan perkusi dengan cara *Head to toe* yaitu sebagai berikut :

- a. Temperatur, hasil diperoleh dari suhu tubuh pasien
- b. *Pulse*/denyut nadi : kecepatan, irama dan tempat pengukuran
- c. *Respirasi*/pernapasan : kecepatan, irama, kedalaman serta bunyi pernapasan
- d. Tekanan darah, pengukuran harus dilampirkan posisi pengukuran tekanan darah
- e. Berat dan tinggi badan terakhir beserta IMT
- f. Tingkat orientasi yaitu mengkaji mengenai waktu, tempat dan orang
- g. *Memory*/ingatan
- h. Tidur, yang dikaji yaitu kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola tidur
- i. Istirahat, yang dikaji kuantitas atau lama tidur, kualitas dan pola tidur
- j. Penyesuaian psikososial

Pengkajian sistem persyarafan :

Kesimetrisan raut wajah , tingkat kesadaran: apakah lansia mengalami *snile* (pikun) atau terjadi penurunan data ingat, mata: pergerakan, penglihatan, dan penyakit penyerta, pupil: kesamaan; isokor/anisokor, ketajaman penglihatan: jangan diuji didepan jendela, penggunaan gambar dan tangan, cek kondisi kacamata. sensori *deprivation* (gangguan sensori), ketajaman pendengaran: apakah menggunakan alat bantu dengar, tunitus, dan serumen serta mengkaji rasa sakit atau nyeri: PQRST.

Sistem kardiovaskuler :

Sirkulasi perifer: warna, waktu dan akral, denyut nadi apical, pembengkakan vena jugularis, pusing, nyeri dada dan edema.

Sistem gastrointestinal :

Status gizi: pemasukan diet, anoreksia, mual, muntah, mengunyah dan menelan, keadaan gigi, rahang, rongga mulut, keadaan perut: auskultasi bising usus, palpasi apakah perut kembung atau pelebaran kolon, konstipasi (sembelit), diare dan inkontinensia alvi.

Sistem genitourinarius :

Warna dan bau urine, distensi kandung kemih, inkontinensia, frekuensi, tekanan/desakan, pemasukan cairan, pengeluaran cairan, dysuria dan seksualitas: minat untuk melakukan hubungan seks dan adanya kecacatan social yang mengarah ke aktivitas seksual

Sistem kulit :

Kulit: temperature, tingkat kelembaban, keadaan luka dan turgor (kekenyalan kulit), jaringan parut, keadaan kuku, keadaan rambut, gangguan-gangguan umum

System musculoskeletal

- a. Kontraktur : otot, tendon, gerakan sendi
- b. Tingkat mobilisasi : ambulasi, gerakan, kekuatan otot dan kemampuan melangkah atau berjalan
- c. Pemeriksaan sendi
- d. Paralisis/kelumpuhan
- e. Kifosis/bungkuk

3. Pengkajian Psikologis :

- a. Pengenalan masalah-masalah utama lansia,
- b. Bagaimana sikap lansia terhadap proses penuaan
- c. Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak
- d. Pandangan lansia terhadap kehidupan
- e. Bagaimana mengatasi stress yang di alami
- f. Apakah mudah dalam menyesuaikan diri

- g. Apakah lansia sering mengalami kegagalan
 - h. Harapan saat ini dan harapannya yang akan datang
 - i. Fungsi kognitif : daya ingat, proses piker, alam perasaan, orientasi, kemampuan dalam penyelesaian masalah
4. Sosial Ekonomi :
 - a. Dari mana sumber keuangan lansia
 - b. Apa saja kesibukan dalam mengisi waktu luang lansia
 - c. Dengan siapa lansia tinggal
 - d. Kegiatan organisasi apa yang diikuti lansia
 - e. Bagaimana pandangan lansia terhadap lingkungannya
 - f. Siapa saja yang biasa mengunjunginya
 - g. Apakah dapat menyalurkan hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada
 5. Spiritual :
 - a. Agama yang dianut lansia
 - b. Kegiatan ibadah lansia
 - c. Kegiatan keagamaan yang dilakukan
 - d. Cara lanjut usia menyelesaikan masalahnya
 - e. Penampilan lansia
 6. Psikososial :
 - a. Tingkat ketergantungan lansia
 - b. Fokus diri
 - c. Perhatian
 - d. Rasa kasih kasih sayang yang dirasakan.
 7. Pengkajian status fungsional dengan menggunakan Indeks Katz yang terdiri dari 6 pertanyaan untuk mencocokkan kondisi lansia dengan skor yang diperoleh
 8. Pengkajian status kognitif dan afektif dengan *Short Portable Mental Status Questionnaire* (SPMSQ) yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan interpretasi kesalahan 0-2 : fungsi intelektual utuh, kesalahan 3-4 : fungsi intelektual ringan, kesalahan 5-7 : fungsi intelektual sedang dan kesalahan 8-10 : fungsi intelektual berat

9. Pengkajian skala depresi geriatric (Geriatric Depression Scale/GDS) dengan *Short Form* yang terdiri dari 15 pertanyaan dengan interpretasi 0-5 : normal, 6-10 : kemungkinan depresi dan >10 : depresi
10. Pengkajian skala jatuh morse (*Morse Fall Scale/MFS*) yang terdiri dari 6 pertanyaan. Adapun interpretasinya yaitu tidak berisiko jatuh : 0-24, berisiko rendah : 25-50 dan berisiko tinggi ≥ 51
11. Pengkajian status sosial dengan menggunakan APGAR keluarga yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan total skor 10. Adapun interpretasi penilaian 0-5 : fungsi sosial kurang dan 6-10 : fungsi sosial baik
12. Pengkajian Barthel Indeks yang terdiri dari 13 pertanyaan. Interpretasi penilaiannya lansia mandiri : 130, lansia ketergantungan sebagian : 60-125 dan lansia ketergantungan total : 55
13. Penilaian potensi dekubitus (Skor Norton) yang terdiri dari 5 pertanyaan dengan interpretasi 15-20 : kecil sekali/tidak terjadi, 12-15 : kemungkinan kecil terjadi dan <12 : kemungkinan besar terjadi
14. Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE (*Mini Mental Status Exam*) dengan mengkaji orientasi, registrasi, perhatian, kalkulasi dan mengingat kembali
15. Pengkajian Keseimbangan yang terdiri dari beberapa pertanyaan dengan melakukannya secara langsung. Adapun interpretasinya 0-5 : risiko jatuh rendah, 6-10 : risiko jatuh sedang dan 11-15 : risiko jatuh tinggi
16. Pengkajian waktu duduk dan berdiri pasien, interpretasinya ≤ 10 detik : risiko jatuh rendah, 11-19 detik : risiko jatuh sedang, 20-29 detik : risiko jatuh tinggi dan ≥ 30 detik : gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi

2.2.2 Dignosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan yang dapat terjadi pada lansia dengan sindrom geriatric *Immobility* (SDKI, 2016), yaitu :

1. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)
Definisi : Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

Penyebab :

- a. Kerusakan integritas struktur tulang
- b. Perubahan metabolisme
- c. Ketidakbugaran fisik
- d. Penurunan kendali otot
- e. Penurunana massa otot
- f. Penurunan kekuatan otot
- g. Keterlambatan perkembangan
- h. Kekakuan sendi
- i. Kontraktur
- j. Malnutrisi
- k. Gangguan muskuloskeletal
- l. Gangguan neuromuskular
- m. Indeks massa tubuh di atas persentil ke-75 sesuai usia
- n. Efek agen farmakologis
- o. Program pembatasan gerak
- p. Nyeri
- q. Kurang terpapar informasi tentang aktivitas fisik
- r. Kecemasan
- s. Gangguan kognitif
- t. Keengganan melakukan pergerakan
- u. Gangguan sensori persepsi

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas	1. Kekuatan otot menurun 2. Rentang gerak (ROM) menurun
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Nyeri saat bergerak 2. Enggan melakukan pergerakan 3. Merasa cemas saat bergerak	1. Sendi kaku 2. Gerakan tidak terkoordinasi 3. Gerakan terbatas 4. Fisik lemah

2. Nyeri Kronik (D.0078)

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan, yang berlangsung lebih dari 3 bulan.

Penyebab :

- a. Kondisi musculoskeletal kronis
- b. Kerusakan system saraf
- c. Penekanan saraf
- d. Infiltrasi tumor
- e. Ketidakseimbangan neurotransmitter, neuromodulator dan reseptor
- f. Gangguan imunitas (mis. neuropati terkait HIV, virus varicella-zoster)
- g. Gangguan fungsi metabolik
- h. Riwayat posisi kerja statis
- i. Peningkatan indeks massa tubuh
- j. Kondisi pasca trauma
- k. Tekanan emosional
- l. Riwayat penganiayaan (mis, fisik, psikologis, seksual)
- m. Riwayat penyalahgunaan obat/zat

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Mengeluh nyeri 2. Merasa depresi (tertekan)	1. Tampak meringis 2. Gelisah 3. Tidak mampu menuntaskan aktivitas
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Merasa takut mengalami cedera berulang	1. Bersikap protektif (mis. posisi menghindari nyeri) 2. Waspada 3. Pola tidur berubah 4. Anoreksia 5. Fokus menyempit 6. Berfokus pada diri sendiri

3. Nyeri Akut (D.0077)

Definisi : Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan.

Penyebab :

- a. Agen pencedera fisiologis (mis. inflamasi, iskemia, neoplasma)
- b. Agen pencedera kimiawi (mis. terbakar, bahan kimia iritan)
- c. Agen pencedera fisik (mis. abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

Batasan Karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Mengeluh nyeri	1. Tampak meringis 2. Bersikap protektif (mis. waspada, posisi menghindari nyeri) 3. Gelisah 4. Frekuensi nadi meningkat 5. Sulit tidur
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	1. Tekanan darah meningkat 2. Pola nafas berubah 3. Nafsu makan berubah 4. Proses berfikir terganggu 5. Menarik diri 6. Berfokus pada diri sendiri 7. Diaforesis

4. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

Definisi: Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri.

Penyebab :

- a. Ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen
- b. Tirah baring
- c. Kelemahan
- d. Imobilitas
- e. Gaya hidup monoton

Batasan karakteristik

Gejala dan Tanda Mayor	
Subjektif	Objektif
1. Mengeluh lelah	1. Frekuensi jantung meningkat >20% dari kondisi istirahat
Gejala dan Tanda Minor	
Subjektif	Objektif
1. Dyspnea saat/setelah aktivitas 2. Merasa tidak nyaman setelah beraktivitas 3. Merasa lemah	1. Tekanan darah berubah >20% dari kondisi istirahat 2. Gambaran EKG menunjukkan aritmia saat/setelah aktivitas 3. Gambaran EKG menunjukkan iskemia 4. Sianosis

5. Risiko Jatuh (D.0143)

Definisi : berisiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh

Faktor Risiko :

- a. Berusia ≥ 65 tahun (pada dewasa) atau ≤ 2 tahun (pada anak)
- b. Riwayat jatuh
- c. Anggota gerak bawah prostesis (buatan)
- d. Penggunaan alat bantu berjalan
- e. Penurunan tingkat kesadaran
- f. Perubahan fungsi kognitif
- g. Lingkungan tidak aman (mis. licin, gelap, lingkungan asing)
- h. Kondisi pasca operasi
- i. Hipotensi ortostatik
- j. Perubahan kadar glukosa darah
- k. Anemia
- l. Kekuatan otot menurun
- m. Gangguan pendengaran
- n. Gangguan keseimbangan
- o. Gangguan penglihatan (mis. glukoma, katarak, ablasio retina, neuritis optikus)
- p. Neuropati
- q. Efek agen farmakologis

6. Defisit Perawatan Diri (D.0109)

Definisi : tidak mampu melakukan atau menyelesaikan aktivitas perawatan diri.

Penyebab :

- a. Gangguan musculoskeletal
- b. Gangguan neuromuskuler
- c. Kelemahan
- d. Gangguan psikologis dan/atau psikotik
- e. Penurunan motivasi/minat

Batasan Karakteristik

Gejala dan tanda mayor	
Subjektif	Objektif
1. Menolak melakukan perawatan diri	1. Tidak mampu mandi/mengenakan pakaian/makan/ke toilet/berhias secara mandiri 2. Minat melakukan perawatan diri kurang
Gejala dan tanda minor	
Subjektif	Objektif
(tidak tersedia)	(tidak tersedia)

2.2.3 Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan data dari masalah yang ditemukan. Intervensi yang dapat diterapkan berdasarkan (SIKI, 2018) pada lansia dengan sindrom geriatric *Immobility* yaitu:

1. Gangguan Mobilitas Fisik (D.0054)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan

Kriteria hasil :

- a. Pergerakan ekstremitas meningkat
- b. Kekuatan otot meningkat
- c. Rentang gerak (ROM) meningkat
- d. Nyeri menurun
- e. Kecemasan menurun
- f. Kaku sendi menurun
- g. Gerakan tidak terkoordinasi menurun

h. Gerakan terbatas menurun

i. Kelemahan fisik menurun

Intervensi	Rasional
Observasi: 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melalui pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi	1. Untuk mengurangi cedera pada bagian tubuh lain 2. Untuk meminimalkan gerakan pada bagian tersebut 3. Untuk mengidentifikasi faktor resiko terkena penyakit lain 4. Untuk menghindari terjadinya komplikasi
Teraupetik : 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu 2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan	1. Untuk memudahkan proses mobilisasi 2. Agar memudahkan melakukan pergerakan 3. Untuk membantu proses mobilisasi tersebut
Edukasi : 1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi 2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini 3. Ajarkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)	1. Agar pasien paham mengenai prosedur tindakan yang diberikan 2. Untuk meminimalisir pergerakan mobilisasi yang banyak 3. Agar pasien dan keluarga dapat melakukannya dengan individu

2. Nyeri Kronik (D.0078)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan Nyeri kronis menurun dengan

Kriteria hasil :

- a. Keluhan nyeri menurun
- b. Merasa depresi (tertekan) menurun
- c. Gelisah menurun
- d. Perasaan takut mengalami cedera berulang menurun
- e. Sikap protektif menurun
- f. Pola tidur membaik
- g. Anoreksia menurun
- h. Fokus membaik

i. Berfokus pada diri sendiri menurun

Intervensi	Rasional
<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri 5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri 7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup 8. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 9. Monitor efek samping penggunaan analgetik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri 2. Untuk mengetahui skala nyeri 3. Untuk mengetahui mimik wajah yang diperlihatkan pasien saat nyeri muncul 4. Untuk mengetahui apa saja yang memperberat dan memperingan keadaan nyeri 5. Untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri 6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya terhadap respon nyeri 7. Untuk mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup 8. Untuk mengetahui keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan 9. Untuk mengetahui efek samping penggunaan analgetik
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aroma terapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dengan menggunakan teknik nonfarmakologis 2. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dan memberikan kenyamanan 3. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien 4. Agar strategi yang diberikan bisa efektif dalam meredakan nyeri
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan pemahaman agar pasien tidak gelisah saat nyeri timbul 2. Untuk mengontrol mengatasi nyeri ketika nyeri muncul 3. Untuk memajemen nyeri secara mandiri 4. Penggunaan analgetik yang tepat dapat mengurangi rasa nyeri 5. Untuk menghindari peningkatan nyeri
<p>Kolaborasi</p>	

1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	1. Untuk membantu menekan rasa nyeri
---	--------------------------------------

3. Nyeri Akut (D.0077)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan nyeri akut menurun dengan

Kriteria hasil :

- a. Keluhan nyeri menurun
- b. Meringis menurun
- c. Sikap protektif menurun
- d. Gelisah menurun
- e. Frekuensi nadi membaik
- f. Kesulitan tidur menurun
- g. Tekanan darah membaik
- h. Pola napas membaik
- i. Nafsu makan membaik
- j. Proses berfikir membaik
- k. Menarik diri menurun
- l. Berfokus pada diri sendiri menurun
- m. Diaforesis menurun

Intervensi	Rasional
Manajemen Nyeri	
Observasi	
1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri	1. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri
2. Identifikasi skala nyeri	2. Untuk mengetahui skala nyeri
3. Identifikasi respon nyeri non verbal	3. Untuk mengetahui mimik wajah yang diperlihatkan pasien saat nyeri muncul
4. Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri	4. Untuk mengetahui apa saja yang memperberat dan memperingan keadaan nyeri
5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri	5. Untuk mengetahui pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri
6. Identifikasi pengaruh budaya terhadap respon nyeri	6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya terhadap respon nyeri
7. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup	7. Untuk mengetahui pengaruh nyeri pada kualitas hidup
8. Monitor keberhasilan terapi	8. Untuk mengetahui keberhasilan

komplementer yang sudah diberikan 9. Monitor efek samping penggunaan analgetik	terapi komplementer yang sudah diberikan 9. Untuk mengetahui efek samping penggunaan analgetik
Terapeutik 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. TENS, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aroma terapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat/dingin, terapi bermain) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis. suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan) 3. Fasilitasi istirahat dan tidur 4. Pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri	1. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien 2. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dan memberikan kenyamanan 3. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien 4. Agar strategi yang diberikan bisa efektif dalam meredakan nyeri
Edukasi 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri	1. Untuk memberikan pemahaman agar pasien tidak gelisah saat nyeri timbul 2. Untuk mengontrol mengatasi nyeri ketika nyeri muncul 3. Untuk manajemen nyeri secara mandiri 4. Penggunaan analgetik yang tepat dapat mengurangi rasa nyeri 5. Untuk menghindari peningkatan nyeri
Kolaborasi 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu	1. Untuk membantu menekan rasa nyeri

4. Intoleransi Aktivitas (D.0056)

Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan toleransi aktifitas meningkat dengan

Kriteria Hasil:

- a. Frekuensi nadi menurun
- b. Kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat
- c. Kecepatan berjalan meningkat
- d. Jarak berjalan meningkat
- e. Kekuatan tubuh bagian atas meningkat
- f. Kekuatan tubuh bagian bawah meningkat

- g. Keluhan lelah menurun
- h. Dispnea saat aktivitas menurun
- i. Dispnea setelah aktivitas menurun
- j. Perasaan lemah menurun
- k. Aritmia saat aktivitas menurun
- l. Aritmia setelah aktivitas menurun
- m. Sianosis menurun
- n. Tekanan darah membaik
- o. Frekuensi napas membaik

Intervensi	Rasional
<p>Manajemen energi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan 2. Monitor kelelahan fisik dan emosional 3. Monitor pola dan jam tidur 4. Monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui faktor penyebab kelelahan agar dapat menentukan intervensi yang sesuai 2. Mengetahui adanya kelelahan baik fisik maupun emosional 3. Pola tidur yang kurang baik dapat mempengaruhi tingkat kelelahan 4. Mengetahui hambatan selama melakukan aktivitas
<p>Teraupetik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan/atau pasif 3. Berikan aktivitas distraksi yang menyenangkan 4. Fasilitasi duduk disisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi paparan stimulus yang dapat mempengaruhi kondisi pasien 2. Meningkatkan rentang gerak pasien, melancarkan peredaran darah dan mencegah kelemahan 3. Mengalihkan pasien dari kelelahan 4. Meningkatkan aktivitas pasien
<p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan tirah baring 2. Ajarkan melakukan aktivitas secara bertahap 3. Anjurkan menghubungi perawat jika ada tanda dan gejala kelelahan tidak berkurang 4. Ajarkan strategi koping untuk mengurangi kelelahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan istirahat 2. Agar dapat beradaptasi dalam melakukan aktivitas sederhana 3. Memberikan intervensi lebih lanjut jika kelelahan tidak berkurang 4. Mengurangi kelelahan
<p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asupan makanan dapat meningkatkan aktivitas dan imunitas pasien

5. Risiko jatuh (D.0143)

Tujuan : Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan tingkat jatuh menurun dengan

Kriteria Hasil:

- a. Jatuh dari tempat tidur menurun
- b. Jatuh saat berdiri menurun
- c. Jatuh saat duduk menurun
- d. Jatuh saat berjalan menurun
- e. Jatuh saat dipindahkan menurun
- f. Jatuh saat naik tangga menurun
- g. Jatuh saat di kamar mandi menurun
- h. Jatuh saat membungkuk menurun

Intervensi	Rasional
<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh 2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi 3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan faktor risiko 4. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala 5. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi roda dan sebaliknya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh 2. Memonitor adanya risiko jatuh guna melakukan pencegahan 3. Mengetahui keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi terhadap risiko jatuh 4. Mengetahui tingkat risiko jatuh 5. Untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian pasien
<p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi ruangan pada pasien dan keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci 3. Pasang <i>handrell</i> tempat tidur 4. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah 5. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari <i>nurse station</i> 6. Dekatkan bell pemanggil dalam jangkauan pasien 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui ruangan dan mengidentifikasi tempat yang memiliki risiko jatuh 2. Meminimalisir risiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda 3. Dapat menciptakan aktivitas yang mandiri dengan aman dan nyaman 4. Dapat merasa takut jatuh karena perubahan ukuran dan tinggi tempat tidur 5. Memudahkan perawat untuk mengawasi pasien dengan risiko jatuh 6. Membuat pasien memiliki rasa aman, dapat mengatur diri dan mengurangi ketakutan karena

	ditinggal sendiri
Edukasi 1. Anjurkan memanggil peawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 3. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh 4. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri 5. Ajarkan cara menggunakan bel pemanggil untuk memanggil perawat	1. Menurunkan resiko terjatuh 2. Membantu pasien untuk berjalan dengan langkah yang menetap/mempertahankan keseimbangan diri dengan mencegah terjadinya kaki terkilir 3. Meminimalisir risiko jatuh 4. Meminimalisir risiko jatuh 5. Membuat pasien memiliki rasa aman dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri

6. Defisit Perawatan Diri (D.0109)

Tujuan : Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama ... x 24 jam, diharapkan perawatan diri meningkat dengan

Kriteria hasil :

- a. Kemampuan memberi asuhan meningkat
- b. Kemampuan merawat pasien meningkat
- c. Kemampuan menyelesaikan tugas merawat pasien meningkat
- d. Kekhawatiran dirawat kembali menurun
- e. Kekhawatiran kelanjutan perawatan menurun

Intervensi	Rasional
Observasi 1. Identifikasi usia dan budaya dalam membantu kebersihan diri 2. Identifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan 3. Monitor kebersihan tubuh (mis. rambut, mulut, kulit, kuku) 4. Monitor integritas kulit	1. Memandirikan pasien sesuai dengan umur 2. Mengetahui jenis bantuan yang dibutuhkan pasien 3. Menentukan intervensi lebih lanjut 4. Mencegah terjadinya iritasi pada kulit pasien
Terapeutik 1. Sediakan peralatan mandi (mis. sabun, sikat gigi, shampoo, pelembab kulit) 2. Sediakan lingkungan yang aman dan nyaman 3. Fasilitasi menggosok gigi, sesuai kebutuhan 4. Fasilitasi mandi, sesuai kebutuhan 5. Pertahankan kebiasaan kebersihan	1. Mempermudah pasien untuk mandi, keramas, gosok gigi 2. Agar pasien menjadi nyaman 3. Agar mempermudah menggosok gigi 4. Memudahkan pasien mandi 5. Agar pasien biasa dalam menjaga

diri 6. Berikan bantuan sesuai tingkat kemandirian	kebersihan diri 6. Memandirikan pasien sesuai dengan umur
Edukasi 1. Jelaskan manfaat mandi dan dampak tidak mandi terhadap kesehatan 2. Ajarkan kepada keluarga cara memandikan pasien, jika perlu	1. Meningkatkan pemahaman pasien tentang manfaat mandi terhadap kesehatan 2. Agar keluarga dapat termotivasi menjaga kebersihan pasien

2.2.4 Implementasi Keperawatan

Implementasi Keperawatan adalah suatu ide dari rencana tindakan dalam membantu mencapai tujuan secara khusus. Proses pelaksanaannya diawali penyusunan rencana tindakan dan ditujukan kepada perintah keperawatan (*nursing orders*) dalam membantu klien mencapai tujuan yang diinginkan (Awaludin dkk., 2018).

2.2.5 Evaluasi Keperawatan

Evaluasi merupakan langkah terakhir dalam proses tindak lanjut. Langkah evaluasi ini akan menilai keberhasilan tindakan yang telah dilakukan. Indikatornya adalah kriteria hasil yang telah ditulis ke dalam tujuan selama pengembangan rencana aksi. Evaluasi dikatakan berhasil jika tujuan tercapai. Pada asuhan keperawatan catatan perkembangan berupa laporan implementasi setiap intervensi terdiri dari:

1. Data subyektif (S)

Data subyektif merupakan ungkapan secara subyektif pasien setelah dilakukan intervensi, misalnya pasien mengatakan nyeri yang dirasakan sudah berkurang.

2. Data obyektif (O)

Data obyektif merupakan data yang dapat dilihat secara obyektif atau secara langsung, data ini merupakan hasil pemeriksaan atau observasi, dan hasil pemeriksaan penunjang. Contohnya tekanan darah klien 120/80 mmHg

3. Analisis (A)

Analisis hasil yang diperoleh dengan mengacu pada tujuan yang relevan dengan diagnosis keperawatan. Analisis ini kesimpulan dari pencapaian indikator outcome.

4. Perencanaan (P)

Perencanaan merupakan tindakan lanjutan apabila indikator hasil belum tercapai maka dapat melakukan modifikasi intervensi, atau dapat melanjutkan intervensi selanjutnya jika indikator hasil tercapai.

Langkah-langkah evaluasi bisa formatif dan sumatif. Evaluasi formatif merupakan hasil asesmen yang dilakukan selama proses keperawatan, yang menjabarkan evaluasi pelaksanaan setiap intervensi. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir asuhan keperawatan secara keseluruhan.

2.3 Pendekatan Teori yang Digunakan

Penggunaan Teori *Comfort* Kolcaba terhadap teori keperawatan dalam memperoleh kenyamanan. Rasa nyaman merupakan bagian dari perawatan yang sangat penting untuk diperhatikan. Teori yang dikembangkan oleh Kolcaba ini menekankan bahwa kenyamanan merupakan prioritas utama dalam menerapkan proses keperawatan. Kolcaba menjelaskan bahwa kenyamanan holistik merupakan kenyamanan yang menyeluruh seperti kenyamanan fisik, psikospiritual, lingkungan dan psikososial. Tingkat kenyamanan ini terbagi menjadi tiga yaitu: *relief* adalah pasien membutuhkan kenyamanan yang spesifik, *ease* adalah pasien terbebas dari rasa ketidaknyamanan atau rasa nyaman meningkat, dan *transcendence* yaitu pasien mampu mentoleransi atau mampu beradaptasi dengan ketidaknyamanan yang dirasakan (Kolcaba & Dimarco, 2005; Tomey & Alligood, 2006).

Teori *Comfort* Kolcaba memaparkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan yang holistik diperlukan kerja sama antara tenaga perawat dan keluarga pasien. Keterlibatan keluarga mutlak diperlukan pada perawatan karena keluarga adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anggota keluarga yang sakit. Anggota keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan

kesehatan atau kesejahteraan pasien. Keluarga juga merupakan sumber utama dalam memberikan kekuatan dan dukungan (Neal, et al 2007). Sesuai dengan studi kasus ini bahwa pasien memerlukan keterlibatan keluarga dalam melakukan manajemen nyeri nonfarmakologi untuk meningkatkan kenyamanan yang holistik. Kenyamanan holistik ini berpengaruh pada persepsi pasien dalam merasakan nyeri sehingga nyeri yang dirasakan akan berkurang, hilang atau pasien juga mampu meningkatkan coping positif terhadap nyeri yang dirasakan (Ilmiasih dkk., 2015).

2.4 Evidence Based Practice In Nursing

2.4.1 Pengertian

Relaksasi benson merupakan gabungan antara teknik relaksasi dengan sistem keyakinan individu yang difokuskan pada ungkapan tertentu seperti nama-nama Tuhan atau kata-kata yang memiliki makna menenangkan bagi pasien, teknik ini diucapkan secara berulang-ulang dengan ritme yang teratur dan terbatas pada skala nyeri 4-10 (Benson & Proctor, 2017). Relaksasi Benson merupakan teknik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh pasien (Safitri dkk., 2018). Mengingat Allah sangat dianjurkan seperti yang dijelaskan dalam QS.Ar-Ra'd /13:28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (Q.S:Ar-Ra'd /13:28).

Al-Sa'di memaparkan didalam kitabnya, Taisir al-Karim al-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, surah ar-Ra'd [13] ayat 28 menjelaskan bahwa zikir dapat menenangkan hati. Maksudnya, zikir dapat menghilangkan rasa ke Gundahan, kegalauan, keguncangan, dan keraguan hati. Dengan melakukan zikir hati akan menjadi tenang dan merasakan kenikmatan. Jika zikir tidak dilakukan dengan benar, maka itu tidak akan memberi manfaat signifikan. Maka tidak heran, kita sering menemukan

dan bahkan mungkin dirasakan oleh sebagian orang, masih ada rasa gelisah dan rasa takut dalam hati walaupun sudah berzikir. Hal ini disebabkan karena adanya kotoran di dalam hati dan adanya ketidaktulusan (Ihya Ulumuddin).

2.4.2 Tujuan

Relaksasi Benson dapat menurunkan skala nyeri seseorang (Wahyu, 2018). Relaksasi Benson juga dapat merilekskan otot-otot sehingga mampu menimbulkan perasaan tenang dan nyaman (Safitri dkk., 2018).

2.4.3 Indikasi

1. Orang yang merasakan nyeri
2. Orang yang mengalami ketegangan pada otot-ototnya

2.4.4 Kontraindikasi

Relaksasi benson ini tidak mempunyai efek samping apapun (Novitasari & Aryana, 2013).

2.4.5 Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Langkah-langkah relaksasi Benson (Inayati, 2012) adalah sebagai berikut:

1. Fase Orientasi
 - a. Berikan salam
 - b. Perkenalkan diri
 - c. Identifikasi pasien
 - d. Kontrak waktu
 - e. Jelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan, berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya dan jawab seluruh pertanyaan pasien, berikan *informed consent*.
2. Fase Kerja
 - a. Langkah pertama: Pilih kata atau ungkapan singkat yang mencerminkan keyakinan pasien. Anjurkan pasien untuk memilih ungkapan yang memiliki arti khusus seperti tenang dan lain-lain. Dalam penelitian ini, menggunakan *subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar*.

- b. Langkah kedua: Atur posisi yang nyaman. Pengaturan posisi dapat dilakukan dengan cara duduk, berlutut atau tiduran selama tidak mengganggu pikiran pasien
 - c. Langkah ketiga: Pejamkan mata sewajarnya. Tindakan dilakukan dengan wajar dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga
 - d. Langkah keempat: Lemaskan otot-otot tubuh. Lemaskan semua otot pada tubuh pasien dari kaki, betis, paha dan perut. Memutar kepala dan mengangkat bahu dapat dilakukan untuk melemaskan otot bagian kepala, leher dan bahu. Ulurkan tangan, kemudian kendurkan dan biarkan terkulai di samping tubuh
 - e. Langkah kelima: Mulai dengan bernapas yang lambat dan wajar, serta mengucapkan dalam hati satu kata atau kalimat sesuai keyakinan pasien, kalimat yang digunakan berupa kalimat pilihan pasien. Tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut secara perlahan sambil mengucapkan kata yang telah dipilih dan diulang-ulang saat mengeluarkan nafas. Sambil terus melakukan langkah nomor 5 ini, lemaskan seluruh tubuh disertai dengan sikap pasrah
 - f. Langkah keenam: pertahankan sikap pasif. Anjurkan pasien untuk tidak mempedulikan berbagai macam pikiran yang mengganggu konsentrasi pasien
 - g. Langkah ketujuh: lakukan teknik relaksasi dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan dalam waktu 10-20 menit. Pasien diperbolehkan membuka mata untuk melihat waktu tetapi jangan menggunakan alarm. Bila sudah selesai tetap berbaring atau duduk dengan tenang selama beberapa menit, mula-mula mata terpejam dan sesudah itu mata terbuka.
3. Fase Terminasi
 - a. Beritahu pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan
 - b. Evaluasi tindakan
 - c. Beri *reinforcement* positif pada pasien.

2.4.6 Kriteria evaluasi

Setelah dilakukan intervensi skala nyeri berat menurun menjadi skala sedang atau skala ringan dan skala nyeri sedang menurun menjadi skala nyeri ringan (Andari & Santri, 2021).

2.4.7 Artikel utama & pendukung

1. Artikel utama

Penulis : Fatsiwi Nunik Andari, Reska Ayu Santri, Nurhayati

Tahun : 2021

Judul : Terapi Benson Untuk Penurunan Nyeri Rheumatoid Arthritis Lansia

Sumber : Google Scholar, Jurnal Vokasi Keperawatan (JVK)

2. Artikel pendukung

Penulis : Zohreh Kalani, Khadeigeh Nasiriani, Marzieh Modarresi Maraghi

Tahun : 2019

Judul : *The Effect of Benson's Relaxation Technique on Postoperative Pain after Total Knee Replacement in elder hospitalized Patients in selected Hospitals of Kashan*

Sumber : Google scholar, *Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing (IJRN)*

3. Artikel pendukung

Penulis : Hariyanto, Agus

Tahun : 2018

Judul : Perbedaan Efektifitas Relaksasi Benson Dan Kompres Hangat Dalam Menurunkan Nyeri Sendi Lanjut Usia

Sumber : Portal Garuda, STIKES PPNI Bina Sehat Mojokerto

4. Artikel pendukung

Penulis : Satria Eureka Nurseskasatmata, Kun Ika Nur Rahayu

Tahun : 2020

Judul : Perbedaan Efektifitas Relaksasi Benson Dan *Massage Effleurage* Terhadap Intensitas Nyeri Pinggang Pada Pasien Dewasa Dengan Riwayat *Low Back Pain*

Sumber : Google Scholar, *Nursing Sciences Journal*.


a. Artikel pendukung

Penulis : Ismansyah , Wiyadi , Rini Ernawati

Tahun : 2021

Judul : Penerapan Relaksasi Autogenik Dan Relaksasi Benson Terhadap Nyeri Pasien Fraktur

Sumber : Portal Garuda, *Husada Mahakam : Jurnal Kesehatan*



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Hidayat (2019), mendefinisikan studi kasus yaitu bagian dari metode penelitian yang memberikan kerangka tertentu pada tahapan prosesnya dengan menentukan tema dan subjek penelitian, menentukan tempat, menentukan metode yang akurat, menentukan teknik pengumpulan data yang relevan, menganalisis hasil data, membuat kesimpulan dan laporan dari penelitian.

3.2 Subyek Studi Kasus

Subyek yang digunakan dalam studi kasus ini adalah individu atau pasien yang mengalami nyeri, usia >60 tahun, tidak mengalami gangguan pendengaran dan bersedia menjadi responden.

3.3 Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan asuhan keperawatan terhadap masalah yang dikaji secara mendalam yaitu Asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami *immobility* dengan masalah nyeri melalui penerapan relaksasi benson.

3.4 Instrumen Studi Kasus

Instrumen yang digunakan dalam studi kasus ini yaitu format proses asuhan keperawatan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan terapi benson, perlu dilakukan pengakajian nyeri seperti P : provoking atau pemicu, yaitu faktor yang munculnya nyeri, Q : quality atau kualitas nyeri (mis. tumpul,tajam), R : Region atau daerah, yaitu daerah perjalanan ke daerah lain, S : Severity atau keganasan, yaitu keparahan atau intensitas nyeri dan T : Time atau waktu, yaitu lama serangan atau frekuensi nyeri (Kasiati & Rosmalawati, 2016). Berdasarkan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Hasibuan (2019) menggunakan metode *rating question* untuk mengukur nyeri yang dirasakan responden, kuesioner yang berjumlah tujuh pertanyaan dengan menggunakan skala *likert* dengan 4 kategori; 1-3 (gangguan ringan), 4-6 (gangguan sedang), 7-9 (gangguan berat) dan 10 (sangat mengganggu).

Jika responden yang tidak mampu mengisi kuesioner, maka penulis membantu mengisi kuesioner responden tersebut. Dari 7 pertanyaan yang tersedia, jika responden menjawab sangat mengganggu nilai tertinggi pada skala 10, maka diberi skor 70 dengan menggunakan skala rasio ($P = \text{rentang kelas} : \text{panjang kelas}$). Sehingga, disimpulkan untuk mengetahui nilai kategori nyeri sebagai berikut:

$$P = \frac{70}{4} = 17$$

Sangat mengganggu : 53-70

Gangguan nyeri berat : 36-53

Gangguan nyeri sedang : 18-35

Gangguan nyeri ringan : 0-17

Kuesioner skala nyeri

1. Aktivitas sehari-hari

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak mengganggu Sangat mengganggu

2. Suasana hati


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak mengganggu Sangat mengganggu

3. Berjalan

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak mengganggu Sangat mengganggu



3.5 Prosedur Pengambilan Data

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain:

3.5.1 Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus.

3.5.2 Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara.

3.5.3 Penyusunan Laporan

Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

3.6 Tempat/Waktu Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar yang dilaksanakan pada tanggal mulai pengkajian yaitu 28 Maret 2022 sampai 30 Maret 2022.

3.7 Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis data untuk mengetahui pengaruh intervensi pada subyek studi kasus yaitu dengan menggunakan lima proses keperawatan dalam hal ini pengkajian, diagnosis, intervensi dan evaluasi keperawatan, pengolahan data yang sudah didapatkan dari hasil pengkajian dari proses wawancara, pemeriksaan fisik dan observasi kemudian memasukan data yang telah didapatkan kedalam tabel analisa data dan kemudian dilakukan kategorisasi data untuk menentukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan keadaan pasien berdasarkan Buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), menentukan rencana tindakan keperawatan berdasarkan Buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) dan menentukan kriteria hasil yang ditetapkan berdasarkan Buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) kemudian melakukan tindakan keperawatan sesuai rencana yang ditetapkan dan yang terakhir mengevaluasi respon pasien menggunakan format SOAP setelah dilakukan tindakan khususnya pemberian terapi benson, penyajian data disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan serta menggambarkan bagaimana hasil pengkajian sampai dengan evaluasi.

3.8 Etika Studi Kasus

Menurut Hidayat (2019), etika penelitian yang harus diperhatikan yaitu:

3.8.1 *Informed consent* (persetujuan)

Sebelum melakukan pengkajian penulis terlebih dahulu melakukan *informed consent* pada klien. *Informed consent* adalah suatu bentuk persetujuan antara penulis dan pasien, *informed consent* bertujuan untuk mengetahui maksud, tujuan serta dampak intervensi yang ingin diberikan, dalam studi kasus ini penulis telah mendapat persetujuan pasien untuk diberikan intervensi.

3.8.2 *Anonimity* (Tidak menyebutkan nama)

Anonimity ini berhubungan dengan penyebutan nama pasien dimana didalamnya tidak diperbolehkan mencantumkan nama pasien saat pendokumentasian, cukup dengan menuliskan kode atau inisial nama pasien pada lembar dokumentasi. Dalam studi kasus ini penulis hanya menuliskan nama pasien menggunakan inisial.

3.8.3 *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Confidentiality berhubungan dengan jaminan kerahasiaan. Dalam studi kasus ini penulis menjaga kerahasiaan data-data yang diperoleh dan telah menjelaskan kepada klien dan keluarganya bahwa semua data-data klien akan dirahasiakan.



BAB IV

LAPORAN KASUS

4.1 Pengkajian

Data Demografi

Nama Lansia : Ny.S
Umur : 67 tahun
Alamat : Campalagia Polewali Mandar
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Keturunan
- Anak : 7
- Cucu : 25
Nama Suami/Istri : Alm.Z
Umur : -
Tgl Pengkajian : 28 Maret 2022

A. Pengkajian Fisik

Wawancara

Pandangan lanjut usia tentang kesehatannya:

Pasien mengatakan saat ini dia merasa tawakkal dan berserah diri kepada Allah SWT. Namun pasien mengatakan bahwa dia ingin sembuh dan tetap semangat untuk sembuh.

Kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia:

Keluarga mengatakan saat sehat pasien dapat menyapu rumah dan membersihkan area halaman, namun saat ini pasien tidak mampu melakukan hal tersebut. Pasien mengatakan saat ini ia tidak dapat bergerak bebas dan tidak dapat berjalan.

Kebiasaan lanjut usia merawat diri sendiri:

Keluarga mengatakan saat sehat pasien dapat secara mandiri melakukan perawatan diri (mandi, BAB, BAK, ganti pakaian, mengosok gigi) namun saat ini pasien perlu dibantu untuk perawatan diri. Saat ini tampak setiap pagi dan sore pasien di lap-

lap menggunakan tissue basah oleh keluarganya. Pasien nampak bersih, rapi dan wangi.

❑ **Kekuatan fisik lanjut usia:**

Pasien mengeluh tidak dapat mengerakkan kaki kirinya karena sakit. Tampak tidak ada masalah pada penglihatan dan pendengaran pasien, pasien dapat mendengar dengan baik

❑ **Kebiasaan makan, minum, istirahat/tidur, buang air besar/kecil:**

Pasien mengatakan saat ini biasanya ia makan 3 kali sehari dengan porsi sedang/15 sendok setiap makan dan mengkonsumsi minum sekitar 1200 cc perhari. Pasien mengatakan jam tidurnya tidak teratur tetapi rutin bangun subuh.

❑ **Kebiasaan gerak badan/olahraga/senam lanjut usia:**

Pasien mengatakan sebelum sakit ia rajin berolahraga dengan berjalan kaki dipagi hari, saat ini pasien tidak pernah lagi berolahraga semenjak ia sakit.

❑ **Perubahan-perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna dirasakan:**

Pasien mengatakan di usianya yang semakin tua ia mengatakan ia sering sakit-sakitan dan susah untuk melakukan pergerakan karena kaki kirinya sakit. Pasien mengatakan perubahan yang paling dia rasakan pada perubahan otot dan sendinya, ia mengeluh nyeri pada lutut kirinya

❑ **Kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatan dan kebiasaan dalam minum obat:**

Pasien mengatakan ia rutin dalam minum obat yang dianjurkan oleh dokter. Dan ia juga mengatakan selalu makan sayur dan buah yang disediakan keluarganya.

❑ **Masalah-masalah seksual yang dirasakan:** Pasien mengatakan tidak memiliki masalah

Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan dilakukan dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi untuk mengetahui perubahan sistem tubuh

Pendekatan yang digunakan dalam pemeriksaan fisik, yaitu:

- ***Head to toe***

- **Sistem tubuh**

1. Temperatur : 36,7°C

- Tempat pengukuran : Pada aksila

2. Pulse (denyut nadi)

➤ Kecepatan : 97x/menit

➤ Irama : Reguler

Tempat pengukuran : Arteri Radialis pada pergelangan tangan

3. Respirasi (Pernapasan)

➤ Kecepatan : 20x/menit

➤ Irama : Teratur

➤ Kedalaman : Dada bergerak secara simetris, tidak ada pernapasan cuping hidung

➤ Bunyi : Vesikuler

4. Tekanan darah : 95/69 mmHg

Posisi pengukuran : Pasien dalam posisi berbaring, pemeriksaan pada lengan atas sebelah kiri

5. Berat dan tinggi badan terakhir : BB 57 kg, TB 155 cm, IMT : 23,75

6. Tingkat orientasi

a. Waktu : Saat ditanya tanggal, bulan dan tahun berapa hari ini, pasien menjawab tanggal 28 bulan 3 tahun 2022

b. Tempat : Pasien mengetahui tempat tinggalnya dan dimana dia berada sekarang.

c. Orang : Pasien dapat mengenali orang baik itu keluarga dan orang lain.

7. **Memory (ingatan)** : Tidak ada masalah, pasien mampu mengingat tanggal lahir, nama suami, anak dan cucu-cucunya, pasien juga mampu menceritakan masa lalunya

8. **Tidur :**

- a. Kuantitas (lama tidur) : Pasien mengatakan pada malam hari 7 jam, sedangkan pada siang hari ± 2 jam
- b. Kualitas : Kualitas tidur tidak baik
- c. Pola : Pola tidur tidak teratur

9. **Istirahat**

- a. Kuantitas (lama tidur) : Malam 7 jam, siang 1-2 jam
- b. Kualitas : Tidak baik
- c. Pola : Tidak teratur

10. **Penyesuaian psikososial :**


Pasien mengatakan selama sakit ia bersyukur karena dukungan keluarganya yang selalu membantu dan memberikan perawatan yang baik baginya.

Sistem Persyarafan


- 1. Kesimetrian raut wajah : raut wajah pasien tampak simetris kiri dan kanan dan sering tersenyum
- 2. Tingkat kesadaran:
 - Snile (pikun) : pasien tidak mengalami pikun
 - Daya ingat : pasien memiliki daya ingat yang baik dan mampu mengingat masa lalunya
- 3. Mata
 - Pergerakan : Baik, pergerakan bola mata pasien mampu mengikuti pergerakan jari perawat
 - Penglihatan : Pasien mampu melihat tanpa alat bantu
 - Penyakit penyerta : Tidak ada penyakit penyerta
- 4. Pupil
 - Kesamaan : Isokor

5. Ketajaman penglihatan : pasien tidak mampu melihat jarak jauh, tetapi mampu melihat dengan jarak dekat
Cek kondisi kacamata : Tidak memakai kacamata
6. Sensori *deprivation* (gangguan sensorik) : Tidak ada gangguan
7. Ketajaman pendengaran
- Apakah menggunakan alat bantu dengar : Tidak menggunakan alat bantu pendengaran
 - Tinitus : Tidak
 - Serumen : Tidak ada serumen
8. Rasa sakit dan nyeri :
- P : pasien mengatakan nyeri dirasakan ketika ia menggerakkan kakinya
- Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk
- R : pasien mengatakan nyeri di bagian lutut kaki kirinya
- S : skala nyeri yang dirasakan 5/3 (gangguan nyeri berat)
- T : pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul selama ± 5 menit
- Pasien mengatakan akibat nyeri tersebut aktivitasnya menjadi terbatas dan pasien tampak tidak dapat berjalan. Selain itu, pasien tampak gelisah dan meringis.

1. Aktivitas sehari-hari



2. Suasana hati




3. Berjalan




4. Bekerja normal



5. Tidur



6. Hubungan dengan orang lain



Sistem Kardiovaskuler

1. Sirkulasi perifer
 - Warna : Merah muda
 - Waktu : >2 detik
 - Akral teraba hangat
2. Denyut nadi apikal : 89x/menit
3. Pembengkakan vena jugularis : Tidak ada pembengkakan
4. Pusing : Tidak mengalami pusing
5. Nyeri dada : Tidak ada nyeri dada
6. Edema : Adanya edema pada lutut kiri

Sistem Gastrointestinal

1. Status gizi : Baik dengan IMT : 23,75
2. Pemasukan diet : Pasien mengatakan tidak melakukan diet
3. Anoreksia : Tidak
4. Mual : Tidak mual
5. Muntah : Tidak muntah
6. Mengunyah dan menelan : Pasien mampu mengunyah dan menelan makanan dengan baik
7. Keadaan gigi : Tampak gigi atas pasien berjumlah 8 dan bawah 10
8. Rahang : Normal, tidak ada kelainan pada rahang

9. Rongga mulut : Normal, tidak terdapat stomatitis
10. Keadaan perut : Baik, tidak ada nyeri tekan dan tidak ada pembengkakan
11. Konstipasi (sembelit) : Tidak mengalami konstipasi
12. Diare : Tidak mengalami diare
13. Intontinesia alvi : Pasien mengatakan merasakan sensasi ketika hendak buang air kecil/besar

Sistem Genitourinarius

1. Warna dan bau urin : Berwarna kuning jernih dan bau khas urin
2. Distensi kandung kemih : Tidak ada distensi kandung kemih
3. Inkontinensia : Tidak terjadi inkontinensia
4. Frekuensi : Pasien mengatakan 5-7 kali sehari
5. Tekanan/desakan : Tidak ada tekanan atau desakan
6. Pemasukan cairan : 1200 cc
7. Pengeluaran cairan : 5-7 kali sehari
8. Disuria : Tidak mengalami disuria
9. Seksualitas : Pasien mengatakan ia sudah tidak pernah melakukannya, pasien mengatakan suaminya sudah meninggal.
Minat melaksanakan hubungan seks : pasien mengatakan tidak ada minat untuk melakukan seksualitas karena sudah tua.
Frekwensi : Tidak ada

Sistem Kulit

1. Kulit
 - Temperatur : 36,7°C
 - Tingkat kelembaban : Kulit terasa lembab
 - Keadaan luka : Tidak ada luka
 - Turgor (kekenyalan kulit) : Kulit lembek dan berkeriput
2. Jaringan parut : Tidak ada jaringan parut
3. Keadaan kuku : Pendek dan bersih
4. Keadaan rambut : Panjang, lurus, bersih dan nampak beruban
5. Gangguan-gangguan umum : Tidak ada

Sistem Muskuloskeletal

1. Kontraktur

- Otot : Mengalami penurunan kekuatan otot
- Tendon : Terjadinya penurunan fungsi tendon
- Gerakan sendi : Mengalami penurunan fungsi sendi, pasien mengatakan ia tidak dapat mengangkat kaki kirinya.

2. Tingkat mobilisasi

- Ambulasi (Dengan atau tanpa bantuan/ peralatan) : pasien mengatakan dengan bantuan keluarga
- Gerakan : Lambat, pasien tampak dibantu oleh keluarganya pada saat bangun dari tempat tidur
- Kekuatan otot : Melemah/menurun

4	4
4	1

- Kemampuan melangkah atau berjalan : Pasien mengatakan tidak mampu berjalan

3. Pemeriksaan sendi : Lutut kiri pasien nampak sulit ia gerakkan. Pasien mengatakan ia takut menggerakkan lututnya dan merasa nyeri dan kaku pada kaki kirinya.

4. Paralisis : Tidak

5. Kifosis : Tidak

B. Pengkajian Psikologis

- Pengenalan masalah-masalah utama : Pasien mengetahui masalah yang sedang dihadapi
- Sikap terhadap proses penuaan : Pasien mengatakan menerima karena semua orang pasti akan tua
- Perasaan dibutuhkan : Pasien mengatakan selalu merasa dibutuhkan, terutama oleh cucu-cucunya
- Pandangan terhadap kehidupan : Pasien tampak bersemangat dalam menjalani kehidupannya, pasien mengatakan semua orang akan kembali ke tuhan

- ❑ Koping stressor : Pasien mengatakan ingin segera pulang karena rindu dengan anak dan cucu-cucunya
- ❑ Penyesuaian diri : Pasien mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik
- ❑ Kegagalan : Pasien mengatakan tidak pernah merasa gagal, ia mengatakan tetap semangat untuk sembuh
- ❑ Harapan saat ini dan yang akan datang : Pasien berharap agar segera sembuh dan bisa kembali kerumah
- ❑ Fungsi kognitif
 - Daya ingat : Pasien mengatakan kadang ia lupa hari
 - Proses pikir : Baik, pasien saat menjawab pertanyaan nyambung
 - Alam perasaan : Baik, jika pasien menceritakan kebahagiaan ia nampak tersenyum dan kadang tertawa, apabila menceritakan tentang Alm suaminya ia nampak murung atau bersedih
 - Orientasi : Baik, pasien mampu menyebutkan saat ini sedang berada di RS
 - Kemampuan dalam penyelesaian masalah : pasien mengatakan dalam mengambil keputusan harus mengambil keputusan dengan anaknya

C. Sosial Ekonomi

- ❑ Sumber keuangan
 - Berasal dari anak-anaknya
- ❑ Kesibukan dalam mengisi waktu luang
 - Pasien mengaji dan berdzikir untuk mengisi waktu luangnya
- ❑ Teman tinggal
 - Tinggal bersama anak dan cucunya
- ❑ Kegiatan organisasi
 - Tidak ada
- ❑ Pandangan terhadap lingkungannya
 - Pasien mengatakan suka dengan lingkungannya hubungan dengan orang lain diluar rumah terbina dengan baik

Hubungan dengan orang lain baik

- Yang biasa mengunjungi
Keluarga dan tetangga
- Penyaluran hobi/kegiatan sesuai fasilitas yang ada :
Berdzikir

D. Spiritual

- Agama : Islam
- Kegiatan ibadah : Pasien sholat, puasa dan tampak senantiasa berzikir.
- Kegiatan keagamaan : Berinadah, berdoa dan berzikir
- Cara lanjut usia menyelesaikan masalah : Pasien mengatakan menyelesaikan masalah dengan berdoa dan berdiskusi dengan anaknya
- Penampilan lansia : Pasien tampak bersih dan rapi

E. Psikososial

- Tingkat ketergantungan : Pasien dibantu total dalam melakukan aktivitas
- Fokus diri : Baik, pasien mengatakan tidak hanya berfokus kepada diri sendiri tapi juga dengan anak cucunya
- Perhatian : Pasien mampu memperhatikan diri maupun lingkungannya
- Rasa kasih sayang : Pasien menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada keluarga dan orang lain

PENGAJIAN STATUS FUNGSIONAL

INDEKS KATZ	
SCORE	KRITERIA
A	Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, ke kamar kecil, berpakaian, dan mandi
B	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali satu dari fungsi tersebut (berpindah)
C	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi dan satu fungsi tambahan
D	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian dan satu fungsi tambahan
E	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan satu fungsi tambahan
F	Kemandirian dalam semua aktivitas hidup sehari-hari, kecuali mandi, berpakaian, berpindah dan satu fungsi tambahan
√	Ketergantungan pada enam fungsi tersebut

Beri tanda (√) pada point yang sesuai kondisi pasien Analisis

Interpretasi :

Ny.S ketergantungan untuk semua fungsi diatas

PENGKAJIAN STATUS KOGNITIF DAN AFEKTIF

<i>Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)</i>				
Score		No	Pertanyaan	Jawab
+	-			
	-	1	Tanggal berapa hari ini ?	Pasien menjawab tanggal 29
+		2	Hari apa sekarang ini ? (hari, tanggal, tahun)	Pasien menjawab hari Senin, tanggal 28 Maret 2022
+		3	Apa nama tempat ini ?	Pasien menjawab Rumah Sakit
		4a	Berapa nomor telpon anda ?	Pasien tidak ada nomor telefonnya
+		4b	Dimana alamat anda ? (tanyakan hanya bila pasien tidak mempunyai no.telepon)	Pasien menjawab di Mandar campalagia
+		5	Berapa umur anda ?	Pasien menjawab 74 tahun
+		6	Kapan anda lahir ?	Pasien menjawab 01-07-1957
+		7	Siapa presiden sekarang ?	Pasien menjawab bapak Jokowi
+		8	Siapa presiden sebelumnya ?	Pasien menjawab bapak Jokowi
+		9	Siapa nama kecil ibu anda ?	Pasien menjawab tidak tahu
	-	10	Kurangi 3 dari 20 dan tetap pengurangan 3 dari setiap angka baru, semua secara menurun	20 dikurang 3 = 17 17 dikurang 3 = 14 14 dikurang 3 = 11 11 dikurang 3 = 9 8 dikurang 3 = 5 5 dikurang 3 = 2

Penilaian :

- **Kesalahan 0– 2** **fungsi intelektual utuh**
- Kesalahan 3– 4 fungsi intelektual ringan
- Kesalahan 5– 7 fungsi intelektual sedang
- Kesalahan 8– 10 fungsi intelektual berat

**SKALA DEPRESI GERIATRIK
(GERIATRIC DEPRESSION SCALE /GDS)**

(Short Form)

No	Pertanyaan	Ya	Tdk
1	Apakah pada dasarnya anda puas dengan kehidupan anda?	0√	1
2	Apakah anda telah banyak meninggalkan kegiatan dan minat/kesenangan anda?	1√	0
3	Apakah anda merasa kosong dengan kehidupan yang dijalani saat ini?	1	0√
4	Apakah anda sering bosan ?	1	0√
5	Apakah anda mempunyai semangat yang baik setiap waktu ?	0√	1
6	Apakah anda takut sesuatu akan terjadi pada anda ?	1√	0
7	Apakah anda merasa bahagia di setiap waktu ?	0√	1
8	Apakah anda merasa tidak berdaya?	1	0√
9	Apakah anda lebih suka tinggal di rumah pada malam hari, daripada pergi dan melakukan sesuatu yang baru ?	1√	0
10	Apakah anda memiliki banyak masalah dengan daya ingat dibandingkan kebanyakan orang?		√
11	Apakah anda berpikir sangat menyenangkan hidup sekarang ini?	0√	1
12	Apakah anda merasa Saya sangat tidak berharga/ berguna?	1	0√
13	Apakah anda merasa penuh semangat?	0√	1
14	Apakah anda merasa tidak memiliki harapan?	1	0√
15	Apakah anda berpikir keadaan orang lain lebih baik daripada anda?		√
	Skor	3	

Penilaian :

0 – 5 : Normal

6 – 10 : Kemungkinan depresi

>10 : Depresi

SKALA JATUH MORSE (MORSE FALL SCALE/ MFS)

No.	Item	Skala		Skor
1	Riwayat jatuh Apakah lansia pernah jatuh dalam 3 bulan terakhir?	Tidak	0	
		Ya	25	25
2	Diagnosis sekunder Apakah lansia memiliki lebih dari satu penyakit?	Tidak	0	
		Ya	15	15
3	Alat bantu pergerakan <i>Bed rest</i> /dibantu perawat		0	0
	Walker/kruk/tongkat		15	
	Berpegangan pada benda sekitar (kursi, meja, lemari)		30	
4	Terapi intravena: Apakah saat ini lansia terpasang infus?	Tidak	0	
		Ya	20	20
5	Gaya berjalan/cara berpindah Normal		0	
	Lemah		10	
	Gangguan/tidak normal		20	20
6	Status mental Lansia menyadari kondisinya		0	0
	Lansia mengalami keterbatasan daya ingat		15	
Total nilai				80

Keterangan:

Tingkat Risiko	Nilai MPS	Tindakan
Tidak berisiko	0 -24	Perawatan dasar
Risiko rendah	25 - 50	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh standar
Risiko tinggi	≥ 51	Pelaksanaan intervensi pencegahan jatuh risiko tinggi

PENGKAJIAN STATUS SOSIAL

APGAR Keluarga					
No	Fungsi	Uraian	Selalu	Kadang	Hampir tidak pernah
			2	1	0
1	Adaptasi	Saya puas bahwa saya dapat kembali pada keluarga (teman-teman) saya untuk membantu pada waktu sesuatu menyusahkan saya	√		
2	Hubungan	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya membicarakan sesuatu dengan saya dan mengungkapkan masalah dengan saya	√		
3	Pertumbuhan	Saya puas bahwa keluarga (teman-teman) saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas atau arah baru	√		
4	Afeksi	Saya puas dengan cara keluarga (teman-teman) saya mengekspresikan afek dan berespons terhadap emosi-emosi saya, seperti marah, sedih atau mencintai	√		
5	Pemecahan	Saya puas dengan cara teman-teman saya dan saya menyediakan waktu bersama-sama	√		
TOTAL				10	

Penilaian :

0 – 5 Fungsi sosial kurang

6 – 10 Fungsi sosial baik

BARTHEL INDEKS

No	Kriteria	Dengan Bantuan	Mandiri	Keterangan
1	Makan	5	10	Frekuensi : 3 kali Jumlah : 450 mg Jenis : Nasi, sayur, ikan
2	Minum	5	10	Frekuensi : 10-13 kali Jumlah : Sedang Jenis : Air putih
3	Berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya	5	15	Dengan bantuan oleh keluarganya
4	Personal toilet (cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi)	0	5	Frekuensi : Setiap hari
5	Keluar masuk toilet (membuka pakaian, menyeka tubuh, menyiram)	5	10	Dengan bantuan oleh keluarganya
6	Mandi	5	15	Frekuensi : 2 kali sehari
7	Jalan di permukaan datar	0	5	Dengan bantuan oleh keluarganya
8	Naik turun tangga	5	10	Dengan bantuan oleh keluarganya
9	Mengenakan pakaian	5	10	Dengan bantuan oleh keluarganya
10	Kontrol bowel (BAB)	5	10	Frekuensi : 1 kali sehari
11	Kontrol bladder (BAK)	5	10	Pasien menggunakan popok
12	Olahraga/latihan	5	10	Dengan bantuan oleh keluarganya
13	Rekreasi/pemanfaatan waktu luang	5	10	Jenis : Frekuensi :
Total			55	

Keterangan :

- 130 : Mandiri
- 60-125 : Ketergantungan sebagian
- 55** : **Ketergantungan total**

PENILAIAN POTENSI DEKUBITUS (SKOR NORTON)

Kondisi Fisik Umum

- | | |
|-----------------|----------|
| a) Baik | 4 |
| b) Lumayan | 3 |
| c) Buruk | 2 |
| d) Sangat buruk | 1 |

Kesadaran

- | | |
|-------------------------|----------|
| a) Kompos mentis | 4 |
| b) Apatis | 3 |
| c) Sopor | 2 |
| d) Koma | 1 |

Aktivitas

- | | |
|---------------------------|----------|
| a) Ambulan | 4 |
| b) Ambulan dengan bantuan | 3 |
| c) Hanya bisa duduk | 2 |
| d) Tiduran | 1 |

Mobilitas

- | | |
|---------------------------|----------|
| a) Bergerak bebas | 4 |
| b) Sedikit terbatas | 3 |
| c) Sangat terbatas | 2 |
| d) Tidak bisa bergerak | 1 |

Inkontinen

- | | |
|------------------------------|----------|
| a) Tidak | 4 |
| b) Kadang-kadang | 3 |
| c) Sering inkontinesia urin | 2 |
| d) Inkontinensia alvi & urin | 1 |

Interpretasi :

15-20 : Kecil sekali/tak terjadi


12-15 : Kemungkinan kecil terjadi

< 12 : Kemungkinan Besar terjadi

Identifikasi aspek kognitif dan fungsi mental dengan menggunakan MMSE
(*Mini Mental Status Exam*)

- Orientasi
- Registrasi
- Perhatian
- Kalkulasi
- Mengingat kembali

No.	Aspek Kognitif	Nilai Maks	Nilai Pasien	Kriteria
1	Orientasi Waktu	5	3 karena hanya dapat menyebutkan hari, bulan dan tahun dengan benar	Menyebutkan dengan benar : (Nilai 1 untuk tiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▣ Tahun ▣ Bulan ▣ Hari ▣ Musim ▣ Tanggal
	Orientasi Tempat	5	5 karena mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar	Dimana kita sekarang berada? (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▣ Kota ▣ Propinsi/Kabupaten/Kecamatan ▣ Di ruangan mana ▣ Di lantai berapa ▣ Nama wisma.....
2	Registrasi	3	3 karena mampu menyebut semua obyek dengan benar	Sebutkan nama 3 obyek/benda (oleh pemeriksa), 1 detik untuk menyebutkan masing-masing obyek. Kemudian tanyakan kepada pasien ketiga obyek yang disebutkan tadi. (Nilai 1 untuk setiap jawaban) <ul style="list-style-type: none"> ▣ Obyek pintu ▣ Obyek jendela ▣ Obyek lampu
3	Perhatian dan kalkulasi	5	4 karena mampu mengeja kata dari belakang, tetapi tidak mampu menghitung mundur	Minta pasien mengeja 5 kata dari belakang, misal "BAPAK" <ul style="list-style-type: none"> • K • A • P • A • B Minta pasien hitung mundur dari 100 ke bawah dengan pengurangan 5. Berhenti setelah mendapat nilai 75. (Nilai 1 setiap jawaban benar)
4	Mengingat	3	3 karena mampu menyebut	Minta pasien untuk mengulangi ketiga obyek pada No.2 (registrasi) tadi. Bila benar, 1 poin untuk masing-masing obyek.

			semua obyek dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu • Jendela • Lampu
5	Bahasa (9) Menamai	2	2 karena mampu menyebut nama benda dengan benar	Tunjukkan pada pasien suatu benda dan tanyakan namanya pada pasien. <ul style="list-style-type: none"> ■ (misal jam tangan) ■ (misal pensil)
	Pengulangan	1	1 karena mampu menyebut ulang dengan benar	Minta pasien untuk mengulang kata berikut : “Tak ada jika, dan, atau, tetapi.” Bila benar, nilai satu poin. <ul style="list-style-type: none"> ■ Pernyataan benar 2 buah (contoh : tak ada, tetapi)
	Pemahaman	3	3 karena mampu mengikuti perintah dengan benar	Minta pasien untuk mengikuti perintah berikut yang terdiri dari 3 langkah : Ambil kertas di tangan anda, lipat dua, dan taruh di lantai.” <ul style="list-style-type: none"> ■ Ambil kertas di tangan anda ■ Lipat dua ■ Taruh di lantai
	Membaca	1	1 karena mampu mengikuti perintah dengan benar	Perintahkan pada pasien untuk hal Berikut (bila aktivitas sesuai perintah nilai 1 point) <ul style="list-style-type: none"> ■ “Tutup mata Anda”
	Menulis	1	1 karena mampu menulis kalimat dengan benar	Perintahkan pada pasien untuk menulis satu kalimat dan menyalin gambar. <ul style="list-style-type: none"> ■ Tulis satu kalimat “saya ingin sembuh”
	Menggambar	1	1 karena mampu menggambar dengan benar	Perintahkan pasien untuk menggambar, gambar di bawah ini : 


Interpretasi hasil

26-30 : Aspek kognitif dan fungsi mental baik (27)

21-25 : Aspek kognitif dari fungsi mental ringan

11-20 : Kerusakan aspek fungsi mental sedang

0-10 : Terdapat kerusakan aspek fungsi mental berat



Pengkajian Keseimbangan

Pengkajian keseimbangan dinilai dari dua komponen utama dalam bergerak, dari kedua komponen tersebut dibagi dalam beberapa gerakan yang perlu di observasi oleh perawat. Kedua komponen tersebut adalah:

1) Perubahan posisi atau gerakan keseimbangan

Beri nilai 0 jika pasien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, dan 1 bila menunjukkan kondisi berikut ini.

- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan dalam analisis) dengan mata terbuka*

Tidak bangun dari tempat tidur dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali (0)

- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata terbuka*
Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk di tengah kursi (0)

- *Bangun dari tempat duduk (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup*

Tidak bangun dari tempat duduk dengan sekali gerakan, akan tetapi lansia mendorong tubuhnya ke atas dengan tangan atau bergerak ke bagian depan kursi terlebih dahulu, tidak stabil pada saat berdiri pertama kali (0)

- *Duduk ke kursi (dimasukkan ke dalam analisis) dengan mata tertutup*
Menjatuhkan diri ke kursi, tidak duduk ke tengah kursi (1)

Keterangan : Kursi harus yang keras tanpa lengan

- *Menahan dorongan pada sternum (Pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata terbuka*

Pasien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya (1)

- *Menahan dorongan pada sternum (pemeriksa mendorong sternum sebanyak 3 kali dengan hati-hati) dengan mata tertutup*

Pasien menggerakkan kaki, memegang objek untuk dukungan, kaki tidak menyentuh sisi-sisinya (1)

- *Perputaran leher (pasien sambil berdiri)*

Menggerakkan kaki, menggenggam objek untuk dukungan kaki; keluhan vertigo, pusing, atau keadaan tidak stabil (1)

- *Gerakan menggapai sesuatu)*

Tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya sementara berdiri pada ujung-ujung jari kaki, tidak stabil memegang sesuatu untuk dukungan (0)

- *Membungkuk*

Tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek-objek kecil (misalnya pulpen) dari lantai, memegang objek untuk bisa berdiri lagi, dan memerlukan usaha-usaha yang keras untuk bangun (0)

2) Komponen gaya berjalan atau pergerakan

Beri nilai 0 jika pasien tidak menunjukkan kondisi di bawah ini, atau beri nilai 1 jika pasien menunjukkan salah satu dari kondisi di bawah ini :

- *Minta pasien untuk berjalan ke tempat yang ditentukan*

Ragu-ragu, tersandung, memegang objek untuk pegangan (1)

- *Ketinggian langkah kaki (mengangkat kaki saat melangkah)* Kaki tidak naik dari lantai secara konsisten (menggeser atau menyeret kaki), mengangkat kaki terlalu tinggi (> 5 cm) (1)

- *Kontinuitas langkah kaki (lebih baik diobservasi dari samping pasien)*

Setelah langkah-langkah awal menjadi tidak konsisten, memulai mengangkat satu kaki sementara kaki yang lain menyentuh lantai (1)

- *Kesimetrisan langkah (lebih baik diobservasi dari samping pasien)*

Langkah tidak simetris, terutama pada bagian yang sakit (1)

- *Penyimpangan jalur pada saat berjalan (lebih baik diobservasi dari samping kiri pasien)*

Tidak berjalan dalam garis lurus, bergelombang dari sisi ke sisi (1)

- *Berbalik*

Berhenti sebelum mulai berbalik, jalan sempoyongan, bergoyang, memegang objek untuk dukungan (1)


Interpretasi hasil: Nilai yang diperoleh adalah 11

Jumlahkan semua nilai yang diperoleh pasien, kemudian di interpretasikan sebagai berikut :

0 – 5 risiko jatuh rendah

6 – 10 risiko jatuh sedang

11 – 15 risiko jatuh tinggi



Waktu duduk dan berdiri pasien

No	Langkah
1.	Posisi pasien duduk di kursi
2.	Minta pasien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah (3 meter), kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik

Interpretasi :

Pasien tidak dapat melakukannya

≤ 10 detik : Risiko jatuh rendah

11-19 detik : Risiko jatuh sedang

20-29 detik : Risiko jatuh tinggi

≥ 30 detik : Gangguan mobilitas dan risiko jatuh tinggi



4.2 Diagnosis

ANALISA DATA

NO.	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN				
1.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengeluh nyeri P : pasien mengatakan nyeri dirasakan ketika ia menggerakkan kakinya Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk R : pasien mengatakan nyeri di bagian lutut kaki kirinya S : skala nyeri yang dirasakan 53 (gangguan nyeri berat) T : pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul selama ± 5 menit <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak meringis Pasien tampak gelisah TTV : TD : 95/69 mmHg, HR:97 x/menit, RR: 20x/menit, S: 37,4 C Hasil pengukuran skala nyeri <i>likert</i> 53 yang artinya gangguan nyeri berat 	Agen pencedera fisiologis	Nyeri Akut				
2.	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien mengatakan sulit mengerakkan kaki sebelah kirinya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pasien tampak lemah Kekuatan otot <table border="1" data-bbox="528 1536 732 1603"> <tr> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </table> Pasien dibantu total dalam melakukan aktivitas Hasil pengkajian <i>barthel indeks</i> total 55 artinya ketergantungan total 	4	4	4	1	Gangguan musculoskeletal	Gangguan Mobilitas Fisik
4	4						
4	1						
3	<p>Faktor risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> Usia >65 tahun Riwayat jatuh 3 bulan terakhir Kekuatan otot menurun Skala <i>Morse Fall Scale</i> 	Kekuatan otot menurun	Risiko Jatuh				


	(MFS) dengan skor 80 yang artinya risiko tinggi 5. Pengkajian keseimbangan : 11 yang berate risiko jatuh tinggi		
4	Faktor risiko: 1. Penurunan Hemoglobin 2. Leukopenia 3. WBC (<i>White Blood Cell count</i>) : 0,4 (4.00-10.00) 4. RBC (<i>Red Blood Cell</i>) :3,7 (4.00-6.00) 5. HGB (Hemoglobin) : 6.8 (12.0-16.0) 6. HCT (Hematokrit) : 29 (37.0-48.0) 7. Tampak terpasang infus 8. Penilaian potensi decubitus (Skor Norton) : 15 yang beratri kecil sekali/tak terjadi	Ketidak adekuatan pertahanan tubuh sekunder	Risiko Infeksi

4.3 Intervensi

No.	Diagnosis keperawatan	Kriteria evaluasi	Intervensi	Rasional
1.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dibuktikan dengan: DS:</p> <p>1. Pasien mengeluh nyeri P : pasien mengatakan nyeri dirasakan ketika ia menggerakkan kakinya Q : pasien mengatakan nyeri seperti tertusuk-tusuk R : pasien mengatakan nyeri di bagian lutut kaki kirinya S : skala nyeri yang dirasakan 53 (gangguan nyeri berat) T : pasien mengatakan nyeri yang dirasakan hilang timbul selama ±5 menit</p> <p>DO:</p> <p>1. Pasien tampak meringis 2. Pasien tampak gelisah 3. TTV : TD : 95/69 mmHg, HR:97 x/menit, RR: 20x/menit, S: 37,4 C 4. Hasil pengukuran skala nyeri 53 yang artinya gangguan nyeri berat</p>	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan manajemen nyeri selama 3x24 jam pertemuan, diharapkan tingkat nyeri pasien menurun dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Keluhan nyeri menurun (Skala 0-17) 2. Meringis menurun</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</p> <p>2. Identifikasi skala nyeri</p> <p>3. Identifikasi respon nyeri non verbal</p> <p>4. Identifikasi faktor yang memper berat dan memperingan nyeri</p> <p>5. Identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri</p> <p>6. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</p> <p>7. Monitor keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p> <p>8. Monitor efek samping penggunaan analgetik</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi benson)</p> <p>2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.</p>	<p>Observasi</p> <p>1. Agar mengetahui lokasi, derajat dan tingkat nyeri yang dialami dan untuk dapat melakukan intervensi selanjutnya</p> <p>2. Untuk menentukan derajat nyeri</p> <p>3. Untuk mengetahui respon nonverbal yang diperlihatkan pasien saat nyeri muncul</p> <p>4. Untuk mengetahui apa penyebab nyeri</p> <p>5. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan pasien tentang nyeri yang di alami</p> <p>6. Untuk melihat apakah terapi yang diberikan berhasil atau tidak</p> <p>7. Untuk mengetahui keberhasilan terapi komplementer yang sudah diberikan</p> <p>8. Untuk memantau efek samping dari pemberian obat pereda nyeri</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien</p> <p>2. Untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan pasien dan memberikan</p>

			<p>suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</p> <p>3. Fasilitasi istirahat dan tidur</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi meredakan nyeri 3. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri 4. Anjurkan menggunakan analgetik secara tepat 5. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik 	<p>kenyamanan</p> <p>3. Agar strategi yang diberikan bisa efektif dalam meredakan nyeri</p> <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan pemahaman agar pasien tidak gelisah saat nyeri timbul 2. Untuk mengontrol mengatasi nyeri ketika nyeri muncul 3. Untuk manajemen nyeri secara mandiri 4. Penggunaan analgetik yang tepat dapat mengurangi rasa nyeri 5. Untuk menghindari peningkatan nyeri <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk membantu menekan rasa nyeri 				
2.	<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan musculoskeletal dibuktikan dengan:</p> <p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengatakan sulit menggerakkan kaki sebelah kirinya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien tampak lemah 2. Kekuatan otot <table border="1"> <tr> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1</td> </tr> </table> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien dibantu total dalam melakukan aktivitas 4. Hasil pengkajian <i>barthel indeks</i> total 	4	4	4	1	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan dukungan mobilisasi selama 3x24 jam pertemuan, diharapkan mobilitas fisik pasien meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergerakan ekstremitas meningkat 2. Kekuatan otot meningkat 	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor frekuensi jantung dan tekanan darah seelum memulai mobilisasi 4. Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Pagar tempat tidur) 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui apabila adanya nyeri dan keluhan fisik lainnya 2. Mengetahui adanya keterbatasan dalam melakukan aktivitas 3. Mengetahui frekuensi jantung dan tekanan darah pasien 4. Mengathu kondisi umum pasien untuk memberikan dukungan mobilisasi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasang pagar pengaman tempat tidur untuk mencegah terjadinya insiden
4	4							
4	1							

	55 artinya ketergantungan total		<p>2. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu</p> <p>3. Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Jelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi</p> <p>2. Anjurkan melakukan mobilisasi dini</p> <p>3. Anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan (mis. Duduk di tempat tidur, duduk di sisi tempat tidur, pindah dari tempat tidur ke kursi)</p>	<p>2. Memfasilitasi pergerakan apabila mampu</p> <p>3. Libatkan keluarga untuk membantu mobilisasi pasien</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Perlunya Pendidikan bahwa mobilisasi dini perlu diberikan kepada pasien</p> <p>2. Mobilisasi dini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekakuan pada sendi</p> <p>3. Mobilisasi sederhana ditempat tidur dapat dilakukan seperti miring kiri dan miring kanan</p>
3.	<p>Risiko jatuh dibuktikan dengan Faktor risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia >65 tahun 2. Riwayat jatuh 3 bulan terakhir 3. Kekuatan otot menurun 4. Skala <i>Morse Fall Scale</i> (MFS) dengan skor 80 yang artinya risiko tinggi 5. Pengkajian keseimbangan : 11 yang berate risiko jatuh tinggi 	<p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam kepada Ny.S diharapkan tingkat jatuh menurun dengan kriteria hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jatuh dari tempat tidur menurun 	<p>Pencegahan Jatuh</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi faktor risiko jatuh 2. Identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi 3. Identifikasi faktor lingkungan yang meningkatkan faktor risiko 4. Hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala 5. Monitor kemampuan berpindah dari tempat tidur kee kursi roda dan sebaliknya <p>Terapeutik</p>	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal perilaku dan faktor-faktor yang berpotensi mengakibatkan jatuh 2. Memonitor adanya risiko jatuh guna melakukan pencegahan 3. Mengenal keadaan lingkungan sekitar yang berkontribusi terhadap resiko jatuh 4. Mengetahui tingkat resiko jatuh 5. Untuk meningkatkan keamanan dan kemandirian pasien <p>Terapeutik</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi ruangan pada pasien dan keluarga 2. Pastikan roda tempat tidur dan kursi roda selalu dalam kondisi terkunci 3. Pasang <i>handrell</i> tempat tidur 4. Atur tempat tidur mekanis pada posisi terendah 5. Tempatkan pasien berisiko tinggi jatuh dekat dengan pantauan perawat dari <i>nurse station</i> 6. Dekatkan bell pemanggil dalam jangkauan pasien <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan memanggil peawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah 2. Anjurkan menggunakan alas kaki yang tidak licin 3. Anjurkan berkonsentrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh 4. Anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri 5. Ajarkan cara menggunakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengenal ruangan dan mengidentifikasi tempat yang memiliki resiko jatuh 2. Meminimalisir resiko jatuh dari tempat tidur atau kursi roda 3. Dapat menciptakan aktivitas yang mandiri dengan aman dan nyaman 4. Dapat merasa takut jatuh karena perubahan ukuran dan tinggi tempat tidur 5. Memudahkan perawat untuk mengawasi pasien dengan resiko jatuh 6. Membuat pasien memiliki rasa aman, dapat mengatur diri dan mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan resiko terjatuh 2. Membantu pasien untuk berjalan dengan langkah yang menetap/mempertahankan keseimbangan diri dengan mencegah terjadinya kaki terkilir 3. Meminimalisir resiko jatuh 4. Meminimalisir risiko jatuh 5. Membuat pasien memiliki rasa aman dan
--	--	---	---	---

			bel pemanggil untuk memanggil perawat	mengurangi ketakutan karena ditinggal sendiri
4.	<p>Risiko infeksi dibuktikan dengan Faktor risiko:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Hemoglobin 2. Leukopenia 3. WBC (<i>White Blood Cell count</i>) : 0,4 (4.00-10.00) 4. RBC (<i>Red Blood Cell</i>) :3,7 (4.00-6.00) 5. HGB (Hemoglobin) : 6.8 (12.0-16.0) 6. HCT (Hematokrit) : 29 (37.0-48.0) 7. Tampak terpasang infus 8. Penilaian potensi decubitus (Skor Norton) : 15 yang beratri kecil sekali/tak terjadi 	<p>Setelah diberikan intervensi keperawatan 3x24 jam Pencegahan infeksi maka tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar sel darah putih membaik 	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Batasi jumlah pengunjung 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien 3. Pertahankan Teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 2. Ajarkan cara mencuci tangan dengan benar 3. Ajarkan cara memeriksa kondisi luka atau luka operasi 4. Anjurkan meningkatkan asupan nutrisi 5. Anjurkan meningkatkan cairan <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian imunisasi 	<p>Observasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui adanya tanda dan gejala infeksi <p>Terapeutik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengunjung bisa saja membawa bakteri dan kuman dari luar sehingga pasien terkontaminasi 2. Mencuci tangan untuk mencegah terkontaminasi dengan bakteri dan kuman 3. Untuk mencegah penyakit infeksi yang lebih beresiko <p>Edukasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya edukasi tanda dan gejala sejak dini pada keluarga 2. Cuci tangan dengan benar pada keluarga 3. Mengajarkan pada pasien dan keluarga apabila ada luka maka perlu dicegah agar tidak terjadi infeksi 4. Asupan nutrisi yang seimbang untuk memperkuat kekebalan tubuh 5. Anjurkan asupan cairan air minum <p>Kolaborasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. imunisasi salah satu pencegahan untuk meningkatkan kekebalan tubuh

4.4 Implementasi dan Evaluasi Keperawatan

Diagnosis keperawatan	Hari/Tanggal/Jam	Implementasi Keperawatan	Evaluasi	Paraf dan Nama
Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis	Senin, 28 Maret 2022	Manajemen Nyeri Observasi	Senin, 28 Maret 2022 14.00 WITA	Hikmah
	09.00 WITA	1. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri 53 yang artinya gangguan nyeri berat	S: Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan berkurang O: Skala nyeri berkurang menjadi 46 atau nyeri berat, pasien nampak tenang	
	09.05 WITA	2. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri Hasil : lokasi nyeri pada daerah lutut sebelah kirinya, hilang timbul dan merasa seperti di tusuk-tusuk	TTV TD : 90/73 mmHg N : 92 x/menit S : 37,1°C P : 20x/menit	
	09.07 WITA	3. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil: pasien nampak gelisah dan meringis	A: Masalah nyeri akut belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan	
	09.10 WITA	4. Mengidentifikasi faktor yang memperberat nyeri Hasil : Pasien mengatakan saat menggerakkan kakinya	1. Identifikasi skala nyeri 2. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Relaksasi Benson)	
	09.15 WITA	5. Mengidentifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup Hasil : pasien mengatakan mengganggu tidurnya		
	09.18 WITA	6. Memonitor efek samping penggunaan analgetik Hasil : pasien mengatakan tetap merasakan nyeri		
	10.00 WITA	Terapeutik 1. Memberikan teknik		

		<p>nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi benson)</p> <p>hasil : pasien mengatakan nyerinya menurun menjadi 50</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri</p> <p>Hasil : pasien dan keluarganya paham mengenai penyebab, periode dan pemicu nyeri</p>						
	10.35 WITA							
Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan musculoskeletal	Senin, 28 Maret 2022 09.00 WITA	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya</p> <p>Hasil : klien mengatakan nyeri pada kaki kirinya dan sulit menggerakannya</p>	Senin, 28 Maret 2022 14.03 WITA	Hikmah				
	12.10 WITA	<p>2. Memonitor tekanan darah sebelum memulai mobilisasi</p> <p>Hasil : TD : 100/96 mmHg, RR : 20x/menit, N : 98x/menit. S : 36,8°C</p>	<p>S: Pasien mengatakan ia mampu menggerakkan kakinya secara perlahan-lahan</p> <p>O:</p> <p>1. TTV</p> <p>TD : 95/69 mmHg</p> <p>N : 96x/menit</p> <p>RR : 20x/menit</p> <p>S : 36,°C</p>					
	12.15 WITA	<p>3. Memonitor kondisi umum selama melakukan molisasi</p> <p>Hasil : pasien nampak lemas tetapi memiliki semangat yang tinggi</p>	<p>2. Kekuatan otot :</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> </tr> </table>		4	4	4	1
	4	4						
4	1							
12.20 WITA	<p>Terapeutik</p> <p>1. Membantu melakukan pergerakan (ROM pasif)</p> <p>Hasil : Peneliti membantu pasien melakukan ROM pasif</p> <p>Edukasi</p>	<p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>1. Membantu melakukan pergerakan ROM</p>						

	12.21 WITA	1. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : Pasien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur mobilisasi		
Risiko jatuh dibuktikan dengan faktor risiko kekuatan otot menurun	Senin, 28 Maret 2022 09.10 WITA 09.15 WITA 09.20 WITA 09.25 WITA 09.30 WITA	Pencegahan Jatuh Observasi 1. Mengidentifikasi faktor risiko jatuh Hasil : pasien berusia >65 tahun dan kekuatan otot pasien menurun 2. Menhitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : skala morse 80 risiko tinggi jatuh Terapeutik 1. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur pasien terkunci dengan baik 2. Memasang <i>handrell</i> tempat tidur Hasil : <i>handrell</i> tempat tidur terpasang dengan baik Edukasi 1. Menganjurkan memanggil peawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah	Senin, 28 Maret 2022 14.05 WITA S: pasien mengatakan ia merasa aman O: nampak terpasang <i>handrell</i> dan roda tempat tidur terkunci A: Risiko Jatuh tidak terjadi P: Lanjutkan Intervensi 1. Menghitung skala morse 2. Memasang kunci roda dan <i>handrall</i>	Hikmah
Risiko infeksi dibuktikan dengan faktor risiko ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder	Senin, 28 Maret 2022 11.30 WITA	Pencegahan Infeksi Observasi 1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik	Senin, 28 Maret 2022 14.10 WITA Risiko Infeksi S: -	Hikmah

	<p>11.40 WITA</p> <p>08.00 WITA</p> <p>08.00 WITA</p> <p>11. 50 WITA</p>	<p>Hasil : hasil pemeriksaan didapatkan penurunan WBC:0,4, RBC :3,7, HGB: 6.8 dan PLT: 31</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Membatasi jumlah pengunjung Hasil : hanya anak pasien yang berkunjung</p> <p>2. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : perawat mencuci tangan dan menjaga kebersihan</p> <p>3. Mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi Hasil : tidak terjadi penularan bakteri</p> <p>Edukasi</p> <p>1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : pasien dan keluarganya mengetahui tanda dan gejala infeksi</p>	<p>O: Suhu: 36,7 C , WBC:0,4, PLT:31</p> <p>A: Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>3. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</p>	
<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis</p>	<p>Selasa, 29 Maret 2022</p> <p>07.30 WITA</p> <p>07.33 WITA</p> <p>07 35 WITA</p>	<p>Manajemen Nyeri</p> <p>Observasi</p> <p>1. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri 46 yang artinya gangguan nyeri berat</p> <p>2. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil: pasien nampak meringis</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk</p>	<p>Selasa, 29 Maret 2022</p> <p>14.00 WITA</p> <p>S: Pasien mengatakan nyeri pada kaki kirinya berkurang</p> <p>O: Skala nyeri 37 dengan gangguan nyeri berat, pasien nampak tidak meringis</p> <p>TTV</p> <p>TD : 100/93 mmHg</p> <p>N : 91 x/menit</p> <p>S : 36,3°C</p>	<p>Hikmah</p>

		<p>mengurangi rasa nyeri (relaksasi benson) Hasil : pasien mengatakan nyerinya menurun menjadi 42 yang artinya gangguan nyeri berat</p> <p>Edukasi</p> <p>08.00 WITA</p> <p>1. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil : pasien dan keluarganya paham mengenai strategi meredakan nyeri menggunakan relaksasi benson</p> <p>08.10 WITA</p> <p>2. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri selama 3x sehari Hasil : Pasien mau melakukan relaksasi benso secara mandiri</p>	<p>P : 20x/menit A: Masalah nyeri akut belum teratasi P: Intervensi dilanjutkan</p> <p>1. Identifikasi skala nyeri 2. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Terapi Benson) 3. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri (mis.suhu ruangan, pencahayaan, kebisingan)</p>					
Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan musculoskeletal	<p>Selasa,29 Maret 2022</p> <p>08.12 WITA</p> <p>08.15 WITA</p> <p>08.20 WITA</p>	<p>Dukungan mobilisasi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : TD : 100/96 mmHg, RR : 20x/menit, N : 98x/menit. S : 36,8°C</p> <p>2. Memonitor kondisi umum selama melakukan molisasi Hasil : pasien nampak lemas tetapi memiliki semangat yang tinggi</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Membantu melakukan pergerakan (ROM pasif) Hasil : Peneliti membantu pasien melakukan ROM pasif</p>	<p>Selasa, 29 Maret 2022</p> <p>14.05 WITA</p> <p>S: Pasien mengatakan ia mampu menggerakkan kakinya secara perlahan-lahan</p> <p>O:</p> <p>1. TTV TD : 95/69 mmHg N : 96x/menit RR : 20x/menit S : 36,°C</p> <p>2. Kekuatan otot :</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td> </tr> </table> <p>A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi</p>	4	4	4	1	Hikmah
4	4							
4	1							

	08.20 WITA	Edukasi 1. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : Pasien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur mobilisasi	1. Melakukan ROM pasif	
Risiko jatuh dibuktikan dengan faktor risiko kekuatan otot menurun	Selasa, 29 Maret 2022 07.30 WITA 07.40 WITA 07.43 WITA	Observasi 1. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : skala morse 55 risiko tinggi jatuh Terapeutik 1. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur pasien terkunci dengan baik 2. Memasang <i>handrell</i> tempat tidur Hasil : <i>handrell</i> tempat tidur terpasang dengan baik	Selasa, 29 Maret 2022 14.10 WITA S: pasien mengatakan ia merasa aman O: nampak terpasang <i>handrell</i> dan roda tempat tidur terkunci A: Risiko Jatuh tidak terjadi P: Lanjutkan Intervensi 1. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala morse	Hikmah
Risiko infeksi dibuktikan dengan faktor risiko ketidakadekuatan pertahanan tubuh sekunder	Selasa, 29 Maret 2022 10.00 WITA 07.00 WITA 07.05 WITA	Pencegahan Infeksi Observasi 1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik Hasil pemeriksaan didapatkan penurunan WBC:0,4, RBC :3,7, HGB: 6.8 dan PLT: 31 Terapeutik 1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien Hasil : perawat mencuci tangan dan menjaga kebersihan 2. Mempertahankan teknik aseptik	Selasa, 29 Maret 2022 14.15 WITA S: - O: Suhu: 36,7 C , WBC:0,4, PLT:31 A: Risiko Infeksi tidak terjadi P: Lanjutkan intervensi Observasi 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien	Hikmah

	10.10 WITA	<p>pada pasien berisiko tinggi Hasil : tidak terjadi penularan bakteri</p> <p>Edukasi 1. Menjelaskan tanda dan gejala infeksi Hasil : pasien dan keluarganya mengetahui tanda dan gejala infeksi</p>	3. Pertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi	
Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis	<p>Rabu, 30 Maret 2022 07.45 WITA</p> <p>07.48 WITA</p> <p>08.00 WITA</p> <p>08.30 WITA</p>	<p>Manajemen Nyeri Observasi 1. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil : skala nyeri 39 yang artinya sangat mengganggu 2. Mengidentifikasi respon nyeri non verbal Hasil: pasien nampak mengkerutkan alisnya</p> <p>Terapeutik 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi benson) Hasil : pasien mengatakan nyerinya menurun menjadi 33 yang artinya gangguan nyeri sedang</p> <p>Edukasi 1. Menganjurkan memonitor nyeri secara mandiri Hasil : pasien mau melakukan terapi benson secara mandiri 3x sehari</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022 14.05 WITA S: Pasien mengatakan nyerinya berkurang dan merasa nyaman O: Skala nyeri 21 dengan nyeri gangguan sedang, pasien nampak lebih rileks TTV TD : 90/87 mmHg N : 86 x/menit S : 36,3°C P : 20x/menit A: Masalah nyeri akut teratasi P: Pertahankan intervensi : 1. Memberikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi benson)</p>	Hikmah

<p>Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan musculoskeletal</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022 07.50 WITA 08.40 WITA 08.40 WITA 08.45 WITA</p>	<p>Dukungan mobilisasi Observasi 1. Memonitor tekanan darah sebelum memulai mobilisasi Hasil : TD : 100/96 mmHg, RR : 20x/menit, N : 98x/menit. S : 36,8°C 2. Memonitor kondisi umum selama melakukan molisasi Hasil : pasien nampak lemas tetapi memiliki semangat yang tinggi Terapeutik 1. Membantu melakukan pergerakan (ROM pasif) Hasil : Peneliti membantu pasien melakukan ROM pasif Edukasi 1. Menjelaskan tujuan dan prosedur mobilisasi Hasil : Pasien dan keluarga memahami tujuan dan prosedur mobilisasi</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022 14.15 WITA S: Pasien mengatakan ia mampu menggerakkan kakinya secara perlahan-lahan O: 1. TTV TD : 95/69 mmHg N : 96x/menit RR : 20x/menit S : 36,°C 2. Kekuatan otot : <table border="1" style="margin-left: 20px;"><tr><td style="padding: 2px 10px;">4</td><td style="padding: 2px 10px;">4</td></tr><tr><td style="border-top: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</td><td style="border-top: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</td></tr></table> A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Membantu melakukan pergerakan (ROM pasif)</p>	4	4	4	2	<p>Hikmah</p>
4	4							
4	2							
<p>Risiko jatuh dibuktikan dengan faktor risiko kekuatan otot menurun</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022 09.00 WITA 09.10 WITA</p>	<p>Pencegahan Jatuh Observasi 1. Menghitung risiko jatuh dengan menggunakan skala Hasil : skala morse 21 risiko tinggi jatuh Terapeutik 1. Memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci Hasil : roda tempat tidur pasien</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022 14.20 WITA S: Pasien mengatakan tidak jatuh selama perawatan O: nampak terpasang <i>handrell</i> dan roda tempat tidur terkunci A: Risiko Jatuh tidak terjadi P: Pertahankan Intervensi 1. Menghitung risiko jatuh dengan skala morse 2. Memasang roda tempat tidur</p>	<p>Hikmah</p>				

	09.13 WITA	<p>terkunci dengan baik</p> <p>2. Memasang <i>handrell</i> tempat tidur</p> <p>Hasil : <i>handrell</i> tempat tidur terpasang dengan baik</p>	3. Memasang <i>handrell</i> tempat tidur	
Risiko infeksi dibuktikan dengan faktor risiko ketidak adekuatan pertahanan tubuh sekunder	<p>Rabu, 30 Maret 2022</p> <p>09.30 WITA</p> <p>07.00 WITA</p> <p>07.00 WITA</p>	<p>Pencegahan Infeksi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>Hasil : pemeriksaan didapatkan penurunan WBC:0,4, RBC :3,7, HGB: 6.8 dan PLT: 31</p> <p>Terapeutik</p> <p>1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>Hasil : perawat mencuci tangan dan menjaga kebersihan</p> <p>2. Pertahankan Teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</p>	<p>Rabu, 30 Maret 2022</p> <p>14.25 WITA</p> <p>S: -</p> <p>O: Suhu: 36,3 C , WBC:0,6, RBC : 3.72, HGB : 10,4 PLT:31</p> <p>A: Risiko Infeksi tidak terjadi</p> <p>P: Lanjutkan intervensi</p> <p>Observasi</p> <p>1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik</p> <p>2. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien</p> <p>3. Pertahankan Teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi</p>	Hikmah

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Analisis Asuhan Keperawatan

5.1.1 Analisis Pengkajian

Pengkajian pada Ny.S dimulai pada tanggal 28 Maret 2022 di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saat ini Ny.S berumur 67 tahun ia mengeluh nyeri pada bagian kaki kirinya. Hal ini sejalan dengan penelitian Malo dkk (2019) bahwa usia sangat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang karena semakin bertambahnya usia akan rentan mengalami penurunan fungsi tubuh baik dari segi fisik, mental, sosial dan spiritual. Oleh karena itu, usia dapat memberikan pengaruh terhadap kesehatan lansia. Ny.S juga mengatakan bahwa nyeri yang dirasakan pada kaki kirinya sudah sejak 4 hari yang lalu. Sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh (Widiantari, 2019) Ny.S ini sudah termasuk mengalami sindrom *immobility*, *immobility* merupakan suatu keadaan tidak bergerak atau tirah baring selama 3 hari atau lebih sehingga gerakan anatomi tubuh menghilang karena perubahan pada fungsi fisiologis.

Pengkajian uji kekuatan otot pada Ny.S didapatkan bahwa pasien mengalami penurunan kekuatan otot dimana kaki sebelah kiri pasien hanya ada sedikit gerakan (skor 1) dan pada kaki kanan hanya mampu terangkat namun tidak mampu melawan tekanan yang diberikan (skor 4). Sedangkan pada kedua ekstremitas atas pasien hanya mampu terangkat namun tidak mampu melawan tekanan yang diberikan (skor 4). Sesuai dengan teori yang dijelaskan (Widiantari, 2019) bahwa salah satu manifestasi klinis sindrom *immobility* yaitu penurunan massa otot. Ny.S juga mengatakan bahwa selama kakinya sakit ia sudah tidak mampu berjalan ia *bed rest* total. Hal ini sejalan dengan teori (Kisner & Colby, 2016) yang menyatakan bahwa penurunan kekuatan otot pada ekstremitas bawah pada lansia dapat menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan mempertahankan keseimbangan tubuh pada lansia sehingga

menyebabkan terjadinya resiko jatuh pada lansia dan lansia mengalami kesulitan untuk berjalan.

Pada hasil pemeriksaan Ny.S yang mengatakan ia pernah terjatuh pada 3 bulan terakhir sehingga dilakukan pemeriksaan dan terdiagnosis mengalami osteoarthritis grade II. Hal ini sesuai dengan teori (Widiantari, 2019) yang menyatakan bahwa salah satu penyakit degeneratif yang banyak dijumpai pada pasien geriatri adalah *osteoarthritis*. Dari hasil pengkajian Ny.S didapatkan hasil pengkajian Skala Morse yaitu 80 maka disimpulkan bahwa berisiko jatuh yang tinggi. Maka kesimpulan penulis mengenai keluhan subjektif serta objektif yang terjadi pada Ny.S dengan teori menurut beberapa penelitian sesuai antara teori dan fakta. Kesimpulan yang didapat dari data pengkajian pasien hampir keseluruhan sesuai dengan teori.

5.1.2 Analisis Diagnosis

Berdasarkan hasil pengkajian dan analisa data terdapat 4 diagnosa keperawatan yang ditegakkan pada pasien. Diagnosis keperawatan utama pada kasus ini adalah nyeri akut. Adapun definisi nyeri akut yang bersumber dari buku (SDKI, 2016) adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Masalah ini ditemukan penulis sejak hari pertama dilakukan pengkajian. Tanda dan gejala yang ditemukan pada Ny.S adalah nyeri pada lutut bagian kirinya dan nampak gelisah serta meringis. Hal ini sejalan dengan penelitian Aisyah (2017) yang menjabarkan bahwa dampak yang ditimbulkan nyeri pada lansia adalah nampak meringis, gelisah serta imobilisasi. Diperkuat dengan buku (SDKI, 2016) gejala dan tanda mayor subjektif adalah mengeluh nyeri, sedangkan gejala dan tanda mayor objektif seperti tampak meringis dan gelisah.

Diagnosis kedua yaitu gangguan mobilitas fisik karena Ny.S mengatakan sulit mengerakkan kakinya, sendi kaku dan ketika ingin

berpindah tempat pasien dibantu oleh keluarganya, oleh karena itu mobilitas pasien dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya menjadi terganggu. Hal ini sesuai dengan buku (SDKI, 2016) yang menjelaskan bahwa gangguan mobilitas fisik adalah keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri. Tanda dan gejalanya yang dialami oleh Ny.S sesuai dengan buku (SDKI, 2016) bahwa gejala dan tanda mayor subjektif adalah mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas, sedangkan gejala dan tanda mayor objektif adalah kekuatan otot menurun dan rentang gerak (ROM) menurun. Gejala dan tanda minor subjektif adalah sulit menggerakkan kaki, sedangkan gejala dan tanda minor objektif adalah sendi kaku.

Diagnosis ketiga yaitu risiko jatuh dibuktikan dengan riwayat jatuh, hal ini sesuai dengan teori Falls dkk., (2013) yang mengemukakan bahwa risiko jatuh dapat disebabkan oleh kondisi tubuh yang sedang mengalami sakit terutama yang mengalami gangguan pada ekstremitas sehingga mengalami keterbatasan gerak, rata-rata yang mengalami risiko jatuh tinggi karena melakukan aktivitas sendiri tanpa meminta bantuan, kurangnya pengawasan, mengalami pusing/vertigo. Sejalan dengan penelitian Penelitian Pasaribu dkk (2018), mengindikasikan bahwa kekuatan otot ekstremitas sangat berpengaruh terhadap kejadian jatuh, perawat dapat menilai risiko jatuh setiap pasien dengan menggunakan Skala Jatuh Morse (*Morse Fall Scale*) untuk pasien dewasa dan Humpy Dumpty untuk pasien anak-anak, hasil pengkajian pada kasus Ny.S menggunakan skala morse didapatkan skor 80 artinya pasien mengalami risiko jatuh tinggi.

Diagnosis selanjutnya adalah risiko infeksi. Diagnosa ini muncul karena saat dilakukan pengkajian dari hasil pemeriksaan laboratorium darah menunjukan hasil hemoglobin berada dibawah angka normal yaitu 6,8 gr/dL. Sejalan dengan teori yang dijelaskan oleh (Utomo dkk., 2020) bahwa kekurangan zat besi yang menyebabkan anemia dapat berpengaruh pada kemampuan sistem imun dan memerangi berbagai

patogen, sehingga penderita anemia lebih rentan terkena penyakit infeksi. Selain itu hasil pemeriksaan fisik pada area tangan kiri pasien terdapat pemasangan iv line NaCl 0,9 % dengan tusukan infus sejak tanggal 23 Maret 2022, sesuai dengan teori (Utomo dkk., 2020) bahwa infeksi dapat terjadi di tempat dimana jarum infus ditusukan.

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus Ny.S yang mengalami immobility dengan masalah nyeri.

5.1.3 Analisis Intervensi

Intervensi keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi nyeri akut bersumber dari buku (SIKI, 2018) adalah manajemen nyeri dengan rencana tindakan berupa observasi mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri dan skala nyeri. Pasien yang masih merasa nyeri dan tidak mampu beradaptasi dengan nyeri yang dirasakan apabila efek dari analgetik hilang sehingga dibutuhkan terapi non-farmakologis (Fitrianingrum, 2018). Teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan memberikan relaksasi benson (Andari & Santri, 2021).

Intervensi yang diberikan pada diagnosis gangguan mobilitas fisik menurut buku (SIKI, 2018) adalah dukungan mobilisasi, dengan rencana tindakan berupa observasi monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, terapeutik fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, edukasi: jelaskan tujuan prosedur mobilisasi dan anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori Milyati dkk (2021) yang menyatakan bahwa mobilisasi diperlukan untuk meningkatkan kemampuan diri, meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit khususnya penyakit degeneratif dan untuk aktualisasi diri (harga diri dan citra tubuh). Lingkup mobilisasi itu sendiri mencakup *exercise* atau *range of motion*

(ROM), ambulasi, *body mechanic* (Kozier, 2004). Pada kasus Ny.S salah-satunya rencana yang akan dilakukan adalah melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan dan pemberian mobilisasi ROM, ROM adalah salah-satu bentuk intervensi mandiri perawat pada masalah keperawatan tersebut adalah dengan, ROM pasif biasanya dilakukan pada pasien semikoma dan tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi, tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, pasien tirah baring total atau pasien dengan paralisis ekstermitas (Murtaqib, 2013). ROM pasif merupakan gerakan dimana energi yang dikeluarkan untuk latihan berasal dari orang lain atau alat mekanik. Perawat melakukan gerakan persendian klien sesuai dengan rentang gerak yang normal, kekuatan otot yang digunakan pada gerakan ini adalah 50%. ROM pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot individu lain secara pasif, misalnya perawat membantu mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri (Maimurahman et al, 2012).

Intervensi yang diberikan pada diagnosis risiko jatuh menurut buku (SIKI, 2018) adalah pencegahan jatuh dengan rencana tindakan observasi: identifikasi risiko jatuh setidaknya sekali setiap shift atau sesuai dengan kebijakan institusi, hitung risiko jatuh dengan menggunakan skala morse, terapeutik: pastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang *handrell* tempat tidur, edukasi: memberikan anjuran memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah. Pada kasus Ny.S salah-satu rencana yang akan dilakukan adalah identifikasi risiko jatuh dengan menggunakan skala morse, skala morse merupakan instrumen penilaian risiko jatuh yang dirancang untuk mengantisipasi pasien jatuh karena kondisi fisiologis (Harun dkk., 2022).

Intervensi yang diberikan pada diagnosis risiko infeksi menurut buku (SIKI, 2018) adalah pencegahan infeksi dengan rencana tindakan observasi: memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, terapeutik : membatasi jumlah pengunjung, cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien dan mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Salah satu intervensi yang paling penting adalah mencuci tangan karena tangan merupakan media utama bagi penularan kuman-kuman penyebab penyakit, cuci tangan harus dilakukan dengan baik dan benar sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan walaupun telah memakai sarung tangan dan alat pelindung lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan sehingga penyebaran penyakit dapat di kurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi (Nurjanah, 2021).

5.1.4 Analisis Implementasi

Pada proses implementasi keperawatan pada keluarga Ny.S diberikan sebanyak 3 hari dimulai dari senin 28 maret 2022 hingga jumat 30 maret 2022 dengan melaksanakan intervensi yang telah disusun. Diagnosis pertama yaitu nyeri akut telah diberikan implementasi dengan manajemen nyeri dengan cara mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri dan skala nyeri. Terapeutik teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dengan memberikan relaksasi benson. Relaksasi benson yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut membuat rasa nyeri menjadi menurun dimana sebelum melakukan relaksasi skala nyeri Ny.S dengan hasil 53 (gangguan nyeri berat) , setelah pemberian menurun menjadi 21 (gangguan nyeri sedang). Sejalan dengan penelitian (Andari & Santri, 2021) yang menunjukkan bahwa sebelum pemberian intervensi relaksasi benson terdapat 1 responden yang mengalami nyeri berat, 5 responden yang mengalami nyeri sedang dan 1 responden yang mengalami nyeri ringan. Saat setelah pemberian intervensi relaksasi benson 0 responden

yang mengalami nyeri berat, 1 responden nyeri sedang dan 6 responden nyeri ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian intervensi relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Bengkulu. Sejalan dengan penelitian (Singh dkk., 2012) yang menunjukkan bahwa relaksasi benson ini dapat menurunkan skala nyeri berat dan sedang menjadi skala nyeri ringan.

Diagnosis kedua yaitu gangguan mobilitas fisik peneliti memberikan intervensi dukungan mobilisasi mengobservasi tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi, pemberian ROM dan melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan, menjelaskan tujuan prosedur mobilisasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Rahmadani dan Rustandi, 2019) yang menjelaskan bahwa ada pengaruh *range of motion* (ROM) terhadap peningkatan kekuatan otot ekstremitas pasien. Penelitian (Ridha & Putri, 2015) juga menyatakan bahwa setelah dilakukan latihan Range Of Motion, diketahui terdapat pengaruh latihan Range Of Motion terhadap kekuatan otot ekstremitas bawah pada lansia dengan osteoarthritis di wilayah kerja PuskesmasKoni Kota Jambi.

Diagnosis risiko jatuh peneliti telah memberikan implementasi dengan cara memnghitung risiko jatuh menggunakan skala morse, memastikan roda tempat tidur selalu dalam kondisi terkunci, pasang *handrell* tempat tidur, mengedukasi untuk memanggil perawat jika membutuhkan bantuan untuk berpindah.

Diagnosis risiko infeksi peneliti mengimplementasikan dengan cara memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, membatasi jumlah pengunjung, mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien dan lingkungan pasien dan mempertahankan teknik aseptik pada pasien berisiko tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alvadri, 2016) yang menjelaskan bahwa ada hubungan antara cuci tangan perawat dengan kejadian infeksi di rumah sakit.

5.1.5 Analisis Evaluasi

Hasil evaluasi pada diagnosis pertama adalah selama pemberian implementasi didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan skala nyeri yang dirasakan oleh pasien sebelum diberikan intervensi mengalami gangguan nyeri berat dengan skor 53 setelah diberikan intervensi skala nyeri menurun menjadi 21 dengan artian gangguan nyeri sedang. Ny.S juga mengatakan ia merasa nyaman dan tidak nampak meringis, sehingga dapat disimpulkan bahwa teknik relaksasi *benson* efektif menurunkan nyeri sendi. Ny.S dan keluarga mampu melakukan relaksasi benson secara mandiri.

Hasil evaluasi pada diagnosis kedua adalah Ny.S mengatakan ia dapat menggerakkan kakinya secara perlahan-lahan dan meningkatkan kekuatan otot pasien diperoleh hasil sebelum diberikan intervensi kekuatan otot kaki kiri pasien dengan skor 1 setelah diberikan intervensi meningkat menjadi skor 2. Ny.S dan keluarga mampu mengetahui pengertian, tujuan dan pergerakan ROM pasif.


Hasil evaluasi pada diagnosis ketiga adalah tidak terjadi jatuh pada pasien selama perawatan, Ny.S dan keluarga mengatakan ia telah mengetahui dan mampu menerapkan intervensi pencegahan jatuh dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan hasil evaluasi pada diagnosis keempat didapatkan hasil bahwa tidak terjadi infeksi selama perawatan.

5.2 Analisis Intervensi EBP

Perioritas masalah dari kasus Ny.S adalah nyeri akut, intervensi utama berupa manajemen nyeri dengan tindakan teknik non farmakologis dengan relaksasi benson untuk mengurangi rasa nyeri pasien berdasarkan *evidence based nursing*. Relaksasi Benson ini merupakan tehnik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh pasien (Safitri dkk., 2018). Hal ini sesuai dengan teori dalam Benson & Proctor (2017) yang menyatakan bahwa relaksasi benson merupakan teknik relaksasi yang digabung dengan keyakinan yang dianut oleh pasien, dan formula- katakata/zikir atau kalimat tertentu yang dibaca berulang-ulang dengan melibatkan unsur keimanan dan

keyakinan akan menimbulkan respon relaksasi yang lebih kuat dibandingkan dengan hanya relaksasi tanpa melibatkan unsur keyakinan pasien tersebut. Selain itu relaksasi benson dapat mengurangi nyeri karena dilakukan dengan memperhatikan suasana lingkungan yang tenang, keterlibatan mental, sikap pasrah/pasif serta posisi baring atau duduk yang nyaman. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismansyah dkk (2021) bahwa relaksasi benson yang menggabungkan relaksasi dan zikir (dalam Islam) atau doa sesuai dengan keyakinan responden memberi dampak saling menguatkan untuk menimbulkan efek rileks dan pada saat yang sama dapat menekan sensasi nyeri.

Diagram 5.1 Perubahan skala nyeri



Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa pada hari pertama sebelum diberikan intervensi nyeri yang dirasakan adalah 53, sedangkan setelah pemberian relaksasi benson menurun menjadi 46. Pada hari kedua sebelum diberikan intervensi nyeri yang dirasakan adalah 46, sedangkan setelah pemberian relaksasi benson menurun menjadi 37. Pada hari ketiga sebelum

diberikan intervensi nyeri yang dirasakan adalah 39, sedangkan setelah pemberian relaksasi benson menurun menjadi 21. Maka dapat disimpulkan bahwa relaksasi benson ini efektif dalam menurunkan nyeri sendi pada lansia.

Relaksasi benson dapat menurunkan skala nyeri seseorang bekerja dengan cara mengalihkan fokus seseorang terhadap nyeri dengan berusaha menciptakan suasana yang nyaman serta tubuh yang rileks sehingga di dalam tubuh akan terjadi peningkatan proses analgesia endogen yang kemudian terus meningkat dengan diperkuatnya oleh kalimat atau kata-kata penuh keyakinan yang dianut pasien sehingga mampu merelaksasikan otot-otot dan memberikan efek menenangkan (Wahyu, 2018). Relaksasi benson merupakan tehnik relaksasi yang digabung dengan unsur kata-kata keyakinan dari pasien dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan *endorphin* dan *enkefalin* yang dapat menghambat impuls nyeri dengan cara memblokir transmisi impuls di dalam otak dan medulla spinalis (Anita, Misrawati, dan Safri, 2016). Sejalan dengan teori Agustin (2019) yang menyatakan bahwa dalam keadaan relaksasi secara alamiah akan memicu hormon *endorfin*, hormon ini merupakan analgesik alami dari tubuh sehingga nyeri akan berkurang.

Relaksasi benson merupakan tehnik relaksasi pernafasan dengan melibatkan keyakinan yang mengakibatkan penurunan terhadap konsumsi oksigen oleh tubuh dan otot-otot tubuh menjadi rileks sehingga menimbulkan perasaan tenang dan nyaman. Apabila O₂ dalam otak tercukupi maka manusia dalam kondisi seimbang. Kondisi ini akan menimbulkan keadaan rileks secara umum pada manusia. Perasaan rileks akan diteruskan ke hipotalamus untuk menghasilkan *corticotropin releasing factor* (CRF). CRF akan merangsang kelenjar dibawah otak untuk meningkatkan produksi proopiomelanocortin (POMC) sehingga produksi enkefalin oleh medulla adrenal meningkat. Kelenjar dibawah otak juga menghasilkan β *endorphine* sebagai neurotransmitter (Yusliana, 2015). *Endorphine* muncul dengan cara memisahkan diri dari deoxyribo nucleid acid (DNA) yaitu substansi yang mengatur kehidupan sel dan memberikan perintah bagi sel untuk tumbuh atau berhenti tumbuh. Pada permukaan sel terutama sel saraf terdapat area yang

menerima endorphine. Ketika endorphine terpisah dari DNA, endorphine membuat kehidupan dalam situasi normal menjadi tidak terasa menyakitkan. Endorphine mempengaruhi impuls nyeri dengan cara menekan pelepasan neurotransmitter di presinap atau menghambat impuls nyeri dipostsinap sehingga rangsangan nyeri tidak dapat mencapai kesadaran dan sensorik nyeri tidak dialami (Solehati & Kokasih, 2015).

Selain itu, relakssi benson ini dapat menghambat aktivitas saraf simpatik yang mengarah pada pengurangan konsumsi oksigen oleh tubuh dan selanjutnya otot-otot jadi rileks sehingga timbul perasaan tenang dan nyaman (Safitri dkk., 2018). Melakukan relaksasi untuk mengendalikan nyeri yang dirasakan, maka tubuh akan meningkatkan komponen saraf parasimpatik secara stimulan, maka ini menyebabkan terjadinya penurunan kortisol dan adrenalin dalam tubuh yang mempengaruhi tingkat stress, sehingga dapat meningkatkan konsentrasi dan membuat merasa tenang untuk mengatur ritme pernafasan menjadi teratur. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan kadar PaCO₂ dan akan menurunkan kadar pH sehingga terjadi peningkatan kadar oksigen (O₂) dalam darah (Nurseskasatmata & Rahayu, 2020).

Terapi benson merupakan intervensi non farmakologi dan sebagai ikhtiar untuk membantu lansia proteksi dampak buruk dari nyeri sendi yang diharapkan memberikan efek yang positif bagi kesehatan dengan izin Allah swt. seperti firman Allah dalam QS Al-Syu'ara /26: 80

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya:

“*dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku*” (QS Al-Syu'ara /26: 80).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menandakan bahwa sakit merupakan keniscayaan hidup manusia yang harus dicari kesembuhannya. Nabi Ibrahim a.s. menegaskan bahwa penyerahan diri kepada Allah terhadap suatu penyakit yang diderita bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan lagi. Sekian banyak hadis Nabi saw. yang

memerintahkan untuk berobat. Ucapan Nabi Ibrahim a.s. itu hanya bermaksud menyatakan bahwa sebab dari segala sebab adalah Allah swt (Shihab, 2012). Maksud ayat diatas adalah segala penyakit yang diderita pasti akan disembuhkan oleh-Nya.

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menangani penyakit seperti kasus di atas yaitu teori *comfort* Kolcaba. Kolcaba berasumsi bahwa pada dasarnya semua manusia membutuhkan kenyamanan sebagai kebutuhan dasar. Kolcaba memandang bahwa teori kenyamanan menjadi salah satu pilihan teori keperawatan yang dapat diaplikasikan langsung di lapangan karena bersifat universal dan tidak terhalang budaya masyarakat (Kolcaba & DiMarco, 2005). Sesuai dengan teori Kolcaba, kondisi pasien pada kasus diatas perlu dipenuhi kebutuhan akan kenyamanan fisiknya dimana pasien berada dalam perasaan tidak nyaman untuk melakukan aktivitas dalam rangka mobilisasi karena nyeri sehingga perawat memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan akan kenyamanan fisiknya.

5.3 Keterbatasan

Keterbatasan pada karya tulis ini adalah perlunya pemberian intervensi dengan rentang waktu yang cukup lama agar keefektifan dalam pemberian intervensi dapat berpengaruh dengan maksimal.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa :

- 6.1.1 Hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny.S di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar didapatkan bahwa Ny.S mengalami sindrom geriatric *immobility* yang disebabkan karena nyeri pada persendiannya.
- 6.1.2 Diagnosis keperawatan yang didapatkan pada Ny.S, yaitu : nyeri akut, gangguan mobilitas fisik, risiko jatuh dan risiko infeksi.
- 6.1.3 Intervensi keperawatan yang akan diterapkan pada Ny.S, yaitu : Manajemen nyeri : relaksasi benson, dukungan mobilisasi, pencegahan jatuh dan pencegahan infeksi.
- 6.1.4 Implementasi keperawatan yang telah diterapkan pada Ny.S dilakukan selama 3x24 jam dan semua implementasi yang diterapkan sesuai dengan intervensi yang telah disusun.
- 6.1.5 Hasil Evaluasi keperawatan pada Ny.S di dapatkan bahwa diagnosis keperawatan nyeri akut dan gangguan mobilisasi hasilnya belum teratasi. Sedangkan diagnosis keperawatan risiko jatuh dan risiko infeksi hasilnya faktor resiko tidak terjadi.
- 6.1.6 Hasil analisis relaksasi benson didapatkan bahwa sebelum pemberian intervensi skala nyeri yang dirasakan yaitu 53 dan setelah pemberian intervensi 21 maka dapat disimpulkan bahwa relaksasi benson efektif menurunkan skala nyeri pada lansia yang mengalami sindrom geriatri *immobility*.


6.2 Saran

6.2.1 Bagi institusi

Karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *immobility*

6.2.2 Bagi pelayanan kesehatan

Karya tulis ini dapat menjadi bahan referensi bagi para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada lansia yang mengalami sindrom geriatric *immobility* dan mengetahui tentang keefektifan pemberian relaksasi bensondalam mengatasi nyeri.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2017). Manajemen Nyeri Pada Lansia Dengan Pendekatan Non Farmakologi. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 2(1). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/1201>
- Akbar, M. (2019). *Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia*. 2.
- Alvadri, Zilpianus. "Hubungan pelaksanaan tindakan cuci tangan perawat dengan kejadian infeksi rumah sakit di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol." Karya Tulis Ilmiah). Universitas Esa Unggul, Jakarta (2016).
- Andari, F. N., & Santri, R. A. (2021). *TERAPI BENSON UNTUK PENURUNAN NYERI RHEUMATOID ARTHRITIS LANSIA*. 4(2), 12.
- Andarmoyo, S. (2013). *Konsep Dan Proses Keperawatan Nyeri*. Ar-Ruzz.
- Arifianto, Aini, D. N., & Sari, N. D. W. (2019). The Effect of Benson Relaxation Technique on a Scale Of Post operative Pain in Patients with Benign Prostat Hyperplasia at RSUD dr. H Soewondo Kendal. *Media Keperawatan Indonesia*, 2(1), 1–9.
- Awaludin, S., A, A. C. N., & Sekarwati, W. (2018). HUBUNGAN KECEMASAN DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN POST CORONARY ARTERY BAYPASS GRAFT (CABG) DI RUANG REHABILITASI JANTUNG RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA JAKARTA. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 1(1), 243–247.
- Azizah, L. M. (2011). *Keperawatan lanjut usia*. Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. (2020, Juli 9). *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2019 dan 2018*. <https://sulsel.bps.go.id/statictable/2020/07/09/287/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-2019-dan-2018.html>
- Benson, & Proctor. (2017). Pengaruh Terapi Relaksasi Benson Terhadap Intensitas Nyeri Pasien Post Operasi Benigna Prostate Hiperplasia. "MIDWINERSLION" *Jurnal Kesehatan Stikes Bebeleng*, 4, 46–50.
- Brunner, & Suddarth. (2011). *Keperawatan Medikal Bedah (12th ed.)*. Kedokteran EGC.

- Damanik, & Hasan. (2019). Modul Bahan Ajar Keperawatan Gerontik. *Universitas Kristen Indonesia Bmp.Uki : Smd-36-Kg-Pk-Iv-2019*.
- Dini, A. . (2013). Sindrom Geriatric (Imobilitas, Instabilitas, Gangguan Intelektual, Inkontinensia, Infeksi, Malnutrisi, Gangguan Pendengaran). *Med.Unila,1(3):117-127. Med.Unila, 1(3), 117–127*.
- Dinianti, S. R., Tori Rihiantoro, & Titi Astuti. (2017). Senam Lansia dan Kekambuhan Nyeri Sendi pada Lansia penderita Arthritis. *Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Betik, 9(2), 246–251*.
- Hamranani, S. S. T. (2018). *RELAKSASI BENSON DAPAT MENURUNKAN NYERI SENDI PADA LANSIA*.
- Harun, Sigit, Sujianto, U., & Johan, A. (2022). Pengkajian Risiko Jatuh Skala Morse dan Stratify. *Jurnal Ilmiah, 17(1)*.
- Hasibuan, D. L. S. (2019). *Hubungan Interferensi Nyeri dengan Intensitas Nyeri pada Pasien Osteoarthritis di RSUP Haji Adam Malik Medan*.
- Hidayat. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Afabeta.
- Ilmiasih, R., Nurhaeni, N., & Waluyanti, F. T. (2015). *APLIKASI TEORI COMFORT KOLCABA DALAM MENGATASI NYERI PADA ANAK PASCA PEMBEDAHAN LAPARATOMI DI RUANG BCH RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA. 6, 7*.
- Inayati, N. (2012). Pengaruh Teknik Relaksasi Benson Terhadap Tingkat Depresi Lanjut Usia Awal (Early Old Age) Umur 60-70 Tahun di Upt Pelayanan Sosial Lanjut Usia Jember. *Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jember*.
- Ismansyah, Wiyadi, & Ernawati, R. (2021). Penerapan Relaksasi Autogenik dan Relaksasi Benson Terhadap Nyeri Pasien Fraktur. *Husada Mahakam: Jurnal Kesehatan, 11(1), 29–41*.
- Kasiati, & Rosmalawati, N. W. D. (2016). *Kebutuhan Dasar Manusia I*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kisner, C., & Colby, L. A. (2016). *Terapi Latihan: Dasar dan Teknik edisi 6. Jakarta: EGC (6 ed.)*. EGC.

- Kolcaba, K., & DiMarco, M. (2005). *Comfort Theory and Its Application to Pediatric Nursing. Pediatric Nursing*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2022 dari <http://www.pediatricnursing.net>.
- Kozier, B. (2004). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik* (7 ed., Vol. 1). EGC.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Qur'an*. Lentera Hati.
- Malo, Y., Ariani, N. L., & Yasin, D. D. F. (2019). PENGARUH SENAM ERGONOMIS TERHADAP SKALA NYERI SENDI PADA LANSIA WANITA. *Nursing News*, 4, 10.
- Miller, C. A. (2018). *Nursing for Wellness in Older Adults Edition 8, revised Wolters Kluwer Law & Business*.
- Milyati, N. I., R, R., E, A., & P, W. D. (2021). ASUHAN KEPERAWATAN PADA Ny. S DENGAN GANGGUAN MOBILITAS FISIK PADA DIAGNOSA MEDIS GOUT ARTHRITIS DIKELURAHAN GADINGREJO KOTA PASURUAN. *Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia*.
- Novitasari, D., & Aryana, K. . (2013). Pengaruh tehnik relaksasi benson terhadap penurunan tingkat stres lansia di unit rehabilitas sosial wening wardoyo ungaran. *Jurnal keperawatan jiwa*, 1(2), 186–195.
- Nurdiana. (2021). INTERVENSI KOMPRES HANGAT SERAI PADA LANSIA YANG MENGALAMI SINDROM GERIATRI IMMOBILITY DENGAN MASALAH NYERI. *Repository UIN*.
- Nurjanah. (2021). Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak: A Literatur Review. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa*.
- Nurseskasatmata, S. E., & Rahayu, K. I. N. (2020). Perbedaan Efektifitas Relaksasi Benson Dan Massage Effleurage Terhadap Intensitas Nyeri Pinggang Pada Pasien Dewasa Dengan Riwayat Low Back Pain. *Nursing Sciences Journal*, 4(2), 100–106.
- Pany, M., & Boy, E. (2019). Prevalensi Nyeri Pada Lansia. *Magna Medica*, 6(2).
- Purnama, A. (2009). *Kepuasan Hidup dan Dukungan Sosial*. B2P3KS PRESS.

- Puspitha, A., Nurdin, N., & Saleh, U. (2019). Pendampingan Posyandu Lanjut Usia. *Media Karya Kesehatan*, 2(1). <http://jurnal.unpad.ac.id/mkk/article/view/19399>
- Rahmadani, E., & Rustandi, H. (2019). Peningkatan Kekuatan Otot Pasien Stroke Non Hemoragik dengan Hemiparese melalui Latihan Range of Motion (ROM) Pasif. *Jurnal Telenursing (JOTING)*, 1 (2), 354-363.
- Ridha, M. R., & Putri, M. E. (2015). PENGARUH LATIHAN RANGE OF MOTION (ROM) AKTIF TERHADAP KEKUATAN OTOT EKSTREMITAS BAWAH PADA LANSIA DENGAN OSTEOARTHRITIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KONI KOTA JAMBI. *Jurnal Akademika Baiturrahim*, 4(2).
- Safitri, Y., Erlinawati, E., & Apriyanti, F. (2018). Perbandingan Relaksasi Benson dan Relaksasi Kesadaran Indera terhadap Tingkat Kecemasan pada Pasien Kanker Serviks Di RSUD Bangkinang Tahun 2018. *Jurnal Ners*, 2(1).
- Singh, J. A., Bharat, A, Curtis, J. R, Kavanaugh, A. F, Kremer, J. M, Saag, K. G., & Furst, D. E. (2012). 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. *Arthritis care & research*, 64(5), 625–639.
- Stanley, & Mickey. (2006). *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta: EGC. EGC.
- Tasalim, R., & Cahyani, A. R. (2020). *DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP DIET RENDAH GARAM PADA LANSIA YANG MENDERITA HIPERTENSI: NARRATIVE REVIEW*. 4(1), 8.
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2016). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia Edisi 1*. Jakarta: DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: DPP PPNI.
- Utomo, R. ., Wulandari, N. ., Suyamto, S., & Khodriyati, N. S. (2020). Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Autoimmune Hemolytic Anemia (Aiha). *Prosiding Diseminasi Hasil Penelitian Dosen Program Studi Keperawatan dan Farmasi*, 2(1).

- Wahyu, A. (2018). Efektifitas Relaksasi Benson Terhadap Penurunan Nyeri Pasien Pasca Sectio Caesarea. *urnal Keperawatan Silampari (JKS)*, 2(1), 236–251.
- Widiantari, R. (2019). Asuhan Keperawatan Pada Klien Ny.D Dengan Sindrom Geriatri + Anoreksia Di Ruang Rawat Inap Interne Ambun Suri Lantai 3 Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun 2019. *Skripsi I : Stikes Perintis Padang*.
- World Health Organization (WHO). (t.t.). *Musculoskeletal Conditions (Who.Int)*.
- Yusliana, A., Misrawati, & Safri. (2015). *Efektivitas relaksasi benson terhadap penurunan nyeri pada ibu post partum section caesarea*.



L

A

M


P

I

R


A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1 : Pathway



TERAPI BENSON UNTUK PENURUNAN NYERI RHEUMATOID ARTHRITIS LANSIA

Fatsiwi Nunik Andari¹, Reska Ayu Santri², Nurhayati³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Keperawatan UM Bengkulu

Email: fatsiwiandari@umb.ac.id

Abstract

Rheumatoid Arthritis is a long-term condition that causes pain, swelling and stiffness in the joints, especially in the hands, feet, and wrists. Benson therapy is one of the pain reliefs of rhumatoid arthritis. The aim of this study was to examine the effect of benson therapy to reduce Rheumatoid arthritis pain in elderly patients at Nursing Home of Tersna Werdha in Bengkulu. This research was a quantitative study with a quasi-experimental design. The results of the dependent t-test showed the p-value of 0.000 ($p < 0.05$), it means that there was a significant effect of benson therapy in reducing rheumatoid arthritis pain.

Keywords: benson therapy, elderly, rheumatoid arthritis pain



Lampiran 3 : Hasil uji turnitin

Hikmah 9/8/22

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX	24% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	13%
2	ejournal.unib.ac.id Internet Source	2%
3	iamnursingstudent.wordpress.com Internet Source	1%
4	repo.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
6	tafsiralquran.id Internet Source	1%
7	vdocuments.site Internet Source	1%
8	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
9	ecampus.poltekkes-medan.ac.id Internet Source	1%

Lampiran 4 : Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nurhikmah, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 04 Februari 1999. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Hasanuddin dan Ibu Sukanriana. Penulis menempuh pendidikan di TK BLKI Makassar, Sekolah Dasar (SD) Inpres Tello Baru 2 Makassar lulus tahun 2011, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 20 Makassar lulus tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Makassar lulus tahun 2017. S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) melalui jalur UMPTKIN, tepatnya di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan dengan Jurusan Keperawatan. Selanjutnya penulis melanjutkan kuliah Profesi Ners di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM). *Alhamdulillah* penulis sangat bersyukur saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan keras beserta doa dari kedua orang tua, keluarga dan rekan-rekan yang dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul “Analisis Asuhan Keperawatan Pada Lansia Yang Mengalami *Immobility* Dengan Masalah Nyeri Menggunkan Terapi Benson Di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Makassar”.