

**HUBUNGAN HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN  
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI KOTA MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Skripsi**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NURUL HUDAYAH**

NIM: 70600118012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan satu tugas untuk meraih kelulusan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Atas berkat dan Karunia-Nya pulalah disertai usaha yang sungguh-sungguh, doa, ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dan pengalaman selama masa preklinik serta arahan dan bimbingan dokter pembimbing, maka skripsi yang berjudul **“Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun penulis tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan yang terbaik dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK dan dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes selaku dosen pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama ini.
4. dr. Fhirastika Annisha Helvian, MARS selaku dosen penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag selaku dosen penguji integrasi penulis yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama ini.
5. Pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
6. Teristimewa kepada orang tua penulis Venice Irianto S.si, Apt & Dr. dr. Nadirah Rasyid Ridha M.Kes, SpA(K), Nurwardah Fatimah S.Ked, Muhammad Anis Venice, Darminah Almirah VA, saudara-saudara dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Terkhusus untuk sahabat penulis, Dewi Pitaloka Puspitasari, Nur Fadylah Yanti, Syadza Muthia Safira, Muh. Ilham Akbar, dan Muh. Wildhan Hidayat yang telah memberikan dukungan selama ini.
8. Tekhusus untuk seluruh Keluarga Besar Fibronektin Angkatan 2018 yang penulis banggakan dan telah memberikan dukungan selama ini.

9. Semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang turut mendukung penulis selama ini.

Tidak ada manusia yang sempurna maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis siap menerima kritik dan saran serta koreksi yang membangun dari semua pihak.

Makassar, 26 Agustus 2021



Nurul Hidayah


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                               | <b>i</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                   | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                                 | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                                | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISTILAH</b> .....                               | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                      | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I</b> .....  | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                                  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                  | 5           |
| C. Hipotesis .....  | 6           |
| 1. Hipotesis nol ( $H_0$ ).....                           | 6           |
| 2. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ).....                    | 6           |
| D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian..... | 7           |
| 1. Definisi Operasional.....                              | 7           |
| 2. Ruang Lingkup Penelitian.....                          | 7           |
| E. Kajian Pustaka .....                                   | 8           |
| F. Tujuan Penelitian .....                                | 9           |
| 1. Tujuan Umum Penelitian .....                           | 9           |
| 2. Tujuan Khusus Penelitian .....                         | 10          |
| G. Manfaat Penelitian.....                                | 10          |
| 1. Bagi Peneliti .....                                    | 10          |
| 2. Bagi Institusi .....                                   | 10          |
| 3. Bagi Masyarakat.....                                   | 11          |
| <b>BAB II</b> .....                                       | <b>12</b>   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                     | <b>12</b> |
| A. Hipertensi Dalam Kehamilan .....                               | 12        |
| B. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).....                            | 21        |
| C. Hubungan Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian BBLR ..... | 27        |
| D. Kerangka Teori.....  | 29        |
| E. Kerangka Konsep.....   | 30        |
| <b>BAB III .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                    | <b>31</b> |
| A. Desain Penelitian.....   | 31        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....                               | 31        |
| 1. Lokasi Penelitian.....   | 31        |
| 2. Waktu Penelitian .....   | 31        |
| C. Populasi dan Sampel Penelitian.....                            | 31        |
| 1. Populasi .....   | 31        |
| 2. Sampel Penelitian.....   | 31        |
| D. Teknik Pengambilan Sampel.....                                 | 33        |
| E. Cara Pengumpulan Data .....                                    | 33        |
| F. Cara Kerja Penelitian .....                                    | 33        |
| G. Alur Penelitian.....   | 35        |
| H. Langkah Pengolahan Data .....                                  | 36        |
| I. Analisis Data.....   | 36        |
| J. Etika Penelitian.....  | 36        |
| <b>BAB IV .....</b>   | <b>38</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                 | <b>38</b> |
| A. Hasil .....  | 38        |
| 1. Analisis Univariat.....  | 38        |
| 2. Analisis Bivariat.....   | 39        |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| B. Pembahasan .....               | 41        |
| <b>BAB V .....</b>                | <b>49</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....                | 49        |
| B. Saran .....                    | 49        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>       | <b>51</b> |




## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Definisi Operasional.....  | 9  |
| Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....  | 10 |
| Tabel 4.1 Distribusi Data Ibu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah<br>1 Muhammadiyah Makassar..... | 36 |
| Tabel 4.2 Hubungan antara Hipertensi Dalam Kehamilan dengan Kejadian BBLR.....                           | 37 |



## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Patofisiologi Hipertensi..... | 19 |
| Gambar 2.2 Patofisiologi BBLR.....       | 25 |
| Gambar 2.3 Kerangka Teori.....           | 28 |
| Gambar 2.4 Kerangka Konsep.....          | 29 |
| Gambar 3.1 Alur Penelitian.....          | 33 |



## DAFTAR ISTILAH

|       |   |
|-------|---|
| ACE   | : <i>Angiotensin Converting Enzyme</i>                                    |
| AKB   | : Angka Kematian Bayi   |
| BBLR  | : Bayi Berat Lahir Rendah   |
| BBLSR | : Bayi Berat Lahir Sangat Rendah  |
| BBLER | : Bayi Berat Lahir Extrem Rendah  |
| CI    | : <i>Confidence Interval</i>  |
| DIC   | : <i>Disseminated Intravascular Coagulation</i>                           |
| DM    | : Diabetes Mellitus   |
| HDK   | : Hipertensi Dalam Kehamilan  |
| HELLP | : <i>Hemolysis Elevated Liver Enzymes and Low Platelet Count</i>          |
| HPHT  | : Hari Pertama Haid Terakhir  |
| IUGR  | : <i>Intrauterine Growth Retardation</i>                                  |
| ISHHP | : <i>International Society For The Study of Hypertension in Pregnancy</i> |
| JNC   | : <i>Joint National Community</i>   |
| NK    | : <i>Natural Killer</i>   |
| NO    | : Nitrit Oksida   |
| PR    | : <i>Prevalence Ratio</i>   |
| ROS   | : <i>Reactive Oxygen Species</i>  |
| SFLT  | : <i>Soluble Fms-Like Tyrosine kinase</i>                                 |

SPSS : *Statistical Package for the Social Sciences*

TX : Thromboxane

USG : Ultrasonografi

WHO : *World Health Organization*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 70600118012

Tempat/Tgl Lahir : Kolaka, 01 Desember 2001

Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter

Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok F2/11A

Judul : Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 14 Agustus 2022

Penyusun

Nurul Hidayah  
70600118012

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurul Hidayah  
NIM : 70600118012  
Judul : Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar

Karya tulis ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 14 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK

dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar**” yang disusun Nurul Hidayah NIM 70600118012, Mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 14 Agustus 2022  
16 Muharam 1444 H

### DEWAN PENGUJI

**Ketua** : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. (.....)  
**Sekretaris** : dr. Andi Tihardimanto, M.Kes, Sp.JP. (.....)  
**Pembimbing I** : dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK (.....)  
**Pembimbing II**: dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes. (.....)  
**Penguji I** : dr. Fhirastika Annisha Helvian, MARS (.....)  
**Penguji II** : Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag. (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.  
NIP. 19800701 200604 2 002

## ABSTRAK

**Nama** : Nurul Hudayah  
**Nim** : 70600118012  
**Jurusan** : Pendidikan Dokter  
**Judul** : Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar  
**Pembimbing I** : dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK  
**Pembimbing II** : dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes

---

Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas akut yang berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu. Hipertensi dalam kehamilan dapat berlanjut hingga ke masa persalinan yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang akan mempengaruhi berat badan lahir bayi sehingga pada ibu yang memiliki tekanan darah tinggi memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *consecutive sampling*. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 350 orang sampel. Teknik analisis data menggunakan uji *Chi-Square*.

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah ( $p \text{ value} \leq 0,05$ ). Hasil perhitungan *Prevalence Ratio* (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi berisiko 1,661 kali mengalami kejadian bayi berat lahir rendah (95% CI 1,284-4,849).

Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Kota Makassar.

**Kata Kunci:** Hipertensi Dalam Kehamilan, Bayi Berat Lahir Rendah, Ibu Hamil.

## ABSTACT

**Name** : Nurul Hudayah  
**Reg. Number** : 70600118012  
**Department** : Medical Education Program  
**Tittle** : Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Di Kota Makassar  
**Supervisor I** : dr. Henny Fauziah, M.Kes, Sp.PK.  
**Supervisor II** : dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes


---

Hypertension in pregnancy is considered to be the major cause of severe acute morbidity, long-term disability, and maternal death. Hypertension in pregnancy can continue until the day of labor which may cause fetal growth disorders that will affect the baby's birth weight. Therefore, a pregnant mother with a high blood pressure tends to have a higher risk of having a low-birth weight baby. The major objective of this study was to investigate the relationship between hypertension in pregnancy and the occurrences of low-birth weight in babies. The methodological approach used in this research was an observational analytical study by using a cross sectional approach. The samples of this research were selected by using a consecutive sampling method where 350 samples were selected as samples of this research. The data analysis was conducted by using Chi-Square test.

Based on the Chi-Square test, it was apparent that there was a significant relationship between hypertension in pregnancy and the occurrences of low birth weight with the p value of 0.05. The calculation results of the Prevalence Ratio (PR) showed that pregnant women with hypertension were at risk at 1.661 times to have low-birth weight babies (95% CI 1.284-4.849).

It could be concluded from this research that there was a relationship between hypertension in pregnancy and the occurrences of low birth weight in Makassar

**Key Words:** Hypertension in Pregnancy, Low-birth Weight Babies.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persentasi kejadian Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) sebesar 5-15% dari seluruh kehamilan di dunia, angka kejadian ini lebih banyak terjadi di negara berkembang dibanding pada negara maju. Di Indonesia, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2020 diakibatkan oleh hipertensi dalam kehamilan yaitu sebanyak 1.110 kasus (Kemenkes, RI 2020). Kematian ibu di Indonesia masih didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi. Hipertensi dalam kehamilan semakin meningkat menjadi penyebab utama sementara perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan (Manulang & Simanjuntak, 2020).

Data ibu hamil yang mengalami hipertensi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Tahun 2017 sebanyak 160 ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 4.907 ibu yang melahirkan. Tahun 2019 sebanyak 191 ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 5.100 ibu yang melahirkan dan tahun 2020 sebanyak 203 ibu hamil yang mengalami hipertensi dari 3.513 ibu yang melahirkan (Sistem Informasi Rumah Sakit, 2022).

Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) didefinisikan sebagai tekanan darah >140/90mmHg dalam dua kali pengukuran atau lebih. Berdasarkan *International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy* (ISHHP) ada 4 kategori hipertensi dalam kehamilan, yaitu preeklamsia-eklamsia, hipertensi gestasional, kronik hipertensi dan

superimpose preeklamsia hipertensi kronik (Manuaba, 2014). Hipertensi dalam kehamilan disebabkan oleh konversi yang tidak sempurna dari arteri spiralis karena invasi yang tidak tepat ke dinding pembuluh darah oleh sel trophoblast ekstravili pada awal kehamilan. Selama masa janin, hubungan vaskular antara ibu dan janin yang tidak terbentuk dengan baik sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi (Nakimuli et al., 2020). Hipertensi dalam kehamilan dapat berlanjut hingga ke masa persalinan yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin intrauterin yang akan berdampak pada berat badan lahir. Hal ini diakibatkan oleh perfusi uteroplasenta yang menurun, kerusakan sel endotel pembuluh darah, dan vasospasme, sedangkan pada ibu yang memiliki tekanan darah normal, tidak ditemukan kelainan tersebut sehingga perfusi nutrisi dan oksigen untuk pertumbuhan janin akan menjadi adekuat sehingga pada ibu yang memiliki tekanan darah tinggi memiliki resiko melahirkan bayi berat lahir rendah lebih tinggi (Razy & Hestiyana, 2019).

Jumlah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia masih cukup tinggi, data *World Health Organization* (WHO) mencatat Indonesia berada pada peringkat ke sembilan dunia dengan presentase lebih dari 15,5% dari kelahiran bayi setiap tahunnya. Wanita dengan hipertensi dalam kehamilan berisiko untuk melahirkan bayi berat lahir rendah (Manulang & Simanjuntak. 2020). Dalam skala global, dalam semua kasus, bayi dengan berat lahir rendah memiliki risiko kematian perinatal yang lebih tinggi dibandingkan dengan bayi yang tumbuh normal berdasarkan usia kehamilan (Nakimuli et al., 2020). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) diartikan sebagai bayi dengan berat lahir yang kurang dari 2500 gram

yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta maupun kombinasi dari berbagai faktor yang berdampak pada gangguan proses transportasi nutrisi pada plasenta (Lestari, Etika & Lestari, 2021). Faktor risiko ibu untuk bayi berat lahir rendah adalah primiparitas, ketuban pecah dini, hipertensi, perdarahan antepartum dan anemia pada kehamilan, interval antar kehamilan yang pendek, dan ibu malnutrisi. Di antara faktor-faktor risiko tersebut, hipertensi dalam kehamilan merupakan satu dari tiga penyebab mortalitas tertinggi dan morbilitas pada ibu bersalin, sekitar 5% hingga 15% menjadi penyulit selama kehamilan (Sarwono, 2016).

Bidang sains dan kedokteran menjelaskan tentang betapa pentingnya menjaga tekanan darah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Dijelaskan pula dalam QS. Thaha/20:81.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۝٨١

Terjemahnya:

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.” (QS. Thaha/20:81) Tafsir QS.Thaha/20:81 yaitu ayat ini Allah menyuruh supaya mereka memakan di antara rezeki yang baik, yang lezat cita rasanya dan yang telah Allah karuniakan kepada mereka, jangan sekali-kali mereka menyalahgunakannya, seperti menafkahnnya dengan boros, tidak mensyukurinya, mendermakan kepada kemaksiatan, dan lain-lain sebagainya, karena

kalau demikian berarti mereka telah mengundang kemurkaan Allah yang akan menimpakan siksa-Nya. Celaka dan binasalah orang-orang yang telah ditimpa kemurkaan Allah.

Dalam hal ini Rasulullah telah bersabda: "Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara yang tidak sombong dan tidak berlebihan. Sesungguhnya Allah suka melihat penggunaan nikmat-Nya kepada hamba-Nya." (Riwayat Ahmad, at-Tirmidzi dan al-hakim dari Abu Hurairah) Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya.

Dijelaskan pula dalam QS. Al-Hajj/22:5.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ  
مِّن مَّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu” (QS. al-Hajj/22:5).

Al-Razi menulis pendapat para ahli tafsir mengenai maksud firman Allah, “...kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna ...” ia mengatakan bahwa para ahli tafsir terbagi menjadi beberapa pendapat berikut, yaitu janin yang telah sempurna penciptaannya dan yang belum sempurna. Seakan-akan Allah membagi mudhghah menjadi dua, 1). Janin yang sempurna bentuk, indera, dan skemanya. 2). Janin yang masih kurang kejadiannya. Jadi Allah menjelaskan bahwa setelah Dia menjadikannya

mudhghah, di antaranya ada yang diciptakanNya menjadi manusia sempurna tanpa kekurangan, dan ada yang tidak sempurna. Ini adalah pendapat Qatadah dan Dhahak. Seolah-olah Allah SWT. menciptakan mudhghah ini berbeda-beda tingkatannya. Di antaranya ada yang sempurna penciptaannya dan bebas dari cacat, dan ada pula yang kebalikannya. Perbedaan ini mengikuti perbedaan manusia dalam penciptaan, bentuk, tinggi dan pendek, sempurna dan kurangnya mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk mengetahui hubungan hipertensi dalam kehamilan dan bayi berat lahir rendah. Namun belum adanya penelitian yang dilakukan pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar sehingga peneliti perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar?



### **C. Hipotesis**

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis nol ( $H_0$ )

Tidak ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah.

2. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )

Ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah.



## D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Definisi Operasional

| NO                  | Variabel                         | Definisi Operasional  | Cara Ukur  | Kriteria Objektif  | Skala   |
|---------------------|----------------------------------|---|--|--|---------|
| Variabel Independen |                                  |   |  |  |         |
| 01.                 | Hipertensi<br>Dalam<br>Kehamilan | Ibu hamil dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg.                                      | Data tekanan darah pasien pada rekam medis.                        | Tekanan darah ibu $\geq 140/90$ mmHg diukur dalam dua kali pengukuran.   | Nominal |
| Variabel Dependen   |                                  |   |  |  |         |
| 02.                 | Bayi Berat<br>Lahir<br>Rendah    | Bayi lahir dengan berat kurang dari 2500 gram dari ibu hamil yang mengalami hipertensi. | Data bayi dengan riwayat bayi berat lahir rendah pada rekam medis. | a. < 2.500 gram ialah bayi dengan berat lahir rendah.<br>b. > 2.500 gram ialah bayi dengan berat lahir normal. | Nominal |

Tabel 1.1 Definisi Operasional

### 2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengetahui hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah dengan menggunakan metode analitik observasional.

### E. Kajian Pustaka

| NO | Nama Peneliti dan Tahun penelitian                 | Judul  | Tujuan   | Metode  | Persamaan  | Perbedaan   | Hasil   |
|----|--|--|--|---|--|---|---|
| 1. | Nita Hestiyana, Fakhrudin Razy. 2015.              | Hubungan Hipertensi dalam Kehamilan dengan Angka Kejadian BBLR di Wilayah Kerja RSUD Indrasari Rengat Tahun 2015       | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hipertensi pada kehamilan dengan kejadian BBLR. | Rancangan penelitian menggunakan <i>case control</i> dengan menggunakan pendekatan retrospektif.  | Penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan hipertensi pada kehamilan dengan kejadian BBLR. | Perbedaan penelitian terletak pada pengambilan sampel kasus yaitu menggunakan <i>total sampling</i> .                         | Hipertensi dalam kehamilan memiliki hubungan dengan kejadian berat badan lahir rendah.  |
| 2. | Anjas Dwi Purwanto, Chatarina Umbul Wahyuni. 2016. | Hubungan Antara Umur Kehamilan, Kehamilan Ganda, Hipertensi, dan Anemia dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) | Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian BBLR.           | Penelitian ini menggunakan rancang bangun studi <i>case control</i> dengan menggunakan pendekatan retrospektif dan menggunakan metode <i>systematic random sampling</i> . | Penelitian tersebut menjelaskan tentang hubungan hipertensi pada kehamilan dengan kejadian BBLR. | Perbedaan penelitian terletak pada pengambilan sampel kasus yaitu dengan menggunakan metode <i>systemic random sampling</i> . | Ada hubungan antara hipertensi dengan kejadian BBLR. Risiko kejadian BBLR 2,753 kali lebih besar pada ibu yang hipertensi daripada yang tidak hipertensi. |

|    |   |  |  |  |  |   |  |
|----|---|--|--|--|--|---|--|
| 3. | Maria Lusia<br>Bela Bili,<br>Debora Shinta<br>Liana, Ika<br>Febianti<br>Buntoro.<br>2019. | Hubungan<br>Antara Jarak<br>Kelahiran,<br>Riwayat<br>Hipertensi,<br>dan Riwayat<br>Abortus pada<br>Ibu dengan<br>Kejadian<br>Bayi Berat<br>Lahir<br>Rendah di<br>RSUD Prof.<br>Dr. W. Z.<br>Johannes | Tujuan<br>umum<br>penelitian ini<br>adalah untuk<br>mengetahui<br>hubungan<br>jarak<br>kelahiran,<br>riwayat<br>hipertensi,<br>dan riwayat<br>abortus<br>dengan<br>kejadian<br>BBLR. | Penelitian ini<br>merupakan<br>penelitian<br>analitik<br>observasional<br>dengan<br>rancangan<br><i>case control<br/>study</i> . | Penelitian<br>tersebut<br>menjelaskan<br>tentang<br>hubungan<br>hipertensi<br>pada<br>kehamilan<br>dengan<br>kejadian<br>BBLR. | Perbedaan<br>penelitian<br>terletak pada<br>pengambilan<br>sampel yaitu<br>menggunakan<br>teknik<br><i>propability<br/>sampling</i> . | Terdapat<br>hubungan<br>yang<br>signifikan<br>antara<br>riwayat<br>hipertensi<br>pada ibu<br>dengan<br>kejadian<br>BBLR    |
| 4. | Riyen Sari<br>Manulang,<br>Farida<br>Simanjuntak.<br>2020.                                | Hubungan<br>Hipertensi<br>dalam<br>Kehamilan<br>dengan<br>Kejadian<br>Berat Bayi<br>Lahir<br>Rendah di<br>RS Graha<br>Juanda<br>Tahun 2018.  | Tujuan dari<br>penelitian ini<br>adalah untuk<br>mengetahui<br>hubungan<br>antara<br>hipertensi<br>pada<br>kehamilan<br>dengan<br>kejadian<br>BBLR.                                  | Jenis<br>penelitian<br>yang<br>digunakan<br>adalah<br>metode studi<br>analitik<br>kuantitatif.                                   | Penelitian<br>tersebut<br>menjelaskan<br>tentang<br>hubungan<br>hipertensi<br>pada<br>kehamilan<br>dengan<br>kejadian<br>BBLR. | Perbedaan<br>penelitian<br>terletak pada<br>pengambilan<br>sampel kasus<br>yaitu<br>menggunakan<br><i>total<br/>sampling</i> .        | Diketahui<br>sebagian<br>besar<br>mengalami<br>hipertensi<br>dan<br>melahirkan<br>bayi<br>dengan<br>berat lahir<br>rendah. |

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

## F. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.

## **2. Tujuan Khusus Penelitian**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui angka kejadian ibu bersalin dengan hipertensi dalam kehamilan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.
- b. Mengetahui angka kejadian bayi lahir hidup dengan bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.
- c. Menganalisis hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.

## **G. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**


Bagi peneliti sendiri merupakan suatu pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian dan pengetahuan tentang hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian BBLR.

### **2. Bagi Institusi**

Sebagai bahan masukan kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.

### **3. Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi tambahan kepada masyarakat tentang hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah, sehingga diharapkan dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya hipertensi dalam kehamilan dan bayi berat lahir rendah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hipertensi Dalam Kehamilan**

##### **1. Definisi Hipertensi Dalam Kehamilan**

Hipertensi dalam kehamilan didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik 140 dan atau tekanan darah diastolik 90. Hal ini mempengaruhi 10-15% kehamilan (Wiles, Damodaram & Frise, 2021).

##### **2. Epidemiologi Hipertensi Dalam Kehamilan**

Hipertensi dalam kehamilan mempengaruhi sekitar 10% dari semua wanita hamil di seluruh dunia. Penyakit dan kondisi ini termasuk preeklamsia dan eklampsia, hipertensi gestasional, dan hipertensi kronis. Hipertensi dalam kehamilan merupakan penyebab utama morbiditas akut yang berat, cacat jangka panjang, dan kematian ibu dan anak. Hampir sepersepuluh kematian ibu di Asia dan Afrika disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan, dan seperempat kematian ibu di Amerika Latin disebabkan oleh komplikasi (Kartika Sari, Hakimi & Baning Rahayujati, 2016).

Prevalensi hipertensi dalam kehamilan di Indonesia, mencatat bahwa ditemukan sebanyak 8341 kasus (1.51%) ibu hamil dari semua sampel perempuan yang berusia 15–54 tahun. Prevalensi hipertensi pada ibu hamil sebesar 1062 kasus (12.7%). 1062 kasus ibu hamil dengan hipertensi, ditemukan 125 kasus (11.8%) yang pernah didiagnosis menderita hipertensi oleh petugas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering muncul

selama kehamilan dan dapat menimbulkan komplikasi pada 2–3% kehamilan (Masriadi, Handayani Idrus & Baharuddin 2022).

### 3. Klasifikasi Hipertensi Dalam Kehamilan

Hipertensi dalam kehamilan saat ini dibedakan menurut The Working Group of Hypertensive Disorders Complicating Pregnancy sebagai berikut.

- a. Hipertensi Gestasional, sebelumnya klasifikasi ini disebut dengan *pregnancy induced hypertension*. Terjadi pada hipertensi ringan selama kehamilan pada ibu hamil yang sebelumnya normotensive, tanpa disertai proteinuria dan kelainan hasil laboratorium lain. Bila sindrom preeklamsia tidak terjadi dan hipertensi hilang setelah 12 minggu pascasalin, diagnosis berubah menjadi hipertensi transien.
- b. Sindrom Preeklamsia dan Eklamsia, preeklamsia berarti hipertensi dan proteinuria pada perempuan hamil yang sebelumnya normotensive setelah kehamilan 20 minggu atau pada periode pascasalin dini. Pada penyakit trofoblast, preeklamsia dapat terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu.
- c. Eklamsia, adalah penderita preeklamsia yang mengalami kejang.
- d. Hipertensi kronik yang diperparah oleh sindrom preeklamsia, preeklamsia atau eklamsia yang menyerang perempuan hamil penderita hipertensi kronik.
- e. Hipertensi kronik, terjadi sebelum kehamilan atau tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih sebelum usia kehamilan 20 minggu pada 2 kali pemeriksaan tekanan darah dengan selang waktu 6 jam (Martaadisoebrata, 2013).

#### 4. Etiologi Hipertensi Dalam Kehamilan

Teori yang telah dikemukakan tentang terjadinya hipertensi dalam kehamilan, dari beberapa teori ini tidak ada yang mutlak dianggap paling benar. Teori-teori yang sekarang banyak dianut adalah sebagai berikut.

##### a. Teori Kelainan Vaskularisasi Plasenta

Dalam keadaan normal, rahim dan plasenta mendapat suplai darah dari cabang arteri uterin dan arteri ovarika. Pembuluh darah tersebut akan menembus miometrium berupa arteri arkuata yang nantinya akan bercabang menjadi arteri radialis. Selanjutnya akan menembus endometrium menjadi arteri basalis dan arteri basalis tersebut akan bercabang menjadi arteri spiralis (Sarwono, 2016).

Selama perkembangan plasenta yang normal, trofoblas menginvasi arterior endometrium uterus dan selanjutnya melakukan pembentukan kembali arterior ibu menjadi pembuluh darah besar dengan resistensi yang rendah terhadap aliran darah. Sedangkan pada penderita hipertensi, arterior ibu tidak berhasil mengalami adaptasi terhadap perubahan tersebut (Guyton, 2016).

Pada kehamilan normal, di dalam lapisan otot arteri spiralis terjadi invasi trofoblas yang menimbulkan degenerasi lapisan otot tersebut selanjutnya arteri spiralis akan dilatasi. Keadaan ini juga terjadi pada jaringan sekitar arteri spiralis yang mengakibatkan distensi dan dilatasi yang berdampak penurunan tekanan

darah, penurunan resistensi vaskular, dan peningkatan aliran darah pada daerah utero plasenta. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan dari janin dapat terjamin. Proses ini disebut “*remodeling arteri spiralis*” (Sarwono, 2016).

Dalam keadaan hipertensi tidak terjadi invasi sel trofoblas pada lapisan arteri spiralis maupun jaringan yang berada disekitarnya sehingga tidak memungkinkan untuk terjadinya distensi dan vasodilatasi. Kemudian terjadi penurunan aliran darah uteroplasenta dan terjadinya hipoksia dan iskemia plasenta. Dengan penyebab yang belum jelas, dan terjadi insufisiensi suplai darah ke plasenta. Selanjutnya menyebabkan plasenta mengeluarkan berbagai bahan yang memasuki sirkulasi ibu dan menyebabkan gangguan fungsi endotel vaskular, menurunkan aliran darah ke ginjal, retensi garam yang berlebihan, dan peningkatan tekanan darah (Guyton, 2016).

b. Teori Iskemia Plasenta, Radikal Bebas, dan Disfungsi Endotel

Keadaan ini akan menghasilkan oksidan. Salah satu oksidan yang dihasilkan adalah radikal hidroksil yang sangat toksik. Radikal ini akan merusak membran sel, yang mengandung banyak asam lemak tidak jenuh menjadi peroksida lemak yang dapat merusak membran sel, nukleus, dan protein pada sel endotel (Sarwono, 2016).

Selain itu, keadaan ini juga memicu pelepasan faktor vasoaktif seperti *soluble fms-like tyrosine kinase-1* (sFlt-1). Beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa beredarnya sFlt-1 mungkin tanda timbulnya gejala klinis hipertensi (Gilbert, 2018).

Keadaan tersebut dapat menyebabkan disfungsi sel endotel vaskular diseluruh tubuh, termasuk didalamnya ginjal. Ketika terjadi disfungsi endotel maka akan menurunkan pelepasan dari nitrit oksida dan bahan-bahan vasodilator lainnya sehingga terjadi vasokonstriksi, penurunan laju filtrasi cairan dari glomerulus ke dalam tubulus ginjal, terganggunya natriuresis tekanan oleh ginjal dan timbulnya hipertensi. Semuanya berlawanan dengan perubahan yang terjadi pada wanita hamil normal (Guyton, 2016).

#### c. Disfungsi Endotel

Ketika terjadi disfungsi endotel maka akan terjadi:

- 1). Gangguan metabolisme prostaglandin yaitu menurunkan produksi prostasiklin (PGE<sub>2</sub>) yang merupakan vasodilator kuat.
- 2). Agregasi sel-sel trombosit pada daerah endotel terjadi kerusakan. Hal ini menyebabkan produksi tromboksan (TXA<sub>2</sub>) lebih banyak. Tromboksan adalah vasokonstriktor kuat. Pada saat hipertensi, kadar tromboksan lebih dominan dibandingkan kadar prostasiklin sehingga terjadi vasokonstriksi.
- 3). Perubahan khas pada sel endotel kapiler glomerulus.
- 4). Peningkatan permeabilitas kapiler.
- 5). Peningkatan produksi bahan-bahan vasopressor yaitu endotelin. Kadar NO (vasodilator) menurun sedangkan endotelin meningkat (Sarwono, 2016).

Dengan demikian, peningkatan dari *soluble fms-like tyrosine kinase-1* (sFlt-1), TNF $\alpha$  dan IL-6, angiotensin II tipe 1 *receptor autoantibodies* (AT1-AA), dan thromboxane (TX) akan memicu disfungsi endotel dengan penurunan dari nitrit oksida (NO) dan peningkatan dari *reactive oxygen species* (ROS) dan endothelin-1 (ET-1). Kondisi ini akan mengganggu fungsi dari ginjal yang pada akhirnya akan memicu terjadinya hipertensi (Gilbert, 2018).

d. Teori Intoleransi Immunologik antara Ibu dan Janin

Pada kehamilan normal, respon ibu tidak menolak adanya hasil konsepsi yang dianggap asing. Ini dikarenakan adanya HLA-G yang dapat berperan sebagai modulasi respon imun sehingga ibu tidak menolak hasil konsepsi. HLA-G dapat melindungi trofoblas dari lisis oleh *Natural Killer* (NK) ibu. Selain itu, HLA-G juga dapat mendukung invasi dari trofoblas kedalam desidua. Pada hipertensi terjadi penurunan pada HLA-G yang menghambat invasi trofoblas ke dalam desidua. Akhirnya jaringan desidua susah menjadi lunak dan gembur sehingga arteri spiralis tidak direnovasi dan akhirnya susah untuk dilatasi (Bodnar, 2016).

## 5. Faktor Risiko Hipertensi Dalam Kehamilan


Hipertensi dalam kehamilan memiliki risiko lebih besar menyebabkan persalinan premature, IUGR (*Intrauterine Growth Retardation*), kesakitan dan kematian, gagal ginjal akut, gagal hati akut, pendarahan saat dan setelah persalinan, HELLP (*Hemolysis Elevated Liver Enzymes and Low Platelet Count*), DIC (*Disseminated Intravascular Coagulation*), pendarahan serebral dan epilepsy (Alatas, n.d., 2019).

Hipertensi dapat menyebabkan masalah hati, ginjal, dan otak, serta sistem pembekuan darah yang tidak normal. Komplikasi ini juga melibatkan plasenta, yang meningkatkan risiko janin. Kelainan yang paling umum terjadi adalah pertumbuhan yang tidak baik bagi janin diakibatkan oleh pasokan darah yang tidak memadai melalui plasenta yang rusak, dan masalah prematuritas (berkaitan dengan persalinan prematur spontan atau kelahiran dengan induksi maupun dengan section secaria agar melindungi ibu maupun janin) (Faadhillah, 2020).

## **6. Patofisiologi Hipertensi Dalam Kehamilan**

Mekanisme terjadinya hipertensi ialah didasarkan pada pembentukan angiotensin II dari angiotensin I oleh *Angiotensin I Converting Enzyme* (ACE). ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensin yang diproduksi oleh hati. Selain itu, renin yang diproduksi oleh ginjal, diubah menjadi angiotensin I oleh hormone. ACE di paru-paru mengubah angiotensin I menjadi angiotensin II. Angiotensin II memegang peranan penting dalam meningkatkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama ialah meningkatkan sekresi hormone antidiuretik (ADH) dan meningkatkan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar hipofisis) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Saat ADH meningkat, sangat sedikit urin yang dikeluarkan dari tubuh (antidiuretik), sehingga menjadi pekat dan memiliki osmolalitas yang tinggi. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume

darah meningkat, yang juga akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua ialah menstimulasi korteks adrenal untuk mensekresi aldosterone. Aldosteron adalah hormon steroid yang berperan penting dalam ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan menyerap kembali NaCl (garam) dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah (Nuraini, 2015).



**Gambar 2.1** Patofisiologi Hipertensi (Nuraini, 2015)

## 7. Diagnosis Hipertensi Dalam Kehamilan

Diagnosis hipertensi secara empirik ditegakkan bila tekanan darah sistolik mencapai >140 mmHg atau diastolik >90 mmHg. Fase V Korotkoff dipergunakan untuk menetapkan tekanan diastolik. Peningkatan tekanan sistolik sebesar 30 mmHg dan diastolik 15 mmHg selama kehamilan, walaupun tekanan darah <140/90 mmHg, dahulu pernah menjadi salah satu kriteria hipertensi, tetapi saat ini sudah tidak dipakai lagi karena ternyata tidak disertai dengan peningkatan luaran kehamilan yang buruk. Apabila hal ini terjadi, penderita tersebut harus lebih sering dipantau karena dapat terjadi kejang/eklamsia pada penderita dengan tekanan darah di bawah 140/90 mmHg (Ediriweera, D.S. & Dilina, 2017). Untuk semua ibu hamil, sebaiknya dilakukan pengukuran tekanan darah dalam posisi duduk, karena posisi terlentang dapat menyebabkan tekanan darah lebih rendah daripada yang dicatat dalam posisi duduk. Mendiagnosis hipertensi selama kehamilan membutuhkan pengukuran tekanan darah dua kali terjadi hipertensi setidaknya dalam 6 jam. Selama kehamilan, curah jantung meningkat sebesar 40%, sebagian karena peningkatan stroke volume. Pada trimester ketiga, denyut jantung meningkat 10x/menit. Pada trimester kedua, resistensi vaskular sistemik menurun, dan penurunan ini berhubungan dengan penurunan tekanan darah (Alatas n.d., 2019).

Dalam aspek dunia medis dan sesuai dengan apa yang Allah SWT. telah anjurkan kepada kita untuk memakan makanan yang bernutrisi karna kandungan zat gizi yang ada dalam makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dsb. yang terdapat pada

makanan berguna sebagai energi dalam tubuh dan dianjurkan untuk tidak memakan makanan yang berlebihan yang dapat merugikan tubuh kita terutama disaat masa kehamilan yang telah dijelaskan dalam QS. Al-A'raf/7:31.

يٰۤاِبْنٰى اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
۳۱ الْمُسْرِفِيْنَ ؕ

Terjemahannya:

“Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al A'raf/7:31).

Tafsir QS. Al A'raf/7:31 yaitu larangan berlebihan itu mengandung beberapa arti, di antaranya: 1. Jangan berlebihan dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan dan minum dengan porsi yang berlebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa haus hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan atau minum masih ada. 2. Termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan Allah.

## **B. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)**

### **1. Definisi Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)**

Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) merupakan bayi yang berat lahirnya <2500 gram tanpa memandang usia kehamilan. BBLR merupakan faktor penting dalam meningkatkan mortalitas, morbilitas, dan disabilitas neonatus. Bayi dan anak dengan

BBLR memiliki dampak jangka panjang pada kehidupan masa depan mereka (Yarah et al., 2020).

Sesungguhnya Allah SWT. menciptakan dalam bentuk yang paling sempurna diantara ciptaan Allah SWT. yang lain. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat ini pula dijelaskan dalam QS. Al-Infithar/82:7.

﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾﴾

Terjemahnya:

“yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)-mu seimbang...”(QS Al-Infithar/82:7)

Pada ayat ini pula dijelaskan dalam QS. Al-Infithar/82:7.

﴿فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾

Terjemahnya:

“Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun (tubuh)-mu.”(QS Al-Infithar/82:8)

Uraian tentang proses tersebut yang demikian mengagumkan membuktikan perlunya beriman dan tunduk kepada Allah Sang Pencipta serta keharusan mengikuti jejak orang-orang mukmin yang disebut pada ayat-ayat kelompok pertama. Hal itulah yang dapat mengantarkan manusia mencapai kesempurnaan hidup duniawi dan ukhrawi.

## 2. Epidemiologi BBLR

Menurut WHO, pada tahun 2017, 4,1 juta bayi di seluruh dunia meninggal pada tahun pertama kehidupan. Pada tahun 2015, Indonesia memiliki angka kematian bayi (AKB) tertinggi di ASEAN, 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara itu, menurut data Riskesdas tahun 2013, prevalensi berat badan lahir rendah di Indonesia adalah 10,2 nm pada tahun 2010 dan kemudian turun menjadi 6,2% pada tahun 2018 (Manurung, 2020).

Provinsi Sulawesi Selatan peringkat ketujuh terjadinya prevalensi BBLR adalah 12%. Pada tahun 2015, presentase bayi dengan BBLR di Sulawesi Selatan meningkat yaitu 4.697 (3,23%), dengan jumlah lahir hidup sebesar 149.986 dan jumlah bayi lahir hidup ditimbang sebesar 120.293 dan tertinggi di Kota Makassar sebesar 690 kasus (Finandakasih, Addul Rosmah & Arif Tiro, 2019).

### **3. Klasifikasi BBLR**

Anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah, dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

- a. Anak Lahir Kurang Bulan. Berat dan Panjang anak sesuai dengan umur kehamilan, jadi pertumbuhannya tidak terganggu. Ukurannya kecil karena masih muda. Dahulu dikenal sebagai bayi prematur.
- b. Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT). Bayi mempunyai berat badan di bawah 10 persentil dari kurva berat badan yang normal. Dikenal sebagai *Intra-Uterine Growth Restriction* (Martaadisoebrata, 2013).

Berdasarkan umur kehamilan atau masa gestasi yang ditetapkan, maka bayi BBLR digolongkan dalam tiga kelompok:

- a. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) yaitu berat lahir 1500-2500 gram.
- b. Bayi Berat Lahir Sangat Rendah (BBLSR) yaitu bayi berat lahir <1500 gram.
- c. Bayi Berat Lahir Extrem Rendah (BBLER) yaitu bayi yang berat lahirnya <1000 gram (Pantiawati, 2019).

#### **4. Etiologi BBLR**

BBLR dapat disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor ibu (gizi, usia, paritas, status ekonomi), riwayat kehamilan yang buruk (BBLR, keguguran), hipertensi, asuhan antenatal care yang buruk, kondisi janin, riwayat penyakit seperti Diabetes Mellitus (DM) dan perdarahan antepartum, perokok, dan faktor pekerjaan. Wanita yang memiliki status ekonomi rendah seringkali memiliki asupan makanan yang tidak mencukupi, sanitasi tempat tinggal yang buruk, dan rendahnya kemampuan untuk mencari perawatan selama kehamilan, yang dapat mempengaruhi berat lahir bayi. Seorang ibu berusia 15 tahun memiliki risiko tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Hartiningrum & Fitriyah, 2018).

#### **5. Gambaran Klinis BBLR**

Gambaran bayi berat lahir rendah bergantung pada usia kehamilan sehingga dapat dikatakan bahwa makin kecil bayi, makin muda kehamilan. Sebagai gambaran umum dapat dikemukakan bahwa bayi berat badan lahir rendah memiliki karakteristik seperti,

berat badan kurang dari 2500gr, Panjang kurang dari 45 cm, lingkaran dada kurang dari 30 cm, lingkaran kepala kurang dari 33 cm, usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kepala relatif lebih besar, kulit tipis transparan, rambut lemak kulit kurang, pernapasan tidak teratur yang dapat menyebabkan apnea, kepala tidak mampu tegak, dan frekuensi nadi 100 sampai 140 denyut per menit (Manuaba, 2014).


## **6. Faktor Risiko BBLR**

Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian BBLR adalah karakteristik sosial demografi ibu (usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 34 tahun, kurangnya status sosial ekonomi, tingkat pendidikan rendah). Risiko medis ibu sebelum kehamilan juga berperan dalam kejadian BBLR (paritas, berat dan tinggi badan, Riwayat lahir BBLR, jarak kelahiran). Status Kesehatan reproduksi ibu berisiko BBLR (keadaan gizi ibu, infeksi dan penyakit selama kehamilan, riwayat kehamilan, dan komplikasi kehamilan). Status pelayanan antenatal (frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal, petugas Kesehatan tempat periksa hamil umur kandungan saat pertama kali periksa kehamilan) juga berisiko untuk melahirkan BBLR (Ismayanah, Nurfaizah & Syatirah, 2020).

## **7. Patofisiologi BBLR**

Diagram alir yang menunjukkan konsekuensi antara pertumbuhan intrauterin dan kelahiran prematur yang mengakibatkan berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah mungkin memiliki efek buruk pada pembentukan nefron dan hipertrofi glomerulus; yang dapat meningkatkan kerentanan pertumbuhan intrauterin individu

yang lahir atau prematur terhadap penyakit ginjal jangka Panjang (Ediriweera & Dilina, 2017).



**Gambar 2.2** Patofisiologi BBLR (Ediriweera & Dilina, 2017).

## 8. Diagnosis BBLR

Menegakkan diagnosis BBLR adalah dengan mengukur berat lahir bayi dalam jangka waktu 1 jam setelah lahir, dapat diketahui dengan dilakukan anamnesis, pemeriksaan fisis, dan pemeriksaan penunjang. Riwayat yang perlu ditanyakan pada ibu dalam anamnesis untuk menegakkan mencari etiologi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya BBLR, yaitu: umur ibu, riwayat HPHT, riwayat persalinan sebelumnya, paritas, kenaikan BB selama hamil, aktivitas, dll. Pada pemeriksaan fisis, yang dapat dijumpai pada bayi BBLR adalah berat badan, tanda-tanda prematuritas, dan tanda bayi cukup bulan atau lebih bulan. Pada pemeriksaan penunjang, yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan *skor ballard*, tes kocok, darah rutin, foto dada ataupun *babygram*, dan USG kepala bayi (Pantiawati, 2019).

## 9. Prognosis BBLR

Bayi BBLR mempunyai peluang lebih kecil untuk bertahan hidup dan lebih rentan terhadap penyakit hingga mereka dewasa. BBLR sering menyebabkan perkembangan kognitif, retardasi mental, dan lebih mungkin terinfeksi infeksi yang menyebabkan penyakit dan bahkan kematian. Efek lain yang muncul pada orang dewasa dengan riwayat BBLR adalah risiko berkembangnya penyakit degenerative yang dapat membebani ekonomi individu dan masyarakat (Novitasari, Hutami & Pristya, 2020).

### **C. Hubungan Hipertensi Dalam Kehamilan Dengan Kejadian BBLR**


Tekanan darah pada trimester pertama kehamilan seringkali sama dengan tekanan darah sebelum kehamilan. Pada trimester kedua, tekanan darah wanita hamil turun beberapa milimeter air raksa (mmHg). Pada trimester ketiga, tekanan darah akan naik Kembali. Pada saat inilah ditemukan bahwa tekanan darah tinggi sering mencapai titik hipertensi. Wanita dengan tekanan darah tinggi sebelum hamil juga mengalami perubahan tekanan darah, sehingga tekanan darah paling rendah pada trimester kedua. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan ibu mengalami keracunan kehamilan ringan dan berat, bahkan kejang. Tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing dan lemas (Sarwono, 2016).

Berat bayi lahir rendah biasanya disebabkan oleh perkembangan plasenta yang abnormal, kebutuhan oksigen yang tidak mencukupi, asupan nutrisi yang tidak mencukupi, dan produksi metabolit yang abnormal sehingga menyebabkan sirkulasi plasenta uterus yang abnormal (Sarwono, 2016).

Komplikasi medis ibu, seperti penyakit vaskular kronis, terutama jika adanya hipertensi yang memperberat, sering menyebabkan hambatan pertumbuhan janin. Bahkan hipertensi ini mengakibatkan kegagalan pada pertumbuhan janin, terutama bila awitannya sebelum umur 37 minggu kehamilan. Secara teoritis, insufisiensi plasenta yang berhubungan dengan hipertensi dapat menyebabkan penurunan suplai dan penyimpanan glukosa di hati (Leveno et al., 2019). Keadaan hipoksia, sebagaimana yang terjadi pada hipertensi, produksi dari radikal bebas di plasenta sangat banyak sedangkan antioksidan sangat sedikit maka keadaan seperti ini akan menjadi parah (Sarwono, 2016).




#### D. Kerangka Teori



Gambar 2.3 Kerangka Teori


## E. Kerangka Konsep

Variabel Independen



**BBLR**

Variabel Dependen



= Variabel diteliti

=Variabel tidak diteliti

Gambar 2.4 Kerangka Konsep

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian *analitik observasional* yaitu peneliti hanya melakukan pengamatan langsung terhadap variabel yang diteliti tanpa memberikan perlakuan. Melalui pendekatan *cross sectional* yaitu suatu penelitian yang menggunakan kolerasi antara faktor risiko semua pengukuran variabel yang diteliti.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan pada Juli 2022.

#### **C. Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tahun 2021.

##### **2. Sampel Penelitian**

Sampel penelitian adalah seluruh populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Cara pengambilan sampel adalah *Consecutive Sampling*. Sampel dalam penelitian ini adalah

ibu hamil yang melahirkan bayi hidup di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar dengan memperlihatkan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi.

Besar sampel minimal dihitung dengan rumus besar Slovin, dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

$$n = \frac{2.694}{1 + 2.694(0,05)^2}$$

$$n = \frac{2.694}{1 + 2.694(0,0025)}$$

$$n = \frac{2.694}{1 + 6,735}$$

$$n = \frac{2.694}{7,735}$$

$$n = 348,287$$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$d$  = Tingkat Signifikansi ( $p$ )

Sehingga besar minimal sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 350 orang.

## **D. Teknik Pengambilan Sampel**

### **1. Kriteria Inklusi**

- a) Ibu yang melahirkan dengan bayi lahir hidup.
- b) Data rekam medik lengkap seperti terdapat nomor rekam medik, terdapat nama ibu, usia ibu, riwayat hipertensi, dan berat badan lahir bayi.

### **2. Kriteria Eksklusi**

- a) Ibu dengan riwayat penyakit DM, anemia, perdarahan antepartum, dan penyakit penyerta lainnya.
- b) Ibu dengan status gizi kurang.
- c) Kehamilan multiple/gemelli.
- d) Kelainan kongenital pada bayi.
- e) Data rekam medik tidak lengkap seperti tidak tercantum identitas ibu, tidak terdapat riwayat hipertensi pada rekam medis ibu, dan tidak tercantum berat badan lahir bayi.


## **E. Cara Pengumpulan Data**

Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari rekam medik pasien yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar.


## **F. Cara Kerja Penelitian**

1. Melakukan persiapan penelitian.
2. Mengurus perizinan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar untuk mengambil data.

3. Mengambil data rekam medik yang sesuai dengan syarat penelitian melalui seleksi subjek dari populasi terjangkau berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.
4. Didapatkan jumlah pasien yang sesuai dengan besar sampel yang peneliti telah tentukan.



## G. Alur Penelitian



**Gambar 3.1** Alur Penelitian

## **H. Langkah Pengolahan Data**

Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 21, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang terkumpul (*editing*).
2. Memberi angka-angka atau kode-kode tertentu yang telah disepakati terhadap data rekam medik (*coding*).
3. Memasukkan data rekam medik sesuai kode yang telah ditentukan untuk masing-masing variabel sehingga menjadi suatu data dasar (*entry*)
4. Menggolongkan, mengurutkan, serta menyederhanakan data, sehingga mudah dibaca dan diinterpretasikan (*cleaning*).

## **I. Analisis Data**

### **1. Analisis Univariat**

Analisis univariat digunakan untuk menjelaskan masing-masing frekuensi distribusi, berupa gambaran karakteristik responden, variabel dependen dan independen.

### **2. Analisis Bivariat**

Analisis dilakukan menggunakan uji *Chi Square* untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel kategorik dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen.

## **J. Etika Penelitian**

Hal-hal yang berhubungan dengan etika penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Membuat surat pengantar yang ditujukan kepada pihak atau instansi terkait sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.
2. Tidak melakukan manipulasi data yang diambil dari Rumah Sakit.
3. Menjamin kerahasiaan identitas subjek atau responden penelitian sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas penelitian yang sedang dilakukan.
4. Diharapkan dari penelitian yang kita lakukan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil

##### 1. Analisis Univariat

**Tabel 4.1 Distribusi Data Ibu di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar**

| <b>Karakteristik</b>               | <b>n</b>   | <b>%</b>     |
|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Usia Ibu</b>                    |            |              |
| Risiko Tinggi<br>(<20 - >35 tahun) | 255        | 72.9         |
| Risiko rendah<br>(20-35 tahun)     | 95         | 27.1         |
| <b>Pekerjaan</b>                   | 181        | 51.7         |
| Tidak Bekerja                      |            |              |
| Bekerja                            | 216        | 61.7         |
| <b>Paritas</b>                     | 134        | 38.3         |
| Primipara                          |            |              |
| Multipara                          | 26         | 7.4          |
| <b>Abortus</b>                     | 324        | 92.6         |
| Ya                                 |            |              |
| Tidak                              | 253        | 72.3         |
| <b>Hipertensi</b>                  | 97         | 27.7         |
| Ya                                 |            |              |
| Tidak                              | 208        | 59.4         |
| <b>Berat Badan Lahir</b>           | 142        | 40.6         |
| BBLR                               |            |              |
| BBLN                               |            |              |
| <b>Total</b>                       | <b>350</b> | <b>100.0</b> |

Sumber : Data Sekunder 2021

Berdasarkan tabel 4.1 didapatkan distribusi data kehamilan pada ibu yang berisiko tinggi yakni sebanyak 255 responden (72,9%) dan usia ibu yang berisiko rendah yakni sebanyak 95 responden (27,1%). Distribusi data pekerjaan pada ibu yakni tidak bekerja sebanyak 169 responden (48,3%) dan bekerja sebanyak 181 responden (51,7%). Distribusi data riwayat paritas pada ibu yakni primipara sebanyak 216 responden (61,7%), multipara sebanyak 134 responden (38,3%). Distribusi data riwayat abortus pada ibu yakni sebanyak 26 responden (7,4%) yang pernah mengalami abortus dan sebanyak 324 responden (92,6%) yang tidak pernah mengalami abortus. Distribusi data hipertensi pada ibu yakni hipertensi sebanyak 253 responden (72,3%) dan ibu yang tidak hipertensi sebanyak 97 responden (27,7%). Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi yakni BBLR sebanyak 208 responden (59,4%) dan berat badan normal sebanyak 142 responden (40,6%).

## 2. Analisis Bivariat

**Tabel 4.2 Hubungan antara Hipertensi Dalam Kehamilan dengan Kejadian BBLR**

| Hipertensi Dalam Kehamilan | Berat Badan Lahir Rendah |      |       |      | Total |       | PR 95% CI | P-value |
|----------------------------|--------------------------|------|-------|------|-------|-------|-----------|---------|
|                            | Ya                       |      | Tidak |      | n     | %     |           |         |
|                            | n                        | %    | n     | %    |       |       |           |         |
| Ya                         | 169                      | 66.8 | 84    | 33.2 | 253   | 100.0 |           |         |
| Tidak                      | 39                       | 40.2 | 58    | 59.8 | 97    | 100.0 | 1,661     | 0,000   |
| <b>Total</b>               | 208                      | 59.4 | 142   | 40.6 | 350   | 100.0 |           |         |

Sumber : (Data Sekunder 2021, Menggunakan Hasil Uji *Chi-Square*)

Berdasarkan tabulasi tabel 4.2 didapatkan bahwa ibu hipertensi dengan berat bayi lahir rendah sebanyak 169 responden (66,8%), ibu hipertensi dengan berat bayi lahir normal sebanyak 84 responden (33,2%) sedangkan ibu yang tidak hipertensi dengan berat bayi lahir rendah sebanyak 39 responden (40,2%) dan ibu yang tidak hipertensi dengan berat bayi lahir normal sebanyak 58 responden (59,8%).

Hasil uji Chi Square menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah ( $p \text{ value} \leq 0,05$ ). Hasil perhitungan *Prevalence Ratio* (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi berisiko 1,661 kali mengalami kejadian berat bayi lahir rendah (95% CI 1,284-4,849).

## **B. Pembahasan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR) di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar yang terdiri dari 350 sampel sesuai kriteria inklusi yang telah ditetapkan.

Ibu bersalin yang melahirkan mayoritas berumur risiko tinggi ,yaitu sebanyak 255 orang (72,9%). Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada kejadian bayi berat badan lahir rendah. Hal ini sejalan dengan Pinontoan (2016) yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur ibu dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Hasil uji statistik diperoleh nilai  $p\text{-value} = 0,001$ . Umur 31-35 tahun merupakan interval umur dimana seorang wanita telah mempunyai alat reproduksi yang telah matang dan siap untuk hamil dan bersalin. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikatakan Wiknjastro (2016) bahwa umur merupakan faktor yang dapat mengakibatkan bayi lahir dengan berat yang rendah. Kelahiran prematur tampak meningkat pada wanita yang berusia optimum untuk melahirkan (usia optimum untuk melahirkan adalah 20-35 tahun).

Sebagian besar ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tidak bekerja atau ibu rumah tangga yaitu sebanyak 169 orang (48,3%). Ibu yang tidak bekerja berakibat pada perekonomian keluarga yang rendah. Hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan ibu untuk memenuhi pola makan yang bergizi seimbang setiap harinya. Pada ibu yang tidak bekerja cenderung lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga di rumah seperti memasak, merawat

rumah, upacara adat, dan mengurus keluarga. Hal ini membuat ibu lebih sibuk dengan urusan tersebut sehingga mengabaikan kondisi kesehatan dan kehamilannya. Ibu yang asik mengerjakan pekerjaan rumah terkadang sering mengabaikan waktu makan dan istirahatnya. Kurangnya konsumsi makanan yang bergizi dapat mengakibatkan asupan nutrisi ke janin berkurang sehingga menyebabkan BBLR. Hal tersebut sesuai dengan teori Wiknjosastro (2016) bahwa wanita dengan tingkat ekonomi rendah beresiko melahirkan bayi yang mengalami retardasi pertumbuhan maupun bayi kecil.

Ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar banyak tercatat dalam kategori primipara, yaitu sebanyak 216 orang (61,7%) dan multipara sebanyak 134 orang (38,3%). Hal ini sejalan dengan Handayani (2019) yang mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang didapatkan adanya hubungan paritas dengan kejadian bayi berat lahir rendah yaitu p-value 0,037 (OR=0,214, CI=055-838). Paritas yang tinggi akan berdampak pada timbulnya berbagai masalah kesehatan baik bagi ibu maupun bayi yang dilahirkan. Kehamilan dan persalinan yang berulang-ulang menyebabkan kerusakan pembuluh darah di dinding rahim dan kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan saat kehamilan sehingga cenderung timbul kelainan letak ataupun kelainan pertumbuhan plasenta dan pertumbuhan janin sehingga melahirkan BBLR (Nurseha, 2017).

Sebagian kecil ibu bersalin yang melahirkan bayi di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar tercatat memiliki riwayat abortus yaitu sebanyak 26

orang (7,4%). Meskipun didapatkan dalam jumlah kecil, riwayat abortus merupakan salah satu yang mempengaruhi terjadinya bayi lahir dengan berat rendah. Ibu yang memiliki riwayat abortus 1,9 kali lebih beresiko melahirkan bayi dengan berat rendah daripada ibu yang tidak memiliki riwayat abortus. Hasil penelitian Yanti dan Surtiningsih (2016) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara riwayat abortus dengan kejadian BBLR. Ibu dengan riwayat abortus sebelumnya 3,8 kali lebih beresiko melahirkan bayi BBLR ( $p=0,025$ ). Hal ini disebabkan karena abortus dapat terjadi karena beberapa sebab diantaranya kelainan pertumbuhan hasil konsepsi seperti kelainan kromosom/genetik, penyakit kronis yang diderita ibu, maupun kelainan yang terjadi pada organ reproduksi ibu, sehingga kelainan dan penyakit – penyakit tersebut juga dapat berdampak pada kehamilan berikutnya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin sehingga ibu melahirkan bayi dengan berat rendah.

Pada distribusi data hipertensi didapatkan sebanyak 253 (72,3%) ibu hamil yang mengalami hipertensi, artinya hipertensi masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan pada ibu hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryana (2021) ditemukan bahwa hipertensi dalam kehamilan merupakan faktor risiko kejadian bayi berat lahir rendah yang signifikan ( $p<0,01$ ). Normalnya dalam kehamilan arteri spiral dalam rahim akan melebar dari pembuluh darah muskuler berdinding tebal, menjadi pembuluh darah yang tipis dengan diameter yang jauh lebih besar, perubahan ini menyebabkan kapasitas pembuluh darah meningkat sehingga bisa menerima peningkatan volume darah pada kehamilan. Pada pasien dengan preeklamsia terjadi penurunan perfusi plasenta dan

hipoksia, Iskemi plasenta diperkirakan menyebabkan disfungsi sel endotel yang bekerja dengan merangsang pelepasan substansi yang toksik terhadap endotel. Kelainan ini menyebabkan perfusi jaringan yang buruk pada semua organ, meningkatkan resistensi perifer dan tekanan darah, meningkatkan permeabilitas sel endotel, serta menyebabkan kebocoran cairan dan protein intra vaskular serta akhirnya menyebabkan volume plasma berkurang (Lowdermilk dkk, 2016). Hasil tersebut dapat dijelaskan karena saat ibu hamil mengalami hipertensi, asupan makanan terhadap janin menjadi terhambat disebabkan adanya penyempitan pembuluh darah. Asupan makanan yang terhambat akan menyebabkan perkembangan janin dalam kandungan menjadi terhambat. Pada akhirnya bayi terlahir dengan berat badan lahir rendah (Proverawati, 2015).

Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi didapatkan BBLR sebanyak 208 responden (59.4%), lebih banyak dibandingkan berat badan normal sebanyak 142 responden (40.6%). Pada umumnya bayi dengan bayi berat lahir rendah (BBLR) ini berhubungan dengan usia kehamilan yang belum cukup bulan (prematuur), padahal hampir semua lemak, glikogen, dan mineral, contohnya zat besi, kalsium, fosfor dan seng dideposit selama 8 minggu terakhir untuk bayi, BBLR disamping itu juga disebabkan terjadinya dismaturitas, yang berarti bayi lahir cukup bulan (usia kehamilan >37 minggu), tapi berat badan lahirnya lebih kecil dibandingkan dengan masa kehamilannya, yaitu kurang dari 2.500 gram. Masalah ini dapat terjadi karena adanya gangguan pertumbuhan bayi pada saat dalam kandungan yang disebabkan oleh penyakit-penyakit ibu contohnya apabila ada kelainan plasenta, infeksi, hipertensi dan keadaan-keadaan lain yang dapat

mengakibatkan nutrisi yang diperoleh bayi jadi tidak adekuat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Novianti (2018) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit Permata Cibubur-Bekasi” didapatkan berdasarkan usia kehamilan yang mengalami BBLR sebanyak 83(85,6%) berdasarkan usia kehamilan, berdasarkan paritas terbanyak pada multipara dan grandemultipara yaitu 88 (90,7%), berdasarkan jarak kehamilan terbanyak lebih kurang 2 tahun yaitu 58 (59,8%), berdasarkan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 89 (91,8%), berdasarkan gemelli sebanyak 82 (84,5%).

Hasil uji statistik *chi-square* yang dilakukan mengenai hubungan hipertensi dalam kehamilan dan bayi berat lahir rendah (BBLR) didapatkan nilai  $p = 0,000$  sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan hipertensi pada kehamilan dengan kejadian bayi berat badan lahir rendah di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar. Hasil tersebut dapat dijelaskan karena saat ibu hamil mengalami hipertensi, maka asupan makanan terhadap janin menjadi terhambat karena adanya penyempitan pembuluh darah. Asupan makanan yang terhambat menyebabkan perkembangan janin dalam kandungan menjadi terhambat. Pada akhirnya bayi terlahir dengan berat lahir rendah (Proverawati, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyowati (2014), yang meneliti hubungan hipertensi dengan bayi berat lahir rendah dan didapatkan nilai  $p = 0,05$  yang artinya ada hubungan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian bayi berat lahir rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Julia (2016), diperoleh  $p = 0,00$  yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara ibu hipertensi dengan kejadian berat badan lahir rendah (BBLR) dan nilai OR dengan *Confidence Interval* (CI) sebesar 95% memiliki peluang 3,225 kali lebih besar untuk melahirkan bayi berat lahir rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanto, dkk (2016) yang berjudul “Hubungan antara umur kehamilan, kehamilan ganda, hipertensi dan anemia dengan kejadian bayi berat lahir rendah (BBLR)” Berdasarkan hasil uji statistik Chi-square, didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara hipertensi ( $p=0,037$ ;  $OR=2,753$ ;  $95\% CI=1,040-7,292$ ) dengan kejadian BBLR. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat 4 faktor yang berhubungan dengan kejadian BBLR, yaitu umur kehamilan, kehamilan ganda, hipertensi, dan anemia saat hamil.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Manullang & Riyan (2018) yang berjudul hubungan hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah di RS Graha Juanda tahun 2018” Berdasarkan hasil analisis Chi-Square menunjukkan nilai uji statistik dengan menggunakan uji t di dapatkan hasil  $p$ -value 0,001 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah. Dalam penelitian yang juga dilakukan oleh Bili,dkk (2019) didapatkan hasil analisa uji *chi square* menunjukkan  $p = 0,000$ . Berdasarkan hasil tersebut, karena nilai  $p < 0,05$  maka dapat dinyatakan terdapat hubungan signifikan antara riwayat hipertensi pada ibu dengan kejadian BBLR.

Pada beberapa penelitian yang menyimpulkan adanya hubungan antara hipertensi dengan kejadian bayi berat lahir rendah, terdapat pula penelitian yang tidak menemukan adanya hubungan antara hipertensi dengan kejadian bayi berat lahir rendah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Uken (2022) yang berjudul “Hubungan Penyakit Hipertensi Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di Indonesia (Analisis Lanjutan Data RISKESDAS 2018) yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara hipertensi 1,000 ( $p > 0,05$ ) pada ibu hamil dengan bayi berat lahir rendah. Disarankan agar dilakukan analisis lebih lanjut dari faktor maternal lainnya terhadap kejadian bayi berat lahir rendah.

Dalam Q.S.Ar-Rad/13:8:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ  
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahnya:

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.” Q.S.Ar-Rad/13:8.

Menurut Tafsir Al-Misbah Jilid 6 ialah membuktikan kekuasaan Allah tentang kandungan. Allah membentuk sperma untuk membuahi ovum yang kemudian akan menempel di dinding rahim yang membentuk jenis kelamin, berat badan ndan bentuk dari janin. Allah juga mengetahui apa yang kurang di dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat atau keguguran.

Dari An Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ . أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Terjemahnya:

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari no. 52 dan Muslim no. 1599).

Jantung merupakan organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung salah satunya adalah Hipertensi atau tekanan darah tinggi.

Dalam QS. Ar-Rad/13:28;

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.”

Dijelaskan dalam QS. Ar-Rad/13:28 diatas bahwa dengan mengingat Allah hati kita akan tentram, dan salah satu cara mengingat Allah adalah dengan membaca atau mendengarkan firman-Nya yakni Al-Qur'an. Mendengarkan Al-Qur'an dapat memberikan efek ketenangan dalam tubuh sebab adanya unsur relaksasi dan meditasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan


Distribusi data hipertensi pada ibu yakni hipertensi sebanyak 253 responden (72,3%) dan ibu yang tidak hipertensi sebanyak 97 responden (27.7%). Distribusi data riwayat berat badan lahir pada bayi yakni bayi berat lahir rendah sebanyak 208 responden (59.4%) dan berat badan normal sebanyak 142 responden (40.6%).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 350 sampel di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar Tahun 2021, maka pada hasil uji *Chi Square* menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara hipertensi dalam kehamilan dengan kejadian berat bayi lahir rendah ( $P \text{ value} \leq 0,05$ ). Hasil perhitungan *Prevalence Ratio* (PR) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mengalami hipertensi berisiko 1,661 kali mengalami kejadian berat bayi lahir rendah (95% CI 1,284-4,849).

#### B. Saran

1. Pencegahan hipertensi dalam kehamilan harus terus diupayakan untuk mengurangi angka kejadian pada ibu hamil, yaitu dengan memberikan penyuluhan dan edukasi terkait penyebab dan cara mencegah hipertensi yang seringkali terjadi pada ibu hamil terutama untuk ibu hamil trimester 3.
2. Ibu hamil sebaiknya rutin dalam melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu hamil yang berisiko melahirkan BBLR.

3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan sampel dan lingkup yang lebih luas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bari, Saifuddin. (2016). Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal. Jakarta : Bina Pustaka.
- Alatas, H., 2019, "Hipertensi pada Kehamilan." *Herb-Medicine Journal RSUD Banyumas*.
- Al-Batawy, S. A. (2012). Kedahsyatan Surat Yasin. Jakarta: Kunci Iman.
- Agustin, S., Setiawan, B. D., & Fauzi, M. A. (2018). Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pada Bayi Dengan Metode *Learning Vector Quantization* (LVQ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* E-ISSN, 2548(3), 964X.
- Amiruddin, R. & Dwinata, I., 2020, "Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Usia Produktif di Wilayah Kerja Puskesmas Tamalanrea Jaya Makassar. *Factors Related to the Incidence of Hypertension Productive Age in the Working Area of the Tamalanrea Jaya Public Health Center in Makassar,*" *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1.
- Anonim., 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar, Jakarta.
- Arikah, T., Budi, T., Rahardjo, W. & Widodo, S., 2020, Faktor Risiko Kejadian Hipertensi pada Ibu Hamil di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur Tahun 2019.
- Bili, M.L.B., Liana, D.S. & Buntoro, I.F., 2019, "Hubungan Antara Jarak Kelahiran, Riwayat Hipertensi, dan Riwayat Abortus Pada Ibu Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. W. Z."
- Bili, Maria Lusya Bela, Debora Shinta Liana, and Ika Febianti Buntoro. "Hubungan antara Jarak Kelahiran, Riwayat Hipertensi, dan Riwayat Abortus pada Ibu dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Prof. Dr. WZ Johannes." *Cendana Medical Journal (CMJ)* 7.2 (2019): 260-266.
- Bodnar, L.M., 2017, "Maternal vitamin D deficiency increases the risk of preeclampsia.," *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*.
- Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia. Jakarta. 2020.
- Ediriweera, D.S. & Dilina, N., 2017, "Risk of Low Birth Weight on Adulthood Hypertension-Evidence from a Tertiary Care Hospital in a South Asian Country, Sri Lanka." Elya Sari, W., 2016, Kehamilan dengan Hipertensi Gestasional, vol. 4.
- Faadhillah, A., 2020, Hubungan Preeklamsia dengan Kejadian BBLR di RSUD Kabupaten Tangerang Tahun 2018.
- Finandakasih, F., Addul Rosmah, S. & Arif Tiro, M., 2019, "Model Prediksi Berat Lahir Bayi Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Puskesmas Kaluku Badoa Tahun 2017-2018" vol. 2.
- Gilbert, Jeffrey., 2018, "Pathophysiology of hypertension during preeclampsia: linking placental ischemia with endothelial dysfunction.," *American Journal of Physiology Heart and Circulatory Physiology*.

- Guyton, A.C., 2016, Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Arthur C. Guyton, John E. Hall ed.11., EGC, Jakarta.
- Handayani, Fitri, Herlin Fitriani, and Cahaya Indah Lestari. "Hubungan Umur Ibu dan Paritas dengan Kejadian BBLR di Wilayah Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo." *Midwifery Journal: Jurnal Kebidanan UM. Mataram* 4.2 (2019): 67-70.
- Hartiningrum, I. & Fitriyah, N., 2018. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016.
- Hidayatus & Sri, 2015. Analisis Risiko Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) pada Primigravida, *Media Gizi Indonesia*, Vol. 10, No.1 Januari-Juni 2015: hal.57.
- Irayani F. Analisis Hubungan Anemia Pada Kehamilan dengan Kejadian Abortus di RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah. *J Kesehat.* 2015;VI(2):190- 200. Universitas Nusa Cendana 266.
- Ismayanah, I., Nurfaizah, N. & Syatirah, S., 2020, "Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny. I Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tanggal 23 Juli- 25 Juli 2019" *Jurnal Midwifery*, 2(2).
- Jumhati, Siti, and Dian Novianti. "Analisis Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Rumah Sakit Permata Cibubur-Bekasi." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 7.02 (2018): 113-119.
- Komarudin, M., Maharani, S., & Makiyah, N. (2020). Angka Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah Dan Faktor Risiko Yang Berkaitan Di Rskia Sadewa Sleman. *Metamorfosa: Journal of Biological Sciences*, 7(1), 133.
- Leveno, K., Cunningham, F., Gant, N., Alexander, J., *et all.* 2019, *Obsterti Williams: Panduan Ringkas*. Edisi 21., Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Liswanti, R., Nur, D. & Dananda, A., 2016, *Upaya Pencegahan Hipertensi*, vol. 5.
- Lowdermilk D. *Keperawatan Maternitas*. Elsevier Mosby. Jakarta. 2016.
- Manuaba, I.A.Chandranita., 2014, *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB.*, 2nd edn., EGC, Jakarta.
- Manulang, R.S. & Simanjuntak, F., 2020, "Hubungan Hipertensi dalam Kehamilan Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RS Graha Juanda Tahun 2018", vol. 2.
- Manullang, Riyaen Sari. "Hubungan Hipertensi dalam Kehamilan dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah di RS Graha Juanda Tahun 2018." *Jurnal Ayurveda Medistra* 2.1 (2020): 24-29.
- Manurung, P., 2020, Hubungan Riwayat Komplikasi Saat Hamil dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Indonesia.
- Martaadisoebrata, Djamhoer., 2013, *Ilmu Kesehatan Reproduksi. Obsterti Patologi*. Edisi 3. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Nakimuli, A., Starling, J.E., Nakubulwa, S., *et all.* 2020, "Relative impact of pre-eclampsia on birth weight in a low resource setting: A prospective cohort study," *Pregnancy Hypertension*, 21, 1–6.

- National High Blood Pressure Education Program. *The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Arch Intern Med.* 2003;157:2413-46.
- Nurseha, Annisa Zahara Berlannov. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian BBLR. *Faletehan Health Journal*, 4 (5) (2017) 250 -257, ISSN 2088-673XJ Health.4:250–257. 2017.
- Novitasari, A., Hutami, M.S. & Pristya, T.Y.R., 2020, “Pencegahan dan Pengendalian BBLR di Indonesia”, vol. 2.
- Pantiawati, Ika., 2019, *Bayi dengan BBLR*, Muha Medika., Yogyakarta.
- Pinontoan, Veronica Magdalena, and Sandra GJ Tombokan. "Hubungan umur dan paritas ibu dengan kejadian bayi berat lahir rendah." *3.1* (2016): 20-25.
- Puspitasari, Rani, and Sulistyaningsih Sulistyaningsih. *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan Ibu dengan kejadian bayi berat lahir rendah Di RSUD PKU Muhammadiyah Bantul*. Diss. STIKES'Aisyiyah Yogyakarta, 2016.
- Prawihardjo, Sarwono., 2016, *Ilmu Kebidanan*. Edisi 4., Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.
- Purwanto, A.Dwi. & Wahyuni, C.Umbul., 2016, “Hubungan Antara Umur Kehamilan, Kehamilan Ganda, Hipertensi, dan Anemia Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR),” *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4, 349–359.
- Proverawati A, Ismawati C. *Bayi Berat Lahir Rendah*. Nuha Medika. Yogyakarta. 2016.
- Razy, F. & Hestiyana, N., 2019, *Korelasi Hipertensi Pada Persalinan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD DR. H. Moch Anshari Saleh Banjarmasin*.
- Uken, Theodora. *Hubungan Penyakit Hipertensi Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) Di Indonesia (Analisis Lanjutan Data RISKESDAS 2018)*. Diss. Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- Yanti Linda dan Surtiningsih. *Faktor Karakteristik Ibu Terhadap Berat Bayi Lahir Rendah*. RAKERNAS AIPKEMA Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 2016 [diakses tanggal 29 Juni 2022].
- Yarah, S., 2021, “Hubungan Usia Hamil Beresiko dan Kekurangan Energi Kronik (KEK) dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Celala Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020.”
- Suhardjo, M. (2016) ‘Analisa Indikasi Hipertensi Pada ibi Hamil Di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten’, skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wiknjosastro, Hanifa. *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Jakarta. 2016.

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

1. Nama : Nurul Hudayah
2. NIM : 70600118012
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Bumi Permata Sudiang Blok F2/11A
7. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Venice Irianto, S.si, Apt.
  - b. Ibu : Dr. dr. Nadirah Rasyid Ridha, M.Kes, Sp.A(K)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Inpres Laikang
2. SMP : SMP Negeri 30 Makassar
3. SMA : SMA Negeri 21 Makassar
4. Tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Lampiran

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.289/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : NURUL HUDAYAH  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN  
BBLR DI KOTA MAKASSAR"**

*"THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION IN PREGNANCY WITH THE EVENT OF LBW IN  
MAKASSAR CITY"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.

*This declaration of ethics applies during the period June 29th, 2022 until June 29th, 2023.*

June 29th, 2022  
Professor and Chairperson.

  
DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **3790/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Direktur RSIA Sitti Khadijah 1  
Perihal : **Izin penelitian** Muhammadiyah Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2514/Un.06/FKIK/PP.00.9/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL HUDAYAH**  
Nomor Pokok : 70600118012  
Program Studi : Pendidikan Dokter  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juni s/d 23 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juni 2022


A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19650606 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK (RSIA)  
"SITTI KHADIJAH 1"  
MUHAMMADIYAH CABANG MAKASSAR**  
Jl. R.A. KARTINI 15 - 17 TELP. (0411) 3624554, 3629245, 3627119, 3614661 FAX. 3627119  
MAKASSAR SULAWESI SELATAN 90111 E-Mail : rsia.sitti.khadijah@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 703 /DiklatRS/IV.6.AU/F/1413 /2022

Makassar, 28 Dzulhijjah 1443 H  
28 Juni 2022 M

Lamp :

Hal : Pengambilan Data / **Penelitian**

Kepada Yth,  
Ka. Bidang/Ka. Bagian/Ka. Instalasi/Ka. Ruang  
Rekam Medis  
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan Hormat, Mohon bantuannya untuk memberikan data / informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : Nurul Hidayah  
No. Telp. : 0821 9018 3614  
NIM : 70600118012  
Program Studi : Pendidikan Dokter  
Institusi : UIN Alauddin Makassar  
Judul Penelitian : Hubungan Antara Hipertensi Dalam Kehamilan  
Dengan Kejadian KSBLO Di Kota Makassar Tahun 2021  
Tanggal Penelitian : 28 Juni 2022 s/d 06 Juli 2022

Demikian, kami sampaikan atas bantuannya diucapkan banyak TERIMA KASIH dengan iringan do'a Jazaakumullahu Khairat Jazaa.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.  
Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Tembusan :  
1. Arsip.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **3790/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Direktur RSIA Sitti Khadijah 1  
Perihal : **Izin penelitian** Muhammadiyah Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2514/Un.06/FKIK/PP.00.9/6/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **NURUL HUDAYAH**  
Nomor Pokok : **70600118012**  
Program Studi : **Pendidikan Dokter**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" HUBUNGAN ANTARA HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN BBLR DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Juni s/d 23 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN




**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R