

UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK HASIL PARTISI

RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RIMA AMALIAH

NIM: 70100117064

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Amaliah
NIM : 70100117064
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 01 September 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Kacong Dg. Lalang No. 128 B
Judul : Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik itu sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, 09 Agustus 2022

Penyusun

Rima Amaliah
NIM : 70100117064

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)” yang disusun oleh Rima Amaliah, NIM : 70100117064, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Romangpolong, 09 Agustus 2022
11 Muharam 1444 II

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Surya Ningsi, S. Si., M Si.	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M. Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Mukhriani, S. Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M. Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M. A.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,


Dr. dr. Syatirah Sp. A., M. Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm), dapat diselesaikan dengan baik. terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, do’a dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama melakukan penelitian, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes.,Sp. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Apt. Surya Ningsi. S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Farmasi dan Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M. Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Haeria, S. Si., M. Si. selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Apt. Mukhriani, S.Si., M. Si. Selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberi masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

5. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. selaku Penguji Kompetensi yang senantiasa memberikan kritikan dan saran dalam penyelesaian skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, LC., M. A. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
7. Ibu Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Si., M.Si. selaku Panitia Seminar yang telah sangat berkontribusi dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
8. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
9. Kepada ayah dan ibu yang telah menjadi orang tua terhebat di dunia ini, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang yang tulus serta do'a tak henti-hentinya yang tentunya takkan bisa peneliti balas.
10. Kepada adik peneliti, Reski terimakasih atas segala bantuan serta do'anya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2017, Kovalen yang tak henti-hentinya memberi semangat serta mendukung sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan skripsi ini. Terutama untuk teman-teman yang sudah rela direpotkan oleh peneliti, jangan pernah berhenti berbuat baik dan saling tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan.

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada bidang farmasi. Walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan sarannya untuk membangun kesempurnaan penelitian ini.

Romangpolong, 09 Agustus 2022

Penyusun

Rima Amaliah

NIM : 70100117064



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	10
TINJAUAN TEORITIS	10
A. Uraian Sampel.....	10
1. Klasifikasi Sampel.....	10
2. Deskripsi dan Morfologi Sampel	10
3. Kandungan Sampel.....	11
4. Manfaat Sampel.....	12
B. Metode Preparasi Sampel.....	12
1. Ekstraksi	12
2. Fraksinasi dan Pemurnian	16
C. Antioksidan	19
1. Pengertian Antioksidan	20

2. Jenis antioksidan.....	20
3. Mekanisme kerja antioksidan	22
4. Uji aktivitas antioksidan	22
D. Tinjauan Islam.....	23
BAB III	26
METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
1. Jenis penelitian	28
2. Lokasi penelitian	28
3. Waktu penelitian.....	28
B. Pendekatan penelitian.....	28
C. Sampel.....	28
D. Alat dan Bahan.....	28
1. Alat	28
2. Bahan.....	29
E. Prosedur Kerja.....	29
1. Penyiapan sampel	29
2. Maserasi dan Fraksinasi	29
3. Identifikasi kandungan kimia ekstrak hasil partisi	30
4. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (<i>1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl</i>).....	32
5. Analisis data	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Hasil Ekstraksi.....	35
2. Hasil Skrining Fitokimia	35
3. Hasil Pengukuran Nilai IC ₅₀ Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi Rimpang Lempuyang Gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm).....	36
B. Pembahasan.....	37
BAB V.....	46

PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	50
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil ekstrak partisi rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm)	34
Tabel 2. Hasil skrining fitokimia rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm)	34
Tabel 3. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak fraksi rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm)	35
Tabel 4. Hasil uji aktivitas antioksidan vitamin C	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. (A) Daun, (B) Rimpang, (C) Pembungaan lempuyang gajah	10
Gambar 2. Reaksi antara DPPH dengan antiradikal bebas	42
Gambar 3. Kurva standar ekstrak fraksi metanol	57
Gambar 4. Kurva standar ekstrak fraksi N-heksan	58
Gambar 5. Kurva standar ekstrak fraksi etil asetat	58
Gambar 6. Kurva standar ekstrak fraksi aquadest	59
Gambar 7. Kurva standar vitamin C	60
Gambar 8. Sampel rimpang lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm)	61
Gambar 9. Ekstraksi sampel dengan metode maserasi	61
Gambar 10. Proses evaporasi dengan menggunakan alat <i>rotary evaporator</i>	62
Gambar 11. Fraksinasi ekstrak metanol dan N-heksan	62
Gambar 12. Fraksinasi ekstrak aquadest dan etil asetat	63
Gambar 13. Hasil skrining fitokimia	64
Gambar 14. Analisis aktivitas antioksidan pada ekstrak dan vitamin C	65
Gambar 15. Proses analisis sampel uji dengan Spektrofotometer UV-Vis	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan alur penelitian	48
Lampiran 2. Identifikasi kandungan kimia	49
Lampiran 3. Uji aktivitas antioksidan	49
Lampiran 4. Pembuatan larutan	50
Lampiran 5. Perhitungan rendamen ekstrak	54
Lampiran 6. Perhitungan persen inhibisi	54
Lampiran 7. Perhitungan nilai IC_{50}	57
Lampiran 8. Gambar penelitian	61



ABSTRAK

Nama : RIMA AMALIAH
NIM : 70100117064
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : UJI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN EKSTRAK HASIL PARTISI RIMPANG LEMPUYANG GAJAH (*ZINGIBER ZERUMBET* (L). ROSCOE EX SM)

Penelitian ini berjudul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Hasil Partisi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm)” merupakan penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dan menentukan nilai IC50 dari ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) terhadap radikal bebas DPPH. Pada penentuan aktivitas antioksidan dengan menggunakan larutan DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) serta diukur absorbansinya pada panjang gelombang 515 nm. Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH yang ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak fraksi N-heksan memiliki nilai IC50 (77,780 ppm) dan ekstrak fraksi etil asetat dengan nilai IC50 (69,476 ppm) memiliki aktivitas antioksidan ekstrak kuat, tetapi tidak lebih dari kontrol positif vitamin C yaitu (7,79 ppm), pada ekstrak fraksi metanol dengan nilai IC50 (100,956 ppm) yang dimana memiliki aktivitas antioksidan ekstrak sedang, sedangkan pada ekstrak fraksi aquadest dengan nilai (474,003 ppm) memiliki aktivitas antioksidan ekstrak lemah.

Kata Kunci : DPPH, antioksidan, spektrofotometer UV-Vis, *Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm.

ABSTRACT

Name : RIMA AMALIAH
NIM : 70100117064
Department : PHARMACY
Title : TEST OF ANTIOXIDANT ACTIVITY EXTRACT PARTITION
OF LEMPUYANG GAJAH (*ZINGIBER ZERUMBET* (L).
ROSCOE EX SM)

This study entitled "Antioxidant Activity of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Roscoe ex Sm) rhizome partitioned extract" is a study conducted with the aim of knowing the antioxidant activity and determining the IC50 value of the extract of the lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) rhizome partitioned extract.) Roscoe ex Sm) against DPPH free radicals. In determining the antioxidant activity using DPPH solution (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) and the absorbance was measured at a wavelength of 515 nm. Measurement of antioxidant capacity using the DPPH method which is characterized by a color change after incubation. The incubation process was carried out for 30 minutes, which aims to accelerate the reaction between DPPH and the sample which acts as an antioxidant. The results of this study indicate that the N-hexane fraction extract has an IC50 value (77.780 ppm) and the ethyl acetate fraction extract with an IC50 value (69.476 ppm) has a strong antioxidant activity, but not more than a positive control of vitamin C (7.79 ppm). , the methanol fraction extract with IC50 value (100.956 ppm) which has moderate extract antioxidant activity, while the aquadest fraction extract with a value (474.003 ppm) has weak extract antioxidant activity.

Keywords : *DPPH, antioxidant, Spectrophotometer UV-Vis, Zingiber zerumbet (L). Roscoe ex SM*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stres oksidatif merupakan kondisi radikal bebas atau suatu zat yang dapat mempercepat proses oksidasi dibandingkan dengan antioksidan dimana akan terjadi ketidakseimbangan terhadap jumlah oksidan yang terdapat di dalam sel. Hal tersebut dipicu karena kurangnya antioksidan serta kelebihan produksi radikal bebas (Santoso, 2020).

Secara umum disfungsi jantung, apoptosis, penyakit kardiovaskular dan nekrosis jantung dapat diakibatkan oleh radikal bebas atau reaktif oksigen spesies (ROS) dan hiperlipidemia. Di dalam sistem kardiovaskular, ROS dapat menyebabkan hipertrofi pada sel otot polos serta dinding arteri, apoptosis, kerusakan miokard dan kerusakan sel kardiomyosit (Santoso, 2020).

Reaktif oksigen spesies (ROS) yaitu radikal bebas turunan oksigen yang bersumber dari endogen dan eksogen tubuh. Reaktif oksigen spesies yang berupa hidroksi radikal merupakan radikal reaktif yang terdiri dari reaksi foton yang dikatalisis oleh ion Fe. Ketidakseimbangan terhadap reaktif oksigen spesies dan antioksidan dapat menimbulkan stres oksidatif yang berpengaruh terhadap patogenesis kanker, diabetes dan penyakit kardiovaskular. Salah satu hal yang dapat mencegah terjadinya kerusakan oksidatif akibat reaktif oksigen spesies yaitu dengan menggunakan antioksidan (Sunarto, dkk., 2020).

Keseimbangan antara oksidan dan antioksidan sangat penting. Hal tersebut yang berhubungan langsung dengan fungsi imunitas tubuh. Senyawa asam lemak tak jenuh adalah komponen terbesar yang menyusun membran sel, yang diketahui sangat sensitif terhadap perubahan keseimbangan antara oksidan dan antioksidan.

Berdasarkan sumbernya, antioksidan dapat dibedakan menjadi dua yaitu antioksidan sintesis dan antioksidan alami (Dwimayasanti, 2018).

Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menetralkan kereaktifan radikal bebas. Ada beberapa senyawa sintesis eksogen yang bisa digunakan sebagai antioksidan yaitu vitamin E dan BHA. Namun, penggunaan antioksidan sintetis ditemukan adanya efek toksik yang dapat ditimbulkan apabila penggunaan dosis yang kurang tepat (Wandita, dkk., 2018).

Radikal bebas merupakan molekul yang memiliki sekelompok atom ataupun elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berperan dalam proses biologis yang sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan peroksidan ROS dan *Reactive nitrogen species* (RNS) (Berawi, dkk., 2017).

Beberapa antioksidan yang alami dapat dijumpai pada tanaman antara lain yaitu golongan polifenol, vitamin E, vitamin C, flavonoid dan beta karoten (Vifta, dkk., 2019). Kemudian beberapa contoh antioksidan sintetis antara lain yaitu senyawa fenolik seperti *Terbutilasi hidroksi-toluena* (BHT), *Gallate propil* (PG), *Utylated hydroxynisol* (BHA) dan *Butyl hydroquinone tersier* (TBHQ) (Sayuti, dkk., 2015)

Antioksidan merupakan spesi yang dapat menangkal atau meredam radikal bebas dan mencegah timbulnya kerusakan sel yang disebabkan oleh radikal bebas yaitu dengan cara menyumbangkan satu atau beberapa elektron kepada radikal bebas, sehingga menyebabkan terbentuknya spesi yang baru dengan sifat yang kurang reaktif (Vifta, dkk., 2019).

Tumbuhan yang memiliki sifat obat sudah banyak ditemukan yang mengandung berbagai macam metabolit sekunder yang ada sebagai antioksidan. Kemampuan antioksidan berpengaruh dengan senyawa yang dapat melindungi sistem biologis terhadap berbagai macam potensi efek dari reaksi radikal bebas

termasuk spesi oksigen reaktif. Terdapat berbagai macam senyawa yang terkandung dalam spesies zingiberaceae yang berupa flavonoid dan terpenoid yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Wandita, dkk., 2018).

Zingiberaceae merupakan salah satu famili dari kelas liliopsida yang sering digunakan sebagai obat. Famili zingiberaceae memiliki tiga suku yaitu zingiberaceae, hedychieae dan alpinieae. Bagi masyarakat Indonesia zingiberaceae memiliki berbagai macam manfaat yaitu sebagai obat tradisional, tanaman hias maupun sebagai bumbu masakan (Silalahi, 2018).

Zingiber merupakan genus tunggal pada suku zingiberaceae, serta memiliki berbagai macam spesies. Lempuyang merupakan salah satu spesies dari zingiber yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional yaitu sebagai bahan baku pada jamu. Lempuyang juga dikenal dengan julukan sebagai *mild gingers* yang dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), lempuyang wangi (*Zingiber aromaticum*) dan lempuyang pahit/emprit (*Zingiber americans*) (Silalahi, 2018).

Terdapat berbagai macam kandungan pada tanaman lempuyang gajah yaitu minyak atisiri yang tersusun dari kurkumin, bisabolen, zingiberen, kariofilen, seskuifelandren, zerumbon, limonene dan kamfer. Zat pedas gingerol, sogaol, zingeron, paradol, heksahidrokurkumin, dihidrogingerol, damar, tanin, resin pati dan juga gula (Wahyuni, 2016).

Pengujian antioksidan pada tanaman dan bahan pangan pada umumnya dapat menggunakan metode 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH), *Ferric reducing antioxidant power* (FRAP), *Ferrous ion chelating* (FIC) dan yang berbasis lemak misalnya TBA. Metode uji aktivitas antioksidan terhadap radikal bebas yang paling efektif dan efisien yaitu metode DPPH (Maesaroh, dkk., 2018). Aktivitas antioksidan dilakukan dengan cara menghitung adanya penurunan intensitas cahaya

ungu pada DPPH yang berbanding dengan pengurangan konsentrasi DPPH. Aktivitas antioksidan dapat dilihat dari persentase penghambatan radikal bebas DPPH serta nilai IC_{50} . Apabila nilai IC_{50} semakin kecil, maka semakin tinggi pula aktivitas antioksidannya (Indra, dkk., 2019)

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian uji aktivitas antioksidan dari ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) dengan menggunakan metode DPPH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Berapa nilai IC_{50} ekstrak hasil partisi rimpang *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm sebagai antioksidan?
2. Bagaimana kategori antioksidan dari ekstrak hasil partisi rimpang *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Ekstraksi merupakan peristiwa pemindahan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel ditarik oleh pelarut sehingga terjadi larutan zat aktif dalam pelarut tersebut.
 - b. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai.
 - c. Antioksidan adalah bahan yang menghambat atau mencegah keruntuhan, kerusakan atau kehancuran akibat oksidasi.
 - d. DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*) merupakan senyawa radikal bebas yang stabil sehingga apabila digunakan sebagai pereaksi dalam uji

penangkapan radikal bebas cukup dilarutkan dan bila disimpan dalam keadaan kering dengan penyimpanan yang baik dan stabil selama bertahun-tahun.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah serta pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tristantini, dkk., 2016) dengan judul “Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH Pada Daun Tanjung (*Mimusops Elengi* L)”, menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi aktivitas antioksidan pada daun tanjung. Daun tanjung banyak dibudidayakan di India terkhususnya di Sri Lanka dan Burma yang biasanya digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Kandungan utama ekstrak etanol daun tanjung yang memiliki aktivitas antioksidan adalah *quarceetin*, *henriacontane* dan β -karoten yang merupakan sumber alami antioksidan. Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode refluks dengan menggunakan variasi waktu ekstraksi 15 menit, 30 menit, 40 menit, 60 menit dan 75 menit. Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan dengan metode DPPH. Dimana hasilnya menunjukkan ekstrak etanol pada ekstraksi waktu variasi 45 menit memiliki aktivitas antioksidan tertinggi, dengan nilai IC_{50} adalah 10,6 μ g/ml.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Zuliani, dkk., 2019) dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan (Metode DPPH) Ekstrak Metanol Dan Fraksi-Fraksinya Dari Daun Rumput KNOP (*Hyptis Capitata* Jcqc)”, menyatakan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dalam fraksi yang dari pemisah kromatografi kolom. Pengukuran antioksidan dilakukan dengan metode DPPH, sementara uji fitokimia dilakukan dengan uji warna dengan

metode TLC. Hasil pada kolom pertama pada kromatografi kolom menghasilkan 18 pecahan. Sedangkan untuk hasil tes aktivitas antioksidan pada kolom pertama menunjukkan bahwa nilai aktivitas antioksidan berkisar antara 0,923-81,849 % pada konsentrasi sampel 100 ppm. Kemudian pada kolom kedua kromatografi kolom menghasilkan 16 pecahan. Sedangkan pada kolom kedua aktiitas antioksidan berkisar antara 10,384-59,769 % pada konsentrasi sampel 50 ppm. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada fraksi 15 dan fraksi 16 secara berturut-turut memiliki tingkat aktivitas antioksidan dengan nilai IC_{50} 40,321 ppm berpotensi sangat kuat dan 56,812 ppm berpotensi kuat sebagai antioksidan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, dkk., 2014) dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga Dan Daun Patikala (*Etilingera elatior* (Jack) R.M.Sm) Menggunakan Metode DPPH”, menyatakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur aktivitas radikal bebas dalam ekstrak metanol bunga dan daun patikala. Ekstraksi bunga dan daun menggunakan metode maserasi yaitu menggunakan metanol. Analisis kualitatif senyawa kimia dengan eluen tertentu dengan menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) untuk menentukan kelompok senyawa aktif dalam ekstrak. Uji aktivitas antioksidan menggunakan metode perendaman DPPH yang diukur serapan pada panjang gelombang 517 nm dan dibandingkan dengan kekuatan quarsetin antioksidan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak metanol di 1,935 % untuk bunga dan 5,17% untuk daun. Aktivitas antioksidan ekstrak metanol bunda patikala memiliki aktivitas antioksidan yang rendah dengan nilai IC_{50} 101,84 $\mu\text{g/ml}$ dan metanol ekstrak daun patikala memiliki aktivitas antioksidan yang dibuat dengan nilai IC_{50} 30,65 $\mu\text{g/ml}$. Potensi ini lebih rendah dari nilai IC_{50} quarsetin dari 5,35 $\mu\text{g/ml}$.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Purwanto, dkk., 2017) dengan judul “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Pumajiwa (*Kopsia arborea Blume*) Dengan Berbagai Pelarut”, menyatakan penelitian ini bertujuan untuk menentukan kelompok senyawa dan aktivitas antioksidannya. Uji kelompok senyawa dan aktivitas dilakukan dengan metode fitokimia. Hasil uji menunjukkan bahwa dalam ekstrak buah pumajiwa terdapat senyawa metabolit sekunder dari jenis senyawa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan steroid. Uji aktivitas antioksidan dilakukan dengan menggunakan metode DPPH dan besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC_{50} . Aktivitas antioksidan (IC_{50}) berdasarkan tiga jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak yaitu n-heksan, etil asetat dan etanol masing-masing adalah 3524,05 ppm, 316,09 ppm dan 154,89 ppm.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Podungge, dkk., 2017) dengan judul “Isolasi Dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid Dari Daun Miana (*Coleus scutelleriodes Benth*)”, menyatakan penelitian ini dilakukan untuk mengisolasi senyawa flavonoid dari daun miana dan menguji aktivitas antioksidannya. Dimana daun miana diekstraksi dengan pelarut metanol lalu difraksinasi dengan n-heksan dan etil asetat serta diisolasi senyawa flavonoidnya. Kemudian hasil uji fitokimia positif mengandung flavonoid pada berbagai ekstrak dan isolat kecuali ekstrak n-heksan. Hasil dari analisis inframerah menunjukkan adanya pita serapan yang memiliki beberapa gugus fungsi seperti OH, C=C aromatik, C-H aromatik dan C-H alifatik yang diduga merupakan senyawa golongan flavonoid. Hasil pengukuran total fenol diperoleh sebesar 44,38 mg/g GAE (*Gallic Acid Equivalent*). Hasil uji aktivitas antioksidan pada isolat dengan menggunakan metode DPPH diperoleh nilai aktivitas antioksidan sebesar 98,53 mg AEAC/g dan IC_{50} sebesar 324,80 ppm.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, dkk., 2019) dengan judul “Isolasi senyawa antioksidan ekstrak metanol kulit buah naga merah (*Hylocereus polyrhizus*), menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa antioksidan yang terdapat dalam ekstrak metanol kulit buah naga merah yang aktif sebagai antioksidan. Ekstrak kulit buah naga merah yang diperoleh melalui simplisia kulit segar buah naga merah dengan pelarut metanol. Kemudian ekstrak metanol yang diperoleh dipartisi dengan metode cair-cair menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat dan air. Hasil dari partisi yaitu pada fraksi n-heksan kemudian dilakukan rekristalisasi selanjutnya dilakukan isolasi menggunakan KLTP. Berdasarkan dari hasil KLTP fraksi n-heksan diperoleh 8 pita tetapi hanya pita 6 (isolat 1) dan 8 (isolat 11) yang aktif sebagai antioksidan setelah dilakukan penyemprotan DPPH. Kemudian untuk hasil spektroskopi UV-Vis pada isolat 11 diduga merupakan senyawa flavonoid. Uji aktivitas antioksidan diketahui bahwa ekstrak metanol, fraksi etil asetat, fraksi n-heksan dari kulit buah naga merah yaitu memiliki potensi aktivitas antioksidan yang kurang aktif, sedangkan pada fraksi air tidak aktif sebagai antioksidan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mutiara, dkk., 2016) dengan judul “Isolasi dan uji aktivitas antioksidan senyawa metabolit sekunder ekstrak metanol kulit buah mangrove pidada (*Sonneratia caseolaris*)”, menyatakan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa metabolit sekunder dari ekstrak metanol kulit buah mangrove pidada serta mengetahui besar aktivitas antioksidannya. Penelitian ini melalui beberapa tahap yaitu maserasi dengan menggunakan pelarut metanol, fraksinasi, pemurnian, identifikasi dan pengukuran besarnya aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH. Kemudian diperoleh senyawa yaitu kristal putih yang berbentuk serbuk dan positif alkaloid pada pereaksi mayer dan spektrum FTIR. Besar aktivitas antioksidan pada ekstrak

yaitu 56,087 ppm. Pada isolat yaitu 52,926 ppm dan pada vitamin C yaitu 18,805 ppm.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni :

- a. Untuk menentukan nilai IC_{50} dari ekstrak hasil partisi rimpang *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm terhadap radikal bebas DPPH.
- b. Untuk mengetahui kategori aktivitas antioksidan dari ekstrak hasil partisi rimpang *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti serta menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi tanaman lempuyang gajah sebagai obat tradisional terkhususnya antioksidan atau radikal bebas, serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

BAB II


TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Sampel

1. Klasifikasi Sampel

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: Zingiber
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm.

(Lianah, 2019)



Gambar 1. (A) Daun , (B) Rimpang , (C) Pembungaan Lempuyang Gajah
(Silalahi, 2018)

2. Deskripsi dan Morfologi Sampel

Lempuyang gajah merupakan herba yang bisa tumbuh tinggi, batas asli berupa rimpang dibawah tanah, dengan tinggi lebih dari 1 m. Batang semu berupa

kumpulan pelepah berseling, diatas tanah. Beberapa batang berkoloni dan berwarna hijau, serta rimpang tumbuh merayap dan bersifat aromatik. Daun tunggal berpelepah, duduk berseling, pelepah membentuk lanset sempit, berambut dipermukaan atas. Susunan bunga majemuk bulir, berbentuk bola atau memanjang, muncul diatas tanah, tegak, berambut halus, samping ujung agak membulat melebar dan daun palindung dengan dengan ujung datar. Mahkota berwarna kuning terang, sedangkan tangkai putik bercabang dua bebas. Buah bulat berbentuk telur terbalik, merah. Biji bulat dengan bentuk bola memanjang (Agromedia Redaksi, 2008).

3. Kandungan Sampel

Rimpang lempuyang mengandung senyawa seperti alkaloid, saponin, minyak atsiri, polifenol dan zerumbone. Berbagai kandungan kimia tersebut memiliki efek farmakologis sebagai pencahar, pencegah kehamilan, pengobatan pasca persalinan, pereda kejang serta mengurangi rasa nyeri. Selain itu rimpang lempuyang gajah berkhasiat sebagai obat gatal, obat borok, disentri, sesak nafas dan obat caceng (Nurhafidhah, dkk., 2020).

Zerumbone merupakan senyawa sesquiterpen monosiklik yang memiliki aktivitas antikanker. Senyawa ini dapat ditemukan banyak pada rimpang-rimpangan, terutama di rimpang lempuyang gajah dan lempuyang wangi (Nurhafidhah, dkk., 2020).

Kurkumin dan suatu zat warna kuning. Serta ditemukan pula 3,4-diaastilarzelin (mempunyai efek sitotoksik), sineol, dipenten, limonen, kariofilen, arkurkumen, kadinen, kariofilenoksid, humulenepoksid I, II dan III,-humulenol I, II, heksahidrohumulenol II, heksahidro humulenon, zerumbonoksid, kamfen dan humulen (Agromedia Redaksi, 2008).

4. Manfaat Sampel

Lempuyang gajah digunakan sebagai tanaman obat tradisional sejak zaman dahulu oleh negara India, Cina dan Jepang. Tanaman ini dipercaya dapat digunakan sebagai obat anoreksia, dyspepsia dan mengurangi terjadinya peradangan. Lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai obat sefalalgia, asma, batuk, kolik, diare, perut kembung, mual dan muntah. Studi farmakologi menunjukkan manfaat lempuyang gajah mencegah nausea dan muntah-muntah saat kemoterapi, kehamilan, perjalanan jauh atau mabuk laut. Aktivitas lempuyang gajah sebagai antiplatelet, hipolipodemik dan efek ansiolitik digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit seperti demam atau gangguan pada sistem pencernaan (Fatmawati, 2019).

Senyawa kimia yang ditemukan dalam lempuyang gajah adalah terpena dan polifenol. Turunan senyawa tersebut seperti zerumbon atau seskuiterpena merupakan senyawa bioaktif yang ditemukan pada lempuyang gajah yang kemudian dipelajari lebih lanjut sifat obatnya. Hasil ekstrak dan isolasi metabolit dari lempuyang gajah telah menunjukkan beberapa sifat yang mendukung seperti : antiradang, antidiabetes, antikanker, analgesik, antivirus dan antimikroba (Fatmawati, 2019).

B. Metode Preparasi Sampel

1. Ekstraksi

Salah satu cara sehingga mendapatkan manfaat dari suatu kandungan bahan alam adalah dengan mengambil sari ataupun memisahkan kandungan senyawa aktif yang terkandung didalam suatu tanaman. Cara yang sangat sering digunakan untuk mendapatkan sari atau kandungan senyawa aktif dari suatu tanaman biasanya dapat dilakukan dengan cara teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi suatu senyawa aktif bahan alam yang biasanya digunakan anatara lain yaitu

maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokhletasi. Kemudian ekstrak yang dihasilkan dapat dipisahkan lagi menjadi fraksi-fraksinya dengan menggunakan metode kromatografi. Metode kromatografi yang pada umumnya sering digunakan adalah Kromatografi lapis tipis, Kromatografi kolom vakum, Kromatografi kolom gravitasi dan kromatotron (Sudarwati, dkk., 2019).

Secara umum metode ekstraksi dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya proses pemanasan. Dimana pemanasan ini sangat berpengaruh terhadap efektifitas dalam suatu proses ekstraksi yang bergantung pada senyawa target yang diharapkan setelah proses ekstraksi. Berikut adalah jenis-jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan yaitu:

a. Ekstraksi Cara Dingin

Metode cara dingin tidak memerlukan proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung, tujuannya yaitu untuk menghindari rusaknya suatu senyawa yang disebabkan karena adanya pemanasan. Jenis ekstraksi dingin terbagi menjadi 2 yaitu maserasi dan perkolasi (Sudarwati, dkk., 2019).

1) Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Kemudian cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, selanjutnya zat aktif akan larut. Dengan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Sudarwati, dkk., 2019).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah proses penyarian simplisia dengan jalan melewati pelarut yang sesuai secara lambat pada simplisia dalam suatu perkolator. Perkolasi bertujuan agar zat berkhasiat tertarik seluruhnya dan biasanya dapat dilakukan untuk zat berkhasiat yang tahan ataupun tidak tahan pemanasan. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Dan akan bergerak kebawah yang disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain yaitu gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran (Sudarwati, dkk., 2019).

b. Ekstraksi Cara Panas

Metode cara panas melibatkan proses pemanasan. Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Metodenya yaitu refluks, ekstraksi dengan alat soxhlet dan infusa (Sudarwati, dkk, 2019).

1) Reflux

Reflux merupakan salah satu metode sintesis senyawa anorganik, metode tersebut digunakan apabila pada sintesis tersebut menggunakan pelarut yang volatil. Pada kondisi tersebut jika dilakukan pemanasan biasa maka pelarut akan menguap sebelum reaksi berjalan sampai selesai. Prinsip dari metode refluks yaitu pelarut volatil yang digunakan akan menguap pada suhu tinggi, namun akan didinginkan dengan kondensor sehingga pelarut yang dalam bentuk uap akan mengembun pada kondensor dan turun lagi ke dalam wadah reaksi sehingga pelarut akan tetap ada selama reaksi berlangsung. Sedangkan aliran gas N_2

diberikan agar tidak ada uap air atau gas oksigen yang masuk terutama pada senyawa organologam untuk sintesis senyawa anorganik karena sifatnya yang reaktif (Sudarwati, dkk., 2019).

2) Soxhlet

Sokletasi merupakan suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Sokletasi digunakan pada pelarut organik tertentu. Dengan cara pemanasan, sehingga uap yang timbul setelah dingin secara kontinyu akan membasahi sampel, secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa senyawa kimia yang akan diisolasi tersebut. Pelarut yang telah membawa senyawa kimia pada labu distilasi yang diuapkan dengan rotary evaporator sehingga pelarut tersebut dapat diangkat lagi bila suatu campuran organik berbentuk cair atau padat ditemui pada suatu zat padat, maka dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut yang diinginkan (Sudarwati, dkk., 2019).

3) Infusa

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90°C selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml. Cara yang biasa dilakukan adalah serbuk bahan dipanaskan dalam panci dengan air secukupnya selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C sambil sekali-sekali diaduk. Saring selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume yang diinginkan. Apabila bahan mengandung minyak atsiri, penyaringan dilakukan setelah dingin (Sudarwati, dkk., 2019).

2. Fraksinasi dan Pemurnian

Fraksinasi pada prinsipnya adalah proses penarikan senyawa pada suatu ekstrak dengan menggunakan dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Pelarut yang umumnya dipakai untuk fraksinasi adalah n-heksan, etil asetat, dan metanol. Untuk menarik lemak dan senyawa non polar digunakan n-heksan, etil asetat untuk menarik senyawa semi polar, sedangkan metanol untuk menarik senyawa-senyawa polar. Dari proses ini dapat diduga sifat kepolaran dari senyawa yang akan dipisahkan. Sebagaimana diketahui bahwa senyawa-senyawa yang bersifat non polar akan larut dalam pelarut yang non polar sedangkan senyawa-senyawa yang bersifat polar akan larut dalam pelarut yang bersifat polar juga (Sudarwati, dkk., 2019).

Metode yang umum digunakan untuk memisahkan komponen-komponen senyawa yaitu metode kromatografi. Untuk tujuan kualitatif dapat digunakan kromatografi lapis tipis (KLT) sedangkan untuk pemisahan senyawa dalam jumlah besar dapat digunakan kromatografi kolom (Sudarwati, dkk., 2019).

Pemisahan hasil ekstraksi tumbuhan terutama dilakukan dengan salah satu atau gabungan dari beberapa teknik kromatografi. Pemilihan teknik kromatografi sebagian besar bergantung pada sifat kelarutan dan keatsirian senyawa-senyawa yang akan dipisahkan (Endarini, 2016).

a. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)

Fenomena yang terjadi pada KLT adalah berdasar pada prinsip adsorpsi. Setelah sampel ditotolkan di atas fasa diam, senyawa-senyawa dalam sampel akan terelusi dengan kecepatan yang sangat bergantung pada sifat senyawa-senyawa tersebut (kemampuan terikat pada fasa diam dan kemampuan larut dalam fasa gerak), sifat fasa diam (kekuatan elektrostatis yang menarik senyawa di atas fasa diam) dan sifat fasa gerak (kemampuan melarutkan senyawa). Pada KLT, secara

umum senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran rendah akan terelusi lebih cepat daripada senyawa-senyawa yang memiliki kepolaran rendah akan terelusi lebih cepat daripada senyawa-senyawa polar karena senyawa polar terikat lebih kuat pada bahan silika yang mengandung silanol (SiOH_2) yang pada dasarnya memiliki afinitas yang kuat terhadap senyawa polar (Endarini, 2016).

Karena prosesnya yang mudah dan cepat, KLT banyak digunakan untuk melihat kemurnian suatu senyawa organik. Jika analisis dilakukan dengan mengubah pelarut beberapa kali (minimum 3 macam) dan hasil elusi tetap menampilkan satu noda maka dapat dikatakan bahwa sampel yang ditotolkan adalah murni. Selain itu, karena KLT juga dapat menampilkan jumlah senyawa-senyawa dalam campuran sampel (menurut noda yang muncul), maka KLT dapat digunakan untuk mengikuti atau mengontrol jalannya reaksi organik maupun untuk mengontrol proses pemisahan campuran yang dilakukan menggunakan kromatografi kolom. KLT juga merupakan suatu cara yang umum dilakukan untuk memilih pelarut yang sesuai sebelum dilakukan pemisahan menggunakan kromatografi kolom. Jadi, secara ringkas KLT terutama berguna untuk tujuan mencari pelarut yang sesuai untuk kromatografi kolom, analisis fraksi-fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, memonitor jalannya suatu reaksi kimia, identifikasi senyawa (uji kemurnian) (Endarini, 2016).

b. Kromatografi Lapis Tipis Preparatif (KLTP)

KLTP merupakan salah satu metode pemisahan yang memerlukan pembiayaan paling murah dan memakai peralatan paling dasar. Walaupun KLTP dapat memisahkan bahan dalam jumlah gram, sebagian besar pemakaian hanya dalam jumlah miligram. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketebalan plat yang sering dipakai adalah 0,5-2 mm. ukuran plat biasanya 20 x 20 cm atau 20 x 40 cm. Untuk jumlah sampel 10-100 mg, dapat

dipisahkan menggunakan KLTP dengan adsorben silika gel atau aluminium oksida dengan ukuran 20 x 20 cm dan tebal 1 mm. jika tebalnya diduakalikan, maka banyaknya sampel yang dapat dipisahkan bertambah 50%. Seperti halnya KLT biasa, adsorben yang paling umum pada KLTP adalah silika gel (Endarini, 2016).

Plat KLT dapat dibuat sendiri atau dibeli dengan plat sudah terlapis adsorben. Keuntungan membuat plat sendiri adalah bahwa ketebalan dan susunan lapisan dapat diatur sesuai kebutuhan (misalnya dengan menambahkan AgNO_3 atau buffer). Petunjuk untuk pembuatan plat KLTP biasanya terdapat pada kemasan adsorben yang akan dipakai. Sebelum ditotolkan pada plat KLTP, sampel dilarutkan terlebih dahulu dalam sedikit pelarut. Pelarut yang baik adalah pelarut yang mudah menguap (n-heksana, diklorometana atau etil asetat) karena jika pelarut yang digunakan tidak mudah menguap, maka akan terjadi pelebaran pita. Konsentrasi sampel juga sebaiknya hanya 5-10%. Sampel yang ditotolkan harus berbentuk pita yang sesempit mungkin karena baik tidaknya pemisahan juga bergantung pada lebarnya pita. Penotolan dapat dilakukan dengan tangan menggunakan pipa kapiler, dapat juga menggunakan alat penotol otomatis. Untuk pita yang terlanjur terbentuk terlalu lebar dapat dilakukan perbaikan dengan mengelusi plat menggunakan eluen/larutan polar sampai kira-kira 2 cm di atas tempat penotolan, dikeringkan, kemudian elusi dilanjutkan dengan menggunakan pelarut yang diinginkan (Endarini, 2016).

c. Kromatografi sentrifugal

Pada prinsipnya kromatografi sentrifugal adalah kromatografi klasik dengan aliran fasa gerak yang dipercepat oleh gaya sentrifugal. Contoh alat kromatografi ini yang sering dipakai adalah kromatotron. Perbedaan besar antara kromatotron dengan KLT sentrifugal lainnya adalah bahwa pada rotornya tidak

mendatar tetapi miring. Bagian utama dari alat ini adalah plat kaca bundar bergaris tengah 24 cm yang dilapisi dengan adsorben yang cocok sehingga terbentuk lapisan tipis untuk pemisahan preparatif (Endarini, 2016).

d. Kromatografi kolom

Kromatografi kolom juga merupakan suatu metode pemisahan preparatif. Metode ini memungkinkan untuk melakukan pemisahan suatu sampel yang berupa campuran dengan berat beberapa gram. Kelemahan metode ini adalah diperlukan eluen yang cukup besar, waktu elusi untuk dapat menyelesaikan pemisahan sangat lama, deteksi hasil pemisahan tidak dapat langsung dilakukan (masih memerlukan KLT). Pada prinsipnya kromatografi kolom adalah suatu teknik pemisahan yang didasarkan pada peristiwa adsorpsi. Sampel yang biasanya berupa larutan pekat diletakkan pada ujung atas kolom. Eluen atau pelarut dialirkan secara kontinu ke dalam kolom. Dengan adanya gravitasi atau karena bantuan tekanan, maka eluen/pelarut akan melewati kolom dan proses pemisahan akan terjadi. Seperti pada umumnya, eluen/pelarut akan digunakan dimulai dari yang paling non polar dan dinaikkan secara gradien kepolarannya hingga pemisahan dapat terjadi. Sama halnya pada KLT, pemisahan dapat terjadi karena adanya perbedaan afinitas senyawa pada adsorben dan perbedaan kelarutan senyawa pada eluen/pelarut (Endarini, 2016).

C. Antioksidan

Secara biokimia, oksidasi merupakan suatu proses pelepasan elektron dari suatu senyawa. Senyawa yang dapat menarik atau menerima elektron disebut oksidan atau oksidator. Dalam ilmu kimia, pengertian oksidan adalah senyawa penerima elektron yaitu senyawa penarik elektron misalnya ion ferri (Fe^{2+}) (Irianti, dkk., 2017).

1. Pengertian Antioksidan

Sumber antioksidan alami sangat banyak dijumpai dalam bahan pangan misalnya rempah-rempah, buah-buahan, coklat, teh, biji-bijian, dedaunan, sayur-sayuran, protein dan enzim. Secara umum aktivitas antioksidan disebabkan oleh tumbuhan tersebut yang mengandung senyawa metabolit sekunder yang diantaranya adalah fenolik, antosianin, tanin, flavonoid (Rahmi, 2017).

Antioksidan merupakan suatu inhibitor yang dapat digunakan untuk menghambat autooksidasi. Inhibitor radikal bebas bekerja dengan menghambat suatu radikal bebas tak reaktif dan relatif stabil (Haeria, dkk. 2016)

Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan karena beberapa faktor yaitu debu, asap, polusi, kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan cepat saji yang tidak seimbang antara protein, karbohidrat dan lemaknya. Senyawa antioksidan akan mendonorkan satu elektron kepada radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas tersebut dapat menjadi netral kembali dan tidak lagi mengganggu metabolisme tubuh (Rahmi, 2017).

2. Jenis antioksidan

Antioksidan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik.

a. Antioksidan alami

Secara alami beberapa jenis tumbuhan merupakan sumber antioksidan, yang dapat ditemukan pada beberapa jenis sayuran, buah-buahan segar, beberapa jenis tumbuhan dan rempah-rempah. Antioksidan alami dapat diisolasi dari bahan alam. Antioksidan ini memiliki bobot molekul sekitar 200–400. Semua antioksidan alami mudah diserap oleh usus dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Fungsi dari antioksidan alami yaitu sebagai reduktor, peredam pembentukan oksigen singlet, penangkap radikal bebas dan pengkhelat logam. Antioksidan

alami dapat digolongkan menjadi enzim dan vitamin. Antioksidan berupa enzim yang dihasilkan oleh tubuh berupa *superoxide dismutase* (SOD), *glutathion peroxidase*, dan katalase. Sedangkan antioksidan vitamin umumnya seperti beta karoten (vitamin A), alfatokoferol (vitamin E) dan asam askorbat (vitamin C). Antioksidan dari tumbuhan adalah senyawa polifenol atau fenolik, golongan flavonoid, turunan asam sinamat, kumarin, tokoferol dan asam organik (Irianti, dkk., 2017)

b. Antioksidan sintetik

Senyawa antioksidan sintetik memiliki fungsi menangkap radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. Yang merupakan contoh antioksidan sintetik di antaranya *Butylated hydroxyl anisole* (BHA), *Butylated hydroxytoluene* (BHT), *Propyl gallate* (PG) dan *metal chelating agent* (EDTA), *Tertiary butyl hydroquinone* (TBHQ), *Nordihydro guaretic acid* (NDGA). Antioksidan yang utama pada saat ini digunakan dalam produk makanan adalah monohidroksi atau polihidroksi senyawa fenol dengan berbagai substituen pada cincin. Antioksidan fenolik sintesis yang diganti oleh alkil guna untuk meningkatkan kelarutannya dalam lemak dan minyak (Irianti, dkk., 2017)

Antioksidan sintetik utama digunakan dengan batas penggunaan yaitu 0,02% dari kandungan lemak atau minyak. Antioksidan untuk minyak nabati adalah TBHQ. BHA dan BHT cukup stabil terhadap panas dan sering digunakan untuk stabilisasi lemak dalam proses pemanggangan dan penggorengan suatu produk. Antioksidan BHA dan BHT jika digunakan dalam jangka panjang akan memberikan efek pada tubuh. Penggunaan BHT dan BHA sebagai antioksidan memiliki efek toksik yaitu dengan kandungan 1% BHT atau BHA dalam makanan akan menghasilkan penurunan berat badan dan pembengkakan berat pada organ hati dan otak (Irianti, dkk., 2017).

3. Mekanisme kerja antioksidan

Mekanisme kerja antioksidan terbagi atas tiga macam yaitu:

a. Antioksidan primer

Antioksidan primer yang mampu mengurangi dismutase (SOD), glutathione peroksidase dan katalase stabil. Misalnya superoksida yang dapat mengubah radikal superoksida menjadi molekul dan mengubahnya menjadi produk yang lebih.

b. Antioksidan air

Antioksidan air pembentukan radikal bebas baru dengan cara memutuskan reaksi berantai dan sekunder yang berperan mengikat radikal bebas dan mencegah penyebaran senyawa radikal.

c. Antioksidan tersier

Antioksidan tersier berperan dalam mekanisme biomolekuler, misalnya memperbaiki kerusakan sel dan jaringan yang disebabkan radikal bebas.

(Rahmi, 2017).

4. Uji aktivitas antioksidan

Pengujian aktivitas antioksidan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Metode DPPH

Prinsip kerja dari metode DPPH yaitu dengan adanya atom hidrogen dari senyawa antioksidan yang berikatan dengan elektron bebas pada senyawa radikal sehingga mengakibatkan perubahan dari radikal bebas (*diphenylpicrylhydrazyl*) menjadi senyawa non-radikal (*diphenylpicrylhydrazine*). Hal tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (senyawa radikal bebas tereduksi oleh adanya antioksidan). Pada penetapan aktivitas antioksidan dengan metode DPPH digunakan parameter IC_{50} yaitu konsentrasi sampel yang dibutuhkan untuk menangkap radikal DPPH sebanyak 50%, dimana apabila

semakin kecil nilai IC_{50} maka aktivitas antioksidannya semakin kuat (Setiawan, dkk., 2018)

b. Metode ABTS

Prinsip pada pengujian dengan metode ABTS yaitu penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal kation ABTS. ABTS merupakan suatu radikal dengan pusat nitrogen yang memiliki karakteristik warna biru-hijau, yang apabila tereduksi oleh antioksidan akan berubah warna menjadi tidak berwarna. Metode ABTS sangat sensitif dengan cahaya, bahkan pembentukan ABTS, serta memerlukan waktu inkubasi selama 12-16 jam dalam keadaan gelap (Setiawan, dkk., 2018)

c. Metode FRAP

Penetapan aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode FRAP pada prinsipnya dapat berjalan dengan baik jika dilakukan pada senyawa antioksidan yang dapat mereduksi menjadi *ferritripyridyl-triazine* (Fe(III)TPTZ) menjadi kompleks *ferrotripyridyl-triazine* (Fe(II)TPTZ) (Setiawan, dkk., 2018)

D. Tinjauan Islam

Sebagai umat muslim yang diciptakan oleh Allah SWT. baik seluruh alam semesta termasuk bumi dan isinya dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah SWT. menciptakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berbagai macam kandungan dan manfaat yang berguna bagi tubuh manusia. Sebagai firman Allah SWT. Dalam Q.S. Ash-Shu'ara / 96: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahannya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Quraish Shihab mengatakah adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebgai ciptaan Allah SWT. di Bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa (Shihab, 2015).

Ayat ini menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pangan serta kebutuhan manusia dan binatang. Ayat ini juga mengingatkan kepada manusia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan menggunakannya dengan baik anugrah-Nya bahwasanya dia maha kuasa itulah yang telah menurunkannya dari langit. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang berkhasiat sebagai antioksidan.

Keanekaragaman tumbuhan banyak yang dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia yang salah satunya sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. Memiliki fungsi sehingga diciptakan di bumi ini. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Namun untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Sebagai firman Allah SWT. Dalam Q.S Thaha / 20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ٥٣

Terjemahannya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Allah SWT. telah menjadikan kamu sebagai hamparan, maknanya sebagai isyarat bahwa keberadaan manusia di bumi dalam rangka kehidupannya merupakan bagian dari hidayah Allah SWT. Dikatakan dalam Firman-Nya: menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan, merupakan isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya Firman-Nya: Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2015).

Segala penyakit yang diberikan Allah SWT. Pasti akan ada penawarnya dan akan sembuh dengan seizin Allah SWT. Yang dalam hal ini salah satu obatnya yang bisa dijadikan untuk penyembuhan penyakit yaitu rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang dapat berfungsi sebagai antioksidan sehingga dengan seizin Allah SWT. Maka penyakit seseorang dapat disembuhkan.

Adapun sebuah hadist dalam riwayat Imam Muslim, yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بِإِذْنِ رَبِّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya:

“Setiap penyakit memiliki obat. Bila cocok dengan penyakitnya maka akan sembuh dengan izin Allah Ta’ala” (HR. Muslim, No. 2204).

Keterlibatan Allah SWT. Dalam kesembuhan dari berbagai macam penyakit juga terdapat dalam Q.S. Ash-Shu'ara/ 90: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ ٨٠

Terjemahannya:

“Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku” (Kemenag RI, 2018).

Dalam tafsir Al-misbah, “*Wa idza maridhtu*” dan apabila aku sakit yang mengandung makna besarnya kemungkinan atau bahkan kepastian terjadinya keniscayaan terhadap manusia dalam hal ini adalah sakit. Yang menginsyaratkan bahwa sakit baik berat ataupun ringan, fisik maupun mental merupakan salah satu keniscayaan hidup manusia. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah SWT. Dan hal negatif atau buruk yang terjadi pada diri manusia hendaklah terlebih dahulu dicari penyebabnya pada diri sendiri (Shihab, 2015).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah SWT. berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu untuk memperoleh kesembuhan itu.

Keterlibatan ayat dan hadist diatas menginsyaratkan bahwa diizinkan nya seorang muslim mengobati penyakit yang diderita. Karena, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan sudah tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT. penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan.

Berdasarkan beberapa ayat dan hadist yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. menciptakan berbagai macam tanaman didunia untuk dimanfaatkan dan dapat pula ditanam sendiri. Yang mana dengan itu

nantinya Allah SWT. akan menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman tersebut. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm), sebagaimana yang telah diteliti dalam penelitian ini. Dimana nantinya dapat digunakan sebagai obat dan menjadi perantara kesembuhan oleh Allah SWT.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif untuk melakukan partisi dan uji aktivitas antioksidan ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) menggunakan metode DPPH.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi dan Laboratorium Kimia Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung mulai bulan Juli – November 2021

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen laboratorium untuk menganalisis golongan senyawa kimia dan uji aktivitas antioksidan ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) dengan metode DPPH.

C. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa alat yakni botol coklat, batang pengaduk, cawan porselen, corong kaca, erlen meyer, gelas ukur, gelas kimia,

labu pisah, pipet tetes, rotavapor, spektrofotometer Uv-Vis, timbangan analitik, vial, vortekx dan wadah maserasi.

2. Bahan

Beberapa bahan yang dibutuhkan dalam penelitian yakni aquadest, asam klorida 2N, asam askorbat, asam asetat, asam sulfat, reagen bouchardat, DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*), etil asetat, besi(III) klorida, kertas saring, kloroform, serbuk magnesium, metanol, n-heksan, ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan sampel

a. Pengambilan sampel

Sampel rimpang lempuyang gajah yang diperoleh di daerah kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Rimpang lempuyang gajah dipisahkan dengan bagian tumbuhan lainnya dan dicuci dengan air mengalir (Handayani, dkk., 2014).

b. Pengolahan sampel

Sampel yang telah diambil kemudian disortasi basah untuk memisahkan sampel dari kotoran-kotoran atau bahan asing lainnya. Kemudian sampel dicuci bersih dengan air mengalir, kemudian dipotong-potong kecil, selanjutnya dikeringkan dalam lemari pengering kemudian diserbukkan (Handayani, dkk., 2014).

2. Maserasi dan Fraksinasi

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang terdapat dalam sampel. Serbuk rimpang lempuyang gajah ditimbang sebanyak 500 gram dan dimaserasi dengan metanol selama 9 x 24 jam dan setiap 3 x 24 jam pelarut metanol diganti dengan yang baru, selanjutnya maserat di

evaporasi pada suhu 60°C dengan bantuan alat *rotary evaporator* (Podungge, dkk., 2017).

Ekstrak kemudian dipartisi dengan cara melarutkan 20 gram ekstrak metanol kedalam 200 ml metanol. Larutan kemudian dimasukkan kedalam corong pisah dan selanjutnya ditambah dengan 200 ml n-heksan. Campuran dalam corong pisah dikocok selama 5 menit secara perlahan lalu didiamkan hingga terjadi pemisahan pada kedua larutan. Proses partisi kemudian dilakukan secara berulang hingga larutan terlihat bening. Kemudian ekstrak metanol dari hasil partisi selanjutnya diuapkan dan dilarutkan kembali dengan menggunakan aquadest sebanyak 200 ml, setelah larut dimasukkan kedalam corong pisah lalu ditambahkan 200 ml etil asetat, dikocok secara perlahan selama 5 menit, setelah itu didiamkan hingga terjadi pemisahan antara ekstrak aquadest dan ekstrak etil asetat. Kemudian ekstrak etil asetat dipisahkan dengan lapisan aquadest kemudian di partisi kembali hingga larutan berwarna bening. Ekstrak n-heksan cair, ekstrak etil asetat cair dan ekstrak aquadest diuapkan hingga diperoleh ekstrak kental (Nuari, dkk., 2017).

3. Identifikasi kandungan kimia ekstrak hasil partisi

a. Uji alkaloid

Sebanyak 500 mg ekstrak dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu ditambahkan 1 ml HCL 2N dan dicukupkan dengan aquadest hingga 10 ml. Kemudian dipanaskan diatas penangas air selama 15 menit, didinginkan dan disaring. Ditetaskan larutan dalam kaca arlogi dan ditambahkan dengan 2 tetes reagen Bouchardat. Hasil positif ditandai dengan endapan coklat sampai hitam (Utami, 2020)

b. Uji flavonoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak ditambahkan air panas, kemudian dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Magnesium dan 1 ml HCL pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017).

c. Uji steroid dan triterpenoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak, ditambahkan beberapa tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Uji positif steroid menghasilkan warna hijau atau biru dan terpenoid menghasilkan warna merah atau violet (Susanti, dkk., 2015).

d. Uji saponin

Sebanyak 1 gram ekstrak ditambah dengan 10 ml air panas di masukkan kedalam tabung reaksi dan didinginkan. Kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan HCL 2N (Susanti, dkk., 2015).

e. Uji tanin dan polifenol

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan masing-masing dalam dua tabung reaksi. Tabung reaksi A berisi larutan uji sebagai kontrol negatif, sedangkan tabung reaksi B berisi larutan uji dengan penambahan beberapa tetes FeCl_3 10%. Sampel yang mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan atau biru tua (Susanti, dkk., 2015).

4. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (*1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl*)

a. Pembuatan larutan DPPH

Dibuat larutan DPPH dengan konsentrasi 0,45 mM dengan cara menimbang 18 mg serbuk DPPH kemudian dilarutkan menggunakan metanol sebanyak 100 ml lalu di vortex (Nurfiana, dkk., 2017).

b. Panjang gelombang serapan maksimum DPPH

Larutan diambil menggunakan pipet mikro sebanyak 1 ml kemudian ditambahkan 4 ml metanol kemudian di vorteks dan didiamkan selama 30 menit ditempat gelap dan diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm untuk memperoleh panjang gelombang maksimum. Dari skrining yang dilakukan, diperoleh panjang gelombang maksimum DPPH adalah 515 nm (Prasetyo, dkk., 2021).

c. Pembuatan larutan uji

Larutan uji ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah dibuat dengan berbagai seri konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm dengan cara membuat terlebih dahulu larutan induk ekstrak dan fraksi (Prasetyo, dkk., 2021).

Pembuatan larutan induk dilakukan dengan menimbang masing-masing ekstrak fraksi metanol, fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi air sebanyak 50 mg lalu dimasukkan kedalam labu ukur kemudian masing-masing ditambahkan metanol sebanyak 250 ml lalu di homogenkan (Prasetyo, dkk., 2021).

Selanjutnya di ambil masing-masing larutan induk ekstrak dan fraksi sebanyak 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml dan 50 ml kedalam labu ukur dan ditambahkan masing-masing menggunakan pelarut metanol hingga 100 ml atau hingga tanda batas (Prasetyo, dkk., 2021).

d. Pembuatan larutan pembanding

Dibuat larutan pembanding vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm dan 10 ppm dengan cara terlebih dahulu membuat larutan induk. Ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan dimasukkan kedalam labu ukur kemudian ditambahkan 100 ml metanol. Selanjutnya diambil larutan induk vitamin C sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml dan 5 ml. Kemudian dimasukkan kedalam labu ukur dan ditambahkan metanol sebanyak 50 ml lalu di homogenkan (Prasetyo, dkk., 2021).

e. Penentuan aktivitas antioksidan rimpang lempuyang gajah

Larutan uji ekstrak dan fraksi rimpang lempuyang gajah dengan berbagai konsentrasi yaitu 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm dan 100 ppm di pipet sebanyak 4 ml kedalam tabung reaksi kemudian ditambahkan 1 ml larutan DPPH 0,45 mM lalu divorteks lalu didiamkan selama 30 menit di tempat gelap dan selanjutnya dibaca dengan panjang gelombang maksimal 515 nm. Kemudian untuk larutan pembanding vitamin C dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm dan 10 ppm dipipet sebanyak 4 ml kedalam tabung reaksi ditambahkan 1 ml DPPH 0,45 mM lalu di vorteks dan didiamkan selama 30 menit kemudian di baca panjang gelombang maksimal 515 nm (Prasetyo, dkk., 2021).

5. Analisis data

Nilai konsentrasi penghambatan ditentukan dengan analisis statistik menggunakan perhitungan data % inhibisi dengan konsentrasi sampel. Perhitungan persentase inhibisi serapan DPPH dengan menggunakan rumus (Purwanto, dkk., 2017):

$$\% \text{ inhibisi} = \frac{\text{absorbansi blanko} - \text{absorbansi sampel}}{\text{absorbansi blanko}} \times 100\%$$

Keterangan: Absorbansi blanko : absorbansi DPPH

Absorbansi sampel : absorbansi sampel uji

Perhitungan IC_{50} senyawa aktif dilakukan menggunakan regresi linear menggunakan rumus :

$$y = ax + b$$

Keterangan : y = nilai presentase inhibisi
 x = konsentrasi sampel (ppm)
 a = konstanta (titik potong y)
 b = koefisien (variabel x)

(Purwanto, dkk., 2017).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi

Tabel 1. Hasil Ekstrak partisi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

No.	Jenis Ekstrak	Berat Ekstrak Kental Sampel (g)	Berat Ekstrak Hasil Partisi (g)	% Rendamen
1.	Metanol	20	8,296	41,48
2.	N-heksan	20	1,357	6,785
3.	Etil Asetat	20	5,393	26,965
4.	Aquadest	20	2,5	12,5

2. Hasil Skrining Fitokimia

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

Senyawa	Pereaksi	Ekstrak Partisi			
		Metanol	N- heksan	E. Asetat	Aquadest
Alkaloid	(+) 3 ml HCl 2N (+) Mayer (+) Dragendorf	+	+	-	-
Saponin	(+) HCL 2N	-	-	-	-
Flavonoid	(+) Serbuk Mg (+) HCL Pekat	+	+	+	-
Tanin dan Polifenol	(+) FeCl ₃ 10%	+	-	+	-
Steroid dan Triterpenoid	(+) Lieberman-Burchard	+	-	-	-

Keterangan : + = Positif dan - = Tidak Positif

3. Hasil Pengukuran Nilai IC₅₀ Aktivitas Vitamin C, Ekstrak Fraksi Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm)

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antioksidan ekstrak fraksi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm).

Ekstrak Partisi	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀ (ppm)
Metanol	20	0,831	9,772	$y = 0,4606x - 3,4998$ $R^2 = 0,9534$	100,956
	40	0,823	10,641		
	60	0,714	22,512		
	80	0,615	33,189		
	100	0,511	44,553		
N-heksan	20	0,618	32,863	$y = 0,3288x + 24,426$ $R^2 = 0,9583$	77,780
	40	0,597	35,179		
	60	0,528	42,707		
	80	0,429	53,384		
	100	0,399	56,641		
Etil Asetat	20	0,604	34,455	$y = 0,336x + 26,656$ $R^2 = 0,976$	69,476
	40	0,547	40,572		
	60	0,515	44,046		
	80	0,430	53,348		
	100	0,353	61,672		
Aquadest	20	0,739	19,725	$y = 0,0682x + 17,673$ $R^2 = 0,9209$	474,003
	40	0,737	20,014		
	60	0,729	20,883		
	80	0,706	23,308		
	100	0,692	24,900		

Tabel 4. Hasil Uji Aktivitas Antioksidan Vitamin C

Sampel	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi Sampel	% Inhibisi	Persamaan Garis Linear	Nilai IC ₅₀ (ppm)
Vitamin C	2	0,912	0,941	y = 9,1404x - 21,234 R ² = 0,9629	7,79
	4	0,860	6,659		
	6	0,585	36,446		
	8	0,399	56,641		
	10	0,301	67,354		

B. Pembahasan

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menangkap radikal bebas. Radikal bebas yang dihasilkan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu debu, asap, polusi, kebiasaan yang mengkonsumsi makanan dan minuman cepat saji yang tidak seimbang antara karbohidrat, protein dan lemaknya. Senyawa antioksidan tersebut akan mendonorkan satu elektron terhadap radikal bebas yang tidak stabil sehingga radikal bebas tersebut akan menjadi netral kembali dan tidak akan mengganggu metabolisme pada tubuh (Hayatul, 2017).

Radikal bebas merupakan suatu molekul yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Radikal bebas berperan penting dalam proses biologis yang sebagian besar berasal dari proses biologis alami yang melibatkan prooksidan ROS dan RNS (Berawi & Agverianti, 2017).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) yang pada umumnya banyak digunakan sebagai rempah, bumbu dan obat karena rasanya yang unik dan bersifat medis. Di dalam dunia kesehatan dapat mencakup yaitu mengobati radang, demam tinggi, skait gigi, gangguan pencernaan, sembelit, diare serta dapat meredakan rasa sakit (Yob, dkk. 2011).

Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) mengandung senyawa antioksidan sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Insan ayat 17:

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝ ١٧

Terjemahnya:

“Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe” (Kemenag RI, 2018).

Ayat diatas menceritakan di mana orang-orang yang baik di dalam surga itu merela mendapatkan suguhan minuman yang telah bercampur dengan jahe, yang dimana rasa jahenya yang berbeda dengan jahe yang ada di dunia. Dikarenakan minuman tersebut diambil dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil.

Surah Al-Insan ayat 17 menunjukkan suatu balasan yang baik bagi penduduk surga, yaitu berupa minuman yang campurannya adalah jahe, yang dimana jika di dunia sering dikonsumsi manusia, serta dimanfaatkan sebagai minuman sehari-hari serta umumnya banyak disukai, karena selain untuk menyembuhkan, rasanya juga begitu nikmat. Namun tentunya secara rasa jauh lebih lezat daripada jahe yang ada di dunia.

Pada penelitian ini dimulai dengan melakukan preparasi pada rimpang lempuyang gajah dengan cara terlebih dahulu dibersihkan kotoran yang masih tersisa kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir hingga bersih. Kemudian dilakukan perajangan dan dikeringkan dengan cara di masukkan kedalam lemari pengering. Setelah dikeringkan kemudian dilakukan sortasi kering, lalu dimasukkan kedalam toples kaca untuk dilakukan maserasi atau tahap ekstraksi.

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi yang bertujuan untuk mengekstrak komponen aktif yang terdapat dalam sampel. Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi yaitu metanol. Metanol merupakan senyawa yang bersifat polar, metanol juga merupakan pelarut terbaik yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi yang dimana gugus hidroksil dan metil pada metanol memberikan kecenderungan menarik analit-analit yang bersifat polar maupun non polar (Ramdani & Chuzaemi, 2017).

Hasil ekstraksi selanjutnya disaring dan dipekatkan dengan menggunakan alat *rotary evaporator* pada suhu 60°C. Penggunaan alat *rotary evaporator* dipilih untuk mempersingkat waktu proses dalam mengisolasi. Pada penggunaan alat *rotary evaporator* digunakan suhu 60°C guna untuk meminimalisir rentangnya terhadap kondisi senyawa pada ekstrak menjadi rusak (Hasmita, dkk. 2019).

Ekstrak metanol yang telah dipekatkan di ambil sebanyak 20 gram untuk dilakukan partisi dengan pelarut n-heksan, etil asetat dan aquadest. Ekstrak metanol dilarutkan kedalam 200 ml aquadest, lalu dimasukkan kedalam corong pisah. Kemudian ditambahkan 200 ml n-heksan kedalam corong pisah lalu dikocok secara perlahan selama 5 menit agar pelarut dapat menarik senyawa dengan sempurna. Metode partisi dengan menggunakan corong pisah digunakan dalam isolasi senyawa metabolit sekunder yang bertujuan untuk mengklasifikasikan senyawa-senyawa yang terkandung berdasarkan perbedaan tingkat kepolarannya (Saputra, dkk. 2018). Setelah terbentuk lapisan aquadest dan lapisan n-heksan, kemudian kedua lapisan dipisahkan dan dilakukan beberapa kali partisi dengan pergantian pelarut n-heksan secara berkala hingga pada pelarut n-heksan dalam corong pisah berubah warna menjadi bening yang dimana dalam penelitian ini dilakukan sebanyak 13 kali. Hasil partisi n-heksan selanjutnya

dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak kental n-heksan hasil partisi sebanyak 1,357 gram.

Kemudian lapisan aquadest dimasukkan kembali kedalam corong pisah dan ditambahkan 200 ml etil asetat, lalu dilakukan hal yang sama pada proses sebelumnya. Dimana pada partisi ini dilakukan pergantian pelarut etil asetat secara berkala sebanyak 5 kali. Hasil partisi aquadest dan partisi etil asetat kemudian dipekatkan dengan menggunakan *rotary evaporator* hingga didapatkan ekstrak kental aquadest hasil partisi sebanyak 2,5 gram dan ekstrak kental etil asetat hasil partisi sebanyak 5,393 gram.

Tahap selanjutnya yaitu skrining fitokimia yang dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam (Vifta & Advistasari, 2018). Skrining fitokimia dilakukan pada ekstrak partisi metanol, ekstrak partisi n-heksan, ekstrak partisi etil asetat dan ekstrak partisi aquadest. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu uji alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenil serta steroid dan triterpenoid. Pada pengujian alkaloid, hasil yang terbentuk pada ekstrak partisi metanol setelah penambahan reagen mayer pada ekstrak partisi metanol yaitu terdapat endapan jingga, sedangkan pada penambahan reagen bouchardat terbentuk endapan coklat. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan kemungkinan mengandung senyawa alkaloid. Pada ekstrak fraksi n-heksan setelah penambahan reagen mayer terdapat endapan jingga, sedangkan pada penambahan reagen bouchardat terjadi perubahan warna menjadi bening. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan kemungkinan mengandung senyawa alkaloid. Pada ekstrak fraksi etil asetat setelah penambahan reagen mayer terdapat perubahan warna menjadi coklat, sedangkan pada penambahan reagen bouchardat tidak terjadi perubahan warna. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid.

Pada ekstrak fraksi aquadest setelah penambahan reagen mayer terdapat perubahan warna menjadi jingga, sedangkan pada penambahan reagen bouchardat tidak terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid.

Prinsip dari metode analisis ini yaitu reaksi pengendapan yang terjadi karena adanya ligan. Atom nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas pada alkaloid dapat mengganti ion iodo dalam pereaksi-pereaksi (Ergina, dkk., 2014).

Pada pengujian saponin, dengan penambahan HCl 2 N dan dikocok secara vertikal selama 10 detik menunjukkan pada ekstrak partisi metanol, ekstrak fraksi n-heksan, ekstrak fraksi etil asetat dan ekstrak fraksi aquadest menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa saponin.

Pada pengujian flavonoid, dengan penambahan serbuk magnesium dan HCl pekat menunjukkan pada ekstrak metanol terjadi perubahan yaitu berwarna jingga. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi n-heksan terjadi perubahan dengan adanya bentuk cincin hijau. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi etil asetat terjadi perubahan yaitu berwarna jingga. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan adanya kandungan senyawa flavonoid. Pada ekstrak fraksi aquadest tidak terjadi perubahan warna, berdasarkan hal tersebut menunjukkan tidak mengandung senyawa flavonoid.

Tujuan penambahan serbuk magnesium dan HCl yaitu untuk menginduksi inti benzopiron yang terdapat dalam struktur flavonoid sehingga terbentuk garam flavilum berwarna merah atau jingga (Ergina, dkk., 2014).

Pada pengujian tanin dan polifenol dengan penambahan FeCl_3 10% menunjukkan hasil pada ekstrak partisi metanol terjadi perubahan warna hitam

kehijauan, dimana berdasarkan perubahan warna tersebut menunjukkan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi n-heksan terjadi 2 bagian lapisan yang dimana hal tersebut tidak menunjukkan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi etil asetat terjadi perubahan warna yaitu hitam kehijauan yang dimana berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak fraksi aquadest terjadi perubahan warna menjadi jingga dimana berdasarkan perubahan tersebut tidak menandakan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol.

Uji fitokimia dengan menggunakan FeCl_3 untuk menentukan apakah sampel mengandung gugus fenol. Dengan adanya gugus fenol ditunjukkan perubahan warna hijau kehitaman atau biru tua setelah ditambahkan FeCl_3 , sehingga apabila ujifitokimia dengan FeCl_3 memberikan hasil positif dimungkinkan dalam sampel tersebut terdapat senyawa fenol dan kemungkinan salah satunya adalah tanin. Karena tanin merupakan senyawa polifenol (Ergina, dkk., 2014).


Pada pengujian steroid dan triterpenoid dengan penambahan reagen lieberman burchard, menunjukkan pada ekstrak partisi metanol terjadi perubahan warna yaitu agak kemerahan yang dimana berdasarkan perubahan tersebut kemungkinan mengandung senyawa triterpenoid sedangkan pada ekstrak fraksi n-heksan, ekstrak etil asetat dan ekstrak fraksi aquadest tidak menunjukkan adanya kandungan senyawa steroid dan triterpenoid.

Dengan penambahan reagen Lieberman-burchard yaitu campuran antara HCl pekat dengan H_2SO_4 pekat. Yang dianalisis berdasarkan kemampuan senyawa terpenoid dan steroid membentuk warna oleh H_2SO_4 pekat dalam pelarut HCl pekat. Hasil positif pada sampel yang membentuk warna merah jingga untuk analisis triterpenoid dan biru untuk analisis steroid (Ergina, dkk., 2014).

Berdasarkan perbedaan hasil skrining fitokimia yang didapatkan pada ekstrak hasil partisi aquadest tidak mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, steroid dan triterpenoid. Pada ekstrak hasil partisi etil asetat tidak mengandung senyawa alkaloid, saponin, flavonoid, steroid dan triterpenoid, tetapi mengandung senyawa tanin dan polifenol. Pada ekstrak hasil partisi metanol tidak mengandung senyawa saponin, tetapi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, polifenol, steroid dan triterpenoid. Kemudian pada ekstrak hasil partisi N-heksan tidak mengandung senyawa saponin, tanin, polifenol, steroid dan tanin, tetapi mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid.

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*). Prinsip kerja pada metode DPPH yaitu adanya atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang bergandengan dengan elektron bebas pada senyawa radikal sehingga dapat terjadi perubahan dari radikal bebas yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Setiawan, dkk. 2018).

Pengukuran antioksidan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri Uv-Vis dengan panjang gelombang 515 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC₅₀, yang dimana merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH.



Gambar 2. Reaksi antara DPPH dengan antiradikal bebas
 DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) DPPH-H (2,2-difenil-1-pikrilhidrazin)

Pengukuran kapasitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH yang ditandai dengan perubahan warna setelah inkubasi. Proses inkubasi dilakukan selama 30 menit, yang bertujuan untuk mempercepat reaksi antara radikal DPPH dengan sampel yang bertindak sebagai antioksidan. Perubahan warna terjadi pada ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) dan vitamin C sebagai pembanding dimana ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) mengalami perubahan warna yang tidak signifikan setelah diinkubasi. Perubahan (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) hanya mendonorkan atom H-nya dalam jumlah yang sedikit. Pengurangan intensitas warna mengindikasikan kemampuan antioksidan untuk menangkal radikal bebas (Haeria, dkk. 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah sejalan sesuai dengan konsep Al-Qur'an yang telah melakukan pengujian dengan salah satu tumbuhan ciptaan Allah SWT. yang dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak hasil partisi rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) memiliki aktivitas antioksidan terhadap ekstrak metanol memiliki nilai IC_{50} 100,956 ppm; pada ekstrak N-heksan memiliki nilai IC_{50} 77,780 ppm; pada ekstrak etil asetat memiliki nilai IC_{50} 69,476 ppm dan ekstrak aquadest memiliki nilai IC_{50} 474,003 ppm.
2. Berdasarkan nilai IC_{50} yang didapatkan diketahui bahwa pada fraksi etil asetat dan fraksi N-heksan termasuk dalam golongan kuat yaitu 77,780 ppm dan 69,476 ppm, pada ekstrak fraksi metanol termasuk dalam golongan sedang yaitu 100,956 ppm, sedangkan pada fraksi aquadest termasuk dalam golongan lemah karena 474,003 ppm.

B. Saran

Disarankan agar penelitian ini dilanjutkan untuk mengisolasi senyawa bioaktif dari fraksi yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan paling kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agromedia Redaksi. (2008). *Buku Pintar Tanaman Obat 431 Jenis Tanaman Penggempur Aneka Penyakit*. PT Agromedia Pustaka.
- Berawi, K. N., & Agverianti, T. (2017). *Efek Aktivitas Fisik Pada Proses Pembentukan Radikal Bebas sebagai Faktor Risiko Aterosklerosis*. *Jurnal Majority*, 6(2), 86–91. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/1019>.
- Dwimayasanti, R. (2018). *Rumput Laut : Antioksidan Alami Penangkal Radikal Bebas*. *Oseana*, *Xliii*, 13–23. <https://doi.org/10.21603/oseana.v3i1.1877>.
- Endarini, L. H. (2016). *Farmakognosi Dan Fitokimia*. Kemenkes RI.
- Ergina, Nurhayati, Siti., & Puspitasari, Indarini Dwi. (2014). *Uji Kualitatif Seyawa Metabolit Sekunder Pada Daun Palado (Agave angustifolia) Yang diekstraksi Dengan Pelarut Air dan Etanol*. *J. Akad. Kim.* 3(3): 165-172.
- Fatmawati, S. (2019). *Bioaktivitas dan Konstituen Kimia Tanaman Obat Indonesia*. Deepublish.
- Haeria, Hermawati, & Ugi, andi tenri. (2016). *Penentuan Kadar Flavonoid Total dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Bidara (Ziziphus spinachristi L .).* 1(2), 57–61.
- Haeria, Tahar, N., & Munadiah. (2018). *Penentua Kadar Flavonoid Dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa Oleifera) Dengan Metode DPPH, CUPRAC dan FRAP*. 6(2), 88–97.
- Handayani, V., Ahmad, A. R., & Sudir, M. (2014). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Metanol Bunga dan Daun Patikala (Etlingera elatior (Jack) R . M . Sm) Menggunakan Abstrak*. *Pharm Sci Res*, 86–93.
- Hasmita, I., Marya, E., & Redha, F. (2019). *Pengaruh Temperatur Pasa Isolasi Miristin Dari Minyak Pala Menggunakan Rotary Evaporator*. *Biopropal Industri*, 10, 41–48.
- Ilmiati, I., Wulan, S., & Erfiana. (2017). *Uji Fitokimia Ekstrak Buah Dengan*. *Jurnal Dinamika*, 8(1), 66–84.
- Indra, Nurmalasari, N., & Kusmiati, M. (2019). *Fenolik Total , Kandungan Flavonoid , dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Daun Mareme (Glochidion arborescens Blume .).* *Sains Farmasi dan Klinis*, 06(03), 206–212. <https://doi.org/10.25077/jsfk.6.3.206-212.2019>
- Irianti, T., Sugiyanto, Nuranto, S., & Kuswandi. (2017). *Antioksidant*. UGM Press.

- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Quran dan Terjemahannya*: CV. Penerbit Diponegoro. Bandung.
- Lianah. (2019). *Biodiversitas Zingiberaceae Mijen Kota Semarang*. Deepublish.
- Maesaroh, K., Kurnia, D., & Al Anshori, J. (2018). *Perbandingan Metode Uji Aktivitas Antioksidan DPPH, FRAP dan FIC Terhadap Asam Askorbat, Asam Galat dan Kuersetin*. *Chimica et Natura Acta*, 6(2), 93. <https://doi.org/10.24198/cna.v6.n2.19049>
- Mutiara, R., Djangi, M. J., & Herawati, N. (2016). *Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Metabolit Sekunder Ekstrak Metanol Kulit Buah Mangrove Pidada (Sonneratia caseolaris)*. *Chemica*, 17(2), 52–62.
- Nuari, S., Anam, S., & Khumaidi, A. (2017). *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Ekstrak Etanol Buah Naga*. *Galenika Journal of Pharmacy*, 2(2), 118–125. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2017.v3.i2.118>
- Nurfiana, G., Mindi, L., & Novia, M. (2017). *Aktivitas Antioksidan Ekstrak dan Fraksi Daun Manggis (Garcinia Antioxidant Activity of Mangosteen (Garcinia mangostana) Leaves Extract and Fraction toward DPPH (1,1-difenil-2-pikrilhidrazil)*. 14(1), 9–15.
- Nurhafidhah, Hasby, Septiani, Atmaja, T. H. W., & Utami, K. (2020). *Sehat Alami dengan Rimpang-Rimpangan*. Lakeisha.
- Podungge, M. R., Salimi, Y. K., & Duengo, S. (2017). *Isolasi dan Uji Aktivitas Antioksidan Senyawa Flavonoid dari Daun Miana (Coleus Scutelleroides Benth.)*. *Entropo*, 12(1), 67–74.
- Prasetyo, E., Zukhruf, N., Kharomah, W., & Rahayu, T. P. (2021). *Ekstrak Etanol Kulit Buah Durian (Durio zibethinnus L.) dari Desa Alasmalang Kabupaten Banyumas*. 08(01), 75–82.
- Pratiwi, D. I., Syarif, R. A., Waris, R., Studi, P., Farmasi, S., Farmasi, F., & Indonesia, U. M. (2019). *Isolasi Senyawa Antioksidan Ekstrak Metanol Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus)*. 6(1), 340–346.
- Purwanto, D., Bahri, S., & Ridhay, A. (2017). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Purnajiwa (Kopsia arborea Blume.) dengan Berbagai Pelarut*. *KOVALEN*, 3(April), 24–32.
- Rahmi, H. (2017). *Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Buah-buahan di Indonesia*. 2(1), 34–38.
- Ramdani, D., & Chuzaemi, S. (2017). *Pengaruh Perbedaan Jenis Pelarut Dalam Proses Ekstraksi Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L.) Pada Pakan Terhadap Viabilitas Protozoa Dan Produksi Gas In-Vitro*. 27(2), 54–62.


- Santoso, U. (2020). *Antioksidan Pangan*. Gadjah Mada University Press.
- Saputra, T. R., Ngatin, A., & Sarungu, Y. T. (2018). *Penggunaan Metode Ekstraksi Maserasi Dan Partisi Pada Tumbuhan Cocor Bebek (Kalanchoe Pinnata) Dengan Kepolaran Berbeda*. 3(1), 5–8.
- Sayuti, K., & Yenrina, R. (2015). *Antioksidan Alami dan Sintetik (I)*. Andalas University Press.
- Setiawan, F., Yunita, O., & Kurniawan, A. (2018). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan) Menggunakan Metode DPPH, ABTS, dan FRAP*. 2(2), 82–89.
- Shihab, M.Q. (2015). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3*: Penerbit Lentera Hati. Jakarta.
- Silalahi, M. (2018). *Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.)*. *Jurnal Pendidikan, Matematika, dan Sains*, 2(2), 147–160.
- Sudarwati, tri puji lestari, & Fernanda, hanny ferry. (2019). *Aplikasi Pemanfaatan Daun Pepaya (Carica papaya) Sebagai Biolarvasida Terhadap Larva Aedes Aegypti*. Graniti.
- Sunarto, Choironi, N. A., & Syarifah, F. L. (2020). *Aktivitas Antioksidan dan Kadar Flavonoid Total Lempuyang Wangi (Zingiber aromaticum Val.)*. *Acta Pharmaciae Indonesia*, 8(2), 61–68.
- Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2015). *Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 90 % Daun Katuk (Sauropus androgynus (L .) Merr .)*. *Repository Universitas Udayana*, 83–86.
- Tristantini, D., Ismawati, A., Pradana, B. T., & Gabriel, J. (2016). *Pengujian Aktivitas Antioksidan Menggunakan Metode DPPH pada Daun Tanjung (Mimusops elengi L)*. 1–7.
- Utami, N. F. (2020). *Potensi Antioksidan dari Biji Kopi Robusta 9 Daerah di Pulau Jawa (A. K. Wardani (ed.))*. Universitas Pakuan.
- Vifta, R. L., & Advistasari, Y. D. (2018). *Skrining Fitokimia , Karakterisasi , dan Penentuan Kadar Flavonoid Total Ekstrak dan Fraksi-Fraksi Buah Parijoto (Medinilla speciosa B .)*. 1, 8–14.
- Vifta, R. L., Rahayu, R. T., & Luhurningtyas, F. P. (2019). *Indonesian Journal of Chemical Science Uji Aktivitas Antioksidan Kombinasi Ekstrak Buah Parijoto (Medinilla speciosa Blume) dan Rimpang Jahe Merah (Zingiber officinale Roscoe var Rubrum) dengan*. 8(3).
- Wahyuni, D. K. (2016). *Toga Indonesia*. Airlangga University Press.

- Wandita, G. A., & Musrifoh, I. (2018). *Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan*. *Farmaka*, 16(2), 564–571.
- Yob, N. J., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., Salleh, M. Z., & Zakaria, Z. A. (2011). *Zingiber zerumbet (L .) Smith : A Review of Its Ethnomedicinal , Chemical , and Pharmacological Uses*. *Hindawi Publishing Corporation*, 2011, 12. <https://doi.org/10.1155/2011/543216>
- Zuliani, N. E., Kusuma, I. W., Kimia, J., Mulawarman, U., Kehutanan, F., Mulawarman, U., Penajam, J., & Gunung, K. (2019). *Fraksinya Dari Daun Rumput Knop (Hyptis Capitata Jacq .) Test Of Antioxidant Activity (Dpph Method) Of Methanol Extract And Its Fractions From Leaves Of Knobweed (Hyptis capitata Jacq .)*. 36–40.




LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alur Penelitian




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Lampiran 2. Identifikasi kandungan kimia ekstrak partisi



Lampiran 3. Uji aktivitas antioksidan

a. Pengujian antioksidan





Lampiran 4. Pembuatan Larutan

1. Larutan DPPH 0,45 mM

$$0,45 \text{ mM} = 0,00045 \text{ M}$$

$$\diamond M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{V}$$

$$0,00045 = \frac{g}{394,32} \times \frac{1000}{100}$$

$$0,00045 = \frac{10 \cdot g}{394,32}$$

$$10 \cdot g = 0,00045 \times 394,32$$

$$g = \frac{0,177}{10}$$

$$g = 0,0177 \rightarrow 17,8 \text{ mg} \approx 18 \text{ mg}$$

2. Larutan ekstrak dan fraksi

a. Larutan induk

$$\diamond 1 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$$

$$200 \text{ ppm} = 200 \text{ mg} / 1000 \text{ ml}$$

$$= 50 \text{ mg} / 250 \text{ ml}$$

$$= 0,05 \text{ g} / 250 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 200 ppm dengan cara ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 50 mg dan di larutkan dengan 250 ml pelarut.

b. Larutan standar

$$\diamond M_1 V_1 = M_2 V_2$$

- 20 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$200\text{ppm} \cdot V_1 = 20\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{2000}{200}$$

$$V_1 = 10 \text{ ml}$$

- 40 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$200\text{ppm} \cdot V_1 = 40\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{4000}{200}$$

$$V_1 = 20 \text{ ml}$$

- 60 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$200\text{ppm} \cdot V_1 = 60\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{6000}{200}$$

$$V_1 = 30 \text{ ml}$$

- 80 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$200\text{ppm} \cdot V_1 = 80\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{8000}{200}$$

$$V1 = 40 \text{ ml}$$

- 100 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$200\text{ppm} \cdot V1 = 100\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{10.000}{200}$$

$$V1 = 50 \text{ ml}$$

3. Larutan Vitamin C

a. Larutan induk

$$\diamond 1 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$$

$$100 \text{ ppm} = 100 \text{ mg} / 1000 \text{ ml}$$

$$= 10 \text{ mg} / 100 \text{ ml}$$

$$= 0,01 \text{ g} / 100 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan di larutkan dengan 100 ml pelarut.

b. Larutan standar

$$\diamond M1 V1 = M2 V2$$

- 2 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$100\text{ppm} \cdot V1 = 2\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V1 = \frac{100}{100}$$

$$V1 = 1 \text{ ml}$$

- 4 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 4\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{200}{100}$$

$$V_1 = 2 \text{ ml}$$

- 6 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 6\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{300}{100}$$

$$V_1 = 3 \text{ ml}$$

- 8 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 8\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{400}{100}$$

$$V_1 = 4 \text{ ml}$$

- 10 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 10\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{500}{100}$$

$$V_1 = 5 \text{ ml}$$

Lampiran 5. Perhitungan Rendamen Ekstrak

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Bobot Ekstrak (gram)}}{\text{Bobot Simplisia (gram)}} \times 100\%$$

1. Ekstrak fraksi Metanol

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{8,296 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 41,48\%$$

2. Ekstrak fraksi N-heksan

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{1,375 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 6,785\%$$

3. Ekstrak fraksi Etil asetat

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{5,393 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 26,965\%$$

4. Ekstrak fraksi Aquadest

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{2,5 \text{ gram}}{20 \text{ gram}} \times 100\% = 12,5\%$$

Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs.Blanko} - \text{Abs.Sampel}}{\text{Abs.Blanko}} \times 100\%$$

1. Ekstrak fraksi Metanol

a. Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,831}{0,921} \times 100\% = 9,772\%$$

b. Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,823}{0,921} \times 100\% = 10,641\%$$

c. Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,714}{0,921} \times 100\% = 22,512\%$$

d. Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,615}{0,921} \times 100\% = 33,189\%$$

e. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,511}{0,921} \times 100\% = 44,553\%$$

2. Ekstrak Fraksi N-heksan

a. Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,618}{0,921} \times 100\% = 32,863\%$$

b. Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,598}{0,921} \times 100\% = 35,179\%$$

c. Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,528}{0,921} \times 100\% = 42,707\%$$

d. Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,429}{0,921} \times 100\% = 53,384\%$$

e. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,399}{0,921} \times 100\% = 56,641\%$$

3. Ekstrak Fraksi Etil Asetat

a. Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,604}{0,921} \times 100\% = 34,455\%$$

b. Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,547}{0,921} \times 100\% = 40,572\%$$

c. Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,515}{0,921} \times 100\% = 44,046\%$$

d. Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,430}{0,921} \times 100\% = 53,348\%$$

e. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,353}{0,921} \times 100\% = 61,672\%$$

4. Ekstrak Fraksi Aquadest

a. Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,739}{0,921} \times 100\% = 19,725\%$$

b. Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,737}{0,921} \times 100\% = 20,014\%$$

c. Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,729}{0,921} \times 100\% = 20,883\%$$

d. Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,706}{0,921} \times 100\% = 23,308\%$$

e. Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,692}{0,921} \times 100\% = 24,900\%$$

5. Vitamin C

a. Konsentrasi 2 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,912}{0,921} \times 100\% = 0,941\%$$

b. Konsentrasi 4 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,860}{0,921} \times 100\% = 6,659\%$$

c. Konsentrasi 6 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,585}{0,921} \times 100\% = 36,446\%$$

d. Konsentrasi 8 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,399}{0,921} \times 100\% = 56,641\%$$

e. Konsentrasi 10 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,921 - 0,301}{0,921} \times 100\% = 67,354\%$$

Lampiran 7. Perhitungan IC_{50}

1. Perhitungan IC_{50} sampel


Melalui persamaan Linear :

- $y = ax + b$

- $ax = y - b$

- $x = \frac{y-b}{a}$

a.




Gambar 3. Kurva Standar Ekstrak fraksi Metanol

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,4606$
 $b = 3,4998$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$
$$x = \frac{50-3,4998}{0,4606}$$
$$= 100,956 \text{ ppm}$$

b.




Gambar 4. Kurva Standar Ekstrak Fraksi N-heksan

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,3288$
 $b = 24,426$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$
$$x = \frac{50-24,426}{0,3288}$$
$$= 77,780 \text{ ppm}$$

c.



Gambar 5. Kurva Standar Ekstrak Fraksi Etil Asetat

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,336$
 $b = 26,656$


Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{50-26,656}{0,336}$$

$$= 69,476 \text{ ppm}$$

d.



Gambar 6. Kurva Standar Ekstrak Fraksi Aquadest

Diketahui : $y = 50$
 $a = 0,0682$
 $b = 17,673$


Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{50-17,673}{0,0682}$$

$$= 474,003 \text{ ppm}$$

2. Perhitungan IC₅₀ vitamin C



Gambar 7. Kurva Standar Vitamin C

Diketahui : $y = 50$
 $a = 9,1404$
 $b = -21,234$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$
$$x = \frac{50 - (-21,234)}{9,1404}$$
$$= 7,79 \text{ ppm}$$

Lampiran 8. Gambar Penelitian



**Gambar 8. Sampel Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L).
Roscoe ex Sm)**



Gambar 9. Ekstraksi sampel dengan metode maserasi



Gambar 10. Proses Evaporasi dengan menggunakan alat *rotary evaporator*




Gambar 11. Fraksinasi ekstrak metanol dan N-heksan



Gambar 12. Fraksinasi ekstrak aquadest dan etil asetat





Gambar 13. Hasil Skrining Fitokimia

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 14. Analisis aktivitas antioksidan pada ekstrak dan vitamin C



Gambar 15. Proses analisis sampel uji dengan Spektrofotometer UV-Vis

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Peneliti bernama Rima Amaliah, ia terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Nurbaya dan Amiruddin. Peneliti lahir di Ujungpandang, 1 september 1999 dan memulai jenjang pendidikan pada tahun 2003 pada taman kanak-kanak (TK) An-Nur kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD INP Minasaupa 1 dan menyelesaikannya selama 6 tahun pendidikan. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Sungguminasa dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Kemudian melanjutkannya lagi pada tahun yang sama di SMAN 01 Sungguminasa dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikannya kembali pada tahun yang sama pula di kampus peradaban UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR (UINAM) dan mengambil jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan karena ia bercita-cita ingin menjadi seorang ahli bidang farmasi dan sampai sekarang penulis masih memegang motto **“PANTASKAN DIRIMU DAN LAKUKAN YANG TERBAIK”**