ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DENGAN KOMPLIKASI ULKUS DIABETIK MENGGUNAKAN INTERVENSI APLIKASI *POLYHEXAMETILENE BIGUANIDE* DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Oleh:

SINARWATI
70900120022

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2022

ANALISIS ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DENGAN KOMPLIKASI ULKUS DIABETIK MENGGUNAKAN INTERVENSI APLIKASI *POLYHEXAMETILENE BIGUANIDE* DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR

Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Gelar Ners
Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

SINARWATI
70900120022

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sinarwati, S.Kep
NIM	: 70900120022
Tempat/Tgl Lahir	: Takalar, 10 Juli 1999
Jurusan/Prodi	: Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas	: Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat	: Samata, Gowa
Judul	:Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Intervensi Aplikasi *Polyhexametilene Biguanide* Di Rsud Labuang Baji Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 2022

Penyusun

Sinarwati, S.Kep

70900120022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir Ners / Seminar keperawatan Saudara(i) Sinarwati NIM:70900120022, mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Intervensi Aplikasi Polyhexametilene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar", memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, Januari 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
(Ns Ahmad J, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep MB)	(Ns. Wahdah, S.Kep, M.Kes)

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas akhir ners yang berjudul *"Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe Ii Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Intervensi Aplikasi Polyhexametilene Biguanide Di RSUD Labuang Baji Makassar"* yang disusun oleh Sinarwati, NIM: 70900120022, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at 28 Januari 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 28 Januari 2022
26 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah , Sp.A., M.Kes	( )
Sekertaris	: Dr. Patima, S.Kep., Ns. M.Kep	( )
Munaqisy I	: Maria Ulfa Ashar, S.Kep., Ns., M.kes	( )
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan M.M.Ag	( )
Pembimbing I	: Ahmad J,S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep., MB	( )
Pembimbing II	: Wahdaniah, S.Kep., Ns., M.kes	( )

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah , Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ungkapkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat-Nya yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis yang mana telah memberikan mata untuk melihat, memberikan telinga untuk mendengarkan kebesaran-Nya, memberikan tangan untuk melakukan kebaikan, memberikan kaki untuk melangkah kepada kebenaran, memberikan untuk dipergunakan menyuarakan perintah-perintah Allah diatas muka bumi ini. Salah satu nikmat-Nya pulalah memberikan penulis kekuatan sehingga penulis dapat membuat skripsi yang membahas tentang "Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Intervensi Aplikasi *Polyhexametilene Biguanide* Di Rsud Labuang Baji Makassar". Selanjutnya, salawat dan salam, penulis sanjungkan kepada Baginda Rassulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* Beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa ummat manusia dari alam kebodohan ke alam penuh ilmu pengetahuan. Pembela umat manusia yang tak pernah lelah dalam menyuarakan dan memperbaiki akhlak setiap umat.

Pada penyusunan skripsi ini, selain merupakan usaha penulis dengan maksimal, tidak terlepas dari motivasi dan partisipasi beberapa pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa banyak terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua Orang Tua serta saudara/saudari tercinta yang selalu menjadi *support system* yang tanpa disadarinya tindakan, sikap dan semangatnya yang pantang menyerah diikuti dan dijadikan motivasi oleh anak-anaknya serta tak pernah luput dari kata lupa untuk menasehati, menyemangati dan mendoakan perjalanan hidup penulis hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

sekarang sampai di titik ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan yang tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan dalam menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sejajarannya yang memberikan bantuan kepada penyusun selama mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ketua Prodi Keperawatan serta dosen-dosen pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta telah banyak membantu dalam proses administrasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
4. Ns Ahmad J,S.Kep., M.Kep., Sp., Kep MB selaku Pembimbing I dan Ibu Wahdania S.Kep., Ns., M.Kes selaku Pembimbing II yang dengan sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktunya, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan serta saran yang sangat membangun dan berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Ns Maria Ulfa Azhar S.Kep., M.Kep selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. H.M. Dahlan, M.Ag. selaku Penguji II.
6. Kepada Dr. Patimah, S.Kep., Ns., M.Kep. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan berjalan.
7. Kepada kedua orang tua saya Hasniah Malik Dg Bollo dan Muhammad Basir Dg Naba, terimakasih atas doa yang selalu engkau kirimkan kepada saya sehingga saya bisa berada di tahap ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

8. Kepaada teman saya Dinasari S.kep, Agus Salim S.E dan semua teman-teman bergerak yang insya Allah akan Sukses semua, Aamiin. Serta,
9. Kepada teman-teman Epi16lotis dan profesi Ners yang luar biasa kebersamaannya, bergandengan tangan saling merangkul satu sama lain, baik suka maupun duka dalam proses menggapai cita dan selalu menjadi partner, memberikan motivasi, menasehati, siap membantu penulis dalam keadaan apapun untuk menyelesaikan proses penelitian.

Terakhir, pada intinya penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang yang selalu bersedia memberikan arahan dan motivasi kepada penulis. Diharapkan saran dan masukan dari pembaca untuk dijadikan pembenahan terhadap penelitian ini karena penulis sadar, kesempurnaan hanya milik Allah *Subhanahu wata'ala*.

Samata, ,2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Sinarwati, S.Kep
NIM: 70900120022

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……i

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI viii

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan 5

D. Manfaat 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7

A. Konsep Medis 7

B. Konsep Asuhan Keperawatan 43

C. *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN) 64

BAB III 72

METODOLOGI PENELITIAN 72

A. Rancangan Studi Kasus 72

B. Subyek Studi Kasus 72

C. Fokus Studi Kasus 72

D. Instrumen Studi Kasus 72

E. Prosedur Studi Kasus 73

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus 73

G. Analisis Data dan Penyajian Data 73

H. Etika Studi Kasus 73

BAB IV LAPORAN KASUS 75

A. Pengkajian 75

B. Dagnosis Keperawatan 94

C. Intervensi Keperawatan 95

D. Implementasi Keperawatan 98

E. Evaluasi 103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V PEMBAHASAN 110
A. Analisis Asuhan Keperawatan 110
B. Analisis Intervensi EBPN 118
BAB VI PENUTUP 120
A. Kesimpulan 120
B. Saran-saran 121
REFERENSI.....122
LAMPIRAN……....128

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : **Sinarwati**

NIM : **70900120022**

Judul : **Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Intervensi Aplikasi *Polyhexametilene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar**

Latar Belakang: Diabetes Melitus bisa mengakibatkan berbagai komplikasi salah satunya iyalah ulkus diabetik. Tingkat kejadian ulkus diberbagai Negara mengalami peningkatan. Dalam sebuah Stady menyampaikan bahwa prevalensi Ulkus Dekubitus yang terjadi di ASEAN seperti Jepeang, Korea dan Cina mencapai 2,1% - 18%. Pada tahun 2010 di Inggris prevalensi penderita Ulkus Dekubitus sebanyak 21% dan di Indonesia prevalensi Ulkus Dekubitus akibat luka tekan mencapai 33,3% . **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Efektifitas *Polihexametilene Biguanide* pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi ulkus diabetik. **Metode:** penelitian ini merupakan studi kasus yaitu pemberian intervensi perawatan luka pada pasien Diabetes Melitus tipe II dengan ulkus diabetik menggnakan pengkajian luka *Bates-Jensen Wound Assessment*. **Hasil:** Setelah dilakukan proses asuhan keperawatan selama 3 hari didapatkan hasil terdapat perubahan intervensi *Polihexametilene Beguinade* terhadap perubahan kerusakan jaringan dari tingkat keparahan luka dari skor 34 (sedang) menjadi 28 (ringan). **Kesimpulan:** intervensi perawatan luka dengan *Polihexametilene Biguanide* memberikan perubahan yang baik terhadap proses penyembuhan ulkus diabetik.

Kata Kunci : Diabetes Melitus, Ulkus Diabetik, *Polyhexametilene Biguanide*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diabetes Melitus merupakan keadaan glukosa dalam darah mengalami peningkatan sehingga insulin tidak mampu mengubah glukosa menjadi energy (Suryati, Primal, & Pordiati., 2019). Diabetes Melitus merupakan kumpulan gejala yang timbul pada seseorang akibat tubuh mengalami gangguan dalam mengontrol kadar glukosa dalam darah. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh sekresi hormon insulin yang tidak adekuat, fungsi insulin yang terganggu (resistensi insulin) atau dapat merupakan gabungan dari keduanya. Diabetes Melitus merupakan ketidak mampuan tubuh dalam menggunakan insulin yang dihasilkan ataupun pankreas yang tidak cukup bagus menghasilkan insulin inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit Diabetes Melitus (IDF, 2019).

Menurut Organisasi International Diabetes Federation (IDF) secara global Diabetes Melitus mengalami peningkatan setiap tahunya. Peningkatan ini dilihat dari data yang diperkirakan ditahun 2019 jumlah penderita Diabetes Melitus sebanyak 463 juta jiwa dengan prevalensi 9,3% pada orang dengan usia 20-79 tahun. Diperkirakan seiring bertambahnya umur penduduk pada tahun 2030 akan mencapai 578 juta jiwa dan pada tahun 2045 akan mencapai 700 juta jiwa yang mengalami Diabetes Melitus . Dalam daftar 10 Negara tertinggi penderita Diabetes Melitus Indonesia masuk dalam urutan ke 7 dengan tingkat prevalensi 10,7% sedangkan prevalensi Negara tertinggi yang mengalalami Diabetes Melitu adalah Cina 116,4%, dilanjut oleh India dengan prevalensi 77,0% dan tertinggi ketiga adalah Amerika Serikat dengan prevalensi 31,0%. Meskipun Indonesia masuk dalam urutan 7 ini

menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki kontribusi peningkatan prevalensi Diabetes Melitus di dunia (Kemenkes, 2020).

Peningkatan kejadian Diabetes Melitus juga terjadi di provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi Diabetes Melitus di provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan secara signifikan pada penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun yakni sebesar 1,8% ditahun 2018. Survai data penyakit tidak menular pada kasus Diabetes Melitus pada 46 puskesmas tahun 2018 sebanyak 27.252 kasus Diabetes Melitus dan sebanyak 27.252 (Dinkes Makassar, 2018). Dari data yang diperoleh Dinas Kesehatan Makassar prevalensi Diabetes Melitus pada penduduk semua umur di Indonesia sebanyak 1,5%, sedangkan pada umur diatas 15 tahun sebanyak 2,0%. Prevalensi Diabetes Melitus di daerah perkotaan sebanyak 1,9% sedangkan pedesaan 1,0%. Prevalensi Diabetes Melitus jenis kelamin laki-laki lebih kecil dari pada perempuan dengan banyak prevalensi 1,2% pada laki-laki dan 1,8% pada perempuan (Dinkes Makassar, 2018).

Diabetes Melitus merupakan penyakit kronis yang bersifat progresif, artinya penyakit tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang dengan kondisi yang semakin memburuk. Diabetes Melitus juga dikenal sebagai penyakit yang dapat menimbulkan komplikasi seperti Ulkus Decubitus, amputasi, penyakit lainnya bahkan kematian (Infodatin, 2018). Ulkus Decubitus merupakan salah satu masalah yang sering dialami oleh penderita Diabetes Melitus . Salah satu faktor terjadinya Ulkus Dekubitus adalah adanya keterbatasan gerak maupun lama perawatan dirumah sakit yang mengakibatkan timbulnya Ulkus (Herman et al., 2021).

Tingkat kejadian ulkus diberbagai Negara mengalami peningkatan. Dalam sebuah Stady menyampaikan bahwa prevalensi Ulkus Dekubitus yang terjadi di ASEAN seperti Jepeang, Korea dan Cina mencapai 2,1% - 18%. Pada tahun 2010 di Inggris prevalensi penderita Ulkus Dekubitus sebanyak 21% dan di Indonesia prevalensi Ulkus Dekubitus akibat luka tekan mencapai 33,3% (Herman et al., 2021).

Diabetes Melitus bisa mengakibatkan berbagai komplikasi. Diperkirakan semakin tinggi angka kejadian penderita Diabetes Melitus setiap tahunnya akan memancing semakin banyaknya masalah komplikasi yang akan muncul. Komplikasi-komplikasi yang muncul termasuk Ulkus Dekubitus merupakan masalah yang harus ditangani. Ulkus Decubitus akan mengakibatkan gangguan integritas kulit atau jaringan (Herman et al., 2021). Dalam buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia menjelaskan Gangguan integritas kulit atau jaringan merupakan kerusakan kulit (dermis atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi dan ligament (PPNI, 2016).

Ditemukan kejadian luka ulkus diabetik masi ditemukan di ruang perawatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis selama praktek di ruangan Mamminasa Baji RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, 2 dari 13 pasien rawat inap yang memiliki diagnosa medis Diabetes Melitus memiliki luka Ulkus diabetik. Salah satu dari pasien tersebut sudah melakukan 2 kali amputasi pada kaki kanan akibat luka, dan di jadwalkan akan amputasi ke 3 untuk kaki kiri akibat luka gangreng. Selain luka pada kaki, pasien sudah mengalami ulkus dekubitus akibat lama baring.

Perawatan luka merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani kerusakan integritas kulit dan jaringan. Kerusakan integritas kulit atau jaringan yang dialami oleh pasien Diabetes Melitus merupakan jalan masuk bakteri dan penyebab infeksi. Infeksi yang terjadi di akibatkan oleh peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kerusakan integritas kulit atau luka membutuhkan penangan yang baik dan benar dalam proses penyembuhan. Penanganan yang dilakukan pada masalah kerusakan integritas kulit atau jaringan adalah perawatan luka (Dyah Ayu Yulyastuti, 2021). Dalam buku Standar intervensi Keperawatan Indonesia dijelaskan bahwa Perawatan luka didefinisikan sebagai pengidentifikasian dan peningkatan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka (PPNI, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (Leni, 2020) menjelaskan perawatan luka dengan metode modern dressing mampu mempercepat proses penyembuhan luka. Pada beberapa jenis modern dressing mengandung Antimikroba yang dapat menghambat proses pertumbuhan bakteri gram negative dan positif. Metode modern dressing dinilai efektif dan efisian dalam melakukan perawatan luka baik dari segi waktu, biaya maupun pencegahan infeksi.

Polihhexamethylene Biguanide (PHMB) merupakan salah satu produk perawatan luka yang mengandung Antimikroba. Senyawa sintetik yang terkandung di dalam PHMB memiliki struktur kimia yang sama dengan antimikroba (APM) alamiah pada kerotinosit dan neutrophil sehingga lebih efektif dalam penyembuhan luka (F. Efendi, Kamal, & Margono., 2021). Alasan lain penggunaan PHMB Gel ini karena memiliki banyak keuntungan ketika digunakan pada luka kronis dan akut untuk tingkat penyembuhan luka, diantaranya dapat mendebridement slough, mendorong pembentukan jaringan

granulasi, risiko sensitivitas rendah, memudahkan pengambilan biofilm dan mengurangi koloni bakteri yang dapat memperlambat proses infeksi (Welch & Forder, 2016).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang ”Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar”

B. Rumusan Masalah

Komplikasi berupa ulkus yang terjadi pada penderita Diabetes Melitus merupakan masalah keperawatan yang harus ditangani secara cepat dan tepat. Oleh karena itu peneliti ingin melihat bagaimana Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana intervensi Asuhan Keperawatan Pada Pasien Diabetes Melitus Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunaan Aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini, antara lain untuk :

a. Untuk menganalisis pengkajian Pada Pasien Diabetes Melitus Tipe II Dengan Komplikasi Ulkus Diabetik Menggunakan Aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

b. Untuk menganalisis diagnosis pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.
c. Untuk menganalisis intervensi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.
d. Untuk menganalisis implementasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.
e. Untuk menganalisis evaluasi pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.
f. Untuk menganalisis asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum menggunakan aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.

D. Manfaat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir Ners ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dalam penerapan intervensi perawatan luka pada pasie Diabetes Melitus tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum.

2. Manfaat Aplikatif

Intervensi Aplikasi *Polihhexamethylene Biguanide* (PHMB) diharapkan dapat diterapkan pada pasien Diabetes Melitus Tipe II dengan Komplikasi Ulkus Diabetikum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Medis

I. Diabetes Melitus

A. Definisi Diabetes Melitus

Diabetes adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (atau gula darah), yang dari waktu ke waktu menyebabkan kerusakan serius pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan saraf. Yang paling umum adalah diabetes tipe 2, biasanya pada orang dewasa, yang terjadi ketika tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak membuat cukup insulin. Dalam tiga dekade terakhir prevalensi diabetes tipe 2 telah meningkat secara dramatis di negara-negara dari semua tingkat pendapatan. Diabetes tipe 1, dulu dikenal sebagai diabetes remaja atau diabetes tergantung insulin, adalah kondisi kronis di mana pankreas memproduksi sedikit atau tidak ada insulin dengan sendirinya (Abutaleb, 2016)

Untuk orang yang hidup dengan diabetes, akses ke pengobatan yang terjangkau, termasuk insulin, sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Ada target yang disepakati secara global untuk menghentikan peningkatan diabetes dan obesitas pada tahun 2025. Sekitar 422 juta orang di seluruh dunia menderita diabetes, mayoritas tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dan 1,5 juta kematian secara langsung dikaitkan dengan diabetes setiap tahun. Baik jumlah kasus maupun prevalensi diabetes terus meningkat selama beberapa dekade terakhir (Mitha & Karimah, 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diabetes terjadi ketika tubuh Anda tidak mampu mengambil gula (glukosa) ke dalam sel dan menggunakannya untuk energi. Ini menghasilkan penumpukan gula ekstra dalam aliran darah Anda. Diabetes yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan konsekuensi serius, menyebabkan kerusakan pada berbagai organ dan jaringan tubuh termasuk jantung, ginjal, mata, dan saraf (Mitha & Karimah, 2018).

B. Etiologi

Etiologi DM dapat sangat bervariasi tetapi selalu meliputi: defek pada sekresi atau respon insulin atau keduanya pada suatu saat dalam perjalanan penyakit. Sebagian besar penderita Diabetes Melitus memiliki baik diabetes tipe 1 (yang dimediasi kekebalan atau idiopatik) DM tipe 2 (sebelumnya dikenal sebagai DM tidak tergantung insulin) adalah bentuk paling umum dari DM ditandai dengan hiperglikemia, insulin resistensi, dan defisiensi insulin relatif (JS et al., 2017)

Diabetes tipe 2 disebabkan oleh kombinasi faktor genetik yang berhubungan dengan gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin dan faktor lingkungan seperti obesitas, makan berlebihan, kurang olahraga, dan stres, serta penuaan. Ini biasanya merupakan penyakit multifaktorial yang melibatkan banyak gen dan faktor lingkungan hingga tingkat yang bervariasi. Perkembangan diabetes tipe 2 jelas berhubungan dengan riwayat keluarga diabetes (Mitha & Karimah, 2018).

Tingkat kesesuaian yang lebih tinggi secara signifikan antara kembar monozigot daripada antara kembar dizigotik menunjukkan keterlibatan yang cukup besar dari faktor genetik. Patogenesis diasumsikan melibatkan kelainan genetik pada molekul yang terkait dengan sistem regulasi metabolisme glukosa. Analisis gen kandidat yang ditargetkan pada sekresi insulin yang dirangsang glukosa sel pankreas dan molekul yang menyusun mekanisme molekuler untuk kerja insulin telah mengidentifikasi kelainan genetik yang dapat menjadi penyebab independen patogenesis, termasuk gen glukokinase, gen mitokondria, dan gen reseptor insulin (Putri, Persariningrat, Surialaga, A., & Syamsunarno, 2019)

Abnormalitas genetik yang dilaporkan sejauh ini, semuanya digabungkan, menjelaskan sekitar 30% faktor genetik untuk diabetes, dan pemahaman kita tentang faktor genetik diharapkan praktis lengkap dalam waktu dekat. Menurut klasifikasi jenis penyakit saat ini, kasus diabetes dengan kelainan genetik yang teridentifikasi diklasifikasikan di bawah "yang disebabkan oleh mekanisme spesifik lainnya" atau penyakit.”

1. Faktor genetik. Diabetes

   Pada diabetes tipe 1, pengaruh genetik terkuat diberikan oleh gen di kompleks HLA yang bertanggung jawab untuk sekitar setengah dari kerentanan genetik. Sebaliknya, pengaruh genetik pada risiko diabetes tipe 2 tampaknya tersebar di seluruh genom dan dikaitkan dengan sejumlah besar varian genetik umum masing-masing berkontribusi dalam jumlah kecil terhadap heritabilitas penyakit (Carlsson, 2019)

   Efek terkuat diberikan oleh varian dalam gen faktor *transkripsi 7-like 2* (TCF7L2), yang dikaitkan dengan peningkatan risiko 30%. Mayoritas varian risiko genetik terkait diabetes tipe 2 yang diketahui

terkait dengan sekresi insulin daripada resistensi insulin (Fuchsberger *et al.*, 2016). Mirip dengan diabetes tipe 1, *Latent Autoimmune Diabetes in Adults* (LADA) terkait erat dengan gen di kompleks HLA, dan lebih jauh lagi, risiko tertinggi terlihat pada pembawa haplotipe HLA HLA-DRB1∗04-DQB1∗03:02 dan HLADRB1∗ 03:01-DQB1 02:01, yang juga memberikan risiko diabetes tipe 1 tertinggi (Mishra, Hodge, Cousminer, Leslie, & Grant, 2018)

Gen HLA mengkode kompleks histokompatibilitas utama (MHC) yang mengatur sistem kekebalan, akibatnya temuan ini menunjukkan keterlibatan yang kuat dari sistem kekebalan dalam patogenesis LADA (Andersen dan Hansen, 2018). Selain itu, LADA terkait dengan varian terkait diabetes tipe 1 di luar wilayah HLA termasuk PTPN22, INS, dan SH2B3 (Mishra et al., 2017). Tumpang tindih genetik dengan diabetes tipe 2 juga telah dilaporkan; temuan yang paling konsisten adalah hubungan dengan varian terkait tipe 2 dari TCF7L2. Bukti ini terutama berasal dari studi gen kandidat yang terbesar didasarkan pada 978 kasus LADA keturunan Eropa (Mishra et al., 2017) namun, baru-baru ini studi GWAS pertama tentang LADA diterbitkan termasuk data yang dikumpulkan dari 2634 pasien (Cousminer et al. ., 2018).

Studi ini menegaskan bahwa dasar genetik LADA terutama menyerupai diabetes tipe 1, tetapi juga mencakup varian genetik yang terkait dengan diabetes tipe 2. Yang penting, penelitian yang dilakukan hingga saat ini secara konsisten menunjukkan bahwa kelebihan risiko LADA yang diberikan oleh genotipe HLA jauh lebih kuat daripada risiko yang diamati untuk varian genetik terkait tipe 2 (Andersen dan

Hansen, 2018). Untuk mendukung hal ini, penelitian terbaru tentang riwayat keluarga diabetes menunjukkan bahwa risiko LADA meningkat enam kali lipat pada individu dengan riwayat keluarga diabetes tipe 1 dibandingkan dengan 2 kali lipat pada mereka dengan riwayat keluarga diabetes tipe 2 (Mishra et al., 2017)

2. Gaya hidup

Diabetes Tipe 1 dan Tipe 2

Penuaan, obesitas, konsumsi energi yang tidak mencukupi, minum alkohol, merokok, dll. merupakan faktor risiko independen patogenesis. Obesitas (khususnya obesitas lemak viseral) karena kurang olahraga disertai dengan penurunan massa otot, menginduksi resistensi insulin, dan terkait erat dengan peningkatan pesat jumlah pasien paruh baya dan tinggi. Perubahan sumber energi makanan, terutama peningkatan asupan lemak, penurunan asupan pati, peningkatan konsumsi gula sederhana, dan penurunan asupan serat makanan, berkontribusi terhadap obesitas dan menyebabkan penurunan toleransi glukosa. Bahkan obesitas ringan (BMI 25) menyebabkan peningkatan 4 hingga 5 kali lipat risiko terkena diabetes, jika disertai dengan peningkatan massa lemak visceral (Handersen & Hansen, 2018).

Dukungan kuat untuk peran faktor lingkungan dalam etiologi diabetes autoimun disediakan oleh peningkatan insiden diabetes tipe 1 di seluruh dunia pada anak-anak yang diusulkan mencerminkan lingkungan yang semakin diabetogenik daripada perubahan susunan genetik populasi. Namun, pemicu lingkungan dari autoimunitas dan diabetes tipe 1 telah terbukti sulit untuk dipetakan. Asosiasi dengan

sejumlah faktor gaya hidup telah dilaporkan, termasuk paparan enterovirus, beberapa faktor makanan, penambahan berat badan dan stres psikologis (Mayer-Davis et al., 2017).

Namun demikian, upaya untuk mereplikasi temuan di seluruh studi sering gagal dan studi intervensi sebagian besar tidak berhasil dalam mencegah diabetes tipe 1 pada anak-anak. Lebih banyak diketahui tentang etiologi diabetes tipe 2; risiko terkait erat dengan sejumlah faktor gaya hidup tidak sehat dan di antaranya, kelebihan berat badan adalah faktor risiko terkuat; obesitas dikaitkan dengan peningkatan risiko tujuh kali lipat menurut meta-analisis berdasarkan 18 studi kohort prospektif. Berat badan lahir rendah, diduga mencerminkan malnutrisi janin, juga dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 (Handersen & Hansen, 2018).

Sebaliknya, aktivitas fisik dikaitkan dengan penurunan risiko (Smith et al., 2016), sedangkan waktu duduk (Biswas et al., 2015) dan jam menonton TV (Patterson et al., 2018) secara positif terkait dengan kejadian diabetes tipe 2. Perokok memiliki risiko berlebih yang meningkat secara dosis-respons dengan jumlah rokok. Beberapa faktor diet juga telah dikaitkan dengan diabetes tipe 2 bahkan setelah penyesuaian untuk BMI; Kelompok makanan yang terkait dengan penurunan risiko termasuk gandum utuh, buah dan sayuran, alkohol (sedang vs tanpa asupan) dan kopi, sementara peningkatan risiko dikaitkan dengan konsumsi minuman manis, dan daging merah dan olahan (Schwingshackl, Hoffmann, Lampousi, Knüppel, S., Iqbal, & Schwedhelm, 2017).

Potensi pencegahan diabetes tipe 2 tampaknya cukup besar; sebuah studi baru-baru ini berdasarkan China Kadoorie Biobank termasuk >400.000 peserta memperkirakan bahwa kombinasi BMI yang sehat, rasio pinggang-pinggul (WHR) dan diet bersama-sama dengan tidak merokok dapat mencegah 3/4 dari semua kasus diabetes tipe 2 (Schwingshackl et al., 2017).

Temuan serupa telah dilaporkan di Eropa (Laaksonen et al., 2010) dan pada kelompok etnis yang berbeda di Amerika Serikat (Steinbrecher et al., 2011). Mekanisme biologis yang menghubungkan sebagian besar faktor gaya hidup ini dengan diabetes tipe 2 terutama melibatkan peningkatan resistensi insulin atau efek menguntungkan pada sensitivitas insulin (Petersen dan Shulman, 2006). Karena LADA, selain autoimunitas, tampaknya dicirikan oleh resistensi insulin, dapat dihipotesiskan bahwa faktor lingkungan atau gaya hidup yang diketahui meningkatkan resistensi insulin juga dapat meningkatkan risiko LADA (Schwingshackl et al., 2017).

C. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis pada pasien diabetes serupa pada kedua tipe 1 dan diabetes tipe 2 tetapi intensitas gambaran klinisnya berbeda. Gejala utama termasuk polidipsia (haus berlebihan dan berkepanjangan), polifagia (lapar berlebihan) dan poliuria (kencing berlebihan), penurunan berat badan, kram pada otot-otot anggota badan, penglihatan kabur, sembelit dan kelelahan. Sifat progresif diabetes dari waktu ke waktu dikaitkan dengan dua jenis komplikasi diabetes jangka panjang: makrovaskular dan mikrovaskular. Yang terakhir biasanya terjadi lebih awal dan mungkin melibatkan retinopati, nefropati dan neuropati perifer. Yang pertama dapat

menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, penyakit pembuluh darah perifer dan kerusakan atau kehilangan penglihatan, ekstremitas dan ginjal (Knight, 2017).

Ciri khas diabetes adalah hiperglikemia. Pada pasien diabetes tipe 1, dapat terjadi dengan cepat dengan gejala yang jelas, karena sel beta penghasil insulin pankreas dihancurkan dengan cepat. Pada pasien dengan diabetes tipe 2, hiperglikemia biasanya berkembang secara bertahap selama periode waktu yang lebih lama, menyebabkan gejala yang kurang jelas yang banyak dipelajari untuk dijalani (Abutaleb, 2016)

Beberapa orang dengan diabetes tipe 2 mungkin tidak menunjukkan gejala pada saat diagnosis. Akibatnya, pada diabetes tipe 2, diagnosis sering tertunda, kadang-kadang bertahun-tahun, dan ketika penyakit ini akhirnya dipastikan, kerusakan permanen pada banyak organ dan jaringan mungkin telah terjadi (Nitisha, Nehal, & Kamlesh, 2019)

Onset diabetes tipe 2 yang bertahap dan seringkali berbahaya juga membantu menjelaskan mengapa ada sekitar 1,1 juta orang yang tidak terdiagnosis di Inggris saat ini (Diabetes UK, 2016). Kotak 1 berisi daftar gejala utama yang seharusnya meningkatkan kecurigaan diabetes pada pasien yang tidak terdiagnosis. Pasien yang menggambarkan salah satu atau kombinasi dari gejala yang tercantum dalam Kotak 1 idealnya harus diuji untuk menentukan apakah mereka menderita diabetes atau tidak, serta untuk menyingkirkan kondisi medis lainnya (Knight, 2017).

Gejala diabetes bervariasi tergantung pada seberapa banyak gula darah Anda meningkat. Beberapa orang, terutama mereka yang menderita pradiabetes atau diabetes tipe 2, terkadang tidak mengalami gejala. Pada diabetes tipe 1, gejalanya cenderung datang dengan cepat dan lebih parah.

Beberapa tanda dan gejala diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2 adalah (Knight, 2017).:

1. Rasa haus yang meningkat
2. Sering buang air kecil
3. Kelaparan yang ekstrim
4. Penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan
5. Kehadiran keton dalam urin (keton adalah produk sampingan dari pemecahan otot dan lemak yang terjadi ketika tidak ada cukup insulin yang tersedia)
6. Kelelahan
7. Sifat lekas marah
8. Penglihatan kabur
9. Luka yang lambat sembuh
10. Infeksi yang sering terjadi, seperti infeksi gusi atau kulit dan infeksi vagina

Diabetes tipe 1 dapat berkembang pada usia berapa pun, meskipun sering muncul selama masa kanak-kanak atau remaja. Diabetes tipe 2, tipe yang lebih umum, dapat berkembang pada usia berapa pun, meskipun lebih sering terjadi pada orang yang lebih tua dari 40 tahun.

D. Klasifikasi

Jika ada karakteristik yang dapat menentukan tujuan baru untuk klasifikasi DM, itu adalah niat untuk mengkonsolidasikan pandangan etiologis mengenai DM. Istilah lama dan membingungkan dari insulin-dependent atau non-insulin-dependent yang diusulkan oleh WHO pada tahun 1980 dan 1985 telah menghilang dan istilah sistem klasifikasi baru

mengidentifikasi empat jenis diabetes mellitus: tipe 1, tipe 2, "tipe spesifik lainnya" dan diabetes gestasional (Baynest, 2015).

1. Diabetes Melitus tipe 1

   Diabetes mellitus tipe 1 (diabetes remaja) ditandai dengan beta-penghancuran sel yang disebabkan oleh proses autoimun, biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut. Tipe 1 biasanya ditandai dengan adanya anti-asam glutamat dekarboksilase, sel pulau atau antibodi insulin yang mengidentifikasi proses autoimun yang mengarah pada penghancuran sel beta. Akhirnya, semua pasien diabetes tipe 1 akan memerlukan terapi insulin untuk mempertahankan normglikemia.

2. Diabetes Melitus tipe 2

   Kepentingan relatif dari defek pada sekresi insulin atau pada kerja perifer dari hormon dalam terjadinya DM2 telah dan akan terus menjadi bahan diskusi. DM2 terdiri dari 80% sampai 90% dari semua kasus DM. Kebanyakan individu dengan diabetes tipe 2 menunjukkan obesitas intra-abdominal (visceral), yang berkaitan erat dengan adanya resistensi insulin. Selain itu, hipertensi dan dislipidemia (trigliserida tinggi dan kadar kolesterol HDL rendah; hiperlipidemia postprandial) sering terjadi pada individu ini.

   Ini adalah bentuk paling umum dari diabetes mellitus dan sangat terkait dengan riwayat keluarga diabetes, usia yang lebih tua, obesitas dan kurang olahraga. Ini lebih sering terjadi pada wanita, terutama wanita dengan riwayat diabetes gestasional, dan pada orang kulit hitam, Hispanik

Diabetes dapat diklasifikasikan ke dalam kategori umum berikut:

1. Diabetes tipe 1 (karena penghancuran sel b autoimun, biasanya mengarah ke absolut defisiensi insulin)
2. Diabetes tipe 2 (karena hilangnya sekresi insulin sel b secara progresif yang sering terjadi latar belakang resistensi insulin)
3. Diabetes mellitus gestasional (GDM) (diabetes didiagnosis pada kedua atau ketiga) trimester kehamilan yang tidak jelas diabetes sebelum kehamilan)
4. Jenis diabetes tertentu karena penyebab lain, misalnya sindrom diabetes monogenik (seperti diabetes neonatal dan diabetes onset dewasa muda [MODY]), penyakit pankreas eksokrin (seperti cystic fibrosis dan pankreatitis), dan diabetes yang diinduksi obat atau bahan kimia (seperti dengan penggunaan glukokortikoid, dalam pengobatan HIV/AIDS, atau setelah transplantasi organ) (Knight, 2017).

E. Patofisiologi

Gangguan sekresi insulin dan resistensi insulin berkontribusi lebih atau kurang bersama untuk pengembangan kondisi patofisiologis menurut (Kohei, 2017).

1. Sekresi insulin terganggu

Gangguan sekresi insulin adalah penurunan responsivitas glukosa, yang diamati sebelum onset klinis penyakit. Lebih khusus lagi, gangguan toleransi glukosa (IGT) diinduksi oleh penurunan sekresi insulin fase awal yang responsif terhadap glukosa, dan penurunan sekresi insulin tambahan setelah makan menyebabkan hiperglikemia postprandial. Tes toleransi glukosa oral (OGTT) dalam kasus IGT umumnya menunjukkan respon yang berlebihan pada

individu Barat dan Hispanik, yang memiliki resistensi insulin yang sangat tinggi (JS et al., 2017).

Di sisi lain, pasien Jepang sering menanggapi tes ini dengan penurunan sekresi insulin. Bahkan ketika respons berlebihan terlihat pada orang dengan obesitas atau faktor lain, mereka menunjukkan penurunan respons sekretori fase awal. Penurunan sekresi fase awal merupakan bagian penting dari penyakit ini, dan sangat penting sebagai perubahan patofisiologis dasar selama timbulnya penyakit di semua kelompok etnis(Kohei, 2017).

Gangguan sekresi insulin umumnya progresif, dan perkembangannya melibatkan toksisitas glukosa dan lipotoksisitas. Ketika tidak diobati, ini diketahui menyebabkan penurunan pankreas massa sel β pada hewan percobaan. Progresivitas gangguan fungsi sel β pankreas sangat mempengaruhi pengendalian glukosa darah jangka panjang. Sementara pasien pada tahap awal setelah onset penyakit terutama menunjukkan peningkatan glukosa darah postprandial sebagai akibat dari peningkatan resistensi insulin dan penurunan sekresi fase awal, perkembangan penurunan fungsi sel β pankreas selanjutnya menyebabkan peningkatan permanen glukosa darah (Kohei, 2017).

2. Resistensi insulin

Resistensi insulin adalah suatu kondisi di mana insulin dalam tubuh tidak memberikan tindakan yang cukup sebanding dengan konsentrasi darahnya. Gangguan kerja insulin pada organ target utama seperti hati dan otot adalah gambaran patofisiologi umum dari diabetes tipe 2. Resistensi insulin berkembang dan meluas sebelum timbulnya

penyakit. Penyelidikan mekanisme molekuler untuk kerja insulin telah menjelaskan bagaimana resistensi insulin berhubungan dengan faktor genetik dan faktor lingkungan (hiperglikemia, asam lemak bebas, mekanisme inflamasi, dll). Faktor genetik yang diketahui, tidak hanya mencakup polimorfisme gen reseptor insulin dan substrat reseptor insulin (IRS)-1 yang secara langsung mempengaruhi sinyal insulin tetapi juga polimorfisme gen hemat seperti gen reseptor adrenergik β dan *uncoupling protein gen* (UCP), terkait dengan obesitas visceral dan meningkatkan resistensi insulin. Glukolipotoksisitas dan mediator inflamasi juga penting sebagai mekanisme gangguan sekresi insulin dan gangguan sinyal insulin (Wod, Thomsen, Pedersen, Yderstraede, & Beck-Nielsen, 2018)

Perhatian baru-baru ini telah difokuskan pada keterlibatan zat bioaktif yang diturunkan dari adiposit (adipokines) dalam resistensi insulin. Sementara TNF-, leptin, resistin, dan asam lemak bebas bekerja untuk meningkatkan resistensi, adiponektin meningkatkan resistensi. Tes klinis untuk menilai sejauh mana resistensi insulin meliputi penilaian model homeostasis untuk resistensi insulin (HOMA-IR), uji sensitivitas insulin (loading test), glukosa plasma kondisi mapan (SSPG), analisis model minimal, dan teknik penjepit insulin (Rosyid, 2017).

Indeks Matsuda 4 sekarang mendapatkan pengakuan sebagai prosedur yang relatif sederhana yang secara bersamaan dapat mengevaluasi resistensi insulin di hati dan otot. Setelah melakukan OGTT, indeks ini dihitung dengan rumus: Indeks Matsuda 10.000/ (FPGFPI)(rata-rata PG rata-rata PI), di mana FPG adalah glukosa

plasma puasa dan FPI adalah insulin plasma puasa. Cara yang lebih mudah untuk memperkirakan tingkat resistensi adalah dengan memeriksa adanya insulin darah puasa yang tinggi, obesitas viseral, hipertrigliseridemia, dll (Rosyid, 2017).

a. Penatalaksanaan

Tujuan pengobatan diabetes adalah untuk menjamin kualitas hidup atau *quality of life* (QOL) dan umur yang sebanding dengan orang sehat, dan prasyarat untuk mencapai tujuan ini adalah pencegahan timbulnya dan perkembangan komplikasi vaskular. Risiko penyakit makrovaskular seperti gangguan kardiovaskular (lesi aterosklerotik) sudah meningkat pada individu dengan kadar glukosa darah marginal, menggarisbawahi perlunya intervensi dini.

1. Pendidikan tentang manajemen hari sakit,
2. Kontak dini dengan penyedia layanan kesehatan.
3. Menekankan pentingnya insulin selama sakit dan alasan untuk tidak pernah berhenti tanpa menghubungi tim perawatan kesehatan.
4. Kaji ulang tujuan glukosa darah dan penggunaan suplemen short-or insulin kerja cepat.
5. Memiliki obat yang tersedia untuk menekan demam dan mengobati infeksi.
6. Inisiasi diet cair yang mudah dicerna yang mengandung karbohidrat dan garam saat mual.
7. Pendidikan anggota keluarga tentang manajemen dan pencatatan hari sakit menjaga termasuk menilai dan

mendokumentasikan suhu, glukosa darah, dan tes keton urin/darah; pemberian insulin; asupan oral; dan berat.

8. Perawatan yang efektif untuk mengontrol vaskular komplikasi

   Laporan tentang intervensi untuk mencegah timbulnya diabetes, mengendalikan komplikasi, dan meningkatkan prognosis menunjukkan fakta-fakta berikut:

   a. perbaikan gaya hidup dan obat antidiabetes (-glucosidase inhibitor, metformin, thiazolidine) untuk mengobati IGT menekan risiko pengembangan diabetes tipe
   b. obat SU, metformin, dan insulin efektif dalam mengendalikan penyakit mikrovaskular dan penyakit makrovaskular, dan intervensi dini sangat penting untuk pengendalian penyakit makrovaskular,
   c. intervensi komprehensif termasuk tekanan darah dan manajemen lipid sangat efektif dalam mengendalikan komplikasi vaskular dan mengurangi angka kematian, dan
   d. pioglitazone menekan kekambuhan gangguan kardiovaskular (Wod et al., 2018).

   Lebih awal dan intervensi yang lebih komprehensif (termasuk glukosa darah, tekanan darah, dan lipid) lebih efektif dalam mengendalikan komplikasi vaskular dan meningkatkan prognosis.

9. Alur pengobatan

   Algorisme pengobatan untuk diabetes tipe 2 yang direkomendasikan di Eropa dan Amerika Serikat, berdasarkan hasil United Kingdom Prospective Diabetes Study bertujuan untuk

perawatan hemat biaya di mana perbaikan gaya hidup dan metformin dimulai pada saat yang sama dan pasien yang menunjukkan respons buruk selanjutnya diobati. Dengan penggunaan tambahan obat SU dan terapi insulin. Di sisi lain, praktik umum di Jepang adalah memilih agen hipoglikemik oral yang tepat ketika pasien gagal mencapai target kontrol glukosa darah meskipun pasien cukup. Pendidikan tentang sifat diabetes dan terapi diet dan terapi olahraga selama 2 sampai 3 bulan (Knight, 2017).

Ada lima kelompok agen oral yang saat ini digunakan: obat SU, sekresi insulin kerja cepat stimulator (glinida), biguanida, tiazolidin, dan penghambat –glukosidase beberapa di antaranya adalah obat yang dikembangkan setelah UKPDS. Mengingat perbedaan antara Jepang dan Barat populasi dalam fitur patofisiologi diabetes, dan mempertimbangkan pendirian kita sendiri pada target kontrol glukosa darah dan paradigma pengobatan, adalah logis bahwa kita memerlukan pedoman pengobatan yang berbeda dari yang ada di negara-negara Barat (Knight, 2017).

Hasil terbaru dari studi *Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes* (ACCORD) menunjukkan kemungkinan bahwa terapi intensif yang tiba-tiba kadang-kadang dapat menyebabkan prognosis yang buruk. Di sisi lain, terapi intensif telah dilaporkan untuk mencapai kontrol yang lebih baik dari risiko kardiovaskular di negara-negara berkembang. pasien dengan riwayat penyakit yang lebih pendek. Pengobatan pasien dengan penyakit lama dan riwayat panjang kontrol glukosa darah yang buruk, serta mereka dengan kerusakan pembuluh darah lanjut, harus ditujukan pada perbaikan bertahap

kontrol glukosa darah daripada cepat turun menjadi HbA1c 6% (Nitisha et al., 2019).

F. Komplikasi

Diabetes secara luas diakui sebagai epidemi yang muncul yang memiliki dampak kumulatif di hampir setiap negara, kelompok usia, dan ekonomi di seluruh dunia. Menurut Federasi Diabetes Internasional, pada tahun 2015, sekitar 415 juta orang menderita diabetes di seluruh dunia, dan jumlah ini diperkirakan akan melebihi 640 juta pada tahun 2040. Diperkirakan setengah dari pasien diabetes tidak menyadari penyakitnya dan sehingga lebih rentan untuk mengembangkan komplikasi diabetes. Namun, biaya penanganan diabetes bisa tidak terjangkau dalam hal uang yang dikeluarkan dan nyawa yang hilang. Pada tahun 2015, sekitar 5,0 juta kematian dikaitkan dengan diabetes, meskipun pada tahun yang sama, lebih dari 12% dari pengeluaran kesehatan global didedikasikan untuk mengatasi penyakit dan komplikasinya (Papatheodorou et al., 2018).

Komplikasi diabetes umum terjadi pada pasien dengan diabetes tipe 1 atau tipe 2 tetapi, pada saat yang sama, bertanggung jawab atas morbiditas dan mortalitas yang signifikan. Komplikasi kronis diabetes secara luas dibagi menjadi mikrovaskular dan makrovaskular, dengan yang pertama memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi daripada yang terakhir. Komplikasi mikrovaskular meliputi neuropati, nefropati, dan retinopati, sedangkan komplikasi makrovaskular terdiri dari penyakit kardiovaskular, stroke, dan penyakit arteri perifer (PAD). Sindrom kaki diabetik didefinisikan sebagai adanya ulkus kaki yang berhubungan dengan neuropati, PAD, dan infeksi, dan merupakan penyebab utama amputasi ekstremitas bawah (Papatheodorou et al., 2018).

Terakhir, ada komplikasi diabetes lain yang tidak dapat dimasukkan dalam dua kategori di atas seperti penyakit gigi, penurunan daya tahan terhadap infeksi, dan komplikasi kelahiran pada wanita dengan diabetes gestasional (Papatheodorou et al., 2018).

1. Hipoglikemia dan hipokalemia adalah dua komplikasi umum dengan pengobatan DKA yang berlebihan dengan insulin dan bicarb
2. Asidosis hiperkloremik non-anion gap, yang terlihat selama fase pemulihan DKA, bersifat self-limited dengan beberapa konsekuensi klinis
3. Hal ini mungkin disebabkan oleh hilangnya ketoanion, yang dimetabolisme menjadi bikarbonat selama evolusi KAD dan infus cairan berlebih dari cairan yang mengandung klorida selama pengobatan
4. Edema serebral, yang terjadi pada 0,3-1,0% episode DKA pada anak-anak, sangat jarang pada pasien dewasa selama pengobatan DKA
5. Sejumlah mekanisme telah diusulkan, yang meliputi peran iskemia/hipoksia serebral, pembentukan berbagai mediator inflamasi, peningkatan aliran darah serebral, gangguan transpor ion membran sel, dan pergeseran cepat cairan ekstraseluler dan intraseluler yang mengakibatkan perubahan.
6. Pencegahan mungkin termasuk menghindari hidrasi berlebihan dan penurunan cepat osmolaritas plasma, penurunan bertahap glukosa serum, dan pemeliharaan glukosa serum antara 250-300 mg/dl

sampai osmolalitas serum pasien dinormalisasi dan status mental membaik.

7. Infus manitol dan ventilasi mekanik disarankan untuk pengobatan edema serebral

II. Ulkus Diabetik

A. Definisi

Ulkus kulit adalah luka terbuka yang disebabkan oleh aliran darah yang buruk. Aliran darah yang baik diperlukan untuk penyembuhan luka. Tapi jika Anda memiliki masalah sirkulasi darah, luka ringan tidak bisa sembuh dengan baik. Seiring waktu, cedera bisa berubah menjadi ulkus kulit. Jika terdapat bisul terinfeksi, itu harus segera diobati. Luka yang terinfeksi serius karena infeksi dapat menyebar ke seluruh tubuh.(Wijaya, Budiyanto, Indwiani, & Mustofa, 2019).

Ada beberapa alasan mengapa diabetes meningkatkan peluang terkena bisul. Salah satu gejala utama diabetes adalah gula darah tinggi (juga disebut glukosa darah). Seiring waktu, kadar gula darah yang tinggi dapat merusak saraf dan pembuluh darah. Itu mengurangi aliran darah (terutama ke tangan, kaki, dan anggota tubuh), yang mempersulit luka dan luka untuk sembuh. Itu membuat penderita lebih mungkin terkena infeksi juga. Terlebih lagi, diabetes terkait dengan kondisi yang disebut penyakit arteri perifer (PAP) (Handersen & Hansen, 2018)

Kerusakan saraf juga membuat penderita lebih sulit merasakan sakit atau gejala lain dari bisul atau infeksi. Itu bisa mencegah penderita merawat luka yang lebih kecil sebelum menjadi bisul (Handersen & Hansen, 2018).

B. Etiologi

Ada beberapa komponen yang menyebabkan munculnya dari ulkus diabetik pada pasien diabetes, dapat dibagi menjadi dua faktor utama, yaitu :

1. Faktor penyebab

   a. Neuropati perifer (sensorik, motorik, otonom)

      Faktor penyebab utama dan terpenting. Neuropati sensorik biasanya cukup dalam (>50%) sebelum mengalami kehilangan sensasi protektif yang mengakibatkan kerentanan terhadap trauma fisik dan termal, sehingga meningkatkan risiko ulkus kaki. Tidak hanya sensasi nyeri dan tekanan yang hilang, tetapi proprioception dari sensasi posisi kaki juga hilang. Neuropati motorik mempengaruhi semua otot di kaki, mengakibatkan penonjolan tulang abnormal, arsitektur normal kaki berubah, deformitas khas seperti hammer toe dan hallux rigidus. Adapun neuropati otonom atau autosimpatektomi yang ditandai dengan kulit kering, tidak berkeringat dan peningkatan pengisian kapiler sekunder akibat *arteriovenous shorts* di kulit, memicu terjadinya fisura, kerak kulit, semuanya membuat kaki rentan terhadap trauma minimal

   b. Trauma

      Terutama trauma berulang, 21% trauma akibat gesekan dari alas kaki, 11% karena cedera kaki (kebanyakan karena jatuh), 4% selulitis karena komplikasi tinea pedis dan 4% karena kesalahan potong kuku (Rosyid, 2017).

2. Faktor kontributif

a. Aterosklerosis

Aterosklerosis akibat penyakit pembuluh darah perifer, terutama mengenai pembuluh darah femoroplitea dan pembuluh darah kecil di bawah lutut, merupakan faktor penyumbang yang paling penting. Risiko tukak lambung, dua kali lebih tinggi pada pasien diabetes dibandingkan dengan pasien non-diabetes.

b. Diabetes

Diabetes menyebabkan penyembuhan luka intrinsik, termasuk gangguan kolagen cross-linking, gangguan fungsional matriks metrikoproteinase dan gangguan imunologi, terutama gangguan fungsi PMN. Selain itu, penderita diabetes memiliki tingkat infeksi onikomikosis dan tinea yang lebih tinggi, sehingga kulit mudah terkelupas dan infeksi(Handersen & Hansen, 2018)..

Pada DM, ditandai dengan hiperglikemia berkelanjutan serta peningkatan mediator inflamasi, memicu respons inflamasi, menyebabkan peradangan kronis, tetapi ini dianggap sebagai peradangan tingkat rendah, karena hiperglikemia menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan seluler. Peradangan dan neovaskularisasi adalah penting dalam penyembuhan luka, tetapi harus berurutan, terbatas sendiri dan dikontrol ketat oleh interaksi sel molekuler. Pada DM, respon inflamasi akut dianggap lemah dan angiogenesis terganggu sehingga terjadi gangguan penyembuhan luka (Rosyid, 2017)

Gambar 2.1. *Wound healing disorders in diabetes.*



Sumber: (Rosyid, 2017)

C. Patofisiologi

Aterosklerosis dan neuropati perifer diabetik adalah dua penyebab utama yang menyebabkan komplikasi diabetes seperti ulkus. Aterosklerosis menyebabkan penurunan aliran darah pada pembuluh darah besar dan menengah akibat penebalan membran basal kapiler, hilangnya elastisitas, dan pengendapan lipid di dalam dinding. Arteriosklerosis lebih lanjut menyebabkan iskemia pembuluh darah kecil. Neuropati perifer mempengaruhi sistem saraf sensorik, motorik, dan otonom. Ada penyebab multifaktorial seperti penyakit vaskular yang menyumbat vasa nervorum, disfungsi endotel, hiperosmolaritas kronis, dan efek peningkatan sorbitol dan fruktosa (Jones, 2017).

Pada pasien DM terjadi peningkatan risiko utama terjadinya dan berkembangnya ulkus diabetik yaitu neuropati perifer, penyakit pembuluh darah perifer dan gangguan respon terhadap infeksi. Selain itu, pada DM terdapat gangguan penyembuhan luka yang meningkatkan risiko infeksi. Neuropati pada DM bermanifestasi terhadap motorik, sensorik dan otonom (Jones, 2017).

Kerusakan persarafan menyebabkan ketidakseimbangan sehingga terjadi deformitas dan perubahan titik tekan. Lambat laun akan menyebabkan kerusakan kulit yang berkembang menjadi bisul. Neuropati otonom menurunkan aktivitas kelenjar minyak dan keringat sehingga kelembapan berkurang dan rentan cedera. Neuropati sensorik menurunkan ambang nyeri sehingga sering tidak menyadari adanya luka hingga luka semakin parah

Pada arteri perifer, hiperglikemia menyebabkan disfungsi endotel dan otot pembuluh darah, serta penurunan produksi vasodilator oleh endotel sehingga terjadi konstriksi. Hiperglikemia pada DM meningkatkan tromboksan A2, yaitu avasokontriktor dan agregat agregat trombosit, sehingga meningkatkan risiko hiperkoagulabilitas plasma. Hipertensi dan dislipidemia juga berkontribusi terhadap terjadinya penyakit arteri perifer. Penjelasan di atas akan menyebabkan oklusi arteri penyakit yang kemudian menyebabkan iskemia pada punggung sacral dan meningkatkan risiko ulkus sehingga ulkus yang terbentuk akan mudah terinfeksi dan berkembang (Rosyid, 2017).

Pada DM terjadi penurunan kemampuan penyembuhan jaringan lunak perifer yang berujung pada ulkus. Pada diabetes, terutama pada stadium lanjut dimana struktur jaringan kulit, saraf, pembuluh darah dan

jaringan pendukung lainnya telah rusak, sehingga kontrol glukosa darah tidak lagi cukup untuk memperbaikinya. Lambatnya penyembuhan luka pada DM akan meningkatkan risiko komplikasi luka yang selanjutnya akan memperlambat penyembuhan luka. Komplikasi ini termasuk infeksi (termasuk selulitis, abses dan osteomielitis), gangren dan septikemia (Rosyid, 2017).

D. Manifestasi klinis

Umumnya, ulkus kulit terlihat seperti luka terbuka berbentuk bulat di kulit. Batas luar mungkin terangkat dan tebal. Pada tahap awal, akan melihat perubahan warna kulit di area tersebut. Mungkin terlihat merah dan terasa hangat. Jika memiliki warna kulit yang lebih gelap, mungkin terlihat mengkilap atau biru.Saat kulit semakin parah, itu akan terlihat seperti cairan bening atau darah. Gejala lain tergantung pada jenis dan tingkat keparahan ulkus seperti :

1. Pembengkakan
2. Kemerahan
3. Kelembutan
4. rasa gatal
5. nyeri
6. perubahan warna kulit
7. perubahan tekstur kulit
8. nanah kuning atau hijau (karena infeksi) (Rosyid, 2017)

E. Klasifikasi

Ada empat jenis ulkus kulit. Masing-masing memiliki penyebab yang berbeda dan gejala yang sedikit berbeda. Jenis ulkus kulit Wod et al., (2018) meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

1. Ulkus dekubitus (tekanan)

   Ulkus dekubitus disebabkan oleh tekanan atau gesekan yang terus menerus pada kulit. Mereka juga disebut luka tekan dan luka tekan. Ulkus ini sering berkembang di daerah tulang, karena tulang memberi tekanan ekstra pada kulit. Ulkus dekubitus biasanya mempengaruhi:

   a. Pinggul
   b. Pantat
   c. pergelangan kaki
   d. tumit

2. Ulkus kulit vena

   Ulkus kulit vena disebabkan oleh sirkulasi darah yang buruk di vena kaki. Mereka biasanya mempengaruhi kaki antara lutut dan pergelangan kaki. Sekitar 80 sampai 90 persen dari semua ulkus kaki adalah ulkus vena kaki.

3. Ulkus kulit arteri

   Ulkus arteri, atau borok iskemik, terjadi ketika arteri yang tersumbat menyebabkan aliran darah yang buruk.Ulkus ini biasanya terbentuk pada:

   a. kaki bagian bawah
   b. kaki
   c. tumit
   d. jari kaki
   e. sisi luar pergelangan kaki

   Biasanya, ulkus arteri sangat menyakitkan. Rasa sakit mungkin bertambah buruk di malam hari atau saat kaki tidak bergerak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

4. Ulkus kulit neuropatik

   Ulkus neuropatik disebabkan oleh kerusakan saraf dan penyempitan arteri. Mereka juga disebut ulkus kaki diabetik. Ulkus ini biasanya terjadi pada titik-titik tekanan kaki. Ini termasuk:

   a. Tumit
   b. jari kaki
   c. bagian bawah kaki

F. Penatalaksanaan ulkus diabetik

Tujuan utama dalam pengelolaan ulkus diabetikum adalah penutupan luka. Pengobatan luka pada pasien DM dilakukan secara terus menerus dengan jenis tindakan tergantung dari beratnya ulkus dan ada tidaknya iskemia. Dasar terapi ulkus diabtikum adalah: nekrotomi/debridement, mengurangi beban/tekanan pada area luka (offloading), mengelola infeksi dengan mendiagnosis jenis bakteri, memberikan antibiotik yang memadai dan pengobatan ulkus dengan menggunakan pembalut luka yang bersih dan lembab.

1. Debridement

   Debridement adalah tindakan membuang benda mati, benda asing, dan jaringan tidak sehat yang sulit pulih dari luka. Debridement harus dilakukan pada semua luka kronis untuk menghilangkan jaringan nekrotik dan debris. Tindakan ini dilakukan dengan menghilangkan dasar luka abnormal dan jaringan tepi luka seperti hiperkeratosis epidermal (kalus) dan jaringan dermal nekrotik, debris dan elemen bakteri yang dapat menghambat penyembuhan luka. Dari beberapa studi uji klinis, ditemukan bahwa debridement berperan dalam membantu penyembuhan luka melalui produksi jaringan granulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Debridement merupakan langkah penting dan menentukan dalam penanganan ulkus diabetik sebagai upaya persiapan dasar luka dengan mengubah lingkungan atau lingkungan setempat dari luka kronis menjadi luka akut untuk merangsang dan mempercepat proses penyembuhan luka. debridement, terdapat perdarahan luka baru, sehingga tindakan debridement pada ulkus diabetik akan mampu meningkatkan kadar VEGF sesuai dengan hipotesis Frank et al (2018). Debridement ulkus diabetik yang sering dapat meningkatkan laju penyembuhan luka, meskipun tidak ada cukup bukti untuk menetapkan pendapat ini.

Ada 5 jenis debridement: pembedahan, enzimatik, autolitik, mekanik dan biologik, hanya debridement bedah yang terbukti efektif dalam uji klinis. Debridement bedah adalah debridement tajam untuk menghilangkan semua jaringan dan tulang yang mati. Tujuan debridement adalah untuk mengubah lingkungan penyembuhan luka kronis menjadi penyembuhan luka akut. Debridement enzimatik, menggunakan enzim proteolitik yang dirancang khusus seperti kolagenase, papain/urea dari pepaya, kombinasi fibrinolisis/DNAse, tripsin, streptokinase-streptodornase.

Debridement autolitik, terjadi secara alami pada ulkus yang sehat, lembab dan perfusi. Debridement mekanik, dilakukan secara fisik dengan dry-wet dressing, irigasi tekan, lavage dan hidroterapi. Debridement biologis, menggunakan larva lalat Lucilia sericata yang steril, larva mengeluarkan enzim proteolitik yang dapat mengencerkan jaringan nekrotik (Jones, 2017).

2. Mengurangi beban atau mengurangi tekanan

Pada pasien dengan lesi pada area punggung *sacral*, diperlukan pembongkaran melalui beberapa metode atau alat untuk menggeser tumpuan berat badan menjauh dari sisi ulkus. Tujuan dari offloading ini adalah untuk mencegah trauma jaringan dan memfasilitasi penyembuhan luka. Offloading adalah pengurangan tekanan pada ulkus, menjadi salah satu komponen manajemen ulkus diabetes. Ulserasi biasanya terjadi di area punggung yang mendapat tekanan tinggi. Istirahat di tempat tidur dengan sering mengubah posisi adalah cara yang ideal untuk mengurangi tekanan.

3. Penatalaksanaan infeksi

Ulkus diabetes memungkinkan masuknya bakteri, serta infeksi pada luka. Karena tingginya angka kejadian infeksi pada ulkus diabetikum, pendekatan sistemik diperlukan untuk penilaian yang lengkap. Diagnosis infeksi terutama didasarkan pada kondisi klinis seperti eritema, edema, nyeri, kelembutan, kehangatan dan pelepasan dari nanah. Penentuan derajat infeksi menjadi sangat penting. Menurut penyakit menular masyarakat Amerika membagi infeksi menjadi 3 kategori:

a. Infeksi ringan: jika eritema diperoleh <2 cm,
b. Infeksi sedang: jika eritema > 2 cm dan
c. Infeksi berat: sistemik infeksi.

Ulkus diabetikum dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu: (1) Non-limbal mengancam: selulitis < 2cm dan tidak meluas ke tulang atau sendi dan (2) Mengancam ekstremitas: selulitis> 2 cm dan memiliki tulang dan sendi, dan infeksi sistemik. Penelitian tentang penggunaan

antibiotik sebagai terapi ulkus diabetikum masih kurang, hanya berdasarkan pengalaman klinis. Terapi antibiotik harus didasarkan pada hasil kultur bakteri dan kemampuan toksisitas antibiotik.

Pada infeksi yang tidak mengancam anggota tubuh biasanya disebabkan oleh staphylococcus dan streptococcus. Infeksi ringan dan sedang dapat diobati untuk poliklinik dengan antibiotik oral, seperti sefaleksin, amoksisilin-klavulanat, moksifloxin atau klindamisin. Pada infeksi berat akibat infeksi polimikroba, seperti staphylococcus, streptokokus, Enterobacteriaceae, pseudomonas, enterococcus dan bakteri anaerobik mis. Bacteroides, Pepto cocci, Pepto streptococci. Pada infeksi berat harus dirawat inap, dengan antibiotik yang meliputi gram positif dan gram negatif, serta aerobik dan anaerobik. Pilihan antibiotik intravena untuk infeksi berat termasuk imipenem-cilastatin, B-laktam Blactamase (ampicillin-sulbactam dan piperacilintazobactam) dan sefalosporin spektrum luas (Jones, 2017).

4. Dressing

Dressing adalah bahan yang digunakan secara topikal pada luka untuk melindungi luka dan membantu penyembuhan luka. Balutan akan mengalami kontak langsung dengan luka dan dibedakan dengan plester sebagai pembatas balutan. Ada beberapa jenis dressing: film, komposit, hidrogel, hidrokoloid, alginat, busa dan dressing serap lainnya seperti terapi luka tekanan negatif.

Tujuan utama dari luka tertutup-bersih atau luka granulasi adalah untuk menyediakan lingkungan penyembuhan yang lembab untuk memfasilitasi migrasi sel dan mencegah luka kering. Pilihan pembalut tergantung pada jumlah dan jenis eksudat yang ada pada luka.

Pembalut hidrogel, film, komposit baik digunakan untuk pemotongan dengan sedikit eksudat. Untuk luka dengan jumlah eksudat digunakan hidrokoloid dan untuk luka dengan jumlah eksudat banyak digunakan alginat, busa. Luka dengan jaringan nekrotik yang besar harus dilakukan debridement sebelum dibalut.

Terapi luka tekanan negatif atau penutupan luka dengan vakum menggunakan spons pada luka, ditutup dengan dressing kedap udara, kemudian vakum dipasang. Negatif Terapi luka tekan dapat digunakan untuk luka dengan kebocoran limfatik besar dan fistula. Mekanisme utama NPWT adalah untuk menghilangkan edema, NPWT menghilangkan cairan getah bening atau getah bening di interstisial, sehingga meningkatkan difusi oksigen interstisial ke dalam sel. Terapi luka tekanan negatif juga menghilangkan kolagenase dan enzim MMP yang meningkatkan kadar luka kronis (Jones, 2017).

G. Derajat ulkus diabetikum

Ada beberapa klasifikasi ulkus diabetik dikenal saat ini seperti: klasifikasi Wagner, Universitasof *Texas wound classification system* (UT) dan PEDIS. Klasifikasi Wagner banyak digunakan, menggambarkan luas dan berat ulkus tetapi tidak menggambarkan keadaan iskemia dan inisiatif pengobatan. Kriteria untuk diagnosis infeksi pada ulkus diabetik jika ada atau lebih dari tanda-tanda berikut:

1. Pembengkakan
2. Indurasi
3. eritema di sekitar lesi
4. nyeri lokal
5. teraba lokal kehangatan dan adanya nanah.

Infeksi dibagi menjadi infeksi ringan (dangkal, dalam dan terbatas ukurannya), sedang (lebih dalam dan lebih luas), parah (disertai dengan tanda-tanda sistemik atau gangguan metabolisme). Termasuk dalam infeksi berat seperti *necrotizing fasciitis*, gas gangren, selulitis asenden, ada sindrom kompartemen, infeksi toksisitas sistemik atau ketidakstabilan metabolik yang mengancam kaki dan jiwa pasien (Jones, 2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 2.1 Derajat Luka Ulkus Diabetes Melitus

No.	Derajat luka	Keterangan
1.	Derajat luka I	Lokasi luka Epidermis (lapisan kulit atas). Perubahan temperature kulit (lebih dingin atau lebih hangat), perubahan konsistensi jaringan (lebih keras atau lebih lunak), perubahan sensasi (gatal atau nyeri)
2.	Derajat luka II	Lokasi luka hilangnya sebagian lapisan kulit epidermis. Lukanya superficial, abrasi, melepuh atau membentuk lubang yang dangkal. Ulserasi mengenai dermis dan meluas sampai jaringan adipose, terlihat eritema dan indurasi (melepuh).
3.	Derajat luka III	Lokasi luka hilangnya sebagian lapisan kulit epidermis. Adanya edema, inflamasi, infeksidan dan hilangnya struktur jaringan. Hilangnyalapisan kulit secara lengkap, meliputi kerusakan atau nekrosis dari jaringan subkutan atau lebih dalam, tapi tidak sampai fascia.
4.	Derajat luka IV	Lokasi luka ulserasi dan nekrosis meluas sampai mengenai fascia, otot, tulang serta sendi. Hilangnya lapisan kulit secara lengkap dengan kerusakan yangluas, nekrosis jaringan, kerusakan pada otot, tulang dan tendon.

Sumber: (@appskep, 2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

H. Proses Penyembuhan Luka

Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia dan memainkan peran penting dalam berbagai proses seperti: hidrasi, perlindungan dari bahan kimia dan patogen, inisialisasi sintesis vitamin D, ekskresi dan regulasi termal. Oleh karena itu, kerusakan kulit yang parah dapat mengancam jiwa. Menyembuhkan luka kulit menunjukkan mekanisme fungsi seluler yang luar biasa yang sifatnya khas. Proses perbaikan meliputi: interaksi sel, faktor pertumbuhan dan sitokin yang terlibat dalam penutupan lesi (Particia & Perry, 2015)

Ketidaknyamanan disebabkan oleh cedera, terutama untuk luka kronis, terutama terkait dengan pengobatan dan manajemen prosedur membatasi perbaikan luka, daripada restorasi integritas jaringan (disebut "restitutio ad" integral”). Untuk alasan ini, beberapa penelitian berorientasi pada pencapaian luka yang lebih efektif terapi, untuk mengurangi biaya kesehatan dan memberikan bantuan jangka panjang dan, pada akhirnya, bekas luka yang efektif penyembuhan. Terapi luka kulit diklasifikasikan sebagai "Konvensional" atau "Regeneratif" (Particia & Perry, 2015).

Konvensional terapi mengarah pada pembentukan bekas luka terlepas dari estetika dan kemungkinan perubahan fungsional. Terapi luka regeneratif adalah bidang baru dan berkembang pesat dalam penelitian biomedis; itu bertujuan untukmmengembalikan kulit ke fungsi aslinya, membangun kembali sel-sel yang rusak dan jaringan kulit tanpa jaringan parut. Bagaimanapun, strategi regenerasi harus dianggap sebagai pelengkap perawatan konvensional yang esensial, seperti debridement (Annemarie, 2017).

Obat luka yang berkembang dari alat “pelapis” sederhana hingga pengobatan tingkat lanjut, serta kelebihan dan keterbatasannya dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

proses regenerasi kulit, akan diselidiki. Secara khusus, tinjauan ini difokuskan pada kemajuan dalam pengobatan luka dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Komplikasi utama yang terkait dengan proses penyembuhan dan manajemen klinis luka kronis dijelaskan dalam ulasan. Selain itu, strategi perawatan lanjutan untuk regenerasi kulit dan teknik eksperimental untuk rekayasa seluler dan rekayasa jaringan kulit dibahas. Munculnya teknik regenerasi kulit yang melibatkan perancah yang diaktifkan dengan faktor pertumbuhan, molekul bioaktif, dan sel yang dimodifikasi secara genetik dimanfaatkan untuk mengatasi keterbatasan teknologi penyembuhan luka dan untuk menerapkan desain terapi yang dipersonalisasi (Annemarie, 2017).

Fase penyembuhan luka dibagi menjadi tiga fase, yaitu:

1. Fase Inflamasi

   Fase ini dimulai segera setelah cedera terjadi dan berlangsung selama 0-3 hari yang merupakan respons darurat tubuh terhadap cedera. Tujuan utama dari respon inflamasi adalah untuk mencegah kehilangan darah lebih lanjut melalui vasokonstriksi, yang mengakibatkan bekuan darah atau keropeng. Tanpa respon ini, tidak ada penyembuhan yang dapat terjadi. Setelah pendarahan dihentikan, pembuluh darah di dalam luka melebar.

   Hal ini memungkinkan cairan yang membawa sel-sel yang diperlukan untuk proses penyembuhan masuk ke dalam luka. Sekitar 10-15 menit setelah cedera terjadi, tanda klasik inflamasi tampak jelas di sekitar luka. Ini termasuk munculnya luka merah, panas, bengkak dan nyeri, dan merupakan hasil dari histamin dan prostaglandin di lokasi luka.

2. Fase Proliferasi

Proses ini diibaraktkan seperti rumah. Setelah puing-puing dari kebakaran rumah telah dibersihkan, pembangun dipanggil untuk mengembalikan rumah ke struktur sebelumnya; dalam penyembuhan luka, ini dikenal sebagai fase proliferasi dan biasanya berlangsung 3-24 hari.

Selama fase ini, jaringan baru diregenerasi dan dibangun oleh fibroblas, sel-sel yang bertanggung jawab untuk pengembangan pembuluh darah baru, kolagen dan jaringan ikat lainnya. Kapiler baru yang kecil bergabung bersama dalam perancah di dalam luka; ini berkembang menjadi jaringan granulasi yang mengisi rongga luka. Jaringan granulasi berwarna merah muda pucat tetapi menjadi merah cerah karena lebih banyak pembuluh darah baru berkembang.

3. Fase Manurasi

Fase pematangan dapat diibaratkan seperti mendekorasi ulang rumah setelah kebakaran; itu berlangsung antara 21 hari dan dua tahun. Sel epitel, terletak di folikel rambut utuh, kelenjar keringat dan di sekitar tepi luka, bergerak di atas granulasi yang baru terbentuk jaringan dan mengurangi ukuran luka dengan cara berkontraksi, sehingga menarik tepinya bersama-sama (Makrofag mengatur ulang kolagen di dalam luka yang baru sembuh untuk membentuk bekas luka. Jaringan parut ini akan memudar dari merah menjadi putih seiring waktu ; namun, ini hanya akan mengembalikan 80% kekuatan kulit yang tidak terluka (Annemarie, 2017).

I. PKDM Diabetes Melitus Tipe 2



B. Konsep Asuhan Keperawatan

1. Konsep Teori Keperawatan

Pendekatan Teori Keperawatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Virginia Henderson. Teori Virginia Henderson dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu komponen kebutuhan biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. kebutuhan dasar poin 1-9 termasuk komponen kebutuhan biologis, poin 10 dan 14 termasuk komponen kebutuhan psikologis, poin 11 termasuk kebutuhan spiritual, dan komponen 12 dan 13 termasuk komponen kebutuhan sosiologis. Empat belas kebutuhan dasar manusia yang merupakan dasar dalam pemberian asuhan keperawatan:

1. Bernapas normal, Pasien mampu bernapas tanpa ada gangguan seperti adanya sumbatan jalan napas, adanya penyempitan jalan napas dan gangguana lainnya yang mampu mempengaruhi proses pertukaran gas dalam tubuh.
2. Mengonsumsi makanan dan minuman yang cukup. Pasien mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dan cairan dengan baik.
3. Mengeluarkan buangan tubuh. Pasien nampu melakukan eliminasi dengan baik dan nyaman tanpa adanyamasalah seperti nyeri, adanya pendarahan dan lain-lain.
4. Menggerakkan dan mempertahankan postur tubuh. Pasien mampu melakukan pergerakan secara mandiri,melakukan aktivitas secara mandiri dengan postur tubuh yang baik.
5. Tidur dan beristirahat. Pasien mampu beristirahat dengan tenang tanpa merasakan adanya masalah kekurangan tidur, susah tidur ada gangguan dalam istirahat.

6. Memilih pakaian yang tepat; memilih antara memakai atau melepas pakaian. Pasien mampu menentukan pilihan dalam menggunakan pakaian yang ingin di gunakan dan dilepaskan secara mandiri.
7. Mempertahankan suhu tubuh pada batas normal dengan cara menyesuaikan pakaian dan modifikasi lingkungan. Pasien mampu memilih pakaian yang sesuai dalam mempertahankan suhu tubuh.
8. Mempertahankan kebersihan tubuh, berhias dengan pantas, dan melindungi kulit. Pasien mampu mempertahankan kebersihan kulitnya, melindungi kulit dari adanya luka.dan apabila ada luka pasien mampu melakukan perawatan luka agar terhindar dari peluasan luka yang makin lebar dan dalam. Pasien mampu mengontrol kebersihan luka agar tidak terjadi infeksi.
9. Mencegah aktivitas yang dapat membahayakan orang lain dan lingkungan. Pasien mampu mengonrol pergerakan yang dilakukan agar tidak membahayakan dirinya, orang lain dan lingkungan sekitar.
10. Mampu mengkomunikasikan dan mengungkapkan perasaan, kebutuhan, kekhawatiran, dan pendapat kepada orang lain. Pasien mampu mengepresikan perasaan yang dirasakan seperti marah, senang dan bahagia.
11. Beribadah sesuai keyakinan dirinya. Pasien mampu melakukan ibadah dalam memenuhi kebutuhan spiritualnya.
12. Bekerja sehingga merasa berprestasi. Pasien mampu melakukan pekerjaan secara baik hingga merasakan kepuasan atas kerja yang telah dilakukan.
13. Ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan rekreasi. Pasien mampu berbagi dan melakukan interaksi social dalam menolong seseorang.

14. Belajar, menemukan, atau memuaskan rasa ingin tahu yang mendukung pengembangan diri dan kesehatan yang normal, serta menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia. Pasien mampu mengguanakan pasilitas kesehatan dengan baik, melakukna pemeriksaan jika mersaka ingin melakukan konsultasi kesehatan (Risnah, 2021).

2. Pengkajian Keperawatan

A. Anamnesa

a. Data pasien: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, pekerjaan, alamat, suku bangsa, status perkawinan, tanggal masuk.

b. Keluhan utama : riwayat penyakit, biasanya keluhan utama berupa luka yang tidak kunjung sembuh, luka yang tidak beraturan, keras, kemerahan, bau yang tidak sedap dan kadang-kadang pendarahan.

c. Riwayat kesehatan masa lalu: Riwayat kecelakaan, Dirawat dirumah sakit, Obat-obatan yang pernah diminum dan keturunan.

d. Riwayat kesehatan sekarang: Alasan masuk rumah sakit, keluhan utama, kronologis keluhan yang terjadi (Mayusef Sukmawan., 2020)

B. Data Dasar Pengkajian Pasien

Dalam pengkajian ulkus diabetik data dasar berfokus pada pengkajian luka pasien berfokus pada penilaian warna dasar luka. Selain itu juga dikaji terkait letak luka dan ukuran luka. Peniaian warna dasar luka ini dikenal dengan sistem RYB *(Red, Yellow, Black)*

a. Luka dengan warna dasar merah

Biasanya dapat berwarna merah tua atau merah mudah dan tampak lembab, luka tampak bersih dengan banyak vaskularisasi dan mudah berdarah. Tujuan perawatan dengan luka warna merah dengan

mempertahankan lingkungan luka dalam keadaan lembab dan mencegah pendarahan akibat traumatik.

b. Luka dengan warna dasar kuning

Biasanya dapat berwarna kuning/ kuning kecoklatan/ kuning kehijauan/kuning pucat merupakanj tanda jaringan nekrosis. Kondisi ini merupakan tanda luka yang terkontaminasi, atau terinfeksi dan avaskularisasi. Tujuan perawatannnya dengan meningkatkan *System Autolysis Debrediment* agar luka dapat segera berbwarna merah, menghilangkan bau tidak sedap dan mencegah terjadinyaa infeksi

c. Luka dengan warna dasar hitam

Luka dengan warna ini biasanya dikenal dengan jaringan nekrosis, berwarna hitam dan merupakan jaringan avaskularisasi. Tujuan perawatannya sama dengan luka dasar kuning (Dyah Ayu Yulyastuti, 2021) .

C. Riwayat Kesehatan

a. Riwayat Kesehatan Sekarang

Biasanya klien masuk ke rumah sakit karena adanya ulkus, kulit berwarna merah dan mengeras, bengkak dan nyeri.

b. Riwayat Kesehatan Dahulu

Adanya riwayat keturunan penderita Diabetes Melitus atau faktor usia, lama tirah baring, kegemukan, kebiasaan makan tinggi gula, jarang berolahraga, merokok.

c. Riwayat Kesehatan Keluarga

Adanya keluarga yang mengalami riwayat Diabetes Melitus

D. Pemeriksaan Fisik

a. Kepala: normal, kepala tegak lurus, tulang kepala umumnya bulat dengan tonjolan frontal di bagian anterior dan oksipital dibagian posterior.
b. Rambut: biasanya tersebar merata, tidak terlalu kering, tidak terlalu berminyak.
c. Mata: biasanya tidak ada gangguan bentuk dan fungsi mata. Mata anemis, tidak ikterik, tidak ada nyeri tekan.
d. Telinga: normalnya bentuk dan posisi simetris. Tidak ada tanda-tanda infeksi dan tidak ada gangguan fungsi pendengaran.
e. Hidung: bentuk dan fungsi normal, tidak ada infeksi dan nyeri tekan.
f. Mulut: mukosa bibir kering, tidak ada gangguan perasa
g. Leher: biasanya terjadi pembesaran KGB.
h. Dada: adanya kelainan kulit berupa peau d'orange, dumpling, ulserasi atau tanda-tanda radang.
i. Hepar: biasanya tidak ada pembesaran hepar.
j. Ekstremitas: biasanya terjadi luka pada bagian ektremitas bawah karena luka tekan (Mayusef Sukmawan., 2020)

3. Diagnosis keperawatan

Diagnosa keperawatan yang sering muncul pada kasus ulkus diabetik adalah sebagai berikut.

1. Nyeri Akut
2. Gangguan mobilitas fisik
3. Gangguan integritas jaringan
4. Resiko infeksi

5. Gangguan citra tubuh

Diagnosis tersebut dijelaskan dalam (PPNI, 2016), sebagai berikut :

1. Nyeri Akut

a. Definisi

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan

b. Penyebab

1) Agen pencedera fisiologis (mis. Inflamasi, iskemia, neoplasma)
2) Agen pencedera kimiawi (mis. Terbakar, bahan kimia iritan)
3) Agen pencedera fisik (mis. Abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan)

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengeluh Nyeri

Objektif

1) Tampak meringis
2) Bersikap protektif (mis. Posisi menghindari nyeri)
3) Gelisah
4) Frekuensi nadi meningkat
5) Sulit tidur

d. Gejala dan tanda Minor

Subjektif

Tidak tersedia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Objektif

1) Tekanan darah meningkat
2) Pola napas berubah
3) Nafsu makan berubah
4) Proses berfikir terganggu
5) Menarik diri
6) Berfokus pada diri sendiri
7) Diaphoresis

e. Kondisi klinis terkait

1) Kondisi pembedahan
2) Cedera traumatis
3) Infksi
4) Sindrom korener akut
5) Glaucoma

2. Gangguan mobilitas fisik

a. Definisi

Keterbatasan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri

b. Penyebab

1) Kerusakan intergritas struktur tulang
2) Perubahan metabolisme
3) Ketidakbugaran fisik
4) Penurunan kendali otot
5) Penurunan massa otot
6) Penurunan kekuatan otot
7) Kekakuan sendi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

8) Gangguan muskuloskelatal

9) Nyeri

10) Efek agen farmakologis

11) Kecemasan

12) Gangguan kognitif

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas

Objektif

1) Kekuatan otot menurun

2) Retang gerak menurun

d. Gejala dan tanda Minor

Subjektif

1) Nyeri saat bergerak

2) Enggan melakukan pergerakan

3) Merasa cemas saat bergerak

Objektif

1) Sendi Kaku

2) Gerakan tidak terkoordinasi

3) Gerakan terbatas

4) Fisik Lemah

e. Kondisi Klinis Terkait

1) Stroke

2) Cedera medulla spinalis

3) Trauma

4) Fraktur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

5) Osteoarthritis

6) Ostemalasia

7) Keganasan

3. Gangguan integritas kulit/jaringan

a. Definisi

Kerusakan kulit (dermis atau epidermis) atau jaringan (membrane mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, ligament)

b. Penyebab

1. Perubahan sirkulasi
2. Perubahan status nutrisi
3. Kekurangan/kelebihan volume cairan
4. Penurunan mobilitas
5. Bahan kimia iritan
6. Suhu lingkungan yang ekstrim
7. Factor mekanis (seperti penekanan pada tonjolan tulang, gesekan)
8. Efek samping terapi radiasi
9. Kelmbaban
10. Neuropati feriver
11. Perubahan pigmentasi
12. Perubahan hormonal

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

1) Kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d. Gejala dan tanda Minor

Subjektif

Tidak tersedia

Objektif

1) Nyeri
2) Pendarahan
3) Kemerahan
4) Hematoma

a. Kondisi Klinis Terkait

1) Imobilisasi
2) Gagal jantung kongestif
3) Gagal ginjal
4) Diabetes mellitus
5) Imunodefisiensi

4. Risiko Infeksi

a. Definisi

Beresiko mengalami pengingkatan terserang organisms patogenik

b. Faktor Risiko

1) Penyakit kronis
2) Efek prosedur invasive
3) Melnutrisi
4) Peningkatan paparan organisme pathogen lingkungan
5) Ketidakadekutan pertahanan tubuh primer
   a) Gangguan peristaltic
   b) Kerusakan integritas kulit
   c) Perubahan sekresi pH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

d) Merokok

6) Ketidakadekutan pertahanan tubuh sekunder

a) Penurunan hemoglobin

b) Imununosupresi

c) Leukopenia

c. Kondisi Klinis Terkait

1. AIDS
2. Luka Bakar
3. Penyakit paru obstruktif
4. Tindakan invasive
5. Penyalagunaan obat
6. Kanker
7. Gagal ginjal
8. Gangguan fungsi hati

5. Gangguan Citra Tubuh

a. Definisi

Perubahan persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi fisik individu

b. Penyebab

1) Perubahan struktur/ bentuk tubuh (mis. Amputasi, tasurma, lua bakar)

2) Perubahan fungsi tubuh (mis. Proses penyakit, kehamilan, kelumpuham)

3) Perubahan fungsi kognitif

4) Ketidaksesuaian budaya, keyakinan atau system nilai

5) Gangguan psikososial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

6) Efek tindakan/pengobatan (mis. Pembedahan, kemoterapi, terapi radiasi)

c. Gejala dan Tanda Mayor

Subjektif

Mengungkapkan kecacatan/ kehilangan bagian tubuh

Objektif

1) Kehilangan bagian tubuh
2) Fungsi/struktur tubuh berubah/hilang

d. Gejala dan tanda Minor

Subjektif

1) Tidak mau mengungkapkan kecacatan/kehilangan bagian tubuh
2) Mengungkapkan perasaan negative tentang perubahan tubuh
3) Mengungkapkan kehawatiran pada penolakan/reaksi orang lain
4) Mengungkapkan perubahan gaya hidup

Objektif

1) Menyembunyikan/menunjukkan bagian tubuh secara berlebihan
2) Menghindari melihat dan/atau menyentuh bagian tubuh
3) Focus berlebihan pada perubahan tubuh
4) Respon non verbal pada perubahan dan persepsi tubuh
5) Focus pada penampilan dan kekuatan masa lalu
6) Hubungan sosial berubah

e. Kondisi Klinis Terkait

1) Mastektomi
2) Amputasi
3) Jerawat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

4) Parut atau luka bakar yang terlihat
5) Obesitas
6) Hiperpigmentasi pada kehamilan
7) Gangguan psikiatri
8) Program terapi neoplasma
9) Lopecia Chemically induced

4. Intervensi Keperawatan (PPNI, 2018)**,** (PPNI, 2019)

1. Nyeri Akut

Manajemen Nyeri

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan

Mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat

Kriteria Hasil

Pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambar dan berintraksi ringan hingga berat dan konstan dapat menurut dengan kriteria hasil:

1) Keluhan nyeri menurun
2) Meringis dapat menurun
3) Gelisah dapat menurun
4) Sikap protektif dapat menurun
5) Kesulitan tidur menurun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

b. Intervensi keperawatan dan rasional

1) Observasi

a) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri

Rasional : mengetahui lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri dari pasien

b) Identifikasi skala nyeri

Rasional : mengetahui tingkat nyeri yang dirasakan pasien

c) Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

Rasional : mengetahaui hal-hal yang dapat memperberat ataupun memperingan nyeri yang dirasakan pasien

d) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

Rasional : mengetahui seberapa besar rasa nyeri mempengarui kualitas hidup pasien

2) Terapeutik

a) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

Rasional : mengurangi tingkat nyeri pasien/ mengalihkan pasien dari rasa nyerinya

b) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

Rasional : mengurangi resiko factor yang dapat memperberat nyeri/menimbulkan nyeri

c) Fasilitasi isterahat dan tidur

Rasional : mengalihkan dan memenuhi kebutuhan istrahat pasien

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3) *Edukasi*

a) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

Rasional : memberikan informasi terkait nyeri yang dirasakan pasien

b) Jelaskan strategi mengatasi nyeri

Rasional : membantu pasien mengatasi saat rasa nyeri muncul

c) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

Rasional : pasien dapat mengetahui sendiri karakteristik, penyebak, lokasi saat nyeri muncul

d) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

Rasional : memudahkan pasien untuk mengotrol nyeri dengan cara sederhana

4) *Kolaborasi*

a) Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Rasional : mengurangi/ menghilangkan rasa nyeri yang dirasakan pasien

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Gangguan Mobilitas Fisik

Dukungan Mobilisasi

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan

Menfasilitasi pasien untuk mingkatkan aktivitas pergerakan fisik

Kriteria Hasil

Kemampuan dalam gerakan fisik dari satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dapat meningkat dengan kriteria hasil:

1) Pergerakan ekstremitas meningkat
2) Kekuatas otot meningkat

3) Rentang gerak meningkat

b. Intervensi keperawatan dan rasional

1) Observasi

a) Identifikasi adanya nyeri atau keluahan fisik lainnya

Rasional : mengetahui keluhan lain pasien dan rencana tidakan berikutnya yang dapat dilakukan

b) Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan

Rasional : mengetahui kemampuan dan batasan pasien terkait latiahan/gerak yang akan dilakukan berikutnya

c) Monitor frekuensi dan tekanan darah sebelum dan memulai mobilasasi

Rasional : mengetahui adanya perubahan status kerja frekuensi dan tekanan darah pasien

d) Monitor kondisi umum selama melakukan mobilisasi

Rasional: mengetahui kondisi terkini pasien dan perubahan yang dapat terjadi selama melakukan mobilisasi

2) Terapeutik

a) Fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu (mis. Berpegang pada pagar tempat tidur)

Rasional : memberikan bantuan kepada pasien saat akan melakukan mobilisasi dan mengurangi resiko jatuh/ sakit saat berpindah

b) Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu

Rasional : meningkatkan status mobilitas fisik pasien

c) Libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan

Rasional : keluarga dapat secara mandiri membantu pasien melakukan latihan pergerakan

3) *Edukasi*

a) Jelaskan tujuan dan Prosedur Tindakan

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait tindakan yang akan diberikan

b) Anjurkan mobilisasi dini

Rasional : untuk mengurangi resiko kekakuan dan kelemahan otot yang berkepanjangan

c) Ajarkan mobilisasi sederhana yang dapat dilakukan (mis. Duduk ditempat tidur, duduk disisi tempat tidur)

Rasional : melatih kekuatan otot dan pergerakan pasien agar tidak terjadi kekakuan otot maupun sendi

3. Gangguan Integritas jaringan

Perawatan Luka

a. Tujuan dan kriteria hasil

Tujuan

Mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mengcegah terjadinya komplikasi luka

Kriteria Hasil

Integritas kulit dan jaringan dapat meningkat dengan kriteria hasil:

1) Kerusakan jaringan menurun
2) Kerusakan lapisan kulit menurun
3) Nyeri menurun
4) Pendarahan menurun

b. Intervensi keperawatan dan rasional

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1) *Observasi*

a) Monitor karakteristik luka (drainase, ukuran, warna, bau)

Rasional : mengetahui jenis dan derajat luka

b) Monitor tanda-tanda infeksi

Rasional : mengkaji abnormalitas penyembuhan luka

2) *Terapeutik*

a) Bersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih nontoksik

Rasional : Larutan NaCl memiliki karakteristik cairan tubuh sehingga lebih efektif

b) Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase

Rasional : mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut serta mencegah Maserasi

3) *Edukasi*

a) Jelaskan tanda dan gejala infeksi

Rasional : Edukasi bagi keluarga dan pasien mengenaikondisi yang perlu diwaspadai

b) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein

Rasional : informasi bagi pasien dan keluarga mengenai makanan/ diet yang membantu proses penyembuhan luka

4) Kolaborasi

a) Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

Rasional : sebagai obat yang menghambat perkembangan bakteri

4. Risiko Infeksi

Pencegahan Infeksi

a. Tujuan dan Kriteria Hasil

Tujuan

Mengidentifikasi dan menurunkan risiko terserang organisme patogenik

Kriteria Hasil

Tingkat infeksi menurun dengan kriteria hasil:

a. Demam menurun
b. Nyeri menurun
c. Kadar sel darah putih membaik

b. Intervensi Keperawatan dan rasional

Observasi

1) Monitor tanda dan gejalan infeksi

Rasional : mengetahui tanda dan gejala adanya infeksi

Terapeutik

a. Cuci tangan sesudah dan sebelum kontak dengan pasien

Rasional : mengurangi risiko kontaminasi mikroorganime

b. Pertahankan teknik aseptik

Rasional : mengurangi kontaminasi mikroorganisme

Edukasi

1) Jelaskan tanda dan gejalan infeksi

Rasional : memberikan infoemasi kepada pasien terkait tanda dan gejala infeksi

2) Ajarkan etika batuk

Rasional : mencegah penyebaran mikroorganime saat batuk

Kolaborasi

1) Kolaborasi pemberian antibiotic, jika perlu

Rasional : untuk mencegah terjadinya infeksi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

5. **Gangguan Citra Tubuh**

Promosi Citra Tubuh

c. **Tujuan dan kriteria hasil**

Tujuan

Meningkatkan perbaikan perubahan persepsi terhadap fisik pasien

Kriteria Hasil

Persepsi tentang penampilan, struktur dan fungsi fisik dapat meningkat dengan kriteria hasil:

1) Verbalisasi perasaan negative tentang perubahan tubuh menurun
2) Verbalisasi kekhawatiran pada penolakan orang lain menurun
3) Verbalisasi kehilangan bagian tubuh membaik
4) Menyentuh bagian tubuh membaik
5) Melihat bagian tubuh membaik

d. **Intervensi keperawatan dan rasional**

1) Observasi

a) Identifikasi harapan citra tubuh berdasarkan tahap perkembangan

Rasional : mengetahui harapan pasien terkait kondisi fisiknya sekarang

b) Monitor frekuensi pernyataan kritik terhadap diri sendiri

Rasional : mengetahui seberapa sering pasien mengeluhkan kondisi fisiknya saat ini

c) Monitor apakah pasien bisa melihat bagian tubuh yang berubah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Rasional : mengetahui penerimaan pasien terhadap kondisinya saat ini

2) *Terapeutik*

a) Diskusikan perubahan tubuh dan fungsinya

Rasional : mengetahui gambaran dan persepsi pasien terkait kodisi fisiknya saat ini

b) Diskusikan kondisi stress yang mepengaruhi citra tubuh

Rasional : mengetahui factor pencetus lain yang dapat mempengarui persepsi terhadap citra tubuh

c) Diskusikan persepsi pasien dan keluarga tentang perubahan citra tubuh

Rasional : mengetahu persepsi pasien dan keluarga terkait perubahan citra tubuh

3) *Edukasi*

a) Jelaskan kepada keluarag tentang perawatan perubahan citra tubuh

Rasional : memberikan informasi kepada pasien dan keluarga cara yang tepat untu merawat bagian tubh yang mengalami perubahan

b) Anjurkan mengungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh

Rasional : memberikan ruang kepada pasien untuk mengungkapkan persepsinya terhadap kondisi fisiknya saat ini

c) Latih fungsi tubuh yang dimiliki

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Rasional : mengurangi risiko kekakuan danmelatih kemampuan pasien

C. *Evidence Based Practice in Nursing* (EBPN)

1. Defenisi *Polyhexametilene Biguanide*

Polyhexamethylene biguanide (PHMB), juga dikenal sebagai polyhexanide, adalah senyawa biguanide terpolimerisasi yang digunakan sebagai antiseptik spektrum luas, desinfektan, dan pengawet, lihat Skema. Ini telah terbukti efektif melawan berbagai patogen, termasuk strain Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, dan bahkan Protista Acanthamoeba castellanii . Sebelumnya telah dianggap bekerja terutama melalui gangguan membran mikroba, namun, baru-baru ini dilaporkan juga secara selektif mengikat dan mengembun DNA bakteri, menahan pembelahan sel bakteri (E. Efendi, 2019).

2. Tujuan

Tujuan pemberian *Polyhexamethylene biguanide* (PHMB) pada perawatan luka adalah mempercepat penyembuhan luka.

3. Mekanisme

Mekanisme aksi antimikroba mekanis ini dapat membantu menjelaskan mengapa PHMB memiliki risiko rendah untuk resistensi antimikroba, yang belum pernah ada direkam meskipun pengujian ekstensif sejak sintesis pertama. Sel mamalia relatif tidak terpengaruh oleh polimer karena dipisahkan menjadi endosom, tampaknya melindungi inti dari efek berbahaya, menyebabkan penutupan luka lebih cepat dibandingkan dengan antimikroba lainnya. Ada banyak perawatan antiseptik berbeda yang saat ini digunakan dalam perawatan kesehatan, dan banyak sistem pengiriman yang berbeda sedang diselidiki. Misalnya,

nanopartikel perak telah menunjukkan harapan dalam sistem pengiriman hidrogel dan mikroemulsi, klorheksidin dalam bentuk gel telah menunjukkan sifat antimikroba yang kuat, dan pembalut busa povidone-iodine sepenuhnya mencegah infeksi dalam studi fase 4 prospektif (E. Efendi, 2019).

Dalam hal ini metode untuk perawatan luka memakai dressing luka yang modern dengan menciptakan kondisi lingkungan luka yang lembab menggunakan dressing PHMB Gel (Polyhexamethylene biguanide). PHMB (Polyhexamethylene biguanide) adalah senyawa sintetis yang memiliki struktur serupa sebagai agen dressing antimikroba. Alasan penggnaan PHMB Gel ini karena memiliki banyak keuntungan ketika digunakan pada luka kronis dan akut untuk tingkat penyembuhan luka, diantaranya dapat mendebridement slough, mendorong pembentukan jaringan granulasi, risiko sensitivitas rendah, memudahkan pengambilan biofilm dan mengurangi koloni bakteri yang dapat mengekang infeksi (Welch & Forder, 2016). Selain itu Agen PHMB (Polihhexamethylene Biguanide) terbukti mengurangi rasa sakit lebih efektif daripada perawatan kontrol. Ini kemungkinan terkait dengan pengurangan cepat beban bakteri, karena rasa sakit adalah indikator infeksi dengan spesifisitas 100% (Tan, Mordiffi, & Lang, 2016).

4. Kontraindikasi

Meskipun penelitian komprehensif tentang antiseptik untuk pengendalian infeksi luka, banyak yang memiliki efek samping yang tidak diinginkan atau memiliki sistem pengiriman yang buruk: Perak menyebabkan sensitisasi kulit dan memiliki penetrasi jaringan yang terbatas; klorheksidin menyebabkan sensitisasi kulit; antiseptik berbasis

yodium menodai kulit dan beberapa sistem pengiriman yodium dapat mengurangi penyembuhan luka atau menyebabkan sensitisasi kulit. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut tentang antimikroba alternatif dan sistem pengiriman yang dapat memberikan pengurangan efek samping (E. Efendi, 2019).

5. Prosedur

   Prosedur perawatan mengguanakan Polihexamethylene Biguanide dilakukan dengan Standar Operasional prosedur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Table 2.3 Standar Operasional Prosedur

Perawatan luka menggunakan PHMB Gel *(Polihhexamethylene Biguanide Gel)*

Pengertian	Suatu tehnik aseptik yang bertujuan membersihkan luka dari debris untuk mempercepat proses penyembuhan luka
Tujuan	1. Mencegah infeksi 2. Membantu penyembuhan luka
Indikasi	Perawatan luka akut dan kronis yang berisiko infeksi, dengan eksudat rendah ke sedang.
Alat-alat	1. Pincet anatomi 1 2. Kassa Steril 3. Handscoon 1 pasang. 4. Bengkok 5. Cairan NaCl 0,9% 6. Penggaris luka 7. Underpad/ alas 8. Perekat/ hypafix 9. Sarung tangan/handscone bersih atau steril 10. Dressing Antimikrobial PHMB Gel
Prosedur Perawatan	1. Tahap Persiapan a. Memberitahukan klien tentang tindakan yang akan dilakukan b. Menyiapkan lingkungan klien dan menutup tabir tempat tidur c. Mengatur posisi tidur klien 2. Tahap Kerja a. Mencuci tangan b. Menggunakan sarung tangan disposible c. Basahi luka dengan cairan NaCl 0,9% d. Basahi kasa dengan sabun kemudian cuci luka sampai bersih dari kotoran (gunakan teknik memutar searah jarum jam dari dalam ke area luar e. Lakukan debridement pada jaringan f. Bersihkan menggunakan NaCl 0,9% g. Keringkan daerah luka dan pastikan area daerah luka bersih dari kotoran h. Melakukan pengkajian luka: lokasi, stage, dasar luka (merah, kuning, hijau, hitam, merah), tipe jaringan, pengukuran luka, cairan luka, bau/aroma, tepi luka, kulit sekitar luka, tanda infeksi, nyeri i. Aplikasikan PHMB Gel ke bagian luka lalu tutup dengan secondary dressing j. Aplikasi untuk luka dangkal atau rata: aplikasikan PHMB gel pada luka, aplikasikan kira-kira setebal 1mm 1cm. Tutup dengan dressing sekunder. k. Aplikasi untuk luka yang dalam: bercelah, aplikasikan 1-3 cm PHMB Gel. Tutup atau lapisi luka dengan dressing sekunder tanpa penekanan. k. PHMB Gel dapat digunakan sampai dengan 56 hari sesudah kemasan dibuka l. Merapikan pasien 3. Tahap Terminasi a. Mengevaluasi hasil tindakan b. Berpamitan dengan klien c. Mencuci tangan d. Dokumentas

Sumber: (Lut Titi Handayani, 2016)

6. Kriteria Evaluasi

Evaluasi yang dilihat dari hasil pengaplikasian Polihexamethylene Biguanide adalah bagaimana tingkat keparahan luka ebelum dan seudah dilakuakn imlementasi. Pengukuran dilakukan dengan instrument Pengkajian *Bates-Jensen Wound Assessment.*

Table 2.2 format Pengkajian *Bates-Jensen Wound Assessment*

No	Items	Pengkajian	Hasil	tgl
1	Ukuran Luka	1= P X L < 4 cm 2= P X L 4 < 16cm 3= P X L 16 < 36cm 4= P X L 36 < 80cm 5= P X L > 80cm		
2	Kedalaman	1= stage 1 2= stage 2 3= stage 3 4= stage 4 5= necrosis wound		
3	Tepi Luka	1= samar, tidak jelas terlihat 2= batas tepi terlihat, menyat dengan dasar luka 3= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka 4= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal 5= jelas, fibrotic, parut tebal /hyperkeratonic		
4	GOA (Lubang Luka Dibawah Jaringan Sehat)	1= tidakada 2= goa< 2 cm di di area manapun 3= goa 2-4 cm < 50 % pinggir luka 4= goa 2-4 cm > 50% pinggir luka 5= goa> 4 cm di area manapun		
5	Tipe Jaringan Nekrosis	1 = Tidakada 2= Putih atau abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidaklengket (mudah dihilangkan) 3 = slough mudah dihilangkan 4 = Lengket, lembutdanada jaringan parut palsu berwarna hitam (black eschar) 5 = lengket berbata stegas, keras dan ada black eschar		
6	Jumlah Jaringan Nekrosis	1=Tidak tampak 2= 25% dari dasar luka 3= 25% hingga 50% daridasarluka 4 = 50% hingga < 75% dari dasar luka 5 = 75% hingga 100% dari dasar luka		
7	Tipe Eksudat	1= tidak ada 2= bloody 3= serosanguineous 4= serous		

		5= purulent		
8	Jumlah Eksudat	1= kering 2= moist 3= sedikit 4=sedang 5= banyak		
9	Warna Kulit Sekitar Luka	1= pink atau normal 2= merah terang jika di tekan 3=putih atau pucat atau hipopigmentasi 4=merah gelap / abu2 5=hitam atau hyperpigmentasi		
10	Jaringan Yang Edema	1=no swelling atau edema 2=non pitting edema kurang dari< 4 mm disekitar luka 3=non pitting edema > 4 mm disekitar luka 4=pitting edema kurang dari 4 mm disekitar luka 5 = krepitasi atau pitting edema >4 mm		
11	Pengerasan Jaringan Tepi	1 = Tidak ada 2=Pengerasan < 2 cm di sebagian kecil sekitar luka 3=Pengerasan 2-4 cm menyebar < 50% di tepi luka 4=Pengerasan 2-4 cm menyebar > 50% di tepi luka 5=pengerasan> 4 cm di seluruh tepi luka		
12	Jaringan Granulasi	1= kulit utuh atau stage 1 2= terang 100 % jaringan granulasi 3= terang 50 % jaringan granulasi 4= granulasi 25 % 5= tidak ada jaringan granulasi		
13	Epitelisasi	1=100 % epitelisasi 2= 75 % - 100 % epitelisasi 3= 50 % - 75% epitelisasi 4= 25 % - 50 % epitelisasi 5= < 25 % epitelisasi		
		TOTAL SKOR		

sumber: (Carlsson, 2019)

Gambar 2.2 Wound Status Continuum



Sumber: (Subrata, 2015)

Keterangan :

13-20 : tingkat keparahan minimal

21-30: tingkat keparahan ringan

31-40: tingkat keparahan sedang

41-65: tingkat keparahan ekstrem

7. Artikel utama Polihexamethylene Biguanide dan pendukung

Polihexamethylene Biguanide (PHMB) Gel diindikasikan untuk pembersihan, penyerapan bau luka, dekontaminasi dan pelembab luka akut dan luka kronis pada ulkus kaki diabetik, ulkus kaki, ulkus tekan, luka pasca operasi serta luka bakar (Wound & Solution, 2016). Luka kronis dapat menghasilkan eksudat dan biofilm yang berlebihan, dan membutuhkan antibakteri yang diresapi atau pembalut gel yang tepat untuk mengurangi dan menghilangkan biofilm untuk penyembuhan luka. Berdasarkan jurnal penelitian dengan kasus luka pada Diabetes Melitus tipe 2. Kondisi ulkus berukuran 2,6 cm x 2,6 cm, memiliki 10% slough dan 90% granulasi ke dasar, kalus maserasi dan tingkat eksudat moderat. Kaki menunjukkan tanda-tanda infeksi, termasuk panas dan eritema, dan pasien mengalami peningkatan suhu dan merasa demam serta tidak ada rasa sakit yang dilaporkan karena neuropati. Dalam penatalaksanaan perawatan kaki ulkus diabetik selama 4 minggu menggunakan PHMB (Polihhexamethylene Biguanide) mampu memperlihatkan pengurangan luas luka hingga 53% dari penilaian awal (Welch, 2016)

Penurunan kerusakan integritas kulit dengan aplikasi Polihexamethylene Biguanide juga berhasil dilakuakan pada penelitian (F. Efendi et al., 2021). Penelitian dilakukan selama 12 kali pemberian

dengan hasil sebelum dilakukan perawatan luka, luas luka 34 dan setelah dilakukan perawatan menjadi 26. Perawatan luka menunjukkan adanya pengaruh pemberian Polihexamethylene Biguanide terhadap tingkat keparahan luka. Sejalan dengan penelitian yang dilakuakan oleh (Kurnia, Sumangkut, & Hatibie, 2017) yang mengatakan pemberian Polihexamethylene Biguanide pada luka dapat mempercepat proses penyembuhan luka penyandang Diabetes Melitus dengan ulkus yang disertai infeksi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Studi Kasus

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut (Nasaruddin, Aminullah, & Syarifuddin, 2017) studi kasus adalah pengkajian secara mendalam terhadap suatu kasus. Kasus yang dikaji mulai dari skala umum sampai dengan detail masalah kasus yang akan di angkat. Masalah studi kasus bisa dilakukan secara mendalam dengan proses pengumpulan data dengan wawancara, obervasi lapangan dan dokumentasi.

B. Subyek Studi Kasus

Subjek yang dilakukan penelitian pada studi kasus ini adalah individu atau klien. Kasus yang diangkat pada penelitian ini memiliki kriteria inklusi dan ekslusi. Kriteria inklusis adalah pasien memiliki diagnosa Diabetes melitus, sedang melakukan perawatan, memiliki luka. Kriteria ekslusi adalah klien tidak memiliki masalah kerusakan integritas jaringan.

C. Fokus Studi Kasus

Fokus studi kasus ini adalah melakukan proses asuhan keperawatan terhadap masalah yang akan dikaji secara mendalam. Masalah yang diangkat adalah analisis asuhan keperawatan pada pasien Diabetes Melitus dengan Komplikasi Ulkus Diabetik menggunakan intervensi aplikasi *Polyhexametilene Biguanide* Di RSUD Labuang Baji Makassar.

D. Instrumen Studi Kasus

Instrumen pada penelitian ini menggunakan format pengkajian asuhan keperawatan medikal bedah, format Pengkajian *Bates-Jensen Wound Assessment* untuk melihat tingkat berat luka dan sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur Perawatan luka menggunakan PHMB Gel *(Polihhexamethylene Biguanide Gel).*

E. Prosedur Studi Kasus

Prosedur penelitian berisi tentang uraian proses dalam melakukan studi kasus yang terdiri dari beberapa tahap antara lain: pertama, Persiapan. Persiapan yang dilakukan meliputi pengajuan judul studi kasus. Kedua, Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketiga Penyusunan Laporan. Laporan disusun berdasarkan tahapan penulisan karya tulis ilmiah.

F. Tempat dan Waktu Pengambilan Data Studi Kasus

Penelitian dilakukan di RSUD Labuang Baji Makassar, gedung E lantai 3 ruang perawatan Mamminasa Baji. Pengambilan data dilakukan pada hari Senin, 24 Mei 2021.

G. Analisis Data dan Penyajian Data

Analisis pengkajian data dilakukan secara wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengkajian dilakukan pada saat praktek departemen keperawatan medikal bedah. Hasil pengkajian kemudian dituangkan dalam pendokumentasian secara naratif.

H. Etika Studi Kasus

Prinsip etik keperawatan yang diterapkan saat melakukan penelitian pada kasus ini adalah prinsip *beneficience, fidelity* dan *justice.* Prinsip *beneficience* atau kebaikan adalah memberikan perawatan yang baik dan tidak merugikan. Pada kasus ini pasien tidak mampu melakukan perawatan luka mandiri sehingga tugas sebagai perawat adalah memberikan asuhan keperawatan perawatan luka yang baik dan benar. Perawatan luka yang dilakukan memerluka waktu yang lumayan lama dengan jangka waktu yang panjang

sehingga prinsip etik selanjutnya yangharus dimiliki perawat adalah fidelity atau menepati janji. Perawatan luka yang dilakukan pada kasus ini dilakukan setiap hari secara konsisten.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB IV
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian

I.Identitas

A. Pasien

Nama	: Ny. A
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: 57 Tahun
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Menikah
Pekerjaan	: IRT
Pendidikan Terakhir	: SMA
Alamat	: Pallangga, Gowa
No. Rekam Medik	: 387 ***
Diagnosa Medis	: Diabetes Melitus
Tanggal masuk RS	: 17 Mei 2021
Tanggal Pengkajian	: 24 Mei 2021

B. Penanggung Jawab

Nama	: Tn. H
Umur	: 60 Tahun
Pendidikan	: SMA
Alamat	: Pallangga, Gowa

II.Riwayat Kesehatan

A. Riwayat Penyakit Pasien

1. Riwayat Kesehatan Sekarang

   a. Keluhan Utama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri

b. Kronologi Penyakit Saat Ini

Tn. H mengatakan bulan 01, 2020 pasien melakukan amputasi pertama pada kaki kanan sampai pertengahan betis. 2 bulan kemudian dilakukan amputasi ke 2 pada kaki kanan sampai pertengahan paha karena lukanya membusuk. Kaki kiri pada saat itu baru berair. 1 bulan terakhir kaki kiri sudah menghitam sampai pergelangan kaki dan rencana amputasi sebentar jam 11.00 tanggal 24 Mei 2021. Terdapat luka ulkus diabetik pada pinggang bagian belakang Ny. A yang diakibatkan oleh tirah baring.

c. Apa yang diharapkan pasien dari pelayanan kesehatan

Pasien mengatakan pasrah dengan penyakitnya namun sangat berharap setelah operasi bisa lebih baik lagi.

2. Riwayat Penyakit Masa Lalu

a. Penyakit masa anak-anak

Ny. A mengatakan tidak sakit-sakit waktu anak-anak.

b. Imunisasi

Ny. A mengatakan imunisasinya lengkap.

c. Alergi

Pasien mengatakan tidak memiliki makanan elergi.

d. Pengobatan terakhir

Pasien mengatakan selalu mengontrol penyakitnya ke poli dan dokter.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

B. Riwayat Kesehatan Keluarga

1. Genogram



Keterangan :

	: Laki-laki		: Perkawinan
	: Perempuan		: Serumah
	: Meninggal		: Keturunan
?	: Usia tidak diketahui		: Klien

G1 : Kakek dan Nenek pasien telah meninggal dunia karena faktor Degenerative.

G2 : Ayah dan ibu pasien sudah meninggal. Ibu pasien meninggal karena serangan jantung.

G3 : Pasien 6 bersaudarah.5 saudara pasien meninggal karena riwayat penyakit Diabetes.

a. Dengan siapa klien tinggal dan berapa jumlah keluarga

Keluarga pasien mengatakan tinggal bertiga yaitu pasien, suami dan anaknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

b. Apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit serupa

Keluarga pasien mengatakan 5 saudara dari pasien yang meninggal memiliki riwayat diabetes.

c. Apakah ada keluarga yang mempunya penyakit menular atau menurun

Pasien mengatakan tidak memiliki kelurga yang memiliki penyakit menular.

d. Bagaimana efek yang terjadi pada keluarga bila salah satu anggota keluarga sakit

Pasien mengatakan apabila ada keluarganya sakit maka keluarganya akan saling mendukung.

C. Pengkajian Biologis

1. Rasa Aman Dan Nyaman

a. Apakah ada nyeri : ya

P : Pasien mengatakan nyeri saat bergerak.

Q : Pasien mengatakan nyeri seperti ditekan.

R : Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri dan pinggang bagian belakang.

S : Skala nyeri 4.

T : Pasien mengatakan nyeri hilang timbul. Pasien nampak meringis.

b. Apakah mengganggu aktifitas

Pasien mengatakan nyeri yang dirasakan menggangu aktifitasnya dan kondisinya sekarang sangat tidak nyaman.

c. Apakah yang dilakukan untuk mengurangi/ menghilangkan nyeri

Pasien mengatakan ketika nyerinya timbul pasien hanya diam dan beristigfar.

d. apakah ada riwayat pembedahan

pasien mengatakan ini akan dilakukan operasi ke 3. Pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang.

2. Aktifitas Istirahat Tidur

a. Aktifitas

1) Apakah klien selalu berolahraga? Jenis olahraga

Pasien mengatakan sebelum sakit dirinya sering berolahraga. Pasien mengatakan saat sakit tidak pernah berolahraga, pasien mengatakan hanya bisa beraktifitas ditempat tidur seperti nonton dan makan.

2) Apakah klien menggunakan alat bantu dalam beraktifitas

Nampak semua aktifitas pasien dibantu oleh keluarga

3) Apakah ada gangguan aktifitas

Pasien mengatakan sudah tidak mampu melakukan aktifitas sendiri. Pasien mengatakan semua aktivitas dibantu oleh keluarga.

4) Apakah klien mempunyai keterampilan khusus

Pasien mengatakan pintar masak. Saat sehat pasien sering memasakkan keluarganya.

5) Bagaimana aktifitas klien saat sakit sekarang ini? Apakah perlu bantuan

Pasien mengatakan perlu bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

b. Istirahat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

1) Kapan dan berapa lama klien beristirahat

   Pasien mengatakan sebelum sakit istirahatnya cukup dan selama dirumah sakit dia tidak pernah tenang. Pasien nampak cemas.

2) Apa kegiatan untuk mengisi waktu luang

   Sebelum sakit pasien mengatakan suka memasak didapur.

3) Apakah pengisian waktu luang sesuai hobby

   Iya, Pasien mengtakan hobby memasak, sebelum sakit dia senang memasak.

4) Bagaimana istirahat klien saat sakit sekarang ini

   Pasien mengatakan istirahatnya kurang.

c. Tidur

1) Bagaimana pola tidur klien?

   Pasien susah tidur.

2) Apakah kondisi saat ini menganggu klien

   Pasien mengatakan terganggu dengan kondisi kesehatannya saat ini.

3) Apakah klien terbiasa meminum obat penenang sebelum tidur

   Pasien mengatakan tidak pernah meminum obat tidur.

4) Bagaimana kebiasaan tidur

   Pasien mengatakan sebelum sakit sebelum tidur nonton Tv bersama keluarga dan saat sakit pasien mengatakan sebelum tidur cerita-cerita dengan suaminya.

5) Berapa jam klien tidur? Bagaimana kualitas tidurnya?

   Sebelum sakit pasien tidur 8 jam dan saat sakit pasien tidur 7 jam.

6) Apakah klien sering terjaga saat tidur

Pasien mengatakan kadang terjaga.

7) Pernahkan mengalami gangguan tidur

Pasien mengatakan akhir-akhir ini seing cemas karena akan diakukan amputasi.

8) Apa hal yang ditimbulkan akibat gangguan tersebut

Pasien mengatakan cemas. Pasien nampak gelisah.

d. Cairan

1) Berapa banyak klien minum perhari

Pasien mengatakan sebelum sakit minum <1L/hari. Pasien mengatakan saat sakit minum >1,5 L/hari.

2) Minuman apa yang disukai klien dan yang biasa diminum klien

Pasien mengatakan sebelum sakit suka minum minuman yang berasa, setelah sakit pasien hanya minum air putih.

3) Apakah ada minuman yang disukai/pantangan

Pasien mengatakan suka minum susu tapi sekarang sakit jadi pasien tidak minum susu lagi.

4) Apakah klien terbiasa minum alkohol

Pasien mengatakn tidak minum alkohol.

5) Bagaimana pola pemenuhan cairan perhari

Pasien mengatakan saat haus, ia minum.

6) Ada program pembatasan cairan

Pasien mengatakan tidak ada pembatasan cairan.

e. Nutrisi

1) Apa yang biasa dimakan klien tiap hari

Pasien mengatakan makan nasi, ikan dan sayur.

2) Bagaimana pola pemenuhan nutris klien? Berapa kali perhari

   Sebelum sakit pasien mengatakan makan 3 kali sehari denganporsi basar. Saat sakit pasien mengatakan makan 3 kali sehari dengan porsih yang di takar.

3) Apakah ada makanan kesukaan, makanan yang dipantang

   Pasien mengatakan suka makan nasi kuning. Dan tidak ada makanan pantangan.

4) Apakah ada riwayat alergi terhadap makanan

   Pasien mengatakan tidak memiliki riwayat elergi makanan.

5) Apakah ada kesulitan menelan? Mengunyah?

   Pasien mengatakan tidak memiliki kesulitan dalam menelan.

6) Apakaha ada alat bantu dalam makan? Sonde, infus

   Nampak tidak terpasang alat bantu makan.

7) Apakah ada yang menyebabkan gangguan pencernaan

   Pasien mengatakan tidak memiliki gangguan pencernaan.

8) Bagaimanan kondisi gigi geligi klien? Jumlah gigi? Gigi palsu? Kekuatan gigi?

   Nampak gigi pasien masi utuh semua.

9) Ada riwayat pembedahan dan pengobatan yang berkaitan dengan sistem pencernaan

   Tidak ada.

10) Adakah program diet bagi klien? Jenis? Bila ada, jelaskan secara rinci

    Pasien mengatakan hanya mengurangi porsi makan nasinya setiap kali makan.

f. Eliminasi: Urine dan Feses

1) Elimisasi feses

a) Bagaimana pola klien dalam defekasi? Kapan, pola dan karakteristik feses?

Pasien buang air besar 1 kali sehari di pagi hari.

b) Apakah terbiasa menggunakan obat pencahar

Pasien mengatakan tidak pernah menggunakan obat pelancar BAB.

c) Apakah ada kesulitan

Pasien mengatakan tidak memiliki masalah dalam BAB.

d) Usaha yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah

Pasien mengatakan sampai sekarang belum pernah memiliki masalah BAB.

e) Apakah klien menggunakan alat bantu defekasi

Nampak pasien BAB di tempat tidur. Setiap pagi keluarga membersihkan popok yang digunakan pasien.

2) Eliminasi urine

a) Apakah BAK klien teratur?

Pasien mengatakan BAK sekitar 5-6 kali sehari.

b) Bagaimana polam frekuensi, waktu, karakteristik, serta perubahan yang terjadi dalam miksi

Pasien mengatakan ganti popok 1-2 kali sehari.

c) Bagaimana pola perubahan miksi klien

Pasien mengatakan BAK sesuai berapa yang dia minum, jika minum banyak maka akan BAK lebih berkali-kali.

d) Apakah ada riwayat pembedahan, apakah menggunakan alat bantu dalam miksi

Pasien mengatakan pernah di lakukan pembedah pada kaki, nampak terpasang kateter urin.

e) Bila menggunakan alat bantu sudah berapa lama

Pasien nampak menggunakan kateter urin dan popok. Keluarga pasien mengatakan pasien menggunakan kateter urin setelah dilakukan operasi sedangkan menggunakan popok dewasa sudah lama sejak pasien tidak bisa lagi melakukan aktivitas secara mandiri.

g. Kebutuhan Oksigenasi dan Karbondioksida

1) Pernapasan

a) Apakah ada kesulitan dalam bernafas? Bunyi nafas?

Pasien mengatakan tidak memiliki gangguan dalam bernapas. Tidak ada suara napas tambahan.

b) Apakah yang dilakukan klien untuk mengatasi masalah

Pasien mengatakan tidak memiliki masalah dalam pernapasan.

c) Posisi yang nyaman bagi pasien

Pasien mengatakan nyaman berbaring. pasien nampak terbaring.

d) Apakah klien terbiasa merokok? Obat-obatan untuk melancarkan pernapasan?

Pasien mengatakan tidak merokok, pasien tidak menggunakan obat untuk melancarka pernapasan.

e) Apakah ada alergi terhadap debu, obat-obatan dan lain-lain

Pasien mengatakan tidak memiliki elergi debu dan lain-lain.

f) Apakah klien pernah dirawat dengan gangguan pernapasan

Pasien mengatakan tidak pernah dirawat dengan gangguan pernapasan.

2) Kardiovaskuler

a) Apakah klien cepat lelah

Pasien mengatakan tidak muda lelah.

b) Apakah ada keluhan berdebar-debar? Nyeridada yang menyebar? Pusing? Rasa berat didada?

Pasien mengatakan tidak memiliki gejala seperti itu.

c) Apakah klien menggunakan alat pacu jantung

Pasien mengatakan tidak menggunakan alat pacu jantung.

d) Apakah klien mendapat obat untuk mengatasi gangguan kardiovaskuler

Pasien mengatakan tidak mengkonsumsi obat jantung.

h. Personal Hygiene

1) Bagaimana pola personal hygiene ? berapa kali mandi, gosok gigi, dan lain-lain

Sebelum sakit pasien mengatakan mandi 2 kali sehari dan selama sakit nampak suami pasien memandikan pasien 1 kali sehari dipagi hari.

2) Berapa hari klien terbiasa cuci rambut

Pasien mengatakan sebelum sakit cuci rambut 2 kali seminggu, saat sakit pasien di cucikan rambutnya 1 kali seminggu.

3) Apakah klien memerlukan bantuan dalam melakukan personal hygiene.

Pasien nampak menggunakan bantuan dari suami dan perawat dalam melakukan personal hygiene

i. Sex

1) Apakah ada kesulitan dalam hubungan seksual

Pasien mengatakan selama sakit, pasien dan suami tidak pernah berhubungan seksual.

2) Apakah penyakit sekarang mempengaruhi/menganggu fungsi seksual.

Suami pasien mengatakan istrinya sudah tidak bisa lagi.

D. Pengkajian Psikososial Dan Spiritual

1. Psikologi

a. Status emosi

1) Pasien nampak mampu mengekspresikan perasaannya.

2) Pasien nampak cemas.

3) Pasien nampak khawatir untuk menghadapi meja operasi.

b. Konsep diri

1) Pasien mengatakan dia seorang istri yang memiliki 5 orang anak.

2) Pasien mengatakan dia harus sembuh dengan kondisinya yang sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

3) Pasien nampak berbaring di tempat tidur dan nampak bercerita kepada anak-anaknya.

2. Hubungan Sosial
   1) Pasien megatakan memilik banyak teman.
   2) Pasien mengatakan tetangganya sangat baik.
   3) Pasien mengatakan sangat mempercayai suaminya.
3. Spiritual
   1) Pasien beragama islam.
   2) Pasien mengatakan tidak terlalu percaya dengan dukun.
   3) Selama sakit pasien tidak perna sholat.

III.Pemeriksaan Fisik

1. Kesadaran : Composimentris GCS:15
2. Kesadaran umum : tampak lemah
3. TTV sign TD : 110/70 MmHg P : 20 x/i
   N : 88 x/I S : 36,5°C
   Spo2 : 95%
4. TB : 152 cm IMT : 31,3
   BB : 72 kg
5. Warna kulit : coklat
6. Kelainan kulit : struktur kulit luka-luka dan kering.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Pemeriksaan Head To Tde

	Keadaan Umum Pasien
Kepala	- Bentuk kepala bulat, normal, kulit kepala bersih, rambut warna hitam. - Mata nampak bersih, penglihatan normal, refleks pupil baik, sklera putih, konjungtiva merah muda. - Telinga nampak bersih, tidak ada sekret, tidak ada nyeri telinga, pendengaran bagus. - Hidung nampak bersih, tidak ada nyeri tekan, penciuman baik. - Mulut nampak bersih, gigi sedikit warna kuning, gigi sebagian sudah tida ada, lidah bersih, perasa bagus.
Leher	- Inpeksi: leher nampak simetris, tidak ada udem atau pembesaran kelenjar tiroid. - Palpasi: pasien menngatakan tidak ada nyeri telan.
Dada	- Inspeksi : bentuk dada simetris, pernafasan 20 x/i, tidak ada pernafasan cuping hidung, tidak ada otot bantu pernapasan. - auskultasi : tidak ada suara tambahan, bentuk dada sama antara kiri dan kanan, ekspansi paru simetris antara kiri dan kanan. - Perkusi : suara sonor - Palpasi : tidak terdapat nyeri tekan, RR : 20 x/i.
Abdomen	- Inspeksi : perut nampak simetris, warna kulit coklat, turgor kulit bagus, tidak ada bekas luka. - Auskultasi : peristaltik usus 10 x/i. - Perkusi : tidak ada penumpukan cairan, tidak ada kembung/udara. - Palpasi : kekuatan otot lemah, tidak ada massa/tumor, tida teraba adanya pembesaran hepar.
Genetalia	- Inspeksi : Terpasang kateter. - Palpasi : Tida teraba penumpukan urine.
Ekstremitas	- Atas : pasien memiliki jari-jari tangan lengkap, terpasang infus NaCl. - Bawah : kekuatan otot menurun $\begin{array}{c\|c} 4 & 4 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$ Kaki sudah teramputasi pada kaki kiri dan kanan hingga paha. Terdapat luka lecet pada sela-sela selangkangan pasien. Terdapat ulkus pada pinggang bagian belakang pasien. Luas luka 6x4 cm, ada bauh, warna luka merah gelap, kedalaman luka 4 cm.

Tabel 4. 1 Pemeriksaan Fisik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

IV.**Pemeriksaan Penunjang** ; Tanggal 21-05-2021

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Rujukan	Satuan
Darah Rutin			
WBC	19.44	4.0-10.0	10^3/ul
GRA	15.60	1.3-6.7	10^3/ul
HCT	31.0	40-50	%
MCV	79.1	80.0-96.0	fL
GRA	80.2	50-70	%
PLT	574	150-400	10^3/ul
Kimia darah			
Glukosa darah sewaktu	160	< 200	mg/dL

Tabel 4.2 Pemeriksaan Penunjang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

V.Terapi Yang Diberikan

1. Metronidazole adalah obat antibiotic untuk infeksi bakteri. 8 jam / IV
2. Meropenum adalah obat antibiotic untuk menghentikan pertumbuhan dan perkembangan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dan perkembangan bakteri dengan cara menghambat pembentukan dinding dengan sel bakteri. 8 jam / IV
3. Ameprazole adalah obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit-penyakit refluks gustroesofagus, ulku peptikum dan sindrom zollinger-ellison. 40 mg / hari
4. Cairan NaCl 0,9% untuk pemenuhan cairan. 20 tpm
5. Prontosan pemberih luka 1x / hari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Klasifikasi Data

Nama : Ny. A No. Rekam Medik : 387 ***

Umur : 57 Tahun Diagnosa : DM

Data Subjektif	Data Objektif
1. Pasien mengatakan nyeri saat bergerak 2. Pasien mengatakan hanya bisa beraktivitas ditempat tidur seperti nonton dan makan. 3. Pasien mengatakan semua aktivitas dibantu oleh keluarga 4. Pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang 5. Pasien mengatakan tidak berdaya 6. P : Pasien mengatakan nyeri saat bergerak. Q : Pasien mengatakan nyeri seperti ditekan. R : Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri dan pinggang bagian belakang. S : Skala nyeri 4. T : Pasien mengatakan nyeri hilang timbul.	1. Penyakit Diabetes Melitus 2. Satu bulan terakhir kaki kiri sudah hitam sampai pergelangan kaki dan rencana amputasi sebentar jam 11.00 tanggal 24/05/2021 3. Struktur kulit luka-luka 4. Terdapat ulkus diabetik pada pinggang bagian belakang. Luas luka 6x4 cm, ada bauh, warna luka merah gelap, kedalaman luka 4 cm. 5. Kekuatan otot menurun $\frac{4 \mid 4}{3 \mid 3}$ 6. Terpasang kateter urin 7. Terpasang infus 8. Kedua kaki sudah teramputasi 9. Pasien tampak meringis 10. Pasien susah tidur 11. Pasien nampak gelisah 12. TTV TD: 100/70 MmHg N : 88 x/i P : 20 x/i S : 36,5 ^{0}C Spo_2 : 95%

Tabel 4.3 Klasifikasi Data

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Analisa Data

Nama : Ny. A No. Rekam Medik : 387 ***

Umur : 57 Tahun Diagnosa : DM

No	Data	Etiologi	Masalah
1	Ds : - Do : 1. Terdapat ulkus diabetik pada pinggang bagian belang. 2. Struktur kulit luka-luka. 3. Satu bulan terakhir kakikiri sudah hitam sampai pergelangan kaki. 4. Diagnose medis Diabetes Melitus	Faktor genetic ↓ Kerusakan pankreas ↓ Resistensi insulin ↓ Glukosa dalam sel menurun ↓ Glukosa dalam darah meningkat (Hiperglikemia) ↓ Arterosklerosis ↓ Mirkoangiopati ↓ Sensibilitas menurun (Neuropati) ↓ Mudah terluka ↓ Gangguan integritas kulit/ jaringan	Gangguan Integritas Jaringan
2	Ds : 1. Pasien mengatakan nyeri saat bergerak 2. Pasien mengatakan hanya bisa beraktifitas ditempat tidur seperti nonton dan makan. 3. Pasien mengatakan semua aktivitas dibantu oleh keluarga. Do : 1. Kedua kaki sudah teramputasi 2. Kekuatan otot menurun 4 | 4 3 | 3 3. Terpaang kateter urin 4. Terpasang infus NaCl	Faktor genetic ↓ Kerusakan pankreas ↓ Resistensi insulin ↓ Glukosa dalam sel menurun ↓ Glukosa dalam darah meningkat (Hiperglikemia) ↓ Arterioklerosis ↓ alirran darah lambat, iskemik ↓ Dekubitus ↓ Luka, susah sembuh ↓ Amputasi ↓ Gangguan Mobilitas Fisik	Gangguan Mobilitas Fisik
3	Ds : P : Pasien mengatakan nyeri saat bergerak. Q : Pasien mengatakan nyeri seperti ditekan.	Faktor genetic ↓ Kerusakan pankreas ↓ Resistensi insulin ↓	Nyeri Akut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

	R : Pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri dan pinggang bagian belakang. S : Skala nyeri 4. T : Pasien mengatakan nyeri hilang timbul. Do : 1. Pasien tampak meringis 2. TTV TD: 100/70 MmHg N : 88 x/i P : 20 x/i S : 36,5 ^{0}C Spo_2 : 95%	Glukosa dalam sel menurun ↓ Glukosa dalam darah meningkat (Hiperglikemia) ↓ Arteroklerosis ↓ Aliran darah lambat ↓ Iskemik jaringan ↓ Dekubitus ↓ Luka susah sembuh ↓ Amputasi ↓ Pelepasan mediator kimia (bradikinin, prostaglandin) ↓ Dipersepsikan di hipotalamus ↓ Infus kesaraf yang luka atau cedera ↓ Nyeri Akut	
4	Ds : 1. Pasien mengatakan khawatir dengan kondisinya sekarang 2. Pasien mengatakan tidak berdaya Do : 1. Pasien nampak gelisah 2. Pasien susah tidur 3. TTV TD: 100/70 MmHg N : 88 x/i P : 20 x/i S : 36,5 ^{0}C Spo_2 : 95%	Faktor genetic ↓ Kerusakan pankreas ↓ Resistensi insulin ↓ Glukosa dalam sel menurun ↓ Glukosa dalam darah meningkat (Hiperglikemia) ↓ Anabolisme protein menurun ↓ Kerusakan pada antibody ↓ Kekebalan tubuh menurun ↓ Neuropati sensori perifer ↓ Nekrosis luka ↓ Lama perawatan luka ↓ Kurang terpapar informasi ↓ Kurang pengetahuan ↓ Ansietas	Ansietas
5	Faktor Resiko 1. Diagnose medis Diabetes	Faktor genetic ↓ Kerusakan pankreas ↓	Resiko Infeksi

	Melitus 2. Terdapat ulkus diabetic pada pinggang bagian belakang 3. Luka bekas amputasi paha sebelah kiri.	Resistensi insulin ↓ Glukosa dalam sel menurun ↓ Glukosa dalam darah meningkat (Hiperglikemia) ↓ Arteroklerosis ↓ Aliran darah lambat ↓ iskemik jaringan ↓ Dekubitus ↓ Resiko Infeksi	

Tabel 4.4 Analisis Data

B. Dagnosis Keperawatan

1. Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/ melindungi integritas jaringan dibuktikan dengan kerusakan jaringan atai lapisan kulit.
2. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan gerak terbatas.
3. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis.
4. Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan sulit tidur.
5. Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas kulit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

C. Intervensi Keperawatan

Nama : Ny. A No. Rekam Medik : 387 ***

Umur : 57 Tahun Diagnosa : DM

No.	Diagnosa Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi	Rasional
1.	Gangguan integritas jaringan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang upaya mempertahankan/ melindungi integritas jaringan dibuktikan dengan kerusakan jaringan.	Setelah dilakukan tidakan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan integritas jaringan meningkat dengan kriteria hasil: kerusakan lapian jaringan sedang (3).	Perawatan Luka Observasi : 1. Monitor karakteristik luka 2. Monitor tanda-tanda infeksi Terapeutik : 3. Perawatan luka 4. Ubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring Edukasi : 5. Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein	1. Untuk mengetahui terjadinya gangguan integritas jaringan. 2. Untuk mengetahui proses perkembangan luka 3. Untuk mempercepatprosespenyembuhan luka. 4. Untuk mengurangi proses terjadinya kerusakan integritas jaringan pasien 5. Untuk meningkatkan supan nutrisi
2.	Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot dibuktikan dengan gerak terbatas.	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan 3x24 jam maka diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ektremitas meningkat dari 4 | 4 menjadi 5 | 5 3 | 3 3 | 3	Dukungan mobilisasi Observasi : 1. Identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya 2. Identifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan 3. Monitor kondisi umum selama melakukan pergerakan Terapeutik : 4. Fasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu 5. Libatkan keluarga untuk membantu	1. Untuk mengetahui lokasi nyeri yang dirasakan pasien 2. Untuk meminimalkan terjadinya cedera 3. Untuk mengetahui tingkat kemempuan pasien dalam melakukan mobilissasi 4. Untuk membantu pasien dalam melakukan pergerakan 5. Untuk memberikan semangat akan rasa

			pasien dalam melakukan pergerakan Edukasi : 6. Anjurkan melakukan mobilisasi dini	peduli untuk pasien 6. Untuk melatih otot pasien melakukan pergerakan sedikit demi sedikit.
3.	Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dibuktikan dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis.	Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, maka diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil : keluhan nyeri menurun	Manajemen nyeri Observasi : 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi respon nyeri non verbal 4. Identifikasi faktor yang memperberat dan meringankan nyeri Terapeutik : 5. Berikan tekhnik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi napas dalam) 6. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri (suhu, posisi) Edukasi: 7. Jelaskan penyebab dan pemicu nyeri Kolaborasi : 8. Berikan analgetik	1. Untuk mengetahui lokasi, karakteristik, durasi dan frekuensi 2. Untuk mengetahui sala nyeri 3. Untuk melihat respon nyeri non verbal 4. Untuk meningkatkan rasa nyaman 5. Untuk meringankan rasa nyeri 6. Untuk meminimalkan rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman 7. Untuk meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga 8. Untuk meredahkan nyeri
4.	Ansietas berhubungan dengan kurang terpapar informasi dibuktikan dengan pasien gelisah dan sulit tidur.	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam diharapkan ekspektasi ansietas menurun dengan kriteria hasil: perilaku gelisah menurun.	Terapi Relaksasi Observasi : 1. Identifikasi tekhnik relaksasi yang perna digunakan 2. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, suhu sesudah latihan. Terapeutik:	1. Untuk mengetahui tehnik yang sudah di gunakan 2. Untuk mengetahui hasil dari relaksasi yang digunakan 3. Untuk memberikan rasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			3. Ciptakan lingkungan yang tenang dan tanpa gangguan 4. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang Edukasi : 5. Jelaskan tujuan, manfaat dan batasan jenis relaksasi 6. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman 7. Anjurkan sering mengulangi atau malatih tekhnik relaksasi yang di anjurkan	aman dan nyaman 4. Untuk menurunkan tingkat kegelisaan pasien 5. Untuk memberikan informasi tentang relaksasi yang dilakukan 6. Untuk memberikan rasa nyaman 7. Agar pasien mampu mengontrol rasa cemas dengan relaksasi
5.	Resiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan.	Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam maka diharapkan resiko infeksi menurun dengan kriteria hasil : 1. Cairan berbau busuk menurun	Pencegahan Infeksi Observasi : 1. Monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan iskemik. Terapeutik : 2. Batasi jumlah pengunjung 3. Berikan perawatan kulit 4. Cuci tangan sebelum dan sesudah kontakdengan pasien Edukasi : 5. Jelaskan tanda dan gejala infeksi 6. Anjurkan cuci tangan dengan benar 7. Anjurkan cara membersihkan luka-luka operasi	1. Untuk mengidentifikasi infeksi yang terjadi 2. Untuk mengurangi tingkat infeksi 3. Untuk mengatasi resiko infeksi 4. Untuk menghindari dari penyebab penyakit 5. Untuk menambah pengetahuan 6. Agar terhindar dari mikroorganisme 7. Agar pasien bisa melakukan secara mandiri pross perawatan luka

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

D. Implementasi Keperawatan

Nama : Ny. A No. Rekam Medik : 387 ***

Umur : 57 Tahun Diagnosa : DM

No.	No. Diagnosis	Hari,Tgl/Jam	Implementasi	Nama Jelas
1.	Gangguan integritas jaringan	Selasa, 25 Mei 2021 08.33 08.35 08.42 08.57 09.04	1. Memonitor karakteristik luka H: pasien mengatakan sudah lama berbaring, karena sudah operasi. Nampak luka dekubitus lebar 6 cm, dalam 4 cm. 2. Memonitor tanda-tanda infeksi H: luka berwarna merah ada cairan putih kekuning-kuningan dan berbau 3. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring H: pasien mengatakan nyaman jika sering dikasi miring 4. menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein H: pasien mengatakan kadang makan jika mau saja 5. melakukan Perawatan luka H: pembersian luka, mengangkat jaringan mati berwarna putih kekuning-kuningan. Luka berbau.	Sinarwati Sinarwati
		Rabu, 26 Mei 2021 08:43 14.15	1. Melakukan perawatan luka H: pembersian luka, mengangkat jaringan mati. 2. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring H: saat di bantu mengubah posisi pasien merasa kesakitan. Dan saat sudah miring pasien mengatakan sudah nyaman.	
		Kamis, 27 Mei 2021 08:45 14.15 14.20	1. Melakukan perawatan luka H: pembersian luka, luka mulai berwarna pink kemerah-merahan, muncul jaringan baru, tidak berbauh 2. mengubah posisi tiap 2 jam jika tirah baring H: pasien mengatakan di bantu oleh keluarga untuk miring kiri-miring kanan	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			3. menganjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein H: pasien mengatakan makan sayur sedikit dan ikan	
2.	Gangguan mobilitas fisik	Selasa, 25 Mei 2021 10:03 10:05 10:07	1. Mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya. H: pasien mengatakan nyeri pada kaki sebelah kiri bekas amputasi dan pinggang bagian belakang 2. Mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan H: pasien nampak tidak bisa bergerak di tempat tidur 3. memfasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu H: pasien berpegangan di sisi tempat tidur jika pasien dilakukan tindakan	Sinarwati
		Rabu, 26 Mei 2021 14:30 14:32 14:35	1. memfasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu H: pasien kadang berpegangan dengan badan keluarga jika dilakukan tindakan keperawatan oleh perawat 2. melibatkan keluarga untuk membantu pasien dalam melakukan pergerakan. H: nampak keluarga selalu antusias membantu jika dilakukan tindakan 3. menganjurkan melakukan mobilisasi dini H: setelah menganjurkan pasien untuk melakukan pergerakandini, pasien kadang melakukan ROM pasif bagian tangan di tempat tidur.	Sinarwati
		Kamis, 27 Mei 2021 15:00 15:04	1. mengidentifikasi toleransi fisik melakukan pergerakan H: pasien mengatakan nyeri pada pinggang bagian belakang yang luka, dan nyeri pada kaki bekas amputasi 2. memfasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu H: pasien nampak berpegangan di sisi tempat tidur	Sinarwati
3.	Nyeri akut	Selasa, 25 Mei		Sinarwati

		2021 11:30 11:32 11:34 Rabu, 26 Mei 2021 15:15 15:17 15:22 Kamis, 27 Mei 2021 16:30 16:45	1. mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi nyeri H: pasien mengatakan nyeri pada kaki kiri bekas amputasi dan pada pinggang bagian belakang 2. mengidentifikasi skala nyeri H: nyeri skala 4 3. Identifikasi respon nyeri non verbal H: pasien nampak meringis jika bergerak 1. mengidentifikasi faktor yang memperberat dan meringankan nyeri H: pasien mengatakan jika bergerak nyeri yang di rasakan akan semakin sakit 2. mengajarkan tekhnik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi napas dalam) H: setelah melakukan relaksasi napas dalam, pasien mengatakan lebih tenang dan lebih nyaman 3. mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri (suhu, posisi) H: mengatur suhu rungan pasien supaya tidak panas 1. Memberikan tekhnik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri (relaksasi napas dalam) H: pasien mengatakan jika merasa nyeri pasien melakukan secara mandiri 2. Mengontrol lingkungan yang memperberat nyeri (suhu, posisi) H: mengatur suhu rungan pasien dan memberikan posisi yang nyaman.	Sinarwati Sinarwati
4.	Ansietas	Selasa, 25 Mei 2021 13:40 13:42 13:50	1. mengidentifikasi tekhnik relaksasi yang perna digunakan H: pasien mengatakan sering melakukan relaksasi napas dalam 2. melakukan Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, suhu sesudah latihan. H: TD: 110/80 MmHg N : 90 x/i P : 20 x/i S : 36,6 ^{0}C 3. Ciptakan lingkungan yang tenang	Sinarwati

			dan tanpa gangguan H: membatasi pengunjung agar pasien dapat istirahat dengan tenang	Sinarwati
		Rabu, 26 Mei 2021 16:30 16:45 16:47 16:57	1. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang H: pasien kadang terlihat melakukan tekhnik relaksasi 2. Jelaskan tujuan, manfaat dan batasan jenis relaksasi H: pasien paham dengan tujuan dilakukan relaksasi 3. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman H: untuk mmberikan rasa nyaman dan tenang 4. Anjurkan sering mengulangi atau malatih tekhnik relaksasi yang di anjurkan H: pasien mengatakan mengerti.	Sinarwati
		Kamis, 27 Mei 2021 16:47 16:52	1. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman H: untuk mmberikan rasa nyaman dan tenang 2. Anjurkan melakukan relaksasi H: pasien tersenyu dan mengangguk mengerti	
5.	Resiko infeksi	Selasa, 25 Mei 2021 09:00 09:02 09:04 09:19	1. Memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan iskemik H: terdapat luka bekas amputasi pada kaki sebelah kiri dan luka decubitus pada pinggang bagian belakang. Kondisi luka berbauh dan berwarna kuning. 2. membatasi jumlah pengunjung H: keluarga pasien paham tujuan pembatasan pengunjung 3. memberikan perawatan kulit H: menggunakan cairan polyhexametilene biguanide, dan salep. Warna luka putih kekuning-kuningan, berair dan berbauh. 4. mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien H: selalu menerapkan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		Rabu, 26 Mei 2021 08:40 08:43 08:58 09:02 Kamis, 27 Mei 2021 08:42 08:45	1. menjelaskan tanda dan gejala infeksi H: pasien dan keluarga mengangguk mengerti setelah di jelaskan tanda dan gejala infeksi infeksi 2. memberikan perawatan kulit H: menggunakan cairan polyhexametilene biguanide, dan salep. Pasien mengatakan terimakasih. Keadaan luka masi ada ada cairan putih, bauh sudah tidak terlalu menyengat. 3. menganjurkan cara membersihkan luka-luka operasi. H: keluarga pasien ikut aktif dalam pembersian luka yang dilakukan ke pasien. 4. menganjurkan cuci tangan dengan benar H: pasien dan keluarga mampu mempraktekkan 6 langkah cuci tangan 1. mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien H: cuci tangan 6 langkah 2. memberikan perawatan kulit H: menggunakan cairan polyhexametilene biguanide, dan salep. Keadaan luka berwarna pink, bauhnya sudah berkurang.	Sinarwa Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

E. Evaluasi

Nama : Ny. A No. Rekam Medik : 387 ***

Umur : 57 Tahun Diagnosa : DM

No.	Diagnosa Keperawatan	Hari, Tgl/Jam	Evaluasi (SOAP)	Nama Jelas
1.	Gangguan integritas jaringan	Selasa, 25 Mei 2021 14:10	S: Pasien mengatakan nyaman jika sering di miringkan O: Terdapat ulkus decubitus dan luka bekas amputasi. Luka berbauh. Skor tingkat keparahan luka 34 A: Masalah gangguan integritas kulit/ jaringan belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Perawatan luka 2. Ubah posisi per 2 jam	Sinarwati
		Rabu, 26 Mei 2021 20:00	S: - O: Pasien nampak berbaring, keadaan luka tidak terlalu berbau A: Masalah gangguan integritas kulit/ jaringan belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 3. Perawatan luka 4. Ubah posisi per 2 jam 5. Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein	Sinarwati
		Kamis, 27 Mei 2021 20:05	S: Pasien mengatakan masi nyeri saat bergerak O: Pasien nampak berbaring, ulkus decubitus tidak terbau dan terdapat bekas luka amputasi. Skor tingkat keparahan luka dekubitus pada pinggang bagian belakang 28. A: Masalah gangguan integritas kulit/ jaringan belum teratasi	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			P: Lanjutkan intervensi 1. Perawatan luka 2. Ubah posisi per 2 jam 3. Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein	
2.	Gangguan mobilitas fisik	Selasa, 25 Mei 2021 14:13	S: Pasien mengatakan nyeri jika bergerak O: kebutuhan pasien dibantu oleh keluarga A: Masalah gangguan mobilitas fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Fasilitai melakukan pergerakan 2. Libatkan keluarga dalam melakukan pergerakan 3. Anjurkan mobilisasi dini	Sinarwati
		Rabu, 26 Mei 2021 20:05	S: Pasien mengatakan sering melatih tangannya untuk bergerak O: kekuatan otot $\begin{array}{c\|c} 4 & 4 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$ A: Masalahm gangguan mobilits fisik belum teratasi P: Lanjutkan intervensi 1. Identifikasi toleransi fisik 2. Pasilitasi melakukan pergerakan, jika perlu	Sinarwati
		Kamis, 27 Mei 2021 20:08	S: Pasein mengatakan jika ingin miring, ia berpegang di sisi tempat tidur O: kekuatan otot meningkat $\begin{array}{c\|c} 5 & 5 \\ \hline 3 & 3 \end{array}$ A: Masalah gangguan mobilitas fisik teratasi	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

			P: Pertahankan intervensi	
3.	Nyeri akut	Selasa, 25 Mei 2021 14:16 Rabu, 26 Mei 2021 20:08 Kamis, 27 Mei 2021 20:12	S: Pasien mengatakan nyeri saat bergerak O: pasien nampak meringis, sakala nyeri 5 A: Masalah nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan intervesi 1. Identifikasi faktor yang memperberat 2. Berikan terapi nonfarmakologi (relaksasi napas dalam) 3. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri S: pasien mengatakan nyaman jika melakukan relaksasi O: pasien nampak lebih tenang A: Masalah nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan intervesi 1. Berikan terapi nonfarmakologi (relaksasi napas dalam) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri S: Pasien mengatakan nyeri jika bergerak O: Pasien nampak melakukan terapi relaksasi napas dalam A: Masalah nyeri akut belum teratasi P: Lanjutkan intervesi 1. Berikan terapi nonfarmakologi (relaksasi napas dalam) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat nyeri	Sinarwati Sinarwati Sinarwati
4.	Ansietas	Selasa, 25 Mei 2021	S: Pasien megatakan sering	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		14:19 Rabu, 26 Mei 2021 20:12 Kamis, 27 Mei 2021 20:15	melakukan relaksasi napas dalam O: Pasien nampak lebih tenang A: Masalah ansietas belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi 1. Berikan posisi yang nyaman 2. Jelaskan manfaat relaksasi 3. Anjurkan untuk mengulang-ulangi relaksasi S: Pasien mengatakan paham tujuan dilakukannya relaksasi O: Tanda-tanda vital pasien stabil A: Masalah ansietas belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi 1. Berikan posisi yang nyaman 2. Anjurkan untuk mengulang-ulangi relaksasi S: Pasien mengatakan tenang jika sudah melakukan relaksasi O: Pasien namak tenang A: Masalah ansietas teratasi P: Pertahankan Intervensi	Sinarwati Sinarwati
5.	Resiko infeksi	Selasa, 25 Mei 2021 09:25 Rabu, 26 Mei 2021 09:20	S: Keluarga pasien mengatakan luka bagian belakang pinggang pasien berbauh O: nampak luka dekubitus bagian belakang pinggang pasien A: Masalah resiko infeksi belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi 1. Anjurkan untuk cuci tangan 2. Lakukan perawatan luka 3. Anjurkan keluarga untuk membantu S: Keluarga pasien mengatakan luka	Sinarwati Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

		Kamis, 27 Mei 2021 08:50	decubitusnya sudah lama karena lama tidur O: Bauh luka dekubitusnya sudah tidak terlalu menyengat A: Masalah resiko infeksi belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi 1. Cucitangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien 2. Perawatan luka S: Keluarga pasien mengatakan lukanya mulai memerah O: Luka nampak terlihat jaringan baru berwarna pink, bauh luka sudah hilang A: Masalah resiko infeksi belum teratasi P: Lanjutkan Intervensi 1. Jaga lingkungan 2. Lakukan perawatan luka setiap hari	Sinarwati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Hasil pengkajian yang dilakukan sebelum dan sesudah perawatan luka dengan menggunakan *Bates-Jensen Wound Assessment.*

No	Items	Pengkajian	Hasil selasa 25-05-2021	Hasil Sesudah kamis 27-05-2021
1	Ukuran Luka	1= P X L < 4 cm 2= P X L 4 < 16cm 3= P X L 16 < 36cm 4= P X L 36 < 80cm 5= P X L > 80cm	3	3
2	Kedalaman	1= stage 1 2= stage 2 3= stage 3 4= stage 4 5= necrosis wound	3	3
3	Tepi Luka	1= samar, tidak jelas terlihat 2= batas tepi terlihat, menyat dengan dasar luka 3= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka 4= jelas, tidak menyatu dengan dasar luka, tebal 5=jelas, fibrotic, parut tebal /hyperkeratonic	3	2
4	GOA (Lubang Luka Dibawah Jaringan Sehat)	1= tidakada 2= goa< 2 cm di di area manapun 3= goa 2-4 cm < 50 % pinggir luka 4= goa 2-4 cm > 50% pinggir luka 5= goa> 4 cm di area manapun	3	3
5	Tipe Jaringan Nekrosis	1 = Tidakada 2= Putih atau abu-abu jaringan mati dan atau slough yang tidak lengket (mudah dihilangkan) 3 = slough mudah dihilangkan 4 = Lengket, lembutdanada jaringan parut palsu berwarna hitam (black eschar) 5 = lengket berbata stegas, keras dan ada black eschar	2	2
6	Jumlah Jaringan Nekrosis	1=Tidak tampak 2= 25% dari dasar luka 3= 25% hingga 50% daridasarluka 4 = 50% hingga < 75% dari dasar luka 5 = 75% hingga 100% dari dasar luka	1	1
7	Tipe Eksudat	1= tidak ada 2= bloody 3= serosanguineous 4= serous 5= purulent	3	2
8	Jumlah Eksudat	1= kering 2= moist	3	2

		3= sedikit 4=sedang 5= banyak		
9	Warna Kulit Sekitar Luka	1= pink atau normal 2= merah terang jika di tekan 3=putih atau pucat atau hipopigmentasi 4=merah gelap / abu2 5=hitam atau hyperpigmentasi	4	2
10	Jaringan Yang Edema	1=no swelling atau edema 2=non pitting edema kurang dari< 4 mm disekitar luka 3=non pitting edema > 4 mm disekitar luka 4=pitting edema kurang dari 4 mm disekitar luka 5 = krepitasi atau pitting edema >4 mm	1	1
11	Pengerasan Jaringan Tepi	1 = Tidak ada 2=Pengerasan < 2 cm di sebagian kecil sekitar luka 3=Pengerasan 2-4 cm menyebar < 50% di tepi luka 4=Pengerasan 2-4 cm menyebar > 50% di tepi luka 5=pengerasan> 4 cm di seluruh tepi luka	1	1
12	Jaringan Granulasi	1= kulit utuh atau stage 1 2= terang 100 % jaringan granulasi 3= terang 50 % jaringan granulasi 4= granulasi 25 % 5= tidak ada jaringan granulasi	4	3
13	Epitelisasi	1=100 % epitelisasi 2= 75 % - 100 % epitelisasi 3= 50 % - 75% epitelisasi 4= 25 % - 50 % epitelisasi 5= < 25 % epitelisasi	3	3
TOTAL SKOR			34	28

sumber: (Carlsson, 2019)

Gambar 4.1 luka sebelum perawatan

Gambar 4.2 luka setelah perawatan

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Asuhan Keperawatan

1. Analisis Pengkajian

Pada laporan kasus akhir Ners, pasien atas nama Ny A mengalami diagnosa penyakit Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik. Pengkajian dilakukan dengan teknik wawancara, pengukuran dan observasi. Didapatkan bahwa pasien masuk rumah sakit pada tanggal 17 Mei 2021 dengan keluhan nyeri pada kaki kiri dan ulkus dekubitus pada punggung pasien. Penelitian yang dilakuakan oleh (Fitria, Nur, Marissa, & Ramadhan, 2017) mengatakan salah satu karakteristik Diabetes Melitus adalah terjadinya ulkus. Setelah 1 minggu di ruang perawatan Ny A akan dilakukan amputasi pada tanggal 24 Mei 2021 karena kaki kiri sudah nekrosis sampai ke pergelangan kaki. Sebelumnya Ny A perna dilakukan amputasi pada kaki kanan di bulan januari lalu, dan dilakukan amputasi kedua pada bulan Maret pada kaki yang sama. Dibulan April kaki kiri Ny A mulai berair dan melepuh dan mulai menghitam atau ganggreng. Hasil penelitian yang dilakukan di RS wongsnegoro semarang mengatakan ada hubungan yang bermakna antara lama penderita Diabetes Melitus dengan kejadian gangreng (Kirana, Rosa, Udiyono, Kusariana, & Dian, 2019).

Berawal dari amputasi pertama Ny A, ia mulai enggan melakukan pergerakan karena merasa nyeri saat bergerak. Satu bulan terakhir Ny A berbaring di tempat tidur hingga timbul ulkus dekubitus akibat luka tekan. Dalam penelitian (F. Efendi et al., 2021) menjelaskan faktor yang mengakibatkan terjadinya ulkus dekubitus adalah adanya beban atau tekanan yang mengakibatkan kurangnya suplai darah ke bagian tubuh. Didukung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

oleh penelitian (Fitria et al., 2017) yang mengataka tekanan mampu mengakibatkan terjadinya ulkus.

Faktor lain penyebab Diabetes Melitus adalah usia diatas 45 tahun (Dyah Ayu Yulyastuti, 2021). Usia merupakan salah satu indicator penyebab terjadinya ulkus. usia Ny A sudah di atas 45 tahun dimana ada penelitian yang mengatakan bahwa rerata pasien yang mengalami diabetes melitus tipe 2 adalah perempuan yang berusia dewasa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2020) bahwa rata-rata penderita Diabetes Melitus tipe 2 berusia diatas 55 tahun yaitu sebesar 68,8%.

Obesitas atau kelebihan berat badan juga merupakan faktor penyebab terjadinya Diabetes Melitus (Oroh, 2018). Dalam proses Pengumpulan data pasien memiliki berat badan 72 kg dan tinggi badan 152 cm. IMT Ny A adalah 31,3 sehingga pasien masuk kedalam kategori obesitas. Indeks massa tubuh (IMT) lebih dari 23 kg/m2. Memiliki riwayat keturunan diabetes melitus, obesitas, kurang aktifitas fisik juga merupakan faktor-faktor dari penyakit Diabetes Melitus (PERKENI, 2019).

Faktor penyebab Diabetes Melitus mampu mengakibatkan terjadinya komplikasi. Komplikasi yang dialami Ny A selain luka amputasi adalah ulkus dekubitus. Nampak luka punggung bagian belakang, kondisi luka nampak sedikit basah dan balutan merembes. Luas luka adalah 6x4 cm dengan kedalama luka stage 3 tepi luka jelas, tidak menyatu dengan dasar luka. Kedalaman GOA atau lubang luka sekitar 4cm, tipe jaringan nekrosis putih atau abu-abu jaringan mati dan slough yang tidak lengket (mudah diangkat). Jumlah jaringan nekrosis tidak tampak, tipe eksudat bloody, jumlah eksudat sedikit, warna kulit sekitar luka merah gelap atau abu-abu, jaringan yang edema tidak ada, pengerasan jaringan tipe tidak ada. Jaringan

granulasi 25% dan jaringan epitelisasi 50%. Skor total *wont status epitel continuum* adalah 34 dan nilai tes gula sewaktu 164 mg/dl. Hasil pengkajian luka dilakukan dengan menggunakan format pengkajian *Bates-Jensen Wound Assessmen.* pengkajian luka *Bates-Jensen Wound Assessmen* digunakan untuk mengkaji status luka yang disebabkan karena adanya tekanan atau berbagai macam sebab (Dati & Yulistiani, 2020). Pengkajian intrumen luka sudah teruji validitas dengan nilai 0,85 (Rasyid, Yusuf, & Tahir, 2018).

2. Analisis Diagnosis

Pasien masuk dengan keluhan Berdasarkan hasil analisa data pada Ny A diagnosis keperawatan utama yang bisa muncul adalah gangguan integritas jaringan yang ditandai dengan adanya ulkus dekubitus pada pinggang bagian belakang. Arteroklrosis dan neuropati perifer diabetik adalah dua penyebab utama terjadinya komplikasi diabetes seperti ulkus (Jones, 2017). Ulkus pada penelitian ini adalah ulkus dekubitus (Wod et al., 2018).

Ulkus decubitus merupakan kondisi dimana terjadi kerusakan atau kematian kulit sampai jaringan dibawahnya bahkan dapat menembus otot sampai mengenai tulang dan dapat mengganggu proses pemulihan pasien dan biasanya di ikuti dengan nyeri yang berkepanjangan bahkan dapat menyebabkan terjadinya infeksi sehingga proses pemulihan pasien yang berlangsung lama dan dapat menambah panjang lama perawatan, dengan adanya *ulkus decubitus* dapat menjadi suatu penanda prognosis yang buruk yang akan terjadi untuk pasien. Penegakan ulkus dekubitus ini adalah hasil anamnesa dimana pasien memang memiliki keturunan riwayat Diabetes melitus. Pasien sudah menderita penyakit Diabetes ini dari beberapa tahun lalu, juga sudah 2 kali melakukan operasi amputasi pada kakinya sehingga

membuat pasien berbaring lama di tempat tidur. Perubahhan fisik yang dialami Ny A membuat badannya terlalu lama berbaring sehingga menimbulkan luka tekan pada belakang pinggangnya.

Ulkus dekubitus merupakan ulkus yang terjadi akibat luka tekan. Lama baring dapat menimbulkan konsekuensi kulit akan mengalami penekanan dan merubah formasi jaringan lunak di daerah tonjolan tulang. Pada beberapa kasus hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya luka tekan yang mempengaruhi kerusakan integritas kulit (Endah Janitra, Adi Wibawa, Sultan Agung, 2019). Kerusakan integritas kulit bisa dilakuakan perawatan luka (Jones, 2017). Setelah ditegakkan diagnosis keperawatan langkah selanjutnya adalah menyusun rencana keperawatan. Tujuan dari rencana keperawatan ini adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam maka diharapkan integritas jaringan meningkat dengan kriteria hasil kerusakan lapisan jaringan menurun (PPNI, 2019).

3. Analisis Intervensi

Intervensi yang dilakukan untuk mencapai kriteria hasil tersebut adalah perawatan luka. Intervensi dalam perawatan luka menurut Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (PPNI, 2018) adalah: (1) Monitor karakteristik luka, (2) Monitor tanda-tanda infeksi, (3) Perawatan luka, (4) Ubah posisi setiap 2 jam jika tirah baring, dan(5) Anjurkan mengonsumsi makanan tinggi kalori dan protein. Pada poin ke 3 perawatan luka, peneliti akan mengaplikasikan perawatan luka menggunakan polyhexametilene Benguade (PHMB) sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Perawatan luka menggunakan *polyhexametilene Benguade* (PHMB) memiliki hasil yang efektif (F. Efendi et al., 2021). Perawatan luka lain yang digunakan ialah mengubah posisi. Posisi yang di maksud adalah miring kiri

miring kanan . hal tersebut menunjukkan hasil adanya perasaan nyaman yang dirasakan oleh Ny A saat dilakukan mika-miki. Sejalan dengan penelitian (Faridah, 2019) bahwa dengan dilakukan posisi miring kanan-miring kiri dapat menurunkan derajat luka dekubitus. Intervensi keperawatan lainnya bisa menggunakan pengaturan pola makan yang tinggi kalori dan protein. Control pola makan, olahraga yang teratur, jangan stress, hindari asap rokok mampu meminimalkan proses tingkat keparahan luka. (Dyah Ayu Yulyastuti, 2021).

Penerapan perawatan luka tekan dengan menggunakan *polyhexametilene Benguade* (PHMB) yang baik harus didukung dengan penerapan kepatuhan minum obat oral anti diabetik terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pengontrolan kadar gula dalam darah sangat penting dalam proses penyembuhan. Hasil dalam sebuah penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum obat dengan perubahan kadar gula darah pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 (Fandinata, 2020).

4. Analisis Implementasi

Implementasi keperawatan mulai dilakuakn pada tanggal 25-27 Mei 2021 di ruangan Mamminasa Baji lantai 3 gedung E RSUD Labuang Baji Makassar setiap pagi. Implementasi perawatan luka dengan diagnosis keperawatan gangguan integritas jaringan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur perawatan luka mengguankan polyhexametilene Benguade (PHMB) . Selain itu peneliti juga melihat karakteristik luka, warna,bau luka, kedalaman luka. Melihat apakah ada tanda-tanda infeksi, menganjurkan pasien untuk mengubah posisi per 2 jam supaya tidak ada tekanan yang memperparah luka, dan menganjurkan untuk pemenuhan

nutrisi yang baik yaitu makan makanan tinggi kalori dan protein. Karakteristik luka harus di perhatikan untuk melihat tingkat keparahan ulkus yang terjadi (Rosyid, 2017).

Menurut (Ayuni, 2020) bahwa diabetes Melitus tipe 2 merupakan DM yang paling umum di jumpai di masyarakat, biasanya terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Pada DM tipe 2 pankreas masih mampu untuk memproduksi insulin namun insulin yang dihasilkan buruk dan tidak dapat berfungsi dengan baik untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, sehingga dapat mengakibatkan glukosa didalam darah meningkat.

Penderita ulkus diabetikum paling banyak pada usia lansia akhir sebanyak 55 pasien (46.2%), paling banyak berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan dengan total 71 pasien (59.7%), paling banyak berdasarkan riwayat penyakit keluarga, adanya riwayat penyakit keluarga sebanyak 101 pasien (84.9%), berdasarkan lama rawat inap paling banyak pada 0-5 hari dengan total 94 pasien (79.0%), berdasarkan terapi, paling banyak dengan tindakan bedah dengan total 98 pasien (82.4%) (Syahid, 2021).

Perawatan hari pertama sebelum melakukan tindakan perawatan luka, peneliti melakukan pengukuran luka menggunakan *Bates jensen wound Assesmen.* Hasil pengukuran pada hari pertama mendapatkan hasil 34 di mana masi terdapat bauh, warna belum memperlihatkan tanda adanya granulasi. Perawatan lalu dilakukan selama 3 hari setiap pagi. Perawatan luka yang dilakukan memberikan pengaruh yang baik dari tingkat keparahan 34 menjadi 28. Perawatan luka mengguankan polyhexametilene Benguade (PHMB) memiliki hasil yang baik. Dikatakan dalam sebuah jurnal bahwa perawatan yang dilakukan selama 12 kali dengan pengaplikasian

polyhexametilene Benguade (PHMB) mampu menurunkan tingkat keparahan luka dekubitus (F. Efendi et al., 2021).

5. Analisi Evaluasi

Dari hasil intervensi maka dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan tahap akhir dari pemberian asuhan keperawatan. Tahap evaluasi peneliti melihat apa dan bagaimana perkembangan dari apa yang telah diimplementasikan. Dari hasil evaluasi yang dilihat terdapat perubahan skor tingkat keparahan luka. Sebelum dilakukan perawatan dengan rutin, luka dekubutus pasien berbau. Setelah dilakukan perawatan selama 3 hari, bauh tersebut sudah tidak ada. Ukuran luka tetap 6x4, kedalaman luka stage 3 tepi luka terlihat jelas. Kedalaman GOA atau lubang luka sekitar 4cm <50% pinggir luka, tipe jaringan nekrosis putih atau abu-abu jaringan mati dan slough yang tidak lengket (mudah diangkat). Jumlah jaringan nekrosis tidak tampak, tipe eksudat bloody, jumlah eksudat moist, warna kulit sekitar luka merah terang jika ditekan, jaringan yang edema tidak ada, pengerasan jaringan tipe tidak ada. Jaringan granulasi terang 50% dan jaringan epitelisasi 50%-70%. Dapat dilihat bahwa sebelum dilakukan perawatan skor atau tingkat keparahan luka dekubitus pasien adalah 34 (tingkat parah sedang) dan setelah melakukan perawatan selama 3x24 jam tingkat keparahannya berubah menjadi 28 (tingkat keparahan rigan) sehingga dapat disimpulkna bahwa masalah integritas kulit dan jaringan dengan intervensi perawatan luka menggunakan PHMB memiliki efek yang baik dalam penyembuhan luka sehingga tindakan selanjutnya adalah lanjutkan intervensi yang sama.

Sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh (F. Efendi et al., 2021) bahwa terdapat efektifitas perawatan luka menggunakan polyhexametilene Benguade (PHMB). Perawatan yang dilakukan kepada pasien yang memiliki

komplikasi ulkus diabetik selama beberapa hari memang memiliki perubahan yang signifikan. oleh karena itu diharapkan dalam perawatan pasien dengan ulkus dilakukan secara teratur setiap hari dengan waktu yang sudah ditetapkan.

Perawatan yang dilakukan secara rutin mampu memberikan efek perubaha yang baik. Selain itu dalam menunjang hasil yang di inginkan pasien juga harus di bekali dengan pemahaman dalam pengaturan pola makan. Aktifitas seperti miring kiri dan kanan jika pasien tidak bisa berpindah tempat, serta pembatasan pengunjung guna penurunan tingkat terjadinya infeksi.

Selain berusaha secara medis yang dilakukan, maka perlu memperbanyak berdoa kepada Allah swt karena pada hakikatnya Allah swt yang menyembuhkan. Firman Allah dalam QS Asy-Syu'ara' /26: 80

وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠

Terjemahnya:

80. Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku.

Menurut Kemenag dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa Allah yang menyembuhkan manusia apabila ia sakit. Allah berkuasa menyembuhkan penyakit apa saja yang diderita oleh seseorang. Meskipun begitu, manusia juga harus mencari tahu cara untuk memperoleh kesembuhan itu (Al-Qur'an Kemenag, 2019).

Di jelaskan pada diatas segala sesuatu yang di derita seseorang maka jangan khawatir ada Allah yang Maha penyembuh. Karena segala penyakit yang diturunkan pasti memiliki obatnya.

B. Analisis Intervensi EBPN

Hasil penelitian (Kurnia et al., 2017) menjelaskan PHMB gel dapat diaplikasikan pada luka dengan infeksi dan memiliki hasil yang bagus dalam pengaplikasiannya. Jurnal ini menjelaskan perbandingan kepekaan kuman antara PHMB dengan NaCl. Didapatkan hasil lebih bermakna PHMB dengan P <0,05 sedangkan NaCl gel 20% tidak bermakna dengan P >0,05. Dalam jurnal lain menjelaskan peranan pencucian luka efektif dalam menghambat proses perkembangan bakteri yang mampu memperberat luka (Nurbaya, Tahir, & Yusuf, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh (F. Efendi et al., 2021) mengatakan aplikasi polihhexamettylene biguanide gel pada penderita Diabetes Melitus dengan kerusakan integritas jaringan memiliki hasil yang bangus dalam penurusan derajat luka. Perawatan luka dilakukan 2 kali sehari sebanyak 12 kali. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas kulit yang dilihat menggunakan instrument *Bates Jensen Assesmen Tool* dengan SOP perawatan luka modern. Peningkatan perbaikan jaringan luka dari skor 34 menjadi 26. Hal tersebut menunjukkan adanya efektifitas yang bagus dalam perawatan luka menggunakan Polyhexametilene Beguinade (PHMB). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Welch, 2016) Dalam penatalaksanaan dijelaskan perawatan kaki ulkus diabetik selama 4 minggu menggunakan PHMB (Polihhexamethylene Biguanide) mampu memperlihatkan pengurangan luas luka hingga 53% dari perawatan awal (Welch, 2016)

Firman Allah dalam QS Yunus /10: 57

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُم مَّوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَشِفَآءٞ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلۡمُؤۡمِنِينَ ٥٧

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Allah semua manusia bahwa kepada mereka yang telah didatangkan al qur'an melalui rasulNya. Didalamnya mengandung aturan-aturan berupa pedoman yang sangat berguna dalam kehidupan. Pedoman-pedoman di sini di ibaratkan berupa jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-ancamanNya. Ayat diatas mnyimpulkan fungsi Al qur'an Al Karim dalam memperbaiki perasaan serta jiwa manusia di antaranya: Mauidhah adalah pembelajaran dari Allah kepada semua manusia agar mereka mempelajari yang hak dan yang batil. Syifa ialah penyembuh bagi penyakit-penyakit yang bersarang di dada manusia, seperti penyakit syirik, kufur dan munafik, termasuk penyakit yang mengganggu ketentraman jiwa manusia. Huda yaitu diberikan petunjuk yang benar terlepas dari jalan yang sesak. Rahmah yaitu karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin yang dapat di petik dari petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab Al qur'an (Kementrian Agama RI, 2019).

C. Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan tidak lupuk dari keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya waktu dalam pengimplementasian asuhan keperawatan. Waktu yang digunakan masih cukup singkat dalam mengatasi masalah kerusakan integritas jaringan. Diharapkan dalam pemberian asuhan keperawatan khususnya perawatan luka, membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan pada Ny A di Ruang Mamminasa Baji lantai 3 gedung E RSUD Labuang Baji Makassar, penulis dapat simpulkan bahwa:

1. Pengkajian

   Pengkajian yang didapatkan peneliti dalam kasus dengan diagnosa Diabetes Melitus sesuai dengan konsep teori.peningkatan kadar glukosa dalam darah yang tidak bisadihancurkan oleh insulin maupun menyebabkan terjadinya arteroklerosis atau penyempitan pembuluh darah kecil yang menghambat proses aliran darah ke seluruh tubuh. Ditambah adanya tekanan yang berlangsung lama diakibatkanoleh tirah baring sehingga terjadi ulkus dekubitus. Hal tersebut yang dialami Ny A.pengkajian yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021 didapatkan adanya ulkus dekubitus di pinggang bagian belakang, IMT 31,3, memiliki riwayat diabetes melitus dan mengeluh Nyeri saat bergerak.

2. Diagnosis Keperawatan

   Dari hasil pengkajian diatas diagnosis keperawatan Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik adalah gangguan integritas kulit atau jaringan.

3. Intervensi keperawatan

   Merujuk pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia peneliti memutuskan untuk melakukan perawatan luka pada pasien Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik yang bertujuan untuk memperbaiki jaringan kulit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

4. Implementasi Keperawatan

   Implementasi yang dilakukan sesuai intervensi keperawatan yang sudah direncanakan.implementasi dilakukan selama 3 hari pada pagi hari.

5. Evaluasi Keperawatan

   Evaluasi hasil dari perawatan luka Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus dekubitus adalah adanya penurunan tingkat keparahan luka dari yang sedang ke yang ringan.

6. Analisis Intervensi Pengaplikasian Polyhexametilene Beguanide

   Hasil yang didapatkan dari pengaplikasian Polyhexametilene Beguanide adalah terdapat pengaruh. Perawatan yang dilakuakn selama 3 hari mendapatkan hasil penurunan tingkat keparahan Luka dari skor 34 menjadi 28.

B. Saran-saran

1. Bagi profesi keperawatan semoga karya tulis ilmiah ini bisa menambah informasi dalam pemberian asuhan keperawatan Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik.
2. Bagi pelayanan Rumah sakit semoga karyatulis ini bisa menjadi salah satu rujukan intervensi Diabetes Melitus dengan komplikasi ulkus diabetik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

REFERENSI

(PERKENI), P. D. I. (2019). *Pedoman Pengelola Dan Pencegahan Prediabetes Di Indonesia*. Jakarta: PB PERSADIA.

@appskep. (2021). *4 Derajat Luka Dekubitus*.

Abutaleb, M. H. (2016). Diabetes mellitus: an overview. *Pharmacy & Pharmacology International Journal*, *4*(5), 7.

Ahmad, J. (2020). *Gambaran Tingkat Pengetahuan Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 Tentang Manajemen Diabetes Overview of Knowledge Levels of Type 2 Diabetes Mellitus Patients Regarding*.

Annemarie. (2017). *Phases of the wound healing process : Understanding how wounds heal enables nurses to apply the appropriate treatment and management techniques at each phase to support the healing process*. *111*(46), 2.

Baynest, H. W. (2015). Classification, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. *Journal of Diabetes and Metabolism*, *6*(5), 9. https://doi.org/DOI: 10.4172/2155-6156.1000541

Carlsson, S. (2019). *Etiology and Pathogenesis of Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA) Compared to Type 2 Diabetes*. *7*(10). https://doi.org/https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00320

Dati, S. A., & Yulistiani, M. (2020). Validitas Format Pengkajian Luka TIME Modifikasi Bates-Jensen. *Jurnal Keperawatan*, *12*(4), 555–566.

Dyah Ayu Yulyastuti, D. (2021). *Perawatan Dan Pencegahan Ulkus Diabetikum* (T. S. PRESS, Ed.). Jalan Manila 37 Kota Kediri Jawa Timur Indonesia: Penerbit Anggota Resmi IKAPI Indonesia.

Efendi, E. (2019). *Aplikasi Pemberian Phmb Gel (Polihhexamethylene Biguanide Gel) Pada Penderita Diabetes Mellitus Untuk Kerusakan Integritas Kulit*.

Magelang.

Efendi, F., Kamal, S., & Margono. (2021). *Aplikasi Polihhexamethylene Biguanide gel pada penderita Diabetes Mellitus dengan kerusakan integritas kulit*. *01*(01), 12–23. https://doi.org/Borobudur Nursing Review, Vol. 01, No. 01

Endah Janitra, F., Adi Wibawa, Y., Sultan Agung, I., & Rumah Sakit Kariadi Semarang, P. (2019). Suhu dan Kelembaban Kulit pada Kejadian Luka Tekan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Pencerah*, *08*(2), 75–80.

Faridah, U. (2019). *P ENGARUH P OSISI M IRING T ERHADAP D EKUBITUS P ADA P ASIEN*. *10*(1), 155–162.

Fitria, E., Nur, A., Marissa, N., & Ramadhan, N. (2017). Karakteristik Ulkus Diabetikum pada Penderita Diabetes Mellitus di RSUD dr. Zainal Abidin dan RSUD Meuraxa Banda Aceh. *Buletin Penelitian Kesehatan*, *45*(3), 153–160. https://doi.org/10.22435/bpk.v45i3.6818.153-160

Handersen, & Hansen. (2018). *Genetics of latent autoimmune diabetes in adults. Curr. Diabetes*. https://doi.org/doi: 10.2174/1573399814666180730123226

Herman, A., Thalib, S., Ningsih, L. W., Studi, P., Akademi, D. K., & Makassar, K. (2021). *Efektifitas Perawatan Luka Decubitus Dengan Metode Modern Dressing Terhadap Proses Penyembuhan Luka : Literatur Review*. *XI*, 37–44.

IDF. (2019). *IDF Diabetes ATLAS*.

Infodatin. (2018). *Infodatin Hari Diabetes Sedunia*.

Jones. (2017). *Exploring the complex care of the diabetic foot ulcer*. *2*(3), 11.

JS, S., GL, B., E, B., T, D., RH, E., & Groo. (2017). *lDifferentiation of Diabetes by Pathophysiology, Natural History, and Prognosis. Diabetes*. *66*, 15.

Kemenkes. (2020). *ISSN: 2442-7659 Infodatin. pusat data dan informasi*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

kementrian kesehatan RI tetp produktif, cegah dan atasi diabetes melitus.

Kementrian Agama, R. (2019). *Al-Qur'an kemenag.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

Kirana, S., Rosa, D., Udiyono, A., Kusariana, N., & Dian, L. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Timbulnya Gangren Pada Pasien Diabetes Mellitus Di Rsud K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, *7*(1), 192–202.

Knight, J. (2017). *Diabetes management 1: disease types, symptoms and diagnosis*. *113*(4), 8.

Kohei. (2017). Pathophysiology of Type 2 Diabetes and Its Treatment Policy. *Journal of the Japan Medical Association*, *53*(1), 9.

Kurnia, S., Sumangkut, R., & Hatibie, M. (2017). *Perbandingan kepekaan pola kuman ulkus diabetik terhadap pemakaian PHMB gel dan NaCl gel secara klinis*. https://doi.org/Jurnal Biomedik (JBM), Volume 9, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 38-44

Leni, A. H. (2020). *Manajemen Diabetik dan Perawatan Mandiri Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Mansyur Muhammad*. *11*, 181–185. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.33846/sf11nk433

Mayusef Sukmawan., D. (2020). *Pengkajian Luka Menurut Meggit-Wagner Dan Pedis Pada Pasien Ulkus Diabetik*.

Mishra, Hodge, Cousminer, D. L., Leslie, R. D., & Grant. (2018). *A global perspective of latent autoimmune diabetes in adults*. *29*, 9. https://doi.org/doi: 10.1016/j.tem.2018.07.001

Mishra, R., Chesi, A., Cousminer, D. L., Hawa, M. I., Bradfield, J. P., & Hodge. (2017). *Relative contribution of type 1 and type 2 diabetes loci to the genetic etiology of adult-onset, non-insulin-requiring autoimmune diabetes*. *376*. https://doi.org/doi: 10.1056/NEJMoa1610187

Mitha, & Karimah. (2018). Waist-Hip Circumference Ratio As Strongest Factor Correlation With Blood Glucose Level. *Corrine F Packer Syed A. Ali Biagio Manna*, *6*(3), 13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jbe.V6I32018.219-226

Nasaruddin, Aminullah, M., & Syarifuddin. (2017). *Metodologi Penelitian; penelitian kualitatif, Tindakan kasus dan studi kasus*. Jln. Bojong Ganteng No. 18 kec. Bojong Ganteng Kab. sukabumi, jawa barat: Cv Jejak.

Nitisha, Nehal, & Kamlesh. (2019). Adherence to type 2 diabetes management. *The British Journal Of Diabetes*, *19 No. 2*, 8. https://doi.org/https://doi.org/10.15277/bjd.2019.223

Nurbaya, N., Tahir, T., & Yusuf, S. (2018). Peranan Pencucian Luka Terhadap Penurunan Kolonisasi Bakteri Pada Luka Kaki Diabetes. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, *3*(2), 110–115. https://doi.org/10.30651/jkm.v3i2.1829

Oroh, W. (2018). Hubungan Obesitas Dengan Kejadian Diabetes Melitus D Wilayah Kerja Puskesmas Ranomut Kota Manado. *Jurnal Keperawatan*, *6*(1).

Papatheodorou, K., Banach, M., Bekiari, E., Manfredi Rizzo, Edmonds, & Ichael. (2018). Complications of Diabetes 2017. *Ournal of Diabetes Research*, *20*, 4.

Particia, P. A., & Perry, A. G. (2015). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses dan Praktik* (EGC, Ed.). jakarta.

PPNI. (2016). *Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia*. Jakarta: dewan pengurus pusat persatuan perawat nasional Indonesia.

PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*.

PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia*.

Putri, M., Persariningrat, R. T. I., Surialaga, S., A., M. R. A., & Syamsunarno.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

(2019). Physical Activities Decrease Fasting Blood Glucose Level in Diabetes Mellitus Type 2 Patients: Use of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Rural Area. *Kedokteran Bandung*, *51 No. 4*, 5. https://doi.org/https://doi.org/10.15395/mkb.v51n4.1765

Rasyid, N., Yusuf, S., & Tahir, T. (2018). Study Literatur : Pengkajian Luka Kaki Diabetes. *Jurnal Luka Indonesia*, *4*(2), 123–137.

Riskesdas. (2018). Riset Kesehatan Dasar. In *Kemenkes RI*.

Risnah, M. I. (2021). *Falsafah dan teori keperawatan dalam integrasi keilmuan*. Retrieved from website: http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/

Rosyid, F. N. (2017). Etiology, Pathophysiology, Diagnosis and Management of Uiabetics' Foot Ulcer. *International Journal of Research in Medical Sciences*, *5*(10), 10. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20174548

Schwingshackl, L., Hoffmann, G., Lampousi, A. M., Knüppel, S., Iqbal, K., & Schwedhelm. (2017). *Food groups and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur. J. Epidemiol*. *5*(2), 8. https://doi.org/doi: 10.1007/s10654-017-0246-y

Suryati, I., Primal, D., & Pordiati., D. (2019). *P-ISSN : 2355-9853 HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN LAMA MENDERITA DIABETES MELLITUS (DM) DENGAN KEJADIAN ULKUS DIABETIKUM PADA PASIEN DM TIPE 2 P-ISSN : 2355-9853*. *6*, 1–8. https://doi.org/P-ISSN : 2355-9853 E-ISSN : 2622-4135

Welch, F. (2016). *Pengurangan beban bakteri dan rasa sakit pada luka kronis menggunakan busa antimikroba poliheksametilena biguanide baru hasil uji coba klinis*.

Wijaya, L., Budiyanto, A., Indwiani, A., & Mustofa. (2019). Pathogenesis, evaluation, and recent management of diabetic foot ulcer. *Journal Of the*

Medical Sciences, *Vol. 51*(1), 16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19106/JMedSci005101201910

Wod, M., Thomsen, R. W., Pedersen, L., Yderstraede, K. B., & Beck-Nielsen, H. (2018). Lower mortality and cardiovascular event rates in patients with latent autoimmune diabetes in adults (LADA) as compared with type 2 diabetes and insulin deficient diabetes: a cohort study of 4368 patients. *Diabetes Res. Clin. Pract*, *7*(3), 6. https://doi.org/doi: 10.1016/j.diabres.2018.02.042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN

Polifix
Polifix
Polifix
Polifix
Polifix

KTI

ORIGINALITY REPORT

21%	21%	0%	12%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Poltekkes Kemenkes Sorong Student Paper	4%
2	es.scribd.com Internet Source	3%
3	123dok.com Internet Source	2%
4	pt.scribd.com Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	2%
6	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1%
7	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	1%
8	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	1%
9	samoke2012.wordpress.com Internet Source	1%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sinarwati, lahir di Takalar pada tanggal 10 Juli 1999. Penulis merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak **Muh Basir DG Naba** dan Ibu **Hasniah malik DG Bollo**. Penulis mulai mengikuti Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2004 di SD Impres Kalappo dan selesai ditahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manggarabombang pada tahun 2010 dan selesai ditahun 2013, kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 2 Takalar pada tahun 2013 dan selesai ditahun 2016. Pada tahun 2021 telah menyelesaikan S1 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Ilmu Keperawatan. Syukur Alhamdulillah masih bisa diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan Pendidikan Profesi Ners dikampus yang sama dengan berbagai pengalaman di Rumah Sakit maupun Puskesmas serta di masyarakat dan sampai saat ini masih diberi Kesehatan sehingga bisa melewati perjuangan keras dan disertai iringan doa dari kedua orang tua penulis, keluarga serta rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Karya Tugas Akhir Ners dengan judul "Analisis Asuhan Keperawatan pada Pasien diaberes melitus tipe II dengan komplikasi ulkus diabetik menggunakan intervensi aplikasi *polyhexametilenen biguanide* di RSUD Labuang Baji Makassar"

Penulis aktif didalam organisasi, pada masa SMA seperti Paskibraka kabupaten, Silat, Volly dan Saat di perguruan tinggi penulis bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Keperawatan UIN Alauddin Makassar sebagai anggota Divisi akhlak dan moral periode 2016-2017, dan kemudian setelah tahun berikutnya bergabung di komunitas kesehatan masyarakat yaitu *interpersonal health student community* di tahun 2018-2019.