

**HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN
PERDARAHAN POSTPARTUM
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG KABUPATEN
PANGKEP PERIODE 2021**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

AQILAH FARAH SALSABIL

NIM : 70600118023

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilah Farah Salsabil
NIM : 70600118023
Tempat/Tgl Lahir : Pangkajene, 06 September 2000
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Andi Mauraga Timur No. 23
Judul : Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Agustus 2022

Penyusun



Aqilah Farah Salsabil

NIM : 70600118023

PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN

JUDUL : HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG KABUPATEN PANGKEP PERIODE 2021

TELAH DISETUJUI OLEH PEMBIMBING UNTUK DIAJUKAN DALAM SEMINAR HASIL KARYA TULIS ILMIAH (KTI) MAHASISWA KEDOKTERAN

MAKASSAR, 20 AGUSTUS 2022

PEMBIMBING 1



dr. Raully Rahmadhani, M.Kes.

PEMBIMBING 2



dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021” yang disusun oleh Aqilah Farah Salsabil, NIM 70600118023, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 19 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 20 Agustus 2022
22 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr. Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Raully Rahmadhani, M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul **“Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan proposal ini, tidak hanya semata-mata dari usaha penulis sendiri. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtuaku yang tercinta, sebagai penyemangat dan sumber inspirasi terbesarku serta adikku tersayang atas cinta kasih, doa restu, bimbingan, dukungan serta motivasi. Demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan tak terhingga, kepada :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Dr. dr. Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes.
3. Kepada seluruh Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Kepada dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku Ketua Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

5. Kepada dr. Raully Rahmadhani, M.Kes. selaku Pembimbing Akademik dan juga sekaligus pembimbing I yang telah memberikan masukan baik kritik, saran dan motivasi selama proses penyelesaian proposal ini dan selama pendidikan sampai saat ini.
6. Kepada dr. Ulfah Rimayanti, Ph.D., Sp.M., M.Kes. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan arahan serta motivasi untuk penyelesaian proposal ini.
7. Kepada dr. Abd. Rahman, Sp.B., M.Kes. selaku Penguji kompetensi dan Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Penguji integrasi keislaman atas saran, kritikan, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga penulisan dapat menghasilkan karya yang terbaik.
8. Kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep yang telah berkenan menerima peneliti untuk melakukan penelitian serta para staf yang senantiasa membantu selama penyusunan proposal ini.
9. Seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
10. Kepada sahabat – sahabat saya CEBA SQUAD serta seluruh sejawat saya angkatan 2018 “FIBRONEKTIN” Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis selama mengenyam pendidikan hingga saat ini dalam keadaan apapun, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
11. Kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah Swt. semoga diberikan balasan oleh-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Terlepas dari segala dukungan yang diberikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Segala kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt. semata. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi terbentuknya suatu tulisan yang dapat bermanfaat bagi segala pihak.

Makassar, 10 Maret 2022

Penulis

Aqilah Farah Salsabil




DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	7
1. Hipotesis Nol (H_0)	7
2. Hipotesis Alternatif (H_a)	7
D. Definisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1. Definisi Operasional.....	8
2. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian.....	17

1. Tujuan Umum	17
2. Tujuan Khusus	17
G. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Perdarahan Postpartum	18
1. Definisi Perdarahan Postpartum.....	18
2. Klasifikasi Perdarahan Postpartum	18
3. Faktor – Faktor Risiko Perdarahan Postpartum	18
4. Etiologi Perdarahan Postpartum.....	22
5. Diagnosis	24
6. Pencegahan Dan Penanganan Perdarahan Postpartum.....	25
B. Anemia Pada Kehamilan	27
1. Definisi Anemia Pada Kehamilan	27
2. Jenis Anemia Pada Kehamilan.....	27
3. Patofisiologi Anemia Pada Kehamilan.....	32
4. Gejala Anemia Pada Kehamilan	33
5. Derajat Anemia Pada Kehamilan	34
6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan.....	34
7. Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Kehamilan	39
C. Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum	41
D. Kerangka Teori.....	42
E. Kerangka Konsep	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
A. Desain Penelitian.....	44

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	44
1.	Lokasi Penelitian	44
2.	Waktu Penelitian	44
C.	Populasi dan Sampel.....	44
1.	Populasi.....	44
2.	Sampel	45
3.	Kelompok Kasus	45
4.	Kelompok Kontrol.....	46
D.	Metode Pengumpulan data.....	46
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	47
1.	Teknik Pengolahan Data.....	47
2.	Analisis Data	48
F.	Alur Penelitian	49
G.	Etika Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		51
A.	Hasil Penelitian	51
1.	Analisis Univariat.....	51
2.	Analisis Bivariat.....	60
B.	Pembahasan.....	63
1.	Kejadian Perdarahan Post-partum di RSUD Batara Siang	63
2.	Kejadian Anemia dalam Kehamilan di RSUD Batara Siang.....	67
3.	Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Batara Siang	71
BAB V PENUTUP.....		77
A.	Kesimpulan	77

B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	90




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional	8
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	10
Tabel 4.1 Sebaran Usia Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang	51
Tabel 4.2 Distribusi Data Gravida Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang.....	52
Tabel 4.3 Distribusi Data Paritas Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang.....	52
Tabel 4.4 Distribusi Data Abortus Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang.....	53
Tabel 4.5 Distribusi Data Pendidikan Terakhir Ibu Bersalin di RSUD Batara	53
Tabel 4.6 Distribusi Data Pekerjaan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang	54
Tabel 4.7 Distribusi Jarak Kehamilan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang	55
Tabel 4.8 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 1 Ibu Bersalin di RSUD Batara.	55
Tabel 4.9 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 2 Ibu Bersalin di RSUD Batara.	56
Tabel 4.10 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 3 Ibu Bersalin di RSUD.....	56
Tabel 4.11 Distribusi Penyebab Perdarahan Post Partum Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang	57
Tabel 4.12 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 1 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum.....	58
Tabel 4.13 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 2 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum	59
Tabel 4.14 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 3 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum	60

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	42
Bagan 2.2 Kerangka Konsep	44
Bagan 3.1 Alur Penelitian.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Inform Consent.....	90
Lampiran 2. Hasil Analisis Data.....	91
Lampiran 3. Hasil Tabulasi Data	98
Lampiran 4. Surat Keterangan Layak Etik.....	104
Lampiran 5. Surat Izin Balitbangda	105
Lampiran 6. Izin Penelitian DPM-PTSP	106
Lampiran 7. Surat Izin Telah Meneliti.....	107
Lampiran 8. Dokumentasi	108



**Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum
Di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021**

Aqilah Farah Salsabil¹, Rauly Rahmadhani², Ulfah Rimayanti³,

Abd. Rahman⁴, Arifuddin Ahmad⁵

Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar

Kontak : 70600118023@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia, tingginya angka kematian ibu masih menjadi masalah. Perdarahan postpartum, yang menyumbang 19,3% dari semua kematian ibu di Indonesia, adalah penyebab utama kematian bagi wanita hamil. Salah satu faktor risiko perdarahan postpartum adalah anemia. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara anemia dalam kehamilan dengan frekuensi perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metodologi *case control* dan merupakan studi observasional analitik. Dengan total 150 sampel, sampel ini menggunakan rasio 1:1 antara kelompok kontrol dan kasus. Teknik analisis univariat dan bivariat digunakan untuk menganalisis data. Dengan uji *chi-square*, p sama dengan 0,000 ($p < 0,05$), dan perhitungan OR yang diperoleh pada trimester pertama kehamilan 25.351, trimester kedua 10.804, dan trimester ketiga sebesar 35.821 yang memperlihatkan ibu hamil dengan anemia sangat berisiko mengalami perdarahan postpartum, hasilnya menunjukkan hubungan antara anemia selama kehamilan dan kejadian perdarahan postpartum. Ibu hamil lebih mungkin mengalami anemia pada trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%) dan trimester ketiga (90,7%). Retensio plasenta adalah faktor utama dalam terjadinya perdarahan postpartum (44 persen). Temuan studi menunjukkan korelasi yang kuat antara prevalensi perdarahan postpartum dan kejadian anemia selama kehamilan.

Kata Kunci : Anemia dalam kehamilan; perdarahan postpartum

**The Relationship Between Anemia in Pregnancy and the Occurrences of
Postpartum Bleeding**

at Batara Siang Regional Hospital of Pangkep Regency Year 2021

Aqilah Farah Salsabil¹, Raully Rahmadhani², Ulfah Rimayanti³,

Abd. Rahman⁴, Arifuddin Ahmad⁵

Medical Program of UIN Alauddin Makassar

Contact : 70600118023@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

The high maternal mortality rate in Indonesia is still a problem. Postpartum haemorrhage, which accounts for 19.3% of all maternal deaths in Indonesia, is the leading cause of death for pregnant women. One of the risk factors for postpartum haemorrhage is anemia. This study aims to analyze the relationship between anemia in pregnancy and the frequency of postpartum haemorrhage at the Batara Siang Regional General Hospital in Pangkep Regency. This study uses *case-control* and is an analytic observational study. With 150 samples, this sample used a 1:1 ratio between the control and case groups. Analyze data using univariate and bivariate analysis techniques. With the *chi-square*, p equals 0.000 ($p < 0.05$). The calculated OR obtained in the first trimester of pregnancy is 25,351, the second trimester is 10,804, and the third trimester is 35,821, which shows that pregnant women with anemia are significantly at risk for postpartum haemorrhage. The results show an association between anemia during pregnancy and the incidence of postpartum haemorrhage. Pregnant women are more likely to experience anemia in the first trimester (85.3%), second trimester (76%) and third trimester (90.7%). Retention of the placenta is a major factor in postpartum haemorrhage (44%). The study findings show a strong correlation between the prevalence of postpartum haemorrhage and the incidence of anemia during pregnancy.

Key Words : Anemia in pregnancy, postpartum haemorrhage

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diperkirakan sekitar 810 ibu meninggal diakibatkan komplikasi dalam kehamilan dan proses melahirkan setiap harinya secara global. Sejarah mencatatkan pada tahun 2017 terdapat kurang lebih 295.000 wanita meninggal selama dan/atau setelah waktu kehamilan/ proses persalinan. *Maternal mortality ratio* (MMR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kematian ibu hamil pada suatu negara (Ganchimeg et al., 2014). Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), MMR memiliki beberapa determinan faktor penyebab peningkatan nilai, yakni keadaan ekonomi yang sulit dan perbedaan signifikan dalam aspek akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai. Data menunjukkan, terdapat 15 negara dengan kategori “*high alert*”, seperti Sudan, Somalia, Afrika Tengah, Zimbabwe, Iraq, Haiti, Afghanistan, dkk. Negara – negara tersebut memiliki tingkat MMR berkisar dari 31 (Syria) hingga 1150 (Sudan). Kontras jika dibandingkan dengan negara maju, yang rata – rata MMR nya berkisar di angka 11-15 (Althabe et al., 2015; Ganchimeg et al., 2014; Wolde et al., 2018). Hal tersebut, kemudian menjadi perhatian WHO guna meratakan tingkat kesehatan di dunia. Sebagian besar dari penyebab tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan penatalaksanaan yang adekuat. Penyebab utama kematian ibu selama proses persalinan, yakni perdarahan (75%), partus tak maju, preeklamsia, dan aborsi ilegal (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017; Wolde et al., 2018).

Berdasarkan data dari WHO, Jumlah angka kelahiran kasar (*crude birth rate*) yang dihitung setiap kelahiran hidup per 1000 populasi. Secara global, angka kelahiran kasar berada di kisaran 17.56 per 1000 populasi. Di Indonesia, berdasarkan data tahun 2022 angka kelahiran kasar berkisar 16.92 per 1000 populasi. Selain itu, jika meneliti lebih dalam pada salah satu provinsi di Indonesia yakni Sulawesi Selatan, memiliki angka kelahiran kasar sebesar 18.2 per 1000 populasi. Namun, data angka kelahiran kasar

provinsi Sulawesi Selatan ditemukan hanya terbatas pada Sensus penduduk tahun 2011 saja (World Health Organization, 2022).

Pelayanan kesehatan maternal merupakan salah satu dimensi aspek yang dinilai dalam penentuan status kesehatan. Menurut literatur demografi, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan jumlah kematian ibu saat hamil atau 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan yang disebabkan karena kehamilan atau pengelolaannya, dan bukan karena penyebab lainnya, Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung per 1000 kehamilan hidup (Dinas kesehatan Sulawesi selatan, 2019). Indonesia sendiri belum terlepas dari permasalahan angka kematian ibu hamil yang tinggi. Menurut data, angka kematian ibu mencapai 305/100.000 kelahiran hidup (Badan Pusat Statistik, 2015). Angka tersebut menjadi sebuah problematika karena jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi teratas dalam angka kematian ibu dalam kurun waktu 1991-2015. Tingginya angka kematian ibu sendiri menjadi sebuah indikator gagalannya program kesehatan universal di Indonesia yang menargetkan AKI di angka 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017). Merujuk kepada data terbaru pada tahun 2020, tercatat terdapat 4.267 kematian ibu di Indonesia (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020). Data ini meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2019 dengan 4.221 kematian (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020). Jika ditarik kesimpulan, berdasarkan riset dari Kementerian Kesehatan Indonesia penyebab utama kematian ibu hamil yakni, perdarahan (30,3%), hipertensi selama kehamilan (27,1%), infeksi (7,3%), dan lain – lain. Selain itu, kanker, penyakit ginjal, kelainan jantung, atau penyakit lainnya menyumbang 35,3% kasus kematian ibu hamil di Indonesia (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Perdarahan pada kehamilan berperan sebanyak 30,3% sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu. Perdarahan antepartum, berdasarkan hasil penelitian Sunarsih & Susanaria (2015) berperan sebanyak 3% dari kejadian angka kematian ibu. Kemudian, berdasarkan penelitian Putri (2020) sebanyak 8% ibu dengan perdarahan intrapartum berperan terhadap peningkatan angka kematian ibu. Sedangkan perdarahan postpartum menyumbang 19,3% penyebab kematian ibu secara keseluruhan. (Satriyandari & Hariyati, 2017). Sulawesi Selatan termasuk ke dalam satu dari enam provinsi dengan angka kematian ibu dan neonatal tertinggi di Indonesia. Menurut data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, terdapat 144 kematian ibu yang dominan penyebabnya yakni perdarahan, preeklamsia, dan eklamsia (Dinas kesehatan Sulawesi selatan, 2019; Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2021, terdapat 6 daerah tertinggi dengan angka kejadian ibu mengalami perdarahan postpartum di Sulawesi Selatan yaitu pertama di Kabupaten Bone (11,8%), kedua di Kabupaten Jeneponto (10,4%), ketiga di Kabupaten Maros (10%), keempat di Kabupaten Gowa (8,5%), kelima di Kota Makassar (8,3%) dan keenam di Kabupaten Pangkep (7,8%) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2021).

Salah satu penyebab terbanyak kematian ibu saat hamil ialah perdarahan postpartum. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang dirangkum dalam Pusdatin 2020, tercatat penyebab kematian Ibu terbanyak pada tahun 2020, yakni perdarahan postpartum sebanyak 1.330 kasus. (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2020). Perdarahan post-partum menyumbang 19,3% tingkat kematian ibu di Indonesia secara keseluruhan. (Satriyandari & Hariyati, 2017). Perdarahan post-partum kemudian dapat dikategorikan menjadi primer dan sekunder berdasarkan waktu kejadian perdarahan. Selain itu, perdarahan post-partum dapat disebabkan oleh beberapa aspek yakni partus lama, multiparitas, peregangan uterus berlebih, oksitosin drip, anemia pada kehamilan, dan persalinan dengan tindakan (Satriyandari & Hariyati, 2017).

Perdarahan maternal sendiri dapat ditemukan pada orang hamil dengan risiko tinggi seperti preeklamsia (Yurniati & Mustari, 2019). Komplikasi dari perdarahan maternal sendiri meliputi, syok hemoragik hingga anemia. Penurunan volume darah tubuh yang mendadak akibat perdarahan masif akan memberikan *trigger* bagi tubuh merangsang keadaan syok hipovolemik karena rendahnya volume darah dalam tubuh. Kejadian syok ini dapat diikuti oleh penurunan kesadaran dan merupakan ancaman serius terhadap nyawa ibu dan janin yang dikandungnya (Fasha & Rokhanawati, 2019; Yurniati & Mustari, 2019). Kejadian kematian maternal ini dapat dicegah dengan mengurangi faktor risiko kejadian perdarahan, seperti placenta previa, atonia uterus, infeksi, status gizi buruk, eklamsi, multiparitas, anemia pada kehamilan, jarak kehamilan yang terlalu dekat, umur maternal, riwayat pemeriksaan kehamilan (ANC), dan riwayat kronologis kehamilan terdahulu (Hidayah, 2018). Pencegahan dilakukan dengan melakukan deteksi dini faktor resiko tersebut melalui edukasi pentingnya melakukan ANC secara rutin ke bidan dan dokter kandungan keluarga. Dengan teraturnya ANC, sebuah penelitian menunjukkan luaran yang berkorelasi positif terhadap keadaan persalinan yang lebih baik (Hidayah, 2018).

Anemia merupakan faktor risiko terjadinya kejadian postpartum. Rendahnya kadar hemoglobin menyebabkan rendahnya perfusi oksigen ke jaringan, sedangkan kebutuhan perfusi jaringan meningkat akibat proses persalinan sehingga tubuh akan terus berkompensasi hingga muncul kecenderungan terjadi atonia uteri pada ibu yang melakukan persalinan. Atonia uteri terjadi akibat kontraksi uteri yang tidak adekuat akibat rendahnya perfusi darah ke jaringan (Asbar, 2021; Wuryanti, 2010).

Anemia selama kehamilan merupakan permasalahan *emerging* pada negara berkembang dan terbelakang. Menurut World Health Organization (WHO) prevalensi anemia pada kehamilan di Asia Tenggara mencapai 48% dimana hal ini diklasifikasikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang berat (Breyman, 2015). Berdasarkan data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa angka kejadian anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 48,9% meningkat dari tahun 2013 yang masih 37,1%

(Badan Pusat Statistik, 2015). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dari 23.839 ibu hamil yang di periksa kadar hemoglobinya, terdapat ibu hamil dengan kadar hemoglobin 8-11 mg/dl terdapat 23.478 orang (98,49 %) dan ibu hamil dengan kadar hemoglobin < 8 mg/dl terdapat 361 orang (1,15%) (Tanziha et al., 2016). Data dari RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Tahun 2021 mencatatkan terdapat 2336 wanita hamil dalam wilayah kerja rumah sakit. Sebanyak 81 wanita dari 2336 wanita hamil mengalami anemia selama kehamilan. Selain itu, data dari RSUD Batara Siang menunjukkan angka perdarahan *post-partum* pada wanita hamil pada tahun 2021 sejumlah 75 wanita hamil (Data RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep).

Semua resiko yang disebutkan diatas harus ditanggung oleh seorang ibu demi melahirkan buah hati tercintanya. Perjuangan yang harus dilalui selama 9 bulan lamanya membawa buah hati tercinta demi melahirkan dengan selamat dan mendidiknya menjadi anak yang berguna di dunia. Dalam tinjauan keislama, Allah SWT berfirman dalam Surah Al Ahqaf ayat 15 :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahan :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, “Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”

Berdasarkan tafsir kementerian agama RI. Ayat-ayat yang lalu menjelaskan tuntunan tentang pemurnian akidah disertai perintah agar mengesakan Allah dan tidak menyekutukan kepada-Nya. Kini Allah mewasiatkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kami telah mewasiatkan, yakni telah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang sempurna. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya yang sempurna adalah selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia, sang anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, merupakan usia yang menunjukkan kesempurnaan bagi perkembangan jasmani dan rohani manusia, maka dia berdoa, 'ya tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan berilah aku kemampuan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir turun temurun sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada engkau atas segala dosa-dosaku dan sungguh, aku termasuk orang muslim, yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah. (Lutfiah, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas penulis memutuskan untuk mengangkat topik penelitian terkait anemia dan kejadian perdarahan postpartum yang ditinjau dari urgensi bagi edukasi dan penambahan wawasan khasanah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021 ?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak terdapat hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Terdapat hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021.

D. Definisi Operasional Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Instrumen	Kriteria Hasil	Skala
Anemia pada Kehamilan	Anemia pada kehamilan dapat ditegakkan jika kadar Hb \leq 11 gr/dl pada trimester ke-1 dan ke-3, dan/atau \leq 10,5 gr/dl pada trimester ke-2.	Hb $<$ 11 gr/dl pada trimester I dan III atau Hb $<$ 10,5 gr/dl pada trimester II pada saat Antenatal Care (ANC) 1, 2, 3, dan 4.	Data rekam medik	1. Anemia dalam Kehamilan jika sesuai dengan kriteria 2. Tidak anemia pada kehamilan jika tidak sesuai dengan parameter	Nominal
Perdarahan Postpartum	Perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah \geq 500 ml dalam 24 jam pasca melahirkan.	Perdarahan \geq 500 ml dalam 24 jam pertama postpartum	Data rekam medik	1. Perdarahan postpartum jika sesuai parameter 2. Tidak perdarahan post-partum jika tidak sesuai paramater	Nominal

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep untuk mengetahui Hubungan Anemia pada Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum.



E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No	Nama Penelitian/ Tahun	Judul	Metode	Jumlah Sampel	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Farah Luthfia Nugroho, Ninuk Dwi Ariningtyas, Yudith Annisa Ayu Rezkita, Pribakti Budinurdjaja, Muhammad Anas; 2020	Relationship of Anemia in Pregnancy with Postpartum Hemorrhage in Jombang Regional Hospital	Analitik dengan pendekatan <i>case control</i> .	72 sampel	Data penelitian menunjukkan hasil yang signifikan terkait hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum, selain itu, hubungan antara kedua variabel tersebut terbukti kuat secara statistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum • Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>case control</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan
2	Nova Liana Fasha, Dewi	Hubungan anemia dalam kehamilan	Analitik dengan pendekatan	104 sampel	Data penelitian menunjukkan hasil yang signifikan terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat

	Rokhanawati; 2019	dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD PKU Muhammadiyah Bantul tahun 2018	<i>case control.</i>		hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum. Selain itu berdasarkan hasil <i>odds ratio</i> (OR) ibu hamil dengan anemia memiliki resiko 5x lebih besar untuk mengalami perdarahan postpartum	dengan kejadian perdarahan postpartum <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>case control</i> 	penelitian dilakukan <ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penelitian
3	Yurniati, Rohani Mustari; 2017	Hubungan Anemia Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten	Analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study.</i>	91 sampel	Hasil penelitian menunjukkan data yang signifikan terkait hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum. Diharapkan kepada ibu hamil untuk teratur memeriksakan kehamilannya sehingga	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum • Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan • Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>cross sectional study</i>

		Takalar Tahun 2017			dapat terdeteksi sedini mungkin tentang anemia sehingga pencegahan dan pengobatan anemia dapat dilakukan dengan baik serta mengkonsumsi tablet Fe secara teratur dan memperhatikan pola makan dengan gizi seimbang		<ul style="list-style-type: none"> • Waktu Penelitian
4	Hani Nurul Hidayah; 2018	Hubungan Anemia Pada Ibu Hamil Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Di RSUD Ambarawa	Deskriptif korelasi dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> .	85 sampel	Hasil penelitian menunjukkan signifikansi terkait hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum. Selain itu berdasarkan hasil <i>odds ratio</i> (OR) ibu hamil dengan anemia memiliki	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan • Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif

					resiko 4,35x lebih besar untuk mengalami perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia saat hamil		<ul style="list-style-type: none"> korelasi dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>. Waktu Penelitian
5	Feny Aryani; 2017	Hubungan Anemia Pada Saat Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum Di Rsud Panembahan Senopati Bantul	Analitik dengan pendekatan <i>case control</i> dan retrospektif	128 sampel	Hasil penelitian menunjukkan signifikansi terkait hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum. Selain itu berdasarkan hasil <i>odds ratio</i> (OR) ibu hamil dengan anemia memiliki resiko 5x lebih besar untuk mengalami perdarahan postpartum	<ul style="list-style-type: none"> Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>case control</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi dan tempat penelitian dilakukan Waktu penelitian

					dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia saat hamil. Pada grup pasien kasus didapatkan 30,5% mengalami perdarahan postpartum, sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan 11.7% pasien yang mengalami perdarahan postpartum		
6	Debbiyatus Sofia;2015	Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Perdarahan Post Partum	Analitik dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> .	25 sampel	Hasil penelitian menunjukkan signifikansi terkait hubungan antara anemia pada kehamilan dengan perdarahan postpartum.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum • Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan • Waktu penelitian • Penelitian ini menggunakan pendekatan

							studi <i>cross sectional</i> .
7	Diana Handaria, Andra Novitasari, Anada Kaporina; 2012	Perdarahan Post Partum Akibat Anemia pada Ibu Hamil di RSUD Tugurejo Semarang	Observasional dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> .	55 sampel	Hasil penelitian menunjukkan signifikansi terkait hubungan antara kadar hemoglobin dalam darah berpengaruh pada perdarahan postpartum. Pasien dengan defisiensi kadar Hb sedang-berat memiliki risiko lebih besar untuk mengalami perdarahan postpartum	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan • Waktu penelitian
8	Iqfini Kurniati B, Sitti Rahma, Ridha Hafid; 2018	Hubungan Anemia Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan	Analitik dengan pendekatan <i>case control</i>	60 sampel	Hasil penelitian menunjukkan signifikansi terkait hubungan antara anemia berpengaruh pada perdarahan postpartum.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini membahas hubungan antara anemia dengan kejadian perdarahan postpartum 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi dan tempat penelitian dilakukan

		Postpartum Di RSUD Prof. DR. HI. Aloe Saboe Kota Gorontalo				<ul style="list-style-type: none">• Penelitian ini menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan <i>case control</i>	<ul style="list-style-type: none">• Waktu penelitian
--	--	---	--	--	--	---	--

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kejadian anemia pada kehamilan di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021
- b. Mengidentifikasi kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021
- c. Menganalisis hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021.

G. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan bacaan, referensi, serta acuan bagi pembaca khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan promosi kesehatan ibu dan anak pada masyarakat umum guna meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mencegah faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi institusi RSUD Batara siang, Kabupaten Pangkep dalam Menyusun program pencegahan anemia pada ibu hamil di Kabupaten Pangkep.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perdarahan Postpartum

1. Definisi Perdarahan Postpartum

World Health Organization mendefinisikan perdarahan postpartum sebagai kehilangan darah ≥ 500 ml dalam 24 jam pasca melahirkan (Dept. of Reproductive Health and Research, 2012). Perdarahan postpartum dapat diketahui sumber perdarahannya berasal dari tempat implantasi plasenta (plasenta previa), laserasi di traktus genitalia, atau keduanya terjadi bersamaan. Terdapat definisi alternatif yang mengemukakan bahwa perdarahan postpartum adalah kehilangan darah ≥ 500 ml pada persalinan pervaginam atau ≥ 1000 ml pada operasi section caesaria (Brenner et al., 2019).

2. Klasifikasi Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum dapat diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan waktu terjadinya, yakni: (VanderMeulen et al., 2019)

- a. Primer (*early postpartum haemorrhage*), merupakan perdarahan ≥ 500 cc yang terjadi dalam 24 jam pertama setelah persalinan.
- b. Sekunder (*late postpartum haemorrhage*), merupakan perdarahan ≥ 500 cc yang terjadi setelah 24 jam pasca persalinan.

3. Faktor – Faktor Risiko Perdarahan Postpartum

Terdapat beberapa faktor risiko yang mengakibatkan perdarahan postpartum, yakni multiparitas, regangan uterus berlebih, partus lama, usia tua, jarak kehamilan yang terlalu dekat, persalinan dengan tindakan bantuan, anemia, Riwayat persalinan sebelumnya yang buruk, dan status gizi ibu yang buruk (Wuryanti, 2010).

a. Usia

Usia maternal ≤ 20 tahun atau ≥ 35 tahun meningkatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum yang berakibat fatal bagi hidup maternal. Pada usia ≤ 20 tahun, organ reproduksi Wanita masih dalam tahap perkembangan dan belum siap untuk mengandung janin. Sedangkan pada usia ≥ 35 tahun, penurunan fungsi reproduksi Wanita semakin jelas, sehingga memungkinkan komplikasi tersering yakni laserasi di organ genitalia yang menyebabkan perdarahan postpartum menjadi lebih massif (Arya et al., 2021).

“4 terlalu” yang merupakan kampanye Keluarga Berencana (KB) terdiri dari terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat jarak kelahiran, dan terlalu sering melahirkan. Dua diantara kampanye tersebut berkenaan dengan usia maternal dalam mengandung dan melahirkan janin. Jika maternal terlalu muda ditakutkan ada beberapa komplikasi seperti keguguran, preeklampsia, eclampsia, bayi premature, BBLR, fistula vesicovaginal, fistula retovaginal dan kanker leher rahim. Sedangkan jika maternal hamil dan melahirkan terlalu tua akan berisiko lebih besar pada terjadinya keguguran, preeklampsia, eclampsia, partus macet, perdarahan massif, BBLR, dan kelainan kongenital lainnya (Arya et al., 2021; Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017; VanderMeulen et al., 2019).

b. Paritas

Paritas didefinisikan sebagai frekuensi serta kuantitas persalinan yang pernah dialami maternal sebelum kehamilan/ persalinan saat ini. Kemudian, paritas dikelompokkan menjadi 4, yakni: (Mardiyah, 2021)

- Nulipara, paritas 0
- Primipara, paritas 1
- Multipara, paritas 2-5
- Grande multipara, paritas > 5

Pada ibu dengan paritas rendah (primipara/nullipara), sering dijumpai ketidaksiapan dalam reaksi penyesuaian tubuh Wanita karena baru mengalami perubahan yang terjadi seperti kehamilan. Selain itu, terkadang ibu tidak siap menangani komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan semakin meningkat frekuensi melahirkan (multipara > 3) menyebabkan kelemahan uterus sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada kehamilan. Jika ditinjau dari berbagai aspek, jumlah paritas 2-3 merupakan jumlah yang dapat ditolerir jika ditinjau dari penurunan risiko perdarahan postpartum yang dapat menyebabkan kematian maternal. Penurunan dan pencegahan risiko paritas tinggi yang berakhir pada perdarahan postpartum harus dikurangi dengan program keluarga berencana. Karena sejatinya mayoritas masyarakat dengan paritas tinggi merupakan paritas yang tidak direncanakan (Punt et al., 2020; VanderMeulen et al., 2019).

c. Jarak Kelahiran

Jarak kelahiran adalah jarak waktu antara dua kelahiran hidup yang beruntut dari seorang wanita. Proses persalinan dan kehamilan menguras banyak energi fisik dan mental dari seorang perempuan. Tubuh perempuan perlu waktu untuk kembali pulih, jika jarak antara dua kehamilan terlalu dekat, tubuh tidak sempat memulihkan kebugaran, dan berbagai komplikasi permalahan lainnya (Althabe et al., 2015).

Jarak antara dua kelahiran merupakan faktor predisposisi perdarahan postpartum disebabkan oleh berkurangnya kontraksi uterus karena jarak kehamilan terlalu dekat, buruknya kualitas kontraksi uterus tersebut dapat mengakibatkan terlepasnya sebagian plasenta, robekan pada sinus maternalis. Kemudian, tubuh Wanita harus diberikan waktu istirahat 2-4 tahun agar kondisi tubuh maternal dapat kembali prima. Kehamilan dengan jarak ≤ 2 tahun, rahim dan kesehatan ibu belum baik, yang menyebabkan kehamilan ini perlu untuk diwasapadai karena ada kemungkinan terjadinya perdarahan postpartum (Hidayah, 2018).

d. Partus Lama

Kontraksi uterus tidak adekuat merupakan penyebab utama terjadinya partus lama, disamping faktor lain seperti janin dan panggul ibu. Inersia uteri merupakan penurunan frekuensi kontraksi rahim yang menimbulkan penipisan dan pembukaan servik, sehingga bagain terendah janin turun (Tanziha et al., 2016). *Incoordinate uterine action* adalah peningkatan otot uterus diluar kontraksi normal, tidak ditemukan adanya koordinasi kontraksi pada uterus bagian atas, bawah, dan tengah, sehingga kontraksi tidak efisien untuk mengadakan pembukaan. Peningkatan tonus otot menginduksi rasa nyeri berlebih, jika peningkatan tonus disertai oleh pecahnya air ketubuh dalam durasi yang cukup lama, hal itu akan menyebabkan terjadinya spasmus sirkuler setempat yang menyebabkan penurunan luas cavum uteri yang disebut dengan lingkaran kontraksi (Asbar, 2021; Wuryanti, 2010).

Partus lama menyebabkan kelelahan pada uterus, sehingga menyebabkan penurunan tonus ketika melahirkan plasenta. Kemudian setelah uterus tidak dapat berkontraksi dengan baik akan terjadi perdarahan postpartum primer (Sri Yoelinda Sari S, 2010).

e. Anemia

Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah yang beredar dalam darah, kemudian penurunan jumlah sel darah merah diikuti dengan penurunan jumlah Hb dalam darah. Dengan penurunan Hb, yang berfungsi sebagai transport O₂, akan memiliki dampak signifikan terhadap proses persalinan pada Ibu hamil. Pada proses persalinan, aliran darah akan terfokus pada uterus, dikarenakan uterus memerlukan O₂ paling banyak kala itu. Pada ibu hamil dengan anemia, penurunan suplai O₂ akan menyebabkan atonia uterus, atonia uteri ini yang akan berkomplikasi terhadap perdarahan post-partum, yang dapat menyebabkan kematian dari ibu dan janin. Atonia uteri dapat terjadi karena mekanisme hiperkontraksi uterus tanpa diimbangi suplai O₂ yang adekuat ke organ tersebut (Garzon et al., 2020; Handaria et al., 2017; Massé & Antonacci, 2005; Sultan, 2020).

4. Etiologi Perdarahan Postpartum

a. Tonus (Atonia Uteri)

Atonia uteri ialah keadaan tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan yang diakibatkan pelepasan implantasi plasenta setelah bayi lahir. Buruknya kontraktibilitas dari uterus merupakan penyebab utama dari perdarahan postpartum (Blitz et al., 2020).

Atonia uteri disebabkan tidak adekuatnya kontraksi uterus karena respon negatif terhadap oksitosin endogen yang dilepaskan ketika persalinan. Perdarahan postpartum disebabkan oleh karena gangguan arteri spiralis, gangguan ini digambarkan oleh karena ketergantungan terhadap kontraksi namun nihilnya otot guna, sehingga harus dilakukan kompresi manual guna mengembalikan ke keadaan semula. Diagnosis atonia uteri ditegakkan dengan kehilangan darah masif dan rahim lembek, kemungkinan mengandung darah berlebih. Atonia uteri sendiri tidak sepenuhnya menyebabkan gangguan kontraktibilitas, pada beberapa pasien dapat ditemukan kontraksi normal pada fundus uteri yang dapat dirasakan pada saat pemeriksaan abdomen, namun bagian bawah yang tidak dapat diperiksa, dan harus dilakukan pemeriksaan pervaginam (Blitz et al., 2020).

b. *Tissue* (Retensi Plasenta)

Tertinggalnya jaringan, seperti kasus retensio plasenta, dapat mencegah kontraktibilitas maksimal yang dapat dicapai rahim agar dapat mencapai tonus uterus optimal. Waktu lahir plasenta normalnya 8-9 menit pasca bayi lahir, peningkatan waktu lahirnya plasenta meningkatkan risiko terjadinya perdarahan postpartum. Kondisi plasenta yang tetap tertinggal dalam uterus 30 menit setelah anak lahir disebut dengan retensi plasenta. Dicurigai terdapat adhesi kuat antara plasenta dan uterus ketika terjadinya retensi plasenta walaupun sudah diberikan pertolongan aktif kala III (Greenbaum et al., 2017).

Setelah melahirkan, myometrium retro plasenta akan mengalami fase relaksasi. Hal ini terjadi bersamaan dengan myometrium berkontraksi, sehingga plasenta terlepas dan terjadi ekspulsi spontan. Kegagalan kontraksi retro-plasenta mengakibatkan terjadinya retensi plasenta (Endler et al., 2018; Greenbaum et al., 2017).

c. Trauma

Lacerasi dan hematoma yang terjadi akibat proses persalinan dapat menyebabkan kehilangan darah yang lumayan signifikan. Hematoma vagina dan vulva dapat timbul sebagai rasa sakit atau sebagai perubahan tanda – tanda vital yang tidak proporsional dengan jumlah kehilangan darah (Ingec et al., 2011).

Selain itu, trauma yang dapat terjadi pada uterus yakni inversi uterus. Meskipun prevalensi kejadian hanya 0,04% dari persalinan yang terjadi. Inversi uterus biasanya muncul sebagai massa abu kebiruan yang menonjol dari vagina. Pasien dengan inversi uterus mungkin memiliki tanda syok tanpa kehilangan banyak darah (Handaria et al., 2017).

Rupture uteri dapat menyebabkan perdarahan intrapartum dan postpartum. Induksi dan augmentasi meningkatkan risiko ruptur uterus, terutama untuk pasien dengan persalinan sesar sebelumnya. Sebelum persalinan, tanda utama ruptur uteri adalah nyeri perut, hilangnya kontraksi uterus, takikardi ibu, bradikardi janin, dan perdarahan vagina (Handaria et al., 2017; Ingec et al., 2011).

d. Trombin

Sistem koagulasi darah mencegah darah kita untuk terus mengalir dan mengurangi volume darah yang keluar, sehingga perdarahan yang terjadi tidak masif. Kelainan pada proses koagulasi harus dicurigai ketika pasien dengan perdarahan postpartum tidak responsive dengan tatalaksana biasa. Selain itu, ketika darah tidak mengalami penggumpalan ketika berada di wadah samping tempat tidur atau tabung laboratorium *red-top* dalam waktu 5-10 menit, kita harus mencurigai adanya kelainan koagulasi. Kebanyakan penyakit kelainan koagulasi merupakan kelainan hereditas, seperti

sindrom HELLP, hemofilia, purpura trombositopeni, dan penyakit Von-Willebrand (Endler et al., 2018; VanderMeulen et al., 2019).

5. Diagnosis

Perdarahan dengan kuantitas ≥ 500 cc pasca persalinan dalam 24 jam pertama memiliki potensi yang berpengaruh terhadap hemodinamik maternal. Diagnosis perdarahan postpartum menjadi krusial ketika dokter melihat terdapat perdarahan yang berpotensi terjadinya hipotensi dan anemia. Hipotensi dan anemia yang terjadi dalam waktu berkepanjangan akan mengakibatkan kondisi syok. Perdarahan postpartum tidak hanya akan terjadi ketika orang tersebut memiliki faktor predisposisi yang kuat, namun setiap persalinan memiliki risiko yang sama untuk terjadinya perdarahan postpartum (Sentilhes et al., 2016).

Perdarahan postpartum dapat terjadi dengan dua tipe aliran yakni deras dan merembes. Mungkin dokter atau tenaga kesehatan yang merawat pasien akan teralihkan perhatiannya ketika terjadi perdarahan masif, namun seringkali perdarahan yang terjadi merembes kurang nampak dan mendapatkan perhatian (Hidayah, 2018). Perdarahan merembes ini berlangsung lama akan menghasilkan kehilangan darah yang banyak. Seringkali dokter menampung luaran urine dari pasien guna menghitung jumlah perdarahan dan mencatatnya untuk dilakukan pemantauan secara ketat.

Perdarahan postpartum dapat terjadi perdarahan hebat yang dapat memicu keadaan syok. Perdarahan postpartum juga dapat bentuk tetesan darah yang sedikit namun secara konsisten mengeluarkan volume darah yang sama, sehingga dapat menjadi lemas dan jatuh dalam keadaan subsyok atau syok. Dalam proses persalinan harus dilakukan pemantauan tanda – tanda vital dan periksa kontraksi uterus dan perdarahan 1 jam.

Terkadang perdarahan pun dapat terjadi penumpukkan di vagina dan di dalam uterus. Hal ini dapat diketahui selanjutnya ketika adanya kenaiakn fundus uteri setelah

uri keluar. Etiologi perdarahan harus dicari tahu melalui anamnesis, pemeriksaan umum, abdomen, dan pemeriksaan vagina (Yurniati & Mustari, 2019).

Atonia uteri disebabkan oleh kegagalan kontraksi uterus, sehingga pada pemeriksaan fisik, palpasi, kita didapatkan uterus besar dan lembek (Belghiti et al., 2011). Pada laserasi jalan lahir, pada pemeriksaan palpasi didapatkan uterus keras. Eksplorasi vagina, dapat dilakukan dengan pemeriksaan dalam vagina dan uterus, hasil pemeriksaan dapat ditemukan adanya robekan serviks, vagina, hematoma, dan adanya plasenta previa (Blitz et al., 2020; Brenner et al., 2019; Greenbaum et al., 2017).

Diagnosis perdarahan postpartum susah ditegakkan jika terjadi dalam durasi yang cepat. Namun, jika kebalikannya perdarahan sedikit namun terjadi terus menerus dalam waktu yang lama dapat menimbulkan kehilangan banyak darah. Gejala khas pada perdarahan postpartum yang masif ditandai oleh perdarahan tak terkontrol, penurunan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, penurunan hematokrit, oedema dan nyeri jaringan vagina dan perineum.

6. Pencegahan Dan Penanganan Perdarahan Postpartum

a. Penatalaksanaan Perdarahan Postpartum

Tujuan penatalaksanaan perdarahan postpartum yakni, menghentikan perdarahan dan mengganti darah yang hilang. Normalnya, kedua tindakan dilakukan secara bersama sama, tetapi dalam beberapa keadaan, mengganti darah yang hilang diutamakan (Ganchimeg et al., 2014).

b. Pencegahan Perdarahan Postpartum

Pencegahan bagi perdarahan postpartum adalah penatalaksanaan pengejanan kala II dan III secara berurutan (*lege artis*). Beberapa sumber menyebutkan pemberian injeksi ergometrin pasca bayi lahir dapat bermanfaat untuk mengurangi perdarahan.

Perdarahan postpartum sudah menjadi penyebab utama dari kematian maternal pasca bersalin, biasanya disebabkan oleh retensio plasenta dan atonia uteri. Pencegahan utama yang terbaik dengan melakukan tatalaksana aktif kala III, yakni: (Asbar, 2021)

- 1) Jepit dan potong tali pusat segera setelah bayi lahir. Penjepitan tali pusat menggunakan klem Kelly atau kocher sekitar 3 cm dari umbilicus bayi. Kemudian lakukan pengurutan tali pusat dari klem ke arah maternal. Berikat jepitan menggunakan klem kedua pada jarak 2 cm dari vagina ibu. Sterilkan area diantara kedua klem menggunakan povidone iodine. Pegang tali pusat dengan tangan kiri dan potong tali pusat di area antara dua klem, sementara tangan lainnya melindungi bayi.
- 2) Pemberian uterotonika bertujuan untuk menggenerasi kontraksi yang adekuat. Terdapat dua jenis obat uterotonika yaitu oksitosin dan ergometrin. Namun, lumrahnya dalam prakteknya sering digunakan Oksitosin 10 IU secara intramuskuler.
- 3) *Controlled cord traction* dilakukan guna membantu persalinan plasenta
- 4) Pasca persalinan kala III berakhir, dokter penolong harus tetap waspada terkait risiko perdarahan. Penyebab utama pada kematian adalah perdarahan postpartum yaitu atonia uteri. Untuk mengurangi kemungkinan atonia adalah dengan melakukan masase uterus secara aktif untuk merangsang kontraksi uterus yang baik.
- 5) Inisiasi menyusui diri, kemudian diberikan perangsangan reflektoris putting susu untuk mengeluarkan oksitosin oleh kelenjar hipofisis yang dapat membantu perbaikan kontraksi uterus.

B. Anemia Pada Kehamilan

1. Definisi Anemia Pada Kehamilan

Anemia pada kehamilan dapat ditegakkan ketika jumlah hemoglobin maternal (Hb) ≤ 11 gr/dl berdasarkan standar yang ditentukan oleh *World Health Organization* (WHO). Namun, berdasarkan definisi dari *Center of Disease Control* (CDC) Amerika, anemia pada kehamilan dapat ditegakkan jika kadar Hb ≤ 11 gr/dl pada trimester ke-1 dan ke-3, dan/atau $\leq 10,5$ gr/dl pada trimester ke-2 (Sultan, 2020).

Hb terkandung dalam sel darah merah yang berfungsi mengikat oksigen kemudian mengantarkannya ke jaringan yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama tubuh membutuhkan oksigen sebagai bahan bakar utama dalam melakukan proses metabolisme dan lainnya di dalam tubuh. Begitu pula pada ibu hamil, dimana tingkat metabolisme perempuan sedang berada di puncaknya. Tubuh perempuan melakukan adaptasi dengan meningkatkan metabolisme karena di dalam tubuhnya ada manusia kecil yang dipersiapkan lahir ke dunia (Stephen et al., 2018). Peningkatan metabolisme tersebut bertujuan untuk membentuk jaringan tubuh, organ janin, dan mempersiapkan energi bagi ibu hamil dalam beraktifitas serta mempersiapkan tubuh untuk proses persalinan nantinya.

2. Jenis Anemia Pada Kehamilan

Terdapat beberapa jenis anemia pada kehamilan, yakni:

a. Anemia Fisiologis

Pada kehamilan terdapat berbagai penyesuaian pada tubuh maternal salah satunya terdapat penyesuaian dengan peningkatan plasma, sel darah merah, dan hemoglobin yang tidak proporsional. Peningkatan ketiga komponen tersebut disebabkan oleh hemodilusi atau peningkatan volume plasma yang melebihi sel darah merah (Horowitz et al., 2013).

b. Anemia akibat Defisiensi Nutrisi

1) Anemia Defisiensi Besi

Permasalahan pada anemia paling sering ditemui jenis anemia defisiensi besi pada orang awam. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 370 juta Wanita di negara berkembang memiliki anemia defisiensi zat besi. Jika dilihat lebih dalam, ibu hamil memiliki dominasi pada angka 51% dibandingkan dengan Wanita yang tidak hamil di angka 41% (Garzon et al., 2020).

Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FTKP), mayoritas ibu hamil yang mengeluhkan keluhan lemas, dll didiagnosa dengan anemia defisiensi besi (Yurniati & Mustari, 2019). Berdasarkan penelitian, sekitar 80% Wanita di Asia tidak minum suplemen zat besi ketika kehamilan, yang menyebabkan terjadinya anemia defisiensi zat besi. Penyebabnya bermacam – macam, rendahnya asupan zat besi, absorbs buruk dari makanan, buruknya cadangan zat besi masa remaja, peningkatan kebutuhan fisiologik selama kehamilan, perdarahan kronis, dan infeksi virus atau bacterial (Breyman, 2015).

Manifestasi klinis umum pada anemia yaitu lemas, lesu, tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas, meskipun hal tersebut juga terkadang normal pada kehamilan tertentu (primipara & trimester awal kehamilan) (Mardiyah, 2021). Selain itu, pusing, kebas, konjungtiva anemis, chelitis, dan parestesia (kesemutan) dapat menjadi gejala pendukung dari diagnosis anemia defisiensi zat besi pada kehamilan. Tanda khas dalam mendiagnosa anemia defisiensi besi ialah, choilonychia atau kuku sendok, pada kasus anemia berat bisa ditemukan perdarahan retina, konjungtivitis, takikardi, dan splenomegaly (Garzon et al., 2020).

Hal ini pun dijelaskan dalam perintah Allah SWT yang tercantum dalam firmannya pada Q.S. Abasa (80) : 24

قَلِيلٌ يَنْظُرُ الْإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahan :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”.

Menurut Tafsir Al Misbah Jilid 15 ialah Allah berfirman: Jika ia benar-benar ingin melaksanakan tugasnya dengan sempurna, maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memperhatikan dan merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya, kemudian Kami belah bumi yakni bumi itu membelah tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, kemudian Kami tumbuhkan di atasnya biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran, dan juga pohon Zaitun serta pohon kurma, dan kebun-kebun yang rimbun, serta buah-buahan dan rumput-rumputan, untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternak kamu.

Menurut Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya dengan memasang akal nya – kepada makanannya. Artinya bahwa setiap makanan itu harus di ketahui bagaimana makanan itu diciptakan dan diatur untuknya.

2) Anemia Defisiensi Asam Folat & Vitamin B12

Kelainan dalam proses replikasi DNA dapat berpengaruh terhadap tingkat kematangan sel darah merah sehingga menyebabkan yang kita kenal anemia megaloblastik. Penyebab utama anemia tersebut yakni kekurangan asam folat dan vitamin B12 yang menjadi prekursor kelainan replikasi DNA. Secara statistik, anemia defisiensi B12 merupakan jenis anemia terbanyak kedua setelah anemia defisiensi zat besi. Hal ini berhubungan dengan fungsi asam folat dalam

metabolisme internal tubuh, yakni nutrisi untuk sintesis DNA dan produksi asam amino. Anemia defisiensi asam folat dapat disebabkan rendahnya asupan makanan bergizi, penurunan status gizi hingga buruk, hingga abnormalitas pada penyerapan asam folat dalam tubuh. Selain itu, dapat ditemukan peningkatan fisiologi terhadap kebutuhan asam folat karena kehamilan, yang jika tidak dipenuhi akan berdampak buruk pada pertumbuhan janin dan proses eritropoesis maternal (Horowitz et al., 2013; Stephen et al., 2018; World Health Organization, 2021).

c. Anemia Herediter

1) Anemia Sel Sabit

Sickle cell anemia merupakan tipe anemia herediter yang berbentuk bulan sabit seperti namanya. Secara fisiologis, sel darah merah berbentuk bikonkaf dan oval yang memudahkan pergerakannya melalui pembuluh darah besar maupun kecil karena kemampuan elastisitasnya yang didukung oleh bentuknya tersebut. Namun, pada penderita anemia sel sabit bentuk sel darah merah akan berubah menjadi seperti bulan sabit, keras, dan lengket, sehingga menyulitkan peredaran darah ke pembuluh darah perifer yang sempit (Sundd et al., 2019). Selain itu, karena bentuknya yang membatasi pergerakannya tersebut, sel darah merah ketika melalui pembuluh darah kecil akan menyumbat aliran darah. Hal tersebut dapat menimbulkan komplikasi yang serius seperti stroke.

2) Talasemia

Talasemia terjadi akibat defisiensi pada pembentukan rantai α atau β pada hemoglobin. Anemia dibagi menjadi dua berdasarkan defisiensi yang terjadi pada kedua rantai globin tersebut. Talasemia merupakan penyakit yang diturunkan secara herediter dan memiliki komplikasi yang banyak dan dominan muncul pada dekade kedua dalam hidup. Namun, sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Asia dan Indonesia memiliki kecenderungan memunculkan hal tersebut

lebih cepat yang disebabkan oleh anemia kronis, kelebihan zat besi akibat kurangnya edukasi penggunaan suplementasi zat besi (Nienhuis & Nathan, 2012).

3) Anemia Hemolitik

Berdasarkan terminologi dari anemia ini menunjukkan bahwa proses destruksi sel darah merah terjadi lebih cepat dibandingkan produksinya di dalam limpa. Anemia hemolitik jelas menjadi penyulit pada keadaan hamil oleh karena kondisi anemia hemolitik akan memberat pada kehamilan, dan menyebabkan kerentanan pada kehamilan tersebut. Namun, secara sebaliknya, kehamilan pun dapat menjadi *trigger* dari terjadinya krisis hemolitik pada Wanita yang sebelumnya tidak menderita anemia (Tanziha et al., 2016).

4) Sindroma HELLP

HELLP sindrom merupakan akronim dari Hemolisis, *Elevated Liver enzymes*, dan *low platelets*, yang berhubungan erat dengan preeklamsia. Prevalensi kejadian sindroma HELLP meningkat secara linear dengan adanya preeklamsia pada Wanita hamil (Tanziha et al., 2016).

5) Anemia Hipoplastik

Anemia hipoplastik merupakan anemia yang disebabkan oleh disfungsi sumsum tulang dalam produksi sel darah merah baru. Dalam menegaskan diagnosis anemia hipoplastik, pemeriksaan diagnostik menyeluruh harus dilakukan yakni pemeriksaan darah tepi, pungsi ekternal, dan pemeriksaan retikulosit (Sultan, 2020).

3. Patofisiologi Anemia Pada Kehamilan

Peningkatan jumlah darah pada Wanita hamil lazim ditemukan. Peningkatan sel darah merah tersebut dibarengi oleh peningkatan masif dari plasma darah sehingga terjadi pengenceran darah. Pada keadaan ini, plasma darah memiliki porsi 30%, sel darah merah 18%, dan hemoglobin 19%. Puncak dari peningkatan sel darah merah ini akan terjadi pada trimester ke-III pada kehamilan. Peningkatan sel darah merah disertai dengan peningkatan plasma tersebut berfungsi untuk mengurangi kinerja jantung yang berat saat kehamilan, dikarenakan ada dua manusia yang harus disuplai oleh jantung kita. Perubahan sirkulasi pada kehamilan terfokus pada plasenta dan payudara merupakan perubahan hematologi yang lumrah sehubungan dengan kehamilan. Kemudian, perubahan hematologi tersebut akan mulai menurun dan akhirnya menghilang sepenuhnya pada bulan ke-3 pasca melahirkan (Khalafallah & Dennis, 2012). Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah (*hypervolemia*). *Hypervolemia* merupakan hasil dari peningkatan volume plasma dan eritrosit (sel darah merah) yang berada dalam tubuh tetapi peningkatan ini tidak seimbang yaitu volume plasma peningkatannya jauh lebih besar sehingga memberi efek yaitu konsentrasi haemoglobin berkurang dari 12 g/100 ml.

Pada kehamilan relatif terjadi anemia karena ibu hamil mengalami *hemodelusi* (pengenceran) dengan peningkatan volume 30 % sampai 40 % yang puncaknya pada kehamilan 32 sampai 34 minggu. Jumlah peningkatan sel darah 18 % sampai 30 % dan haemoglobin sekitar 19 %. Bila haemoglobin ibu sebelum hamil berkisar 11 gr% maka dengan terjadinya hemodilusi akan mengakibatkan anemia dalam kehamilan dan Hb ibu akan menjadi 9, 5-10 gr%.

Peningkatan volume plasma dimulai pada minggu ke-6 kehamilan. Peningkatan kadar plasma darah menyusul peningkatan dari sel darah merah, sehingga terjadi penurunan jumlah Hb fisiologis selama kehamilan. Sebagai dampaknya terdapat peningkatan kapasitas pengangkut oksigen pada ibu Hamil walaupun dengan kadar Hb yang rendah (Nienhuis & Nathan, 2012; Sentilhes et al., 2016; Stephen et al., 2018).

Pada Wanita hamil aterm, diperkirakan volume plasma berkisar 1.250 ml, dengan total peningkatan diatas 48% dari kondisi saat tidak mengandung. Jumlah tersebut merupakan angka yang cukup drastis jika dibandingkan dengan keadaan awal, yang kemudian dilanjutkan dengan peningkatan volume plasma yang lebih lambat setelah minggu ke – 30 kehamilan.

4. Gejala Anemia Pada Kehamilan

Pasien sering datang dengan keluhan kelelahan, pusing berulang, mata berkunang, kurangnya nafsu makan, dan muntah hebat ketika mendekati usia kehamilan trimester pertama.

Dokter harus mulai mencurigai seorang ibu menderita anemia defisiensi besi ketika keluhan lemah, pucat, mudah pingsan, disertai tekanan darah yang rendah menonjol. Secara klinis, pemeriksa dapat menemukan kepucatan pada muka dan keadaan umum lemah (malnutrisi). Selanjutnya dengan kecurigaan tersebut dokter dapat meminta pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan lab darah rutin, yang berfokus pada pemeriksaan kadar hemoglobin darah. Standar baku untuk pemeriksaan hemoglobin adalah menggunakan spektrofotometri (Belghiti et al., 2011; Ingec et al., 2011; Khalafallah & Dennis, 2012).

Perjalanan anemia melalui beberapa tahap, yaitu penurunan jumlah ferritin, yang diakibatkan inadkuatnya *intake* zat besi dari makanan; rendahnya penyerapan zat besi dari makanan (berkisar 20-30% dari sumber hewani, sedangkan nabati hanya berkisar 1-6%); kejadian anemia memicu peningkatan kinerja jantung untuk memenuhi kadar O₂ untuk seluruh organ, yang akhirnya menimbulkan palpitasi yang sering dirasakan oleh penderita. Lemas, letih, lesu, mata berkunang, mengantuk, konjungtivitis anemia, dan *clubbing finger* merupakan beberapa gejala penyerta dari anemia (Asbar, 2021).

5. Derajat Anemia Pada Kehamilan

Diagnosis anemia pada ibu hamil menurut WHO dapat ditegakkan apabila kadar Hb ≤ 11 gr/dL. Di Indonesia, anemia pada ibu hamil diklasifikasikan menjadi; anemia ringan: 9-10.9 gr/dL, anemia sedang : 7-8 gr/dL, dan anemia berat: kurang dari 7 gr/dL (Asbar, 2021).

Standarisasi pengukuran baku hemoglobin dengan cara cyanmet, namun selain cyanmet terdapat cara oxyhaemoglobin dapat digunakan sebagai standarisasi pemeriksaan terhadap pemeriksaan cyanmet. Sejauh ini, pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) di Indonesia alat diagnostik yang tersedia yakni alat Sahli. Alat Sahli terkenal karena kemudahan dan biaya penggunaan yang bersahabat untuk penggunaan massal di FTKP.

6. Pengaruh Anemia Pada Kehamilan

Anemia dalam kehamilan dapat memberikan dampak negatif pada maternal, baik dalam masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Beberapa penyulit yang dapat timbul akibat anemia yakni, abortus, kehamilan premature, partus lama, yang diakibatkan lemahnya otot rahim karena ketidakmampuan berkontraksi dalam waktu yang lama akibat insufisiensi aliran darah (inersia uteri), perdarahan pasca melahirkan karena tidak adanya otot rahim (atonia uteri), syok hipovolemik, infeksi, serta anemia derajat berat yang dapat menyebabkan dekompensasi kordis. Syok hipovolemik dapat memberikan komplikasi berupa hipoksia yang dapat berujung kepada kematian ibu ketika proses melahirkan (Althabe et al., 2015; Arya et al., 2021; Asbar, 2021; Belghiti et al., 2011).

Risiko kejadian pada masa antenatal ditandai dengan BBLR, plasenta previa, preeklamsia, pecahnya ketuban dini, anemia pada masa intranatal, subinvolusi uteri. Pada trimester ke-II dan III, anemia dapat menyebabkan kelahiran premature, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin, asfiksia intrapartum hingga

kematian, hiperemis gravidarum, ketubahn pecah dini, dan dekompensasi kordis hingga kematian ibu (Dept. of Reproductive Health and Research, 2012).

Pada anemia dengan kehamilan dapat menyebabkan gangguan his kekuatan mengejan, kala dua berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan waktu lama dan sering memerlukan tindakan operasi ginekologi, kala tiga dapat diikuti retensio plasenta dan perdarahan postpartum akibat atonia uteri, kala empat dapat terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri, primer & sekunder, janin lahir dengan anemia, persalinan dengan tindakan tinggi karena ibu cepat Lelah dan gangguan perjalanan persalinan perlu tindakan operatif (Belghiti et al., 2011; Blitz et al., 2020; Brenner et al., 2019). Anemia kehamilan dapat menyebabkan kelemahan dan kelelahan sehingga akan mempengaruhi proses persalinan ibu nantinya.

Pertumbuhan plasenta dan janin akan mengalami gangguan akibat penurunan hemoglobin akibat peningkatan frastis volume darah yang disertai peningkatan volume plasma yang menyebabkan hemodilusi (Breyman, 2015). Penurunan volume ini akan terjadi lebih kecil pada ibu hamil dengan zat besi yang adekuat. Kenaikan volume plasma berfungsi untuk memenuhi peningkatan kebutuhan perfusi dari plasenta dan untuk penyediaan cadangan saat kehilangan darah terbesar ketika melahirkan.

Selanjutnya Menurut Proverawati akibat yang akan terjadi pada anemia kehamilan adalah:

- a. Hamil muda (trimester pertama): abortus, missed abortion, dan kelainan *congenital*.
- b. Trimester kedua: persalinan prematur, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam rahim, asphyxia intrauterine sampai kematian, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), gestosis dan mudah terkena infeksi, IQ rendah, dekompensasi kordis kematian ibu.

Lebih lanjut, akibat kekurangan asupan zat gizi atau anemia pada trimester I dapat menyebabkan hypermisis gravidarum, kelahiran premature, kematian janin, keguguran

dan kelainan pada system saraf pusat. Sedangkn pada trimester ke II dan III dapat mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan janin terganggu, BBLR. Selain itu, berakibat terjadi gangguan kekuatan rahim saat persalinan dan perdarahan postpartum.

Allah berfirman dalam QS Luqman /31:14;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahan :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tuanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang tuamu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Menurut Ilmu Tafsir Al Misbah Jilid 11, ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan Kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; Pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya dan penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: bersyukurlah kepada-Ku! karena Aku yang menciptakan kamu dan menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada dua orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan karena hanya kepada Allah tidak kepada selain Aku kembali kamu semua wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Dan kami perintakan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan al-wahn ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Ata Al-Khurrasani ialah lemah yang bertambah-tambah. – dan menyapihnya dalam dua tahun yakni mengasuh dan menyusunya setelah melahirkan selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Kata (Lai j) wahn berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan betapa lemahnya sang ibu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Firman-Nya: (J waJishaluhufi ‘amain) dan penyapiannya di dalam dua; tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima.

Allah berfirman dalam QS Ar-Rad/13:8 :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّوا مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Terjemahan :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir berdasarkan firman Allah dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kandungan rahim yang tidak sempurna dan yang bertambah lemah. (Ar-Ra'd: 8) Imam Bukhari menceritakan kepada kami Ibrahim ibnul Munzir, telah menceritakan kepada kami Ma'an, telah menceritakan kepada kami Malik, dari Abdullah ibnu Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Ada lima kunci ilmu gaib, tidak ada yang tahu selain Allah, yaitu: Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali hanya Allah, tidak ada yang tahu apa yang terkandung di dalam rahim kecuali hanya Allah, tidak ada yang tahu bila hujan turun kecuali hanya Allah, seseorang tidak akan mengetahui di negeri mana ia akan mati, dan tidak ada yang tahu bila kiamat terjadi kecuali hanya Allah. Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, dan Ad-Dahhak. Mujahid juga mengatakan bahwa itu berarti ketika seorang wanita melihat darah sebelum sembilan bulan kehamilan. Mujahid menambahkan lebih dari sembilan bulan hari seperti hari-hari haid. Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Ibnu Zaid, dan Mujahid juga mengatakan tentang arti firman-Nya: dan isinya kurang sempurna. (Ar-Ra'd: 8) Bahwa yang dimaksud adalah bila wanita yang bersangkutan mengeluarkan banyak darah hingga ≥ 500 gr/dl.

7. Pencegahan Dan Penanganan Anemia Pada Kehamilan

Penatalaksanaan anemia bergantung pada jenis anemia dan penyebab anemia tersebut. Secara umum, WHO menganjurkan pemberian 120 mg elemental iron dan 0,4 mg asam folat pada wanita hamil yang terdiagnosa anemia. 30 mg elemental iron setara dengan 150 mg ferrous sulfate, 90 mg ferrous fumarate atau 250 mg ferrous gluconate (Khalafallah & Dennis, 2012; Sundd et al., 2019; World Health Organization, 2021; Yurniati & Mustari, 2019).

Selain itu, penanganan anemia defisiensi besi adalah dengan menggunakan preparate besi per oral atau parenteral. Terapi secara per oral dengan pemberian preparate besi ferrosulfat, fero glukonat, atau N a-fero bistirat. Diberikan dosis sebanyak 60 mg/hari sehingga dapat memberikan dampak bagi kenaikan hemoglobin dalam darah sebanyak 1 gr/dL per bulan setelah pemakaian. Sedangkan pada pemberian preparate secara parenteral (intravena) dengan menggunakan ferum dextran sebanyak 1000 mg (20 ml) intravena atau 2 x 10 ml secara intramuscular, efek dari pemberian obat ini relatif lebih cepat karena dapat meningkatkan kadar hemoglobin sebanyak 2 gr/dL selama setelah penggunaan teratur. Pemberian secara parenteral hanya didasarkan oleh indikasi, seperti intoleransi zat besi pada traktus gastrointestinal, anemia berat, dan rendahnya kepatuhan pasien terhadap minum obat. Pada daerah dengan angka kehamilan yang tinggi namun disertai dengan angka pemenuhan nutrisi yang minim, Wanita di daerah tersebut diwajibkan meminum suplementasi yakni sulfas ferrous atau glukonas ferrous satu tablet per hari selama masa kehamilannya. Selain itu, penekanan atas diet yang seimbang dan juga meningkatkan konsumsi sayuran tinggi akan zat besi dilakukan pada upaya edukasi wanita hamil untuk mengurangi prevalensi kejadian dari anemia defisiensi besi yang tinggi seperti yang terjadi Sekarang ini di negeri Indonesia.

Pencegahan anemia pada kehamilan dapat dilakukan dengan cara diet seimbang, kaya akan zat besi dan protein. Makanan yang kaya akan zat besi, seperti pangan hewani yaitu hati, daging, dan telur. Selain itu dapat diperoleh dari nabati, seperti

sayuran hijau, kacang polong, kacang-kacangan, dan gandum. Dianjurkan juga untuk menggunakan peralatan masak yang terbuat dari besi (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, 2017).

Dalam firman Allah Swt. juga menjelaskan tentang anjuran agar memperhatikan makanan seperti dalam (Q.S Al-Baqarah ayat 168) :

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu”


Berdasarkan tafsir kementerian agama RI, Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu dayanya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia.

C. Hubungan Anemia Pada Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum

Prevalensi kejadian anemia pada kehamilan jelas memberikan pengaruh buruk bagi janin, ibu, proses persalinan, maupun nifas. Komplikasi yang sering kali kita amati yakni Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), bayi lahir prematur, aborsi, perdarahan postpartum, partus lama, dan syok hipovolemik. Banyak faktor yang mempengaruhi peristiwa ini, namun ada beberapa faktor risiko yang hampir selalu ada, yakni status gizi, kadar Hb, umur, dan tingkat pendidikan (Fasha & Rokhanawati, 2019; Ganchimeg et al., 2014; Garzon et al., 2020; Greenbaum et al., 2017).

Anemia secara pasti mengurangi jumlah sel darah merah yang beredar dalam darah, yang kemudian berpengaruh terhadap jumlah hemoglobin dalam darah. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkan ke organ yang membutuhkan. Ketika berbicara terkait proses persalinan, uterus membutuhkan jumlah oksigen yang lebih dibandingkan organ lain karena berkontraksi dengan hebat kala itu. Pada ibu hamil dengan anemia, berkurangnya pasokan oksigen ke organ vital, salah satunya uterus, dapat menyebabkan komplikasi, salah satunya perdarahan hingga kematian. Kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lama dapat menginduksi kelelahan otot rahim dalam berkontraksi yang berujung kepada atonia uterus (Handaria et al., 2017; Horowitz et al., 2013; Khalafallah & Dennis, 2012; Mardiyah, 2021; Nienhuis & Nathan, 2012). Atonia uteri menjadi berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya syok hipovolemik yang disebabkan oleh perdarahan postpartum. Hal ini termasuk ke dalam kegawatdaruratan bidang obstetri, yang tidak ditangani segera akan menyebabkan kematian.

D. Kerangka Teori






Bagan 2.1 Kerangka Teori

E. Kerangka Konsep



Keterangan :

-  = Variabel Independen
-  = Variabel Dependen
-  = Hubungan yang diteliti

Bagan 2.2 Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang bersifat analitik. Penelitian observasional yaitu penelitian yang tidak memberikan perlakuan sama sekali tapi hanya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

Penelaahan lebih lanjut terkait hubungan anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum menggunakan analisis data sekunder dengan pendekatan *case control*. Pendekatan *case control* dipilih guna memprediksi faktor-faktor risiko terjadinya penyakit. Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok kontrol dan kasus. Kelompok kontrol terdiri dari ibu bersalin yang tidak mengalami kejadian perdarahan postpartum. Sedangkan, kelompok kasus terdiri dari ibu bersalin yang mengalami kejadian perdarahan postpartum.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang, Kabupaten Pangkep.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan 31 Mei – 30 Juni 2022.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai generalisasi wilayah yang terdiri dari subjek dan objek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan dari hasilnya. Populasi pada penelitian ini yakni ibu pasca melahirkan di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep pada 1 Januari 2021 – 31 Desember 2021 yakni 2336 pasien.

2. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama dan dapat digunakan untuk subjek penelitian. Sampel didapatkan dengan menggunakan teknik sampling yang benar. Sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan tidak masuk ke dalam kriteria eksklusi.

Penelitian ini menggunakan perbandingan 1:1 antara kelompok kontrol dan kasus kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep yakni 75 pasien. Karena perbandingan yang digunakan 1:1, maka jumlah sampel kelompok kontrol (pasien yang tidak mengalami perdarahan postpartum) yaitu 75 pasien. Sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 150 sampel.

3. Kelompok Kasus

Sampel kelompok kasus pada penelitian ini adalah ibu bersalin mengalami Perdarahan Postpartum berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu dengan persalinan pervaginam
- 2) Ibu bersalin dengan perdarahan >500 cc selama <24 jam postpartum
- 3) Terdapat pemeriksaan Hb pada saat Antenatal Care (ANC) 1, 2, 3, dan 4
- 4) Ibu dengan riwayat anemia pada kehamilan dengan perbaikan setelah obat tambah darah tetap dimasukkan sebagai subjek penelitian
- 5) Ibu berusia 20-35 tahun
- 6) Ibu dengan paritas ≤ 4
- 7) Tercatat lengkap dalam rekam medis RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Ibu bersalin dengan penyakit kronis
- 2) Ibu bersalin dengan usia kehamilan preterm
- 3) Ibu dengan kehamilan ganda
- 4) Kematian janin intrauterine

4. Kelompok Kontrol

Sampel kelompok kontrol pada penelitian ini adalah ibu bersalin yang tidak mengalami Perdarahan Postpartum berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu dengan persalinan pervaginam
- 2) Ibu bersalin dengan perdarahan <500 cc selama <24 jam postpartum
- 3) Terdapat pemeriksaan Hb pada saat Antenatal Care (ANC) 1, 2, 3, dan 4
- 4) Ibu dengan riwayat anemia pada kehamilan dengan perbaikan setelah obat tambah darah tetap dimasukkan sebagai subjek penelitian
- 5) Ibu berusia 20-35 tahun
- 6) Ibu dengan paritas ≤ 4
- 7) Tercatat lengkap dalam rekam medis RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep Periode 2021

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Ibu bersalin dengan penyakit kronis
- 2) Ibu bersalin dengan usia kehamilan preterm
- 3) Ibu dengan kehamilan ganda
- 4) Kematian janin intrauterine

D. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dan sekunder merupakan proses pendekatan dan pengumpulan karakteristik sampel dalam sebuah penelitian.

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode data sekunder. Peneliti mengumpulkan data variabel terikat dan variabel bebas yang dibutuhkan menggunakan sumber Rekam Medis Pasien RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Peneliti melakukan sortir data yang sesuai dengan kriteria inklusi serta tidak masuk dalam kriteria eksklusi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *SPSS for Windows* yang disajikan dalam bentuk tabulasi distribusi frekuensi dan persentase yang dijelaskan secara naratif. Kemudian, uji *chi-square* dilakukan untuk menilai pengaruh antar variabel bebas dan terikat. Berikut, peneliti menjabarkan langkah – langkah pengolahan data, sebagai berikut:

a. *Editing*

Proses ini meliputi pengecekan kembali keabsahan data dalam penelitian, kebenaran, dan kelengkapan guna mendapatkan luaran penelitian yang objektif.

b. *Coding*

Coding dimaksudkan untuk mengkuantifikasi nilai dari data yang berupa kalimat agar mudah diolah secara statistik.

c. *Transferring*

Data yang sudah diberikan kode kemudian disusun secara berurutan sesuai dengan klasifikasi data.

d. *Tabulating*

Tabulasi merupakan proses meringkas dan mengelompokkan data dalam bentuk tabel – tabel sesuai kebutuhan guna memudahkan dalam proses analisa data.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesa yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis data dibagi sebagai berikut:


a. Analisis Univariat

Analisis univariat menjelaskan keseluruhan data secara deskriptif pada setiap variabel dependen dan independen dalam tabel frekuensi.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel, yakni dependen (kejadian perdarahan postpartum) dengan variabel independen (anemia pada kehamilan).

F. Alur Penelitian



Bagan 3.2 Alur Penelitian

G. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Menyertakan surat pengantar yang ditujukan kepada pihak terkait sebagai permohonan izin penelitian.
3. Menjaga kerahasiaan data yang didapat dari responden yang digunakan hanya untuk keperluan penelitian.
4. Tidak memberi paksaan dan mengintervensi subjek penelitian dalam proses pengambilan data.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Siang merupakan rumah sakit tipe C milik pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Pangkajene No. 7. RSUD Batara Siang merupakan salah satu RSUD dari dua RSUD yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Tabel 4.1 Sebaran Usia Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Usia	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
20 – 25 tahun	32	42,6%	32	42,6%
26 – 30 tahun	19	25,3%	21	28%
31 – 35 tahun	24	32,1%	22	29,33%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Dalam tabel 4.1 menjelaskan bahwa usia ibu bersalin di RSUD Batara siang memiliki sebaran usia Ibu yang melahirkan terbanyak pada usia 20-25 tahun (42,6%), kemudian diikuti kelompok usia 31-35 tahun pada kelompok kasus dan kontrol berurutan (32,1% & 29,33%), dan terakhir adalah kelompok usia 26-30 tahun (25,3% & 28%).

Tabel 4.2 Distribusi Data Gravida Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Gravida	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Primigravida	20	26,7%	25	33,3%
Multigravida	55	73,3%	50	66,7%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara Siang didominasi oleh ibu yang sudah mengalami kehamilan beberapa kali atau multigravida baik pada kelompok kasus (73,3%) dan kelompok kontrol (66,7%). Sedangkan hanya terdapat 26,7% ibu primigravida di kelompok kasus dan 33,3% di kelompok kontrol. Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil data univariat dalam dua kelompok, yakni kelompok kontrol (normal) dan kasus (perdarahan post-partum).

Tabel 4.3 Distribusi Data Paritas Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Partus	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Nulipara	20	26,7%	31	41,3%
Primipara	23	30,7%	26	34,7%
Multipara	32	42,6%	18	24%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara Siang didominasi oleh ibu yang sudah mengalami persalinan beberapa kali atau multipara pada kelompok kasus (42,6%), kemudian diikuti oleh kelompok primipara (30,7%) dan nullipara (26,7%) pada kelompok pasien kasus. Namun temuan berbeda ditemukan pada kelompok kontrol yang menunjukkan frekuensi

yang lebih tinggi ditemukan pada ibu nullipara (41,3%), primipara (34,7%), dan multipara (24%) secara berurutan.

Tabel 4.4 Distribusi Data Abortus Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Abortus	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Tidak pernah abortus	58	77,3%	61	81,3%
Abortus satu kali	12	16%	9	12%
Abortus lebih dari satu	5	6,7%	5	6,7%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa ibu bersalin di RSUD Batara Siang didominasi oleh ibu yang belum pernah mengalami abortus pada kelompok kasus (77,3%) dan kelompok kontrol (81,3%), kemudian frekuensi kedua terbanyak ditemukan pada kelompok ibu yang mengalami abortus satu kali pada kelompok kasus (16%) dan kelompok kontrol (12%), dan terakhir oleh ibu yang pernah mengalami abortus lebih dari satu kali pada kelompok kasus (6,7%) dan kelompok kontrol (6,7%).

Tabel 4.5 Distribusi Data Pendidikan Terakhir Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Pendidikan Terakhir	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Sekolah Dasar	26	34,6%	20	26,6%
Sekolah Menengah Pertama	27	36%	20	26,6%
Sekolah Menengah Atas	17	22,6%	22	29,3%
Diploma	0	0%	1	1,3%
Sarjana	5	6,6%	12	16%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa frekuensi tertinggi tingkat Pendidikan terakhir ibu yang menjalani persalinan di RSUD Batara Siang adalah Sekolah Menengah Pertama pada kelompok kasus (36%). Kemudian, pada kelompok pasien kasus ditemukan Pendidikan terakhir ibu yang melahirkan diurutkan berdasarkan frekuensi yakni SMP (36%), SD (34,6%), SMA (22,6%), dan Sarjana (6,6%). Sedangkan pada kelompok kontrol, urutan frekuensi Pendidikan terakhir ibu yang menjalani persalinan sebagai berikut: SMA (29,3%), SMP (26,6%), SD (26,6%), Sarjana (16%), dan Diploma (1,3%).

Tabel 4.6 Distribusi Data Pekerjaan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Pekerjaan	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Ibu Rumah Tangga	65	86,6%	65	86,6%
Pegawai Negeri Sipil	2	2,6%	4	5,3%
Honorer	2	2,6%	6	8%
Mahasiswa	1	1,3%	0	0%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 dapat ditarik kesimpulan bahwa frekuensi pekerjaan ibu yang menjalani persalinan di RSUD Batara Siang untuk kedua kelompok kasus (86,6%) dan kontrol (86,6%) yakni Ibu Rumah Tangga. Pada kelompok kasus didapatkan urutan frekuensi yakni Ibu Rumah Tangga (86,6%), PNS (2,6%), Honorer (2,6%), dan Mahasiswa (1,3%). Sedangkan pada kelompok Kontrol ditemukan frekuensi tertinggi pada pekerjaan IRT (86,6%), dilanjutkan oleh Honorer (8%), dan PNS (5,3%).

Tabel 4.7 Distribusi Jarak Kehamilan Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Jarak Kehamilan	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
< 2 tahun	24	32%	25	33,3%
2-4 tahun	46	61,3%	37	49,3%
> 4 tahun	5	6,7%	13	17,4%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 frekuensi jarak kehamilan ibu bersalin di RSUD Batara Siang berada pada kelompok 2-4 tahun baik pada kelompok kasus (61,3%) dan kelompok kontrol (49,3%). Kemudian diikuti oleh kelompok jarak kehamilan < 2 tahun pada kelompok kasus (32%) dan kelompok kontrol (33,3%), dan terakhir oleh kelompok > 4 tahun pada kelompok kasus (6,7%) dan kelompok kontrol (17,4%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu bersalin di RSUD Batara Siang masih berada di usia produktif dan siap untuk menjalani proses persalinan.

b. Anemia

Tabel 4.8 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 1 Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Kadar Hemoglobin	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Anemia	64	85,3%	14	18,6%
Tidak anemia	11	14,7%	61	81,4%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester pertama didominasi oleh kelompok kasus yakni 64 ibu hamil (85,3%), sedangkan terdapat 11 ibu pada kelompok kasus yang tidak mengalami anemia (14,7%). Namun, pada kelompok kontrol masih dapat ditemukan ibu hamil dengan anemia yakni sebanyak 14 ibu hamil (18,6%), dengan perbandingan 61 ibu hamil tanpa mengidap anemia (81,4%)

Tabel 4.9 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 2 Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Kadar Hemoglobin	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Anemia	57	76%	17	22,6%
Tidak anemia	18	24%	58	77,4%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester kedua didominasi oleh kelompok kasus yakni 57 ibu hamil (76%), sedangkan pada

kelompok ini juga ditemukan ibu hamil yang tidak mengalami anemia sebanyak 18 ibu hamil (24%). Namun, pada kelompok kontrol masih dapat ditemukan ibu hamil dengan anemia yakni sebanyak 17 ibu hamil (22,6%), dengan perbandingan 58 ibu hamil tanpa anemia (77,4%).

Tabel 4.10 Distribusi Kadar Hemoglobin Trimester 3 Ibu Bersalin di RSUD Batara Siang

Kadar Hemoglobin	Kasus		Kontrol	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Anemia	68	90,6%	16	21,3%
Tidak anemia	7	9,4%	59	78,7%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 dapat disimpulkan pada ibu bersalin di RSUD Batara Siang yang mengalami kejadian anemia pada kehamilan di trimester ketiga didominasi oleh kelompok kasus yakni 68 ibu hamil (90,6%), dengan disertai 7 orang ibu hamil tanpa anemia (9,4%). Namun, pada kelompok kontrol masih dapat ditemukan ibu hamil dengan anemia yakni sebanyak 16 ibu hamil (21,3%), dengan 59 ibu hamil tanpa anemia (78,7%).

c. Penyebab Perdarahan

Tabel 4.11 Distribusi Penyebab Perdarahan Post Partum Ibu Bersalin di RSUD
Batara Siang

Penyebab Perdarahan	Kasus	
	Frekuensi	%
Atonia Uteri	21	28%
Retensio Plasenta	33	44%
Ruptura Uteri	14	18,6%
Inversio Uteri	7	9,4%

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan data di tabel 4.11 dapat ditarik kesimpulan bahwa kejadian retensio plasenta (44%) menjadi penyebab terbesar kejadian perdarahan post-partum. Kemudian, penyebab lainnya yang mengikuti kedua yakni atonia uteri (28%), ruptura uteri (18,6%), dan inversio uteri (9,4%) pada urutan terakhir.

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.12 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 1 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum

Kadar Hemoglobin Trimester 1	Perdarahan Post-Partum				Total	
	Ya	%	Tidak	%	F	%
Anemia	64	85,3	14	18,7	78	52
Tidak Anemia	11	14,7	61	81,3	72	48
Total	75	100	75	100	150	100
P					0,000	
OR					25.351	

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 1 dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara statistic dengan $p < 0,05$ ($p=0,000$) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai OR (*odds ratio*) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami anemia pada trimester pertama akan berisiko 25,351x untuk mengalami perdarahan post-partum.

Tabel 4.13 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 2 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum

Kadar Hemoglobin Trimester 2	Perdarahan Post-Partum				Total	
	Ya	%	Tidak	%	F	%
Anemia	57	76	17	22,7	74	49
Tidak Anemia	18	24	58	77,3	76	51
Total	75	100	75	100	150	100
P	0,000					
OR	10,804					

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 2 dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara statistic dengan $p < 0,05$ ($p=0,000$) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai OR (*odds ratio*) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami anemia pada trimester kedua akan berisiko 10,804x untuk mengalami perdarahan post-partum.

Tabel 4.14 Analisis Bivariat Hubungan Kadar Hemoglobin Trimester 3 dan Kejadian Perdarahan Post-Partum

Kadar Hemoglobin Trimester 3	Perdarahan Post-Partum				Total	
	Ya	%	Tidak	%	F	%
Anemia	68	90,7	16	32	84	56
Tidak Anemia	7	9,3	59	78,7	66	44
Total	75	100	75	100	150	100
P	0,000					
OR	35,821					

Sumber : Data Sekunder, 2021

Berdasarkan hasil uji bivariat pada variabel kadar hemoglobin trimester 3 dengan kejadian perdarahan post-partum didapatkan hasil yang signifikan secara statistic dengan $p < 0,05$ ($p=0,000$) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara ibu yang mengalami anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan post-partum di RSUD Batara Siang. Kemudian, pengujian dilakukan untuk menilai OR (*odds ratio*) yang berhubungan dengan kadar hemoglobin dengan kejadian perdarahan post-partum. Dari hasil analisis statistik, ibu hamil yang mengalami anemia pada trimester ketiga akan berisiko 35,821x untuk mengalami perdarahan post-partum.

B. Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di RSUD Kabupaten Pangkep yang menggunakan 150 sampel dengan 75 sampel ibu yang melakukan persalinan dengan riwayat kejadian perdarahan post-partum dan 75 ibu yang melahirkan tanpa riwayat kejadian perdarahan post-partum selama tahun 2021. Teknik *Sampling* dilakukan dengan metode *total sampling*, dimana seluruh data yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian akan dimasukkan menjadi sampel dalam penelitian.

1. Kejadian Perdarahan Post-partum di RSUD Batara Siang

Perdarahan postpartum primer didefinisikan sebagai perdarahan yang terjadi dalam kurun waktu < 24 jam setelah bayi lahir dengan kuantitas >500 cc. Perdarahan post-partum biasanya terjadi pada kala III persalinan atau ketika tenaga kesehatan berusaha melahirkan plasenta bayi (VanderMeulen *et al.* 2019). Kejadian perdarahan post-partum dapat disebabkan oleh trauma seperti inversi uterus dan ruptura uteri. Inversi uterus biasanya muncul sebagai massa abu kebiruan yang menonjol dari vagina. Pasien dengan inversi uterus mungkin memiliki tanda syok tanpa kehilangan banyak darah (Handaria *et al.* 2017). Rupture uteri dapat menyebabkan perdarahan intrapartum dan postpartum. Induksi dan augmentasi meningkatkan risiko rupture uterus, terutama untuk pasien dengan persalinan sesar sebelumnya. Sebelum persalinan, tanda utama rupture uteri adalah nyeri perut, hilangnya kontraksi uterus, takikardi ibu, bradikardi janin, dan perdarahan vagina (Ingec *et al.* 2011, Handaria *et al.* 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Simanjuntak (2020) yang pada hasil penelitian tersebut menunjukkan beberapa etiologi dari perdarahan postpartum primer adalah retensio plasenta, laserasi jalan lahir, atonia uteri, dan inversion uteri. Selain itu penelitian dari Hikmah & Yani (2015) yang melakukan penelitian serupa di RSUD Jombang menunjukkan bahwa kejadian perdarahan postpartum juga dapat disebabkan oleh faktor predisposisi, salah satunya anemia pada masa kehamilan. 50% sampel dalam penelitian ditemukan mengalami anemia yang menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum.

Hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa penyebab perdarahan postpartum terbanyak ialah retensio plasenta. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Joeri (2019) yang menyatakan bahwa retensio plasenta menjadi penyebab paling banyak terhadap kejadian perdarahan post partum primer di Rumah Sakit Baiturrahim Jambi dibandingkan penyebab lainnya seperti atonia uteri, laserasi jalan lahir, dan kelainan darah. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara retensio plasenta dengan kejadian perdarahan post partum. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sumami (2011) *dalam* Lanny Apriani (2016) di RSUD Kota Bandung, penyebab perdarahan postpartum yang paling banyak adalah retensio plasenta. Hasil tersebut juga sesuai dengan teori Oxorn dan William (2010), retensio plasenta menghambat kontraksi dan retraksi uterus sehingga apabila plasenta sudah dilahirkan dengan cara plasenta manual akan menyebabkan kelelahan, sehingga menimbulkan atonia uteri atau terjadi perdarahan pada daerah tersebut. Retensio plasenta merupakan kondisi dimana plasenta bayi masih tertinggal di dalam uterus dalam durasi lebih dari 30 menit pasca bayi lahir. Penyebab dari retensio plasenta yakni sukarnya dilepaskan plasenta meskipun dengan peertolongan aktif kala III akibat adhesi kuat dari plasenta dan uterus. Terdapat beberapa penyebab kejadian retensio plasenta, yakni 1) plasenta belum terlepas dari dinding rahim karena adhesi yang mendalam; 2) plasenta sudah lepas namun belum keluar karena atonia uteri yang kemudian memperparah tingkat perdarahan (Sentilhes et al., 2016; VanderMeulen et al., 2019).

Atonia uteri merupakan ketidakmampuan uterus dalam berkontraksi normal pasca lahirnya plasenta. Perdarahan postpartum pada kondisi fisiologis dikendalikan oleh kontraksi myometrium terutama yang dikelilingi oleh pembuluh darah yang memvaskularisasi perlengketan plasenta. Atonia uteri dapat terjadi akibat kegagalan kontraksi myometrium (Asbar, 2021). Dengan kontraksi yang buruk dapat menyebabkan inadekuasi kontraksi yang dibutuhkan oleh myometrium, sehingga menyebabkan kepada perdarahan postpartum (Stephen et al., 2018).

Terdapat beberapa faktor risiko yang mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum selama kehamilan antara lain infeksi, gizi buruk, eklamsia, paritas ibu hamil, anemia pada kehamilan, jarak persalinan, usia kehamilan, umur ibu, riwayat melakukan ANC, dan riwayat persalinan terdahulu (Arya et al., 2021). Persalinan lebih baik dan disarankan pada ibu hamil dengan usia 20-35 tahun yang merupakan umur reproduksi optimal wanita.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

”Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang - orang yang berbuat baik.”(QS. Al-Baqarah (2):195).

Ayat tersebut menyampaikan bahwa islam juga membolehkan ibu dengan kehamilan atau persalinan pada usia < 20 tahun tetapi berisiko terjadinya komplikasi yang bervariasi salah satunya perdarahan postpartum (Todhunter et al., 2021). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa persalinan terbanyak adalah pada usia 20-35 tahun . Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengerti tentang kesehatan reproduksinya walaupun masih ada ibu bersalin yang bersalin pada usia < 20 tahun dan > 35 tahun yang merupakan kelompok berisiko terjadinya perdarahan pasca persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Yanti *et al.* (2017) bahwa frekuensi ibu hamil pada usia 20-35 tahun lebih banyak dibandingkan usia < 20 tahun dan > 35 tahun. Pada usia \leq 20 tahun, organ reproduksi wanita masih dalam tahap perkembangan dan belum siap untuk mengandung janin. Jika maternal terlalu muda ditakutkan ada beberapa komplikasi seperti keguguran, preeklampsia, eklampsia, bayi premature, BBLR, fistula vesicovaginal, fistula retovaginal dan kanker leher rahim (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI 2017, VanderMeulen *et al.* 2019, Arya *et al.* 2021). Sedangkan pada wanita yang menjalani persalinan ketika

berusia > 35 tahun mengalami penurunan fungsi organ reproduksi akibat penyebab degeneratif dan penurunan daya tubuh yang mempengaruhi kesulitan saat menjalani proses persalinan (Moulana *et al.* 2019). Jika maternal hamil dan melahirkan terlalu tua akan berisiko lebih besar pada terjadinya keguguran, preeklampsia, eclampsia, partus macet, perdarahan masif, BBLR, dan kelainan kongenital lainnya (Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI 2017, VanderMeulen *et al.* 2019, Arya *et al.* 2021). Hal ini diperkuat oleh Arya *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa pada usia ≥ 35 tahun terjadi penurunan fungsi reproduksi wanita yang memungkinkan terjadinya komplikasi paling sering yakni laserasi di organ genitalia yang menyebabkan perdarahan postpartum menjadi lebih massif.

Hasil penelitian ini, responden dengan perdarahan post-partum sebagian besar pada usia tidak berisiko (20-35 tahun). Hal ini sejalan dengan penelitian Yunadi *et al.* (2019) dan Aprilia (2013) yang menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi kejadian perdarahan postpartum terdapat pada kelompok usia 20-35 tahun. Hal ini dapat terjadi karena faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan bukan hanya faktor usia saja, melainkan faktor lain dimungkinkan dapat menjadi penyebab terjadinya perdarahan post-partum seperti jarak persalinan yang terlalu dekat atau terlalu jauh, anemia, paritas, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian, atonia uteri menjadi penyebab kedua terbanyak terhadap kejadian perdarahan post partum. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Joeri (2019), bahwa atonia uteri menjadi penyebab kejadian perdarahan post-partum primer terbanyak setelah retensio plasenta. Kejadian atonia uteri disebabkan oleh beberapa faktor risiko antara lain multiparitas atau grandemultipara (Lestari *et al.* 2020). Rupture perineum yang disebabkan oleh kerapuhan dari bagian tersebut sering ditemukan pada wanita dengan riwayat grandemultipara sehingga meningkatkan risiko kejadian perdarahan postpartum. Grandemultipara didefinisikan sebagai wanita yang sudah melahirkan lebih dari 5 anak, yang kemudian menjadi salah satu faktor penyulit dalam kehamilan dan persalinan (Eriza *et al.* 2015). Semakin meningkat frekuensi melahirkan menyebabkan kelemahan uterus sehingga meningkatkan risiko komplikasi pada

kehamilan. Jika ditinjau dari berbagai aspek, jumlah paritas 2-3 merupakan jumlah yang dapat ditolerir jika ditinjau dari penurunan risiko perdarahan postpartum yang dapat menyebabkan kematian maternal (VanderMeulen *et al.* 2019, Punt *et al.* 2020).

2. Kejadian Anemia dalam Kehamilan di RSUD Batara Siang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian anemia pada kehamilan baik trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) pada ibu bersalin dengan kejadian perdarahan post-partum primer.

Diagnosis anemia pada ibu hamil menurut WHO dapat ditegakkan apabila kadar Hb ≤ 11 gr/dL (Asbar 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan kehamilan trimester ketiga lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan dengan trimester pertama dan kedua Agrawal *et al.* (2015). Hal ini sejalan dengan penelitian ini, dimana kejadian anemia pada kehamilan trimester ketiga lebih tinggi dibandingkan dengan trimester pertama dan kedua. Selain itu, studi literatur Fite *et al.* (2021), bahwa beberapa penelitian juga menyatakan bahwa ibu hamil pada trimester ketiga 2,09 kali lebih berisiko untuk mengalami anemia dibandingkan dengan ibu hamil trimester pertama dan kedua (Alene dan Dohe, 2014; Gedefaw *et al.*, 2015; Okube *et al.* 2016; Gebreweld dan Tsegaye, 2018; Berhe *et al.*, 2019; Nonterah *et al.*, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian, kejadian anemia kehamilan pada trimester ketiga lebih tinggi dibandingkan trimester kedua. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Mardiana (2021) yang menyatakan bahwa anemia dalam kehamilan trimester ketiga lebih tinggi dibandingkan trimester kedua. Usia kehamilan pada trimester ketiga memiliki risiko 2,67 kali lebih besar dibandingkan dengan trimester kedua. Hasil pada penelitian tersebut juga menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara umur kehamilan dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Hal ini diketahui dengan adanya peningkatan kejadian anemia dengan bertambahnya umur kehamilan yang disebabkan karena adanya perubahan fisiologis pada kehamilan yang dimulai pada minggu ke-6, yaitu bertambahnya volume plasma dan mencapai puncaknya pada minggu ke-26, sehingga terjadi penurunan kadar Hb. Selain itu, seiring

bertambahnya umur kehamilan secara fisiologis ibu akan mendekati masa melahirkan akan cenderung mengalami stres yang berdampak kurang nafsu makan, sehingga kekurangan asupan gizi yang dapat menjadi salah satu penyebab kejadian anemia (Astuti dan Kulsum, 2018).

Kejadian anemia pada trimester ketiga dapat disebabkan adanya peningkatan kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan janin dan berbagai zat besi dalam darah ke janin yang akan mengurangi cadangan zat besi ibu (Padmi 2018). Selain itu, faktor rendahnya pendapatan keluarga ibu hamil dan kurangnya pengetahuan terkait gizi pada makanan atau tidak diterapkannya pengetahuan yang telah dimiliki juga dapat memengaruhi ibu dalam memilih jenis makanan yang berakibat pemenuhan gizi pada ibu kurang baik (Dewi dan Mardiana 2021). Menurut teori Proverawati (2011), usia kehamilan berpengaruh terhadap faktor kejadian anemia pada ibu hamil yaitu terjadinya anemia kehamilan atau rendahnya kadar hemoglobin (Hb) dalam darah, yang menyebabkan komplikasi selama masa kehamilan, persalinan dan nifas, akibatnya dapat terjadi abortus atau keguguran, bayi lahir prematur, BBLR pada bayi, pendarahan post partum karena ibu hamil rentan terhadap infeksi dan syok.

Hemoglobin merupakan komponen darah yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk metabolisme sel khususnya pengangkutan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Penurunan kadar hemoglobin dapat memberikan efek yang buruk terhadap luaran dari kondisi ibu ketika persalinan. Selama persalinan, uterus melakukan kontraksi yang kuat pada saat persalinan, menghentikan perdarahan sehingga menyebabkan lepasnya plasenta dari tempat perlekatannya di uterus. Kemudian, uterus akan kembali ke ukuran semula (involusi). Anemia pada kehamilan didefinisikan sebagai kadar Hb yang < 11 gr% pada trimester pertama dan ketiga, serta $< 10,5$ gr% pada trimester kedua. Penurunan kadar Hb ini dapat menyebabkan kelemahan dari kontraksi otot rahim yang terjadi selama persalinan berlangsung, sehingga dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko kejadian perdarahan postpartum, yang dapat menyebabkan peningkatan potensial morbiditas dan mortalitas maternal dan fetal (Garzon et al., 2020). Umumnya kejadian anemia ialah kurang gizi,

kekurangan zat besi, riwayat perdarahan pada persalinan terakhir, dan penyakit kronik lainnya. Penurunan kadar Hb dapat disebabkan karena perubahan fisiologis dalam darah yang terjadi selama kehamilan, yakni: penambahan volume plasma yang besar daripada penambahan massa hemoglobin dan volume sel darah merah, sehingga menyebabkan kejadian pengenceran darah (Horowitz et al., 2013; Stephen et al., 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kejadian anemia pada ibu hamil di RSUD Batara Siang ditemukan pada trimester ketiga (90,6%) dibandingkan dengan kedua trimester lainnya. Anemia pada trimester ketiga kehamilan didefinisikan sebagai keadaan kadar Hb < 11 gr/dL yang kemudian menunjukkan bahwa ibu hamil berada dalam kondisi anemia. Kejadian anemia pada trimester ketiga kehamilan dapat berbeda sesuai dengan kondisi demografik seseorang. Pertimbangan status sosial-ekonomi suatu negara menjadi faktor krusial dalam menentukan tingkat anemia pada trimester ketiga kehamilan. Sebuah studi dari Koyuncu et al., (2017) menunjukkan rerata kadar Hb sampel penelitiannya memiliki kadar Hb 11.98 ± 1.35 SD dengan batas bawah 7 dan batas atas 15.2. Kemudian, analisis dilanjutkan yang menunjukkan bahwa kelompok ibu hamil dengan kondisi Hb < 8.5 gr/dL memberikan luaran yang buruk terhadap skor APGAR bayi dan lama hospitalisasi bayi. Anemia pada trimester ketiga kehamilan sering ditemui atas alasan peningkatan kebutuhan suplai hemoglobin untuk menambah volume plasma tubuh, produksi sel darah merah lebih banyak, menyokong fetal-maternal unit, dan kompensasi kehilangan zat besi ketika persalinan. Peningkatan kebutuhan ini dapat terjadi sekitar 1000-1200 mg pada wanita dengan berat badan 55 kg (Garzon et al., 2020). Faktanya peningkatan kebutuhan zat besi berkembang seiring bertambahnya usia gestasi, pada trimester pertama ibu hamil membutuhkan zat besi 0,8 mg/hari, namun pada trimester ketiga meningkat menjadi 3.0-7.5 mg/hari (Fisher & Nemeth, 2017).

Pada penelitian ini didapatkan bahwa ibu bersalin memiliki pendidikan SMP pada kelompok kasus 36% dan 29,4% tertinggi pada frekuensi pendidikan terakhir SMA pada kelompok kontrol. Pendidikan menjadi faktor yang menentukan karena

dengan pendidikan dapat memberikan bimbingan orang lain terhadap perkembangan yang terarah. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang dikorelasikan dengan kemudahan dalam menerima informasi, yang berdampak terhadap rasionalitas cara berfikir seseorang. Dengan korelasi tersebut menjelaskan bahwa ibu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih memperhatikan pola konsumsi gizi dari makanan yang disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan gizi setiap orang yang diakibatkan perubahan fisiologis yang disebabkan kehamilan. Selain itu, konsumsi obat penambah darah dan mikronutrien lainnya ditemukan lebih baik pada ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Yani et al., 2020).

Frekuensi konsumsi makanan tinggi zat besi dapat memberikan suplai tambahan kepada ibu hamil yang rentan mengalami anemia akibat hemodilusi darah. Pada pemeriksaan ANC triwulan III biasanya baru ditemukan anemia karena pada masa ini janin membutuhkan cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai persediaan ketika masa persalinan nantinya. Selain itu, kepatuhan konsumsi tablet Fe diikuti dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara mengkonsumsi, dan frekuensi konsumsi per hari. Suplementasi besi merupakan salah satu upaya yang penting terhadap pencegahan anemia ketika kehamilan. Selain itu, suplementasi dapat memberikan efek baik dengan penambahan asam folat yang bermanfaat bagi pertumbuhan otak janin (Garzon et al., 2020). Asam folat ditemukan pada makanan seperti sayuran berdaun hijau, buah-buahan, kacang-kacangan dan biji-bijian.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Abasa (80):24-28 berkaitan dengan sumber zat gizi dari biji-bijian adalah sebagai berikut :

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبًّا وَقَضْبًا

Terjemahan :

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran.” (Q.S Abasa (80):24-28)

Menurut tafsir Al-Mishbah sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Lalu: sesungguhnya telah aku turunkan bantuan dari langit. Allah Ta'Ala: kemudian kami belah bumi dengan tumbuh - tumbuhan. Dan Allah berfirman: lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. yaitu biji tanaman dan semuanya itu tidak dikeluarkan dari bumi dari biji-bijian seperti biji gandum dan lainnya yang seperti itu. dan Allah berfirman : (Anggur), lalu: dimuliakan anggur (dan sayur-sayuran) yaitu dengan sayur: buah kurma dan orang makkah menanamkannya tumbuhan pohon. Karena Allah telah memberikan kecukupan makanan sehingga manusia terhindar dari rasa lapar dan menganugerahkan perasaan aman dan tenteram, maka seyogyanya manusia beribadah kepada Allah Swt. demikian tugas manusia sebagai hamba Allah. kegiatan beribadah secara luas melibatkan aktivitas jasmani, nafsani, dan rohani dan aktifitas fisik, mental dan spiritual, yang semuanya itu memerlukan energi yang didapatkan dari makanan dan minuman.

3. Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Batara Siang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu bersalin yang mengalami kejadian perdarahan postpartum juga mengalami anemia pada masa kehamilannya, yang ditunjukkan dengan hasil pengukuran Hb pada tiga trimester kehamilannya. Secara berurutan berikut prevalensi anemia pada kehamilan ibu hamil di trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) yang melakukan persalinan di RSUD Batara Siang.

Hal ini sejalan dengan penelitian Paramita dan Sukatendel (2021) yang menyatakan bahwa ibu hamil yang menderita anemia kehamilan pada trimester ketiga dengan kadar hemoglobin < 11g/dL di RSUP Haji Adam Malik Medan paling banyak mengalami perdarahan post-partum dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin normal. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Ramadhan *et al.* (2019) di RSUP Dr. M. Djamil Padang juga menunjukkan bahwa ibu yang memiliki kadar hemoglobin < 11g/dL mengalami perdarahan post-partum sebanyak 92,4%. Perdarahan postpartum lebih sering

dijumpai pada wanita yang memiliki kadar hemoglobin rendah dalam kehamilannya dan lebih sering berakibat fatal, sebab ibu yang bersalin dengan kadar hemoglobin rendah dalam kehamilannya tidak dapat mentoleransi kehilangan darah saat persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kadar hemoglobin rendah (anemia) dengan kejadian pasca persalinan (Hikmah dan Yani, 2015).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak mengalami perdarahan postpartum lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal atau tidak anemia di trimester ketiga kehamilannya dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin rendah atau anemia di trimester ketiga kehamilannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Paramita dan Sukatendel (2021) yang menunjukkan bahwa ibu dengan persalinan yang tidak mengalami perdarahan postpartum lebih banyak yang memiliki kadar hemoglobin normal pada masa kehamilannya yaitu sebanyak 58,3%.

Berdasarkan hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *chi-square* didapatkan nilai $p = 0,000$ ($p < 0,05$) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikansi kejadian anemia pada kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum pada ibu yang melakukan persalinan di RSUD Batara Siang. Selain itu, dilakukan uji regresi logistik untuk mencari *odds ratio* (OR) dari anemia pada kehamilan di tiga trimester tersebut, dan didapatkan hasil OR pada trimester pertama kehamilan sebesar 25,351, kemudian pada trimester kedua OR 10,804, dan pada trimester ketiga sebesar 35,821. Hal ini menunjukkan bahwa ibu hamil dengan anemia sangat berisiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Dalam hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penyebab paling sering komplikasi perdarahan pasca persalinan di RSUD Batara Siang, yakni retensio plasenta (44%), kemudian diikuti oleh atonia uteri (28%).

Kejadian anemia pada trimester ketiga kehamilannya memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan dengan trimester pertama dan kedua. Aryanto *et al.* (2021) dalam penelitiannya di RSUD Waikabubak NTT menunjukkan jumlah kasus anemia pada trimester ketiga dengan usia kehamilan 37-42 minggu paling banyak

yaitu sebanyak 259 kasus (72,966%) dibandingkan dengan usia kehamilan < 37 minggu (23,38%) dan > 42 minggu (3,66%). Hal ini didukung oleh penelitian Sumiaty *et al.* (2018) di RSUD Undata Palu yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara kadar hemoglobin rendah dengan kejadian perdarahan postpartum dengan nilai OR = 28.571. Hal ini juga diperkuat oleh Yurniati & Mustari (2019) dalam penelitiannya yang mencari hubungan anemia dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar. Mereka menemukan bahwa dari 91 ibu hamil yang menjalani persalinan dengan faktor risiko anemia, didapatkan hasil uji statistik yang signifikan antara hubungan kedua variabel tersebut yang kemudian dilakukan uji OR yang didapatkan OR sebesar 45x lebih berisiko terjadinya perdarahan postpartum pada ibu yang mengalami anemia selama kehamilan.

Berdasarkan penelitian Aryanto *et al.* (2021), ibu hamil trimester ketiga di RSUD Waikabubak yang menderita anemia berdasarkan derajat anemia, paling banyak adalah anemia derajat sedang yaitu sebanyak 193 kasus atau 54,37%. Anemia dalam kehamilan trimester ketiga berdasarkan kriteria WHO apabila kadar hemoglobinnya < 11 mg/dL, sedangkan kategori anemia derajat sedang apabila kadar hemoglobinnya mencapai 7-9,9 mg/dL (Stevens *et al.* 2013; Taner *et al.* 2015). Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah kasus anemia ibu hamil pada kehamilan trimester ketiga. Rendahnya kadar hemoglobin ibu bersalin pada masa kehamilannya akan mengganggu kondisinya apabila terjadi kehilangan darah meskipun sedikit, sebab anemia dihubungkan dengan kelemahan yang dapat dianggap sebagai penyebab langsung perdarahan post-partum. Risiko perdarahan post-partum meningkat pada wanita bersalin dengan anemia, dimana uterus kekurangan oksigen, glukosa, serta nutrisi esensial dan cenderung bekerja tidak efisien pada semua persalinan. Hal ini lah yang menyebabkan perdarahan postpartum semakin meningkat dan memiliki prognosis yang buruk (Satriyandari dan Hariyati, 2017).

Ibu yang melakukan persalinan dengan kadar hemoglobin rendah saat kehamilannya akan mengakibatkan kemampuan ibu untuk bertahan saat persalinan semakin berkurang, sebab rendahnya kadar hemoglobin dapat mengakibatkan proses metabolisme energi menjadi terhambat karena kekurangan pasokan oksigen. Metabolisme energi yang rendah akan membuat otot uterus tidak berkontraksi secara maksimal (Siagian *et al.*, 2017). Apabila otot uterus tidak dapat berkontraksi secara maksimal, maka akan terjadi gangguan pada ibu bersalin. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, kala I dapat berlangsung lama, kala II dapat berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi, kala III dapat terjadi retensio plasenta yang diikuti perdarahan post-partum, dan kala IV dapat terjadi atonia uteri (Manuba, 2013). Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian dari kejadian kasus retensio plasenta di RSUD Batara Siang menjadi penyebab terbanyak perdarahan post-partum, kemudian diikuti atonia uteri, ruptur uteri, dan inversio uteri. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Paramita dan Sukatendel (2021) yang menunjukkan penyebab terbanyak perdarahan post-partum di RSUP Haji Adam Malik Medan adalah disebabkan oleh retensio plasenta, kemudian diikuti oleh atonia uteri. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ramadhan *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa penyebab terbanyak perdarahan post-partum ibu bersalin adalah retensio plasenta sebesar 38,5%, diikuti oleh sisa plasenta 20,5%, atonia uteri 5,3%, dan penyebab lain sebanyak 35,7%.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menambahkan bahwa anemia dalam kehamilan mempengaruhi kejadian perdarahan postpartum. Pada anemia, penurunan sel darah merah mempengaruhi Jumlah Hb dalam darah yang berfungsi memberikan suplai oksigen ke seluruh tubuh. Termasuk ketika persalinan, tubuh khususnya organ uterus membutuhkan suplai lebih karena penggunaannya untuk mengatur kontraksi agar dapat melahirkan janin. Penurunan suplai Hb dalam darah dapat memberikan pengaruh terhadap proses persalinan bayi seperti atonia uteri dan retensio plasenta yang terbukti sebagai dua faktor etiologic terbanyak penyebab terjadinya perdarahan postpartum pada ibu yang mengalami anemia pada kehamilan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara anemia selama kehamilan dengan kejadian perdarahan postpartum. Pada ibu hamil yang menderita anemia trimester ketiga dengan kadar Hb < 11 g/dL diketahui lebih berisiko terjadi perdarahan postpartum. Hal ini berkaitan dengan anemia selama kehamilan dengan perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri. Seperti yang dijelaskan pada studi Frass (2015) mengenai perdarahan postpartum terkait dengan kadar Hb saat persalinan, kadar Hb yang rendah (anemia) pada saat melahirkan memiliki hubungan dengan risiko perdarahan postpartum. Dalam hasil penelitiannya, sebanyak 29,1% wanita anemia mengalami perdarahan post partum yang penyebab utamanya adalah atonia uteri. Atonia uteri menunjukkan hubungan sebab akibat dengan anemia berat (Hb \leq 7 g/dL) yang merupakan penyebab utama terjadinya perdarahan post partum. Atonia uteri sendiri sering dikaitkan oleh permasalahan kontraktilitas uterus pascapersalinan akibat rendahnya kadar Hb yang mengakibatkan kurangnya suplai darah yang diberikan sistemik intra persalinan, sehingga menghambat proses metabolisme energi yang akan membuat otot uterus tidak berkontraksi secara maksimal (Manuba, 2013; Siagian *et al.*, 2017). Dalam studi yang dilakukan Frass (2015) juga menunjukkan bahwa tingkat kejadian dari histerektomi darurat atas indikasi atonia uteri dilakukan pada 39,6% wanita yang melahirkan dengan anemia berat selama kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa pasien dengan kadar Hb 7 atau kurang, dimungkinkan mengalami perdarahan post partum, sebab atonia uteri sangat meningkat pada pasien dengan kadar Hb 7,1-10.

Pada penelitian ini, adanya hubungan antara ibu yang menderita anemia selama kehamilan terhadap kejadian perdarahan post partum juga menunjukkan adanya korelasi antara kadar Hb dengan kehilangan darah yang berbanding terbalik secara signifikan, dimana semakin parah anemia atau semakin rendah kadar Hb, maka kemungkinan kehilangan darah yang lebih banyak juga semakin besar. Hal ini disebutkan oleh Frass (2015), bahwa ibu yang menderita anemia selama kehamilan memiliki toleransi yang buruk terhadap perdarahan ringan, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran penduduk untuk memanfaatkan layanan perawatan bersalin yang tersedia bersama dengan promosi suplementasi zat besi dan folat untuk semua ibu hamil.

Selain itu, faktor lainnya yang mencetuskan perdarahan postpartum yakni cara persalinan. Dalam penelitian Ariyanti et al., (2022) didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa kejadian perdarahan pasca persalinan meningkat sebesar 8,6x pada pasien yang menjalani persalinan pervaginam dibandingkan dengan SC. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tegangan dan tidak stabilnya irama mengejan pada ibu hamil selama proses persalinan. Selain itu, ditinjau dari sisi fetal, terdapat beberapa risiko yang meningkatkan kejadian perdarahan pascapersalinan yakni gemelli atau bayi lahir dengan berat badan > 3,5 kg, disertai dengan pintu panggul yang sempit dari ibu hamil dapat menambah tingkat kesulitan proses persalinan dan meningkatkan tingkat morbiditas sebanyak 8,6x lebih tinggi apabila persalinan pervaginam dilanjutkan.(Anggraeni et al., 2019)

Terdapat beberapa faktor penyebab lainnya yang dapat memberikan peningkatan kejadian morbiditas dan mortalitas kejadian perdarahan pasca persalinan pada ibu hamil dengan anemia. Menurut penelitian dari Windiyati, (2020) usia pada saat kehamilan > 35 tahun dapat memberikan peningkatan risiko sebesar 3,23x dibandingkan dengan pasien dengan kehamilan pada rentang usia 20-34 tahun. Selain itu, tingkat pendidikan berperan memberikan peningkatan risiko perdarahan pasca persalinan sebesar 1,79x pada pasien dengan tingkat pendidikan SD-SMP dibandingkan dengan pasien dengan tingkat pendidikan SMA-Sarjana. Jenis pertolongan yang diberikan juga memberikan peningkatan risiko yang signifikan, pada kelompok ibu yang diberikan pertolongan oleh tenaga non-medis memiliki risiko 3,249x lebih untuk mengalami perdarahan post-partum. Beberapa faktor risiko ini memberikan gambaran yang jelas bahwa persalinan merupakan proses yang harus ditangani dengan baik guna memberikan luaran yang terbaik bagi fetal dan maternal.(Downes et al., 2017)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait hubungan anemia dengan kejadian perdarahan postpartum primer di RSUD Batara Siang Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kejadian perdarahan postpartum dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 75 sampel dengan penyebab perdarahan tertinggi adalah retensio plasenta dan atonia uteri
2. Kejadian anemia pada kehamilan trimester pertama (85,3%), trimester kedua (76%), dan trimester ketiga (90,7%) menandakan tingginya kejadian perdarahan postpartum yang berkorelasi dengan anemia pada kehamilan
3. Hubungan antara anemia dalam kehamilan dan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Batara Siang, dengan perhitungan OR yang menunjukkan rasio tinggi untuk mengalami perdarahan pada ibu yang mengalami anemia pada kehamilan.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, masyarakat lebih paham dan waspada terkait kesehatan ibu hamil, khususnya terkait konsumsi gizi seimbang dan memperhatikan mikronutrien lainnya yang meningkat akibat perubahan fisiologis selama kehamilan.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menambahkan data berbasis evidens terkait kejadian anemia pada ibu hamil, sehingga dapat menjadi acuan dalam melakukan promosi kesehatan ke masyarakat kelak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan penjelajahan dengan variabel terikat lainnya untuk dapat membahas fenomena anemia pada kehamilan dan hubungannya dengan kejadian perdarahan post-partum lebih komprehensif dan menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, S., Fledderjohann, J., Vellakkal, S., dan Stuckler, D., 2015. Adequately diversified dietary intake and iron and folic acid supplementation during pregnancy is associated with reduced occurrence of symptoms suggestive of pre-eclampsia or eclampsia in indian women. *PLoS ONE*, 10 (3), 1–23.
- Alene, K.A. dan Dohe, A.M., 2014. Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women in an urban area of eastern ethiopia. *Anemia*, 2014 (1–7).
- Alhabe, F., Moore, J. L., Gibbons, L., Berrueta, M., Goudar, S. S., Chomba, E., Derman, R. J., Patel, A., Saleem, S., Pasha, O., Esamai, F., Garces, A., Liechty, E. A., Hambidge, K. M., Krebs, N. F., Hibberd, P. L., Goldenberg, R. L., Koso-thomas, M., Carlo, W. A., McClure, E. M. (2015). Adverse maternal and perinatal outcomes in adolescent pregnancies: The Global Network’s Maternal Newborn Health Registry study. *Reproductive Health*, 12(Suppl 2), 1–9.
- Anggraeni, M.D., Setiyani, R., dan Setiawati, N., 2019. Post-partum Hemorrhage and Anemia as its Modifiable Risk Factor: A Literature Review. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 14 (3).
- Aprilia, D., 2013. Karakteristik Ibu Bersalin yang Mengalami Perdarahan Postpartum Primer di RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun 2012. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Aisyiyah Yogyakarta.
- Ariyanti, R., Febrianti, S., dan Rahmawati, E., 2022. The Relationship of Pregnancy Anemia with Primary Postpartum Hemorrhage in Tarakan, North Kalimantan. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 2 (4), 698–703.
- Arya, S., Wilton, P., Page, D., Boma-Fischer, L., Floros, G., Winikoff, R., Teitel, J., Dainty, K., & Sholzberg, M. (2021). “They don’t really take my bleeds seriously”: Barriers to care for women with inherited bleeding disorders. *Journal of Thrombosis and Haemostasis: JTH*, 19(6), 1506–1514. <https://doi.org/10.1111/jth.15311>
- Aryanto, E., Sugiarto, A.D., Darmawan, P.H., dan Pande, N.P.Y.A., 2021.

Gambaran anemia pada kehamilan trimester III di bagian obstetri dan ginekologi RSUD Waikabubak, Nusa Tenggara Timur periode 2019–2020. *Intisari Sains Medis*, 12 (2), 463–467.

Asbar, A. (2021). *HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM KARENA ATONIA UTERI DI RSUP DR WAHIDIN SUDIROHUSODO PADA TAHUN 2015-2020*. UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Astuti, D. dan Kulsum, U., 2018. Pola Makan Dan Umur Kehamilan Trimester III Dengan Anemia Pada Ibu Hamil. *Indonesia Jurnal Kebidanan*, 2 (1), 24–30.

Badan Pusat Statistik. (2015). *Angka Kematian Ibu Berdasarkan Pulau Tahun 2015*. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

Belghiti, J., Kayem, G., Dupont, C., Rudigoz, R.-C., Bouvier-Colle, M.-H., & Deneux-Tharaux, C. (2011). Oxytocin during labour and risk of severe postpartum haemorrhage: a population-based, cohort-nested case-control study. *BMJ Open*, 1(2), e000514. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2011-000514>

Berhe, B., Mardu, F., Legese, H., Gebrewahd, A., Gebremariam, G., Tesfay, K., Kahsu, G., Negash, H., dan Adhanom, G., 2019. Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women in Adigrat General Hospital, Tigray, northern Ethiopia, 2018. *BMC Research Notes*, 12 (310), 1–6.

Blitz, M. J., Yukhayev, A., Pachtman, S. L., Reisner, J., Moses, D., Sison, C. P., Greenberg, M., & Rochelson, B. (2020). Twin pregnancy and risk of postpartum hemorrhage. *The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine : The Official Journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians*, 33(22), 3740–3745. <https://doi.org/10.1080/14767058.2019.1583736>

Brenner, A., Ker, K., Shakur-Still, H., & Roberts, I. (2019). Tranexamic acid for post-partum haemorrhage: What, who and when. *Best Practice & Research*

Clinical Obstetrics & Gynaecology, 61, 66–74.

Breyman, C. (2015). Iron Deficiency Anemia in Pregnancy Christian. *Seminars in Hematology*. <https://doi.org/10.1053/j.seminhematol.2015.07.003>

Dept. of Reproductive Health and Research, W. (2012). WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage. In *World Health Organization*.

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/9789241548502/en/

Dewi, H.P. dan Mardiana, 2021. Faktor risiko yang memengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Nusawungu II Cilacap. *Journal of Nutrition College*, 10 (4), 285–196.

Dinas kesehatan Sulawesi selatan. (2019). Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. *Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah*, 25–26.

Direktur Jenderal P2P Kementrian Kesehatan RI. (2017). InfoDatin: Situasi Kesehatan Ibu. In *Keme* (Vol. 33, Issue 2, pp. 4–19). <https://doi.org/10.7326/0003-4819-128-9-199805010-00016>

Downes, K.L., Grantz, K.L., dan Shenassa, E.D., 2017. Maternal, Labor, Delivery, and Perinatal Outcomes Associated with Placental Abruption: A Systematic Review. *American journal of perinatology*, 34 (10), 935–957.

Endler, M., Cnattingius, S., Granfors, M., & Wikström, A.-K. (2018). The inherited risk of retained placenta: a population based cohort study. *BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 125(6), 737–744. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.14828>

Eriza, N., Defrin, D., & Lestari, Y. (2015). Hubungan Perdarahan Postpartum dengan Paritas di RSUP Dr. M. Djamil Periode 1 Januari 2010 - 31 Desember 2012. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(3), 765–771. <https://doi.org/10.25077/jka.v4i3.360>

Fasha, N. L., & Rokhanawati, D. (2019). Hubungan anemia dalam kehamilan

- dengan kejadian perdarahan postpartum di RSUD Muhammadiyah Bantul tahun 2018. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 3(2), 102–105. <https://doi.org/10.32536/jrki.v3i2.63>
- Fisher, A.L. dan Nemeth, E., 2017. Iron homeostasis during pregnancy. *The American journal of clinical nutrition*, 106 (Suppl 6), 1567S-1574S.
- Fite, M.B., Assefa, N., dan Mengiste, B., 2021. Prevalence and determinants of anemia among pregnant women in sub-Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. *Archives of Public Health*, 79 (2019), 1–11.
- Frass, K.A., 2015. Postpartum hemorrhage is related to the hemoglobin levels at labor: Observational study. *Alexandria Journal of Medicine*, 51 (4), 333–337.
- Ganchimeg, T., Ota, E., Morisaki, N., Laopaiboon, M., Lumbiganon, P., Zhang, J., Yamdamsuren, B., Temmerman, M., Say, L., Tunçalp, Ö., Vogel, J. P., Souza, J. P., Mori, R., & WHO Multicountry Survey on Maternal Newborn Health Research Network. (2014). Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a World Health Organization multicountry study. In *BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology: Vol. 121 Suppl* (pp. 40–48). <https://doi.org/10.1111/1471-0528.12630>
- Garzon, S., Cacciato, P. M., Certelli, C., Salvaggio, C., Magliarditi, M., & Rizzo, G. (2020). Iron deficiency anemia in pregnancy: Novel approaches for an old problem. *Oman Medical Journal*, 35(5), 1–9. <https://doi.org/10.5001/omj.2020.108>
- Gebreweld, A. dan Tsegaye, A., 2018. Prevalence and Factors Associated with Anemia among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic at St. Paul's Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia. *Advances in Hematology*, 2018, 1–8.
- Gedefaw, L., Ayele, A., Asres, Y., dan Mossie, A., 2015. Anemia and Associated Factors Among Pregnant Women Attending Antenatal Care Clinic in Wolayita Sodo Town, Southern Ethiopia. *Ethiopian journal of health sciences*, 25 (2), 155–162.

- Greenbaum, S., Wainstock, T., Dukler, D., Leron, E., & Erez, O. (2017). Underlying mechanisms of retained placenta: Evidence from a population based cohort study. *European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology*, 216, 12–17. <https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2017.06.035>
- Handaria, D., Novitasari, A., & Kaporina, A. (2017). *Perdarahan Post Partum Akibat Anemia pada Ibu Hamil di RSUD Tugurejo Semarang Postpartum Hemorrhage due to Anemia During Pregnancy in RSUD*. 4.
- Hidayah, H. N. (2018). *HUBUNGAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD AMBARAWA*.
- Hikmah, N., & Yani, D. P. (2015). GAMBARAN HEMORAGIC POST PARTUM PADA IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN ANEMIA DI RUANG PONEK RSUD KABUPATEN JOMBANG. *Jurnal Edu Health*, 5(2), 142–150.
- Horowitz, K. M., Ingardia, C. J., & Borgida, A. F. (2013). Anemia in pregnancy. *Clinics in Laboratory Medicine*, 33(2), 281–291. <https://doi.org/10.1016/j.cll.2013.03.016>
- Ingec, M., Levent, A., Delibas, I. B., Pular, A., & Karaca, I. (2011). A Case of Primary Postpartum Bleeding due to Vaginal Laceration after Vaginal Delivery: Successful Management with Transcatheter Arterial Embolization. In *The Eurasian journal of medicine* (Vol. 43, Issue 1, pp. 57–59). <https://doi.org/10.5152/eajm.2011.12>
- Khalafallah, A. A., & Dennis, A. E. (2012). Iron deficiency anaemia in pregnancy and postpartum: pathophysiology and effect of oral versus intravenous iron therapy. *Journal of Pregnancy*, 2012, 630519. <https://doi.org/10.1155/2012/630519>
- Koyuncu, K., Turgay, B., Şükür, Y.E., Yıldırım, B., Ateş, C., dan Söylemez, F., 2017. Third trimester anemia extends the length of hospital stay after delivery. *Turkish Journal of Obstetrics and Gynecology*, 14 (3), 166–169.

- Lanny Apriani, 2016. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Di Rsud Dr. Pirngadi Kota Medan Periode Januari 2011-Juni 2015. *Jurnal Ilmiah Kebidanan IMELDA*, 2 (2).
- Lestari, M., Mulawardhana, P., & Utomo, B. (2020). Faktor Risiko Kejadian Atonia Uteri. *Pedimaternal Nursing Journal*, 5(2), 189. <https://doi.org/10.20473/pmnj.v5i2.13459>
- Lutfiah, N. (2016). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ISLAM PRANATAL*.
- Manuba, 2013. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. 2nd ed. Jakarta: EGC.
- Mardiyah, N. (2021). *Hubungan Antara Frekuensi Dan Tempat Antenatal Care (Anc) Dengan Luaran Kehamilan Pada Preeklamsi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2019*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Moulana, F., Martadiansyah, A., & Liberty, I. A. (2019). Risk Factors of Postpartum Hemorrhage in Rsup Dr. Mohammad Hoesin. *Majalah Kedokteran Sriwijaya*, 51(2), 63–72. <https://doi.org/10.32539/mks.v51i2.8534>
- Nienhuis, A. W., & Nathan, D. G. (2012). Pathophysiology and Clinical Manifestations of the β -Thalassemias. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2(12), a011726. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a011726>
- Nonterah, E., Adomolga, E., Yidana, A., Kagura, J., Agorinya, I., Ayamba, E., Atindama, S., Kaburise, M.B., dan Alhassan, M., 2019. Descriptive epidemiology of anaemia among pregnant women initiating antenatal care in rural Northern Ghana. *African Journal of Primary Health Care and Family Medicine*, 11 (1), 1–7.
- Okube, O.T., Mirie, W., Odhiambo, E., Sabina, W., dan Habtu, M., 2016. Prevalence and Factors Associated with Anaemia among Pregnant Women Attending Antenatal Clinic in the Second and Third Trimesters at Pumwani Maternity Hospital, Kenya. *Open Journal of Obstetrics and Gynecology*, 6 (16), 16–27.

- Oxorn, H.F. dan William, R., 2010. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medika.
- Padmi, D., 2018. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di Puskesmas Tegalrejo Tahun 2017. *Journal of Materials Processing Technology*, 1 (1), 1–8.
- Paramita, B.F. dan Sukatendel, K., 2021. Hubungan Kadar Hemoglobin Pada Ibu di Trimester III Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Pascapersalinan di RSUP Haji Adam Malik Medan. *SCRIPTA SCORE Scientific Medical Journal*, 2 (2), 68–75.
- Proverawati, 2011. *Anemia dan Anemia Kehamilan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Punt, M. C., Aalders, T. H., Bloemenkamp, K. W. M., Driessens, M. H. E., Fischer, K., Schrijvers, M. H., & van Galen, K. P. M. (2020). The experiences and attitudes of hemophilia carriers around pregnancy: A qualitative systematic review. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, 18(7), 1626–1636. <https://doi.org/10.1111/jth.14825>
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. In *Profil Kesehatan Provinsi Bali*. Kementerian Kesehatan RI.
- Putri, A. R. S. (2020). Pendidikan dan tempat tinggal ibu dengan kejadian perdarahan pada kehamilan di Indonesia. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 4(2), 38–42. <https://doi.org/10.32536/jrki.v4i2.88>
- Rahmawati, D. dan Joeri, S., 2019. Hubungan Antara Paritas Dan Retensio Plasenta dengan Kejadian Perdarahan Post Partum Primer Di Rumah Sakit Baiturrahim Jambi Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Umum Dan Kesehatan Aisyiyah*, 4 (1), 64–73.
- Ramadhan, J.W., Rasyid, R., dan Rusnita, D., 2019. Profil Pasien Hemorrhagic Postpartum di RSUP Dr. M. Djamil Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8 (2S), 46–53.
- Satriyandari, Y. dan Hariyati, N.R., 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

- Kejadian Perdarahan Postpartum. *Journal of Health Studies*, 1 (1), 49–64.
- Satriyandari, Y., & Hariyati, N. R. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Perdarahan Postpartum. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 1(1), 49–64. <https://doi.org/10.31101/jhes.185>
- Sentilhes, L., Merlot, B., Madar, H., Sztark, F., Brun, S., & Deneux-Tharoux, C. (2016). Postpartum haemorrhage: prevention and treatment. *Expert Review of Hematology*, 9(11), 1043–1061. <https://doi.org/10.1080/17474086.2016.1245135>
- Siagian, R., Sari, R.D.P., dan Ristyaning, P., 2017. Hubungan Tingkat Paritas dan Tingkat Anemia terhadap Kejadian Perdarahan Postpartum pada Ibu Bersalin. *Jurnal Majority*, 6 (3), 45–50.
- Simanjuntak, L. (2020). Perdarahan Postpartum (Perdarahan Paskasalin). *Jurnal Visi Eksakta*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51622/eksakta.v1i1.51>
- Sri Yoelinda Sari S. (2010). MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN DENGAN PARTUS LAMA DI RSIA SITTI FATIMAH MAKASSAR. *Theoretical and Applied Genetics*, 7(2), 1–7. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://dx.doi.org/10.1016/j.tplants.2011.03.004> <http://dx.doi.org/10.1016/j.pbi.2010.01.004> <http://www.biomedcentral.com/1471-2156/12/42> <http://dx.doi.org/10.1016/j.biotechadv.2009.11.005> [/www](http://www)
- Stephen, G., Mgongo, M., Hussein Hashim, T., Katanga, J., Stray-Pedersen, B., & Msuya, S. E. (2018). Anaemia in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors, and Adverse Perinatal Outcomes in Northern Tanzania. *Anemia*, 2018, 1846280. <https://doi.org/10.1155/2018/1846280>
- Stevens, G.A., Finucane, M.M., De-Regil, L.M., Paciorek, C.J., Flaxman, S.R., Branca, F., Peña-Rosas, J.P., Bhutta, Z.A., dan Ezzati, M., 2013. Global, regional, and national trends in haemoglobin concentration and prevalence of total and severe anaemia in children and pregnant and non-pregnant women for

1995-2011: A systematic analysis of population-representative data. *The Lancet Global Health*, 1 (1), 16–25.

Sultan, S. (2020). *FACTORS EFFECT POST PARTUM HEMORRHAGE IN RSIA SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR 2014-2019 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERDARAHAN POST PARTUM DI RSIA SITI KHADIJAH 1 MAKASSAR.*

Sunarsih, & Susanaria, P. (2015). HUBUNGAN USIA DAN PARITAS IBU HAMIL DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN ANTEPARTUM DI RSUD ABDOEL MOELOEK BANDAR LAMPUNG TAHUN 2013. *Jurnal Kebidanan*, 1(1), 2015.

Sumiaty, S., Udin, U., dan Aminuddin, A., 2018. Anemia Kehamilan dan Jarak Persalinan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di RSUD Undata Palu Propinsi Sulawesi Tengah. *Husada Mahakam Jurnal Kesehatan*, 4 (5), 315.

Sundd, P., Gladwin, M. T., & Novelli, E. M. (2019). Pathophysiology of Sickle Cell Disease. *Annual Review of Pathology*, 14, 263–292. <https://doi.org/10.1146/annurev-pathmechdis-012418-012838>

Taner, C.E., Ekin, A., Solmaz, U., Gezer, C., Çetin, B., Keleşoğlu, M., Erpala, M.B., dan Özeren, M., 2015. Prevalence and risk factors of anemia among pregnant women attending a high-volume tertiary care center for delivery. *Journal of the Turkish German Gynecology Association*, 16 (4), 231–236.

Tanziha, I., Utama, L. J., & Rosmiati, R. (2016). *Faktor risiko anemia ibu hamil di indonesia (. 11(2), 143–152.*

Todhunter, L., Hogan-Roy, M., & Pressman, E. K. (2021). Complications of Pregnancy in Adolescents. *Seminars in Reproductive Medicine*. <https://doi.org/10.1055/s-0041-1734020>

VanderMeulen, H., Petrucci, J., Floros, G., Meffe, F., Dainty, K. N., & Sholzberg, M. (2019). The experience of postpartum bleeding in women with inherited bleeding disorders. *Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis*, 3, 733–740.

- Windiayati, 2020. Faktor Resiko Kejadian Perdarahan Pasca Persalinan Di Desa Sei Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Pontianak (Data Tahun 2017 – 2018). *Jurnal_Kebidanan*, 9 (1), 358–367.
- Wolde, F., Mulaw, Z., Zena, T., Biadgo, B., & Limenih, M. A. (2018). Determinants of late initiation for antenatal care follow up: The case of northern Ethiopian pregnant women. In *BMC Research Notes* (Vol. 11, Issue 1). <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3938-9>
- World Health Organization. (2021). *Iron and folate supplementation*. file:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Care - Unknown - Iron and folate supplementation.pdf
- World Health Organization. (2022). *Crude birth rate (births per 1000 population)*. [https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/indicator-explorer-new/mca/crude-birth-rate-\(births-per-1000-population\)](https://www.who.int/data/maternal-newborn-child-adolescent-ageing/indicator-explorer-new/mca/crude-birth-rate-(births-per-1000-population))
- Wuryanti, A. (2010). *Hubungan anemia dalam kehamilan dengan perdarahan postpartum karena atonia uteri di RSUD Wonogiri*.
- Yani, L. Y., Merbawani, R., & Munfadlila, A. W. (2020). Correlation of Nutrition Education Model for Pregnant Women In Industrial Areas To Increase Knowledge of Nutrition, Nutritional Behavior, and Hemoglobin Levels of Pregnant Women. *STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 9(2), 990–997. <https://doi.org/10.30994/sjik.v9i2.391>
- Yanti, N.K.W., Kusharisupeni, dan Sabri, L., 2017. Analisis Faktor Determinan Berhubungan dengan Risiko Perdarahan Post Partum di RSUD Provinsi NTB. *Jurnal Health Care Media*, 3 (2), 10–21.
- Yunadi, F.D., Andhika, R., dan Septiyaningsing, R., 2019. Identifikasi Faktor Ibu Dengan Perdarahan Post Partum. *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 6 (2), 119–126.
- Yurniati, & Mustari, R. (2019). HUBUNGAN ANEMIA DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POST PARTUM DI RSUD H. PADJONGA DG. NGALLE

KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2017. *Jurnal Ilmiah Forilkesuit*, 1(2),
41–47. <https://uit.e-journal.id/JF/article/view/547>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Inform Consent

Kepada Yth
Penanggung Jawab Rekam Medik
Di RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkep

Dengan Hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AQILAH FARAH SALSABIL
NIM : 70600118023

Adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan Anemia dalam Kehamilan dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021” data akan diambil dari rekam medik.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon izin pengambilan data dari rekam medik. Penelitian ini tidak menimbulkan bahaya potensial maupun kerugian bagi pasien maupun pihak Rumah Sakit karena hanya menggunakan data sekunder dari rekam medik.

Kerahasiaan semua informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian

Demikian permohonan saya, atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih

Menyetujui
Penanggung Jawab Rekam Medik

Homat Saya,
Peneliti

(.....)

(.....)

Lampiran 2. Hasil Analisis Data

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
	Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 1	150	100.0%	0	0.0%	150
Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 2	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%
Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 3	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 1		Total
		Anemia	Normal	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	64	11	75
	Normal	14	61	75
Total		78	72	150

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	66.774 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	64.129	1	.000		
Likelihood Ratio	72.969	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	66.328	1	.000		
N of Valid Cases	150				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 2		Total
		Anemia	Tidak Anemia	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	57	18	75
	Normal	17	58	75
Total		74	76	150

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	42.674 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	40.567	1	.000		
Likelihood Ratio	44.973	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	42.390	1	.000		
N of Valid Cases	150				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 3		Total
		Anemia	Tidak Anemia	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	68	7	75
	Normal	16	59	75
Total		84	66	150

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	73.160 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	70.373	1	.000		
Likelihood Ratio	81.501	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	72.672	1	.000		
N of Valid Cases	150				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,00.

b. Computed only for a 2x2 table

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 1	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%
Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 2	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%
Kelompok Perlakuan * Kadar Hb Trimester 3	150	100.0%	0	0.0%	150	100.0%

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 1		Total
		Anemia	Normal	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	64	11	75
	Normal	14	61	75
Total		78	72	150

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	66.774	1	.000
Mantel-Haenszel	63.702	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate	25.351		
ln(Estimate)	3.233		
Standard Error of ln(Estimate)	.441		
Asymptotic Significance (2-sided)	.000		
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	10.684
		Upper Bound	60.152
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	2.369
		Upper Bound	4.097

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

M A K A S S A R

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 2		Total
		Anemia	Tidak Anemia	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	57	18	75
	Normal	17	58	75
Total		74	76	150

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	42.674	1	.000
Mantel-Haenszel	40.297	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

EGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate				10.804
ln(Estimate)				2.380
Standard Error of ln(Estimate)				.386
Asymptotic Significance (2-sided)				.000
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	5.068	
		Upper Bound	23.032	
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	1.623	
		Upper Bound	3.137	

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

Crosstab

Count

		Kadar Hb Trimester 3		Total
		Anemia	Tidak Anemia	
Kelompok Perlakuan	Perdarahan Post Partum	68	7	75
	Normal	16	59	75
Total		84	66	150

Tests of Homogeneity of the Odds Ratio

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Breslow-Day	.000	0	.
Tarone's	.000	0	.

Tests of Conditional Independence

	Chi-Squared	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Cochran's	73.160	1	.000
Mantel-Haenszel	69.904	1	.000

Under the conditional independence assumption, Cochran's statistic is asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution, only if the number of strata is fixed, while the Mantel-Haenszel statistic is always asymptotically distributed as a 1 df chi-squared distribution. Note that the continuity correction is removed from the Mantel-Haenszel statistic when the sum of the differences between the observed and the expected is 0.

Mantel-Haenszel Common Odds Ratio Estimate

Estimate	35.821		
ln(Estimate)	3.579		
Standard Error of ln(Estimate)	.487		
Asymptotic Significance (2-sided)	.000		
Asymptotic 95% Confidence Interval	Common Odds Ratio	Lower Bound	13.796
		Upper Bound	93.012
	ln(Common Odds Ratio)	Lower Bound	2.624
		Upper Bound	4.533

The Mantel-Haenszel common odds ratio estimate is asymptotically normally distributed under the common odds ratio of 1,000 assumption. So is the natural log of the estimate.

Lampiran 3. Hasil Tabulasi Data

Perdarahan Post Partum

No	No. RM	Nama Ibu bersalin	Usia Ibu Bersalin	Pendidikan Terakhir	Jarak Kehamilan Terakhir	Paritas	Pemeriksaan Hemoglobin (Hb)				Penyebab Perdarahan	Alamat	Pekerjaan
							Trimester I	Trimester II	Trimester III				
							ANC 1	ANC 2	ANC 3	ANC 4			
1	153060	Ny. M	29 Tahun	SMP	2 Tahun	G3P2A0	8,6 gr/dl	11,2 gr/dl	9,2 gr/dl	9,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
2	288558	Ny. R	34 Tahun	SD	3 Tahun	G4P3A0	10,2 gr/dl	9,6 gr/dl	9,7 gr/dl	10 gr/dl	Atonia Uteri	Bungoro	IRT
3	285856	Ny. S	32 tahun	SMP	2 Tahun	G4P3A0	11,2gr/dl	11,5 gr/dl	12,4 gr/dl	13,3 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
4	283757	Ny. H	31 Tahun	SMA	3 Tahun	G3P0A1	10,4 gr/dl	11,3 gr/dl	11,7 gr/dl	12,1 gr/dl	Inversio Uteri	Ma'rang	IRT
5	213655	Ny. L	24 Tahun	SMP	2 Tahun	G3P2A0	9,7 gr/dl	9,7 gr/dl	9,1 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
6	244855	Ny. M	26 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	12,4 gr/dl	9,8 gr/dl	10,5 gr/dl	10,3 gr/dl	Atonia Uteri	Taraweang	IRT
7	284255	Ny. S	20 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	9,5 gr/dl	8,6 gr/dl	8,5 gr/dl	8,7 gr/dl	Ruptura Uteri	Segeri	IRT
8	285859	Ny. S	32 Tahun	SMP	3 Tahun	G3P2A0	9,6 gr/dl	9 gr/dl	11,3 gr/dl	11,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
9	283247	Ny. E	25 Tahun	SMP	1 Tahun	G2P1A0	9,2 gr/dl	8,7 gr/dl	12,7 gr/dl	13,2 gr/dl	Ruptura Uteri	Balocci	IRT
10	115848	Ny. S	31 Tahun	SMP	3 Tahun	G4P2A1	8,8 gr/dl	7,5 gr/dl	8,1 gr/dl	8,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Mandalle	IRT
11	231849	Ny. M	35 Tahun	SMP	4 Tahun	G4P102	8,7 gr/dl	8,5 gr/dl	9,1 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Pundata Baji	IRT
12	276453	Ny. N	27 Tahun	SMA	2 Tahun	G2P1A0	10,4 gr/dl	8,8 gr/dl	9,3 gr/dl	9,6 gr/dl	Atonia Uteri	Pangkajene	IRT
13	210353	Ny. V	24 Tahun	SMA	2 Tahun	G3P2A0	11,4 gr/dl	11,8 gr/dl	12,4 gr/dl	12,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Bungoro	IRT
14	281354	Ny. D	35 Tahun	SMA	4 Tahun	G4P3A0	9,7 gr/dl	13,4 gr/dl	12,5 gr/dl	12,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
15	289651	Ny. N	20 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	8,6 gr/dl	8,8 gr/dl	8,5 gr/dl	8,9 gr/dl	Atonia Uteri	Bungoro	IRT
16	241851	Ny. G	27 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G2P1A0	9,2 gr/dl	8,5 gr/dl	12,2 gr/dl	11,5 gr/dl	Atonia Uteri	Labakkang	PNS
17	251751	Ny. M	32 tahun	SMP	5 Tahun	G4P3A0	9,2 gr/dl	9,4 gr/dl	11,7 gr/dl	12,5 gr/dl	Ruptura Uteri	Ma'rang	IRT
18	282851	Ny. R	35 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P1A2	9,5 gr/dl	8,7 gr/dl	8,9 gr/dl	9,4 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
19	287852	Ny. N	21 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	8,4 gr/dl	10,2 gr/dl	11,4 gr/dl	11,5 gr/dl	Ruptura Uteri	Ma'rang	IRT
20	215844	Ny. S	28 Tahun	SMA	3 Tahun	G4P3A0	9,6 gr/dl	9 gr/dl	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT

21	287844	Ny. N	21 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	8,8 gr/dl	9 gr/dl	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	Atonia Uteri	Ma'rang	IRT
22	179645	Ny. M	20 Tahun	SD	1 Tahun	G2P0A1	10,2 gr/dl	14,2 gr/dl	12,2 gr/dl	12,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
23	286059	Ny. F	20 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	11,5 gr/dl	11,8 gr/dl	12,5 gr/dl	12,9 gr/dl	Atonia Uteri	Pangkajene	IRT
24	281759	Ny. H	34 Tahun	SMP	2 Tahun	G3P2A0	9,3 gr/dl	9,3 gr/dl	9,6 gr/dl	10 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
25	284513	Ny. F	20 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	14 gr/dl	13,1 gr/dl	10,3 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Ma'rang	IRT
26	282809	Ny. E	35 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl	9,8 gr/dl	8,7 gr/dl	Atonia Uteri	Kalabbirang	IRT
27	284907	Ny. N	20 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	11,3 gr/dl	10,7 gr/dl	8,8 gr/dl	9,4 gr/dl	Atonia Uteri	Minasatene	IRT
28	279901	Ny. H	20 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	9 gr/dl	8,7 gr/dl	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl	Ruptura Uteri	Pangkajene	IRT
29	207309	Ny. N	27 Tahun	SMP	3 Tahun	G4P1A2	7,8 gr/dl	8,6 gr/dl	8,9 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Ma'rang	IRT
30	244503	Ny. M	24 Tahun	SD	2 Tahun	G4P3A0	12,4 gr/dl	12,5 gr/dl	13,5 gr/dl	13,8 gr/dl	Atonia Uteri	Ma'rang	IRT
31	161912	Ny. S	31 Tahun	SD	4 Tahun	G3P0A2	8,8 gr/dl	9 gr/dl	9,4 gr/dl	10 gr/dl	Ruptura Uteri	Bungoro	IRT
32	239412	Ny. N	23 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	9 gr/dl	9,7 gr/dl	9,4 gr/dl	9,8 gr/dl	Ruptura Uteri	Labakkang	IRT
33	159213	Ny. R	28 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G2P0A1	10,5 gr/dl	9,8 gr/dl	10,3 gr/dl	10 gr/dl	Retensio Plasenta	Bonto Perak	HONORER
34	215013	Ny. R	35 Tahun	SD	4 Tahun	G4P3A0	9,3 gr/dl	9,6 gr/dl	9 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Bungoro	IRT
35	267216	Ny. N	22 Tahun	SD	3 Tahun	G2P1A0	10 gr/dl	9,5 gr/dl	10 gr/dl	9,8 gr/dl	Inversio Uteri	Pangkajene	IRT
36	278705	Ny. N	26 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	10,1 gr/dl	9,5 gr/dl	9,8 gr/dl	10,2 gr/dl	Ruptura Uteri	Segeri	IRT
37	104413	Ny. S	35 Tahun	SD	5 Tahun	G4P3A0	10 gr/dl	9,3 gr/dl	9,7 gr/dl	9,4 gr/dl	Retensio Plasenta	Ma'rang	IRT
38	253706	Ny. F	29 Tahun	SMP	3 Tahun	G3P1A1	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	12,7 gr/dl	13 gr/dl	Retensio Plasenta	Ma'rang	IRT
39	286924	Ny. I	29 Tahun	SMP	3 Tahun	G3P2A0	10 gr/dl	9,5 gr/dl	9,5 gr/dl	10,3 gr/dl	Atonia Uteri	Segeri	IRT
40	272025	Ny. K	22 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	10 gr/dl	12,3 gr/dl	10,7 gr/dl	11,7 gr/dl	Atonia Uteri	Pangkajene	IRT
41	227110	Ny. A	26 Tahun	SD	3 Tahun	G3P2A0	8,1 gr/dl	8,8 gr/dl	9,2 gr/dl	9,6 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
42	246718	Ny. F	20 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	12,8 gr/dl	11,7 gr/dl	12,2 gr/dl	11,4 gr/dl	Ruptura Uteri	Bungoro	IRT
43	223816	Ny. Y	31 Tahun	SMP	4 Tahun	G2P1A0	8,9 gr/dl	8,7 gr/dl	9,4 gr/dl	9,8 gr/dl	Ruptura Uteri	Pangkajene	IRT
44	283515	Ny. S	33 Tahun	SD	5 Tahun	G3P1A1	10,5 gr/dl	9,9 gr/dl	9,4 gr/dl	10 gr/dl	Atonia Uteri	Bungoro	IRT
45	181999	Ny. J	33 Tahun	SD	4 Tahun	G3P2A0	10,5 gr/dl	9,7 gr/dl	9,5 gr/dl	10 gr/dl	Retensio Plasenta	Labakkang	IRT
46	243689	Ny. N	25 Tahun	SMA	2 Tahun	G2P0A1	8,6 gr/dl	12,4 gr/dl	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Pangkajene	IRT
47	278683	Ny. F	35 Tahun	SD	6 Tahun	G4P3A0	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	8,8 gr/dl	9,2 gr/dl	Retensio Plasenta	Bungoro	IRT

48	281691	Ny. H	20 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	9,3 gr/dl	9,5 gr/dl	10,1 gr/dl	9,4 gr/dl	Atonia Uteri	Labakkang	IRT
49	147589	Ny. E	34 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G3P2A0	10,7 gr/dl	9,8 gr/dl	12,1 gr/dl	12,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	PNS
50	282690	Ny. I	27 Tahun	SMP	3 Tahun	G3P1A1	10,5 gr/dl	9,2 gr/dl	9,4 gr/dl	8,5 gr/dl	Inversio Uteri	Minasatene	IRT
51	289280	Ny. N	34 Tahun	SMP	4 Tahun	G4P3A0	10 gr/dl	9,5 gr/dl	9,2 gr/dl	10,2 gr/dl	Inversio Uteri	Ma'rang	IRT
52	286494	Ny. I	34 Tahun	SD	5 Tahun	G4P2A1	8,1 gr/dl	9,3 gr/dl	9,7 gr/dl	10 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
53	156894	Ny. R	29 Tahun	SMP	4 Tahun	G3P2A0	9,2 gr/dl	10,8 gr/dl	10,2 gr/dl	9,2 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
54	289473	Ny. N	28 Tahun	SMP	3 Tahun	G3P2A0	9,8 gr/dl	9 gr/dl	9,7 gr/dl	9,4 gr/dl	Inversio Uteri	Bungoro	IRT
55	289993	Ny. N	31 Tahun	SMA	4 Tahun	G3P2A0	8,5 gr/dl	8,8 gr/dl	9,2 gr/dl	9,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
56	284274	Ny. S	33 Tahun	SD	5 Tahun	G4P1A2	7,5 gr/dl	8,4 gr/dl	8,8 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Bungoro	IRT
57	285178	Ny. K	20 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	9,6 gr/dl	14,3 gr/dl	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl	Retensio Plasenta	Ma'rang	IRT
58	281176	Ny. D	26 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	11,3 gr/dl	8,5 gr/dl	8,9 gr/dl	9,7 gr/dl	Atonia Uteri	Bungoro	IRT
59	282795	Ny. S	27 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	10,4 gr/dl	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	10,1 gr/dl	Atonia Uteri	Labakkang	HONORER
60	280992	Ny. A	20 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	8,3 gr/dl	9,3 gr/dl	9,8 gr/dl	10,3 gr/dl	Atonia Uteri	Minasatene	MAHASISWI
61	289473	Ny. N	26 Tahun	SMA	1 Tahun	G2P0A1	9,8 gr/dl	9,3 gr/dl	8,4 gr/dl	9 gr/dl	Atonia Uteri	Minasatene	IRT
62	284675	Ny. K	25 Tahun	SD	2 Tahun	G3P2A0	10,3 gr/dl	9,3 gr/dl	9,7 gr/dl	10,3 gr/dl	Ruptura Uteri	Bungoro	IRT
63	284077	Ny. H	24 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	8,8 gr/dl	13,6 gr/dl	12,5 gr/dl	12,8 gr/dl	Ruptura Uteri	Bungoro	IRT
64	284077	Ny. R	25 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	9 gr/dl	9,7 gr/dl	9,3 gr/dl	10 gr/dl	Ruptura Uteri	Pangkajene	IRT
65	288236	Ny. S	27 Tahun	SMA	3 Tahun	G2P1A0	9,5 gr/dl	9,8 gr/dl	8,9 gr/dl	9,5 gr/dl	Retensio Plasenta	Bungoro	IRT
66	279901	Ny. N	34 Tahun	SMP	4 Tahun	G4P3A0	8,8 gr/dl	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	10 gr/dl	Retensio Plasenta	Minasatene	IRT
67	222742	Ny. D	21 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	8,5 gr/dl	8,9 gr/dl	9,4 gr/dl	10,3 gr/dl	Ruptura Uteri	Minasatene	IRT
68	220846	Ny. R	28 Tahun	SMP	4 Tahun	G3P1A1	7,8 gr/dl	11,6 gr/dl	12,2 gr/dl	13,4 gr/dl	Atonia Uteri	Labakkang	IRT
69	282103	Ny. A	23 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	7,5 gr/dl	8,7 gr/dl	9,6 gr/dl	10,3 gr/dl	Inversio Uteri	Labakkang	IRT
70	284675	Ny. K	21 Tahun	SMP	2 Tahun	G2P1A0	9 gr/dl	8,5 gr/dl	9,3 gr/dl	9,9 gr/dl	Inversio Uteri	Pangkajene	IRT
71	282683	Ny. H	24 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	12,7 gr/dl	13,3 gr/dl	13,5 gr/dl	12,7 gr/dl	Atonia Uteri	Minasatene	IRT
72	282503	Ny. R	34 Tahun	SARJANA	6 Tahun	G2P1A0	8,9 gr/dl	9,5 gr/dl	10 gr/dl	9,5 gr/dl	Atonia Uteri	Pangkajene	IRT
73	283032	Ny. M	21 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	14 gr/dl	13,4 gr/dl	13,6 gr/dl	13,8 gr/dl	Ruptura Uteri	Minasatene	IRT
74	254838	Ny. N	24 Tahun	SD	2 Tahun	G3P1A1	8 gr/dl	9,1 gr/dl	9,7 gr/dl	10,3 gr/dl	Retensio Plasenta	Balocci	IRT
75	289473	Ny. D	20 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	7,4 gr/dl	8,1 gr/dl	9,2 gr/dl	9,7 gr/dl	Retensio Plasenta	Mandalle	IRT

Kehamilan Normal

76	279946	Ny. H	35 Tahun	SMA	5 Tahun	G3P2A0	14,2 gr/dl	13,7 gr/dl	14 gr/dl	14,2 gr/dl		Pangkajene	IRT
77	288446	Ny. M	23 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	11,5 gr/dl	12 gr/dl	12,5 gr/dl	13 gr/dl		Bungoro	IRT
78	279748	Ny. S	22 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	9,2 gr/dl	9,4 gr/dl	10,2 gr/dl	10,5 gr/dl		Bungoro	IRT
79	280648	Ny. R	22 Tahun	SMP	2 Tahun	G2P0A1	11,3 gr/dl	11,8 gr/dl	12,5 gr/dl	11,7 gr/dl		Labakkang	IRT
80	174452	Ny. S	30 Tahun	SMP	4 Tahun	G3P2A0	11,7 gr/dl	12,5 gr/dl	13 gr/dl	12,7 gr/dl		Pangkajene	IRT
81	283952	Ny. N	21 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	8,8 gr/dl	9,4 gr/dl	13,4 gr/dl	13,7 gr/dl		Taraweang	IRT
82	280752	Ny. L	34 Tahun	SD	6 Tahun	G3P1A1	11,3 gr/dl	11,7 gr/dl	12,8 gr/dl	13,5 gr/dl		Labakkang	IRT
83	194847	Ny. F	29 Tahun	SD	4 Tahun	G4P1A2	12 gr/dl	9,4 gr/dl	10,4 gr/dl	10,7 gr/dl		Pangkajene	IRT
84	242451	Ny. A	24 Tahun	SMP	3 Tahun	G2P1A0	9,6 gr/dl	12,5 gr/dl	10,7 gr/dl	10,2 gr/dl		Balocci	IRT
85	278751	Ny. D	35 Tahun	SMP	4 Tahun	G3P1A1	11,2 gr/dl	11,8 gr/dl	12,7 gr/dl	13,2 gr/dl		Labakkang	IRT
86	283846	Ny. S	23 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	12,8 gr/dl	12,5 gr/dl	13,1 gr/dl	12,4 gr/dl		Labakkang	IRT
87	282346	Ny. N	30 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	11,2 gr/dl	11,6 gr/dl	12,4 gr/dl	13 gr/dl		Minasatene	IRT
88	280653	Ny. R	20 Tahun	SD	2 Tahun	G2P1A0	7,8 gr/dl	8,6 gr/dl	10,2 gr/dl	10,5 gr/dl		Bungoro	IRT
89	277154	Ny. S	35 Tahun	SMP	6 Tahun	G3P2A0	13 gr/dl	12,4 gr/dl	13,5 gr/dl	13,9 gr/dl		Balocci	IRT
90	281453	Ny. S	33 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	11,5 gr/dl	12,4 gr/dl	12,9 gr/dl	11,5 gr/dl		Pangkajene	IRT
91	285459	Ny. S	20 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	11,4 gr/dl	12 gr/dl	12,7 gr/dl	13,4 gr/dl		Minasatene	IRT
92	278859	Ny. L	20 Tahun	SD	0 Tahun	G1P0A0	11,5 gr/dl	12,2 gr/dl	10,4 gr/dl	10,1 gr/dl		Labakkang	IRT
93	278649	Ny. H	21 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	8,1 gr/dl	9,3 gr/dl	11,5 gr/dl	12,7 gr/dl		Kalabbirang	IRT
94	278249	Ny. H	35 Tahun	SD	5 Tahun	G4P2A1	13,3 gr/dl	12,4 gr/dl	12,9 gr/dl	13,3 gr/dl		Bungoro	IRT
95	179849	Ny. H	32 tahun	SD	4 Tahun	G4P3A0	8,3 gr/dl	9,4 gr/dl	13,7 gr/dl	13,3 gr/dl		Balocci	IRT
96	276149	Ny. N	34 Tahun	SMP	6 Tahun	G2P1A0	13,7 gr/dl	14 gr/dl	13,4 gr/dl	13,8 gr/dl		Minasatene	IRT
97	219954	Ny. R	34 Tahun	SMP	5 Tahun	G3P1A1	11,4 gr/dl	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl	13,4 gr/dl		Minasatene	IRT
98	130244	Ny. D	22 Tahun	SMP	2 Tahun	G2P1A0	12,4 gr/dl	12,7 gr/dl	13,1 gr/dl	12,6 gr/dl		Bungoro	IRT
99	189944	Ny. F	24 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	9,1 gr/dl	13,7 gr/dl	12,5 gr/dl	13,5 gr/dl		Bungoro	IRT
100	146744	Ny. R	28 Tahun	SMA	3 Tahun	G3P2A0	12,2 gr/dl	12,8 gr/dl	13,2 gr/dl	12,8 gr/dl		Minasatene	IRT

101	279044	Ny. N	32 tahun	DIPLOMA	3 Tahun	G3P2A0	11,7 gr/dl	8,5 gr/dl	9,7 gr/dl	10,5 gr/dl		Minasatene	IRT
102	209044	Ny. M	23 Tahun	SMP	3 Tahun	G2P1A0	11,7 gr/dl	12,7 gr/dl	13,8 gr/dl	14 gr/dl		Pangkajene	IRT
103	279858	Ny. D	33 Tahun	SD	5 Tahun	G4P3A0	11,2 gr/dl	11,7 gr/dl	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl		Pangkajene	IRT
104	269758	Ny. N	35 Tahun	SMP	7 Tahun	G3P0A2	8,7 gr/dl	9,2 gr/dl	12,7 gr/dl	13 gr/dl		Ma'rang	IRT
105	283555	Ny. M	23 Tahun	SMP	3 Tahun	G2P1A0	14,5 gr/dl	13,2 gr/dl	13,5 gr/dl	13,8 gr/dl		Bonto Perak	IRT
106	191950	Ny. W	20 Tahun	SD	4 Tahun	G2P1A0	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl	12,7 gr/dl	13,2 gr/dl		Minasatene	IRT
107	160150	Ny. H	34 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G3P2A0	11,7 gr/dl	12,3 gr/dl	12,8 gr/dl	13,3 gr/dl		Ma'rang	HONORER
108	246718	Ny. N	28 Tahun	SMA	3 Tahun	G2P1A0	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl	13,2 gr/dl	13,8 gr/dl		Minasatene	IRT
109	286968	Ny. A	27 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	13 gr/dl	13,4 gr/dl	13,8 gr/dl	13,4 gr/dl		Pangkajene	HONORER
110	282770	Ny. I	35 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P2A1	12,7 gr/dl	13 gr/dl	13,7 gr/dl	14,2 gr/dl		Minasatene	IRT
111	284017	Ny. N	34 Tahun	SMA	5 Tahun	G3P2A0	11,2 gr/dl	11,5 gr/dl	12,6 gr/dl	13,1 gr/dl		Pangkajene	IRT
112	279780	Ny. M	32 tahun	SMP	4 Tahun	G2P1A0	13 gr/dl	13,4 gr/dl	13,2 gr/dl	12,6 gr/dl		Pangkajene	IRT
113	283515	Ny. S	25 Tahun	SMP	3 Tahun	G2P1A0	13,4 gr/dl	13 gr/dl	12,5 gr/dl	12,8 gr/dl		Pangkajene	IRT
114	281354	Ny. L	22 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	12 gr/dl	12,6 gr/dl	12,9 gr/dl	13,5 gr/dl		Bungoro	IRT
115	282435	Ny. N	23 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	11,4 gr/dl	9,7 gr/dl	10,2 gr/dl	10,5 gr/dl		Pangkajene	IRT
116	282681	Ny. F	23 Tahun	SMP	3 Tahun	G2P0A1	11 gr/dl	12,5 gr/dl	12,7 gr/dl	13,7 gr/dl		Pangkajene	IRT
117	223816	Ny. F	35 Tahun	SD	4 Tahun	G4P3A0	12 gr/dl	12,8 gr/dl	10,8 gr/dl	10,5 gr/dl		Bungoro	IRT
118	282162	Ny. M	28 Tahun	SARJANA	4 Tahun	G2P1A0	9,4 gr/dl	10,2 gr/dl	13 gr/dl	13,4 gr/dl		Pangkajene	HONORER
119	280992	Ny. F	27 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G2P1A0	13,6 gr/dl	12,8 gr/dl	12,4 gr/dl	13,2 gr/dl		Bungoro	PNS
120	288558	Ny. M	27 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	12,4 gr/dl	12,7 gr/dl	13,1 gr/dl	13,8 gr/dl		Minasatene	HONORER
121	262131	Ny. L	27 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	14 gr/dl	13,2 gr/dl	13,5 gr/dl	13,7 gr/dl		Minasatene	IRT
122	125096	Ny. W	29 Tahun	SMP	3 Tahun	G4P3A0	13,5 gr/dl	13 gr/dl	12,6 gr/dl	13,1 gr/dl		Pangkajene	IRT
123	281648	Ny. D	21 Tahun	SMP	2 Tahun	G2P1A0	11,4 gr/dl	12,4 gr/dl	12,8 gr/dl	13,3 gr/dl		Minasatene	IRT
124	282795	Ny. S	21 Tahun	SMP	2 Tahun	G2P1A0	11,9 gr/dl	12,6 gr/dl	13,1 gr/dl	13,5 gr/dl		Pangkajene	IRT
125	281983	Ny. H	25 Tahun	SMA	3 Tahun	G2P1A0	11,6 gr/dl	12,3 gr/dl	12,9 gr/dl	13,4 gr/dl		Pangkajene	IRT
126	155699	Ny. K	30 Tahun	SMA	4 Tahun	G3P0A2	12,8 gr/dl	9,4 gr/dl	13,6 gr/dl	13,9 gr/dl		Pangkajene	IRT
127	288666	Ny. R	25 Tahun	SMA	3 Tahun	G2P1A0	13 gr/dl	13,4 gr/dl	12,8 gr/dl	13,5 gr/dl		Pangkajene	IRT
128	283041	Ny. N	24 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	12,1 gr/dl	12,6 gr/dl	10,3 gr/dl	12,4 gr/dl		Pangkajene	IRT

ALAUDDIN
MAKASSAR

129	284907	Ny. N	34 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P3A0	13,2 gr/dl	12,5 gr/dl	12,8 gr/dl	13,1 gr/dl		Labakkang	IRT
130	231849	Ny. F	30 Tahun	SMP	7 Tahun	G3P0A2	9,6 gr/dl	12,1 gr/dl	9,4 gr/dl	9,8 gr/dl		Labakkang	IRT
131	220799	Ny. R	35 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P3A0	11,4 gr/dl	12 gr/dl	12,6 gr/dl	13 gr/dl		Bungoro	IRT
132	278436	Ny. F	28 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	13 gr/dl	12,5 gr/dl	12,8 gr/dl	12,4 gr/dl		Ma'rang	PNS
133	215685	Ny. F	27 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	12,9 gr/dl	13,3 gr/dl	13,7 gr/dl	13,4 gr/dl		Minasatene	HONORER
134	220217	Ny. D	33 Tahun	SD	4 Tahun	G4P3A0	8,6 gr/dl	8,8 gr/dl	9,4 gr/dl	9,8 gr/dl		Bungoro	IRT
135	282797	Ny. N	30 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G2P1A0	11,8 gr/dl	12,4 gr/dl	12,7 gr/dl	12,3 gr/dl		Minasatene	PNS
136	200862	Ny. S	24 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	12,5 gr/dl	11,7 gr/dl	11,5 gr/dl	12,4 gr/dl		Pangkajene	IRT
137	284255	Ny. I	35 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P2A1	12,8 gr/dl	9,8 gr/dl	10,3 gr/dl	10,8 gr/dl		Bungoro	IRT
138	287844	Ny. H	35 Tahun	SD	4 Tahun	G4P3A0	13 gr/dl	10,2 gr/dl	11,8 gr/dl	12,7 gr/dl		Minasatene	IRT
139	161912	Ny. D	35 Tahun	SD	3 Tahun	G4P1A2	11,6 gr/dl	9,4 gr/dl	9,7 gr/dl	10,3 gr/dl		Minasatene	IRT
140	283428	Ny. A	27 Tahun	SMA	3 Tahun	G3P2A0	12,7 gr/dl	11,5 gr/dl	11,3 gr/dl	11,7 gr/dl		Bungoro	IRT
141	282809	Ny. F	28 Tahun	SARJANA	4 Tahun	G2P1A0	12,5 gr/dl	12,2 gr/dl	11,7 gr/dl	11,3 gr/dl		Pangkajene	IRT
142	241851	Ny. I	20 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	8,4 gr/dl	9 gr/dl	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl		Minasatene	IRT
143	281176	Ny. N	20 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	13,5 gr/dl	13,5 gr/dl	12,6 gr/dl	12,3 gr/dl		Labakkang	IRT
144	282971	Ny. F	21 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	14 gr/dl	13,4 gr/dl	13,7 gr/dl	11,5 gr/dl		Pangkajene	IRT
145	287852	Ny. N	24 Tahun	SARJANA	0 Tahun	G1P0A0	14 gr/dl	13,5 gr/dl	12,7 gr/dl	12,8 gr/dl		Balocci	HONORER
146	299123	Ny. A	28 Tahun	SMA	3 Tahun	G3P1A1	7,8 gr/dl	8,4 gr/dl	9,2 gr/dl	9,5 gr/dl		Minasatene	IRT
147	279118	Ny. N	34 Tahun	SMP	5 Tahun	G4P3A0	11 gr/dl	11,6 gr/dl	11,9 gr/dl	12,3 gr/dl		Ma'rang	IRT
148	244503	Ny. I	30 Tahun	SARJANA	3 Tahun	G2P1A0	12,2 gr/dl	12,5 gr/dl	11,2 gr/dl	11,8 gr/dl		Labakkang	PNS
149	282618	Ny. H	20 Tahun	SMP	0 Tahun	G1P0A0	13 gr/dl	12,2 gr/dl	10,5 gr/dl	9,3 gr/dl		Kalabbirang	IRT
150	282998	Ny. A	22 Tahun	SMA	0 Tahun	G1P0A0	12,5 gr/dl	12,8 gr/dl	13,4 gr/dl	12,2 gr/dl		Pangkajene	IRT

Lampiran 4. Surat Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.273/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:
The research protocol proposed by:

<i>Peneliti utama</i> <i>Principal Investigator</i>	AQILAH FARAH SALSABIL
<i>Nama Institusi</i> <i>Name of the Institution</i>	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

**"HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN
PERDARAHAN POSTPARTUM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA
SIANG KABUPATEN PANGKEP PERIODE 2021"**

*"RELATIONSHIP OF ANEMIA IN PREGNANCY WITH POSTPARTUM BLOODING EVENTS IN
BATARA SIANG REGIONAL GENERAL HOSPITAL, PANKEP REGENCY, THE PERIOD 2021"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu: 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penelitian, yang mengacu pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and benefits, 4) Risk, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023.

This declaration of ethics applies during the period June 14th, 2022 until June 14th, 2023.

June 14th, 2022
Professor and Chairperson.


DR. Dr. Sutitah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 5. Surat Izin Balitbangda


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
Website : <http://aimap-new.sulawiprov.go.id> Email : ptsp@sulawiprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 1596/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.	Bupati Pangkep
Lampiran	: -		
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>		

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-1883/Un.D6/FKIK/PP.00.8/5/2022 tanggal 4 Mei 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: AQILAH FARAH SALSABIL
Nomor Pokok	: 70600118023
Program Studi	: Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Palong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" HUBUNGAN ANEMIA DALAM KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN PERDARAHAN POSTPARTUM DI RSUD BATARA SIANG KABUPATEN PANGKEP PERIODE 2021 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Mei s/d 30 Juni 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 25 Mei 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Drs. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M. Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA Nip : 19650606 199003 2 011
---	---

Tambahan Yth:

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Bertanggung

Lampiran 6. Izin Penelitian DPM-PTSP

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Hassanuddin Nomor 40 ☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 156/1PT/DPMPTSP/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep;
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	: AQILAH FARAH SALSABIL
Nomor Pokok	: Y0600118023
Tempat/Tgl. Lahir	: Pangkajene / 06 September 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Andi Mawardi Timur No. 23-Ke/ Desa Tumampung Kec. Pangkajene Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: RSUD Batara Siang Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan melakukan penelitian dalam rangka Pemulisan Survey dengan Judul :
Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021

Waktunya Penelitian : 31 Mei 2022 s.d 30 Juni 2022

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) contoh foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila mana pemegang izin teroryata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 31 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.









STAMP: 156/1PT/DPMPTSP/2022
SIALPORA, S.Sos, M.Si
PANGKAJENE, Ttn. U/10/19
NIP. 80730202 198603 2 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);
2. Kepala Kantor Keuang;
3. Arsip;

Lampiran 7. Surat Izin Telah Meneliti

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE & KEPULAUAN**
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATARA SIANG
Jl. Sultan Hassanudin no 7, Kec. Pangkajene, email : rsupangkep118@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 1266 / RSBS-TU / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, an. Direktur Rumah Sakit Umum Pangkep, Kasubag Umum, Diklat dan Akreditasi menerangkan bahwa :

Nama : Aqilah Farah Salsabil
NIM : 70600118023
Program Studi : Pendidikan Kedokteran
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Andi Mursana Timur No. 23, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkajene dan Kepulauan.


Benar telah selesai melaksanakan Penelitian berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 156/IPT/DPMPSTSP/V/2022 tanggal 31 Mei 2022 Perihal Izin Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep mulai tanggal 31 Mei s/d 30 Juni 2022 Maksud dan Tujuan mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Survey dengan judul :

" Hubungan Anemia Dalam Kehamilan Dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang Kabupaten Pangkep Periode 2021 "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 17 Juni 2022

An. Direktur,
Kasubag. Administrasi Umum, Diklat dan Akreditasi


Inawati, S. Kep. Ns., M.Kes
Nip. 19836924 200604 2 011

Lampiran 8. Dokumentasi



M A K A S S A R



M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Aqilah Farah Salsabil
2. NIM : 70600118023
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jln. Andi Mauraga Timur No. 23 Kabupaten Pangkep
7. Nama Orang tua
 - a. Ayah : dr. H. Sakariah Hanis, M.M
 - b. Ibu : Hj. Rosdiana Rahman, SKM

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 10 Bontomangape
2. SMP : SMP Negeri 1 Pangkajene
3. SMA : SMA Negeri 1 Pangkep
4. S1 : Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar