

**PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TREN PENURUNAN
ANGKA CAKUPAN IMUNISASI HB0, BCG DAN POLIO 1 DI WILAYAH
KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Kedokteran Pada Program Studi Pendidikan
Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

NUR FADYLAH YANTI

NIM: 70600118031

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadylah Yanti
NIM : 70600118031
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkajene Sidrap, 06 Februari 2000
Jurusan : Pendidikan Dokter
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jln. Recing Center Perumahan BTN Gardenia D/4
Judul : Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2022


Nur Fadylah Yanti
NIM: 70600118031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar"** yang disusun oleh Nur Fadyah Yanti, NIM 70600118031, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis, 25 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran.

Makassar, 25 Agustus 2022
27 Muharram 1444 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: dr. Andi Tihardimanto, Sp.JP., M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	: dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed.	(.....)
Penguji I	: Dr. dr. Rosdianah Rahim, M.Kes.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mardani, M.Ag.	(.....)

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

NIP. 19800701 200604 2 002

ABSTRAK

Nama : Nur Fadylah Yanti
NIM : 70600118031
Jurusan : Pendidikan Dokter
Judul : Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio-1 Di Wilayah Kota Makassar
Pembimbing I : dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes.
Pembimbing II : dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed.

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Jadi Imunisasi merupakan tindakan yang dengan sengaja memberikan antigen atau bakteri dari suatu patogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan, sehingga hanya mengalami gejala ringan apabila terpapar dengan penyakit tertentu. COVID-19 adalah jenis dari coronavirus, Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 berdampak pada pelaksanaan program kesehatan khususnya pelayanan imunisasi dan surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi. Menurut kementerian Kesehatan 2020 Analisis data menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1 di Wilayah Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional*. Sampel penelitian ini diambil menggunakan metode *total sampling*. Teknik analisis data digunakan aplikasi computer berupa program SPSS (Statistical Package for the Social Science), Penelitian ini menggunakan data perbedaan angka cakupan diidentifikasi berdasarkan periode waktu 2019,2020 dan 2021, pembagian wilayah puskesmas di wilaya kota Makassar. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar.

Kata Kunci: COVID-19, Imunisasi, HB0, BCG, Polio-1.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar**”. Proposal ini yang merupakan satu tugas untuk meraih kelulusan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Pendidikan Dokter Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan proposal ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, namun penulis tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan yang terbaik dan berharap semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang tulus, rasa hormat kepada kedua orang tua ayahanda H.Dr.Muhammad Suyuti Thamrin.SE,MM. Dan ibunda Hj.Nurlaela Tombong.SE,MM serta saudara-saudara Muhammad Adyl Ridha Suyuti.SE,MM, Fadlyani Putri Handayani.SH, Muhammad Resky Ananda, serta atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan proposal ini kepada :

1. Prof. Dr. Hamdan Juhannis, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A, M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.


3. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes dan dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed selaku dosen pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama ini.
4. Dr.dr.Rosdianah Rahim, M.Kes selaku dosen penguji kompetensi dan Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku dosen penguji integrasi saya yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan kepada penulis selama ini.
5. Terima kasih staff akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal admistrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.
6. Terima kasih Dinas Kesehatan Kota Makassar yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
7. Terkhusus untuk sahabat terima kasih selalu mendukung dan mengingatkan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Terkhusus untuk seluruh Keluarga Besar Fibronektin Angkatan 2018 yang penulis banggakan dan telah memberikan dukungan selama ini.
9. Semua pihak terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang turut mendukung penulis selama ini.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang turut berperan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 10 Agustus 2022

Nur Fadylah Yanti



DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis.....	6
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Imunisasi	11
B. Pandemi COVID-19.....	32
C. Kerangka Teori.....	50
D. Kerangka Konsep.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Desain Penelitian	52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
C. Populasi dan Tabel	52

D. Teknik Pengambilan Sampel	53
E. Cara Pengumpulan Data	53
F. Instrumen Penelitian	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Analisis Data	55
I. Alur Penelitian	56
J. Etika Penelitian	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Hasil Penelitian	58
B. Pembahasan.....	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Jenis Imunisasi Berdasarkan Sifat Penyelenggara.....	12
Gambar 2.2 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 Tahun	20
Gambar 2.3 Kerangka Teori.....	52
Gambar 2.4 Kerangka Konsep.....	53
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Definisi Operasional.....	5
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	6



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak akhir tahun 2019, hingga saat ini, seluruh dunia masih menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat berdampak ke seluruh aspek terutama pada pelayanan kesehatan diseluruh dunia. COVID-19 adalah jenis dari coronavirus, yaitu (SARSCoV2). Virus ini berasal dari Wuhan, China, ditemukan pada akhir Desember 2019. Penyakit ini disebut penyakit virus corona 2019 (COVID-19). Virus ini merupakan virus RNA-positif berantai tunggal yang menginfeksi saluran pernapasan seseorang. COVID-19 menghadirkan gejala berupa demam, batuk, dan kesulitan bernapas (Yuliana, 2020).

World Health Organization mengelompokkan virus SARS-CoV-2 menjadi dua kategori, yaitu *variant of interest* (VOI) dan *variant of concern* (VOC). Kategori VOI diberikan jika terdapat mutasi bare dengan implikasi fenotipenya bisa diduga dan harus terpenuhi satu mutasi yang menyebabkan transmisi lokal atau menyebabkan multipel klaster atau terdeteksi di beberapa negara. Kategori VOI dapat naik menjadi VOC bila terdapat beberapa syarat. Pertama, varian ini jelas memiliki peningkatan transmisi, secara epidemiologi lebih cepat. Kedua, varian ini memiliki virulensi yang lebih tinggi, sehingga terjadi peningkatan keparahan terhadap inangnya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketiga, varian tersebut menurunkan efektifitas protokol kesehatan, alat diagnostik, vaksin, dan terapi. *World Health Organization* (WHO) telah mengklasifikasikan varian Omicron sebagai *variant*

of concern (VOC). Klasifikasi ini berdasarkan ditemukannya sejumlah besar mutasi pada varian ini dan beberapa diantaranya mengkhawatirkan (WHO, 2021). Data imunisasi januari hingga April 2020 dibandingkan 2019 mengalami penurunan dari 0,5% menjadi 87%. cakupan imunisasi bayi lahir Januari 2019: HB 0, BCG, dan Polio 1 (89,5 dan imunisasi dasar lengkap (39,5%). Cakupan imunisasi bayi lahir Januari 2020 sedangkan HB 0 (96,7%); BCG (83,3%); Polio 1 (85,0 dan imunisasi dasar lengkap (18,3%). Hal di atas menunjukkan bahwa cakupan imunisasi dasar bayi sebelum pandemi COVID-19 adalah 39,5% dan saat pandemi COVID-19 adalah 18,3%. Penurunan cakupan imunisasi dasar bayi didapatkan 21,2%(Kedokteran *et al.*, 2022)

Seluruh provinsi di Indonesia berada pada angka kesembuhan >90% dan kasus aktif <10% . Pasien positif COVID-19 dengan usia ≥ 60 tahun memiliki risiko tertinggi kematian (13.34%) terutama pada laki-laki, disusul kedua tertinggi dengan pasien berusia 46-59 tahun dengan risiko kematian 5.50%. Terus terjadi kenaikan jumlah pemeriksaan kasus COVID-19 mengikuti standar target WHO. Update terbaru COVID-19 khusus daerah sulsel per 07 Februari tahun 2022 dari data penentuan COVID-19 Sulsel Provinsi. Terdapat suspek *follow up* 2021, total suspek 11339, *probable follow up* 15 (0,0% sembuh) 222 (93,7%) meninggal. total ; *probable* 237. Konfirmasi aktif 655, Asimtomatik 560 sedangkan simtomatik 95. Konfirmasi sembuh 107901 (97,4%) dan yang meninggal 2247 (2,0%) . Total konfirmasi 110803 (Sulsel Tanggap COVID-19 , 2022).

Dengan peningkatan varian COVID-19 ini membuat pelayanan kesehatan lebih ketat lagi terutama yang di sebutkan tadi yaitu pelayanan kesehatan seperti pelaksanaan pemberian imunisasi dasar lengkap. Hampir seluruh puskesmas menyebutkan selama masa pandemi COVID-19 terjadi penurunan bahkan penghentian layanan vaksinasi karena adanya kekhawatiran dari orang tua atau agen untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020 berdampak pada pelaksanaan program kesehatan khususnya pelayanan imunisasi dan surveilans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31). Menurut kementrian Kesehatan 2020 Analisis data menunjukkan bahwa cakupan vaksinasi mengalami penurunan selama pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19 ini, imunisasi harus selalu tepat waktu untuk melindungi anak dari Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31) Pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, berdasarkan analisis situasi epidemiologis penyebaran COVID-19, angka vaksinasi rutin, dan situasi epidemik epidemiologi PD31. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (PD31) sebagian besar merupakan penyakit yang apabila menginfeksi seseorang akan memerlukan biaya pengobatan dan perawatan yang relatif tinggi, yang tentunya akan menjadi beban negara dan masyarakat, pergaulan dan keluarga. Biaya yang dikeluarkan untuk program vaksinasi jauh lebih rendah dari total potensi biaya yang dikeluarkan jika masyarakat terpapar Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD31) (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Allah SWT dalam QS.Asy-Syu'ara'/79: 80.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِتَ النَّاسُ ۗ

Terjemahnya :

“Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku” (Asy-Syu'ara'/79: 80).

Penafsiran Al-Wajiz pada QS.Asy-Syu'ara'/79: 80 yaitu Dan sifat keempat adalah pemberi kesembuhan. Jika aku sakit, Allah adalah Dzat yang menyembuhkanku dari penyakit setelah aku menerima beberapa sebab (kesembuhan) seperti obat. Imunisasi merupakan salah satu ikhtiar kepada Allah SWT. Imunisasi sangat penting untuk mencegah dari beberapa penyakit.

Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 sampai 2 meter. Unit kesehatan perlu berkoordinasi dan mendukung otoritas setempat dalam pelayanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status imunisasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya. tapi masih ada di daerah dengan kasus tertinggi memberhentikan posyandu untuk sementara seperti beberapa puskesmas di wilayah kota Makassar. Ada pula yang tetap melakukan kegiatan posyandu tetapi orang tua dari bayi yang tidak berani untuk membawa anaknya ke posyandu Karena akan kekhawatiran takut terpapar di posyandu atau di puskesmas Karena ramai sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan imunisasi dasar ke puskesmas atau kegiatan posyandu (Felicia and Suarca, 2020).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2019 merupakan tahun sebelum mengalami pandemi COVID-19. Cakupan imunisasi pada tahun 2019 semua puskesmas mencapai target. Pada tahun 2020 mulai meningkat kasus COVID-19 dan telah memasuki masa pandemi COVID-19 dan cakupan imunisasi mulai mengalami penurunan sehingga beberapa puskesmas tidak mencapai target. Kemudian pada tahun 2021 angka COVID-19 sangat meningkat dan cakupan imunisasi mengalami penurunan drastis sampai tidak mencapai target dan hampir terjadi di seluruh puskesmas di kota Makassar. Kemudian pada tahun 2021 cakupan imunisasi lebih menurun dari pada tahun 2021. Terlihat pada Puskesmas Layang (72%), Puskesmas Barombong (76,14%), dan Karuwisi (68,4%) (Dinkes Makassar, 2021). Kemudian pada tahun 2020 merupakan tahun angka kejadian COVID-19 terendah selama pandemi dilaporkan bahwa kunjungan imunisasi mengalami penurunan tapi tidak serendah dari tahun 2021 di kota Makassar terdapat di Puskesmas Layang (84,5%%), Puskesmas Barombong (92,1%), dan Karuwisi (83,2%) Dinkes Makassar, 2020). Cakupan imunisasi di tahun 2019 semua puskesmas mencapai target untuk pencapaian imunisasi dasar lengkap. Terdapat di Puskesmas Layang (99,2%%), Puskesmas Barombong (108,8%), dan Karuwisi (97,7%) Dinkes Makassar, 2019).

——— Uraian di atas menunjukkan bahwa saat ini diseluruh dunia, terkhusus Indonesia sedang mengalami masa krisis kesehatan yang berdampak pada penurunan pelayanan kesehatan salah satunya adalah imunisasi. Dengan melihat penyebaran kasus virus COVID-19 berbeda setiap daerah tetapi apabila diakumulasikan diseluruh

Indonesia mengalami kenaikan kasus COVID-19 ini. Maka akan dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 di wilayah Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Apakah terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1 di Wilayah Kota Makassar?

C. Hipotesis

1. Hipotesis nol (H0)

Tidak ada pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan polio1 di Wilayah Kota Makassar.

2. Hipotesis alternatif (Ha)

Terdapat pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan polio1 di Wilayah Kota Makassar.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Cara ukur	Kriteria Objektif	Skala
Variabel Independen					
1.	Cakupan Imunisasi HBO, BCG dan POLIO 1	persentase bayi usia <12 bulan yang telah menjalankan imunisasi BCG, HBO dan Polio 1 di	Data sekunder dari dinas Kesehatan kota	1. Tren meningkat apabila pencapaiannya melebihi target sebelumnya	Nominal

		bandingkan dengan jumlah bayi keseluruhan yang menjadi target pada tahun itu.	Makassar mengenai Cakupan imunisasi dasar yaitu Hb0, BCG dan polio 1 pada bayi usia 0 – 12 bulan.	2. Tren menurun apabila pencapaiannya penurunann target sebelumnya.	
Variabel dependen					
1.	Pandemi COVID-19	Peristiwa penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2.	Data sekunder dari dinas Kesehatan kota Makassar mengenai angka kejadian COVID-19 tertinggi pada satu puskesmas di setiap kecamatan	Data COVID-19 tertinggi Data COVID-19 terendah	Nominal

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada permasalahan angka cakupan imunisasi dasar lengkap Hb0, BCG dan Polio 1 pada saat pandemi di wilayah kota Makassar.

Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan data sekunder.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

No.	Nama/Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Kharisma Nurul Fazrianti Rusman, Evi Martha. 2021	Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Imunisasi Pada Anak	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan imunisasi anak	<i>narrative literature review.</i>	Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak pandemi covid 19 terhadap pemberian imunisasi dasar.	Perbedaan penelitian terletak pada pengambilan sampel kasus yaitu dengan menggunakan metode <i>narrative literatur review</i>	COVID-19 memberikan dampak khusus terhadap pelayanan imunisasi anak. Pelayanan imunisasi harus tetap diupayakan berjalan dan dilaksanakan sesuai standar
2.	Siti Syamsiah, Risza Choirunnisa, Risza. 2020	Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kunjungan Imunisasi Di Posyandu Desa Tanjungwangi Kecamatan Cijambe	Tujuan umum dari penelitian ini. Untuk mengetahui pengaruh pandemi covid-19 terhadap partisipasi kunjungan imunisasi di posyandu tanjungwangi puskesmas kecamatan cijambe	<i>Cross sectional</i>	Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak pandemi covid 19 terhadap pemberian imunisasi dasar.	Perbedaan penelitian terletak pada kriteria inklusi dan metode penelitian	Tidak ada pengaruh pengetahuan ibu (<i>pvalue</i> = 0,468), sikap ibu (<i>p-value</i> = 0,667), dan dukungan keluarga (<i>p-value</i> = 0,626) terhadap partisipasi ibu dalam kunjungan imunisasi di Posyandu Tanjungwangi, Desa Tanjungwangi, Kecamatan Cijambe Tahun 2020.

3.	Surya Dina Amri, Adik Wibowo. 2022.	Dampak Pandemi Terhadap Kunjungan Posyandu Di Wilaya Kota Solok	Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kunjungan POSYANDU di Wilayah Kerja Puskesmas seKota Solok antara masa sebelum pandemi dengan masa tanggap darurat COVID-19.	kuantitatif dengan data sekunder	Penelitian tersebut menjelaskan tentang dampak pandemi covid 19 terhadap pemberian imunisasi dasar.	Perbedaan penelitian terletak pada pengambilan sampel kasus yaitu dengan menggunakan metode deskriptif	Ditemukan bahwa hampir semua POSYANDU di wilayah kerja Puskesmas se-Kota Solok tidak beroperasi selama Bulan April dan Mei. Dikarenakan pandemi
----	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---	--	---

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1 di Wilayah Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG dan Polio 1 sebelum pandemi COVID-19 pada periode 2019 di wilayah kota Makassar.
- b. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG selama pandemi COVID-19 pada periode 2020 di wilayah kota Makassar.
- c. Mengetahui cakupan imunisasi HBO, BCG dan Polio imunisasi selama pandemi COVID-19 pada periode 2021 di wilayah kota Makassar.
- d. Mengetahui angka kejadian COVID-19 periode 2021 dan 2020 di wilayah kota Makassar.

- e. Menganalisis tren pencapaian angka cakupan imunisasi dasar selama pandemi COVID-19 wilayah kerja puskesmas perkecamatan di kota Makassar.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan Dokter

Sebagai bahan masukan keputakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas.

2. Bagi Praktisi

Menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia Kesehatan mengenaipengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1di Wilayah Kota Makassar.

3. Manfaat bagi peneliti

Menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam penelitian. Juga menerapkan ilmu yang telah di dapatkan di bidang Kesehatan terutama mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan angka cakupan imunisasi Hb0, BCG dan Polio1di Wilayah Kota Makassar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Imunisasi

Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Anak diimunisasi, berarti diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Anak kebal atau resisten terhadap suatu penyakit tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (KEPKN, 2017). Jadi Imunisasi merupakan Tindakan yang dengan sengaja memberikan antigen atau bakteri dari suatu pathogen yang akan menstimulasi sistem imun dan menimbulkan kekebalan, sehingga hanya mengalami gejala ringan apabila terpapar dengan penyakit tertentu.

1. Jenis Imunisasi

Jenis imunisasi berdasarkan sifat penyelenggara di Indonesia. Berikut ini bagan pembagian jenis imunisasi.



Gambar 2.1 Skema Jenis Imunisasi Berdasarkan Sifat Penyelenggara

a. Imunisasi Wajib

Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.

1) Imunisasi Rutin

Imunisasi rutin adalah kegiatan imunisasi yang dilakukan secara terus menerus sesuai dengan jadwal. Imunisasi rutin meliputi vaksinasi primer dan vaksinasi lanjutan. Berikut uraian vaksin imunisasi yang umum, meliputi deskripsi, indikasi, cara pemberian dan dosis, kontraindikasi, efek samping, dan penanganan efek samping.



a) Imunisasi Dasar

Kementerian kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

(1) Vaksin BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)

Vaksin BCG (*Bacillus Calmette Guerin*) merupakan vaksin beku yang mengandung mycobacterium *bovis* hidup yang dilemahkan. Indikasi pemberian vaksin ini adalah untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit *tuberculosis* (KEPKN, 2017). *Tuberculosis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis dimana penyebarannya sangat mudah terutama kepada anak-anak (Rosandali, Aziz and Suharti, 2016). Menurut laporan data penelitian tahun 2007, tingkat anak berusia 12-23 bulan yang menerima vaksinasi BCG secara nasional adalah 86,9%. Sebanyak 14 provinsi memiliki angka vaksinasi BCG pada anak usia 12 - 23 bulan lebih rendah dari angka nasional, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Banten, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua (Depkes, 2008).

Manfaat vaksin BCG adalah untuk mencegah bayi atau anak dari serangan penyakit TB yang serius, seperti meningitis TB dan TB milier (Rivanica et al., 2020). Vaksin BCG diberikan secara viseral pada lengan kanan atas dengan dosis 0,05 ml sekali. Vaksin BCG akan menimbulkan efek samping berupa whey di tempat suntikan 26 minggu setelah vaksinasi. Papula tersebut kemudian membesar dan mengalami ulserasi selama 24 bulan, kemudian perlahan sembuh membentuk jaringan parut dengan diameter 210 mm (KEPKN, 2017).

(2) Vaksin DPT- HB – HIB

Vaksin DTP - Hb - Hib adalah vaksin yang melindungi anak di bawah 5 tahun dari penyakit difteri, tetanus, pertusis, hepatitis B dan Haemophilus influenza tipe B pada anak di bawah 5 tahun. Vaksin ini mulai digunakan pada tahun 2013 di Indonesia. Ketiga vaksin ini dibentuk dalam kombinasi vaksin, yaitu vaksin pentabio. Vaksin DTP HB Hib adalah suspensi homogen yang mengandung difteri murni, tetanus oksida, bakteri tidak aktif, vaksin permukaan murni terhadap infeksi hepatitis B (HbsAg) dan komponen Hib. Vaksin subunit bakteri berupa *Haemophilus influenzae* menular. Kapsul polisakarida B (Hib) terkonjugasi dengan protein detoksifikasi toksoid tetanus (Agustin Kurnia, 2015). Vaksin DTP – HB – Hib biasanya diberikan pada bayi berusia 0–11 bulan. Vaksin harus diberikan secara intramuskular ke dalam antero-paha atas dengan dosis 0,5 ml untuk anak-anak. Kontraindikasi penggunaan vaksin ini adalah pada

anak dengan kejang atau kelainan otak neonatus berat atau kelainan saraf berat (KEPKN, 2017). Penggunaan vaksin ini dikaitkan dengan efek samping lokal dan sistemik yang dapat ditoleransi berupa demam, gelisah, dan nyeri serta kemerahan di tempat suntikan (Sundoro *et al.*, 2014).

(3) Vaksin Hepatitis B

Vaksin hepatitis B menggunakan antigen HbsAg melalui teknologi rekombinan. Vaksin hepatitis B dapat diberikan sebagai formulasi tunggal antigen dan juga dalam kombinasi tetap dengan vaksin lainnya. Vaksin hepatitis B secara aktif dapat menurunkan prevalensi hepatitis B (Ramadhian and Pambudi, 2016). Vaksin hepatitis B mengandung protein HbsAg yang mampu menginduksi respon imun sel inang sehingga terbentuk HbsAg yang mampu memperlambat penempelan virus dan masuknya virus ke dalam sel inang (Rosalina, 2012). Vaksin ini diberikan dengan dosis 0,5 ml atau satu buah HB PID, secara intramuscular. Pemberian dosis sebanyak 3 kali, dosis pertama usia 07 hari dan dosis berikutnya interval minimal 4 minggu. Pemberian dosis ini akan memberikan efek samping berupa reaksi local seperti nyeri, kemerahan dan pembengkakan di sekitar area penyuntikan. Reaksi biasanya ringan dan akan menghilang setelah 2 hari (KEPKN, 2017).

(4) Vaksin Polio Polar (OPV)

OPV sering disebut sebagai vaksin polio sabin, berbentuk trivalent (tOPV) Vaksin poliomyelitis oral merupakan vaksin bivalen yang mengandung suspensi dari tipe 1 dan 3 virus poliomyelitis hidup yang dilemahkan. (Satari, Ibbibah and Utoro,

2017). Berdasarkan Permenkes No. 12 tahun 2017, pemerintah menerapkan pemberian empat dosis Oral Polio Vaccine (OPV) dan satu dosis *Inactivated Polio Vaccine* (IPV) ke dalam jadwal imunisasi rutin pada bayi. Dalam tiga tahun terakhir, cakupan OPV4 telah mencapai lebih dari 90% tetapi, belum memenuhi target nasional. (Kemenkes RI, 2020). OPV diberikan secara oral dalam dosis tunggal (2 tetes) 4 kali dengan interval minimal 4 minggu untuk setiap dosis (KEPKN, 2017).

(5) Vaksin Inactive Polio Vaccine (IPV)

IPV diperkenalkan secara nasional pada tahun 2016 (Kemenkes RI, 2020). Vaksin ini mengandung tiga virus polio tipe liar. Vaksin yang disuntikkan mengaktifkan kekebalan yang dimediasi IgG, menekan viremia, dan melindungi neuron motoric (Satari, Ibbibah and Utoro, 2017).

Itu disuntikkan secara intramuskular atau subkutan dengan dosis 0,5 ml sejak usia 2 bulan, 3 suntikan berturut-turut 0,5 ml harus diberikan satu atau dua bulan terpisah. Penyuntikan IPV akan memberikan efek samping berupa reaksi peradangan local pada lokasi penyuntikan seperti nyeri,

kemerahan, indurasi dan bengkak dalam waktu 48 jam setelah penyuntikan dan dapat bertahan selama satu atau dua hari (KEPKN, 2017).

Bayi yang divaksinasi OPV saja tidak kebal terhadap virus polio difteri, sehingga rentan terhadap infeksi virus polio difteri yang dapat terjadi akibat impor dari masyarakat yang masih menggunakan tOPV. Bayi harus menerima IPV yang mengandung tiga virus polio yang tidak aktif. *Strategic Advisory Group (SAGE)* merekomendasikan setidaknya satu dosis tambahan IPV dalam jadwal imunisasi rutin di negara-negara yang hanya OPV. Imunitas mukosa terhadap virus polio satu dan tiga akan meningkat ketika IPV diberikan pada anak yang telah menerima bOPV, sehingga mempercepat eradikasi polio. Waktu terbaik untuk pengelolaan IPV adalah pemberian DTP3 dan bOPV3 secara bersamaan pada tingkat antibodi polio ibu terendah untuk imunogenisitas optimal (Pediatri, 2016).

(6) Vaksin Campak

Cegah penyakit campak dengan mendapatkan vaksin campak atau vaksin MMR (Meales, Mumps, Rubella). Menurut jadwal rekomendasi IDAI 2004, vaksin campak diberikan pada usia 9 bulan. Setelah itu, suntikan *booster* diberikan pada usia dua tahun (Halim, 2016). Vaksin ini mengandung virus campak yang dilemahkan. Dosis 0,5 ml vaksin campak diberikan secara subkutan ke bisep kiri atau paha kiri, pada usia 911 bulan. Pemberian vaksin akan memberikan efek samping berupa demam ringan dan kemerahan selama tiga hari (KEPKN, 2017).

Dengan adanya program vaksinasi campak, angka kejadian campak per 100.000 penduduk di Indonesia pada periode 2011-2017 cenderung menurun dari 9,2 menjadi 5,6 per 100.000 penduduk. Cakupan vaksin campak cenderung meningkat dari tahun 2008 hingga 2012. Namun trennya menurun dari 99,3% pada tahun 2012 menjadi 89,9% pada tahun 2017 (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

b) Imunisasi Lanjutan

Imunisasi lanjutan adalah imunisasi ulangan untuk mempertahankan tingkat kekebalan atau memperpanjang masa perlindungan. Bayi di bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR). Imunisasi lanjutan diberikan kepada anak usia di bawah tiga tahun (balita), anak sekolah dasar, dan anak wanita subur seperti vaksin DT yang mengandung *toksoid tetanus* dan *toksoid difteri* murni yang di terabsorpsi ke dalam aluminium fosfat, indikasinya untuk pemberian kekebalan stimultan terhadap doferi dan tetanus pada anak-anak. Dianjurkan untuk anak usia di bawah delapan tahun dan vaksin lanjutan kedua yaitu TD yang di indikasi kan untuk imunisasi ulangan terhadap tetanus dan difteri pada individu mulai usia 7 tahun (KEPKN, 2017).

2) Imunisasi Tambahan

Imunisasi tambahan di berikan kepada kelompok umur tertentu yang paling beresiko terkena penyakit sesuai kajian epidemiologis pada periode

waktu tertentu. Yang termasuk dalam kegiatan imunisasi tambahan adalah *Backlog fighting, crash program*, PIN (Pekan Imunisasi Nasional) , Sub- PIN , Catch up campaign campak dan imunisasi dalam penanganan KLB (*Outbreak Response Immunization / ORI*)(KEPKN, 2017).

3) Imunisasi Khusus

Imunisasi yang dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap penyakit tertentu pada situasi tertentu. Seperti persiapan keberangkatan calon Jemaah haji/umrah, persiapan perjalanan menuju negara endemis penyakit tertentu dan kondisi kejadian luar biasa. Jenis imunisasi khusus, antara lain terdiri atas imunisasi Meningitis Meningokokus, Imunisasi Demam Kuning, dan Imunisasi Anti-Rabies(KEPKN, 2017).

b. Imunisasi Pilihan

Imunisasi pilihan adalah imunisasi yang dapat diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka melindungi yang bersangkutan dari penyakit menular tertentu, yaitu vaksin MMR, HiB, Tifoid, Varisela, Hepatitis A, Influenza, Pneumokokus, Rotavirus, Japanese Encephalitis dan HPV(KEPKN, 2017).

2. Jadwal Imunisasi

Jadwal Imunisasi adalah informasi mengenai kapan suatu jenis vaksin atau imunisasi harus diberikan kepada anak. Dalam program imunisasi, pemberian

imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan keseharusan (Nainggolan, T and Indarwati, 2019).

Jadwal Imunisasi Anak Umur 0-18 tahun
Rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Tahun 2020

Imunisasi	Umur																							
	Lahir	Bulan												Tahun										
		1	2	3	4	5	6	9	12	15	18	24	3	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18
Hepatitis B	1		2	3	4									5										
Polio	0	1	2	3									4											
BCG	1 kali																							
DTP		1	2	3								4			5									Td / Tdap
Hib			1	2	3							4												
PCV			1		2		3			4														
Rotavirus		1		2			3 (p)																	
Influenza						1																		Diulang setiap tahun 1 kali
MR / MMR							MR					MR / MMR			MR / MMR									
JE							1						2											
Varisela										2 kali, interval 6 minggu - 3 bulan														
Hepatitis A											2 kali, interval 6 - 36 bulan													
Tifoid												1												Diulang setiap 3 tahun 1 kali
HPV																								2 kali
Dengue																								3 kali, interval 6 bulan

Gambar 2.2 Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 Tahun (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020)

- a. **Vaksin Hepatitis B (HB) monovalen** : sebaiknya diberikan kepada bayi segera setelah lahir sebelum berumur 24 jam, didahului penyuntikan vitamin K1 minimal 30 menit sebelumnya. Bayi dengan berat lahir kurang dari 2000g, imunisasi hepatitis B sebaiknya ditunda sampai berumur 1 bulan atau lebih, kecuali ibu HBsAg positif dan bayi bugar berikan imunisasi HB segera setelah lahir tetapi tidak dihitung sebagai dosis promer. Bayi lahir dari ibu HBsAg positif, segera berikan vaksin HB dan immunoglobulin hepatitis B(HB1g) pada ekstremitas yang berbeda, maksimal dalam 7 hari terakhir setelah lahir.

Imunisasi HB selanjutnya diberikan bersama DTwP atau DTaP (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).

- b. **Vaksin polio 0 (nol)** : sebaiknya diberikan segera setelah lahir. Apabila lahir di fasilitas kesehatan berikan bOPV-0 saat bayi pulang atau pada kunjungan pertama. Selanjutnya berikan bOPV atau IPV bersama DTwP atau DTaP. Vaksin IPV minimal diberikan 2 kali sebelum berumur 1 tahun bersama DTwP atau DTaP (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- c. **Vaksin BCG** : sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau segera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Bila berumur 3 bulan atau lebih, BCG diberikan bila uji tuberculin negative. Bila uji tuberculin tidak tersedia, BCG dapat diberikan. Bila timbul reaksi local cepat pada minggu pertama dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk diagnosis tuberculosis (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- d. **Vaksin DPT** : dapat diberikan mulai umur 6 minggu berupa vaksin DTwP atau DTaP. Vaksin DTaP diberikan pada umur 2,3,4 bulan atau 2,4,6 bulan. Booster pertama diberikan pada umur 18 bulan. Booster berikutnya diberikan pada umur 5-7 tahun atau pada program BIAS kelas 1. Umur 7 tahun atau lebih menggunakan vaksin Td atau Tdap. Booster selanjutnya pada umur 10-18 tahun atau pada program BIAS kelas 5. Booster Td diberikan setiap 10 tahun (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).

- e. **Vaksin pneumokokus (PCV)** : diberikan pada umur 2,4 dan 6 bulan dengan booster pada umur 12 – 15 bulan. Jika belum diberikan pada umur 7-12 bulan, berikan PCV 2 kali dengan jarak 1 bulan dan booster setelah umur 12 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya. Jika belum diberikan pada umur 1-2 tahun, berikan PCV 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan. Jika belum diberikan pada umur 2-5 tahun, PCV10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan, PCV13 diberikan 1 kali (Soedjatmiko *et al.*, 2020).
- f. **Vaksin rotavirus monovalen** : diberikan 2 kali, dosis pertama mulai umur 6 minggu, dosis kedua dengan interval minimal 4 minggu harus selesai pada umur 24 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- g. **Vaksin rotavirus pentavalen** : diberikan 3 kali, dosis pertama 6-12 minggu, dosis kedua dan ketiga dengan interval 4 sampai 10 minggu, harus selesai pada umur 32 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- h. **Vaksin influenza** : diberikan mulai umur 6 bulan, diulang setiap tahun. Pada umur 6 bulan sampai 8 tahun imunisasi pertama 2 dosis dengan interval minimal 4 minggu. Umur > 9 tahun, imunisasi pertama 1 dosis (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
-
- i. **Vaksin MR/MMR** : pada umur 9 bulan berikan vaksin MR. Bisa sampai umur 12 bulan belum mendapat vaksin MR, dapat diberikan MMR. Umur 18 bulan berikan MR atau MMR. Umur 5-7 tahun berikan MR (dalam program BIAS kelas 1) atau MMR (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).

- j. **Vaksin Japanese encephalitis (JE)** : diberikan mulai umur 9 bulan di daerah endemis atau yang akan bepergian ke daerah endemis. Untuk perlindungan jangka panjang dapat diberikan booster 1-2 tahun kemudian (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- k. **Vaksin varisela** : diberikan mulai umur 12-18 bulan. Pada umur 1-12 tahun diberikan 2 dosis dengan interval 6 minggu sampai 3 bulan. Umur 13 tahun atau lebih dengan interval 4 sampai 6 minggu (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- l. **Vaksin hepatitis A** : diberikan 2 dosis mulai umur 1 tahun, dosis ke-2 diberikan 6 bulan sampai 12 bulan kemudian (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- m. **Vaksin tifoid polisakarida** : diberikan mulai umur 2 tahun dan diulang setiap 3 tahun (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
- n. **Vaksin human papilloma virus (HPV)** : diberikan pada anak perempuan umur 9-14 tahun 2 kali dengan jarak 6-15 bulan (atau pada program BIAS kelas 5 dan 6). Umur 15 tahun atau lebih diberikan 3 kali dengan jadwal 0,16 bulan (vaksin bivalen) atau 0,2,6 bulan (vaksin quadrivalent) (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).
-
- o. **Vaksin dengue** : diberikan pada anak umur 9-16 tahun dengan seropositive dengue yang dibuktikan adanya riwayat pernah dirawat dengan diagnosis dengue (pemeriksaan antigen NS-1 dan atau uji serologis IgM/IgG antidengue

positif) atau dibuktikan dengan pemeriksaan serologi IgG anti dengue positif (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020).

3. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)

Kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) adalah suatu kejadian sakit yang terjadi setelah seseorang menerima imunisasi yang diduga disebabkan oleh imunisasi. KIPI diklasifikasikan menjadi empat yaitu, induksi vaksin, provokasi vaksin, kesalahan dan koinsiden. Gejala klinis KIPI dapat dibagi menjadi gejala local dan sistemik serta reaksi lainnya, dapat timbul secara cepat maupun lambat. Pada anak, reaksi KIPI yang berat adalah reaksi anafilaktis. Tatalaksana KIPI terdiri dari penemuan kasus, pelacakan kasus lebih lanjut, analisis kejadian, tidak lanjut dan evaluasi (Hadinegoro, 2016).

4. Imunisasi Dalam Pandangan Islam

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga Kesehatan, yang dalam prakteknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat apabila sedang terkena penyakit, yaitu dengan imunisasi. Salah satu hadist Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ
الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ"

Artinya:

Dari Abu Darda' [diriwayatkan], ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit akan obatnya. Maka hendaklah kamu berobat, tetapi janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram” [HR. Abu Dawud].

Dalil di atas, dapat diambil pengertian bahwa manusia harus senantiasa menjaga diri agar tidak terkena penyakit yang bisa merusak tubuhnya, dan sudah seharusnya berobat jika menderita sakit, sepanjang tidak berobat dengan sesuatu yang haram. Dalam kasus polio, penyakit ini cukup berbahaya bagi manusia. Di sisi lain, vaksin yang merupakan sarana untuk menghindarkan diri dari penyakit yang berbahaya ini, mengandung unsur babi, – yang jelas haram dimakan dagingnya, – meskipun bukan merupakan bahan baku, melainkan sekedar alat (perantara) untuk memisah sel.

Dalam kajian hukum, menghindarkan diri dari penyakit polio merupakan *hajah* (kebutuhan), meskipun harus menggunakan vaksin yang memanfaatkan *enzim tripsin* dari babi. Hal ini sesuai dasar dikeluarkannya fatwa MUI sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

MAKASSA الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْرِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: “Kebutuhan itu menduduki darurat.”

Demikian pula, babi adalah mafsadah, polio juga mafsadah. Menghadapi dua hal yang sama-sama *mafsadah* ini, harus dipertimbangkan mana yang lebih besar madlarat-nya dengan memilih yang lebih ringan

madlarat-nya. Oleh karena itu, dalam rangka membentengi penyakit polio dibolehkan menggunakan vaksin tersebut.

Hal ini sesuai dasar dikeluarkannya fatwa MUI didasarkan pada kaidah ushul fiqih:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُئِيَ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya:

“Apabila bertentangan dua mafsadah, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mafsadahnya.”

Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan *enzim tripsin* dari babi hukumnya adalah mubah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu. Sehubungan dengan itu, kami menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya adalah haram.

Pendapat Imam Al-‘Izz ibn’Abd Al-Salam dalam Kitab “Qawa’id Al-Ahkam” menyatakan bahwa: Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat mengantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.

Pendapat Muhammad Al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya: “berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya”. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ menyatakan bahwa:

Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi’i) berpendapat: sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan -obat dengan benda yang suci- maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari hadist “sesungguhnya allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian”, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut mazhab Syafi’i) berpendapat: dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatanfarmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat - dengan benda najis itu - direkomendasikan oleh dokter muslim. (MUI, 2016)

Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam. Contoh vaksin yang kontroversial di masyarakat adalah vaksin campak-rubela (MR) karena

vaksin tersebut mengandung unsur ilegal babi. Dilihat dari komposisi vaksinnya, campak-rubella (MR) yang beredar mengandung komponen daging babi: gelatin kulit babi dan typecin pankreas babi. Bahan lain yang mungkin bersentuhan dengan babi selama proses pembuatan adalah hidrolisat laktobumin, beberapa di antaranya berasal dari tubuh manusia (sel diploid manusia).

Sejumlah faktor membuat masyarakat tidak menerima vaksin, seperti persepsi keyakinan agama terkait proses produksi vaksin yang mengandung babi dan vaksin yang tidak bersertifikat halal. Menyadari masih tingginya kasus campak dan rubella yang terjadi di Indonesia, fatwa MUI memutuskan bahwa pelaksanaan vaksinasi RR memenuhi kriteria darurat syar`iyyah mengingat kemungkinan bahayanya jika Vaksinasi tidak dilakukan dan tidak ada vaksin yang halal dan tidak ada vaksin lain yang halal. alternatif yang efektif untuk mencegah campak dan rubella. Penggunaan vaksin MR diperbolehkan selama belum ditemukan vaksin yang berstatus hukum halal (Herlina, 2019).

Pada tahun 2016, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4 Vaksinasi adalah penyuntikan (muba) yang pada prinsipnya diperbolehkan sebagai bagian dari upaya untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh manusia dan mencegah terjadinya penyakit, dan vaksin yang digunakan untuk vaksinasi harus dibuat. Adanya informasi dari tenaga medis yang berkompeten dan tervalidasi bahwa tidak ada vaksin yang halal kecuali ada bahan vaksin yang halal dan suci untuk digunakan dalam keadaan darurat (Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Dasar dikeluarkannya fatwa MUI didasarkan pada kaidah ushul fiqh yang mengatakan bahwa “sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat dibatasi sebatas (perlu)” dan firman 'Allah SWT dalam surat QS. Al-Baqarah/2: 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Baqarah/2: 173).

Dalam ayat ini, ada tiga macam benda terlarang yang semuanya berasal dari makhluk hidup, yaitu babi, darah, dan babi. Ditambah dengan syarat bahwa hewan juga menjadi halal jika disembelih tanpa menyebut nama Allah SWT dan ada dua syarat yang mengubah hal yang dilarang menjadi halal, yaitu; Keadaan wajib, tidak mau dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan.

Bangkai yang dimaksud adalah hewan yang hidup dengan cara ilegal, seperti dicekik, dipukul, dilepaskan, dipenggal, dan ditikam. Tapi dia tidak punya waktu untuk dibunuh dan (yang dibunuh untuk berhala). Hewan air (ikan, dll.) dan belalang tidak termasuk dalam definisi bangkai. Darah, yakni darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku, misalnya limpa

& hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang, lemah, & kulitnya(Herlina, 2019)

Binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, artinya bahwa binatang semacam itu baru haram dimakan bila disembelih dalam keadaan menyebut selain nama Allah. Adapun bila tidak disebut namanya, binatang halal yang disembelih demikian, masih dapat ditoleransi untuk dimakan(Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluk sehingga Allah selalu menghendaki kemudahan bagi manusia. Allah tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka dan oleh karena itu larangan di atas dikecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat; Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya(Majelis Ulama Indonesia, 2016).

Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematian; sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal terdapat makan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan selernya. Seding, yang dimaksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah karena Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Herlina, 2019).

Kesimpulan dari ayat ini diambil oleh para ulama sebagai isyarat bahwa seseorang tidak mengalami keadaan darurat, kecuali akibat dari dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini adalah hal yang paling sia-sia yang dipahami oleh Firman. Keputusan yang mengancam jiwa seseorang tidak menyentuh hati orang beriman dan dapat bertahan sampai pertolongan Allah. Uraian tentang makanan haram di atas dihadirkan dalam konteks menyalahkan masyarakat jahiliyah di Mekkah maupun Madinah yang memakannya. Misalnya, hewan mati dapat dimakan tanpa disembelih karena halal manusia menyembelih atau membunuh. Jadi mengapa Allah sendiri yang mengambil nyawanya adalah Haram?

Abu Zahrah mendefinisikan keadaan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu yang dilarang tetapi masih dapat dilakukan untuk kelangsungan hidup atau ketakutan akan kehilangan harta benda atau karena kebutuhan mendesak seseorang yang mengancam jika tidak memeliharanya kecuali melakukan sesuatu yang dilarang, tanpa melanggar hak orang lain (Herlina, 2019).

Ulama Syafi'i Ijma mengatakan bahwa keadaan darurat ini tidak perlu menunggu kematian datang. Mereka juga sepakat bahwa seseorang boleh makan makanan yang diharamkan jika ia takut lapar, atau tidak dapat berjalan atau tidak dapat mengemudi, atau terpisah dari kelompoknya, atau jika seseorang khawatir akan penyakit yang ditakuti, seperti kematian. Dengan kata

lain, disepakati bahwa salah satu tindakan darurat dapat melalui pertimbangan medis atau nasihat ahli (Herlina, 2019).

Ada dua alasan untuk mengizinkan penggunaan vaksin yang awalnya haram jadi mubah . Pertama, penggunaan bahan produksi vaksin yang berasal dari unsur haram (babi) semata-mata karena sampai saat ini belum ada bahan lain yang berasal dari sesuatu yang halal yang dapat menggantikan zat haram dari bahan vaksin. . Kedua, penyediaan vaksin ini sangat sesuai dengan standar kesehatan masyarakat dan diharapkan Indonesia dapat menghilangkan ancaman virus MR. Vaksin tidak diberikan dalam dosis besar, dan diberikan dalam dosis kecil hanya tiga kali untuk profilaksis luas dan jangka Panjang (Herlina, 2019).

B. Pandemi COVID-19

Wabah infeksi virus corona merupakan sindrom pernafasan akut yang parah yang terjadi di Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019 dan menyebar ke seluruh dunia. Pada 12 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menamai penyakit yang disebabkan oleh penyakit coronavirus baru 2019 (covid19). Lebih dari 1,7 juta infeksi COVID-19 baru dan 39,00 kematian baru telah dilaporkan ke WHO. Pada 23 Agustus, penurunan 5% dalam jumlah kasus dan penurunan 12% dalam jumlah kematian. Secara kumulatif, lebih dari 23 juta kasus baru dan 800.000 kematian telah dilaporkan. Asia Tenggara adalah wilayah yang

terkena dampak terburuk kedua dan sekarang menyumbang 28 dari 19 kematian. (WHO, 2020)

Pandemi Covid19 terjadi karena adanya mutase baru dari virus SARSCoV yang menjadi sangat infeksius dan kadar virulen yang tinggi. (Handayani et al., 2020). Berdasarkan data saat ini, SARS coronavirus 2 awalnya ditularkan oleh kelelawar kemudian dituarkan ke manusia melalui trenggiling atau hewan liar lainnya yang dijual di pasar makanan laut Huanan yang kemudian menyebar melalui manusia ke manusia. Gejala klinis dari Covid19 tidak spesifik. Gejala umum termasuk demam, batuk, myalgia, dan kelelahan. Lansia dengan penyakit penyerta akan mengalami gagal napas akibat kerusakan alveolus. Covid19 harus dicurigai pada pasien demam dan gejala saluran pernapasan atas dengan leukopenia atau limfositopenia, terutama yang memiliki riwayat pajanan pasien Covid19 (Shrestha and Shrestha, 2020).

Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Riwayat, riwayat perjalanan, atau riwayat kontak dekat dengan kasus terkonfirmasi atau bekerja di fasilitas medis yang merawat pasien Covid19 atau berada di rumah atau lingkungan yang sama dengan pasien kasus terkonfirmasi. COVID-19 terkonfirmasi dengan gejala klinis dan penyakit penyerta. Gejala klinis yang paling umum sampai saat ini adalah demam (98%), batuk dan myalgia. Tes penunjang dapat dilakukan dalam bentuk rontgen dada dan CT scan dada dengan kontras. Diagnosis definitif atau kasus terkonfirmasi ditentukan berdasarkan hasil tes ekstraksi RNA SARSCoV2 menggunakan RTPCR untuk mengisolasi 2 gen

SARSCoV2 (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, 2020).

Saat ini tidak ada terapi khusus terhadap nCoV 2019 dan obat antivirus lainnya terhadap virus corona. Dalam manajemen kasus harus diterapkan prinsip trinitas, yaitu; Identifikasi dan isolasi pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut yang parah segera dan dengan mempertimbangkan prinsip PPI, pengobatan suportif dan pemantauan pasien, pengembalian spesimen untuk pengujian diagnostik, pengobatan segera obati pasien dengan hipoksemia atau gagal napas dan gagal napas akut. sindrom distres, syok septik, dan kondisi lainnya. pengulas lain (World Health Organization, 2020). Pencegahan terutama meliputi membatasi pergerakan mereka yang berisiko inkubasi, membangun stamina, meningkatkan cuci tangan, menggunakan masker, berolahraga dan cukup istirahat. Tidak ada vaksin primer. Pencegahan sekunder dengan menghentikan pertumbuhan virus segera sehingga virus tidak lagi menjadi sumber infeksi. Saat ini, angka kematian adalah 2%, tetapi jumlah kasus yang parah adalah 10%. Prognosis tergantung pada beratnya penyakit, ada tidaknya penyakit penyerta, dan usia (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, (Erlina Burhan, 2020).

1. Pelayanan Imunisasi Selama Pandemi COVID-19

Imunisasi dasar dan lanjutan masih diselesaikan dan dilaksanakan sesuai jadwal. Layanan vaksinasi selama pandemi COVID-19 dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip

pengecehan dan pengendalian infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 sampai 2 meter. Unit kesehatan harus berkoordinasi dan melobi otoritas setempat dalam pelaksanaan layanan vaksinasi selama pandemi Covid19. Dalam pelaksanaan vaksinasi, langkahlangkah harus diambil untuk memastikan bahwa vaksin sasaran terlindungi dari penyakit berbahaya terkait vaksinasi(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Empat prinsip yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program imunisasi pada anak di masa pandemi COVID-19, yaitu: 1) imunisasi dasar dan lanjutan selalu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terjadwal dengan baik untuk melindungi anak dari PD3I; 2) Secara operasional, pelayanan imunisasi di posyandu, puskesmas, puskesmas keliling dan fasilitas kesehatan lainnya mengikuti kebijakan pemerintah daerah; 3) kegiatan pemantauan PD3I harus dioptimalkan, termasuk pelaporan; 4) Menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter(Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Jika penundaan imunisasi atau vaksinasi diperlukan, staf akan mendaftarkan yang tidak divaksinasi dengan memantau bayi dan balita dengan status imunisasi tidak lengkap atau tidak lengkap (pelacakan default), memastikan segera memberikan vaksin pada kesempatan pertama berikutnya dan merencanakan intervensi dalam bentuk operasi ekstensif, DOFU, BLF sebagai serta program darurat, berdasarkan analisis situasi epidemiologis Covid-19, cakupan vaksinasi rutin dan epidemiologi PD3I. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum

tercapai pelayanan gedung Puskesmas, karena kesulitan dalam pemberian imunisasi kepada pasien puskesmas atau posyandu atau masyarakat skeptis terhadap kontribusinya di kawasan pemukiman karena khawatir dengan penularan Covid-19, maka layanan kesehatan keliling dapat diimplementasikan dalam bentuk *medical center mobile economy*.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan imunisasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi pada masa pandemi Covid19 dan pascapandemi Covid19 dimaksudkan untuk menilai apakah rencana implementasi yang dikembangkan telah dilaksanakan dengan baik dan untuk memastikan program vaksinasi Strain layanan beroperasi sesuai proses yang telah ditetapkan. tindak lanjut yang dapat dilakukan dan dilakukan oleh para vaksinator setelah pandemi Covid19 berakhir (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap

Turunnya angka vaksinasi di Indonesia akibat dampak COVID-19 yang digambarkan dalam data *world health organization* (WHO) Laporan Indonesia bahwa pada Maret-April 2020 dibandingkan Maret-April 2019. Hal ini dikarenakan petugas kesehatan (petugas imunisasi) difokuskan untuk menangani kasus COVID-19. Selain itu, petugas imunisasi juga merasa khawatir terhadap risiko penularan COVID-19 yang bisa terjadi saat melakukan

pelayanan imunisasi. Indonesia juga menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di beberapa daerah menyebabkan aktivitas diluar rumah dibatasi dan sulitnya transportasi ke pelayanan kesehatan.¹⁶ Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes RI, mengatakan bahwa hampir 83,9% layanan kesehatan, utamanya Program Imunisasi terhenti akibat pandemi COVID-19. Di berbagai negara banyak yang melakukan lockdown, sebagai pencegahan penularan COVID-19 dengan memberlakukan physicalsocial distancing yang ketat, isolasi mandiri dan karantina (World Health Organization, 2020). Faktor yang mempengaruhi penurunan pelaksanaan pemberian imunisasi secara rutin sesuai jadwal adalah dengan adanya isolasi mandiri, bayi dikeluarga yang terinfeksi COVID19, terhambatnya distribusi penyediaan vaksin dan akses ke fasilitas kesehatan karena pembatasan sistem transportasi umum (Hungerford and Cunliffe, 2020).

Hingga 80 juta anak di bawah satu tahun berisiko tinggi terkena polio, *tuberculosis*, dan hepatitis akibat layanan imunisasi rutin selama pandemi COVID-19 atau keterlambatan pelaksanaan layanan vaksinasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari GAVI, WHO dan UNICEF, tercatat 60 negara telah menunda kampanye vaksinasinya, terutama terhadap campak dan polio. Ini dapat memicu kejadian abnormal PD3I (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

4. Pandangan Islam Terhadap COVID-19

COVID-19 adalah bagian dari ujian kehidupan, maka penting bagi mereka yang beriman untuk meningkatkan keimanan terhadap firman dan takdir Allah, dan apa yang terjadi pada mereka terkait dengan hukum kausalitas (sebab akibat). (2) Sikap umat Islam dalam menghadapi COVID-19 antara lain: Beberapa sikap yang ditanamkan Islam kepada seluruh umat Islam antara lain: Silakan serahkan masalah Covid ini kepada ahlinya dan berikan informasi apa pun yang Anda yakini benar. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan Allah. Harap baik hati kepada Allah. Upaya pencegahan penyakit dengan mengikuti Tawakkal dan protokol kesehatan. Saat mempraktikkan agama, prioritaskan menyangkal bahaya daripada bahaya. Meningkatkan keyakinan akan keindahan dan kebenaran Islam. Meluangkan waktu untuk bekerja dari rumah menjadikan keluarga sebagai garis pertahanan terakhir. Saling membantu dan memotivasi mereka untuk berkorban demi kepentingan umum. (3) Islam mengajarkan konsep *al-ta'ayusy*, atau hidup berdampingan (bukan damai) dengan COVID-19. Menurut para ahli, wabah korona akan terus ada dalam kehidupan kita, meski roda perekonomian harus terus berputar. Namun, *new normal* harus dikaitkan dengan Macaside Shariah, dan penerapannya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang umumnya sejalan dengan ajaran Islam (Supriatna, 2020).

Islam mengajarkan kepada setiap Muslim bahwa kehidupan di dunia adalah 'daar al-bala' (tempat manusia diuji). Cobaan hidup terkadang disertai dengan keuntungan yang baik, terkadang dengan malapetaka yang buruk. Tiada kehidupan kecuali satu orang bergiliran menerima nikmat atau musibah sebagai ujian hidup. Jadi pengujian adalah kebutuhan hidup, tidak ada sarana pengujian, atau kesuksesan. Kebanyakan orang cenderung memilih untuk diuji kebaikannya, meski sedikit yang menentangnya. Di sisi lain, ujian keburukan tampaknya sangat menakutkan, meski banyak orang telah mengatasinya. Allah SWT berfirman QS. Al-Anabiya/21: 25.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarnya). Dan hanya kepada Kami lah kamu dikembalikan” (QS. Al-Anabiya/21: 25).

Salah satu wujud dari ujian keburukan adalah ujian dengan wabah dan penyakit. Allah berfirman: “Dan sungguh kami akan mengujimu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dalam hal harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang bersabar. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah/2: 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya :

“Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan Kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu” (QS. Al-Baqarah/2: 155).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap terbaik yang harus ditampilkan di saat bencana adalah dengan terus memperkuat ketakwaan, iman, ibadah, dan perbuatan baik yang dilakukan dengan sebaik-baiknya (ihsan), sehingga tidak perlu berpikir untuk mencari, mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain.

Dengan kata lain, cobaan atau bencana adalah cara Tuhan "memanggil" hamba-Nya kembali dan meminta pertolongan-Nya. Lihat apa yang harus dilalui oleh Nabi Ayyub Alayhissalam ketika penyakit mengerikan menyerang. Ayub berdoa dan itu adalah tindakan yang sangat Tuhan kasihi. Ini adalah kunci sukses dalam ujian. Ibnu Qayyim berpendapat tentang shalat yang urutan shalat Nabi Ayyub sangat luar biasa, karena memadukan tauhid dengan ketidakmampuannya sehingga ia sepenuhnya membutuhkan dan hanya mengandalkan Allah SWT. Di sinilah pentingnya menjadi seorang mukmin sekali lagi memperkuat keyakinannya terhadap ketetapan dan takdir Allah. Keyakinan pada takdir mengharuskan setiap Muslim untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Allah sejak zaman dahulu, dan bahwa apa yang terjadi pada manusia terkait dengan hukum sebab akibat (cause and effect). Ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa munculnya penyakit merupakan suatu bentuk eksperimentasi kehidupan sebagai akibat dari perbuatan manusia.

a. COVID-19: penyakit ataukah bala dan azab?

Islam mengajarkan kepada setiap muslim bahwa tatkala Allah mengizinkan sesuatu untuk terjadi, maka sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali di baliknya ada hikmah dan kebaikan. Karenanya, Islam mengajarkan untuk berfikir positif dalam Qur'an. Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah/2 :216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
سَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Allah SWT berfirman: “Boleh jadi dibalik sesuatu yang engkau benci ada kebaikan di sebaliknya, boleh jadi dibalik apa yang engkau senangi ada keburukan yang tersembunyi” (QS. Al-Baqarah/2 :216).

Dalam menafsirkan asal-usul COVID-19 ini ada beragam tafsiran yang dikemukakan:

Pertama, sebagian kalangan meyakini bahwa COVID-19 terbentuk dari kebiasaan mengonsumsi makanan favorit. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kasus pertama COVID-19 terdeteksi di kota Wuhan, China, dan di kota ini ditemukan bahwa sebagian besar warganya cenderung menghabiskan waktu. Menjamu kuliner lain yang sering dianggap ekstrem oleh beberapa .

Kedua, ada orang yang mengaitkan COVID ini dengan teori konspirasi. Dengan kata lain, ada sekelompok orang yang menggunakan COVID-19 sebagai

plot untuk menggunakan senjata biologis untuk memenangkan persaingan menjadi negara adidaya global. Sebagian orang menganggap bahwa COVID-19 adalah senjata biologis China untuk menyerang AS. Dan penyebaran virus corona untuk pertama kalinya di kota Wuhan tidak lepas dari bocornya senjata biologis dari laboratorium pengembangan senjata biologis asli China yang berada di kota Wuhan. Yang lain mencoba menafsirkannya sebagai senjata biologis Amerika untuk memukul ekonomi Cina, yang mencoba menjadi negara adidaya baru untuk menggantikan Amerika. Bahkan ada yang berpendapat bahwa WHO (World Health Organization) tidak sepenuhnya lepas dari tanggung jawabnya dalam menyebarkan virus ini. Secara umum, sebagian besar penjelasan yang diberikan tentang COVID-19 hanya didasarkan pada interpretasi materialis. Bahkan, pendapat dan pandangan agama seringkali diabaikan dalam memahami persoalan ini. Dari sudut pandang Islam, ketika suatu penyakit menular, ada tiga kemungkinan (G/Tsodik *et al.*, 2020)

Pertama, COVID-19 adalah ujian dari Allah untuk manusia Kedua, COVID-19 adalah hukuman dari Allah SWT untuk manusia Ketiga, Covid 19 adalah rahmat dari Allah SWT untuk manusia. Maka manusia sebagai hamba Tuhan harus menjadikan kehadiran virus ini tepat waktu untuk merenung dan mengoreksi dirinya sendiri. Apakah selama ini ada perilaku menyimpang atau sudahkah kita melakukan sesuatu yang benar? Bagi yang masih berbuat maksiat, tentu COVID-19 adalah hukuman Allah bagi mereka. Oleh karena itu, perlu untuk meminta pengampunan darinya agar dia bisa menjauh dari nasib ini. Namun bagi

mereka yang telah berbuat baik dan benar selama ini, ini jelas bukan hukuman melainkan ujian baginya(G/Tsadik *et al.*, 2020)

Jika manusia menjalani ujian penyakit, mendekatkan diri kepada-Nya dan menyebut nama Allah SWT semakin banyak, maka covid 19 ini memang akan menjadi berkah dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Seorang Muslim seharusnya tidak hanya fokus pada interpretasi materialis, tetapi mengubah bencana ini menjadi momen refleksi dan refleksi diri. Disinilah kita bisa mengecek apakah COVID-19 itu momok atau hukuman dari Allah SWT. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa penyakit mendingan umat Islam yang membuat seseorang menjadi mangsa orang lain adalah orang yang terlalu mencintai dunia dan sangat membenci kematian. Datangnya COVID-19 menunjukkan betapa lemah dan mudahnya masyarakat ini bubar. Semua orang lari karena takut mati. Di sinilah menariknya, kata wuhan dekat dengan kata wuhan, nama kota yang pertama kali muncul virus ini. Salah satu pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari keberadaan COVID-19 adalah bahwa yang paling ditakuti oleh orang beriman bukanlah COVID-19, tetapi yang paling ditakuti jika Allah berpaling dan meninggalkan pekerjaan, lindungilah kita dari mara bahaya. Jika kita menaati aturan Allah SWT, Allah SWT berjanji akan menjaga kita.

Kajian ilmiah tentang Islam juga diberikan oleh Profesor Syekh.. Dr. 'Abdurrazzaq bin 'Abdil Muhsin Al-'Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M Dimana orang banyak membicarakan tentang bahaya dan bahaya

yang ditimbulkan oleh virus ini. Mereka juga berbicara tentang cara menghindari dan bertahan dari virus. Dia kemudian menjelaskan petunjuk Al-Qur'an dan sarana yang dapat menjelaskan jalan seorang mukmin untuk menghadapi masalah tersebut. Di antara petunjuk indah Al-Qur'an adalah bahwa seorang hamba tidak akan terpengaruh oleh bencana apa pun kecuali Allah telah menulis dan menentukan bencana itu. Allah SWT. berbicara pada (QS. At-Taubah/9: 51).

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman” (QS. At-Taubah/9: 51).

Allah SWT berfirman mengenai musibah yang menimpa seseorang adalah perbuatan dari manusia itu sendiri. Dijelaskan pada QS. At-Thaghabun/64: 11.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, akan Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya” (QS. At-Thaghabun/64: 11).

Allah SWT. juga berfirman QS. Al-Hadid/57: 22.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala.” (QS. Al-Hadid/57: 22).

Maka tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba kecuali apa yang telah dituliskan Allah kepadanya. Maka sungguh, seorang hamba sangat membutuhkan dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwa apapun yang tertulis harus terjadi. Dan apa yang terjadi pada seorang hamba tidak akan luput darinya dan apa yang terjadi pada seorang hamba tidak akan terjadi padanya dan apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Ketika manusia saat ini dihadapkan pada masalah lingkungan, muncul pertanyaan mengapa agama-agama besar dunia ini, dengan ajaran moral dan biologisnya, sangat sedikit atau tidak berperan dalam memecahkannya. Namun, jika kita perhatikan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, kita akan melihat bahwa penyebab utamanya terletak pada materialisme yang melingkupi dunia saat ini. Umat manusia berebut untuk mendapatkan kesenangan material sebanyak mungkin(Supriatna, 2020).

Mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan-segan menebang pohon di hutan, menangkap ikan di laut sebanyak-banyaknya, termasuk benihnya,

menyedot semua mineral yang ada di dalam tanah, dan membuang sampah ke air dan tanah. . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada atau kurang perhatian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, padahal 15 abad yang lalu ayat-ayat Al-Qur'an memperingatkan manusia tentang kerusakan yang terjadi di darat dan di laut akibat ulah manusia. Hari ini, apa yang dikatakan Alquran sudah jelas. Masalah lingkungan muncul, karena keserakahan manusia akan material. Jadi Penyakit Virus Corona COVID-19 Menurut Islam , kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan terancam oleh ulah manusia tanpa disadari, demikian semoga Allah SWT memperingatkan kita untuk selalu mengingat Allah SWT(G/Tsadik *et al.*, 2020).

b. Sikap muslim dalam menghadapi COVID-19?

COVID-19 adalah bagian dari ujian keimanan bagi setiap muslim, maka untuk menghadapinya dibutuhkan sikap yang tepat agar tantangan ini dapat dimanfaatkan menjadi peluang yang berharga. Adapun sikap yang di anjurkan islam bagi setiap manusia antara lain:

- 1) Jangan memperparah masalah COVID-19 dengan memberikan pernyataan dan pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan berbagi informasi validitas dan akurasi. Allah berfirman: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan bertanggung jawab.

- 2) Merujuk masalah COVID-19 ini kepada para ahli untuk memberikan informasi yang diyakini akurat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui perbedaan antara pekerjaan agama dan pekerjaan duniawi.
 - 3) Sabar dan tabah dalam menghadapi ujian Allah. Kata sabar memiliki makna yang dalam, karena kata sabar selalu bersahabat dengan ketulusan. Klise untuk mengatakannya. Namun, fitur ini memang sangat sulit untuk dipraktikkan di kehidupan nyata.
 - 4) Berbuat baiklah kepada Tuhan. Nabi (damai dan berkah Allah besertanya)
 - 5) Tawakkal serta ikhtiyar menghindar dari penyakit dengan mengikuti protokol kesehatan. Berserah diri dan Tawakal tanpa disertai dengan ikhtiar adalah nol besar.
 - 6) Diantaranya adalah memakai masker setiap ingin berpergian, rutin mencuci tangan ketika setelah menyentuh permukaan benda, menjaga jarak, juga protokol dalam kegiatan beribadah di tempat umum dll. Penetapan protokol kesehatan tersebut hendaknya jangan dijadikan sebagai anggapan bahwa ada penghalangan dalam beraktivitas terutama dalam beribadah, kita harus menyadari bahwa penerbitan protokol kesehatan sejatinya adalah suatu ikhtiar demi kemaslahatan bersama.
-
- 7) Menetapkan prioritas dalam menjalankan agama bahwa menolak kemudharatan didahulukan dibandingkan mendatangkan kemashlahatan. Wabah COVID-19 memberikan indikator kuat, betapa beragama itu fleksibel,

tidak kaku. Lebih mendahulukan menghindari petaka, daripada mendatangkan manfaat/ maslahat.


- 8) Menambah keyakinan akan keindahan dan kebenaran islam. Apa yang dianjurkan dalam protokol kesehatan sejalan dengan apa yang islam ajarkan kepada para pengikutnya, seperti pentingnya menjaga kebersihan. Allah menyukai para hamba-Nya yang menjaga kebersihan dan kesehatan.
- 9) Menjadikan waktu bekerja di rumah sebagai momen menjadikan keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir. Keberhasilan pemerintah dalam menekan dampak pandemi COVID-19, tidak hanya memberlakukan kebijakan-kebijakan tetapi intinya bagaimana kebijakan tersebut bisa dijalankan dengan baik oleh semua pihak, khususnya keluarga yang menjadi sentral utama dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut.
- 10) Saling membantu sesama dan meningkatkan semangat berkorban demi kepentingan umum. Berbagi kepada mereka yang membutuhkan bukan hanya berbentuk materi, namun bisa bermacam-macam bentuknya mulai dari berbagi makanan, kebutuhan sehari-hari, ilmu dan lain sebagainya (G/Tsadik *et al.*, 2020).

Kesimpulannya adalah penjelasan yang diuraikan dengan segala informasi yang hilang yang tersedia bagi peneliti, dapat disimpulkan bahwa Covid-19 di mata umat Islam adalah peristiwa pandemi dari epidemi virus yang menular, seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dan teman-temannya bernama


Tho'un. Meskipun masih kontroversi di kalangan ulama tentang penyebutan Tho'un untuk COVID-19, faktanya wabah COVID-19 ini sangat mirip dengan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. dan kawan kawan. Akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dari sudut pandang Islam, pandemi COVID-19 adalah ujian dari Allah SWT. Kepada umat manusia, agar manusia dapat mengingat bahwa Allah SWT. Mahakuasa atas segala sesuatu yang menyangkut dunia ini. Sebagai manusia biasa yang tidak berdaya dan tidak berusaha, tentunya kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga wabah covid-19 segera berakhir.






C. Kerangka Teori



D. Kerangka Konsep



-  → Variabel dependen
-  → Variabel tidak diteliti
-  → Variabel independen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian observasional analitik ini yaitu peneliti diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan dan situasi. Penelitian mencoba mencari tahu pengaruh pandemi COVID-19 dengan tren penurunan angka cakupan imunisasi HB0, BCG dan polio 1 di wilayah kota Makassar dengan pendekatan *cross-sectional* . Data yang di gunakan adalah data sekunder dengan pengambilan data angka COVID-19 dan angka cakupan imunisasi HBO, BCG dan POLIO 1 di Dinas Kesehatan Kota Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dinas Kesehatan Kota Makassar bagian pencegahan dan pengendalian penyakit. Jl. Teduh Bersinar No.1, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli – Agustus tahun 2022

C. Populasi dan Tabel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang berusia 0-12 bulan yang tercatat di Dinas Kesehatan Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang di ambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling yaitu mengambil setiap sampel dalam data COVID-19 dan angka cakupan imunisasi. Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang di ambil melalui prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.

E. Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan pengambilan data angka COVID-19 paling tertinggi dan terendah untuk disandingkan dengan data imunisasi angka cakupan. angka Data cakupan imunisasi dikelolah untuk membedakan data sebelum pandemi periode 2019 dan selama pandemi COVID-19 periode 2020 dan 2021. Sementara data puskesmas yang mewakili perkaecamatan untuk mengidentifikasi perubahan angka cakupan berdasarkan wilayah perkecamatan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan pengambilan data COVID-19 yang tertinggi dan

terendah. Data imunisasi angka cakupan. Data cakupan angka yang di ambil oleh data sekunder di dinas Kesehatan berdasarkan klaster perkecamatan dengan mengambil 1 puskesmas perkecamatan jadi total ada 15 puskesmas . Di wilayah kota Makassar terdapat 15 kecamatan dan 47 puskesmas.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengendalian Data (*Editing*)

Pengeditan adalah suatu pemeriksaan atau koreksi data yang telah terkumpul. Data – data yang terkumpul yang tidak memenuhi syarat dapat dilengkapi kekurangan atau membuat data yang tidak memenuhi syarat.

2. Coding dan Transformasi Data

Coding (pengkodean data) adalah pemberian kode kode tertentu pada tiap – tiap data. Kode adalah *symbol* seperti angka atau huruf untuk memberikan identitas data. Hal ini bertujuan agar lebih mudah mengelola data. Kuantikasi atau transformasi data dapat dilakukan dengan memberikan skor terdapat setiap jenis data.

3. Tabulasi Data


Tabulasi adalah proses mendapatkan data yang di dalam bentuk table — dengan cara membuat tabel atau yang berisi data sesuai dengan data yang akan analisis.

H. Analisis Data

Digunakan aplikasi *computer* berupa program SPSS (*Statistical Package for the Social Science*), dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel independen yaitu angka cakupan imunisasi HB0, BCG dan polio 1. Analisis pengaruh menggunakan uji regresi linier sederhana, Penelitian ini menggunakan data perbedaan angka cakupan diidentifikasi berdasarkan periode waktu, pembagian wilayah puskesmas di wilayah kota Makassar.



I. Alur Penelitian



J. Etika Penelitian

1. Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam melakukan penelitian ini ada hal-hal yang berhubungan dengan etika penelitian, yaitu:
2. Membuat surat pengantar yang ditunjukkan kepada pihak atau instansi sebagai permohonan izin untuk melaksanakan penelitian.
3. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait sesuai dengan manfaat yang telah disebutkan sebelumnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Analisis Univariat

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan menggunakan desain penelitian analitik *cross-sectional*. Pengambilan data dilakukan dengan cara menngambil data di Dinas Kesehatan Kota Makassar. Untuk mendapatkan hasil cakupan untuk imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 (Gambar 1-3), jumlah anak yang mendapatkan imunisasi tersebut dibagi dengan jumlah bayi baru lahir. Hal ini disebabkan karena ketiga imunisasi tersebut diberikan pada bayi baru lahir sampai dengan usia 1 bulan. Dalam penelitian ini, selisih angka cakupan dapat dihitung dengan mengurangi angka cakupan imunisasi di tahun 2021 dengan tahun 2020 dan di tahun 2020 dengan tahun 2019

Berdasarkan ketentuan Kemenkes RI, target cakupan imunisasi pertahun adalah minimal 95% dengan setiap bulannya minimal meningkat sebanyak 7,9%. Sehingga, target cakupan imunisasi minimal untuk bulan Januari 7,9%, Februari 15,8%, Maret 23,7%, April 31,6%, Mei 39,5%, Juni 47,4%, Juli 55,3%, dan Agustus 63,2%,
September 71,1%, Oktober 79%, November 86,9%, dan Desember 94,8%. Pada penelitian ini, data diambil dari bulan Januari hingga Desember untuk melihat perkembangan angka cakupan setiap bulannya, kemudian menilai cakupan imunisasi

pada periode bulan yang sama di tahun yang berbeda. serta, batas periode selama wabah COVID-19 pada penelitian ini adalah pada bulan Januari-Desember 2020.


4.1.1 Angka Cakupan Imunisasi HBO Kota Makassar di Bulan Januari-Desember Periode Tahun 2019,2020 dan 2021



Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Selisih (%) 2020-2019	30,90%	1,30%	1,70%	8,50%	0,60%	0,40%	0,20%	-0,30%	0,20%	- 0,40%	-0,50%	0,40%
Selisih (%) 2021-2020	-30,60%	- 1,20%	- 1,10%	- 7,30%	1,20%	0,70%	0,10%	-0,50%	-1,90%	- 2,20%	-2,60%	- 3,30%

Menurut (Gambar 1), angka cakupan imunisasi hepatitis B (HBO) pada tahun 2019, angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Agustus 2019, namun pada bulan September-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun


2020, angka cakupan imunisasi HB0 mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan April 2020, namun pada bulan Mei-Agustus angka cakupan tidak mencapai target, tapi pada bulan September hingga bulan Desember angka cakupan imunisasi mencapai target kembali. Sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan imunisasi HB0 tidak mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021.



Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Selisih (%) 2020-2019	-0,10%	-0,80%	-1,90%	-4,20%	-5,30%	-6,40%	-7,20%	-6,50%	-4,10%	-11,20%	-2,00%	-1,80%
Selisih (%) 2021-2020	-0,20%	0,10%	1,30%	4,10%	5,90%	6,10%	5,40%	3,20%	-0,30%	-0,10%	-1,20%	-1,50%

Gambar 2. Grafik garis imunisasi BCG berdasarkan periode waktu (Tahun 2019, 2020 dan 2021, target cakupan imunisasi, dan selisih angka cakupan imunisasi pada tahun 2019,2020 dan 2021)

Berdasarkan (Gambar 2), angka cakupan imunisasi BCG pada tahun 2019, angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Juni 2019, namun pada bulan Juli-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun 2020, angka cakupan imunisasi BCG tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan Oktober 2020, dan hanya pada bulan November-Desember 2020 angka cakupan mencapai target, sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan imunisasi BCG tidak mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021.



Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Selisih (%) 2020-2019	-0,10%	-0,50%	-2,10%	-4,40%	-5,40%	-6,60%	-7,70%	-7,10%	-4,50%	-3,50%	-2,70%	-2,50%
Selisih (%) 2021-2020	-0,30%	-0,70%	1,00%	3,80%	5,40%	5,10%	4,70%	2,60%	-0,90%	-0,80%	-1,70%	-1,80%

Gambar 3. Grafik garis imunisasi Polio 1 berdasarkan periode waktu (Tahun 2019, 2020 dan 2021, target cakupan imunisasi, dan selisih angka cakupan imunisasi pada tahun 2019,2020 dan 2021)

Berdasarkan (Gambar 3), angka cakupan imunisasi Polio 1 pada tahun 2019, angka cakupan tidak mencapai target pada bulan Januari-Juni 2019, namun pada bulan Juli-Desember target cakupan imunisasi telah tercapai. Pada tahun 2020, angka cakupan imunisasi Polio 1 tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan Oktober 2020, dan hanya pada bulan November-Desember 2020 angka cakupan mencapai target, sedangkan pada tahun 2021, angka cakupan imunisasi Polio 1 tidak mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021.

4.1.2 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi Berdasarkan Pembagian Wilayah Puskesmas kota Makassar






Gambar 4. Grafik batang angka cakupan imunisasi HB0 berdasarkan pembagian wilayah puskesmas kota Makassar pada tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imunisasi pada tahun (2020-2019), (2021-2020).

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi HB0 di tahun 2019, 2020 dan 2021 (Gambar 4), di beberapa wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan imunisasi HB0 di tahun 2020 kecuali di puskesmas Kaluku Badoa (10,2%), Andalas (8,1%), Makasau (1,1%), Tamalate (6,6%), Kassi-kassi (1,8%), Sudiang raya (4%) dan Tamalanrea (4,1%). Sementara itu wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2020. Pada tahun 2021 wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan imunisasi HB0 di tahun 2021 kecuali di puskesmas Tamalate (7,2%), Batua (8,7%) dan Antang


(1%) dan wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2021.



Gambar 5. Grafik batang angka cakupan imunisasi BCG berdasarkan pembagian wilayah puskesmas kota Makassar pada tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imunisasi pada tahun (2020-2019), (2021-2020).

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi BCG di tahun 2019, 2020 dan 2021 (Gambar 5), di beberapa wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan imunisasi BCG di tahun 2020 kecuali di puskesmas Andalas (1,8%), Makasau (8,7%), Panambung (3%), Tamalate (8,8%), dan Sudiang raya (1,5%). Sementara itu wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2020. Pada tahun 2021 wilayah puskesmas kota Makassar mengalami penurunan angka cakupan

imunisasi BCG di tahun 2021 kecuali di puskesmas Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya (17,1%), Tamalate (5%) dan Antang (7,1 %) . Sementara wilayah puskesmas lain mengalami penurunan angka cakupan imunisasi di tahun 2021




Gambar 6. Grafik batang angka cakupan imunisasi Polio 1 berdasarkan pembagian wilayah puskesmas kota Makassar pada tahun 2019, 2020, 2021 serta selisih angka cakupan imuniasi pada tahun (2020-2019), (2021-2020).

Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi Polio 1 di tahun 2019, 2020 dan 2021 (Gambar 6), di beberapa puskesmas wilayah kota Makassar Berdasarkan grafik batang selisih angka cakupan imunisasi Polio 1 di tahun 2019, 2020 dan 2021 (Gambar 6), di beberapa puskesmas wilayah kota Makassar Pada tahun 2019 angka cakupan hampir di seluruh perwakilan puskesmas mencapai target kecuali

puskesmas antang perumnas 65%, puskesmas tabaringan 93%, puskesmas karlod 89% puskesmas penabung 94%) dan puskesmas tamalanrea . Sedangkan pada tahun 2020 hamper seluruh puskesmas mengalami penurunan cakupan imunisasi . Hanya ada 2 puskesmas yang mecapai target yaitu puskesmas P. kodingarreng sudiang saya. Pada tahun 2021 juga mengalami penurunan cakupan imunisasi lebih rendah dari tahun 2020. pada tahun 2022 hanya ada 2 puskesmas yang mencapai target yaitu puskesmas bara- barayya dan puskesmas tamalate. Selisih antara tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami tren penuruan Karena jumlah cakupan sebelumnya lebih kurang dari 2019. begitupun di tahun 2021 ke 2020.

4.1.3 Peerbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Sebelum Pandemi COVID-19 Tahun 2019


Analisis Pencapaian angka cakupan imunisasi HBO,BCG,Polio 1 Sebelum Pandemi Covid 19 Tahun 2019



Gambar 7. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Sebelum Pandemi COVID-19 Tahun 2019

Berdasarkan grafik batang perbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 (Gambar 7) dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi hanya dua Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi yaitu Puskesmas Kaluku Badoa (90,66%) dan Puskesmas Tamalate (91,20%). Adapun Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi.

4.1.4 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2020




Gambar 8. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Berdasarkan grafik batang perbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2020 (Gambar 8) dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi terdapat empat Puskesmas yang tidak mencapai target

imunisasi yaitu Puskesmas Tabaringan (93,50%) dengan jumlah kasus COVID-19 (7%) kasus, Puskesmas Kalulu Badoa (92,60%) dengan jumlah kasus COVID-19 (26,40%) kasus, Puskesmas Layang (94,20%) dengan jumlah kasus COVID-19 (15,00%) kasus dan Puskesmas Batua (70,90%) dengan jumlah kasus COVID-19 (35,40%) kasus. Adapun Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi.

4.1.6 Perbedaan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2021



Gambar 9. Grafik batang Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 Selama Pandemi COVID-19 Tahun 2021

Berdasarkan grafik batang perbedaan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2021 (Gambar 9) dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi terdapat delapan Puskesmas yang tidak mencapai target

imunisasi yaitu Puskesmas Tabaringan (84,16%) dengan jumlah kasus COVID-19 sebanyak (51,10%) kasus, Puskesmas Layang (64,33%) dengan jumlah kasus COVID-19 (68,20%) kasus, Puskesmas Makkasau (90,66%) dengan jumlah kasus covid -19 (133,30%) kasus, Puskesmas Tamalate (93.33%) dengan jumlah kasus COVID -19 (72,00%) kasus, Puskesmas Batua (84,66%) dengan jumlah kasus COVID-19 (38,00%) kasus, Puskesmas Tamalate (76%) dengan jumlah kasus COVID -19 (138,30%) kasus, Puskesmas Sudiang Raya (91%) dengan jumlah kasus COVID -19 (134,60%) kasus, dan Puskesmas Tamalanrea (88,33%) dengan jumlah kasus COVID -19 (189,60%) kasus, Adapun tujuh Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi.

Tabel 4.1 Distribusi cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 pada pandemi Covid-19 di Wilayah Kota Makassar Tahun 2019

No.	Nama Puskesmas	Cakupan Imunisasi		
		HB0 (bayi)	BCG (bayi)	Polio 1 (bayi)
1.	Tabaringan	386	386	386
2.	Pulau Kodingarreg	83	83	83
3.	Kaluku Bodoa	1374	1368	1370
4.	Layang	635	625	645
5.	Andalas	313	310	311
6.	Makkasau	509	505	545
7.	Cenderawasih	785	815	815
8.	Panambungan	386	386	386
9.	Tamalate	1050	1060	1054
10.	Kassi- Kassi	1574	1630	1630
11.	Batua	1118	1105	1103
12.	Antang Perumnas	398	282	273
13.	Tamalanrea	693	706	706

14.	Sudiang Raya	958	958	958
15.	Bara-Barayya	712	755	755
Jumlah				

2. Analisis Bivariat

Tabel 4.4 Pengaruh pandemi COVID-19 pandemi Covid-19 terhadap cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 di Wilayah Kota Makassar 2020

No.	Nama Puskesmas	Cakupan Imunisasi			Data Covid-19
		HB0	BCG	Polio 1	
1.	Tabaringan	280	281	89	70
2.	Pulau Kodingarreng	87	89	1341	16
3.	Kaluku Bodoa	1289	1341	604	264
4.	Layang	584	602	274	150
5.	Andalas	285	283	572	120
6.	Makkasau	507	544	803	203
7.	Cenderawasih	777	803	373	199
8.	Panambungan	375	373	1041	168
9.	Tamalate	1179	1041	1522	264
10.	Kassi- Kassi	1530	1523	1045	567
11.	Batua	1054	1045	246	354
12.	Antang Perumnas	397	246	712	199
13.	Tamalanrea	717	712	970	298
14.	Sudiang Raya	1028	970	752	165
15.	Bara-Barayya	756	752	89	198
Nilai p-value		0,000	0,000	0,000	
Nilai R		0,826	0,818	0,818	

Hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel 4.4 pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di wilayah kota Makassar tahun 2020 di dapatkan hasil uji regresi linear dengan nilai p-value 0,000 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, R 0,826 BCG R 0,818, dan Polio 1 0,818 pada tahun dan 2021. Nilai koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar, BCG, , Polio 1 R . hal ini menunjukkan bahwa

secara memiliki pengaruh pandemi COVID-19 terhadap imunisasi HB0 82,6 % BCG 81,8% dan Polio 1 81,8%.

Tabel 4.5 Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 di Wilayah Kota Makassar 2021

No.	Nama Puskesmas	Cakupan Imunisasi			Data Covid-19
		HB0	Polio 1	BCG	
1.	Tabaringan	233	233	233	511
2.	Pulau Kodingarreng	86	94	94	19
3.	Kaluku Bodoa	1379	1314	1314	1052
4.	Layang	393	403	403	682
5.	Andalas	284	283	283	751
6.	Makkasau	507	514	514	1333
7.	Cenderawasih	736	764	764	1027
8.	Panambungan	377	367	367	720
9.	Tamalate	1161	1159	1159	1916
10.	Kassi- Kassi	1532	1520	1520	3800
11.	Batua	1152	1187	1081	2100
12.	Antang Perumnas	412	284	286	1383
13.	Tamalanrea	633	647	647	1896
14.	Sudiang Raya	992	909	926	1346
15.	Bara-Barayya	729	883	901	844
Nilai <i>p-value</i>		0,001	0,002	0,001	
Nilai <i>R</i>		0,762	0,742	0,747	

Hasil dari penelitian ini berdasarkan tabel 4.5 pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di wilayah kota Makassar tahun 2020 di dapatkan hasil uji regresi linear dengan nilai *p-value* 0,001 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 pada tahun 2020 dan 2021. Nilai koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar *R* 0,762, BCG, *R* 0,742, Polio 1 *R* 0,747 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh terhadap pandemi COVID-19 dengan imunisasi HB0 76,2 %, BCG 74,2% dan Polio 1 74,7%.

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan di 15 Puskesmas Kota Makassar menunjukkan adanya dampak wabah COVID-19 terhadap angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di Puskesmas Kota Makassar. Hal ini ditunjukkan dalam grafik garis, dimana angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 menurun di tahun 2020 dan 2021 yang pada tahun 2019 hanya terdapat 2 Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi menjadi 4 Puskesmas di tahun 2020 (Gambar 8) dan terlihat drastis pada tahun 2021 (Gambar 9) menjadi 8 Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira (2020) dengan judul “Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Angka Cakupan Imunisasi Dasar di Provinsi Sumatera Selatan” dengan hasil terdapat penurunan angka cakupan imunisasi dasar lengkap di tahun 2020 semenjak bulan Januari sebesar 0,6%. Namun setelah kasus COVID-19 dikonfirmasi terdapat di Provinsi Sumatera Selatan, penurunan angka cakupan semakin meningkat, penurunan tertinggi terjadi pada bulan April dan Mei 2020.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ziad Mansour dkk (2021) dengan judul “Impact of COVID-19 Pandemic on The Utilization of Routine Immunization Service in Lebanon bahwa pelauanan imunisasi mengalami penurunan sebesar 30%. Di sektor swasta, penyediaan layanan imunisasi berkurang 46,9% terutama antara Februari dan April 2020. Tingkat penurunan tertinggi diamati. Jumlah dosis vaksin yang diberikan di sektor publik turun 20%. Penurunan paling

menonjol terdeteksi untuk vaksin OPV dan campak, dan selama Oktober 2019 dan Maret 2020.

Angka cakupan imunisasi yang turun drastis pada tahun 2021 disebabkan karena pada periode tersebut merupakan periode wabah COVID-19 masih tergolong tinggi di Kota Makassar. Berdasarkan (Gambar 4-6), Di 15 Puskesmas mengalami penurunan angka cakupan HB0, BCG, dan Polio 1 di tahun 2021 kecuali di puskesmas Tamalate (7,2%), Batua (8,7%) dan Antang (1%) untuk imunisasi HB0, Puskesmas Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya (17,1%), Tamalate (5%) dan Antang (7,1 %) untuk imunisasi BCG dan puskesmas Kaluku Badoa (7,3%), Bara-baraya (22,2%), Tamalate (5%) dan Batua (3,5 %) untuk Imunisasi Polio 1.

Penurunan ini dapat dilihat di (Gambar 7-9) pada tahun 2019 sebelum periode Pandemi COVID-19 hanya terdapat 2 Puskesmas yang tidak memenuhi target imunisasi menjadi 4 Puskesmas yang tidak memenuhi target di tahun 2020 saat periode wabah COVID-19, keempat Puskesmas tersebut memiliki kasus COVID-19 diatas 100 kasus yaitu Puskesmas Tabaringan 370 kasus, Puskesmas Kaluku Badoa 264 kasus, Puskesmas Layang 150 kasus dan Puskesmas Batua 354 kasus.

Pada tahun 2021 terdapat 8 Puskesmas yang tidak memenuhi target imunisasi dengan kasus COVID-19 diatas 500 kasus yaitu Puskesmas Tabaringan 511 kasus, Puskesmas Layang 682 kasus, Puskesmas Makkasau 1333 kasus, Puskesmas Tamalate 720 kasus, Puskesmas Batua (84,66%) 3800 kasus, Puskesmas Tamalate 1383 kasus, Puskesmas Sudiang Raya 1346 kasus, dan Puskesmas Tamalanrea 1896 kasus.

Cakupan imunisasi menurun ini dapat pula disebabkan karena pelayanan kesehatan di masa wabah COVID19 terfokus pada pencegahan transmisi serta penanganan kasus COVID-19, ditambah dengan penerapan sistem “lockdown” yang menyebabkan pelayanan kesehatan rutin seperti imunisasi menjadi terganggu, selain itu pula ibu khawatir dan enggan untuk membawa anaknya ke posyandu atau pusat kesehatan lainnya untuk mendapatkan imunisasi (Felicia dan Suarca, 2020).

Masa pandemi COVID-19 hendaknya tidak menyurutkan semangat tenaga kesehatan untuk tetap mengaungkan pentingnya imunisasi dan tetap memastikan setiap anak terlindungi dari penyakit berbahaya dengan imunisasi. Imunisasi tetap harus diupayakan lengkap sesuai jadwal untuk melindungi anak dari PD3I dan pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat (Yaazia dkk, 2020).

Pelayanan imunisasi dilakukan sesuai prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1-2 meter. Sektor kesehatan harus berkoordinasi dan mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan imunisasi selama pandemi COVID-19. Selain itu, petugas kesehatan diharapkan dapat memantau status vaksinasi masing-masing sasaran di wilayah kerjanya. Namun, masih ada daerah dengan jumlah kasus tinggi terjadi penarikan sementara posyandu di beberapa Puskesmas di wilayah kota Makassar. Ada yang tetap melakukan kegiatan Posyandu, namun ada pula orang tua bayi yang tidak berani membawa anaknya ke Posyandu karena takut terkena COVID-19, PSBB dan *lockdown* (Felicia and Suarca, 2020).

4.1.7 Program Imunisasi Selama Pandemi COVID-19

Dengan adanya pandemi COVID-19, Pelaksanaan program imunisasi menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk menyasati hal itu, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi pada masa Pandemi COVID-19. Didalamnya berisi mekanisme pelayanan imunisasi, tata cara pelaporan, manajemen dan logistik vaksin di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. (Kemenkes, 2020)

Terdapat empat prinsip yang dijadikan acuan untuk pelayanan imunisasi di masa pandemi ini yaitu mengutamakan pelaksanaan imunisasi dasar dan lanjutan untuk anak agar terhindar dari PD3I, mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat untuk operasional pelayanan imunisasi baik di puskesmas, posyandu, puskesmas keliling maupun pelayanan imunisasi lainnya, mengoptimalkan kegiatan surveilans PD3I dan pelaporannya dan menerapkan prinsip PPI dan menjaga jarak aman 1-2 meter dalam pelaksanaannya (Nadhifa, Laras and Rismawati, 2020).

Keberlangsungan pelayanan imunisasi ditentukan berdasarkan pertimbangan risiko dan manfaat. Dinas Kesehatan dan Puskesmas akan melakukan pemetaan dan penilaian risiko berdasarkan analisis epidemiologi transmisi lokal COVID-19, cakupan Imunisasi setempat dan situasi PD3I daerah, kemudian data tersebut akan dijadikan dasar untuk membuat rekomendasi keberlangsungan imunisasi di daerah tersebut, dilanjutkan dengan advokasi pada pemerintah daerah setempat untuk memperoleh dukungan kebijakan maupun operasional untuk mengoptimalkan pelayanan imunisasi

dan kemudian dinas kesehatan dan puskesmas melakukan monitoring intensif terhadap cakupan imunisasi dan surveilans PD3I untuk mendapatkan gambaran tingkat perlindungan di masyarakat dan untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berisiko tinggi terjadinya KLB untuk menjadi prioritas dalam kegiatan *catch-up* imunisasi sesudah masa pandemi COVID-19 selesai. (Nadhifa, 2020)

Berdasarkan hasil analisis pemetaan risiko maka rekomendasi pelayanan imunisasi dapat berupa pemilihan tempat pelayanan yang sesuai dengan kondisi daerah seperti Puskesmas, Posyandu ataupun di daerah yang masih rawan dapat dilaksanakan dengan sistem jemput bola dengan Puskesmas Keliling. Apabila kondisi belum memungkinkan maka rekomendasi berupa penundaan imunisasi, dengan pencatatan oleh petugas dan kader kesehatan daftar anak yang belum mendapatkan imunisasi untuk kemudian akan diprioritaskan segera saat kesempatan imunisasi selanjutnya tersedia. Berdasarkan petunjuk teknis pelayanan imunisasi yang dikeluarkan kementerian kesehatan, pelayanan imunisasi masih mungkin dilanjutkan dalam kondisi pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan dan ketentuan pelayanan yang ada. Hal ini dinilai baik mengingat pentingnya imunisasi PD3I agar tidak terjadi KLB penyakit lain yang dapat berpotensi menjadi beban ganda di masa pandemi ini. (Kemenkes, 2020)

Terkait kebijakan baru program imunisasi secara tertulis tidak dibuat oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar selama wabah COVID- 19, tetapi hanya mengikuti kebijakan yang sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan RI. (Terlampir: Surat Edaran Pelayanan Imunisasi Pada Anak Selama Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019).

Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI menyarankan kepada petugas kesehatan agar kegiatan esensial seperti imunisasi untuk tetap berjalan, agar diharapkan tidak menimbulkan beban ganda yaitu KLB PD3I. (Kemenkes, 2020)

Dinas Kesehatan Kota Makassar tentunya mengikuti arahan yang tercantum dalam surat edaran Menteri Kesehatan tersebut. Namun pada kenyataannya, petugas kesehatan di lapangan mempertimbangkan untuk memberhentikan atau menunda program imunisasi selama pandemi COVID-19 dan juga setengah dari orang tua dan pengasuh yang disurvei enggan membawa anaknya ke fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19 atau khawatir tidak ada protokol kesehatan yang tepat.

Upaya yang dilakukan pemerintah setempat apabila imunisasi tidak mencapai target maka untuk mencapai target setiap daerah lingkup puskesmas tersebut ada bidan yang mengontrol perkembangan puskesmas perkelurahan, mengunjungi rumah pasien, melakukan seminar tentang pentingnya imunisasi. Saat ini pemerintah berupaya memulihkan cakupan yang hilang akibat gangguan kegiatan imunisasi terkait COVID-19. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta orang tua dan pengasuh untuk membawa anaknya yang belum mendapat imunisasi lengkap ke Puskesmas, Posyandu dan fasilitas kesehatan lainnya selama Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) berlangsung (Kemenkes RI, 2020)

Berdasarkan tabel 4.4 dan 4.5 pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tren penurunan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 di wilayah kota Makassar tahun 2020 di dapatkan HB0, BCG dan Polio 1 dengan hasil uji regresi linear dengan nilai p-value 0,000 dan di tahun 2021 didapatkan hasil uji regresi linear dengan nilai p-value 0,001

, $p < 0,05$ dan pada tahun 2021 terdapat imunisasi HB0 p-value 0,001 , BCG, p-value 0,001 dan Polio 1 p-value 0,002 .P 0,05 yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pandemi COVID-19 dengan cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020 Nilai koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar R 0,826 , BCG, R 0,818, Polio 1 R 0,818. hal ini menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh pandemi COVID-19 terhadap imunisasi dengan presentase HB0 82,6 % BCG 81,8% dan Polio 1 81,8%. Pada tahun 2021 Nilai koefisien determinasi pada variabel HB0 adalah sebesar R 0,762 , BCG, R 0,742, Polio 1 R 0,747 hal ini menunjukkan bahwa secara simultan memiliki pengaruh pandemi COVID-19 terhadap imunisasi HB0 76,2 %, BCG 7,42% dan Polio 1 74,7%.

4.1.8 Pandangan Islam Terkait Pandemi COVID-19

Dalam Qur'an Surah Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman Dalam QS. Yunus /10 :57.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

٥٧

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Alquran) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman (QS. Yunus /10 :57).

Tafsir Kementerian Agama menerangkan, melalui ayat ini, Allah menyeru kepada semua manusia bahwa telah didatangkan Al-Quran kepada mereka melalui Rasul-Nya. Di dalamnya terkandung pedoman-pedoman hidup yang sangat berguna bagi kehidupan umat manusia. Di dalam ayat ini disebutkan pedoman-pedoman hidup

itu sebagai jawaban atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan ancaman-ancaman-Nya.

Ayat ini juga menyimpulkan fungsi Alquran al-Karim dalam memperbaiki jiwa manusia. Di antaranya, pertama, *Mauidhah*, yaitu pelajaran dari Allah kepada seluruh manusia agar mereka mencintai yang hak dan benar, serta menjauhi perbuatan yang batil dan jahat. Pelajaran ini harus betul-betul dapat terwujud dalam perbuatan mereka.

Kedua, *Syifa* yaitu penyembuh bagi penyakit yang bersarang di dada manusia, seperti penyakit syirik, kufur dan munafik. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketenteraman jiwa manusia, seperti putus harapan, lemah pendirian, menuruti hawa nafsu, menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia, perasaan takut dan pengecut, mencintai kebatilan dan kejahatan, serta membenci kebenaran dan keadilan.

Ketiga, *Huda* yaitu petunjuk ke jalan yang lurus yang menyelamatkan manusia dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaannya agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Serta membimbing mereka agar giat beramal, dengan jalan mengutamakan kemaslahatan yang akan mereka dapati dari amal yang ikhlas, dan menjalankan aturan hukum yang berlaku, mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana perbuatan yang harus di jauhi.

Terdapat pula hadis tentang aturan saat terjadinya wabah penyakit yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَقْرُوا مِنْهُ

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: ‘Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar , penyebab paling dominan dalam penurunan angka cakupan di masa pandemi COVID-19 adalah faktor tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti Angka kejadian COVID-19 yang tinggi, PSBB dan juga Karena kekhawatiran ibu terhadap COVID-19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 sebelum pandemi COVID-19 tahun 2019 dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi hanya dua Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi yaitu Puskesmas Kaluku Badoa (90,66%) dan Puskesmas Tamalate (91,20%). Adapun Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi.
2. Pada tahun 2020, angka cakupan imunisasi HB0 mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan April 2020. Cakupan imunisasi BCG dan Polio1 tidak mencapai target minimal sejak bulan Januari hingga bulan Oktober 2020.
3. Pada tahun 2021 angka cakupan imunisasi HB0, BCG dan Polio 1 tidak mencapai target minimal sama sekali sejak bulan Januari hingga bulan Desember 2021.
4. Angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2020 dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi terdapat empat Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi. Adapun Puskesmas lainnya memenuhi target cakupan imunisasi dan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 selama pandemi COVID-19 tahun 2021 dari 15 Puskesmas yang melakukan imunisasi terdapat delapan Puskesmas yang tidak mencapai target imunisasi dengan rata rata di wilayah tersebut dengan angka kejadian COVID-19 yang tinggi

5. Terdapat pengaruh tren penurunan angka cakupan imunisasi HB0, BCG, dan Polio 1 pada pandemi COVID-19 di wilayah kerja puskesmas perkecamatan di wilayah kota Makassar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyarankan beberapa hal antara lain:

1. Intervensi manajemen kebijakan bagi tenaga kesehatan diharapkan terus ditingkatkan, terutama melalui pemberian bimbingan dan pelatihan kepada pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan terkait COVID-19 selama masa pandemi COVID-19. Vaksinasi untuk menghindari beban ganda wabah di masa depan. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk mempromosikan fasilitas bagi petugas kesehatan, termasuk menyediakan mereka dengan APD.
2. Pemerintah Kota Makassar dan dinas kesehatan diharapkan dapat menerapkan program dan kebijakan khusus untuk meningkatkan jumlah vaksinasi primer, terutama pada masa wabah COVID-19.
3. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut peran faktor yang mempengaruhi cakupan vaksinasi primer atau imunisasi dasar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Kurnia, W. A. F. L. (2015) 'Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Imunisasi Pentabiodi Puskesmas Tasikmadu Kabupaten Karanganyar', *Maternal*, 12, pp. 43–55.
- Depkes (2008) *No Title*.
- Dinkes Kota Makassar. (2021). *Data Angka Kejadian COVID-19*.
- (2020). *Data Angka Kejadian COVID-19*.
- (2021). *Data Imunisasi Lengkap dan Lanjutan..*
- (2020). *Data Imunisasi Lengkap dan Lanjutan..*
- (2019). *Data Imunisasi Lengkap dan Lanjutan..*
- Felicia, F. V. and Suarca, I. K. (2020) 'Pelayanan Imunisasi Dasar pada Bayi di Bawah Usia 12 Bulan dan Faktor yang Memengaruhi di RSUD Wangaya Kota Denpasar Selama Masa Pandemi COVID-19', *Sari Pediatri*, 22(3), p. 139. doi: 10.14238/sp22.3.2020.139-45.
- Hadinegoro, S. R. S. (2016) 'Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi', *Sari Pediatri*, 2(1), p. doi: 10.14238/sp2.1.2000.2-10.
- Halim, R. G. (2016) 'Campak pada Anak Ricky', *Campak pada Anak*, 43(3), pp. 186–189.
- Herlina, L. (2019) 'a Tinjauan Konsistensi Ajaran Islam Dalam Qs. Al – Baqarah Ayat 173 Dalam Persoalan Vaksin Mr', *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 8(2), pp. 167–182. doi: 10.20414/schemata.v8i2.1569.
-
- Hungerford, D. and Cunliffe, N. A. (2020) 'Coronavirus disease (COVID-19) – impact on vaccine preventable diseases', *Eurosurveillance*, 25(18), pp. 1–2. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.18.2000756.
- IDAI (2014) 'Jadwal Imunisasi Anak Umur 0 – 18 tahun', *Ikatan Dokter Anak Indonesia*, p. 2014.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (2020) 'Jadwal Imunisasi Anak pada Situasi Pandemi COVID-19', (5), pp. 1–2. Available at: <https://www.idai.or.id/about-idai/idaistatement/rekomendasi-imunisasi-anak-pada-situasi-pandemi-covid-19>.

Kementrian Agama RI, 2020. Tafsir Surah Yunus Ayat 57.

Kemenkes RI (2020) 'Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi Pada Masa Pandemi Covid-19', *Covid-19 Kemenkes*, p. 47. Available at:

<https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/petunjuk-teknis-pelayananimunisasi-pada-masa-pandemi-covid-19/#.X6IYy6ozbIU>.

Kementerian Kesehatan RI (2018) 'Situasi Campak dan Rubella di Indonesia 2018. Kementerian Kesehatan RI Pusat Data dan Informasi. Jakarta Selatan:

Infodatin;2018', *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*, 3(2), pp. 2–6.

----- "Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas Pada Masa Pandemi Covid-19." (2020).

Kemenkes. 2020. Buletin Surveilans PD3I dan Imunisasi Juli 2020.

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2020) 'Buletin Surveilans PD3I & Imunisasi - TETAP TERLINDUNGI DI MASA PANDEMI COVID-19', pp.

11–11.

Available

at:

https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/sit-rep/buletin-surveilans-pd3i-dan-imunisasi-edisi-22020.pdf?sfvrsn=2a76da54_2.

KEPKN (2017) *Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan RI*. Available

at:

<https://www.kemkes.go.id/article/view/19093000001/penyakit-jantungpenyebab-kematian-terbanyak-ke-2-di-indonesia.html>.

Majelis Ulama Indonesia (2016) 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi', p. 4. Makassar, D. K. K. (2021) *No Title*.

Mansour, Ziad, et al. "Impact of COVID-19 pandemic on the utilization of routine immunization services in Lebanon." *PloS one* 16.2 (2021): e0246951.

- Nainggolan, O., T, D. H. and Indarwati, L. (2019) 'Karakteristik Kegagalan Imunisasi Lengkap di Indonesia (Analisis Data Riskesdas Tahun 2013)', *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 29(1), pp. 13–24. doi: 10.22435/mpk.v29i1.109.
- Nurhasanah, I. (2021) 'Pelayanan Imunisasi Di Masa Pandemi Covid-19: Literatur Review', *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1), p. 104. doi: 10.26751/jikk.v12i1.899.
- Pediatri, S. (2016) 'Jadwal Imunisasi Rekomendasi IDAI', *Sari Pediatri*, 2(1), p. 43. doi: 10.14238/sp2.1.2000.43-7.
- Ramadhian, R. and Pambudi, R. (2016) 'Efektivitas Vaksinasi Hepatitis B untuk Menurunkan Prevalensi Hepatitis B', *Majority*, 5(1), pp. 91–95.
- Rosalina, I. (2012) 'Hubungan Polimorfisme Gen TLR 9 (RS5743836) Dan Tlr 2 (RS3804099 dan RS3804100) dengan Pembentukan Anti-Hbs pada Anak Pasca Vaksinasi Hepatitis B', *Ijas*, 2(3), pp. 123–127.
- Rosandali, F., Aziz, R. and Suharti, N. (2016) 'Hubungan antara Pembentukan Scar Vaksin BCG dan Kejadian Infeksi Tuberkulosis', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), pp. 381–384. doi: 10.25077/jka.v5i2.526.
- Satari, H. I., Ibbibah, L. F. and Utoro, S. (2017) 'Eradikasi Polio', *Sari Pediatri*, 18(3), p. 245. doi: 10.14238/sp18.3.2016.245-50.
- Shrestha, R. and Shrestha, L. (2020) 'Coronavirus disease 2019 (Covid-19): A pediatric perspective', *Journal of the Nepal Medical Association*, 58(227), pp. 525–532. doi: 10.31729/jnma.4977.
- Sulsel Tanggap. Data Penantuan COVID-19 update 07 Februari 2022. <https://covid19.sulselprov.go.id>
-
- Sundoro, J. *et al.* (2014) 'Profil Keamanan setelah Pemberian Dosis Primer Vaksin Pentabio ® pada Bayi di Indonesia Safety Profile Following Pentabio ® Primary Dose Vaccination in Indonesian Infants', *Majalah Kedokteran Bandung*, 49(2), pp. 86–93.
- WHO (2020) 'Coronavirus disease (COVID-19)', (August)

- World Health Organization (2020a) 'Clinical Management of Severe Acute Respiratory Infection when Novel Coronavirus (nCoV) Infection is Suspected', Who, 2019(January), p. 12. Available at:
[https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical-management-ofsevere-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infectionis-suspected%0Ahttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178529/1/WHO_MERS_Clinical_15.1_eng.pdf](https://www.who.int/internal-publications-detail/clinical-management-ofsevere-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infectionis-suspected%0Ahttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178529/1/WHO_MERS_Clinical_15.1_eng.pdf).
- .'Coronavirus Disease Situation Report World Health Organization', World Health Organization, 19(May), pp. 1–17.
- Yazia, dkk. 2020. Dukungan Keluarga dan Tingkay Kecemasan Orangtua Dalam Kepatuhan Imunisasi Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Keperawatan Vol 12, No.4, Desember 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus 1, Jl. Sultan Alauddin, No.53 Makassar
Kampus 2, Jl. HAF, Yash Lingsu No.35 Ronteng Poleang Gasa, Tolo, (0411) 841819 Fax (0411) 8221405

Nomor : B-3842/Un.06/FKIK/PP.09/8/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 11 Agustus 2022

Yth,

Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

di-

Tempat

Assalamu alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Dalam rangka penelitian mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nur Fadyah Yanti
NIM : 70600118031
Program Studi : Pendidikan Dokter
Judul Penelitian : Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0,BCG Dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar
Dosen Pembimbing : 1. dr. Utami Nutri Pratiwi, M.Kes
2. dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Gemy Nesity Handayany



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I, Jl. Sultan Alauddin No.53 Makassar
Kampus II, Jl. H.M. Yach Limpo No.36 Rongga Palong-Gowa Telp. (0411) 541575 Fax (0411) 5221400

Nomor : B-3752/Un.06/FKK/PP.00.9/8/2022 Gowa, 07 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Nur Fadyah Yanti**
N I M : 70600118031
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Pendidikan Dokter
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Wasabbe Blok A/23

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG Dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes
2. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian, terhitung mulai Juli sampai Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa

DINAS KESEHATAN KOTA MAKASSAR
JL. TEDUH BERSHARNO.1 Tlp (0411) 881948
FAX (0411) 887710

Surat Asal	U/PAK. Pak. Kesehatan	Diterima	11/1/11
Tanggal	01/01/11	Menor	010
Nomor Surat		Diteruskan Kepada	

(3) Dikopi
 1. Untuk diketahui sehubungan dengan
 2. Untuk dipelajari
 3. Untuk ditanggapi
 4. Untuk ditindaklanjuti
 5. Untuk wreghadri

1823/2

- I. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN
 1. Subag Urusan dan Kepegawaian
 2. Subag Keuangan
 3. Subag Perencanaan dan Pelaporan
- II. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer & Tradisional
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 3. Seksi Promosi dan Peningkatan Mutu
- III. KEPALA BIDANG PROMOSI DAN BUDAYA KESEHATAN
 1. Seksi Kefarmasian
 2. Seksi Riset Kesehatan Perilaku Kesehatan & Kesehatan Masyarakat
 3. Seksi SDM Kesehatan dan Regulasi Kesehatan
- IV. KEPALA BIDANG PRONOSIASI DAN MONITORING PENYAKIT
 1. Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 2. Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Korona
 3. Seksi Surveilans dan Infeksi
- V. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan GIG
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- VI. SEKRETARIS KORPRI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I J. Sultan Alauddin No.53 Makassar
Kampus II J. M.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa Telp. (0411) 841875 Fax (0411) 8221400

Nomor : B-3752/Un.06/FKIK/PP.00.9/8/2022 Gowa, 07 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
**Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Selatan**

Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Fadyah Yanti
N I M : 70600118031
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Pendidikan Dokter
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN Wasabbe Blok A/23

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Tren Penurunan Angka Cakupan Imunisasi HB0,
BCG Dan Polio 1 Di Wilayah Kota Makassar".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. dr. Utami Murti Pratiwi, M.Kes
2. dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian, terhitung mulai Juli sampai Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam
Dekan,

Syatirah

Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar di Gowa



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : psp@sulselprov.go.id
Makassar 90031

Nomor : 7542/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Walikota Makassar
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3752/Un.06/FKIK/PP.00.9/8/2022 tanggal 07 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NUR FADYLAH YANTI
Nomor Pokok : 70600118031
Program Studi : Pendidikan Dokter
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : J. H.M. Yasin Limpa No.36 Romang Palong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TREN PENURUNAN ANGKA CAKUPAN
IMUNISASI HB0, BCG DAN POLIO 1 DI WILAYAH KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Agustus s/d 15 September 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 Agustus 2022

A.A. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Terbaca Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Parhimpun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAUDDIN
KASSAR



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

MAKASSAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

No surat : 440/148/PSDK /VIII/2022

Bersama dengan surat ini menerangkan bahwa :

Nama : Nur Fadyah Yanti
NIM : 70600118031
Jurusan : Pendidikan Dokter
Institit : Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar

Judul : Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Tren Penurunan
Angka Cakupan Imunisasi HB0, BCG dan Polio 1
Di Wilayah Kota Makassar”

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di kantor Dinas kesehatan Kota Makassar Propinsi Sulawesi selatan, pada tanggal 6 Juli 2022 s/d 6 Agustus 2022

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Agustus 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



Dr. Nurulhidah Sirajuddin, M.kes
Pangkat : Pembina TK I / IV B
NIP : 19730112 2006042012

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.310/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh
The research protocol proposed by

Penciri utama : Nur Fadylah Yanti
Principal Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP TREN PENURUNAN ANGKA
CAKUPAN IMUNISASI HB0, BCG DAN POLIO 1 DI WILAYAH KOTA
MAKASSAR"**

*"THE EFFECT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE TREND OF DECREASING THE COVERAGE
NUMBERS HB0, BCG AND POLIO 1 IMMUNIZATION IN MAKASSAR CITY AREA"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bojakan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023.

This declaration of ethics applies during the period August 4th, 2022 until August 4th, 2023.

August 4th, 2022

Professor and Chairperson,



DR. H. Saifan, Sp.A., M.Kes

REGRESSION

/MISSING LISTWISE
 /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
 /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
 /NOORIGIN
 /DEPENDENT Data_COVID19_2020
 /METHOD=ENTER Cakupan_Imunisasi_HB0_2020.

Regression

Notes

Output Created		22-AUG-2022 13:07:23
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	15
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Data_COVID19_2020 /METHOD=ENTER Cakupan_Imunisasi_HB0_2020.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,32
	Memory Required	1356 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	0 bytes

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_HB0_2020 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.826 ^a	.682	.657	75.757

a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2020

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	159830.962	1	159830.962	27.849	.000 ^b
	Residual	74608.371	13	5739.105		
	Total	234439.333	14			

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2020

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31.829	39.952		.797	.440
	Cakupan_Imunisasi_HB0_2020	.254	.048	.826	5.277	.000

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_BCG_2020 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.669	.643	77.269

a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2020

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	156823.369	1	156823.369	26.267	.000 ^b
	Residual	77615.964	13	5970.459		

Total	234439.333	14		
-------	------------	----	--	--

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2020

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.840	40.024		.945	.362
	Cakupan_Imunisasi_BCG_2020	.252	.049	.818	5.125	.000

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020 ^b		Enter

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.670	.644	77.177

- a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157006.581	1	157006.581	26.359	.000 ^b
	Residual	77432.752	13	5956.366		
	Total	234439.333	14			

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37.304	40.050		.931	.369
	Cakupan_Imunisasi_Polio1_2020	.252	.049	.818	5.134	.000

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2020

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_HB0_2021 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.762 ^a	.581	.548	602.776

a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2021

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6537573.979	1	6537573.979	17.993	.001 ^b
	Residual	4723408.021	13	363339.079		
	Total	11260982.000	14			

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_HB0_2021

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	201.441	300.535		.670	.514
	Cakupan_Imunisasi_HB0_2021	1.542	.364	.762	4.242	.001

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742 ^a	.550	.515	624.380

a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6192930.444	1	6192930.444	15.885	.002 ^b
	Residual	5068051.556	13	389850.120		
	Total	11260982.000	14			

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	226.315	312.221		.725	.481
	Cakupan_Imunisasi_Polio1_2021	1.524	.382	.742	3.986	.002

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Cakupan_Imunisasi_BCG_2021 ^b		Enter

a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.559	.525	618.262

a. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2021

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6291764.220	1	6291764.220	16.460	.001 ^b
	Residual	4969217.780	13	382247.522		

Total	11260982.000	14		
-------	--------------	----	--	--

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021
b. Predictors: (Constant), Cakupan_Imunisasi_BCG_2021

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	226.465	307.345		.737	.474
	Cakupan_Imunisasi_BCG_2021	1.513	.373	.747	4.057	.001

- a. Dependent Variable: Data_COVID19_2021



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Nur Fadylah Yanti
2. NIM : 70600118031
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Bumi Tirta Nusantara Gardenia D/4
7. Nama Orang tua
 - a. Ayah : Dr.H.Muhammad Suyuti Thanrin.SE,MM
 - b. Ibu : Hj.Nurlaela Tombong.SE,MM

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 10 Pangsid
2. SMP : SMPN RSBI 1 Pangsid

3. SMA : SMAN 2 Sidrap
4. S1 : Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar