

**DETERMINAN KERACUNAN PADA PETANI SAYUR
PENGUNA PESTISIDA DI DESA KANREAPIA
KECAMATAN TOMBOLO PAO
KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR RACHMATULLAH AMIN

70200117114

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Nur Rachmatullah Amin
Nim : 70200117114
Tempat/TanggalLahir : Takalar, 28 Desember 1999
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu kesehatan
Alamat : BtnBontomate'neindahblok A2 No.9
Judul : Determinan Keracunan Pada Petani Sayur
Pengguna Pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan
Tombolopao Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sungguh dan dengan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa,22Agustus 2022

Penyusun

NurRachmatullah Amin
NIM 70200117114

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Determinan keracunan pada petani sayur penggarwa pestisida di Desa Kahrappa Kecamatan Tombolopo Kabupaten Gowa*" yang disusun oleh Nur Rachmatullah Amin NIM: 70200117114, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Agustus 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat

Samata-Gowa, 22 Agustus 2022 M
24 Muharram 1444 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Madjid HR. Laga, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Azriful, SKM., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Mezakkir, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nildawati Amir, SKM., M.Epid	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa”**Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan Skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2022/2023.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Aminuddin S,Pd dan Nurliati atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga peneliti dapat berada di tahap ini untuk meraih gelar sarjana Kesehatan Masyarakat. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik pengembangan Lembaga), Prof. Dr. Wahyuddin, M.Hum Selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan perencanaan keuangan), Prof. Dr. Darussalam, M.Ag selaku Wakil Rektor III (Bid. Kemahasiswaan) dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku

Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan pengembangan Lembaga) UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus ini.

2. Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany.,S.Si.,M.Si.,Apt selaku Wakil dekan I, Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM.,MARS selaku Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi,M.Pd selaku Wakil Dekan III Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus administrasi selama peneliti menempuh pendidikan.
3. Abd. Madjid HR. Lagu,SKM.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan masyarakat dan Suktifrianty syahrir SKM, M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar serta seluruh staff dan dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama studi.
4. Dr. Hasbi Ibrahim,SKM,M.Kes selaku pembimbing I dan Nildawati Amir,SKM,M.Kes selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penelitian, arahan referensi yang berguna untuk penelitian skripsi, motivasi yang membangun sehingga peneliti bisa ke tahap ini serta informasi yang ter update.
5. Dr. Azriful,SKM.,M. Kes selaku penguji akademik dan Dr. Muzakkir,M.Pd.I selaku Penguji Agama yang sabar dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada kakak kakak Saya, Nur Imran Amin, Nur Ichsan Amin, Andi Wiwied yulita aстриana yang menjadi sponsor terbaik, Menjadi tempat berbagi, selalu memberi semangat dukungan dan membantu penulis.

7. Kepada keluarga besar HMJ Kesehatan masyarakat tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang penelitian, pengabdian masyarakat yang begitu berharga sehingga saya bisa ke tahap ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Teman-teman angkatan saya ANTHOPHILA yang telah memberikan peneliti motivasi dan pemikiran positif.
9. Kepada seluruh petani di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa yang menjadi responden saya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

Akhir kata, peneliti memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Peneliti menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian. Jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih.

Samata, Juni 2022
Peneliti

Nur Rachmatullah Amin
Nim : 70200117114

ABSTRAK

Nama : Nur Rachmatullah Amin
NIM : 70200117114
Judul : Determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kec. Tombolo pao, Kab. Gowa

Latar belakang: *World Health Organization* (WHO), memperkirakan 1-5 juta kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian mencapai 220.00 korban jiwa. Sekitar 80% keracunan dilaporkan terjadi di Negara- Negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, Afrika, Amerika tengah dan amerika Latin.

Tujuan : Untuk mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Metode : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *cross sectional study*, dengan mengambil populasi pada petani sayur yaitu sebanyak 88 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 44 responden.

Hasil : Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 27 Resonden mengalami keracunan dan 17 Resonden tidak mengalami keracunan. Faktor yang berhubungan dengan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida, cara penyemprotan ($p\ value = 0,002$), personal hygiene ($p\ value = 0,042$) dan penggunaan APD ($p\ value = 0,006$). Sedangkan yang tidak berhubungan dengan keracunan pestisida adalah lama kerja ($p\ value = 0,244$) dan masa kerja ($p\ value = 0,437$).


Kesimpulan : Dari hasil penelitian di ketahui bahwa faktor yang berhubungan dengan determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida adalah cara penyemprotan, personal hygiene dan penggunaan APD. Sedangkan lama kerja dan masa kerja tidak memiliki hubungan dengan kejadian keracunan pada petani sayur pengguna pestisida.

Kata Kunci : Determinan, Keracunan, Petani Sayur, Pestisida

DAFTAR ISI

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat penelitian	5
E. Definisi Operasional	7
G. Hipotesis penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN TEORI	21
A. Tinjauan teori Pestisida.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Kolinesterase (indikator keracunan pestisida)	27
C. Tinjauan Teori tentang personal hygiene.....	33
D. Tinjauan Teori Tentang Alat Pelindung Diri (APD)	35
E. Kerangka Teori.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan waktu penelitian	39
C. Populasi dan sampel.....	39
D. Teknik pengumpulan data	40
E. Instrumen Penelitian	41
F. Instrumen Pengumpulan Data	41
1. Uji Enzim Cholinesterase.....	41
G. Uji Validitas dan Reliabilitas	43
1. Uji Validitas	43

H. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	44
I. Pengolahan dan Analisis Data	45
2. Analisis Data	45
J. Etika Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	58
C. Keterbatasan penelitian	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112



DAFTAR TABEL


Tabel 1.1	Definisi Operasional	7
Tabel 1.2	Kajian Pustaka	10
Tabel 2.1	Daftar Pestisidayang digunakan Petani	23
Tabel 4.1	Luas wilayah Desa Kanreapia	49
Tabel 4.2	Wilayah Desa Kanreapia	49
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi berdasarkan Usia pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	50
Tabel 4.4	Distribusi frekuensi berdasarkan Pendidikan pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	50
Tabel 4.5	Distribusi frekuensi berdasarkan Keracunanpada Petani di Desa Kanreapia, Kec. TombolopaoKab.Gowa Tahun 2021	51
Tabel 4.6	Distribusi frekuensiberdasarkan JenisPestisida padaPetani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	51
Tabel 4.7	Distribusi frekuensi berdasarkan Lama Kerja pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	52
Tabel 4.8	Distribusi frekuensi berdasarkan Masa Kerja pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	52
Tabel 4.9	Distribusi frekuensi berdasarkan Cara penyemprotan pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	53
Tabel 4.10	Distribusi frekuensi berdasarkanPersonal Hygiene padaPetani di Desa Kanreapia Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	53

Tabel 4.11	Distribusi frekuensi berdasarkan Penggunaan APD pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	54
Tabel 4.12	Hubungan keracunan dan Jenis Pestisida pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	54
Tabel 4.13	Hubungan keracunan dan Lama Kerja pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	55
Tabel 4.14	Hubungan keracunan dan Masa Kerja pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	56
Tabel 4.15	Hubungan keracunan dan Cara Penyemprotan pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	56
Tabel 4.16	Hubungan keracunan dan Personal Hygiene pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	57
Tabel 4.17	Hubungan keracunan dan Penggunaan APD pada Petani di Desa Kanreapia, Kec. Tombolopao, Kab.Gowa Tahun 2021	58



DAFTAR BAGAN

Bagan2.1 Kerangka Teori.....	37
Bagan2.2 Kerangka Konsep	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pertanian merupakan profesi informal terbanyak dan mempunyai peranan penting dalam membangun perekonomian terutama di Indonesia, Namun perkembangan industri tersebut belum sejalan dengan perhatian terhadap manajemen risiko dan pengelolaan secara optimal. Setiap pekerjaan memiliki risiko dan bahaya (*hazard*) baik pada sektor formal maupun informal (Akbar, 2019). Petani adalah pekerjaan yang berpotensi berbahaya karena kurangnya penerapan praktek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara baik. Fenomena tersebut merupakan faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan serta timbulnya berbagai macam penyakit pada petani, yang mengakibatkan penurunan produktivitas dan kerusakan ekonomi serta permasalahan sosial (Farid dkk., 2019).

World Health Organization (WHO), memperkirakan 1-5 juta kasus keracunan pestisida pada pekerja pertanian dengan tingkat kematian mencapai 220.00 korban jiwa. Sekitar 80% keracunan dilaporkan terjadi di Negara- Negara yang sedang berkembang, seperti di Asia, Afrika, Amerika tengah dan amerika Latin. Negara berkembang menggunakan sekitar 25% pestisida dalam kegiatan pertanian, namun kematian akibat penggunaan pestisida tersebut mencapai angka 99% (WHO 2017).

Secara global terdapat 107.705 kasus orang yang meninggal dunia akibat keracunan pestisida (WHO, 2015). Selain itu, berdasarkan data dari sentra informasi keracunan atau sikernas diketahui bahwa sebanyak 771 keracunan pestisida di sebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pengetahuan terkait cara penggunaan pestisida yang baik (SIKERNAS, 2016).

Peningkatan penggunaan pestisida disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan petani sehingga cara pestisida juga sangat tidak aman dan cenderung berlebih dan tidak terkendali. Berdasarkan data yang dirujuk dari sentra informasi keracunan nasional, pada tahun 2016 terjadi sebanyak 771 kasus keracunan pestisida di Indonesia (sikernas). Keracunan pestisida pada periode April-Juni 2017 tercatat sebanyak 180 kasus, sedangkan pada periode Juli-September 2017 terjadi 4 kasus keracunan pestisida di Provinsi Jawa Tengah dengan 2 diantaranya meninggal dunia.

Kasus keracunan yang dilaporkan melalui aplikasi SPIMKer KLB K selama tahun 2019 terdapat 2,813 Rumah Sakit di Indonesia yang melaporkan kasus keracunan pestisida. Kasus keracunan pestisida di dominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu 3.516 kasus dan 2.689 kasus kejadian pada wanita. Berdasarkan data BPOM tahun 2019 terdapat 5 provinsi dengan kasus pestida tertinggi yaitu Jawa Barat dengan jumlah 2.377 kasus, Jawa Timur 1312 kasus, DKI Jakarta 943, Bali 373 dan Banten 214, Sedangkan di Sulawesi Selatan terdapat 3 kasus keracunan selama 2019. Berdasarkan penyebab keracunan 334 kasus keracunan yang disebabkan oleh pestisida (BPOM, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinkes provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa 1.010 petani yang diperiksa aktivitas cholinesterase darah menunjukkan 225 petani mengalami keracunan (22,7%) dengan keracunan ringan 201 petani (89,33%), keracunan sedang 22 petani (9,78%) dan berat 2 petani (0,89%) (Tampudu, Russeng and Rahim, 2010). Penelitian lainnya dilakukan oleh Habibi yaitu 62 petani di Kanreapia, Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa terdapat 22 orang (35,5%) mengalami keracunan ringan

dankeracunan sedang 6 orang (9,7%) (Habibi,2021).

Pestisida digunakan oleh petani untuk mengendalikan hama menghilangkan hama, sehingga meningkatkan hasil panen (Mesran dkk., 2018). Ada banyak cara manusia terpapar pestisida, antara lain melalui minum, makan atau pekerjaan dan melalui kulit, saluran pernafasan atau rongga mulut. Untuk menghindari timbrungnya entitas berbisa pada badan manusia perlu untuk memakai APD. Berdasarkan permenakertrans RI NO PER. 08/MEN/VII/2010 terkait Alat pelindung diri (APD), dimana dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa APD dapat melindungi manusia, dan memiliki fungsi untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja (Permenakertrans, 2010). Jenis APD yang paling umum di gunakan petani adalah *Hat* (topi), protektor mata (*Goggles*), Protector pernafasan (*face mask*), Protektor tubuh (baju/celemek Kerja), Protektor tangan (*glove*), dan Protektor kaki (Sepatu bot) (Fajriani dkk., 2019).

Sulawesi Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang sangat memadai salah satunya adalah sektor pertanian. Kecamatan Tombolopao adalah sentra pertanian untuk tanaman sayuran dan hortikultura lainnya di Kabupaten Gowa bersama Kecamatan Tinggimoncong, Tompobulu, Biringbulu. Sub-sektor usaha tanaman pangan hortikultura merupakan penyumbang terbesar terhadap sub-sektor pertanian yaitu tercatat sebesar 60,9% dari seluruh nilai tambah pertanian di Kabupaten Gowa. Ada beragam jenis tanaman hortikultura khas dataran menengah dan tinggi yang merupakan produksi wilayah ini seperti jenis sayuran kubis, cabe, tomat, bawang, kentang, wortel, kol bunga, brokoli dan masih banyak lagi, serta jenis buah markisa dan beraneka ragam tanaman hias yang potensial (BPS Gowa, 2017).

Gambaran hasil penelitian pada tahun 2021 yang dilakukan di Kecamatan Tombolopao diketahui bahwa kategori umur petani pengguna pestisida pada kelompok kontrol 55-65 dengan presentase 42.86%. kemudian tingkat pendidikan pada kelompok kontrol dan intervensi terbanyak dengan pendidikan SD yaitu 42.85%. Masa kerja pada kelompok kasus dan intervensi sebesar 95,24% dengan masa kerja > 5 tahun (lama). Lama kerja untuk kelompok control yaitu 80.95% (17 orang) yang bekerja sekita ≤ 8 jam/hari dan 9.53% (2 orang) bekerja > 8 jam/hari. Teknik penyemprotan dengan kategori tidak memenuhi syarat yaitu pada kelompok control sebesar 66.66% dan 71.43% pada kelompok intervensi. Penggunaan APD yang tidak lengkap pada kelompok kontrol sebesar 85.71% dan 90.48% pada kelompok intervensi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu di lakukan penelitian untuk mengetahui determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah “apa saja faktor Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Mengetahui Faktor Determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran kejadian keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- b. Mengetahui karakteristik responden diantaranya usia, pendidikan dan jenis pestisida yang digunakan.
- c. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida berdasarkan lama kerja di Desa Kanreapia, Kec. Tombolo Pao kabupaten Gowa.
- d. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida berdasarkan masa kerja di Desa Kanreapia, Kec. Tombolo Pao kabupaten Gowa.
- e. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida berdasarkan cara penyemprotan pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- f. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida berdasarkan *personal hygiene* petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- g. Mengetahui faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida berdasarkan penggunaan APD di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat bagi peneliti selanjutnya


Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pendapat dan pengalaman serta menjadi sumber rujukan terkait determinan keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

2. Institusi

Sebagai informasi mengenai faktor determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

3. Bagi petani sayur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.



E. Definisi Operasional

Tabel 1.1

Defenisi Operasional Penelitian Determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa

Variabel Penelitian	Definisi Oprasional	Teknik Pengambilan Data	Kategori
Keracunan Pestisida	Keracunan pestisida adalah kondisi ketika racun serangga tidak sengaja tertelan, terhirup atau terserap ke dalam kulit	Menggunakan alat Tintometer kit	<p>a. Tidak mengalami keracunan apabila responden memiliki kadar cholinesterase > 75 %</p> <p>b. Mengalami keracunan apabila responden memiliki kadar cholinesterase < 75%</p> <p>(Sumber : Ika Rahmawati, 2014)</p>
Umur	Umur adalah lamanya hidup petani yang dinyatakan dalam tahun	Kuesioner	<p>a. 20-30 tahun</p> <p>b. 31-40 tahun</p> <p>c. 41-50 tahun</p> <p>d. 51-60 tahun</p>
Pendidikan	Tingkat pendidikan merupakan sekolah terakhir pendidikan formal yang dilalui pekerja	kuesioner	<p>a. SD</p> <p>b. SMP</p> <p>c. SMA</p> <p>d. D3-S1</p>
Jenis Pestisida	Pestisida adalah bahan atau Zat kimia yang digunakan Petani	Observasi, Kuesioner	<p>a. Insektisida</p> <p>b. Fungisida</p> <p>c. Herbisida</p> <p>(Sumber : Moekasan dan prabaningrum, 2011)</p>
Lama Kerja	Lama kerja adalah durasi waktu yang	Kuesioner	<p>a. Tidak LamaApabilares ponden bekerja</p>

	digunakan responden pada saat melakukan pekerjaannya dalam sehari		<p>≤ 2 jam Sehari</p> <p>b. Lama : Apabila responden bekerja >2 jam sehari</p> <p>(Sumber : Sati, 2014)</p>
Masa kerja	Masa kerja adalah Lama responden bekerja sejak awal bertani hingga waktu dilakukannya Penelitian	Kuesioner	<p>a. Lama : Jika responden bekerja >6 Tahun</p> <p>b. Baru : Jika responden bekerja ≤ 6 Tahun</p> <p>(Sumber : budiawan 2013)</p>
Cara Penyemprotan	Cara penyemprotan adalah Posisi penyemprotan responden	Kuesioner	<p>a. Tidak memenuhi Syarat : Apabila cara penyemprotan berlawanan dengan arah angin</p> <p>b. memenuhi syarat: apabila cara penyemprotan searah dengan arah angin</p> <p>(Sumber : Okvitasari & Anwar, 2017)</p>
<i>Personal Hygiene</i>	<i>Personal hygiene</i> adalah bagaimana kebersihan petani setelah melakukan penyemprotan	Kuesioner	<p>a. Tidak memenuhi syarat : Apabila pekerja tidak menerapkan kriteria yang ditetapkan.</p>

	pestisida		<p>b. Memenuhi syarat : Apabila pekerja mencuci tangan (Menggunakan sabun), Mengganti pakaian dan mandi setelah melakukan pekerjaan paling lambat sebelum istirahat</p> <p>(Sumber : Riska & Asbath, 2018)</p>
Alat Pelindung diri (APD)	Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat keamanan yang dipakai petani untuk menjaga tubuhnya dari Kecelakaan akibat kerja	Kuesioner	<p>a. Tidak Lengkap : Apabila Pekerja tidak menggunakan salah satu dari APD yang ada di atas</p> <p>b. Lengkap : Apabila pekerja menggunakan APD saat bertani</p> <p>(Sumber : Okvitasari & Anwar, 2017)</p>

F. Kajian pustaka

Tabel.1.2
Kajian pustaka Penelitian terkait Determinan keracunan pada petani pengguna pestisida

No	Tahun	Penulis	Judul	Variable	Metode	Hasil
1	2017	Istiana, Ari yuniastuti	Hubungan masa kerja, Lama menyemprot, jenis pestisida, penggunaan AD dan pengelolaan pestisida dengan kejadian keracunan pada petani di Brebes https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/phpj/article/view/13581	Masa kerja, lama kerja, jumlah jenis pestisida, pemakanan APD dan pengelolaan pestisida	Observasi analitik dengan pendekatan Cross sectional	Diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara waktu kerja ($p = 0,049$), durasi jam kerja ($p = 0,044$), jumlah jenis pestisida ($p = 0,000$), pemakaian APD ($p=0,000$) dan penggunaan pestisida perlakuan ($p = 0,000$) diracuni oleh pembajak di Kabupaten Brebes.

2	2018	Norsita agustina, Norfai	<p>Paparan pestisida terhadap kejadian Anemia pada petani Hortikultura</p> <p>http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/1398</p>	Paparan pestisida, status gizi	<i>Cross section al</i>	<p>Variabel yang memiliki kaitan penting dengan kejadian anemia pada tukang kebun adalah paparan pestisida dan status gizi dengan p value 0,05, sementara variabel yang tidak berhubungan secara statistik dengan kejadian anemia pada tukang kebun adalah gender dan lama kerja. P nilai > 0,05. Paparan pestisida dan status gizi memiliki kontribusi dan efek yang sangat penting pada anemia petani berkebun</p>
3	2018	Fitria Agustina, suhartono, Darminto	<p>Hubungan pajanan pestisida dengan kejadian hipertensi pada petani Hortikultura di desa gerlang Kecamatan Blado kabupaten Batang</p>	Tingkat penggunaan pestisida, jenis pestisida, lama kerja, tata laksana penggunaan pestisida	Cross section al	<p>Terdapat kaitan tingkat penggunaan pestisida ($p=0,032$) bersama jenis pestisida ($p=0,021$) dengan darah tinggi. Tidak ada hubungan antara panjang penggunaan pestisida (nilai p tidak dapat ditampilkan karena jawaban tetap) dan manajemen penggunaan pestisida ($p=0,018$) dengan hipertensi.</p>

			https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/21453			
4	2019	Gita nur fajriani, Suci Rizki nurul aeni, Dika adhi sriwiguna	Penggunaan APD saat penyemprotan pestisida dan kadar kolinesterase dalam darah petani desa pasirhalang http://journal.poltekkes-mks.ac.id/ojs2/index.php/mediaanalisis/article/view/1229	Penggunaan APD	<i>Cross sectional</i>	Petani yang tidak memakai full APD 83,7% dan yang memakai APD saat melakukan semprot 16,3%. Dari hasil Mengukur parameter kolinesterase, 14% orang tani keracunan kecil, dan 86% petani bersahaja. Hasil analisis chi-kuadrat menunjukan taksir 0,017 ($\alpha = 0,05$) akhirnya tersimpul bahwa adanya interaksi yang berarti tengah memakai APD.

5	2018	Lilis afriyani mukadar, sulistiyani, Tri joko	<p>Keracunan Risiko pajanan pestisida terhadap kejadian keracunan pestisida pada petani di Jawa tengah</p> <p>(Studi literatur hasil-hasil penelitian di FKM Undip)</p> <p>https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22178</p>	Faktor keracunan pestisida	<i>Literature review</i>	Faktor risikoyang paling banyakdigunakan sebagai variabel penelitian adalah faktor pengetahuan, jam kerja, masa kerja, penggunaan APD, dan kombinasi pestisida

6	2020	Darmiati	<p>Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko keracunan pestisida pada petani</p> <p>http://ejournal.polttekkesaceh.ac.id/index.php/gikes/article/view/474</p>	Kepatuhan petani pada pemakaian APD	<i>Cross-sectional</i>	Ada2 variabel yang berhubungan dengan kadar kolinesterase yaitu menggunakan p- value $0,030 < 0,05$ dan p-value pengetahuan $0,41 < 0,05$.
7	2020	Hannah Marcus, Russel J de Souza	<p><i>Risk Factors for Acute pesticide Poisoning in Developing Countries</i></p> <p>https://journals.mcmaster.ca/ghar/article/view/2389</p>	Faktor resiko	<i>Systematic Review</i>	Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan pandangan global tentang APP dan interkoneksinya determinansosial. Resiko APP sangat terkait dengan keunikan seseorang terhadap profil sosial dan status ekonomi. Dengan mengkompilasi data lintas negara dari 13 negara yang berbeda hasilnya menunjukkan cakupan

						geografis yang luas, dan keberangkatan penting dari studi khusus negara. Faktor risiko yang teridentifikasi yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dapat digunakan untuk menginformasikan arah studi masa depan untuk memperkuat basis bukti yang sesuai.
8	2020	Nur syahidatul Aqilah jambari, Nurul izzah abdul Samad, Siti marwanis Anua, Rumaizah ruslan, Nurul ainun Hamzah	<i>Knowledge, Attitude and Practice (KAP) on pesticide Exposure among farmers in Kota Bharu, Kelantan</i> https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Ainun-	Pengetahuan, sikap dan praktik	<i>Cross sectional</i>	Sekitar 85,4% dari mereka adalah laki-laki dengan usia rata-rata 48 tahun, dan 66% dari mereka menyelesaikan sekolah menengah. Keluhan responden bahwa mereka pernah mengalami gejala seperti keringat berlebihan (34,7%), penglihatan kabur (27,1%) dan mati rasa di kaki (22,9%) sekitar 63% petani menyimpan botol pestisida di tempat yang telah ditentukan,

			<p>Hamzah/publication/346582152 Knowledge Attitude and Practice KAP on Pesticide Exposure Among Farmers in Kota Bharu Kelantan/links/5fc8a700299bf188d4eda2b0/Knowledge-Attitude-and-Practice-KAP-on-Pesticide-Exposure-Among-Farmers-in-Kota-Bharu-Kelantan.pdf</p>		<p>sementara 62% memakai APD dalam penyemprotan pestisida. Sekitar 61,1% responden memiliki pengetahuan sedang pestisida yang digunakan, 56,3% menunjukkan tingkat sikap tidak peduli terhadap penggunaan pestisida dan 21,5% menunjukkan mereka menunjukkan praktik yang baik saat menangani pestisida. Korelasi signifikan diamati antara sikap dengan pengetahuan dan praktek ($p < 0,001$)</p>
--	--	--	--	--	--

9	2021	Devyana dyah wulandari, Andreas putro ragil santoso	Evaluasi gejala keracunan pestisida melalui pemeriksaan kadar kolinesterase pada petani http://repository.unusa.ac.id/6623/	Pengetahuan	<i>Cross-sectional</i>	8% petani mengalami gejala keracunan pestisida dengan kadar kolinesterase bagi petani di desa sumbersono, Mojokerto yaitu para petani mengetahui bahwasanya kolinesterase merupakan biomarker keracunan pestisida yang perlu diperiksa secara rutin
10	2021	Christine G Park, Jonathan N Hofmann, Laura E Beane Freeman, Dale P sandler	<i>Agricultural pesticides and shingles Risk in a Prospective Cohort</i> https://ehp.niehs.nih.gov/doi/full/10.1289/EHP7797	Penggunaan pestisida	<i>Cohort</i>	Dilaporkan 590 insiden positif herpes zoster, untuk delapan insektisida yang tidak pernah digunakan, tigafumigan, dua fungisida dan lima herbisida dan tren respons paparan terlihat di kuartil yang meningkat (Q3 dan Q4 > Q1) atau tertil (T3 dan T2 > T1) untuk empat insektisida (Permethrin, coumaphos, malathion dan lindane) dua fumigant (Karbon tetraklorida/karbon disulfide

						dan metil bromida) dan tiga herbisida (alachlor trifluralin (60 tahun) dan asam diklorofenol asetat 2,4).
--	--	--	--	--	--	---

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, disimilaritas penelitian yang dilaksanakan dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek penelitian dan sasaran penelitian. Pada penelitian sebelumnya dilakukan penelitian pada faktor keracunan pestisida pada petani secara umum sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada determinan keracunan petani sayur yang menggunakan pestisida di Desa Kanreapia, Dusun Kanreapia Kec. Tombolo Pao

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis ini merupakan hipotesis sementara atas hasil penelitian yang dibuktikan dengan penggunaan analisis yang tepat (Sani, 2016). Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan tersebut, penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis Nol (H_0) =


- a. Lama kerja bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- b. Masa kerja bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- c. Cara penyemprotan bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- d. Personal Hygiene bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- e. Penggunaan APD bukan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

Hipotesis Alternatif (H_a) =

- a. Lama kerja merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- b. Masa Kerja merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten

Gowa.

- c. Cara penyemprotan merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- d. Personal Hygiene merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.
- e. Penggunaan APD merupakan Faktor determinan Keracunan pestisida pada petani sayur di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan teori Pestisida

1. Pengertian Keracunan Pestisida

Pestisida dapat dipahami secara harfiah sebagai pestisida juga kelainan, oleh sebab itu pestisida berasal dari kata “spes”, yang berarti kuman dalam batasan bebas, termasuk penyakit tanaman dan pestisida. Bahkan menanam sayuran sepertinya tidak bisa dipisahkan dari penggunaan pestisida. Berbagai laporan penelitian mengklaim bahwa pestisida dalam jumlah besar digunakan pada tanaman sayuran, dengan jeda penyemburan yang lebih kecil dan takaran saji yang lebih tinggi. Jika situasi ini konstan berlanjut buat berdampak negatif terhadap keamanan area, petaka zat beracun bagi pengguna (petani) dan residu kimia yang sangat berbahaya bagi konsumen yang mengkonsumsi produk pertanian tersebut (Moekasan & Prabaningrum, 2011).

2. Penggolongan pestisida

Pestisida dapat digolongkan berdasarkan organisme target dan cara kerjanya, yaitu:

a. Insektisida

Insektisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang bisa mematikan semua jenis serangga. Serangga menyerang tanaman untuk memperoleh makanan dengan berbagai cara, sesuai tipe mulutnya. Kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa sub kelompok kimia yang berbeda, yaitu:

1. Organoklorin merupakan insektisida Chlorinated hydrocarbon secara kimiawi tergolong insektisida yang relatif stabil dan kurang efektif, ditandai dengan dampak residunya yang lama terurai di lingkungan.

Salah satu insektisida organoklorin yang terkenal adalah DDT. Pestisida ini telah menimbulkan banyak perdebatan. Kelompok organoklorin merupakan racun terhadap susunan saraf baik pada serangga maupun mamalia. Keracunan dapat bersifat akut atau kronis. Keracunan kronis bersifat karsinogenik (kanker).

2. Organofosfat, insektisida ini merupakan ester asam fosfat atau asam tiosulfat. Pestisida ini umumnya merupakan racun pembasmi serangga yang paling toksik secara akut terhadap binatang bertulang belakang seperti ikan, burung, cicak dan mamalia. Pestisida ini mempunyai efek, memblokir penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat enzim asetilkolinesterase. Keracunan kronis pestisida golongan organofosfat berpotensi karsinogenik.
3. Karbamat, kelompok ini merupakan ester asam H-metilkarbamat. Bekerja menghambat asetilkolinesterase. Tetapi pengaruhnya terhadap enzim tersebut tidak berlangsung lama, karena prosesnya cepat reversibel. Apabila timbul gejala tidak bertahan lama dan cepat kembali normal. Pestisida kelompok ini dapat bertahan dalam tubuh antara 1 sampai 24 jam sehingga cepat diekskresikan.
4. Piretroid dan yang berasal dari tanaman lainnya piretroid berasal dari piretrum diperoleh dari bunga *Chrysanthemum cinerariaefolium*. Insektisida tanaman lain adalah nikotin yang sangat toksik secara akut dan bekerja pada susunan saraf. Piretrum mempunyai toksisitas rendah pada manusia tapi menimbulkan alergi pada orang yang peka (Okvitasari & Anwar, 2017).

b. Fungisida

Fungisida merupakan bahan yang mengandung senyawa kimia beracun dan bisa digunakan untuk memberantas dan mencegah

fungi/cendawan. Cendawan ini merusak tanaman dengan berbagai cara. Misalnya sporanya masuk kedalam bagian tanaman lalu mengadakan pembelahan dengan cara pembesaran sel yang tidak teratur sehingga menimbulkan bisul-bisul (Himmawan, 2016).

c. Herbisida

Herbisida merupakan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan gulma atau tumbuhan pengganggu yang tidak dikehendaki. Karena herbisida aktif terhadap tumbuhan, maka herbisida bersifat fitotoksik.

Tabel 2.1 Daftar Pestisida yang digunakan oleh Petani

Pestisida	Golongan	Jenis Pestisida
<i>WHO Grade Ib</i>		
Beta Siflur	Pyrethroid	Insektisida
Karbofuran	Carbamate	Insektisida
Metamidofos	Organophosphate	Insektisida
Triazophos	Organophosphate	Insektisida
<i>WHO Grade II</i>		
Alfa Sipermetrin	Pyrethroid	Insektisida
Amitranz	Formamidine	Insektisida
Bifenthrin	Pyrethroid	Insektisida
Deltametrin	Pyrethroid	Insektisida
Difenokonazol	Azone	Insektisida
Dimehypo/Bensultup	Nereistoxin	Insektisida
Analogue		
Fenpropathrin	Pyrethroid	Insektisida
Fipronil	Pyrazole	Insektisida
Imidakloprid	Neonicotinoid	Insektisida
Karbonsulfan	Carbamate	Insektisida
Katap Hidroksida	Nereistoxin	Insektisida
Analogue		
Klofenapir	Pyrazol	Insektisida
Pestisida	Golongan	Jenis Pestisida

Lamda Sihalotrin	Pyrethroid	Insektisida
MICP/Isoprokard	Carbamate	Insektisida
Permethrin	Pyrethroid	Insektisida
Profenpos	Organophosphate	Insektisida
WHO Grade III		
Cyromazine	Triazin	Insektisida
Diafenthuron	Urea	Insektisida
Iprodione	Dicarboximide	Insektisida
WHO Grade IV		
Klorantraniliprol	Diamide	Insektisida
Klorfuazuro	Urea	Insektisida
Klorpirifos	Organophosphate	Insektisida

Adapun jenis-jenis pestisida dan potensi bahaya bagi kesehatan menurut Pesticide Action Network (PAN) Indonesia dalam (Habibi, 2009) adalah sebagai berikut :

1. *Asefat Insektisida* berpotensi menimbulkan kanker, mutasi gen, kelainan alat reproduksi
2. *Aldikard Insektisida*, sangat beracun pada dosis rendah
3. *BHC Insektisida* berpotensi menimbulkan kanker, beracun pada alat reproduksi
4. *Kaptan Insektisida* berpotensi menimbulkan kanker, mutasi gen
5. *Karbaril Insektisida* berpotensi menimbulkan mutasi gen, kerusakan ginjal
6. *Klorbensilat Insektisida* berpotensi menimbulkan kanker, mutasi gen, keracunan obatreproduksi.
7. *Klorotalonil Fungisida* berpotensi menimbulkan kanker, keracunan alat reproduksi
8. *Klorpropamid Herbisida* berpotensi menimbulkan kanker, mutasi gen, pengaruh kronis

9. *Siheksatin Insektisida* Karsinogen.

10. *DDT Insektisida* berpotensi menimbulkan cacat lahir, pengaruh kronis.

3. Cara penyemprotan pestisida

Berdasarkan peralatan semprot, Tangki/Pompa semprot. Berikut Proses persiapan air pestisida pelarut adalah sebagai berikut

- a. Pakai air bersih seperlunya
- b. Gunakan pH meter nitrit untuk mengukur pH air
- c. Jika pH air > 7 , tambahkan asam nitrat seperlunya
- d. Ukur kembali pH air tersebut, jika pH < 7 , maka dia bisa menggunakan air membuat larutan pestisida

Operasi afikasi cairan semprotan belakang adalah:

- a. Tuang pestisida ke dalam ember berisi air
- b. Aduk merata
- c. Tuangkan cairan semprotan ke tangki semprot

Tujuannya adalah untuk melakukan proses pengadukan dengan benar untuk mendapatkan larutan yang seragam, sebab itu larutan semprot tidak akan seragam sehingga efektivitas pestisida akan berkurang. Jika menggunakan alat penyemprot bertekanan tinggi (penyemprot listrik), terlebih dahulu encerkan pestisida tambahkan air dalam mangkuk kecil dan aduk hingga merata. Selanjutnya siapkan wadah lebar (ember) dan tambahkan air ke volume yang dibutuhkan. Secara bertahap tambahkan larutan pestisida encer ke dalam ember berisi air bersih dan aduk hingga larutan pestisida merata (Moekasan & Prabaningrum, 2011).

4. Frekuensi (n) Penyemprotan

Dibandingkan dengan penyemprotan 2 kali seminggu, petani yang menyemprot melebihi seminggu 2x hampir 14 lebih kali mungkin mengalami keracunan pestisida. Interval waktu yang singkat dan sering terpapar pestisida akan meningkatkan jumlah residu pestisida dalam tubuh. Semakin lama pestisida terakumulasi dalam tubuh maka akan menimbulkan gejala keracunan pestisida (Pradaningrum dkk., 2021).

5. Waktu Penyemprotan

Waktu terbaik untuk menyemprot dibagi menjadi dua, yaitu sebelum jam 11 pagi dan setelah jam 3 sore. Ada sejumlah hal yang mesti diingat pada saat penyemprotan, yaitu berkaitan dengan tubuh berkeringat, terutama pada siang hari dipengaruhi oleh suhu ruangan. Tidak dianjurkan untuk melakukan kegiatan penyemprotan saat angin kencang, dan tidak cocok untuk menyemprot saat hujan atau hujan dan embun pagi telah hilang. Dibandingkan dengan perilaku penyemprotan pestisida setelah pukul 11.00 dan sebelum pukul 15.00 adalah 3,535 kali (Pradaningrum dkk., 2021).

6. Lama penyemprotan

Waktu penyemprotan adalah waktu yang dibutuhkan petani untuk menyemprot 5.604 kali sehari kurang dari 2 jam. Risiko keracunan organofosfat adalah 5.604 kali lipat dari penyemprotan lebih dari dua jam sehari. Semakin lama waktu penyemprotan, semakin banyak pestisida yang terpapar dan semakin besar risiko keracunan (Pradaningrum dkk., 2021).

7. Lama Kerja

Waktu kerja normal seseorang umumnya 6-10 jam. Jam kerja yang panjang dapat menyebabkan kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan kerja (Okvitasari & Anwar, 2017).

Semakin lama masa tanam, semakin tinggi Frekuensi (n) penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida biasanya berdampak pada keracunan akut petani. Hal ini terjadi karena semakin lama petani menyemprot secara terus menerus maka kadarnya semakin masuk ke dalam tubuh. Paparan berulang ini akan menyebabkan zat beracun menumpuk di dalam tubuh, sehingga melebihi ambang batas keracunan dan menyebabkan paparan pestisida (Yuniastuti, 2018).

8. Masa Kerja

Waktu kerja seseorang adalah bagian dari penyebab terjadinya kadar kolinesterase dalam darah petani. Semakin lama waktu kerja maka semakin rendah kadar kolinesterase dalam darah seseorang sehingga meningkatkan risiko keracunan pestisida. Akibat yang tidak diinginkan dari kontak dengan pestisida ini adalah toksinisasi. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin lama petani bekerja, semakin rendah aktivitas kolinesterase dalam darah. Petani sayuran yang telah terpapar pestisida dalam waktu lama atau terus menerus berada pada risiko keracunan berikutnya (Yuniastuti, 2018).

B. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Kolinesterase (indikator keracunan pestisida)

1. Pengertian Aktivitas Kolinesterase

Aktivitas *kolinesterase* adalah jumlah enzim *kolinesterase* aktif di dalam plasma pestisida *organofosfat*.

Menurut Depkes RI, Jakarta 1993, *kolinesterase* adalah suatu enzim yang didalam jaringan tubuh yang berperan untuk menjaga agar otot kelenjar dan sel- sel saraf dapat bekerja secara terorganisir dan harmonis. Ketika seseorang keracunan *organofosfat* atau *karbamat*, tingkat *kolinesterase* akan turun.

Ada dua tipe *kolinesterase* dalam darah, yang satu terdapat dalam sel darah merah dan satunya dalam plasma darah. Karena itu ada dua tipe tes *kolinesterase*, tes aktivitas *kolinesterase* yang ada dalam sel darah merah merupakan tes yang lebih baik karena dapat memberikan petunjuk pada dokter perawatan yang paling efektif.

2. Pemeriksaan Cholinesterase

Pemeriksaan kolinesterase digunakan untuk:

- a. Penapisan terhadap pasien dengan kecurigaan sensitif terhadap bahan *anestesi succinylcholine (suxamethonium)*. Penapisan dapat ditujukan baik pada pasien pra operasi dengan kecurigaan primer genetik maupun sekunder karena paparan terhadap *insektisida*. Sedangkan Pada pasien dengan aktivitas *kolinesterase* yang rendah baik secara genetik maupun sekunder karena paparan *insektisida*, pemeriksaan *kolinesterase* pra operasi ini bertujuan untuk mencegah atau mengevaluasi efek-efek akibat pemberian anestetik *succinylcholine* yang dapat menyebabkan apnea yang berlanjut setelah pembedahan (*prolonged apnea*). Pada pasien dengan aktivitas *kolinesterase plasma* yang rendah, *succinylcholine* dalam jumlah yang sangat sedikit pun (0,04-0,06 mg/kg) dapat mengakibatkan 90% blokade *neuromuscular* (Heckman dkk., 2018).
- b. Monitoring keracunan *insektisida organofosfat* dan *karbamat*. Aktivitas enzim *kolinesterase* akan menurun. Untuk dapat mengevaluasi dengan baik, nilai dasar pasien sebelum paparan seharusnya telah diperiksa dahulu. Keadaan klinis yang dapat mengindikasikan pemeriksaan ini yaitu paparan pestisida dengan gejala terutama *miosis*, penglihatan kabur, kelemahan otot, *twitching* dan *fasciculation*, *bradikardi*, *nausea*, diare, mual, banyak mengeluarkan air liur, berkeringat, edema paru, *aritmia* dan kejang. Manfaat pemeriksaan *kolinesterase* sebagai status risiko pada pasien yang terpapar *insektisida*

organofosfat masih dipertanyakan. Apakah nilai normal mengindikasikan kepastian tidak adanya paparan dan bagaimana pada varian genetik dengan atau tanpa paparan. Interpretasi masih menjadi problem pada aktivitas enzim *kolinesterase* rendah atau tinggi. Studi keluarga dapat dilakukan pada individu dengan tipe abnormal genetik defisiensi *pseudokolinesterase serum*, yang idealnya dikonfirmasi dengan *fenotip*

3. *Kolinesterase* sebagai indikator keracunan


a. Mekanisme pestisida dalam tubuh.

Rute penyerapan pestisida atau : “*port d’entry*” dalam tubuh melalui tiga cara yaitu kulit, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan. Pestisida yang telah diabsorpsi masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme dan didistribusikan ke dalam jaringan dan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui urin, pestisida yang didistribusikan dan disimpan ke dalam jaringan lemak, dengan demikian *biotransformasi* di dalam bagian tubuh akan terdapat di dalam darah, urin, jaringan lemak dan sebagainya. Setelah diserap usus, maka substansi *lipophilicya* akan diekskresikan ke dalam empedu sebagai akibat sirkulasi *enterohepatik*.

Di seluruh sistem persyarafan (*the nervous system*) terdapat pusat-pusat pengaliran elektro *chemical* yang dinamakan *synapses* dimana getaran-getaran syaraf *electrochemist* di bawah menyeberangi antar sebuah sel saraf (*neuron*) dan sebuah otot dari *neuron*. Karena getaran syaraf (sinyal) mencapai suatu sinapses, sinyal itu merangsang pembebasan *acetylcholine* (ACH). *Acetylcholine* berperan sebagai jembatan penyeberangan bagi mengalirnya getaran sinyal (*new impulse*) setelah impuls saraf oleh *acetylcholine* dipindahkan (diseberangkan) melampaui kesenjangan, enzim kolinesterase ini memecahkan *acetylcholine* dengan cara menghidrolisis *acetylcholine* menjadi *choline* dan asam asetat, impuls saraf kemudian

berhenti, reaksi-reaksi ini sangat cepat ketika pestisida *organophosphat* dan *karbamat* memasuki tubuh manusia pestisida ini akan menempel pada enzim *kolinesterase* di dalam darah. Karena kolinesterase tidak dapat memecahkan *acetylcholine*, maka impuls saraf mengalir terus (konstan) menyebabkan suatu kontraksi otot yang cepat dan akhirnya mengarah kepada kelumpuhan. Depresi dari aktivitas *kolinesterase* kenyataan yang paling jelas adanya penyerapan yang berlebihan dan pestisida *organophosphat* dan *karbamat* secara sederhana (Hardi dkk., 2020).

Skema reaksi dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 2.1 :Skema reaksi *kolinesterase* dengan pestisida *organophosphatedan karbamat*

b. Keracunan pestisida.

Keracunan pestisida secara subklinik dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan aktivitas *kolinesterase* darah seseorang dengan menggunakan alat tintometer kit. Aktivitas *kolinesterase* darah seseorang yang diperiksa dapat dinyatakan sebagai sesuatu persentase dari aktivitas *kolinesterase* darah normal. Berdasarkan pemeriksaan aktivitas *kolinesterase* darah maka dapat ditentukan keracunan seseorang sebagai berikut, (Depkes RI, 1993) :

1. 75 % - 100 % dari normal, tidak ada tindakan tetap perlu diuji ulang dalam waktu dekat, kelompok ini termasuk kategori normal atau tidak keracunan.
2. > 50 % - < 75 % dari normal, kemungkinan *over exposure* perlu di uji ulang jika respon lemah, maka disarankan untuk istirahat (tidak kontak dengan pestisida), selama dua minggu, kemudian diuji ulang sampai mencapai normal, kelompok ini masuk kategori keracunan ringan.
3. > 25 % - 50 % dari normal, *over exposure* serius perlu diulangi pengujian, jika benar perlu diistirahatkan dari segala pekerjaan yang berkenaan dengan pestisida. Kelompok ini masuk kategori keracunan sedang.
4. 0 % - 25 % dari normal *over exposure* yang sangat serius perlu diuji ulang dan yang bersangkutan harus diistirahatkan dari semua pekerjaan dan perlu segera dirujuk ke pemeriksaan medis. Berdasarkan keracunan tersebut dapat menentukan suatu tindakan untuk mencegah keracunan oleh pestisida.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi turunnya aktivitas kolinesterase darah.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas *kolinesterase* darah adalah sebagai berikut :

- a. Umur, semakin tua umur seseorang akan memiliki aktivitas *kolinesterase* rata-rata lebih rendah.
- b. Gizi, seseorang yang memiliki tingkat gizi yang baik cenderung memiliki rata-rata aktivitas *kolinesterase* lebih tinggi.
- c. Pengetahuan, seseorang yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang penggunaan pestisida cenderung memiliki rata-rata aktivitas *kolinesterase* yang normal.

- d. Personal hygiene, seseorang yang memperhatikan kebersihan tubuhnya setelah melakukan penyemprotan cenderung memiliki rata-rata aktivitas *kolinesterase* yang normal
- e. Keluhan-keluhan kesehatan, seseorang yang sering mengalami gangguan kesehatan (keluhan subyektif) setelah melakukan penyemprotan cenderung mengalami penurunan aktivitas *kolinesterase*.
- f. Kadar hemoglobin, seseorang yang memiliki kadar hemoglobin yang baik cenderung memiliki rata-rata aktivitas *kolinesterase* lebih tinggi pula.
- g. Jenis kelamin, wanita memiliki rata-rata kadar aktivitas *kolinesterase* lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.
- h. Penyakit, seseorang yang menderita penyakit kronis seperti penyakit hati (*hepatitis*) cenderung memiliki resiko tinggi (*high risk*) bila bekerja dengan pestisida *organophosphate* dan *karbamat*.
- i. Tinggi tanaman yang disemprot, makin tinggi tanaman yang disemprot petani cenderung mendapatkan paparan yang lebih besar.
- j. Posisi penyemprot, petani yang melakukan penyemprotan selalu berlawanan arah angin, cenderung mendapatkan paparan yang lebih tinggi.
- k. Pemakaian alat pelindung diri (APD), petani yang memiliki pelindung diri yang baik, cenderung mendapatkan paparan yang lebih rendah.
- l. Dosis, penggunaan dengan dosis yang lebih tinggi cenderung mendapatkan resiko lebih besar.
- m. Luas lahan, petani yang memiliki luas lahan yang lebih luas, cenderung mendapatkan paparan yang lebih besar.
- n. Frekuensi (n) penyemprotan, petani yang mempunyai Frekuensi (n) penyemprotan lebih banyak, cenderung mendapatkan resiko yang lebih

tinggi.

- o. Lama kerja, petani yang bekerja lebih dari 5 jam/hari terpapar pestisida, cenderung mendapatkan resiko yang lebih tinggi.
- p. Masa kerja, petani sayur pengguna pestisida yang bekerja sudah lama/ bertahun-tahun, cenderung mendapatkan resiko yang lebih tinggi.

C. Tinjauan Teori tentang personal hygiene

1. Definisi Personal Hygiene

Dikutip dari Riska & Asbath,(2018) dalam sulistyono,2012 Kebersihan pribadi berasal dari Yunani bermakna Personal berarti pribadi dan hygiene berarti kesehatan. Personal hygiene seseorang adalah cara perawatan diri seseorang untuk menjaga kesehatannya berupa kebersihan diri, pembersihan pakaian, pembersihan tempat tidur, dan lain-lain. Tujuan penerapan personal hygiene ialah agar mengurangi lemak, keringat, sel-sel mati dan bakteri, meniadakan bau badan, menjaga keutuhan permukaan kulit dan melancarkan peredaran darah.Sirkulasidarahseseorang,dan untuk meningkatkan dan menjaga kesehatan seseorang.Menjaga kebersihan adalah keharusan bagi semua orang, apalagi di masa pandemi seperti ini.Kita harus selalu menjaga kebersihan agar terhindar dari morbiditas. Rasulullah SAW memperagakan kebersihan diri dan cara menjaga kebersihan. Umat islam sangat membutuhkan kebersihan setiap saat, karena kebersihan, kesucian dan keindahan adalah hal yang disenangi oleh Allah SWT. Sebagaimana pada QS Al-baqarah:2/222 yang bunyinya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ...

Terjemahnya :

”Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

Dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar membuat kegiatan badan menjadi lebih bernilai. Tidak hanya menaati perintah dan dicintai Allah, tetapi menjaga kebersihan juga baik. Hal ini sejalan dengan Hadits Riwayat Muslim yang berbunyi

الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya :

“*Bersuci (Thaharah) itu adalah setengah dari iman*” (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi)

Umat Islam sangat membutuhkan kebersihan setiap saat, karena kebersihan, kesucian dan keindahan adalah hal yang disenangi oleh Allah. Agar terhindar dari penyakit dermatitis, perlu untuk tetap menjaga kebersihan personal khususnya pada petani, seperti :

- a) Mencuci tangan, Salah satu tindakan pribadi yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan dan kaki setelah bekerja. Tangan adalah bagian tubuh yang paling terbuka gunakan bahan kimia, sehingga mudah teriritasi. Kebiasaan mencuci tangan yang baik akan membantu membersihkan kotoran dan bahan kimia yang menumpuk pada kulit (Riska & Asbath, 2018).
- b) Mencuci pakaian, setelah menggunakan pestisida lepaskan pakaian kerja secara terpisah dari pakaian rumah tangga untuk menghindari terjadinya kejadian dermatitis pada keluarga (Maden dkk., 2015).
- c) Mandi atau bilas segera setelah bekerja dengan menggunakan pestisida (Maden dkk., 2015).

2. Tujuan *Personal Hygiene*

- a) Meningkatkan kesehatan
- b) Menjaga kebersihan diri
- c) Meningkatkan kebersihan diri pribadi
- d) Pencegahan penyakit
- e) Memperkuat kepercayaan diri
- f) Menciptakan keindahan

D. Tinjauan Teori Tentang Alat Pelindung Diri (APD)

1. Pengertian Alat Pelindung diri (APD)

Alat pelindung diri adalah alat yang dipakai untuk menjaga petani dari cedera atau morbiditas yang disebabkan oleh paparan bahaya di tempat kerja. Baik kimia, biologi, radioaktif, fisik, listrik, mekanik atau lainnya (Lisnawatidkk., 2016). Dikutip dari A.Sayanto dkk., (2014) dalam suma'mur,2009. APD tidak dapat menghilangkan atau mengurangi risiko. Peralatan hanya memangkas besaran sentuhan dengan hazard dengan menaruh penghambat disela pekerja dan hazard.

2. Macam-macam Alat Pelindung Diri

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permenakertrans) Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri yaitu :

a) Pelindung Pernafasan

Perlengkapan penyokong pernafasan dan perlengkapannya ialah alat pelindung yang menaungi bagian pernafasan dengan mengarahkan hawa suci dan fit dan/atau menapis polutan kimia, bakteri, abu, terang laras (aerosol), setum, dan gas (Zuraida, 2012)

b) Alat Pelindung Tangan.

Protector tangan (*glove*) ialah aparat protector yang dipakai untuk

menaungi tangan dan jemari dari api, panas, suhu rendah, radiasi elektromagnetik, radiasi pengion, arus listrik, bahan kimia, sengatan listrik, tubrukan dan goresan serta infeksi parasit dan jenis mikroorganisme (Correlation dkk., 2019).


c) Pakaian pelindung

Pakaian pelindung digunakan untuk meneduhi separuh hingga semua tubuh dari suhu tinggi atau rendah yang lewat batas, eksplikasi bara dan barang panas, bahan kimia termal, eceran dan metal, uap panas, mesin, peralatan dan benturan bahan, luka, radiasi, binatang, manusia, mikroorganisme parasit binatang, tumbuhan dan zona seperti virus, kuman dan serat (Fajriani dkk., 2019).

d) Alat pelindung kaki


Alat pelindung kaki dipakai dalam melingkupi kaki dari benda berat terhimpit atau terantuk, benda tajam tercacak, kontak dengan eceran panas atau dingin, uap panas, paparan cuaca yang bahaya, paparan bahan bala kimia dan mikroba juga terhindar dari terpeleset (Fajriani dkk., 2019).

E. Kerangka Teori



Bagan 2.1 kerangka teori

Sumber : (Moekasan & Prabaningrum, 2011), (Pradaningrum dkk., 2021), (Oktaviani & Pawenang, 2020), (Yuniastuti, 2018), (Fajriani dkk., 2019).



Bagan 2.2 : Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian *cross sectional study*. Penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan antara keracunan pada petani sayur berdasarkan lama kerja, masa kerja, cara penyemprotan, *personal hygiene* dan penggunaan APD. Selain itu akan dilihat bagaimana karakteristik seperti umur, pendidikan dan jenis pestisida yang digunakan oleh petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia Kec.Tombolo Pao

B. Tempat dan waktu penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian ini di Desa Kanreapia Dusun Kanreapia Kec.Tombolo Pao Kab.Gowa. Penelitian ini dilakukan pada bulan juni 2022. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Kanreapia berprofesi sebagai petani sayur dan menggunakan pestisida.

C. Populasi dan sampel

Adapun jumlah petani pada Desa Kanreapia dengan jumlah petani sebanyak 80 Orang. Sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 petani sayur yang ada di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling*.

Kriteria Inklusi :

1. Petani dengan jenis kelamin laki-laki
2. Berusia 25-55 tahun

3. Bersedia menjadi responden

Kriteria Eksklusi

1. Petani dengan masa kerja 2 tahun
2. Petani dengan jenis kelamin perempuan
3. Tidak bersedia menjadi responden

Jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Taro Yamane dan Slovin. Apabila populasi telah diketahui maka teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus *Taro Yamane* dan *Slovin*, rumus tersebut sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1.80} = \frac{80}{(0,1)^2 + 1.80} = \frac{80}{1,8} = 44$$

Keterangan :

n= Jumlah Sampel

N = Jumlah Poulasi

d²= Presisi (10%)

Type equation here.

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan rumus Taro Yamane dan Slovin adalah 44 Sampel.

D. Teknik pengumpulan data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, tanya jawab, dan pemberian kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dikelola melalui aplikasi SPSS.

2. Data Sekunder

Data sekunder ditemukan dari buku maupun jurnal penelitian, dan juga dokumen-dokumen atau data yang diberikan oleh para petani.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan peralatan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian menurut Indira (2016). Dalam penelitian ini instrumen penelitian yang digunakan peneliti adalah kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang berisikan pertanyaan atau pernyataan peneliti yang akan dijawab oleh responden.

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah lembar kuesioner untuk mengetahui keracunan pestisida, lama kerja, masa kerja, cara penyemprotan, personal hygiene, dan penggunaan APD. Sedangkan data karakteristik terdiri dari 4 butir pertanyaan yaitu, nama inisial, umur, pendidikan terakhir dan jenis pestisida yang digunakan.

F. Instrumen Pengumpulan Data

1. Uji Enzim Cholinesterase

a) Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah tintometer kit (*Lovibond comparator 2000+*), Kapas alkohol 70%, kapas kering, lanset, pipet mikro, tabung reaksi, rak, label nama, cuvet, *yellow tip autoclik*, komperator dan *stopwatch*. Bahan yang digunakan adalah Sampel darah kapiler, alkohol 70%, *acetylcholine perlorate*, *aquades* bebas CO₂, larutan *bromtymolblue*.

b) Pembuatan Reagen

Indikator solution BTB 0,5 g di larutkan dalam 250 ml *distillated water* (*Free CO₂*) ketetapan konsentrasi cukup penting dalam pembuatan larutan indikator. *Substrate solution* ACP 0,25 gram dilarutkan dalam 50 ml *distillate water* (*Free CO₂*) konsentrasi tidak terlalupenting dalam pembuatan larutan namun larutan harus selalu baru. *Aquades* bebas *CO₂* dipanaskan *aquades* dalam *beaker glass* dengan penutup kira-kira 10 menit didinginkan.

c) Pengambilan Sampel

Persiapkan pasien yang telah membersihkan diri setelah melakukan penyemprotan (mandi), siapkan alat dan bahan yang digunakan, bersihkan jari yang akan ditusuk dengan menggunakan kapas alkohol 70%, lalu keringkan setelah kering. tusuk jari menggunakan lanset, darah yang keluar pertama dibuang dengan kapas kering, darah kedua baru ambil dengan menggunakan pipet mikro sebanyak 10 μ l darah yang diambil dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah dicampurkan larutan, kemudian dihomogenkan.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti (Sugiyono, 2016). Validitas sebagai salah satu derajat ketepatan atau keandalan pengukuran instrumen mengenai isi pertanyaan.

Uji validitas ini dilakukan untuk mengukur apakah data yang telah didapat setelah penelitian merupakan data yang valid atau tidak, dengan menggunakan alat ukur yang digunakan (Kuesioner). Pengukuran validitas dilakukan dengan cara mengisi butir soal dimana skor yang ada pada setiap butir soal dikorelasikan dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah product moment menggunakan program aplikasi pengolah data statistik SPSS.

Uji validitas untuk instrumen penelitian akan dilakukan di lokasi penelitian dengan karakteristik responden yang sama. Instrumen penelitian yang akan diuji validitas adalah kuesioner cara penyemprotan, *Personal Hygiene* dan Penggunaan APD. Peneliti melibatkan sebanyak 44 responden untuk uji validitas pada instrumen penelitian ini.

2. Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2017) variabel dikatakan baik apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6 (Priyatno, 2017). Uji reliabilitas Cronbach's Alpha merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam

menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner.

H. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Peneliti telah melakukan uji validitas pada instrumen cara penyemprotan, *Personal Hygiene* dan penggunaan APD pada 30 responden. Peneliti menggunakan uji validitas *Product Moment*, yaitu uji validitas = r hitung (*Corrected Item-Total Correlation*) > r tabel. R tabel dapat diketahui dari *degree of freedom* (df) = n-2 yaitu 0.3061. dari hasil uji validitas ini terdiri atas 3 instrumen yaitu cara penyemprotan, *Personal Hygiene* dan penggunaan APD.

Pada instrumen cara penyemprotan yang terdiri atas 4 pertanyaan berdasarkan uji validitas didapatkan hasil r hitung 0,6429-0,7845 (> dari r tabel 0,3061) yang berarti bahwa 4 pertanyaan dinyatakan valid. Pada instrumen *Personal Hygiene* terdiri dari 5 pertanyaan berdasarkan uji validitas didapatkan hasil r hitung 0,6624-0,8339 (> dari r tabel 0,3061) yang berarti 5 pertanyaan dinyatakan valid. Pada instrumen penggunaan APD terdiri dari 6 pertanyaan dari uji validitas didapatkan hasil r hitung 0,6584 – 0,7813 (> dari r tabel 0,3061) yang berarti seluruh pertanyaan dinyatakan valid.

Kuesioner dalam penelitian ini telah diuji reliabilitasnya dengan menggunakan *Alpha Cronbach* dengan nilai r- 0,643 (> dari 0,6) artinya instrument *reliable*, pada kuesioner cara penyemprotan, nilai r- 0,791 (> dari 0,6) artinya instrument *Reliable* pada kuesioner *Personal Hygiene*, Nilai r- 0,

794 (> dari 0,6) artinya instrument *Reliable* pada kuesioner penggunaan APD.

I. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Semua fakta yang didapat, termasuk data primer dan sekunder, diselesaikan dengan susunan sebagai berikut:

a. Menata Data (*Editing*)

Sebelum pengolahan data perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu, dengan memverifikasi kelengkapan dan konsistensi kuesioner, verifikasi ini dapat dilakukan saat pengumpulan data di tempat.

b. Mengkode Data (*Coding*)

Coding adalah suatu kegiatan yang memberikan kode-kode untuk tanggapan terhadap kuesioner yang ada untuk mempengaruhi proses pengolahan yang terkomputerisasi.

c. Memasukkan Data (*Entry*)

Setelah dilakukan coding lalu diolah dalam program komputer

d. Membersihkan Data (*Cleaning*)

Memeriksa data yang telah dimasukkan agar menciptakan data yang sesuai.

2. Analisis Data

Keterangan yang didapatkan diolah dan menyatakan dalam bentuk tabel dan disertakan dengan penjelasan variabel yang merupakan faktor yang dapat menyebabkan gejala keracunan pestisida pada petani sayur menggunakan program SPSS.

a. Analisis Univariat

Analisis Univariat ini bertujuan untuk memaparkan karakteristik dari

variabel Independen dan dependen dimana seluruh data pada kuesioner diolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi (n).

b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan analisis uji *Chi-Square*. Melalui Uji *Chi-square* maka akan didapatkan nilai *P*, dimana dalam penelitian ini digunakan tingkat kemaknaan sebesar 0.05. Jadi penelitian antara dua variabel dikatakan bermakna jika mempunyai nilai $p \leq 0.05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dan dikatakan Tidak bermakna apabila nilai $p \geq 0.05$ yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak.

J. Etika Penelitian

Etika penelitian adalah hubungan timbal balik antara peneliti dan orang yang diteliti sesuai dengan prinsip etika (Notoatmodjo, 2018). Masalah etika yang harus diperhatikan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut

1. *Informed Consent* (Persetujuan Responden)


Informed consent dilakukan melalui instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner yang disebarkan secara langsung dengan menjelaskan kepada responden tujuan yang dilakukan pada penelitian ini. Jika subjek tidak mengisi kuesioner peneliti tidak boleh memaksa subjek dengan tindakan lainnya agar tetap menghormati hak yang dimiliki responden.

2. *Anonymity* (Tanpa Nama)

Dengan menjaga kerahasiaan responden pada kuesioner, responden tidak disebutkan namanya karena peneliti hanya meminta memasukkan kode atau inisial dari nama responden, seperti (N) sebagai upaya untuk menjaga kerahasiaan responden.

3. *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Peneliti harus memastikan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dengan hanya menunjukkan data yang didokumentasikan sebagai hasil studi. Ketika hasil diberikan, data yang tidak diperlukan oleh peneliti tidak disertakan, sehingga kuesioner yang digunakan, untuk melihat fenomena kecemasan, pada saat selesai mempresentasikan hasil penelitian dihilangkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kanreapia berasal dari dua kata yaitu “kanre” dan “api” yang artinya “terbakar” dan “api”. Menurut cerita leluhur orang tua, nama tersebut mulai dikenal saat daerah ini terbakar pada tahun 1921 dan abadi menjadi nama KANREAPIA sampai sekarang. Menjadi desa persiapan pada tahun 1985 dan definitif menjadi Desa Kanreapia pada tahun 1990.

Wilayah Desa Kanreapia secara umum mempunyai letak geografis berupa daerah daratan dan perumahan rakyat, pertanian, serta hutan selanjutnya, kondisi alam Desa Kanreapia yang merupakan daerah pegunungan, dengan panorama alam serta cuaca yang dingin. Oleh karena itu, Desa Kanreapia sangat cocok sebagai tempat bagi orang yang memiliki hobby outbound serta menjadikan Desa Kanreapia sebagai tempat beristirahat atau tempat untuk memulihkan kesehatan.

Desa Kanreapia secara geografis berada di ketinggian antara 600-1050 dpl (diatas permukaan laut) dengan keadaan curah hujan rata-rata dalam setahun antara 150 hari s/d 200 hari, serta suhu rata-rata setahun adalah 30 s/d 50 °C. Secara administrasi Desa Kanreapia terletak di wilayah Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa.

1. Demografi / Batas Desa

- | | |
|--------------------|---|
| Disebelah utara | : berbatasan dengan desa Tonasa |
| Di Sebelah selatan | : berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba |
| Disebelah Barat | : berbatasan dengan kecamatan Tinggimoncong |
| Disebelah Timur | : berbatasan dengan Bolaromang |

2. Jarak

Jarak dari ibu kota Kecamatan 14 Km

Jarak dari ibu kota Kabupaten 84 Km

Jarak dari ibu kota Provinsi 94 Km

3. Luas wilayah Desa dalam tata guna lahan

Luas wilayah Desa Kanreapia 17.75 Km persegi terdiridari:

Tabel 4.1 luas wilayah desa Kanreapia

No	Wilayah	Luas (%)
1	Persawahan	153,0ha(8,6%)
2	Lahanperusahaan/HGU	120,0ha(6,8%)
3	BadanJalan	13,6ha(0,8%)
4	Perumahan,KantordanKebun	1304,2ha(73,5%)
5	Pasardan Terminal	1,5ha(0,1%)
6	Bukit,Hutan,RakyatdanTegalan	135,0ha(7,6%)
7	Sungai,SempadandanPengendali	1,7ha(0,1%)
8	PekuburanMuslim	3,5ha(0,2%)
9	LapanganOlahraga	2,5ha(0,1%)
	JUMLAH	1.775,0ha (100%)

Di Desa Kanreapia secara umum kondisi tanahnya gembur dan subur semua jenis tanaman bisa tumbuh baik berupa tanaman hortikultura maupun tanaman jangka panjang, serta sangat cocok untuk peternakan (Penggemukan Sapi). Wilayah Desa Kanreapia terdiri dari 7 (tujuh) dusun yaitu.

Tabel 4.2 Wilayah Desa Kanreapia

NO	Nama Dusun	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	Bontona	2	4
2	Bontolebang	3	8
3	Kanreapia	2	4
4	Halahalaya	2	6
5	Balang lohe	2	4
6	Parang boddong	3	6
7	Silanggaya	2	4

Jumlah	16	36
---------------	-----------	-----------

Sumber: Kantor Desa Kanreapia Kecamatan Tinggimoncong.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

a) Usia

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pada Petani Sayur Pengguna
Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao Kabupaten
Gowa Tahun 2022

Usia	Frekuensi (n)	Persentase (%)
20-30 Tahun	10	23
31-40 Tahun	13	29
41-50 Tahun	11	25
51-60 Tahun	10	23
Total	44	100

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan usia pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden berusia 31-40 tahun dengan jumlah 13 orang (29%) dan sebagian kecil berusia 20-30 tahun dan 51-60 tahun masing masing sebanyak 10 orang (23%).

b) Pendidikan

Tabel 4.4

**Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Pada Petani Sayur
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao,
Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
SD	19	43
SMP	11	25
SMA	9	21
D3-S1	5	11
Total	44	100

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi (n) berdasarkan pendidikan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden berpendidikan SD dengan jumlah 19 orang (43%) dan sebagian kecil berpendidikan D3-S1 sebanyak 5 orang (11%).

c) Jenis Pestisida

Tabel 4.5
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pestisida Pada Petani Sayur
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao,
Kabupaten Gowa Tahun 2022

Jenis pestisida	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Insektisida	21	48
Fungisida	15	34
Herbisida	8	18
Total	44	100

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa distribusi Frekuensi berdasarkan jenis pestisida yang digunakan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden menggunakan jenis pestisida insektisida dengan jumlah 21 Orang (48%) dan sebagian kecil menggunakan jenis pestisida herbisida dengan jumlah 8 orang (18%).

2. Analisis Univariat

a. Kejadian Keracunan

Tabel 4.6
Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Keracunan Pada Petani Sayur
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao,
Kabupaten Gowa Tahun 2022

Keracunan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak keracunan	17	39
Keracunan	27	61
Total	44	100

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan kejadian keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden mengalami keracunan dengan jumlah 27 Orang (61%) dan sebagian kecil tidak mengalami keracunan dengan jumlah 17 orang (39%).

b. Lama Kerja

Tabel 4.7
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Kerja Pada Petani Sayur
Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao,
Kabupaten Gowa Tahun 2022

Lama kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Lama (≤ 8 Jam)	7	16
Lama (≥ 8 Jam)	37	84
Total	44	100

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan lama kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden tidak lama (< 8 Jam) dengan jumlah 37 orang (84%) dan sebagian kecil lama ($>$ jam) dengan jumlah 7 orang (16%).

c. Masa Kerja

Tabel 4.8
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa Tahun 2022

Masa kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baru (<6 tahun)	15	34
Lama (>6 Tahun)	29	66
Total	44	100

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan masa kerja pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden lama dengan jumlah 29 orang (66%) dan sebagian kecil responden baru dengan jumlah 15 orang (34%)

d. Cara penyemprotan

Tabel 4.9
Distribusi Responden Berdasarkan Cara penyemprotan Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa Tahun 2022

Cara penyemprotan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Memenuhi Syarat	29	66
Tidak Memenuhi Syarat	15	34
Total	44	100

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa distribusi Frekuensi) berdasarkan cara penyemprotan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden memenuhi syarat dengan jumlah 29 orang (66%) dan sebagian kecil tidak memenuhi syarat dengan jumlah 15 orang (34%).

e. *Personal Hygiene*

Tabel 4.10
Distribusi Berdasarkan Personal Hygiene Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa

Tahun 2022

<i>Personal hygiene</i>	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Memenuhi Syarat	22	50
Tidak Memenuhi Syarat	22	50
Total	44	100

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan *Personal Hygiene* pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagian besar responden memenuhi syarat dengan jumlah 22Orang (50%) dan sebagian kecil tidak memenuhi syarat sebanyak 22 orang (50%).

f. Penggunaan APD

Tabel 4.11
Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan APD Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa Tahun 2022

Penggunaan APD	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lengkap	24	55
Tidak Lengkap	20	45
Total	44	100

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa distribusi frekuensi berdasarkan penggunaan APD pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa tahun 2022 sebagian besar responden lengkap dengan jumlah 24 orang (55%) dan sebagian kecil responden tidak lengkap dengan jumlah 20 orang (45%).

3. Analisis Bivariat

a) Analisis kejadian keracunan dan lama kerja

Tabel 4.13
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Lama Kerja

**Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Lama Kerja	Kejadian keracunan						P value
	keracunan		Tidak keracunan		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Lama (< 8 jam)	21	48	16	36	37	84	0,149
Baru (<8 jam)	6	14	1	2	7	16	
Total	27	52	17	38	44	100	

Berdasarkan Tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa petani sayur yang bekerja lebih dari 8 jam sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 21 orang sedangkan petani sayur yang bekerja kurang dari 8 jam sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 6 orang

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, diperoleh nilai *p value* 0,149 ($p = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara lama kerja dan kejadiankeracunanpada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

b) Analisis Keracunan dan masa Kerja

**Tabel 4.14
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Masa Kerja Pada Petani
Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao
Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Masa kerja	Kejadian keracunan						<i>P value</i>
	Keracunan		Tidak keracunan		Total		
	n	%	n	%	n	%	
Baru (<6 Tahun)	7	16	8	19	15	34.	0,150
Lama (>6 Tahun)	20	50	9	20	29	.66	
Total	27	56	17	39	44	100	

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa petani yang bekerja <6 Tahun sebagian besar mengalami tidak mengalami keracunan sebanyak 8 orang sementara petani yang bekerja >6 tahun sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 2 orang

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, didapatkan nilai *p value* 0,150 ($P = > 0,05$) ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan tombolopao, Kabupaten Gowa.

c) Analisis Keracunan dan Cara penyemprotan

Tabel 4.15
Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Cara penyemprotan
Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022

Cara penyemprotan	Kejadian keracunan						<i>P value</i>
	Keracunan		Tidak keracunan		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Memenuhi syarat	13	30	2	5	15	34	0,000
Tidak memenuhi syarat	4	9	25	57	29	66	
Total	17	39	27	61	44	100	

Berdasarkan tabel 4.15 diatas dari 44 responden dapat diketahui bahwa petani yang memenuhi syarat pada cara penyemprotan sebagian besar tidak mengalami mengalami keracunan sebanyak 13 orang dan petani yang

tidak memenuhi syarat pada cara penyemprotan sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 25 orang

Setelah dilakukan uji Statistik dengan *Chi square*, diperoleh nilai *p value* 0,000 ($P = < 0,005$) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara cara penyemprotan dan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

d) Analisis Keracunan dan Personal *Hygiene*

Tabel 4.16

Hubungan Antara Kejadian Keracunan Dan Personal Hygiene Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022

<i>Personal hygiene</i>	Kejadian keracunan						<i>P value</i>
	Keracunan		Tidak keracunan		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Memenuhi syarat	6	14	16	36	22	50	0,000
Tidak memenuhi syarat	21	48	1	2	22	50	
Total	27	52	17	38	44	100	

Berdasarkan tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa petani yang memenuhi syarat pada *Personal Hygiene* sebagian besar tidak mengalami keracunan dengan jumlah 16 orang orang sementara petani yang tidak memenuhi syarat pada *Personal Hygiene* sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 21 orang

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi Square, diperoleh nilai *P Value* 0,000 ($P = < 0,05$) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara personal hygiene dengan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida Desa Kanreapia, kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

e) Analisis Kejadian keracunan dan Penggunaan APD

Tabel 4.17

**Hubungan Antara Keracunan Dan Penggunaan APD
Pada Petani Sayur Pengguna Pestisida Di Desa Kanreapia
Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa Tahun 2022**

Penggunaan APD	Kejadian keracunan						<i>P value</i>
	Keracunan		Tidak keracunan		Total		
	n	%	n	%	N	%	
Tidak lengkap	19	43	1	2	20	45	0,000
Lengkap	8	18	16	36	24	65	
Total	27	61	17	38	44	100	

Berdasarkan Tabel 4.17 diatas dapat diketahui bahwa petani sayur yang menggunakan APD lengkap sebagian besar tidak mengalami keracunan dengan jumlah 16 orang sedangkan petani yang menggunakan APD tidak lengkap sebagian besar mengalami keracunan sebanyak 19 orang.

Setelah dilakukan uji statistik dengan Chi square, diperoleh nilai *p value* 0,000 ($P < 0,05$) ini berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara penggunaan APD dan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini pada Karakteristik Responden didapatkan hasil distribusi pada Jenis pestisida jenis insektisida lebih banyak ditemukan pada kelompok dengan keracunan tinggi sebanyak 2 responden dan keracunan rendah lebih banyak ditemukan pada jenis fungisida dan herbisida masing masing sebanyak 7 responden. Jenis pestisida berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penggunaan pestisida. Ada kelompok dengan keracunan tinggi ditemukan penggunaan pestisida yang lebih beragam dibanding ada kelompok dengan keracunan rendah. Ada kelompok dengan keracunan tinggi jenis pestisida yang digunakan antara lain insektisida, fungisida dan herbisida. Sedangkan pada kelompok dengan

keracunan rendah jenis pestisida yang digunakan hanya fungisida dan herbisida. Madaan (2011) menyatakan bahwa para petani yang terlibat dalam penyemprotan insektisida memiliki penurunan tingkat enzim kolinesterase yang signifikan dibandingkan dengan jenis lainnya. Darcin (2017) juga menyatakan bahwa jenis insektisida memiliki efek yang paling buruk pada kesehatan petani.

Selain insektisida, herbisida juga memberikan dampak bagi kesehatan maupun lingkungan sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Obiri dkk., 2021) menunjukkan bahwa 100% petani menganggap herbisida memiliki efek merusak pada flora (bibit, makanan liar, obat-obatan) dan fauna (mikroorganisme tanah, ikan di sungai) serta kualitas air, struktur tanah dan kesehatan manusia. Selain itu (Mazlan dkk., 2016) melakukan penelitian untuk memperkirakan risiko yang ditimbulkan terhadap petani melalui paparan air permukaan yang mengandung herbisida imazapic ditemukan bahwa meskipun nilai indeks bahaya yang dihitung menunjukkan tingkat risiko minimum, ada kekhawatiran terhadap bahaya paparan jangka panjang kepada petani dari sistem pertanian yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka.

Selain jenis pestisida, Jumlah jenis pestisida yang digunakan dalam waktu penyemprotan akan menimbulkan efek lebih besar bila dibandingkan dengan penggunaan satu jenis pestisida karena daya racun atau konsentrasi pestisida akan semakin kuat sehingga memberikan efek samping yang semakin besar (Samosir dkk., 2017). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Yuniastuti, 2018) sebagian besar petani yang menggunakan pestisida dalam memberantas hama pertanian mengoplos pestisida minimal 3 macam dalam satu kali penyemprotan, dengan alasan agar lebih efektif membasmi hama tanaman tanpa mempertimbangkan bahwa yang

ditimbulkannya. Selain itu penelitian Agustina (2018) juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara jenis pestisida dengan kejadian hipertensi. Petani yang menggunakan pestisida golongan organofosfat dan karbamat memiliki risiko 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang menggunakan pestisida golongan lain.

Dosis pestisida berkaitan dengan bahaya keracunan pestisida, karena itu dalam melakukan kegiatan penyemprotan, petani hendaknya memperhatikan takaran atau dosis yang tertera pada label. Dosis atau takaran yang melebihi aturan akan membahayakan penyemprot itu sendiri. Setia zat kimia ada dasarnya bersifat racun dan terjadinya keracunan ditentukan oleh dosis dan cara pemberian (S. Nurhayati, N. Nur Jazuli, 2018). Sejalan dengan penelitian Marsaulina (2017), yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara dosis pestisidaterhadap kejadian keracunan dengan risiko 2,5 kali lebih besar pada dosis yang tidak sesuai. Selain itu penelitian yang dilakukan (Marete dkk., 2021) sebagian besar petani (65%) memiliki pengetahuan tentang prosedur penanganan pestisida yang aman termasuk membaca label pada kemasan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan sebagian besar petani di Desa Kanreapiajenis insektisida denganmerek dagang seperti Pounce 20 EC, Spring, Abaset sementara pada jenis fungisida petani kadang menggunakan merek dagang Platoon 75 WP (Bahan aktif Klorotalonil 75%) ,Sirkus 50 WP (bahan aktif Dimetomorf 50%), untuk herbisida merek dagang yang sering digunakan yaitu Umicron, Akil dan sebagainya. Petani biasanya melihat dulu hama penyakit di lapangan. Penetapan dosis pestisida oleh petani umumnya dilakukan berdasarkan banyaknya jumlah hamadi lapangan.Oleh sebab itu sering kali terlihat petani meningkatkan dosis hingga dua kali lipat dari ukurannya sampai hama/ulatnya mati.

2. Hubungan Kejadian keracunan dan Lama Kerja

Pada penelitian ini didapatkan distribusi petani sayur yang memiliki lama kerja lebih dari 8 jam per hari (kategori Lama) sebanyak 5 responden yang memiliki keracunan ringan, sedangkan petani sayur yang memiliki lama kerja kurang dari 8 jam per hari (Kategori Tidak Lama) sebanyak 16 responden memiliki keracunan normal. Di dapatkan $p\text{ value } 0,149$ ($P > 0,005$) yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara keracunan dan lama kerja

Kejadian keracunan pestisida dipengaruhi oleh intensitas paparan yang terjadi serta rentang waktu yang lama. Lamanya seorang petani menyemprot dalam sehari memberikan gambaran intensitas paparan terhadap pestisida. Semakin lama seorang petani terpapar pestisida maka semakin banyak pestisida yang terabsorpsi ke dalam tubuhnya (Darmiati, 2021).

Lama bertani dan jumlah jam kerja dapat mempengaruhi jumlah pestisida yang masuk dalam tubuh petani. Semakin lama masa bertani dan jam kerja per hari maka semakin banyak terpapar pestisida dan kadar kolinesterase dalam darah semakin rendah. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lucki, Fitriyah; Hanani, Yusnia; Yunita, 2018) bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara lama bekerja per hari dengan kadar kolinesterase pada petani ($P\text{ Value} = 0,154$). Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan bahwa kebiasaan petani dalam melakukan penyemprotan hanya di jam-jam tertentu seperti di pagi atau sore hari. Kegiatan di lahan juga beraneka ragam dan tidak selalu terpapar pestisida seperti, penyiapan bibit, membersihkan tanaman dari gulma dan memetik hasil panen.

Penelitian ini juga dilakukan oleh (Muqaddar, 2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama kerja dengan

kejadian keracunan pestisida pada petani. Hal tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal yakni, kegiatan penyemprotan yang dilakukan oleh para petani berada di bawah batas ketentuan lama kerja per hari yakni hanya selama 2 jam perhari.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan (Yuniastuti, 2018) Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi-square* ($p\text{ value} = 0,044$) bahwa ada hubungan antara lama setiap penyemprotan dengan kejadian keracunan. Artinya semakin lama responden melakukan penyemprotan semakin menurun kadar cholinesterase dalam darah responden.

Dalam penelitian ini tidak ada hubungan antara lama kerja dengan keracunan karena kegiatan pertanian tidak dilakukan secara terus menerus selama 8 jam kerja, sebagian besar petani juga menyediakan tempat istirahat di kebun sehingga ketika petani merasa capek, petani segera istirahat di rumah kebun yang ada atau di bawah pohon besar. Biasanya petani berangkat ke kebun pada Pukul 07.00, kemudian petani pulang kerumah pada pukul 11.00 apabila tidak membawa makanan ke kebun. Dan akan kembali ke kebun ada pukul 13.00 sampai pukul 17.00, seringkali petani juga tidur/istirahat di rumah kebun.

3. Hubungan Kejadian keracunan dan masa Kerja

Setelah melakukan penyebaran kusioner didapatkan hasil uji statistik adalah $p\text{ value}$ 0,150 ($P = > 0,005$) pada masa kerja terhadap keracunan yang artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida.

Secara teori, masa kerja dapat mempengaruhi kadar *Cholinesterase* pada pekerja. Semakin lama seseorang bekerja dengan kontak langsung terhadap pestisida maka akan semakin banyak zat kimia dari pestisida yang akan masuk dan terakumulasi pada tubuh petani, hal ini akan semakin

berisiko apabila para petani tidak menggunakan APD saat bekerja. Hasil penelitian yang dilakukan (Muqaddardkk., 2018) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara masa kerja dengan kejadian keracunan pestisida pada petani. Masa kerja tidak berhubungan dengan kejadian keracunan pestisida pada petani dapat terjadi karena petani tidak melakukan kegiatan pertanian secara terus menerus, atau dapat dikatakan bahwa petani mempunyai waktu untuk rehat sejenak dari kegiatan pertanian. Sehingga kadar cholinesterase dalam darah petani dapat kembali normal setelah melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pestisida.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Vicky (2017) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan atau pengaruh masa kerja dengan keracunan pestisida. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan (Andarini & Rosanti, 2018) bahwa Masa kerja tidak berpengaruh terhadap kejadian keracunan pada petani. Penelitian (Octiara & Saftarina, 2021) juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keracunan pestisida dalam darah petani dengan *P value* 0,508 dimana nilai $p > 0,05$. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Pratiwi, 2020) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan gejala keracunan pestisida akut dengan nilai *p* sebesar 1,000. Hal ini didukung oleh penelitian Isnawan (2013) yang menunjukkan bahwa petani tidak melakukan kegiatan pertanian secara terus menerus.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Lucky, Fitriyah; Hanani, Yusnia; Yunita, (2018) menunjukkan bahwa masa kerja petani berhubungan dengan kadar cholinesterase yang diketahui dari nilai *p value* = 0,008 dan *r* hitung -0,467 yang berarti masa kerja memiliki hubungan yang sedang dan bersifat negatif dengan kadar cholinesterase. Artinya, Semakin lama masa kerja seorang petani maka semakin rendah kadar

kolinesterase darah petani, dijelaskan juga oleh rustia dkk (2010) dalam (Osang dkk., 2016) bahwa semakin lama petani menyemprot, kontak dengan pestisida pun akan semakin tinggi dan risiko keracunan akan semakin tinggi pula. Prasetya (2010) menjelaskan bahwa keracunan kronis lebih sulit dideteksi karena tidak segera terasa dan tidak menimbulkan gejala serta tanda yang spesifik. Namun, keracunan Kronis dalam jangka waktu lama bisa menimbulkan gangguan kesehatan.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti sebagian besar petani tidak melakukan penyemprotan terus menerus dari awal menjadi seorang petani sehingga dilakukannya penelitian, petani kadang mempekerjakan seseorang untuk melakukan penyemprotan, sering kali juga petani dibantu oleh keluarga atau rekan lainnya sehingga petani tidak terus menerus terpapar oleh pestisida

Sebagian besar petani di Desa Kanreapia menghabiskan waktunya dengan bertani untuk mencari rezeki baik itu untuk dijual maupun untuk dikonsumsi secara pribadi. Bekerja di dunia merupakan salah satu jembatan menuju akhirat. Karena itu, bekerja bukan semata-mata mencari penghidupan dunia. Cara kerja kita akan menentukan, apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat atau tidak. Maka, setiap langkah kerja kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT. Allah berfirman dalam QS. Al-Qashash/20:77, yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

Terjemah nya :

“dan carilah (pahala) negeri akhiran dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”

Dijelaskan pula dalam QS. An-Naba/78 :11 yang bunyinya :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Terjemah nya :

“ dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”

Menurut Quraish Shihab, ayat ini merupakan nasihat yang diberikan oleh beberapa pemuka kaum nabi Musa as kepada Qarun, bahwa ia boleh berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk meraih kesuksesan dunia dengan cara yang dibenarkan Allah Swt. Namun, hal tersebut jangan sampai membuat dirinya melupakan tujuan manusia sesungguhnya di dunia, yakni beribadah kepada-Nya. Oleh karena itu, segala hal yang didapatkan di dunia seyogyanya diorientasikan untuk kepentingan akhirat (Rafi, 2020).

4. Hubungan Kejadian keracunan dan Cara penyemprotan

Pada penelitian ini didapatkan Distribusi Petani yang memenuhi syarat pada Cara penyemprotan Dominan memiliki Keracunan Normal dan Ringan masing masing dengan jumlah 14 Responden. Sedangkan petani yang Tidak memenuhi syarat pada Cara penyemprotan sebagian besar memiliki keracunan Sedang dengan Jumlah 6 responden. Dengan nilai *P value* 0,000 ($P < 0,005$) berarti ada Hubungan bermakna antara Keracunan dan Cara penyemprotan

Teknik penyemprotan juga merupakan satu penyebab adanya paparan pestisida dalam tubuh petani. Kegiatan menyemprot terhadap arah angin merupakan tindakan petani saat menyemprot tanaman yang memakai pestisida dengan arah angin yang bertiup. Penyemprotan yang baik jika petani mengikuti arah angin saat melakukan penyemprotan, bagi petani yang

melawan arah angin akan membuat paparan pestisida yang lebih banyak sehingga akan mudah mendapatkan keracunan apalagi jika tanaman yang disemprot tinggi (Rakhmi Aisyah El Mawaddah, Sugiarto, 2022).

Sejalan dengan penelitian (Siahaan, 2020) berdasarkan Uji statistik dengan uji Chi square diperoleh nilai $P Value = 0,000$ ($p < 0,05$) maka ada Hubungan antara arah angin dengan kadar kolinesterase. Hasil pengujian statistik pada penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang tidak memperhatikan arah angin saat melakukan penyemprotan akan mempunyai risiko terjadinya keracunan pestisida dibanding dengan petani yang menyemprot mengikuti arah angin. Penelitian (Adamu & Abebe, 2022) juga mengungkapkan bahwa petani memiliki praktik yang baik dalam kalibrasi mesin penyemprot dan menjaga arah angin selama penyemprotan.

Penyemprotan yang tidak memperhatikan arah angin menyebabkan cairan semprot pestisida mengenai tubuh pekerja sehingga akan lebih mudah terjadi keracunan terlebih jika tanaman yang disemprot memiliki bentuk yang tinggi. Penyemprotan yang tidak mempertimbangkan arah angin juga akan mengakibatkan pencemaran lahan pertanian akibat akumulasi bahan aktif dari pestisida. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Osang dkk., 2016) terdapat hubungan yang signifikan antara praktek penyemprotan pestisida terhadap arah angin dengan kadar kolinesterase darah ($P Value = 0,004$). Penelitian (Maya dkk., 2021) juga menunjukkan ada Hubungan antara cara penyemprotan dengan kadar *Cholinesterase* bekerja dengan $P Value = 0,000$. Begitu pula penelitian yang dilakukan Yuantari (2015) dalam (Nikmah & Pawenang, 2020) menyebutkan bahwa arah angin merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi paparan pestisida.

Semakin sering melakukan penyemprotan maka semakin tinggi pula risiko keracunan. Aktivitas penyemprotan tanaman yang dilakukan petani

sebaiknya tidak lebih dari 2x dalam seminggu (S. Nurhayati, N. Nurjazuli, 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiawan dalam (Utami dkk., 2021) yang menyatakan ada hubungan antara tingkat Frekuensi (n) penyemprotan dengan kolinesterase petani bawang merah di Ngurensiti Pati. Hal tersebut dikarenakan paparan pestisida dengan Frekuensi (n) yang sering dan interval waktu yang singkat menyebabkan residu pestisida dalam tubuh menjadi meningkat. Oleh karena itu, Frekuensi (n) penyemprotan pestisida sebaiknya dilakukan terjadwal dan tepat waktu untuk mengurangi paparan dan mencegah keracunan menjadi semakin buruk

Hasil penelitian (Mahyuni dkk., 2021) menemukan bahwa salah satu Faktor penentu keracunan pestisida adalah perilaku buruk pada saat melakukan penyemprotan seperti menyemprot sambil merokok, itu juga dapat disebabkan karena ketidaktahuan petani tentang efek racun yang menyebabkan keracunan Kronis. Sedangkan Pada petani di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, sebagian Besar petani mengetahui Cara atau Cara penyemprotan seperti mengikuti arah Mata angin dan Menghindari merokok, makan/Minum pada saat melakukan penyemprotan oleh karena itu dominan petani sayur di Desa kanreapia Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa memiliki Kadar Cholinesterase yang Tinggi atau Keracunan yang Normal

5. Hubungan Kejadian keracunan dan Personal Hygiene

Hasil uji statistik pada penelitian ini berdasarkan Tabel 4.15 didapatkan *p value* 0,000 ($P = < 0,05$) hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara Personal hygiene pada saat sebelum dan sesudah penyemprotan dengan keracunan Pestisida, yang berarti semakin baik petani

menerapkan personal Hygiene nya maka semakin kurang resiko terpapar keracunan Pestisida

Penelitian Herdinanti, (2018) menunjukkan ada hubungan yang bermakna antara personal hygiene dengan gejala keracunan pestisida pada petani nanas di kecamatan Sungai gelam Muaro Jambi. Penelitian yang dilakukan (Ulva dkk., 2019) sebanyak 26,8% responden langsung makan dan minum setelah melakukan penyemprotan. Sebanyak 33,9% responden tidak baik dalam mengelola limbah pestisida. Sebanyak 48,2% responden jarang membersihkan peralatan penyemprotan. Selain itu, petani juga pada umumnya tidak langsung mengganti pakaian yang digunakan setelah selesai melakukan penyemprotan. Hal ini dapat menyebabkan masuknya kandungan pestisida melalui kulit petani sehingga mengakibatkan terjadinya keracunan pestisida pada petani tersebut

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Andarini & Rosanti, 2018) mayoritas personal hygiene petani hortikultura di Desa Demangan termasuk dalam kategori tidak baik sebanyak 27 orang (90%), sedangkan 3 orang petani mempunyai personal hygiene yang baik dengan persentase 10%. Penelitian Ganjar (2014) membuktikan bahwa personal Hygiene merupakan faktor risiko terjadinya keracunan pestisida, artinya petani yang tidak higienis mempunyai risiko lebih besar dibandingkan dengan petani yang higienis dengan melihat faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi tingkat risiko keracunan pestisida pada petani.

Dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa personal Hygiene berhubungan dengan keracunan karena tidak adanya kesadaran petani dalam kebersihan tubuh dan pakaiannya, yang seharusnya mencuci tangan setelah bekerja menggunakan sabun, langsung mandi dan mencuci pakaian kerja agar pestisida yang menempel segera dibersihkan sebelum terjadinya

keracunan. Namun sebagian kecil responden pada penelitian ini tidak langsung mencuci pakaian kerja yang digunakan, tapi hanya disimpan dan dipakai kembali pada saat bekerja.

Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan dalam ajaran dalam islam bertujuan unruk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan di akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian islam adalah Thaharah, kesucian dan kebersihan. Kebersihan badan dan jasmani merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan kebersihan rohmani, karena setiap ibadah harus dilakukan dalam keadaan bersih badannya. Dalam kaitan ini, Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al-Maidah/5:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۗ

Terjemahnya :

“ hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basulah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah..”

Ayat diatas mengajarkan agar manusia menjaga kebersihan antara lain, dengan mandi. Semakin sering mandi akan semakin baik untuk kebersihan, menghilangkan daki/kotoran dari badan ibarat membersihkan dosa.

Selain menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit, istirahat juga perlu dilakukan agar tubuh terasa lebih berenergi dan fit. Allah telah menciptakan pergantian malam dan siang, bukan sesuatu yang tak bermakna. Pergantian ini dimaksudkan adalah untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk berusaha pada siang hari dan beristirahat pada malam

hari setelah lelah berusaha. Hal ini kembali membuktikan bahwa islam sangat memperhatikan masalah kesehatan. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah : QS. Al-Qashash/20:73

وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٣)

Terjemahan :

“Dan adalah karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya

Pergantian siang dan malam dengan fungsinya masing-masing, yaitu siang digunakan untuk berusaha mencari rezekki dan malam digunakan untuk istirahat dan melepaskan lelah, sehingga pulih kembali tenaga yang telah dipergunakan pada siang ahrinya, adalah merupakan rahmat besar dari Allah yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri (Tafsir Ibnu Katsir, n.d.) .

Diantara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada 2 nikmat yang manusia lalai darinya. Nikmat tersebut adalah kesehatan dan waktu luang.

Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya dikarenakan sakit yang diderita. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu betapa banyak manusia yang menyesali oleh waktu. Waktu ibarat pedang bermata 2, jika digunakan untuk kebaikan maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari.

6. Hubungan Kejadian keracunan dan Penggunaan APD

Salah satu cara untuk Menghindari keracunan pestisida adalah dengan menggunakan Alat pelindung Diri. Hasil penelitian ini didapatkan nilai *P*

$Value < 0,000$ lebih kecil dari 0,05 hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara Penggunaan APD pada saat penyemprotan dengan Keracunan, berarti jika petani melakukan penyemprotan dengan memakai APD yang memenuhi Syarat dapat menghindari terjadinya keracunan pestisida.

Kurangnya kesadaran petani dalam penggunaan APD pada saat pencampuran dan penyemprotan pestisida yang mengakibatkan banyaknya petani yang mengalami keracunan pestisida. Sebaiknya pada saat melakukan pencampuran dan penyemprotan petani menggunakan APD sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan membaca petunjuk pada kemasan pestisida.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yuniastuti, 2018) sebanyak 7 responden sebagian besar responden mengalami keracunan akibat pestisida sebanyak 51 orang (72,9%) dan yang tidak keracunan sebanyak 19 orang (27,1%). Sedangkan responden yang menggunakan APD secara lengkap hanya 16 orang dan yang mengalami keracunan hanya sebanyak 4 orang (25%) serta tidak keracunan sebanyak 12 orang (75%). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Winandar (2016), didapatkan persentase petani yang menggunakan APD lengkap sebesar 20%, sedangkan yang tidak menggunakan APD lengkap sebesar 56,3%. Hasil penelitian Budiawan (2013), terdapat 63% petani yang menggunakan APD lengkap dan tidak mengalami keracunan pestisida.

Penelitian yang dilakukan (Vonisha & Oktariani, 2019) berbagai jenis APD memberikan tingkat pelengkap perlindungan pribadi terhadap paparan kulit. Mengenakan sarung tangan merupakan metode perlindungan yang paling efektif terhadap paparan pestisida yang terjadi.

Terkait APD yang digunakan oleh petani saat penyemprotan,

berdasarkan hasil wawancara studi terdahulu tidak menggunakan APD yang lengkap. APD yang sering mereka gunakan hanya masker, Baju lengan panjang, celana Panjang dan sepatu Boot pada saat penyemprotan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kesadaran diri tentang penggunaan APD. Kesadaran diri didasari dengan pengetahuan dalam mencegah berbagai masalah kesehatan hingga kecelakaan kerja (Azizah & Asyfiradayati, 2021)

Dari Hasil observasi yang dilakukan Peneliti pada Petani sayur di Desa Kanreapia, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Sebagian besar petani memakai APD lengkap seperti Baju lengan Panjang dan celana panjang, Penutup kepala, Sarung tangan serta sepatu Boot. Menurut Petani yang tidak menggunakan APD lengkap memiliki alasan tersendiri seperti kurang nyaman Pada saat digunakan.

C. Keterbatasan penelitian

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian ataupun riset sebelumnya sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil penelitian maupun pada analisisnya.
2. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti seperti yang disebutkan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian ini hanya berfokus pada variabel-variabel tersebut.
3. Sampel yang digunakan hanya sebesar 44 responden 88 Petani yang ada di desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa pada tahun 2021. Meski 44 responden sudah memenuhi jumlah ideal responden penelitian menurut persamaan Slovin, namun akan lebih baik jika lebih banyak sampel yang digunakan.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kejadian keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa yaitu yang mengalami keracunan sebanyak 27 responden (61%) dan yang tidak mengalami keracunan yaitu sebanyak 17 responden (39%).
2. Karakteristik responden berdasarkan umur didominasi oleh umur 31-40 Tahun yaitu sebesar 13 Responden (29 %), karakteristik respondend berdasarkan pendidikan diketahui bahwa petani sebagian besar berpendidikan SD yaitu 19 Responden (43 %) dan jenis pestisida yang digunakan sebagian besar menggunakan pestisida jenis Insektisida sebesar 21 Responden (48 %)
3. Hasil analisis bivariante diketahui bahwa variable yang berhubungan dengan kejadian keracunan pada petani sayur penggunapestisida adalah cara penyemprotan ($p \text{ value} = 0,000$), *personal hygiene* ($p \text{ value} = 0,000$) dan penggunaan APD ($p \text{ value} = 0,000$). Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah masa kerja ($p \text{ value} = 0,150$) dan lama kerja ($p \text{ value} = 0,149$).

B. Saran

1. Petani diharapkan agar lebih memperhatikan Hal hal yang dapat menyebabkan Keracunan Pestisida seperti Penggunaan APD seperti Masker dan Sarung tangan pada saat melakukan pencampuran Pestisida, Memperhatikan *Personal Hygiene* Setelah melakukan penyemprotan dan Cara penyemprotan dengan Searah mata Angin.

2. Bagi Petugas kesehatan agar dapat meningkatkan promosi kesehatan atau Penyuluhan kesehatan terkait Keracunan pestisida pada masyarakat di Desa Kanreapia kecamatan tombolo pao kabupaten Gowa khususnya Pada Peta.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, F., Suhartono, S., & Dharminto, D. (2018). Hubungan Paparan Pestisida Dengan Kejadian Hipertensi Pada Petani Hortikultura Di Desa Gerlang Kecamatan Blado Kabupaten Batang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 6(4), 447-452.
- Agustina, N., & Norfai, N. (2018). Paparan pestisida terhadap kejadian anemia pada petani hortikultura. *Majalah Kedokteran Bandung*, 50(4), 215-221.
- Adamu, A., & Abebe, W. (2022). Practices and challenges of wheat producer farmers on safe pesticide use in Basoliben district, East Gojjam zone, Ethiopia. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 21(1), 43–50. <https://doi.org/10.1016/j.jssas.2021.06.013>
- Agustin, R., & Muhartono. (2018). Dampak Penggunaan Pestisida Organoklorin terhadap Risiko Kanker Payudara. *Journal Agromedicine*, 5, 433–437.
- Akbar, F. K. R. (2019). Analisis Risiko K3 Pemberantasan Hama Pekerjaan Pertanian Jeruk. *Journal of Public Health Research and Community Health Development*, 3(1), 01. <https://doi.org/10.20473/jphrecode.v3i1.13067>
- Andarini, Y. D., & Rosanti, E. (2018). Kajian Toksisitas Pestisida Berdasarkan Masa Kerja Dan Personal Hygiene Pada Petani Hortikultura Di Desa Demangan. *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 5(2), 82. <https://doi.org/10.31602/ann.v5i2.1655>
- Andersson, E., & Isgren, E. (2021). Gambling in the garden: Pesticide use and risk exposure in Ugandan smallholder farming. *Journal of Rural Studies*, 82(January), 76–86. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.013>
- Apriliani, E. A., Oktavidiati, E., Ramon, A., & Wati, N. (2021). Gambaran Perilaku Petani Sayuran Di Wilayah Kerja Puskesmas Nusa Indah Ditinjau Dari Aspek Kesehatan. *Avicenna: Jurnal Ilmiah*, 16(1), 34–45. <https://doi.org/10.36085/avicenna.v16i1.1567>
- Asiaka, F. K. P., & Ludang, E. (2022). Peranan keamanan pestisida di Bidang pertanian bagi para petani dan Lingkungan. 17(1), 1–9.
- BPOM. (2019). Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Correlation, T., Pesticide, B., Labitta, A., Budiyo, B., & Rahardjo, M. (2019). The International Journal of Health Education. *Public Health*, 72(1–6), 77–78. [https://doi.org/10.1016/s0033-3506\(58\)80020-7](https://doi.org/10.1016/s0033-3506(58)80020-7)
- Darmiati, D. (2021). Faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko keracunan pestisida pada petani. *Jurnal SAGO Gizi dan Kesehatan*, 2(1), 81. <https://doi.org/10.30867/gikes.v2i1.474>
- Ema, M., 1, A., Ilmu, J., Masyarakat, K., Keolahragaan, I., I. A., & Alamat,. (2020). 415

HIGEIA 4 (Special 2) (2020) hygeia journal of public health research and development Faktor Kejadian Keracunan Pestisida pada Kelompok dengan Keracunan Tinggi dan Rendah.4(Special 2), 415–425. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>

Fajriani, G. N., Aeni, S. R. N., & Sriwiguna, D. A. (2019). Penggunaan Apd Saat Penyemprotan Pestisida Dan Kadar Kolinesterase Dalam Darah Petani Desa Pasirhalang. *Jurnal Media Analisis Kesehatan*, 10(2), 163. <https://doi.org/10.32382/mak.v10i2.1229>

Farid, A., Pratiwi, A., & Fitri, A. D. A. (2019). Hubungan Karakteristik Petani Terhadap Persepsi Penerapan K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Pada Petani Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. *Sosiologi Pedesaan*, 3, 152--158.

Firity D Rumandor, Akili, R. H., & Paninditan, O. R. (2017). Faktor Risiko Keterpaparan Pestisida Pada Petani Tanaman Hortikultura Di Perkebunan Wawo Kota Tomohon 2017. *Kesmas*, 6(3), 1–5.

Hardi, Muh. Ikhtiar, & Baharuddin, A. (2020). Cholinesterase Darah Pada Petani Sayur Jene Tallasa-Rumbia Relationship of Pesticides on Blood Cholinesterase Levels in Vegetable Farmers Jene Tallasa-Rumbia. *Ikesma*, 16(1), 53–59. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/IKESMA/article/view/16999>

Heckman, J. J., Pinto, R., & Savelyev, P. A. (2018). Faktor risiko keracunan pestisida pada petani. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 24–27.

Himmawan, L. S. (2016). Pengaruh pemakaian alat pelindung pernafasan terhadap kapasitas fungsi paru pada petani sayuran pengguna pestisida semprot. <http://lib.unnes.ac.id/695/>

Lucki, Fitriyasyah; Hanani, Yusnia; Yunita, N. A. (2018). Hubungan Masa Kerja, Lama Kerja, Lama Penyemprotan Dan Frekuensi (n) Penyemprotan Terhadap Kadar Kolinesterase Dalam Darah Pada Petani Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(6), 128–134.

Maden, E. Van Der, Gordijn, F., & Wulansari, M. (2015). Panduan Pelatihan Paparan Pestisida di Ladang & Pengaruh Pestisida Terhadap Kesehatan. *March*, 1–65.

Mahyuni, E. L., Haharap, U., Harahap, R. H., & Nurmaini. (2021). Pesticide toxicity prevention in farmer's community movement. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9, 1–7. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.5565>

Marete, G. M., Lalah, J. O., Mpathia, J., & Wekesa, V. W. (2021). Pesticide usage practices as sources of occupational exposure and health impacts on horticultural farmers in Meru County, Kenya. *Heliyon*, 7(2), e06118. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06118>

Maya, D., Siregar, S., & Saragih, M. (2021). Cholinesterase Darah Pekerja Bagian Penyemprotan Pt. *Anglo*. 6(1), 1–9.

- Mazlan, A. Z., Hussain, H., & Zawawi, M. A. M. (2016). Potential Dermal Exposure Assessment of Farmers to Herbicide Imazapic in an Agriculture Area. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 234, 144–153. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.229>
- Moekasan, T. K., & Prabaningrum, L. (2011). Penggunaan Pestisida Berdasarkan Konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT).
- Mukadar, L. afriyani, Sulistiyani, & Joko, T. (2018). Faktor Risiko Pajanan Pestisida Terhadap Kejadian Keracunan Pestisida Pada Petani Di Jawa Tengah (Studi Literatur Hasil-Hasil Penelitian Di Fkm Undip). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(6), 205–213.
- Nikmah, S. S., & Pawenang, E. T. (2020). Faktor Kejadian Hipertensi pada Petani Penyemprot Bunga. *Hygeia Journal of Public Health Research and Development*, 1(3), 625–634.
- Obiri, B. D., Obeng, E. A., Oduro, K. A., Apetorgbor, M. M., Peprah, T., Duah-Gyamfi, A., & Mensah, J. K. (2021). Farmers' perceptions of herbicide usage in forest landscape restoration programs in Ghana. *Scientific African*, 11. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2020.e00672>
- Octorara, D. L., & Saftarina, F. (2021). Hubungan Masa Kerja dengan Keracunan Pestisida melalui Pengukuran Kadar Cholinesterase dalam Darah pada Petani di Pekon Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Relationship of Personal Hygiene Behavior with Pesticide Poisoning through C. *Medical Profession Journal of Lampung*, 11(3), 259–265.
- Oktaviani, R., & Pawenang, T. (2020). Risiko Gejala Keracunan Pestisida pada Petani Greenhouse. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 4(2), 178–188. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia> <https://doi.org/10.15294/higeia/v4i2/33544>
- Okvitasari, R., & Anwar, M. C. (2017). Hubungan Antara Keracunan Pestisida Dengan Kejadian Anemia Pada Petani Kentang Di Gabungan Kelompok Tani Al-Farruq Desa Patak Banteng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Tahun 2016. *Buletin Keslingmas*, 36(3), 299–310. <https://doi.org/10.31983/keslingmas.v36i3.3109>
- Osang, A. R., Lampus, B. S., Wuntu, A. D., Kesehatan, F., Universitas, M., & Manado, S. R. (2016). Hubungan Antara Masa Kerja Dan Arah Angin Dengan Kadar Kolinesterase Darah Pada Petani Padi Pengguna Pestisida Di Desa Pangian Tengah Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 5(2), 151–157.
- Prabaningrum, S., Setyaningsih, Y., & Suwondo, A. (2021). Karakteristik individu, prosedur penyemprotan dan ringan cholinesterase : Studi literatur pada pekerja yang terpapar pestisida. Peran Mikronutrien Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19, 11(April), 5–6.
- Pratiwi. (2020). *Jurnal kesehatan Masyarakat Khatulistiwa*. J kesehatan masy., 1, 8.

- Pratiwi, H., Yenni, M., & Mardiyanto, E. (2022). Faktor Yang Berhubungan Dengan Gejala Dermatitis Kontak Pada Petani Di Wilayah Kerja Puskesmas Paal Merah Ii. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3415–3420.
- Rakhmi Aisyah El Mawaddah, Sugiarto, E. K. (2022). Faktor yang berhubungan dengan tekanan darah pada petani di wilayah kerja puskesmas paal merah ii kota jambi tahun 2021. 2(10), 3297–3302.
- Riska, F., & Asbath, S. (2018). Hubungan Personal Hygiene Dengan Kejadian Dermatitis Kontak Iritan Pada Petani di Wilayah Kerja Puskesmas Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal MJPH*, 1(2), 1–12.
- S. Nurhayati, N. Nur Jazuli, and T. J. (2018). Hubungan Paparan Pestisida Dengan Tekanan Darah Diastolik Pada Petani Hortikultura Desa Kapuhan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(6), 335–343. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/22195>
- Samosir, K., Setiani, O., & Nur Jazuli, N. (2017). Hubungan Paparan Pestisida dengan Gangguan Keseimbangan Tubuh Petani Hortikultura di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 16(2), 63. <https://doi.org/10.14710/jkli.16.2.63-69>
- Siahaan, S. (2020). Faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Keracunan Pestisida Pada Petani Sayur dan Palawija di Desa Selat Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 1079. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i3.1099>
- Tafsir Ibnu Katsir. (n.d.). *Risalah Muslim*. <https://risalahmuslim.id/quran/yunus/10-67/>
- Tafsir kemenag. (n.d.). *Risalah Muslim*. <https://risalahmuslim.id/quran/al-qashash/28-77/>
- Ulva, F., Rizyana, N. P., & Rahmi, A. (2019). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Gejala Keracunan Pestisida pada Petani Penyemprot Pestisida Tanaman Hortikultura di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(3), 501. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i3.696>
- Utami, T. P., Lestari, M., Novrikasari, N., Purba, I. G., Sitorus, R. J., Nandini, R. F., & Fujianti, P. (2021). Penurunan Kadar Enzim Kolinesterase Tenaga Sprayer di Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 20(1), 27–33. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.27-33>
- Vonisha, M., & Oktariani, R. zakiah. (2019). keracunan pestisida Kronik pada Petani. *Bimfi*, 6(2), 1–7.
- Yuniastuti, A. (2018). Hubungan Masa Kerja, Lama Menyemprot, Jenis Pestisida, Penggunaan APD dan Pengelolaan Pestisida dengan Kejadian Keracunan Pada Petani di Brebes. *Public Health Perspective Journal*, 2(2), 117–123.

L

A

M

P

I

R



N



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN**

*Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36
Samata - Gowa*

KUESIONER

**FAKTOR DETERMINAN KERACUNAN PADA PETANI SAYUR
PENGGUNA PESTISIDA , DI DUSUN KANREAPIA, DESA KANREAPIA
KEC. TOMBOLO PAO KAB. GOWA TAHUN 2021**

Nomor :

Tanggal :

Bersama ini saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner. Informasi yang bapak/ibu berikan hanya untuk melengkapi data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ **Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di desa kanreapia kecamatan Tombolo Pao kabupaten Gowa**”, Untuk itu diharapkan bapak/ibu bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan / pernyataan (kuesioner) berikut.

1. Identitas

Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

2. Kuesioner Keracunan

Keracunan	Ya	Tidak
Normal (75 % - 100 %)		
Keracunan Ringan (> 50 % - < 75 %)		
Keracunan Sedang (>25 % - 50 %)		
Keracunan Berat (0 % - 25 %)		

3. Kuesioner Jenis pestisida

No	Jenis Pestisida	Ket
1	Insektisida	
2	Fungisida	
3	Herbisida	

4. Kuesioner Lama Kerja

Durasi Waktu	Ya	Tidak
Tidak Lama (< 8 Jam/Hari)		
Lama (> 8 Jam/ Hari)		

5. Kuesioner Masa Kerja

≤ 6 Tahun (baru)	>6 Tahun (lama)

6. Kuesioner *Personal Higiene*

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah Anda selalu mencuci tangan pada saat selesai bekerja?		
Jika iya, apakah anda mencuci tangan menggunakan sabun?		
Apakah sepulang dari kerja Anda mengganti pakaian sebelum melakukan aktivitas?		
Apakah sepulang dari kerja Anda mencuci pakaian kerja Anda?		
Apakah setelah bertani Anda langsung mandi?		

7. Kuesioner Cara penyemprotan

Pertanyaan	Ya	Tidak
Apakah anda mengetahui arah penyemprotan searah dengan arah angin?		
Apakah anda mengetahui merokok ketika menyemprot dapat menyebabkan keracunan?		
Apakah anda mengetahui penyemprotan merupakan penanganan pestisida yang paling mudah mengenai kulit?		
Apakah anda mengetahui bahwa harus menghentikan penyemprotan jika muncul gejala keracunan?		

8. Penggunaan APD

Penggunaan APD	Pertanyaan	Jawaban		Ket
		Y	T	
	1. Penutup kepala			
	2. Masker			
	3. Kacamata			
	4. Sarung tangan			
	5. Baju lengan panjang			
	6. Celana panjang			
	7. Sepatu boot			
NILAI				

Lampiran 2

**DOKUMENTASI
PEMERIKSAAN KADAR KOLINESTERASE DENGAN TINTOMETER
KIT DI KANTOR BPP PERTANIAN KANREAPIA
(6 Oktober 2021)**



**DOKUMENTASI
WAWANCARA DENGAN PETANI
(17-24 Juni 2022)**



**DOKUMENTASI
PESTISIDA YANG DIGUNAKAN PETANI
(17-24 Juni 2022)**




Pounce (Insektisida)



Calcium Susu



Spring (Fungisida)



Cadilac (Fungisida)



Platoon (Fungisida)



Sirkus (Fungisida)



Demazeb (Fungisida)



Demorf (Fungisida)

Cyperban (Insektisida)

**DOKUMENTASI
KEGIATAN PETANI
(17-24 Juni 2022)**



**DOKUMENTASI
KEGIATAN PETANI
(17-24 Juni 2022)**



Lampiran 3

SURAT ETIK PENELITIAN

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

B.279/KEPK/FKIK/VI/2022

Protokol penelitian yang diajukan oleh
The research protocol prepared by

Peneliti utama
Principal Investigator : Nur Rachawatiyah AHIN

Nama Instansi
Name of the Institution : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dengan judul:
Title

**"Determinan Keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di desa kamreapia
kecamatan tumbolopon kabupaten gowa"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Perencanaan, 4) Manfaat dan Risiko, 5) Hakikat Eksplanasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Perencanaan Setelah Penelitian, yang tertera pada Pedoman CIOMS 2011 "Hal ini" seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Assurable Anonymity and Benefit, 4) Risk, 5) Permission/Explanation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2011 CIOMS Guidelines. This is so indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

This declaration of ethics applies during the period June 1st, 2022 until June 30th, 2022.

June 08th, 2022
Professor and Chairperson

Dr. Dr. Syarifah, Sp. A., M. Kes

SURAT IZIN PENELITIAN


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Soegerville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448038
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 3123/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: Izin penelitian	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2348/UN.05/FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: NUR RACHMATULLAH AMIN
Nomor Pokok	: 70200117114
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No 36 Romang Palong-Gowa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" DETERMINAN KERACUNAN PADA PETANI SAYUR PENGGUNA PESTISIDA DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Juni s/d 15 Juli 2022

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 14 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

	Dra. Hj. SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
	Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
	Nip : 19650608 199003 2 011

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat

Lampiran 5

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

KODING: 0411-887188 SINGGAMASA 92111



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Singgamas 92111

Singgamas, 14 Juni 2022

Nomor : 503/614/DPM-PTSP/PENELITIAN/VI/2022
 Lamp :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala desa Katrempia, Kecamatan
 Tombolopao, Kabupaten Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 3123/S.01/PTSP/2022 tanggal 14 Juni 2022 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: NUR RACHMATULLAH AMIN
Tempat/Tanggal Lahir	: Takalar / 28 Desember 1999
Nomor Pokok	: 70200117114
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Btu Bentomasie'Ne

Bernaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembara di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "*ANALISIS DETERMINAN KERACUNAN PADA PETANI SAYUR PENGGUNA PESTISIDA DI DESA KANREAPIA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA*."

Selama : 15 Juni 2022 s/d 15 Juli 2022
 Pengikat :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menstasi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

Demikian disampaikan dan untuk launcinya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperuhnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Ses,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 15721026 199903 1 003

Terbilang Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringat

1. Dokumen ini diterbitkan secara otomatis Cloud berdasarkan data dari Perangkat Lunak atau sistem berbasis Cloud yang memiliki tanggung jawab Persebab
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh INF-ESDN.



Lampiran 6

SURAT SELESAI PENELITIAN


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLO PAO
DESA KANREAPIA
Jalan Bullo Baro No.12 Kanreapia - Kode Pos 92174

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 070/03/KR/VI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Syukri, S.Sos
Jabatan	: Sekretaris Desa Kanreapia
Alamat	: Dusun Halahalaya Desa Kanreapia

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama	NUR RACHMATULLAH AMIN
Tempat/Tanggal Lahir	Takalar, 28-12-1999
Jenis Kelamin	Laki-Laki
Nomor Pokok	70200117114
Program Studi	Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan	Mahasiswa (S1)
Alamat	Bn Bonomate'ne

Berikut telah mengadakan *Penelitian/Pengumpulan Data* di Desa Kanreapia Kecamatan Tombohopao dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul :

"DETERMINAN KERACUNAN PADA PETANI SAYUR PENGGUNA PESTISIDA DI DESA KANREAPIA, KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA"

Waktu Penelitian	: 15 Juni 2022 s/d 15 Juli 2022
Tempat Penelitian	: Desa Kanreapia Kecamatan Tombohopao

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kanreapia, 21 Juni 2022


Syukri, S.Sos
Sekretaris Desa


PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMBOLOPAO
SYUKRI, S.Sos
SEKRETERAR DESA
0760413 200906 1 001

Lampiran 7


MASTER TABEL

Nama	Umur	Kat.	Tingkat pendidikan	Kat.	aktivitas cholinestrase	Kat.	Jenis pestisida	LK	kat	MK	Kat.	Personal Hygiene					Total	Kat.	Cara penyemprotan				Total	Kat.
												p1	p2	p3	p4	p5			p1	p2	p3	p4		
MR	26	1	SMP	2	100	1	3	<8 jam	2	6 tahun	1	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
AM	49	3	SD	1	25	2	1	<8 jam	2	16 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	2	1	1	1	5	1
A	28	1	SMP	2	50,0	2	1	<8 jam	2	5 tahun	1	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
SU	51	4	SMP	2	62,5	2	1	<8 jam	2	18 tahun	2	2	2	2	2	1	9	2	2	2	1	2	7	2
HR	26	1	SD	1	80	1	3	<8 jam	2	4 tahun	1	1	1	1	1	2	6	1	2	2	2	2	8	2
MB	33	2	SMA	3	62,5	2	2	>8 jam	1	15 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	1	1	1	1	4	1
R	37	2	SMP	2	100	1	1	<8 jam	2	15 tahun	2	2	2	1	2	2	9	2	2	2	2	2	8	2
R	36	2	SMA	3	15	2	1	>8 jam	1	16 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	1	1	1	2	5	1
SA	33	2	SD	1	75	2	2	8 jam	2	6 tahun	1	2	2	1	1	1	7	2	2	1	1	2	6	1
H	32	2	SD	1	75	2	1	<8 jam	2	17 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	2	2	1	1	6	1

RHMT	35	2	SD	1	62,5	2	1	<8 jam	2	12 tahun	2	1	1	1	1	1	5	1	2	2	2	2	8	2
ZF	30	1	SD	1	80	1	3	<8 jam	2	6 tahun	1	2	2	1	2	2	9	2	1	2	2	2	7	2
T	48	3	SD	1	62,5	2	2	<8 jam	2	30 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	2	1	1	1	5	1
S	52	4	SD	1	20	2	1	<8 jam	2	17 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	1	1	1	1	4	1
SUH	50	3	SD	1	62	2	2	>8 jam	1	31 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	2	2	1	1	6	1
MR	25	1	SMP	2	85	1	2	<8 jam	2	5 tahun	1	2	2	2	2	1	9	2	2	2	2	2	8	2
A	45	3	SMA	3	100	1	3	<8 jam	2	11 tahun	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
AI	31	2	MTS	2	62	2	1	<8 jam	2	4 tahun	1	1	1	1	1	2	6	1	2	1	1	1	5	1
ARMN	55	4	SMA	3	75	2	3	<8 jam	2	35 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	2	2	2	2	8	2
MRNI	29	1	SMA	3	100	1	2	<8 jam	2	3 tahun	1	2	2	1	2	2	9	2	2	1	2	2	7	2
MLG	42	3	SMA	3	80	1	2	<8 jam	2	18 tahun	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
ABD.J	54	4	SMP	2	50	2	1	<8 jam	2	20 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	2	2	2	1	7	2
B	42	3	SD	1	100	1	2	<8 jam	2	25 tahun	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
HIS	54	4	SMP	2	50	2	1	<8 jam	2	25 tahun	2	1	1	1	1	1	5	1	1	2	2	2	7	2
HAM	33	1	S1	4	75	2	1	<8 jam	2	4 tahun	1	2	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	4	1

RF	53	4	SD	1	80	1	3	<8 jam	2	26 tahun	2	2	2	2	1	2	9	2	2	1	2	2	7	2
YN	42	3	SD	1	80	1	3	<8 jam	2	25 tahun	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	8	2
Y	45	3	MTS	2	62	2	1	<8 jam	2	20 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	2	1	1	2	6	1
U	35	2	SMP	2	50,0	2	2	>8 jam	1	5 tahun	1	2	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	4	1
YLS	26	1	D3	4	62,5	2	1	>8 jam	1	5 tahun	1	2	1	1	1	1	6	1	2	2	1	1	6	1
SHD	38	2	D3	4	62,5	2	1	<8 jam	2	12 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	2	1	2	1	6	1
JND	36	2	D3	4	85	1	2	<8 jam	2	4 tahun	1	2	2	2	1	2	9	2	2	2	2	2	8	2
W	35	2	D3	4	62,5	2	1	<8 jam	2	11 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	1	2	2	2	7	2
MRN	50	3	SD	1	100	1	3	<8 jam	2	25 tahun	2	2	2	2	1	1	8	2	2	2	2	2	8	2
AMR	29	1	SMA	3	80,0	1	1	<8 jam	2	5 tahun	1	2	2	2	2	1	9	2	1	2	2	2	7	2
SJ	49	3	SMA	3	80	1	2	<8 jam	2	26 tahun	2	1	2	2	1	2	8	2	2	1	1	1	5	1
N	43	3	SD	1	62,5	2	1	<8 jam	2	28 tahun	2	1	1	1	1	2	6	1	2	2	1	1	6	1
JBR	51	4	SD	1	50,0	2	1	>8 jam	1	30 tahun	2	2	1	1	1	2	7	2	2	1	1	1	5	1
RL	32	2	SMA	3	50,0	2	2	<8 jam	2	12 tahun	2	2	2	1	1	2	8	2	2	1	1	1	5	1
RDWN	55	4	SD	1	62,5	2	2	<8 jam	2	28 tahun	2	2	1	1	1	1	6	1	1	2	2	1	6	1

BSRI	34	2	SD	1	62,5	2	2	<8 jam	2	3 tahun	1	1	1	1	1	2	6	1	2	2	1	1	6	1
HMK	51	4	SD	1	75	2	1	<8 jam	2	11 tahun	2	2	2	2	1	1	8	2	2	2	2	2	8	2
SLMN	55	4	SD	1	80	1	2	>8 jam	1	32 tahun	2	2	1	1	2	3	9	2	2	2	1	2	7	2
AWL	25	1	SMP	2	80	1	1	<8 jam	2	4 tahun	1	2	1	2	1	1	7	2	2	2	2	2	8	2



AMR	2	2	1	1	2	2	2	12	2
SJ	1	1	1	1	2	2	1	9	1
N	2	1	1	1	2	2	1	10	1
JBR	2	1	1	1	2	2	1	10	1
RL	1	1	1	1	2	2	1	9	1
RDWN	2	1	1	1	2	2	1	10	1
BSRI	2	1	1	1	2	2	1	10	1
HMK	2	2	2	2	2	1	1	12	2
SLMN	1	2	2	2	2	2	1	12	2
AWL	2	1	1	2	2	2	2	12	2

Keterangan Coding	Ket. Kejadian Keracunan	Ket. Jenis Pestisida	Ket. Lama Kerja
	1 = Tidak keracunan	1 = Insektisida	1 = Tidak Lama (< 8 Jam/Hari)
	2 = Keracunan	2 = Fungisida	2 = lama (> 8 Jam/Hari)
		3 = Herbisida	
Keterangan Kategori	Kat.PH = Personal Hygiene	Kat. CP = Cara penyemprotan	Kat. APD = Alat Pelindung Diri
	1 = Tidak memenuhi syarat	1 = Tidak memenuhi syarat	1 = Tidak Lengkap
	2 = memenuhi Syarat	2 = memenuhi Syarat	2 = Lengkap

Ket. Masa kerja
1 = Baru (<6 Tahun)
2 = Lama (>6 Tahun)

Lampiran 8

OUTPUT SPSS

i. Hasil Univariat

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	19	43,2	43,2	43,2
	SMP	11	25,0	25,0	68,2
	SMA	9	20,5	20,5	88,6
	D3-S1	5	11,4	11,4	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20-30 tahun	10	22,7	22,7	22,7
	31-40 tahun	13	29,5	29,5	52,3
	41-50 Tahun	11	25,0	25,0	77,3
	50-60 tahun	10	22,7	22,7	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

jenis pestisida

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Insektisida	21	47,7	47,7	47,7
	Fungisida	15	34,1	34,1	81,8
	Herbisida	8	18,2	18,2	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

APD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak lengkap	20	45,5	45,5	45,5
	Lengkap	24	54,5	54,5	100,0
	Total	44	100,0	100,0	

CARA PENYEMPROTAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak memenuhi syarat	29	64.4	64.4	64.4
	Memenuhi syarat	15	35.6	35.6	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Personal Hygiene

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	memenuhi syarat	22	50.0	50.0	50.0
	Tidak memenuhi syarat	22	50.0	50.0	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak lama	15	34.1	34.1	34.1
	Lama	29	65.9	65.9	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Keracunan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak keracunan	17	38.6	38.6	38.6
	Keracunan	27	61.4	61.4	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

Lama kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak lama	7	15.9	15.9	15.9
	Lama	37	84.1	84.1	100.0
	Total	44	100.0	100.0	

ii. Hasil Bivariat

MASA KERJA * KERACUNAN Crosstabulation

Count

		KERACUNAN		Total
		tidak keracunan	keracunan	
MASA KERJA	tidak Lama	8	7	15
	lama	9	20	29
Total		17	27	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.073 ^a	1	.150		
Continuity Correction ^b	1.240	1	.266		
Likelihood Ratio	2.053	1	.152		
Fisher's Exact Test				.198	.133
Linear-by-Linear Association	2.026	1	.155		
N of Valid Cases	44				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.80.

b. Computed only for a 2x2 table

LAMA KERJA * KERACUNAN Crosstabulation

Count

		KERACUNAN		Total
		tidak keracunan	keracunan	
LAMA KERJA	Tidak lama	1	6	7
	Lama	16	21	37
Total		17	27	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	2.082 ^a	1	.149		
Continuity Correction ^b	1.040	1	.308		
Likelihood Ratio	2.347	1	.125		
Fisher's Exact Test				.220	.154
Linear-by-Linear Association	2.035	1	.154		
N of Valid Cases	44				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.70.

b. Computed only for a 2x2 table

Personal Hygiene * Keracunan Crosstabulation

Count

		Keracunan		Total
		Tidak keracunan	Keracunan	
Personal Hygiene	tidak memenuhi syarat	1	21	22
	memenuhi syarat	16	6	22
Total		17	27	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	21,569 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	18,789	1	,000		
Likelihood Ratio	24,786	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	21,078	1	,000		
N of Valid Cases	44				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,50.

b. Computed only for a 2x2 table

CARA PENYEMPROTAN * KERACUNAN Crosstabulation

Count

		KERACUNAN		Total
		tidak keracunan	keracunan	
CARA PENYEMPROTAN	tidak memenuhi syarat	4	25	29
	Memenuhi syarat	13	2	15
Total		17	27	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	22.145 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	19.178	1	.000		
Likelihood Ratio	23.655	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	21.641	1	.000		
N of Valid Cases	44				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.80.

b. Computed only for a 2x2 table

APD * Keracunan Crosstabulation

Count


		Keracunan		Total
		Tidak keracunan	Keracunan	
APD	Tidak lengkap	1	19	20
	Lengkap	16	8	24
Total		17	27	44

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	17.498 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	14.993	1	.000		
Likelihood Ratio	20.211	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.100	1	.000		
N of Valid Cases	44				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.73.

b. Computed only for a 2x2 table



Lampiran 9

UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

1. PERSONAL HYGIENE

Uji Validitas

Correlations

		Pertanyaan satu	pertanyaan dua	pertanyaan tiga	pertanyaan empat	pertanyaan lima	Total
Pertanyaan satu	Pearson Correlation	1	.555**	.429*	.312	.312	.662**
	Sig. (2-tailed)		.001	.018	.093	.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30
pertanyaan dua	Pearson Correlation	.555**	1	.373*	.342	.342	.701**
	Sig. (2-tailed)	.001		.042	.064	.064	.000
	N	30	30	30	30	30	30
pertanyaan tiga	Pearson Correlation	.429*	.373*	1	.636**	.323	.744**
	Sig. (2-tailed)	.018	.042		.000	.081	.000
	N	30	30	30	30	30	30
pertanyaan empat	Pearson Correlation	.312	.342	.636**	1	.713**	.834**
	Sig. (2-tailed)	.093	.064	.000		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30
pertanyaan lima	Pearson Correlation	.312	.342	.323	.713**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.093	.064	.081	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.662**	.701**	.744**	.834**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.791	5

2. Cara penyemprotan

Uji Validitas

Correlations

		Pertanyaan satu	pertanyaan dua	pertanyaan tiga	pertanyaan empat	Total
Pertanyaan satu	Pearson Correlation	1	.558**	.208	.059	.643**
	Sig. (2-tailed)		.001	.270	.755	.000
	N	30	30	30	30	30
pertanyaan dua	Pearson Correlation	.558**	1	.367*	.085	.718**
	Sig. (2-tailed)	.001		.046	.656	.000
	N	30	30	30	30	30
pertanyaan tiga	Pearson Correlation	.208	.367*	1	.583**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.270	.046		.001	.000
	N	30	30	30	30	30
pertanyaan empat	Pearson Correlation	.059	.085	.583**	1	.632**
	Sig. (2-tailed)	.755	.656	.001		.000
	N	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.643**	.718**	.785**	.632**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Pertanyaan enam	Pearson Correlation	.234	.234	.234	.234	.351	1	.860**	.696**
	Sig. (2-tailed)	.212	.212	.212	.212	.057		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Pertanyaan tujuh	Pearson Correlation	.327	.327	.327	.327	.408*	.860**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.078	.078	.078	.078	.025	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
Total	Pearson Correlation	.658**	.658**	.618**	.618**	.729**	.696**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabel

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.794	7



Lampiran 9

**HASIL PENGUKURAN CHOLINESTERASE DARAH PADA PETANI SAYUR DI
DESA KANREAPIAKECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA**

No	Nama	Hasil	Keterangan
1	Sanusi	75,0	KERACUNAN RINGAN
2	Sudirman	62,5	KERACUNAN RINGAN
3	Hendra	75,0	KERACUNAN RINGAN
4	Arman	75,0	KERACUNAN RINGAN
5	Muh. Basri	62,5	KERACUNAN RINGAN
6	Muh. Ramdan	100	NORMAL
7	Rahmat	62,5	KERACUNAN RINGAN
8	Hamka	75,0	KERACUNAN RINGAN
9	Rosep pamungkas	75, 0	KERACUNAN RINGAN
10	H. Rosuli	80,0	NORMAL
11	Zulfikar	100	NORMAL
12	Asdar	62,5	KERACUNAN RINGAN
13	Ambo Tuo	75,0	KERACUNAN RINGAN
14	Nuar	75,0	KERACUNAN RINGAN
15	Dirham	75,0	KERACUNAN RINGAN
16	Sugianto	75,0	KERACUNAN RINGAN
17	Junaid	100	NORMAL
18	Tahir	62,5	KERACUNAN RINGAN
19	Rais	100	NORMAL
20	Yusuf	75,0	KERACUNAN RINGAN
21	Ahmad Mahmud	25,0	KERACUNAN SEDANG
22	Takdir	100	NORMAL
23	Salman	100	NORMAL
24	Suhardi	62,5	KERACUNAN RINGAN
25	Ali Imran	62,5	KERACUNAN RINGAN
26	Bahri	62,5	KERACUNAN RINGAN
27	Wardiman	62,5	KERACUNAN RINGAN
28	Andika	100	NORMAL
29	Dg Tiro	75,0	KERACUNAN RINGAN
30	Bapak Andika	50,0	KERACUNAN SEDANG
31	Hamdan	75,0	KERACUNAN RINGAN
32	Sommeng	75,0	KERACUNAN RINGAN
33	Hasri	87,5	NORMAL
34	Zaenal	75,0	KERACUNAN RINGAN
35	Nandang	62,5	KERACUNAN RINGAN
36	Aziz	100	NORMAL
37	Iwan	100	NORMAL
38	Abd. Jufri	50,0	KERACUNAN SEDANG
39	Rahman	12,5	KERACUNAN BERAT

40	Yunus	62,5	KERACUNAN RINGAN
41	Herman C	75,0	KERACUNAN RINGAN
42	Sudirman	100	NORMAL
43	Abd rahman	75,0	KERACUNAN RINGAN
44	H. Ilyas	62,5	KERACUNAN RINGAN
45	Agussalim	100	NORMAL
46	Hanif Iswana	50,0	KERACUNAN SEDANG
47	Budi	75,5	KERACUNAN RINGAN
48	Ujang R	50,0	KERACUNAN SEDANG
49	Jabbar	50,0	KERACUNAN SEDANG
50	Rusli	75,0	KERACUNAN RINGAN
51	Ramli	50,0	KERACUNAN SEDANG
52	Mang Wawan	75,0	KERACUNAN RINGAN
53	Rosyid	100	NORMAL
54	Sirajuddin	75,0	KERACUNAN RINGAN
55	Ridwan	62,5	KERACUNAN RINGAN
56	Asdar	50,0	KERACUNAN SEDANG
57	Basri	62,5	KERACUNAN RINGAN
58	Yasin	80,0	NORMAL
59	M. Ridwan	15,5	KERACUNAN BERAT
60	Awal	80,0	NORMAL
61	Sahrul	80,0	NORMAL
62	Yasin	80,0	NORMAL

NORMAL :18
 KERACUNAN RINGAN : 34
 KERACUNAN SEDANG : 8
 KERACUNAN BERAT :2



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nur Rachmatullah Amin, lahir di Takalar pada tanggal 12 Desember 1999. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dari pasangan bapak Aminuddin s.pd dan Ibu Nurliati. Penulis dengan akrab di panggilan Rahmat ini memulai bangku pendidikan sekolah dasar pada tahun 2005 di SD Inpres pari'risi dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Takalar dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah Atas di SMA Negeri 2 Takalar dan selesai pada tahun 2017. Setelah menempuh pendidikan SMA di tahun yang sama penulis memasuki bangku perkuliahan yang merupakan salah satu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat. Tak henti hentinya penulis mengucapkan syukur karena sampai saat ini masih diberi kesehatan sehingga bisa melewati segala rintangan yang disertai dengan perjuangan dan do'a dari orang tua penulis, seluruh keluarga, serta rekan-rekan seperjuangan yang selalu siap untuk bertukar pikiran dan dapat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun skripsi yang berjudul “ Determinan keracunan pada petani sayur pengguna pestisida di Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa”.