

**Isolasi, Karakterisasi, dan Uji Bioaktivitas Metabolit Sekunder dari Spons
Agelas clothrides.**

Isolation, Characterization, and Bioactivity of Secondary Metabolites Chloroform Extract of Sponges Agelas clothrides.

Asri Salehi¹⁾, Rauf Patong²⁾, Ahyar Ahmad²⁾

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Jurusan Kimia Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

The isolation, structure determination and activity test against *bacteria patogen* secondary metabolites of sponges *Agelas clothrides* has been carried out. Separation techniques used consisted of maceration and fractionation, while the structure of compounds were elucidated based on physical, spectroscopic UV and IR data. Two compounds that obtained were predicted as (1) Triterpenoid, and (2) Steroid. Compound (1) showed strong toxicity against *bacteria patogen* 9,51 mm (2) showed high toxicity *bacteria patogen* with 11,41 mm.

Keywords : *Agelas clothrides*, Bioactivity, *Bakteri patogen*., Triterpenoid, Steroid.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan pola penyakit yang ada, maka usaha penemuan obat-obat baru terus dilakukan dan saat ini penelitian cenderung dikembangkan ke arah laut karena sebagian sumber daya alamnya belum dieksploitasi (Nybakken, 1993). Empat per lima jumlah organisme yang ada di dunia ini terdapat di laut, antara lain terdiri dari ikan, spons, karang lunak, echinodermata, ascidian dan tunicates. Beberapa jenis organisme tersebut merupakan sumber vitamin, protein dan mineral. Selain itu, ada juga beberapa jenis organisme yang mensintesis dan menyimpan senyawa toksin yang disebut *marine toxin* pada bagian tubuhnya atau dikeluarkan ke lingkungan hidupnya.

Beberapa peneliti melaporkan bahwa aktivitas substansi dari laut antara lain berkhasiat sebagai antimikroba, antivirus, anti HIV, antikanker dan antiinflamasi (Satari, 1996). Senyawa tersebut merupakan metabolit sekunder yang digunakan dalam sistem pertahanan diri, yaitu untuk mempertahankan hidup dan menghindari gangguan dari organisme lain di lingkungan hidupnya. Karena aktivitas farmakologiknya maka senyawa tersebut memiliki prospek untuk diisolasi dan dimanfaatkan dalam bidang pengobatan (Sardjoko, 1996).

Pengadaan bahan baku obat terus dikembangkan apalagi dalam masa krisis moneter seperti saat ini, dimana harga obat-obatan meningkat dengan pesat hingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat. Dalam pengembangannya, ketersediaan bahan baku, keterjaminan akan kebenaran khasiat, mutu, dan keabsahan obat yang beredar pada masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan (Yuliani, 2001).

Selain sebagai sumber senyawa bahan alam, spons juga memiliki manfaat yang lain, seperti digunakan sebagai indikator biologi untuk pemantauan pencemaran laut (Amir, 1991), dan sebagai hewan penting untuk akuarium laut (Riseley, 1971)

Senyawa-senyawa yang berhasil diisolasi dan diidentifikasi zat bioaktifnya dari spons Indonesia, antara lain : barangamide A-D (**1-4**) (Higa *et al.*, 2001); bitungolide A-F (**5-10**) (Tanaka *et al.*, 2005); lembehyne A (**11**), haliclotriol A-B (**12-13**) (Faulkner *et al.*, 2001); aaptamine (**14**), isoaptamine (**15**), dan methylaaptamine (**16**) (Calcul *et al.*, 2003); dan manadomanzamine A (**17**) (Jiang *et al.*, 2003).

Dengan berkembangnya penelitian senyawa antimikroba baru, kebutuhan akan metode pendeteksian yang cepat dan efisien merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penemuan senyawa aktif. Kompleksnya komponen kimia dari ekstrak tanaman atau biota laut telah memacu berkembangnya usaha isolasi senyawa-senyawa antibakteri dari ekstrak tersebut. Namun demikian, banyaknya jenis bunga karang dapat memberikan keragaman produk metabolit sekunder dengan aktivitas antimikrobal yang berbeda.

Uji resistensi bakteri terhadap bahan antibakteri sudah banyak dilakukan di Indonesia. Dari informasi diperoleh bahwa *E.coli* dan *Salmonella sp* yang diisolasi dari ayam, babi, dan ternak lain sudah banyak yang resisten terhadap antibakteri, tidak hanya terhadap satu antibakteri tetapi juga terhadap beberapa antibakteri (Sri Purnomo *et al.*, 1992). Disamping itu bakteri *Staphylococcus sp* dan *Streptococcus sp*, dan resistensi *Mycoplasma gallisepticum* yang diisolasi dari kasus mastitis pada sapi, banyak yang multiresisten terhadap beberapa antibakteri.

Sebenarnya masalah resistensi bakteri sudah terjadi sejak lama, hanya perhatian terhadap efek resistensi belum begitu besar saat ini. Pada saat ini untuk mengetahui resistensi tidak saja didasarkan atas uji hambatan pertumbuhan di laboratorium, tetapi ditandai juga dengan adanya perubahan cara pengobatan, yang semula hanya dengan sulfonamides

kemudian harus dengan obat yang lebih paten. Penyebaran resistensi dapat terjadi secara transfer genetik.

Pada penggunaan antibakteri yang memiliki efek membasmi yang sangat cepat, zat-zat antibakteri yang tidak meninggalkan residu tidak dapat menciptakan bakteri yang resisten. Resistensi adalah hasil penggunaan jangka panjang dalam jumlah yang sedikit. Dalam eksperimen bahwa bakteri mutan yang resisten terhadap antibiotik, terutama chloramphenicol, ampicillin, tetracycline, dan ciprofloxacin.

Peralihan musim bagi sebagian peternak dianggap sebagai hal yang paling mengkhawatirkan, dimana terjadi penurunan kondisi fisik tubuh ternak, terutama ternak yang minim antibodi, sehingga respon terhadap perlakuan apapun pada ternak menurun. Pola penyakit tercatat sebagai penyebab kerugian terbesar di peternakan, seperti penyakit pernafasan dan pencernaan meliputi ngorok, berak kapur, kolera, dan kolibasilosis (Infovet,2006). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan ekstraksi senyawa antimikroba berupa fraksi kloroform dan fraksi protein dari beberapa jenis bunga karang dan analisis aktivitas antimikrobia terhadap mikroba patogen dari unggas.

Pencarian obat dari spons di beberapa perairan Indonesia telah dilakukan, namun masih banyak lokasi di Indonesia yang belum tersentuh (Wahyuono, 2003). Berdasarkan potensi tersebut, maka pada penelitian ini yang diambil di perairan sekitar Pulau Barang Lompo, karena memiliki keanekaragaman spesies spons yang melimpah (Rahman R, 2004)

METODE PENELITIAN

1. Isolasi dan pemurnian senyawa metabolit sekunder dari spons

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada metode yang sering digunakan dalam mengisolasi senyawa kimia bahan alam yang meliputi pemilihan spesies spons, penentuan lokasi pengambilan sampel, persiapan dan pengambilan sampel hewan, maserasi, partisi, fraksinasi dan analisis spektroskopi dari senyawa murni yang diperoleh dan dilanjutkan dengan uji aktivitas dari senyawa yang diperoleh (Soekamto, 2003).

2. Uji Antibakteri

Skrining aktifitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri *Escherichia coil*, *Staphylococcus aureus*, dan *Salmonella pullorum*, *Pasteurella Mulcotida*. Dasar pemilihan mikroba uji ini adalah karena keempatnya merupakan mikroba patogen yaitu untuk *Escherichia coil* dan *Salmonella pulluom* merupakan bakteri anaerobik fakultatif gram negatif yang bersifat patogenik penyebab utama diare kronik dan tifoid. *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri kokus katalase positif gram positif yang bersifat patogenik

penyebab infeksi kulit dan keracunan makanan, sedangkan *Pasteurella Mulcotida* merupakan yang bersifat patogenik penyebab vaginitis atau keputihan (Hawley, 2003)

Medium yang digunakan untuk menumbuhkan biakan mikroba uji adalah *Muller Hiliton Agar* (MHA), medium ini berisi ekstrak daging peptone sebagai sumber protein dan glukosa sebagai sumber karbohidrat yang diketahui dapat menunjang pertumbuhan bakteri maupun jamur atau disebut juga medium serbaguna. Untuk uji dilusi padat digunakan medium *Glukosa nutrient* agar (GNA) yaitu medium padat yang diberi pematat seperti agar (Hadioetomo, 1990)

Kloramfenikol dipilih sebagai kontrol positif pada uji aktivitas antibakteri karena berspektrum luas yaitu efektif untuk bakteri gram positif dan gram negatif serta mikroorganisme yang lain (Mycek, 2001),

3. Penentuan Struktur Senyawa

Penentuan struktur senyawa dapat dilakukan berdasarkan pengukuran instrument seperti UV dan IR terhadap senyawa bioaktif yang telah dimurnikan.

HASIL PENELITIAN

1. Ekstraksi dan Fraksinasi

Hasil maserasi ekstrak kloroform setelah disaring dievaporasi pada tekanan rendah diperoleh maserat kental berupa residu berwarna coklat sebanyak 1280 mL dan secara konversi berat per volume diperoleh ekstrak sebanyak 142,2 g. Hasil ekstraksi cair-cair dalam corong pisah berturut-turut dengan pelarut n-heksan, kloroform dan etil asetat pada penguapan menggunakan alat rotary vapor dengan tekanan rendah diperoleh ekstrak n-heksan (10,45 g), kloroform (11,367 g).

Ekstrak kloroform (11,367g) tersebut selanjutnya difraksinasi dengan menggunakan KKV dan eluen n-heksan, campuran n-hesan-etil asetat dengan peningkatan kepolaran diperoleh 15 fraksi. Berdasarkan analisis KLT fraksi dengan Rf yang sama digabung hingga diperoleh 8 fraksi utama (A-I), kemudian dievaporasi dan ditentukan beratnya serta dimonitor dengan KLT.

Fraksi 3, setelah difraksinasi dengan KKT menggunakan eluen n-heksan, campuran n-heksan etil asetat dengan peningkatan kepolaran diperoleh 15 fraksi.

Fraksi 7 berupa serbuk putih kekuningan, dikristalisasi dan direkristalisasi dengan metanol diperoleh senyawa (1) berupa serbuk putih sebanyak 4,2 mg dengan titik leleh 118 –119 °C. Kemurnian senyawa tersebut dengan melalui analisis KLT yang menunjukkan noda tunggal dengan tiga macam sistem eluen.

Fraksi utama ke 3 setelah dikristalisasi dengan metanol menghasilkan senyawa (2) yang berupa kristal putih sebanyak 11,2 mg. Kristal tersebut larut dalam pelarut n-heksan. Fraksi utama 3 difraksinasi lebih lanjut dengan menggunakan KKT dengan eluen etil-asetat–n-heksan 40% diperoleh 5 fraksi. Setelah fraksi dikristalisasi dengan aseton kemudian fraksi 3 dan fraksi HX dianalisis dengan KLT secara bersama-sama, karena analisis KLT mempunyai nilai Rf yang sama dengan titik leleh 187 – 189 °C. Karakter senyawa tidak

berpendar dibawah UV, namun dengan menggunakan pereaksi penampak noda seriumsulfat menunjukkan noda mula-mula berwarna biru kemudian memudar dan larut dalam kloroform. Kemurnian senyawa (2) dibuktikan melalui analisis KLT dengan tiga macam sistem eluen yang menunjukkan noda tunggal.

2. Uji Bioaktivitas. antibakteri

Tabel 1. Nilai aktivitas hambatan dalam mm ekstrak kasar dari beberapa spons.

Jenis spons	Jenis bakteri			
	SA	SP	EC	PM
BLU 01	-	-	11,15	9,5
BLS 02	-	10,75	12,4	9,5
BLU 03	-	-	11,15	15,1
BLS 04	-	-	9,15	-
K.(+)	10,75	16,5	24,6	24,7
K.(-)	-	-	-	-

Tabel 2. Nilai aktivitas antibakteri 8 fraksi utama hasil fraksinasi ekstrak kloroform spons *Agelas clothrides*

Fraksi Utama	Jenis bakteri			
	SA	SP	EC	PM
F1	-	-	-	-
F2	-	12,05	15,5	10,75
F3	-	-	11,15	-
F4	-	12,5	12,5	-
F5	-	18,9		
F6				
F7	12,2	-	11,6	-
F8	-	-	-	10,5
K +	16,6	13,7	22,1	21,9
K -				

Tabel 3. Zona hambatan antibakteri dalam mm senyawa (isolat tunggal)

No	Senyawa	Berat (mg)	Zona hambatan antibakteri (mm)
1.	Senyawa 1	4,2	9,4
2.	Senyawa 2	11,2	10,3

3. Pengukuran Spektroskopi

Senyawa (1) diperoleh sebagai serbuk berwarna putih dengan titik leleh 118 – 119 °C. UV (MeOH) λ_{maks} : 237 nm dan 366 nm; penambahan pereaksi NaOH menunjukkan λ_{maks} : 237 nm dan 366 nm; spektrum IR (Kbr) ν_{maks} cm^{-1} : >3000 cm^{-1} (OH), 2918,

2962, 2850 cm^{-1} (C-H alifatik) 1705 cm^{-1} (C=O), 1261, cm^{-1} (O-CH₃), 1097 cm^{-1} (C-O), 1465 cm^{-1} dan 1407 cm^{-1} (CH₂ dan CH₃) serta tekukan keluar bidang C-H pada serapan 865, 801 dan 720 cm^{-1}

Senyawa (2) diperoleh sebagai kristal berwarna putih dengan titik leleh 129 – 131 °C. UV (MeOH) λ_{maks} : 229 nm dan 274 nm; penambahan pereaksi geser NaOH menunjukkan λ_{maks} : 229 nm dan 274 nm; spektrum IR (Kbr) ν_{maks} cm^{-1} : 3433 cm^{-1} (OH), 2924 dan 2851 cm^{-1} (C-H alifatik) 1107 (C-O), 1710 cm^{-1} (C=O), 1464 dan 1374 cm^{-1} (CH₂ dan CH₃) serta serapan tekukan keluar bidang C-H pada serapan 959, 879 dan 793 cm^{-1} .

PEMBAHASAN

1. Interpretasi senyawa

Senyawa 1 diperoleh berbentuk serbuk berwarna putih dengan titik leleh 118–119 °C. Hasil uji kualitatif dengan pereaksi Liebermann Burchard menunjukkan positif warna merah ungu yang mengindikasikan golongan senyawa triterpenoid.

Dari spektrum UV tampak bahwa **senyawa 1** memberikan pita serapan maksimum pada daerah panjang gelombang λ_{maks} 237 nm (9230) dan serapan pada panjang gelombang λ_{maks} 366 nm (727), setelah penambahan pereaksi geser NaOH tidak menyebabkan pergeseran panjang gelombang yang mengindikasikan bahwa tidak ada pergeseran gugus hidroksil.

Dari data spektrum IR tersebut di atas, nampak adanya serapan pada ν_{maks} >3000 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus OH, serapan pada 2918, 2962, 2850 cm^{-1} yang sangat kuat dan tajam menunjukkan adanya gugus C-H alifatik diikuti dengan serapan pada ν_{maks} 1463 cm^{-1} yang merupakan tekukan C-H alifatik dari CH₂ dan serapan pada ν_{maks} 1385 cm^{-1} yang merupakan tekukan C-H alifatik dari CH₃ yang khas untuk golongan triterpenoid (Yoshihiro *et al*, 2001). Serapan pada 1705 cm^{-1} yang menunjukkan regangan ulur ikatan C=O sebagai keton siklik, serapan pada 1261 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus metoksi dan serapan pada 1097 cm^{-1} merupakan regangan ulur dari C-O alkohol sekunder serta tekukan keluar bidang gugus C-H pada serapan 865, 801 dan 720 cm^{-1} .

Berdasarkan data-data di atas dan hasil studi literatur senyawa-senyawa triterpenoid maka dapat disimpulkan bahwa **senyawa 1** adalah senyawa golongan triterpen.

Senyawa 2 diperoleh berbentuk kristal berwarna putih dengan titik leleh 129– 131 °C. Karakter senyawa ini tidak berpendar dibawah UV, namun dengan menggunakan pereaksi penampak noda seriumsulfat menunjukkan noda mula-mula berwarna biru kemudian memudar dan larut dalam kloroform. Hasil uji kualitatif dengan pereaksi Liebermann Burchard menghasilkan warna hijau biru yang mengindikasikan senyawa golongan steroid hal ini juga didukung dengan adanya analisis spektrum UV dan IR.

Selanjutnya informasi mengenai **senyawa 2** sebagai senyawa steroid diperoleh dari spektrum infra merah nampak adanya bilangan gelombang maksimum pada daerah ν_{maks} 3433 cm^{-1} yang merupakan serapan untuk gugus OH (hidroksil), indikasi terhadap adanya gugus hidroksil


didukung oleh serapan pada daerah ν_{maks} 1107 cm^{-1} merupakan regangan ulur dari C-O alkohol sekunder yang khas untuk golongan steroid (Guogiang *et al*, 2005). Pada bilangan gelombang ν_{maks} 2924, 2851 cm^{-1} terdapat serapan yang sangat kuat dan tajam menunjukkan adanya gugus C-H alifatik diikuti dengan serapan pada ν_{maks} 1464 cm^{-1} yang merupakan tekukan C-H alifatik dari CH_2 dan serapan pada ν_{maks} 1374 cm^{-1} yang merupakan tekukan C-H alifatik dari CH_3 . Bilangan gelombang pada ν_{maks} 1710 cm^{-1} menunjukkan adanya serapan gugus karbonil (C=O) sebagai keton siklik dan bilangan gelombang pada gelombang ν_{maks} 1259 cm^{-1} yang kuat menunjukkan adanya gugus metoksi serta tekukan keluar bidang C-H pada serapan 959,879 dan 793 cm^{-1} .

Berdasarkan data-data di atas dan hasil studi literatur senyawa-senyawa steroid maka dapat disimpulkan bahwa senyawa 2 adalah senyawa golongan steroid.

2. Uji Bioaktivitas Senyawa Metabolit Sekunder

Metabolit sekunder ekstrak n-heksan, fraksi-fraksi, dan isolat tunggal yang diperoleh dari spons *Agelas clothrides*. diuji aktivitasnya dengan menggunakan bakteri patogen pada unggas. Hasil uji menunjukkan adanya toksisitas yang cukup tinggi bahkan ada yang toksisitasnya tergolong sangat tinggi. Aktivitas ekstrak awal kloroform, terhadap bakteri patogen pada unggas Hasil ini menunjukkan bahwa ekstrak kloroform sangat aktif. Hal ini mengindikasikan bahwa fraksi-fraksi dari ekstrak kloroform spons *Agelas clothrides* kemungkinan mengandung senyawa yang bersifat bioaktif atau kemungkinan terdapat beberapa senyawa yang tidak aktif yang bergabung dan saling memperkuat bioaktivitasnya sehingga menyebabkan fraksi tersebut aktif.


Fraksi yang toksisitasnya tergolong sangat tinggi, yaitu fraksi G dengan hambatan 12,2 mm menunjukkan bahwa pada fraksi ini terdapat senyawa yang sangat aktif atau bersifat bioaktif. Hal ini didukung dengan ditemukannya senyawa golongan triterpenoid.. Aktivitas yang sangat tinggi pada senyawa triterpenoid dengan gugus asam karboksilat juga dijumpai pada asam (24Z)-3-oksotirukalla-7,24-dien-26-olat dan asam *epi*-oleanolat (Gambar 5) yang berhasil diisolasi dari daun *Celaenododendron mexicanum* (Euphorbiaceae). Kedua senyawa ini mempunyai aktivitas anti-protozoa (Manuel *et al.*, 2001).



Gambar 1. Struktur Molekul Senyawa Triterpenoid Asam Karboksilat

Fraksi C dan fraksi B dengan 10,9 mm dan 12,1 mm juga tergolong fraksi yang aktif. Hasil fraksinasi fraksi E dan fraksi F memperlihatkan hambatan lemah. Fraksi 3, Fraksi 7 dilakukan uji bioaktivitas walaupun tidak larut sempurna dalam larutan uji yang digunakan dalam hal ini adalah DMSO

Kemudian fraksi 3, dan fraksi 7 yang aktivitasnya tergolong sangat tinggi 10,9 mm setelah direksistalisasi diperoleh senyawa (2) yang dipastikan sebagai senyawa golongan steroid menunjukkan bahwa pada fraksi ini terdapat senyawa yang bersifat bioaktif. Hal ini didukung dengan ditemukannya senyawa golongan steroid pada fraksi tersebut. Golongan senyawa steroid yang hampir selalu dapat ditemukan pada hewan dan tumbuhan. Senyawa ini diduga terbentuk dari asam asetat melalui jalur asam mevalonat kemudian mengalami beberapa reaksi kondensasi, siklisasi dan sebagainya hingga terbentuk senyawa antara/intermediate. Penggunaan senyawa-senyawa aktif farmakologik yang berasal dari alam seperti turunan steroid sangat penting artinya ditinjau dari segi kesehatan karena efek sampingnya relatif kecil dibanding dengan senyawa sintetik. Di samping itu, bahan baku senyawa-senyawa ini juga dapat diperbaharui. Senyawa golongan steroid seperti β -sitosterol memiliki efek farmakologis yaitu mampu menghambat kerja enzim yang mengkonversi testosteron menjadi dehidrotosteron (DHT) yang merupakan penyebab terjadinya kanker prostat (Renai Sante dalam Sapar, 2004).



Gambar 2. Struktur molekul senyawa steroid (β -sitosterol)

KESIMPULAN

Hasil interpretasi data fisik dan spektrum (UV dan IR) menghasilkan 2 jenis senyawa yang diperoleh merupakan (1) senyawa triterpenoid dan (2) senyawa steroid. Hasil uji bioaktif yang dilakukan terhadap bakteri patogen pada unggas memperlihatkan bahwa senyawa (1) sangat toksik terhadap bakteri patogen pada unggas 9,51 mm sedang senyawa (2) cukup toksik terhadap bakteri patogen pada unggas 11,41 mm

SARAN

Agelas clothrides berpotensi untuk dikembangkan sebagai fitofarmaka mengingat senyawa yang terkandung di dalamnya bersifat bioaktif. Untuk itu perlu dilakukan eksplorasi lebih jauh dan analisis spektrum lebih lanjut agar dapat diketahui secara pasti struktur senyawa yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S.A. 2004. *Empat puluh tahun dalam kimia organik bahan alam tumbuh-tumbuhan tropika Indonesia*, Rekoleksi dan Prospek. Bulletin of The Indonesian Society of Natural Products Chemistry, 4(2): 5-54.
- Anderson, J.E., Goetz, C.M, and McLaughlin, J.L. 1990. A blind Comparison of Simple Banch-top Bioassay and Human Tumour Cell Cytotoxicities as Anti tumour Prescreen. *Phytochemical Analysis* . 6: 107-111
- Anonim, 2003. *Foundation Scuba Diver Indonesia*. <http://www.Terangi.or.id/> Indonesian/terumbu-Indon, diakses 2008.
- Anonim, 2006, *Mencari Obat Mujarab Laut*. <http://www.Forek.or.id>, diakses 2008.
- Amir, I & Bidiyanto, A., 1996, *Mengenal Spons Laut (Demospongia) Sec. Umum*. Oseana, Vol 21 No 2, Lipi, Jakarta.
- Astuti, P., 2003, *Spons Invertebrata Laut Berpotensi sebagai Sumber Bahan Baku Obat Alam*, vol 8 No.26 Oktober-Desember (Edisi khusus). Bagian Biologi-Farmasi, UGM, Yogyakarta.
- Barnes, R., P. Calon and P. Olive, 1989. *The Invertebrata*. Blacwell Scientific Pub. Oxford. London. Edinburg. Boston Melbourne. Five Pub: 49-53.
- Barnes., R.S.K., 1999. *A new Synthesis*. Second Edition. Blacwel Science, UK, 49-52.
- Caraan, G.B., Lazaro, J.E., Concepcio, G.P., 1994, *Biological Assays for Screening of Marine Samples, Second Marine Natural Product Workshop*, Marine Science Institute and Institute of Chemistry, University of the Philipines.
- Dini, I. 2005. *Penelusuran Metabolit Sekunder Ekstrak Kulit Batang Tumbuhan Paliasa (Kleinhovia hospita Linn.) dan Bioaktivitasnya terhadap Artemia salina Leach*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Kimia Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Eru Wibowo, A., dkk., 2005, *Studi Eksplorasi Senyawa Metabolit Sekunder dari biota Laut*, Pusat Pengkajian dan penerapan Teknologi Farmasi dan Medika. <http://www.Iptek.com>, diakses 2008.
- Fusetani, N., J Warabi, K. Nogata, Y., Nakao, Y & Matsunaga, S. 1997. *Koshikamide Al, a new Cytotoxic Linear Peptide Isolated from a Marine Sponge, Theonella sp.* Tetrahedron letters 40, 4687-4690.
- Garson, M.J., 1994. *The Biosynthesis of Sponge Secondary Metabolites: Why it is Important?* In : Soest, R. W. M. van, Th. M.G. van Kempen and J. C. Braekman, *Sponges in Time and space*. Proc. 4 th Int. Porifera Congr. Rotterdam: Balkema.
- Gatot, D. 1984. *Kemoterapi Tumor Ganas dalam "Tumor Ganas pada Anak"*. Bagian Patologi Anatomi, FK-UI, Jakarta, 99-105.
- Gan, S. 1987. *Anti Kanker dalam "Farmakologi dan Terapi"*, Edisi III, Bagian Farmakologi FK-UI, Jakarta. 625-626, 635..
- Gisela P.C., Gina, C., dan Lazaro, J.E. 1994. *Biological Essay For Screening Of Marine Samples, "In Natural Product Workshop"*, Work Book, Marine Science Institut, University Of The Philipines, Philipine, 15-18.
- Guogiang Li, Zhiwei, D., Huasi, G., Leen van, O., Peter, P & Wenhan, L. 2005. Steroids from the soft coral *Dendrophyta sp.* www.elsevier.com/locate/steroids. Diakses 2008.
- Hadi, S. and John B. Bremner. 2001. *Initial Studies on Alkaloids from Lombok Medicinal Plants: Molecules*. Departement of Chemistry; University of Wollongong; Wollongong V. 6. 117-129, Australia.
- Harryanto, A.R., Aru, W.S., 1990. *Kemoterpi Kanker dalam Ilmu Penyakit Dalam*. Jilid II, Balai Penerbit FK-UI, Jakarta, 524-529.
- Hooper, J.N.A., 1997. *Guide to Sponge Collection and Identification*. Version Merch. Queensland Museum South Brisbane, Queensland.
- Hostettmann, K., Hostettmann, M., Marston, A. 1991. *Isolasi dan Uji Sitotoksik Senyawa Bahan Alam*. ITB, Bandung.
- Jasin, M., 1987. *Sistematika Hewan Invertebrata dan Vertebrata*. Sinar Wijaya. Surabaya.
- Kompas, 2004. *Menggali Bahan Baku Obat di Dalam Laut*. Terbit 12 Mei 2004. Jakarta.
- Lomis, T.A., 1978. *Toksikologi Dasar*. Edisi III, Penerjemah Imono Argo, IKIP Semarang Press, 4, 16-21.
- Manuel J. and Luis M., 2001. Plant Natural Product With Leishmaniacidal Activity. *J. The Royal Society of Chemistry*, 18: 674-688.
- McLaughlin, J. L., C.J. Chang, and D.L. Smith, 1991. *Benclop : Bioassay for The Discovery of Bioactive Natural Products an update; in studies in Natural Products Chemistry*. Elsevier, Amsterdam, in Press. 1-10.
- Meyer, B.N., N.R. Ferrigni, J.E Putnan, L.B. Jacobsen, D.E. Nicholas, J.L. McLaughlin 1982. *Brine Shrimp: A*

- Convenient General Bioassay for Active Plant Constituent*. Departement of Medical Chemistry and Pharmacognocny, School of Pharmacy and pharmacal science, and Cell Culture Libratory, Perdue Cancer Center. West lavayette. USA.
- Raflizar, Adimunca, C.,Tuminah, S. 2006. Dekok Daun Paliasa (*Kleinhovia hospita* Linn) Sebagai Obat Radang Hati Akut. *Cermin Dunia Kedokteran*. **50**: 10-14.
- Rahmaniar, 2003. *Produk Alam Laut sebagai Lead Compound untuk Farmasi dan Pertanian*, Dibawakan pada Seminar Sehari Perpektif baru dalam Drug. Discovery, Makassar, 2008.
- Rahman,R, Abd & Ahmad ridhay, 2004. *Penapisan senyawa Antimikroba dari Beberapa Jenis Bunga Karang (Porifera)*.Tesis tidak diterbitkan. Makassar, Jurusan Farmasi Univeritas Hasanuddin.
- Romimohtarto,K & Sri Juwana, 2001. *Biologi Laut*, Ilmu Pengetahuan Tentang Biota Laut, Djambatan, Jakarta.
- Rosmiati & Suryati,E 2001, *Isolasi, Identifikasi dan Pengaruh senyawa Bioaktif Spona terhadap Bakteri Patogen udang*. <http://Pustaka.bogor.net/publ/J> biotek diakses2008.
- Rusli, 2005. *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif Anti Mikroba Beberapa Spons dari Perairan Pulau Samalona*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Kimia Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Sapar, A., A.S. Kumanireng, N, de Voogd, Alfian N, 2004. *Isolasi dan Penentuan Struktur Metabolit Sekunder Aktif Sponges *Biemna triraphis* Asal Pulau Kapodasang (Kepulauan Spermonde)*, Marina Chemica Acta. J.V. 6 NO.1.
- Sarjoko, 1996. *Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas, Rancangan Rasional dalam Pengembangan Senyawa Bioaktif*, Dibawakan pada Seminar sehari Perspektif baru dalam Drug. Discovery, Ujung Pandang.
- Satari, RR, 1999. *Penelitian Produk Bahan Alam Laut di Indonesia*. Arah dan prospek: Seminar Nasional Kimia Bahan Alam. Jakarta.
- Scheuer, P.J., (Ed), 1978. *Marine Natural Product : Chemical and Biological Perspectives*. Vol. II. Academic Press, Inc. New York. USA.
- Scmidt, E.W and Faulkner, D.J. 1998. *Mecrosclerodermis C-E, Anrifungal Cyclic, peptide from the lithistid Marine Sponges *Theonella* sp and *Microscleroderma* sp*, Tetrahedron 54, 3043-3056.
- Soekamto, N.H., 2003. *Profil Fitokimia Beberapa Spesies Moraceae Indonesia*; Disertasi tidak diterbitkan. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Troter II, R.T., Logan, M.H., Rocha, J.M., dan Bonetta, J.L., 1983. *Ethnography and Bioassay : Combined Methods for a Preliminary Screen of Home Remedies for Potensial Pharmacological Activity*. MFI, J. of Pharm, vol 6, no 4.
- Ulfa, M. 2006. *Isolasi, Karakterisasi dan Uji Bioaktivitas Metabolit Sekunder Ekstrak Kulit Batang Tumbuhan Paliasa (*Kleinhovia hospita* Linn.)*. Tesis tidak diterbitkan. Makassar: Jurusan Kimia Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Wahyuono, S., 2003, *Mencari Obat antikanker dari Spons Perairan Indonesia*, Cakrawala Suplemen Pikiran Rakyat. <http://www.Pikiranrakyat.com>, diakses 2008.
- Wiryowidagdo, S & W. Moka, 1995. *Identifikasi dan Eksplorasi Organisme Laut sebagai Sumber Bahan Baku obat* di Kepulauan Spermonde Sul-Sel.
- Yuliani, S. 2001. *Prospek Pengembangan Obat Tradisional Menjadi Obat Fitofarmaka*. *Jurnal Litbang Pertanian Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat - Bogor*. **20**,(3).
- Yoshihiro, M., Masoto, F., Akihito,Y., Yutaka, S., Shigenori, & Hiroshi,S. 2001. Triterpene glycosides from the roots of *Sanguisorba officinalis*. www.elsevier.com/locate/phytochem. Dieakses 2008.

