

**PENGARUH BAWANG PUTIH TERHADAP PENURUNAN  
TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS BALANGNIPA  
KECAMATAN SINJAI UTARA  
KABUPATEN SINJAI**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**ARNI DAMAYANTI**  
**70300110017**

**JURUSAN KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2014**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan sinjai Utara Kabupaten Sinjai , NIM : 70300110017, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu. Tanggal 5 September 2014 M, bertepatan dengan 10 Dzulqaedah 1435 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 5 September 2014 M

10 Dzulqaedah 1435 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, S.KM.,M.Kes (.....)

Munaqisy I : Risnah, S.KM.,S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Munaqisy II : Drs. Syamsul Bahri, M.Si (.....)

Pembimbing I : Hj. St. Suriah N.Zen.,S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Pembimbing II: Mahyuddin, S.Kep.,Ns.,M.Kes (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP: 19550203 198312 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arni Damayanti  
Nim : 70300110017  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 7 September 1991  
Jurusan : Keperawatan  
Fakultas : Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jln. Damai Unhas Pondok Nuraeda  
Judul : Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah  
pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas  
Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 5 September 2014

Penyusun,

Arni Damayanti  
Nim. 70300110017

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kalimat yang paling pantas penulis panjatkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan untuk menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”. Penelitian dan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Keperawatan pada Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai *Sang Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia di atas bumi ini.

Sumber inspirasi terbesar, semangat hidup dalam menggapai cita-cita, kedua orang tuaku Muh. Jafar dan Muhaidah, yang tak habis-habisnya dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasinya dalam berbagai bentuk serta doa restu yang terus mengiringi perjaanan kehidupanku. Saudari-saudariku Wahdaningsi dan Megawati serta keluarga besarku yang juga memberikan dukungan dan doa restunya kepadaku.

Dengan kerendahan hati, melalui kesempatan ini Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Fatmawaty M., S.KM., M.Kes, selaku wakil dekan bidang akademik, Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt selaku wakil dekan bidang administrasi dan Drs. Wahyuddin M.Ag selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan.
3. Dr. Nurhidayah, S.Kep.,Ns.,M.Kes, selaku ketua prodi Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan yang selalu memberikan arahan, motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
4. Hj. St. Suriah N.Zen, S.Kep., Ns., M.Kes, selaku pembimbing I atas ketulusan hati dan kasih sayangnya dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Mahyudin, S.,Kep.,Ns.,M,Kes, selaku pembimbing II atas ketulusan hati dan kasih sayangnya dalam membimbing dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Risnah, S.KM., S.Kep., Ns., M.Kes, selaku penguji I sekaligus sebagai sekretaris jurusan yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan Skripsi ini.

7. Para pegawai, staf dan dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang sangat besar bantuannya dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Para sahabat yang terus memberikan ide, motivasi, kritik dan saran serta literature dalam penyelesaian Skripsi ini terutama Nurfadillah Abbas, Andi Jumriati Zainuddin, Astina N, Dian Permatasari, Dwi Agustiani Aisyah, Biharsini Hasbah, Fadillah, Tria Satria serta teman-teman seangkatan lainnya yang bergabung dalam Keluarga Besar Angiopati 2010 yang tak bisa disebutkan satu persatu.
9. Para sahabat KKN angkatan ke-49 Kecamatan Barombong Kelurahan Tamannyeleng yang telah banyak memberikan motivasinya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat umumnya. Aamiin...

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, 5 Agustus 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis Penelitian.....	4
D. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif .....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tekanan darah.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang Bawang Putih.....	29



C. Kerangka Konsep.....	41
D. Kerangka Kerja .....	42
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....</b>	<b>44</b>
A. Desain Penelitian.....	44
B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....	44
C. Populasi Dan Sampel .....	45
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	46
E. Pengumpulan Data .....	48
F. Pengolahan Dan Analisis Data.....	48
G. Penyajian Data .....	50
H. Pertimbangan Etik Penelitian.....	50
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Hasil penelitian.....	56
C. Pembahasan.....	61
D. Keterbatasan penelitian .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Implikasi Penelitian.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Klasifikasi Hipertensi Menurut WHO.....	17
Tabel 4.1	Distribusi responden pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi pada warga di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	56
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi hipertensi sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	57
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	58
Tabel 4.4	Pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	60

## DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	59



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Konsep Penelitian.....	41
Gambar 2.2	Kerangka Kerja.....	42



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran 2 *Informed Consent*
- Lampiran 3 Lembar Observasi
- Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 5 Master Tabel
- Lampiran 6 Hasil Analisis Data
- Lampiran 7 Surat Izin Pengambilan Data
- Lampiran 8 Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 9 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10 Surat Keterangan telah Menyelesaikan Penelitian
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nama : Arni Damayanti**

**Nim : 70300110017**

**Judul : Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

---

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah meningkat secara kronik dan melebihi batas normal. Hasil pengukuran tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg. Salah satu cara untuk menurunkan tekanan darah adalah dengan mengkonsumsi bawang putih berbentuk olahan saringan (ekstrak) yang memiliki kandungan *Alisin* yang dapat menurunkan tekanan darah. Tujuan dari Penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi.

Penelitian ini menggunakan *pre experimental* dengan *rancangan one group pre test-post test desain*. Populasi penelitian ini adalah warga di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Waktu penelitian yaitu pada tanggal 01 Agustus – 04 Agustus 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 15 responden yang sesuai dengan kriteria Inklusi. Alat ukur yang digunakan adalah lembar observasi, Tensi dan bawang putih.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  $p$  Value = 0,002 atau  $p < 0,005$  sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bawang putih berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Untuk Penelitian lanjutan diharapkan peneliti menggunakan sampel yang lebih banyak dan perlakuan yang lebih lama yang dilakukan secara rutin sehingga mungkin akan menimbulkan efek yang lebih besar terhadap penurunan tekanan darah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Pada era globalisasi saat ini, perkembangan ilmu kesehatan makin pesat, mulai dari sarana dan prasarana kesehatan, maupun sumber daya manusia yang makin ahli dalam bidang masing-masing. Namun bukan berarti bahwa hal itu sudah cukup untuk menjawab segala permasalahan dalam kesehatan itu sendiri, hal ini disebabkan manusia pada kodratnya yang tidak sempurna. Kebutuhan akan penyembuhan penyakit, menyebabkan timbulnya orang-orang yang mencoba mengatasi penyakit dengan mencari cara pengobatan beserta obat-obatannya (Slamet, 2009)

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan dimana tekanan darah meningkat secara kronik dan melebihi batas normal. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 kriteria hipertensi yang digunakan pada penetapan kasus merujuk pada kriteria diagnosis JNC VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg. Kriteria JNC VII 2013 hanya berlaku untuk umur  $\geq 18$  tahun, maka prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah dihitung hanya pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun.

Penyembuhan dengan herbal merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi hipertensi. Salah satu herbal yang tersohor khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah adalah bawang putih. Ribuan tahun sebelum Masehi bawang putih telah di kenal luas oleh herbalis pada masanya untuk menyembuhkan hipertensi. Salah satu bukti sejarah Mesir, Yunani, dan Roma<sup>1</sup> menyebut secara jelas bahwa bawang putih adalah herbal yang ampuh untuk mengatasi penyakit yang di tandai dengan tekanan darah tinggi (Lingga, 2012). Uji klinis untuk membuktikan khasiat bawang putih sebagai antihipertensi dilakukan banyak ahli dari berbagai Negara. Semua studi laboratorium ataupun studi klinis menyimpulkan bahwa bawang putih efektif untuk menurunkan tekanan darah (Lingga, 2012)

Pada analisis hipertensi terbatas pada usia 15-17 tahun menurut JNC VII 2003 didapatkan prevalensi nasional sebesar 5,3 persen (laki-laki 6,0% dan perempuan 4,7%), perdesaan (5,6%) lebih tinggi dari perkotaan (5,1%). Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui pengukuran pada umur  $\geq 18$  tahun sebesar 25,8 persen, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%), Kalimantan Timur (29,6%) dan Jawa Barat (29,4%). Sedangkan di Sulawesi Selatan sendiri terdapat (28, 1%) merupakan peringkat 26 dari 33 provinsi. Prevalensi hipertensi di Indonesia yang didapat melalui kuesioner terdiagnosis tenaga kesehatan sebesar 9,4%, yang didiagnosis tenaga kesehatan atau sedang minum obat sebesar 9,5%. Jadi, ada 0,1% yang minum obat sendiri. Responden yang mempunyai tekanan darah normal tetapi sedang minum obat



hipertensi sebesar 0.7%. Jadi prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 26,5% (25,8% + 0,7 %) (Riskesdes, 2013)

Dari hasil penelitian yang dilakukan Yumiati, dkk (2010) mengenai perbandingan efektifitas seduhan bawang putih dengan *captopril* terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi bahwa perbandingan tekanan darah sistol dan diastol pada kelompok intervensi bawang putih (n=15), *captopril* (n=15) dan kontrol (n=15) sesudah diberikan terapi memperlihatkan ada perbandingan yang sangat signifikan pada tekanan darah sistol dan diastole setelah diberikan intervensi dengan nilai *p value* =0,000 dengan  $\alpha$  5% ( $p < 0,05$ ) yang berarti adanya perbedaan yang sangat signifikan antar kelompok responden. Sehingga terapi seduhan bawang putih sangat efektif dalam menurunkan tekanan darah baik sistol maupun diastol.

Berdasarkan data awal dari Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai tahun 2013 dalam jumlah kunjungan (rawat jalan) di Kelurahan Balangnipa pasien hipertensi terdapat 82 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 39 orang dan perempuan 43 orang. Untuk Kelurahan Lappa pasien hipertensi terdapat 40 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 15 orang dan perempuan 25 orang. Di Kelurahan Bikeru jumlah pasien hipertensi terdapat 18 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 7 orang dan perempuan 11 orang dan Kelurahan Bongki pasien hipertensi terdapat 2 kasus hipertensi, jumlah laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang.

Data dari Puskesmas Balangnipa menunjukkan hipertensi masih cukup tinggi dan bahkan cenderung meningkat dengan gaya hidup yang jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat, mahalnya biaya pengobatan, disertai kurangnya sarana dan prasarana penanggulangan hipertensi. Bahkan warga Kabupaten Sinjai sendiri khususnya di area kerja Puskesmas Balangnipa beberapa belum menyentuh pengobatan tradisional berupa bawang putih yang merupakan salah satu herbal yang dapat digunakan untuk mengobati hipertensi. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini yaitu: Apakah Ada Pengaruh Bawang Putih Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai?

### **C. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian (Nursalam, 2008). Adapun hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )**

Tidak ada pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

## 2. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

### *D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif*

#### 1. DO: Olahan saringan bawang putih

Olahan saringan bawang putih merupakan cara membuat penurunan tekanan darah dengan mengkonsumsi hasil ekstrak bawang putih dengan cara merubah bawang putih dari padat menjadi cair melalui prosedur yang telah ditetapkan.

KO: ekstrak bawang putih yang berbentuk olahan saringan bawang putih yaitu 3 siung bawang putih (6 gram) ditumbuk halus dan diperas dengan air matang sebanyak 30 ml kemudian di saring. Minum secara teratur selama 4 hari, 2 gelas dalam sehari (pukul 08.00 WITA dan pukul 13.00 WITA)

#### 2. DO: Penurunan tekanan darah

Penurunan tekanan darah merupakan alternatif untuk menurunkan tekanan darah dengan melihat selisih tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih dimana tekanan pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung keseluruhan anggota tubuh manusia.

KO: batasan penurunan tekanan darah dari awal pengukuran hingga terjadi penurunan setelah diberikan olahan saringan bawang putih.

### ***E. Kajian Pustaka***

Yumiati, dkk (2010) melakukan penelitian di Kota Pekanbaru menyatakan bahwa hasil uji statistik pada kelompok intervensi bawang putih dengan menggunakan uji *Repeated Anova* untuk tekanan darah sistol diperoleh perubahan tekanan darah dari 157,53 mmHg menjadi 139,33 mmHg dengan p value = 0,000 dan uji *Repeated Anova* tekanan darah diastole dari 94,00 mmHg menjadi 81,27 mmHg dengan p value = 0,000 dimana nilai  $p < \alpha$  (0,005). Hasil ini dapat disimpulkan terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tekanan darah sistol dan tekanan darah diastol setelah diberikan terapi seduhan bawang putih.

Darmadi dan Riska Habriel Ruslie (2013) melakukan penelitian di Kabupaten Way Kanan menyatakan bahwa terjadi penurunan tekanan darah sistolik sekitar  $4,6 \pm 2,8$  mmHg pada kelompok yang mendapat terapi bawang putih dibandingkan plasebo  $p=0.001$ . Penurunan tekanan darah sistolik pada pasien hipertensi rata-rata  $8,4 \pm 2,8$  mmHg, sementara penurunan tekanan darah diastolik pada pasien hipertensi dengan terapi bawang putih rata-rata  $7,3 \pm 1,5$  mmHg  $p<0,00001$ . Efek antihipertensi dari bawang putih sudah diteliti namun masih bersifat kontroversial. Penelitian pada binatang menunjukkan bawang putih dapat menurunkan tekanan darah, tetapi penelitian pada manusia menunjukkan hasil yang bervariasi. Namun, pada penelitian-penelitian sekarang ini, didapatkan

bahwa bawang putih secara ermakna lebih superior dibandingkan plasebo. Dalam menurunkan tekanan darah. Dari hasil meta-analisis dan bawang putih angat toleransi oleh tubuh maka bawang putih dapat digunakan sebagai bagian dari diet sebagai salah satu strategi tatalaksana hipertensi.

## ***F. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Diketuainya pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Terindifikasinya jumlah penderita hipertensi sebelum pemberian olahan saringan bawang putih.
- b. Terindifikasinya jumlah penderita hipertensi setelah pemberian olahan saringan bawang putih.
- c. Diketuainya pengaruh olahan saringan bawang putih terhadap penurunan tekanan darah terhadap pasien hipertensi.

## ***G. Manfaat Penelitian***

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang keperawatan mengenai pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah terhadap pasien hipertensi.

## 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Responden

Memberikan wawasan mengenai pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah terhadap pasien hipertensi dengan demikian dapat diaplikasikan dalam melakukan eksperimen bawang putih dalam bentuk olahan saringan.

### b. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman dalam bidang penelitian serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah terhadap pasien hipertensi.

### c. Bagi Pelayanan Kesehatan (RS)

Memberikan masukan bagi pelayanan kesehatan khususnya bagi lahan penelitian terkait untuk dapat memberikan manfaat bawang putih terhadap penurunan tekanan darah misalnya pengolahan bawang putih untuk dikonsumsi.

### d. Bagi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah referensi bagi pendidikan mengenai pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah terhadap pasien hipertensi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Tinjauan Tentang Tekanan Darah***

##### **1. Tekanan Darah**

###### ***a. Defenisi tekanan darah***

Tekanan darah adalah tekanan didalam pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung keseluruhan anggota tubuh. Tekanan darah dapat dilihat dengan mengambil dua ukuran dan biasanya ditunjukkan dengan angka seperti berikut: 120/80 mmHg. Angka 120 menunjukkan tekanan pada pembuluh arteri ketika jantung berkontraksi. Disebut dengan tekanan sistolik. Angka 80 menunjukkan tekanan ketika jantung sedang berelaksasi disebut dengan tekanan diastolik.

Tekanan darah merupakan gambaran keadaan curah jantung tahanan perifer, volume darah, elastisitas pembuluh darah dan tahanan pembuluh darah perifer baik langsung maupun tidak langsung sehingga akan mempengaruhi tekanan darah seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain, volume sekuncup, frekuensi jantung, pembuluh darah, sistem saraf otonom serta ginjal. Volume sekuncup adalah volume darah yang dipompakan jantung pada satu kali kontraksi dan ditentukan oleh kekuatan kontraksi otot jantungserta volume darah yang kembali ke jantung (venous return) , sehingga bila terjadi perubahan dalam frekuensi kontraksi otot jantung atau perubahan diameter pembuluh darah atrial oleh

pengaruh aktivitas sistem saraf otonom maupun hormonal dan berpengaruh terhadap tekanan darah.

Pengaruh tekanan darah oleh ginjal dilakukan melalui regulasi pengaturan cairan tubuh dan *renin angiotensin aldosteron* sistem (RAA), perubahan volume cairan tubuh akan mempengaruhi volume cairan ekstrasel akan meningkat diikuti dengan peningkatan volume plasma yang mengakibatkan aliran darah balik juga meningkat sehingga tekanan darah meningkat, peningkatan tekanan tersebut akan dikompensasi oleh ginjal melalui peningkatan ekskresi urin sehingga volume plasma menurun yang disertai penurunan tekanan darah sel jugtaglomerulus ginjal dapat menghasilkan renin sebagai suatu enzim yang dapat merubah angiotensin menjadi angiotensin I. Pelepasan renin dipengaruhi oleh penurunan volume plasma atau penurunan perfusi ginjal selanjutnya atau pengaruh ACE. Angiotensin I diubah menjadi angiotensin II yang mempunyai efek meningkatkan kontraktilitas otot jantung, vasokonstriksi dan sekresi hormon aldosteron yang yang memicu terjadinya retensi natrium dan air. Ketiga faktor tersebut akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Hormon aldosteron adalah suatu mineral okotikoid yang dihasilkan korteks adrenal, dan bagian medulla menghasilkan epineprin dan norepineprin suatu glukocortikoid yang ikut pula mengendalikan tekanan darah.

*b. Cara pengukuran tekanan darah*

Peninggian tekanan darah seringkali merupakan satu-satunya tanda klinis hipertensi, sehingga diperlukan pengukuran tekanan darah secara akurat. Agar



didapat pengukuran yang akurat, sebaiknya pengukuran dilakukan setelah responden beristirahat dengan cukup, minimal setelah 5 menit berbaring dan dilakukan pada posisi berbaring, duduk dan berdiri sebanyak 3-4 kali pemeriksaan, dengan interval antara 5-10 menit. Tempat pemeriksaan dapat pula mempengaruhi hasil pengukuran. Ukuran manset harus cocok dengan ukuran lengan atas, manset harus melingkari paling sedikit 80% lengan atas, pinggir bawah manset harus 2 cm diatas fossa kubiti untuk mencegah kontak dengan stetoskop. Sebaiknya tersedia berbagai ukuran manset untuk dewasa, anak dan orang gemuk. Balon dipompa sampai di atas tekanan sistolik kemudian tekanan darah diturunkan perlahan-lahan dengan kecepatan 2-3 mmHg tiap denyut jantung. Tekanan sistolik dicatat saat mendengar bunyi yang pertama (korotKoff 1) sedangkan tekanan diastolik dicatat jika bunyi tidak terdengar lagi (korotKoff V). Pemeriksaan tekanan darah sebaiknya dilakukan pada kedua lengan, pada posisi berbaring, duduk dan berdiri. Pengukuran tekanan darah sebaiknya dilakukan dengan menggunakan sphygmomanometer air raksa. (Awaluddin, 2012)

## **2. Hipertensi**

Hipertensi adalah faktor utama penyebab kematian karena stroke dan faktor yang memperberat infark miokard (serangan jantung). Kondisi tersebut merupakan gangguan yang paling umum pada tekanan darah. Hipertensi merupakan gangguan asimptomatik yang sering terjadi ditandai dengan peningkatan tekanan darah secara persisten (Potter & Perry, 2005)

*a. Defenisi Hipertensi*

- 1) Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus dari suatu periode.
- 2) Menurut Ignatavicus (1994) yang dikutip oleh Udjianti (2010) menyatakan bahwa hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg dan atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg yang terjadi pada seorang klien pada tingkat kejadian terpisah.
- 3) Menurut WHO, batasan tekanan darah yang masih dianggap normal adalah 140/90 mmHg, sedangkan tekanan darah  $\geq 160/95$  mmHg dinyatakan sebagai hipertensi.

Jadi hipertensi merupakan tekanan darah tinggi yang bersifat abnormal dan diukur paling tidak pada tiga kesempatan yang berbeda. Tekanan darah normal bervariasi sesuai usia, sehingga setiap diagnosis harus bersifat spesifik usia. Namun secara umum, seseorang dianggap mengalami hipertensi apabila tekanan darahnya lebih tinggi dari 140 mmHg sistolik atau 90 mmHg diastolic (140/90) mmHg (Udjianti, 2010)

*b. Etiologi*

Hipertensi sering diklasifikasikan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Berdasarkan ada tidaknya penyebab yang dapat diidentifikasi. Kebanyakan besar kasus hipertensi tidak diketahui penyebabnya dan disebut

hipertensi primer esensial. Apabila penyebab hipertensi dapat diketahui dengan jelas disebut hipertensi sekunder.

#### 1) Hipertensi primer

Hipertensi primer merupakan 90 persen dari kasus-kasus hipertensi. Selama 75 tahun terakhir telah banyak penelitian untuk mencari etiologinya. Beberapa faktor yang pernah dikemukakan relevan terhadap mekanisme penyebab hipertensi adalah sebagai berikut:

- a) Genetik, individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi, beresiko tinggi untuk mendapatkan penyakit ini.
- b) Jenis kelamin dan usia, laki-laki berusia 35 sampai dengan 50 tahun dan wanita pasca menopause beresiko tinggi untuk mengalami hipertensi.
- c) Diet, konsumsi diet tinggi garam atau lemak secara langsung berhubungan dengan berkembangnya hipertensi.
- d) Berat badan: obesitas (>25% diatas BB ideal) dikaitkan dengan berkembangnya hipertensi.

#### 2) Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder merupakan 10 persen dari seluruh kasus hipertensi adalah hipertensi sekunder, yang didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena suatu kondisi fisik yang ada sebelumnya seperti gangguan ginjal atau gangguan tiroid. Faktor pencetus munculnya hipertensi sekunder antara lain: penggunaan kontrasepsi oral, *coartation aorta*, neurogenik (tumor otak,

ensefalitis, gangguan psikiatri), kehamilan peningkatan volume intravaskuler, luka bakar, rokok, alkohol dan stres (Udjianti, 2010)

c. *Patofisiologi*

Mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin II dan angiotensin I oleh angiotensin I *converting enzyme* (ACE). ACE memegang peran fisiologi penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati. Selanjutnya oleh hormone, rennin (diproduksi oleh ginjal) akan diubah menjadi angiotensin I oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin I diubah menjadi angiotensin II. Angiotensin II inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi *hormone antidiuretik* (ADH) dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus (kelenjar pituitari) dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin.

Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang disekresikan ke luar tubuh (abtdiuresis), sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencerkannya, volume cairan ekstraseluler dan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraseluler. Akibatnya, volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormone steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl (garam) dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan

diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume dan tekanan darah  
(Anonim, 2009)

*d. Manifestasi Klinik*

Manifestasi klinis dari hipertensi adalah sebagai berikut :

- 1) Pusing
- 2) Mudah marah
- 3) Telinga berdengung
- 4) Mimisan (jarang)
- 5) Sukar tidur
- 6) Sesak nafas
- 7) Rasa berat di tengkuk
- 8) Mudah lelah
- 9) Mata berkunang-kunang

Gejala akibat komplikasi hipertensi yang pernah dijumpai adalah :

- 1) Gangguan penglihatan
- 2) Gangguan saraf
- 3) Gagal jantung
- 4) Gangguan fungsi ginjal
- 5) Gangguan serebral (otak) yg mengakibatkan kejang dan pendarahan pembuluh darah otak yang mengakibatkan kelumpuhan, gangguan kesadaran hingga koma.

Pada sebagian besar penderita, hipertensi tidak menimbulkan gejala; meskipun secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya berhubungan dengan tekanan darah tinggi (padahal sesungguhnya tidak). Gejala yang dimaksud adalah sakit kepala, perdarahan dari hidung, pusing, wajah kemerahan dan kelelahan; yang bisa saja terjadi baik pada penderita hipertensi, maupun pada seseorang dengan tekanan darah yang normal.

Jika hipertensinya berat atau menahun dan tidak diobati, bisa timbul gejala berikut:

- 1) Sakit kepala
- 2) Kelelahan
- 3) Mual
- 4) Muntah
- 5) Sesak nafas
- 6) Gelisah
- 7) Pandangan menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung dan ginjal.

Kadang penderita hipertensi berat mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma karena terjadi pembengkakan otak. Keadaan ini disebut ensefalopati hipertensif, yang memerlukan penanganan segera (Nuzulul, 2011)



e. *Klasifikasi*

Untuk menilai apakah seseorang itu menderita penyakit hipertensi atau tidak haruslah ada suatu standar nilai ukur dari tensi atau tekanan darah.

**Tabel 2.1 Klasifikasi Hipertensi menurut WHO**

<b>Kategori</b>	<b>Sistol (mmHg)</b>	<b>Diastole (mmHg)</b>
<b>Optimal</b>	<120	<80
<b>Normal</b>	<130	<85
<b>Tingkat 1 (hipertensi ringan)</b>	140-159	90-99
<b>Sub grup : perbatasan</b>	140-149	90-94
<b>Tingkat 2 (Hipertensi sedang)</b>	160-179	100-109
<b>Tingkat 3 (hipertensi berat)</b>	≥ 180	≥110
<b>Hipertensi sistol terisolasi</b>	≥140	<90
<b>Sub grup : perbatasan</b>	140-149	<90

*Sumber: Klasifikasi Hipertensi menurut WHO*

1) Normal

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu kondisi ketika tekanan darah meningkat dan dikatakan normal apabila sistol mencapai <120 mmHg dan diastole mencapai <80 mmHg.

2) Tingkat 1 (hipertensi ringan)

Dokter biasanya akan melakukan tes tekanan darah tinggi pada selama beberapa kali terhadap pasien sebelum menyimpulkan sebuah diagnosis. Mendiagnosis hipertensi tidak dapat hanya dengan melakukan satu kali pengujian saja. Namun, jika pada beberapa kunjungan, seorang pasien ternyata memiliki tekanan darah Anda adalah antara 140-159 mmHg lebih dari 90 sampai 99 mmHg, pasien tersebut mungkin di diagnosis menderita hipertensi stadium 1. Dokter biasanya akan menyarankan pasien tersebut

dengan pola makan khusus atau mencoba diet, olahraga, manajemen stres dan perubahan gaya hidup lainnya untuk jangka waktu beberapa bulan sebelum merujuk pada jenis obat-obatan tertentu.

### 3) Tingkat 2 (hipertensi sedang)

Hipertensi Tingkat 2 biasanya didiagnosis ketika tekanan darah pasien naik hingga lebih dari 160 mm Hg atau lebih tinggi dari 100 mmHg. Pada tahap ini ada berbagai obat yang dapat membantu pasien untuk membawa menurunkan angka ini. Sebuah studi mengklaim bahwa kedua angka memang penting, namun dokter Anda akan lebih fokus terhadap nomor sistolik yang dihasilkan. Pengujian ini dapat berkorelasi dengan penumpukan plak di arteri, yang merupakan penyebab utama hipertensi (Andira, 2013)

#### f. Komplikasi

Komplikasi hipertensi meliputi:

- 1) Krisis hipertensi, penyakit arteri perifer, aneurisma aorta dissecting, PJK, angina, infark miokard, gagal jantung, aritmia dan kematian mendadak. Penyebab krisis hipertensi yaitu: fungsi renal yang abnormal, ensefalopati hipertensi, perdarahan intraserebral, penghentian pemakaian obat-obatan antihipertensi (yang mendadak), iskemia miokard, eklansia, feokromositoma, interaksi inhibitor monoamina oksidase.
- 2) Serangan iskemik sepiintas *transient ischemic attack*(TIA), stroke, retinopati, dan ensefalopati hipertensi.
- 3) Gagal ginjal (Kowalak, dkk, 2011)



*g. Pemeriksaan Diagnosis*

Pemeriksaan Laboratorium pada penderita hipertensi yaitu:

- 1) Hb/Ht: untuk mengkaji hubungan dari sel-sel terhadap volume cairan (viskositas) dan dapat mengindikasikan faktor resiko seperti : hipokoagulabilitas, anemia.
- 2) BUN / kreatinin: memberikan informasi tentang perfusi / fungsi ginjal.
- 3) Glukosa: Hiperglikemi (DM adalah pencetus hipertensi) dapat diakibatkan oleh pengeluaran kadar ketokolamin.
- 4) Urinalis: darah, protein, glukosa, mengisaratkan disfungsi ginjal dan ada DM.
- 5) CT Scan: Mengkaji adanya tumor cerebral, encephalopati.
- 6) EKG: Dapat menunjukkan pola regangan, dimana luas, peninggian gelombang P adalah salah satu tanda dini penyakit jantung hipertensi.
- 7) IUP: mengidentifikasi penyebab hipertensi seperti : Batu ginjal, perbaikan ginjal.
- 8) Photo dada: Menunjukkan destruksi kalsifikasi pada area katup,pembesaran jantung
- 9) Pencegahan dan penanggulangan hipertensi (Borneo, 2012)

Terdapat 7 langkah praktis untuk mencegah terjadinya hipertensi atau komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh hipertensi:

- 1) Langkah 1: Mengetahui resiko

Tanya pada diri sendiri pertanyaan berikut: Apakah anda memiliki sejarah keluarga penderita hipertensi? Apakah anda memiliki berat badan berlebih?

Apakah anda cukup olahraga atau apakah anda perokok? Jika jawaban anda ya pada salah satu pertanyaan diatas. Anda beresiko memiliki tekanan darah tinggi.

2) Langkah 2: Mengontrol pola makan

Apabila ingin terhindar dari resiko hipertensi, jauhi makan makanan berlemak dan mengandung garam. *American Heart Association* menyarankan konsumsi maksimum garam sebanyak satu sendok teh per hari. Sementara lemak memang dibutuhkan tubuh namun dalam jumlah kecil yaitu untuk menjaga tubuh tetap berfungsi karena itu konsumsi lemak disarankan kurang dari 30% dari konsumsi kalori setiap hari.

3) Langkah 3: Tingkatkan konsumsi potassium (K) dan magnesium (mg).

Pola makan yang rendah potassium magnesium menjadi salah satu faktor pemicu tekanan darah tinggi. Buah-buahan dan sayuran segar adalah sumber terbaik bagi kedua nutrisi tersebut.

4) Langkah 4: Makan makanan jenis padi-padian

Dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam *American Journal Clinical Nutrition*, ditemukan pria yang makan sedikitnya satu porsi perhari sereal dari jenis padi-padian kecil kemungkinan terkena penyakit jantung hingga 20%. Semakin banyak konsumsi jenis padi-padian, semakin rendah resiko penyakit koroner termasuk tekanan darah tinggi. Satu langkah penting menurunkan tekanan darah tinggi dan menghindari komplikasi akibat hipertensi adalah sederhana memilih roti gandum alih-alih makan beras putih atau beras merah.

5) Langkah 5: Tingkatkan aktivitas

Dengan meningkatkan aktivitas fisik (olahraga) dapat menurunkan resiko tekanan darah tinggi. Olahraga yang dianjurkan hanya 30 sampai 45 menit lima hari dalam seminggu cukup untuk menurunkan hipertensi.

6) Langkah 6: Sertakan bantuan dari kelompok pendukung

Sertakan keluarga dan teman menjadi kelompok pendukung pola hidup sehat. Dukungan dan partisipasi orang lain membuatnya lebih mudah dan lebih asyik bagi setiap orang. Penelitian menunjukkan dukungankelompok terbukti berhasil dalam membuat perubahan gaya hidup untuk mencegah tekanan darah tinggi.

7) Langkah 7: Berhenti merokok

Merokok meningkatkan resiko komplikasi lain seperti penyakit jantung dan stroke pada mereka penderita hipertensi (Arifin, 2013)

*h. Penatalaksanaan*

Secara umum pengobatan hipertensi dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu penatalaksanaan farmakologis penatalaksanaan non farmakologis (Karyadi, 2010)

1) Penatalaksanaan farmakologis

Penatalaksanaan dengan obat amat perlu karena penderita hipertensi maligna hanya dapat hidup 1 sampai dengan 2 tahun sebelum terjadi komplikasi perdarahan otak atau gagal ginjal. Faktor prinsip pengobatan hipertensi diantaranya pengobatan hipertensi sekunder dan mendahulukan kausal, dengan tujuan menurunkan tekanan darah demi memperpanjang umur

dan mengurangi komplikasi, pencapaian dengan menggunakan obat anti hipertensi.

Bawang putih memiliki efek menurunkan tekanan darah yang setara dengan obat-obat yang biasa diresepkan misalnya beta bloker menurunkan tekanan darah sistolik sebanyak 5 mmHg, ACE inhibitor sebanyak 8 mmHg pada tekanan darah sistolik, dan angiotensin II type 1 receptor antagonist sebanyak 10,3 mmHg tekanan darah diastolik. Walau penurunan tekanan darah 4-5 mmHg pada sistolik dan 2-3 mmHg pada diastolik, penurunan ini dapat menurunkan resiko morbiditas dan mortalitas sebesar 8-20% (Imelda, Meilina & Steffi Kurniawan. 2013)

Obat beta bloker merupakan obat yang menghambat efek sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis adalah sistem saraf yang dengan segera akan memberikan respon terhadap stres, dengan cara meningkatkan tekanan darah. Obat-obat beta bloker efektif diberikan kepada penderitanya usia muda, penderitanya yang pernah mengalami serangan jantung, penderitanya dengan denyut jantung yang cepat, angina pectoris (nyeri dada) dan sakit kepala migran. Efek terhadap sistem kardiovaskuler merupakan efek obat beta bloker yang terpenting, terutama akibat kerjanya pada jantung. Obat beta bloker mengurangi denyut jantung dan kontraktilitas miokard. Efek ini kecil pada orang normal dalam keadaan istirahat, tetapi menjadi nyata bila sistem simpatis di pacu, misalnya sewaktu olahraga atau stres. Obat beta bloker tidak menurunkan tekanan darah yang normal, tetapi menurunkan tekanan darah

penderita hipertensi. Pemberian obat beta bloker secara terus-menerus pada penderita hipertensi pada akhirnya menyebabkan penurunan resistensi perifer. Mekanisme belum diketahui, tetapi mungkin sekali adanya penyesuaian pembuluh darah perifer terhadap pengurangan curah jantung yang berlangsung secara kronik/terus-menerus. Disamping itu, hambatan sekresi renin dari ginjal oleh obat beta bloker juga menimbulkan efek hipotensi. Sebagian sekresi renin akibat diet rendah natrium juga dihambat oleh obat beta bloker (Anonim, 2012)

Cushman dan Ondetti menemukan obat yang dapat menghambat aktifitas ACE yaitu *angiotensin-converting enzyme inhibitor* (ACE-I) yang pada awalnya digunakan untuk pengobatan hipertensi. Selain digunakan untuk pengobatan hipertensi, ACE-I juga berperan dalam pengobatan gagal jantung, dan mempunyai efek lain yang penting yaitu dapat mencegah terjadinya proses aterosklerosis. Pemahaman mengenai manfaat ACE-I untuk pengobatan hipertensi, gagal jantung dan proteksi terhadap terjadinya disfungsi endotel didasarkan pada pengetahuan tentang sistem renin-angiotensin aldosteron (RAA). Renin dihasilkan oleh ginjal sebagai respon terhadap adanya katekolamin, penurunan kadar natrium plasma, dan penurunan aliran darah ginjal. Renin selanjutnya mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin I, yang merupakan decapeptida yang tidak aktif. Angiotensin I diubah menjadi angiotensin II oleh ACE. Angiotensin mempunyai banyak efek yang berperan terhadap terjadinya hipertensi, gagal

jantung dan proses aterosklerosis. Angiotensin II berefek vasokonstruktor kuat, meningkatkan aktifitas sistem saraf simpatis, merangsang produksi aldosteron, sebagai faktor pertumbuhan (*growth factor*), meningkatkan agregasi trombosit dan adhesi monosit, merangsang terbentuknya plasminogen activator inhibitor (PAI), memacu terbentuknya endotelin dan meningkatkan produksi radikal bebas. Di samping berperan pada sistem RAA, ACE-I juga berpengaruh pada sistem kinin-kalikkrein. *Angiotensin converting enzyme* yang identik dengan kininase II menyebabkan penginaktifan bradikinin, sehingga pemberian ACE-I dengan sendirinya akan menyebabkan peningkatan kadar bradikinin. Selain berefek vasodilator langsung, bradikinin juga menyebabkan rangsangan produksi dan pelepasan *nitric oxide* (NO) *endothelium-derived relaxing factor* (EDRF), prostasiklin, dan *endothelium-derived hyperpolarizing factor* (EDHF) dari endotelium vaskular (Anita, 2009)

Adapun obat yang sering digunakan dalam pengobatan hipertensi, yaitu:

a) Diuretik

Merupakan golongan obat anti hipertensi yang paling murah. Murah, efektif, ditoleransi dengan baik pada dosis rendah. Dibuktikan dapat mencegah kejadian kardiovaskuler mayor termasuk stoke dan penyakit jantung koroner pada bermacam kelompok penderita hipertensi. Efek samping diuretik adalah seperti hipoglikemi, intoleransi gula, irama ektopi ventrikel dan impoten dihubungkan

dengan dosis yang tinggi ( HCT dan Chrthaldione 50 sampai dengan 100 mg )  
 diuretic terutama digunakan pada orangtua dan kulit hitam. Contoh obat golongan  
 diuretic adalah HCT (*Hydrochlorothiazide*). Chlorthalidone (Hygroton, Thalidon),  
 Bumetanide (Burinex), Piretanide sustained-release (Areki), Furosemide (Lasix,  
 Impugan, Cetasix, Diurefo, Furosix, Farsix, Furosetic, Nclex, Uresic).  
 Turosemide (Unat), Xipamide (Diurexan), Indapamide (Natrikix), Spinorolactone  
 (Aldactone, Idrolatton, Letoral), dan Amirilade HCL (Puritride)

b) Penyakit alfa dan beta

Contoh obat golongan ini adalah Labetalol HCL (Trandate), dan Carvedilol  
 (Dilbloc)

c) Antagonis kalsium

Semua golongan obat ini efektif dan ditoleransi dengan baik oleh penderita  
 hipertensi. Bermanfaat untuk mencegah stroke pada orang tua dengan hipertensi  
 sistolik. Pada penyakit jantung koroner dipilih yang efek jangka lama. Antagonis  
 kalsium terutama berguna untuk orang tua dengan hipertensi sistolik dan orang  
 kulit hitam. Efek samping meliputi tradikardi, muka merah, edema tungkai dan  
 konstipasi. Contoh obat golongan ini adalah Diltiazem, Veramil, Nifedipine,  
 Nicardipine, Felodipine, Lacidipine, dan Amlodipine.

d) Antagonis Angitensin

Merupakan golongan obat antihipertensi paling baru yang gambarannya mirip  
 dengan Inhibitor ACE. Efek samping lebih sedikit sehingga meningkatkan  
 kepatuhan penderita, lebih unggul dibanding Inhibiyor ACE karena tidak

menimbulkan batuk. Contoh obat golongan ini adalah Losartam K, Valsartan, Candesartan, Irbesartan, dan Telmisartan.

e) Penyekat Alfa

Golongan ini aman dan efektif untuk menurunkan tekanan darah. Efek samping utama hipotensi postural. Obat mungkin bermanfaat pada penderita dislipidemia, intoleransi gula dan dengan hipertrofi prostat. Contoh obat golongan ini adalah Prazosin, Terazosin, dan Bunazosin. Pada hipertensi yang lebih berat perlu dilakukan pengobatan simptomatis. Obat-obat yang diberikan pada umumnya harus ditelan seumur hidup, karena sebab-sebab penyakit tidak dihilangkan.

Berdasarkan tingkatannya maka pengobatan hipertensi adalah:

a) Hipertensi ringan dan sedang

Tekanan darah antara 160/90 mmHg dan 180/105 mmHg diobati dengan suatu diuretikum (saluretikum) guna mengeluarkan garam dan air dan mengurangi volume darah, biasanya digunakan klorotiledon atau suatu tazida dengan kerja panjang untuk memudahkan penggunaannya (*single-dose*), misalnya politiazide (renese) metiklotiazide (enduron). Jika tensi belum menurun secukupnya, maka dianjurkan kombinasi dengan suatu beta blocker, yakni propanol atau turunannya.

b) Hipertensi yang lebih kuat

Tekanan darah diatas 180/105 mmHg biasanya diobati dengan kombinasi dari saluretikum, beta blocker dan suatu vasolidator, seringkali hidralazin, atau dengan suatu obat sentral seperti: metildopa atau klonidin. Jika pilihan-pilihan pertama



ini belum efektif, maka barulah dapat digunakan obat-obat lainnya, misalnya derivat-derivat-guanidin (guanetidin, guanoksan dan sebagainya) dan obat-obat paru prazosin serta labetolol.

c) Hipertensi ganas (maligna)

Lazimnya diobati dengan guanetidin, diazoksida atau perintang-perintang ganglion sedangkan feochromocytoma dengan fentolamin dan akhirnya pembedahan tumor.

d) Krisis hipertensi

Diatasi dengan infuse nitroprusid atau injeksi-injeksi intravena klonidin atau diazoksida. Tujuan pengobatan hipertensi adalah untuk mencegah terjadinya morbiditas dan mortalitas akibat tekanandarah tinggi. Ini berarti tekanan darah tinggi harus diturunkan serendah mungkin yang tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung, maupun kualitas hidup, sambil dilakukan pengendalian faktor-faktor resiko kardiovaskuler lainnya. Telah terbukti bahwa makin rendah tekanan

2) Penatalaksanaan non farmakologis

a) Pola hidup

Penatalaksanaan non farmakologis meliputi: menghindari kegemukan, penurunan asupan garam, kebiasaan berolahraga, menghindari faktor resiko seperti merokok, minum alkohol dan stress. (Asnur, 2007)

b) Herbal

Darah tinggi (tekanan darah tinggi) merupakan penyakit yang menyerang kepala hingga terasa mau pecah dan sering dialami oleh banyak orang. Darah

tinggi sebenarnya adalah gejala meningkatnya tekanan darah pada pembuluh darah arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang bertugas mengedarkan darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Darah tinggi seringkali menjadi dalang dari terjadinya serangan jantung dan stroke jika sudah cukup parah dan tidak segera diobati (Prayoga, 2013)

Pengobatan hipertensi secara herbal merupakan pilihan yang sangat tepat untuk pengobatan penyakit ini. Ada banyak sekali kebaikan pengobatan secara herbal dibandingkan dengan cara yang menggunakan obat kimia. Jika pada penggunaan obat kimia ada efek samping yang bisa saja terjadi dan juga adanya efek ketergantungan setelahnya, pada pengobatan hipertensi secara herbal kemungkinan adanya efek samping sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali dan juga tidak akan menimbulkan ketergantungan setelahnya (Rudy, 2013)

Salah satu jenis obat herbal darah tinggi adalah bawang putih, selain itu juga terdapat jus kulit manggis, daun sirsak dan jus mentimun. Antioksidan bawang putih penting untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selain itu antioksidan ini berperan mencegah atherosclerosis dan penyakit jantung dengan cara melawan oksidasi dari serum lemak. Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa bawang putih untuk hipertensi juga dapat menurunkan LDL, dan meningkatkan HDL (kolesterol baik) memelihara aliran darah tetap lancar, menurunkan tekanan darah, mencegah serangan penyakit kanker, menurunkan gula darah, dan mengobati gangguan pencernaan. Bawang putih untuk hipertensi juga mengandung yodium yang tinggi (Pratomo, 2012).

Melalui pengaruh bawang putih terhadap hipertensi diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penurunan tekanan darah setelah pemberian minuman olahan saringan bawang putih pada pasien hipertensi.

## ***B. Tinjauan tentang Bawang Putih***

### **1. Nama Botani**

*Allium sativum L* adalah tanaman ternak berbentuk rumput. Daunnya panjang berbentuk pipih (tidak berlubang). Helai daun seperti pita dan melipat ke arah panjang dengan membuat sudut pada permukaan bawahnya, kelopak daun kuat, tipis, dan membungkus kelopak daun yang lebih muda sehingga membentuk batang semu yang tersembul keluar. Bunganya hanya sebagian keluar atau sama sekali tidak keluar karena sudah gagal tumbuh pada waktu berupa tunas bunga (Anonim, 2010)

### **2. Nama Lain**

Garlic (Inggris), bawang putih (Indonesia), bawang (Jawa), bawang bodas (Sunda), bawang handak (Iampung), kasuna (Bali), lasuna pute (Bugis), bhabang pote (Madura), laisona mabotick (Nusa Tenggara), bawa bodudo (Ternate), kalfeo foleu (Timor), bawa subudo (Maluku) (Kariman, 2014).

Bawang putih (*Allium sativum L.*), dapat tumbuh di berbagai strata tanah, diperkirakan turunan dari *Allium longicuspis*, yang tumbuh liar di kawasan Asia Tenggara. Tanaman ini sudah dikenal sejak zaman dahulu kala untuk campuran kuliner dan pengobatan. Baunya yang khas menumbuhkan cita rasa dalam masakan. Bagian yang digunakan untuk keperluan konsumsi

hanyalah suing, daun, batang, dan bunga sedangkan kulit, rizoma, dan akarnya tidak.

Dalam sejarah bangsa-bangsa tercatat tanaman ini telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Pekerja pembangunan piramid Khufu disugahi tanaman ini agar mempunyai kekuatan dan daya tahan untuk bekerja keras. Juga mereka (bangsa Mesir kuno) pernah menggunakan untuk obat cacar, radang sara, dan TBC.

Di beberapa Negara Eropa bawang putih di anggap mampu untuk proteksi penyakit, pelindung setan, atau vampire. Untuk menjatuhkan vampire tanaman ini di pakai dan di kalungkan di leher, di gantungkan di atas pintu masuk/jendela atau di gosokkan pada bendul pintu atau lubang kunci (Winarsho, 2013)

### 3. Suku

*Liliaceae* sering dikenal sebagai suku bawang-bawangan. Tanaman pada family ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai umbi lapis sebagai alat perkembangbiakan vegetatifnya. Tanaman dalam keluarga ini memiliki daun linier, sebagian besar dengan urat paralel tetapi dengan beberapa genus memiliki venasi venasi (misalnya, *Cardiocrinum*, *Clintonia*, *Medeola*, *Prosartes*, *Scoliopus*, *Tricyrtis*), dan bunga diatur dalam tiga-tiga. Beberapa spesies memiliki umbi, sementara yang lain memiliki rimpang (Agustina, 2011)

#### 4. Deskripsi

Bawang putih adalah herba semusim berumpun yang tingginya sekitar 60 cm. Batangnya berupa batang semu dan berwarna hijau. Umbi lapis yang berupa umbi majemuk dengan bagian bawah versiung dan bergabung menjadi umbi besar yang berwarna putih. Tiap suing terbungkus oleh kulit tipis seperti kertas. Jika diiris, baunya sangat tajam. Tanaman ini berakar serabut dan daunnya pipih memanjang (Latief, 2014)

#### 5. Farmakologi

Bawang putih dapat digunakan dalam bentuk segar, dikeringkan atau disaring dan diambil minyaknya. Bawang putih mempunyai konsentrasi tinggi sulfur. Tiosulfinat, yang mengandung allicin, merupakan substansi aktif dari bawang putih. Allicin di bentuk ketika alliin, suatu asam amino yang mengandung sulfur, kontak dengan enzim alinase ketika bawang putih mentah dipotong, dihancurkan, atau di kunyah. Preparat bawang putih kering yang mengandung alliin dan alliinase harus dikemas dalam bentuk salut enterik agar efektif karena asam lambung dapat menghambat alliinase. Karena allinase dideaktivasi oleh panas, bawang putih yang telah dimasak kurang bermanfaat lagi secara medis. Efek antimikroba, hipolipidemik, dan antitrombotik yang terdapat pada bawang putih berhubungan dengan alliin dan produk pemecahannya. Efek antineoplastik mungkin berhubungan dengan

adanya komponen sulfur atau komponen lainnya yang belum diketahui (Darmadi & Riska, 2013)

Bawang putih ditengarai mampu mencegah penyakit jantung (termasuk aterosklerosis, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi). Efek vasodilatif mungkin di sebabkan katabolisme polisulfida yang di ubah menjadi hydrogen sulfide dalam sel darah merah. Hidrogen sulfide bersifat kardioprotektif untuk vascular. Penelitian membuktikan juga tanaman ini mampu mengurangi agregasi trombosit dan menurunkan kadar gula darah. Penggunaan insulin tidak boleh menggunakan tanaman ini karena dapat menyebabkan penurunan gula darah yang lebih besar (Winarsho, 2013)

## 6. Kandungan Kimiawi

Per 100 gram bawang putih terdapat energy (149 kkal); karbohidrat 33,06 g; gula 1,00 g; serabut 2,1 g; lemak 0,5 g; protein 6.39 g; beta karoten 5 µg; vitamin B1 0,2 mg (15%); riboflavin (B2) 0,11 mg (7%); niacin (B3) 0,7 mg (5%); pantothenic acid (B5) 0,596 mg (12%); vitamin B6 1,235 mg (95%); folate (B9) 3 µg (1%); vitamin C 31,2 mg (52%); kalsium 181 mg (18%); besi 1,7 mg (14%); magnesium 25 mg (7%); fosfor 153 mg (22%); kalsium 401 mg (9%); natrium 17 mg (1%); zinc 1.16 mg (12%); manganese 1,672 mg; selenium 14,2 µg (Winarsho, 2013). Beberapa zat yang terkandung dalam bawang putih yang bertanggung jawab untuk ini penurunan tekanan darah ini adalah sulfur. Komponen-komponen ini diyakini oleh para peneliti yang mempromosikan dilatasi arteri (pelebaran pembuluh darah), sehingga

aliran darah menjadi lancar dan tekanan darah menjadi turun. Selain itu, sifat lain yang mendukung dari bawang putih adalah mengencerkan darah atau mencegah penggumpalan darah. Khasiat Bawang putih untuk menurunkan tekanan darah tinggi (Yuli, 2013)

Minyak atsiri yang bersifat anti bakteri dan antiseptik. Kandungan alisin dan allin menghasilkan daya antikolesterol. Daya ini mencegah (jantung koroner dan tekanan darah tinggi). Umbi bawang mengandung kalsium dan bersifat menenangkan sehingga cocok sebagai pencegah hipertensi. Bawang putih juga mengandung senyawa kimia saktivin, yang dapat mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta menstimulasi susunan saraf. Kandungan dialilsulfidanya bersifat antelmintik (anti cacing) (Latief, 2014)

Selain itu bawang putih juga mengandung sejumlah kecil selenium dan germanium. Selenium dalam bawang putih membantu dalam mencegah pembekuan darah abnormal dan menormalkan tekanan darah. Selain itu, bawang putih juga mengandung inhibitor ACE alami peptida gamma-glutamil dan senyawa dengan flavonol. Ini juga merupakan sumber yang kaya magnesium dan fosfor. Dalam kandungan adenosin dan belerang senyawa semuanya membantu dalam mengurangi kondisi tekanan darah tinggi, karena membantu dalam pelebaran arteri. Hal ini pada gilirannya membantu dalam membuat aliran darah di arteri lebih mudah, yang pada gilirannya membantu dalam menurunkan tekanan darah tinggi (Dianti, 2012)

Ulasan dr. Mason menunjukkan manfaat dari nutrisi penting pada bawang putih yaitu kalium membantu mengurangi tekanan darah. Secara khusus, bukti-bukti menunjukkan bahwa kalium dapat berperan sinergis, terutama dalam konteks asupan natrium rendah dan menjaga tekanan darah tetap sehat (Ade Saputra, 2013). Umbi batang mengandung zat-zat kalsium yang bersifat menenangkan sehingga cocok sebagai pencegah hipertensi. Saltivine bisa mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta merangsang susunan sel saraf. *Diallylsulfide* dan *alilpropil-disulfida* sebagai anti cacing (Rahmawati, 2013)

Dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2:172

إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ لِلَّهِ وَأَشْكُرُوا أَرْزَقْنَاكُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
تَعْبُدُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Dalam ayat diatas orang-orang mu'min ini, dianjurkan oleh Allah swt.

Makan yang baik agar mereka bersyukur kepada zat yang memberi nikmat.



## 7. Kegunaan dan Efikasi

### a. Efek antihipertensi

Hipertensi merupakan faktor resiko utama penyebab kardiovaskuler, sehingga penurunan tekanan darah akan secara signifikan menurunkan angka resiko kejadian kardivaskuler. Disfungsi endotel, yang disebabkan oleh penurunan bioavailabilitas *nitric oxide* (NO), merupakan faktor resiko penting penyebab hipertensi dan penyakit kardiovaskuler. Bukti-bukti menunjukkan bahwa NO memegang peran utama dalam regulasi tekanan darah; gangguan bioaktivitas NO dapat menyebabkan kekakuan arteri, yang merupakan penyebab hipertensi.

Mekanisme penurunan tekanan darah adalah melalui efek vasolidatasi oleh NO. NO merupakan mediator penting dalam homeostasis tekanan darah, karena mempunyai beberapa fungsi fisiologis dalam sistem kardiovaskuler. Bawang putih dilaporkan mengandung arginin yang dapat meningkatkan sintesis NO melalui *nitric oxide synthase* (NOS). Pemberian bawang putih (Aged Garlic Extract 2.86 g/kg per oral) dapat meningkatkan produksi NO sebanyak 30-40% setelah 15 sampai 60 menit pemberian bawang putih.

Gas *hydrogen sulphide* (H<sub>2</sub>S) adalah gas yang penting sebagai regulator fungsi fisiologis penting, antara lain diameter arteri, aliran darah dan adhesi leukosit; gas ini juga mempunyai efek antiinflamasi dan anti apoptosis. H<sub>2</sub>S merupakan substansi vasorelaksasi poten yang kerjanya mirip molekul lain, yaitu NO. Berbeda dengan NO, sumber utama H<sub>2</sub>S darah diproduksi dari sel darah merah atau melalui sel otot polos vaskuler. H<sub>2</sub>S diproduksi dari sistein, melalui

enzim *cystathionine beta synthase* dan *cystathionine gamma-lyase* (CSE). Pada bawang putih setelah dikonsumsi, komponen allicin (didapatkan setelah allicin berinteraksi dengan enzim alliinase) dilepas ke pembuluh darah; pada beberapa studi manusia allicin mampu mencetuskan sel darah merah untuk menghasilkan H<sub>2</sub>S yang mempunyai efek vasodilator (Imelda, 2013)

Di bawah ini beberapa khasiat dan manfaat bawang putih tunggal bagi kesehatan.

#### 1) Kesehatan jantung

Pakar gizi dan diet meyakini bahwa bawang putih bisa menurunkan kandungan homosistein ( asam amino ) di dalam darah yang tidak bagus untuk kesehatan jantung. Bawang putih juga bisa mengurangi bertumpuknya plak beresiko pada dinding arteri.

#### 2) Kesehatan darah

Sebuah penelitian membuktikan bahwa bawang putih bisa meningkatkan sirkulasi darah dengan menambah kandungan hidrogen sulfida di dalam darah. Senyawa sulfur di dalam bawang putih dapat mengurangi zat lemak pada darah, menopang dan mengatur tekanan darah dan membantu untuk mengetahui gejala hipertensi. Senyawa belerang di dalam bawang putih, khususnya ajoene bisa mencegah menggumpalnya darah. Bawang putih kerap dipakai sebagai pengencer darah untuk meningkatkan sirkulasi dan menghindari penggumpalan darah.

3) Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Bawang putih dapat merangsang kegiatan sel darah putih yang bisa menghindari infeksi dan penyakit. Bawang putih bisa menambah kerja hati saat melawan radikal bebas.

4) Menstabilkan gula darah

Sebuah studi memperlihatkan bahwa bawang putih mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kandungan insulin di dalam darah dan menstabilkan gula darah.

5) Antioksidan

Antioksidan yang dikandung bawang putih membuat perlindungan sel dari radikal bebas dan menghalangi perkembangan kanker.

6) Menurunkan kolesterol

Bawang putih mempunyai fungsi penting saat menurunkan kandungan kolesterol di dalam darah.

7) Sex

Bawang putih konon dapat melindungi kandungan testoteron pada pria dan bisa menambah libido pada pria dan wanita. Di samping banyak kegunaan dan faedah dari bawang putih, perlu di perhatikan juga dampak dari mengkonsumsinya. Bawang putih bisa mengencerkan darah alami dan menghalangi pembekuan darah. Jadi untuk mereka yang mempunyai masalah dengan darah, perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi bawang putih tunggal (Aditya, 2013)

## 8. Kontraindikasi, Efek Samping dan Interaksi

Asupan dari satu atau dua bawang putih mentah per hari mempunyai efek positif pada orang dewasa. Efek yang tidak diinginkan setelah memakan bawang putih adalah bau napas dan bau badan. Konsumsi bawang putih mentah dalam jumlah yang berlebihan, terutama saat perut kosong, dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal, flatulensi, dan perubahan pada flora usus. Selain itu, dilaporkan juga adanya dermatitis alergik, terbakar dan melepuh setelah penggunaan topikal dari bawang putih mentah (Tattelman, 2005)

Bawang putih juga dilaporkan tidak mempunyai efek dalam metabolisme obat, meskipun beberapa studi menunjukkan hasil yang berlawanan yaitu bahwa bawang putih mempunyai efek dalam farmakokinetik protease inhibitor. Pasien yang menggunakan antikoagulen harus berhati-hati ketika menggunakan bawang putih karena mempunyai efek antitrombotik. Maka, pada pasien-pasien yang akan menjalani operasi, untuk tidak memakan bawang putih dosis tinggi 7 sampai 10 hari sebelum operasi tersebut karena bawang putih dapat menyebabkan perpanjangan masa perdarahan dan berhubungan dengan hematoma epidural/spinal

## 9. Dosis

Dosis efektif penggunaan bawang putih tidak ditentukan. Secara umum, dosis yang digunakan pada orang dewasa adalah 4 gram (satu sampai dua siung) bawang putih mentah per hari, 300 mg bubuk bawang putih kering,

2 sampai 3 kali perhari atau penggunaan ekstrak bawang putih 7,2 gram perhari. Banyak penelitian yang menggunakan bubuk bawang putih dengan dosis 600-900 mg per hari, yang mengandung 3,6-5,4 mg allicin yang merupakan komponen aktif bawang putih (Darmadi & Riska, 2013). Menurut Untari dkk, dosis yang digunakan 3 siung bawang putih untuk olahan saringan bawang putih pada pengobatan hipertensi

## **10. Terapi Bawang Putih di Asia Tenggara**

### **a. Indonesia**

Tradisi mengkonsumsi bawang putih di Indonesia dibawa oleh bangsa India. Tidak diketahui secara pasti sejak kapan bawang putih mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada catatan sejarah nusantara yang mencatatnya. Terbatasnya catatan tentang material medika di Indonesia menyulitkan perunut sejarah untuk mewartakan sejarah penggunaan herbal bawang putih di Indonesia.

Dalam budaya Jawa dikenal kepercayaan menggunakan bawang putih tunggal sebagai “tolak bala” terutama untuk mengusir penyakit yang disebabkan oleh roh jahat. Sementara itu, secara empiris masyarakat tradisional di Indonesia mengenal bawang putih sebagai herba untuk mengobati diare dan hipertensi.

### **a. Thailand**

Sonja deGraff – ahli herbal dari Amerika memperoleh gelar Ph.D., bidang nutrisi setelah meneliti kebiasaan mengonsumsi bawang putih di beberapa Negara yang dia jadikan tempat penelitian. Selama empat tahun lebih berada di Thailand, de Graff menemukan bahwa bawang putih termasuk salah satu herba penting di

Thailand. Bagi masyarakat Thailand, bawang putih adalah rempah dapur yang dianggap penting. Hampir semua masakan dalam kuliner khas Thailand menggunakan bawang putih sebagai bumbunya. Selain itu, mereka pun biasa mengonsumsi herba bawang putih (Lingga, 2012).



### C. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep adalah konsep yang dipakai sebagai landasan berfikir dalam kegiatan ilmiah (Nursalam, 2008)

#### Variabel Independen

#### Variabel Dependen



#### Keterangan

- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang diteliti
- : Variabel yang tidak diteliti

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

#### D. Kerangka Kerja





Pembahasan dan penyajian hasil



Kesimpulan

Gambar 2.2 Kerangka Kerja Penelitian



### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEPTUAL**

##### ***A. Desain Penelitian***

Desain penelitian adalah keseluruhan dari penomoran untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian (Nursalam, 2008). Desain penelitian yang digunakan adalah *pre experimental* dengan rancangan *one group pre test-post test desain*. Penelitian ini dilakukan dengan cara *pretest* (pengukuran awal) tekanan darah dengan menggunakan tensi terlebih dahulu sebelum diberikan minuman olahan saringan bawang putih. Setelah itu, diberikan minuman olahan saringan bawang putih kemudian dilakukan lagi *posttest* (pengukuran akhir) untuk mendapatkan hasil setelah mengkonsumsi olahan saringan bawang putih (Hidayat, 2009). Minuman olahan saringan bawang putih di berikan selama 1 jam untuk menentukan hasil pengukuran tekanan darah (Eko Hernawan, Udi & Dwi Setyawan, Ahmad, 2003)

##### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

- 1. Lokasi:** penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.
- 2. Waktu :** penelitian dilaksanakan selama 4 hari pada bulan Agustus 2014.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah setiap subjek yang memenuhi karakteristik yaitu pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Populasi dalam penelitian ini adalah warga yang berada di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sebanyak 142 warga.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap mewakili populasi (Nursalam, 2008). Beberapa saran praktis untuk menentukan ukuran sampel adalah sensus untuk populasi kecil, menurut ukuran sampel dari penelitian serupa sebelumnya, menggunakan tabel yang sudah dipublikasi, dan menggunakan rumus untuk menentukan ukuran sampel (Tiro, 2011)

Sampel dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sebanyak 142 orang. Besar sampel penelitian ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d)^2}$$

Keterangan:

N = besar populasi

n = besar sampel

d = tingkat kepercayaan ketetapan yang diinginkan (0.25)

$$n = \frac{142}{1 + 142 (0,0625)}$$

$$n = \frac{142}{1 + 8,875}$$

$$n = \frac{142}{9,875}$$

$$n = 14,38$$

Jadi besar sampelnya adalah: 15 responden.



#### D. Teknik Pengambilan Sampel

##### 1. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah teknik yang dipergunakan untuk mengambil sampel dari populasi. Sampling adalah suatu proses dari menyeleksi porsi dan populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2008)

Sampling yang dipakai dalam penelitian ini adalah “*Non Probability Sampling*” dengan teknik “*Purposive Sampling*” yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai yang dikehendaki peneliti (memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi). Sampel dalam penelitian ini adalah

semua populasi pasien yang sudah melalui kriteria yaitu berjumlah 15 responden.

## 2. Kriteria inklusi dan Eksklusi

### a. Kriteria inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008)

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasien yang terdiagnosa mengalami hipertensi primer
- 2) Pasien yang tidak mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya
- 3) Pasien yang bersedia sebagai sampel
- 4) Pasien berusia  $\geq 18$  tahun

### b. Kriteria eksklusi

Kriteria eksklusi adalah karakteristik sampel yang tidak dapat dimasukkan atau tidak layak untuk diteliti.

Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pasien yang tidak bersedia mengkonsumsi olahan saringan bawang putih
- 2) Pasien yang tidak bersedia sebagai sampel

## ***E. Pengumpulan Data***

### **1. Sumber data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

#### **b. Data Sekunder**

Jumlah data pasien hipertensi di Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

### **2. Metode pengumpulan data**

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa lembar observasi, Tensi dan bawang putih. Berisi identitas responden, hasil pengukuran tekanan darah serta pemberian minuman olahan saringan bawang putih untuk mendapatkan informasi dari responden.

## ***F. Pengolahan dan Analisa Data***

Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi lembar observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut:

### **1. Editing**

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian dan konsistensi dari setiap jawaban

## 2. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap jawaban (pengkodean).

## 3. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

## 4. Analisa Data

Hasil jawaban atas pertanyaan lembar observasi di isi dan di ceklis kemudian dilakukan perbandingan nilai antara pre perlakuan dan post perlakuan kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

Analisis data merupakan tindakan menginterpretasikan data yang didapat untuk dapat digambarkan dan dipahami. Analisis data berisi tentang penjelasan data pada masing-masing variabel yang diteliti yang kemudian dideskripsikan. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data *univariat* dan *bivariat*.

Analisa *Univariat* adalah proses menganalisis tiap-tiap variable penelitian yang ada secara deskriptif dengan menghitung distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 2005)

Analisa *Bivariat* adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berpengaruh (Notoatmodjo, 2005). Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau untuk membuktikan hipotesis

pengaruh variable dianalisis dengan menggunakan uji statistik yang akan digunakan adalah uji *Friedman*, dengan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0,05$  yang dilakukan dengan bantuan komputer SPSS versi 20. Setelah uji hipotesis dilakukan dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan  $df=1$ , maka penilaian hipotesis ;  $H_a$  diterima jika  $p < \alpha = 0,05$ .

### **G. Penyajian Data**

Penyajian data disajikan dalam bentuk frekuensi tabel distribusi disertai penjelasannya.

### **H. Pertimbangan Etik Penelitian**

Menurut Yurisa (2008) dalam bukunya Etika Penelitian Kesehatan, bahwasanya Komite Nasional Etika Penelitian telah membagi empat etika yang harus ada dalam melakukan penelitian kesehatan yaitu:

#### **1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)**

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*).



## 2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas responden.

## 3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religious subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian.

Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana

kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subyek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

**4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)**

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stress tambahan, maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara sebagai lembaga kesehatan dibangun pada tahun 1974, merupakan salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Sinjai yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara dengan batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Tengah

Pada awal mula dibangunnya Puskesmas Balangnipa merupakan Rumah Sakit pertama di Kabupaten Sinjai. Setelah Kabupaten Sinjai mengalami kemajuan yang begitu pesat maka dibangunlah Rumah Sakit Umum Daerah di jalan Jenderal Sudirman dan kemudian bangunan lama dijadikan Puskesmas Balangnipa sampai sekarang. Pada tahun 2004 di tingkatkan pelayanannya menjadi Puskesmas perawatan maka dibangunlah sarana penunjang yaitu Ruang Rawat Inap.

Luas tanah Puskesmas Balangnipa adalah 1.330 m<sup>2</sup> (memiliki 3 bangunan/gedung). Gedung ruang rawat KIA dengan luas lantai 96 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2006 pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan pemugaran terhadap gedung Puskesmas Balangnipa, dengan berlantai 2 (administrasi/poli umum/UGD) dan digunakan pada awal 2007 sampai sekarang, dengan luas lantai gedung 252,7 m<sup>2</sup>. Pada tahun 2008 dibangun lagi gedung rawat inap berlantai 2 dengan luas lantai 200 m<sup>2</sup>.

## **2. Visi dan Misi Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

### **a. Visi**

Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan secara optimal untuk mewujudkan Sinjai Utara sehat di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa tahun 2015.

### **b. Misi**

- 1) Memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan kualitas lingkungan yang kondusif, hidup sehat dan produktif
- 2) Peningkatan pelayanan kesehatan (pelayanan prima)
- 3) Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
- 4) Pengembangan JAMKESDA dan dokter keluarga
- 5) Meningkatkan komitmen lintas sektor dan lintas program dalam memberdayakan masyarakat.

6) Membina kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan.

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara pada 01 Agustus 2014 sampai 04 Agustus 2014, data dikumpulkan dari sampel sebanyak 15 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Dari jumlah populasi warga sebanyak 142 warga.

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode penelitian adalah *pre experimental* dengan rancangan *one group pre test-post test desain*. Dimana teknik pengambilan sampel adalah dengan cara *purposive sampling*. Berdasarkan hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan kemudian disajikan dalam distribusi frekuensi analisa univariat dan bivariat.

Pengukuran dilakukan dua kali dalam sehari dimana dilakukan jam 08.00 WITA dan jam 13.00 WITA. Pada jam 08.00 WITA dilakukan pengukuran tekanan darah setelah itu diberikan olahan saringan bawang putih dan di tunggu selama satu jam setelah itu dilakukan lagi pengukuran tekanan darah untuk mengetahui reaksi bawang putih dalam tubuh begitu pula dengan jam 13.00 WITA (Untari, 2010)

## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

Responden yang berumur 18-28 tahun sebanyak 2 responden (13,3%), umur 29-39 tahun sebanyak 1 responden (6,7%), umur 40-50 tahun sebanyak 9 responden (60%), umur 51-60 tahun sebanyak 2 responden (13,3%) dan umur 61-71 tahun sebanyak 1 responden (6,7%). Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 6 responden (40%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 9 responden (60%). Responden yang memiliki pekerjaan sebanyak 12 responden (80%) dan yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 3 responden (20%) .

Dari data tersebut dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**

**Distribusi responden pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

Karakteristik Responden		f	%
Umur	18-28 tahun	2	13,3
	29-39 tahun	1	6,7
	40-50 tahun	9	60
	51-60 tahun	2	13,3
	61-71 tahun	1	6,7
Jenis Kelamin			
	Laki-laki	6	40
	Perempuan	9	60
Pekerjaan	Ada	12	80
	Tidak ada	3	20
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer, 2014

## 2. Analisa univariat

### a. Distribusi frekuensi hipertensi sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih

Responden yang mengalami hipertensi ringan sebelum pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 8 responden (53,3%) dan responden yang mengalami hipertensi ringan setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 12 responden (80,0%). Responden yang mengalami hipertensi sedang sebelum pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 3 responden (20,0%) dan responden yang mengalami hipertensi sedang setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 2 responden (13,3%). Responden yang mengalami hipertensi berat sebelum pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 4 responden (26,7%) dan responden yang mengalami hipertensi berat setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 1 responden (16,7%).

Dari data tersebut dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Distribusi frekuensi hipertensi sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

Hipertensi	Sebelum		Setelah	
	f	%	f	%
Ringan	8	53,3	12	80,0
Sedang	3	20,0	2	13,3
Berat	4	26,7	1	6,7
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	<b>15</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer, 2014

b. *Distribusi frekuensi perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih*

Responden yang mengalami perubahan tekanan darah menurun sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 15 responden (100%) dan responden yang mengalami perubahan tekanan darah tidak menurun sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 0 responden (0%).

Dari data tersebut dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi frekuensi perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**


Kategori	Perubahan	
	f	%
Menurun	15	100
Tidak menurun	0	0
<b>Total</b>	15	100

Sumber: Data Primer, 2014



Dari frekuensi tabel diatas kita dapat melihat grafik 2-D area sebagai berikut:

**Grafik 4.1**  
**Perubahan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**



Keterangan :

Sumbu x : kategori hipertensi dengan 1 = hipertensi ringan , 2 = hipertensi sedang dan 3 = hipertensi berat. Kategori penurunan dengan 1 = menurun dan 0 = tidak menurun

Sumbu y : inisial responden

————— : batas pengukuran

■ : sesudah pengukuran

■ : sebelum pengukuran

■ : perubahan setelah pengukuran

### 3. Analisa Bivariat

Analisis *bivariat* dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu pengaruh terapi musik religi terhadap penurunan derajat nyeri menstruasi. Untuk Mengetahui adakah pengaruh yang signifikan antara tiga variabel, maka dilakukan uji Friedman yang disajikan pada data tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan Uji Friedman diperoleh data bahwa terdapat 15 responden setelah pemberian olahan saringan bawang putih mengalami penurunan dan tidak ada responden yang mengalami peningkatan pengukuran tekanan darah kembali. Dan nilai  $p = 0,002 < \alpha = 0,05$ . Oleh karena  $p < \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak bawang putih berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara.

Dari data tersebut dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 4.4

**Pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**

Tekanan Darah	Sebelum		Setelah		p Value
	f	%	f	%	
Ringan	8	53,3	12	80,0	0,002
Sedang	3	20,0	2	13,3	
Berat	4	26,7	1	6,7	

*Uji Friedman*

### C. Pembahasan

Tabel 4.1 Menunjukkan bahwa responden yang berusia 40-50 tahun merupakan usia yang rentang terkena hipertensi yaitu sebanyak 9 orang (60%). Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan penambahan umur. Pasien yang berumur antara 40-50 tahun, 50 – 60 % mempunyai tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140/90 mmHg. Hal ini merupakan pengaruh degenerasi yang terjadi pada orang yang bertambah usianya.

Hipertensi merupakan penyakit multifaktorial yang munculnya oleh karena interaksi berbagai faktor. Dengan bertambahnya umur, maka tekanan darah juga akan meningkat. Setelah umur 45 tahun, dinding arteri akan mengalami penebalan oleh karena adanya penumpukan zat kolagen pada lapisan otot, sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Tekanan darah sistolik meningkat karena kelenturan pembuluh darah besar yang berkurang pada penambahan umur sampai dekade ketujuh sedangkan tekanan darah diastolik meningkat sampai dekade kelima dan keenam kemudian menetap atau cenderung menurun. Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis, pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik. Pengaturan tekanan darah yaitu refleks baroreseptor pada usia lanjut sensitivitasnya sudah berkurang, sedangkan peran ginjal juga sudah berkurang dimana aliran darah ginjal dan laju filtrasi glomerulus menurun (Ade, 2008)

Berdasarkan karakteristik penelitian, didapatkan jenis kelamin penderita hipertensi lebih banyak pada perempuan yaitu 9 orang (60 %). Dari hasil

penelitian Rayhani (2005) didapatkan wanita lebih banyak wanita menderita hipertensi dibandingkan dengan pria yaitu 51% banding 49% dan hasil penelitian Oktora (2007) juga didapatkan wanita lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan pria yaitu 58% banding 42%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 15 orang responden bahwa yang memiliki penyakit hipertensi yang terbanyak adalah yang memiliki pekerjaan yaitu 5 orang (33,3%). Berdasarkan teori Apriel (2011) dikatakan bahwa kaitan pekerjaan dengan hipertensi (jantung dan pembuluh darah) dapat dipahami karena dengan jantung merupakan organ vital yang memasok kebutuhan darah di seluruh tubuh. Dengan meningkatnya aktivitas fisik (pekerjaan) seseorang maka kebutuhan darah yang mengandung oksigen akan semakin besar. Kebutuhan ini akan dipenuhi oleh jantung dengan meningkatkan aliran darahnya. Hal ini juga direspon pembuluh darah dengan melebarkan diameter pembuluh darah (vasodilatasi) sehingga akan berdampak pada tekanan darah individu tersebut.

Tabel 4.2 distribusi frekuensi hipertensi sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih yang mengalami hipertensi berat sebelum pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 4 responden (26,7%) dan responden yang mengalami hipertensi berat setelah pemberian olahan saringan bawang putih adalah 1 responden (26,7%). Hal ini terjadi karena responden yang mengalami hipertensi berat merupakan hasil pengukuran tekanan darah yang dilakukan pada hari pertama dimana karakteristik responden mengalami hipertensi dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih terdapat 1

responden yang mengalami perubahan atau penurunan tekanan darah. Hal ini dikarenakan kandungan bawang putih pada hari pertama sudah bereaksi dalam tubuh selama 60 menit sehingga terjadi penurunan tekanan darah. Menurut Imelda, Meilina & Kurniawan, Steffi (2013) pemberian *Garlic (Aged Grlic Extract 3 g/kg peroral)* dapat meningkatkan produksi NO sebanyak 30-40% setelah 15 sampai 60 menit pemberian *Garlic*. Namun sebagian besar responden yang mengalami hipertensi berat setelah dilakukan pengkajian disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang dapat memicu tekanan darah misalnya daging, ayam goreng, garam, margarin dan lain sebagainya. Responden yang berumur 22 tahun pada saat itu mengkonsumsi mie instan. Menurut Novita (2014) berikut beberapa pantangan makanan untuk darah tinggi. Orang yang mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi, perlu membatasi makanan yang mengandung sodium (Na) yang banyak terdapat pada garam. Beberapa zat makanan yang menjadi pantangan karena dapat meningkatkan tekanan darah.

Pertama pantangan makanan untuk darah tinggi adalah makanan berlemak. Hal ini dapat membahayakan karena dapat mengakibatkan darah menjadi lengket dengan dinding pembuluh darah, sehingga darah akan menjadi lebih mudah untuk menggumpal. Makanan yang mengandung lemak jahat. Seperti ; keju, minyak sayur, ayam goreng, kentang goreng, hot dog, sosis, hamburger, pizza, susu, dll. Dan hampir semua makanan siap saja seperti yang sudah dijelaskan mengandung lemak jenuh yang dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi mengalami

peningkatan dan menyebabkan penyakit jantung pada penderitanya. Selain itu beberapa makan ini juga patut untuk di hindari diantaranya

1. Mie instan

Mudah untuk membuatnya dan rasanya nikmat. Tetapi sebungkus mie instan mengandung 14 gram lemak dan 1,580 sodium.

2. Margarin

Bagi orang penderita penyakit darah tinggi, mereka harus memastikan bahwa margarin tak mengandung lemak jenuh, bacalah kemasannya guna memastikannya.

3. Susu tinggi lemak

Merupakan sumber kalsium, tetapi tinggi lemak. Dalam segelas susu terkandung 8 gram lemak dan 5 gram lemak jenuh. Lemak jenuh tak baik bagi pengidap liver dan berbahaya bagi orang yang memiliki tekanan darah tinggi.

4. Acar

Makanan ini memang rendah kalori yang baik untuk tubuh, tetapi memiliki kandungan sodium yang tinggi, 1 buah acar mentimun bisa mengandung 570 mg sodium. Hal itu setara dengan sepertiga dari jumlah maksimum sodium perhari (2300 mg).

5. Ayam potong goreng

Ayam potong goreng mengandung 270 mg sodium dan 4.5 gram lemak. Daging burung dan ayam kampung bisa menjadi alternatif ketimbang daging ayam potong.

## 6. Daging

Daging asap dan daging Merah seperti daging sapi, daging kambing.

Frekuensi hipertensi sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih di dapatkan sebanyak 3 responden (20,0%) yang mengalami hipertensi sedang dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih terjadi perubahan tekanan darah dimana terdapat 2 responden (13,3%) yang mengalami perubahan tekanan darah. Hal ini terjadi karena setelah di lakukan pengkajian responden tidak melakukan diet dengan pola khusus dan olahraga sehingga perubahan tekanan darah tidak menurun secara signifikan, responden hanya makan seadanya tanpa memperhatikan kondisi kesehatannya mengingat hari tersebut merupakan hari raya Idul Fitri dimana makanan yang terjamu mengandung bahan yang dapat memicu terjadinya peningkatan tekanan dan olahragapun tidak mereka lakukan mengingat melayani tamu yang datang kerumahnya. Menurut Kesehatan, Artikel (2013) langkah pertama yang sangat penting dilakukan adalah menjaga pola makan karena suplai makanan yang masuk ke tubuh sangat memengaruhi naik turunnya tekanan darah seseorang. Diet yang sehat sangat penting dalam usaha mengontrol tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko penyakit jantung.

Sebenarnya, tidak ada peraturan yang terlalu ketat dalam menjaga pola makan yang sehat. Pada intinya, makanan yang sehat dimulai dan diakhiri dengan keseimbangan dan keragaman. Ini termasuk makanan dengan kadar garam rendah dan minuman alkohol yang sewajarnya ini adalah termasuk cara diet yang sehat.

Banyak orang makan garam melebihi apa yang dibutuhkan tubuhnya. Garam umumnya terdapat pada makanan yang diproses atau diawetkan. Garam yang berlebihan mempengaruhi tekanan darah. Jika Anda mengidap tekanan darah tinggi, jumlah garam yang Anda makan dapat mengganggu usaha pengontrolan tekanan darah Anda. Makanlah makanan segar yang tidak mengandung garam atau kurangi makanan yang diawetkan dengan garam.

Olahraga teratur atau kegiatan fisik yang lain juga dapat menjaga kestabilan tekanan darah karena peredaran darah akan menjadi lancar. Berdasarkan penelitian, seseorang yang berolahraga secara teratur terbukti dapat menurunkan tekanan darah ke tingkat normal 50 persen lebih besar dibandingkan orang yang jarang melakukan aktivitas tersebut. Satu sesi olahraga rata-rata menurunkan tekanan.

Tidak perlu olah raga yang berat, cukup dengan jalan kaki, berenang, bersepeda, atau dengan kegiatan fisik lainnya. Hindari olah raga berat dan menegangkan karena justru dapat meningkatkan tekanan darah. Lebih bijak jika sebelumnya Anda mengkonsultasikan dengan dokter mengenai jenis olahraga yang cocok untuk Anda.

Olahraga dan aktif berkegiatan fisik juga berperan untuk menurunkan berat badan. Berat badan yang berlebihan membebani kerja jantung sehingga kinerja jantung menjadi tidak optimal dan akhirnya peredaran darah pun tidak lancar. Menurunkan berat badan serta mengontrolnya merupakan cara yang efektif dalam mencegah hipertensi.



Responden yang mengalami hipertensi ringan sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih terdapat 8 responden (53,3%) dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 12 responden (80,0%), ekstrak bawang putih sudah menunjukkan pengaruhnya terhadap penurunan tekanan darah yang sebelumnya juga sudah lebih dahulu bereaksi yang terjadi pada hipertensi berat dimana hari pertama kandungan bawang putih sudah bereaksi dalam tubuh selama 60 menit sehingga terjadi penurunan tekanan darah.

Tabel 4.3 distribusi frekuensi pengukuran tekanan darah sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih responden yang mengalami perubahan tekanan darah menurun sebanyak 15 responden (100%) dan responden yang mengalami perubahan tekanan darah tidak menurun sebelum dan setelah pemberian olahan saringan bawang putih sebanyak 0 responden (0%). Hal ini sudah terbukti bahwa kandungan bawang putih yang terdapat di dalamnya dapat menurunkan tekanan darah dan menunjukkan bahwa tidak ada responden yang mengalami peningkatan tekanan darah karena ekstrak bawang putih bersifat menurunkan tekanan darah. Menurut Yuli (2013) bahan alami yang sangat populer diseluruh dunia untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi adalah bawang putih. Bawang putih sudah lama dianggap baik untuk membantu menyembuhkan penyakit hipertensi dan penyakit lainnya karena sifat-sifat yang dimilikinya.

Tabel 4.4 menunjukkan bawang putih berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah setelah pemberian ekstrak bawang putih pada pasien hipertensi di

Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, dimana terdapat 15 responden yang menurun, penurunan ini disebabkan karena adanya senyawa allisin dalam bawang putih. Angiotensin II adalah protein yang membantu pembuluh darah berkontraksi sehingga meningkatkan tekanan darah. Allisin yang terkandung dalam bawang putih memblokir aktivitas angiotensin II dan membantu mengurangi tekanan darah. Kandungan polisulfida pada bawang putih diubah menjadi gas yang disebut *hydrogen sulfide* oleh sel darah merah. *Hydrogen sulfide* memperbesar pembuluh darah dan membantu mengontrol tekanan darah (Admin, 2012). Komponen allisin secara alami tidak terdapat didalam bawang putih, tetapi terbentuk dengan cepat apabila jaringan sel bawang putih terluka, misalnya pada saat d tumbuk. Untuk mendapatkan allisin dalam kadar maksimal, bawang putih harus diekstrak lebih dahulu (Ramadani, 2012)

Penelitian ini sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan Piotrowski yang bekerja di University of Geneva, menggunakan bawang putih pada 100 pasien yang menderita hipertensi secara tidak normal. Dari sekitar 40% kasus yang dirawat, terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan dalam satu minggu perawatan. Piotrowski mengaku bahwa bawang putih memiliki efek dilatoris terhadap pembuluh darah yakni, bawang putih memiliki efek untuk membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar sehingga mengurangi tekanan.

Arifin (2004) juga menambahkan bahwa *Allisin* yang terdapat dalam bawang putih adalah salah satu *inhibitor* kuat *release* dan anti agregrasi trombosit melalui inhibisi sintesis tromboksan. Hambatan aktivasi *fosfolipase* membran dan

mobilisasi kalsium ke *intraselular*. *Allisin* juga dapat menyebabkan *hiperpolarisasi* membrane melalui pembukaan *kanal ion K<sup>+</sup>* yang selanjutnya akan menutup *kanal Ca<sup>2+</sup>* sehingga *Ca<sup>2+</sup> intraseluler* menurun dan mengakibatkan *agregasi* trombosit. Kandungan yang terdapat dalam bawang putih sangat jelas dapat menjaga tekanan darah tetap teratur dan stabil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terapi seduhan bawang putih dapat membantu menjaga mempertahankan keseimbangan pompa kalium dan natrium yang berpengaruh terhadap tekanan darah.

Pemberian terapi seduhan bawang putih pada responden, sebagian besar menyatakan bahwa setelah mengkonsumsi seduhan bawang putih mereka merasa tenang dan sakit ditengkuk mereka menjadi berkurang dan bahkan tidur menjadi lebih enak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kandungan bawang putih yang dikonsumsi oleh responden mampu mengurangi ketegangan otot dan emosional sehingga terapi seduhan bawang putih ini dapat mengurangi resiko terkena hipertensi atau berdampak positif terhadap tekanan darah.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa bawang putih memiliki efek *hiperpolarisasi* pada pembuluh darah yang terbukti mempengaruhi beban kerja jantung. Pompa kalium-natrium dan bersifat menenangkan yang berdampak positif pada tekanan darah. Dengan demikian terapi seduhan bawang putih cukup efektif dalam menurunkan dan mengontrol tekanan darah.

Islam sangat ketat dalam hal mengkonsumsi makanan seperti yang dijelaskan dalam QS. 'Abasa/80:24

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahannya:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

Maksud dari ayat tersebut adalah hendaknya manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Disamping itu iapun bisa merasakan kelezatan makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan waktunya.

Pemberian olahan saringan bawang putih jika dilakukan 4 hari penelitian penurunan tekanan darah terhadap ekstrak bawang putih tidak signifikan jelas berbeda bila dilakukan selama satu bulan. Menurut Darmadi & Riska (2013) penelitian yang dilakukan oleh Alicajic F (2009) terhadap 30 pasien hipertensi ringan dan sedang untuk menilai efisiensi bawang putih sebagai tatalaksana hipertensi ringan dan sedang. 30 pasien, berusia 41-64 tahun, 17 laki-laki dan 13 perempuan mendapat 3 siung bawang putih tiap hari selama sebulan. Subyek tidak diperkenankan mengkonsumsi obat antihipertensi. Ditemukan penurunan tekanan darah sistolik rata-rata 9,52% dan untuk tekanan darah sistolik rata-rata 10,42%. Bahwa dengan bawang putih tidak terjadi penurunan tekanan darah yang signifikan, namun dapat digunakan sebagai bagian dari diet sebagai strategi tatalaksana hipertensi.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan Penelitian pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara adalah :

1. Waktu penelitian yang bertepatan dengan hari kerja responden.
2. Sebagian besar penderita hipertensi mengalami mual saat mengonsumsi olahan saringan bawang
3. Derajat hipertensi harus sama dengan perlakuan dalam pemberian olahan saringan bawang putih
4. Kriteria hipertensi ditentukan oleh umur, berat badan dan jenis kelamin.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Ada pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan nilai  $p = 0,002$
2. Frekuensi hipertensi sebelum pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai responden yang mengalami hipertensi ringan sebanyak 8 responden (53,3%), yang mengalami hipertensi sedang sebanyak 3 responden (20,0%) dan yang mengalami hipertensi berat sebanyak 4 responden (26,7%).
3. Frekuensi hipertensi setelah pemberian olahan saringan bawang putih di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai responden yang mengalami hipertensi ringan sebanyak 12 responden (80,0%), yang mengalami hipertensi sedang sebanyak 2 responden (13,3%) dan yang mengalami hipertensi berat sebanyak 1 responden (16,7%).

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Pada peneliti selanjutnya  
Sebaiknya penelitian dilakukan secara rutin karena empat hari merupakan hari dimana tekanan darah tidak turun secara signifikan. Menurut penelitian yang dilakukan Darmadi & Riska (2013) selama sebulan peranan bawang putih

terhadap pasien hipertensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan tekanan darah namun dapat digunakan sebagai bagian dari diet sebagai strategi tatalaksana hipertensi.

2. Pada penderita hipertensi

Perlunya pemeriksaan tekanan darah secara rutin, pengobatan secara rutin, dan menjalani pola hidup yang sehat, seperti menghindari pola asupan garam yang tinggi, menghentikan kebiasaan merokok, serta menghindari stress untuk mencegah timbulnya komplikasi lanjut

3. Pada masyarakat

Perlunya pencegahan terjadinya penyakit hipertensi sedini mungkin terutama pada masyarakat yang memiliki factor resiko untuk terjadinya penyakit hipertensi melalui perbaikan pola hidup dengan menghindari pola asupan garam yang tinggi. Masyarakat dihimbau agar selalu memonitor tekanan darahnya secara rutin serta membatasi konsumsi makanan yang mengandung lemak seperti daging, kuning telur, keripik kentang, kerupuk asin, makanan beku (nugget, pizza dan wafer), kue kering dan natrium yang bersumber dari asupan kalori seperti gorengan, nasi goreng, snack (makanan ringan), kue asin, kecap dan bumbu salad serta sejenisnya

4. Wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Perlunya kebijakan untuk menggunakan program promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten

Sinjai bahwa perlunya deteksi dini melalui pemeriksaan kesehatan secara rutin dan perlunya mengetahui faktor-faktor resiko dari kejadian hipertensi mengingat angka kejadian hipertensi terus meningkat dari tahun ke tahun.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2013. Departemen Agama RI
- Ade Dian Anggraini ,dkk. 2008. *Faktor-Faktor yang berhubungan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pasien yang Berobat di Poliklinik Dewasa Puskesmas Bangkinang Periode Januari Sampai Juni 2008*. Diakses tanggal 11 Agustus 2014 dari <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FTKXBk8q-zAJ:yayanakhyar.files.wordpress.com/2009/02/files-of-drsmed-faktor-yang-berhubungan-dengan-kejadian-hipertensi.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Ade Saputra, Helmi. 2013. *Cegah Hipertensi Makan Saja Bawang Putih*. Diakses tanggal 17 Mei 2014 dari <http://health.okezone.com/read/2013/11/04/484/891749/cegah-hipertesi-makan-saja-bawang-putih>
- Aditya, Rifqi. 2013. *Manfaat Bawang Putih Tunggul*. Diakses tanggal 31 Mei 2014 dari <http://www.tubuhwanita.com/manfaat-bawang-putih-tunggul>
- Admin. 2012. *15 Khasiat Bawang Putih Untuk Kesehatan*. Diakses tanggal 20 Agustus 2014 dari <http://www.akuinginsukses.com/15-khasiat-bawang-putih-untuk-kesehatan/>
- Agoes, Azwar. 2012. *Tanaman Obat Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika
- Agustina, Putri. 2011. *Liliaceae Suku Bawang-Bawangan*. Diakses tanggal 25 Mei 2014 dari <http://princesssaccharifera.blogspot.com/2011/04/liliaceaesuku-bawang-bawangan.html>
- Apriel. 2011. *Pengaruh Pekerjaan dengan Kinerja Jantung*. Diakses tanggal 15 Agustus 2014 dari <http://nununk10023216.wordpress.com/2011/12/27/pengaruh-pekerjaan-terhadap-kinerja-jantung/>
- ASM, Saifuddin. 2013. *Ali-Imran:93-94 Batalnya Yahudi yang Mengharamkan Makanan*. Diakses tanggal 12 Agustus 2014 dari <http://saifuddinasm.com/2013/01/23/ali-imran93-94-batalnya-yahudi-yang-mengharamkan-makanan/>
- Anita. 2009. *Peranan Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitor Pengobatan Gagal*. Diakses tanggal 30 Mei 2014 dari <http://uncruxers.com>

wordpress.com/2009/06/25/peranan-angiotensin-converting-enzyme-ace-inhibitor-dalam-pengobatan-gagal-jantung/

- Anonim. 2009. *Hipertensi Primer*. <http://www.scribd.com/doc/3498615/HIPERTENSIPRIMER?Autodowdoc>
- Anonim. 2010. *Bawang Putih*. Diakses tanggal 25 Mei 2014 dari [digilib.unimus.ac.id/download.php?id=11261](http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=11261)
- Anonim. 2012. *Obat-Obat Beta Bloker*. Diakses tanggal 30 Mei <http://blogkesehatan.net/obat-obat-beta-blocker/>
- Arifin, Akbar. 2013. *Pengaruh Gaya Hidup Terhadap Resiko Terjadinya Hipertensi di RW 04 Kelurahan Tamalanrea Indah Wilayah Kerja Puskesmas Antara Makassar*. Tidak diterbitkan
- Asnur. 2007. *Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kepatuhan Berobat pada Pasien Hipertensi Rawat Jalan di RSUD Labuang Baji Makassar*. Tidak diterbitkan
- Awaluddin, Amsal. 2012. *Hubungan Gaya Hidup dengan Tingkat Kejadian Hipertensi di Ruang Rawat Inap Bagian Penyakit Dalam di RSUD Labuang Baji Makassar*. Tidak diterbitkan
- Borneo, Marcel. 2012. *Asuhan Keperawatan Hipertensi*. Diakses tanggal 17 2014 dari <http://mycellino.blogspot.com/2012/05/askep-hipertensi.htm><sup>1</sup>
- Darmadi & Riska. 2013. *Peranan bawang Putih (Allium Sativum) Terhadap Hipertensi*. Diakses tanggal 14 November dari [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31249/.../Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/31249/.../Chapter%20II.pdf)
- Dianti, Sri. 2012. *Bawang Putih dan Tekanan Darah Tinggi*. Diakses tanggal 17 Mei 2014 dari <http://www.sridianti.com/bawang-putih-tekanan-darah-tinggi.html>
- Djamilah & Najmuddin. 2013. *Khasiat Bawang Putih*. Diakses tanggal 31 Mei 2014 dari <http://www.djamilah-najmuddin.com/khasiat-bawang-putih>
- Eko Hermawan, Udhi & Dwi Setyawan, Ahmad. 2003. *Senyawa Organosulfur Bawang Putih (Allium Sativum L.) dan Aktivitas Biologinya*. Diakses tanggal 4 Juni 2014 dari [lib.umpo.ac.id/gdl/download.php?id=473](http://lib.umpo.ac.id/gdl/download.php?id=473)
- Hidayat, A. Azis Alimul. 2008. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika

- Kesehatan, Artikel. 2013. *Memahami Tekanan Darah Tinggi*. Diakses tanggal 27 Agustus 2014 dari [http://www. hdindonesia. com/ info-kesehatan /memahami-tekanan-darah-tinggi-2](http://www.hdindonesia.com/info-kesehatan/memahami-tekanan-darah-tinggi-2)
- Lidya. 2013. *Penyebab Hipertensi*. Diakses tanggal 28 Agustus 2014 dari <http://penyebabhipertensi.com/faktor-penyebab-hipertensi/>
- Imelda, Meilina & Kurniawan, Steffi. 2013. *Peranan Garlic (Bawang Putih) pada Pengelolaan Hipertensi*. Diakses tanggal 14 November 2014. Dimas. [eprints.undip.ac.id/7592/1/Dimas\\_Tri\\_Anantyo.pdf](http://eprints.undip.ac.id/7592/1/Dimas_Tri_Anantyo.pdf)
- Kariman. 2014. *Bebas Penyakit dengan Tanaman Ajaib*. Surakarta: Open Books
- Kartika. 2013. *Hipertensi*. Di akses tanggal 12 Agustus 2014 dari <http://kartika.pibriyanti.wordpress.com/2013/09/24/hipertensi/>
- Karyadi, E. 2014. *Hidup Bersama Penyakit Hipertensi, Asam Urat, Jantung Koroner*. Jakarta: Intisari Mediatama
- Latief, Abdul. 2014. *Obat tradisional*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Leung, S. & Mukherjee, D. 2009. *Contemporary management of hypertension--how to optimize therapy. Cardiovascular & Hematological Disorders Drug Targets*
- Lingga, Lanyy. 2012. *Terapi Bawang Putih untuk Kesehatan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Notoatmodjo. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrument Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Nuzulul. 2011. *Asuhan Keperawatan Hipertensi*. Diakses tanggal 17 Mei 2014 dari [http://nuzulu1-fkp09.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-35459-Kep%20Kardiovaskuler-Askep%20Hipertensi.html](http://nuzulu1-fkp09.web.unair.ac.id/artikel_detail-35459-Kep%20Kardiovaskuler-Askep%20Hipertensi.html)
- Oktora .2007. *Gambaran Penderita Hipertensi yang Dirawat Inap di Bagian Penyakit Dalam RSUD Arifin Achmad Pekanbaru Periode Januari Sampai Desember 2007*, Skripsi, FK UNRI, 2007, hal 41-42. Diakses tanggal 11

Agustus 2014 dari [http:// webcache. Googleusercontent. com/ search?q= cache:FTKXBk8q-zAJ: yayanakhyar. files. wordpress. com/2009/02/ files-of- drsmed -faktor -yang -berhubungan- dengan-kejadian- hipertensi.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FTKXBk8q-zAJ:yayanakhyar.files.wordpress.com/2009/02/files-of-drsmed-faktor-yang-berhubungan-dengan-kejadian-hipertensi.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id)

- P. Kowalak, Jenifer, dkk. 2011. *Buku Ajar Patofisiologi*. Jakarta: EGC
- Potter & Perry. 2005. *Fundamental Keperawatan*. Jakarta: EGC
- Pratomo, Yuda. 2012. *Bawang Putih*. Diakses tanggal 30 Mei 2014 dari <http://www.bawangputih.org/bawang-putih-untuk-hipertensi/>
- Rahmawati. 2013. *Manfaat Bawang Putih*. Diakses tanggal 17 Mei 2014 dari <http://10108487.blog.unikom.ac.id/manfaat-bawang-putih.11c>
- Ramadani,rani. 2012. *Melihat Kegunaan Bawang Putih yang Sedemikian Banyak*. Diakses tanggal 2 Juli 2014 dari <http://rumput.hijau.blogspot.com/2012/09/kegunaan-bawang-putih.html>
- Rayhani. 2005. *Epidemiologi Penderita Hipertensi Esensial yang Dirawat di Bagian Penyakit Dalam Perjan RS DR. M. Djamil Padang Periode 1 Januari 2002 – 31 Desember 2003*. Skripsi. Padang. 2005. Hal. 32. . Diakses tanggal 11 Agustus 2014 dari [http:// webcache. Googleusercontent. com/ search?q= cache:FTKXBk8q-zAJ: yayanakhyar. files. wordpress. com/2009/02/ files-of- drsmed -faktor -yang -berhubungan- dengan-kejadian- hipertensi.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FTKXBk8q-zAJ:yayanakhyar.files.wordpress.com/2009/02/files-of-drsmed-faktor-yang-berhubungan-dengan-kejadian-hipertensi.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id)
- Ried K, Frank OR, Stocks NP. 2010. *Aged Garlic Extract Lowers Blood Pressur in Patients with Treated But Uncontrolled Hypertension: A Randomised Controlled Trial*. Maturitas
- Riskesdes. 2013. *Riset Kesehatan Dasar 2013*. Diakses tanggal 22 Juni 2014 dari [depkes.go.id/downloads/riskesdas2013/Hasil%20Riskesdas%202013.pdf](http://depkes.go.id/downloads/riskesdas2013/Hasil%20Riskesdas%202013.pdf)
- Rudy. 2013. *Pengobatan Hipertensi*. Diakses tanggal 30 Mei 2014 dari <http://pengobatanhipertensi.com/>
- Setiadi. *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Slamet, Juli Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press: Bandung
- Suriana, Neti & Shobariani, Irni. 2013. *Ensiklopedia Tanaman Obat*. Malang: Rumah Ide

- Tiro, Muhammad. 2011. *Penelitian: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Andira Publisher
- Tattelman. 2005. *Health Effects of Garlic*. Am Fam Physician
- Udjianti, Wajan Juni. 2010. *Keperawatan Kardiovaskuler*. Jakarta: Salemba Medika
- Untari, Ida. 2010. Bawang Putih Sebagai Obat Paling Mujarab Bagi Kesehatan. Di akses tanggal 4 Juli 2014 dari [www.jurnal.stikes-aisyiya.ac.id/index.php/gaster/article/.../59/56](http://www.jurnal.stikes-aisyiya.ac.id/index.php/gaster/article/.../59/56)
- Widiyani, Rosmha . 2013. *Hipertensi pada Wanita Lebih Berbahaya*. Diakses tanggal 27 Agustus 2014 dari <http://health.kompas.com/read/2014/01/03/1614268/Hipertensi.pada.Wanita.Lebih.Berbahaya>
- Winarsho. 2013. *Pintar Meracik Sendiri Ramuan Herbal untuk Penyakit Asam Urat, Kolesterol dan Hipertensi*. Yogyakarta: Araska
- Yumiati, dkk. 2010. *Perbandingan Efektifitas Seduhan Bawang Putih Dengan Captopril Terhadap Penurunan Tekanan Darah Pada Penderita Hipertensi*. Diakses tanggal 4 Juni 2014 dari [repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/.../jurnal%20YUMIATI.pdf?...](http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/.../jurnal%20YUMIATI.pdf?...)
- Yurisa, Wella. 2008. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: FKUR


## RIWAYAT HIDUP



Arni Damayanti, dilahirkan di Sinjai tanggal 7 September 1991.

Penulis merupakan anak sulung dari tiga bersaudara, buah hati dari Ayahanda Muh. Jafar dan Ibunda Muhaidah.

Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pertiwi X tahun 1997, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar tahun 1998 di SDN 03 Unggulan Balangnipa dan sekolah Menengah Pertama tahun 2004 di SMP Negeri 1 Unggulan Sinjai Utara. Kemudian pada tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Favorite Sinjai Utara jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan tamat pada tahun 2010 telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ROHIS (Rohani Islam) dan gerak jalan. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan dan meraih gelas sarjana Keperawatan pada tahun 2014.



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

### *(Informed Consent)*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama: ARNI DAMAYANTI, dengan judul **“PENGARUH BAWANG PUTIH TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BALANGNIPA KECAMATAN SINJAI UTARA BALANGNIPA KABUPATEN SINJAI”**

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pernyataan yang akan saya jawab benar-benar dapat dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.



Makassar, 2014

Responden

( )

## LEMBAR OBSERVASI

### PENGARUH BAWANG PUTIH TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BALANGNIPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI

Nomor Responden : Tanggal: 2014

Nama Responden :

Jenis pemberian : Minuman Olahan Saringan Bawang Putih

Alat dan Bahan yang Digunakan: Gelas ukur 50 ml, Tensi, Bawang Putih 6 gram, Gelas Ukur 50 ml dan Analitik

#### A. Identitas Responden

1. Umur : (tahun)
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Alamat :
4. Jenis Kelamin : a. Laki-laki   
b. Perempuan
5. Agama : a. Islam   
b. Kristen   
c. Hindu   
d. Budha
6. Pekerjaan : a. Ada   
b. Tidak ada
7. Suku : a. Bugis   
b. Jawa   
c. Makassar



d. Lain-lain

8. Status Pernikahan : a. Menikah

b. Belum menikah

9. Merupakan pasien hipertensi primer :

a. Ya

b. Tidak

10. Tidak mengkonsumsi obat-obatan sebelumnya :

a. Ya

b. Tidak

11. Tabel Hasil Pengukuran

No	Sampel	Hari	Waktu Pemberian	Hasil pengukuran	
				Sebelum Pemberian	Setelah Pemberian
		Pertama			
		Kedua			
		Ketiga			
		Keempat			

PEREMPUAN

NO	INISIAL	PRE TEST		POS TEST	
		8		13	
		SISTOLE	DIASTOLE	SISTOLE	DIASTOLE
1	AM	150	100	140	90
2	NI	200	150	190	120
3	SU	160	100	150	90
4	AN	180	100	170	90
5	NU	160	100	140	90
6	AF	140	90	140	80
7	SH	200	100	170	90
8	NR	150	90	140	80
9	HS	140	90	140	80
10	MJ	180	100	140	90
11	AS	140	90	140	80
12	AK	170	100	140	90
13	MU	140	90	140	85
14	KA	140	90	140	90
15	AB	140	90	140	80

karakteristik

- 1: hipertensi ringan
- 2: hipertensi sedang
- 3: hipertensi berat

karakteristik

- 1: menurun
- 0: tidak menurun

NO	INISIAL	sebelum	setelah	perubahan
1	AM	1	1	1
2	NI	3	3	1
3	SU	2	1	1
4	AN	3	2	1
5	NU	2	1	1
6	AF	1	1	1
7	SH	3	2	1
8	NR	1	1	1
9	HS	1	1	1
10	MJ	3	1	1
11	AS	1	1	1
12	AK	2	1	1
13	MU	1	1	1
14	KA	1	1	1
15	AB	1	1	1

IDENTITAS RESPONDEN			
NO	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1	3	2	1
2	5	2	1
3	4	1	2
4	3	1	1
5	3	1	1
6	1	2	1
7	1	2	1
8	3	1	1
9	3	2	1
10	3	2	2
11	3	2	1
12	3	2	1
13	4	1	2
14	3	2	1
15	2	1	1

KETERANGAN :

UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN
1 = 18-28	1 = LAKI-LAKI	1=ADA
2 = 29-39	2 = PEREMPUAN	2=TIDAK ADA
3 = 40 - 50		
4 = 51 - 60		
5 = 61 - 71		



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Kelurahan Balangnipa

Sebagai pernyataan tugas akhir mahasiswa Program S1 Keperawatan UIN Alauddin Makassar, saya akan melakukan penelitian tentang pengaruh bawang putih terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penurunan tekanan darah setelah pemberian minuman olahan saringan bawang putih pada pasien hipertensi, untuk keperluan tersebut saya mohon *bersedia/tidakbersedia* \*) Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Demikian, lembar persetujuan ini kami buat. Atas bantuan dan partisipasinya disampaikan terimakasih.

Sinjai, 2014

Responden

Peneliti

( )

( )

```

GET
  FILE='G:\SKRIPSI ARNY\spss ang knew.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=sebelum setelah perubahan
  /ORDER=ANALYSIS.

```

## Frequencies

Notes		
Output Created		02-SEP-2014 01:50:11
Comments		
Input	Data	G:\SKRIPSI ARNY\spss ang knew.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data	15
Missing Value Handling	File	
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Syntax	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
		FREQUENCIES VARIABLES=sebelum setelah perubahan /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

[DataSet1] G:\SKRIPSI ARNY\spss ang knew.sav

**Statistics**

		sebelum	setelah	perubahan
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0

**Frequency Table**

**sebelum**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	hipertensi ringan	8	53.3	53.3	53.3
	hipertensi sedang	3	20.0	20.0	73.3
	hipertensi berat	4	26.7	26.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

**setelah**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	hipertensi ringan	12	80.0	80.0	80.0
	hipertensi sedang	2	13.3	13.3	93.3
	hipertensi berat	1	6.7	6.7	100.0
	Total	15	100.0	100.0	

**perubahan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	menurun	15	100.0	100.0	100.0

```

EXAMINE VARIABLES=sebelum setelah perubahan
  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.

```

## Explore

Notes	
Output Created	02-SEP-2014 01:33:49
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data 15 File Definition of Missing
Missing Value Handling	User-defined missing values for dependent variables are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any dependent variable or factor used.
Syntax	EXAMINE VARIABLES=sebelum setelah perubahan /PLOT BOXPLOT STEMLEAF NPLOT /COMPARE GROUPS /STATISTICS DESCRIPTIVES /CINTERVAL 95 /MISSING LISTWISE /NOTOTAL.
Resources	Processor Time 00:00:04.96 Elapsed Time 00:00:04.88

[DataSet0]

**Warnings**

perubahan is constant. It will be included in any boxplots produced but other output will be omitted.

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sebelum	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
setelah	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%
perubahan	15	100.0%	0	0.0%	15	100.0%

**Descriptives<sup>a</sup>**

		Statistic	Std. Error
sebelum	Mean	1.73	.228
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	1.24	
	Upper Bound	2.22	
	5% Trimmed Mean	1.70	
	Median	1.00	
	Variance	.781	
	Std. Deviation	.884	
	Minimum	1	
	Maximum	3	
	Range	2	
	Interquartile Range	2	
	Skewness	.601	.580
	Kurtosis	-1.494	1.121
setelah	Mean	1.27	.153
	95% Confidence Interval for Mean		
	Lower Bound	.94	
	Upper Bound	1.60	
	5% Trimmed Mean	1.19	



Median	1.00	
Variance	.352	
Std. Deviation	.594	
Minimum	1	
Maximum	3	
Range	2	
Interquartile Range	0	
Skewness	2.273	.580
Kurtosis	4.785	1.121

a. perubahan is constant. It has been omitted.

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
sebelum	.330	15	.000	.734	15	.001
setelah	.473	15	.000	.525	15	.000

a. Lilliefors Significance Correction

b. perubahan is constant. It has been omitted.

## sebelum

sebelum Stem-and-Leaf Plot

Frequency	Stem &	Leaf
8.00	1 .	00000000
.00	1 .	
3.00	2 .	000
.00	2 .	
4.00	3 .	0000

Stem width: 1  
Each leaf: 1 case(s)

NPAR TESTS  
 /FRIEDMAN=sebelum setelah perubahan  
 /MISSING LISTWISE.

## NPar Tests

Notes		
Output Created		02-SEP-2014 01:35:38
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	15
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax		NPAR TESTS /FRIEDMAN=sebelum setelah perubahan /MISSING LISTWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02
	Number of Cases Allowed <sup>a</sup>	98304

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet0]

## Friedman Test

Ranks	
	Mean Rank
Sebelum	2.43
Setelah	1.90
Perubahan	1.67

**Test Statistics<sup>a</sup>**

N	15
Chi-Square	12.087
df	2
Asymp. Sig.	.002

a. Friedman Test



FREQUENCIES VARIABLES=umur jeniskelamin pekerjaan  
/ORDER=ANALYSIS.

## Frequencies

Notes	
Output Created	21-AUG-2014 07:54:45
Comments	
Input	Active Dataset DataSet0
	Filter <none>
	Weight <none>
	Split File <none>
	N of Rows in Working Data File 15
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax	FREQUENCIES VARIABLES=umur jeniskelamin pekerjaan /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time 00:00:00.02
	Elapsed Time 00:00:00.01

[DataSet0]

### Statistics

		umur	jeniskelamin	pekerjaan
N	Valid	15	15	15
	Missing	0	0	0

## Frequency Table

umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-28	2	13.3	13.3	13.3
29-39	1	6.7	6.7	20.0
40-50	9	60.0	60.0	80.0
51-60	2	13.3	13.3	93.3
61-71	1	6.7	6.7	100.0
Total	15	100.0	100.0	

jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	6	40.0	40.0	40.0
perempuan	9	60.0	60.0	100.0
Total	15	100.0	100.0	

pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	12	80.0	80.0	80.0
tidak ada	3	20.0	20.0	100.0
Total	15	100.0	100.0	

## DOKUMENTASI KEGIATAN

### ALAT DAN BAHAN



### SETELAH DIOLAH



**MENGGISI LEMBAR OBSERVASI**



**TANDA TANGAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**





**PENGUKURAN TEKANAN DARAH**

**SEBELUM PEMBERIAN OLAHAN SARINGAN BAWANG PUTIH**



**PEMBERIAN OLAHAN SARINGAN BAWANG PUTIH**





**SETELAH PEMBERIAN OLAHAN SARINGAN AWANG PUTIH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR