

**GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA
TENTANG DAMPAK JARAK KEHAMILAN YANG TERLALU DEKAT
DI PUSKESMAS/RSP VI KASSI-KASSI MAKASSAR
TAHUN 2014**



**KARYA TULIS ILMIAH
(KTI)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

OLEH

AYU EFRIYANTI AMINULLAH
70400011009

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2014 M
1435 H

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM AYU ERIYANTI AMINULLAH
NIM : 70400011009

ALAUDDIN
MAKASSAR

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Ayu Efriyanti Aminullah

Nim : 70400011009

Judul : Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang
Dampak Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Di Puskesmas/RSP VI
Kassi-Kassi Makassar Tahun 2014

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada Seminar Karya Tulis Ilmiah Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2014 M
1435 H

ALA UDDIN
MAKASSAR
Pembimbing

Hj. Sitti Saleha S.SiT.,S.KM.,M.Keb
Nip : 19760126 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “ **Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang Dampak Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar Tahun 2014**” yang disusun oleh **Ayu Efriyanti Aminullah, Nim : 70400011009**, Mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, Agustus 2014 M
1435 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc (.....)

Sekretaris : Firdayanti S.SiT.,M.Keb (.....)

Pembimbing : Hj. Sitti Saleha S.SiT.,S.KM.,M.Keb. (.....)

Penguji I : dr. Darmawansyih S.Ked.,M.Kes (.....)

Penguji II : Dr. H. Supardin M.Hi (.....)

Mengetahui :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
Nip : 19950203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT yang maha sempurna dengan limpahan rahmat, berkah dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya, penabur cahaya ilham, pilar nalar kebenaran dan kebaikan yang terindah.

Shalawat dan salam kepada sang *Uswatun Khasanah*, baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabatiyah atas suri tauladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang Dampak Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar Tahun 2014”.

Dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, doa, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Melalui lembar putih ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tersayang Ikhsan Aminullah S.Pd, dan ibunda tercinta Umi Fartilah, beliau laksana cahaya di tengah gelapnya malam yang selama ini telah mengasuh, mendidik, membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang. Segala doa ayahanda dan ibunda yang tulus dan

ikhlas , serta motivasi yang selalu diberikan. Saudaraku tercinta Aditya Firmansyah Aminullah beserta keluarga besarku, terimakasih atas segala bantuan, doa dan motivasi baik moril maupun materil selama penulis menjalani pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

Penulis secara pribadi mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H.A. Qadir Gassing,HT.Ms. selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
2. Bapak Dr.dr.Andi Armyan Nurdin, M.Sc selaku PJS.Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh Mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama masa pendidikan.
3. Ibu Firdayanti S.SiT.,M.Kes. selaku ketua prodi kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb
4. Ibu Hj. Sitti Saleha S.SiT.,S.KM.,M.Keb, selaku pembimbing yang dengan ikhlas telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis dari awal hingga akhir dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini.

5. Ibu dr. Darmawansyih S.Ked.,M.Kes, selaku penguji karya tulis ilmiah yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Dr. H. Supardin M.Hi. selaku penguji agama yang telah memberikan masukan dan bimbingan baca Al-Qur'an kepada peneliti.
7. Kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama masa pendidikan.
8. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Wali Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. Kepada kepala puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Sahabat-sahabtku tersayang yang selalu bersedia membantu (Vera,Indri,Hasmiah,Sriwahyuni,Faturrahmi) terimakasih atas segala motivasi, perjuangan kalian serta kebersamaannya selama ini dalam suka maupun duka.
12. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2011 yang sellau bersama baik suka maupun duka selama menjalani pendidikan.
13. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

Peneliti menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun penulisannya. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak kepada penulis. Akhirnya penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin Ya Rabbal Alamin..

Wasslamua'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2014

Penyusun

Ayu Efriyanti Aminullah

Nim : 70400011009



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	vix
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan	8
1. Pengertian Pengetahuan.....	8
2. Tingkat Pengetahuan	9
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Sikap.....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan	15

1. Pengertian Kehamilan	15
2. Pengertian Primigravida.....	15
3. Fisiologi Kehamilan	17
4. Fertilisasi (konsepsi)	18
5. Implantasi.....	19
6. Plasentasi	20
7. Diagnosa Kehamilan	21
8. Perubahan Fisiologi Pada Masa Kehamilan.....	23
9. Klasifikasi Kehamilan.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Jarak Kehamilan	36
1. Pengertian Jarak Kehamilan	36
2. Penentuan Jarak Kehamilan.....	38
3. Risiko Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat	40
4. Upaya Dalam Pengaturan Jarak Kehamilan	43
E. Tinjauan Agama Tentang Jarak Kehamilan.....	49
F. Kerangka Konsep.....	53
1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.....	53
2. Bagan Kerangka Konsep.....	55
G. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	59
D. Pengolahan Data dan Analisa Data.....	60

1. Pengolahan Data.....	60
2. Analisa Data.....	60
E. Penyajian Data	61
F. Etika Penelitian	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Responden	63
B. Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Distribusi frekuensi umur responden Di Puskesmas/RSP VI Kassi Kassi Makassar Tahun 2014	63
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Tahun 2014	64
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi pekerjaan responden Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Tahun 2014	65
Tabel 4.4	Distribusi frekuensi pengetahuan ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar tahun 2014	66
Tabel 4.5	Distribusi frekuensi sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Makassar tahun 2014	66



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	55



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi
- Lampiran II : Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran III : Lembar Kuesioner Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang Dampak Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar Tahun 2014
- Lampiran IV : Surat Pengambilan Data Awal dari Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Moda Daerah Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran VI : Surat Izin Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Walikota Makassar
- Lampiran VII : Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Kota Makassar (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
- Lampiran VIII : Surat Izin Penelitian dari Dinas Kesehatan Kota Makassar kepada Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar
- Lampiran IX : Surat Keterangan Meneliti di Puskesmas Kassi-Kassi dari Kepala Puskesmas Kassi-Kassi Makassar

Lampiran X : Master tabel Penelitian

Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2014

Penulis : Ayu Efriyanti Aminullah
NIM : 70400011009
Pembimbing : Sitti Saleha
Judul : **Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Primigravida Tentang Dampak Jarak Kehamilan Yang Terlalu Dekat Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar Tahun 2014**

Jarak kehamilan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama atau sebelumnya dengan kehamilan berikutnya. Terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan dengan kehamilan berikutnya kurang dari 2 tahun (24 bulan). Jarak kehamilan yang dianjurkan adalah 36 bulan (BKKBN 2007).

Adapun tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi tahun 2014. Sementara itu, tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan dan bagaimana sikap ibu hamil primigravida terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas Kassi-Kassi/RSP VI tahun 2014.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar tahun 2014. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 17 Juni-30 Juli 2014 dan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 35 responden. Data diperoleh melalui kuesioner dan diolah secara manual.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan gambaran pengetahuan ibu didapatkan sebanyak 16 responden (45,7%) yang memiliki pengetahuan dengan kategori baik, dan 19 responden (54,3%) memiliki pengetahuan dengan kategori yang kurang. Sementara itu berdasarkan gambaran sikap ibu didapatkan sebanyak 22 responden (62,9%) yang memiliki sikap positif dan 13 responden (37,1,%) yang memiliki sikap negatif.

Pengetahuan dan sikap ibu terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat masih kurang, sehingganya petugas kesehatan diharapkan meningkatkan sosialisasi agar ibu mengerti dan memahami dampak yang akan ditimbulkan jika jarak kehamilan tidak diatur dengan baik.

Daftar Pustaka : Literatur 42 (2005-2013)

Kata Kunci : Ibu Primigravida, Jarak Kehamilan

ABSTRACT

DEPARTMENT OF MIDWIFERY
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC WRITING, AUGUST 2014

Author : Ayu Efriyanti Aminullah
NIM : 70400011009
Supervisor : Sitti Saleha
Title : Overview of Knowledge and Attitudes Mothers Primigravida About Pregnancy The Impact Distance Too Close At PHC / RSP VI Kassi-Kassi Makassar 2014

Distance pregnancy is a consideration for determining the first or previous pregnancy with subsequent pregnancies. Too close pregnancy spacing is the distance between one pregnancy to the next pregnancy of less than 2 years (24 months). The recommended spacing pregnancies is 36 months (BKKBN, 2007).

The general purpose of this research is to determine the knowledge and attitudes of pregnant women to the effects of distance primigravida pregnancies too close at PHC / RSP VI Kassi-Kassi 2014. Meanwhile, the specific purpose of this study is to determine the extent of knowledge and how primigravida pregnant women attitudes towards the impact of pregnancy spacing is too close in Puskesmas Kassi-Kassi / RSP VI in 2014.

Type of study is a descriptive study in which the study was conducted at PHC / RSP VI Kassi-Kassi 2014 Makassar. This study was conducted on 17 June to 30 July 2014 and the total sampling technique that sampling with a sample size as many as 35 respondents. Data were obtained through questionnaires and processed manually.

The results of the research that has been conducted based on the picture of the mother's knowledge gained as much as 16 respondents (45.7%) who had a good knowledge of the categories, and 19 respondents (54.3%) have less knowledge of the category. Meanwhile, based on the description of the attitude of the mother obtained were 22 respondents (62.9%) who have a positive attitude and 13 respondents (37.1%) who had a negative attitude.

Knowledge and attitudes toward the impact of maternal pregnancy spacing is too close still lacking, so that health workers are expected to increase socialization for mothers to understand and understand the impact that would be incurred if a distance of pregnancy are not well regulated.

Bibliography: Literature 42 (2005-2013)

Keywords: primigravida, Pregnancy Spacing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jarak kehamilan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama atau sebelumnya dengan kehamilan berikutnya. Sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak yang ideal kehamilan sekurang-kurangnya 2 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan dengan kehamilan berikutnya kurang dari 2 tahun (24 bulan). Jarak kehamilan yang dianjurkan adalah 36 bulan (BKKBN, 2007).

WHO (*World Health Organization*) merekomendasikan kepada pasangan suami istri untuk mengatur jarak kehamilan sedikitnya 2-3 tahun antar kehamilan dengan tujuan mengurangi risiko kesehatan maternal yang kurang baik dan kesehatan anak. Studi terbaru yang didukung oleh Agen Amerika Serikat untuk Pengembangan Internasional (USAID) menyatakan bahwa jarak kehamilan dengan interval 3-5 tahun dapat mengurangi risiko yang akan terjadi (WHO,2006).

Komplikasi kehamilan dan persalinan yang menyebabkan kematian antara lain jarak kehamilan terlalu dekat, jumlah kehamilan terlalu banyak, kehamilan pada usia terlalu muda atau juga terlalu tua. Mempunyai anak dengan jarak kehamilan terlalu dekat, bukanlah ide yang positif, sesuai dengan hasil penelitian yang di publikasikan *The British Medical journal*.

Para peneliti mengatakan bahwa wanita dengan interval yang pendek antara 2 kehamilan mempertinggi resiko terjadinya komplikasi seperti kelahiran prematur dan keguguran.

Efek pengaturan jarak kelahiran susah diukur dengan tepat, meskipun bukti yang tersedia di negara berkembang menunjukkan jarak yang pendek/singkat dihubungkan dengan angka kematian bayi yang tinggi. Kesehatan anak juga dipengaruhi dengan pengaturan jarak kehamilan yang pendek/singkat seperti berat badan lahir rendah (BBLR), persalinan prematur, infeksi/peradangan. Selain itu kesehatan ibu juga memburuk jika jarak kehamilan terlalu dekat (Tawfeek, R.S dkk Tikrit Medical Journal, 2011).

Angka kematian ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan kesehatan disuatu negara. Kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin dan nifas masih merupakan masalah di Negara berkembang. Menurut WHO , setiap hari ada 1500 perempuan meninggal dari kehamilan, persalinan atau komplikasi terkait. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, menyebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) untuk 5 tahun sebelum survei 2003-2007 sebesar 228/100.000 kelahiran hidup. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka kematian ibu (AKI) hasil SDKI tahun 2002-2003 yang mencapai 307/100.000 kelahiran hidup (Profil Kesehatan Indonesia tahun 2012).

Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia masih tetap tinggi di kawasan ASEAN walaupun sudah terjadi penurunan dari 307/100.000 kelahiran hidup,

(SDKI 2002-2003) menjadi 263/100.000 kelahiran hidup bila dibandingkan dengan kematian ibu di negara Thailand 129/100.000, Malaysia 39/100.000 dan Singapura 6/100.000. Tingginya angka kematian ibu ini tidak terlepas dari masih tingginya kehamilan yang tidak diinginkan yaitu mencapai 16,8 %. Di sisi lain masih banyak ditemukan kehamilan yang tidak ideal (terlalu banyak anak, terlalu muda, terlalu tua dan terlalu dekat jarak kehamilan), yang sangat membahayakan bagi kesehatan ibu atau lebih dikenal dengan 4T ada sebesar 22.4% dengan rincian hamil terlalu muda (< 18 tahun), sebesar 4,1%, hamil terlalu tua (>34 tahun) sebesar 3,8%, jarak terlalu dekat (<2 tahun) sebesar 5,2%, dan jumlah anak terlalu banyak (>3 orang) sebesar 9,4% (BKKBN 2007).

Sementara itu, di kota Makassar Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2012 menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,32 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini didapatkan dari hasil formulasi data yang dilaporkan serta hasil pencatatan unit-unit pelayanan kesehatan yang direkap dan dilaporkan oleh Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kota Makassar dimana tercatat 2 kasus kematian ibu maternal dari 24.034 kelahiran hidup yang disebabkan perdarahan yaitu perdarahan karena placenta previa (placenta tertanam pada segmen bawah rahim) dan perdarahan karena atonia uteri. Jumlah kematian ibu melahirkan sepanjang tahun 2011 sebanyak 3 kasus kematian ibu dari 26.129 jumlah kelahiran hidup sehingga didapatkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 11,6 per 100.000 kelahiran hidup, sama dengan tahun 2010 dimana tercatat 3 kasus

kematian ibu dari 25.830 kelahiran hidup dengan Angka Kematian ibu (AKI) sebesar 11,6 per 100.000 kelahiran hidup (Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar 2012).

Ibu hamil yang mengalami salah satu atau lebih dari kriteria 4T mencapai sekitar 65%. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya komplikasi pada bayi dan ibu pada saat hamil dan melahirkan. Kondisi yang sebetulnya bisa dicegah tapi sampai saat ini masih banyak kita temukan di masyarakat. Menurut Depkes RI (2007), jarak kehamilan yang aman ialah antara 2-4 tahun. Jarak antara dua kehamilan yang < 2 tahun berarti tubuh ibu belum kembali pada keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban yang lebih berat, sehingga kehamilan dalam keadaan ini perlu di waspadai karena adanya kemungkinan pertumbuhan janin yang kurang baik, mengalami persalinan yang lama atau perdarahan (Nurjannah & septiani, Jurnal keperawatan anak, 2013).

Pengaturan jarak kehamilan yang direalisasikan melalui program Keluarga Berencana ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena pada kenyataannya masih banyak ibu-ibu muda memiliki jarak kehamilan terlalu dekat. Data di Indonesia menunjukkan 36% kelahiran memiliki jarak kelahiran kurang dari 2 tahun (Dian 2008, dalam jurnal Stikes Respati Yogyakarta).

Kurangnya informasi dan minimnya jangkauan pelayanan kesehatan terutama untuk ibu dan ketidak pedulian suami akan kesehatan istrinya menempatkan banyak kejadian kehamilan yang menjadi kehamilan tidak ideal . kehamilan yang berisiko tinggi mengundang masalah sampai kepada

ancaman jiwa saat melahirkan. Untuk mencegah munculnya kasus-kasus baru ibu hamil resiko tinggi yang baru adalah dengan mensosialisasikan 4T kepada masyarakat, mendukung penggunaan kontrasepsi baik untuk laki-laki maupun perempuan, mendorong agar tiap persalinan dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan dan mensosialisasikan pentingnya hidup sehat terutama untuk ibu hamil (Sudarianto, <http://datinkessusel.wordpress.com>, diakses tanggal 15 desember 2013).

Berdasarkan data awal yang didapatkan di Puskesmas Kassi-Kassi, jumlah kunjungan ibu hamil pada satu tahun terakhir mulai dari Januari-Desember 2013 yaitu K1 berjumlah 2273 ibu hamil dan K4 berjumlah 2166 ibu hamil. Sedangkan jumlah kunjungan ibu primigravida dari januari-desember 2013 berjumlah 365 orang, dengan rata-rata jumlah kunjungan ibu hamil primigravida setiap bulan yaitu 30 orang.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang menyangkut salah satu komponen dari 4T yaitu berjudul “ Gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas Kassi-kassi/RSP VI tahun 2014”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-kassi tahun 2014.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi tahun 2014.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas Kassi-Kassi/RSP VI tahun 2014.
2. Untuk mengetahui sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pelayanan Kesehatan


Sebagai informasi atau masukan dalam meningkatkan pelayanan khususnya tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat.

2. Bagi ibu hamil

Diharapkan ibu primigravida lebih mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang dampak yang ditimbulkan jika jarak kehamilan tidak diatur dan terlalu dekat.

3. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang penelitian dan untuk memenuhi tugas akhir di Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar program studi DIII Kebidanan penulisan Karya Tulis Ilmiah tentang “ gambaran pengetahuan ibu primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi tahun 2014 “.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda(Notoadmodjo, 2005 hal.139).

Manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal. Kemudian dari akal tersebut Allah memerintahkan kita untuk menimba ilmu pengetahuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Mujadillah/ 56 : 11

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ آذِنُوا فَآذِنُوا يُرَفِّعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis-majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan melapangkan buat kamu, dan apabila dikatakan “ Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Maha Mengetahui (Shihab, 2009).

Ayat diatas merupakan tuntutan ahlak. Kalau ayat yang lalu membicarakan tentang rahasia, kini menyangkut perbuatan dalam satu majelis . Ayat diatas memberi tuntutan bagaimana menjalin hubungan harmonis dalam suatu majelis (Shihab, 2009).

2. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoadmodjo (2007), pengetahuan dibagi menjadi 6 tingkatan pengetahuan, yaitu :

a. Tahu (*knowledge*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya

b. Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Menerapkan (*Application*)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk

keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang tersebut menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang lain maupun dari media masa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banya pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan

pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya (Budiman dan Riyanto,2013).

b. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya semakin cocok jenis pekerjaan yang diemban, makin tinggi pula tingkat kepuasan yang diperoleh.

c. Pengalaman

Sesuatu yang pernah dialami seseorang akan merubah pengetahuan dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bersifat informal.

d. Informasi/ Media Masa

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek sehingga memberikan pengaruh perubahan atau peningkatan pengetahuan.

Berkembangnya teknologi akan menyediakan bermacam-macam media masa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media masa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang (Budiman dan Riyanto,2013).

e. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh

terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut (Budiman dan Riyanto, 2013).

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin bertambah pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik (Budiman dan Riyanto, 2013).

g. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial seseorang akan mempengaruhi pengetahuan seseorang (Budiman dan Riyanto, 2013).

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap

1. Pengertian

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Campbell (1950) mendefinisikan sangat sederhana, yakni : “ *An individual's attitude is syndrome of response consistency*

with regard to object. “ jadi jelas, disini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain (Notoadmodjo,2010 hal.141).

Menurut Notoadmdjo (2010), sikap mempunyai tingkatan berdasarkan intensitasnya yaitu :

a. Menerima (*Receiving*)

Menerima diartikan bahwa seseorang atau subjek mau menerima stimulus yang diberikan (objek).

b. Menanggapi (*Responding*)

Menanggapi disini diartikan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau objek yang dihadapi.

c. Menghargai (*valving*)

Menghargai diartikan subjek, atau seseorang memberikan nilai yang positif terhadap objek atau stimulus, dalam arti membahasnya dengan orang lain dan bahkan mengajak atau mempengaruhi atau menganjurkan orang lain merespons.

d. Bertanggung jawab (*Responding*)

Sikap yang paling tinggi adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah diyakininya. Seseorang yang telah mengambil sikap tertentu berdasarkan keyakinannya, dia harus berani mengambil risiko lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah dan fisiologis. Setiap wanita yang memiliki organ reproduksi sehat, yang telah mengalami menstruasi, dan melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang organ reproduksinya sehat, sangat besar kemungkinannya akan mengalami kehamilan. Apabila kehamilan ini direncanakan, akan memberi rasa kebahagiaan dan penuh harapan (Mandriwati, 2011 hal.3).

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender Internasional. Kehamilan terbagi dalam 3 trimester, dimana trimester kesatu berlangsung dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke 13- minggu ke 27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke 28 – minggu ke 40) (Prawirohardjo, 2010).

2. Pengertian Primigravida

Primigravida didefinisikan sebagai seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya atau belum pernah hamil sebelumnya. Primigravida merupakan kelompok yang berisiko tinggi. Karena ini adalah awal dari sebuah kehidupan baru bagi seorang wanita, maka

dianggap sebagai kelompok penting yang membutuhkan bantuan dalam hal antenatal dan postnatal, hal ini juga akan membantu wanita primigravida selama kehamilan, persalinan dan nifas (Ayub Med Coll Abbotabad,2010).

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Sedangkan asal mula kejadian manusia dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'minun /25: 12-14

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani itu kami jadikan gumpalan darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk hidup yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik” (Shihab, 2009).

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang proses kejadian dan perkembangan manusia, sesungguhnya manusia diciptakan dari satu sumber yaitu tanah, lalu berkembang sampai terbentuk menjadi manusia kemudian ditiupkan roh. Maha suci Allah dengan segala ciptaan-Nya.

3. Fisiologi Kehamilan

Setiap bulan wanita akan melepaskan satu atau dua telur dari indung telurnya. Setelah itu, sel telur akan ditangkap oleh umbai-umbai pada saluran telur. Pada saat bersetubuh cairan semen akan tumpah ke vagina. Berjuta-juta sperma akan bergerak ke rongga rahim lalu masuk kedalam sel telur. Disekitar sel telur banyak terkumpul sperma yang mengeluarkan ragi untuk mencairkan zat yang ada di dalam ovum (Windadari, 2009).

Kemudian satu persatu sperma masuk kedalam ovum. Biasanya hanya satu sel sperma yang bisa membuahi sel telur. Sperma yang lain akan meninggal. Maka terjadilah pembuahan. Pembuahan ini terjadi di tuba fallopi. Pada proses pembuahan, hanya bagian kepala sperma yang menembus sel telur dan bersatu dengan inti sel telur. Bagian ekor yang merupakan alat gerak sperma akan melepaskan diri. Sel telur yang telah dibuahi akan mengalami pengerasan bagian luarnya. Ini memungkinkan sel telur hanya dapat dibuahi oleh satu sperma.

Inti sel telur yang telah dibuahi akan mengalami pembelahan menjadi dua bagian setelah 30 jam. Kemudian 20 jam inti sel telur ini akan kembali membelah menjadi empat bagian. Tiga sampai empat hari setelah pembuahan, sel akan sampai dibagian rahim. Dalam jangka waktu satu minggu setelah pembuahan, akan dihasilkan suatu massa sel yang berbentuk bola sebesar pentol jarum, yang disebut *blastula*.

Dalam proses selanjutnya, yaitu sekitar 5 hari berikutnya, blastula akan menempel dan terimplantasi kedalam *endometrium*. Masuknya atau tertanamnya hasil pembuahan ke dalam endometrium disebut dengan *nidasi* atau *implantasi*. Selama dua sampai empat minggu pertama perkembangan, blastula mendapatkan nutrisi dari endometrium. Pada masa perkembangan ini, akan terbentuk plasenta. Plasenta merupakan organ berbentuk cakram yang mengandung pembuluh darah ibu dan embrio. Melewati plasenta inilah, embrio akan mendapatkan nutrisi dari maternal. Dengan begitu, maka janin akan dapat berkembang dan tumbuh (Windadari, 2009).

4. Fertilisasi (Konsepsi)

Fertilisasi adalah penyatuan sperma dari laki-laki dengan ovum dari perempuan. Spermatozoa merupakan sel yang sangat kecil dengan ekor yang panjang sehingga memungkinkannya untuk bergerak dalam media cair. Sel-sel benih ini diyakini dapat mempertahankan kemampuan fertilisasinya selama 2-4 hari (Wahdaniah, 2011 hal.25).

Sel telur (ovum) akan hidup selama maksimal 48 jam setelah ovulasi sehingga agar fertilisasi berhasil, senggama harus dilakukan dalam waktu 5 hari disekitar ovulasi. Selama senggama akan terdapat sebanyak 300 juta spermatozoa didalam 3 ml cairan seminalis (air mani). Sejumlah besar sperma akan hancur akibat keasaman vagina, dan beberapa diantaranya mati dalam perjalanan menuju tuba falopii. Sel-sel benih ini berjalan dengan menggerakkan ekornya memakai

energinya sendiri, dan pada saat ovulasi gerakannya dibantu oleh mucus serviks yang mudah ditembus. Perjalanan sperma lewat serviks serta korpus uteri dan kedalam tuba falopii diperkirakan berlangsung selama sekitar 20 menit (Wahdaniah, 2011 hal.26).

Pada saat ovulasi, ovum akan didorong keluar dari *folikel de Graaf* dan kemudian ditangkap oleh fimbriae yang memeluk tuba falopii pada sisi tersebut. Spermatozoa bertemu dengan ovum didekat ujung tuba yang memiliki fimbria. Hanya satu sperma yang akan membuahi ovum, namun beberapa juta sperma lainnya diperlukan untuk memasok enzim hialuronidase yang akan melunakkan korona radiata (sel-sel yang mengelilingi ovum).

Spermatozoa menembus ovum dengan membenamkan kepalanya lewat dinding ovum tersebut yang dengan segera menjadi tidak permeable lagi bagi semua sperma lainnya. Kedua sel benih itu menyatu dan membentuk satu sel tunggal. Sel tunggal ini merupakan individu yang baru dan unik karena mampu berkembang menjadi bayi dengan jenis kelamin serta karakteristik yang sudah ditentukan selain membentuk placenta serta selaput ketuban (Wahdaniah, 2011 hal.27).

5. Implantasi

Zona pelusida berdegenerasi dan trofoblas melekatkan dirinya pada endometrium rahim, biasanya pada daerah fundus anterior atau posterior. Antara tujuh sampai sepuluh hari setelah konsepsi, trofoblas mensekresi enzim yang membantunya membenamkan diri kedalam

endometrium sampai seluruh bagian blastosis terbenam. Proses ini dikenal dengan implantasi. Pembuluh darah endometrium pecah dan sebagian wanita akan mengalami perdarahan ringan akibat implantasi. (bercak darah atau perdarahan ringan pada saat seharusnya terjadi menstruasi berikutnya). Vili korion, yang berbentuk seperti jari, terbentuk di luar trofoblas dan menyusup masuk ke dalam daerah yang mengandung darah pada endometrium. Vili ini adalah tonjolan yang mengandung banyak pembuluh darah dan mendapat oksigen dan gizi dari aliran darah ibu serta membuang karbondioksida dan produk sisa ke dalam darah ibu. Setelah implantasi, endometrium disebut desidua, bagian yang langsung berada di bawah blastosis, tempat vili korion mengetuk darah, disebut desidua basalis. Bagian yang menutup blastosis ialah desidua kapsularis dan bagian yang melapisi sisa uterus ialah desidua vera (Fauziah & Sutejo, 2012).

6. Plasentasi

Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta. Setelah nidasi embrio ke dalam endometrium, plasentasi dimulai. Pada manusia plasenta berlangsung sampai 12-18 minggu setelah fertilisasi (Prawirohardjo, 2010).

Dalam 2 minggu pertama perkembangan hasil konsepsi, trofoblas invasif telah melakukan penetrasi ke pembuluh darah endometrium. Terbentuklah sinus intertrofoblastik yaitu ruangan-ruangan yang berisi darah maternal dari pembuluh-pembuluh darah

yang dihancurkan. Pertumbuhan ini berjalan terus, sehingga timbul ruangan-ruangan interviler dimana vili korialis seolah-olah terapung-apung diantara ruangan-ruangan tersebut sampai terbentuknya plasenta (Prawirohardjo,2010).

7. Diagnosa Kehamilan

Kehamilan berlangsung dalam waktu 280 hari (40 minggu). Kehamilan wanita dibagi menjadi tiga triwulan , triwulan pertama: 0-12 minggu, triwulan kedua : 13-28 minggu, triwulan ketiga : 20-40 minggu (Bandiyah,2009 hal.10).

Pada masa rantai konsepsi (fertilisasi), implantasi (nidasi) terjadi perubahan rohani dan jasmani, karena terdapat pengeluaran hormon spesifik dan menimbulkan gejala dan tanda hamil sebagai tanda dugaan hamil, tanda kemungkinan hamil, dan tanda pasti kehamilan (Bandiyah, 2009 hal.10).

a) Tanda dugaan hamil

Tanda ini meliputi tidak datang bulan (amenorea)dengan konsepsi dan nidasi mulai mengeluarkan hormon, maka pertumbuhan dan perkembangan folikel tidak terjadi, sehingga terdapat keadaan “ tidak datang bulan “. Buah dada sakit, buah dada dipersipkan sejak semula, dengan terjadi perubahan peredaran darah, menahan air dan garam, sehingga ujung saraf tertekan yang menimbulkan rasa penuh dan sakit, terutama kehamilan pertama. Perasaan mengidam (ingin makanan khusus) yang dapat berupa mual muntah terutama

pagi hari (*morning sickness*), kurang suka makanan, tidak tahan bau-bauan, terdapat pengeluaran air liur berlebihan (hipersalivasi), kepala sakit dan pusing, ingin makanan tertent. Gangguan pencernaan dan perkemihan sering sulit buang air besar karena kurang makan serat dan pengaruh hormonal, sering kencing berlebihan karena kandung kemih tertekan rahim. Pigmentasi kulit, karena pengaruh hormon tertentu terdapat pigmentasi kulit wajah, sekitar buah dada, dan dinding perut.

b) Tanda Kemungkinan Hamil

Pada pemeriksaan kehamilan dapat diduga hamil bila dijumpai pembesaran rahim dan perut, pemeriksaan memberi petunjuk adanya kehamilan (terdapat kontraksi rahim saat diraba, ada tanda hegar, *Chadwick*, *piscaseck*, ballotement, dan reaksi pemeriksaan kehamilan positif).

c) Tanda Pasti Kehamilan

Dengan menggunakan alat Ultrasonografi (*USG* , kehamilan pasti sudah dapat ditetapkan pada umur yang relatif muda. Oleh karena itu kehamilan pasti dapat ditegakkan melalui pemeriksaan *USG* dapat diketahui "*fetal plate*" , kantung gestasi rahim membesar. Dengan metode konvensional kepastian hamil bila teraba bagian janin, terdengar detik jantung janin, teraba gerakan janin.

8. Perubahan Fisiologi Pada Masa Kehamilan

a. Sistem Reproduksi

1) Uterus

Selama kehamilan uterus akan beradaptasi untuk menerima dan melindungi hasil konsepsi (janin, plasenta, amnion) sampai persalinan. Uterus mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk bertambah besar dengan cepat selama kehamilan dan pulih kembali seperti keadaan semula dalam beberapa minggu setelah persalinan. Pada perempuan tidak hamil uterus mempunyai berat 70 gram dan kapasitas 10 ml atau kurang. Selama kehamilan, uterus akan berubah menjadi suatu organ yang mampu menampung janin, plasenta dan cairan amnion rata-rata pada akhir kehamilan volume totalnya mencapai 5 L bahkan dapat mencapai 20 L atau lebih dengan berat rata-rata 1100 g (Prawirohardjo, 2010 hal. 174).

Pembesaran uterus meliputi peregangan dan penebalan sel-sel otot, sementara produksi miosit yang baru sangat terbatas. Bersamaan dengan hal itu terjadi akumulasi jaringan ikat dan elastik, terutama pada lapisan otot luar. Kerja sama tersebut akan meningkatkan kekuatan dinding uterus. Daerah korpus pada bulan-bulan pertama akan menebal, tetapi seiring dengan bertambahnya usia kehamilan akan menipis. Pada

akhir kehamilan ketebalannya hanya berkisar 1,5 cm bahkan kurang.

Sejak trimester pertama kehamilan, uterus akan mengalami kontraksi yang tidak teratur dan umumnya tidak disertai dengan nyeri. Pada trimester kedua kontraksi ini dapat dideteksi dengan pemeriksaan bimanual. Fenomena ini pertama kali diperkenalkan oleh *Braxton Hicks* pada tahun 1872 sehingga disebut dengan kontraksi *Braxton Hicks*. Kontraksi ini muncul tiba-tiba dan sporadik, intensitasnya bervariasi antara 5-25 mmHg. Sampai bulan terakhir kehamilan biasanya kontraksi ini sangat jarang dan meningkat pada satu atau dua minggu sebelum persalinan. Hal ini erat kaitannya dengan meningkatnya jumlah reseptor oksitosin dan *gap junction* diantara sel-sel miometrium. Pada saat ini kontraksi akan terjadi setiap 10-20 menit, dan pada akhir kehamilan kontraksi ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan dianggap sebagai persalinan palsu (Prawirohardjo,2010).

2) Serviks

Satu bulan setelah konsepsi, serviks akan menjadi lebih lunak dan kebiruan. Perubahan ini terjadi akibat penambahan vaskularisasi dan terjadinya edema pada seluruh serviks, bersamaan dengan terjadinya hipertrofi dan hiperplasia pada kelenjar-kelenjar serviks. Berbeda kontras dengan korpus,

serviks hanya memiliki 10-15% otot polos. Jaringan ikat ekstraseluler serviks terutama kolagen tipe 1 dan 3 dan sedikit tipe 4 pada membran basal. Diantara molekul-molekul kolagen itu, berkatalasi glikosaminoglikan dan proteoglikan, terutama dermatan sulfat, asam hialuronat, dan heparin sulfat. Juga ditemukan fibronektin dan elastin diantara serabut kolagen. Rasio tertinggi elastin terhadap kolagen terdapat diostium interna. Baik elastin maupun otot polos semakin menurun jumlahnya mulai dari ostium interna ke ostium eksterna (Prawirohardjo, 2010 hal.178).

Pada perempuan yang tidak hamil berkas kolagen pada serviks terbungkus rapat dan tidak beraturan. Selama kehamilan, kolagen secara aktif disintesis dan secara terus menerus diremodel oleh kolagenase, yang disekresi oleh sel-sel serviks dan neutrofil. Kolagen didegradasi oleh kolagen intraseluler yang menyingkirkan struktur prokolagen yang tidak sempurna untuk mencegah pembentukan kolagen yang lemah, dan kolagenase ekstraseluler yang secara lambat akan melemahkan matriks koagen agar perslinan dapat berlangsung. Pada akhir trimester pertama kehamilan, berkas kolagen menjadi kurang kuat terbungkus. Hal ini terjadi akibat penurunan konsentrasi kolagen secara keseluruhan. dengan sel-sel otot polos dan jaringan elastis, serabut kolagen bersatu

dengan arah paralel terhadap sesamanya sehingga serviks menjadi lunak dibanding kondisi tidak hamil, tetapi tetap mampu mempertahankan kehamilan.

Pada saat kehamilan mendekati aterm, terjadi penurunan lebih lanjut dari konsentrasi kolagen. Konsentrasinya menurun secara nyata dari keadaan yang relatif dilusi dalam keadaan yang menyebar (dispersi) dan ter-remodel menjadi serat. Dispersi meningkat oleh peningkatan rasio dekorin terhadap kolagen (Prawirohardjo, 2010).

3) Ovarium

Proses ovulasi selama kehamilan akan terhenti dan pematangan folikel baru juga ditunda. Hanya satu korpus luteum yang dapat ditemukan di ovarium. Folikel ini akan berfungsi maksimal selama 6-7 minggu awal kehamilan dan setelah itu akan berperan sebagai penghasil progesteron dalam jumlah yang relatif minimal (Prawirohardjo, 2010).

Relaksin, suatu hormon protein yang mempunyai struktur mirip dengan insulin dan *insulin like growth factor* I dan II, disekresikan oleh korpus luteum, desidua, placenta dan hati. Aksi biologi utamanya adalah dalam proses remodelling jaringan ikat pada saluran reproduksi, yang kemudian akan mengakomodasi kehamilan dan keberhasilan proses persalinan. Perannya belum diketahui secara menyeluruh,

tetapi diketahui mempunyai efek pada perubahan struktur biokimia serviks dan kontraksi miometrium yang akan berimplikasi pada kehamilan preterm (Prawirohardjo,2010).

4) **Vagina dan Perineum**

Selama kehamilan peningkatan vaskularisasi dan hiperemia terlihat jelas pada kulit dan otot-otot di perineum dan vulva. Sehingga pada vagina akan terlihat berwarna keungu-unguan yang dikenal dengan tanda *Chadwick*. Perubahan ini meliputi penipisan mukosa dan hilangnya sejumlah jaringan ikat dan hipertrofi dari sel-sel otot polos.

Dinding vagina mengalami banyak perubahan yang merupakan persiapan untuk mengalami peregangan pada saat persalinan dengan meningkatnya ketebalan mukosa, mengendornya jaringan ikat, dan hipertrofi sel otot polos. Perubahan ini mengakibatkan bertambah panjangnya dinding vagina. Papilla mukosa juga mengalami hipertrofi dengan gambaran seperti paku sepatu (Prawirohardjo,2010).

5) **Kulit**

Pada kulit dinding perut akan terjadi perubahan warna menjadi kemerahan, kusam dan kadang-kadang juga akan mengenai daerah payudara dan paha. Perubahan ini dikenal dengan nama *striae gravidarum*. Pada multipara selain *striae*

kemerahan itu seringkali ditemukan garis berwarna perak berkilau yang merupakan sikatrik dari striae sebelumnya.

Pada banyak perempuan, kulit digaris pertengahan perutnya (linea alba) akan berubah menjadi kecoklatan yang disebut dengan linea nigra. Kadang-kadang akan muncul dalam ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher yang disebut dengan chloasma atau melasma gravidarum. Selain itu, pada areola dan daerah genital juga akan terlihat pigmentasi yang berlebihan. Pigmentasi yang berlebihan itu biasanya akan hilang atau sangat jauh berkurang setelah persalinan (Prawirohardjo,2010).

6) Payudara

Pada awal kehamilan perempuan akan merasakan payudaranya menjadi lebih lunak. Setelah bulan kedua payudara akan bertambah ukurannya dan vena-vena di bawah kulit akan terlihat. Puting payudara akan lebih besar, kehitaman dan tegak. Setelah bulan pertama suatu cairan berwarna kekuningan yang disebut kolostrum dapat keluar. Kolostrum ini berasal dari kelenjar-kelenjar asinus yang mulai beraksi. Meskipun dapat dikeluarkan, air susu belum dapat diproduksi karena hormon prolaktin ditekan oleh *prolactin inhibiting hormone*. Setelah persalinan kadar progesteron dan estrogen akan menurun sehingga pengaruh inhibisi progesteron

terhadap α -laktalbumin akan hilang. Peningkatan prolaktin akan merangsang sintesis laktose dan pada akhirnya akan meningkatkan produksi air susu. Pada bulan yang sama areola akan lebih besar dan kehitaman. Kelenjar *Montgomery*, yaitu kelenjar sebacea dari areola, akan membesar dan cenderung untuk menonjol keluar. Jika payudara makin membesar, striae seperti yang terlihat pada perut akan muncul. Ukuran payudara sebelum kehamilan tidak mempunyai hubungan dengan banyaknya air susu yang akan dihasilkan (Prawirohardjo, 2010 hal. 179).

b. Perubahan Metabolisme

Guna mengantisipasi peningkatan laju metabolik dan konsumsi oksigen, juga kebutuhan uterus, janin, dan placenta yang tumbuh dengan cepat, ibu hamil mengalami banyak perubahan metabolisme (Fraser & Cooper, 2011 hal.75).

- 1) Metabolisme protein meningkat untuk menyuplai substrat bagi pertumbuhan ibu dan janin.
- 2) Metabolisme lemak meningkat, yang dibuktikan oleh peningkatan semua fraksi lipid dalam darah.

Suplai glukosa kontinu yang diperlukan bagi pertumbuhan janin dipenuhi dengan :

- 1) Asupan glukosa ketika ibu makan
- 2) Peningkatan sekresi insulin dalam merespons glukosa

Kadar glukosa darah yang optimal pada ibu hamil berkisar 4,4 dan 5,5 mmol/L. Pada ibu hamil, hipoglikemi didefinisikan sebagai konsentrasi glukosa di bawah 3,3 mmol/L.

Kadar glukosa darah ibu sangat penting bagi kesejahteraan janin dan berpuasa dalam waktu lama selama kehamilan akan menimbulkan ketonemia berat yang berbahaya bagi kesehatan janin (Fraser & Cooper, 2011 hal.76).

c. Sistem Respirasi

Kehamilan sangat sedikit mempengaruhi sistem respirasi dibandingkan dengan sistem kardiovaskuler. Tetapi perubahan yang terjadi menyebabkan ketidaknyamanan dan keadaan yang tidak menyenangkan pada kehamilan dan penyakit sistem respirasi bisa menjadi lebih parah karena kehamilan. Mukosa sistem respirasi menjadi hiperemik dan edema dengan mukus yang hipersekresi mengarah pada sesak dan epistaksis. Hasilnya banyak wanita hamil yang mengeluh pilek kronis. Napas yang berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dispnea dan pusing. Ketika kebutuhan untuk bernapas menjadi lebih, ibu hamil mengeluh “napas pendek” (Jannah, 2012 hal.97).

d. Sistem Kardiovaskuler

Peningkatan denyut nadi pada masa kehamilan meningkat sekitar 10-15 denyut permenit pada kehamilan. Karena diafragma semakin naik terus selama kehamilan, jantung digeser ke kiri dan

ke atas. Sementara pada waktu yang sama, organ ini agak berputar pada sumbu panjangnya. Akibatnya apeks jantung digerakkan agak ke lateral dari posisinya pada keadaan tidak hamil normal. dan membesarnya ukuran bayangan jantung ditemukan pada radiogra. Luasnya perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh ukuran dan posisi uterus, kekuatan otot-otot abdomen dan konfigurasi abdomen dan thorak. Besar dari jantung bertambah sekitar 12 % dan meningkatkan kapasitas jantung sebesar 70-80 ml (Jannah, 2012 hal. 97).

1. Trimester I

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta. Uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula, mammae dan alat-alat lain yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Suplai darah kedalam rahim harus meningkat seiring dengan perkembangan rahim dan memenuhi kebutuhan plasenta yang mulai berfungsi. Hormon estrogen menyebabkan perkembangan pembuluh-pembuluh darah baru. Pada awalnya pembuluh-pembuluh darah baru ini membentuk jaringan berliku-liku melalui dinding rahim.

2. Trimester II

Ukuran jantung membesar karena ada peningkatan beban kerja yang disebabkan oleh meningkatnya cardiac output. Jantung

juga dapat bergeser ke kanan dan ke kiri serta berputar dimuka karena tekanan uterus meningkat yang disebabkan oleh perkembangan uterus. Cardiac output jantung yang meningkat mengakibatkan menurunnya sedikit daya tahan tubuh. Dinding-dinding pembuluh darah mengalami relaksasi dan membesar akibat pengaruh hormon progesteron. Kapasitas pembuluh darah dan kapiler juga bertambah, curah jantung akan bertambah sekitar 30 %. Bertambahnya hemodilusi darah mulai tampak sekitar umur kehamilan 16 minggu. Volume darah meningkat tetapi tekanan darah cenderung akan menurun.

3. Trimester III

Volume darah semakin meningkat dimana jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhan sel darah sehingga terjadi semacam pengenceran darah. Hemodilusi mencapai puncaknya pada umur kehamilan 32 minggu, serum darah volume darah bertambah sebesar 25 sampai 30 %. Selama kehamilan, dengan adanya peningkatan volume darah pada hampir semua organ dalam tubuh, terlihat adanya perubahan yang signifikan pada sistem kardiovaskuler.

e. Sistem Digestivus

Awal trimester kehamilan terjadi perubahan rasa tidak enak di ulu hati disebabkan karena posisi lambung dan aliran balik asam

lambung ke esophagus bagian bawah. Produksi asam lambung menurun. Sering terjadi *nause* dan muntah karena pengaruh HCG, tonus otot-otot traktus digestivus menurun sehingga motilitas seluruh seluruh traktus digestivus juga berkurang. Makanan lebih lama dilambung dan apa yang dicernakan lebih lama berada dalam usus-usus. Saliva atau pengeluaran air liur berlebihan daripada biasanya. Rasa mual baik yang sedang maupun berat dengan atau tanpa terjadinya muntah setiap saat siang atau malam.

Sistem digestivus pada trimester lanjut juga mengalami perubahan yaitu terjadi konstipasi karena pengaruh hormon progesteron yang meningkat. Selain itu perut kembung juga terjadi karena adanya tekanan uterus yang membesar dalam rongga perut mendesak organ-organ dalam perut khususnya saluran pencernaan, usus besar, kearah atas dan lateral. Wasir (*hemorrhoid*) cukup sering pada kehamilan sebagian besar akibat konstipasi dan naiknya tekanan vena-vena dibawah uterus termasuk vena *hemorrhoid*. Panas perut (*heart burn*) terjadi karena terjadinya aliran balik asam gastric kedalam esofagus bagian bawah (Pantiawati & Saryono, 2010 hal. 59).

f. Sistem Urinarius

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kemih akan tertekan oleh uterus yang mulai membesar sehingga menimbulkan sering berkemih. Keadaan ini akan hilang dengan makin tuanya

kehamilan bila uterus keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, jika kepala janin sudah mulai turun ke pintu atas panggul keluhan itu akan timbul kembali (Prawirohardjo, 2010).

Ginjal akan membesar, *glomerular filtration rate*, dan *renal plasma flow* juga akan meningkat. Pada ekskresi juga akan dijumpai kadar asam amino dan vitamin yang larut air dalam jumlah yang banyak. Glukosuria juga merupakan suatu hal yang umum, tetapi kemungkinan adanya diabetes mellitus juga harus tetap diperhitungkan. Sementara itu, proteinuria dan hematuria merupakan suatu hal yang abnormal. Pada fungsi renal akan dijumpai peningkatan *creatinine clearance* lebih tinggi 30 % (Prawirohardjo, 2010).

g. Sistem Endokrin

Selama kehamilan normal kelenjar hipofisis akan membesar ± 135 %. Akan tetapi, kelenjar ini tidak begitu mempunyai arti penting dalam kehamilan. Pada perempuan yang mengalami hipofisektomi persalinan dapat berjalan dengan lancar. Hormon prolaktin akan meningkat 10 x lipat pada saat kehamilan aterm. Sebaliknya, setelah persalinan konsentrasinya pada plasma akan menurun. Hal ini juga ditemukan pada ibu-ibu yang menyusui.

Kelenjar tiroid akan mengalami pembesaran hingga 15,0 % ml pada saat persalinan akibat dari hiperplasia kelenjar dan peningkatan vaskularisasi.

Kelenjar adrenal pada kehamilan normal akan mengecil, sedangkan hormon androstenedion, testosteron, dioksikortikosteron, aldosteron, dan kortisol akan meningkat. Sementara itu, dehidroepiandrosteron sulfat akan menurun (Prawirohardjo, 2010).

h. Sistem Muskuloskeletal

Lordosis yang progresif akan menjadi bentuk yang umum pada kehamilan. Akibat kompensasi dari pembesaran uterus ke posisi anterior, lordosis menggeser pusat daya berat ke belakang ke arah dua tungkai. Sendi sakroiliaka, sakrokoksigis, dan pubis akan meningkat mobilitasnya, yang diperkirakan karena pengaruh hormonal. Mobilitas tersebut dapat mengakibatkan perubahan sikap ibu dan pada akhirnya menyebabkan perasaan tidak enak pada bagian bawah punggung terutama pada akhir kehamilan (Prawirohardjo, 2010).

9. Klasifikasi kehamilan

Menurut Wiknjosastro (2007), ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

a) Kehamilan triwulan I (0-12 minggu)

Awal kehamilan atau trimester pertama merupakan saat yang rawan bagi perkembangan janin, karena biasanya banyak wanita yang tidak menduga bahwa dirinya sedang hamil. Pada saat masa subur, jika sel telur dbuahi maka akan terjadi penempelan sel telur yang

berbentuk semacam bola pada dinding rahim calon ibu. Masa ini adalah masa rawan, karena janin masih berupa cikal bakal.

b) Kehamilan triwulan II (12 – 28 minggu)

Memasuki bulan keempat, perkembangan janin akan memasuki trimester kedua. Janin akan mulai bergerak yaitu pada bulan keempat, tepatnya sekitar minggu ketiga belas. Hal ini terjadi karena hormon pada bayi mulai aktif sehingga mereka mulai bisa bereaksi dengan situasi dalam kandungan.

c) Kehamilan triwulan ke III (28 – 40 minggu)

Setelah usia janin memasuki trimester pertama dan kedua, sisanya adalah menunggu kelahiran yang biasanya terjadi pada trimester ketiga. Pada trimester akhir ini, bayi sudah benar-benar berkembang, baik dalam kelengkapan serta fungsi organ-organ tubuh ataupun penambahan berat badannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Jarak Kehamilan

1. Pengertian Jarak Kehamilan

Jarak kehamilan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama atau sebelumnya dengan kehamilan berikutnya. Sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak yang ideal kehamilan sekurang-kurangnya 2 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan dengan kehamilan berikutnya kurang dari 2

tahun (24 bulan). Jarak kehamilan yang dianjurkan adalah 36 bulan (BKKBN, 2007).

Penghitungan jarak kehamilan dilakukan pada pasien multiparitas. Berdasarkan laporan WHO pada tahun 2006 tentang teknik konsultasi terhadap jarak kehamilan, jarak kehamilan yang baik adalah antara 2-5 tahun. Jarak kehamilan kurang dari dua tahun atau lebih dari lima tahun akan meningkatkan risiko kelainan luaran maternal dan perinatal. Sebagian besar pasien mengalami abortus pada jarak kehamilan kurang dari 2 tahun. Hal ini sesuai dengan kriteria jarak kehamilan yang disarankan WHO bahwa jarak kehamilan sebaiknya antara 2-5 tahun untuk mencegah luaran maternal dan perinatal yang kurang baik (WHO,2006).

Kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga ini biasanya dikaitkan dengan konsep perencanaan keluarga, pasangan muda dianggap lebih siap baik secara mental, spiritual maupun finansial dalam menata masa depan anak-anak mereka. Tentu saja pandangan ini masih bisa dipertanyakan mengingat penataan masa depan keluarga sangat berkaitan dengan banyak faktor. Di masyarakat masih berlaku kebiasaan dimana sebagian besar suami-istri hanya berbincang tentang ukuran keluarga ketika ingin menambah jumlah anak, tetapi tidak detail hingga menyentuh masalah kesiapan istri untuk menerima kehamilan. Secara medis, rahim sebenarnya sudah siap untuk hamil kembali tiga bulan setelah melahirkan. Namun berdasarkan catatan statistik penelitian

bahwa jarak kelahiran yang aman antara anak satu dengan lainnya adalah 27 sampai 32 bulan. Pada jarak ini, si ibu akan memiliki bayi yang sehat serta selamat saat melewati proses kehamilan (Agudelo 2007 dalam Jurnal USU, 2008).

Penelitian *The Demographic and health survey*, menyebutkan bahwa anak-anak yang dilahirkan 2-5 tahun setelah kelahiran anak sebelumnya, memiliki kemungkinan hidup sehat 2,5 kali lebih tinggi daripada yang berjarak kelahiran kurang dari 2 tahun, maka jarak kehamilan yang aman adalah 2-5 tahun (Yolan,2007 dalam Jurnal USU,2008).

2. Penentuan Jarak Kehamilan

Menentukan jarak kehamilan tidak semua pasangan usia subur mengetahui secara jelas manfaatnya buat kehidupan jangka panjang yang lebih baik. Maka yang paling penting dalam hal ini adalah meningkatkan peran suami istri dalam memahami betul manfaat menentukan jarak kehamilan. Dimana, terdapat keadaan bahwa jarak kehamilan yang diinginkan sebagian besar wanita di negara berkembang tersebut tidak selalu terpenuhi. Hal itu diakibatkan beberapa faktor yang mungkin sangat kompleks sifatnya seperti faktor sosial budaya serta pengambilan keputusan yang dilakukan tidak oleh istri, akan tetapi oleh anggota keluarga lainnya seperti suami atau ibu mertua. Kejadian ini masih terjadi di Indonesia, terutama di beberapa daerah pedalaman yang masih kuat nilai-nilai tradisionalnya. Padahal tertulis dalam hak-hak reproduksi yang

mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan jumlah anak yang dimiliki serta jarak kehamilan yang diinginkan.

Pengaturan jarak kehamilan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia ibu dan status ekonomi (diukur secara tidak langsung melalui pendidikan dan status pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, lingkungan atau faktor lain). Faktor-faktor tersebut mempunyai hubungan antara jarak kehamilan dengan hasil perinatal yang merugikan (Agudelo dkk, 2006).

Menurut (BKKBN 2007), pada saat merencanakan kehamilan yang harus dihindari antara lain 4T yaitu :

1. Terlalu muda untuk hamil (< 18 tahun)
2. Terlalu tua untuk hamil (> 34 tahun)
3. Terlalu sering hamil (anak > 3 orang berisiko tinggi)
4. Terlalu dekat jarak kehamilan (< 2 tahun)

Beberapa alasan mengapa jarak kehamilan harus diatur dan tidak boleh kurang dari 2 tahun yaitu :

1. Kondisi rahim belum pulih
2. Dapat mengakibatkan terjadinya penyulit dalam kehamilan seperti anemia
3. Dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak dan posisi janin.
4. Dapat menyebabkan perdarahan pasca persalinan

5. Waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi kurang (BKKBN,2007).

3. Risiko Jarak Kehamilan yang Terlalu Dekat

Menurut Amiruddin (2007) proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan prioritas 1-3 anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilan ternyata jarak kurang dari 2 tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak. Jarak kehamilan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu hamil dengan jarak yang terlalu dekat beresiko terjadi anemia dalam kehamilan. Karena cadangan zat besi ibu hamil belum pulih. Akhirnya berkurang untuk keperluan janin yang dikandungnya (Nusadewiarty dkk, Jurnal Universitas Lampung, 2013).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nuzadewiarty dkk (2013), menunjukkan bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat menyebabkan Anemia dalam kehamilan (Nuzadewiarty dkk, Jurnal Universitas Lampung, 2013).

Jarak kehamilan yang terlalu dekat < 2 tahun, selain menyebabkan anemia juga dapat menyebabkan kejadian BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah). Hal ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nurfi Laila (2012). Hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan pernyataan teori (Depkes RI, 2011), jarak kehamilan ibu hamil sangat mempengaruhi berat bayi yang dilahirkan. Seorang ibu

yang jarak kehamilannya dikatakan berisiko apabila hamil dalam jangka kurang dari dua tahun, dan hal ini jelas menimbulkan gangguan pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, prematuritas, cacat bawaan, atau janin lahir dengan berat badan yang rendah. Keadaan ini disebabkan karena kurangnya suplai darah nutrisi akan oksigen pada placenta yang akan berpengaruh pada fungsi placenta terhadap janin (Laila, Jurnal STIKes U'Budiyah Banda Aceh, 2012).

Efek dari pengaturan jarak kelahiran susah untuk diukur dengan tepat. Meskipun bukti yang tersedia di negara berkembang menunjukkan jarak yang pendek/singkat berhubungan dengan angka kematian bayi yang tinggi. Kesehatan anak juga dipengaruhi dengan pengaturan jarak kehamilan yang pendek/singkat seperti berat badan lahir rendah, persalinan prematur, infeksi/peradangan dan kesehatan ibu juga memburuk jika jarak kehamilan terlalu dekat (Tawfeek dkk, Tikrit Medical journal 2011).

Penelitian lain tentang risiko jarak kehamilan yang terlalu dekat dilakukan oleh Conde Agudelo A, dkk (2006). Hasil penelitiannya mengatakan bahwa jarak kehamilan yang lebih pendek dari 6 bulan dapat mengakibatkan prematuritas dan BBLR. Sementara itu hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Conde Agudelo A, dkk juga mengatakan bahwa jarak kehamilan dengan interval yang singkat berhubungan dengan perdarahan utero placenta (placenta abruption dan placenta previa) (Tawfeek dkk, Tikrit Medical Journal 2011).

Studi penelitian yang dilakukan oleh Cheslack-Postava dkk (2011), membuktikan bahwa jarak kehamilan yang kurang dari 24 bulan, dapat membahayakan kesehatan ibu maupun anak. Dalam penelitian yang dilakukan dan melibatkan 725 pasang keluarga, menunjukkan bahwa jarak kehamilan yang terlalu dekat berisiko kelahiran prematur dan berat bayi lahir rendah (BBLR), yang lebih berisiko terhadap perkembangan bayi jangka panjang (Cheslack-Postava K, dkk Journal Pediatrics 2011).

Hasil penelitian lain yang ditemukan oleh Cheslack-Postava yaitu meningkatnya risiko autisme pada anak-anak yang lahir dengan interval kehamilan yang sangat pendek. Risiko tertinggi yaitu jika jarak kehamilan kurang dari 1 tahun. Cheslack-Postava menyebutkan bahwa mengandung anak kurang dari 1 tahun setelah kelahiran memiliki risiko 3,4 kali lebih tinggi mengalami autisme. Sedangkan bayi yang dikandung 12-23 bulan setelah kelahiran memiliki risiko 1,9 kali lebih tinggi, dan jarak 2-3 tahun memiliki risiko 1,2 kali lebih tinggi (Cheslack-Postava dkk, Journal Pediatrics 2011).

Selama ini penyebab autisme masih menjadi misteri, tetapi diperkirakan disebabkan oleh kombinasi antar genetik dan lingkungan, terutama saat bayi masih dalam kandungan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Cheslack-Postava menemukan bahwa ada hubungan yang erat antara jarak kehamilan yang terlalu dekat dengan kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Terutama folat yang dibutuhkan selama kehamilan untuk

perkembangan otak janin. Hal ini bisa menjadi salah satu penyebab yang menghubungkan antara jarak kehamilan yang terlalu dekat dengan autisme (Cheslack-Postava dkk, Journal Pediatrics 2011).

Sementara itu, menurut BKKBN (2007) risiko yang akan terjadi jika jarak kehamilan kurang dari 2 tahun (24 bulan) yaitu :

1. Keguguran
2. Anemia
3. Payah jantung
4. Bayi lahir sebelum waktunya (prematur)
5. Berat bayi lahir rendah (BBLR)
6. Cacat bawaan
7. Tidak optimalnya tumbuh kembang balita

4. Upaya dalam Pengaturan Jarak Kehamilan

Keberhasilan beberapa negara maju yang wanitanya berpendidikan lebih tinggi cenderung menggunakan kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan.

Keluarga Berencana (KB) diimplementasikan diseluruh dunia dengan tujuan umum yaitu penurunan kehamilan yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesehatan dan pengembangan hasil reproduksi, meskipun banyak program keluarga berencana mempromosikan jarak kelahiran melalui *Health Timing Spacing Pregnancy* (HTSP) yang menekankan peran jarak antara kehamilan daripada kelahiran dan

menyoroti dampak pada kesehatan ibu dan anak, khususnya yang berkaitan dengan kehamilan berisiko tinggi. Mereka yang terjadi sebelum usia 18 tahun, setelah usia 34 tahun, terlalu dekat jarak kehamilan, atau tinggi paritas. HTSP membantu mencegah maternal, perinatal dan neonatal dengan hasil kesehatan yang merugikan, seperti peningkatan risiko bayi lahir mati, prematur, berat lahir rendah dan kematian neonatal, serta angka kematian ibu, preeklampsia, aborsi dan keguguran. Hal ini merupakan review bukti tahun 2013 yang di selenggarakan oleh USAID dan UNICEF. Ulasan ini menganalisis evaluasi dari intervensi yang dirancang untuk membantu perempuan mencapai HTSP, dengan fokus pada empat perilaku kunci, yaitu :

1. Menunda kehamilan pertama sampai setidaknya 18 tahun
2. Menunggu setidaknya 24 bulan setelah kelahiran hidup sebelum mencoba kehamilan selanjutnya.
3. Menunggu enam bulan setelah aborsi atau keguguran sebelum mencoba kehamilan.
4. Menghindari kehamilan setelah usia 34 tahun (USAID, 2014).

Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen, dan upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara , alat atau obat-obatan (Proverawati dkk, 2010). Secara umum, menurut cara pelaksanaannya kontrasepsi dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Cara temporer (*spacing*), yaitu menjarangkan kelahiran selama beberapa tahun sebelum menjadi hamil lagi.
- b. Cara permanen (kontrasepsi mantap), yaitu mengakhiri kesuburan dengan cara mencegah kehamilan secara permanen.

Pelayanan kontrasepsi mempunyai 2 tujuan yaitu :

- a. Tujuan umum : pemberian dukungan dan pematapan penerimaan gagasan KB yaitu dihayatinya NKKBS.
- b. Tujuan khusus : penurunan angka kelahiran yang bermakna.

Upaya dalam mengatur jarak kehamilan dapat ditempuh dengan beberapa fase dalam pelayanan KB yaitu :

1. Fase menunda kehamilan

Pasangan Usia Subur (PUS) dengan usia kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya karena:

- a) Usia dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena berbagai alasan.
- b) Prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral, karena peserta masih muda.
- c) Penggunaan kondom kurang menguntungkan, karena pada pasangan muda frekuensi bersenggama relatif tinggi.
- d) Penggunaan IUD mini bagi yang belum mempunyai anak

(Sofyan, 2011).

2. Fase Menjarangkan Kehamilan

Pada fase ini usia istri antara 20- 30/35 tahun, merupakan periode usia yang paling baik untuk hamil dan melahirkan dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antar kelahiran 2-4 tahun yang dikenal sebagai catur warga. Alasan menjarangkan kehamilan adalah:

- a) Usia antara 20-30 tahun merupakan usia yang terbaik untuk hamil dan melahirkan.
- b) Segera setelah anak pertama lahir, maka dianjurkan untuk memakai IUD sebagai pilihan utama.
- c) Kegagalan yang menyebabkan kehamilan cukup tinggi namun disini tidak/ kurang berbahaya karena yang bersangkutan berada pada usia hamil dan melahirkan yang baik.
- d) Kegagalan kontrasepsi disini bukan merupakan kegagalan program (Sofian, 2011).

Pengaturan jarak kehamilan mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah :

- 1) Memberikan waktu istirahat untuk mengembalikan otot-otot tubuhnya seperti semula. Untuk memulihkan organ kewanitaan wanita setelah melahirkan. Rahim wanita setelah melahirkan, beratnya menjadi 2 kali lipat dari sebelum hamil. Untuk mengembalikannya keberat semula membutuhkan waktu sedikitnya

- 3 bulan, itupun dengan kelahiran normal. Untuk kelahiran dengan cara caesar membutuhkan waktu lebih lama lagi.
- 2) Menyiapkan kondisi psikologis ibu yang mengalami trauma pasca melahirkan atau saat dijahit. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat wanita siap lagi untuk hamil dan melahirkan.
 - 3) Bagi wanita dengan riwayat melahirkan secara caesar, bayi lahir cacat, preeklampsia, dianjurkan untuk memberi jarak antar kehamilan yang cukup. Karena mereka memiliki risiko yang lebih besar daripada wanita dengan riwayat kelahiran normal.
 - 4) Agar bayi yang sudah lahir mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya

Sementara itu, menurut West Virginia Perinatal Partnership (2009) berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa manfaat dari mengatur jarak kehamilan > 2 tahun yaitu:

- 1) Manfaat bagi bayi
 - a. Bayi akan lebih mendapat banyak perhatian dari orang tuanya, kebutuhan dasar bayi akan terpenuhi dengan maksimal selain itu perhatian dari orang tua dapat membantu untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - b. Ibu akan memberikan nutrisi yang cukup melalui ASI
 - c. Orang tua akan memiliki waktu yang cukup untuk menumbuhkan ikatan antara anak dan orang tua.

2) Manfaat bagi ibu

- a. Ibu akan memiliki lebih banyak energi dan sedikit tekanan psikologis
- b. Ibu akan lebih sedikit mengalami tekanan psikologi postpartum
- c. Ibu akan memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan kesehatan tubuhnya seperti semula dengan pemenuhan nutrisi yang cukup untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya.
- d. Ibu akan memiliki sedikit risiko atau kesulitan-kesulitan selama kehamilan seperti perdarahan, kelahiran prematur, ruptur uteri dan komplikasi lainnya.
- e. Ibu akan memiliki cukup waktu untuk memutuskan setiap permasalahan dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti mengonsumsi makanan yang sehat, mengonsumsi vitamin, menghindari diri dari bahan-bahan kimia, berhenti merokok dan merencanakan kehamilan berikutnya.

3) Manfaat bagi keluarga

- a. Orang tua akan memiliki lebih banyak waktu untuk menumbuhkan ikatan dengan setiap anaknya.
- b. Setiap keluarga akan memiliki waktu untuk bersama-sama dan memberikan perhatian kepada bayinya.
- c. Orang tua akan memiliki lebih banyak waktu untuk satu sama lain
- d. Keluarga akan memiliki sedikit tekanan dalam hal keuangan.

E. Tinjauan Agama tentang Jarak Kehamilan

Pengaturan jarak kehamilan yang ideal mempunyai banyak manfaat bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkannya. Pernyataan ini ternyata telah tuliskan dalam Q.S al-baqarah/ 2 : 233.

Firman Allah SWT.

1. Q. S al- Baqarah / 2 : 233



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Shihab, 2009.Hal 608).

Dari ayat tersebut di atas maka seorang ibu yang menunda kehamilan demi memelihara dan merawat anaknya maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami dan istri) demi kesempurnaan penyapihan kewajiban ayah dan ibu, sehingga seorang anak pun dapat merasakan kehangatan kasih sayang kedua orang tuanya. Dengan menyusui bayinya secara benar dan tepat maka dapat mencegah kehamilan dengan cara menyusui bayinya setiap 2 jam dengan teratur (Shihab, 2009. Hal.610).

Selain itu, jarak kehamilan yang tidak diatur dengan baik, dapat membahayakan kehamilan selanjutnya. Ibu maupun janin akan mengalami komplikasi yang dapat membahayakan jiwa ibu maupun janinnya. Penjelasan tersebut dijelaskan dalam hadis nabi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Jangan bahayakan dan jangan membahayakan orang lain”(H.R Imam Malik dalam Al-Muwathta’).

2. Q.S al-ahqaaf/ 46 : 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ ۖ وَفَصَّلَتْهُ ۖ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ۖ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri".

Salah satu firman Allah dalam ayat tersebut yang berbunyi : *wahamluhu wa fishaluhu tsalsuna syahran / kandungan dan penyapihan adalah 30 puluh bulan* mengisyaratkan bahwa masa kandungan minimal adalah enam bulan karena pada QS. al-Baqarah 233 telah dinyatakan bahwa masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun, yakni 24 bulan. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa penyusuan minimal adalah sembilan bulan karena masa kandungan yang normal adalah sembilan bulan. Betapapun, ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI (Shihab, 2009.hal 401).

Ayat di atas juga menunjukkan betapa pentingnya ibu kandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak. Karena itu, tidaklah tepat membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya. Betapapun banyak kasih sayang yang

dapat diberikan oleh orang lain, tetap saja kasih sayang ibu bapak masih sangat mereka butuhkan (Shihab, 2009.hal 402).

Berkaitan dengan pernyataan dari Q.S al-Ahqaaf ayat 15 yang mengandung arti tentang kasih sayang terhadap anak dan penyempurnaan penyusuan , ternyata terdapat pula di dalam firman Allah dalam Q.S Luqman ayat 14.

3. Q.S Luqman / 31: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Terjemahnya :

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamu Aku kembali (Shihab,2009.hal 299).

Ayat di atas bagaikan menyatakan : Dan Kami wasiatkan, yakni berpesan dengan amat kukuh, kepada semua manusia menyangkut kedua orang ibu bapanya ; pesan kami disebabkan karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Maksud kelemahan disini adalah yang berganda dan dari saat kesaat semakin bertambah. Lalu dia melahirkannya dengan susah payah, bahkan ditengah malam ketika saat manusia lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapihnya

didalam 2 tahun terhitung sejak melahirkan sang anak, ini jika orang tuanya ingin menyepurnakan penyusuan (Shihab, 2009 hal. 299).

4. Q.S Al-Israa / 17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Dalam ayat tersebut diatas maka Allah memerintahkan agar orang tua menjaga anaknya, mulai dari dia dalam kandungan hingga dia menjadi dewasa (Sholeh dan Sholehah) dan jangan khawatir tentang rezeki mereka dan rezeki kamu. Bukan kamu sumber rezeki, tetapi kamilah sumbernya. Karena itu, *kami yang akan memberi*, yakni menyiapkan sarana, *rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu* (Shihab, 2009).

F. Kerangka Konsep

1. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

a. Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat

dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga), dan indera penglihatan (mata). Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda(Notoadmodjo, 2005).


b. Sikap

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu, yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setuju-tidak setuju, baik-tidak baik, dan sebagainya). Campbell (1950) mendefinisikan sangat sederhana, yakni : “ *An individual's attitude is syndrome of response consistency with regard to object.* “ jadi jelas, disini dikatakan bahwa sikap itu suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus atau objek, sehingga sikap itu melibatkan pikiran, perasaan, perhatian, dan gejala kejiwaan yang lain (Notoadmodjo,2010).

c. Jarak kehamilan


Jarak kehamilan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama atau sebelumnya dengan kehamilan berikutnya. Sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak yang ideal kehamilan sekurang-kurangnya 2 tahun. Terlalu dekat jarak kehamilan adalah jarak antara kehamilan satu dengan dengan kehamilan berikutnya kurang dari 2 tahun (24 bulan). Jarak kehamilan yang dianjurkan adalah 36 bulan (BKKBN, 2007).

2. Bagan kerangka konsep



Gambar. Kerangka konsep

Keterangan :



G. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pengetahuan

Pengetahuan responden tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang dampak dari jarak kehamilan yang terlalu dekat berdasarkan pernyataan dalam kuesioner. Pengetahuan responden diukur melalui 15 pertanyaan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang

menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai responden adalah 15.

Kriteria Objektif:

Baik : bila responden menjawab $> 50\%$ dari seluruh pertanyaan yang ada pada kuesioner tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat

Kurang : bila responden menjawab $\leq 50\%$ dari seluruh pertanyaan yang ada pada kuesioner tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat

b. Sikap

Sikap responden tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat adalah tanggapan atau reaksi responden terhadap apa saja dampak yang ditimbulkan jika jarak kehamilan terlalu dekat berdasarkan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Sikap responden diukur melalui 15 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai oleh responden adalah 15.

Kriteria objektif:

Positif : bila responden menjawab pernyataan dengan skor $> 50\%$ dari seluruh pernyataan sikap yang ada pada kuesioner tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat

Negatif : bila responden menjawab pernyataan dengan skor $\leq 50\%$ dari seluruh pernyataan sikap yang ada pada kuesioner tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang didalamnya tidak ada analisis hubungan antarvariabel namun hanya menggambarkan keterikatan antara variabel bebas dan terikat, bersifat umum yang membutuhkan jawaban di mana, kapan, berapa banyak, siapa, di mana, dan analisis statistik yang digunakan adalah deskriptif (Hidayat, 2010).

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaiman gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk pengambilan data selama penelitian berlangsung (Budiarto, 2004). Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 17 juni - 30 juli 2014.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi (universe) adalah keseluruhan unit analisis yang karakteristiknya akan diduga. Anggota (unit) poupulasi disebut elemen populasi (Hastono, Sabri, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil primigravida yang memeriksakan kehamilannya di puskesmas/RSP VI Kassi-Kasii Makassar. Jumlah populasi ibu hamil primigravida pada periode Maret 2014 sebanyak 34 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2010). Sampel adalah sebagian populasi yang ciri-cirinya diselidiki atau diukur. Unit sampel dapat sama dengan unit populasi, tetapi dapat juga berbeda(Hastono, Sabri,2010).

Pada penelitian ini, jumlah sampel awal yang didapat sebanyak 34 ibu primigravida.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik Sampling atau teknik pengambilan sampel merupakan suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili keseluruhan populasi yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan teknik Total

Sampling yakni cara pengambilan sampel dengan mengambil semua anggota populasi menjadi responden atau sampel (Sugiyono, 2009).

D. Pengolahan Data dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator berdasarkan variabel yang diteliti dengan formula rumus sebagai berikut :

$$S = R$$

Keterangan :

S : Skor yang diperoleh

R : Jawaban yang benar

2. Analisa Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori keperpustakaan yang ada.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

Keterangan :

P : persentase yang dicari

f: Frekuensi atau variabel

n : Jumlah sampel

E. Penyajian Data

a. Editing

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

b. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban ragu-ragu, diberi kode (2) untuk kepentingan tabulasi data, namun pilihan jawaban ragu-ragu tetap dimasukkan dalam kategori jawaban salah.

c. Tabulating

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi

F. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia, maka

segi etika penelitian harus diperhatikan (Hidayat,2010). Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

a. *Informed Consent*

Informed consent merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan responden penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. *Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar persetujuan untuk menjadi responden. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika subjek bersedia, maka mereka harus menandatangani lembar persetujuan. Jika responden tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak pasien (Hidayat,2010).

b. Tanpa nama (*anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu (Hidayat,2010).

c. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian (Hidayat, 2010).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Maksassar tahun 2014. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan ibu dan sikap ibu tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat.

Penelitian ini dilakukan mulai dari 17 Juni sampai dengan 30 Juli 2014 di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar dengan jumlah sampel 35 Responden.

A. Karakteristik Responden

1. Umur

Tabel 4.1

Distribusi frekuensi umur responden

Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi

Makassar Tahun 2014

Umur(tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
≤ 20	11	31,4
21-25	15	42,9
26-30	6	17,1
> 30	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : data primer

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 35 responden, dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki umur ≤ 20 tahun adalah sebanyak 11 responden (31,4%), responden yang memiliki umur 21-25 tahun adalah sebanyak 15 responden (42,9%), responden yang memiliki umur 26-30 tahun adalah sebanyak 6 responden (17,1%), dan responden yang memiliki umur >30 tahun adalah sebanyak 3 responden (8,6%).

2. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi frekuensi tingkat pendidikan responden
Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi
Tahun 2014

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD	7	20
SMP	11	31,4
SMA	13	37,1
Diploma	1	2,9
S1	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : data primer

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 35 responden, dapat diketahui jumlah responden dengan pendidikan SD sebanyak 7

responden (20%), SMP sebanyak 11 responden (31,4%), SMA sebanyak 13 responden (37,1%), Diploma sebanyak 1 responden (2,9%), dan S1 sebanyak 3 responden (8,6%).

3. Pekerjaan

Tabel 4.3

Distribusi frekuensi pekerjaan responden

Di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi

Tahun 2014

Pekerjaan	Frekuensi	Presentase(%)
IRT	32	91,4
PNS	3	8,6
Jumlah	35	100

Sumber : Data primer

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 35 responden, dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 32 rsponden (91,4%), dan jumlah responden dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3 responden (8,6%).

B. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4

Distribusi frekuensi pengetahuan ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar tahun 2014

Pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
Tahu	16	45,7
Tidak tahu	19	54,3
Jumlah	35	100

Sumber : data primer

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 35 responden ibu hamil primigravida, terdapat 16 responden (45,7%) yang tahu tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan 19 responden (54,3%) yang tidak tahu tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat.



Tabel 4.5

Distribusi frekuensi sikap ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat di Puskesmas/RSP VI Makassar tahun 2014

Sikap	Frekuensi	Persentase
Positif	22	62,9
Negatif	13	37,1
Jumlah	35	100

Sumber : Data primer

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 35 responden ibu hamil primigravida, terdapat 22 responden (62,9%) yang memiliki sikap positif terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat, dan 13 responden (37,1,%) yang memiliki sikap negatif terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat.

C. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data beserta hasilnya, berikut ini akan dilakukan pembahasan sesuai dengan variabel yang diteliti.

1. Pengetahuan ibu primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat

Hasil penelitian di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi makassar pada 35 orang yang di ambil sebagai responden maka diperoleh data bahwa sebanyak 16 responden (45,7%) memiliki pengetahuan yang baik, sementara itu responden yang memiliki pengetahuan kurang adalah sebanyak 19 responden (54,3%). Hal ini berarti bahwa pengetahuan responden masih minim tentang apa saja dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat serta hal-hal yang berkaitan dan menunjang dalam pengaturan jarak kehamilan.

Kurangnya pengetahuan pada ibu hamil primigravida di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi makassar ini karena sebagian besar responden belum pernah mendapat pendidikan/konseling tentang

jarak kehamilan beserta dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat sebelumnya, sehingganya pengetahuan mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat minim. Pendidikan kesehatan seharusnya dilaksanakan bukan hanya satu atau dua kali saja, tetapi harus dilakukan secara berkali-kali dan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan pendapat Notoadmadjo (2007) bahwa metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan seseorang adalah metode ceramah melalui pendidikan kesehatan dan sebaiknya dilakukan secara berangsur-angsur dan dalam jangka waktu yang lama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui pendidikan formal saja, tetapi juga dapat diperoleh melalui pengindraan terhadap suatu objek tertentu melalui media-media ataupun pengalaman.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Conde Agudelo menyatakan bahwa terdapat (44%) dari sampel yang diteliti memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, sehingga menyebabkan sampel yang diteliti memilih untuk memutuskan memiliki anak dengan jarak kehamilan yang dekat < 2 tahun (Agudelo,2008).

Hingga saat ini, belum ada peneliti sebelumnya yang meneliti mengenai pengetahuan tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat pada ibu hamil primigravida, sehingga peneliti tidak mendapatkan gambaran untuk melihat perbedaan dan

membandingkan pengetahuan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Namun demikian pada penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa masih banyak ibu hamil primigravida yang belum mengetahui tentang jarak kehamilan dan dampak dari jarak kehamilan yang terlalu dekat. Sementara itu jarak kehamilan yang dianjurkan adalah 24 -36 bulan (BKKBN 2007).

Hal ini dapat diperjelas bahwa pengetahuan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk informasi dari petugas kesehatan, media cetak, media elektronik dan lainnya. Dengan demikian informasi yang diperoleh oleh responden dapat beraneka ragam dan mempengaruhi tingkat pengetahuan responden tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat.

Dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa perlu adanya sosialisasi yang banyak pada masyarakat khususnya ibu hamil primigravida, sebagaimana kita ketahui bahwa ibu hamil primigravida adalah ibu yang baru pertama kali hamil dan perlu banyak informasi mengenai pendidikan kesehatan agar sejak dini mereka mengetahui pentingnya mengatur jarak kehamilan sehingga jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat dicegah untuk kedepannya demi kesehatan ibu maupun anak.

2. Sikap ibu primigravida terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 35 responden ibu hamil primigravida, terdapat 22 responden (62,9%) yang memiliki sikap positif terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat, yaitu dengan cara ingin menunda kehamilan lebih dari 2 tahun dengan pertimbangan risiko yang akan terjadi jika jarak kehamilan tidak di atur. Sikap positif yang paling dominan di tunjukkan para responden adalah dampak yang akan terjadi, penggunaan KB untuk menunda kehamilan, keadaan ekonomi dan psikososial, pemulihan kondisi rahim kurang lebih 2 tahun, perencanaan kehamilan, dan pemenuhan gizi untuk ibu maupun bayi. Sikap menerima yang ditunjukkan oleh responden menunjukkan bahwa meskipun responden kurang mengetahui tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat, namun mereka bersedia mempertimbangkan untuk menunda kehamilan selanjutnya.

Sebagaimana menurut Notoadmojo (2010), sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap itu tidak dapat dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.

Sementara itu, dari 35 responden terdapat 13 ibu primigravida (37,1%) yang memiliki sikap negatif terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat. Ini berarti masih ada sebagian besar ibu primigravida yang belum mampu menyikapi dampak yang akan terjadi jika jarak kehamilan itu terlalu dekat. Hal ini dikarenakan karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana dampak yang akan ditimbulkan jika jarak kehamilan terlalu dekat dan tidak diatur dengan baik.

Penelitian tentang sikap terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat sebelumnya belum pernah ada yang meneliti, sehingganya peneliti tidak bisa membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang memiliki sikap positif masih kurang, sehingganya ibu yang statusnya adalah primigravida harus mendapatkan pendidikan kesehatan yang lebih baik agar mereka mengerti dan mampu menyikapi hal-hal yang dapat merugikan ibu hamil maupun bayinya jika jarak kehamilan itu tidak diatur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu hamil primigravida tentang dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat masih kurang. Hal ini disebabkan karena ibu kurang mendapatkan pendidikan dan informasi kesehatan tentang jarak kehamilan.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ibu hamil primigravida yang mau menerima atau mempunyai sikap positif terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat juga masih kurang. Hal ini disebabkan karena ibu belum menyadari sepenuhnya manfaat dari pengaturan jarak kehamilan, selain itu pengetahuan ibu juga masih sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Pengetahuan ibu hamil primigravida terhadap dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat perlu ditingkatkan, khususnya pada ibu primigravida yang memiliki pendidikan yang rendah dan memiliki usia dibawah 20 tahun, karena pada usia itu sistem reproduksi belum matang

secara sempurna sehingga risiko yang diakibatkan oleh karena jarak kehamilan yang terlalu dekat sangatlah besar.

2. Melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan secara berulang-ulang agar ibu dapat mengerti dan memahami bahwa dampak jarak kehamilan yang terlalu dekat bisa membahayakan jiwa ibu maupun bayinya.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk aktif mengikuti penyuluhan tentang peningkatan kesehatan ibu dan anak yang diadakan oleh tenaga kesehatan agar masyarakat atau ibu dapat memahami tentang pentingnya mengatur jarak kehamilan demi kesejahteraan di lingkup keluarga ataupun masyarakat.
4. Para ibu primigravida yang nantinya telah bersalin hendaknya memberi ASI eksklusif untuk kesehatan tumbuh kembang anak dan untuk kesehatan ibu itu sendiri. Karena selain memberi nutrisi kepada bayi, ASI eksklusif juga dapat dijadikan KB alami untuk menunda kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. 2011. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung : Diponegoro
- Arief, ZR & Kristiyanasari, Weni. 2009. *Neonatus dan Asuhan Keperawatan Anak*. Yogyakarta : Medical Book
- A.Nusadewiarti, R.Zuraida, IU.Yase . *The Corelation Between Nutrient Status and Pregnancy Space On Pregnant Women With Anemia in Private Midwifes-Practice Mrs dessy On Selamat Riyadi IV Street Pahoman Bandar Lampung*, Jurnal Medical faculty Of Lampung University (2013). jurnal.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/.../268 diakses tanggal 23 Februari 2014.
- Bandiyah, Siti. 2009. *Kehamilan, Persalinan dan Gangguan Kehamilan*. Yogyakarta : Nuha Offset
- Budiman dan Riyanto. 2013. *Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika
- Budiman dan Riyanto. 2013. *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika
- BKKBN. 2007. *Hindari Kehamilan 4 Terlalu*. www.semarangkab.go.id/skpd/kbpbp/.../4terlalu.pdf diakses tanggal 14 Maret 2014
- Cheslack-Postava, *et al.* *Closely Spaced Pregnancies Are Associated With Increased Odds of Autism in California Sibling Births*. Official Journal of The American academy of Pediatrics 2011 ; h. 246-253. <http://pediatrics.aappublications.org/content/127/2/246.full.html> diakses tanggal 14 Maret 2014.
- Conde – Agudelo, *et al.* *Birth Spacing and Risk of Adverse Perinatal Outcomes A Meta- analysis*. JAMA, Vol. 295 no 15 (2006); h 1809-1823. <http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/295/15/1809> diakses tanggal 23 Februari 2014.
- D.Nargish, F.Aneesa, A.Nasreen. *Assesment Of Pregnancy Outcome In Primigravida: Comparison Between Booked And Un-Booked Patients*,

- Journal Ayub Medical College Abbottabad 2010; 22(2).
<http://www.ayubmed.edu.pk/JAMC/PAST/22-2/Nargis.pdf>
- Fauziah, Siti & Sutejo, Ns. 2012. *Keperawatan Maternitas Kehamilan*. Jakarta : Kencana
- Fraser, M.D & Cooper A.M. 2011. *Buku Saku Pratik Klinik Kebidanan*. Jakarta : EGC
- Gita.Almira, H.Ninuk, Zulaela. *Hubungan Jarak Kehamilan dengan kejadian BBLR di RSD Panembahan Senopati Bantul*. Jurnal Stikes Respati Yogyakarta 2009. e-journal.respati.ac.id/.../ di Akses tanggal 16 Mret 2014
- Hastono, SP & Sabri Luknis. 2010. *Statistik Kesehatan*. Jakarta : Rajawali Press
- Hidayat, A.Aziz Alimul. 2010. *Metode Penelitian Kebidanan & Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika
- Jannah, Nurul. 2012. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Yogyakarta : ANDI
- Laila,Nurfi. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya BBLR Periode Januari Sampai Desember 2012 di RSUD dr Zainoel Abidin*. Jurnal Karya Tulis Ilmiah Stikes U BUNDIYAH BANDA ACEH (2012).
- Mandriwati, G.A, ed. 2011. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta : EGC
- Muazizah, Nugroho H.A, Rahmawati. *Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Dengan Berat Bayi Lahir di RS Permata Bunda*, Jurnal Universitas Muhamadiyah Semarang (2011).
jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/.../611 diakses tanggal 16 Maret 2014.
- Notoadmodjo, Sukidjo. 2005. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya
- Notoadmodjo, Sukidjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoadmodjo, Sukidjo. 2010. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Edisi Revisi dan diperluas. Jakarta : Rineka Cipta

- Nurjannah, Nunung & Septiana, TD. *Hubungan jarak Kelahiran dan Jumlah Balita dengan Status Gizi di RW 07 Wilayah Kerja Puskesmas Cijerah Bandung*. Jurnal Keperwatan Anak, Vol 1 No.2(2013); h. 120-126 jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/.../1019 diakses tanggal 16 Maret 2014.
- Pantiawati, Ika & Saryono. 2010. *Asuhan Kebidanan I (Kehamilan)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Pitoyo, AJ. 2010. *Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Proverawati,A, Islaely, Aspuah. 2010. *Panduan Memilih Kontrasepsi*. Yogyakarta : Medical Book
- Prawirohardjo, Sarwono. 2010. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka
- Pinem, Saroha. 2009. *Kesehatan Reproduksi & Kontrasepsi*. Jakarta : CV.Trans Media
- Profil Dinas Kesehatan Kota Makassar tahun 2012. www.dinkeskotamakassar.net diakses tanggal 10 Januari 2014.
- Profil Kesehatan Indonesia tahun 2011. <http://www.kemkes.go.id>. Di akses tanggal 10 januari 2014.
- Ridwan dan Abdullah. *Al Muwaththa' Imam Malik*. Jakarta : Pustaka Azzam
- Sofian, Amru. 2012. *Rustam Mochtar Sinopsis Obstetri*. Jakarta : EGC
- Sudarianto. 2008. *Bumil Risti di Sulsel tahun 2007*. <http://datinkessulsel.wordpress.com> Diakses tanggal 15 desember 2013.
- Siregar,R.Y. *Faktor yang mendasari Penentuan Jarak Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS)*. Sumatra : DIV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara (2008). repository.usu.ac.id/bitstream/.../4/Chapter%20II.pdf diakses tanggal 20 Maret 2014
- Shihab, M Quraish.2009. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati
- Tawfeek RS, Khaleel HA, Mustafa ZM. *Spacing Effects on Maternal-Child Health. A Hospital Based Study at Tikrit Teaching Hospital*, Tikrit Medical Journal 2011 ; 17 (2) : h 1-6. www.Tikritmedicaljournal.org/... Diakses tanggal 20 Februari 2014.

USAID. *Engaging Families For Healthy Pregnancies 2014.*
www.healthcommcapacity.org/.../HTSP-AMA-HP-Assessment-Final-Report
di akses tanggal 2 April 2014.

————— *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian.* Makassar : Alauddin Press

Wahdaniah. 2011. *Keperawatan Maternitas.* Makassar : Alauddin Press

Windadari,Murni. 2009. *Kiat Mengatasi Masalah Kehamilan dan Janin.* Yogyakarta: Elmatara Publishing

Winkjosastro, Hanifa. 2007. *Ilmu Kebidanan Edisi ke tiga.* Jakarta: YBP-SP

World Health Organization (WHO). *Birth Spacing – Report from a WHO Technical Consultation 2006.*
www.who.int/making.../birth_spacing.pdf.diakses tanggal 24 maret 2014.



LEMBAR KONSULTASI KTI

Nama : Ayu Efriyanti Aminullah
Nim : 70400011009
Judul KTI : Gambaran Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Primigravida tentang Dampak Jarak Kehamilan yang Terlalu Dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar
Pembimbing : Hj.Sitti Saleha S.ST.,S.KM.,M.Keb

No	Tanggal	Materi Konsul	Paraf
1	Senin, 26 September 2013	Konsul Judul	
2	Kamis, 13 Februari 2014	Konsul BAB I-III	
3	Selasa, 25 Februari 2014	Perbaikan BAB I-III	
4	Sabtu, 29 Maret 2014	Kuisisioner	
5	Sabtu, 29 Maret 2014	ACC proposal	
6	Senin, 12 Mei 2014	Ujian Proposal	
7	Selasa, 27 Mei 2014	ACC perbaikan proposal	
8	Rabu, 20 Agustus 2014	Konsul BAB IV-V	
9	Sabtu, 23 Agustus 2014	Perbaikan BAB IV-V	
10	Senin, 25 Agustus 2014	ACC KTI	

11	Rabu, 27 Agustus 2014	Ujian KTI	
12	Rabu, 10 September 2014	ACC Perbaikan KTI	

Pembimbing

Hj. Sitti Saleha S.ST.,S.KM.,M.Keb

Nip : 19760126 200604 2 001



LEMBAR KUISIONER

GAMBARAN PENGETAHUAN IBU PRIMIGRAVIDA TENTANG DAMPAK JARAK KEHAMILAN YANG TERLALU DEKAT DI PUSKESMAS/RSP VI KASSI-KASSI MAKASSAR TAHUN 2014

No. Kuisisioner :

Tanggal :

A. Karakteristik responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

B. Kuisisioner

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang dianggap benar

a. Ya

b. Tidak

Kuisisioner tentang Pengetahuan

1. Apakah ibu tahu apa itu jarak kehamilan yang terlalu dekat ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Menurut ibu apakah jarak kehamilan yang dianjurkan adalah lebih dari 2 tahun ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Menurut ibu, apakah jarak kehamilan itu perlu diatur ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janinnya?

- 
- a. Ya
b. Tidak
5. Apakah risiko anemia sering terjadi pada ibu hamil dengan jarak kehamilan kurang dari 2 tahun ?
a. Ya
b. Tidak
6. Apakah anemia dapat membahayakan kesehatan ibu hamil maupun janinnya?
a. Ya
b. Tidak
7. Menurut ibu apakah bayi yang lahir dengan berat badan rendah juga disebabkan karena jarak kehamilan yang terlalu dekat ?
a. Ya
b. Tidak
8. Apakah jarak kehamilan yang terlalu dekat kurang dari 2 tahun, dapat menyebabkan keguguran ?
a. Ya
b. Tidak
9. Menurut ibu, apakah dengan menunda kehamilan lebih dari 2 tahun dapat memulihkan kondisi rahim ibu ?
a. Ya
b. Tidak
10. Apakah jarak kehamilan yang terlalu dekat tidak akan menimbulkan banyak komplikasi kesehatan ?
a. Ya
b. Tidak
11. Apakah dengan menunda kehamilan lebih dari 2 tahun dapat memenuhi nutrisi bayi secara maksimal ?
a. Ya
b. tidak
12. Apakah penggunaan alat kontrasepsi (KB) dapat membantu untuk menjarangkan kehamilan ?
a. Ya
b. Tidak

13. Menurut ibu, apakah ASI eksklusif juga dapat membantu untuk menunda kehamilan?
- Ya
 - Tidak
14. Apakah jarak kehamilan yang terlalu dekat kurang dari 2 tahun tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ?
- Ya
 - Tidak
15. Menurut ibu, apakah pengaturan jarak kehamilan dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga?
- Ya
 - Tidak

Berilah tanda (√) pada salah satu jawaban yang dianggap benar

Kuisisioner Tentang Sikap

No	Pernyataan	Jawaban	
		Setuju	Tidak Setuju
16.	Pengaturan jarak kehamilan tidak terlalu penting untuk kesehatan ibu maupun anak		
17.	Jarak kehamilan yang ideal tidak harus lebih dari 2 tahun		
18.	Hamil kembali dengan jarak kehamilan sebelumnya kurang dari 2 tahun, bukan suatu masalah yang serius.		
19.	Anemia selama hamil bukan penyakit yang membahayakan		
20.	Kecil kemungkinan mengalami anemia jika jarak kehamilan kurang dari 2 tahun		

21.	Bayi bisa lahir dengan berat badan yang rendah jika jarak kehamilan kurang dari 2 tahun		
22.	Penggunaan KB penting untuk mengatur jarak kehamilan		
23.	Keadaan ekonomi keluarga juga mempengaruhi pengaturan jarak kehamilan		
24.	Bayi mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya jika jarak kehamilan lebih dari 2 tahun		
25.	Setelah bersalin, ibu perlu memulihkan kondisinya \pm 2 tahun		
26.	Kehamilan selanjutnya perlu direncanakan dengan baik bersama keluarga, bidan atau dokter		
27.	Gizi bayi akan terpenuhi secara maksimal dengan memberikan ASI eksklusif hingga 6 bulan		
28.	Setelah melahirkan, Ibu perlu banyak mengonsumsi makanan yang bergizi		
29.	Jika umur ibu diatas 20 tahun, ibu dianjurkan menggunakan KB jangka panjang setelah melahirkan		
30.	Penggunaan KB sangat dianjurkan untuk kesejahteraan keluarga		

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Bersedia menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : Ayu Efriyanti Aminullah

Nim : 70400011009

Setelah mendapat penjelasan mengenai penelitian ini, saya mengerti bahwa segala informasi mengenai penelitian ini akan dirahasiakan untuk kepentingan penelitian. Maka saya bersedia dengan suka rela dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun untuk menjadi responden penelitian ini yang berjudul “Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Primigravida tentang Dampak Jarak Kehamilan yang Terlalu Dekat di Puskesmas/RSP VI Kassi-Kassi Makassar tahun 2014”. Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menjadi responden.

Makassar, 2014

Responden

MASTER TABEL
GAMBARAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU HAMIL PRIMIGRAVIDA TENTANG
DAMPAK JARAK KEHAMILAN YANG TERLALU DEKAT
DI PUSKESMAS KASSI-KASSI
TAHUN 2014

No	Responden	umur	pendidikan	pekerjaan	Pengetahuan															S=R	P (%)	Klasifikasi		Sikap															S=R	P (%)	Klasifikasi		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			B	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			P	N	
1	Ny "K"	18	SMP	IRT	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	6	40	√	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	8	53,3	√		
2	Ny "K"	19	SD	IRT	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	8	53,3	√	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	7	46,7		√	
3	Ny "A"	37	S2	PNS	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	10	66,7	√	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	11	73,3	√		
4	Ny "E"	37	SD	IRT	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	5	33,3	√	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	40		√
5	Ny "L"	16	SMP	IRT	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	6	40	√	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	8	53,3	√			
6	Ny "M"	24	SMA	IRT	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	9	60	√	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	60	√		
7	Ny "S"	26	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	10	66,7	√	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13	86,7	√		
8	Ny "H"	24	SMP	IRT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5	33,3	√	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	6	40		√
9	Ny "S"	25	SMP	IRT	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4	26,7	√	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	46,7		√
10	Ny "M"	24	SMA	IRT	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	12	80	√	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	11	73,3	√	
11	Ny "J"	23	SD	IRT	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	6	40	√	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	10	66,7	√		
12	Ny "I"	19	SMP	IRT	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7	46,7	√	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	40		√
13	Ny "R"	24	SMA	IRT	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	7	46,7	√	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	13	86,7	√		
14	Ny "I"	17	SMP	IRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	20	√	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	7	46,7		√	
15	Ny "L"	21	SMA	IRT	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	11	73,3	√	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	80	√	
16	Ny "R"	23	SMP	IRT	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	7	46,7	√	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	8	53,3	√		
17	Ny "H"	18	SD	IRT	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	5	33,3	√	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	5	33,3		√	
18	Ny "D"	30	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	12	80	√	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	66,7	√		
19	Ny "A"	32	Akademi	IRT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	6	40	√	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	7	46,7		√		

20	Ny "A"	28	SD	IRT	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	20		√	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	5	33,3		√
21	Ny "F"	22	SMK	IRT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	7	46,7		√	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	10	66,7	√										
22	Ny "N"	22	SMA	IRT	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	6	40		√	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	9	60	√											
23	Ny "A"	20	SMA	IRT	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	10	66,7	√		1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	10	66,7	√														
24	Ny "M"	17	SMP	IRT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	4	26,7		√	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	4	26,7		√													
25	Ny "L"	21	SMA	IRT	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	9	60	√		1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	66,7	√																	
26	Ny "K"	24	SMA	IRT	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	10	66,7	√		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,3	√												
27	Ny "S"	25	SMA	IRT	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	8	53,3	√		1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	9	60	√																	
28	Ny "R"	22	SMA	IRT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4	26,7		√	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	26,7		√																
29	Ny "M"	24	S1	PNS	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	10	66,7	√		1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	10	66,7	√																	
30	Ny "R"	22	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	10	66,7	√		1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9	60	√																		
31	Ny "S"	28	S1	PNS	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	13	86,7	√		1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14	93,3	√												
32	Ny "R"	29	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	9	60	√		0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	60	√																	
33	Ny "S"	19	SD	IRT	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	5	33,5		√	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	7	46,7		√																
34	Ny "S"	20	SD	IRT	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	20		√	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	5	33,5		√																
35	Ny "S"	30	SMA	IRT	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	8	53,3	√		1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	66,7	√																	

Sumber : Hasil Pengolahan Data primer

Keterangan :

1. Ny : Nyonya
2. 1 : Jawaban yang benar
3. 0 : Jawaban yang salah
4. S : Skor yang diperoleh
5. R : Jawaban yang benar

6. B : Baik
7. K : Kurang
8. P : Positif
9. N : Negatif
10. P : Persentase