

**PENGARUH LATIHAN GERAK KAKI (*STRETCHING*) TERHADAP
PENURUNAN NYERI SENDI EKSTREMITAS BAWAH PADA
LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA GAU
MABAJI KAB. GOWA**



Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Oleh:
NUR ASIAH
NIM. 70300110070

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2014

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Agustus 2014

Penyusun.

NUR ASIAH
NIM 70300110070



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) Terhadap Penurunan Nyeri Sendi Ekstemitas Bawah Pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa” yang disusun oleh Nur Asiah, NIM: 70300110070, Mahasiswa Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 M, bertepatan dengan 15 Syawal 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Ilmu Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)*.

Makassar, 11 Agustus 2014 M.
15 Syawal 1435 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A. (.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt (.....)

Munaqisy I : Hasnah, S.SiT., M.Kes. (.....)

Munaqisy II : Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si. (.....)

Pembimbing I : Hj. Murtini, SKM., M.Kes. (.....)

Pembimbing II : Muh. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes. (.....)

Diketahui oleh :
Pjs Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. DR. H. Ahmad M. Sewang, M.A
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pengaruh Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) Terhadap Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Keperawatan pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan tetapi berkat ketekunan, ketabahan, kesabaran dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa skripsi ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasanya ditemukan kekurangan-kekurangan karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang sempurna.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga pada penyusunan yang akan datang lebih baik seperti yang kita harapkan bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan moril dan material dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. dr. H. Armyn Nurdin, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes selaku Wakil Dekan I, Ibu Dra. H. Faridha Yenny Nonci, M.Si., A.Pt selaku Wakil Dekan II dan Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan.
5. Ibu Hj. Murtini, SKM., M.Kes selaku pembimbing I dan Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan mulai dari persiapan proposal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hasnah, S.Si.T., M.Kes Selaku Penguji I dan Drs H. Syamsul Bahri M.Si selaku penguji II yang telah memberikan saran dan kritiknya dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Almarhum Ayahanda Muh. Natsir dan Ibunda Hj. Insana juga Bapak Muh. Ishak yang tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan kasih sayang serta dukungan kepada penulis dalam

menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya penyusunan skripsi ini.

8. Para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi ini.
9. Kepala, Pegawai, dan seluruh Staf Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dengan tangan terbuka menerima penulis selama melakukan penelitian. Kakek dan Nenek tercinta penghuni Panti yang bersedia menjadi responden dan berbagi pengalaman serta cerita perjalanan hidup.

Sebagai akhir, penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahannya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Makassar,
Penulis,

Agustus 2014

Nur Asiah
70300110070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Tujuan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Lansia.....	12
1. Definisi lansia.....	12
2. Batas-batas lanjut usia.....	12

3. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia.....	13
4. Penyakit yang umum yang terjadi pada lanjut usia.....	15
5. Pandangan Islam tentang lanjut usia.....	15
B. Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah.....	18
1. Definisi nyeri.....	18
2. Fisiologi nyeri.....	19
3. Klasifikasi nyeri.....	22
4. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan reaksi terhadap nyeri....	24
5. Pengkajian nyeri.....	26
6. Nyeri sendi pada lanjut usia.....	29
7. Penatalaksanaan nyeri sendi.....	32
C. Peregangan (<i>Stretching</i>).....	37
1. Definisi peregangan (<i>Stretching</i>).....	37
2. Manfaat melakukan peregangan (<i>Stretching</i>).....	37
3. Teknik-teknik umum peregangan (<i>Stretching</i>).....	38
4. Petunjuk-petunjuk melakukan peregangan (<i>Stretching</i>).....	40
5. Prinsip dasar peregangan (<i>Stretching</i>).....	40
6. Prosedur latihan gerak kaki (<i>Stretching</i>) untuk ekstremitas bawah	41
D. Kerangka Konsep.....	45
E. Kerangka Kerja.....	46
F. Variabel yang diteliti.....	47

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	52
G. Etika Penelitian	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	64

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan	72
B. Implikasi.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Perbedaan Serabut Saraf A-delta dan C.....	20
Tabel 3.1	Desain Penelitian Pengaruh Latihan Gerak Kaki (<i>Stretching</i>)	48
Tabel 4.1	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa.....	56
Tabel 4.2	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa ...	56
Tabel 4.3	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa	57
Tabel 4.4	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit yang Diderita Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa.....	57
Tabel 4.5	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menderita Nyeri Sendi Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.....	58
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lokasi Nyeri Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa ...	58
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakter Nyeri Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa	59
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Waktu Muncul Nyeri Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa	59
Tabel 4.9	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hal yang Dilakukan Bila Ada Serangan Nyeri Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.....	60
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Nyeri Sebelum Latihan Gerak Kaki (<i>stretching</i>) Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.....	60

Tabel 4.11	Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Nyeri Setelah latihan Gerak kaki (<i>stretching</i>) Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.....	61
Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4.13	Pengaruh Pemberian Latihan Gerak Kaki (<i>Stretching</i>) Terhadap Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab.Gowa.....	62



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Skala Numerik (<i>Numeric Rating Scale, NRS</i>)	7
Gambar 2.1	Proses Terjadinya Nyeri	21
Gambar 2.2	Skala Deskriptif Verbal (VDS)	27
Gambar 2.3	Skala Numerik (<i>Numeric Rating Scale, NRS</i>)	28
Gambar 2.4	Skala Wajah <i>Work Bekers</i>	28
Gambar 2.5	Skala Analog Visual (VAS)	28
Gambar 2.6	Respon Inflamasi Sendi	31
Gambar 2.7	Penyempitan Rongga Sendi	31
Gambar 2.8	Peregangan Betis	41
Gambar 2.9	Ringkasan Peregangan untuk Kaki dan Pergelangan Kaki	44
Gambar 2.10	Variasi Posisi Kaki dan Lutut di Tekuk	44
Gambar 2.11	Kerangka Konsep Penelitian	45
Gambar 2.12	Kerangka Kerja	46
Gambar 4.13	Grafik rata-rata Persesi Latihan	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Responden
- Lampiran 2 : *Informed Consent*
- Lampiran 3 : Lembar Kuesioner
- Lampiran 4 : Skala Nyeri Dengan Skala Numerik 0 Sampai 10
- Lampiran 5 : Format Observasi Nyeri Sebelum Intervensi *Stretching*
- Lampiran 6 : Format Observasi Nyeri Sesudah Intervensi *Stretching*
- Lampiran 7 : Master Tabel
- Lampiran 8 : Hasil Olah Data Menggunakan SPSS
- Lampiran 9 : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data
- Lampiran 10 : Surat Permohonan Izin Penelitian UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 11 : Surat Izin Penelitian BKPMMD Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari PSTW Gau Mabaji di Kabupaten Gowa.
- Lampiran 13 : Lembar Persetujuan Seminar Proposal
- Lampiran 14 : Undangan Seminar Proposal
- Lampiran 15 : Lembar Persetujuan Seminar Hasil
- Lampiran 16 : Undangan Seminar Hasil
- Lampiran 17 : Lembar Persetujuan Seminar Tutup
- Lampiran 18 : SK Penguji Ujian Munaqasha
- Lampiran 19 : Undangan Seminar Tutup

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Asiah
Nim : 70300110070
Judul Penelitian : Pengaruh Latihan Gerak Kaki (*Stretching*)
Terhadap Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas
Bawah Pada Lansia di Panti Sosial Tresna
Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Nyeri adalah salah satu di antara keluhan utama yang menggerakkan seseorang untuk datang pada pelayanan kesehatan. Menua adalah proses alami yang dialami oleh setiap makhluk hidup. Proses mencakup beberapa perubahan seperti fisiologis, psikologi, sosial dan status spiritual. Perubahan fisiologis pada sistem muskuloskeletal salah satu penyebabnya adalah nyeri sendi. Ada beberapa cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan latihan gerak kaki (*stretching*).

Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pre ekperimental design* dengan rancangan *one grup pre test-post test design*. Sampel pada penelitian ini berjumlah 20 orang dan teknik sampling *purposive sampling*. Data diambil dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Variabelnya yaitu yang mengalami nyeri sendi ekstremitas bawah. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji *paired t-test* dengan taraf signifikan $p \leq 0,05$ hasil menunjukkan terjadi penurunan nyeri sendi setelah pemberian latihan gerak (*stretching*).

Kesimpulan bahwa *stretching* mengurangi nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia. Dengan adanya penurunan nyeri sendi tersebut maka lansia dapat menjadi lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar ruang lingkup penelitiannya lebih mendalam lagi untuk hasil yang lebih akurat dengan melibatkan sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih panjang dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nyeri adalah salah satu di antara keluhan utama yang menggerakkan seseorang untuk datang pada pelayanan kesehatan. Nyeri merupakan masalah kesehatan yang kompleks. Nyeri dapat mengenai semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, umur, ras, status sosial, dan pekerjaan. Nyeri adalah sensasi yang sangat tidak menyenangkan dan sangat individual yang tidak dapat dibagi dengan orang lain.

Letak anatomis utama munculnya keluhan nyeri terbanyak menurut penelitian F. Wolf (1995), 98% kasus nyeri berasal dari muskuloskeletal dan salah satunya adalah nyeri sendi pada ekstremitas bawah. Nyeri sendi yang paling banyak adalah pada sendi-sendi penahan berat tubuh (panggul, lutut dan kaki) (Nugroho, 2000).

Nyeri merupakan faktor utama yang menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan dan menghambat kemampuan serta keinginan individu untuk beraktivitas. Maka dari itu, individu yang mengalami nyeri akan mencari upaya untuk menghilangkan nyeri dan mengembalikan kenyamanan tersebut dengan mencari pengobatan dan perawatan kesehatan. Salah satu upaya untuk mengatasi nyeri sendi terutama ekstremitas bawah adalah latihan gerak kaki (*stretching*). Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan oleh *The New England of Journal*

of Medicine (2006) yang dimuat dalam Penelitian Mahasiswa keperawatan di Denpasar (2012), mengemukakan bahwa hal yang terbaik dilakukan untuk nyeri sendi adalah latihan *stretching* daripada tindakan pembedahan, apalagi dilakukan dengan rutin akan membuat aktivitas normal kembali. Penelitian oleh Yohanita Pamungkas (2010) yang berdasarkan hasil penelitiannya mengatakan ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Posyandu Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri.

Latihan gerak kaki (*stretching*) dapat dilakukan sebagai penanganan segera untuk nyeri sendi ekstremitas bawah. Latihan ini meningkatkan fleksibilitas (kelenturan) otot dan jangkauan gerakan persendian. Latihan *stretching* juga merupakan tindakan yang sangat praktis dan dapat diaplikasikan dengan mudah. Melakukan *stretching* sederhana setiap hari dapat mengatur nyeri sendi menuju pemulihan dengan biaya yang tidak banyak seperti yang dikemukakan dalam sebuah *Journal Watch General Magazine* (2012) yang dimuat dalam Penelitian Mahasiswa keperawatan Denpasar (2012).

Proses menua (*aging*) merupakan proses yang terus-menerus (berlanjut secara alamiah) yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua makhluk hidup (Nugroho, 2008). Perubahan-perubahan akan terjadi pada tubuh manusia sejalan dengan makin meningkatnya usia. Perubahan fisiologis yang terjadi pada lansia yang mengenai sistem muskuloskeletal, yaitu rasa nyeri sendi pada ekstremitas bawah adalah keluhan yang paling sering muncul pada lansia (Taslim, 2009).

Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai jumlah penduduk lanjut usia mencapai 18,1 juta jiwa atau 9,6 persen dari jumlah penduduk (Kemenko Kesra, 2010). Dan menurut proyeksi Bappenas jumlah penduduk lansia 60 tahun atau lebih akan meningkat dari 18,1 juta tahun 2010 menjadi dua kali lipat (36 juta) pada tahun 2025.

Berdasarkan data BPS tahun 2009, jumlah total lansia di Sulawesi Selatan adalah 721.353 jiwa (9,19 persen dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan). Sedangkan yang tergolong lansia di kota Makassar dengan jumlah lansia sebanyak 79.581 jiwa dan jumlah lansia di Kabupaten Gowa mencapai 49.030 jiwa (Subhan Kadir, 2013).

Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 juga menunjukkan pola penyakit pada lansia yang terbanyak adalah gangguan sendi kemudian diikuti oleh hipertensi, katarak, stroke, gangguan mental emosional, penyakit jantung dan diabetes mellitus, yang merupakan penyebab kematian pada umur 65 tahun ke atas. Adapun data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah Kejadian reumatik yang merupakan salah satu penyakit akibat nyeri sendi utamanya yang berada pada kelompok usia lanjut sebanyak 650 jiwa dari 1.248.436 jiwa usia lanjut di kota Makassar (Arbianto, 2013).

Data yang diperoleh dari Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa 2014 bahwa sebagian besar lansia yang berjumlah 100 orang, 39 lansia laki-laki dan 61 lansia perempuan di Panti Tresna Werdha. Menurut penelitian Sartika (2011) di dapatkan jumlah lansia yang menderita nyeri sendi yaitu sekitar

33 orang (33,3%) dari 100 penghuni Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

Sekitar 80 persen lansia mengalami kondisi kronis yang dihubungkan dengan nyeri (Stanyley, 2007), dan hampir 8 persen orang-orang yang berusia 50 tahun ke atas mempunyai keluhan pada sendinya, misalnya linu, pegal, dan kadang-kadang terasa seperti nyeri. Bagian yang terkena biasanya ialah persendian pada jari-jari, tulang punggung, sendi-sendi penahan berat tubuh (panggul, lutut, dan kaki) (Nugroho, 2006). Beberapa kelainan akibat perubahan sendi yang banyak terjadi pada lansia antara lain osteoarthritis, arthritis reumatoid, dan arthritis gout. Kelainan ini dapat menimbulkan gangguan berupa rasa nyeri, bengkak, kekakuan sendi, keterbatasan luas gerak sendi, gangguan berjalan dan aktivitas keseharian lainnya, dan peningkatan resiko jatuh.

Anjuran untuk selalu memperhatikan, menghormati dan memuliakan lansia termuat dalam Q.S Maryam/19: 14.

عَصِيًّا جَبَّارًا يَكُنْ وَلَمْ يُولَدِ لَهُ وَبْرًا ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

“Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka.”

Dari ayat diatas mengemukakan bahwa sebagai anak harus menghormati orang tua. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua serta senantiasa merawat mereka jika usia lanjut menghampiri mereka sebagaimana mereka merawat kamu

sewaktu kecil hingga beranjak dewasa. Dan rawatlah mereka ketika mereka sudah tidak dapat beraktivitas lebih layaknya sewaktu mudahnya.

Sebagai perawat professional perlu mengetahui asuhan keperawatan yang dapat diberikan pada lanjut usia dengan nyeri sendi untuk mencegah cedera lebih lanjut, Upaya untuk mengatasi nyeri sendi pada lansia, dapat dilakukan dengan relaksasi. Salah satu teknik relaksasi yang digunakan adalah olahraga ringan seperti latihan gerak kaki (*stretching*).

Berdasarkan data dan uraian di atas tampak keluhan nyeri pada lansia merupakan masalah keperawatan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian adalah : “Bagaimana pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa ?.”

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1) Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

2) Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Latihan Gerak Kaki (*Stretching*)

Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) dalam penelitian ini adalah melakukan peregangan pada ekstremitas bawah dengan melakukan gerakan yang dapat menghasilkan tarikan pada sendi yang akan diregangkan lalu tahan posisi tersebut pada setiap gerakan ditahan selama 5 detik kalau responden masih mampu waktu untuk menahan gerakan ditambah selama 5 detik kalau tidak jangan lanjutkan tunggu sampai responden lain selesai untuk gerakan tersebut.

Kriteria Objektif :

Dilakukan dengan frekuensi 3 kali per minggu secara teratur dan terus-menerus selama 2 minggu. Selain itu, latihan gerak kaki (*Stretching*) dilakukan selama 15 sampai dengan 30 menit setiap intervensi.

2. Nyeri Sendi

Nyeri sendi yang dimaksud adalah merasa tidak nyaman ketika dipegang/nyeri, kaku, bengkak sampai keterbatasan gerak tubuh diakibatkan oleh kerusakan pada jaringan sendi. Skala yang dilakukan adalah Skala Numerik (*Numerical Rating Scale, NRS*).

Kriteia objektif:

Mengukur intensitas nyeri

Gambar 1.1 Skala Numerik (*Numerical Rating Scale, NRS*)



0 : Tidak Nyeri

1 –3 : Nyeri Ringan; secara objektif klien dapat berkomunikasi

4 – 6 : Nyeri Sedang; secara objektif klien mendesis, dapat mendeskripsikannya, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mengikuti perintah dengan baik.

7 – 9 : Nyeri Hebat; secara objektif klien terkadang tidak dapat

Mengikuti perintah tapi masih respon terhadap

tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri.

10 : Nyeri Paling Hebat; pasien tidak mampu lagi berkomunikasi.

Alat Ukur : Format Observasi

Skala ukur : Ordinal

E. Kajian Pustaka

Saat ini, nyeri sendi diderita oleh banyak orang. Gaya hidup yang terlalu banyak mendiamkan tubuh mengakibatkan nyeri sendi dibagian tertentu. Misalnya pada lutut dan pergelangan kaki, hal tersebut dapat dialami oleh siapapun. Namun paling rentan pada usia lanjut, seperti lanjut usia yang diungkapkan dalam Jurnal Ilmiah Medikora Kesehatan Olahraga kesehatan (2010). Oleh sebab itu, dengan latihan gerak kaki (*stretching*) dapat menurunkan nyeri sendi terutama dibagian lutut dan pergelangan kaki. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanita Pamungkas (2010), menunjukkan bahwa latihan gerak kaki (*stretching*) berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Posyandu Lansia Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri. Hal ini dikarenakan setelah lansia melakukan latihan gerak kaki (*stretching*) secara benar dan teratur, otot-otot yang tegang akan berkurang dan mempertahankan atau meningkatkan kelenturan tubuh sehingga tubuh terasa lebih relaks. Selain itu rentang gerak lansia menjadi lebih luas sehingga membuat aktivitas yang berat menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan adanya penurunan rasa nyeri sendi

tersebut maka lansia lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman.

Berdasarkan sebuah studi yang dipublikasikan oleh *The New England of Journal of Medicine* (2006) yang dimuat dalam penelitian Mahasiswa Denpasar (2012), mengemukakan bahwa hal yang terbaik dilakukan untuk nyeri sendi adalah latihan *stretching* daripada tindakan pembedahan, apalagi dilakukan dengan rutin akan membuat aktivitas normal kembali. Melakukan *stretching* sederhana setiap hari dapat mengatur nyeri sendi menuju pemulihan dengan biaya yang tidak banyak.

Manfaat *stretching* untuk penurunan nyeri, juga di ungkapkan oleh Suprianto (2008) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa terdapat penurunan tingkat nyeri setelah melakukan latihan gerak pinggul (*stretching*) dimana Ho ditolak, dan Ha diterima. Dan perhitungan didapatkan ada pengaruh yang signifikan latihan gerak pinggul (*stretching*) terhadap tingkat nyeri punggung bawah di Sanggar Senam Bagas Desa Mangunrejo.

Dari Penelitian yang dilakukan oleh seorang Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Denpasar (2012), dari uji analisis data dapat dinyatakan terdapat pengaruh pemberian latihan peregangan (*stretching*) terhadap nyeri pada pasien *iskhialgia* di Praktik Pelayanan Keperawatan Latu Usada Abiansal, Badung, dapat menurunkan nyeri pada pasien *iskhialgia*.

Maka dari itu individu yang mengalami nyeri akan mencari upaya untuk menghilangkan nyeri dan mengembalikan kenyamanan tersebut dengan mencari

pengobatan dan perawatan kesehatan. Salah satu upaya untuk mengatasi nyeri terutama nyeri sendi ekstremitas bawah adalah dengan latihan gerak kaki (*stretching*)

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah diketahuinya pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya nyeri sendi sebelum diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
- b. Diketahuinya nyeri sendi setelah diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
- c. Diketahuinya pengaruh pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Proses penelitian ini merupakan pengalaman ilmiah yang berharga dan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Dapat dijadikan sebagai referensi atau sumber informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dan bahan bacaan bagi mahasiswa.

3. Bagi Instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia khususnya di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa.

4. Bagi Profesi Keperawatan

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat tentang pengaruh pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lansia

1. Definisi lansia

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada BAB pasal 1 ayat 2 "lanjut usia (*old age*) adalah seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun ke atas."

Menurut Bustan M.N (2007) lanjut usia atau manusia usia lanjut (manula), adalah kelompok berumur tua. Golongan penduduk yang mendapat perhatian atau pengelompokan tersendiri ini adalah populasi berumur 60 tahun atau lebih.

Menurut Costantinides (1994), menua (menjadi tua) adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya sehingga tidak dapat bertahan terhadap infeksi dan memperbaiki kerusakan yang diderita (Potter & Perry, 2006).

2. Batas-batas lanjut usia

Umur yang dijadikan patokan sebagai lanjut usia berbeda-beda, umumnya berkisar antara 60 sampai 65 tahun. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan umur yaitu :

- a. Menurut *World Health Organization* (WHO), usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria berikut: usia pertengahan (*middle age*) ialah

kelompok usia 45 sampai 59 tahun, lanjut usia (*elderly*) ialah antara 60 dan 74 tahun, lanjut usia tua (*old*) ialah antara 75 dan 90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.

- b. Menurut Dra. Ny. Jos Masdani (Psikolog UI) terdapat empat fase yaitu: fase inventus usia antara 25 sampai 40 tahun, fase fertilitas usia antara 40 sampai 50 tahun, fase prasenium usia antara 55 sampai 65 tahun, dan fase senium usia antara 65 tahun hingga tutup usia.
 - c. Menurut Prof. DR. Koesoemanto Setyonegoro, masa lanjut usia (*geriatric age*): lebih dari 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (*geriatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu usia 70 sampai 75 tahun (*young old*), usia 70 sampai 80 tahun (*old*), dan Usia lebih dari 80 tahun (*very old*).
3. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia

Adapun perubahan yang terjadi pada lanjut usia adalah :

- a. Perubahan Fisik dalam hal ini Sistem muskuloskeletal

Perubahan normal muskuloskeletal terkait usia lanjut termasuk penurunan tinggi badan, redistribusi massa otot dan lemak subkutan, peningkatan porositas tulang, atrofi otot, pergerakan yang lambat, pengurangan kekuatan, dan kekakuan sendi-sendi (Stanley, 2007). Perubahan pada tulang, otot, dan sendi mengakibatkan terjadinya perubahan penampilan, kelemahan, dan lambatnya pergerakan yang menyertai penuaan.

Kekuatan muskular mulai merosot sekitar usia 40 tahun, dengan suatu kemunduran yang dipercepat setelah usia 60 tahun. Perlambatan pergerakan yang kurang aktif dihubungkan dengan perpanjangan waktu kontraksi otot, periode laten, periode relaksasi dari unit motor dalam jaringan otot. Sendi-sendi seperti pinggul, lutut, siku, pergelangan tangan, dan vertebra menjadi sedikit fleksi pada usia lanjut. Peningkatan fleksi disebabkan oleh perubahan dalam kolumnavertebralis, ankilosis (kekakuan) ligament dan sendi, penyusutan dan sklerosis tendon dan otot, dan perubahan degeneratif sistem ekstrapiramidal.

b. Perubahan Mental

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari empat aspek yaitu fisik, psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Berkurangnya penampilan, persepsi dan keterampilan psikomotor (Nugroho, 2008).

c. Perubahan Psikososial

Perubahan sosialisasi karena produktivitas menurun, berkurangnya kesibukan sosial, kehilangan finansial, status, teman atau relasi, pekerjaan atau kegiatan.

4. Penyakit yang umum yang terjadi pada lanjut usia

Menurut Stieglitz (1945) yang dikutip dalam Buku Keperawatan Gerontik mengemukakan adanya empat penyakit yang sangat erat hubungannya dengan proses menua, yakni:

- a. Gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi, kelainan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak dan ginjal.
- b. Gangguan metabolisme hormonal, seperti diabetes melitus, dan ketidakseimbangan tiroid.
- c. Gangguan pada persendian, seperti osteoarthritis dan gout arthritis.
- d. Berbagai penyakit neoplasma.

Di Indonesia penyakit yang sering dijumpai pada lansia meliputi; penyakit sistem persyarafan, penyakit kardiovaskuler dan pembuluh darah, penyakit pencernaan makanan, penyakit urogenital, penyakit gangguan metabolik, penyakit persendian dan tulang, dan penyakit-penyakit akibat keganasan (Nugroho, 2008).

5. Pandangan islam tentang lanjut usia

Seperti halnya masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Ini adalah tugas yang harus dijalankan oleh perawat. Lansia adalah orang tua yang harus dirawat, dihormati, dan dimuliakan. Hal ini sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam syariat Islam.

Seperti yang disebutkan dalam Q.S Al-Isra'/17: 23-24.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
 أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ ﴾

Terjemahnya:

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia(23).”
 “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil (24).”

Dari ayat diatas mengingatkan bahwa kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana pada saat kita masih bayi hingga dewasa, orang tua dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya. Dan hingga kita beranjak dewasa kasih sayangnya tiada batas apapun. Dan merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak untuk merawat dan menghormati orang tuanya tatkala mereka menginjak usia lanjut.

Menua merupakan proses yang terus-menerus yang berlanjut secara alamiah yang dimulai sejak lahir dan umumnya dialami oleh semua

mahluk hidup. Terutama ibu, kita harus berbakti sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ
أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أُمُّكَ، قَالَ ثُمَّ مَنْ، قَالَ أَبُوكَ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, beliau berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihiwasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihiwasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”

Imam Al-Qurthubi menjelaskan, “Hadits tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu, harus tiga kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi SAW menyebutkan kata ibu sebanyak tiga kali, sementara kata ayah hanya satu kali. Bila hal itu sudah kita mengerti, realitas lain bisa menguatkan pengertian tersebut. Karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak, hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Ada banyak bukti, bahwa berbakti kepada kedua orang tua dalam wacana Islam adalah persoalan utama, dalam jejeran hukum-hukum yang terkait dengan berbuat baik terhadap sesama manusia. Allah SWT sudah cukup

menegaskan wacana ‘berbakti’ itu, dalam banyak firman-Nya, demikian juga Rasulullah SAW dalam banyak sabdanya, dengan memberikan ‘bingkai-bingkai’ khusus, agar dapat diperhatikan secara lebih saksama.

Dijelaskan mengenai menua dalam Q.S yasin/36: 68.

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

“Dan barang siapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya), maka apakah mereka tidak memikirkan ?.”

Allah telah menjelaskan dalam surah Yasin ayat 68 bahwa siapa yang dipanjangkan umurnya sampai usia lanjut akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Keadaan itu ditandai dengan rambut yang memulai memutih, penglihatan mulai kabur, pendengaran sayup-sayup, gigi mulai berguguran, kulit mulai keriput, langkahpun mulai gontai. Ini adalah sunnatullah yang tidak bisa ditolak oleh siapapun (Fadhil, 2013).

B. Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah

1. Definisi nyeri

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. (Hidayat, 2006).

Menurut Mc. Caffery (1979) dikutip dalam buku konsep & penatalaksanaan nyeri (Tamsuri, 2006), nyeri didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang, dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya. Menurut Asosiasi Nyeri Internasional (1979) disebutkan bahwa nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan baik secara aktual, maupun potensial, atau menggambarkan keadaan kerusakan seperti tersebut di atas.

2. Fisiologi nyeri

Pathways Nyeri

Rangkaian proses terjadinya nyeri diawali dengan tahap *transduksi*, di mana hal ini terjadi ketika nosiseptor yang terletak pada bagian perifer tubuh distimulasi oleh berbagai stimulus, seperti faktor biologis, mekanis, listrik, radiasi, thermal dan lain-lain. Serabut saraf tertentu bereaksi atas stimulus tertentu, sebagaimana juga telah disebutkan dalam klasifikasi reseptor sebelumnya.

Fast pain dicetuskan oleh reseptor tipe mekanis atau thermal (yaitu serabut saraf A-Delta), sedangkan *slow pain* (nyeri lambat) biasanya dicetuskan oleh serabut saraf C. Serabut saraf A-delta mempunyai karakteristik menghantarkan nyeri dengan cepat serta bermielinasi, dan serabut C yang tidak bermielinasi, berukuran sangat kecil dan bersifat lambat dalam menghantarkan nyeri. Serabut A mengirim sensasi yang tajam, terlokalisasi, dan jelas dalam melokalisasi sumber nyeri dan

mendeteksi intensitas nyeri. Serabut C menyampaikan impuls yang tidak terlokalisasi (bersifat difusi), viseral dan terus menerus.

Serabut A-Delta	Serabut C
Bermielinasi	Tidak bermielinasi
Diameter 2-5 mikrometer	Diameter 0,4-12,2 mikrometer
Kecepatan hantaran 12-39 m/dt	Kecepatan hantar 0,5-2 m/dt
Menyalurkan impuls yang bersifat tajam, menusuk, terlokalisasi dan jelas	Menyalurkan impuls nyeri yang bersifat tidak terlokalisasi, viseral dan terus menerus.


Tabel 2.1 Perbedaan Serabut Saraf A-Delta dan C

Tahap selanjutnya adalah *transmisi*, dimana impuls nyeri kemudian ditransmisikan serat afferen (A-delta dan C) ke medulla spinalis melalui dorsal horn, di mana disini impuls akan bersinapsis di substansia gelatinosa (lamina II dan III). Impuls kemudian menyeberang keatas melewati traktus spinothalamus anterior dan lateral. Beberapa impuls yang melewati traktus spinothalamus lateral diteruskan langsung ke thalamus tanpa singgah di formation retikularis membawa impuls *fast pain*. Di bagian thalamus dan korteks serebri inilah individu kemudia dapat mempersepsikan, menggambarkan, melokalisasi, menginteroretasikan dan mulai berespon terhadap nyeri.

Beberapa impuls nyeri ditransmisikan melalui traktus paleospinothalamus pada bagian tengah medulla spinalis. Impuls ini memasuki formation retikularis dan sistem limbik yang mengatur perilaku emosi dan kognitif, serta integrasi dari sistem saraf otonom, *slow pain* yang terjadi akan mengakibatkan emosi, sehingga timbul respon terkejut,

marah, cemas, tekanan darah meningkat, keluar keringat dingin dan jantung berdebar-debar.

Secara singkat proses terjadinya nyeri dapat dilihat pada gambar.



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Nyeri

3. Klasifikasi nyeri

a. Nyeri akut

Nyeri akut terjadi setelah terjadinya cedera akut, penyakit, atau intervensi bedah dan memiliki awitan yang cepat dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat) dan berlangsung untuk waktu singkat (Meinhart & McCaffery, 1983 yang dikutip oleh Prasetyo, 2010). Nyeri akut berdurasi singkat (kurang dari 6 bulan), memiliki onset yang tiba-tiba, dan terlokalisir. Nyeri ini biasanya diakibatkan oleh trauma, bedah, atau inflamasi. Nyeri akut terkadang disertai oleh aktivasi sistem saraf simpatis yang akan memperlihatkan gejala-gejala seperti: peningkatan tekanan darah, peningkatan respirasi, peningkatan denyut jantung, dan dilatasi pupil.

b. Nyeri kronis

Nyeri kronis berlangsung lebih lama dari pada nyeri akut, intensitas bervariasi (ringan sampai berat) dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan. Tanda dan gejala yang tampak pada nyeri kronis sangat berbeda dengan yang diperlihatkan oleh nyeri akut. Tanda-tanda vital seringkali dalam batas normal dan tidak disertai dengan dilatasi pupil. (Prasetyo, 2010).

c. Nyeri Kutaneus/ *superficial* (*cutaneous pain*)

Ada dua macam bentuk nyeri *superficial*, bentuk yang pertama adalah nyeri dengan onset yang tiba-tiba dan mempunyai kualitas yang tajam, dan bentuk kedua adalah nyeri dengan onset yang lambat

disertai rasa terbakar. Nyeri *superficial* dapat dirasakan pada seluruh permukaan tubuh atau kulit klien (Prasetyo, 2010).

d. Nyeri somatik dalam (*deep somatic pain*)

Nyeri somatis merupakan fenomena nyeri yang kompleks. Struktur somatik merupakan bagian pada tubuh seperti otot-otot atau tulang (Prasetyo, 2010).

e. Nyeri visceral

Nyeri visceral cenderung bersifat difus (dirasakan menyebar), sulit untuk dilokalisir, samar-samar, dan bersifat tumpul.

f. *Reffered pain*

Nyeri ini dapat diakibatkan dari gangguan organ visceral atau lesi pada bagian somatik dalam (missal: otot, ligament, vertebra). *Reffered pain* terkadang “aneh” ketika *reffered pain* dirasakan oleh klien dengan sangat, padahal mungkin pada titik nyeri sebenarnya hanya merupakan stimulus nyeri yang ringan bahkan tidak ada.

g. Nyeri psikogenik

Nyeri psikogenik disebut juga *psychalgia* atau nyeri somatoform, adalah nyeri yang tidak diketahui secara fisik, nyeri ini biasanya timbul karena pengaruh psikologis, mental, emosional atau faktor perilaku.

4. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan reaksi terhadap nyeri

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dan reaksi masing-masing individu terhadap nyeri. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Usia

Usia merupakan variabel yang penting mempengaruhi nyeri, khususnya pada anak-anak dan lansia. Cara lansia berespon terhadap nyeri dapat berbeda dengan cara berespon dengan orang yang berusia lebih muda. Namun individu yang berusia lanjut memiliki resiko tinggi mengalami situasi-situasi yang membuat mereka merasakan nyeri. Karena lansia hidup lebih lama, mereka kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kondisi patologis yang menyertai nyeri.

b. Jenis kelamin

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam berespon terhadap nyeri. Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi jenis kelamin, misalnya menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, sedangkan seorang anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama (Gill, 1990).

c. Kebudayaan

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana

bereaksi terhadap nyeri. Cara individu mengepresikan nyeri merupakan sifat kebudayaan.

d. Makna nyeri

Makna nyeri pada seseorang memengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri.

e. Lokasi dan tingkat keparahan nyeri

Nyeri yang dirasakan bervariasi dalam intensitas dan tingkat keparahan pada masing-masing individu. Nyeri yang dirasakan mungkin terasa ringan, sedang atau biasa jadi nyeri berat. Dalam kaitannya dengan kualitas nyeri, masing-masing individu juga bervariasi, ada yang melaporkan nyeri seperti tertusuk, nyeri tumpul, berdenyut, terbakar, dan lain-lain.

f. Perhatian

Tingkat perhatian seseorang terhadap nyeri akan mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat terhadap nyeri akan meningkatkan respon nyeri sedangkan upaya pengalihan (distraksi) dihubungkan dengan penurunan respon nyeri. Konsep inilah yang mendasari berbagai terapi untuk menghilangkan nyeri, seperti relaksasi, teknik imajinasi terbimbing, dan masase (Gill, 1990).

g. *Ansietas* (kecemasan)

Hubungan antara nyeri dan kecemasan bersifat kompleks. Kecemasan seringkali meningkatkan persepsi nyeri, akan tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan kecemasan.

h. Keletihan

Keletihan/ kelelahan yang dirasakan seseorang akan meningkatkan sensasi nyeri dan menurunkan kemampuan coping individu.

i. Pengalaman sebelumnya

Seseorang yang terbiasa merasakan nyeri akan lebih siap dan mudah mengantisipasi nyeri daripada individu yang mempunyai pengalaman sedikit tentang nyeri.

j. Dukungan keluarga dan sosial

Individu yang mengalami nyeri seringkali membutuhkan dukungan, bantuan, perlindungan dari anggota keluarga lain, atau teman terdekat. Walaupun nyeri masih dirasakan oleh klien, kehadiran orang terdekat akan meminimalkan kesepian dan ketakutan.

5. Pengkajian nyeri

Terdapat beberapa komponen yang harus diperhatikan seseorang di dalam memulai mengkaji respon nyeri yang dialami oleh klien. Donovan & Girton (1984) yang dikutip dalam Buku Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri (2010) mengidentifikasi komponen-komponen tersebut, diantaranya:

a. Penentuan ada tidaknya nyeri

Dalam melakukan pengkajian terhadap nyeri, perawat harus mempercayai ketika pasien melaporkan adanya nyeri, walaupun dalam observasi perawat tidak menemukan adanya cedera atau luka. Setiap nyeri yang dilaporkan oleh klien adalah nyata.

b. Karakteristik nyeri (Metode P. Q. R. S.T)

1) Faktor pencetus (P: *Provocate*)

Perawat mengkaji tentang penyebab atau stimulus-stimulus nyeri pada klien, dalam hal ini dapat melakukan observasi bagian-bagian tubuh yang mengalami cedera.

2) Kualitas (Q: *Quality*)

Kualitas nyeri merupakan sesuatu yang subjektif yang diungkapkan oleh klien, seringkali klien mendeskripsikan nyeri dengan kalimat-kalimat: tajam, tumpul, berdenyut, berpindah-pindah, seperti tertindih, perih, tertusuk dan lain-lain.

3) Lokasi (R: *Region*)

Untuk mengkaji lokasi nyeri maka perawat meminta klien untuk menunjukkan semua bagian/daerah yang dirasakan tidak nyaman oleh klien.

4) Keparahan (S: *Severe*)

Tingkat keparahan nyeri merupakan karakteristik yang paling subjektif. Pada pengkajian ini klien diminta menggambarkan nyeri yang ia rasakan sebagai nyeri ringan, nyeri sedang atau berat.


Ada beberapa metode yang umumnya digunakan untuk menilai intensitas nyeri, antara lain:

a) Skala Deskriptif Verbal (*Verbal Descriptor Scale, VDS*)

merupakan salah satu alat ukur tingkat keparahan yang lebih bersifat objektif. Skala Deskriptif Verbal terdiri dari beberapa

kalimat pendeskripsi yang tersusun dalam jarak yang sama sepanjang garis.

Gambar 2.2 Skala Deskriptif Verbal (*Verbal Descriptor Scale, VDS*)



- b) Skala Numerik (*Numerical Rating Scale, NRS*) digunakan sebagai pengganti alat pendeskripsi kata. Dalam hal ini, pasien menilai nyeri dengan skala 0 sampai 10 (AHCPR, 1992). Angka 0 diartikan kondisi klien tidak merasakan nyeri, angka 10 mengindikasikan nyeri paling hebat. Skala ini efektif digunakan untuk mengkaji intensitas nyeri sebelum dan sesudah intervensi terapeutik.

Gambar 2.3 Skala Numerik (*Numerical Rating Scale, NRS*)



- c) Skala wajah Wong-Bekers untuk mengukur nyeri

Metode ini dengan cara melihat mimik wajah pasien dan biasanya untuk menilai intensitas nyeri pada anak-anak.

Gambar 2.4 Skala wajah Wong-Bekers untuk mengukur nyeri



- d) Skala Analog Visual (*Visual Analog Scale*, VAS) merupakan suatu garis lurus, yang mewakili intensitas nyeri yang terus menerus dan memiliki alat pendeskripsi verbal pada setiap ujungnya.

Gambar 2.5 Skala Analog Visual (*Visual Analog Scale*, VAS)



5) Durasi (T: Time)

Perawat menanyakan pada pasien untuk menentukan awitan, durasi, dan rangkaian nyeri.

6. Nyeri sendi pada lanjut usia

a. Definisi nyeri sendi

Nyeri sendi adalah suatu peradangan sendi yang ditandai dengan pembengkakan sendi, warna kemerahan, panas, nyeri dan terjadinya gangguan gerak. Pada keadaan ini lansia sangat terganggu, apabila lebih dari satu sendi yang terserang (Santoso, 2009).


Nyeri sendi merupakan keluhan utama pasien reumatik. Nyeri yang dirasakan berlangsung lama/kronik dan menetap rasa sakit biasanya digambarkan sebagai rasa sakit yang berat dan membatasi mobilitas. Nyeri pada malam hari dan meningkat pada pagi hari terutama dirasakan sebagai suatu regangan, merupakan nyeri akibat peninggian tekanan intraartikuler akibat suatu nekrosisavaskuler atau kolaps tulang akibat reumatik yang berat (Suyono S., Waspadji, S., Lesman, L., et al, 2001).

Pada awalnya, nyeri terjadi bersama gerakan, kemudian nyeri dapat terjadi pada saat istirahat. Peningkatan rasa nyeri diiringi oleh kehilangan fungsi secara progresif. Keseluruhan koordinasi dan postur tubuh mungkin terpengaruh sebagai hasil dari nyeri dan hilangnya mobilitas. Kaku sendi merupakan rasa seperti diikat, pasien merasa sukar untuk menggerakkan sendi (*worn off*). Keadaan ini biasa akibat desakan cairan yang berada disekitar jaringan yang mengalami inflamasi, kaku sendi makin nyata pada pagi hari atau setelah istirahat. Gangguan fungsional disebabkan oleh rasa nyeri ketika sendi digerakkan dan keterbatasan gerak yang terjadi akibat perubahan structural dalam sendi (Reeves, C.J., Roux, G., Lockhart, R, 1999).

b. Patofisiologi kerusakan nyeri sendi

Tulang-tulang dalam tubuh dihubungkan satu sama lain dengan sendi atau artikulasi yang memungkinkan berbagai macam gerakan. Hubungan anantara dua tulang atau lebih dinamakan sendi (Smeltzer, 2001). Sendi merupakan bagian tubuh yang paling sering terkena inflamasi dan degenerasi yang terlihat pada lansia. Meskipun memiliki keanekaragaman mulai dari kelainan multisistem yang sistemik, semua nyeri sendi meliputi inflamasi dan degenerasi dalam derajat tertentu yang biasa terjadi sekaligus. Pada penyakit reumatik inflamatori, inflamasi merupakan proses primer dan degenerasi yang terjadi proses sekunder yang timbul akibat pembentukan pannus. Sebaliknya, pada penyakit reumatik degeneratif dapat terjadi proses inflamasi yang

sekunder. Sinovitis biasanya lebih ringan serta menggambarkan suatu proses reaktif, dan lebih besar terlihat pada penyakit yang lanjut (Smeltzer& Bare, 2001).



Gambar 2.6 Respon inflamasi pada sendi (A) sendi pada gambar sebelah kiri mengalami pembengkakan dan penumpukan cairan. (B) sendi pada sebelah kanan memperlihatkan pannus, kartilago artikuler yang erosive dan penyempitan rongga sendi semua ini turut menyebabkan atrofi otot dan ankilosis (Smeltzer dan Bare, 1996).



Gambar 2.7 penyempitan rongga sendi dan asteofit (bone spurs) merupakan ciri khas perubahan degeneratif dalam sendi (Smeltzer dan Bare, 1996).

7. Penatalaksanaan nyeri sendi

Sampai sekarang belum ada obat yang spesifik yang khas untuk nyeri sendi. Program penanganan melibatkan tim multidisiplin termasuk pasien sendiri merupakan dasar bagi penatalaksanaan nyeri sendi. Sifat kronik pada sebagian besar penyakit ini mengharuskan pasien untuk memahaminya, mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terbaik secara mandiri berkenaan dengan penanganan penyakit dan memperoleh program terapi yang dapat disesuaikan dengan gaya hidupnya (Smeltzer & Bare, 2001).

Terdapat berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri yang diderita. Tindakan-tindakan tersebut mencakup tindakan nonfarmakologis dan tindakan farmakologis. Terdapat tiga kategori tindakan yang digunakan untuk mengontrol nyeri, yaitu: tindakan farmakologis, *non-invasif* dan tindakan *invasif* (Prasetyo, 2010).

Penatalaksanaan nyeri secara farmakologis meliputi penggunaan opioid (narkotik), nonopioid/NSAIDs (*Nonsteroid Anti-Inflammation Drugs*), dan adjuvan, serta ko-analgesik (Tamsuri, 2006).

Penatalaksanaan nonfarmakologis terdiri dari berbagai tindakan penanganan nyeri berdasarkan stimulasi fisik maupun perilaku kognitif. Penanganan nyeri dengan tindakan fisik dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: meningkatkan kenyamanan, memperbaiki adanya disfungsi fisik, merubah respons fisiologik, menurunkan kecemasan yang berhubungan

dengan imobilitas karena nyeri atau karena adanya pembatasan aktivitas (Tamsuri, 2006).

Adapun jenis penanganan nyeri secara invasif (nonfarmakologis) antara lain:

a. Masase kulit

Masase kulit memberikan efek penurunan kecemasan dan ketegangan otot. Rangsangan masase ini dipercaya akan merangsang serabut berdiameter besar, sehingga mampu memblok atau menurunkan impuls nyeri.

b. Kompres

Penggunaan kompres panas, selain memberikan efek mengatasi atau menghilangkan sensasi nyeri, teknik ini juga memberikan reaksi fisiologis antara lain: meningkatkan respons inflamasi, meningkatkan aliran darah dalam jaringan, meningkatkan pembentukan edema (Tamsuri, 2006).

c. Stimulasi Kontralateral

Stimulasi kontralateral adalah memberi stimulasi pada daerah kulit di sisi yang berlawanan dari daerah terjadinya nyeri. Stimulasi kontralateral dapat berupa garukan pada daerah yang berlawanan jika terjadi gatal, menggosok (masase) jika kram (kejang) atau pemberian kompres dingin atau panas serta pemberian balsem atau obat gosok (Tamsuri, 2006).

d. *Akupressure* (pijat refleksi)

Akupressure dikembangkan dari ilmu pengobatan kuno Cina dengan menggunakan sistem akupuntur. Terapi ini memberi tekanan jari-jari pada berbagai titik organ tubuh seperti pada akupuntur. Tindakan ini merupakan tindakan sederhana dan mudah dipelajari (Tamsuri, 2008).

e. *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS)

Stimulasi saraf elektritranskutan unit peralatan yang dijalankan dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, gataran, atau mendengung pada area kulit tertentu.

f. Imobilisasi

Imobilisasi terhadap organ tubuh yang mengalami nyeri hebat mungkin dapat meredakan nyeri. Kasus seperti arthritis reumatoid mungkin memerlukan teknik untuk mengatasi nyeri.

g. Distraksi

Distraksi adalah pengalihan dari fokus perhatian terhadap nyeri ke stimulus yang lain. Macam-macam distraksi yaitu distraksi visual, distraksi pendengaran, distraksi intelektual, tekik pernapasan, dan imajinasi terbimbing.

h. Relaksasi

Relaksasi adalah suatu tindakan untuk membebaskan mental dan fisik dari ketegangan dan stress, sehingga dapat meningkatkan

toleransi terhadap nyeri. Berbagai metode relaksasi digunakan untuk menurunkan kecemasan dan ketegangan otot sehingga didapatkan penurunan denyut jantung, penurunan respirasi serta penurunan ketegangan otot. Contoh tindakan relaksasi yang dapat dilakukan untuk menurunkan nyeri adalah napas dalam dan relaksasi otot. Berikut prosedur napas dalam dan relaksasi otot yang dapat diajarkan pada klien:

Napas dalam

- 1) Anjurkan pasien untuk duduk relaks
- 2) Anjurkan klien untuk tarik napas dalam dengan pelan
- 3) Tahan beberapa detik, kemudian lepaskan (tiupkan lewat bibir).

Saat menghembuskan udara anjurkan klien untuk merasakan relaksasi.

Relaksasi otot

- 1) Anjurkan klien untuk mengepalkan tangan dan mintalah klien merasakan, biarkan ketegangan beberapa detik.
- 2) Mintalah klien untuk melepaskan kepala, dan relaks.
- 3) Lanjutkanlah tindakan yang sama pada beberapa otot (lengan, bahu, muka, kaki).

Latihan relaksasi progresif merupakan kombinasi latihan pernapasan dan rangkaian kontraksi serta relaksasi kelompok otot. Saat klien melakukan relaksasi pernapasan dalam dengan diafragma dengan teratur, perawat mengarahkan klien untuk melokalisasi daerah yang

mengalami ketegangan otot, merasakannya, menegangkan otot tersebut, kemudian mengendorkan dengan sepenuhnya (Prasetyo, 2010).

Relaksasi otot rangka dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan merelaksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa nyeri. Teknik relaksasi mungkin perlu diajarkan beberapa kali agar mencapai hasil yang optimal. Dengan relaksasi, dapat mengubah persepsi terhadap nyeri. Kemampuannya dalam melakukan relaksasi fisik dapat menyebabkan relaksasi mental. Relaksasi memberikan efek secara langsung terhadap fungsi tubuh seperti: penurunan tekanan darah, nadi, frekuensi pernapasan, penurunan konsumsi oksigen oleh tubuh, penurunan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan konsentrasi dan menurunkan perhatian terhadap stimulus lingkungan. (Tamsuri, 2008).

i. Umpan Balik Tubuh

Umpan balik tubuh adalah (*biofeedback*) adalah teknik mengatasi nyeri dengan memberikan informasi kepada klien tentang respon fisiologis tubuh terhadap nyeri yang di alami klien (misalnya, tekanan darah atau ketegangan otot) dan cara untuk mengendalikan secara involunter respons tersebut (Tamsuri, 2006).

j. Sentuhan Terapeutik

Teknik yang digunakan adalah perawat melakukan meditasi dalam waktu singkat sebelum kontak dengan klien. Pada periode ini,

perawat menyembunyikan tingkat energi internal, kemudian meraba klien dan mentransmisikan energi penyembuhan. Rasionalisasi keberhasilan metode ini dapat dimengerti dengan jelas (Tamsuri, 2006).

C. Peregangan (*Stretching*)

1. Definisi peregangan (*Stretching*)

Latihan peregangan (*Stretching*) adalah salah satu bentuk latihan yang merangsang kerja otot rangka yang salah satu aksinya adalah menghasilkan panas, dan pada saat otot berkontraksi energi kontraksi dipenuhi dari pemecahan ATP dan kegiatan kalsium yang cukup beroksigen sehingga nantinya dapat memperlancar sirkulasi darah sehingga mekanisme pengangkutan zat-zat yang terkandung dalam otot (asam laktat) berjalan lancar (Barbara C Long, 1998).

Peregangan atau *stretching* adalah aktivitas meregangkan otot untuk meningkatkan fleksibilitas (kelenturan) otot dan jangkauan gerakan persendian. Aktivitas peregangan merupakan bagian penting dari latihan olahraga atau program rehabilitasi. Peregangan membantu pemanasan tubuh sebelum melakukan aktivitas fisik sehingga mengurangi resiko kecelakaan dan nyeri otot.

2. Manfaat melakukan peregangan (*Stretching*)

Terdapat beberapa manfaat apabila seseorang melakukan gerakan peregangan sebelum memulai aktifitas olahraga, diantaranya dapat adalah

meningkatkan kelenturan (fleksibilitas), meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, mengurangi nyeri, meningkatkan kemampuan fisik, mempercepat pemulihan setelah berolahraga, meningkatkan produksi cairan sinovial persendian, dan meningkatkan kebugaran.

3. Teknik-teknik umum peregangan (*Stretching*)

Terdapat lima teknik peregangan (*stretching*), yaitu statis, balistik, PNF, terisolasi aktif, gerakan aktif. (Millar, 2003)

a. Peregangan Statis

Peregangan statis mungkin merupakan yang paling termudah dan paling bermanfaat untuk dilakukan. Teknik ini tidak hanya sederhana tetapi membuat nyaman dan tidak memerlukan bantuan dalam melakukannya. Peregangan statis dilakukan dengan menggerakkan tubuh ke posisi yang menurut dapat menghasilkan tarikan lembut pada otot yang akan diregangkan lalu tahan posisi tersebut. Saat otot terasa lentur, Anda dapat sedikit meregangkan lagi dan dengan peregangan teratur, gerakan akan semakin meningkat.

Peregangan yang paling efektif, yakni selama 30 detik dan pengulangan peregangan sebanyak 3-5 kali akan memberikan kemajuan luar biasa (Bandi, Irion, dan Briggler, 1998). Peregangan minimum dilakukan tiga kali seminggu, setelah program peregangan dihentikan, maka program harian akan membantu Anda mengurangi kekakuan.

b. Peregangan Balistik

Peregangan balistik menerapkan gerakan melompat berulang-ulang untuk terjadinya peregangan. Peregangan balistik dikenal sebagai peregangan buruk, karena sebagian besar merujuk pada teori bukan pada penelitian.

c. Teknik *Proprioceptive Neuromuscular Facilitation* (PNF)

Teknik *Proprioceptive Neuromuscular Facilitation* (PNF) adalah teknik yang memanfaatkan refleks sistem saraf untuk membantu melemaskan otot. Meskipun sangat efektif, peregangan ini memerlukan bantuan orang lain dan sangat bergantung pada teknik yang tepat (Sady, Wortman, dan Blake, 1962 dikutip oleh Millar, 2003).

d. Peregangan Terisolasi Aktif

Peregangan Terisolasi Aktif merupakan variasi yang relatif baru peregangan dengan bantuan orang lain yang semakin populer akhir-akhir ini. (Wharton dan Wharton, 1996 dikutip oleh Millar 2003).

e. Rentang Gerakan Aktif

Rentang gerakan aktif merupakan teknik kelenturan yang umumnya digunakan oleh ahli terapi fisik sebagai program pemulihan. Gerakan ini sebenarnya bukan merupakan metode peregangan, melainkan digunakan untuk meningkatkan gerak normal. Kegiatan ini

melibatkan penggunaan otot sekitar sendi untuk menggerakkan sendi tersebut dengan sempurna untuk rentang gerakan yang ada.

Latihan rentang gerak harus dilakukan 5-10 kali, tergantung pada kenyamanan (Kisner dan Colby, 2002). Karena aktivitas rentang gerakan bukan peregangan yang sebenarnya, aktivitas tersebut paling berguna untuk menjaga gerak normal dan mengurangi kekakuan pada sendi, sedangkan aktivitas sebelumnya sebenarnya dirancang untuk meningkatkan jangkauan gerakan sendi.

4. Petunjuk-petunjuk melakukan peregangan (*Stretching*)

Sebelum mulai melakukan program peregangan (*stretching*) harus memperhatikan petunjuk-petunjuk berikut ini:

- a. Selalu mengutamakan keselamatan dan menghindari cedera pada tubuh anda.
- b. Identifikasi tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapai dan realistis dalam melakukan peregangan.
- c. Tidak melakukan peregangan segera setelah makan.
- d. Mengenakan pakaian yang longgar dan nyaman.
- e. Sebaiknya menanggalkan perhiasan yang dipakai.
- f. Memilih tempat yang bersih dan tenang.
- g. Lakukan peregangan pada permukaan tempat yang tidak licin.

5. Prinsip dasar peregangan (*Stretching*)

Peregangan adalah hal yang harus dilakukan oleh siapa saja minimal 15 sampai 30 menit.(Ahmad, 2012).

6. Prosedur latihan gerak kaki (*Stretching*) untuk ekstremitas bawah

a. Peregangan betis

- 1) Mulai dengan pemanasan ringan selama 2 sampai 3 menit (berjalan di tempat sambil mengayun-ayunkan tangan ke depan dan belakang melewati tubuh bagian atas).
- 2) Pertama-tama, kita akan melakukan peregangan betis. Sandarkan kedua lengan bawah ke dinding atau benda lain sebagai tumpuan. Tempelkan dahi di punggung telapak tangan. Tekuk salah satu lutut dan dekatkan ke dinding atau sandaran. Kaki yang berada di belakang harus lurus, telapak kaki menempel di lantai serta mengarah lurus ke depan.



Gambar 2.8 Peregangan Betis


- 3) Sekarang tanpa mengubah posisi kaki, gerakkan perlahan-lahan pinggul Anda ke depan sambil menjaga kaki belakang tetap lurus dan telapak kaki menempel di lantai. Lakukan peregangan ringan di otot betis. Tahan regangan ringan selama 10 detik. Kemudian, beralih sedikit ke peregangan lanjutan selama 10 detik. Jangan sampai berlebihan. Kini lakukan peregangan pada betis yang lain.

b. Peregangan untuk Kaki dan Pergelangan Kaki:

- 1) Putar pergelangan kaki searah dan berlawanan jarum jam, dari satu sisi ke sisi yang lain, dengan sedikit ditahan oleh tangan. Gerakan memutar ini membantu meregangkan dengan lembut ligament pergelangan kaki yang kaku. Ulangi 10 sampai 20 kali untuk setiap arah. Lakukan pada kedua pergelangan dan rasakan jika ada perbedaan rasa kaku dan jangkauan gerak. Kadang-kadang pergelangan kaki yang keseleoakan terasa sedikit lebih lemah dan kaku. Perbedaan ini mungkin baru diketahui setelah menggerakkan tiap pergelangan secara terpisah dan membandingkan keduanya.
- 2) Selanjutnya, gunakan jari-jari tangan untuk menarik dengan lembut jari kaki ke arah tubuh untuk meregangkan ujung telapak kaki dan otot jari kaki. Tahan regangan ringan selama 10 detik. Ulangi 2 sampai 3 kali. Lakukan pada kedua kaki. Menahan posisi ini juga membantu merelaksakan telapak kaki (*plantar fascia*).
- 3) Letakkan jempol tangan di pangkal jempol kaki, telunjuk ditekek sedikit dan ditaruh di atas kuku jempol kaki. Gunakan telunjuk dan jempol tangan itu untuk menggerakkan jempol kaki maju mundur selama 15 sampai 20 detik, kemudian putar jempol kaki dengan gerakan melingkar searah jarum jam dan berlawanan jarum jam selama 10 sampai 15 detik. Pusatkan perhatian untuk meningkatkan jangkauan gerak jari –jari kaku saat melatih daerah

ini adalah cara yang bagus untuk memperbaiki atau mempertahankan kelenturan dan peredaran darah di daerah ini.

- 4) Dengan jempol, pijat naik turun lengkung membujur ditelapak kaki. Lakukan gerak melingkar dengan sedikit tekanan untuk melonggarkan jaringan. Lakukan pada kedua telapak kaki. Ini membantu mengurangi ketegangan dan kekakuan pada telapak kaki.
- 5) Berbaringlah pada posisi kiri tubuh, kepala bertumpuh pada telapak tangan kiri. Pegang ujung kaki kanan dengan tangan kanan diantara jari dan sendi pergelangan kaki. Perlahan tarik tumit kanan ke arah bokong kanan untuk meregangkan pergelangan kaki dan *quadrisep* (paha depan). Tahan regangan ringan selama 10 detik.
- 6) Sekarang gerakkan pinggul kanan depan anda ke depan dengan mengkontraksikan otot paha kanan sambil menarik kaki kanan dengan tangan kanan sambil menarik kaki meregangkan paha depan. Dan merelakskan paha belakang (*hamstring*). Tahan regangan ringan selama 10 detik. Jaga agar tubuh tetap dalam garis lurus. Sekarang regangkan kaki kiri dengan cara yang sama. Melakukan peregangan secara teratur akan menghasilkan perubahan positif.



Gambar 2.9 Ringkasan peregangan untuk kaki dan pergelangan kaki

c. Variasi posisi kaki lurus dan lutut tertekuk

- 1) Letakkan lengan kiri ke sisi luar kaki kanan. Letakkan tangan kanan ke samping untuk menjaga keseimbangan. Gerakan ini akan meregangkan otot punggung atas dan tulang belakang serta samping punggung bawah, selain paha belakang. Untuk merubah regangan, menolehlah ke belakang pundak kanan sambil memutar bagian depan pinggul kiri sedikit ke arah dalam. Ini akan meregangkan punggung bawah dan daerah di antara tulang belikat. Bernapaslah dengan santai. Jangan menahan napas. Tahan selama 10 sampai 15 detik.



Gambar 2.10 Variasi posisi kaki lurus dan lutut tertekuk Untuk meregangkan bagian belakang kaki bawah (betis dan otot soleus), gunakan handuk melingkari telapak kaki untuk menarik jari-jari kaki ke arah lutut (Gbr.1) atau jika anda lentur, gunakan tangan untuk menarik jari-jari kaki ke arah lutut (Gbr.2) atau tarik telapak kaki ke arah lutut tanpa menggunakan tangan, kemudian majukan badan sedikit ke depan untuk meregangkan betis (Gbr.3). Tahan 10 sampai 20 detik.

- 2) Untuk meregangkan sisi luar kaki bawah, pegang sisi luar telapak kaki dengan tangan yang berlawanan (lihat gambar). Sekarang, perlahan-lahan putar bagian luar telapak kaki ke arah dalam hingga terasa regangan di sisi luar kaki bawah. Peregangan ini dapat dilakukan dengan kaki lurus, atau dengan lutut di tekuk jika sulit menggapai batas luar telapak kaki dengan kaki lurus. Pada posisi kaki lurus, paha depan harus relaks. Tahan regangan ringan selama 10 detik.
- 3) Ingat jangan mengunci lutut saat melakukan peregangan sambil duduk. Pastikan paha depan relaks di setiap posisi. Anda tidak dapat meregangkan paha belakang dengan benar jika pasangan otot yang berlawanan (paha depan) tidak relaks.

D. Kerangka Konsep



Keterangan :




: Variabel dependen



: Variabel independen

Gambar 2.11 Kerangka Konsep Penelitian

E. Kerangka Kerja



Gambar 2.12 Kerangka Kerja

F. Variabel yang di Teliti

Variabel Penelitian :

1. Variabel dependen (terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dalam hal ini nyeri sendi diukur dengan Skala Numerik.

2. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah relaksasi yakni pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) yang dilakukan oleh lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pre experimental design* dengan rancangan *one grup pre test-post test design* dimana penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan *pre-test* (pengamatan awal) terlebih dahulu sebelum diberikan intervensi, kemudian dilakukan *post-test* (pengamatan akhir).

Tabel 3.1 Desain penelitian pengaruh latihan gerak kaki (*Stretching*) terhadap penurunan Nyeri sendi ekstremitas bawah

<i>Pretest</i>	Perlakuan	<i>Posttest</i>
O	X	O-A

Keterangan:

O = Observasi tingkat nyeri sendi sebelum pemberian latihan gerak kaki(*stretching*)

X = Pemberian latihan gerak kaki (*stretching*)

O-A= Observasi tingkat nyeri sendi setelah pemberian latihan gerak kaki(*stretching*).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

2. Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 08 Juni sampai 21 Juni 2014.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 100 orang.

2. Sampel

Dalam penelitian ini sampel dilakukan dengan cara *Non probability sampling* jenis *purposive sampling* dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang spesifik yang ada dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.

Dalam penelitian keperawatan, kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria tersebut menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Merupakan penghuni di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

- 2) Lansia yang mengalami nyeri sendi pada ekstremitas bawah.
- 3) Lansia dalam keadaan sadar dan mampu berkomunikasi.
- 4) Lansia yang masuk dalam kelompok *elderly* (60-74 tahun) dan lanjut usia tua/ *old* (75-90 tahun).
- 5) Bersedia menjadi responden.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Lansia yang *bed rest* total.
- 2) Lansia yang mengalami gangguan penglihatan (buta).
- 3) Lansia yang cacat fisik.
- 4) Lansia meninggalkan Panti.
- 5) Tidak bersedia menjadi responden.
- 6) Lansia *very old* (diatas 90 tahun).

Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan teori Frenkel dan Wallen (1993) yang mengatakan bahwa jumlah sampel minimum dalam penelitian eksperimen adalah 15 subjek.

Berdasarkan teori tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 20 orang.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh responden, yaitu lansia yang diberikan latihan gerak kaki (*stretching*).

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu data dari dokumentasi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

2. Cara Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan lansia yang akan mengikuti latihan gerak kaki (*stretching*).
- b. Memperkenalkan diri, maksud dan tujuan penelitian.
- c. Latihan gerak kaki (*stretching*) dengan frekuensi 3 kali seminggu selama 2 minggu.
- d. Melakukan pengukuran dengan lembar observasi skala intensitas nyeri *numerical rating scale* untuk mengetahui intensitas nyeri.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang oleh peneliti sesuai dengan literatur yang ada.

1. Kuesioner untuk mengetahui identitas umum pasien.
2. Lembar observasi skala intensitas nyeri *numerical rating scale* untuk mengetahui intensitas nyeri.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

a. *Editing*

Proses *editing* setelah data hasil pemeriksaan terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan keseragaman data.

b. *Coding*

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap hasil pemeriksaan (pengkodean).

c. *Tabulating*

Tabulasi adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel-tabel sesuai kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian.

d. *Entry Data*

Memasukkan data yang telah ditabulasi ke dalam program komputer.

2. Analisa Data

a. Analisa Univariat

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariat

Dilakukan uji normalitas dari distribusi data dengan uji *Shapiro wilk*. Bila data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, maka untuk mengetahui status perubahan nyeri sendi yang terjadi pada setiap perlakuan *stretching* dianalisis dengan uji *paired t-test*. Jika ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah perlakuan maka perlakuan yang diberikan berpengaruh secara signifikan (Suryabrata, 2011). Pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), apabila $p\text{ value} < \alpha$ maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) yang diberikan terhadap variabel dependen. Sedangkan apabila $p\text{ value} > \alpha$ berarti H_0 diterima yang berarti tidak ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) yang diberikan (Arikunto, 2010).

G. Etika Penelitian

Masalah etika penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting dalam penelitian, mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, maka segi etika penelitian harus diperhatikan (Hidayat, 2007). Masalah etika yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Informed consent*

Informed consent disampaikan kepada calon responden, peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, apabila bersedia menjadi

responden, maka peneliti memohon kesediaan menandatangani lembar persetujuan. Bila calon responden tidak bersedia, peneliti tidak boleh memaksakan dan harus menghormati hak calon responden.

2. *Anonymity* (tanpa nama)

Untuk menjawab identitas responden, peneliti tidak boleh mencantumkan nama responden namun hanya menulis kode nama.

3. *Confidentiality* (kerahasiaan)

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dengan cara kuesioner disimpan dalam tempat yang terkunci dan pemusnahan akan dilakukan dengan cara dibakar.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8 Juni sampai 22 Juni 2014, di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *Non probability* yaitu *purposive sampling* yang mana jumlah sampel yang menjadi subjek penelitian ini adalah 20 orang.

Dalam penelitian ini intervensi dilakukan tiga kali seminggu selama 2 minggu dengan waktu 15 menit setiap intervensi. Penelitian diawali dengan observasi nyeri sebelum intervensi latihan gerak kaki (*stretching*). Setelah dilakukan intervensi latihan gerak kaki (*stretching*), di observasi kembali skala nyerinya.

Setelah data terkumpul peneliti melakukan pengolahan data meliputi editing, koding, dan tabulasi. Selanjutnya data dalam bentuk ordinal dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat.

Data primer diambil melalui teknik wawancara berstruktur dan observasi langsung yang dilakukan pada responden dengan nyeri sendi. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut:

1. Karakteristik responden

a. Umur

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Umur	n	%
Lanjut Usia (<i>Elderly</i>)	11	55,0
Lanjut Usia Tua (<i>Old</i>)	9	45,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.1 menunjukkan distribusi responden berdasarkan umur di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah dengan lanjut usia (*Elderly*) 60 sampai 74 tahun.

b. Jenis kelamin

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Jenis Kelamin	n	%
Laki-laki	8	40,0
Perempuan	12	60,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.2 menunjukkan distribusi responden berdasarkan jenis kelamin di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah perempuan.

c. Pendidikan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan
Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Pendidikan	n	%
Tidak Sekolah	15	75,0
SD	4	20,0
SMA	1	5,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.3 menunjukkan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah tidak sekolah.

2. Analisis Univariat

a. Penyakit yang diderita

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Penyakit yang
Diderita Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Penyakit Yang Diderita	N	%
Reumatik	20	100,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.4 menunjukkan distribusi responden berdasarkan penyakit yang diderita di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah reumatik.

b. Lama nyeri

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menderita
Nyeri Sendi Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Lama Nyeri	n	%
3-6 bulan	4	20,0
6 bulan-1 tahun	2	10,0
>1 tahun	14	70,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.5 menunjukkan distribusi responden berdasarkan lama menderita nyeri di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah > 1 tahun.

c. Lokasi nyeri

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lokasi Nyeri
Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Lokasi Nyeri	n	%
Lutut	17	85,0
Kaki	3	15,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.6 menunjukkan distribusi responden berdasarkan lokasi nyeri disendi-sendi tubuh yang paling banyak adalah lutut.

d. Karakter nyeri

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakter Nyeri
Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji
Kabupaten Gowa

Karakter Nyeri	n	%
Rasa terikat/ kram	18	90,0
Tumpul/tajam	2	10,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.7 menunjukkan distribusi responden berdasarkan karakter nyeri yang paling banyak adalah yang mengalami nyeri sendi seperti diikat/kram.

e. Waktu nyeri

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Waktu Muncul
Nyeri Di Panti Sosial TresnaWerdhaGauMabaji
Kabupaten Gowa

Lama Nyeri	n	%
Pagi Hari	11	55,0
Malam Hari	9	45,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.8 menunjukkan distribusi responden berdasarkan waktu muncul nyeri yang paling banyak adalah pada pagi hari.

f. Serangan nyeri

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Hal yang Dilakukan Bila Ada Serangan Nyeri Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Bila Ada Serangan Nyeri	n	%
Istirahat	15	75,0
Mengkomsumsi obat	5	25,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.9 menunjukkan distribusi responden hal yang dilakukan bila ada serangan nyeri yang terbanyak adalah istirahat.

3. Analisa Bivariat

- a. Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri sebelum diberikan latihan gerak kaki (*stretching*).

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan Nyeri Sebelum Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Tingkatan nyeri sebelum latihan gerak kaki (<i>stretching</i>)	n	%
Nyeri ringan	4	20,0
Nyeri sedang	14	70,0
Nyeri hebat	2	10,0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.10 menunjukkan intensitas nyeri sebelum diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) di Panti Sosial Tresna

Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah nyeri sedang.

- b. Distribusi frekuensi responden berdasarkan intensitas nyeri setelah diberikan latihan gerak kaki (*stretching*).

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkatan nyeri Setelah Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Tingkatan nyeri sebelum latihan gerak kaki (<i>stretching</i>)	n	%
Nyeri ringan	15	75.0
Nyeri sedang	5	25.0
Total	20	100,0

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.11 menunjukkan intensitas nyeri setelah diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa yang paling banyak adalah nyeri ringan.

- c. Uji Normalitas

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk Sig.
Sebelum intervensi	0,076
Setelah intervensi	0,0128

Sumber : Data Primer 2014

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji normalitas dengan uji *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa data berdistribusi

normal (>0.05). setelah itu dilakukan uji *paired t test* untuk mengetahui pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia sebelum dan setelah dilakukan intervensi.

d. Hasil uji beda *paired t test*

Tabel 4.13
Pengaruh Pemberian Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) Terhadap
Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia
Di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji
Kabupaten Gowa

Latihan	Skala Nyeri						Mean	Selisih	p. value
	Nyeri hebat		Nyeri sedang		Nyeri ringan				
	n	%	n	%	n	%			
Pre Test	2	10,0	14	70,0	4	20,0	24,80	5,45	0,000
Post Test	0	0,0	5	25,0	15	75,0	19,35		

Uji paired t test


Tabel 4.13 menunjukkan distribusi frekuensi pengaruh pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) bahwa lansia yang sebelum dilakukan latihan gerak kaki yang mengalami nyeri hebat sebanyak 2 responden (10,0%), dan yang mengalami nyeri sedang sebanyak 14 responden (70,0%) serta yang mengalami nyeri ringan sebanyak 4 responden (20,0%), sedangkan setelah dilakukan latihan gerak kaki yang mengalami nyeri hebat sebanyak 0 responden (0,0%) dan yang mengalami nyeri sedang sebanyak 5 responden (25,0%) serta yang mengalami nyeri ringan sebanyak 15 reponden (75,0%).

Hasil analisis menggunakan uji *paired t* dengan tingkat kepercayaan 5% ($\alpha=0,05$) diperoleh nilai *p value* adalah 0,000. Dengan

demikian $p\text{ value} < \alpha$ ($0,000 < 0,05$), maka H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap tingkat nyeri.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil uji *tpaired* didapatkan $p\text{-value}$ sebesar 0.000 atau $p < 0.05$ berarti ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) secara signifikan terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia.

e. Grafik rata-rata nyeri per-sesi latihan



Gambar 4.13. Grafik rata-rata persesi latihan

Berdasarkan grafik diatas, menunjukkan bahwa penurunan nyeri sendi terjadi secara signifikan karena latihan dilakukan secara rutin tiga kali seminggu selama 2 minggu.

B. Pembahasan

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya (Hidayat, 2006). Intensitas nyeri dapat diketahui dengan melakukan observasi kepada pasien melalui skala numerik 0 sampai dengan 10, yaitu 0 bila tidak nyeri, 1 sampai dengan 3 bila nyeri ringan, 4 sampai dengan 6 bila nyeri sedang, 7 sampai dengan 9 bila nyeri hebat, dan bila 10 nyeri paling hebat.

Berdasarkan hasil penelitian sebelum diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) didapatkan nyeri terbanyak adalah nyeri sedang kemudian nyeri ringan, dan terakhir nyeri hebat. Setelah dilakukan latihan gerak kaki (*stretching*) didapatkan hasil bahwa nyeri yang terbanyak adalah nyeri ringan kemudian nyeri sedang.

Terjadinya penurunan intensitas nyeri dapat disebabkan beberapa faktor diantaranya bahwa lansia yang melakukan gerakan kaki (*Stretching*) melakukan gerakan dengan benar sesuai intruksi dari peneliti, ada juga faktor perancu yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti yaitu ada sebagian responden yang mengkonsumsi obat jadi kemungkinan salah satu faktor yang harus di kontrol peneliti.

Nyeri sedang yang dirasakan membuat lansia tidak dapat beraktivitas terlebih apabila mengalami nyeri hebat. Nyeri yang dirasakan ada yang bersifat akut dan kronis. Dan yang dialami lansia umumnya nyeri kronis

akibat reumatik. Nyeri kronis seperti pada reumatik mempunyai efek yang merugikan. Nyeri kronis sering menyebabkan depresi dan ketidakmampuan. Pasien tidak mampu melanjutkan aktivitas dan melakukan hubungan interpersonal bahkan sebelum nyeri mulai dirasakan. Ketidakmampuan ini dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan dalam aktivitas fisik sampai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan ADL (*Activity Daily Living*) karena terkait nyeri pada sendi-sendi tubuh.

Sekitar 50 persen keluhan reumatik adalah osteoarthritis yang merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan karena rapuhnya atau pengoroposan kapsul sendi, sehingga merusak lapisan tulang rawan yang menutup permukaan ujung-ujung tulang. Menurut Dra Adelia S, 2011, osteoarthritis biasanya menyerang sendi-sendi penopang tubuh, seperti lutut, pinggul, dan tulang belakang. Pada sebagian penderita tidak sampai parah. Gejala osteoarthritis berupa nyeri dan kaku pada sendi, terutama pada waktu berdiri dan berjalan setelah lama duduk, apabila lutut dan pinggul yang terserang. Penyebab osteoarthritis disebabkan karena degenerasi atau ausnya kartilago (jaringan elastis) yang seharusnya melingkari ujung-ujung tulang pada persendian.

Respon nyeri yang dialami lansia dengan reumatik dipengaruhi oleh karakter responden dan karakter nyeri. Karakter responden yaitu umur, jenis kelamin dan pendidikan. Sedangkan karakter nyeri yaitu lama menderita nyeri, lokasi nyeri, karakter nyeri dan waktu muncul nyeri.

Menurut teori Suyono, S (2001) menyatakan bahwa yang paling beresiko terkena reumatik adalah perempuan dibanding laki-laki. Diatas 50 tahun perempuan lebih banyak menderita reumatik. Hal ini menunjukkan adanya peran hormonal pada pathogenesis reumatik. Pada usia diatas 50 tahun wanita akan mengalami menopause. Seiring dengan ovarium yang akan mengisut, produksi esterogen menurun. Menurunnya produksi esterogen mengurangi pembentukan osteoblas tetapi meningkatkan aktivitas osteoklas (sel-sel yang memfagosit tulang). Hal ini akan mengurangi kepadatan tulang, tulang akan menjadi rapuh dan rentan terhadap infeksi dan degenerasi.

Nyeri sendi yang berlangsung lama biasanya lebih dari 6 bulan. Selama proses penyakit nyeri akan hilang timbul atau intermiten, tergantung pada pencetus nyeri. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Reeves (1999) yang menyatakan bahwa nyeri sendi pada kasus reumatik merupakan nyeri yang bersifat kronik. Nyeri ini berlangsung lama, intensitas bervariasi, bersifat menetap, intermiten dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan.

Menurut teori Suyono, S (2001) menyatakan bahwa nyeri sendi merupakan keluhan utama pasien reumatik, dengan karakteristik nyeri seperti terikat, kaku, dan susah digerakkan. Keadaan ini disebabkan karena desakan cairan yang berada disekitar sendi. Nyeri tajam sering dialami oleh pasien reumatik dengan kasus osteoarthritis dimana pada kasus ini terbentuk nodus-nodus pada bagian distal jari-jari. Gesekan yang terjadi antara ujung-ujung

tulang pada saat sendi digerakkan akan menimbulkan sensasi nyeri yang tajam seperti tertusuk.

Nyeri terikat terjadi akibat proses inflamasi pada jaringan sinovial yang membatasi mobilisasi klien. Nyeri digambarkan sebagai rasa terikat dan susah digerakkan dan kaku. Akibat dari inflamasi yang berefek erosi pada kartilago yang normalnya sebagai bantalan pada ujung-ujung sendi pada saat mobilisasi. Terjadi pengikisan lapisan kartilago sangat memungkinkan terjadinya fraksi pada saat mobilisasi yang dapat digambarkan sebagai nyeri yang tertusuk dan tajam.

Nyeri reumatik biasanya akan dirasakan pada pagi dan malam hari. Menurut teori yang dikemukakan oleh Suyono, S (2001) menyatakan bahwa nyeri pada reumatik dirasakan pada malam hari namun akan meningkat pada pagi hari. Tetapi pada kasus tertentu akan muncul pada pagi hari.

Peningkatan nyeri sendi pada pagi dan malam hari terkait suhu udara pada malam hari dan pagi hari yang rendah dengan viskositas cairan sinovial. Suhu udara yang rendah berpengaruh pada peningkatan viskositas cairan sinovial (kental). Kekentalan cairan sinovial mempengaruhi gerakan sendi menjadi tidak maksimal, terjadi gesekan ujung-ujung tulang yang terdapat pannus dan nodus akan berakibat penekanan pada kavum sinovial. Penekanan pada kavum synovial akan menimbulkan jejas serta penekanan pada taraf propioseptif. Reseptor-reseptor nyeri nosiseptor teraktivasi dan berespon dengan mengirimkan sinyal/impuls nyeri ke substansia gelatinosa pada kornu dorsalis medulla spinalis. Selanjutnya impuls nyeri menyebrangi medulla

spinalis dari sisi berlawanan dan naik pada pusat yang lebih tinggi dalam otak melalui traktus spinotalamikus.

Jejas yang timbul akibat penekanan akan mengeluarkan substansi-substansi penghasil nyeri termasuk histamine, prostaglandin, dan bradikinin yang juga merangsang ujung-ujung saraf mentransmisikan impuls nyeri pada tingkat yang lebih tinggi dalam otak yaitu korteks serebri untuk dipersepsikan.

Allah Berfirman dalam surah Ar-Raad/13: 11.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

Islam menganjurkan dan cenderung mewajibkan seseorang untuk mampu memelihara kesehatan baik perorangan, keluarga maupun masyarakat.

Untuk itu ada beberapa tuntunan yang perlu kita perhatikan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan meliputi 4 hal yaitu penyuluhan, preventif atau pencegahan, kuratif atau pengobatan dan rehabilitatif yaitu pemulihan.

Latihan gerak kaki (*stretching*) termasuk dalam teknik relaksasi. Teknik relaksasi memberikan individu kontrol diri terhadap rasa tidak nyaman atau saat nyeri, stress fisik dan emosi pada nyeri. *Stretching* atau peregangan adalah penghubung penting antara kehidupan statis dan kehidupan aktif, yang membuat otot tetap lentur, membuat siap bergerak dan membantu tubuh beralih dari kehidupan kurang gerak ke aktivitas banyak gerak tanpa menimbulkan tegangan (Anderson, 2008). Latihan gerak kaki ini merupakan segala upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan

kondisi fisik pada lansia (Pujiastuti, 2003). Latihan gerak kaki (*stretching*) dapat bermanfaat secara optimal apabila dilakukan dengan benar dan teratur. Frekuensi latihan yang dianjurkan adalah 3 atau 5 kali per minggu secara teratur. Selain itu, latihan gerak kaki (*stretching*) dilakukan selama 15-30 menit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan latihan, yaitu memilih latihan yang bermanfaat, aman, sesuai kebutuhan, melakukan latihan tidak dilakukan 1 - 2 jam setelah makan dan tidak duduk segera setelah latihan dan jangan mandi air dingin.

Latihan gerak kaki (*stretching*) termasuk dalam teknik relaksasi. *Stretching* atau peregangan ketegangan otot menjadi berkurang, tubuh terasa lebih relaks, memperluas rentang gerak, menambah rasa nyaman, dan membantu mencegah cedera (Anderson, 2008). Faktor yang mempengaruhi keberhasilan latihan gerak kaki (*stretching*) antara lain lansia dapat melakukan latihan ini dengan tepat dan intensitas yang sesuai, adanya motivasi dan dukungan keluarga.

Berdasarkan hasil uji *paired t-test* didapatkan p value sebesar 0.000 atau $p < 0.05$ berarti ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) secara signifikan terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia.

Sebelum pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) ditemukan bahwa nyeri yang paling banyak adalah nyeri sedang namun setelah pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) ditemukan nyeri yang paling banyak adalah nyeri ringan. Pemberian latihan gerak kaki (*stretching*) yang rutin diberikan akan memberikan kontribusi yang cukup besar pada penurunan tingkat

nyerinya. Berkurangnya rasa nyeri atau menurunnya sensasi nyeri dari nyeri berat menjadi nyeri sedang dan nyeri sedang menjadi nyeri ringan karena efek dari latihan gerak kaki (*stretching*). Hal ini dikarenakan setelah lansia melakukan latihan gerak kaki (*stretching*) secara benar dan teratur, otot-otot yang tegang akan berkurang dan mempertahankan atau meningkatkan kelenturan tubuh sehingga tubuh terasa lebih relaks. Selain itu rentang gerak lansia menjadi lebih luas sehingga membuat aktivitas yang berat menjadi lebih mudah dilakukan. Dengan adanya penurunan nyeri sendi tersebut maka lansia dapat menjadi lebih aktif, produktif dan dapat menjalani masa tuanya dengan lebih nyaman.

Hal ini juga didukung oleh penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh Dewi Ika Sari (2010) tentang pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia di Posyandu lansia Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri dengan menggunakan uji statistik *Wilcoxon Match Pair Test* hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah dengan nilai $p < 0,000$.

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan I Kadek Saputra tentang pemberian latihan peregangan terhadap penurunan nyeri pada pasien dengan *ischialgia* di Praktik Pelayanan Keperawatan Latu Usadha Abiansemal Badung dengan menggunakan *Paired Sample t-test* dengan tingkat kepercayaan 95 %. Hasil penelitian ini menemukan bahwa latihan peregangan

dapat menurunkan keluhan nyeri pada pasien dengan *ischialgia*, dengan $P = 0,000$.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu untuk mengontrol responden agak sulit karena responden berbeda-beda tempat (wisma). Sehingga peneliti kewalahan mengontrol responden, berdasarkan hasil lembar observasi bahwa responden yang mengalami penurunan nyeri diketahui mengkonsumsi obat sehingga perlu dilakukan pengontrolan ketat untuk menghindari faktor perancu. Diharapkan juga perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) dengan melibatkan jumlah sampel yang besar, waktu penelitian yang lebih panjang, dan metode pengendalian faktor perancu yang lebih ketat.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dari tanggal 08 Juni sampai dengan tanggal 21 Juni dapat disimpulkan bahwa:

1. Sebelum diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) terdapat nyeri ringan, nyeri sedang, dan nyeri hebat.
2. Setelah diberikan latihan gerak kaki (*stretching*) didapatkan hasil bahwa responden mengalami penurunan yang paling banyak adalah nyeri sedang menjadi nyeri ringan.
3. Terdapat pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dengan uji *paired Test* didapatkan p value sebesar 0.000 atau $p < 0.05$.

B. Implikasi Penelitian

1. Bagi Instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji

Hasil penelitian menggambarkan bahwa latihan gerak kaki (*stretching*) sebagai salah satu metode pengendalian nyeri secara nonfarmakologis yang berpengaruh terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada lansia. Maka, *stretching* dapat digunakan dalam

asuhan keperawatan pada lansia untuk membantu mengurangi rasa nyeri pada sendi.

Latihan gerak kaki (*stretching*) sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan peralatan yang khusus sehingga perawat dapat mengajarkan tata cara kepada lansia atau keluarga, ataupun sesama perawat.

2. Bagi Instansi

Demi meningkatkan keilmuan dan mutu pendidikan keperawatan, diharapkan perlu diperhatikan pengembangan informasi dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita reumatik khususnya latihan gerak kaki (*stretching*) kepada lansia.

3. Bagi peneliti Berikutnya

Melihat nyeri sendi merupakan keluhan utama pada penderita reumatik yang dapat mengganggu aktivitas lansia maka bagi peneliti berikutnya dapat meneliti tentang teknik nonfarmakologis lainnya untuk penurunan sensasi nyeri sendi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbianto. *Lansia*. 4 maret 2013 at 7.07. *Blogger: abybactery,blogspot.com/2013.../lansia .com*, (12 februari 2014).
- Anderson,Bob. *Stretching (peregangan)*. Jakarta: PT. Serambi IlmuSemesta,2008.
- Anonim. *Pengaruh pemberian Latihan Gerak Peregangan terhadap penurunan Nyeri Sendi pada Pasien dengan Iskhialgia di Praktik Pelayanan Keperawatan Latu Husada Abiansal Badung*. Denpasar: Universitas Udayana. 2012.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Barbara C long. *Perawatan Medikal Bedah (Suatu Pendekatan Proses Keperawatan)*. Bandung: Yayasan IAPK Pajajaran Bandung, 1996.
- Bustan, M. N. *Epidemiologi: Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Data Panti Sosial Tresna Wedha Gau Mabaji Kab.Gowa. *Jumlah Lansia*, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra, 1996.
- Elqorni. *Metodologi Riset, Materi 6 populasi, sampel dan uji normalitas data*. [http: /com.sec.android. app.sbrowser.scraplist/0219222812.html](http://com.sec.android.app.sbrowser.scraplist/0219222812.html). (19 februari 2014).
- Fadhil. 2012. *Pondok Tadabbur: Nasehat Alquran Bagi mereka yang Berusia Lanjut*. Diakses tanggal 19 februari 2014.
- Hidayat, Azis Alimul. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Medika, 2005.
- Hidayat, Azis Alimul. 2008. *Metode Penelitian Keperawata dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kemenko Kesra. 2010. *Sensus penduduk*. <http://google.co.id>. (02 januari 2014).
- Machfoeds, Ircham. *Cara Membuat Kuesioner & Panduan Wawancara (Alat*

- Ukur Penelitian). Bidang Kesehatan, Kedokteran, Keperawatan dan Kebidanan. Yogyakarta: Fitramaya, 2010.*
- Maryam, R Siti, dkk. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya* Jakarta:Salemba, 2008.
- Millar, A. Lynn. *Program Olahraga Arthritis: Panduan untuk Gerakan yang Bebas Nyeri*. America: Sports Medicine, 2003.
- Nugroho, Wahjudi. *Keperawatan Gerontik & Geriatrik, Edisi 3*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Nugroho, Wahjudi. *Komunikasi dalam Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Nursalam. *Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Info Medika, 2001.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Potter & Perry. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Konsep, Proses, dan Praktik, volume 2, Edisi 4*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Prasetyo, Sigit Nian. *Konsep dan Proses keperawatan Nyeri*. Surakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Profil Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. (2006). *Tidak Diterbitkan*.
- Pujiastuti, S. S & Utomo, B. (2003). *Fisioterapi pada Lansia*. Jakarta: EGC.
- Santoso, Hanna dan Ismail. *Memahami Krisis Lanjut Usia: Uraian Medis dan Pedagogis-Pastoral*. Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Suyono, S., Waspadji, S., Lesmana, L., et al. (2001). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Ed 3. Jilid I,II. Jakarta; Penerbit FKUI.
- Sartika, Fanny Dewi, "Pengaruh Pemberian Kompres Panas Basah Terhadap Pen-urunan Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. (Makassar:Fak. Kesehatan, 2010).
- Setiadi. *Konsep & Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Smeltzer, Suzanne C. *Buku Ajar Keperawatan Medikal - Bedah* Brunner &

- Suddarth, Volume 1 Edisi 8.* Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2002.
- Subhan Kadir. *Jumlah lansia di Sulawesi Selatan*, 2013.
- Stanley, Mickey. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Suprianto. *Pengaruh Latihan Gerak Pinggul (Stretching) terhadap Tingkat Nyeri Punggung Bawah pada Lansia*. Malang, 2008.
- Susanto, Ermawan. *Manfaat Olahraga Renang bagi Lanjut Usia*, *Jurnal MEDIKORA*, Volume VI, no.1, April 2010.
- Tamsuri, Anas. *Konsep & Penatalaksanaan Nyeri*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Taslim. *Gangguan musculoskeletal pada lanjut usia, bagian I*. [www// bin-hasyim.wordpress.com](http://www.bin-hasyim.wordpress.com) tanggal 11 juni 2009 jam 21.10 WIB. (19 februari 2014).
- Tiro, Muhammad Arif.. *Penelitian :Skripsi, Tesis,danDisertasi*. Makassar: Andira Publisher, 2009.
- Wolf, weirzel, Fuerst. *Dasar-dasar Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Yunita. *Hadits tentang Menghormati Orang Tua*. [file/hadit/hadits - tentang-Menghormati - orang- tua_30.html](http://file/hadit/hadits-tentang-Menghormati-orang-tua_30.html) tanggal 30 januari 2013. (19 februari 2014).
- Yohanita Pamungkas, “*Pengaruh Latihan Gerak Kaki (Stretching) terhadap Penurunan Nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Posyandu Lansia Sejahtera GBI Setia Bakti Kediri.*” *STIKES RS. Baptis*. Vol 3, Edisi 1 (2010): h. 8-12.(19 februari 2014).

RIWAYAT HIDUP PENULIS



NurAsiah, Lahir di Sungguminasa, 19 Mei 1992. Merupakan anak tuggal dari pasangan Alm.Muh Natsir dan Hj. Insana. Penulis memulai Pendidikannya di TK. 'Aisyiyah Bustanul Athfal tahun 1996 Kabupaten Gowa. Penulis melanjutkan Pendidikannya di SD. Inpres Pare'-Pare' tahun 1998 Kabupaten Gowa. Sesuai dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun, penulis pun melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di SMP Neg. 1 Pallangga Kabupaten Gowa tahun 2004. Di tahun 2007, penulis melanjutkan pendidikan di SMK Keperawatan Pratidina Makassar. Dan setelah lulus dari SMK di tahun 2010, penulis tetap melanjutkan studinya dan memilih UIN Alauddin Makassar jurusan keperawatan sebagai tempat terbaik menimbah ilmu.

Selama mengenyam pendidikan, penulis juga aktif dalam organisasi. Sejak di bangku SD dan SMK, penulis telah aktif dalam kegiatan Ekstrakurikuler PRAMUKA. Di Bangku kuliah, Penulis Bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan kelompok belajar SCLERA dan PEN (*Pioneer of English Nursing*).

Penulis berharap dalam perjalanan pendidikan penulis tidak berhenti sampai disini, tapi akan terus berlanjut. Semoga apa yang dijalani penulis bernilai ibadah, apa yang diperoleh dapat diaplikasikan kepada masyarakat, sebagai bakti kepada orang tua, bangsa dan Negara, Amin.





LAMPIRAN 1

SURAT PERMOHONAN RESPONDEN

Kepada Yth.

Bapak/ Ibu

Di – Tempat

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa Keperawatan UIN Alauddin Makassar, saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) terhadap Penurunan nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa”** guna untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat kelulusan.

Sehubungan dengan penelitian di atas, saya mohon sekiranya kesediaan Bapak/ Ibu untuk mengisi kuesioner yang telah saya sediakan.

Saya menjamin kerahasiaan dan tidak akan saya gunakan di luar kepentingan penelitian ini, serta hasilnya dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat, atas kesediaannya saya ucapkan terimah kasih.

Wassalam

Makassar, Juni 2014

NUR ASIAH

LAMPIRAN 2

INFORMED CONSENT

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama :

Umur :

Alamat:

Setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian bahwa segala informasi tentang penelitian ini akan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan peneliti, maka saya (bersedia/ tidak bersedia)* untuk menjadi responden penelitian yang berjudul **“Pengaruh Latihan Gerak Kaki (*Stretching*) terhadap Penurunan nyeri Sendi Ekstremitas Bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa”**. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dari saya akibat ini, maka saya akan bertanggung jawab dan tidak akan menuntut dikemudian hari.

Makassar, Juni 2014

Responden,

()

Catatan :

*Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 3

LEMBAR KUESIONER

Judul Penelitian : Pengaruh latihan gerak kaki (*stretching*) terhadap penurunan nyeri sendi ekstremitas bawah pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Tanggal penelitian :

No. Kode penelitian :

Nama : (Inisial)

Umur : tahun

Petunjuk :

1. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan.
2. Berikan tanda *checklist* (✓) pada pertanyaan yang anda anggap paling sesuai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN (KODE)
MAKASSAR Diisi oleh peneliti

Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin :

1) Laki-laki

2) Perempuan

2. Pendidikan :

1) Tidak sekolah

2) SD

3) SMP

4) SMA

Data tentang nyeri

1. Penyakit yang paling diderita sekarang ini :

1) Reumatik

2) Hipertensi

3) DM

2. Sudah berapa lama mengalami nyeri :

1) 3-6 bulan

2) 6 bulan-1 tahun

3) Lebih dari satu tahun

3. Dimana lokasi/titik yang paling anda rasakan nyerinya :

1) Lutut

2) Kaki

3) Pergelangan kaki

4. Seperti apa nyeri yang anda rasakan :

1) Rasa terikat/ kram

2) Tumpul/tajam

3) Remuk



5. Nyeri paling sering muncul waktu :

1) Pagi hari

2) Siang hari

3) Malam hari

6. Apa yang anda lakukan bila ada serangan nyeri :

1) Istirahat

2) Mengonsumsi obat

3) Melakukan aktivitas



LAMPIRAN 4

SKALA NYERI DENGAN SKALA NUMERIK 0 SAMPAI 10



1. 0 : Tidak Nyeri
2. 1 - 3 : Nyeri Ringan: secara objektif klien dapat berkomunikasi
3. 4 - 6 : Nyeri Sedang: secara objektif klien mendesis, dapat mendeskripsikannya, dapat menunjukkan lokasi nyeri, dapat mengikuti perintah dengan baik.
4. 7 - 9 : Nyeri Hebat: secara objektif klien terkadang tidak dapat mengikuti perintah tapi masih respon terhadap tindakan, dapat menunjukkan lokasi nyeri,
5. 10 : Nyeri Paling Hebat: pasien tidak mampu lagi berkomunikasi.

LAMPIRAN 5

Format Observasi Nyeri

Sebelum Intervensi *Stretching*

Nama :(inisial)

No. Kode Responden :

Tanggal Penelitian :

SKALA NYERI DENGAN SKALA NUMERIK 0 SAMPAI 10



NO	INTERVENSI	SKALA NUMERIK					KET
		0 Tidak Nyeri	1-3 Nyeri Ringan	4-6 Nyeri Sedang	7-9 Nyeri Hebat	10 Nyeri Paling Hebat	
1	INTERVENSI 1						
2	INTERVENSI 2						
3	INTERVENSI 3						
4	INTERVENSI 4						
5	INTERVENSI 5						
6	INTERVENSI 6						

TOTAL						
-------	--	--	--	--	--	--

HASIL :

--



LAMPIRAN 6

Format Observasi Nyeri Setelah Intervensi *Stretching*

Nama :(inisial)

No. Kode Responden :

Tanggal Penelitian :

NO	INTERVENSI	SKALA NUMERIK					KET
		0 Tidak Nyeri	1 – 3 Nyeri Ringan	4 – 6 Nyeri Sedang	7 – 9 Nyeri ebat	10 Nyeri Paling Hebat	
1	INTERVENSI 1						
2	INTERVENSI 2						
3	INTERVENSI 3						
4	INTERVENSI 4						
5	INTERVENSI 5						
6	INTERVENSI 6						
TOTAL							

HASIL :

ANALISA UNIVARIAT

UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	60-74	11	55.0	55.0	55.0
	75-90	9	45.0	45.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

JENIS_KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	8	40.0	40.0	40.0
	PEREMPUAN	12	60.0	60.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TIDAK SEKOLAH	15	75.0	75.0	75.0
	SD	4	20.0	20.0	95.0
	SMA	1	5.0	5.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

PENYAKIT_PALING_DERITA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	REUMATIK	20	100.0	100.0	100.0

LOKASI_NYERI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid LUTUT	17	85.0	85.0	85.0
PERGELANGAN KAKI	3	15.0	15.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

KARAKTER_NYERI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid RASA TERIKAT/KRAM REMUK	18	90.0	90.0	90.0
Total	20	100.0	100.0	100.0

WAKTU_MUNCUL

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PAGI HARI	11	55.0	55.0	55.0
MALAM HARI	9	45.0	45.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

LAMA_NYERI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3-6 BULAN	4	20.0	20.0	20.0
6-1 TAHUN	2	10.0	10.0	30.0
>1 TAHUN	14	70.0	70.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

NYERI_DIRASAKAN_SETELAH

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ISTIHARAT	12	60.0	60.0	60.0
AKTIVITAS RINGAN	8	40.0	40.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

BILA_ADA_SERANGAN_NYERI

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ISTIRAHAT	15	75.0	75.0	75.0
MENGKONSUMSI OBAT	5	25.0	25.0	100.0
Total	20	100.0	100.0	

FREKUENSI SKALA NYERI

Statistics

		PRE_TEST	POST_TEST
N	Valid	20	20
	Missing	0	0

PRE_TEST

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NYERI RINGAN	4	20.0	20.0	20.0
	NYERI SEDANG	14	70.0	70.0	90.0
	NYERI HEBAT	2	10.0	10.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

POST_TEST

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NYERI RINGAN	15	75.0	75.0	75.0
	NYERI SEDANG	5	25.0	25.0	100.0
	Total	20	100.0	100.0	

PRE TEST PEMBERIAN INTERVENSI LATIHAN GERAK KAKI STRETCHING

NO	INISIAL	PRE TEST 1	PRE TEST 2	PRE TEST 3	PRE TEST 4	PRE TEST 5	PRE TEST 6	JUMLAH	MEAN	KETERANGAN
1	F	4	3	2	1	1	1	12	2	2
2	R	7	6	4	3	3	2	25	4.166667	3
3	N	6	5	5	4	3	2	25	4.166667	3
4	M	6	5	5	4	4	3	27	4.5	3
5	T	6	5	4	4	3	3	25	4.166667	3
6	B	4	2	2	1	0	0	9	1.5	2
7	K	6	5	4	3	3	2	23	3.833333	3
8	S	7	6	5	4	3	3	28	4.666667	3
9	SU	9	8	7	6	6	5	41	6.833333	4
10	D	4	3	2	2	1	0	12	2	2
11	PI	9	8	7	6	6	6	42	7	4
12	H	8	7	6	6	5	5	37	6.166667	3
13	NU	6	5	4	4	3	3	25	4.166667	3
14	BA	6	5	4	3	2	2	22	3.666667	3
15	Z	6	5	5	4	4	3	27	4.5	3
16	NG	6	5	4	4	3	3	25	4.166667	3
17	A	4	3	3	2	2	2	16	2.666667	2
18	SS	6	5	4	3	3	2	23	3.833333	3
19	BJ	6	5	4	4	3	2	24	4	3
20	KA	7	6	5	5	3	3	28	4.666667	3

KET: 1 = TIDAK NYERI (0)
 2 = NYERI RINGAN (1 - 3)
 3 = NYERI SEDANG (4 - 6)
 4 = NYERI HEBAT (7 - 9)
 5 = NYERI PALING HEBAT (10)

POST TEST PEMBERIAN INTERVENSI LATIHAN GERAK KAKI STRETCHING

NO	INISIAL	POST TEST 1	POST TEST 2	POST TEST 3	POST TEST 4	POST TEST 5	POST TEST 6	JUMLAH	MEAN	KETERANGAN
1	F	3	2	1	0	0	0	6	1	2
2	R	6	4	3	3	2	1	19	3.1666667	2
3	N	5	5	4	2	2	1	19	3.1666667	2
4	M	5	5	4	4	3	2	23	3.8333333	3
5	T	5	4	4	3	3	2	21	3.5	2
6	B	2	2	1	0	0	0	5	0.8333333	2
7	K	5	4	3	3	2	2	19	3.1666667	2
8	S	6	5	5	3	3	3	25	4.1666667	3
9	SU	8	7	6	6	5	4	36	6	3
10	D	3	2	1	1	0	0	7	1.1666667	2
11	PI	8	7	6	6	5	4	36	6	3
12	H	7	6	6	4	4	4	31	5.1666667	3
13	NU	4	4	3	3	2	2	18	3	2
14	BA	5	4	2	2	1	1	15	2.5	2
15	Z	5	4	4	3	3	2	21	3.5	2
16	NG	5	4	3	2	2	2	18	3	2
17	A	3	3	2	2	2	1	13	2.1666667	2
18	SS	5	4	3	2	2	1	17	2.8333333	2
19	BJ	5	4	3	3	2	1	18	3	2
20	KA	6	5	3	3	2	1	20	3.3333333	2

KET: 1 = TIDAK NYERI (0)
 2 = NYERI RINGAN (1 - 3)
 3 = NYERI SEDANG (4 - 6)
 4 = NYERI HEBAT (7 - 9)
 5 = NYERI PALING HEBAT (10)

LAMPIRAN 7

DATA DEMOGRAFI DAN DATA TENTANG NYERI PENGARUH LATIHAN GERAK KAKI *STRETCHING*

N O	INISIAL	UMUR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PENYAKIT PALING DIDERITA	LAMA NYERI	LOKASI NYERI	KARAKTER NYERI	WAKTU MUNCUL	NYERI DIRASAKAN SETELAH	BILA ADA SERANGAN NYERI
1	F	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1
2	R	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3	N	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1
4	M	1	2	2	1	3	1	1	3	2	1
5	T	1	2	1	1	3	1	1	1	2	1
6	B	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
7	K	2	2	1	1	3	1	3	3	1	1
8	S	2	2	1	1	3	1	1	3	1	1
9	SU	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1
10	D	1	1	4	1	3	1	1	3	1	2
11	PI	1	2	1	1	1	3	1	3	1	2
12	H	1	2	2	1	3	3	1	3	2	2
13	NU	1	1	1	1	3	1	3	1	1	2
14	BA	2	2	1	1	3	1	1	1	2	1
15	Z	2	1	2	1	3	1	1	3	1	1
16	NG	2	1	1	1	1	1	1	3	1	2
17	A	1	1	1	1	2	3	1	3	1	1
18	SS	2	1	2	1	3	1	1	1	2	1
19	BJ	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1
20	KA	1	2	1	1	3	1	1	1	2	1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

TES NORMALITAS

Tests of Normality

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
SEBELUM	.914	20	.076
SESUDAH	.926	20	.128

a. Lilliefors Significance Correction

T-Test

Paired Samples Statistics

	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1 SEBELUM	24.80	20	8.606	1.924
SESUDAH	19.35	20	8.425	1.884

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 SEBELUM & SESUDAH	20	.987	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SEBELUM - SESUDAH	5.450	1.395	.312	4.797	6.103	17.478	19	.000

LAMPIRAN 8

DATA UNIVARIAT

		Statistics										
		UMUR	JENIS_KELA MIN	PENDIDIKA N	PENYAKIT_P ALING_DERI TA	LAMA_NYE RI	LOKASI_NYE RI	KARAKTER_ NYERI	WAKTU_MU NCUL	NYERI_DIRA SAKAN_SET ELAH	BILA_ADA_S ERANGAN_N YERI	
N	Valid	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	