

Eva Yustilawati, S. Kep., Ns., M. Kep



# TATA LAKSANA COVID-19 DAN *HEALTH LITERACY* MASYARAKAT VAKSINASI COVID-19



Pusaka AlMaida  
2022

**Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep.**

**TATA LAKSANA COVID-19  
DAN HEALTH LITERACY  
MASYARAKAT VAKSINASI  
COVID-19**

**PUSAKA ALMAIDA  
2022**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

*All Rights Reserved*

**TATA LAKSANA COVID-19 DAN *HEALTH LITERACY*  
MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI**

Penulis:

**Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Editor:

**Eva Yustilawati, S.Kep., Ns., M.Kep.**

Cetakan Ke-1: Desember 2022

vi + 156 halaman 16x23cm

ISBN: 978-623-226-437-3

**Pusaka Almailda**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga buku yang berjudul **TATA LAKSANA COVID-19 DAN HEALTH LITERACY MASYARAKAT TENTANG VAKSINASI** ini dapat disusun dan selesai sesuai yang direncanakan.

Diperlukan sumber belajar yang lengkap dan sistematis berkaitan dengan tata laksana Covid-19 dan *health literacy* masyarakat tentang vaksinasi, khususnya bagi perawat agar dapat memahami materi tersebut secara komprehensif. Covid-19 merupakan kasus yang dimulai pada tahun 2019 yang telah menjadi kasus pandemik saat ini. Masyarakat Indonesia pun terdampak akibat menyebarnya virus Covid-19. Kasus kematian diakibatkan oleh virus Covid-19 yang mengakibatkan *World Health Organization* giat menemukan vaksin. Vaksinasi telah dijalankan dan sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat vaksinasi Covid-19.

Buku ini disusun secara sistematis dilengkapi dengan gambar-gambar, tabel serta bagan yang relevan untuk membantu pembaca dalam memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar secara komprehensif.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini mulai dari membantu, mengumpulkan bahan, memberikan masukan, saran dalam penyusunan buku ini, merevisi sampai pada proses pengeditan, sampai pada tata letak sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang kesehatan buku ini tentu masih memerlukan penyempurnaan ke depan. Oleh karena saran dan kritik dari pembaca sangat diperlukan.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan khususnya pada bidang praktik keperawatan serta pada peningkatan tingkat kesehatan di masyarakat pada umumnya.  
Wassalam

Makassar, Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ iii

DAFTAR ISI ~ v

BAB I Pandemi Covid-19 ~ 1

BAB II Landasan Teori Covid-19 ~ 7

BAB III Vaksinasi Covid-19 ~ 23

BAB IV Kewaspadaan Standar Covid-19 ~ 33

BAB V *Health Literacy* Vaksinasi Covid-19 ~ 99

BAB VI Perilaku Kesehatan Masyarakat Indonesia ~ 123

DAFTAR PUSTAKA ~ 147

BIOGRAFI PENULIS ~ 155

Tata Laksana Covid-19 dan *Health Literacy*  
Masyarakat Vaksinasi Covid-19

## BAB I PANDEMIK COVID-19

Corona virus atau dikenal diawal dengan sebutan *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV) di temukan pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei Cina, pada bulan Desember 2019. Kasus awal yang diidentifikasi diyakini telah tertular dari sumber zoonosis yaitu penularan virus dari hewan ke manusia karena banyak yang melaporkan atau bekerja di Pasar Grosir Makanan Laut Huanan. Pada awal wabah, beberapa kasus menghasilkan rantai penularan dari manusia ke manusia. Sejak tanggal 18 Desember sampai tanggal 29 Desember 2019, terdapat lima pasien dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)*. Hingga tanggal 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 kasusnya meningkat dengan pesat, dilaporkan kasus sebanyak 44 kasus. Dalam kurun waktu singkat, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di negara China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. (Susilo et al., 2020). Salah satu penyebab penularan/transmisi meningkat di luar Hubei Cina disebabkan karena tingginya status pusat transportasi dan pergerakan populasi Wuhan selama tahun baru imlek, sehingga individu yang terinfeksi menyebar ke seluruh negeri (WHO, 2020).

*World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penyakit corona virus (COVID-19) adalah penyakit menular dari manusia ke manusia. Beberapa gejala yang dialami oleh individu yang terkonfirmasi positif adalah masalah pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Akan tetapi bagi individu yang mengalami kondisi dengan penyakit tertentu seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernafasan kronis, dan kanker serta bagi pasien lanjut usia lebih mungkin mengembangkan penyakit serius. Virus COVID-19 menyebar dari droplet penderita ketika batuk atau bersin, dimana saat ini belum ada vaksin atau perawatan khusus untuk COVID-19 (WHO, 2020).

Transmisi virus yang meningkat dan menyebar secara luas, membuat WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemic pada 12 Maret 2020. Hingga tanggal 26 Juni 2020, yang terkonfirmasi sebanyak 9.413.289 kasus, sedangkan kasus yang

meninggal konfirmasi sebanyak 482.730 kasus di seluruh dunia. Wilayah atau Negara yang terdampak yaitu 216 negara. Sehingga 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global (WHO, 2020). Dampak dari pandemik Covid 19, dilakukan beberapa penelitian dan menunjukkan fakta bahwa kondisi dalam berbagai sektor vital untuk menjalankan roda pemerintahan menjadi tidak stabil. Dibutuhkan lebih dari satu dekade bagi dunia untuk menata Kembali roda pemerintahan hingga pulih secara sosial dan ekonomi (United National, 2020), dan mungkin secara signifikan mengaggu kemajuan Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.

Negara Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia, sehingga diperkirakan akan sangat menderita dan dalam jangka waktu yang lebih lama, apabila dibandingkan dengan negara lain dengan penduduk yang lebih sedikit. Saat novel coronavirus SARS-CoV2 menyebar di negara China secara ekstrem pada bulan Desember 2019 – Februari 2020, Indonesia melaporkan tidak ada kasus infeksi sama sekali. Namun pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melaporkan ada dua pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia. Tanggal 2 April 2020, negara Indonesia telah mencapai 1.790 kasus, 113 kasus baru, dengan rerata 170 jumlah kematian, dan sebanyak 112 yang melalui masa pemulihan. Sejak 14 Maret 2020, Pemerintah Indonesia menetapkan penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional. Pada tanggal 22 juni 2020, di Indonesia telah dilaporkan 51.427 orang dengan COVID-19 yang dikonfirmasi. Dimana angka kematian sebanyak 2.683 orang dan angka kesembuhan 21.333 orang dan saat ini pada tanggal 22 September 2020 telah dialporkan 252.923 orang dengan COVID-19 yang dikonfirmasi. Dimana angka kematian sebanyak 9.837 orang dan angka kesembuhan 184.293 orang (Kementrian Kesehatan, 2020) (5). Peningkatan jumlah kasus secara drastis mengindikasikan kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang mematuhi protokol kesehatan saat ini. (WHO. 2020).

Berbagai tindakan tersebut tentu saja akan berdampak pada status kesehatan individu pada berbagai tingkat usia. Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah memberikan edukasi terkait Covid-19,

untuk mencegah dan memperlambat penularan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah mengikuti protokol kesehatan pencegahan covid dengan menjaga jarak, mencuci tangan dengan benar sesering mungkin, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, menggunakan masker jika bepergian, menghindari kerumunan dan keluar rumah jika tidak penting serta menerapkan pola hidup sehat (WHO. 2020).

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chu et al (2020) yang menemukan bahwa Penularan virus lebih rendah dengan jarak fisik 1 m atau lebih, dibandingkan dengan jarak kurang dari 1 m, Penggunaan masker wajah dapat menghasilkan pengurangan risiko penularan infeksi yang besar, serta penggunaan pelindung mata juga dikaitkan dengan penularan infeksi lebih sedikit. Hasil temuan ini mendukung jarak fisik 1 m atau lebih sebagai perkiraan kuantitatif, Penggunaan masker wajah secara optimal, respirator, dan pelindung mata sebagai intervensi yang lebih baik dalam mencegah penularan virus covid-19.

COVID-19 ini menjadi topik hangat di seluruh dunia termasuk Indonesia beberapa upaya yang dilakukan untuk menerapkan percepatan penanganan covid-19 seperti vaksinasi yang merupakan sarana penting untuk membangun kekebalan tubuh dan mencegah penyebaran virus covid-19. Namun, keberhasilan pelaksanaan vaksinasi bergantung pada informasi seputar vaksinasi dan kepercayaan masyarakat tentang vaksinasi. Sehingga diperlukan *health literacy* yang merupakan kemampuan individu atau seseorang dalam menggunakan potensi yang dimiliki untuk mengakses informasi atau pengetahuan terkait dengan vaksinasi covid-19. Banyak faktor dapat menyebabkan *health literacy*, namun kemampuan *health literacy* secara umum adalah penentu kesehatan yang paling penting baik dalam mengakses informasi yang benar mengenai vaksinasi covid-19. (Westra, 2014).

Di Amerika Serikat jutaan meyakini bahwa *health literacy* yang rendah, membuat seseorang tidak mampu membuat keputusan berdasarkan informasi dalam pengaturan klinis. *Health literacy* yang rendah dapat berdampak pada kesehatan seseorang dan kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas perawatan dan

mengambil keputusan tentang masalah kesehatannya termasuk dalam hal melakukan vaksinasi (Gupta, Kim, Griessenauer, Ogilvy, & Thomas, 2017).

Dalam upaya meningkatkan dan mempertahankan kesehatan, setiap individu penting untuk mengetahui *health literacy* maka telah dilakukan berbagai penelitian tentang *health literacy* telah dilakukan sebelumnya penelitian (Nurjanah & Yustin, 2014) yang menilai *health literacy* pada mahasiswa semester 1 fakultas kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang didapatkan hasil responden dengan tingkat *health literacy* yang rendah adalah sebanyak 31,9%. Sedangkan responden yang memiliki literacy kesehatan yang cukup baik, cenderung lebih aktif menggunakan pelayanan kesehatan seperti dokter dan cenderung lebih aktif banyak mengajukan pertanyaan saat konsultasi dengan dokter.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Medis Sekertariat pelatihan di Turki kelompok study yang terdiri dari siswa SMK kesehatan dan tenaga kesehatan, hasil menunjukkan bahwa peserta studi saat ini memiliki *health literacy* yang lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (Tekin, 2018).

Berdasarkan penelitian Sriyanah, Kadar, & Erika, (2019) didapatkan hasil perawat di RS Pelamonia Makassar belum pernah mendengar tentang *health literacy* sebelumnya adalah sebanyak 97,14%. Mayoritas responden juga terkendala dengan kurangnya kerjasama pasien untuk menilai *health literacy*. Masih banyak hambatan yang dimiliki perawat serta kurangnya pengetahuan dan sikap perawat mengenai *health literacy*.

Setiap individu harus mempunyai *health literacy* yang baik dalam mencari informasi dan mengambil keputusan bukan hanya dari kalangan tenaga medis atau petugas Kesehatan, tetapi seluruh masyarakat dan mahasiswa, yang perlu memahami terkait *health literacy* guna mempersiapkan diri menjadi seorang profesional dan mampu edukasi masyarakat yang mempunyai pengetahuan yang rendah dan sulit mengakses informasi. Untuk itu perlu evaluasi tingkat pemahaman mahasiswa dengan disiplin ilmu kesehatan dan mahasiswa non kesehatan terkait *health literacy*, melihat di Indonesia masih sangat sedikit penelitian terkait *health literacy* dan penelitian sebelumnya belum ada yang berfokus pada pengetahuan dan tingkat

*health literacy* mahasiswa kesehatan dan mahasiswa non kesehatan di UIN Alauddin Makassar. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai tingkat *health literacy* mahasiswa kesehatan dan non kesehatan di UIN Alauddin Makassar.

Tata Laksana Covid-19 dan *Health Literacy*  
Masyarakat Vaksinasi Covid-19


## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI COVID-19**

#### **A. TINJAUAN TEORI COVID-19**

##### **1. Definisi**

Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi oleh tubuh manusia, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), sebelumnya disebut 2019 nCoV. WHO menyatakan bahwa lembaga ini pertama kali mengetahui penyakit COVID-19 pada 31 Desember 2019 setelah sebelumnya menerima laporan banyaknya kasus 'pneumonia' di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Negara China. Pada akhir Januari 2020, hanya ada beberapa kasus COVID-19 yang diidentifikasi di luar China, namun sekarang virus tersebut telah menyebar ke berbagai penjuru dunia dengan total kasus lebih dari 100 juta jiwa. Indonesia merupakan salah satu dari negara-negara yang telah terpapar virus COVID-19 dengan total kasus positif COVID-19 sebanyak 4,232,099 kasus dan total kematian terkonfirmasi ialah sebanyak 142,848 jiwa (per 15 Oktober 2021 pukul 21:32 WIB) (Melyana et al., 2021).



*Gambar 1: Virus Covid-19*

Ada dua jenis corona virus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit yang menimbulkan gejala berat contohnya Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome yang disingkat SARS. Penyebaran Virus Covid-19 ini adalah bisa melalui tetesan air liur atau keluar dari hidung ketika orang yang terkonfirmasi batuk atau bersin. Sebagian besar pasien yang terkonfirmasi Covid-19 mengalami gangguan pernapasan ringan dan sedang serta dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan yang khusus. Namun orang dengan usia lanjut atau orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker mungkin akan menunjukkan gejala yang lebih serius dan sangat berbahaya. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak sangat parah dari infeksi Covid-19 ini yang melanda dunia (Suprpto, 2021).

Coronavirus (COVID-19) adalah suatu penyakit menular yang menyerang Saluran udara manusia menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang yang sembuh tanpa pengobatan khusus. Tidak seperti lansia

yang menderita penurunan fisiologis atau masalah kesehatan lainnya seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, kanker, penyakit ini bisa memburuk. 2020). Virus corona menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Sejak kejadian luar biasa yang terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, ditemukan jenis virus corona baru pada manusia, yang kemudian diberi nama severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2), disebut coronavirus disease 2019. (COVID-19) (Kemenkes, 2020)

Coronavirus adalah virus yang Ini mereplikasi RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm dan terutama menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Sebelum COVID-19, ada enam virus corona yang dapat menginfeksi manusia. Alphacoronavirus 229E, Alphacoronavirus NL63, Betacoronavirus OC43, Betacoronavirus HKU1, Penyakit Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV), Sindrom Pernafasan Timur Tengah Coronavirus (MERS).-CoV).

## 2. Etiologi

Coronavirus adalah virus RNA positif dengan penampilan seperti mahkota di bawah mikroskop elektron, korona adalah bahasa Latin untuk mahkota dengan ukuran partikel 120-160 nm dan puncak glikoprotein. Subfamili Orthocoronavirinae dari Coronaviridae (ordo Nidoviridae) dibagi menjadi empat gen CoV: alphacoronavirus (alphaCoV), betacoronavirus (betaCoV), deltacoronavirus (deltaCoV), dan Gamma corona virus (gamma CoV). Kemudian, genus betaCoV membelah menjadi lima sub-genera atau garis keturunan. Karakterisasi genom telah menunjukkan bahwa mungkin kelelawar dan tikus adalah sumber gen alphaCoV dan betaCoVs. Kebalikannya,

spesies burung tampaknya mewakili sumber gen deltaCoVs dan gamma CoVs (Rati,2020).

Virus corona yang menyebabkan COVID-19 termasuk dalam genus Betacoronavirus dan umumnya berbentuk lingkaran, polimorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini termasuk dalam subgenus yang sama, covirus Sarbe, dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002-2004. Berdasarkan hal tersebut, International Commission on Taxonomy of Viruses (ICTV) menyebutkan penyebab COVID-19 SARS-CoV-2. Tidak diketahui berapa lama virus penyebab COVID-19 dapat bertahan di permukaan, tetapi perilakunya mirip dengan jenis virus corona lainnya. Waktu kelangsungan hidup virus corona dapat dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti jenis permukaan, suhu lingkungan dan kelembaban (Rati,2020).

Penyebaran virus ini dapat melalui kontak langsung dengan melalui percikan batuk atau bersin (droplet) yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi virus covid-19, dan berdasarkan bukti ilmiah yang telah ada penyakit ini tidak dapat menyebar melalui udara atau angin. Selain itu, orang juga dapat terinfeksi jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus ini kemudian berpindah melalui sentuhan tersebut (Zuhana et al., 2021).

### **3. Sifat Virus**

Virus corona yang menyebabkan COVID-19 termasuk dalam genus Betacoronavirus. Analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus tersebut termasuk dalam subgenus yang sama, sarbecovirus, sebagai coronavirus yang menyebabkan epidemi penyakit pernapasan akut (SARS) parah pada tahun 2002-2004. Berdasarkan hal tersebut, International Commission on Taxonomy of Viruses mengusulkan nama SARS-CoV-2 (Susilo et al., 2020)

Covid-19 disebabkan oleh virus sindrom pernafasan akut parah Virus Corona 2 (SARS-CoV2). SARS-CoV-2

adalah virus yang mengandung genom RNA untai tunggal positif. SARS-CoV-2 termasuk dalam kategori betaCov dan 96,2% dari urutan genom SARS-Cov-2 identik dengan kelelawar Cov-RaTG13. Vektor kelelawar diyakini sebagai inang asli virus SARS-CoV-2. Namun, ini membutuhkan penelitian lebih lanjut pada spesies hewan. Virus ini juga ditemukan bertahan dalam aerosol hingga 3 jam. Virus lebih stabil pada permukaan padat, bertahan hingga 72 jam pada besi, 48 jam pada tembaga, dan 24 jam pada karton pada media plastik. (Sahin, 2020).

#### **4. Epidemiologi**

Pada 22 Januari 2020, diumumkan bahwa Covid baru berasal dari kelelawar liar dan termasuk dalam kelompok betacoronavirus, yang juga termasuk sindrom pernafasan akut parah terkait (CORs-CoV). Meskipun COVID-19 dan SARS-CoV termasuk dalam subkelompok beta-coronavirus yang sama, kesamaan tingkat genom hanya 70%, dan kelompok baru secara genetik diubah antara epidemi SARS-CoV dan SARS. Tidak menunjukkan perbedaan. Wabah itu terjadi selama festival tradisional paling terkenal di China, Tahun Baru Imlek, ketika sekitar 3 miliar orang bepergian ke seluruh negeri. Kondisi ini memfasilitasi penularan penyakit yang sangat menular ini dan berkontribusi pada kesulitan serius dalam pencegahan dan pengendalian epidemi. Festival ini berlangsung dari 10 Januari hingga 18 Januari. Wuhan, dengan populasi 10 juta, adalah pusat epidemi. Jumlah festival musim semi pada tahun 2020 diproyeksikan meningkat 1,7 kali dari 1,82 miliar pada tahun 2003 menjadi 3,11 miliar. Perjalanan panjang ini telah membantu menyebarkan penyakit yang tak tersembuhkan ini. 31 Desember 2019, China terinfeksi 42.708, meninggal 1.017, Singapura 45, Hong Kong 42, Thailand 33, Korea Selatan 28, Jepang 26, Malaysia 18, Jerman 16, Australia 15, AS 13, Prancis 11, Makau 10, Inggris Raya 8, Uni Emirat Arab 8. (Sahin et al., 2020) Sejak kasus pertama di Wuhan, Cina, jumlah kasus COVID-19 di Cina meningkat setiap

hari, mencapai puncak epidemiologis pada akhir Januari/awal Februari 2020. Laporan wabah pandemi ini berasal dari dan sekitar provinsi Hubei, kemudian menyebar ke provinsi lain di China. Susunan genetik virus mengikuti pola yang mirip dengan virus corona lainnya (Susilo dkk., 2020).

## **5. Data Epidemiologi Covid-19 (Dunia, Asia, Indonesia dan Sulawesi Selatan)**

Pada era pandemi covid-19 seperti sekarang ini perilaku menjaga kesehatan sangatlah penting dilakukan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa covid-19 atau yang lebih dikenal dengan Coronavirus Disease merupakan Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sangat Meresahkan Dunia dengan Jumlah penderita covid-19 terus meningkat dari hari ke harinya (Zuhana et al., 2021).

Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Sejak itu, kasus terus meningkat dan menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Selain Bencana Alam Akibat Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional di Indonesia. Pada 29 September 2020, Gugus Tugas Covid-19 melaporkan 282.724 kasus terkonfirmasi virus Covid-19. Tertinggi di Asia dengan 10.601 kematian (CFR 3,6%) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Hingga 51,2% kasus terjadi pada pria. Kasus terbanyak yang ditemukan antara 31-45 dan 0-5 tahun merupakan kasus yang paling sedikit. Pasien berusia 60 tahun ke atas memiliki angka kematian tertinggi. (Tanjung, 2021).

Dan data jumlah kasus Covid-19 di awal November 2020 di Indonesia adalah kasus positif bertambah 3.143 kasus menjadi 410.088 kasus. Pasien yang sembuh bertambah 3.506 menjadi 337.801 orang. Kasus kematian

terjadi bertambah 87 menjadi 13.768 jiwa orang. Sedangkan, di Provinsi Sulawesi Selatan jumlah Kasus yang Positif 17.936, sembuh sebanyak 15.664 Orang. Begitu besar jumlah kasus Covid-19 yang melanda negara Indonesia khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Suprpto, 2021).

## 6. Manifestasi Klinis

Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, sedang, atau berat. Manifestasi klinis utama adalah suhu tubuh di atas 38° C, batuk, sesak nafas. Selain itu, dapat disertai sesak napas yang parah, kelelahan, nyeri otot, gangguan saluran cerna seperti diare, dan kesulitan bernapas lainnya. Beberapa pasien mengalami sesak napas dalam waktu seminggu. Data menunjukkan bahwa di antara negara-negara di mana pandemi menyerang lebih awal, 40% kasus ringan, 40% sedang, termasuk pneumonia, 15% parah, dan 5% parah. Mematikan. Pasien dengan gejala ringan dikatakan sembuh setelah seminggu (Kemenkes, 2020).

Dalam tinjauan pustaka yang dilakukan oleh (Rati, 2020), berikut ini adalah sindrom klinis yang dapat terjadi dengan infeksi:

### a. Tidak ada komplikasi

Keadaan ini sangat ringan. Gejala yang terjadi dapat berupa gejala non spesifik. Gejala utama seperti demam dan batuk berlanjut, dan mungkin disertai dengan sakit tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit kepala, dan nyeri otot. Perlu dicatat bahwa timbulnya gejala mungkin atipikal atau atipikal pada orang tua dan pasien immunocompromised. Dalam beberapa kasus, gejalanya relatif ringan tanpa demam. Pada kondisi ini, tidak ada gejala komplikasi seperti dehidrasi, sepsis/sesak napas.

- b. Pneumonia ringan  
Gejala inti mungkin termasuk demam, batuk dan sesak napas, tetapi tidak ada tanda-tanda pneumonia berat.
- c. Pneumonia berat  
Pada klien dewasa, gejala yang akan muncul diantaranya adalah demam atau curiga infeksi pada saluran napas. Tanda yang muncul mengalami takipnea (frekuensi napas:  $>30x$ /menit), dan distress pernapasan berat atau saturasi oksigen pasien  $<90\%$  udara luar.
- c. sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS)  
Diagnosis ini memerlukan kriteria klinis dan ventilasi. Sindrom ini menunjukkan episode gagal napas baru yang parah atau memburuknya karakteristik pernapasan yang teridentifikasi oleh tenaga medis. Kemudian bentuk ARDS dibedakan berdasarkan derajat hipoksia.

## 7. Patofisiologi

Virus ini Dapat melewati selaput lendir, terutama mukosa hidung dengan laring, dan masuk ke paru-paru melalui saluran pernapasan. Selain itu, virus menyerang organ target yang mengekspresikan enzim pengubah angiotensin 2 atau ACE2, seperti paru-paru, jantung, sistem ginjal, dan saluran pencernaan. (Fitriani, 2020).

Protein SARS CoV 2 S memfasilitasi masuknya virus corona ke dalam sel target. Masuknya virus tergantung pada kemampuan virus untuk mengikat ACE2, reseptor membran ekstraselular yang diekspresikan pada sel epitel, dan tergantung pada protein S priming ke protease seluler TMPRSS2. Protein SARS CoV 2 dan SARS CoV S memiliki konformasi yang hampir identik dalam domain pengikatan reseptornya. Protein SARS CoV S memiliki afinitas pengikatan yang kuat untuk ACE2 manusia. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa SARS-CoV 2 mengenali ACE2 lebih baik daripada SARS-CoV pada manusia. (Fitriani, 2020).

Masa inkubasi COVID-19 adalah 3-14 hari. Hal ini ditandai dengan jumlah sel darah putih dan limfosit yang normal atau sedikit menurun, dan pasien tidak memiliki gejala virus. Virus kemudian mulai menyebar melalui aliran darah, terutama ke organ yang mengekspresikan ACE2, dan pasien mulai mengalami gejala ringan..4 sampai 7 hari setelah gejala pertama, kondisi pasien mulai memburuk dan ia menjadi sesak napas. ditandai dengan timbulnya pneumonia, limfopenia, dan eksaserbasi lesi paru. Kegagalan untuk mengatasi tahap ini dapat menyebabkan sindrom gangguan pernapasan akut (ARSD), sepsis, dan komplikasi lainnya. Tingkat keparahan klinis berhubungan dengan usia di atas 70 tahun, penyakit penyerta seperti diabetes, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), hipertensi dan obesitas, dan kondisi lainnya. (Fitriani, 2020).

Sistem imun bawaan dapat mengenali RNA virus melalui reseptor seperti RIG-I, NOD-like dan Toll-like. Hal ini selanjutnya merangsang produksi interferon (IFN) dan memicu munculnya efektor antivirus seperti sel CD8+, sel natural killer (NK) dan makrofag. Infeksi oleh betacoronavirus lainnya, yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV, ditandai dengan replikasi virus yang cepat dan produksi IFN yang lambat, terutama oleh sel dendritik, makrofag, dan sel epitel pernapasan. menjadi proinflamasi sebagai penyakit. Sitokin meningkat. melanjutkan. penyakit (Fitriani, 2020).

Infeksi virus ini dapat memicu respon imun pejamu yang berlebihan. Kadang-kadang, reaksi yang biasa disebut sebagai "badai sitokin" terjadi. Badai sitokin adalah peristiwa respons inflamasi yang berlebihan dengan produksi sitokin yang cepat dan masif sebagai respons terhadap infeksi. Hubungan dengan Covid-19 adalah perlambatan sekresi sitokin dan kemokin oleh sel imun bawaan dengan memblokir protein nonstruktural virus. Selain itu, menyebabkan peningkatan sitokin dan kemokin proinflamasi (IL6, TNF $\alpha$ , IL8, MCP1, IL1, CCL2, CCL5, dan interferon) yang terkait dengan aktivasi makrofag dan

limfosit. Pelepasan sitokin ini dapat memicu aktivasi sel imun adaptif seperti sel T, neutrofil, dan sel NK bersama dengan produksi sitokin proinflamasi yang berkelanjutan. Peningkatan sitokin proinflamasi yang cepat ini dapat menyebabkan peradangan jaringan paru-paru dan kerusakan pada epitel paru-paru dan endotelium. Dan kerusakan ini dapat mengakibatkan ARDS, multiple organ failure, dan kematian dalam waktu yang sangat singkat. (Fitriani, 2020).

Diketahui juga Jalur penularan utama SARS CoV 2 adalah penularan droplet. Namun, penularan fecal-oral dimungkinkan. Sebuah studi oleh Xiao et al. Dari 73 pasien yang dirawat karena Covid-19 pada tahun 2020, terlihat 53,42% pasien positif RNA SARS-CoV-2 pada tinja pasien. Faktanya, 23,29% pasien terkonfirmasi positif RNA SARS-CoV-2 dalam fesesnya, meskipun sampel pernapasan sudah menunjukkan hasil negatif. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ACE2 sangat diekspresikan dalam sel-sel kelenjar lambung, duodenum, dan rektum, dan bahwa protein nukleokapsid virus ditemukan di epitel lambung, duodenum, dan rektum. Ini menunjukkan bahwa SARS CoV 2 juga dapat menginfeksi saluran pencernaan manusia dan selanjutnya ditularkan melalui rute fecal-oral. (Fitriani, 2020).

## **8. Pemeriksaan Penunjang**

Diagnosis dapat dilakukan dengan beberapa cara. B. Melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan. Cerita utama adalah cerita perjalanan atau cerita kontak dekat dengan COVID-19, dengan gejala klinis dan penyakit penyerta. Gejala klinis yang bervariasi berdasarkan perawatan pasien terinfeksi COVID-19 yang tinggal dengan atau dekat dengan klien level. Namun, gejala utamanya adalah demam, batuk, nyeri otot, sesak napas, sakit kepala, diare, mual dan sakit perut. Gejala yang paling sering dilaporkan selama ini adalah demam (98%), batuk dan mialgia (Fredy Ferdiansyah, 2021). Diagnosis pasti

pneumonia COVID-19 didasarkan pada reaksi rantai polimerase transkripsi balik atau pengujian RT-PCR. Namun, tes RT-PCR masih terbatas atau sulit diperoleh dan dapat menghasilkan hasil negatif palsu. Di Wuhan, CT scan digunakan sebagai alat diagnostik dan triase kasus untuk COVID-19. Hal ini dikarenakan tes RT-PCR masih sulit didapatkan dan memiliki sensitivitas yang sangat rendah pada saat itu. Pengujian RT-PCR kini diadopsi secara luas untuk skrining dan diagnosis Covid-19 di beberapa negara. Ini karena pengujian RT-PCR banyak digunakan dan sudah sangat sensitif. Namun, jika pemindaian RT-PCR masih terbatas pada hasil yang lebih lama, CT scan ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk membuat atau membatalkan diagnosis pneumonia COVID-19 yang valid (lihat Suryamin, 2021). Berdasarkan Radiological Society of North America (RSNA), gambar pneumonia COVID-19 pada CT scan dada dibagi menjadi empat jenis:

- a. Khas Gambar ground-glass didistribusikan secara sirkular multifokal di sekitar area hamburan interlobular, disebut sebagai patch gila, dengan atau tanpa sklerosis dan penebalan septum interlobular. Tanda-tanda halo terbalik atau gambar lain dari pengorganisasian pneumonia terlihat pada stadium lanjut, gambar lain yang khas dari Covid-19.
- b. bidang paru-paru memiliki tampilan ground-glass dan tidak ditemukan pneumonia COVID yang khas. Kasing dengan tampilan sedikit seperti kaca tanah, bukan perimeter melingkar atau perifer, termasuk kasus COVID-19 menengah.
- c. Tidak khas Abstrak pohon kabut multifokal dalam tunas. Tidak ada anatomi khas COVID-19, konsolidasi lobar atau segmental, kavitas paru, atau penebalan septum interlobular dengan efusi pleura.
- d. negatif Tidak ada konsolidasi fokal, efusi pleura, dan nodul paru mencurigakan yang ditemukan. (Suryamin, 2021).

Pemeriksaan prokalsitonin atau disebut PCT menunjukkan hasil normal kecuali bila dicurigai akan terjadinya infeksi bakteri, maka PCT dapat meningkat. Pemeriksaan lain juga dilakukan untuk melihat komorbid dan evaluasi kemungkinan terjadinya komplikasi pneumonia yaitu fungsi ginjal, fungsi hati, albumin serta analisis gas darah, elektrolit, gula darah dan biakan kuman serta uji kepekaan untuk melihat kemungkinan penyebab bakteri atau bila dicurigai terjadi infeksi ganda dari infeksi bakteri (Fredy Ferdiansyah, 2021).

Diagnosis yang pasti atau kasus terkonfirmasi ditentukan berdasarkan dari hasil pemeriksaan ekstraksi RNA *virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS CoV 2). COVID-19 itu menggunakan *reverse transcription polymerase chain reaction* (RT PCR) untuk mengekstraksi 2 gen SARS CoV 2. Untuk contoh uji yang dapat digunakan adalah sampel berupa swab tenggorok (Fredy Ferdiansyah, 2021).

## 9. Penatalaksanaan Medis

Prinsip tatalaksana yang secara keseluruhan Triase: identifikasi cepat dan isolasi pasien dengan infeksi saluran pernapasan akut berat (disingkat SARI), pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI yang sesuai, perawatan suportif dan pemantauan pasien, diagnosis laboratorium Dilakukan dengan mengikuti prinsip pengumpulan sampel laboratorium untuk Mengobati pasien dengan hipoksemia atau gagal napas, sindrom gangguan pernapasan akut/ARDS, syok septik dan kondisi kritis lainnya(Fredy Ferdiansyah, 2021).

Hingga sekarang Tidak ada terapi antivirus khusus untuk nCoV 2019 atau anticoronavirus lainnya di sini. Beberapa penelitian telah menyarankan penggunaan Janus kinase inhibitor dan regulator endositosis baricitinib untuk memungkinkan virus memasuki sel, terutama sel epitel alveolar. Perkembangan lainnya adalah penggunaan kombinasi remdesivir dan chloroquine yang diketahui

memiliki efek antivirus terhadap RNA, namun keduanya belum berhasil. diperlukan, terapi oksigen sesuai dengan tingkat keparahan penyakit, termasuk penggunaan kanula oksigen, dan terapi oksigen. masker. Jika dicurigai terjadi infeksi multipel, berikan antibiotik spektrum luas (Fredy Ferdiansyah, 2021).

Salah satu pertimbangan manajemen adalah manajemen penyakit penyerta. Dari gambaran klinis pasien COVID-19, penyakit penyerta diketahui berhubungan dengan morbiditas dan mortalitas. Penyakit penyerta yang diketahui berhubungan dengan luaran pasien antara lain usia lanjut, hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penyakit serebrovaskular(Fredy Ferdiansyah, 2021).

Saat ini, tidak ada perawatan khusus yang direkomendasikan untuk pasien COVID-19, termasuk obat antivirus dan vaksin. Perawatan yang mungkin termasuk pengobatan simptomatik dan terapi oksigen. Pasien dengan gagal napas dapat menggunakan ventilator.. Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) telah mengumumkan bahwa interferon-alpha (IFN- $\alpha$ ), lopinavir/ritonavir (LPV/r), ribavirin (RBV) dan chloroquine phosphate adalah beberapa pengobatan yang mungkin untuk infeksi SARS-CoV-2. Kami meninjau beberapa obat dengan kemanjuran (CLQ/r, CQ), remdesvir dan umifenovir (arbidol). Selain itu, ada juga beberapa obat antivirus lain yang sedang diuji di tempat lain.(Susilo et al., 2020).

Ada juga integrasi dengan Islam yang menganjurkan kita supaya bisa menjaga kebersihan diri serta mengintensifkan upaya untuk tetap sehat. Hal ini tertuang dalam surat An Nahl ayat 69 :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ  
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:69]

[69]

Terjemahan :

Maka makanlah setiap (jenis) buah-buahan dan ikutilah jalan Tuhanmu yang telah memudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) aneka warna yang mengandung obat bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir. [An Nahl:69]

Sudah Sejak dahulu,wabah penyakit menular dikenal pada zaman nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan pes dan lepra. Nabi melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah dengan tujuan untuk mencegah penularan ke wilayah wilayah lainnya pada saat itu. Islam telah memberikan peringatan sebagaimana tercantum dalam sabda Rasulullah:

*"Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,"* (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Hal ini erat kaitannya dengan hal yang telah pemerintah lakukan dengan memberlakukan system buka tutup wilayah yang mulai berlangsung pada tahun 2020 yang dikenal dengan istilah lock down. Istilah ini kemudian tergantikan dengan istilah PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dimana kebijakan ini diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan.

Hal ini tentunya bila tidak dilakukan oleh pemerintah, banyak dampak yang ditimbulkan akibat pandemik secara global diantara berdampak pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan kehidupan politik. Dampak utama dalam bidang kesehatan sangat mempengaruhi bidang sektor lainnya. Pandemi global ini diperkirakan akan memanjang seiring dengan belum ditemukannya vaksin. Berbagai Negara belahan dunia mengupayakan sistem pencegahan dan

penanggulangan untuk meminimalkan jumlah pasien dengan paparan Covid 19 tersebut dengan menerapkan sistem yang berlaku secara nasional maupun internasional melalui kewaspadaan standar *Universal Precaution*.

Selain ayat tersebut, terdapat pula perintah Allah SWT untuk menjaga kebersihan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 222:

وَدَيْتُ أَوْلَادَكَ عَنِ الْمَجِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتِرْ لَوْ أَلَيْسَاءَ فِي الْمَجِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهَرُونَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَجِبُ التَّوْبِينَ وَيَجِبُ الْمَتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

yang artinya: "... Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."

Dari arti **ayat** tersebut, kita diingatkan untuk tetap bersih dan suci adalah sebagian dari iman. Perilaku pencegahan yang dikaitkan dalam integrasi keislaman tentunya telah ada sebelum adanya pandemik Covid-19. Maksud ayat ini diejawantahkan dalam bentuk perilaku hidup bersih dan sehat agar virus Covid-19 tidak menular melalui agen dan media lainnya yang menjadi tempat untuk berkolonisasi dalam tubuh manusia itu sendiri.

Ajaran agama islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga Kesehatan. Seorang mukmin yang kuat dan sehat lebih Allah cintai dari pada seorang mukmin yang lemah. Terlebih di tengah pandemik virus Covid-19 yang telah berlangsung selama 2 tahun. Hal ini terwujudkan dalam hal yang selalu kita lakukan sehari-hari seperti melakukan wudhu sebelum sholat dengan membasuh beberapa bagian tubuh untuk membersihkan diri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam Islam. Karena dengan menjaga kebersihan, lebih mendekatkan seseorang pada Kesehatan dan mencegah timbulnya berbagai penyakit. Sebagaimana Abu Malik Al-Ash'ari mengungkapkan bahwa Rasulullah bersabda, "Kesucian itu separuh dari iman"



### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORI VAKSINASI COVID-19**

### **1. Definisi Vaksinasi Covid-19**

Vaksin adalah agen imunisasi biologis yang dirancang untuk memberikan perlindungan spesifik terhadap penyakit tertentu. Proses pemberian vaksin disebut vaksinasi. Dengan kata lain, vaksinasi diberikan kepada individu yang rentan dengan memberikan obat herbal atau obat yang dimodifikasi (seperti vaksin polio oral), suspensi organisme yang tidak aktif (seperti batuk rejan), atau racun yang tidak aktif seperti pertusis. penyakit. Tujuan vaksinasi adalah untuk melindungi orang yang berisiko terkena penyakit, seperti anak-anak, orang tua, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, orang dengan penyakit kronis, dan orang yang tinggal di daerah endemik. Vaksinasi adalah strategi umum untuk mengendalikan, menghilangkan, memberantas, atau menahan penyakit (misalnya strategi vaksinasi massal). (Fredy Ferdiansyah, 2021).

“Vaksinasi massal adalah pemberian vaksin secara serentak kepada suatu komunitas untuk menciptakan herd immunity”, peneliti yang melakukan uji klinis Coronabus dan merencanakan vaksinasi massal terhadap COVID-19 di Indonesia One Yuningsi (2020) menyatakan bahwa program vaksinasi sudah ada. merupakan langkah efektif untuk mencegah penularan penyakit. Ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman COVID-19 dan, dalam jangka panjang, mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang saat ini timbul dari pandemi COVID-19 (Malau et al., 2021). “Perintah pelaksana imunisasi ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang telah menjadi wabah global selama setahun. (Toruna et al., 2021). Penjelasan vaksinasi Covid-19 berdasarkan buku saku vaksinasi (Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2021).

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan

kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin akan membuat tubuh mengenali bakteri dan virus yang disebabkan penyakit tertentu. Vaksin bukanlah obat vaksin mendorong pembentukan kekebalan tubuh spesifik pada penyakit covid-19 agar terhindar dari tertular dan perparahan, pelaksanaan vaksin bertahap covid-19 akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM berdasarkan hasil uji luar negeri atau Indonesia. Tahap vaksinasi yang berlaku internasional terdiri dari 3 tahap yaitu tahap praklinik, tahap klinis (fase 1-3), dan tahap penetapan penggunaan

Secara umum vaksin bekerja dengan menrangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri dan virus sehingga apabila orang terpapar akan terhindar dari penularan, ataupun perparahan penyakit. Efek samping yang timbul pada vaksin covid-19 adalah demam, nyeri otot, dan ruam-ruam pada bekas suntikan, melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap efek samping terberat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut, manfaat vaksin lebih besar dibandingkan risiko sakit dan terinfeksi bila tidak melakukan vaksinasi. Walaupun sudah dilakukan vaksinasi akan tetapi kita juga perlu tetap mengikuti protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun).

## **2. Pentingnya Vaksinasi Covid-19**

Indonesia saat ini telah memasuki era new normal dimana masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah di tengah wabah virus corona COVID-19. Satu-satunya cara jitu penanganan iCOVID-19 yang bisa dilakukan iuntuk imelawan pandemi COVID-19 iadalah dengan menerapkan gaya hidup normal dengan cara baru (new inormal) atau adaptasi kebiasaan baru agar tidak tertular penyakit ini [2]. Selain imelakukan iadaptasi ikebiasaan ibaru, sangat penting ijuga iuntuk vaksinasi COVID-19 guna menekan kasus yang terus bertambah (Yolanda et al., 2021).

Vaksin COVID-19 Sekarang didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pemberian vaksin ini menjadi solusi paling tepat untuk menekan angka kasus infeksi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Sejak vaksin COVID-19 masuk ke Indonesia, banyak pihak yang menentang anjuran pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Memang, penyediaan vaksin ini sangat penting tidak hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara-negara yang terkena pandemi (Yolanda et al., 2021).

Vaksinasi, atau vaksinasi, bertujuan untuk membantu sistem kekebalan tubuh seseorang mengenali dan dengan cepat melawan bakteri dan virus penyebab infeksi. Tujuan yang dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat virus ini. Meskipun vaksin ini tidak dapat memberikan perlindungan 100% terhadap infeksi virus corona, vaksin ini dapat mengurangi kemungkinan gejala parah dan komplikasi dari COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong pengembangan herd immunity atau kekebalan kawanan. Hal ini penting karena beberapa orang tidak dapat divaksinasi karena alasan tertentu (Yolanda et al., 2021).

### **3. Jenis Vaksinasi Covid-19**

Adapun beberapa jenis vaksin yang umum digunakan di Indonesia.

- a. Vaksin Sinovac-Vaksin



*Gambar 2: Vaksin Sinovac*

b. Vaksin AstraZeneca



*Gambar 3: Vaksin AstraZeneca*

c. Vaksin Modern



*Gambar 4: Vaksin moderna*

Vaksin Sinovac atau CoronaVac dibuat menggunakan metode virus yang tidak aktif. Dengan kata lain, virus corona telah KO atau dilemahkan sehingga vaksin ini tetap hidup dan tidak bisa bereplikasi. Virus corona mati dicampur dengan senyawa berbasis aluminium yang disebut adjuvant. Senyawa ini merangsang sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan respons terhadap vaksin. Khasiat vaksin ini adalah 65,3%. Cara kerja vaksin adalah ketika Anda menyuntikkan vaksin Synovac, yang mengandung virus yang tidak aktif, sistem kekebalan Anda menghasilkan antibodi yang secara khusus melawan virus corona. Oleh karena itu, setiap kali tubuh diserang virus corona, sudah ada antibodi yang dapat melawan dan mencegah penyakit tersebut. (Ananda & Paujiah, 2021).

Organisasi Kesehatan Dunia (2021). Ini berbeda dari vaksin Astrazeneca Sinovac karena dibuat dari rekayasa genetika (vektor virus) dari virus influenza yang tidak berbahaya. Khasiatnya adalah 63-75%. Vaksin ini bekerja dengan cara merangsang tubuh untuk memproduksi antibodi yang dapat melawan infeksi virus Covid-19. Seperti

vaksin Covid-19 lainnya, vaksin AstraZeneca dapat menimbulkan efek samping seperti nyeri tempat suntikan, memar dan bengkak, demam dan suhu, menggigil, lelah, sakit kepala, mual, nyeri sendi dan otot (Ananda & Paujiah, 2021).

Vaksin moderna sekarang tersedia untuk penggunaan umum. Beberapa penelitian lain menyatakan bahwa Moderna efektif mencegah kebidaban mutan alfa dan beta virus COVID-19. Bahan-bahan dasar pembuatan messenger RNA (mRNA) membuat Vaksin ini memiliki khasiat 95%. Karena vaksin Moderna terbuat dari mRNA (messenger RNA), cara kerjanya berbeda dengan vaksin yang menggunakan virus yang dilemahkan, seperti yang digunakan dalam vaksin Sinovac dan Sinopharm. Vaksin mRNA bekerja dengan mengajarkan sel-sel tubuh kita untuk membuat protein spesifik yang membentuk respon imun. Setelah respon imun terbentuk, ia melindungi tubuh kita ketika terinfeksi virus. Seperti halnya Sinovac dan AstraZeneca, vaksin ini juga memiliki efek samping sebagai tubuh bereaksi terhadap vaksin. Beberapa orang yang menerima vaksin benih mengatakan efek sampingnya lebih parah daripada yang lain..(Pardi et al., 2018).

#### **4. Fenomena/Masalah Dalam Vaksinasi Covid-19**

Dampak wabah Covid-19 tidak terbatas pada masalah kesehatan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan aspek kehidupan, menciptakan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya bahkan pendidikan. Banyak negara, bahkan Indonesia, telah menutup sekolah dari taman kanak-kanak hingga universitas. Yang paling menakutkan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan begitu banyak korban. Banyak tenaga kesehatan yang meninggal saat menangani kasus Covid-19. Perubahan yang dihasilkan dari dampak Covid 19 mengubah kebiasaan dan perilaku masyarakat di seluruh dunia tanpa kita sadari. Situasi baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang terbentuk sebagai dampak

dari pandemi COVID-19 telah lama disebut kenormalan baru tanpa akhir yang terlihat. (Fauzia & Hamdani, 2021).

Tentu saja, perkembangan Covid-19 yang tampak membuat masyarakat semakin resah. Selain beberapa masalah dalam new normal, ketika banyak orang mengabaikan himbauan pemerintah, masyarakat percaya bahwa penyakit itu datangnya dari Tuhan, dan jika mereka sakit, itu adalah kehendak Tuhan. tapi bukan berarti orang menyerah begitu saja dan selalu berkata, "Semua adalah kehendak Tuhan." Oleh karena itu, manusia diberi akal untuk membedakan dirinya dengan makhluk Tuhan yang lain agar ia dapat berpikir dan menggunakan akalnya. Artinya manusia harus mampu bertahan atau lulus ujian yang diberikan oleh Tuhan, terlepas dari apakah penyakit itu muncul atas dasar ujian atau ujian. (Fauzia & Hamdani, 2021).

Mengenai upaya memutus dan memutus mata rantai penyebaran infeksi virus corona baru, memang benar juga masih banyak masyarakat yang tidak memakai masker di tempat umum dan berkumpul di keramaian meski anggota keluarganya sudah meninggal karena terinfeksi virus corona baru. . Beberapa orang tidak memperhatikan, tapi ya. Prosesi pemakaman. Akibatnya, penularan Covid-19 menyebar dengan cepat. Fenomena ini dapat terjadi karena kebiasaan masyarakat yang masih belum bisa menerima kehadiran Covid-19, pengetahuan tentang Covid-19 yang masih terbatas, serta menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang tidak semestinya terhadap penyebab masyarakat. memprovokasi meningkat. (Fauzia & Hamdani, 2021).

## **5. Langkah Pemerintah Dalam Mempercepat Vaksinasi Covid-19**

Berdasarkan penelitian dari (Dewi & Bustan, 2021), langkah pemerintah dalam mempercepat vaksinasi covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi vaksinasi COVID-19

Sosialisasi vaksinasi COVID-19 dilakukan untuk mendukung upaya pemerintah mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Lebih lanjut, ia meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 aman dan dapat diharapkan, mereka ingin divaksinasi. Saat mengenakan kegiatan sehari-hari, materi yang disajikan antara lain:

1. Apa itu vaksinasi COVID-19?
  2. Mengapa vaksin itu penting?
  3. Siapa yang bisa divaksinasi?
  4. Siapa yang tidak boleh divaksinasi?
  5. Siapa yang harus divaksinasi?
  6. Apa saja vaksin COVID-19 yang diresepkan di Indonesia?
  7. Apakah vaksin COVID-19 aman?
  8. Apa itu herd immunity? Apa efek samping dari vaksin COVID-19?
  9. Berapa biaya vaksinasi COVID-19?
  10. Apa lagi yang harus saya ketahui tentang mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19?
- d. Health log 7M Tujuan kegiatan ini tidak Selain mengedukasi masyarakat tentang pencegahan COVID-19, kami juga akan menyadarkan masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat. Tidak berarti seseorang akan 100% bebas dari COVID-19 setelah pemberian vaksin COVID-19. Selain itu, vaksinasi bukanlah pengganti protokol kesehatan 7M sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan penularan COVID-19.
1. Kenakan masker dan gunakan dengan baik dan benar.
  2. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
  3. Jaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain.
  4. Dengan menghindari keramaian, siapa pun dapat menjadi pembawa virus corona atau orang tanpa

gejala (OTG) yang menyebarkan virus COVID-19.

5. Kurangi mobilitas dan interaksi, kurangi bepergian dari satu tempat ke tempat lain.
6. Jangan makan bersama. Makan bersama sambil mengobrol meningkatkan risiko infeksi di udara.
7. Mendekatkan diri dengan agama. Yang terpenting adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan dapat memberi Anda ketenangan pikiran dan melindungi kewarasan Anda dengan mencegah kepanikan. Hasil rangkaian kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penularan virus COVID-19 melalui vaksinasi terhadap COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan 7M.



## **BAB IV**

### **KEWASPADAAN STANDAR COVID-19**

*Universal precaution* merupakan upaya untuk mencegah penularan dari patogen melalui beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terpapar penyakit (Kemenkes, 2020). Sedangkan menurut Saxena (2020) *Universal precaution* covid-19 merupakan pencegahan umum penularan virus covid-19 yang merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahin (2020) menemukan bahwa penularan covid-19 sering terjadi ketika orang yang terinfeksi bersin dan melalui tetesan pernapasan yang dihasilkan tersebut menyebar ke udara dan dihirup oleh orang lain kemudian menetap dalam paru-patu dan menimbulkan gejala menyerupai influenza dan menimbulkan gangguan pada saluran pernapasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penularan virus covid-19 dapat terjadi akibat tangan atau benda yang terkontaminasi permukaan atau objek yang terinfeksi bersentuhan dengan mulut, hidung, atau mata (Sahin, 2020). Oleh sebab itu penting untuk dilakukan pencegahan penularan virus covid-19.

*World Health Organization* (2020) menyatakan bahwa beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah serta memperlambat penyebaran virus covid-19 yaitu:

- a. Menerapkan pola hidup sehat
- b. Melakukan kebersihan tangan secara benar
- c. Menjaga jarak
- d. Menerapkan etika batuk dan bersin
- e. Menggunakan masker

Kemenkes (2020) menguraikan beberapa pencegahan efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penularan virus covid-19. Adapun metode pencegahan tersebut antara lain:

- a. Membersihkan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun jika tangan terlihat kotor atau menggunakan *hand sanitizer* apabila tangan tidak terlalu kotor

- b. Hindari menyentuh bagian mulut, hidung serta mata apabila belum mencuci tangan
- c. Etika batuk serta bersin dengan menutup bagian mulut dan hidung menggunakan tisu atau siku bagian dalam serta tidak lupa membuang tisu yang telah digunakan ke tempat sampah perlu diterapkan
- d. Penggunaan masker medis apabila memiliki gejala gangguan pada saluran pernapasan serta tetap memperhatikan kebersihan tangan ketika membuang masker yang telah digunakan
- e. Menjaga jarak fisik minimal 1 meter atau lebih pada orang yang memiliki gejala gangguan pernapasan.

Pedoman yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (2020) dan (Kemenkes, 2020) sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chu et al (2020) menyatakan bahwa semua pasien yang datang ke rumah sakit perlu diberlakukan prinsip pencegahan universal terutama pada rumah sakit yang terletak di pusat kota epidemik. Hal ini karena banyak kejadian penularan terjadi pada orang-orang yang tidak bergejala. Oleh karena itu pertanyaan pada setiap pasien yang datang ke rumah sakit seperti adanya riwayat demam, batuk, dan sesak 2 minggu terakhir atau adanya kontak dengan pasien positif tidak dapat membantu untuk mengidentifikasi pasien covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penularan virus lebih rendah dengan jarak fisik 1 meter atau lebih, dibandingkan dengan jarak kurang dari 1 meter, Penggunaan masker wajah dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam risiko infeksi dan ditemukan bahwa masker N95 atau respirator serupa dapat melindungi dari penularan infeksi dibandingkan dengan masker bedah sekali pakai atau sejenisnya (misalnya, masker kapas berlapis 12-16 lapisan yang dapat digunakan kembali), penggunaan pelindung mata juga dikaitkan dengan penurunan risiko infeksi covid-19 (Chen et al., 2020).

Pencegahan umum penularan virus covid-19 menurut Saxena (2020) merupakan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Pencegahan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan antara lain:

- a. Menggunakan masker bedah atau N95 yang menutupi bagian hidung dan mulut
- b. Menggunakan sarung tangan kapan saja untuk menghindari cairan tubuh yang terkontaminasi virus
- c. Menggunakan pakaian pelindung anti air atau *bazmat* serta penggunaan *googles* atau *visor* untuk melindungi mata
- d. Membersihkan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan *hand rub*, sering mengganti sarung tangan dan membersihkan tangan setiap kontak dengan pasien yang berbeda
- e. Hindari menyentuh *face shield*, masker, pelindung mata, wajah, kepala, atau area leher sebelum mencuci tangan.

Penelitian tersebut juga didukung oleh Chu et al (2020) yang meneliti tentang efek jarak fisik optimal, penggunaan masker serta pelindung mata untuk mencegah penularan virus covid-19 pada layanan kesehatan serta komunitas dengan menggunakan metode systematic review dan meta analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa Penularan virus lebih rendah dengan jarak fisik 1 m atau lebih, dibandingkan dengan jarak kurang dari 1 m, Penggunaan masker wajah dapat menghasilkan pengurangan risiko penularan infeksi yang besar, serta penggunaan pelindung mata juga dikaitkan dengan penularan infeksi lebih sedikit. Hasil temuan ini mendukung jarak fisik 1 m atau lebih sebagai perkiraan kuantitatif, Penggunaan masker wajah secara optimal, respirator, dan pelindung mata sebagai intervensi yang lebih baik dalam mencegah penularan virus covid-19 (Chu et al., 2020).

## **A. ETIKA BATUK DAN BERSIN DALAM PENCEGAHAN COVID-19**

### **1. Pengertian Batuk Dan Bersin**

Batuk merupakan usaha untuk melindungi paru-paru dari berbagai rangsangan dan merupakan Refleks fisiologis yang melindungi paru-paru dari trauma mekanis, kimia, dan termal. Batuk menjadi patologis ketika dirasakan sebagai gangguan. Batuk seperti ini seringkali merupakan tanda penyakit di dalam atau di luar paru-paru dan mungkin

merupakan gejala awal dari penyakit tersebut. (Purwanto et al., 2018)

Batuk merupakan manifestasi klinis penyakit saluran pernafasan. batuk bukan penyakit melainkan gejala penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Ada banyak penyakit yang dapat menyebabkan batuk, mulai dari infeksi, alergi, radang hingga keganasan (Patroni et al., 2020)

Klasifikasi batuk menurut Nadesul Hendrawan adalah :

a. Batuk akut

Batuk akut adalah tahap awal batuk dan sembuh dengan mudah dalam waktu 3 minggu. Penyebab utamanya adalah infeksi saluran pernapasan atas seperti pilek, sinusitis bakterial akut, batuk rejan, eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik, rinitis alergi, dan rinitis iritan.

b. Batuk sub akut

Batuk subakut adalah transisi dari akut ke kronis, berlangsung 3-8 minggu. Penyebab paling umum adalah batuk pasca infeksi, sinusitis bakteri, atau asma. c. Batuk Kronis Batuk kronis adalah tahap batuk terus menerus yang terjadi selama periode 8 minggu atau lebih.

c. Batuk kronis

Batuk kronis juga dapat digunakan sebagai tanda penyakit lain yang lebih serius seperti asma, TBC, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit refluks gastroesofageal, dan kanker paru-paru. Bersin adalah cara alami tubuh untuk mengeluarkan atau mengeluarkan benda asing yang mengiritasi hidung dan tenggorokan. Zat asing tersebut dapat masuk dalam berbagai bentuk seperti debu, gas kimia, virus dan bakteri. Bersin adalah aliran udara yang kuat melalui mulut atau hidung Anda. Bersin terjadi di luar kehendak kita. Bersin biasanya disebabkan oleh adanya partikel yang mengiritasi di hidung. Ujung saraf di hidung mendorong bersin untuk menghilangkan partikel-partikel ini.

## 2. Penyebab Batuk dan Bersin

Batuk umumnya berhubungan dengan infeksi saluran pernapasan atas, gejala flu, alergi, TBC, benda asing yang masuk ke saluran napas, sesak napas akibat konsumsi alkohol, menghirup asap rokok lingkungan, dan emosional dan Disebabkan oleh peningkatan psikologis masalah.. (Patroni et al., 2020)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan batuk, antara lain:

- a. Adanya angsgan mekanis seperti asap rokok, debu, tumor, dll.
- b. Adanya perubahan suhu yang tiba-tiba;
- c. iritasi kimia seperti gas dan bau;
- d. adanya peradangan atau infeksi bakteri atau jamur;
- e. reaksi alergi;

Setelah fase ini, otot-otot pernapasan rileks, yang memendek atau memanjang tergantung pada jenis batuk. Jika batuk lain diperlukan, fase relaksasi yang singkat diikuti untuk mempersiapkan batuk. Adapun mekanisme batuk adalah sebagai berikut :

- a. Tahap stimulasi

Iritasi pada salah satu saraf sensorik saraf vagus di serat aferen laring, trakea, bronkus besar, atau cabang faring dari saraf glossopharyngeal dapat menyebabkan batuk. Batuk juga terjadi ketika reseptor batuk yang terletak di lapisan faring dan kerongkongan, rongga pleura, dan saluran telinga dirangsang.

- b. Fase inhalasi

Inhalasi dalam dan cepat, sehingga sejumlah besar masuk ke paru-paru dengan cepat

- c. Tahap kompresi

Tahap ini dimulai dengan penutupan glotis, dan batuk dapat terjadi tanpa penutupan glotis karena otot-otot ekspirasi meningkatkan tekanan intratoraks bahkan ketika glotis tetap terbuka.

- d. Fase ekspirasi

Selama tahap ini, kontraksi kuat otot-otot ekspirasi menyebabkan glotis terbuka secara tiba-tiba, mengeluarkan sejumlah besar udara dengan kecepatan tinggi. Singkirkan benda asing dan zat lainnya. Pergerakan glotis, otot pernapasan, dan bronkus sangat penting untuk mekanisme batuk, karena merupakan tahapan batuk yang sebenarnya. Suara batuk dimodifikasi oleh getaran sekresi saluran napas dan getaran pita suara (Guyton & Hall, 2014)

Bersin disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain alergi, peradangan, infeksi saluran pernapasan, olahraga berlebihan, obat-obatan tertentu, dan sinar matahari (Patroni et al., 2020).

Refleks bersin terjadi ketika benda asing masuk ke hidung. Sistem saraf di rongga hidung mengirimkan sinyal ke otak bahwa ada sesuatu di hidung. Otak merupakan pusat pengatur proses bersin. Ketika otak menerima sinyal ini, otot dada, otot perut, diafragma, otot pita suara, otot punggung, dan otot kelopak mata untuk mempersiapkan saluran hidung untuk dikeluarkan.

Biasanya, saat bersin, hidung Anda menjadi sedikit gatal, dan kemudian Anda menguap sedikit untuk meningkatkan tekanan udara di hidung Anda. Setelah itu, otot-otot tubuh bekerja sama untuk mengeluarkan benda asing tersebut. Bersin setidaknya bisa menyebarkan 100.000 bakteri dan virus ke udara dengan kecepatan 160 km/jam.

### **3. Bakteri Penyebab Batuk**

Batuk dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kebutuhan oksigennya aerob dan anaerob.

- a. Bakteri aerob Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Contoh bakteri aerob adalah spesies *Nitrosomonas*, *Nitrococcus*, *Staphylococci*.
- b. Bakteri anaerob Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Contoh

bakteri anaerob adalah *Aerobacter aeruginosa*, spesies *Streptococcus*, *Escherichia coli*

#### **4. Tujuan Etika Batuk**

Covid 19 ditandai dengan penularan yang sangat cepat, morbiditas dan mortalitas yang tinggi, serta menimbulkan masalah overloading pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mengendalikan kasus Covid-19, seperti melalui kampanye etika batuk dan bersin (Patroni et al., 2020).

#### **5. Etika Batuk Saat Pandemi Covid 19**

Kini menyebar ke seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berusaha memberikan saran tentang cara mencegah infeksi virus ini. Menurut WHO, salah satunya berkaitan dengan etika batuk dan bersin yang benar. Menurut WHO, COVID-19 menyebar dari orang yang terinfeksi ke orang yang sehat.

Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui tetesan kecil dari hidung dan mulut ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Tetesan tersebut kemudian mendarat di benda atau permukaan apa pun yang disentuh atau disentuh orang sehat pada mata, hidung, atau mulut mereka. Etika batuk adalah prosedur batuk yang benar dan benar yang meliputi menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau manset untuk mencegah penularan bakteri di udara ke orang lain.

Etika batuk adalah untuk orang yang batuk dan bersin. Ketika kita batuk dan bersin, ribuan hingga jutaan bakteri bertebaran di udara, dan mereka sudah mengandung bakteri dari batuk dan bersin. Etika bersin harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Etika batuk adalah prosedur batuk yang benar dan benar yang meliputi menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau manset untuk mencegah penularan bakteri di udara ke orang lain. Etika batuk adalah untuk orang yang batuk dan bersin. Saat kita batuk dan bersin, kita

menyebarkan ribuan hingga jutaan bakteri ke udara, dan itu sudah termasuk bakteri dari batuk dan bersin. Etika bersin harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Tata cara etika batuk dan bersin Mengetahui etika sangat penting ketika Anda ingin batuk atau bersin. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Selain menghindari infeksi, kebanyakan orang secara refleks menggunakan tangan untuk menutupinya saat batuk atau bersin. Virus dan bakteri dapat menyebar di telapak tangan Anda. Jabat tangan itu kemudian menular ke orang lain. Jadi etika batuk dan bersin itu penting banget (Kemenkes, 2020)

Menurut WHO, label batuk dan bersin berikut ini untuk mencegah penularan Covid 19.

- a. Tutup mulut dan hidung dengan manset atau sapu tangan saat batuk untuk mencegah penyebaran virus melalui udara.
- b. Buang tisu bekas batuk dan bersin ke tempat sampah
- c. Segera cuci tangan dengan air bersih atau hand sanitizer.
- d. memakai masker

WHO juga merekomendasikan tinggal di rumah jika Anda sakit. Jika Anda mengalami demam, batuk, atau kesulitan bernapas, segera dapatkan bantuan medis dan ikuti saran dari otoritas kesehatan setempat.

Menurut Kementerian Kesehatan RI, etika batuk dan bersin adalah:

- a. Menutup hidung dan mulut dengan sapu tangan atau lengan baju saat batuk atau bersin, Jangan biarkan virus menyebar melalui udara dan menyebar ke orang lain.
- b. Segera buang tisu bekas ke tempat sampah.
- c. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. yaitu memakai masker



*Gambar 5: Etika Batuk*

Berikut etika batuk dan bersin menurut FKM UNDIP :

Alat :

- a. Tisu
- b. Sabun dan air
- c. gel pembersih tangan;
- d. Masker

Prosedur :

- a. Menutup hidung dan mulut dengan tisu saat bersin atau batuk. Jika Anda tidak memiliki tisu, tutupi hidung dan mulut Anda dengan lengan, bukan telapak tangan.
- b. Buang sapu tangan bekas ke tempat sampah.
- c. Segera cuci tangan dengan sabun dan air atau bersihkan tangan dengan hand sanitizer berbasis alkohol yaitu memakai masker yang menutupi hidung Anda(UNDIP, 2020)

Kebiasaan batuk yang buruk

- a. Jangan menutup mulut saat batuk  
Kebiasaan tidak menutup mulut saat batuk atau bersin berarti droplet yang mengandung bakteri dan virus lebih berpeluang menulari orang lain.
- b. Tutup mulut dengan telapak tangan  
Banyak sekali orang merasa pantas untuk menutup mulut mereka dengan menggunakan telapak tangan. Sebenarnya itu tidak benar. Jika Anda menutup mulut dengan telapak tangan, bakteri dan virus hanya dapat menular dari saluran pernafasan ke telapak tangan, sehingga bakteri dan virus lebih mudah menyebar ke orang lain melalui sentuhan atau jabat tangan.
- c. Penggunaan sapu tangan secara berulang-ulang  
Menggunakan tisu untuk menutup mulut saat batuk atau bersin tidak lagi dianjurkan. Karena banyak orang yang menggunakan sapu tangan berulang kali, bakteri dan virus dapat tetap berada di saputangan dan menginfeksi orang lain
- d. Jangan mencuci tangan.  
Kesalahan kecil tapi mematikan adalah tidak mencuci tangan setelah batuk atau bersin. Hal ini memudahkan bakteri dan virus berkembang biak di telapak tangan Anda dan mudah menyebar ke orang lain. Kebiasaan batuk pasca-salah.

Kebiasaan batuk yang salah menurut (Patroni et al., 2020)

- a. Jangan menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum.
- b. Jangan mencuci tangan setelah menggunakannya untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin.
- c. membuang air liur batuk ke mana-mana.
- d. Buang atau buang tisu bekas di mana pun Anda suka.
- e. Jangan menggunakan masker jika sedang pilek atau batuk.

Fokus penanganan COVID-19 tidak hanya menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi, tetapi juga menghindari infeksi dari orang sehat. Ini disebut pemutusan rantai infeksi karena virus pasti berasal dari pasien lain yang sebelumnya terinfeksi. Membangun stamina, menjaga kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, etika batuk dan bersin yang benar, dan sering mencuci tangan pakai sabun adalah hal-hal penting yang dapat melindungi kita dari infeksi COVID-19. (Dinas Kesehatan, 2020)

Mengetahui etika batuk dan bersin dapat membantu mencegah infeksi melalui udara. Latih etika batuk dan bersin setiap hari untuk melindungi orang yang Anda cintai dari penyakit.

## **B. PERILAKU *HAND HYGIENE* DALAM PENCEGAHAN COVID-19**

### **1. Definisi *Hand Hygiene***

Kebersihan tangan juga dapat diartikan sebagai mencuci jari secara higienis dengan air, sabun atau cairan lain untuk tujuan membersihkan tangan. Kebersihan tangan sangat penting karena dapat menurunkan angka kejadian infeksi nosokomial (Sinanto, 2020)

Kebersihan tangan yang melibatkan mencuci tangan dan menggosok memiliki kesamaan dalam teknologi. Jadi ada 6 langkah dan waktu eksekusi yang serupa. Jadi ada 5 momen. Perbedaannya hanya pada medianya. , pembersih berbasis alkohol digunakan saat mencuci tangan dengan pembersih tangan (Ningsih et al., 2017).

### **2. Tujuan Perilaku *Hand Hygiene***

Tujuan dari praktik kebersihan tangan adalah untuk menghilangkan mikroorganisme. Kebersihan tangan dilakukan untuk menghilangkan kontaminasi organik dan membunuh mikroorganisme yang terkontaminasi pada tangan yang diperoleh melalui kontak/kolonisasi dengan

orang yang terinfeksi dan kontak dengan permukaan di lingkungan. (Zulpahiyana, 2013).

tujuan dari tindakan kebersihan tangan adalah :

- a. Mengurangi atau menghambat pertumbuhan bakteri pada kedua tangan.
- b. Mengurangi jumlah bakteri yang dapat tumbuh pada sarung tangan.
- c. Ini mengurangi risiko penularan mikroba dari orang sakit dan kontaminasi silang ke orang sakit lainnya, anggota keluarga, dll. Dengan kata lain, memberikan perasaan segar dan bersih.

### **3. Perilaku Kebersihan Tangan Penting Dilakukan Di Masa Pandemi Covid-19**

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm dan terutama menginfeksi hewan seperti kelelawar dan unta. Sebelum COVID-19, ada enam virus corona yang dapat menginfeksi manusia. alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus OC43, betacoronavirus HKU1, coronavirus penyakit pernapasan akut parah (SARS-CoV), coronavirus sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS). -CoV). Virus corona yang menyebabkan COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. Analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus tersebut termasuk dalam subgenus yang sama dengan coronavirus penyebab wabah penyakit pernapasan akut (SARS) yang parah dari tahun 2002 hingga 2004, yaitu sarbecovirus. Berdasarkan hal tersebut, International Commission on Taxonomy of Viruses mengusulkan nama SARS-CoV-2 (Gorbalenya et al., 2020).

Klasifikasi infeksi COVID-19 di Indonesia saat ini berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)

Tentang pengobatan pneumonia COVID-19. Ada perbedaan kecil dalam klasifikasi WHO. Jadi, kasus suspek disebut sebagai Patient Under Observation (Pdp), dan ada juga Person Under Observation. Istilah yang sebelumnya

ada dalam pedoman Kementerian Kesehatan Indonesia dan sekarang kemungkinan akan hadir dalam pedoman WHO sudah tidak ada lagi. Klasifikasi menurut manual pencegahan dan pengendalian penyakit menular coronavirus baru adalah sebagai berikut .

a. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- 1) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yaitu demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam; penyakit pernapasan seperti batuk/sesak napas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan sampai berat riwayat perjalanan atau tinggal dalam 14 tahun terakhir hari, dengan salah satu gejala/tanda , tanpa penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, sebelum timbulnya gejala di negara/wilayah di mana infeksi lokal telah dilaporkan.
- 2) Individu dengan demam ( $>38^{\circ}\text{C}$ ) atau riwayat demam atau ISPA dan telah melakukan kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala.
- 3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang memerlukan rawat inap dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

b. Orang dalam Pemantauan (ODP)

- 1) Mereka yang mengalami demam ( $38^{\circ}\text{C}$  atau lebih tinggi) atau memiliki riwayat demam. ATAU memiliki gejala penyakit pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, telah bepergian di masa lalu, atau telah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir sebelum timbulnya gejala Penularan yang tinggal di negara/wilayah ke.

- 2) Orang yang mengalami gejala pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala
- c. Orang tanpa gejala

Orang yang tidak menunjukkan gejala dan berisiko terinfeksi oleh seseorang yang terkonfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala adalah seseorang yang telah melakukan kontak dekat dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Kontak dekat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau di dalam ruangan atau mengunjungi (dalam jarak 1 meter dalam kasus pasien yang dipantau atau dikonfirmasi). gejala. Kontak dekat adalah:

  - 1) Tenaga kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantarkan, dan membersihkan ruangan di area perawatan kasus sesuai standar, tanpa menggunakan alat pelindung diri (APD).
  - 2) Seseorang yang telah berada di ruangan yang sama (termasuk pekerjaan, kelas, rumah, dan acara besar) dengan onset dalam 2 hari sebelum onset dan dalam 14 hari setelah onset.
  - 3) Orang-orang yang bepergian bersama dalam segala jenis transportasi/kendaraan (radius 1 meter) dari 2 hari sebelum timbulnya kasus sampai 14 hari setelah timbulnya kasus.

### **1. Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Yang Hasil Tesnya Positif Melalui Pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) .(PDPI, 2020).**

Seperti yang Anda ketahui, COVID-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan dampak yang besar bagi para pelajar untuk selalu menjaga pola hidup sehat. Virus dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang

terinfeksi atau melalui tetesan dari hidung atau mulut ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Tidak sengaja menyentuh benda yang terkontaminasi virus Covid dengan tangan yang tidak terlindungi, seperti pagar, eskalator, gagang pintu, daun meja, mainan, dll, atau secara tidak sengaja menyentuh wajah (mata, mulut, hidung) secara tidak sengaja dengan tangan yang terkontaminasi dapat menyebarkan virus dan menginfeksi orang lain. Virus masuk ke dalam tubuh jadi gunakan sabun atau krim tangan sebagai bentuk pencegahan yang bisa dilakukan untuk melindungi diri di masa Covid-19 ini. Berikut manfaat cuci tangan. (Kemenkes, 2020).

Mencuci Tangan atau hand Hygiene dengan menggunakan sabun telah dikenalkan sejak awal melalui Program yang telah dikenal masyarakat yaitu program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Pencegahan ini paling baik dan terbaik bila dilakukan dengan benar dan benar dengan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan hanya dengan air membunuh lebih sedikit bakteri, tetapi sabun dapat menghilangkan banyak bakteri. Hal ini karena sabun memiliki kandungan khusus seperti alkohol, emolien, triclocarban, triclosan, dan triclocarban yang dapat mengontrol bakteri di tangan Anda.

Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mencuci tangan:

- a. Tangan harus dicuci dengan deterjen dan air mengalir jika terlihat jelas atau terkontaminasi bahan berprotein.
- b. Pembersih tangan berbasis alkohol harus digunakan untuk dekontaminasi tangan rutin kecuali tangan terlihat kotor atau terkontaminasi.
- c. Pastikan tangan Anda kering sebelum memulai aktivitas apa pun. (Nakoe et al., 2020)

Perilaku cuci tangan pakai sabun dan krim tangan merupakan kebiasaan yang harus diterapkan. Praktik ini memiliki tiga pilar sebagai cara untuk membangun sektor kesehatan menuju hidup sehat, menciptakan lingkungan


yang sehat dan memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.. (Susantiningasih et al., 2019).

## **2. Langkah-Langkah Penerapan *Hand Hygiene***

### **a. Cara cuci tangan pakai sabun yang benar**

Cuci tangan yang benar dan benar harus dilakukan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Jika Anda tidak memiliki keran, Anda dapat menggunakan ember atau wadah lain untuk mengalirkan air. Kebersihan tangan dengan air saja tidak cukup untuk membunuh patogen, terutama virus Covid. Mencuci tangan adalah cara yang paling hemat biaya untuk melindungi diri dari penyakit menular, terutama COVID-19, dengan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Cuci tangan pakai sabun setidaknya bisa dilakukan selama 40-60 detik, dan langkah-langkah berikut ini terbukti efektif membunuh bakteri (Kemenkes, 2020).

Rahasia kekuatan sabun yang luar biasa adalah struktur hibridanya. Sabun terdiri dari molekul berbentuk batang, masing-masing molekul memiliki kepala hidrofilik yang dapat bercampur dengan air, dan ekor hidrofobik yang tidak dapat bercampur dengan air, tetapi hanya dengan minyak. Saat mengambang, mereka secara bergantian mengapung dalam satu unit. Lemak, yang dikenal sebagai amphiphiles, secara struktural mirip dengan lipid membran virus dan dapat merusak lipid membran virus (Nakoe et al., 2020).



*Gambar 6: Cara Mencuci Tangan Pakai Sabun*

b. Membersihkan Tangan Menggunakan Cairan Pembersih Tangan.

Dalam keadaan tertentu, seperti ketika sabun dan air bersih tidak tersedia, cuci tangan dengan hand sanitizer dapat digunakan. Mencuci tangan dengan

hand sanitizer juga biasa dilakukan di luar rumah atau di luar rumah. Untuk hasil yang efektif, pembersih tangan yang Anda gunakan harus mengandung setidaknya 60% alkohol. Selain menggunakan produk hand sanitizer berbasis alkohol yang tersedia di pasaran, Anda juga bisa membuat produk hand sanitizer sendiri sesuai standar dan pedoman yang ditetapkan WHO. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan hand sanitizer berbasis alkohol. Sementara sabun dan air bersih dapat menghilangkan semua jenis bakteri dari tangan Anda, pembersih tangan berbasis alkohol hanya dapat mengurangi jumlah bakteri tertentu pada kulit Anda. Hanya tersedia jika tidak ada. Pembersih tangan berbasis alkohol tidak dapat menghilangkan norovirus, *Cryptosporidium*, *Clostridioides difficile*, atau bahkan bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat (Kemenkes, 2020)

## CARA MEMAKAI CAIRAN PEMBERSIH TANGAN



*Gambar 7: Cara Memakai Cairan Pembersih Tangan*

Cara memakai cairan pembersih tangan

- 1) Oleskan pembersih tangan ke satu telapak tangan.  
Pertama, baca label produk yang Anda gunakan untuk menentukan berapa banyak yang perlu Anda gunakan dalam satu waktu..
- 2) Gosok kedua tangan anda.
- 3) Gosokkan cairan ke telapak tangan, punggung tangan dan jari sampai cairan mengering. Lakukan langkah ini selama sekitar 20 detik (Kemenkes, 2020)

### 3. Waktu Penting Cuci Tangan

Menurut (Kemenkes, 2020) waktu penting untuk mencuci tangan yaitu :

a. Menggunakan Sabun dan Air Bersih

Waktu yang penting untuk membersihkan tangan menggunakan sabun dan air adalah:

Selama pandemi waktu penting untuk membersihkan tangan adalah

- 1) Setelah bersin dan batuk
- 2) Setelah menyentuh permukaan benda termasuk kursi, meja, gagang pintu dll.
- 3) Sebelum dan sesudah merawat seseorang yang sedang muntah atau diare
- 4) Sebelum dan sesudah merawat luka
- 5) Setelah menyentuh hewan, pakan ternak, atau kotoran hewan
- 6) Setelah menyentuh sampah
- 7) Jika tangan terlihat kotor atau berminyak
- 8) Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga, atau kerabat yang di rumah sakit atau panti jompo

b. Menggunakan Cairan Pembersih Tangan Berbasis Alkohol (Hand Sanitizer)

Waktu yang penting untuk membersihkan tangan menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) adalah :

- 1) Sebelum dan setelah menyentuh permukaan benda misalnya, kursi, meja , gagang pintu dll.
- 2) Sebelum masuk dan setelah keluar dari fasilitas umum, misalnya kantor, pasar, stasiun, dll
- 3) Sebelum dan sesudah mengunjungi teman, keluarga, dan kerabat di rumah sakit atau panti jompo

Hal yang perlu diingat adalah jangan gunakan pembersih tangan jika tangan terlihat kotor atau berminyak, misalnya, setelah berkebun, memancing, atau berkemah

yang dapat dilakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun.

## **7. Pencegahan Covid-19 Dengan Cuci Tangan Yang Benar**

Berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Covid-19 Republik Indonesia tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-18 dengan 1,4 juta kasus dan tingkat kematian 142 per juta. Berdasarkan laporan kelompok umur bahwa Covid-19 umumnya menginfeksi orang dewasa berusia 31 hingga 45 tahun, kelompok usia yang paling banyak tidak terinfeksi adalah anak-anak berusia 6 hingga 18 tahun, dengan 0 Prevalensi pada kelompok usia 2,8% adalah 2,8%. Paparan Covid-19 (Kemenkes RI, 2020).

Terlepas dari penyebaran Covid-19, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah penularan merupakan hal yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh berbagai kalangan usia, baik orang dewasa, orang tua, maupun anak-anak di masa new normal. lapisan masyarakat akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru hidup dengan Covid-19. Kegiatan pencegahan epidemi masyarakat harus mencakup pembelajaran bersama dengan pengetahuan dan kesadaran risiko melalui survei pengetahuan, sikap dan praktik. Termasuk banyak praktik perilaku (Aerts, 2020).

Pedoman Home Office untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Ini termasuk mencuci tangan secara teratur yang membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Kebersihan tangan merupakan komponen penting dari praktik kebersihan yang baik di rumah tangga dan masyarakat dan dapat menawarkan manfaat yang signifikan dalam hal mengurangi kejadian infeksi (Safrizal et al., 2020).

Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sangatlah penting. Penularan Covid-19 menyebar secara langsung dan tidak langsung melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi, atau melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui mulut atau hidung. Penelitian

menunjukkan bahwa mencuci tangan dapat membantu mencegah paparan penyakit menular seperti Covid-19 (Willmott et al., 2016). Namun, penelitian lain masih menunjukkan bahwa penggunaan cuci tangan masih kurang optimal. Dalam pengaturan klinis (Mohaithef, 2020) surveinya menemukan bahwa 10,3% dari total jumlah responden masih menunjukkan praktik cuci tangan yang buruk, dan 44% dari mereka yang tidak mempraktikkan cuci tangan yang benar adalah laki-laki. Studi lain terhadap anak-anak yang diwawancarai menemukan bahwa hanya 23,3% yang mampu mencuci tangan dengan benar, dan 15% mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Di sisi lain, 23,3% anak terbiasa menyeka tangan dengan tisu (Dajaan et al., 2018). Hal ini sesuai dengan temuan bahwa 71,8% anak tidak mencuci tangan dengan benar (Nazliansyah et al., 2016)

Menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan, merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan masyarakat di masa pandemi virus corona. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menganjurkan menjaga kebersihan tangan, dapat menyelamatkan nyawa dari infeksi virus corona (WHO, 2020). Namun, cuci tangan tidak bisa dilakukan sembarangan oleh masyarakat. Mencuci tangan yang benar dengan air mengalir dan sabun cair minimal 20 detik merupakan cara yang efektif dan harus direkomendasikan dan dipraktikkan oleh masyarakat. Menurut Prasetyo dalam (Gadin, 2021) angka tingkat kepatuhan masyarakat adalah 75,38% untuk cuci tangan, 91,98% untuk memakai masker, 73,54% untuk menjaga jarak, 76% untuk menghindari keramaian, dan 69%

Dengan mencuci tangan, Anda dapat mengurangi siklus infeksi dan mengurangi risiko penyebaran virus corona sebesar 6% hingga 44%. Menggunakan hand sanitizer adalah cara lain untuk menjaga kebersihan tangan selain mencucinya dengan sabun dan air. Hal ini karena hand sanitizer dapat mencegah infeksi mikroba pada manusia. Hand sanitizer atau pengawet yang mengandung

alkohol hingga 62% hingga 95% dapat mendenaturasi protein mikroba dan menonaktifkan virus. Saya bisa. Dengan begitu, penyebaran dan penularan virus corona di masyarakat dapat diminimalisir. Sementara penggunaan hand sanitizer atau pembersih tangan dianjurkan selama pandemi virus corona, penggunaan pembersih tangan terus menerus tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan iritasi kulit dan luka bakar. Lebih baik digunakan di luar rumah atau saat fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir tidak tersedia (Sinanto, 2020)

### **C. TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DALAM PENCEGAHAN COVID19**

#### **1. Defenisi Alat Perlindungan Diri (APD)**

Alat pelindung diri (APD) adalah peralatan yang dirancang khusus untuk mencegah masuknya zat, padatan, cairan, atau partikel di udara untuk melindungi pemakainya dari penyebaran infeksi dan penyakit. Ketika digunakan dengan benar, APD bertindak sebagai penghalang antara agen infeksi seperti virus dan bakteri yang terkait dengan kulit, mulut, hidung, mata, atau tubuh manusia. Alat pelindung diri yang digunakan dapat menghalangi transmisi kontaminan dari darah, cairan tubuh, dan sekresi pernapasan. Saat memilih APD yang tepat, apa pun APD yang Anda gunakan, waspadai potensi risiko kontaminasi, dan pahami mekanisme dasar APD tertentu yang Anda gunakan. APD membantu mencegah penyebaran virus, namun APD tetap menimbulkan risiko bagi keselamatan pengguna saat digunakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kami telah mengidentifikasi risiko yang dapat ditimbulkan oleh APD, seperti desain yang tidak ergonomis, penggunaan berlebihan yang dapat menyebabkan rasa sakit di beberapa bagian tubuh pengguna, serta penyimpanan dan pembuangan yang tidak aman. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan prinsip dalam memilih alat pelindung diri (Kemenkes RI, 2020).

## 2. Prinsip-Prinsip Alat Perlindungan Diri (APD)

Prinsip-prinsip yang harus di perhatikan saat memilih alat pelindung diri (APD):

- a. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya tertentu atau yang dihadapi seperti percikan, kontak langsung atau tidak langsung.
- b. Berat alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus seringan mungkin agar perangkat tidak menimbulkan ketidaknyamanan yang tidak semestinya bagi pengguna atau membatasi pergerakan pengguna.
- c. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus fleksibel Empat.
- d. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan tidak boleh menimbulkan bahaya tambahan
- e. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak.
- f. Alat pelindung diri (APD) harus sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan
- g. Alat pelindung diri (APD) yang digunakan untuk perawatan (Kemenkes RI, 2020).

## 3. Jenis-Jenis Alat Pelindung diri (APD)

Berikut akan dibahas mengenai beberapa jenis Alat Pelindung diri (APD) yang direkomendasikan selama pandemic Covid-19 :

- a. Masker

Masker adalah jenis alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi pengguna dari partikel berbahaya yang dapat masuk melalui mulut dan hidung. Alasan kita menggunakan masker setiap hari biasanya untuk melindungi atau mengurangi paparan debu dan polusi udara saat kita berada di luar ruangan. Dalam bidang kesehatan, masker sendiri memiliki fungsi untuk mencegah penularan virus, bakteri dan penyakit. Berdasarkan bukti yang ada, penyebaran virus Covid-19 disebarkan melalui

droplet, sehingga masker menjadi salah satu pilihan alat pelindung diri yang dapat digunakan untuk menahan droplet dan penyebarannya. Di masa pandemi ini, masker sendiri menjadi salah satu alat pelindung diri yang direkomendasikan WHO untuk penggunaan sehari-hari di dalam dan di luar ruangan guna mencegah penyebaran virus Covid-19 (Theopilus et al., 2020).

Jenis – jenis masker

1) Masker bedah 3 ply (Surgical Mask 3 Ply)

Masker bedah terdiri dari tiga lapisan: lapisan luar yang merupakan kain non-anyaman tahan air, lapisan dalam yang merupakan lapisan penyaring berdensitas tinggi, dan lapisan dalam yang menempel langsung pada kulit dan bertindak sebagai penyerap untuk sejumlah besar cairan bocor. Pemakainya saat batuk atau bersin. Masker bedah ini memiliki lapisan penyaring yang membuatnya sangat efektif menyaring tetesan yang keluar dari pemakainya saat batuk dan bersin. Namun, masker ini bukan penghalang pernapasan. Itu tidak melindungi pemakainya dari menghirup partikel udara kecil. Oleh karena itu, masker ini direkomendasikan untuk penderita gejala flu seperti batuk, bersin, pilek, demam dan sakit tenggorokan. Masker ini juga direkomendasikan untuk tenaga medis di institusi medis (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).



*Gambar 8: Masker Bedah 3 Ply*

2) Masker N95

Masker N95 adalah kelompok masker sekali pakai filtering facepiece respirator (FFR). Kelebihan dari masker ini adalah tidak hanya melindungi pemakainya dari cairan berukuran droplet, tetapi juga dari cairan berukuran aerosol. Masker ini memiliki segel wajah yang rapat yang membantu melindungi pengguna dari paparan aerosol selama segel terpasang dengan benar.

Masker ini terutama direkomendasikan untuk tenaga medis yang perlu melakukan kontak langsung dekat dengan pasien dengan tingkat infeksi tinggi. Padahal, idealnya masker N95 tidak dimaksudkan untuk digunakan kembali. Jika pengguna perlu menggunakan masker N95 lagi atau berulang kali, sangat disarankan untuk melapisi bagian luar masker N95 dengan masker bedah.

Masker ini dapat dilepas tanpa menyentuh bagian dalam masker dan harus disimpan dalam kantong kertas selama 3-4 hari sebelum digunakan kembali. Dengan mengacu pada WHO, masker N95 kelompok dapat digunakan selama 8 jam dan dapat dibuka dan ditutup 5 kali saat dilapisi dengan masker bedah. Masker N95 tidak dapat digunakan kembali atau digunakan kembali jika Anda mengambil tindakan untuk membuatnya. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).



*Gambar 9 : Masker N95*

### 3) *Reusable Facepiece Respirator*

Masker ini merupakan masker yang memiliki keefektifan filter yang lebih tinggi dibanding masker N95. Karena memiliki kemampuan filter yang lebih tinggi, masker ini

juga diklaim dapat menyaring hingga bentuk gas. Masker ini sangat direkomendasikan dan lebih sering digunakan untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terpaparnya gas-gas berbahaya. Masker dengan tipe ini dapat digunakan secara berulang-ulang selama face seal tidak rusak dan harus dipastikan rutin dibersihkan dengan disinfektan secara benar sebelum digunakan kembali (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).



*Gambar 10: Reusable Facepiece Respirator*

#### 4) Masker Kain

Masker kain digunakan dalam praktik untuk mencegah infeksi dan untuk mengatasi kekurangan masker medis yang muncul. Efektivitas penyaringan masker ini meningkat dengan jumlah lapisan dan kepadatan kain yang digunakan. Jika Anda ingin menggunakan

masker kain ini berkali-kali, silakan cuci dan gunakan kembali. Untuk penggunaan pribadi, masker kain dapat digunakan untuk:

a) Untuk masyarakat sehat

Untuk orang sehat, masker ini digunakan saat pengguna berada di tempat umum atau tempat lain, dengan tetap menghormati protokol kesehatan. Artinya menjaga jarak 1-2 meter, namun saat masyarakat melakukan aktivitas yang tergolong berbahaya, seperti coping dengan jenazah Covid-19 dan lainnya. Kami tidak menyarankan menggunakan masker ini.

b) Untuk tenaga medis :

Menggunakan masker kain sebagai alat pelindung diri oleh petugas kesehatan tidak dianjurkan pada kasus yang parah. Ini karena sekitar 40-90% partikel dapat melewati masker ini. Masker kain hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir ketika masker bedah atau masker N95 tidak tersedia. Oleh karena itu, masker kain idealnya dipadukan dengan pelindung wajah yang menutupi seluruh bagian depan dan samping wajah. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).



*Gambar 11: Masker Kain*

Anda harus tepat dalam memilih masker kain yang dapat melindungi Anda dari tertular virus Covid-19. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memilih masker kain: Gunakan masker kain yang memiliki 3 lapis, jangan gunakan masker kain yang hanya menggunakan 1 lapis. WHO merekomendasikan penggunaan masker kain terdiri dari tiga lapisan: lapisan dalam yang terbuat dari bahan penyerap seperti kapas, lapisan tengah yang terbuat dari bahan non-woven seperti polypropylene, dan lapisan non-penyerap seperti polypropylene. Lapisan terluar terbuat dari bahan. Sebagai Poliester Kampus. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan dari uraian ini bahwa memilih untuk menggunakan masker selam versus masker buff tidak disarankan. (Atmojo et al., 2020).

Tabel : perbandingan kelebihan dan kekurangan masker.

Aspek	Jenis masker			
	Masker kain	Masker Bedah (3 PLY)	N95	Reusable facepiece respirator
Melindungi pemakai terhadap droplet besar	Ya	Ya	Ya	Ya
Melindungi pemakai terhadap aerosol/partikel airborne	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Mencegah keluarnya droplet besar dari batuk/bersin pemakai	Ya	Ya	Ya	Ya
Mencegah keluarnya droplet kecil dari batuk/bersin pemakai	Tidak	Ya	Ya	Ya
Efektivitas filtrasi	3 mikron : 10-60%	0,1 mikron : 30- <95%	0,1 mikron: $\geq 95\%$	0,1 mikron : $\geq 99\%$
Face seal fit	Longgar	longgar	Ketat	Ketat
Dapat di gunakan ulang	Ya	Tidak	Tidak	Ya
Tidak mudah bocor	Tidak	Tidak	Ya	Ya

Keterangan :

- 1) Gunakan sabun/deterjen sampai bersih
- 2) Idealnya tidak digunakan kembali, tetapi mengingat persediaan terbatas, dapat digunakan kembali dengan syarat kapasitas penyaringan berkurang dengan penggunaan berulang. Selain itu, untuk penggunaan berulang, pastikan masker dalam keadaan kering selama 3-4 hari tanpa terkena sinar UV secara langsung.
- 3) Masker dapat digunakan kembali setelah dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai
- 4) Tidak ada kebocoran dari masker dan respirator N95 bila digunakan dengan benar (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Mengenai penggunaan masker, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan pedoman penggunaan masker yang tepat.

- 1) Bersihkan tangan sebelum menggunakan masker
- 2) Jangan gunakan masker yang rusak, Selalu pastikan masker yang Anda gunakan tidak sobek atau berlubang.
- 3) Gunakan masker dengan hati-hati, pastikan masker benar-benar menutupi mulut dan hidung, sesuaikan bentuk masker dengan pangkal hidung agar tidak ada celah droplet masuk dan keluar, dan kencangkan masker dengan kencang. ini. minimum. Jarak antara masker dan wajah. Jika masker yang Anda gunakan adalah masker di belakang telinga, jangan menyilangkan tali masker, karena menyilangkan tali akan menambah jarak antara wajah Anda dan masker.

- 4) Hindari menyentuh masker saat digunakan, Jika Anda tidak sengaja menyentuh masker, segera cuci tangan Anda.
  - 5) Gunakan teknik yang tepat saat melepas topeng, Lepaskan topeng dari belakang tanpa menyentuh bagian depan topeng
  - 6) Jika masker lembap, segera ganti dengan yang baru
  - 7) Buang masker atau simpan dalam kantong plastik tertutup sampai masker dicuci dan dibersihkan (masker kain).
  - 8) Jangan memakai masker di pergelangan tangan Anda atau menariknya di dagu atau leher Anda. Kedelapan. Setelah melepas masker dan mencuci tangan.
  - 9) Jangan menggunakan kembali masker sekali pakai
  - 10) Jangan melepas topengmu saat berbicara.
  - 11) Jangan menggunakan masker yang sama secara bergantian dengan orang lain.
  - 12) Disarankan agar masker kain dicuci dengan sabun atau detergen minimal sehari sekali dan dengan air panas minimal 60°C, Jika air panas tidak tersedia, cuci masker dalam air suhu kamar dengan sabun atau deterjen dan rendam masker dalam air mendidih selama 1 menit (World Health Organization, 2020).
- b. Pelindung Wajah (Face Shield)
- Pelindung wajah transparan yang menutupi wajah Anda dan mencegah tetesan yang mengandung virus masuk ke mata, hidung, dan mulut Anda. Pelindung wajah adalah alat pelindung diri yang paling umum digunakan oleh petugas kesehatan. Namun, dengan penyebaran virus corona baru, pelindung wajah sekarang juga banyak digunakan oleh masyarakat umum. Dalam sebuah

penelitian menggunakan simulator batuk yang memberikan aerosol yang mengandung virus influenza, penggunaan pelindung wajah mampu menahan 68-96% dari paparan virus segera setelah batuk pada jarak 46 cm dari sumber batuk. Namun, tidak disarankan bahwa pelindung wajah itu sendiri digunakan hanya sebagai alat pelindung diri. Cairan mikro dapat masuk ke sisi pelindung wajah dan harus digunakan dalam kombinasi dengan peralatan pelindung pribadi lainnya seperti masker dan kacamata.





*Gambar 12: Face Shield*

Manfaat menggunakan Phase Shield :

- 1) Melindungi seluruh bagian wajah terutama mata, hidung dan mulut dari infeksi droplet
- 2) Mudah digunakan karena tidak lengket seperti masker dan tidak membuat wajah panas.
- 3) Fase perisai memiliki daya tahan yang cukup tinggi dan dapat dengan mudah dibersihkan untuk digunakan kembali. Mudah dipasang dan dilepaskan
- 4) Tidak mempengaruhi pernapasan
- 5) Harganya relatif terjangkau, dan cukup banyak di pasaran
- 6) Jangan ganggu pengguna saat berbicara
- 7) Dapat digunakan dalam kombinasi dengan alat pelindung diri lainnya seperti kaca mata dan masker Kedelapan. Minimalkan pengguna menyentuh wajah.
- 8) Tidak mengganggu komunikasi non-verbal melalui ekspresi wajah dan tidak mengganggu

komunikasi membaca bibir bagi penyandang tunarungu

- 9) Penggunaan bersamaan dengan pelindung wajah dapat memperpanjang umur masker (Theopilus et al., 2020).

Kerugian menggunakan face shield adalah:

- 1) Pelindung wajah dapat menyebabkan silau
- 2) Menggunakan pelindung wajah dapat mengaburkan visor karena menghirup uap, sehingga mengurangi jarak pandang.
- 3) Dapat menyebabkan distorsi visual
- 4) Pelindung wajah cukup besar
- 5) Memakai pelindung wajah dapat menimbulkan risiko tetesan masuk melalui sisi terbuka pelindung wajah, karena sisi terbuka pelindung wajah kurang padat dibandingkan masker. (Theopilus et al., 2020).

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika hendak menggunakan face shield, antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Pelindung wajah yang digunakan harus bersih
- 2) Pengguna harus mencuci tangan terlebih dahulu dan memegang pelindung wajah hanya pada bingkai atau tali untuk menghindari kontaminasi pada pelindung.
- 3) Pelindung wajah dipasang dan bantalan busa dipasang di dahi Anda. Pengencang harus memiliki ukuran dan kapasitas pengikatan yang memadai sehingga tidak lepas atau terlalu kencang.
- 4) Saat menggunakan pelindung wajah, jarak visor harus disesuaikan agar tidak terlalu jauh dari wajah pengguna untuk membuat celah di bagian bawah dan samping wajah, tetapi tidak terlalu dekat untuk membuat celah. Menyebabkan kesulitan bernapas atau

pembentukan uap pada visor Kontak tangan dengan visor harus diminimalkan selama penggunaan pelindung wajah untuk mengurangi risiko kontaminasi virus dari tangan pemakainya.

- 5) Saat melepas visor, tangan harus dicuci terlebih dahulu sebelum melepas face shield dengan cara memegang tutup atau jepitan face shield.
  - 6) Cuci bersih seluruh bagian face shield dengan sabun atau detergen sebelum menyimpan face shield. Setelah kering, pelindung wajah harus disimpan di tempat yang bersih untuk digunakan kembali.
  - 7) Jika akan membuang face shield sendiri, bisa dicuci terlebih dahulu dan dipotong-potong untuk mencegah face shield menularkan virus Covid-19 oleh orang lain atau media potensial(Theopilus et al., 2020).
- c. Sarung Tangan (Hand Gloves)


Sarung tangan adalah produk yang digunakan untuk menutupi permukaan tangan manusia. Sarung tangan memiliki salah satu fungsi utama untuk melindungi tangan manusia dari faktor lingkungan seperti angin, panas, debu, bakteri dan virus.. Saat melindungi dari Covid-19, penggunaan sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung diri untuk menghindari kontak dengan droplet/virus pada benda yang disentuh dan mengurangi penyebaran virus dari tangan ke benda yang disentuh, mencegah dan dapat menginfeksi manusia. Paparan virus di tangan Anda sangat berbahaya. Karena orang sering secara sengaja atau tidak sengaja menyentuh wajah mereka dengan tangan, mereka berisiko lebih besar terkena virus.

Berikut adalah standar sarung tangan untuk perlindungan efektif terhadap Covid-19:

- 1) Bahan tidak menyerap air, dan pori-pori kecil mencegah cairan masuk ke dalam sarung tangan.
- 2) Tutupi telapak tangan dengan rapat untuk melindungi seluruh permukaan tanah. (Theopilus et al., 2020).



*Gambar 13: Sarung Tangan Sekali Pakai (A) Plastic (B) Nitril (C) Lateks*



*Gambar 14: Sarung Tangan Pemakaian Berulang (A) Kain (B) Karet (C) Kulit*

d. Pelindung Mata (Goggles)

Pelindung mata (kacamata) Pelindung mata berupa kacamata plastik digunakan sebagai pelindung mata tetap untuk mencegah percikan yang mungkin mengenai permukaan. Penggunaan pelindung mata itu sendiri hanya boleh digunakan pada saat aktivitas yang berisiko terpapar droplet, terutama saat prosedur yang menimbulkan aerosol, dan pada waktu-waktu tertentu kontak dekat dengan wajah pasien.(Kemenkes RI, 2020).




*Gambar 15: Pelindung Mata (Goggles)*

e. Gaun (Gown)

Kemampuan untuk mencegah penetrasi cairan, fungsi atau mobilitas, kenyamanan, ketahanan sobek, fit, tidak beracun, mudah terbakar, bau, dan retensi kualitas. Berdasarkan penggunaannya, gaun dibagi menjadi dua jenis

- 1) Gaun sekali pakai Gaun sekali pakai dirancang khusus untuk dibuang setelah sekali pakai, biasanya tidak dijahit, dikombinasikan dengan plastik untuk mencegah masuknya cairan, dan bahan yang digunakan adalah serat sintetis..
- 2) Gaun ini biasanya terbuat dari bahan katun 100% atau polyester 100%, namun bisa juga dibuat dari bahan kombinasi katun dan dapat digunakan kembali hingga 50 kali selama gaun tersebut tidak rusak.(Kemenkes RI, 2020).



*Gambar 16: Gaun (gown)*

f. Apron (celemek)

Apron atau Celemek adalah alat pelindung diri yang terbuat dari plastik klorin sekali pakai atau dapat digunakan kembali yang dirancang untuk menutupi gaun pelindung yang digunakan oleh petugas kesehatan untuk mencegah masuknya cairan menular dari pasien. Bahan tahan terhadap desinfektan. (Kemenkes RI, 2020).



*Gambar 17: Apron*

g. Pelindung Kepala

Pelindung kepala adalah jenis alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi kepala dan rambut staf medis dari droplet infeksius dari pasien selama perawatan. Tutup kepala harus terbuat dari bahan tahan cairan yang tidak mudah sobek dan ukurannya pas dengan kepala petugas kesehatan yang menggunakannya. Ikat kepala itu sendiri sekali pakai. Jangan gunakan berulang kali. (Kemenkes RI, 2020).



*Gambar 18: Pelindung Kepala*

h. Sepatu Pelindung

Sepatu pelindung Sepatu pelindung adalah alat pelindung diri yang terbuat dari bahan karet atau tahan air dan dapat ditutup dengan kain tahan air. Sepatu pelindung adalah alat pelindung diri yang dirancang untuk melindungi kaki dari tetesan infeksi selama perawatan.



*Gambar 19: Sepatu Pelindung*

#### **4. Manajemen Penggunaan (Penggunaan Kembali) Alat Pelindung Diri Yang Dapat Digunakan Kembali**

- a. Gaun, baju terusan, celemek, masker kain, dan topi bedah yang dapat digunakan kembali

Gaun, celemek, baju terusan, masker kain, dan topi bedah yang dapat digunakan kembali dapat digunakan kembali setelah menyelesaikan proses pembersihan dan disinfeksi dengan:

- 1) Pencucian pakaian dilakukan pada suhu sekitar 57,2 °C sampai 71 °C dengan waktu minimal 25 menit.
- 2) Menggunakan klorin dengan konsentrasi 1:99 sebagai desinfektan

- b. Masker N95

- 1) Berikut adalah beberapa metode yang dapat Anda gunakan untuk membuat masker N95 Anda dapat digunakan kembali: Metode 1: Masker N95 disimpan dalam kantong kertas berlabel nama petugas kesehatan, tanggal dan

- waktu. Masker N95 dapat dibuka dan digunakan kembali 5 kali selama 8 jam.
- 2) Metode 2: Masker N95 dapat digunakan kembali setelah dikeringkan di ruang terbuka pada suhu kamar selama 3-4 hari. Masker N95 tidak boleh dikeringkan dengan sinar UV karena akan merusak bahan masker polypropylene.
  - 3) Metode 3: Sterilkan masker N95 dengan penjepit kayu dalam oven dapur 70°C selama sekitar 30 menit Yaitu Cara
  - 4) Metode 4: Setelah air mendidih selama 10 menit, sterilkan masker N95 dengan uap panas.
- c. Pelindung mata dan wajah
- 1) Lap bagian dalam pelindung dengan kain bersih yang telah direndam sebelumnya dengan deterjen.
  - 2) Bersihkan bagian luar pelindung dengan kain bersih yang dibasahi desinfektan (klorin) dan bersihkan kembali dengan air bersih atau alkohol untuk menghilangkan residu.
  - 3) Keringkan atau lap pelindung hingga kering.
- d. Sepatu pelindung
- 1) . Cuci sepatu dengan deterjen pada suhu 20-30°C
  - 2) Gunakan desinfektan (klorin) setelah membasil sepatu dengan air bersih
  - 3) Keringkan sepatu pelindung dengan mengeringkan di bawah sinar UV (Kemenkes RI, 2020)

## **D. Tinjauan Perilaku *Physical Distancing* dalam pencegahan Covid-19**

### **1. Kebijakan Physical Distancing Dalam Upaya Pencegahan Covid-19**

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan virus corona sebagai salah-satu pandemic di awal tahun 2020, dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat, sehingga

sangat dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam upaya meminimalisir penyebaran virus corona maka, kebijakan *physical distancing* merupakan opsi yang efektif dalam meminimalisir penyebaran virus covid-19 tersebut (Megawati et al., 2020).

Pembatasan kegiatan sosial telah diatur dalam UU Nomor 6 pasal 59-60 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Setiawan, 2020). Dalam UU ini menjelaskan perbedaan antara *Lockdown* dan *social distancing*. Karantina wilayah (*lockdown*) adalah keputusan untuk membatasi ruang gerak masyarakat dari wilayah lain untuk tidak memasuki atau keluar wilayah yang diterapkan kebijakan karantina. Sedangkan *social distancing* adalah membatasi kegiatan sosial masyarakat. Semua kebijakan ini diambil tidak lain adalah untuk menekan angka penularan Covid 19 di masyarakat oleh karena itu masyarakat dituntut untuk patuh dalam menerapkan setiap kebijakan yang diberlakukan (Kemenkes RI, 2020)

Menurut (WHO, 2020) dalam (Aqurini, 2020) Langkah-langkah untuk keseluruhan populasi dalam melaksanakan strategi *physical distancing* termasuk menyajikan rencana kerja yang dapat disesuaikan seperti bekerja jarak jauh, *e-learning*, mengurangi dan menghindari kerumunan, menutup kantor dan administrasi yang tidak penting, melindungi dan menjamin atau memberikan perlindungan populasi rentan, pembatasan pembangunan lingkungan atau publik dan tinggal di rumah, dan mengatur perawatan medis dan organisasi bantuan sosial untuk mengamankan klinik. Tindakan ini digunakan terkait dengan tindakan defensif individu terhadap COVID-19, misalnya, mencuci tangan terus menerus dan menutup mulut saat batuk

## 2. Definisi Perilaku *Physical Distancing*

*Physical Distancing* merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan infeksi dengan cara melakukan pembatasan kontak langsung antara satu

individu dengan individu yang lain, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengendalikan penyebaran penyakit menular. Adapun tujuan utama dari *Physical Distancing* adalah untuk meminimalisir terjadinya kontak secara langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu yang tidak terinfeksi. Sehingga memperkecil kemungkinan penyebaran penyakit menular seperti virus yang akan menyebabkan kematian.

Menurut WHO *physical distancing* adalah pembatasan jarak fisik antara masyarakat, dimana pembatasan jarak bukan berdasarkan pada kegiatan interaksi sosial antara masyarakat melainkan pada diri pribadi individu secara fisik. Sedangkan menurut *center for disease control* (CDC) *physical distancing* diartikan sebagai menjauhi segala bentuk perkumpulan (Megawati et al., 2020).

*Physical Distancing* menjadi opsi yang efektif untuk diimplementasikan untuk meminimalisir penyebaran virus melalui sentuhan secara langsung, baik hubungan seksual atau menyentuh benda atau barang yang telah terkontaminasi, atau transmisi melalui udara, droplet, bersin atau batuk (Yusup et al., 2020).

Masyarakat dapat mengimplementasikan *physical distancing* dengan melakukan beberapa tindakan seperti, tetap berada didalam rumah kecuali untuk hal-hal yang urgent seperti membeli obat-obatan tau kebutuhan pokok lainnya, kemudian masyarakat menghindari berjabat tangan, rajin berolahraga meski berada dirumah, kemudian memanfaatkan tehnologi agar tetap bekerja meski didalam rumah (Kresna & Ahyar, 2020).

Ada beberapa standart yang dihasilkan dan diaplikasikan untuk diterapkan menjadi himbauan di Indonesia antara lain adalah bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Melalui himbauan tersebut, pemerintah ingin agar warganya melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing setidaknya dalam durasi selama 14 hari. Melalui himbauan tersebut, ada pula himbauan untuk melakukan *social distancing*. Mengacu pada arti dalam bahasa

Indonesia, social distancing istancing dan physical dapat diartikan sebagai kegiatan pembatasan sosial dan penjarakan sosial dalam artian menghibau masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas didalam rumah (Patmawati, 2020).

3. Tujuan physical distancing

Adapun tujuan dari *physical distancing* adalah untuk mengontrol atau mengendalikan penyebaran penyakit menular. Adapun tujuan utama dari *Physical Distancing* adalah untuk meminimalisir terjadinya kontak secara langsung antara individu yang terinfeksi dengan individu yang tidak terinfeksi, sehingga memutuskan mata rantai infeksi.

Menurut tujuan dari *physical distancing* atau pembatasan sosial dan lebih dikenal dengan jarak bukan dimaknai dengan melarang melakukan apapun atau melakukan aktivitas apapun diluar rumah, tetapi dalam artian bertujuan untuk melakukan pembatasan kegiatan di luar rumah, karena sama-sama kita ketahui bahwa hal yang paling cenderung dan paling cepat menularkan penyakit adalah manusia khususnya interaksi manusia yang tak terbatas.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku *physical distancing*

Berdasarkan (Pertiwi & Budiono, 2021) ada beberapa yang memengaruhi perilaku *Physical distancing* yaitu :

a. Usia

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa usia mempengaruhi perilaku *physical distancing* masyarakat pada masa pandemi Covid-19, berdasarkan hasil penelitiannya bahwa individu dengan rentang usia 36-45 tahun dan 46-55 tahun cenderung memiliki perilaku physical distancing yang negatif dibandingkan dengan usia yang lebih mudah.

b. Jenis kelamin

Dalam risetnya menyatakan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dapat menerapkan

perilaku *physical distancing* yang positif dibandingkan dengan jenis kelamin laki laki yang didasari oleh perempuan memiliki sifat penuh kasih sayang, lembut serta merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan orang-orang disekitarnya. Sedangkan laki-laki cenderung memiliki sifat yang agresif, senang berpetualang, suka keleluasan, kasar serta lebih berani mengambil resiko. Dalam hal ini resiko yang dimaksud yaitu resiko tertular Covid-19.

Sehingga adanya perbedaan sifat ini, menyebabkan perempuan justru lebih berhati-hati dan cenderung menerapkan perilaku hidup sehat serta takut untuk melakukan pelanggaran yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh (Sriatmi & Kusumastuti, 2020) bahwa perbedaan tersebut didasari oleh perbedaan sifat yang dimiliki pada setiap gender atau jenis kelamin.

Berdasarkan penelitian Riyadi & Putri, (2020, p. 19) rata-rata indeks kepatuhan responden dari berjenis kelamin laki-laki lebih rendah dalam penerapan protokol kesehatan dibanding dari kalangan dengan dan berjenis kelamin perempuan khususnya dalam penerapan *physical distancing*

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku *physical distancing*, tingkat pendidikan yang tinggi akan membentuk perilaku melalui pengetahuan yang luas yang akan membentuk sebuah pemahaman yang akan menentukan dalam berperilaku *physical distancing* yang lebih positif dan sama halnya dengan tingkat pendidikan yang rendah pengetahuan yang rendah akan membentuk cakupan pemahaman individu yang minim dan

akan membentuk perilaku *physical distancing* yang negatif (Pertiwi & Budiono, 2021).

d. Pekerjaan

responden yang bekerja justru lebih jarang menjaga jarak sosial atau menghindari transportasi umum (Li et al., 2020). Hal ini disebabkan karena responden yang bekerja justru lebih banyak beraktivitas dan memiliki kesibukan sehingga kurang memperhatikan upaya pencegahan Covid-19 salah satunya perilaku jaga jarak (Pertiwi & Budiono, 2021).

e. Dukungan keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat dan individu yang paling sering berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, dari setiap individu yang memiliki hubungan kuat antara anggota keluarga. Keluarga memiliki tanggung jawab serta peran penting terhadap kesejahteraan dan kesehatan diri serta anggota keluarga. Selain itu keluarga juga berperan penting dalam menyampaikan informasi, memberikan nasihat dan memotivasi untuk selalu menerapkan perilaku hidup sehat, dan saling menjaga serta saling mengingatkan dalam hal kebaikan khususnya perilaku *physical distancing* positif (Pertiwi & Budiono, 2021).

Berdasarkan Notoatmodjo, S. (2014) yang dikutip dalam (Pertiwi & Budiono, 2021) Dukungan keluarga sangat berperan dalam pembentukan perilaku seseorang. Seseorang yang mendapat dukungan keluarga maka dapat menerapkan perilaku *physical distancing* yang positif. Menurut Lawrence Green faktor penguat terjadinya perilaku yaitu adanya dukungan sosial yang bersifat baik, yang mana dukungan keluarga juga termasuk dalam dukungan sosial.

f. Dukungan tokoh masyarakat

Dukungan sosial juga meliputi dukungan dari tokoh masyarakat. Dukungan tokoh masyarakat mengacu pada ketentraman, ketenangan, bantuan manfaat berupa informasi verbal yang diterima seseorang dari tokoh masyarakat (Akbar et al., 2015). Hal tersebut dalam didukung oleh salah-satu riseta yang menunjukkan adanya hubungan antara dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku *physical distancing* (Pertwi & Budiono, 2021).

Menurut Budiarjo (2008) dalam (Rosidin et al., 2020) menyatakan bahwa tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang penting terhadap perilaku *physical distancing* karena tokoh masyarakat merupakan orang yang berperan besar dalam suatu kelompok masyarakat dan dapat mempengaruhi individu maupun kelompok lain sesuai dengan keinginan dirinya.

g. Sumber informasi

Informasi merupakan pengetahuan yang diperoleh seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi terkait Covid-19 maupun upayaupaya pencegahannya dapat diperoleh dari berbagai sumber. Diketahui dari hasil analisis bivariat pada penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara sumber informasi dengan perilaku *physical distancing* (Pertwi & Budiono, 2021).

Kurangnya sumber informasi dapat mempengaruhi perilaku *physical distancing* masyarakat menjadi negatif, begitupun sebaliknya apabila masyarakat memperoleh informasi yang baik maka akan berpengaruh terhadap perilaku *physical distancing* yang

positif. Hal ini disebabkan adanya sumber informasi yang baik akan mendapat informasi yang lebih luas serta pengetahuan terkait Covid-19 maupun *physical distancing* yang nantinya akan berdampak pada sikap kemudian berpengaruh terhadap perilaku seseorang (Li et al., 2020)

- h. Tingkat pengetahuan covid-19  
Masyarakat cenderung memiliki pengetahuan yang baik dapat disebabkan karena pada era pandemi Covid-19 berbagai informasi terkait Covid-19 telah dapat diakses baik melalui media online maupun offline. pengetahuan yang baik akan diiringi oleh perilaku pencegahan yang baik dan sebaliknya, hal ini disebabkan adanya faktor ekonomi maupun sosial yang mengakibatkan perilaku *physical distancing* sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19 masih kurang dioptimalkan (Pertwi & Budiono, 2021).
- i. Tingkat pengetahuan *physical distancing*  
Dalam hasil penelitian (Pertwi & Budiono, 2021) bahwa responden dengan pengetahuan *physical distancing* kategori cukup 2,095 kali lebih cenderung menerapkan perilaku *physical distancing* yang negatif dari pada responden yang memiliki pengetahuan *physical distancing* kategori baik.  
Tingkat pengetahuan Dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat sangat penting untuk dilakukan edukasi yang meliputi pengenalan, penularan, bahaya COVID-19, serta pencegahan dengan melakukan *physical distancing* adalah langkah yang tepat untuk memutus mata rantai covid-19.
- j. Sikap

Sikap masyarakat memaknai dan Physical distancing dalam menjaga kesejahteraan jiwa didapatkan hasil yang memiliki sikap yang patuh terhadap social distancing dan Physical distancing itu memiliki tingkat yang sangat baik (Widya & Fritasari, 2021).

- k. status pernikahan  
status pernikahan akan menjadi salah-satu faktor yang mempengaruhi perilaku physical distancing, individu yang telah berkeluarga akan cenderung bersikap lebih protektif dalam menghadapi pandemic covid-19, sehingga dari hal tersebut akan cenderung membuat individu untuk selalu waspada dan akan selalu berhati-hati dalam melakukan apapun termasuk dalam menanggapi covid-19, individu dengan status menikah cenderung akan berada di arah lebih patuh dibandingkan dengan individu yang belum menikah karena belum tertanam dalam dirinya bahwa ada rasa tanggung jawab dan keharusan menjaga anggota keluarganya
- l. Kekhawatiran  
Rasa khawatir dan kecemasan seseorang akan berdampak pada tindakan yang akan dilakukan, sama halnya dalam menanggapi pandemic covid-19, individu dengan tingkat kekhawatiran yang relative tinggi maka akan lebih waspada dalam menghadapi pandemic tersebut, sehingga akan mencari banyak cara untuk menghindarinya, dan hal ini akan berpotensi besar untuk mematuhi kebijakan physical distancing berbeda dengan individu yang tingkat kekhawatiran rendah mereka akan lebih cenderung santai dalam menanggapi masalah bahkan lebih cenderung kearah pasif dalam penanganan masalahnya, jadi akan lebih cenderung untuk tetap bersikap tidak patuh

pada sebuah kebijakan dan akan berdampak pada tidak melaksanakan physical distancing (Riyadi & Putri, 2020, p. 19)

m. Status kesehatan

Status kesehatan menjadi salah-satu poin penting yang mempengaruhi kepatuhan individu dalam menerapkan physical distancing, tingkat kesehatan yang lebih rentan terkena penyakit akan cenderung lebih patuh untuk menerapkan perilaku physical distancing dibandingkan dengan yang status kesehatannya lebih tinggi seperti anak mudah dan masyarakat yang tidak memiliki penyakit degenerative, dengan rasional bahwa lansia merupakan populasi rentan begitupun dengan anak-anak dan ibu hamil, berbeda dengan remaja yang masih dalam keadaan sehat bugar akan lebih cenderung acuh atau tidak mengimplementasikan perilaku physical distancing (Riyadi & Putri, 2020, p. 19).

n. Kebijakan pemerintah

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi konsistensi publik dengan pelaksanaan physical distancing. strategi didorong dari awal hingga akhir dengan elit partai menandai perspektif yang tepat dan orang-orang mengikuti arah yang dapat diprediksi dengan sistem kepercayaan sebelumnya. Pengujian yang dapat diprediksi dengan hipotesis wawasan sosial menunjukkan bahwa orang lebih diyakinkan oleh para ahli strategi yang dipandang memiliki nilai-nilai seperti mereka sendiri (Rothgerber et al., 2020).

Kebijakan physical distancing sangat berpengaruh terhadap perilaku penvegahan covid-19 pada masyarakat perkotaan maupun pedesaan, hal ini terjadi karena semakin ketat

sebuah kebijakan dalam artian kebijakan physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah maka tingkat kepatuhan masyarakat akan meningkat pula, dan hal tersebut akan berimbas juga pada perilaku individu dalam melaksanakan physical distancing sebagai upaya pencegahan covid-19 (Achmad, 2021, p. 19).

Mengingat latar belakang politik Amerika, gagasan COVID-19 telah berubah menjadi cara hidup yang signifikan sebagai penanda yang mengakui nonkonformis dari tradisional; pandangan liberal menggaris bawahi bahaya yang ditimbulkan oleh infeksi dan kesulitan dalam menahan penyebarannya, sedangkan pandangan moderat menekankan kompensasi yang berlebihan terhadap bahaya yang disalahartikan. Ketika kesan keseriusan COVID-19 dikaitkan dengan karakter politik, orang mungkin mulai mengukur data yang dihasilkan melalui titik fokus filosofis, membuat objektivitas lebih sulit. (Rothgerber et al., 2020).

#### 5. Kategori perilaku masyarakat terhadap physical distancing

Berdasarkan Maylanny et al., (2021) membagi perilaku masyarakat terhadap physical distancing kedalam 3 kategori yaitu :

##### a. Informan aktif

Informan aktif adalah informan yang sadar bahwa informasi Physical Distancing merupakan informasi yang sangat penting sebagai upaya kontrol diri dan keluarga dalam pencegahan penyebaran virus dan melindungi keluarga maupun masyarakat dari terinfeksi virus covid 19.



- b. Informan simpati  
informan simpatik mereka yang tidak terlalu aktif mengakses dan menerima informasi, namun dalam penerapan kebijakan Physical Distancing dilakukan meskipun tidak secara penuh, tetapi menyesuaikan situasi yang ada.
  - c. Informan pasif/ acuh  
informan pasif merupakan informan atau individu yang tetap mencari informasi dan tidak menerapkan Physical Distancing. Hal ini terjadi karena mereka meyakini tindakan yang terlalu berlebihan menerima informasi Physical Distancing, justru akan mengganggu mental dan akan berdampak pada kondisi fisiknya dan hal seperti ini memberikan dampak positif dan negative terhadap pencegahan covid dimana disisi lain menurunnya rasa khawatir yang berlebihan atau ansietas yang berlebihan akan meminimalisir penurunan gangguan mental yang akan berdampak pada penurunan imun tubuh tetapi disisi lain akan berdampak negative pula karena tidak mematuhi atau menerapkan kebijakan physical distancing sehingga akan sangat beresiko untuk terinfeksi covid-19.
6. Dampak physical distancing bagi masyarakat  
Menurut (Sakti & pribadi, 2018) ada 3 dampak negative physical distancing yaitu :
- a. Pembatasan interaksi antara satu individu dengan individu lain, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan bisa terlepas dari interaksi sosial.
  - b. Menurunnya interaksi ini menyebabkan kurangnya kepekaan terhadap sesama dalam hal ini pembatasan sosial akan menimbulkan efek kepada setiap individu dimana individu tersebut akan terbiasa dengan tanpa interaksi

sosial sehingga akan menekan tingkat kepekaan dan kepedulian dari masing-masing individu tersebut sehingga akan berdampak pada sikap dan perilaku individu yang akan cenderung acuh atau tidak peduli dengan masalah tetangga, atau kelompok yang lain.

- c. Ekonomi yang terganggu dan sulitnya akan akses alat pelindung diri juga menyebabkan langkah proteksi diri bagi masyarakat sangat lemah, dalam hal ini jumlah pendapatan akan terbatas bahkan akan terjadi penurunan secara drastic dan akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan dalam satu keluarga atau perindividu akan terhambat atau dengan kata lain tidak terpenuhi seperti pemenuhan asupan makanan yang bergizi dan pemenuhan obat-obatan sehinggahal ini akan berdampak pada pertahanan diri atau imun akan menurun.

dan menurut (Sukardi & Sulaiman, 2021) ada dua dampak negatif physical distancing bagi kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun secara mental yaitu sebagai berikut :

- a. Kesehatan mental

Physical distancing dan social distancing terhadap kesehatan masyarakat terkadang dapat berdampak negatif, manusia hidup sangat membutuhkan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar. Jadi mengurangi intraksi social dapat menyebabkan seseorang merasa kesepian. Untuk seseorang yang mengalami dampak pemberlakuan physical distancing dan kebijakan social distancing terhadap kesehatan mental dan kesehatan fisiknya cenderung seperti mengalami kesepian, sedih, stres, bahkan depresi mengakibatkan bunuh diri (Sukardi & Sulaiman, 2021). Cakupan dampak dari

penerapan physical distancing juga berdampak pada anak-anak, situasi tersebut akan membuat anak-anak kebingungan, ketakutan, khawatir (cemas) dan merasa terancam dengan kondisi tersebut, kondisi yang penuh dengan pembatasan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tertekan pada anak, sehingga bisa memicu timbulnya trauma pada anak, ditambah lagi dengan beberapa media yang mengabarkan informasi kematian yang diakibatkan oleh covid-19 (Sukardi & Sulaiman, 2021).

b. Kesehatan fisik

Dampak dari physical distancing mengakibatkan beberapa individu menjadi depresi karena kurangnya pendapatan yang berbanding terbalik dengan kebutuhan, sehingga mengakibatkan pemenuhan kebutuhan menurun dan membuat imun menurun sehingga terserang kelaparan, penyakit, stress yang berdampak pada depresi sehingga mencederai diri sendiri dan bunuh diri (Sukardi & Sulaiman, 2021).

Dampak dari physical distancing tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat tetapi juga merambat ke seluruh aspek kehidupan baik pendidikan, sosial ekonomi dan agama, dalam aspek pendidikan physical distancing telah memberikan dampak yang besar di Negara Indonesia, telah meluncurkan beberapa aplikasi yang diharapkan akan dapat menunjang pembelajaran secara DARING, sehingga proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung dengan menggunakan jaringan internet. Namun tidak semua hal berjalan sesuai dengan harapan, banyak kendala dalam penerapannya diantaranya membuat para peserta didik menjadi kehilangan minat terhadap pembelajaran daring, dengan alasan merasa bosan dan sulit untuk

memahami point-point yang diajarkan (Amalia & Nurus, 2020).

Tidak hanya proses belajar yang terganggu, proses mengajar pun turut mendapatkan kendala, dimana jadwal pembelajaran telah berubah, tidak sesuai dengan jadwal sekolah tatap muka, jadwal akan mudah bergeser dan tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu karena pengaplikasian E-leraning atau daring, tidak semua tenaga pengajar paham atau mengerti mengenai penggunaan e-learning, karena keterbatasan pada sumber daya sebagai seorang tenaga pengajar, belum lagi keterbatasan jaringan internet untuk daerah pedesaan atau pedalaman yang turut serta menghambat pembelajaran secara daring (Amalia & Nurus, 2020).

Menurut Bausch, (2020) yang dikutip dalam (Aquarini, 2020) Ada beberapa manfaat melakukan pemisahan fisik atau physical distancing dalam upaya pencegahan COVID-19, lebih spesifiknya dari pelepasan fisik yang tepat dibandingkan dengan berbagai tindakan adalah cenderung dibuat dengan harga minimal dan disesuaikan dengan berbagai macam sosial budaya. dan pengaturan moneter, termasuk di mana kerumitan atau biaya sosial untuk mengikuti penguncian tinggi. sangat tinggi. Aturan dapat dikembangkan secara kooperatif pada tingkat yang sangat dekat oleh perintis lingkungan, bahkan mungkin pada skala lokal. Di tempat-tempat di mana COVID-19 belum diperkenalkan atau di mana transmisi luas belum terjadi, implementasi physical distancing, bersama dengan langkah-langkah lain, bahkan dapat membantu menghindari perlunya tindakan lockdown.

Pemerintah dalam menerapkan kebijakan dapat melakukan pendekatan dan melibatkan masyarakat sebagai mitra sentral dalam perjuangan melawan COVID-19, melawan pesan tersirat kami menentang mereka” dari pemerintah tentang lockdown. Sementara

keuntungan dari kontrol terdesentralisasi jelas, pertimbangan harus diberikan untuk menjaga terhadap orang-orang dan jaringan yang mencoba melakukan strategi yang tidak berbasis bukti atau bahkan menolak pedoman kesejahteraan umum, dengan kemungkinan efek samping, termasuk perluasan penularan COVID-19, dalam jaringan mereka dan kemudian beberapa. Standar menjaga bukti tergantung pada aturan, sejauh bukti ada, harus secara konsisten diperhatikan.

#### 7. Pengimplementasian physical distancing

Dalam hal pengimplementasian perilaku physical distancing sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran covid-19, yang paling berperan penting adalah Partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat telah menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Dengan upaya pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menganjurkan masyarakat untuk menerapkan social distancing (pembatasan sosial) dan physical distancing (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi (Mulyadi, 2020, p. 19)

Pelaksanaan kebijakan pemerintah ditopang penuh oleh undang-undang sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga

sebagai subjek penanganan Covid-19 (Mulyadi, 2020, p. 19).

Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan social distancing/physical distancing, self-quarantine dan self-isolation. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian Widyaningrum et al., (2020) didapatkan bahwa mayoritas responden atau individu dan kelompok mematuhi kebijakan dengan menerapkan physical distancing, hal tersebut didorong dengan adanya pengetahuan masyarakat terkait dengan physical distancing dan bahaya dari covid 19, dan penerapan atau pengimplementasian physical distancing dibuktikan dengan presentase seperti mengunjungi pusat perbelanjaan yaitu hanya satu kali/minggu atau bahkan satu kali/bulan dan mayoritas masyarakat berada diluar rumah yaitu kurang dari satu jam.

Hal tersebut juga sesuai dengan Mona Safitri, (2021) yang menyatakan bahwa penerapan physical distancing tidak berhenti pada orang dewasa saja, melainkan merambat sampai usia kanak-kanak, batita, dan anak sekolah, dimana mereka melalui pengawasan orang tua saat melakukan imunisasi, tetap menerapkan physical distancing dengan tetap melakukan penjarakan sosial, kemudian terkait dengan pendidikan anak-anak tetap melaksanakan proses belajar dengan home schooling atau dalam jaringan (DARING), tanpa harus keluar rumah dan berinteraksi langsung dengan

individu lain diluar rumah, sehingga meminimalisir terjadinya penularan covid-19.

Dalam penerapan physical distancing menurut (Patmawati, 2020) ada beberapa langkah-langkah yang harus diterapkan dalam pengamplifikasiannya yaitu sebagai berikut :

1. Jangan keluar rumah, kecuali untuk urusan penting, seperti membeli kebutuhan pokok atau berobat ketika sakit dalam upaya pencegahan covid dan menghindari interaksi langsung dengan individu lain.
2. Sapa orang lain dengan lambaian tangan, bukan dengan berjabat tangan hal ini bertujuan untuk menghindari kontak langsung melalui tangan sehingga tidak terjadi penularan melalui tanga.
3. Bekerja atau belajarlh dari rumah dengan tujuan tetap melakukan kegiatan yang produktif dirumah tanpa harus keluar rumah dan menyebabkan kerumunan.
4. Manfaatkan telepon genggam atau smartphone untuk video call dan untuk tetap terhubung dengan kerabat dan rekan kerja agar komunikasi tetap terjaga tanpa harus kontak langsung.
5. Lakukan olahraga di rumah, tidak di pusat olahraga atau gym untuk menghindari kerumunan dan tetap menjaga imunitas tubuh tetap bugar dan Vit sehingga tidak mudah terserang penyakit.
6. Jika ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari, lakukan di luar jam sibuk bertujuan untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir untuk kontak dengan orang banyak, sehingga resiko tertular pun lebih minim.
7. Minta kurir pengantar barang atau makanan untuk melakukan contactless delivery

(menerima pesanan tanpa bertemu langsung dengan kurir) saat memesan makanan atau barang lainnya.

8. Menunda mengunjungi orang lain bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran covid.

Berdasarkan beberapa urain di atas, maka hal ini telah membuktikan bahwa physical distancing merupakan langkah yang paing efektif untuk dilakukan, dan menjadi salah-satu opsi yang tepat dalam pemutusan mata rantai penyebaran covid - 19, dan tergambar dengan jelas bahwa pengaplikasian dan efektivitas dari physical distancing sangat signifikan, sehingga individu dapat terhindar dari kontak dengan individu lain, meminimalisir terjadinya penyebaran virus melalui droplet, batuk, atau flu bahkan kontak langsung dengan individu lain, sehingga individu akan merasa lebih aman (Patmawati, 2020).

8. Pengaruh physical distancing terhadap kesehatan

Kebijakan physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak penyebaran infeksi virus Covid-19 di Indonesia. Kebijakan yang telah dipilih telah sesuai dengan himbauan WHO terkait physical distancing dan social distancing. Hal ini dapat kita temukan di tempat-tempat umum, dimana kita dapat melihat simbol physical distancing yang menandakan jarak seseorang dengan orang lain seperti yang terdapat pada halte bus, stasiun kereta api, supermarket, hingga angkutan umum sudah mulai menggunakan nomor atau tanda jarak untuk menjaga batas pengunjung agar terhindar dari kontak fisik dengan pengunjung lainnya (Kresna & Ahyar, 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut telah menunjukkan bahwa kebijakan physical distancing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, dimana dengan kebijakan physical distancing dan social

distancing yang diambil oleh pemerintah dapat menghambat penyebaran infeksi virus Covid-19 diantara masyarakat. Dengan penerapan protokol-protokol kesehatan dan upaya-upaya yang perlu diperhatikan oleh masyarakat luas untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat sehingga masyarakat terhindar dari bahaya penularan dan dampak gangguan kesehatan dari penularan virus Covid-19 (Kresna & Ahyar, 2020).

Penerapan *physical distancing* yang umum dilakukan yaitu: bekerja dari rumah; belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah dan mahasiswa; dan tidak melakukan pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, rapat, atau pesta pernikahan. Ketika menerapkan *physical distancing*, seseorang tidak diperkenankan untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita Covid-19 (Mulyadi, 2020, p. 19).



## **BAB V**

### ***HEALTH LITERACY* VAKSINASI COVID-19**

#### **A. *HEALTH LITERACY***

##### **1. Definisi *Health Literacy***

Tingginya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit di Amerika Serikat pada tahun 1970-an adalah pertama kalinya literasi kesehatan dikonseptualisasikan dan diperkenalkan. Literasi kesehatan dikutip sebagai prasyarat penting untuk status perawatan kesehatan di Amerika Serikat. Namun, dengan diperkenalkannya berbagai media untuk menyampaikan informasi terkait Memperluas basis pengetahuan kesehatan dan medis. Definisinya berkembang pesat (Gupta et al., 2017).

The American Medical Associations Ad Hoc Committee on *Health Literacy* mencatat bahwa istilah "literasi kesehatan" telah ada dalam literatur kesehatan setidaknya selama 30 tahun tanpa definisi kerja yang jelas (D Nutbeam, 2000). Pada dasarnya, literasi kesehatan adalah keterampilan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk mempromosikan dan memelihara kesehatan.

Karena jumlah materi pendidikan kesehatan yang disebarluaskan melalui internet, media sosial, dan media cetak meningkat, pasien bertanggung jawab untuk menguraikan sejumlah besar informasi yang tersedia (Gupta et al., 2017). Definisi literasi kesehatan oleh karena itu dapat digambarkan sebagai pengetahuan, motivasi dan kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi dan menerapkan informasi untuk membuat keputusan tentang pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi kesehatan.. (Quaglio et al., 2017).

*Health literacy* adalah Tingkat kemampuan individu untuk menerima, memproses, dan memahami informasi dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait kesehatan yang tepat. Dari apa

yang telah dikemukakan selama ini, dapat dikatakan bahwa literasi kesehatan berperan besar dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, mencapai literasi kesehatan merupakan tanggung jawab bersama di tingkat individu dan masyarakat. (Nazmi, Galio Rudolfo, Ridha Restila, 2015).

Berkman et al. mencatat bahwa definisi awal *health literacy* atau literasi kesehatan hanya berfokus pada "kemampuan untuk menerapkan literasi dasar dan keterampilan matematika (numerik) dalam konteks perawatan kesehatan". Definisi lain, yang tidak hanya mentransfer keterampilan yang dipelajari sebelumnya dari satu situasi ke situasi lain, adalah "tujuan mencapai literasi kesehatan" atau "memperoleh, memproses, dan menerima informasi medis dalam konteks yang berhubungan dengan kesehatan." memiliki kemampuan untuk memahami"(Berkman et al., 2010). *Health literacy* adalah pengetahuan tentang informasi kesehatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media dan tenaga medis. Oleh karena itu, seseorang dengan pengetahuan yang cukup tentang informasi kesehatan diharapkan dapat mengikuti keponakannya dan mengatasi masalah kesehatannya.

Literasi kesehatan adalah tingkat kemampuan individu untuk menerima, memproses, dan memahami informasi dan layanan kesehatan dasar yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait kesehatan yang tepat.(Nazmi, Galio Rudolfo, Ridha Restila, 2015). *Health literacy* atau Literasi kesehatan adalah pengetahuan tentang informasi kesehatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media dan tenaga medis. Oleh karena itu, individu dengan pengetahuan informasi kesehatan yang cukup diharapkan dapat mengatasi masalah kesehatannya jika diperlukan.(Bodur, Filiz, & Kalkan, 2017). *Health literacy* Literasi kesehatan dibagi menjadi tiga tingkatan: literasi kesehatan fungsional, literasi kesehatan interaktif dan literasi kesehatan kritis (Nutbeam 2015) yaitu *Functional health literac*, *Interaktif helath literacy* dan *Critical health literacy*. Adapun Manfaatnya adalah penghematan anggaran

perawatan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi kesehatan pada individu. Ini termasuk usia, kurangnya pendidikan, perbedaan etnis, hambatan akses ke layanan kesehatan dan akses ke informasi kesehatan (NAAL, 2003).

Berkman et al. mencatat bahwa definisi awal literasi kesehatan hanya berfokus pada "kemampuan untuk menerapkan literasi dasar dan keterampilan matematika (numerik) dalam konteks perawatan kesehatan". Definisi lain, yang tidak hanya mentransfer keterampilan yang dipelajari sebelumnya dari satu situasi ke situasi lain, adalah "tujuan mencapai literasi kesehatan" atau "memperoleh, memproses, dan menerima informasi medis dalam konteks yang berhubungan dengan kesehatan." memiliki kemampuan untuk memahami"(Berkman, Davis, & McCormack, 2010). *Health literacy* Literasi kesehatan adalah pengetahuan tentang informasi kesehatan yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti media dan tenaga medis. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang informasi kesehatan diharapkan dapat mengatasi sendiri masalah kesehatan jika diperlukan.

Meningkatkan literasi kesehatan sangat penting karena hubungan antara tingkat literasi kesehatan dan status kesehatan individu (Bodur et al., 2017). Level ini tercermin dari kemampuan Anda membaca dan menganalisis informasi yang ada (Don Nutbeam, 2015).

Menurut (Don Nutbeam, 2015) *health literacy* dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

a. Functional *health literacy*

Functional *health literacy* atau Literasi kesehatan fungsional menggambarkan keterampilan kesehatan dasar yang cukup untuk memperoleh informasi kesehatan yang relevan (seperti risiko kesehatan dan penggunaan sistem perawatan kesehatan) dan untuk dapat menerapkan pengetahuan ini sampai batas tertentu. kegiatan yang ditunjuk. Aspek ini memudahkan individu untuk mengakses dan

memperoleh informasi dari berbagai sumber. B. Penyebaran informasi kesehatan melalui saluran yang ada dan media yang tersedia (brosur, brosur, media online, media cetak, media elektronik)

b. Literasi kesehatan interaktif

Literasi kesehatan interaktif merupakan keterampilan literasi yang lebih tinggi yang memungkinkan individu untuk mengekstrak informasi, memperoleh makna dari berbagai bentuk komunikasi (interpersonal, media massa), dan menerapkan informasi baru untuk mengubah situasi. Keahlian ini memungkinkan individu untuk bertindak secara independen pada informasi baru dan berinteraksi lebih percaya diri dengan penyedia informasi seperti profesional perawatan kesehatan. Contoh: Bentuk perilaku ini banyak ditemukan dalam program pendidikan kesehatan sekolah modern yang mengarah pada pengembangan keterampilan dan kompetensi pribadi dan sosial.

c. *Critical health literacy*

*Critical health literacy* atau literasi kesehatan kritis Literasi kesehatan kritis mewakili keterampilan kognitif yang lebih tinggi yang dapat diterapkan bersama dengan keterampilan sosial untuk menganalisis informasi secara kritis dan menggunakan informasi itu untuk mengendalikan peristiwa dan situasi kehidupan dengan lebih baik. Misalnya, dengan menyediakan sarana teknis untuk mendukung aksi masyarakat, menghubungkan pemangku kepentingan dengan tokoh masyarakat dan politisi, dan memberdayakan masyarakat untuk menganalisis informasi secara kritis dan menggunakan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan.

## 2. Manfaat *Health Literacy*

Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi dari bacaan pemahaman (rangkaihan kalimat dalam satu paragraf). Contohnya adalah pengumpulan informasi kesehatan dari surat kabar, majalah, pamflet dan manual. Literasi dokumen mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, memahami, dan menggunakan teks dalam berbagai format (daftar, baris, kolom, matriks, grafik). Contohnya termasuk mengisi formulir asuransi kesehatan, meninjau tabel dan grafik data kesehatan, menemukan fasilitas medis di peta, dan menentukan dosis yang benar pada label obat. (Horgan et al., 2017). Pernyataan hampir serupa juga di jelaskan dalam (Štefková, Čepová, Kolarčík, & Gecková, 2018) bahwa *health literacy* menjelaskan pernyataan serupa, yang menyatakan bahwa literasi kesehatan adalah kunci untuk intervensi yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan individu dan kelompok, terutama dalam sistem kesehatan local, interaksi antar penyedia pelayanan medis dan pasien.

Disadari atau tidak, literasi membantu kita memecahkan banyak masalah kesehatan. Beberapa masalah utama yang terkait dengan kesehatan yang buruk adalah buruknya keterbacaan teks kesehatan di masyarakat, komunikasi yang buruk antara dokter dan pasien, dan pencegahan dan deteksi dini penyakit yang mungkin tidak dipahami pasien. Anda dapat melihatnya dalam upaya kami untuk Orang yang melek huruf pasti akan memahami semua prosedur yang diperlukan untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan semua orang, bukan hanya petugas kesehatan.

Literasi kesehatan bukan hanya kemampuan membaca dan menulis tentang kesehatan. Literasi

kesehatan memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan kesehatan individu dan masyarakat. Individu atau kelompok dengan literasi kesehatan yang rendah juga memiliki tingkat kesehatan yang rendah. Selain itu, literasi kesehatan mendorong orang untuk lebih sadar menilai kesehatannya dan berusaha menghindari berbagai jenis penyakit sebisa mungkin.. Bukankah kita selalu lebih ingat dengan jargon “lebih baik mencegah daripada mengobati?”

### 3. Dimensi *Health Literacy*

Terdapat beberapa ahli yang menguraikan tentang dimensi *health literacy*, diantaranya NAAL dan Nutbeam. NAAL (2003) mengklasifikasikan *health literacy* menjadi *Prose literacy*, *document literacy*, dan *quantitative literacy*. *Prose literacy* Ini adalah Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, memahami, dan menggunakan informasi dari pemahaman bacaan (rangkaiian kalimat dalam paragraf). Contohnya adalah pengumpulan informasi kesehatan dari surat kabar, majalah, pamflet dan manual. Literasi dokumen mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menemukan, memahami, dan menggunakan teks dalam berbagai format (daftar, baris, kolom, matriks, grafik). Contohnya termasuk mengisi formulir asuransi kesehatan, meninjau tabel dan grafik data kesehatan, menemukan fasilitas medis di peta, dan menentukan dosis yang benar pada label obat. Literasi kuantitatif adalah pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan perhitungan dan menggunakan informasi dan angka yang terkandung dalam bahan cetak. Contoh keterampilan ini termasuk membandingkan premi asuransi kesehatan dan menghitung informasi gizi pada label makanan. (Sorensen *et al*, 2012).


Nutbeam (2000), mengklasifikasikan *health literacy* menjadi tiga, yaitu *functional health literacy*, *critical health literacy*, dan *communicative health literacy*. Fungsional *health literacy*

merupakan level *health literacy* yang merujuk pada kemampuan dasar dalam membaca dan menulis untuk memahami informasi kesehatan yang relevan (Misalnya membaca bahan pendidikan kesehatan yang berisi faktor yang berpengaruh pada resiko kesehatan, dan bagaimana menggunakan sistem kesehatan) (Nutbeam, 2000; Sørensen *et al*, 2012; Nutbeam, 2015).

*Communicative health literacy* merujuk pada menggunakan keterampilan berpikir dan sosial yang lebih tinggi untuk mengekstrak dan menafsirkan informasi dari berbagai bentuk komunikasi (interpersonal dan media massa serta mengaplikasikan informasi tersebut. Sedangkan *critical health literacy* adalah kemampuan kognitif dan sosial yang lebih maju untuk berpikir kritis dalam menganalisis dan menggunakan informasi untuk mengerahkan kontrol yang lebih besar terhadap berbagai situasi. Tipologi yang berbeda ini mewakili tingkat pengetahuan dan keterampilan yang semakin mendukung otonomi yang lebih besar dan pemberdayaan pribadi terkait pengambilan keputusan kesehatan (Nutbeam, 2000; Sørensen *et al*, 2012; Nutbeam, 2015). Singkatnya, *functional health literacy* masih sebatas kemampuan membaca dan menulis dan pemahaman dasar mengenai informasi kesehatan, pada *communicative health literacy* pasien sudah mampu memberikan penilaian terhadap informasi kesehatan tertentu, dan *critical health literacy* sudah sampai pada pengambilan keputusan pasien terhadap kesehatannya.

*Health literacy* dapat ditingkatkan melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal tetapi juga berbagai pendidikan informal, maupun pemberdayaan masyarakat. Perbaikan dalam *health literacy* dapat diukur melalui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kesehatan. Pengetahuan dan keterampilan terkait dapat dikembangkan melalui pendidikan kesehatan (Nutbeam, 2009; Nutbeam, 2015).

Berikut ini digambarkan model *improving functional health literacy* dalam konteks klinis.




Gambar 20: Model Of Improving Functional Health Literacy In Clinical Care. (Nutbeam, 2015) Page 452.

Literasi kesehatan, khususnya di bidang klinis. Ini berfokus pada pengembangan pemahaman membaca dan kemampuan untuk menerapkan keterampilan ini untuk pengambilan keputusan medis sehari-hari. Ini juga menyoroti pentingnya menemukan cara untuk meningkatkan kualitas organisasi perawatan kesehatan melalui komunikasi antara pasien dan penyedia. Waktu yang terbatas di klinik membatasi komunikasi antara profesional kesehatan dan pasien dan membatasi akses ke informasi faktual tentang risiko kesehatan dan penggunaan obat-obatan dan layanan perawatan. Anda harus meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan pasien Anda secara berkelanjutan tentang perawatan dan perawatan kesehatan. Pendidikan pasien di klinik juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk manajemen mandiri penyakit kronis (Nutbeam, 2015).

Meningkatkan literasi kesehatan interaktif memerlukan pendekatan metode pengajaran yang berbeda. Hal ini dimaksudkan agar individu dapat secara mandiri memperoleh informasi kesehatan yang relevan, menginterpretasikan informasi tersebut, dan menerapkan informasi tersebut untuk kesehatan diri dan keluarganya. Bentuk pendidikan kesehatan disini lebih interaktif, terprogram dan terstruktur, seperti yang dimulai pada bangku sekolah, program pendidikan kesehatan sekolah kontemporer, program pendidikan orang dewasa berdedikasi, maupun program khusus untuk pendidikan pasien (Nutbeam, 2015).

Meningkatkan literasi kesehatan kritis membutuhkan metode yang lebih signifikan dan kompleks. Tidak hanya keterampilan yang berbeda yang meningkatkan Masyarakat dengan banyak determinan kesehatan, tidak hanya kinerja individu, tetapi juga politik, ekonomi, sosial dan lingkungan (Nutbeam, 2000; Nutbeam, 2015).

Model yang digunakan dalam meningkatkan *interactive/communicative* dan *critical health literacy* digambarkan pada bagan 3 sebagai berikut:



*Gambar 21: Model Of Improving Interactive Dan Critical Health Literacy Oleh Nutbeam (2015) Page 453.*

Pada gambar 3 menjelaskan bahwa peningkatan literasi kesehatan yang interaktif dan kritis dimulai dengan memperoleh informasi tentang pengetahuan dan keterampilan individu dalam hal literasi, numerasi, dan pengetahuan kesehatan dasar.

1. Untuk kesehatan disesuaikan dengan pendidikan dan komunikasi
2. Saat ini, terdapat model yang sangat berbeda yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan kesehatan diarahkan pada pengembangan individu yang ditujukan pada pengetahuan dan keterampilan.
3. Keterampilan interpersonal dan social.
4. Dalam model ini, hasil pendidikan dan komunikasi dapat mempengaruhi hasil literasi kesehatan.
5. Orang yang melek kesehatan memiliki keterampilan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam

meningkatkan kegiatan kesehatan, termasuk perilaku pribadi.

6. Intervensi kesehatan sosial dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam keputusan kesehatan. berhenti merokok atau periksa kesehatan.
7. Hasilnya tidak hanya meningkatkan kesehatan, tetapi juga memungkinkan lebih banyak pilihan kesehatan
8. Masing-masing dari pendekatan di atas akan bergantung pada keaksaraan dasar dan berhitung dalam populasi tertentu. Individu dengan keterampilan yang kurang dalam membaca, komunikasi lisan dan berhitung tidak hanya akan memiliki eksposur lebih sedikit untuk pendidikan kesehatan, tetapi juga kurang mengembangkan keterampilan untuk bertindak atas informasi yang diterima. Untuk itu, strategi yang dibangun tetap berkaitan dengan mempromosikan keaksaraan, berhitung dan keterampilan bahasa dalam populasi.

#### **4. Konsep *Health Literacy***

Salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam pemberian pelayanan kesehatan adalah kemampuan pasien dalam memilih, menerima, dan memahami informasi kesehatan. Kemampuan tersebut kemudian dikenal dengan *health literacy*. Istilah *health literacy* mungkin masih sangat asing bagi masyarakat awam di Indonesia, khususnya di Makassar. Namun ternyata, istilah ini sudah lama berkembang di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, Australia, dan sebagian wilayah Asia. *Health literacy* sudah diperkenalkan sejak tahun 1974 (Simonds, 1974 dalam Sørensen, Brouke, Fullam, Doyle, Pelikan, Slonska, & Brand, 2012). Sejak itu, berbagai konsep dan model serta riset *health literacy* terus berkembang, bahkan, menurut WHO (2013), *health literacy* akan menjadi determinan kesehatan di tahun 2020. Nutbeam menyebutkan *health literacy* mengalami pertumbuhan yang luar biasa di lebih dari 25 tahun terakhir. Lebih dari 700 artikel ilmiah dengan topik *health literacy*

dipublikasi di tahun 2013. Dari berbagai riset tersebut ditemukan bahwa permasalahan *health literacy* secara umum masih dialami di berbagai negara, namun ternyata, masyarakat dengan *low literacy* masih dominan ditemukan di negara berkembang, seperti Asia (Nutbeam, 2015).

Banyak pakar yang mendefinisikan tentang *Health Literacy*, mulai dari *functional*, yaitu sebatas kemampuan membaca dan menulis sampai pada definisi yang sangat luas dan spesifik. Menurut *Ad Hoc committee on health literacy for the council on Scientific affairs (1999)*, *Health literacy* di USA didefinisikan sebagai kemampuan dasar dalam membaca dan menulis dengan bahasa Inggris. Demikian halnya oleh *National Assesment of Adult literacy* yang mendefinisikan *health literacy* sebatas pada kemampuan membaca dan menulis saja. Kemampuan tersebut meliputi menggunakan dan menerjemahkan teks, dokumen, angka-angka, secara efektif. Kemampuan membaca brosur, memahami *informed consent*, membaca label obat, memahami informasi lisan dan tulisan dari petugas kesehatan, dan melakukan petunjuk serta prosedur pengobatan merupakan berbagai kemampuan yang harus dimiliki dalam *health literacy* (NAAL, 2003 dalam U.S. Institute of Science, 2006).

*Health literacy* adalah kemampuan individu dalam mendapatkan, memahami, dan memproses informasi dan pelayanan kesehatan dasar untuk mempromosikan dan mempertahankan kesehatan serta membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan. Ini melibatkan keaksaraan serta kemampuan mendengarkan untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan kesehatan (Nutbeam, 2000; IOM, 2004; Dewalt *et al*, 2010).

Ditambahkan oleh *World Health Organization* dalam *Health Promotion Glossary* bahwa *health literacy* yaitu kemampuan kognitif dan sosial yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mendapatkan akses, memahami dan menggunakan informasi dengan mempromosikan dan mempertahankan kesehatan yang baik. Dengan meningkatkan berbagai kemampuan


tersebut, akan menunjukkan pentingnya *health literacy* dalam pemberdayaan (WHO, 1998). Dari definisi ini terlihat bahwa selain kognitif, kemampuan sosial juga berperan dalam menentukan kemampuan dan motivasi seseorang memahami dan menggunakan informasi dalam mengambil keputusan dan tindakan yang akan menentukan status kesehatannya (Nutbeam, 2015).

Lebih luas lagi, *health literacy* dijelaskan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dalam keseharian, baik itu di rumah, komunitas, tempat kerja, pelayanan kesehatan, perdagangan, dan arena politik. Ini adalah strategi pemberdayaan penting untuk meningkatkan kontrol masyarakat atas kesehatan mereka, kemampuan mereka untuk mencari informasi dan kemampuan mereka untuk mengambil tanggung jawab (Kickbush, Wait, dan Maag, 2006). Berbagai kemampuan ini diperlukan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan di sepanjang kehidupan (Rootman & Gordon-Elbhibety, 2008). Sørensen dan kawan-kawan dalam studi literatur *reviennya*, mencoba merangkum semua definisi yang ada dengan menjabarkan bahwa *health literacy* memerlukan pengetahuan, motivasi dan kompetensi orang untuk mengakses, memahami, menilai, dan menerapkan informasi kesehatan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari mengenai kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas hidup sepanjang kehidupan (Sørensen *et al*, 2012).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *health literacy* merupakan kemampuan individu secara kognitif dan sosial dalam mendapatkan, memproses, dan menggunakan informasi kesehatan dalam pengambilan keputusan kesehatan yang akan mempengaruhi status kesehatannya di berbagai bidang kehidupan di sepanjang hidup.

Kemampuan *literacy* seperti kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara akan berpengaruh

pada *health literacy* individu yang akan berinteraksi dengan sistem kesehatan dan sosial budaya di lingkungan dan akhirnya memberikan dampak terhadap status kesehatan dan biaya. Interaksi konteks ini digambarkan oleh *health literacy* framework oleh *Institute of Medicine* di bawah ini.



Gambar 22: *Health Literacy Framework*. IOM (2004)

## 5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Health Literacy*

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi kesehatan seseorang antara lain usia, kurangnya pendidikan, perbedaan etnis, hambatan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan akses terhadap informasi kesehatan. (NAAL, 2003). *Health literacy* yang rendah di masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal berikut :

### a. Pengetahuan

*Knowledge*, atau yang biasa disebut pengetahuan, merupakan hasil dari seseorang yang mempelajari atau

mempersepsikan segala sesuatu, baik secara khusus maupun tidak khusus. Indra yang dicakup di sini adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan.. Hampir sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. (Notoatmodjo, 2010).

b. Usia dan Jenis Kelamin

Usia juga mempengaruhi tingkat *health literacy* seseorang. Keterampilan literasi kesehatan menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya kemampuan berpikir, berkurangnya kemampuan merasakan, dan berkurangnya kemampuan berpikir, sehingga menurunkan kemampuan membaca, menerima, dan memahami informasi. (Kapthings et al., 2014).

Penurunan literasi kesehatan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Hal ini dikarenakan rendahnya status sosial ekonomi perempuan mempengaruhi pendidikan mereka. Kesenjangan ini mengacu pada kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan. perbedaan kesempatan pendidikan. Pekerjaan dan pelayanan kesehatan dapat mempengaruhi tingkat literasi kesehatan. Ketidaksetaraan gender dalam kesehatan mempengaruhi sistem kesehatan, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Pada pria, tingkat literasi kesehatan tergantung pada hubungan sosial, sedangkan pada wanita tergantung pada proses pemahaman dan kemampuan membaca dan menemukan informasi. (Diemer et al., 2017).

c. Pendidikan

Pendidikan pada umumnya sangat erat kaitannya dengan pengetahuan tentang diri sendiri. Oleh karena itu, masyarakat yang berpendidikan rendah memiliki pengetahuan yang sedikit atau terbatas tentang literasi kesehatan. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi kemampuan kita untuk menguasai berbagai bidang, tetapi juga kemampuan kita untuk mengumpulkan dan

menafsirkan informasi yang berbeda, termasuk informasi kesehatan. (Huang et al., 2019)

d. Keterjangkauan Informasi

Penyebab rendahnya kontribusi literasi kesehatan adalah kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Health Literacy Survey HLSEUQ16*, yang mengukur empat dimensi: temu kembali informasi kesehatan, pemahaman informasi kesehatan, analisis informasi kesehatan, dan pengambilan keputusan kesehatan. Penerapan hasil analisis informasi kesehatan. Mereka yang tidak mengetahui literasi kesehatan memiliki literasi kesehatan yang rendah, dan mereka yang tidak memahami literasi kesehatan memiliki literasi kesehatan yang rendah. Setelah mencari dan memahami informasi kesehatan, hasil literasi kesehatan harus dianalisis atau ditimbang untuk memungkinkan pilihan perilaku sehat atau tidak sehat saat menggunakannya. ((Literasi Kesehatan Dengan Kebiasaan Perilaku Sehat Mahasiswa Fakultas Ilmu Olahraga et al., n.d.)

e. Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan

Kesehatan kita dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks, seperti pendapatan, lingkungan sosial, akses yang mudah ke layanan kesehatan, selain literasi. Akses ke layanan kesehatan bisa lebih sulit bagi penduduk pedesaan daripada penduduk perkotaan Hal ini juga menyebabkan upaya yang signifikan oleh petugas kesehatan untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat di daerah dengan akses yang minim. Akibatnya, upaya pencegahan mungkin merupakan strategi terbaik dalam memerangi penyakit. (.*LITERASIKESHEHATAN DITENGAHPANDEMI*, n.d.)

Literasi kesehatan adalah kemampuan untuk membuat keputusan kesehatan yang tepat dalam konteks keseharian, baik di rumah, komunitas, tempat kerja, pelayanan Kesehatan, perdagangan, dan arena politik. Masyarakat yang tidak mengetahui literasi kesehatan beresiko untuk

membuat keputusan yang salah, kondisi Kesehatan masyarakat dapat memburuk dan masyarakat dapat tersesat dalam kompleksitas system Kesehatan.

Literasi Kesehatan melibatkan kemampuan individu dalam hal mendnegarkaan, menulis, membaca, berhitung, serta pengetahuan budaya dan konseptual. Kemampuan individu ini berinterkasi dengan system pleyanan Kesehatan, system Pendidikan serta factor sosial budaya di tempat tinggal, tempat kerja, dan masyarakat. are-area inilah yang dapat menjadi titik intervensi dalam literasi kesheatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status kesehatan serta biaya Kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan, seseorang diharapkan dapat memahami bahan bacaan, informed consent, serta formular asuransi. (Salah et al., n.d.)

## **6. Akses Informasi Kesehatan**

Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan informasi. Sumber informasi yang umum digunakan adalah percakapan dengan anggota keluarga, tenaga kesehatan atau teman, media elektronik dan non-elektronik (ponsel, televisi, radio, brosur, surat kabar, spanduk dan Vidio). Pendidikan kesehatan, website, media sosial, sekolah, perpustakaan, informasi gizi, penyedia layanan kesehatan, dan farmasi (Thompson, 2014).

Tingkat literasi kesehatan seseorang dalam kaitannya dengan kesehatannya sangat bergantung pada kemampuannya mengakses informasi dari orang tersebut. Seseorang yang cukup paham kesehatan dapat dengan mudah Berkomunikasi dengan profesional kesehatan tentang informasi kesehatan yang diperlukan (Heijmans, Waverijn, Rademakers, van der Vaart, & Rijken, 2015). Selain itu, pengguna internet memiliki dampak positif dalam meningkatkan literasi kesehatan. Hal ini dikarenakan internet cenderung banyak digunakan sebagai sumber informasi (Lestari & Handiyani, 2017). ansia seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena

terbatas pada satu sumber informasi. Penggunaan internet telah meningkat secara signifikan, tetapi televisi tetap menjadi sumber informasi yang paling populer dan dapat diakses untuk orang dewasa yang lebih tua.

Akses informasi yang paling sering digunakan oleh mahasiswa untuk memperoleh informasi kesehatan adalah internet dan *handphone*. Semua mahasiswa memiliki *smartphone* atau tablet karena pada saat mereka menjadi mahasiswa baru mendapatkan tablet sebagai program dari sistem informasi akademik. Sumber informasi yang tersedia di internet memang jauh lebih banyak daripada di televisi maupun radio karena minimnya program televisi dan radio tentang kesehatan. Beberapa acara kesehatan di TV dan radio yang ada tidak spesifik untuk remaja sehingga internet selalu menjadi alternatif dan pilihan utama untuk mendapatkan akses informasi kesehatan dibandingkan media lainnya.

Akses informasi kesehatan sangat penting perannya terhadap *health literacy*. Sedikitnya sumber informasi kesehatan yang tersedia, terutama di televisi dan radio menyulitkan mahasiswa mendapatkan informasi. Di sisi lain sumber informasi di Internet sangat banyak, namun terkadang sulit mempercayai kebenaran informasi tersebut. Akses informasi adalah hal awal untuk meningkatkan *health literacy* mahasiswa. Dengan meningkatkan akses terhadap informasi, dan kapasitas untuk menggunakan informasi dengan efektif, *health literacy* menjadi sangat penting untuk pemberdayaan. Perilaku penggunaan media adalah hal yang menentukan akses terhadap informasi. (RASMILASARY\_70200117055, n.d.)

## 7. Dampak Rendahnya Literasi Kesehatan

Dikutip dalam Soemitro (2014) bahwa efek negatif dari literasi kesehatan yang buruk termasuk biaya perawatan kesehatan yang lebih tinggi, rawat inap yang lebih tinggi, hasil pemeriksaan kesehatan yang lebih buruk, dan skor kepatuhan yang lebih rendah. Kepatuhan minum obat,

sering meremehkan, laporan kesehatan yang buruk, kurangnya pengetahuan tentang akses layanan kesehatan dan pencegahan penyakit, dan kondisi kesehatan yang tidak memenuhi standar yang sesuai.

- a. Peningkatan penggunaan rumah sakit Orang dengan literasi kesehatan yang buruk lebih mungkin dirawat di rumah sakit lebih sering karena kesehatan yang buruk. Literasi kesehatan memainkan peran penting dalam manajemen kesehatan pribadi untuk meningkatkan status kesehatan mulai dari yang sakit sampai yang sembuh (Cho et al., 2008).
- b. Rendahnya literasi kesehatan berdampak pada ekonomi, berdasarkan laporan *Low Health Literacy: Implications for National Health Policy*, dikutip dalam *National Network of Libraries of Medicine* (2013). Sistem perawatan kesehatan AS berada pada tingkat Literasi Kesehatan. rendah. Menurut Vernon (2007) yang dikutip dalam *National Library Network of Medicine* (2013) biaya tahunan penurunan literasi kesehatan kepada pemerintah AS cenderung meningkat dari US\$106 miliar menjadi US\$238 miliar. Menurunnya pemahaman tentang kesehatan Di Korea Selatan, literasi kesehatan yang rendah menyebabkan tingginya insiden arthritis dan hipertensi pada orang di atas usia 60 tahun. Rendahnya tingkat literasi kesehatan secara otomatis menyebabkan pemahaman yang buruk tentang kesehatan dan manajemen kesehatan yang buruk (Iii et al., n.d.).

## **8. Strategi Peningkatan Hukum Kesehatan Mahasiswa Atau Profesional Kesehatan**

Potter & Perry (2013) menjelaskan bahwa kosakata merupakan salah satu faktor untuk komunikasi verbal yang efektif. Dokter, perawat, apoteker, dan profesional kesehatan lainnya yang memberikan informasi kepada pasien harus menghindari penggunaan istilah medis yang

mungkin belum dipahami pasien. Istilah medis harus dikomunikasikan dengan menggunakan kosakata yang lebih sederhana sehingga pesan yang dikomunikasikan dapat dimengerti oleh pasien. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mengetahui tingkat literasi kesehatan pasiennya agar dapat berkomunikasi secara efektif.

Menurut McCleary-Jones (2016), penyedia layanan kesehatan tidak hanya perlu memberikan informasi kesehatan dan mendukung pasien dalam memilih sistem perawatan kesehatan, tetapi juga memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan pasien dengan literasi kesehatan yang terbatas. Kami juga memiliki tanggung jawab dasar yang harus dipenuhi. Terlepas dari peran penting penyedia layanan kesehatan dalam membangun dan meningkatkan literasi kesehatan pasien, sebagian besar laporan gagal untuk mengenali dan memahami pentingnya literasi kesehatan dalam perawatan pasien. Salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman penyedia layanan kesehatan tentang literasi kesehatan adalah pengenalan program pendidikan literasi kesehatan dan pendidikan kesehatan ke dalam praktik sehari-hari. Sejumlah penelitian lain telah mengkonfirmasi efek positif dari mengintegrasikan komponen literasi kesehatan ke dalam kurikulum sekolah kesehatan dalam meningkatkan jumlah penyedia pengetahuan dan keterampilan. (Toronto & Weatherford, 2015)

Program pendidikan literasi kesehatan komprehensif yang dirancang dengan baik yang terintegrasi ke dalam kurikulum profesional kesehatan dan memberikan pelatihan literasi kesehatan berkelanjutan selama layanan rumah sakit. Selain itu, penekanan besar perlu ditempatkan pada pembinaan sikap yang lebih positif di antara perawat dengan menekankan pentingnya mengintegrasikan literasi kesehatan ke dalam rutinitas klinis. Upaya perbaikan di masa depan bertujuan untuk menyelidiki literasi kesehatan pasien di rumah sakit atau pusat kesehatan lain dalam rangka meningkatkan perawatan dan kesejahteraan,

terutama untuk pasien dengan literasi kesehatan rendah..  
(Nour Sriyanah, et al. 2019)

Literasi kesehatan harus dimasukkan dalam kurikulum keperawatan. Literasi kesehatan Ini harus dimasukkan dalam kurikulum keperawatan pra-lisensi untuk mempengaruhi hasil kesehatan pasien dan mempersiapkan generasi perawat berikutnya untuk merawat pasien dengan literasi kesehatan terbatas. Kebanyakan silabus berisi informasi tentang proses mengajar pasien, tetapi silabus tidak secara khusus membahas literasi kesehatan. Kurikulum keperawatan membutuhkan lebih dari sekedar menggabungkan strategi pendidikan pasien. Literasi kesehatan telah menjadi topik diskusi penting dalam keperawatan dan pendidikan kesehatan lainnya karena dampak signifikan dari gangguan literasi kesehatan pada hasil pasien. (McCleary-Jones, 2016)

Akses individu terhadap teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang menentukan literasi kesehatan. Hal ini konsisten dengan laporan Penilaian Keaksaraan Orang Dewasa Nasional, yang melaporkan kurangnya informasi kesehatan dari sumber cetak di negara-negara dengan tingkat literasi kesehatan yang rendah di antara populasi kunci.

## **9. *Health Literacy* Pada Mahasiswa Kesehatan**

Yang menentukan motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi untuk mempromosikan dan memelihara kesehatan (Organization, 2019). Meningkatkan literasi kesehatan pribadi membutuhkan perencanaan dan tindakan. Secara khusus, ada kebutuhan akan akses universal terhadap Kesehatan, program pemberdayaan masyarakat, serta materi dan program yang sesuai. Peningkatan literasi kesehatan dan bahan ajar. Untuk meningkatkan literasi kesehatan individu, pendidikan harus diberikan tidak hanya di klinik dan rumah sakit, tetapi juga di institusi lain seperti sekolah, perguruan tinggi Islam, tempat kerja dan

perpustakaan Literasi kesehatan adalah unik untuk setiap mahasiswa kesehatan. Hal ini mengacu pada program studi yang diambil dari program studi mahasiswa. Selain itu, literasi kesehatan mahasiswa dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman rumah sakit.. (Elsborg et al., 2017).

Literasi kesehatan harus diintegrasikan ke dalam pendidikan sarjana sebagai pelatihan teoritis dan praktis yang dapat mengatasi kekurangan terkait literasi kesehatan. Mengembangkan literasi kesehatan di tingkat sarjana membantu mempersiapkan mahasiswa kesehatan untuk memasuki profesi kesehatan, Selain itu dapat meningkatkan komunikasi dengan pasien, meningkatkan kemampuan siswa untuk meningkatkan status kesehatan mereka, dan berdampak positif pada keterampilan manajemen diri siswa. (Mullan et al., 2017).

#### 10. Cara Mengukur *Health Literacy*

Pengukuran literasi kesehatan seseorang dilakukan terhadap sikap pengetahuan, motivasi, niat perilaku, keterampilan pribadi, dan efikasi diri yang terkait dengan kesehatan sehingga mengarah kepada pengetahuan baru, perilaku yang lebih positif, efikasi diri yang lebih besar, perilaku kesehatan positif dan kesehatan yang lebih baik (Baker, 2006; Nutbeam, 2000).

Bagi individu, literasi kesehatan ditentukan oleh tingkat pendidikan, kultur, dan bahasa. Akan tetapi, dibutuhkan juga keterampilan berkomunikasi dan menilai interaksi dengan orang lain terkait dengan kesehatan serta kemampuan media, pasar dan pemerintah untuk menyediakan informasi kesehatan secara benar ((Rudolfo et al., n.d.)

Literasi kesehatan dapat diukur dengan beberapa cara yaitu seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Health Literacy Questionnaire (HLQ)15 mengidentifikasi sembilan skala literasi kesehatan individu yang mencerminkan kompetensi dan pengalaman individu

yang terlibat dalam memberikan perawatan kesehatan praktis.

- a. Tes Fungsional Health Literacy pada Orang Dewasa (TOFHILA)
- b. Berfokus pada membaca informasi kesehatan.
- c. The Newest Vital Sign (NVS) adalah alat untuk mengukur literasi kesehatan dengan mengajukan pertanyaan informasi gizi. yaitu Skala Literasi Kesehatan Elektronik (eHeals) adalah alat yang menilai kemampuan meresponden untuk menggunakan internet sebagai sarana informasi kesehatan .(Nurjanah et al., 2016).



## **BAB VI**

### **PERILAKU KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA**

#### **1. Perilaku Kesehatan Pada Mahasiswa**

Perilaku kesehatan adalah kegiatan individu yang memiliki efek positif dan negatif pada status kesehatan. (Poopin, 2021). Sarjana adalah sekelompok remaja akhir antara usia 18 dan 25 yang belajar di lembaga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau pada tingkat yang sama dengan universitas. Siswa dikenal cerdas secara intelektual dan berpikir, merencanakan, dan bertindak secara cerdas. Namun, siswa itu sendiri masih dalam tahap pertumbuhan. dan masih dalam proses belajar, sehingga tidak semua yang dilakukan mahasiswa itu patut dibenarkan. (Pupin, 2021)

Wawan dan Dewi (2010) berpendapat bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang. Pengalaman dan penelitian telah menunjukkan bahwa perilaku berbasis pengetahuan lebih berkelanjutan daripada perilaku berbasis non-pengetahuan.

Green (1980) menyatakan bahwa perilaku kesehatan seseorang ditentukan oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan tradisi orang tersebut (predisposisi). Selain itu, ketersediaan sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan (enablers), sikap dan perilaku petugas kesehatan terhadap kesehatan (enablers atau reinforcers) juga mendukung dan memperkuat pembentukan perilaku.

Berdasarkan karya Devi Tri Handayani dkk. (2013) menemukan perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku antara mahasiswa kesehatan dan non-kedokteran, dan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa kesehatan memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku pengobatan sendiri yang lebih baik daripada mahasiswa non-medis meningkat. sehat. (Devi et al., 2013.)

Mahasiswa non kesehatan merupakan salah satu komponen masyarakat yang mempunyai tingkat pengetahuan tinggi, namun kurang terpapar masalah kesehatan. (Baswedan & Listiowati, 2014) karena itu, masih diperlukan edukasi lebih lanjut.

Sikap merupakan salah satu faktor pendukung dalam perilaku pencegahan penyakit. Sikap yang baik diharapkan mampu menciptakan perilaku yang baik pula (Zuhana et al., 2021)

Sebuah penelitian oleh Hidayangsih (2014) menemukan bahwa perilaku berisiko dan masalah kesehatan reproduksi di kalangan remaja di kota Makassar berhubungan dengan hubungan yang buruk dengan pasangan, yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, karena masih sedikitnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. dari pembentukan hingga penularan penyakit menular seksual. untuk keguguran. Ini menguraikan rendah dan tidak sehatnya persepsi, sikap dan perilaku kaum muda. Sikap dan perilaku terkait kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap masalah kesehatan reproduksi. (Pupin, 2021)

Terkait perilaku Merokok, Alkohol, dan Seks Pranikah Hasil survei menunjukkan bahwa merokok, konsumsi alkohol, dan seks pranikah merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Temuan menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan narkoba tiga sampai empat kali lebih mungkin untuk merokok (Sani & Sartika, 2021)

Efek umum dari perilaku berisiko di atas tercermin dalam kinerja akademik yang lebih rendah, gangguan kedamaian keluarga, perkelahian, kehamilan yang tidak diinginkan dan perilaku kekerasan, dan peningkatan kecelakaan lalu lintas. Demikian pula masalah kesehatan yang muncul berupa epidemi HIV/AIDS, peningkatan gizi buruk, penyakit paru-paru, gangguan fungsi hati, hepatitis B, dll telah menarik perhatian banyak pihak untuk mengendalikan masalah tersebut. (Sani & Sartika, 2021)

## 2. Perilaku Kesehatan Masyarakat Urban Dan Masyarakat Rural

### a. Definisi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural

Pengertian urbanisasi menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia dalam (Fitri, 2013) adalah, suatu proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Selain itu dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengkotaan suatu wilayah. Proses pengkotaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian. Pengertian pertama, adalah merupakan suatu perubahan secara esensia unsur fisik dan sosial-ekonomi-budaya wilayah karena percepatan kemajuan ekonomi.

Masyarakat, sebagaimana dikatakan Bertrand (1980: 27) dalam (Hidayat, 2013), adalah sekelompok orang yang sama identifikasinya, teratur sedemikian rupa dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi hidup bersama secara harmonis. Sementara Fally dan Asih Mananti (1994) dalam (Hidayat, 2013), mengatakan masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah teritorial tertentu. Para anggotanya memiliki rasa persatuan dan pengalaman hidup bersama yang cukup lama dan pelebagaan atas dasar norma dan nilai-nilai yang dipedomani anggota-anggotanya sehingga menganggap mereka memiliki identitas sendiri yang berbeda dari masyarakat lainnya. Masyarakat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

#### 1) Masyarakat rural

Masyarakat kecil atau yang sering juga disebut rural community yang diartikan sebagai masyarakat yang anggota-anggotanya hidup bersama didalam lokalitas tertentu, yang seorang merasa dirinya bagian dari kelompok, kehidupan mereka meliputi urusan-urusan yang merupakan tanggungjawabbersama dan masing-masing merasa

terikat pada norma-norma tertentu yang mereka taati bersama (Hidayat, 2013).

2) Masyarakat Urban

Sebelum membahas jauh tentang masyarakat urban penting juga idketahui mengenai apaitu urban atau kota Kota menurut hirarkhi besarnya menurut NUDS (*National Urban Development Strategy*),(1985) dalam (Sumardjito, 2018). dapat diamati melalui jumlah penduduk yang tinggal dan beraktivitas dikawasan tersebut, yang menurut sumber tersebut bisa dibagi dalam 5 tingkatan:

- 1) Kota Metropolitan, penduduk > 1.000.000
- 2) Kota Besar, penduduk 500.000 – 1.000.000
- 3) Kota Menengah, penduduk 100.000 – 500.000
- 4) Kota Kecil A, penduduk 50.000 – 100.000
- 5) Kota Kecil B, penduduk 20.000 – 50.000

Masyarakat perkotaan (*urban community*) adalah masyarakat yang dalam kehidupan beragamnya lebih bersifat rasional, dan kehidupan mereka lebih berpusat pada bidang ekonomi, perdagangan, dan sebagainya, dan cenderung ke arah keduniaan (*secular trend*). Orang kota cenderung lebih mandiri dan individual sementara warga desa lebih mementingkan kelompok atau keluarga. Pembagian kerja pada masyarakat kota lebih tegas dan lebih bersifat profesional atau spesialis. Demikian pula dengan kemungkinan memperoleh pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan di desa. Oleh karena masyarakat perkotaan lebih bersifat rasional, maka interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi, dan sangat menghagai pentingnya waktu, serta terbuka dalam menerima pengaruh dari luar (Hidayat, 2013).

b. Perbedaan Karakteristik masyarakat Rural dan masyarakat Urban

- 1) Menurut Soerjono Soekanto,(2009) dalam (Nurdinah, 2017) masyarakat perkotaan sering

disebut juga urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota, antara lain:

- 2) Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Kegiatan-kegiatan keagamaan hanya setempat di tempat-tempat peribadatan, seperti di mesjid, gereja. Sedangkan di luar itu, kehidupan masyarakat berada dalam lingkungan ekonomi, perdagangan. Cara kehidupan demikian memiliki kecenderungan ke arah keduniawian, bila dibandingkan dengan kehidupan warga masyarakat desa yang cenderung ke arah keagamaan.
- 3) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang-orang lain. Yang terpenting di sini adalah manusia perorangan atau individu. Di kota-kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan, sebab perbedaan kepentingan, paham politik, perbedaan agama dan sebagainya.
- 4) Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batasbatas yang nyata. Misalnya seorang pegawai negeri lebih banyak bergaul dengan rekanrekannya daripada dengan tukang-tukang becak, tukang kelontong atau pedagang kaki lima lainnya.
- 5) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada warga desa. Pekerjaan para warga desa lebih bersifat seragam, terutama dalam bidang bertani. Oleh karena itu pada masyarakat desa tidak banyak

dijumpai pembagian pekerjaan berdasarkan keahlian. Lain halnya di kota, pembagian kerja sudah meluas, sudah ada macam-macam kegiatan industri, sehingga tidak hanya terbatas pada satu sektor industri. Singkatnya, di kota banyak jenis-jenis pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh warga-warga kota, mulai dari pekerjaan yang sederhana sampai pada pekerjaan yang bersifat teknologi.

- 6) Jalan pikiran rasional yang pada umumnya dianut masyarakat perkotaan, menyebabkan bahwa interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
- 7) Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota, mengakibatkan pentingnya faktor waktu bagi warga kota, sehingga pembagian waktu yang teliti dan tepat sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan-kebutuhan seorang individu.

Perubahan-perubahan sosial tampak dengan jelas dan nyata di kota-kota, sebab kota-kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh-pengaruh dari luar. Hal ini sering menimbulkan pertentangan antara golongan tua dengan golongan muda. Oleh karena itu, golongan muda yang belum sepenuhnya terwujud kepribadiannya, lebih sering mengikuti pola-pola baru dalam kehidupannya (Nurdinah, 2017).

Sedangkan menurut Max Weber dalam Sarlito (1992: 21) dalam (Sumardjito, 2018) ciri ciri kota yaitu terbagi dalam beberapa bagian:

- a) Ada batas-batas kota yang tegas
- b) Mempunyai pasar
- c) Ada pengadilan sendiri dan mempunyai undang-undang yang khusus berlaku bagi kota

itu, disamping undang-undang yang berlaku lebih umum.

- d) Terdapat berbagai bentuk perkumpulan dalam masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat di kota itu sendiri.
- e) Masyarakatnya mempunyai otonomi tertentu dengan adanya hak mereka untuk memilih walikota dan anggota-anggota dewan kota.

Dari ungkapan di atas bisa dibuat suatu batasan yang lebih khusus, bahwa suatu kota merupakan :

- a) Tempat pusat pemukiman dan kegiatan penduduk
  - b) Tempat dengan kepadatan penduduk tinggi
  - c) Mempunyai watak dan corak heterogen
  - d) Mempunyai ciri khas kehidupan kota.
  - e) Mempunyai batas wilayah administrasi
  - f) Mempunyai hak otonomi (Sumardjito, 2018).
- a. Karakteristik Masyarakat Rural

Adapun karakteristik masyarakat Rural menurut (Nurdinah, 2017) yang menjadi ciri-ciri masyarakat pedesaan antara lain sebagai berikut:

- 1) Di dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas-batas wilayahnya
- 2) Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (*gemeinschaft* atau *paguyuban*)
- 3) Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. Pekerjaan-pekerjaan yang bukan pertanian merupakan pekerjaan sambilan (*part time*) yang biasanya sebagai pengisi waktu luang.

- 4) Masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat-istiadat dan sebagainya.

Oleh karena anggota masyarakat mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti pada waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan desa, membuat saluran air dan sebagainya. Dalam hal-hal tersebut mereka akan selalu bekerja sama. Bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat sering diistilahkan dengan gotongroyong dan tolong-menolong (Nurdinah, 2017).

Beberapa ciri atau karakteristik masyarakat Rural yaitu sebagai berikut :

- 1) Sederhana  
Masyarakat pedesaan atau masyarakat rural selalu dikenal dalam kesederhanaannya, baik dalam berpakaian maupun dalam hal makanan, masyarakat rural cenderung memilih cara yang simple dalam mendeskripsikan kehidupan sehari-hari mereka.
- 2) Mudah curiga  
Masyarakat rural merupakan tipe individu yang selalu was-was dalam menanggapi segala hal, selalu protektif terhadap hal-hal yang baru, dan memastika apakah hal tersebut tidak membahayakan bagi keberlangsungan kehidupan mereka.
- 3) Menjunjung tinggi nilai kesopanan  
Jika diberikan perbandingan masyarakat yang tinggi di area pedesaan akan cenderung lebih sopan dibandingkan dengan yang tinggal didaerah perkotaan, karena mereka sangat minim tersentuh oleh budaya asing.
- 4) Kekeluargaan

Masyarakat pedesaan akan selalu menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan persaudaraan, karena tingkat kepekaan dan jiwa sosial masyarakat pedesaan lebih besar dibandingkan yang tinggal di area perkotaan.

- 5) Lugas  
Masyarakat yang tinggal di pedesaan secara sikap akan lebih lugas dibandingkan yang menetap di perkotaan, masyarakat yang tinggal di pedesaan akan cenderung berkata jujur dan spontan tanpa menutupi apapun meskipun hal itu akan menyakiti lawan bicaranya.
- 6) Tertutup dalam hal keuangan  
Masyarakat rural akan cenderung tertutup dalam hal keuangan, karena menurut mereka hal itu merupakan sebuah privasi yang hanya boleh diketahui anggota keluarga dan orang luar tidak boleh mengetahuinya.
- 7) Menghargai  
Masyarakat rural merupakan masyarakat yang sangat menghargai dan memperhitungkan setiap nilai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain dan akan selalu berusaha membalas lebih dari apa yang dilakukan orang tersebut.
- 8) Menepati janji  
Masyarakat rural merupakan individu yang menjunjung tinggi harga diri dan kepercayaan orang lain, oleh karena itu masyarakat rural sangat jarang untuk tidak menepati janji
- 9) Gotong royong  
Salah-satu khas masyarakat pedesaan diseluruh Indonesia adalah gotong royong, mereka akan selalu bahu-membahu dan saling membantu untuk menyelesaikan suatu tujuan baik itu kepentingan individualis maupun kelompok.
- 10) Demokratis

Sejauh ini, dalam hal pengambilan keputusan dalam sebuah permasalahan atau dalam sebuah kebijakan selalu melakukan system musyawarah dalam mencari kata mufakat.

11) Religius

Dalam masyarakat rural dikenal dengan ketaatan mereka menjalankan ibadah dalam keseharian mereka mulai dari anak-anak sampai lansia.

1. Problema masyarakat Rural dan Urban

a. Masalah masyarakat Rural/pedesaan

Menurut (Nurdinah, 2017) Setidaknya ada beberapa masalah yang umumnya dihadapi masyarakat desa. Masalah-masalah tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Ekonomi Masalah ekonomi adalah masalah umum yang dihadapi masyarakat desa. Aktivitas perekonomian yang rata-rata di sektor pertanian yang belum pasti keberhasilan panen membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti.
- 2) Kebudayaan Adapun permasalahan kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai kultural. Banyak budaya yang masuk ke dalam desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas desa tersebut perlahan hilang.
- 3) Sosial Masalah sosial yang umumnya terjadi pada masyarakat tradisional atau pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang berkembang. Selain itu filterisasi kebudayaan

kota yang tidak maksimal membuat masyarakat pedesaan cenderung konsumtif.

- 4) SDM (Sumber Daya Manusia) Masalah sumber daya manusia di wilayah pedesaan tidak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di pedesaan yang belum maksimal dan memadai membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah.
- b. Masalah masyarakat Urban/Perkotaan
- Menurut (Sumardjito, 2018) ada beberapa masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat perkotaan yaitu :
- 1) Adanya keinginan untuk membatasi hubungan/ pergaulan, khususnya terhadap orang atau kelompok diluar lingkungan atau kelasnya.
  - 2) Adanya konflik kepentingan masing-masing kelompok atau individu akibat dari pemaksaan kehendak dan salah satu kelompok atau individu terhadap kelompok atau individu lain, yang sebenarnya berakar dari pemikiran egosentris masing-masing kelompok atau individu tersebut tanpa mempertimbangkan kepentingan kelompok atau individu lainnya.
  - 3) berpenduduk padat dan permanen terdiri dari individu-individu yang secara sosial heterogen
  - 4) kemunduran lingkungan kota yang juga dikenal dengan istilah "*Urban Environment Degradation*" Bintarto (1989: 36) dalam (Sumardjito, 2018) pada saat ini sudah meluas di berbagai kota di dunia, sedangkan di beberapa kota di Indonesia sudah nampak adanya gejala yang membahayakan.

Kemunduran atau kerusakan lingkungan kota tersebut dapat dilihat dari dua aspek:

- a) Dari aspek fisis, (*environmental degradation of physical nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan dari unsur-unsur alam, misalnya pencemaran air, udara dan seterusnya.
  - b) Dari aspek sosial-masyarakat (*environmental degradation of societal nature*), yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusianya sendiri yang menimbulkan kehidupan yang tidak tenang, tidak nyaman dan tidak tenteram.
2. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Masyarakat Urban dan Tradisional

Dari kemudahan untuk mendapatkan alat telekomunikasi canggih seperti smartphone dan akses internet, setidaknya menimbulkan beberapa perubahan sosial dan budaya di kalangan masyarakat urban dan tradisional, yaitu perubahan perilaku remaja, remaja sekarang lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah, perubahan pola interaksi masyarakat, bahkan ini juga terjadi pada pola interaksi di dalam keluarga, antara orang tua dan anak, terkikisnya budaya lokal, serta meningkatnya gaya hidup konsumeristik dan individualistik. Berikut akan dijabarkan secara rinci (Nurdinah, 2017).

a. Perubahan Perilaku Remaja

Contohnya kota Aceh yang terkenal dengan banyaknya warung kopi yang dijadikan sebagai tempat tongkrongan masyarakat. Tidak hanya anak muda, orang dewasa pun menjadikan warung kopi ini sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan dan berkumpul bersama temanteman. Akan tetapi, untuk ukuran pedesaan, pengguna internet desa memang masih didominasi oleh anak-anak usiasekolah yakni SMP dan SMU serta setingkat universitas.

Mereka yang mahir dan terbiasa dengan penggunaan perangkat teknologi komunikasi informasi yang sudah canggih. Mereka adalah pengguna terbesar internet yang saat ini sudah masuk ke pelosok di pedesaan. Warung kopi ini lazimnya dijadikan sebagai tempat untuk bisa mengakses internet sepuasnya. Setiap warung kopi memiliki akses internet. Fasilitas ini membuat setiap warung kopi tidak pernah sepi dari pengunjung, dari yang muda sampai yang tua. Bahkan hanya bermodalkan 6000 rupiah untuk teh dingin, pelanggan bisa duduk berjam-jam untuk mengakses internet.

Kemudahan ini yang membuat warung kopi seolah-olah menjadi tempat favorit masyarakat. Akses internet pun bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk dijangkau. Yang menjadi persoalan adalah ketika kemudahan ini disalahgunakan oleh penggunanya. Misalkan, para anak muda yang masih berstatuskan pelajar, nongkrong di warung kopi hingga larut malam, akses internet dipergunakan untuk membuka situs-situs yang tidak bermanfaat dan dilarang. Rata-rata menghabiskan waktu berjam-jam di warung kopi dan mengabaikan kegiatan lainnya.

b. *Terkikisnya Budaya Lokal*

Sekarang ini budaya lokal mulai tergantikan oleh pola hidup/gaya hidup asing, tumbuhnya sikap tidak mencintai kebudayaan tradisional karena lebih tertarik oleh 'kemegahan' yang ditawarkan oleh budaya luar yang sebenarnya tidak sepenuhnya cocok dengan kehidupan dan gaya hidup masyarakat muslim. Seperti mengonsumsi obat-obatan terlarang, untuk ukuran Aceh dimana kehidupan masyarakatnya indentik dengan nilai-nilai keislaman, kasus-kasus narkoba terus meningkat, baik di kota maupun di desa. Gaya berbusana, gaya berbicara, dan tingkah laku yang

sudah tidak lagi mempedulikan identitas masyarakat Aceh dan nilai-nilai keislaman. Belum lagi gaya hidup yang serba “mandiri” (Nurdinah, 2017).

Masyarakat desa terkenal dengan nilai persaudaraan dan kekeluargaannya yang kuat. Tapi bahkan sekarang loyalitas dan rasa kepedulian masyarakat terhadap tokoh masyarakat mulai berkurang. Misalkan seseorang yang ingin mengajukan gugatan cerai tidak lagi menghadirkan keuchik atau teungku imum. Padahal dulunya, jika ada masalah warga setempat akan mencoba meminta nasehat atau solusi pada perangkat gampong. Tapi, sekarang ini hal tersebut sudah menjadi pemandangan yang jarang terlihat. Ini merupakan gambaran kondisi di wilayah Simpang Keuramat yang mana bisa dikatakan secara umum terpengaruh oleh arus globalisasi.

c. Perubahan Pola Interaksi

Di dalam Masyarakat Pola interaksi masyarakat semakin berkurang dari biasanya, sampai berada pada titik tidak mempedulikan satu sama lain. Ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat secara umum, misalnya antara tetangga dengan tetangga, tetapi juga antara keluarga, orang tua dan anak. Berkurangnya pola komunikasi ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, misalnya baik orang tua dan anak terlalu tenggelam dalam kesibukan dan kesehariannya masing-masing sehingga tidak memiliki waktu untuk sekedar berbincang-bincang dengan keluarga (Nurdinah, 2017).

Terlalu terlena dengan ‘dunia’ yang ada dalam genggamannya dalam bentuk gadget atau smartphone, jika sudah seperti ini, orang tua dan anak hanya akan terpaku pada smartphone-nya masing-masing tidak menghiraukan satu sama lain

meskipun berada pada ruangan yang sama. Padahal sangat penting untuk dapat membangun komunikasi antara orang tua anak (Nurdinah, 2017).

Sebenarnya sederhana saja untuk bisa menjalin ikatan yang kuat antara orang tua dan anak, cukup dengan menyediakan waktu untuk berbicara dan berbincang satu sama lain. Ini bisa dilakukan misalkan di meja makan. Setelah makan bersama, ada baiknya untuk meluangkan waktu untuk sekedar berbagi tentang hari yang telah dijalani.

Untuk di kota, komunikasi keluarga di meja makan lebih terjalin dengan intens, karena di kota terbiasa dengan budaya makan bersama, satu keluarga duduk bersama di meja makan. Sedangkan di desa, mereka tidak menjadikannya sebuah kebiasaan, dalam artian, tidak benar-benar harus untuk makan bersama. Walaupun makan di waktu yang sama tetapi tidak pada tempat yang sama. Misalkan si anak makan sambil menonton televisi, orang tua duduk di meja makan atau tempat lainnya. Mereka tidak melihat dari aspek pentingnya sebuah keluarga untuk berkumpul di waktu yang sama dan di tempat yang sama (Nurdinah, 2017).

d. Menguatnya Gaya Hidup Individualistis

Hal ini selain menimbulkan dampak buruk dalam berinteraksi interpersonal secara langsung juga merusak psikologis seseorang tersebut, lama kelamaan seseorang akan sulit menjalin komunikasi dan membangun relasi dengan orang-orang disekitarnya. Bila hal tersebut tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yang dimana manusia lama kelamaan akan sangat individualis dan tidak akan ada lagi interaksi ataupun sosialisasi yang dilakukan di dunia nyata. Hanya mementingkan ke-aku-annya

dan mengabaikan yang di luar dirinya (Nurdinah, 2017).

e. Menjamurnya Sifat Konsumtif dalam Masyarakat

Hal lain yang sekarang ini sedang menyerang berbagai kalangan adalah, ketimpangan pemahaman antara kebutuhan dan keinginan terhadap teknologi komunikasi. Banyak masyarakat yang dengan tingkat ekonomi rendah tapi memaksakan untuk membeli gadget yang harganya tidak sesuai dengan kantong masyarakat kalangan menengah ke bawah, hanya karena gengsi dan keinginan yang disalahartikan sebagai kebutuhan. Di Aceh, jika diperhatikan, kepemilikan atas smartphone sudah sangat merata. Dari yang kecil sampai yang tua, seolah smartphone menjadi barang wajib untuk dimiliki. Jika hp yang dimiliki tidak canggih, maka itu dianggap tidak layak pakai.

Kalau diperhatikan lebih dalam, arus globalisasi dan modernisasi ini lebih banyak memberikan efek negatif pada masyarakat desa. Bisa dilihat dari kearifan lokal yang mulai ditinggalkan, nilai-nilai luhur yang mejadi identitas pedesaan seperti persaudaraan, kekeluargaan, gotong-royong mulai luntur karena perlahan-lahan tergantikan oleh gaya hidup individualistis. Kesederhanaan pola hidup masyarakat yang mulai tergantikan oleh sifat konsumtif. Ini dikarenakan masalah yang umumnya terjadi pada masyarakat pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat tersebut.

Selain itu, filterisasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat desa cenderung konsumtif. Belum lagi masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan yaitu mulai lunturnya nilai-nilai kearifan lokal. Banyak budaya luar yang masuk ke dalam

desa tanpa adanya filterisasi sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas sebuah desa perlahan hilang. Ini lah mengapa sangat penting untuk memperkuat pola pertahanan masyarakat, baik urban maupun tradisional, dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial yang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Resistensi masyarakat dalam menghadapi salah satu bentuk arus globalisasi ini sangat diperlukan agar perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya, tidak cenderung ke arah yang negative (Nurdinah, 2017).

Seperti yang sudah dijabarkan pada poin sebelumnya, arus globalisasi dan modernisasi yang tampaknya lebih digandrungi masyarakat, seperti masuknya budaya luar dan akses media komunikasi dan informasi ini menimbulkan beberapa perubahan dari segi sosial dan budaya yang lebih mengarah kepada dampak yang sifatnya negative (Nurdinah, 2017).

3. Perwujudan Perilaku Individualis Masyarakat Kota/urban

Perilaku Individualis pada masyarakat kota secara umum bisa dibedakan dalam 2 aspek, yaitu perwujudan dalam ungkapan fisik (spasial, material dan bentuk), serta perwujudan dalam sikap dan perilakunya. Kedua aspek tersebut bersama-sama mengupayakan suatu “pertahanan” atau “perlawanan” terhadap kondisi kehidupan kota.

4. Perwujudan Perilaku Individualis masyarakat urban/kota Dalam Ungkapan Fisik

Perilaku individualis masyarakat kota cenderung akan tercermin atau diungkapkan dalam

suatu ungkapan fisik yang berupa batas ruang (*territory*) atau ungkapan bentuk. Ungkapan fisik yang berupa batas ruang (*territory*) bisa bersifat tetap atau suatu kondisi yang relatif tidak berubah-ubah, namun bisa juga bersifat tidak tetap. Ini sejalan dengan pendapat Lang (1987: 76) dalam (Sumardjito, 2018), bahwa teritorialitas adalah salah satu perwujudan ego yang tidak ingin diganggu, dan merupakan perwujudan dan privasi. Yang perlu diperhatikan adalah, apabila keinginan perwujudan privasi ini sangat berlebihan, hal ini merupakan indikasi dari sikap dan perilaku individualis.

Beberapa contoh ungkapan fisik sebagai perwujudan perilaku individualis pada masyarakat kota menurut (Sumardjito, 2018) yaitu:

- a. Pemasangan pagar halaman depan yang dibuat sangat tinggi dan masif, mencerminkan ketertutupan, kecurigaan, kehati-hatian dan kurangnya “*welcome*” terhadap tamu yang akan berkunjung.
  - b. Perwujudan bentuk-bentuk bangunan yang tidak selaras dengan lingkungan, hanya karena untuk memenuhi ego pemilik supaya tidak disamakan atau tidak ingin sama dengan lingkungannya, dalam arti supaya dianggap lebih tinggi derajatnya dari lingkungan tersebut.
  - c. Tulisan-tulisan atau tanda-tanda petunjuk yang mempunyai indikasi untuk menunjukkan bahwa sesuatu area adalah milik pribadi, bukan untuk masyarakat umum sehingga masyarakat umum tidak boleh masuk area tersebut, atau setidaknya enggan untuk memasuki mengingat risiko yang mungkin timbul (Sumardjito, 2018).
5. Perwujudan Perilaku Individualis masyarakat kota/urban Dalam Sikap dan Perilaku
- Perilaku individualis selain diwujudkan dalam ungkapan fisik, juga banyak didapati pada sikap dan

perilaku masyarakat kota. Hal ini bisa dilihat dari beberapa contoh:

- a. Kurang akrabnya antartetangga pada suatu kompleks perumahan atau perkampungan, karena masing-masing orang telah sibuk dengan urusannya sendiri.
  - b. Masing-masing tetangga merasa tidak perlu menyapa apabila bertemu di jalan, karena merasa tetangga tersebut adalah orang asing bagi orang tersebut. Kemungkinan lain dan kondisi tersebut adalah tidak terpikirkannya orang tersebut untuk menyapa, karena pikirannya memang sudah dipenuhi dengan berbagai kesibukan kerja hari itu.
  - c. Kurangnya tenggang rasa dalam bersikap dan berbuat (Sumardjito, 2018).
6. Dampak masyarakat urban/perkotaan

Di Indonesia, persoalan urbanisasi sudah dimulai dengan digulirkannya beberapa kebijakan pada orde baru Pertama, adanya kebijakan ekonomi makro (1967-1980), di mana kota sebagai pusat ekonomi. Kedua, kombinasi antara kebijaksanaan substitusi impor dan investasi asing di sektor perpabrikasi (manufacturing), yang justru memicu polarisasi pembangunan terpusat pada metropolitan Jakarta. Ketiga, penyebaran yang cepat dari proses mekanisasi sektor pertanian pada awal dasawarsa 1980-an, yang menyebabkan kaum muda dan para sarjana, enggan menggeluti dunia pertanian atau kembali ke daerah asal (Fitri, 2013).

Arus urbanisasi yang tidak terkendali ini dianggap merusak strategi rencana pembangunan kota dan menghisap fasilitas perkotaan di luar kemampuan pengendalian pemerintah kota. Beberapa akibat negatif tersebut akan meningkat pada masalah kriminalitas yang bertambah dan turunnya tingkat kesejahteraan. Dampak negatif lainnya yang muncul adalah terjadinya<sup>3</sup> over urbanisasi pada penduduk kota yang sangat besar

yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi Negara (Fitri, 2013).

Pada saat kota mendominasi fungsi sosial, ekonomi, pendidikan dan hirarki urban. Hal ini menimbulkan terjadinya pengangguran dan under employment. Kota dipandang sebagai inefisien dan artificial yang terjadi karena urbanisasi merupakan variable dependen terhadap pertumbuhan ekonomi (Fitri, 2013).

Persoalan-persoalan urbanisasi telah menjadi perhatian yang cukup besar, beberapa pemikiran yang membahas dampak urbanisasi dari sudut pandangan ekonomi yaitu Evers dalam Abbas (2002) berpendapat bahwa tingkat urbanisasi yang terlalu rendah dan mengabaikan kebutuhan-kebutuhan kota dapat memperlambat kemajuan ekonomi. Sedangkan menurut Keban, proses urbanisasi yang tidak terkendali dan adanya hirarki kota akan menimbulkan berbagai akibat negatif yaitu munculnya gejala kemiskinan di perkotaan, ketimpangan income perkapita, pengangguran, kriminalitas, polusi udara dan suara, pertumbuhan daerah kumuh, dan sebagainya.

Gmelch dan Zenner (1980) dalam (Fitri, 2013) membahas mengenai dampak sosial yang ditimbulkan oleh urbanisasi dengan menggunakan pendekatan tiga teori urbanisasi yaitu :

- a. *Determinist Theory* atau dikenal juga dengan theory of urban anomie.

Wirth (1938) sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam teori ini memulai analisisnya dengan sebagai gai sebuah wilayah yang relatif besar, padat, dan tempat tinggal permanen dari individu yang secara sosial sangat beragam. Wirth menganalisis bagaimana urbanisasi menghasilkan disorganisasi sosial dan gangguan kepribadian.

Argumen yang digunakan Wirth berdasarkan argument psikologi dan struktur

sosial. Argumen psikologi Writh didasarkan pada pemikiran George Simmel *The Metropolis and Mental Life*. Simmel memusatkan perhatiannya pada cara hidup di kota yang mengubah cara berfikir dan kepribadian individu. Bagaimana stimulasi yang cepat dan terputus dirubah oleh stimulasi yang datang dari dalam dan luar individu. Stimulasi yang paling berpengaruh menurut Simmel antara lain adalah pemandangan, suara, bau, tindakan orang lain, sehingga individu merespon untuk melindungi diri dan beradaptasi dengan fikiran dan hati. Dengan adanya stimulasi dan cara individu merespon tersebut menjadikan individu lebih intelek, rasional, dan berjarak secara emosional dengan orang lain. Suara klakson, telepon, pantulan cahaya, pandangan dan perilaku orang asing, berita surat kabar mempengaruhi perilaku individu dengan reaksi yang berbeda-beda.

Hal ini sangat memungkinkan bagi individu untuk mengalami gangguan kepribadian. Analisa struktur sosial dalam teori ini tidak jauh berbeda dengan argumen psikologi, tetapi dalam proses yang berbeda. Dalam kompetisi ekonomi, spesialisasi pekerjaan, meraih keunggulan, dan kemajemukan kota menghasilkan keberagaman aktivitas kehidupan sosial, seperti di dunia pekerjaan, kehidupan bertetangga, rumah tangga, dan sebagainya. Sehingga waktu dan perhatian inidividu terpecah dan terputus pada tempat dan orang yang berbeda. Sebagai contoh, seorang pengusaha; sarapan pagi dengan keluarga, rapat dengan rekan kerja di kantor, makan siang dengan kolega, rapat dengan klien, bermain golf dengan teman-teman, dan akhirnya makan malam dengan

tetangga. Keberagaman aktivitas ini membuat individu terisolasi dari kehidupan sosialnya dan inilah yang memberi peluang terjadinya anomie karena hilangnya ikatan-ikatan sosial yang berisi nilai-nilai

b. *Compositional theory*

Tidak seperti *Determinist Theory*, teori ini menganggap bahwa urbanisasi tidak berdampak secara langsung terhadap individu atau masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa keberagaman kehidupan sosial tidak serta merta mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat sebab setiap individu atau masyarakat memiliki atribut-atribut yang dapat membantu mereka menangani permasalahan urbanisasi

Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh tingginya arus urbanisasi di Indonesia adalah sebagai berikut (Fitri, 2013) :

- a. Semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan. Pertambahan penduduk kota yang begitu pesat, sudah sulit diikuti kemampuan daya dukung kotanya. Saat ini, lahan kosong di daerah perkotaan sangat jarang ditemui. ruang untuk tempat tinggal, ruang untuk kelancaran lalu lintas kendaraan, dan tempat parkir sudah sangat minim. Bahkan, lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pun sudah tidak ada lagi. Lahan kosong yang terdapat di daerah perkotaan telah banyak dimanfaatkan oleh para urban sebagai lahan pemukiman, perdagangan, dan perindustrian yang legal maupun ilegal. Bangunan-bangunan yang didirikan untuk perdagangan maupun perindustrian umumnya dimiliki oleh warga pendatang. Selain itu, para urban yang tidak memiliki tempat tinggal

- biasanya menggunakan lahan kosong sebagai pemukiman liar mereka. hal ini menyebabkan semakin minimnya lahan kosong di daerah perkotaan
- b. Menambah polusi di daerah perkotaan. Masyarakat yang melakukan urbanisasi baik dengan tujuan mencari pekerjaan maupun untuk memperoleh pendidikan, umumnya memiliki kendaraan. Pertambahan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang membanjiri kota yang terus menerus, menimbulkan berbagai polusi atau pencemaran seperti polusi udara dan kebisingan atau polusi suara bagi telinga manusia. Ekologi di daerah kota tidak lagi terdapat keseimbangan yang dapat menjaga keharmonisan lingkungan perkotaan
  - c. Sebagian besar kota di Indonesia mengalami persoalan polusi sebagai akibat dari proses urbanisasi, baik oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan maupun oleh industri-industri yang tumbuh. 3. Penyebab bencana alam. Para urban yang tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal biasanya menggunakan lahan kosong di pusat kota maupun di daerah pinggiran Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendirikan bangunan liar baik untuk pemukiman maupun lahan berdagang mereka
  - d. Pencemaran yang bersifat sosial dan ekonomi. Kepergian penduduk desa ke kota untuk mengadu nasib tidaklah menjadi masalah apabila masyarakat mempunyai keterampilan tertentu yang dibutuhkan di kota
  - e. Penyebab kemacetan lalu lintas. Padatnya penduduk di kota menyebabkan kemacetan dimana-mana, ditambah lagi arus urbanisasi yang makin bertambah.

- f. Merusak tata kota. Pada negara berkembang, kota-kotanya tdiak siap dalam menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh populasinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, C. P., & Paujjah, E. (2021). *Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Socialization of the Covid-19 Vaccination Through Print Media to Improve Public Understanding About the Importance of the Covid-19 Vaccination*. 32(November).
- Aerts, C. (2020). Understanding the role of disease knowledge and risk perception in shaping preventive behavior for selected vector-borne diseases in Guyana. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, 4.
- Bella, S., Pagesa, F., Harisa, A., Nurdin, N., & Syafar, M. (2022). *HEALTH LITERACY LEVEL OF NURSING STUDENTS IN THE ISLAMIC COLLEGES OF*. 6(2), 62–69.
- Berkman, N. D., Davis, T. C., & McCormack, L. (2010). health literacy: what is it? *Journal of Health Communication*, 15(SUPPL. 2), 9–19. <https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499985>
- Bodur, A. S., Filiz, E., & Kalkan, I. (2017). factors affecting health literacy in adults: a community based study in konya, turkey. *International Journal of Caring Sciences*, 10(1), 100–109.
- Budhathoki, S. S., Pokharel, P. K., Jha, N., Moselen, E., Dixon, R., Bhattachan, M., & Osborne, R. H. (2019). Health literacy of future healthcare professionals: A cross-sectional study among health sciences students in Nepal. *International Health*, 11(1). <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihy090>
- Cuthino, F. L., Sheilini, M., & Chandrababu, R. (2021). The comparison of health literacy between health science and non-health science members-A cross sectional study of multifaceted public health affair. *Clinical Epidemiology and*

*Global Health*, 12(October), 100893.  
<https://doi.org/10.1016/j.cegh.2021.100893>

- Deskriptif, S., Primasari, E. P., Furwasyih, D., & Riyantori, R. (2021). *TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KLASIFIKASI ISTILAH KASUS PASIEN COVID-19*. 4(1), 57–65.
- Dinas Kesehatan, P. (2020). No Title. *Etika Batuk Dan Bersin Yang Benar Putus Rantai Penularan Covid19*.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). *Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*. 7(1).
- Fikro, F. M. I. (2021). *Hubungan Tingkat Helath Literacy, Pengetahuan dan Sikap dengan Praktik Pencegahan Covid-19*. 19, 2021.
- Fitriani, A., Yustilawati, E., , E. H., & Nurul Fadhillah Gani. (2022). *Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar*. *Jurnal Media Keperawatan: Politeknik Kesehatan Makassar*, 13(2), 62–69.
- Fitriani, Y., Andriani, W. O. A. S., Sopamena, Y., Sirinti, Y., & Anshari, D. (2020). *Adaptasi Alat Ukur Literasi Kesehatan Pada Mahasiswa Angkatan Pertama Universitas Andalas Padang Tahun 2019*. *Jukema (Jurnal Kesehatan Masyarakat Aceh)*, 6(1), 60–65.  
<https://doi.org/10.37598/jukema.v6i1.802>
- Gupta, R., Kim, C. J., Griessenauer, C. J., Ogilvy, C. S., & Thomas, A. J. (2017). *overview and history of health literacy in the United States and the epidemiology of low health literacy in belathcare*. New York: Nova Science Publishe, Inc.
- Guyton dan Hall (2014) *Buku Ajar Fisiologis Kedokteran*. Edisi 12. Diedit oleh E. & Ibrahim. Singapura: Elsevier.
- Gorbalenya, A., SC, B., RS, B., RJ, De G., C, D., & Gulyaeva AA, et a. (2020). *The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2*. *Nat Microbiol*.

<https://doi.org/10.1038/s41564-020-0695-z>

- Hasan, H., Raingar, V., Osaili, T., Neinavaei, N. E., Olaimat, A. N., & Aolymat, I. (2021). A cross-sectional study on university students' knowledge, attitudes, and practices toward COVID-19 in the United Arab Emirates. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, *104*(1), 75–84. <https://doi.org/10.4269/AJTMH.20-0857>
- Heijmans, M., Waverijn, G., Rademakers, J., van der Vaart, R., & Rijken, M. (2015). Functional, communicative and critical health literacy of chronic disease patients and their importance for self-management. *Patient Education and Counseling*, *98*(1), 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.10.006>
- Horgan, D., Bolanos, N., Mastris, K., Mendao, L., & Malats, N. (2017). health literacy: read all about It ... *Biomedicine Hub*, *2*(Suppl. 1), 1–4. <https://doi.org/10.1159/000481129>
- Jiwanto, Y. A. (2017). *Riset keperawatan analisa data statistik menggunakan SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- John W Creswell. (2009). *Research Design Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches* (Third; Sage, ed.).
- Kemenkes. (2020). *Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun*. 34.
- Kemenkes. (2020). Prevalensi Covid-19 di Indonesia. *Promkes Kemenkes*.
- K, K. (2011). *Metodologi Penelitian Keperawatan (Pedoman Melaksanakan dan Menerapkan Hasil Penelitian)*. Jakarta: CV Trans Info Media.
- Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). *Buku Saku Vaksinasi* (Kominfo, ed.). Jakarta Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Latif, & Iriana. (2020). *Literasi Kesehatan*. *1*(2), 1–19

- Lestari, P., & Handiyani, H. (2017). The Higher Level of Health Literacy Among Health Students Compared with Non-Health Students. *UI Proc. HealthMed*, 1, 1–5
- McCleary-Jones, V. (2016). A systematic review of the literature on health literacy in nursing education. *Nurse Educator*, 41(2), 93–97. <https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000204>
- Mullan, J., Burns, P., Weston, K., McLennan, P., Rich, W., Crowther, S., ... Osborne, R. (2017). Health literacy amongst Health Professional University Students: A Study Using the Health Literacy questionnaire. *Education Sciences*, 7(2), 54. <https://doi.org/10.3390/educsci7020054>
- NAAL. (2003). *The Health Literacy Of America's Adults*.
- Nakoe, M. R., S, N. A., & Mohamad, Y. A. (2020). *Perbedaan Efektivitas Hand-Sanitizer Dengan Cuci Tangan Menggunakan Sabun Sebagai Bentuk Pencegahan Covid-19*. 2.
- Nazliansyah, N., Wichaikull, S., & Wetasin, K. (2016). FACTORS AFFECTING HAND WASHING PRACTICE AMONG ELEMENTARY SCHOOLS STUDENTS IN INDONESIA. *Belitung Nursing Journal*, 2.
- Nazmi, Galio Rudolfo, Ridha Restila, E. (2015). *faktor yang mempengaruhi literasi dipelayanan kesehatan*. (faktor yang mempengaruhi literasi dipelayanan kesehatan), 303–310.
- Ningsih, S. S. R., Noprianty, R., & Somantri, I. (2017). Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Kebersihan Tangan Oleh Petugas Kesehatan Di Rumah Sakit Dustira Cimahi. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.17509/jpki.v3i1.7486>
- Notoatmodjo, S. (2018). *metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurjanah, Soenaryati, S., & Enny Rachmani. (2016). *Jurnal kesehatan masyarakat*. (2).

- Nurjanah, & Yustin, M. (2014). Literasi kesehatan sebagai indikator keberhasilan program pendidikan kesehatan pada mahasiswa. *Dian Nuswantoro Semarang*.
- Nursalam. (2015). *METODOLOGI PENELITIAN ILMU KEPERAWATAN Pendekatan Praktis*. 4, 412.
- Nursalam. (2017). *metode penelitian ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba medika.
- Nutbeam, D. (2015). defining, measuring and improving health literacy. *Health Evaluation and Promotion Health Evaluation and Promotion*, 42(4), 450–456. <https://doi.org/10.7143/jhep.42.450>
- Osborne, R., Buchbinder, R., Batterham, R., & Elsworth, G. (2014). *Health Literacy Questionnaire*.
- Patroni, R., Ningsih, L., Sumaryono, D., & Sumiati, S. (2020). *Pengaruh Media Video Etika Batuk dan Bersin*
- Purwanto, I., Imandiri, A., & Arifianti, L. (2018). No Title. *COMBINATION OF ACUPUNCTURE THERAPY AND TURMERICLIQUORICE HERBS FOR CHRONIC COUGHING CASE*, *Journal of*, 121–125. *terhadap Peningkatan Pengetahuan pada Anak Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Bengkulu*.
- Safrizal, P., D. I., Sofyan, S., & Bimo. (2020). *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah: Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen*.
- Salsa Bella Fitri PAGESA. (2021). *TINGKAT HEALTH LITERACY MAHASISWA KEPERAWATAN DI PERGURUAN TINGGI ISLAM KOTA MAKASSAR*. *Fakultas Keperawatan Unhas*, 197.
- Shahwan, M., Suliman, A., Jairoun, A. A., Alkhouljah, S., Al-Hemyari, S. S., Al-Tamimi, S. K., Godman, B., & Mothana, R. A. (2022). Prevalence, Knowledge and Potential Determinants of COVID-19 Vaccine



- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Cipto, R. (2020). *Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures*. 7(1), 45–67.
- Suyanto. (2011). *Metodologi dan Aplikasi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medica.
- Syah, M. F., Winarno, R. A. J., & Ahya, D. G. (2020). Literasi Kesehatan dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19. *Jurnal AKRAB*, XI(1), 70–76.
- Tekin, P. S. (2018). Health literacy : an overview of the medical secretarial training health literacy :an overview of the medical secretarial training in turkey. *International Journal of Research - Granthaalayah*, (September). <https://doi.org/10.5281/zensenaodo.1435228>
- Thompson, T. (2014). National Action Plan to Improve Health Literacy. *Encyclopedia of Health Communication*. <https://doi.org/10.4135/9781483346427.n360>
- Wahyuni, A., Semiarty, R., & Machmud, R. (2020). *ANALISIS PENINGKATAN Pencarian Informasi Kesehatan Online DAN e-HEALTH LITERACY MASYARAKAT DI KOTA PADANG ( STUDI KASUS : PANDEMI COVID-19 )*. 25–26
- Westra, B. L. (2014). *Integrative nursing and health literacy*. New York: Oxford university press.
- WHO. (2020). *WHO, Corona Virus*. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Yunita, R., Hakim, A. L., & Sari, A. (2021). *Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial , Literasi Kesehatan , dan Kebijakan Physical Distancing Terhadap Perilaku Pencegahan COVID-19*. 1(1), 1–8.


- Yustilawati, E., Gani, N. F., Fitriani, A., & Hadrayani, E. (2020). *The Behavior of Hands Washing , Use of PPE , and Social Distancing in Preventing of Covid-19 Among Students In Indonesia.*
- Zulpahiyana. (2013). *Efektivitas Simulasi Hand hygiene pada Handover Keperawatan dalam Meningkatkan Kepatuhan Hand hygiene Perawat.* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Eva Yustilawati** Putri ketiga Alm.H.M.Sufri dan Hj.Rahmatiah yang lahir pada tanggal 28 November 1988 di Bone. Menamatkan studi sarjana pada program studi keperawatan pada tahun 2010 dan melanjutkan Pendidikan profesi ners dan selesai pada tahun 2011 di Universitas Hasanuddin. Setelah menyelesaikan program profesi Ners mengabdikan sebagai perawat pelaksana di ruang Instalasi Gawat Darurat dan *Intensive Care Unit* di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin tahun 2011-2018. Melanjutkan studi pendidikan pada program Magister Keperawatan konsentrasi Manajemen keperawatan pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian menjadi dosen PNS UIN Alauddin Makassar pada tahun 2018 hingga saat ini. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi kegawatdaruratan Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia wilayah Sulawesi Selatan sebagai wakil kordinator Humas dan Publikasi. Saat ini masih menjabat sebagai kepala Laboratorium keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar periode tahun 2020-2021.





**ISBN : 978-623-226-437-3**