

ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA HEPATOPANKREAS KEPITING RAJUNGAN (*Portunus pelagicus*)

by Ulfa Ulfa

Submission date: 06-Jan-2023 06:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 1989165834

File name: 268-490-1-SM.pdf (187.19K)

Word count: 1377

Character count: 8197

ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA HEPATOPANKREAS
KEPITING RAJUNGAN (*Portunus pelagicus*)

^{1*} Ulfa Triyani A Latif, ²Yul Fitriani, ³Fatmawati Nur

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri alauddin Makassar, Indonesia

E-mail^{*}: ulfatriyanial@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kandungan logam berat timbal (Pb) pada hepatopankreas Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*). Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pada 2 titik di perairan pulau Lae-lae, yaitu titik 1 di sebelah utara dan titik 2 di sebelah barat. Analisis sampel menggunakan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan logam berat Timbal (Pb) pada titik 1 yaitu 3.182 mg/kg dan titik 2 yaitu 4.781 mg/kg. Angka yang diperoleh menunjukkan bahwa kandungan Pb sudah melewati ambang batas sesuai yang telah ditetapkan (SNI 7380:2009) yaitu 0,5 mg/kg. Berdasarkan data yang diperoleh kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) hasil tangkapan perairan pulau Lae-lae sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

Kata kunci: Kepiting rajungan (*Portunus pelagicus*), Timbal (Pb), Hepatopankrea

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang sangat kaya akan keanekaragaman spesies. Salah satunya adalah Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sebagai salah satu destinasi wisata Pulau Lae-lae setiap hari dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di Pulau Lae-lae maka tingkat pencemaran perairannya semakin tinggi. Beberapa logam berat yang berbahaya antara lain merkuri (Hg), Timbal (Pb), tembaga (Cu), arsen (As) dan Kadmium (Cd). Logam berat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur, diantaranya melalui makanan yang dikonsumsi baik yang berasal dari tanaman dan hewan, polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kosmetik (Morganof., 2003).

Penelitian yang berjudul Analisis kandungan logam berat Timbal (Pb) dan Kadmium (Cd) pada kepiting

Ranjungan (*Portunus pelagicus*) di Perairan teluk Riau Kota Tanjung pinang Provinsi Kepulauan Riau. Kandungan logam Pb pada perairan pada kisaran 0,118-0,147 mg/l, dan kandungan logam Cd pada kisaran konsentrasi 0,103–0,146 mg/l. Kandungan Logam Pb pada daging kepiting Ranjungan pada kisaran 0,030–0,362 mg/g, dan kandungan logam Kadmium (Cd) pada daging kepiting Ranjungan pada kisaran nilai 0.0256-0.0405 mg/g. Secara keseluruhan, kandungan Logam Cd dan Pb pada perairan dan pada daging Kepiting Ranjungan melebihi batas kadar aman yang ditetapkan (Al' Amin, dkk., 2014). Adapun penelitian (Lestari., 2019), menunjukkan bahwa beberapa titik di perairan Pulau Lae-lae sudah tercemar Timbal (Pb) hingga 0.21 mg/L.

Biota perairan yang mempunyai peranan paling tinggi dalam penyerapan logam berat dalam perairan

adalah jenis kepiting seperti kepiting, kerang dan beberapa jenis udang. Kepiting hidup di air laut, air tawar dan darat dengan ukuran yang beraneka ragam. Kepiting merupakan biota perairan yang di habitatnya mempunyai ketahanan hidup yang baik. Kepiting sering dijadikan sebagai bioindikator perairan karena mampu mengakumulasi logam berat yang cukup tinggi dibandingkan dengan biota lainnya (Bambang *et al.*, 1995). Hal ini menjadi salah satu landasan peneliti mengambil penelitian tentang Analisis kandungan logam berat Timbal (Pb) pada hepatopankreas Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*).

METODE PENELITIAN

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tombak, kaca mata renang, lampu, kaki renang, perahu, cool box, botol sampel, penggaris, pisau, pinset, wadah sampel, kamera, pipet volume, bulb, labu erlemeyer 100 ml, gelas kimia 250 ml, labu ukur 100 ml, gelas ukur 100 ml, hot plate, sarung tangan, masker, baju laboratorium, Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS), dan timbangan analitik (Adventure ohaus). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*), es batu, aquabidest, larutan HNO₃, HCLO₄, larutan induk Cd dan Pb dan spidol.

Penentuan kandungan logam berat dalam biota dilakukan dengan menggunakan AAS (Automic Absorption Spectrofotometer), dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Kadar logam Timbal (Pb) pada sampel diperoleh dengan menggunakan rumus perhitungan berikut (Lestari., 2019):

$$C = \frac{c \times V}{A}$$

keterangan:

C : Kadar logam dalam sampel (mg/kg)

c :Konsentrasi larutan sampel (true value)

V : Volume penetapan/pengencer (ml)


A : Berat sampel basah (gram)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada Hepatopankreas Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*)

No	Kode Sampel	Kadar Pb (mg/kg)	Rata-rata
1	TITIK 1	3.182	3.982
2	TITIK 2	4.781	



Gambar 1. Kadar logam berat Timbal (Pb) pada hepatopankreas kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*)

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa kadar logam berat timbal pada Hepatopankreas kepiting rajungan pada titik satu yaitu 3.182 mg/kg dan: sebesar 4.781 mg/kg.

Hepatopankreas merupakan organ pencernaan pada kelas krustasea termasuk kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) yang memiliki fungsi penting, termasuk fungsi absorpsi yang ditandai dengan adanya sel mikrovili yang menunjukkan sebuah fungsi penyerapan, sekresi enzim (penyimpanan nutrisi, metabolisme, tempat sintesis vitellogenin selain ovarium, serta detoksifikasi. Hepatopankreas merupakan organ yang sangat sensitif terhadap perubahan fisiologis dan pengaruh lingkungan (Sousa *et al.*, 2005).

Hepatopankreas ini berperan mendeposit sejumlah glikogen serta mendeposit logam-logam berat dan melokalisasinya ke organ tubuh kepiting seperti daging dan organ lainnya, sehingga kandungan logam berat pada daging lebih kecil dibanding kandungan logam pada hepatopankreas karena pada organ hepatopankreas, logam berat sudah terakumulasi lebih awal sebelum didistribusikan keseluruh organ tubuh kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) termaksud organ daging.

Tingginya kadar logam berat timbal (Pb) pada organ Hepatopankreas sudah melebihi standar Standar Nasional Indonesia (SNI 7380:2009) batas maksimum kandungan logam berat timbal (Pb) pada kepiting yaitu 0,5 mg/kg. Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) sebagai salah satu biota air dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan. Jika di dalam tubuh kepiting telah terkandung kadar logam berat yang tinggi 51 dan melebihi batas normal yang telah ditentukan dapat

sebagai indikator terjadinya suatu pencemaran dalam lingkungan. Kondisi ini tentunya harus segera di bioremediasi agar tidak berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diperoleh di atas bahwa kandungan logam berat timbal (Pb) pada hepatopankreas Kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) pada titik 1 yaitu 3.182 mg/kg dan titik 2 yaitu 4.781 mg/kg. Angka yang diperoleh menunjukkan bahwa kandungan Pb sudah melewati ambang batas sesuai yang telah ditetapkan (SNI 7380:2009) yaitu 0,5 mg/kg. Sehingga kepiting Rajungan (*Portunus pelagicus*) hasil tangkapan diperaian pulau Lae-lae sangat berbahaya untuk dikonsumsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Ibu kurniati S.Si selaku laboran di laboratorium Mikrobiologi dan seluruh staf di laboratorium An Organik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Semoga menjadi amal jariyah dalam bidang pendidikan. Penulis juga mohon maaf atas segala kekurangan dalam penelitian ini, saran dan masukan untuk perbaikan penelitian ini sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al' Amin, dkk. Analysis Content of heavy metal lead (PB) and Cadmium (Cd) of Crab Rajungan (*Portunus pelagicus*) in Riau Bay Tanjung Pinang City Riau

- Archipelago Province. Jakarta: Water Resources management, 2014.
- Bambang Y, G. Charmantier, P. Thuet and J. P. Trilles. Effect of cadmium survival and osmoregulation of various development stages of the shrimp *Penaeus japonicus* (Crustacea: Decapoda). *Journal of Marine Biologi* 3. p. 443–500. 1995.
- Darmono. *Environment And Pollution, Relationship To Toxicology Of Metal Compounds*. Jakarta: Indonesia University Press, 2001.
- Lestari, A. Analisis Kadar Logam Berat Timbal (Pb), Merkuri (Hg) dan Besi (Fe) Pada Perairan Laut di Pulau Lae-Lae. UINAM. 2019
- Marganof. "Potensi Limbah Udang sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan Tembaga) di Perairan." Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004. Baku Mutu Air Laut. 2004
- Pedoman perhitungan kadar logam berat sampel, Instalasi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, 2015.
- SNI 7387. Maximum Limit Of Heavy Metal Contamination In Food. 2009

ANALISIS KANDUNGAN LOGAM BERAT TIMBAL (PB) PADA HEPATOPANKREAS KEPITING RAJUNGAN (*Portunus pelagicus*)

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ repository.unisma.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On