

Manipulasi Pakan menggunakan Limbah Tanaman Perkebunan yang mengandung Metabolit Sekunder sebagai Agen Pereduksi Metana

by Amriana Hifizah

Submission date: 05-Jan-2023 02:41PM (UTC+0700)

Submission ID: 1988769570

File name: Hifizah_et_al.,_2020_JITRO.pdf (446.56K)

Word count: 7282

Character count: 45300

8

Review: Manipulasi Pakan menggunakan Limbah Tanaman Perkebunan yang mengandung Metabolit Sekunder sebagai Agen Pereduksi Metana

Review: Feed Manipulation using Horticultural By-Product Containing Secondary Compounds as Methane Reduction Agent

Amriana Hifizah*, Astati, Anas Qurniawan

Jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa 91113, Sulawesi Selatan

*Email korespondensi: amriana.hifizah@uin-alauddin.ac.id

(Diterima 21-03-2021; disetujui 15-08-2021)

ABSTRAK

Penelitian mengenai reduksi metana (CH₄) pada ternak ruminansia semakin intens dilakukan mengingat efek emisi gas metana ke lingkungan lebih besar dibanding efek yang ditimbulkan oleh emisi gas karbondioksida (CO₂). Selain itu gas metana yang dihasilkan juga mengindikasikan kehilangan gross energi bagi ternak. Salah satu alternatif untuk mengendalikan emisi gas metana pada ternak ruminansia adalah dengan manipulasi pakan menggunakan limbah hasil panen tanaman perkebunan. Makalah ini merupakan studi literatur mengenai pemanfaatan limbah perkebunan untuk mengendalikan produksi gas metana dalam rumen. Teknik memanipulasi pakan dengan mencampurkan pakan berkualitas rendah (limbah pertanian/perkebunan) dengan pakan berkualitas tinggi merupakan langkah praktis untuk diimplementasikan. Beberapa jenis limbah tanaman hortikultura yang menghasilkan produksi metana yang rendah dalam proses fermentasi di rumen antara lain daun dan batang pisang, daun jambu, daun sirsak, daun nangka. Rendahnya produksi gas metana biasanya berbanding lurus dengan produksi gas hasil fermentasi dalam rumen. Untuk tetap menekan produksi metana dalam rumen tanpa membahayakan kondisi rumen, maka teknik manipulasi pakan perlu diperhatikan. Persentase bahan asal limbah perkebunan yang umumnya mengandung serat kasar tinggi juga mengandung senyawa anti metanaogen, harus diimbangi dengan bahan penyusun lain dalam ransum misalnya yang kaya protein seperti lamtoro ataupun menggunakan dedak sebagai sumber karbohidrat mudah tercerna. Total jenis dan jumlah kandungan senyawa sekunder dari semua bahan yang akan digunakan dalam ransum juga penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari efek negatif dari senyawa sekunder yang berfungsi sebagai anti metanaogen tersebut.

Kata kunci: metana, ruminansia, limbah pertanian, hortikultura

ABSTRACT

Over the last decades, there has been much research conducted in reducing methane emission from ruminants considering that it is 23 times more potent than carbon dioxide, and that the amount of methane produced represents a significant loss in gross energy for the ruminants. One alternative solution is through feed manipulation using horticultural waste, such as banana plant leaf and stem, guava leaf, soursop leaf, and jackfruit leaf, in such a way that it can reduce methane production while maintaining the ruminant's productivity. Additionally, utilizing such waste is cost-effective and beneficial to reduce environmental footprints. This paper is a literature review that describes the role of horticultural waste to suppress methane production without depressing the overall rumen condition. Generally, the low amount of methane production in the rumen is in line with the total gas production from the fermentation process in the rumen. To eliminate methane production without harmful rumen conditions, the percentage of the horticultural waste needs to be adjusted with the other feed sources that will be mixed. For example, a high protein legume, Leucaena or an easily digestible carbohydrate source, rice bran. It requires further experiments before feeding it to the real animals to get the proper amount in the ration and to prevent the effect of the anti-microbial compounds or anti-methanogenic compounds that may or may not interfere with the fermentation process in the rumen.

Keywords: methane, ruminants, agricultural waste, horticulture



JITRO (Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Gas metana (CH₄) salah satu gas rumah kaca (GRK) yang secara normal dihasilkan oleh ternak ruminansia saat proses fermentasi pakan dalam rumen. Enterik metana secara global berkontribusi sebanyak 17-37% emisi metana global antropogenik dan persentase ini didominasi oleh gas metana yang dihasilkan dari proses fermentasi enterik (Broucek, 2015). Hasil data terkini dari website NASA melaporkan bahwa terdapat kenaikan emisi gas metana secara signifikan melebihi 1875 ppb (parts per billion) atau sekitar 2,5 kali lebih besar dibanding tahun 1850an (Voiland, 2020). Peningkatan emisi gas metana ini tentunya akan berdampak terhadap efek gas rumah kaca secara global. Hal ini patut menjadi perhatian kita karena peningkatan emisi gas rumah kaca tidak hanya berpengaruh ke lingkungan, keamanan produk pangan, tapi juga berdampak pada produktivitas ternak ruminansia itu sendiri.

Semakin banyak gas metana yang diproduksi oleh ternak ruminansia maka semakin banyak pula gross energi yang akan terbuang, yang semestinya dapat dipergunakan untuk menambah produksi susu, daging dan wool. Salah satu upaya mitigasi gas metana ini adalah dengan memanipulasi jenis dan komposisi pakan, sehingga tidak hanya mengurangi jumlah gas metana tapi juga bisa menambah produktivitas ternak. Sebagai contoh, ternak sapi potong yang mengkonsumsi lamtoro (legume yang umum digunakan sebagai pakan ruminansia di Indonesia) produktivitasnya meningkat sampai 22% dan gas metana yang dihasilkan berkurang 20%; ternak sapi perah yang mengkonsumsi gandum mengalami peningkatan produksi susu sampai 20% sementara gas metana yang dihasilkan menurun 40% (Limited, 2015).

Sistem usaha peternakan di Indonesia bervariasi, mulai dari sistem intensif, semi intensif dan ekstensif. Ternak sapi potong di Indonesia rata-rata menghasilkan 63-68% emisi gas metana dari total emisi GRK sejak tahun 2000-2015. Penggunaan campuran antara pakan asal limbah hortikultura dan pakan kualitas tinggi seperti legume bisa menjadi solusi menurunkan jumlah emisi metana pada peternakan ruminansia. Tahun 2015 emisi gas metana mulai menurun 7.39%, yang mungkin disebabkan mulainya peternak mengadopsi penggunaan legum dan konsentrat (Widiawati *et al.*, 2016).

Makalah ini merupakan studi literatur mengenai usaha mitigasi emisi gas metana di industri peternakan ruminansia dengan memanfaatkan limbah hasil panen tanaman

hortikultura yang mengandung senyawa metabolit sekunder. Tindakan mitigasi ini memberikan manfaat ganda, selain sebagai usaha melestarikan lingkungan dengan memanfaatkan limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada penyediaan bahan pangan asal hewani yang sehat dan aman, juga kontribusi dalam hal efisiensi biaya pakan dan tenaga kerja. Permasalahannya adalah kurangnya diseminasi informasi kepada peternak secara menyeluruh mengenai efek buruk gas metana ini baik ke lingkungan ataupun ke ternak dan informasi mengenai usaha mitigasi gas metana melalui modifikasi pakan dengan memanfaatkan pakan yang berasal dari limbah pertanian sebagai komponen dalam ransum ataupun sebagai pakan alternatif.

Tulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi kepada semua pihak yang bergelut di bidang peternakan mengenai pentingnya mengurangi emisi gas metana dari usaha peternakan mereka dengan memanfaatkan limbah pertanian atau perkebunan yang sudah tersedia, untuk mewujudkan efisiensi biaya pakan sambil meningkatkan produktivitas ternak namun tetap ramah lingkungan.

SENYAWA METABOLIT SEKUNDER PADA BERBAGAI BAGIAN TANAMAN

Senyawa metabolit sekunder pada tanaman (PSC) merupakan senyawa yang alami terdapat pada bagian tanaman yang umumnya tidak esensial untuk pertumbuhan tapi berfungsi sebagai pelindung dari serangan serangga, mikroorganisme, predator, bahkan dari jenis tanaman lainnya (Durmic & Blache, 2012). Beberapa jenis PSC ini dapat mempengaruhi aktivitas biologis atau metabolisme di organisme lainnya. Hal ini menarik untuk diteliti terutama dalam hal menemukan senyawa yang berfungsi sebagai anti-metanaogen tapi tidak menginterferensi jenis bakteri pencerna serat kasar dalam rumen dan tidak memberikan efek negatif bagi kondisi rumen.

Ada empat kelompok besar PSC: fenol (flavonol, flavonoid, tannin), terpenoid (sesquiterpine, saponin), senyawa yang mengandung nitrogen (alkaloid, glikosida sianogenik), dan senyawa yang mengandung sulfur. PSC yang dapat memanipulasi proses fermentasi dalam rumen adalah: tannin (terutama tannin terkondensasi dan tannin terhidrolisis), saponin, dan senyawa lain seperti fenol atau alkaloid (Guerriero *et al.*, 2018). Kelompok terbesar senyawa fenol yang berfungsi sebagai anti mikroba adalah flavonoid (Wencelová *et al.*, 2014). Bahan pakan yang mengandung beberapa senyawa

tersebut telah dilaporkan dapat mengurangi produksi metana tanpa efek merugikan di kondisi rumen. Sehingga PSC lebih menarik untuk digunakan sebagai agen pemodifikasi rumen untuk memperbaiki proses fermentasi sekaligus mengurangi produksi enterik metana (Kim *et al.*, 2015).

Berikut adalah list beberapa senyawa sekunder yang terkandung dalam daun tanaman hortikultura yang biasa hanya menjadi limbah hasil panen yang mungkin saja berpotensi dijadikan campuran pakan ternak.

Tabel 1. Jenis komponen/metabolit sekunder daun tanaman atau kulit buah hortikultura

No	Species	Secondary compounds	References
1.	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Morin, sianoglikosida, flavonoid, alkaloid, tannin dan saponin	Adnyani <i>et al.</i> , 2016
2.	<i>Mangifera indica L.</i>	Flavonoid, tannin, mangiferin, anti inflamasi, anti tumor, anti analgesic, antibakterial	Ningsih <i>et al.</i> , 2017
3.	<i>Annona muricata L.</i>	alkaloid, tannin, annonaceus acetogenins, flavonoid, kumarin, terpenoids/steroid	Puspitasari <i>et al.</i> , 2016
4.	<i>Zingiber officinale Rosc.</i>	Zingiberol, kurkumin, gingerol, atcric oil	Kusbiantoro & Purwaningrum, 2018
5.	<i>Psidium guajava</i>	flavonoid, tanin, atcric oil, saponin polifenol (kuersetin, avikularin, guajaverin, pirogalol), alkaloid	Rosidah & Afiziah, 2012
6.	<i>Eugenia aquea</i>	fenolik compounds, terpenoid, dan tannin	Hariaty <i>et al.</i> , 2015
7.	<i>Saccharum officinarum L.</i>	hydrocyanic acid	Duarte <i>et al.</i> , 2011
8.	<i>Theobroma cacao L.</i>	Alkaloid theobromine, mineral, tannin, gallic acid, catechin	Cruz <i>et al.</i> , 2015
9.	<i>Manihot utilissima</i>	Flavonoid, saponin, fenolik, tannin, flavans, triterpenoid, sterol	Hasyim <i>et al.</i> , 2016
10.	<i>Musa paradisiaca</i>	tannins, saponins, alkaloids, flavonoids, terpenoids	Lumowa & Bardin, 2017
11.	<i>Ipomea batatas L.</i>	flavonoid dan tannin	Sulastri <i>et al.</i> , 2013
12.	<i>Averrhoa carambola L.</i>	saponin, flavonoid, alkaloid, steroid/triterpenoid, glicosides	Yanti & Vera, 2019

Saponin mengandung triterpene atau steroid aglycone dan satu atau lebih rantai gula dan rasanya pahit, yang tentunya dapat mengurangi palatabilitas ternak jika terdapat dalam ransum dalam jumlah banyak. Rasa pahit dapat dihilangkan dengan jalan pencucian atau pengeringan dengan sinar matahari. Saponin dari berbagai spesies dapat menyebabkan gejala keracunan dalam ruminan, termasuk berat badan menurun, anorexia dan gastroenteritis, tergantung konsentrasi saponin dalam dinding sel tanaman. Saponin dapat bersifat toksik bagi protozoa dan dapat diberikan sebagai additive untuk memanipulasi mikroorganisme rumen sehingga bisa mereduksi terbentuknya CH₄ (Susanti & Marhaeniyo, 2014).

Sama halnya dengan pengaruh saponin pada populasi protozoa dan metanogen. Saponin merupakan agen defaunasi yang mengurangi populasi protozoa dan meningkatkan jumlah

bakteria amilolitik yang menyebabkan peningkatan jumlah propionat yang terbentuk dari hasil fermentasi dan berkurangnya jumlah metanogen disebabkan beberapa jenis metanogen ini hidup bersimbiosis pada protozoa. Persentase senyawa saponin dalam dua jenis bahan pakan bisa saja sama, tetapi efeknya terhadap mikroorganisme rumen bisa bervariasi disebabkan perbedaan struktur dari senyawa saponin (Krisnawan *et al.*, 2011).

Tannin terkondensasi (CT) dan tannin terhidrolisir (HT) bisa saja terdapat bersamaan dalam suatu jenis tanaman. HT, yang lebih mudah terdekomposisi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam saluran pencernaan (Wei *et al.*, 2019). Sedangkan CT berat molekulnya lebih besar sehingga sulit terdegradasi di saluran pencernaan. Ini memberikan efek positif bagi ternak karena CT akan berikatan dengan molekul

protein membentuk CT-protein kompleks pada pH rumen yang normal (6.8-7.1). Kondisi ini menyebabkan protein tidak terdegradasi di rumen dan berdampak menurunnya kadar N-amonia dalam rumen. Saat CT-protein kompleks masuk ke usus halus, CT lalu melepaskan protein (Wei *et al.*, 2019). Konsekuensinya, akan lebih banyak jumlah asam amino yang dapat terserap di usus, yang tentu saja akan menguntungkan ternak dan mengurangi N terbuang ke lingkungan.

Tannin, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, juga bisa merusak, misalnya jika konsentrasi tannin dalam pakan melebihi 60 g/Kg DM. Dalam persentase yang lebih rendah sekitar 3 – 6% DM, justru dapat meningkatkan jumlah protein yang terserap langsung oleh ternak dengan melindungi partikel pakan dari proses degradasi dalam rumen. Manfaat lainnya adalah bahwa tannin, khususnya tannin terkondensasi (Condensed Tannins CT) dapat bersifat toksik bagi metanogen (Bodas *et al.* 2012).

CT dapat mengurangi jumlah metanogen dan protozoa secara langsung tanpa mempengaruhi daya cerna dan total produksi gas. Jika hal ini terjadi maka akan lebih besar kesempatan bagi bakteri selulolitik untuk secara aktif mengkonversi pakan yang mengandung karbohidrat kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana yang siap untuk dipakai oleh mikroorganisme rumen untuk bereplikasi dan membentuk protein mikroba. Hal ini akan berefek pada persentase protein mikroba yang terserap di usus halus sejalan dengan pemanfaatan energinya untuk ternak (Wina, 2012).

Adapun manfaat tannin dan saponin jika keduanya terdapat dalam ransum: efek toksik dari kedua kelompok senyawa tersebut dapat terminimalisir, penguraian protein pakan saat masuk ke usus halus bisa menjadi lebih efisien, bloat dapat dicegah serta jalur pemanfaatan H₂ dapat dialihkan sehingga metana yang terbentuk menjadi berkurang (Jayanegara *et al.*, 2011).

Efektifitas tannin sebagai anti metanogen tergantung dari tipe atau struktur dari tannin itu sendiri serta persentasenya dalam ransum (Jayanegara *et al.*, 2011). Struktur senyawa tannin menentukan sejauh mana metana dapat direduksi. Senyawa fenol non-tannin dan tannin dengan jumlah gugus hidroksil yang banyak lebih efektif mengurangi produksi metana. Hal inilah mungkin yang menyebabkan bervariasinya hasil penelitian mengenai efektifitas tannin dalam mereduksi gas metana. Sebagai contoh, pakan yang mengandung 0.45% CT serta ekstrak saponin 275 mg/kg, tidak berpengaruh terhadap jumlah protozoa dan proses fermentasi *in vitro* secara keseluruhan, namun

terjadi penurunan gas metana enterik 50% (Hariadi & Santoso 2010).

Faktor lain yang sebaiknya dipertimbangkan adalah efek PSC secara total terhadap mikroorganisme rumen yang mem-fermentasi serat kasar (khususnya gugus polisakarida) secara menyeluruh dan juga terhadap proses pembentukan gas metana dalam rumen. Komponen bioaktif yang terkandung dalam hijauan, atau limbah tanaman (batang atau daun) yang dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan fermentabilitas sekaligus mengurangi produksi metana dalam rumen atau menghambat pertumbuhan spesies metanogen. Ternak domba yang menghasilkan metana baik dalam jumlah besar ataupun sedikit memiliki jumlah total populasi metanogen yang serupa meskipun terdapat perbedaan dalam hal spesiesnya. Sebagai contoh banyak ditemukan *Methanospaera spp.* pada domba yang menghasilkan rendah metana dan lebih banyak *Methanobrevibacter gottshalkii* ditemukan pada domba yang menghasilkan gas metana yang tinggi (Shi *et al.*, 2014).

Terkait dengan proses degradasi polisakarida, fungi dilaporkan bertanggung jawab pada sebagian besar proses hidrolisis dinding sel polisakarida secara enzimatik (Weimer, 2015). Bisa saja terdapat kemungkinan bahwa tingkat fermentabilitas yang tinggi bisa saja ada hubungannya dengan populasi fungi meskipun secara total populasi mikroorganisme dalam rumen, fungi menempati jumlah terkecil (Castillo-González *et al.*, 2014). Sebaliknya, berdasarkan jumlah komunitas mikroorganisme dalam rumen yang sangat besar akan sangat mungkin terjadi jika banyak spesies yang berbeda ikut berkontribusi terhadap proses degradasi semua substrat yang masuk ke dalam rumen (Weimer, 2015). Sehingga, kita perlu menargetkan jenis bahan pakan yang mengandung komponen atau metabolit sekunder yang bisa benar-benar memodulasi proses fermentasi sedemikian rupa sehingga populasi metanogen berkurang tanpa mengurangi populasi utama bakteri pengurai serat dalam rumen.

Komponen sekunder lainnya dalam hijauan adalah flavonoid dan alkaloids menjanjikan sebagai agen pereduksi enteric metana namun dapat mengurangi kecernaan bahan kering (BK) dan total produksi gas (parameter pengukuran fermentabilitas), meskipun dapat memperbaiki kesehatan dan produksi ternak. Beberapa riset baik *in vitro* maupun *in vivo*, menunjukkan bahwa tanaman yang kaya flavonoid dapat mengurangi jumlah metanogen (Oskoueian *et al.*, 2013). Oleh sebab itu dalam memilih sumber pakan yang

mengandung komponen anti metanogen, komponen sekunder tanaman yang masuk kelompok jenis flavonoid menarik untuk diteliti lebih lanjut.

MEKANISME SENYAWA METABOLIT SEKUNDER DALAM MEREDUKSI GAS METANA

Faktor utama yang mempengaruhi produksi gas metana dalam rumen adalah struktur karbohidrat yang terkandung dalam pakan. Pakan yang berkualitas rendah atau yang lambat dicerna dalam rumen akan mengurangi laju partikel pakan yang meninggalkan rumen dan berdampak pada peningkatan jumlah gas metana dalam rumen (Broucek, 2015). Pada prinsipnya, gas metana terbentuk selama proses fermentasi dari partikel pakan yang mengandung karbohidrat kompleks berlangsung dalam rumen, yang melibatkan kelompok bakteri fibrolitik, protozoa dan fungi. Hidrogen (H₂) yang merupakan produk intermediet akan bereaksi dengan CO₂ dimana kedua jenis gas ini merupakan substrat dari kelompok metanogen dan kelompok bakteri pendegradasi serat. Jumlah atom hydrogen dan karbon yang digunakan oleh kelompok metanogen tergantung pada persentase karbohidrat kompleks yang dikonsumsi ternak. Oleh sebab itu, peralihan pemanfaatan hydrogen antara kelompok metanogen dan kelompok bakteri pendegradasi serat merupakan hal penting dalam upaya menghambat produksi gas metana dalam rumen (Broucek, 2015). Elemen asam lemak terbang (VFA) seperti asetat fumarate dan butirat juga berkontribusi terhadap jumlah H₂ yang terbentuk. Dengan dialihkannya pemanfaatan H₂, maka juga akan mempengaruhi rasio produksi Asetat dan propionate (rasio A:P).

Secara garis besarnya, mekanisme senyawa sekunder dalam mereduksi terbentuknya gas metana dalam rumen melalui tiga jalur, yaitu: dengan cara mengalihkan jalur fermentasi dalam rumen sehingga H₂ yang terbentuk dimanfaatkan untuk pembentukan propionat; dengan cara menghambat aktivitas dan/atau pertumbuhan kelompok metanogen dalam rumen; atau dengan cara menghambat aktivitas dan/atau pertumbuhan kelompok bakteri penghasil H₂ atau penghasil substrat (senyawa yang mengandung methyl) bagi metanogen. Introduksi senyawa metabolit sekunder yang masuk ke dalam rumen, pada proporsi yang berlebihan memiliki dua sisi dampak yang berbeda. Di satu sisi bisa mengurangi jumlah produksi gas metana secara total baik per jumlah konsumsi bahan kering maupun per unit produksi ternak, namun di sisi lain bisa berdampak pada

menurunnya produktivitas ternak. Hal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya ekologi mikroba rumen, mengingat senyawa sekunder juga bersifat anti mikroba.

Senyawa sekunder ini (flavonoid, alkaloid, tannin, saponin) tidak hanya menjadikan kelompok metanogen dan protozoa sebagai targetnya tetapi juga tidak jarang yang menjadi target adalah justru kelompok bakteri pendegradasi serat, sehingga tidak hanya mengurangi produksi gas metana secara total tetapi juga berefek pada penurunan kecernaan bahan kering ransum dan jumlah total gas yang dihasilkan dan juga kecernaan N dalam proses fermentasi partikel pakan di dalam rumen (Oskoueian *et al.*, Oskoueian 2013).


Jika senyawa sekunder tersebut secara langsung mengurangi jumlah protozoa dan metanogen, maka akan lebih banyak kesempatan bagi bakteri selulolitik untuk secara aktif mengkonversi karbohidrat menjadi komponen sederhana yang dibutuhkan oleh bakteri rumen untuk pertumbuhan dan aktivitas mereka. Konsekuensinya, persentase protein mikroba yang diserap di usus halus akan meningkat seiring dengan pemanfaatan energi bagi inangnya (ternak). Struktur tannin seperti senyawa phenolic non tannin dan tannin yang memiliki gugus hidroksil yang lebih banyak, akan lebih efektif dalam mengurangi produksi metana (Jayanegara *et al.*, 2010).

Jumlah tannin terkondensasi (CT) pada konsentrasi 1,6-3,2% BK dalam ransum berkorelasi positif terhadap penurunan produksi metana per unit bahan kering yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia (sapi potong, domba dan kambing). Berkurangnya jumlah metana dalam rumen terkonfirmasi dari menurunnya populasi *Methanobrevibacter spp* (dominan dalam kelompok metanogen rumen, 75%). Dampak dari pakan yang kaya tannin terhadap penurunan metana dalam rumen disebabkan oleh berkurangnya jumlah total populasi metanogen rumen dan menurunnya produksi H₂ rumen karena CT dalam rumen menargetkan *Methanobrevibacter ruminantium*. Penelitian yang lain melaporkan bahwa CT mengurangi populasi *Ruminococcus flavefaciens* dan meningkatkan populasi *F. succinogenes* atau bahkan meningkatkan populasi fungi (Amira *et al.*, 2014). Saat CT masuk ke dalam rumen, CT akan terikat pada substrat (protein pakan) dan permukaan sel bakteri. CT ini menyebabkan terjadinya perubahan aktivitas endoglucanase, enzim yang bertanggung jawab untuk menguraikan ikatan glikosida internal pada polimer glukosa dan morfologi fisik beberapa spesies bakteri rumen (Min *et al.*, 2020).

Fungi dan protozoa juga berkaitan dengan pembentukan metana dalam rumen. Protozoa ini ikut andil dalam menghasilkan H₂. Untuk meningkatkan aksesnya terhadap H₂, kelompok metanogen ada yang bersimbiosis dengan protozoa. Ada sekitar hampir 37% metana dihasilkan oleh metanogen yang bersimbiosis dengan protozoa. Tannin yang terkandung dalam *Arachis hypogaea* menargetkan metanogen yang tidak bersimbiosis dengan protozoa. (Min *et al.*, 2020). Sehingga pada kondisi ini, penggunaan agen defaunasi untuk mengurangi populasi protozoa rumen juga bisa berdampak pada menurunnya persentase gas metana rumen.

Riset tentang metabolit sekunder tanaman yang dapat mengurangi produksi gas metana dapat membantu kita dalam memilih bahan pakan

alternatif. Semua efek bahan metabolit sekunder terhadap komunitas mikroorganisme dalam rumen baik positif ataupun negatif dapat mempengaruhi fermentabilitas partikel pakan dalam rumen, disebabkan adanya interaksi yang kompleks baik antara fraksi senyawa tersebut, konsentrasi dan aktivitas mikroorganisme rumen. Perbedaan efek tersebut disebabkan perbedaan jenis pakan, level komponen anti-metanogen dalam total ransum, level dan jenis zat anti-metanogen dalam hijauan pakan dan aktivitas mikroba selama proses fermentasi berlangsung dalam rumen. Pemahaman mendalam akan hal tersebut akan sangat membantu menentukan bagaimana memanipulasi pakan ternak. Secara skematik, mekanisme kerja senyawa sekunder dalam mereduksi metan terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Mekanisme senyawa sekunder dalam mereduksi gas metana dalam rumen

MANIPULASI PAKAN MENGGUNAKAN LIMBAH TANAMAN PERKEBUNAN SEBAGAI AGEN PEREDUKSI GAS METANA PADA RUMINANSIA

Manipulasi pakan merupakan upaya mengubah sebagian atau keseluruhan bahan pakan penyusun ransum ataupun mengubah persentase bahan pakan tertentu di dalam ransum, untuk tujuan tertentu. Teknik manipulasi pakan ini sebenarnya sudah sering dilakukan oleh peternak lokal di Indonesia dengan memanfaatkan sumber bahan pakan yang ada di sekitar. Namun, kadang terkendala oleh kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat peternak mengenai kelebihan dan kekurangan bahan pakan yang akan digunakan, ataupun juga bagaimana teknik manipulasi yang tepat sehingga tujuan akhir untuk peningkatan produksi sulit untuk dicapai. Jika teknik manipulasi pakan ini dapat dilakukan dengan tepat dan efektif diharapkan agar nantinya ransum menjadi lebih efisien, produktivitas ternak juga bisa meningkat dan pada akhirnya akan terkait dengan berapa banyak gas metana yang dihasilkan per unit produksi ternak. Efisiensi gas metana yang dihasilkan oleh ternak ruminansia erat kaitannya dengan efisiensi pakan dan produksi ternak ruminansia. Beberapa contoh manipulasi pakan dalam upaya mereduksi metana pada ternak ruminansia terkompilasi dalam Tabel 2.

Manipulasi pakan dengan memanfaatkan limbah hasil panen tanaman perkebunan sebagai pakan ternak ruminansia perlu ditingkatkan, mengingat semakin sempitnya lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak. Limbah hasil panen ini dapat berupa batang, daun ataupun kulit buah yang dapat diolah dan digunakan sebagai komponen penyusun ransum ternak ruminansia dengan memperbaiki kualitas dari pakan asal limbah tersebut. Substitusi Sebagian atau keseluruhan pakan konvensional dalam ransum dengan tetap memberikan pakan yang berkualitas, merupakan langkah yang paling praktis dilakukan oleh peternak di Indonesia untuk mengurangi efek gas rumah kaca dari sektor peternakan tanpa mengurangi produktivitas ternak.

Saat memanipulasi pakan, sebaiknya mempertimbangkan efek senyawa sekunder yang terkandung dalam bahan pakan tersebut terhadap proses fermentasi dalam rumen. Sebagai contoh, senyawa tannin dapat memperbaiki proses fermentasi dalam rumen tapi di sisi lain juga dapat menghambat proses fermentasi tergantung dari senyawa lain yang bereaksi bersama tannin atau tergantung dari level, jenis dan struktur tanninnya. Mikroorganisme rumen bisa menjadi resisten terhadap level tannin yang terlalu tinggi. Tanaman yang kaya akan tannin biasanya juga mengandung

protein kasar yang cukup tinggi sehingga akan menyebabkan tingginya konsentrasi amonia (NH_3) dalam rumen sebagai refleksi hasil degradasi protein.

Lamtoro, hijauan makanan ternak berprotein tinggi dan mudah diperoleh, sangat menarik untuk diteliti sebagai salah satu contoh legum berkualitas pengganti rumput karena komponen tanninnya yang menyediakan protein *bypass* untuk ternak tanpa menginterferensi proses fermentasi dalam rumen (Delgado *et al.*, 2013), namun hal ini tidak berlaku pada semua varietas Lamtoro. Lamtoro varietas *pallida* dan *trichandra*, tannin nya sangat menghambat penyerapan protein di usus halus karena tannin dari varietas tersebut akan bereaksi dengan enzim proteolitik sehingga tidak akan ada protein dari pakan yang terserap di usus. Bahkan, jumlah N-amonia tidak akan cukup tersedia bagi mikroba dalam rumen dan itu semua akan berimbas pada rendahnya tingkat produktivitas ternak. Jadi meskipun lamtoro merupakan hijauan berprotein tinggi dan termasuk kategori sumber protein *bypass*, tapi tidak menjamin bahwa semua protein yang lolos dari degradasi dalam rumen akan secara penuh terserap di usus halus. Sebenarnya, akan lebih bermanfaat jika protein pakan terdegradasi dalam rumen, karena akan menjadi sumber N-amonia bagi pembentukan protein mikroba, dimana 80% dari protein jenis ini langsung dapat dimanfaatkan oleh ternak (Al Qori'ah *et al.*, 2016).

Dalam dekade terakhir, riset mengenai mitigasi metana dari proses fermentasi dalam rumen semakin intens, baik melalui pencampuran berbagai jenis pakan seperti konsentrat dengan hijauan pakan lainnya maupun melalui penambahan ekstrak tanaman secara langsung (Durmic *et al.*, 2014; Jayanegara *et al.*, 2011)). Tantangan ke depannya adalah menemukan teknik memanipulasi pakan secara tepat berdasarkan kondisi ternak maupun sumberdaya pakan lokal yang tersedia sehingga proses fermentasi dalam rumen bisa dimodulasi tanpa mengganggu pertumbuhan dan aktivitas jenis mikroba rumen yang kita inginkan. Tantangan ini dapat terjawab dengan menggunakan hijauan sumber protein yang mengandung senyawa anti-metanogen. Legum dan semua tanaman tropis mengandung senyawa sekunder seperti: tannin, saponin dan flavonoid dengan efek anti-metanogennya (Wina, 2012). Jenis hijauan pakan tersebut dapat diseleksi dengan menggunakan metode *in vitro* untuk menguji apakah berpengaruh negatif ke rumen atau tidak, sebelum diberikan ke ternak. Lamtoro, misalnya, merupakan pakan sumber protein tinggi yang telah dilaporkan dapat mengurangi produksi metana sebanyak 3-21% yang disebabkan oleh kandungan tannin nya yang tinggi (Limited, 2015).

Tabel 2. Teknik manipulasi pakan untuk mengurangi produksi gas metana pada ruminansia

No	Cara Manipulasi	Manfaat	Hal yang perlu dipertimbangkan
1	Mencampurkan feed additif (Curnow, 2020); Bahan kimia sintetik misalnya antibiotik, senyawa nitrat Ekstrak tanaman, misalnya tannin Suplementasi lemak/minyak	Mengurangi produksi gas metana sehingga bisa memperbaiki efisiensi pemanfaatan pakan (Curnow, 2020)	Lebih efektif untuk ternak yang dikandangkan untuk tujuan penggemukan; penggunaan yang berlebihan dapat berpengaruh pada kesehatan ternak (Curnow, 2020); Feed additive jenis tersebut kurang efisien bagi penggunaan praktis untuk peternak local skala kecil menengah; penggunaan antibiotik sebagai additif sebaiknya digantikan dengan additif lainnya seperti pro/prebiotik
2	Mensubstitusi sebagian proporsi rumput dengan legum sebagai sumber hijauan (Bodas <i>et al.</i> , 2012), misalnya legum 30-60% dengan tetap memberikan konsentrat	Mengurangi produksi gas metana (Bodas <i>et al.</i> , 2012); menghilangkan ketergantungan pada pakan konvensional yang ketersediaannya terbatas	Jika konsumsi legum berlebihan dan tidak diimbangi dengan konsumsi karbohidrat mudah tercerna, dapat berefek ketidakseimbangan ketersediaan N2 dan kerangka karbon untuk mikroorganisme rumen, dikhawatirkan akan terjadi penumpukan amonia dalam pembuluh darah
3	Memperbaiki kualitas pakan saat musim kering misalnya dengan fermentasi bahan pakan yang mengandung serat kasar yang sangat tinggi (lignin, silika dan wax) (Hu <i>et al.</i> , 2020)	Mengurangi cemaran pada lingkungan akibat pembakaran jerami; mengurangi produksi metana dalam rumen (Hu <i>et al.</i> , 2020)	Pakan fermentasi tidak bisa diberikan secara tunggal dan terus menerus karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan
4	Memberikan porsi konsentrat (pakan non serat) lebih banyak dibandingkan pakan sumber serat (hijauan) di dalam ransum (Roche <i>et al.</i> , 2016)	Mengurangi produksi gas metana; menyediakan lebih banyak persentase propionate yang pada akhirnya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi ternak	Jumlah konsentrat sebaiknya diupayakan tidak lebih dari 60% sebab akan berpengaruh pada menurunnya pH rumen dan dapat mengarah ke asidosis (Jaramillo-López <i>et al.</i> , 2017)
5	Penambahan probiotik ke dalam ransum (<i>S. cerevisiae</i> , <i>S. boulardii</i> , <i>L. acidophilus</i> , <i>P. freudenreichii</i>) (Thota <i>et al.</i> , 2017)	Mengurangi produksi gas metana, meningkatkan kecernaan, mendukung keseimbangan N dalam rumen (Thota <i>et al.</i> , 2017)	Jika diberikan dalam jumlah yang berlebihan, dapat mempengaruhi keseimbangan ekologi mikroorganisme rumen; ada kemungkinan tidak semua strain dalam satu jenis mikroorganisme memiliki efek modulasi yang sama pada proses fermentasi dalam rumen
6	Penambahan enzim selulase ke dalam ransum (Wang & Xue, 2016)	Tergantung jenis ransumnya/substrat, ada yang dapat memperbaiki kecernaan ransum yang kualitasnya rendah, namun dalam penelitian terkini dengan pemberian 2g/kg BK ransum tidak berpengaruh nyata terhadap kecernaan dan produksi gas metana dalam rumen (Wang & Xue, 2016)	Enzim dapat bekerja secara optimal pada substrat yang sesuai; pertimbangan efisiensi biaya jika akan digunakan oleh peternak local skala kecil menengah

Diantara beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan mengenai penyeleksian komponen alternatif dalam pakan ternak adalah perlunya menghindari persaingan antara ternak dan manusia dalam hal pakan (Eisler *et al.*, 2014). Dalam hal ini sudah pasti ada keuntungan jika menggunakan pakan asal limbah hortikultura dan menguji apakah limbah ini mengandung komponen bioaktif atau senyawa anti mikroba (Vercoe *et al.*, 2020) dan tentunya di sisi lain kita telah mengalihkan limbah tersebut sehingga tidak akan dibakar begitu saja yang juga akan menyumbangkan emisi lagi ke lingkungan.

Beberapa riset telah dilakukan mengenai pemanfaatan limbah hasil panen tanaman hortikultura di Asia Tenggara, misalnya: limbah tanaman pisang baik kering maupun segar (*Musa paradisiaca*) untuk kambing dan sapi di Indonesia; kulit markisa kering untuk kambing; jerami padi fermentasi sebagai pakan sapi (Mulijanti *et al.* 2014); dan limbah kelapa sawit untuk ternak kambing maupun sapi potong. Limbah lainnya seperti limbah tapioka (onggok), ampas tahu serta jerami padi fermentasi telah umum dijadikan pakan ternak ruminansia di Indonesia khususnya saat musim kemarau atau saat persediaan hijauan menipis.

Penelitian yang mendalam diperlukan untuk mengkaji daya fermentabilitas bahan pakan alternative saat masuk ke dalam rumen. Tolak ukur fermentabilitas adalah total produksi gas dan produksi VFA (termasuk rasio Asetat: Propionat) dalam rumen, serta pengukuran faktor pendukung lainnya seperti pH rumen, jumlah metana dan amonia yang terbentuk serta evaluasi respon populasi mikroorganisme dalam rumen terhadap

jenis pakan. Hal ini tentu saja sangat kompleks, tetapi pemahaman akan sejauh mana daya fermentabilitas pakan dalam rumen juga penting karena hal itu mengindikasikan ketersediaan gross energy (GE) bagi ternak. Hal ini merupakan tantangan tersendiri, sebab hingga saat ini umumnya tingkat penurunan produksi metana dalam rumen berkorelasi dengan fermentabilitas pakan, jadi semakin rendah produksi metana maka fermentabilitas juga semakin rendah. Untuk menemukan titik tengah dimana produksi metana rendah tapi nilai fermentabilitas paling tidak tetap atau bahan meningkat, diperlukan pengujian yang intensif mengenai komponen bioaktif atau senyawa sekunder, daya fermentabilitas dan efek bahan pakan tersebut terhadap kondisi rumen secara menyeluruh.

Bagi peternak di negara-negara sedang berkembang, manipulasi pakan diarahkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber bahan pakan yang lebih ekonomis dan bisa menekan biaya operasional pakan yaitu yang berasal dari limbah pertanian ataupun limbah hasil panen tanaman hortikultura. Meskipun pada dasarnya limbah ini rendah kandungan nutrisinya, sangat tinggi serat kasar, dan kecernaan rendah, akan tetapi dengan perlakuan yang praktis dan efisien serta mudah diaplikasikan oleh peternak maka limbah ini akan sangat bermanfaat. Pengolahan pakan asal limbah tersebut juga selayaknya memenuhi standar agar bisa bermanfaat bagi ternak, misalnya tidak mengandung bahan beracun, memenuhi standar kebutuhan nutrisi setiap fase produksi, tersedia sepanjang tahun dan mudah dicerna (Makkar, 2017). Pada Tabel 3 contoh beberapa pakan asal limbah pertanian dan limbah hasil panen tanaman perkebunan beserta estimasi enterik produksi gas metananya.

Tabel 3. Estimasi produksi enterik metana dari beberapa bahan pakan asal limbah pertanian/tanaman hortikultura

No	Jenis Limbah	Cara Pengolahan	Komposisi dalam ransum	Estimasi CH ₄ /in vivo/in vitro	Referensi
1	Jerami padi	Fermentasi	40% +Sapindus rarak 20%	19.5% total gas (in vitro)	Krisnawan <i>et al.</i> 2011
2	Campuran daun dan batang pisang	Kering, giling	60-80%	25 mL/gDM (substrat tunggal, in vitro)	Hifizah <i>et al.</i> , 2018
3	Daun jambu	Kering, giling	Digunakan sebagai jamu, dicampur dengan rebusan daun Sirih 47.6 g/L	14.06 mL/gDM (substrat tunggal, in vitro)	Hifizah <i>et al.</i> , 2018; Tama <i>et al.</i> , 2017.
4	Daun sirsak	Kering, giling	NA	28mL/gDM (substrat tunggal, in vitro)	Hifizah <i>et al.</i> , 2018
5	Daun Nangka	Basah, kering	NA	26.5mL/gDM (substrat tunggal, in vitro)	Hifizah <i>et al.</i> , 2018
6	Pucuk tebu	Kering, giling	40% + CRM 2% + Konsentrat	menurunkan produksi metana 15% (in vivo)	Balai PATP, 2018
7	Konsentrat mix (dedak, onggok, kulit kopi, kulit singkong, tetes tebu, garam, urea dan kapur	Kering, giling	80%	40 ppm/7 hari (in vivo)	Gustiar <i>et al.</i> , 2014

Kandungan nutrisi dan pencernaan bahan pakan asal limbah dapat ditingkatkan melalui proses fermentasi menggunakan mikroba aktif (starter) atau urea (Wanapat *et al.*, 2013) atau dengan mencampurkannya dengan hijat 19 berkualitas (Hifizah *et al.*, 2018). Semua proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti khususnya jika menggunakan bahan yang mengandung senyawa anti-mikroba. Saat akan memanipulasi pakan untuk mengendalikan terbentuknya emisi gas metana, menghindari interfensi pada proses fermentasi dalam rumen penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan produktivitas ternak. Untuk menentukan kombinasi dan persentase yang tepat dalam total ransum khususnya jika menggunakan sumber bahan pakan asal limbah pertanian ataupun tanaman hortikultura, harus dipertimbangkan beberapa hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan kesemuanya itu hanya dapat dilakukan melalui eksperimen.

KESIMPULAN

Teknik manipulasi pakan untuk mereduksi gas metana pada ternak ruminansia tampaknya sangat menjanjikan sebagai strategi efektif dengan keuntungan ganda, baik terhadap ternak, peternak maupun ke lingkungan. Manipulasi pakan dengan menggunakan pakan asal limbah hasil panen tanaman perkebunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti: kandungan bahan sekunder dalam sumber pakan serta seberapa besar efeknya terhadap komunitas mikroorganisme dalam rumen termasuk kelompok bakteri pendegradasi serat kasar dan juga kelompok methanogen. Sehingga untuk menemukan porsi penggunaan yang tepat dalam ransum, harus melalui uji penelitian. Secara tidak langsung, jika peternak dapat secara luas menerapkan pemanfaatan limbah pertanian maupun limbah tanaman hortikultura, diharapkan Indonesia bisa berkontribusi positif dalam mengurangi emisi gas metana secara global dan juga bias menjamin keberlangsungan industri peternakan ruminansia ke depannya.

KONFLIK KEPENTINGAN

3 Tidak ada konflik kepentingan dengan hubungan keuangan, pribadi, atau lainnya dengan orang atau organisasi lain yang terkait dengan materi yang dibahas dalam naskah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N.M.R.D., I.M.O.A. Parwata, & I.M.S. Negara. 2016. Potensi ekstrak daun nangka (*Artocarpus heterophyllus Lam.*) sebagai antioksidan alami. *Jurnal Kimia* 10(2):162-167.
- Al Qori'ah, Surono, & Sutrisno. 2016. Sintesis protein mikroba dan aktivitas selulolitik akibat penambahan level zeolit sumber nitrogen slow release pada glukosa murni secara in vitro. *Jurnal Ilmu-ilmu Peternakan* 26(2):1-7.
- Amira, C., G. Louisa, B. Lyas, M. Samir, L. A. Mohamed, L.P.M. Morère, & B. Hacène. 2014. Effects of secondary compounds from cactus and acacias trees on rumen microbial profile changes performed by Real-Time PCR. *Int J Adv Res* 2(2):660-671.
- [Balai PATP] Pengelola Alih Teknologi Pertanian. 2018. Formula pakan ruminansia rendah emisi gas metana. <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id/balaipatp/berita/350>. [17 Maret 2021].
- Bodas, R., N. Prieto, R. García-González, S. Andrés, F.J. Giráldez, & S. López. 2012. Manipulation of rumen fermentation and methane production with plant secondary metabolites. *Anim Feed Sci Technol* 176(1-4):78-93.
- Broucek, J. 2015. Methane yield from cattle, sheep, and goats housing with emphasis on emission factors: A review. *Slovak J Anim Sci* 48(3):122-139.
- Castillo-González, A.R., M.E. Burrola-Barraza, J. Domínguez-Viveros, & A. Chávez-Martínez. 2014. Rumen microorganisms and fermentation. *Arch Med Vet* 46(3):349-361.
- Cruz, J.F.M., P.B. Leite, S.E. Soares, E. D. S. Bispo. 2015. Bioactive compounds in different cocoa (*Theobroma cacao*, L) cultivars during fermentation. *Food Science and Technology (Campinas)* 35(2):279-284. DOI:10.1590/1678-457X.6541
- Curnow, M. 2020. Carbon farming: reducing methane emissions from cattle using feed additives. Department of Primary Industries and Regional Development, Western Australia. <https://agric.wa.gov.au/climate-change/carbon-farming-reducing-methane-emissions-cattle-using-feed-additives> [22 September 2021].

- Delgado, D.C., J. Galindo, J. Cairo, I. Orta, M. Domínguez, & N. Dorta. 2013. Supplementation with foliage of *L. leucocephala*. Its effect on the apparent digestibility of nutrients and methane production in sheep. Cuban J Agric Sci 47(3):267-271.
- Doreau, M., H.M.G. Van der Werf, D. Micol, H. Dubroeuq, J. Agabriel, Y. Rochette, & C. Martin. 2014. Enteric methane production and greenhouse gases balance of diets differing in concentrate in the fattening phase of a beef production system. J Anim Sci 89(8):2518-2528.
- Duarte-Almeida, J. M., A. Salatino, M.I. Genovese, & F.M. Lajolo. 2011. Phenolic composition and antioxidant activity of culms and sugarcane (*Saccharum officinarum* L) Products. Food Chemistry 125(2):660-664.
- Durmic, Z. & D. Blache. 2012. Bioactive plants and plant products: Effects on animal function, health and welfare. Animal Feed Science and Technology 176(1-4):150-162. DOI:10.1016/j.anifeedsci.2012.07.018.
- Durmic, Z., P.J. Moate, R. Eckard, D.K. Revell, R. Williams, & P.E. Vercoe. 2014. In vitro screening of selected feed additives, plant essential oils and plant extracts for rumen methane mitigation. J Sci Food Agric 94(6):1191-6.
- Eisler, M.C., M.R.F. Lee, J.F. Tarlton, G.B. Martin, J. Beddington, J.A.J. Dungait, H. Greathead, J. Liu, S. Mathew, & H. Miller. 2014. Steps to sustainable livestock. Nature 507:32-34. DOI: 10.1038/507032a.
- Guerriero, G., J.A. Berni R, Muñoz-Sanchez, E.M. Apone F, Abdel-Salam, A.A. Qahtan, A.A. Alatar, C. Cantini, & G. Cai. 2018. Production of plant secondary metabolites: examples, tips and suggestions for biotechnologists. Genes (Basel) 9(6):309. DOI:10.3390/genes9060309.
- Gustiar, F., R. A. Suwignyo, Suheryanto, Munandar. 2014. Reduksi gas metana (CH₄) dengan peningkatan komposisi konsentrat dalam pakan ternak sapi. Jurnal Peternakan Sriwijaya 3(1):14-24.
- Gxasheka, M., T.L., Tyasi, N. Qin, & Z. Lyu. 2015. An overview of tannins rich plants as alternative supplementation on ruminant animals: A review. Int J Agric Res Rev 3(6):343-349.
- Hariadi, B.T., & B. Santoso. 2010. Evaluation of tropical plants containing tannin on *in vitro* methanogenesis and fermentation parameters using rumen fluid. Sci Food Agric 90:456-461.
- Hariyati, T., D.S.D. Jekti, & Y. Andayani. 2015. Pengaruh ekstrak etanol dan daun jambu air (*Syzygium aqueum*) terhadap isolat bakteri klinis. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA. 1 (2):31-38.
- Hasyim, S. Falah, & L.K. Dewi. 2016. Pengaruh perebusan daun singkong (*Manihot esculenta crantz*) terhadap kadar total fenol, flavonoid dan aktivitas antioksidannya. Current Biochemistry 3(3):116-127.
- Hifizah, A., P. Vercoe, G.B. Martin, Z. Durmic Z, & J. Vadhanabhuti. 2018. Alternative feed sources for ruminants in Indonesia - a comparison of fruit tree waste with *Leucaena leucocephala* for methane production and fermentability *in vitro*. Advances in Animal Biosciences 9(3):495. DOI: 10.1017/S2040470018000122.
- Hu, Y., Y. He, S. Gao, Z. Liao, T. Lai, H. Zhou, Q. Chen, L. Li, H. Gao, & W. Lu. 2020. The effect of a diet based on rice straw co-fermented with probiotics and enzymes versus a fresh corn Stover-based diet on the rumen bacterial community and metabolites of beef cattle. Scientific reports. Nature Research. DOI: 10.1038/s41598-020-67716-w
- Jaramillo-López, E., M. F. Itza-Ortiz, G. Peraza-Mercado, & J. M. Carrera-Chávez. 2017. Ruminal acidosis: strategies for its control. Austral J Vet Sci 49(3):139-148.
- Jayanegara, A., E. Wina, C.R. Soliva, S. Marquardt, M. Kreuzer, & F. Leiber. 2011. Dependence of forage quality and methanogenic potential of tropical plants on their phenolic fractions as determined by principal component analysis. Animal Feed Science and Technology 163(2-4):231-243. DOI:10.1016/j.anifeedsci.2010.11.009.
- Kim, E.T., L.L. Guan, S.J. Lee, S.M. Lee, S.S. Lee, I.D. Lee. 2015. Effects of flavonoid-rich plant extracts on *in vitro* ruminal methanogenesis, microbial populations and fermentation characteristics. Asian Australasian Journal of Animal Science 28(4):530-537. DOI:10.5713/ajas.14.0692.
- Kusbiantoro, D., & Y. Purwaningrum. 2018.

- Pemanfaatan kandungan metabolit sekunder pada tanaman kunyit dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat. *Kultivasi* 17(1):544-549.
- Krisnawan, N., A. Sudarman, A. Jayanegara, Y. Widyawati. 2011. Efek senyawa saponin pada *Sapindus rarak* dengan pakan berbasis jerami padi dalam mitigasi gas metana. *J Ilmu Pertan Indones* 11(2):29-34.
- Lumowa, S.V.T., & S. Bardin. 2017. Uji kulit pisang kepok (*Musa paradisiaca L.*) Bahan pakan sebagai pestisida nabati berpotensi menekan serangan serangga hama tanaman umur pendek. *Jurnal Sains dan Kesehatan* 1(9):465-469.
- Makkar, H.P.S. 2017. An FAO ration formulation tool for dairy cows released. http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/2017_FAO_Ration_Formulation_Tool.html [17 Maret 2021].
- Meat and Livestock Australia Limited. 2015. More meat, milk and wool: Less methane. <https://www.beefcentral.com/wp-content/uploads/2015/10/Methane-report.pdf> [17 Maret 2021].
- Min, B.R., S. Solaiman, H.M. Waldrip, D. Parker, R. W. Todd, D. Brauer. 2020. Dietary mitigation of enteric methane emissions from ruminants: A review of plant tannin mitigation options. *Animal Nutrition* 6(3):231-246. DOI: 10.1016/j.aninu.2020.05.002.
- Mulijanti, S.L., S. Tedy, & D. Sugandi. 2014. Utilization of rice bran and fermented straw on fattening beef cattle. *Agros* 16(2):360-369.
- Oskoueian, E., N. Abdullah, & A. Oskoueian. 2013. Effects of flavonoids on rumen fermentation activity, methane production, and microbial population. *Journal of Biomedicine and Biotechnology* 2013:1-8. DOI: 10.1155/2013/349129.
- Puspitasari, M.L., T.V. Wulansari, T.D. Widyaningsih, J.M. Maligan, & N.I.P. Nugrahini. 2016. Antioxidant activity herbal supplements of soursop leaf (*Annona muricata L.*) and Pericarp of Mangosteen (*Garcinia mangostana L.*): A Review. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 4(1):283-290.
- Roche, R., R.J. Dewhurst, C. Duthie, J.A. Rooke, N. McKain, D.W. Ross, J.J. Hyslop, A. Waterhouse, T.C. Freeman, M. Watson, & R.J. Wallace. 2016. Bovine host genetic variation influences rumen microbial methane production with best selection criterion for low methane emitting and efficiently feed converting hosts based on metagenomic gene abundance. *PLOS Genetics* February 18, 2016. DOI: 10.1371/journal.pgen.1005846.
- Rosidah & W.M. Afizia. 2012. Potensi ekstrak daun jambu biji sebagai antibakterial untuk menanggulangi serangan bakteri *Aeromonas hydrophila* pada ikan gurame (*Osphronemus gouramy* Lacepede). *Jurnal Akuatika* 3(1): 19-27.
- Shi, W., C.D. Moon, S.C. Leahy, D. Kang, J. Froula, S. Kittelmann, C. Fan, S. Deutsch, & D. Gagic. 2014. Methane yield phenotypes linked to differential gene expression in the sheep rumen microbiome. *Gen Res* 24(9):1517-1525.
- Sulastris., Erlidawati., Syahrial., M. Nazar, & T. Andayani. 2013. Aktivitas antioksidan ekstrak etanol daun ubi jalar ungu (*Ipomea batatas L.*) hasil budidaya daerah Saree, Aceh Besar. *Jurnal Rekayasa dan Lingkungan* 9(3):125-130.
- Susanti, S. & E. Marhaenyanto. 2014. Kadar saponin daun tanaman yang berpotensi menekan gas metana secara *in vitro*. *Buana Sains* 14(1):29-38
- Tama, C.A., D. Septinova, & T. Kurtini. 2017. Pengaruh pemberian jamu tradisional terhadap bobot hidup, bobot karkas, bobot giblet dan berat abdominal broiler. *Jurnal Riset dan Inovasi Peternakan* 1(2):16-21.
- Thota, P., S. Chandra, M. Mahender, & D.B.V. Ramana. 2017. Effect of probiotic supplementation on nutrient digestibilities, growth performance and enteric methane emissions in Deccani Ram lambs. *Journal of Animal Research* 7(6):1009-1017. DOI: 10.5958/2277-940X.2017.00152.8.
- Vercocoe, P., A. Hifizah, G.B. Martin, Z. Durmic, & J. Vadhanabhuti. 2020. Identifying plants that reduce methane production using an in vitro system - Helping the challenge to become C neutral. *Proceeding International Tropical Agriculture Conference*. p. 215. DOI: 10.3390/proceedings2019036175
- Voiland, A. 2020. Methane emissions continue to rise. <https://earthobservatory.nasa.gov/images>

/ 146978/methane-emissions-continue-to-rise
[17 Maret 2021].

- Wanapat, M., S. Kang, & S. Polyorach. 2013. Development of feeding systems and strategies of supplementation to enhance rumen fermentation and ruminant production in the tropics. *Journal of Animal Science and Biotechnology* 4(1):32. DOI:10.1186/2049-1891-4-32.
- Wang, L. & B. Xue. 2016. Effects of cellulase supplementation on nutrient digestibility, energy utilization and methane emission by Boer Crossbred Goats. *Asian-australasian Journal of Animal Sciences* 29(2):204-210. DOI: 10.5713/ajas.15.0094.
- Wei, C., J. Guyader, L. Collazos, K.A. Beauchemin, & G.Y. Zhao. 2019. Effects of gallic acid on *in vitro* rumen fermentation and methane production using rumen simulation (Rusitec) and batch-culture techniques. *Animal Production Science* 59(2):277-287. DOI:10.1071/AN17365.
- Weimer, P.J. 2015. Redundancy, resilience, and host specificity of the ruminal microbiota: implications for engineering improved ruminal fermentations. *Frontiers in Microbiology* 6(296):296. DOI: 10.3389/fmicb.2015.00296.
- Wencelová, M., Z. Váradyová, K. Mihaliková, D. Jalč, & S. Kišidayová. 2014. Effects of selected medicinal plants on rumen fermentation in a high-concentrate diet *in vitro*. *The Journal of Animal and Plant Sciences*. 24 (5):1388-1395.
- Widiawati, Y., M.N. Rofiq, & B. Tiesnamurti. 2016. Methane emission factors for enteric fermentation in beef cattle using IPCC Tier-2 method in Indonesia. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner* 21:101-111. DOI: 10.14334/jitv.v21i2.1358.
- Wina, E. 2012. The use of plant bioactive compounds to mitigate enteric methane in ruminants and its application in Indonesia. *Wartazoa* 22(1):24-34.
- Yanti, S., & Y. Vera. 2019. Skrining fitokimia ekstrak daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi*). *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia* 4(2):41-46.

Manipulasi Pakan menggunakan Limbah Tanaman Perkebunan yang mengandung Metabolit Sekunder sebagai Agen Pereduksi Metana

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
2	www.researchgate.net Internet Source	1%
3	conference.usm.ac.id Internet Source	<1%
4	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
5	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
6	docobook.com Internet Source	<1%
7	jddtonline.info Internet Source	<1%
8	www.onesearch.id Internet Source	<1%

9	teses.usp.br Internet Source	<1 %
10	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
11	Shakeri, P., Z. Durmic, J. Vadhanabhuti, and P. E. Vercoe. "Products derived from olive leaves and fruits can alter in vitro ruminal fermentation and methane production : Effects of olive by-products on methane production", Journal of the Science of Food and Agriculture, 2016. Publication	<1 %
12	es.scribd.com Internet Source	<1 %
13	vskjodhpur.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	hardianimalscience.wordpress.com Internet Source	<1 %
15	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
16	repository.pertanian.go.id Internet Source	<1 %
17	www.gecekitapligi.com Internet Source	<1 %
18	digilib.unila.ac.id	

Internet Source

<1 %

19

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

20

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

21

R W W Sari, N Jamarun, Suyitman, Khasrad, G Yanti. "Mangrove (*Avicennia marina*) leaves as an alternative feed resources for ruminants", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2021

Publication

<1 %

22

text-id.123dok.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Manipulasi Pakan menggunakan Limbah Tanaman Perkebunan yang mengandung Metabolit Sekunder sebagai Agen Pereduksi Metana

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13
