



Eksotisme **BAKTERI ASAM LAKTAT**

Fatmawati Nur

Editor: Hafsan



Alauddin University Press

Eksotisme
BAKTERI
ASAM LAKTAT

Eksotisme **BAKTERI ASAM LAKTAT**

Fatmawati Nur

Editor: Hafsan



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Fatmawati Nur.

Eksotisme Bakteri Asam Laktat/Fatmawati Nur.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 158 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 135

ISBN 978-623-372-512-5

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3639 RAJ

Fatmawati Nur

EKSOTISME BAKTERI ASAM LAKTAT

Cetakan ke-1, Oktober 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Hafsan

Copy Editor : Findi Daraningtyas

Setter : Fazri Ramadhani

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwilinggung, No.112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwilinggung No. 112, Kel. Leuwilinggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Hp. 081222805496. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PENGANTAR REKTOR

Alhamdulillah wa Syukurillah, atas segala rahmat Allah Swt. beserta selawat dan salam kepada Rasul-Nya Muhammad Saw., mengiringi aktivitas keseharian kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab akademik dan peran-peran kehidupan lainnya sehari-hari.

Publikasi karya akademik adalah salah satu ruh perguruan tinggi, karena perguruan tinggi adalah ruang produksi ide dan gagasan yang harus selalu di-*update* dan di-*upgrade*. Buku adalah salah satu produk akademik yang kelahirannya, mesti diapresiasi setinggi-tingginya. Karena di balik proses lahirnya, ada kerja keras yang menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Kerja keras dan upaya sungguh-sungguh untuk menghadirkan sebuah karya akademik, adalah bukti nyata dedikasi serta khidmat seorang insan universitas bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Sebagai kampus yang memiliki visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi ipteks berbasis peradaban Islam, kehadiran buku terbitan PT RajaGrafindo Persada ini, diharapkan menjadi sumbangan berharga bagi diseminasi ilmu pengetahuan di lingkungan kampus peradaban, sekaligus semakin memperkaya bahan bacaan bagi penguatan integrasi keilmuan.

Buku ini tentu jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan masukan dari para pembaca untuk para penulis akan sangat dinantikan. Karena dengan itu, iklim akademik kampus akan dinamis dengan tradisi diskursif yang hidup.

Akhirnya, sebagai Rektor, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku yang menjadi bagian dari Program Penerbitan 100 Buku Referensi UIN Alauddin Makassar tahun 2022 ini. Semoga membawa kemaslahatan bagi warga kampus dan masyarakat secara umum.

Gowa, 2 Mei 2021

**Rektor UIN Alauddin Makassar
Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**



PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur berkat rida dan karunia Allah Swt., pada waktu yang telah ditargetkan penyusunan buku ini dapat terselesaikan. Buku ini merupakan respons atas ledakan temuan baru tentang Bakteri Asam Laktat (BAL) dari masa ke masa. Wawasan yang muncul dari studi dasar ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai inovasi yang mengarah pada pemanfaatan BAL dalam ragam aplikasi selain sekadar fermentasi makanan klasik, namun termasuk nilai eksotik BAL lainnya pada berbagai aspek kehidupan.

Kami sangat menghargai seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyelesaian penulisan buku ini, termasuk yang akan memberikan saran dan argumen konstruktif, kami tentu akan sangat berterima kasih demi peningkatan kualitas buku ini pada edisi berikutnya maupun untuk naskah buku kami lainnya.

Akhirnya, kami haturkan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas masih banyaknya kekeliruan yang tak terhindari dalam buku ini. Semoga karya sederhana namun istimewa ini menemukan pembacanya di antara para pakar maupun pemula dalam bidang mikrobiologi, pangan dan gizi, klinis, termasuk para mahasiswa, dan menghadirkan faedah dengan makna eksklusif. Semoga kita semua senantiasa memperoleh limpahan rahmat dan rida Allah Swt. Aamiin yaa Rabbal aalamiin.

Makassar, April 2022

Penulis



DAFTAR ISI

PENGANTAR REKTOR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 BAKTERI ASAM LAKTAT	1
A. Taksonomi Bakteri Asam Laktat	2
B. Lactobacillaceae sebagai Famili BAL Terpenting	5
C. Kultur Starter Bakteri Asam Laktat dan Industri	8
BAB 2 KOMPONEN ANTI MIKROBA DARI BAKTERI ASAM LAKTAT	11
A. Senyawa Organik Berat Molekul Rendah dengan Aktivitas Antimikroba	12
B. Bakteriosin	15
BAB 3 PRODUKSI VITAMIN OLEH BAKTERI ASAM LAKTAT	45
A. Vitamin Kelompok B (B-Kompleks)	46
B. Probiotik In Situ	58

BAB 4 BAKTERI ASAM LAKTAT DAN IMUNITAS MANUSIA	69
A. Probiotik dan Modulasi Fungsi Kekebalan Tubuh	70
B. Probiotik untuk Induksi Peningkatan Kekebalan Tubuh dan dan Ketahanan Penyakit	84
C. Probiotik dan Gangguan Imunoinflamasi	92
D. Mekanisme Probiotik yang Memediasi Efek Imunomodulator	96
BAB 5 BAKTERI ASAM LAKTAT BAGI KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS HEWAN	99
A. Regulasi Penggunaan Probiotik bagi Kesehatan Hewan	101
B. Probiotik Bakteri Asam Laktat dan Produktivitas Hewan	102
BAB 6 PROBIOTIK DAN PREBIOTIK	119
A. Aspek Umum Prebiotik	120
B. Aspek dan Aplikasi Terkait Kesehatan	127
DAFTAR PUSTAKA	135
BIOGRAFI PENULIS	157



BAKTERI ASAM LAKTAT

Istilah Bakteri Asam Laktat (BAL) saat pertama kali diperkenalkan pada masa pergantian abad ke-20, digunakan untuk merujuk pada “organisme asam susu.” Sementara, kesamaan antara organisme pengasam susu dan bakteri lain yang memproduksi asam laktat segera diamati, dan monografi oleh Orla-Jensen (1919) menjadi dasar klasifikasi BAL hingga saat ini. Kriteria yang digunakan oleh Orla-Jensen (morfologi seluler, cara fermentasi glukosa, kisaran suhu pertumbuhan, dan pola pemanfaatan gula) masih sangat penting untuk klasifikasi BAL, meskipun munculnya alat taksonomi yang lebih modern, terutama metode biologi molekuler, telah sangat meningkatkan jumlah famili BAL dari empat yang semula dikenal oleh Orla-Jensen (*Lactobacillus*, *Leuconostoc*, *Pediococcus*, dan *Streptococcus*) menjadi enam famili.

BAL secara tradisional dikaitkan dengan makanan dan fermentasi pakan, dan umumnya dianggap sebagai mikroorganisme yang menguntungkan, beberapa strain bahkan dimanfaatkan sebagai bakteri yang meningkatkan kesehatan (probiotik). Namun, beberapa gener (*Streptococcus*, *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Carnobacterium*) juga mengandung spesies atau galur yang dikenal sebagai patogen manusia atau hewan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh tentang taksonomi, metabolisme, dan biologi molekuler BAL diperlukan untuk sepenuhnya memanfaatkan aspek teknologi, nutrisi, dan promosi kesehatan BAL dengan tetap menghindari potensi risiko.

A. Taksonomi Bakteri Asam Laktat


BAL merupakan kelompok bakteri Gram positif yang disatukan oleh ciri-ciri morfologi, metabolisme, dan fisiologis tertentu. kelompok ini merupakan bakteri bentuk kokus, batang atau *coccobacilli* (batang pendek) yang tidak berspora, tidak menyukai oksigen, tetapi aerotoleran, dan menghasilkan asam laktat sebagai salah satu produk fermentasi utama karbohidrat. BAL tidak memiliki katalase asli dan tidak memiliki sitokrom. Leluhur BAL tampaknya merupakan organisme tanah mirip *Bacillus*, yang kemudian telah kehilangan beberapa gen dan fungsi fisiologis terkait saat beradaptasi dengan relung ekologi yang kaya nutrisi.

Secara taksonomi, bakteri pembentuk asam laktat didistribusikan dalam garis keturunan yang berbeda: famili Bacillaceae (genus *Bacillus*), famili Sporolactobacillaceae (genus *Sporolactobacillus*), famili Bifidobacteriaceae (genera *Aeriscardovia*, *Alloiscardovia*, *Bifidobacterium*, *Gardnerella*, *Metiscardovia*, *Pariscardovia*, dan *Scardovia*) (Zhou et al., 2013; Mattarelli et al., 2014) dan ordo Lactobacillales, yang secara tradisional dianggap sebagai bakteri asam laktat asli (BAL). Kelompok filogenetik ini, terdiri dari sekitar 500 spesies yang dideskripsikan secara valid, milik enam Famili bakteri Gram positif kandungan GC rendah, khususnya:

1. Aerococcaceae, dengan genus *Abiotrophia*, *Aerococcus*, *Dolosicoccus*, *Eremococcus*, *Facklamia*, *Globicatella*, dan *Ignavigranum*.
2. Carnobacteriaceae, dengan genus *Alkalibacterium*, *Allofustis*, *Alloiococcus*, *Atopobacter*, *Atopococcus*, *Atopostipes*, *Carnobacterium*, *Desemzia*, *Dolosigranulum*, *Granulicatella*, *Isobaculum*, *Lacticigenium*, *Marinilactibacillus*, *Pisciglobus*, dan *Trichococcus*.
3. Enterococcaceae, dengan genus *Bavariicoccus*, *Catelicoccus*, *Enterococcus*, *Melissococcus*, *Pilibacter*, *Tetragenococcus*, dan *Vagococcus*.
4. Lactobacillaceae, dengan genus *Lactobacillus* dan *Pediococcus*.
5. Leuconostocaceae, dengan genus *Leuconostoc*, *Fructobacillus*, *Oenococcus*, dan *Weissella*.

6. Streptococcaceae, dengan genus *Lactococcus*, *Lactovum*, dan *Streptococcus*.

Secara filogenetik, BAL dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria biologi molekuler, seperti sekuensing rRNA. Contoh pohon filogenetik yang membedakan BAL dari kelompok bakteri lain ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pohon filogenetik hubungan antarfamili pada ordo Lactobacillales berdasarkan urutan gen 16S rRNA menggunakan *Neighbor-Joining*. Nilai bootstrap (1.000 ulangan). Bilah skala mewakili jumlah substitusi per situs (Felis et al., 2016).

Sebagai karakteristik umum, Aerococcaceae termasuk kokus umumnya katalase-negatif, nonmotil, fakultatif anaerobik yang berhubungan dengan infeksi manusia dan hewan. Secara filogenetik, dikenali dua kelompok parafiletik (Mattarelli et al., 2014).

Famili Carnobacteriaceae biasanya mencakup kokus atau batang katalase-negatif, umumnya anaerobik fakultatif atau mikroaerofilik, dengan motilitas variabel, dan karakteristik kemotaksonomi yang khas (Ludwig et al., 2009). Juga, yang menarik, bakteri ini dapat melakukan respirasi dalam kondisi aerobik dengan keterlibatan sitokrom b dan d (Mattarelli et al., 2014).

Famili Enterococcaceae terdiri dari kokus katalase-negatif. Bakteri kelompok ini bersifat nonspora, anaerobik fakultatif, anaerobik atau mikroaerofilik, menjadi perhatian utama karena kemungkinan berperan dalam penyebaran resistensi antibiotik (Hollenbeck dan Rice, 2012).

Lactobacillaceae adalah famili yang paling banyak dan heterogen, karena sekitar 180 spesies dikenali (www.bacterio.net/lactobacillus), meskipun *update* spesies baru terus dideskripsikan hampir setiap bulan. Kelompok ini berbentuk batang atau *coccobacilli* yang tidak membentuk spora (mampu membelah dalam tetrad dalam genus *Pediococcus*), bersifat motil, umumnya toleran terhadap oksigen, sering asidofilik, dan *saccharoclastic* obligat, dengan produk akhir fermentasi yang berbeda tetapi juga dengan kemampuan respirasi, setidaknya pada beberapa spesies (Brooijmans et al., 2009). Semua karakteristik lain yang biasanya dipertimbangkan dalam studi taksonomi, seperti kisaran suhu dan pH untuk pertumbuhan, isomer asam laktat yang dihasilkan, dan jenis peptidoglikan dalam dinding sel, sangat bervariasi (Salveti et al., 2012).

Leuconostocaceae adalah bakteri bentuk batang atau kokus yang tidak membentuk endospora dan bersifat fakultatif anaerob, biasanya ditandai dengan produksi asam laktat, etanol, dan karbon dioksida dalam jumlah yang sama dari glukosa (metabolisme heterofermentatif obligat). Pengecualian adalah anggota genus *Fructobacillus*, yang menghasilkan asam asetat bukan etanol (Endo dan Okada, 2008). Demikian pula beberapa spesies dari genus *Leuconostoc* memiliki kemampuan respirasi yang bergantung pada heme. Genus *Oenococcus*, khususnya spesies *O. oeni*, dianggap penting berkat kemampuannya mengubah asam L-malat menjadi asam L-laktat dalam anggur (Henick-Kling, 1993).

Streptococcaceae terdiri dari fakultatif anaerobik, nonspora, sel bulat atau bulat telur homofermentatif, biasanya penataan selnya membentuk rantai atau pasangan. Sebagian besar spesies yang termasuk dalam genus *Streptococcus* adalah parasit pada manusia dan hewan lain dan hubungan antara beberapa streptococcus dan berbagai penyakit manusia dan hewan telah banyak dilaporkan. Di sisi lain, anggota genus *Lactococcus* banyak digunakan dalam industri susu karena kemampuannya untuk menghasilkan L (+) -asam laktat dari laktosa dalam susu mentah yang difermentasi secara spontan pada suhu 20-30°C (Teuber, 1995).

Dari sudut pandang yang diterapkan, famili Lactobacillaceae dan Streptococcaceae mewakili dua garis keturunan yang paling penting karena kelompok tersebut mencakup jumlah tertinggi BAL komersial (*lactobacilli*, *Streptococcus thermophilus* dan *Lactococcus lactis*).

B. Lactobacillaceae sebagai Famili BAL Terpenting

Lactobacillaceae merupakan famili dengan spesies yang termasuk *Generally Recognized As Safe* (GRAS). Famili ini memiliki anggota dengan jumlah tertinggi dan banyak strain dari spesiesnya yang merupakan bakteri terpenting dalam mikrobiologi makanan dan nutrisi manusia karena kontribusinya terhadap produksi makanan fermentasi atau penggunaannya sebagai probiotik. Deskripsi besar-besaran terhadap spesies baru selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan revisi progresif genus dengan pengakuan semakin banyak kelompok filogenetik (Dellaglio dan Felis, 2005; Felis dan Dellaglio, 2007). Setelah pembaruan taksonomi terakhir (Salvetti et al., 2012), sejumlah spesies baru telah dideskripsikan, yaitu *L. backii*, *L. curieae*, *L. faecis*, *L. ginsenosidimutans* (Jung et al., 2013), *L. heilongjiangensis*, *L. iwatensis*, *L. mudanjangensis*, *L. nenjian gensis*, *L. okkaidonensis*, *L. oryzae*, *L. silasei*, *L. songhuajiangensis*, *L. yonginensis*, *L. apis*, dan *L. rodentium*. Spesies-spesies tersebut dianggap berasal dari kelompok filogenetik yang berbeda dan selanjutnya mengacaukan struktur filogenetik famili yang sudah kompleks. Namun demikian, beberapa kelompok filogenetik dapat dikenali dan diramalkan di masa depan, menjadi genera baru ketika kesepakatan tentang kriteria untuk penggambaran mereka tercapai dalam komunitas ilmiah dalam reklasifikasi yang lebih sempurna (Salvetti et al., 2012).

Pada setiap tingkatan taksonomi, yaitu ordo Lactobacillales, famili Lactobacillaceae, genus *Lactobacillus*, dan *L. delbrueckii*-kelompok (*Lactobacillus sensu stricto*), hanya ada sedikit korelasi antara klasifikasi tradisional berdasarkan sifat metabolik dan keterkaitan filogenetik (Claesson et al., 2008). Pengetahuan tentang metabolisme BAL sebagian besar berasal dari genus *Lactobacillus*, dan biasanya didefinisikan sebagai berikut. Spesies yang melakukan fermentasi homolaktik, yaitu metabolisme homofermentatif yang menghasilkan lebih dari 85% asam laktat dari heksosa, menggunakan jalur glikolitik.

Heterofermenter dapat memanfaatkan jalur fosfoglukonat untuk mendegradasi tidak hanya heksosa, tetapi juga menghasilkan pentosa, selain asam laktat, produk samping lainnya, seperti etanol, asam asetat, dan karbon dioksida (Hammes dan Vogel, 1995). Selain itu, metabolisme heterofermentatif dapat berupa fakultatif atau obligat: yang pertama menentukan degradasi heksosa dan pentosa masing-masing oleh jalur glikolitik dan fosfoglukonat, sedangkan yang terakhir, pentosa dan heksosa terdegradasi oleh jalur fosfoglu konat (fase pertama PP jalur) dengan produksi bersamaan CO₂ (Hammes dan Vogel, 1995). Harus ditekankan bahwa informasi ini berasal dari studi tentang jumlah spesies yang sangat terbatas sehubungan dengan keanekaragaman yang sebenarnya dan, seperti yang telah disebutkan, pengelompokan metabolik tidak akan persis dengan kelompok filogenetik (Vandamme et al., 1996).

Saat ini ketersediaan sekuens genom memungkinkan analisis distribusi dan pengorganisasian 42 gen yang termasuk dalam jalur glikolisis (EMPP) dan pentosa fosfat (PP) (Salveti et al., 2013) dalam ordo Lactobacillales. Analisis mengungkapkan terjadinya tren spesifik garis keturunan dari kehilangan/keuntungan gen dalam dua jalur metabolisme yang diperiksa. Dalam genus *Lactobacillus*, *L. delbrueckii* merupakan kluster BAL yang tidak memiliki jumlah gen EMPP pusat tertinggi. Demikian pula sebanyak 11 strain yang dianalisis tidak memiliki pengkodean operon untuk *pyruvate dehydrogenase complex* (PDHc), yang dibentuk oleh empat gen (*pdhA*, *pdhB*, *pdhC*, dan *pdhD*). Hal yang bisa menjadi kunci dalam menghubungkan genotif dengan fenotif mereka adalah karena mereka sama-sama bersifat homofermentatif (Hammes dan Vogel, 1995) dan dengan demikian, glukosa diubah secara eksklusif menjadi asam laktat melalui lactate

dehydrogenase (Ldh). Di sisi lain, Leuconostocaceae dan strain *Lactobacillus* heterofermentatif obligat (anggota kelompok *L. reuteri*, *L. brevis*, dan *L. buchneri*) tidak memiliki phosphofruktokinase (*pfkA*), suatu reaksi penting yang bergantung pada ATP pada awal jalur EMP (Ronimus dan Morgan, 2001). Sekali lagi, tidak adanya gen tersebut, dapat dikaitkan dengan metabolisme mereka, karena fermentasi glukosa didorong melalui jalur PP, yang mengarah pada produksi CO₂ yang diamati pada heterofermenter obligat (Salveti et al., 2013).

Pada spesies BAL *L. delbrueckii*-kelompok, tidak adanya operon PDHc lengkap dan kehadiran gen *pfkA* diamati, sehingga menunjukkan susunan genetik yang koheren meskipun keragaman fenotipik (Salveti et al., 2013). Faktanya, spesies heterofermentatif fakultatif dan obligat seperti *L. asetofermentans*, *L. fornikalis*, *L. hamster*, *L. intestinalis*, *L. jensenii*, dan *L. psittaci* mengungkapkan latar belakang genotipe yang sebanding dengan spesies homofermentatif. Menariknya, pada spesies homofermentatif *L. iners* LMG18914T dan *L. amylophilus* LMG11400T, produk PCR diperoleh untuk primer penargetan *pdhA* dan *pdhB*. Lebih lanjut, urutan yang diperoleh mengungkapkan kesamaan yang tinggi dengan *Staphylococcus warneri* L37603 (98%) dan *Streptococcus haemolyticus* JCSC1435 (91%), menunjukkan bahwa transfer gen horizontal dapat terjadi karena mereka berbagi relung ekologi yang sama, yaitu berasal dari sampel usus, vagina, dan sampel klinis manusia (Falsen et al., 1999; Coton et al., 2009; Pereira et al., 2010). Hipotesis ini diperkuat oleh pengamatan sebelumnya pada jumlah genom yang lebih terbatas (Makarova dan Koonin, 2007), yang mengungkapkan bahwa gen enolase (*eno*) hadir di Lactobacillales dalam lebih dari satu salinan, salah satu versi leluhurnya pada bakteri Gram positif dan yang lainnya mungkin diperoleh dari garis keturunan bakteri yang berbeda, kemungkinan besar Actinobacteria (Makarova dan Koonin, 2007).

Pengamatan tersebut menunjukkan bahwa data genom sangat penting untuk memperjelas hubungan yang benar antara genotipe dan fenotipe, dan dapat memungkinkan untuk menggambarkan taksa secara tiga dimensi, menyelaraskan data genotipe, filogenetik, dan fenotipik. Selain itu, prediksi tentang evolusi BAL ini juga memiliki konsekuensi penting dalam pengembangan skema taksonomi genera dan famili “alami” (yaitu, mencerminkan hubungan evolusioner) (Makarova et al., 2006; Salvetti et al., 2013).

Pendekatan berbasis urutan genom dapat menjadi penyangga terhadap peristiwa evolusioner yang mendistorsi di satu lokus; penyelidikan beberapa urutan dapat mengarah pada pemahaman lebih lanjut dari peristiwa, yang terjadi selama evolusi suatu organisme (Konstantinidis dan Tiedje, 2005).

C. Kultur Starter Bakteri Asam Laktat dan Industri

Sejak awal 1900-an telah terjadi peningkatan yang nyata di seluruh dunia dalam produksi industri keju dan susu fermentasi. Teknologi proses telah berkembang ke arah peningkatan mekanisasi, peningkatan kapasitas produksi, mempersingkat waktu pemrosesan, dan pemrosesan susu dalam jumlah yang lebih besar. Susu fermentasi dapat digunakan di lebih dari 1.000 produk untuk dan mempengaruhi rasa, tekstur, dan kualitas produk akhir. Semua itu tercermin dalam besarnya tuntutan atas kultur starter, aktivitasnya, stabilitas kualitasnya, dan resistensinya terhadap bakteriofag. Proses menghasilkan produk pangan berbasis mikroba atau produk fermentasi menuntut pemahaman yang tepat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi spesies dan strain starter tertentu, agar produksi dapat dimaksimalkan.

Starter merupakan bahan tambahan yang digunakan sebagai pemantik pada tahap awal proses fermentasi. Bahan tersebut terdiri atas biakan mikroba fermenter tertentu yang ditumbuhkan di dalam medium sebagai substrat untuk menghasilkan produk tertentu. Produk fermentasi yang menggunakan starter pada prosesnya disebut fermentasi tidak spontan, yaitu fermentasi yang terjadi terhadap bahan yang disiapkan ditambahkan mikroorganisme pelaku fermentasi dalam bentuk starter atau yang banyak dikenal oleh masyarakat awam sebagai ragi. Pada media yang disiapkan mikroorganisme tersebut, akan tumbuh dan berkembangbiak secara aktif dan mengubah substrat yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan.

Bioalkohol diproduksi terutama menggunakan dua pendekatan, yaitu fermentasi langsung dan fermentasi tidak langsung. Fermentasi langsung melibatkan identifikasi bahan tanaman awal, isolasi dan pengembangan strain bakteri dan cendawan, dan desain protokol yang tepat untuk konversi yang efisien dari bahan tanaman menjadi monomer gula, dan kemudian gula diubah menjadi etanol oleh ragi atau

strain bakteri rekayasa genetika. Fermentasi tidak langsung melibatkan pirolisis bahan baku, diikuti dengan konversi gas yang dihasilkan menjadi alkohol menggunakan bakteri asetogenik (Elshahed, 2010).

Starter yang digunakan dalam produk susu dapat dibagi menjadi starter mesofilik dan termofilik sesuai dengan suhu pertumbuhan optimum. Kultur mesofilik tumbuh dalam suhu 10–40°C, dengan optimum sekitar 30°C. Kultur starter termofilik memiliki suhu pertumbuhan optimum antara 40°C dan 50°C.


Kultur starter mesofilik, terdiri dari lactococci pembentuk asam dan seringkali memiliki rasa produsen, digunakan dalam produksi banyak varietas keju, produk susu fermentasi, dan mentega krim matang. [1] Starter termofilik digunakan untuk yoghurt dan untuk varietas keju dengan suhu memasak yang tinggi (Emmental, Gruyère, Comte, Grana). Kultur starter, biasanya terdiri dari spesies yang berbeda atau dari beberapa galur satu spesies. Starter dengan komposisi berbeda dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. *Single-strain starter*: starter yang terdiri satu galur dari spesies tertentu.
2. *Multiple-strain starter (defined strain starter)*: starter yang terdiri galur berbeda dari satu spesies yang diketahui.
3. *Multiple-mixed-strain starter*: starter yang terdiri atas *spesies* dan/atau strain yang berbeda, namun komposisi tersebut diketahui.
4. *Raw mixed-strain starter*: starter yang terdiri atas *spesies* dan/atau strain yang berbeda, dan sebagian atau seluruhnya tidak diketahui. *Raw mixed-strain starter* tradisional banyak digunakan, terutama dalam produk susu fermentasi dan mentega krim. Sebagaimana kategori starter keju, mengarah sebagai *Multiple-mixed-strain starter*. Kultur starter pada dasarnya diberikan dengan berbagai tujuan sebagai berikut.
 - a. Produksi asam: pembentukan gel; sineresis whey untuk tekstur; Pengawetan pangan; membantu dalam pengembangan rasa.
 - b. Rasa: Pembentukan senyawa rasa, seperti diacetyl dan asetaldehida.
 - c. Pembentukan gas: pembentukan mata pada keju tertentu; produksi tekstur terbuka, misalnya keju berserat biru.

Kelompok bakteri terpenting yang digunakan sebagai kultur starter adalah BAL. Faktanya, hanya sedikit bakteri asam laktat yang tersedia secara komersial sebagai kultur starter. Secara umum, mereka adalah Gram positif, heterotrof katalase negatif yang memetabolisme gula baik melalui metabolisme homofermentatif atau heterofermentatif. BAL tumbuh pada kisaran suhu yang luas, meskipun sebagian besar BAL adalah mesofil atau termofil sedang (dengan suhu optimum sekitar 30°C dan 42°C, masing-masing).

Demikian juga, mereka bervariasi sehubungan dengan toleransi garam, osmotolerance, aerobiosis, dan kondisi lingkungan lainnya, yang sebagian menjelaskan keragaman habitat yang terkait dengan mereka. Meskipun dua belas genera BAL sekarang dikenal, kultur starter BAL termasuk salah satu dari empat genera, dengan BAL susu mewakili kelompok terbesar. Yang terakhir termasuk spesies *Lactococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Lactobacillus*. Pemula susu umumnya dikelompokkan sebagai mesofil atau termofil, tergantung pada aplikasi produk, tetapi bahkan penunjukan ini menjadi agak kabur. Faktanya, strain termofilik dari *Streptococcus thermophilus* sekarang kadang-kadang dimasukkan dalam kultur starter mesofilik (misalnya, untuk keju Cheddar), dan *Lactococcus lactis* subsp mesofilik. *Lactis* kadang-kadang tergabung dalam kultur termofilik (misalnya, untuk keju Mozzarella).


KOMPONEN ANTI MIKROBA DARI BAKTERI ASAM LAKTAT



Bakteri Asam Laktat (BAL) telah digunakan pada skala rumah tangga sejak zaman kuno karena kemampuannya untuk memproduksi dan mengawetkan makanan. BAL telah terbukti lebih unggul dari mikroorganisme lain dalam melakoni peran pengawet makanan dan pakan, meskipun organisme lain juga memiliki peran serupa dalam beberapa produk pangan lainnya. BAL merupakan kelompok bakteri yang tersebar luas di seluruh alam, termasuk menjadi konstituen penting dari mikroflora normal yang menentukan status kesehatan manusia dan hewan. Dalam kelompok BAL, genus *Lactobacillus* adalah kelompok bakteri yang paling banyak ditemui di antara probiotik karena anggota genus ini menunjukkan aktivitas antimikroba yang dimodulasi oleh senyawa-senyawa aktif yang dihasilkan, sebagaimana pada Gambar 2.1. Mereka menghasilkan ragam metabolit antimikroba, termasuk asam organik, senyawa organik lainnya, hidrogen peroksida, dan bakteriosin.

BAL *food grade* memenuhi persyaratan sebagai biopreservatif makanan mikroba yang ideal karena terbukti tidak beracun bagi manusia, tidak mengubah sifat nutrisi makanan, efektif pada konsentrasi rendah, aktif dalam penyimpanan berpendingin, dan mereka bahkan dianggap memiliki efek meningkatkan kesehatan. Ulasan ini pertamanya akan memberikan deskripsi singkat tentang berat molekul rendah, komponen metabolit antimikroba organik yang diproduksi oleh BAL, diikuti dengan gambaran yang lebih rinci tentang bakteriosin yang lebih kompleks yang dihasilkan oleh BAL. Bakteriosin telah mendapat perhatian yang cukup besar karena aktivitas antibakterinya yang kuat

yang berlaku untuk bidang makanan dan kesehatan, dan juga karena mereka merupakan sarana untuk memerangi bakteri yang resisten terhadap antibiotik.



Gambar 2.1 Kelompok Senyawa antimikroba yang Dihasilkan oleh BAL

A. Senyawa Organik Berat Molekul Rendah dengan Aktivitas Antimikroba

1. Asam Organik

Prinsip utama pelibatan BAL dalam pengawetan makanan dan pakan adalah kemampuannya untuk menghasilkan asam organik berupa asam laktat. Selama pertumbuhan, gula sebagian besar diubah menjadi asam laktat, yang memberikan sebagian besar kapasitas penghambatan terhadap mikroorganisme. Ketika asam laktat diproduksi, pH dalam media fermentasi menurun dan akibatnya asam organik atau asam lemak kecil, (*Small Fatty Acids* = SFA) menjadi tidak terdisosiasi. Asam yang tidak terdisosiasi (SFAs) adalah fitur antimikroba utama dari BAL. Telah ditunjukkan bahwa SFAs yang tidak terdisosiasi menargetkan dan menembus membran bakteri, menyebabkan anion asam lemah menumpuk di sitoplasma, sehingga mempengaruhi proses metabolisme. Selanjutnya, terjadi penghambatan pertumbuhan dan mikroorganisme akhirnya mati. BAL homofermentatif fakultatif juga menghasilkan

asam selain asam laktat (misalnya, asam asetat dan asam format) dalam kondisi pertumbuhan tertentu, seperti tidak adanya glukosa dan adanya karbohidrat yang dapat difermentasi lainnya. Tak satu pun dari asam ini memiliki aktivitas antimikroba sekuat asam laktat. Selain itu, metabolit antimikroba minor lainnya dapat diproduksi, seperti alkohol dan aldehida, tetapi mereka tentu saja tidak terlalu penting untuk potensi antimikroba BAL. Dalam BAL heterofermentatif, asam laktat merupakan proporsi yang lebih rendah dari asam yang dihasilkan selama pertumbuhan, sedangkan asam asetat lebih melimpah.

2. Reuterin dan Reuterisiklin

Senyawa antimikroba reuterin yang diturunkan dari gliserol telah terbukti diproduksi oleh sejumlah lactobacilli. Selain *Lactobacillus reuteri*, spesies seperti *L. buchneri*, *L. collinoides* (Claisse dan Lonvaud-Funel 2000), dan *L. coryniformis* (Martin et al., 2005; Morita et al., 2008) juga telah dilaporkan menghasilkan senyawa antimikroba jenis ini.

Reuterin awalnya dilaporkan diproduksi oleh *L. reuteri*, yang merupakan bagian dari flora bakteri endogen, baik pada manusia maupun hewan. Ini adalah agen antimikroba spektrum luas dan aktif melawan bakteri Gram positif dan Gram negatif, termasuk enteropatogen, ragi, jamur, protozoa, dan virus. Reuterin diproduksi dalam kondisi anaerob, dan produksi ditingkatkan dengan adanya gliserol (Lindgren et al., 1990). Reuterin terbukti menjadi metabolit perantara yang terlibat dalam jalur dua langkah di mana gliserol pertama kali didehidrasi menjadi reuterin, beberapa di antaranya kemudian direduksi menjadi 1,3-propanediol (Sriramulu et al., 2008). Aktivitas antimikrobanya terhadap berbagai mikroorganisme dikaitkan dengan campuran monomer, monomer terhidrasi, dan dimer siklik β -hidroksipropionik aldehida.

Telah dilaporkan bahwa reuterin mampu menghambat pertumbuhan *Aspergillus* dan *Fusarium*, dan karena itu mungkin berperan dalam mencegah pembentukan mikotoksin dalam makanan dan pakan yang difermentasi. Beberapa tahun yang lalu, zat antimikroba baru diisolasi dan diberi nama reutericyclin yang menunjukkan spektrum antibakteri yang luas, termasuk *Lactobacillus* spp., *Bacillus subtilis*, *B. cereus*, *Enterococcus faecalis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Listeria innocua*, tetapi tidak

menargetkan Gram negatif. bakteri (Höltzel et al., 2000; Gänzle, 2004). Reutericyclin awalnya disebut sebagai antibiotik yang diproduksi oleh *Lb. reuteri* yang diisolasi dari penghuni pertama (Höltzel et al., 2000).

Reutericyclin dicirikan sebagai asam tetramic terasilasi N yang sangat hidrofobik bermuatan negatif dengan massa molekul 349 Da (Höltzel et al., 2000). Efek bakteristatik atau bakterisida dari reutericyclin, dikaitkan dengan aktivitasnya sebagai ionofor proton pada bakteri target, dan berbagai organisme pembusuk dan patogen berbasis makanan ditemukan dipengaruhi oleh reutericyclin. Telah disarankan bahwa reutericyclin dan galur *L. reuteri*, sebagai galur penghasil reuterisiklin, mungkin memiliki potensi untuk diaplikasikan dalam biopreservasi makanan. Namun, hal ini masih tetap membutuhkan penelitian lanjut.

3. Peptida antijamur dari BAL

Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa berbagai macam BAL menghasilkan senyawa antijamur yang berbeda dari asam organik, namun senyawa tersebut sulit diisolasi dan dikarakterisasi. Hal ini mungkin karena konsentrasinya yang rendah, komposisi kimia, keragaman dan ukuran, aktivitas spesifik yang rendah, stabilitas, menjadi molekul yang aktif secara sinergis dengan aktivitas individu yang rendah, atau alasan lain yang tidak diketahui. Schnürer et al. (2005) mampu mengisolasi dan mengkarakterisasi peptida antijamur tersebut dari berbagai BAL. Mereka menyaring lebih dari 1.200 isolat BAL yang diisolasi dari lingkungan yang berbeda untuk aktivitas antijamur. Beberapa isolat menghambat pertumbuhan kapang seperti spesies *Aspergillus*, *Penicillium commune*, dan *Fusarium sporotrichioides*, serta pertumbuhan khamir *Rhodotorula mucilaginosa*. Isolat BAL bunga diidentifikasi sebagai *L. coryniformis*, *L. plantarum*, dan *Pediococcus pentosaceus*. Pemurnian menunjukkan bahwa aktivitas yang ditemukan dalam media pertumbuhan dapat dipisahkan menjadi beberapa fraksi aktif, menunjukkan kompleksitas dan keragaman senyawa tersebut yang tinggi. Beberapa senyawa antijamur yang diisolasi dari *L. strain plantarum* diidentifikasi sebagai siklo(l-Phe-l-Pro), siklo(l-Phe-trans-4-OH-l-Pro), dan asam 3-fenillaktat (rasio isomer l/d, 9: 1) (Strom et al., 2002), dan nilai konsentrasi hambat minimal (MIC) terhadap *A. fumigatus* dan *P.*

roqueforti adalah 20 mg ml⁻¹ untuk siklo (l-Phe-l-Pro) dan 7,5 mg ml⁻¹ untuk asam fenillaktat. Kombinasi senyawa antijamur menunjukkan efek sinergis yang lemah. Dipeptida siklik siklo(l-Phe-l-Pro) dan siklo(l-Phe-perangkap-4-OH-l-Pro) juga dilaporkan memiliki beberapa aktivitas antijamur. Dalam studi lain yang diterbitkan oleh kelompok yang sama, empat senyawa asam 3-hidroksilemak antijamur tambahan ditemukan diproduksi oleh isolat *Lb* yang berbeda. *plantarum* (Sjogren et al., 2003). Keempat entitas tersebut adalah asam 3-(R)-hidroksidekanoat, asam 3-hidroksi-5-cis-dodekenoat, asam 3-(R)-hidroksidodekanoat, dan asam 3-(R)-hidroksitetradekanoat (Sjogren et al., 2003). Campuran rasemat dari asam lemak 3-hidroksi jenuh menghambat pertumbuhan beberapa kapang dan ragi dengan MIC antara 10 dan 100 g ml⁻¹.

Telah disarankan bahwa senyawa kimia ini dapat digunakan sebagai pengawet makanan, namun dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut mengenai aspek keamanan kesehatan, serta efektivitasnya. Bahkan belum diketahui apakah senyawa antijamur tersebut dibuat dalam makanan fermentasi dan komoditas pakan, atau apakah mereka dibuat dalam jumlah yang cukup untuk memberikan efek antimikroba pada jamur, ragi, atau bakteri.

B. Bakteriosin

Bakteriosin adalah peptida yang disintesis secara ribosomal dengan aktivitas antimikroba. Bakteri Gram positif dan khususnya BAL, menghasilkan bakteriosin dengan spesifisitas target yang lebih luas dibandingkan senyawa yang dihasilkan oleh bakteri Gram negatif. Ini sebagian mengapa bakteriosin BAL telah menerima banyak perhatian selama beberapa dekade terakhir.

Klasifikasi bakteriosin telah lama menjadi bahan diskusi atas keragamannya, tetapi ada konsensus umum untuk dua kelas utama bakteriosin yang dihasilkan oleh BAL, yaitu lantibiotik (Kelas I) dan nonlantibiotik (Kelas II). Selain itu, bakteriosin siklik telah disarankan sebagai terdiri dari kelas mereka sendiri dan bahwa peptida/protein dengan aktivitas litik harus dikelompokkan dalam kelas yang terpisah. Akhirnya, beberapa peptida antimikroba telah terbukti diproduksi oleh degradasi proteolitik spesifik dari protein yang lebih besar.

1. Lantibiotik (Bakteriosin Kelas I)

Di antara bakteriosin pertama yang diidentifikasi dan dikarakterisasi adalah lantibiotik nisin. Senyawa tersebut pertama kali diidentifikasi pada 1920-an, tetapi baru pada tahun 1944 struktur utamanya ditentukan. Pada tahun 1988, sintesis kimia nisin berhasil dicapai, menghasilkan konfirmasi struktur yang diusulkan (Fukase et al., 1988). Biosintesis nisin dilakukan pada waktu yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, nisin dan sejenisnya mendapat banyak perhatian karena kemungkinan penerapannya dan juga karena cara kerjanya yang telah terungkap.

Lantibiotik diketahui mengalami modifikasi pasca translasi dan penamaannya sesuai dengan residu lantionin/metillanthion yang merupakan konstituen dari rantai polipeptidanya. Modifikasi senyawa ini dibuat dengan mendehidrasi residu serin dan/atau treonin tertentu masing-masing menjadi didehidroala sembilan dan didehidrobutirin. Beberapa residu yang dimodifikasi secara kovalen terkait dengan belerang sistein untuk membentuk lantionin dan metil-lantionin dalam lantibiotik dewasa. Sejumlah modifikasi tambahan juga dapat terjadi pada lantibiotik.

Lantibiotik dibagi menjadi dua subkelas: tipe A dan tipe B (Jung, 1991). Lantibiotik tipe A, yang meliputi nisin, galidermin, dan epidermin bersifat memanjang, berat molekul rendah, amfifilik, memiliki membran yang berbentuk ulir depolarisasi dan permeabilisasi peptida kationik hingga 34 residu, serta bekerja melalui penghancuran membran bakteri sebagai targetnya, yang akhirnya menyebabkan kematian sel. Secara struktural, kumpulan jembatan (Me-) Lan tampak sangat mirip di antara lantibiotik tipe A. Lantibiotik tipe B termasuk lantibiotik yang lebih pendek (hingga 19 residu) yang memiliki struktur globular, dan beberapa bertindak dengan menghambat aktivitas enzim yang berdampak pada sintesis dinding sel. Lantibiotik tipe B termasuk mersacidin, actagardine dan duramycins. Karena jumlah dan keragaman lantibiotik terus meningkat, beberapa lantibiotik baru yang tidak sesuai dengan klasifikasi sederhana tersebut, pada tahun 2005, van der Donk et al. membagi kelompok A menjadi dua subkelompok lebih lanjut (AI dan AII) berdasarkan sistem modifikasi, di mana Kelompok AI dimodifikasi oleh dua enzim yang berbeda (Lan B dan C), sedangkan

lantibiotik yang dimodifikasi oleh satu enzim (LanM) berada dalam kelompok AII (Chatterjee et al., 2006). Mereka juga memperkenalkan kelompok terpisah yang terdiri dari lantibiotik dua peptida (Chatterjee et al., 2006). Pada saat yang sama, skema klasifikasi yang direvisi berdasarkan homologi urutan prototipe lantibiotik seperti nisin dan lacticin 481 disarankan oleh Cotter et al. (2005b). Pada tahun 2009, skema klasifikasi yang direvisi diperkenalkan (Piper et al., 2009), tetapi kontroversi klasifikasi masih belum tuntas.

Kelompok lacticin 482 terdiri dari setidaknya 16 anggota dan telah ditinjau sebelumnya (Dufour et al., 2007). Kelompok lantibiotik homolog struktural ini telah diisolasi dari beragam bakteri kelompok BAL, termasuk isolat *Butyrivibrio*, *Kocuria varians*, *Clostridium nexile*, *Butyrivibrio fibrisolvens*. Kelompok lantibiotik 481 disintesis dengan didahului oleh pembentukan glisin ganda dan disekresikan oleh transporter ABC khusus yang awalnya terbukti sebagai sistem sekresi utama di antara bakteriosin Kelas II (Havarstein et al., 1995). Glisin ganda dan transporter ABC khusus juga telah diidentifikasi pada bakteri Gram negatif.

Daftar lantibiotik yang diisolasi dari BAL disajikan pada Tabel 2.1. Di antara enterococci, satu-satunya lantibiotik yang ditemukan sejauh ini adalah sitolisin, dan bakteriosin ini telah terbukti bersifat hemolitik.

Tabel 2.1 Kelas Bacteriocins yang diproduksi oleh BAL

Kelas	Sub-Kelas	Deskripsi
Kelas I (lantibiotik)	A (1)	<i>Elongated, cationic, membrane active, slight (+) or (-) 2, net charge</i>
	A (2)	<i>A(2) Elongated, cationic, membrane active, highly (-) net charge</i>
	B	<i>B Globular, inhibit enzyme activity</i>
Kelas II	Ila	Kecil (<10 kDa), sedang (100°C) hingga tinggi (121°C) stabil pada suhu tinggi, Peptida aktif membran yang tidak mengandung lanthionine, peptida <i>Listeria</i> aktif dengan -Y-G-N-G-V-X-C- <i>near the amino terminus</i>
	Ilb	Bakteriosin 2 peptida
	Ilc	Bakteriosin peptida lainnya
Kelas III		Besar (>,30 kDa) protein labil panas
Kelas IV		Bakteriosin kompleks: protein dengan lipid dan/atau karbohidrat

a. Gen dan Fungsinya

Mesin biosintesis lantibiotik dikodekan oleh banyak gen yang terletak di operon. Selain itu, pada beberapa lantibiotik, sintesisnya berada di bawah kendali sistem regulasi yang dikodekan oleh gen tambahan. Gen biosintetik diatur dalam operon yang dapat bervariasi dalam cara gen dilokalisasi secara individual, tetapi mereka dikelompokkan pada genom dan gen yang terlibat sangat mirip dengan hanya beberapa perbedaan kecil. Mekanisme perlindungan diri dari produsen dapat mencakup lebih dari satu sistem perlindungan, meskipun dalam beberapa lantibiotik seperti nisin, kekebalan membentuk dua mekanisme, sistem pengangkut mirip ABC yang dikodekan oleh tiga gen dan/atau oleh satu kekebalan khusus gen (*nisI*). Juga harus disebutkan bahwa mesin biosintetik lacticin 481 (Xie et al., 2004) dan nisin (Li et al., 2006) telah dilarutkan secara *in vitro* dengan enzim yang dimurnikan.

b. Modifikasi Lantibiotik

Lantibiotik kelompok A dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan mekanisme modifikasi enzimatik (Chatterjee et al., 2006). Di antara II=antibiotik kelas I, enzim dehidratase (LanB) mengubah Ser dan Thr yang ada dalam peptida prekursor menjadi dehydroalanine (Dha) dan dehydrobutyrine (Dhb), masing-masing. Reaksi ini diikuti dengan penambahan Cys tiol ke Dha/Dhb untuk membentuk ikatan kovalen tioeter yang dikatalisis oleh LanC cyclases. Residu asam amino terakhir yang dimodifikasi adalah lanthionine (Dha dan Cys) dan methyllanthionine (Dhb dan Cysr). Lantibiotik kelas II diproduksi oleh enzim pengubah LanM bifungsional, yang bertanggung jawab atas dehidrasi dan siklisasi (Xie et al., 2004). C-terminus protein LanM memiliki urutan homologi dengan enzim LanC, tetapi LanM tidak menunjukkan homologi yang signifikan dengan enzim LanB. Domain mirip LanC dalam protein LanM telah dipelajari dengan analisis struktural dan mutagenesis, yang telah memberikan wawasan tentang langkah-langkah siklisasi dalam biosintesis lantibiotik (Li dan van der Donk 2007). Reaksi dehidrasi oleh sintetase masih belum dipahami hingga saat ini.

Polipeptida yang disintesis secara ribosomal hanya mengandung asam amino l-isoform dan laktosin S lantibiotik yang mengandung tiga residu d-alanin (Skaugen et al., 1994). Residu ini adalah residu asam d-amino pertama dalam protein bakteri yang disintesis secara ribosom yang ditemukan. Dua-peptida lantibiotik laktatin 3147 juga memiliki residu d-alanin tersebut.

c. Resistensi Lantibiotik

Bakteri yang menghasilkan bakteriosin harus melindungi dirinya sendiri terhadap bakteriosinnya sendiri, dan perlindungan diri tersebut disebut sebagai kekebalan. Sistem kekebalan khusus telah diidentifikasi untuk lantibiotik, tetapi kecuali untuk kekebalan nisin, sedikit yang diketahui bagaimana kekebalannya bekerja.

Dalam nisin dan senyawa sejenisnya, kekebalan produsen dapat membentuk dua mekanisme: sistem transporter seperti ABC, yang dikodekan oleh tiga gen *nisEFG*, dan satu gen kekebalan khusus (*nisI*). *nisEFG* adalah dua komponen yang tertanam dalam membran, dan *nisG* mengkodekan entitas sitoplasma dari transporter ABC. Protein kekebalan NisI diduga terletak di permukaan luar membran sitoplasma dan telah terbukti menjadi lipoprotein. Studi fungsional telah menunjukkan bahwa kedua sistem kekebalan diperlukan untuk mencapai perlindungan maksimal. Sistem kekebalan serupa telah ditunjukkan untuk tibatik lainnya, termasuk lantibiotik dua peptida (Draper et al., 2009), tetapi wawasan terperinci tentang bagaimana aktivitas kekebalan lantibiotik BAL bekerja belum ditentukan.

Ada bukti eksperimental yang menunjukkan bahwa domain terminal-C NisI terlibat dalam pengikatan nisin (Koponen et al., 2004) dan bahwa interaksi ini melibatkan NisEFG (Takala dan Saris, 2006). Sebuah makalah baru-baru ini menunjukkan bahwa loop E dari protein NukF, yang merupakan bagian dari fungsi kekebalan transporter ABC dari nukacin-IAK-1, sangat penting untuk fungsi kekebalan (Okuda et al., 2010). Selain sistem kekebalan khusus, sejumlah gen termasuk mimikri kekebalan dari gen homolog kekebalan telah terbukti menurunkan kerentanan terhadap lantibiotik (Draper et al., 2009). Kehadiran gen tersebut sebagian dapat menjelaskan mengapa konsentrasi penghambatan lantibiotik bervariasi antara dan di dalam spesies bakteri.

d. Ragam, Struktur, dan Mekanisme Aksi Lantibiotik

Lantibiotik ditemukan dalam genera dan spesies bakteri Gram positif yang berbeda dan banyak varian lantibiotik pasti telah disebarluaskan melalui berbagai cara transfer gen horizontal dan perlahan berkembang menjadi varian baru. Hal ini terutama ditunjukkan oleh nisin, di mana banyak lantibiotik mirip nisin telah diisolasi dari bakteri yang berbeda (Tabel 2.1). Struktur beberapa lantibiotik BAL diketahui dan sebagian besar perhatian telah diberikan pada nisin, lacticin 481, dan lacticin 3147.

Lacticin 481, yang merupakan bakteriosin yang diproduksi oleh *Lactococcus lactis* ssp. *lactis*, mengandung 27 residu asam amino dan residu dehydrobutyrine yang dimodifikasi pascatranslasi dan lanthio sembilan yang menjembatani tioeter dan 3-metillantionin. Lacticin 481 termasuk dalam kelompok lantibiotik yang berbeda secara struktural yang juga terdiri dari streptokokus A-FF22 dan berbagai salivarin (Tabel 2.1). Spektroskopi resonansi magnetik nuklir multidimensi (NMR) dikombinasikan dengan modifikasi kimia dan urutan peptida mengidentifikasi pola jembatan lantionin dan struktur kedua peptida (A1 dan A2) dari lacticin 3147 (Martin et al., 2004). Spektroskopi NMR juga digunakan untuk analisis konformasi kedua peptida. Ditunjukkan bahwa struktur peptida A1 mengadopsi struktur tipe B mercacidin globular, sedangkan peptida A2 mengadopsi struktur memanjang -heliks, mungkin mirip dengan laktosin S, d-alanin lain yang dimodifikasi, lantibiotik satu peptida. Rasio molar dua peptida untuk aktivitas antimikroba yang optimal adalah 1:1, dan telah disarankan bahwa peran peptida A1 adalah pengenalan target lipid II sedangkan peptida A2 adalah bagian pembentuk pori dari lacticin 3147 (Martin et al., 2004). Juga telah ditunjukkan bahwa aktivitas berurutan dari dua peptida diperlukan. Peptida A1 harus terikat pada target sebelum aksi peptida A2, yang mengarah pada depolarisasi membran bakteri target (Martin et al., 2004). Ketika dua peptida digabungkan, pembunuhan bakteri target terjadi pada konsentrasi nanomolar. Juga harus disebutkan bahwa studi struktural juga telah dilakukan pada sejumlah lantibiotik dari non-BAL dan struktur ini juga telah menjelaskan fitur struktural dari BAL (Abriouel et al., 2011).

2. Nonlantibiotik (Kelas II)

Bakteriosin kelas II merupakan kelompok besar dan beragam peptida antimikroba yang dibagi menjadi beberapa subkelompok yang berbeda. Seperti Kelas I, Kelas II juga terdiri dari peptida kecil yang stabil terhadap panas, kationik, dan hidrofobik/amfifilik.

Dalam ulasan ini bakteriosin Kelas II dibagi atas ke dalam subkelas berikut: bakteriosin IIA, bakteriosin seperti pediosin (IIB), bakteriosin dua peptida (IIC), bakteriosin yang tidak sesuai dengan pengelompokan ini (IID), bakteriosin tanpa pemimpin (IIE), bakteriosin siklik.

a. Bakteriosin IIA

Ini adalah subkelas terbesar (Tabel 2.2). Mereka adalah kelompok peptida yang terdefinisi dengan baik, baik oleh strukturnya maupun oleh cara kerjanya dan spesifisitas targetnya. Banyak ulasan telah membahas peptida ini dan beberapa ulasan baru-baru ini secara khusus berfokus pada mereka (Nissen-Meyer et al., 2009). Bakteriosin ini memiliki panjang antara 36 (plantarisin C19) dan 49 (ubericin A) residu asam amino.

Tabel 2.2 Contoh Bacteriocins Kelas I (Lantibiotik) yang diproduksi oleh BAL.

Lantibiotik	Strain penghasil	Aktivitas antimikroba
Type A (I) Mutacin B-Ny266 Mutacin 1140 Nisin A Nizin Z	<i>Streptococcus mutans</i> Ny266, <i>S. mutans</i> JH1000, <i>Lactococcus lactis</i> dan beberapa strain lainnya misalnya NIZOR5, 6F3, NCFB894, ATCC11454 <i>Lc. lactis</i> , dan beberapa strain lainnya misalnya N8, NIZO22186	<i>Lactococcus</i> spp., <i>Streptococcus</i> spp., <i>Staphylococcus</i> spp., <i>Micrococcus</i> spp., <i>Pediococcus</i> spp., <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Listeria</i> spp., <i>Mycobacterium</i> spp., <i>Clostridium</i> spp. (+ spores), <i>Bacillus</i> spp. (+ spores)
Type A (II) Carnocin U149 Cytolysin Lacticin 481 Lactocin S Salivaricin A Streptococcin	<i>Carnobacterium piscicola</i> U149 <i>Enterococcus faecalis</i> DS16 <i>Lc. lactis</i> CNRZ481 <i>Lactobacillus sake</i> L45 <i>S. salivarius</i> 20P3 <i>S. pyogenes</i> FF22	<i>Carnobacterium</i> spp., <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Pediococcus</i> spp., <i>Lactococcus</i> spp. <i>Lactobacillus</i> spp., <i>Pediococcus</i> spp., and <i>Leuconostoc</i> spp. <i>Micrococcus luteus</i>

1) Struktur dan Ragam Bakteriosin IIa

Berdasarkan urutan asam amino dari 28 bakteriosin Kelas IIa, dua wilayah fungsional telah diidentifikasi:

- a) wilayah terminal-N positif dan hidrofilik yang sangat terkonservasi (hingga 17 residu asam amino); dan
- b) C-terminal wilayah hidrofobik yang kurang terkonservasi dengan baik.

Telah diketahui sejak awal bahwa daerah terminal-N yang sangat terkonservasi dengan jembatan Cys-Cys-nya diperlukan untuk aktivitas antimikroba. Juga telah disarankan bahwa Kelas IIa harus dibagi menjadi tiga atau empat kelompok yang berbeda berdasarkan kesamaan urutan dan perbedaan dalam domain terminal-C yang lebih bervariasi (Johnsen et al., 2005). Pengelompokan ini didasarkan pada panjang, residu triptofan, atau jembatan sistein yang ada di bagian terminal-C peptida, serta analisis struktural (Tabel 2.2). Urutan pemimpin telah dicirikan untuk 27 bakteriosin Kelas IIa, dan mereka semua membawa urutan pemimpin yang menjaga pra-bakteriosin agar tidak menjadi beracun, tetapi dihilangkan selama sekresi. Urutan pemimpin glisin ganda ditemukan di 22 bakteriosin Kelas IIa, sementara hanya enam yang memiliki pemimpin bergantung detik.

Beberapa struktur bakteriosin Kelas IIa telah ditentukan (Haugen et al., 2005), dan elemen struktural yang umum untuk bakteriosin ini adalah domain -sheet terminal-N dengan Cys-Jembatan Cys berengsel ke struktur -heliks yang berakhir dengan domain jepit rambut di terminal-C dan ujung terminal-C yang fleksibel. Juga sangat menarik untuk mengamati bagaimana jenis bakteriosin ini disebarluaskan di antara banyak genera BAL, tetapi belum ditemukan di lactococci.

2) Resistensi Bakteriosin IIa

Seperti semua bakteriosin, bakteriosin mirip pediosin juga memiliki protein resisten khusus yang melindungi produsen agar tidak terbunuh. Protein resisten tersebut, bervariasi antara 88 dan 118 residu asam amino, tetapi ada lebih banyak variasi secara signifikan dalam struktur primernya daripada diamati di antara bakteriosin khusus mereka (Drider et al., 2006). Dengan penyelarasan berpasangan, ditemukan homologi

urutan 3-100%; yang paling jauh adalah kekebalan carnobacteriocin B2 dan plantaricin 423, sedangkan protein kekebalan pediocin PA-1 dan koagulin adalah identik.

Sejumlah penelitian telah dilakukan pada protein ini, termasuk studi tentang itas spesifik (imunitas silang) dan analisis fungsional struktural, termasuk peran mereka dalam mekanisme yang melindungi produsen bakteriosin (Martin-Visscher et al., 2008a). Sangat mengejutkan untuk mengamati spesifisitas kekebalan, dan kekebalan silang hampir tidak terlihat di antara berbagai sistem Kelas IIA.

Struktur kimia dari beberapa protein kekebalan Kelas IIA telah diselesaikan. Spektroskopi NMR atau kristalografi sinar-X telah dilakukan pada lima protein kekebalan: enterocin A (EntA-Im) (Johnsen et al., 2005a), piscicolin 126 (PisI), carnobacteriocin B2 (ImB2), sakacin P, dan curvacin A (Martin-Visscher et al., 2008a). Dalam larutan berair, mereka diatur menjadi bundel empat heliks antiparalel globular struktur.

Dibandingkan dengan ImB2 dan EntA-Im, protein kekebalan PisI memiliki ujung-N yang jauh lebih panjang dan lebih fleksibel, tetapi ujung-C yang lebih pendek. Tidak ada interaksi langsung antara bakteriosin dan protein kekebalan yang diamati oleh NMR, baik dalam larutan berair maupun dalam pelarut yang meniru membran. Hal ini juga ditemukan pada protein imunitas laktokoksin A, suatu sistem yang cukup berbeda dari pediosin. Namun, telah menunjukkan bahwa protein kekebalan tersebut benar-benar mengikat kuat di kompleks dengan bakteriosin dan reseptor, membentuk tri- kompleks ketat yang mencegah bakteriosin membunuh sel target (Diep et al., 2007). Juga telah diamati bahwa bagian terminal-C dari bakteriosin dan bagian terminal-C dari protein kekebalan khusus mereka terlibat dalam interaksi spesifik dan mungkin tidak langsung mereka (Nissen-Meyer et al., 2009).

a) Bakteriosin Dua Peptida

Fitur unik dari bakteriosin ini adalah bahwa dua peptida diperlukan untuk mengekspresikan aktivitas antimikroba atau memiliki aktivitas antimikroba yang optimal. Aktivitas optimal biasanya diperoleh ketika dua peptida bekerja bersama dalam rasio molar 1:1. Untuk menentukan bakteriosin dua peptida, hanya satu protein kekebalan yang diperlukan untuk melindungi produsen dari bunuh diri.

Semua bakteriosin dua-peptida yang diidentifikasi sejauh ini, disintesis dengan pemimpin glisin ganda dan disekresikan oleh transporter ABC khusus dengan domain proteolitik terminal-N yang khas. Orang bisa berspekulasi apakah bakteriosin dua peptida adalah hasil dari fusi dua bakteriosin tunggal dan apakah dua gen kekebalan individu telah digantikan oleh satu gen.

(1) Kekebalan Bakteriosin Dua Peptida

Protein kekebalan dari bakteriosin dua peptida secara struktural berbeda dari protein Kelas IIa. Ukurannya bervariasi dari yang terkecil, termofilin 12, yang panjangnya hanya 52 residu asam amino hingga kekebalan plantarisin EF, dengan panjang 257 residu. Analisis struktural *in silico* memperkirakan bahwa mereka dapat berisi dari dua hingga tujuh heliks transmembran dan bahwa protein tertanam dalam membran. Spektroskopi NMR atau analisis kristalografi sinar-X telah dilakukan pada beberapa bakteriosin Kelas IIb dan menegaskan bahwa protein ini disusun menjadi bundel empat heliks (Jeon et al., 2009). Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, kami melaporkan bahwa beberapa lokus bakteriosin mengkode protein yang termasuk dalam keluarga protein Pfam Abi (aksesi Pfam no. PF02517) (Kjos et al., 2010b). Lokus ini juga termasuk bakteriosin dua peptida EF dan JK di lokus plantarisin (*pln*) *Lb. plantarum* (Diep et al., 1996; Anderssen et al., 1998), serta pada lokus *pnc* multi bakteriosin dari *Streptococcus pneumoniae* (Lux et al., 2007), dan lokus streptolisin S (*sag*) yang ditemukan pada streptokokus grup A (Nizet et al., 2000).

Keluarga protein Abi terdiri dari metalloprotease terikat membran diduga. Sementara mereka terlibat dalam penahan membran protein pada eukariota, sedikit diketahui tentang fungsinya pada prokariota (Pei dan Grishin 2001). Beberapa protein seperti Abi (PlnI dalam *Lb. plantarum*, PncO dalam *Str. pneumoniae*, dan SagE dalam *Str. pyogenes*) ditemukan sebagai protein kekebalan-diri bakteriosin dalam hasil eksperimen dari studi knockout gen (Datta et al., 2005). Lux et al. (2007), juga ditunjukkan oleh lokalisasi gen mereka (yaitu, dikaitkan di sebelah gen struktural bakteriosin). Protein mirip Abi terkait bakteriosin lainnya (misalnya, PlnP dan PlnTUVW di *Lb. plantarum* dan PncP di *Str. pneumoniae*) tampaknya bukan protein kekebalan, tetapi memiliki fungsi yang sama sekali tidak diketahui.

(2) Ragam, Struktur, dan Mekanisme Aksi Bakteriosin Dua Peptida

Setidaknya 17 *bakteriosin* dua peptida telah diidentifikasi (Maldonado-Barragán et al., 2009; Hu et al., 2010); beberapa peptida individu telah dilaporkan memiliki aktivitas antimikroba sedikit, tetapi ketika kedua peptida digabungkan aktivitas sinergis yang kuat terlihat. Namun demikian, dalam banyak kasus ketika peptida yang dimurnikan/disintesis telah dipelajari, kedua peptida tampaknya benar-benar dibutuhkan. Beberapa artikel ulasan yang sangat baik telah membahas bakteriosin dua peptida (Oppegard et al., 2007).

Sejumlah penelitian yang berkaitan dengan struktur dan cara kerja telah dilakukan. Mode awal studi aksi menunjukkan bahwa, seperti banyak bakteriosin lainnya, target dari dua bakteriosin peptida adalah membran, di mana mereka menyebabkan kebocoran (Moll et al., 1998; Moll et al., 1999a) kation monovalen, penipisan ATP kolam, disipasi potensial membran, dan akhirnya kematian organisme target yang rentan. Juga telah ditunjukkan bahwa peptida individu mengikat secara ireversibel ke bakteri target dan tidak dapat bermigrasi ke sel lain ketika terikat, yang menunjukkan bahwa peptida mengikat secara independen satu sama lain, meskipun mungkin tidak spesifik karena tidak ada aktivitas antimikroba yang terlihat saat itu.

Dari bakteriosin dua peptida, laktokoksin G adalah yang paling banyak dipelajari dalam hal cara kerjanya. Diyakini bahwa itu membutuhkan target/reseptor, tetapi belum ada yang diidentifikasi. Seperti yang telah disebutkan, kedua peptida beradaptasi dengan struktur heliks amfifilik setelah terpapar pelarut yang meniru membran. Selanjutnya, ketika dua peptida bersama-sama, mereka berinteraksi, entah bagaimana dimanifestasikan oleh penataan tambahan, seperti yang terlihat pada analisis dichroism melingkar (CD).

Dengan menggunakan spektroskopi NMR, telah ditunjukkan bahwa lactococcin G (Rogne et al., 2008), plantaricin EF (Fimland et al., 2008). Studi struktural yang dilakukan dengan bakteriosin dua peptida PlnE/F dan PlnJ/K dalam berbagai kondisi oleh CD menunjukkan bahwa sementara peptida tidak terstruktur dalam kondisi berair, mereka mengadopsi sebagian struktur heliks dengan adanya trifluoroethanol, misel dodecylphosphocholine, dan liposom dioleoylphosphoglycerol (DOPG) bermuatan negatif (Hauge et al., 1999).

Penataan yang ditingkatkan diamati ketika kedua peptida (PlnE dan PlnF atau PlnJ dan PlnK) ditambahkan secara bersamaan ke liposom DOPG. Studi CD awal menunjukkan bahwa kedua peptida brochocin C tampaknya mengadopsi struktur *-sheet* (Garneau et al., 2003); namun, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap struktur lengkap bakteriosin ini dan sejenisnya.

Studi struktural lactococcin G ditindaklanjuti dengan analisis mutasi daerah heliks peptida (Oppegard et al., 2008). Penelitian ini berfokus pada residu triptofan dan tirosin yang lebih banyak ditemukan pada interfase membran pada protein terkait membran (Killian dan von Heijne, 2000) dan pada motif heliks-heliks diduga GXXXG ditemukan keduanya di peptida (G7–G11 dan G18–G22) dan peptida (G18–G22). Studi ini mendukung gagasan bahwa motif heliks dari dua peptida berinteraksi secara heliks dimer, menembus membran yang diapit oleh residu triptofan di interfase membran. Model tersebut juga menunjukkan bahwa N-termini dari peptida diarahkan ke luar ketika mereka tertanam dalam membran. Bagaimana model ini konsisten dengan model reseptor terlalu dini untuk berspekulasi karena reseptor, jika ada, belum diidentifikasi.

b) Bakteriosin tanpa Urutan Leader N-Terminal

Beberapa bakteriosin tanpa pemimpin telah diidentifikasi dalam BAL. Peptida antimikroba tersebut telah dikenal untuk beberapa waktu di non-BAL, seperti stafilokokus dan bakteri asam propionat (Faye et al., 2011), tetapi bakteriosin tersebut sejak itu juga telah diisolasi dari baik *E. faecium* maupun *E. faecalis* (Martin-Platero et al., 2006). Anehnya, beberapa bakteriosin secara berurutan mengkodekan *orf* (hingga empat *orf*) dengan identitas urutan yang signifikan, dan telah ditunjukkan bahwa mereka bertindak secara sinergis (Cintas et al., 1998; Netz et al., 2001). Enterosin tidak memiliki aktivitas hemolitik, seperti yang terlihat pada beberapa bakteriosin *Staphylococcus*. Enterocin L50A (EntL50A, 44 residu asam amino) dan enterocin L50B (EntL50B, 43 residu asam amino) memiliki identitas urutan 72%. Kedua bakteriosin memiliki aktivitas antimikroba sendiri, dengan EntL50A menjadi yang paling aktif; namun, ketika dua bakteriosin digabungkan, sinergisme yang cukup dapat diamati yang bervariasi antara strain indikator (Cintas et al., 2000). Saat ini, kita tidak tahu banyak tentang mekanisme aksi

mereka tetapi beberapa hasil menunjukkan bahwa transporter ABC mengeksternalisasi peptida, serta melindungi produsen terhadap aktivitas mematikan peptida.

c) Bakteriosin Siklik

Bakteriosin tersebut mengacu pada aktivitas antimikroba yang disintesis secara ribosom di mana ujung N-terminal dan C-terminal dihubungkan secara kovalen oleh ikatan amida. Struktur peptida melingkar membungkus 58-70 residu asam amino, yang bersifat kationik dan mengandung sejumlah besar residu hidrofobik (Maqueda et al., 2008). Mereka menunjukkan stabilitas yang signifikan pada kisaran suhu dan tingkat pH yang luas dan mereka tidak terpengaruh oleh berbagai protease tetapi tidak endoprotease. Aktivitas antimikroba dari beberapa bakteriosin sirkular cukup luas dan juga ditujukan terhadap patogen yang meliputi staphylococci, enterococci, listeria, dan clostridia. Selama bertahun-tahun, AS-48 (Samyn et al., 1994) adalah satu-satunya bakteriosin melingkar yang diketahui, tetapi beberapa bakteriosin seperti itu sekarang telah diisolasi dan dikarakterisasi (Tabel 2.3).

Tabel 2.3 Daftar Bakteriosin Siklik

Bacteriocin	Spesies yang menghasilkan	Residu asam amino
AS48	<i>Enterococcus faecalis</i>	70
Gassericin A	<i>Lactobacillus gasseri</i>	58
Reuterin 6	<i>Lactobacillus reuteri</i>	58
Acidocin B	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	58
Butyriovibriocin	<i>Butyriovibrium fibrisolvens</i>	78
Uberolysin	<i>Streptococcus uberis</i>	78
Circularin A	<i>Clostridium beijerinckii</i>	69
Garvicin ML	<i>Lactococcus garvieae</i>	60
Lactocyclicin Q	<i>Lactococcus sp.</i>	61
Subtilisin A and A1	<i>Bacillus subtilis</i>	35
Carnocyclin A	<i>Carnobacterium maltaromaticum</i>	60

(1) Genetika Bakteriosin Siklik

Determinan genetik AS-48 diidentifikasi pada tahun 2003. Sebuah wilayah 7,8 kb didefinisikan dalam pMB2 plasmid konjugatif sebagai

pengkodean untuk produksi lengkap bakteriosin AS-48. Enam gen berikut awalnya diidentifikasi: gen struktural AS-48 diikuti oleh *as-48B*, *as-48C*, *as-48C1*, *as-48D*, dan *as-48D*. Analisis lebih lanjut mengungkapkan empat gen tambahan, *as-48EFGH*, yang diperlukan untuk ekspresi AS-48 penuh (Diaz et al., 2003). Operon *as-48EFGH* mengkodekan transporter ABC yang tampaknya terlibat dalam produksi kekebalan bakteriosin (Diaz et al., 2003). Seperti yang paling sering diamati, gen-gen yang terlibat dalam sintesis bakteriosin dikelompokkan, dan ini juga kasus untuk bakteriosin siklik di mana gen yang dibutuhkan diatur menjadi dua operon yang diekspresikan secara koordinatif. Konstituen genetik yang dibutuhkan untuk biosintesis bakteriosin melingkar lainnya telah dikloning dan diurutkan (Kawai et al., 2004a). Analisis rinci elemen genetik (struktur operon dengan lima gen) yang mengkode produksi uberolysin di *Str. uberis* strain 42 juga telah dipublikasikan (Wirawan et al., 2007). Analisis bioinformatika telah mengidentifikasi gen dengan peran diduga dalam biosintesisnya, termasuk pemrosesan bakteriosin, kekebalan, dan sekresi. Dari analisis ini, tampaknya berbagai bakteriosin siklik bergantung pada mesin yang sama untuk biosintesisnya, tetapi dengan beberapa modifikasi (Maqueda et al., 2008).

(2) Struktur, Fungsi dan Mekanisme Aksi Bakteriosin Siklik

Saat ini, 10 bakteriosin siklik telah diidentifikasi. Di antaranya, telah ditunjukkan bahwa urutan asam amino primer gassericin A dan reutericin 6 adalah identik, kecuali adanya dua d-alanines di gassericin A dan satu d-alanine di reutericin 6. Perbedaan ini juga tercermin dalam spektrum aktivitas dan profil struktur sekunder yang berbeda (Kawai et al., 2004). Acidocin B dianggap sebagai protein sirkular diduga, karena menunjukkan identitas urutan 98% untuk gassericin A dan reutericin 6, tetapi sifat sirkularnya belum dikonfirmasi. Subtilisin A mewakili kelompok bakteriosin siklik atipikal karena mengandung jembatan tioeter unik yang secara kovalen menghubungkan belerang sistein dengan karbon- residu lain, yang jauh lebih pendek daripada bakteriosin siklik lainnya, serta bersifat anionik (Maqueda et al., 2008). Dalam konteks ini, adalah relevan untuk menyebutkan bakteriosin thuricin CD yang terdiri dari dua peptida berbeda dan membunuh berbagai isolat *Clostridium difficile*. CD thuricin juga mengandung modifikasi yang sama dari tulang punggung peptida karbon seperti yang terlihat

pada subtilisin A (Rea et al., 2010). Kedua bakteriosin ini tidak akan dimasukkan lebih lanjut dalam ulasan ini.

Peptida AS-48 sirkular kationik (70 residu asam amino dan titik isoelektrik mendekati 10,5) sejauh ini merupakan bakteriosin siklik yang paling banyak dipelajari dan telah dilaporkan mengerahkan aktivitas bakterisida dan bakteriostatik, tetapi detail penting dari mode aktivitasnya adalah masih hilang. AS-48 menginduksi perembesan ion, yang disertai dengan runtuhnya potensial membran sitoplasma. Transpor aktif oleh vesikel membran sitoplasma juga terganggu oleh AS-48. Pada konsentrasi rendah, peptida ini juga melakukan permeabilisasi liposom, menyebabkan migrasi bebas senyawa dengan berat molekul rendah tanpa memerlukan potensial membran. Konsentrasi SAS-48 yang lebih tinggi menginduksi disorganisasi membran yang parah, seperti yang diamati oleh mikroskop elektron, seperti agregat dan struktur multilamellar. Pengukuran listrik menunjukkan bahwa AS-48 dapat membentuk saluran dalam lapisan ganda lipid.

Sejumlah efek biologis telah dicatat ketika *L. monocytogenes* terpapar AS-48 (Mendoza et al., 1999). Dinding sel dan struktur membran sangat dipengaruhi oleh AS-48 dan sel hantu diamati. *Li. monocytogenes* dapat beradaptasi dengan enterocin AS-48, di mana ketebalan dinding sel meningkat (Sanchez-Barrena et al., 2003) dan komposisi lipid berubah (300). Sel resisten kurang terpengaruh oleh muramidase dan fenotipe resisten juga dipertahankan dalam protoplas yang dibuat dari sel resisten (Mendoza et al., 1999).

Bakteriosin sirkular mungkin merupakan bakteriosin paling stabil yang diketahui (Cobos et al., 2001). Sejauh ini, struktur dua bakteriosin melingkar telah dilaporkan. Pada tahun 2000 struktur AS-48 ditentukan oleh NMR (Sanchez-Barrena et al., 2003), dan pada tahun 2009 struktur tiga dimensi carnocyclin A (CclA) ditentukan (Martin-Visscher et al., 2009). Studi-studi ini mengkonfirmasi struktur unik bakteriosin ini, tidak hanya ikatan amida kovalen C- dan N-terminal, tetapi juga kesamaan yang luar biasa dalam struktur tiga dimensinya, yang terdiri dari inti hidrofobik kompak dari empat hingga lima heliks. Hal tersebut diusulkan oleh Martin-Visscher et al. bahwa bakteriosin sirkular, meskipun memiliki perbedaan yang signifikan dalam urutan primernya, memiliki motif struktural tiga dimensi yang sama secara keseluruhan dari lipatan saposin (Martin-Visscher et al., 2009).

Lipatan saposin didefinisikan di antara polipeptida seperti saposin yang mencakup NK-lisin, 78 peptida residu asam amino yang bersifat antibakteri dan menunjukkan aktivitas litik yang nyata terhadap garis sel tumor tikus yang sensitif terhadap NK, YAC-1, tetapi tidak melisis sel darah merah. Juga disarankan bahwa lipatan saposin kemungkinan menjadi ciri umum dari semua bakteriosin melingkar yang diidentifikasi hingga Struktur CclA dan AS-48 mencakup kelompok residu dasar pada permukaan peptida, mungkin bertanggung jawab untuk menarik bakteriosin ke permukaan membran target anionik.

Cara kerja bakteriosin sirkular, carnocyclin (CclA), ditentukan dengan menggunakan sistem model lipid bilayer (Gong et al., 2009), dan ditunjukkan bahwa carnocyclin A membentuk saluran selektif anion yang bergantung pada voltase dalam lipid bilayer (Gong et al., 2009). Pembentukan saluran didorong oleh adanya potensial membran negatif yang akhirnya menyebabkan disipasi potensial membran. Dalam perspektif ini, menarik untuk dicatat bahwa dua peptida bakteriosin plantaricin dan JK juga menunjukkan konduktivitas tinggi untuk anion spesifik dan konduktivitas rendah untuk kation dan disipasi potensial membran dan gradien pH pada sel *Lb plantarum* sensitif (Moll et al., 1999b).

Dari pemahaman saat ini, bakteriosin siklik menargetkan membran sel yang rentan; Namun, bagaimana ini terjadi tidak dipahami. Kemungkinan besar bahwa beberapa jenis reseptor dikenali oleh bakteriosin sirkular, seperti yang terlihat dengan bakteriosin Kelas II lainnya, dan melalui interaksi spesifik ini bakteriosin sirkular entah bagaimana membuat membran permeabel terhadap ion berbobot molekul rendah, tetapi tidak ada reseptor yang diidentifikasi demikian jauh.

c) Peptida Antimikroba Terpotong

Kelompok baru peptida antimikroba yang disintesis secara ribosomal yang berbeda dari bakteriosin biasa adalah peptida yang berasal dari protein yang lebih besar. Mereka pertama kali ditemukan dalam sistem eukariotik dan dicontohkan oleh laktoferisin yang berasal dari laktoferin (Jensen dan Hancock 2009) dan peptida antimikroba yang berasal dari histon (Luders et al., 2005). Peptida antimikroba yang diturunkan dari protein tersebut juga telah ditemukan pada bakteri Gram positif, seperti

bakteri asam propionat (Faye et al., 2004), dan pada *L. reuteri* (Bohle et al., 2010). Dari sampel feces yang diperoleh dari anak babi, isolat *L. reuteri* diperoleh dan terbukti menghasilkan peptida antimikroba bernama AP48-MapA. Jelas ditunjukkan bahwa peptida antimikroba (48 residu asam amino) adalah produk degradasi yang terdefinisi dengan baik yang diperoleh dari protein yang mempromosikan adhesi mukus (Bohle et al., 2010). AP48-MapA mampu mencegah pertumbuhan sejumlah patogen Gram positif terpilih. Temuan ini memberi kita beberapa perspektif baru tentang bagaimana beberapa bakteri usus dapat berhasil bersaing di lingkungan ini dan dengan demikian berkontribusi pada mikrobiota yang sehat.

3. Target dan Modus Aksi Bakteriosin

Cara kerja bakteriosin telah menjadi topik penting untuk dipelajari, dan telah ditunjukkan bahwa membran sebagian besar bakteriosin BAL ditargetkan oleh senyawa ini. Ketika bakteri yang rentan terkena bakteriosin, mereka menyebabkan permeabilisasi sel-sel yang rentan. Itu diyakini, dan masih, bahwa bakteriosin tersebut membentuk pori-pori atau memainkan peran penting dalam permeabilisasi membran dan dengan demikian memberi jalan bagi migrasi bebas ion dan molekul kecil lainnya melintasi membran bakteri. Lactococcin A adalah salah satu bakteriosin Kelas II pertama yang dimurnikan dan dikarakterisasi secara genetik (van Belkum et al., 1991). Dalam studi awal itu menunjukkan bahwa itu meningkatkan permeabilitas membran sitoplasma rentan *L. lactis* isolat (van Belkum et al., 1991). Juga ditunjukkan bahwa konsentrasi laktokoksin A yang jauh lebih tinggi diperlukan untuk menghilangkan potensi membran dalam strain kekebalan *L. lactis*.

Banyak proses transportasi biologis sangat terpengaruh ketika laktokoksin A ditambahkan ke sel bakteri. Disimpulkan bahwa laktokoksin A bekerja pada membran sitoplasma dan interaksinya sangat spesifik. Hasil gabungan yang diperoleh dengan sel, vesikel, dan liposom menunjukkan bahwa spesifisitas laktokoksin A mungkin dimediasi oleh protein reseptor yang terkait dengan membran sitoplasma (van Belkum et al., 1991b). Butuh 16 tahun untuk mengidentifikasi reseptor yang dihipotesiskan. Pada tahun 2007, kompleks protein reseptor diidentifikasi sebagai komponen membran dari transporter mannose phosphotransferase (man-PTS) (Diep et al., 2007). Mekanismenya,

meskipun tidak sepenuhnya dipahami, mungkin melibatkan pembukaan ireversibel dari transporter man-PTS yang menyebabkan migrasi bebas molekul kecil antara sitoplasma bakteri dan lingkungan eksternalnya.

Mekanisme di balik bakteriosin Kelas IIa juga telah dipelajari secara rinci. Studi awal yang dilakukan pada pediosin PA1 termasuk bagaimana bakteriosin ini mempengaruhi baik keseluruhan protoplas atau vesikel membran/sistem membran (Chen et al., 1997b). Secara umum disimpulkan bahwa target pediosin PA1 adalah membran, dan melalui permeabilisasi membran, bakteri target dibunuh.

Satu studi yang menarik dilakukan pada liposom yang menyatu dengan vesikel membran yang berasal dari sel sensitif dan sel imun. Ditunjukkan bahwa pediosin PA1 menimbulkan penghabisan ion kecil dalam sistem sensitif, tetapi ketika vesikel sel kekebalan menyatu, sistem menjadi jauh lebih sedikit terpengaruh oleh bakteriosin. Pekerjaan menyimpulkan bahwa pediosin PA1 bertindak dalam volt usia-independen cara, tetapi membutuhkan protein spesifik dalam membran target (Chikindas et al., 1993).

Beberapa studi genetik diikuti, yang sangat menyarankan bahwa sistem man-PTS terlibat dalam aktivitas bakteriosin Kelas II (Lun dan Wilson, 2005). Akhirnya ditunjukkan bahwa bakteriosin Kelas IIa membentuk kompleks yang kuat dengan protein kekebalan serumpunya dan komponen membran man-PTS dari sel-sel sensitif, melumpuhkan bakteriosin dan mencegahnya dari permeabilisasi dan pembunuhan (Diep et al., 2007). Seperti laktokoksin A, Kelas IIa juga membunuh bakteri melalui interaksi dengan bagian permease dari man-PTS, tetapi pengenalan bakteriosin dan man-PTS khusus mereka sangat spesifik (Kjos et al., 2010b). Sementara, lacto coccin A membutuhkan bagian spesifik dari kedua komponen membran, Kelas IIa hanya membutuhkan satu wilayah spesifik urutan hanya dari satu komponen serumpun (Kjos et al., 2010a).

Anehnya, bakteriosin yang berbeda seperti bakteriosin Kelas IIa antilisterial yang kuat dan laktokoksin A spesifik laktokokus keduanya menggunakan bagian membran man-PTS permease, tetapi mereka cukup selektif dalam pemilihannya. Di *Li. monocytogenes* empat sistem man-PTS telah diidentifikasi, tetapi hanya satu dari mereka yang berfungsi sebagai target untuk bakteriosin ini (Kjos et al., 2009).

Lactococcin A memiliki spesifisitas untuk satu-satunya entitas man-PTS yang ditemukan di *Lc. lactis* dan akibatnya hanya membunuh *Lc. strain lactis*. Sangat menarik secara biologis untuk mengamati bahwa dua kelompok bakteriosin yang berbeda (bakteriosin mirip pediosin dan laktokoksin A) dengan spesifisitas target yang sama sekali berbeda sebenarnya telah mengembangkan bagian berbeda dari molekul yang sama untuk dikenali.

Bakteriosin dua peptida (Kelas IIb) juga telah terbukti membuat membran bakteri rentan permeabel terhadap molekul kecil (Nissen-Meyer et al., 2010). Spesifisitas target belum teridentifikasi tetapi berdasarkan pengalaman sebelumnya, tampaknya aktivitas mereka membutuhkan target yang ditentukan. Juga menarik untuk dicatat bahwa bakteriosin dua peptida memiliki aktivitas optimal pada rasio peptida 1:1 (Moll et al., 1999), dan pengujian ketat dari masing-masing peptida telah menemukan bahwa mereka tidak aktif atau bahwa mereka memiliki aktivitas antimikroba yang sangat rendah.

Dari pengetahuan kami saat ini, tampaknya tidak mungkin bahwa bakteriosin ini bertindak dengan melarutkan membran, seperti yang disarankan oleh banyak peptida antimikroba eukariotik, tetapi mereka bertindak dengan menggunakan target spesifik untuk membuat membran permeabel. Heterogenitas dalam pilihan target dan perbedaan potensi banyak bakteriosin mungkin karena variasi dalam struktur reseptor (heterogenitas asam amino dan/atau akses yang buruk ke reseptor bahkan dalam spesies bakteri target yang sama). Aksesibilitas ke reseptor, dapat diubah oleh perubahan muatan permukaan, komposisi membran, hidrofobisitas, struktur kapsul, dan produksi polisakarida.

Di antara lantibiotik BAL, nisin telah menjadi sistem model yang paling menarik perhatian dalam studi **mode-of-action**. Ditunjukkan sejak awal bahwa lantibiotik tipe A mengerahkan aksi antibakteri mereka dengan pembentukan pori-pori, sementara di membran sitoplasma bakteri sensitif, yang menyebabkan disipasi potensial membran dan penghabisan cepat metabolit kecil dan mengakibatkan kematian sel, dan hipotesis ini didukung oleh sejumlah studi sistem membran buatan (Moll et al., 1999). Juga ditunjukkan bahwa nisin mempengaruhi biosintesis dinding sel melalui interaksi dengan lipid II, tetapi pengamatan ini tidak terlalu diperhatikan sebelum Sahl et

al.n (1987) memberikan data tentang interaksi spesifik antara nisin dan lipid II.

Hasil ini dapat menjelaskan beberapa perbedaan yang tampak dan menghubungkan dua model aksi nisin sebagai pembentuk pori, serta penghambat biosintesis dinding sel. Nisin telah terbukti mengikat bagian bactoprenyl pyrophosphate dalam lipid II, entitas penting dalam tesis dan perakitan sintesis peptidoglikan. Nisin dapat menembus membran dan menghambat mesin biosintesis dinding sel (Bierbaum dan Sahl 2009). Lipid II kemudian disebut sebagai molekul docking nisin. Kehadiran lipid II dalam liposom secara dramatis menurunkan konsentrasi nisin yang dibutuhkan untuk membuat liposom bocor, dan interaksi dengan lipid II menjelaskan mengapa konsentrasi nanomolar nisin cukup untuk permeabilisasi membran sel, sedangkan konsentrasi milimolar diperlukan untuk permeabilisasi membran buatan (Hasper et al., 2006).

Sekarang, diyakini bahwa nisin menciptakan pori membran yang stabil yang terdiri dari delapan molekul nisin dan empat molekul lipid II (Hasper et al., 2004). Ketika nisin menghambat biosintesis dinding sel, lipid II menjadi terkilir dari septa dan sintesis diblokir. Banyak lantibiotik tipe A menggunakan lipid II sebagai molekul dok dan mereka mengerahkan aktivitas antimikroba mereka melalui situs pengikatan ini. Mutacin 1140 adalah lipid II lain yang menargetkan lan tibiotik, tetapi tampaknya hanya mampu menghambat biosintesis dinding sel karena tidak mampu membuat pori-pori pada membran bakteri rentan karena terlalu pendek (Hasper et al., 2006).

Peningkatan jumlah lantibiotik (Wiedemann et al., 2006) telah dikaitkan dengan lipid II, tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa defensin (Sass et al., 2010; Schmitt et al., 2010; Schneider et al., 2010) dan bakteriosin Kelas II (Martinez et al., 2008) juga telah dikaitkan dengan lipid II dan biosintesis sel dinding sebagai cara membunuhnya. Karena sifat fisikokimia dari sifat hidrofobik/amfifilik dari sebagian besar peptida antimikroba, mereka mampu menembus/melarutkan membran melalui efek “deterjen” dan hasil ini tidak mencerminkan mekanisme pembunuhan biologisnya. Baik lantibiotik dan bakteriosin Kelas IIa bekerja dengan baik dalam sistem membran/liposom buatan tetapi biasanya pada konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang diamati dengan bakteri target. Oleh karena itu, hasil studi *mode-of-action* yang

dilakukan pada membran lain dan sistem liposom harus ditafsirkan dengan hati-hati. Saat ini, tampaknya sangat mungkin bahwa sebagian besar bakteriosin mengenali reseptor spesifik dalam aksi awalnya.

4. Mekanisme Biosintesis Bakteriosin

Ekspresi gen yang bergantung pada kepadatan sel tampaknya tersebar luas pada bakteri dan berbagai proses diketahui diatur dalam kepadatan sel atau cara yang bergantung pada fase pertumbuhan pada bakteri Gram positif. Jenis regulasi seperti itu juga telah ditemukan untuk mengontrol biosintesis beberapa bakteriosin oleh sistem regulasi dua komponen (sering disebut sebagai sistem regulasi tiga komponen) dan banyak ulasan tentang topik ini telah dipublikasikan. Tiga entitas yang terlibat langsung dalam jalur pensinyalan yang mengarah ke produksi bakteriosin terdiri dari (i) peptida sinyal (peptida feromon, PP), dan (ii) reseptor/target yang tertanam di membran untuk PP yang pada penawarannya mengarah ke fosforilasi kaskade pensinyalan yang akhirnya mengarahkan residu fosfat ke (iii) regulator respons, yang kemudian berikatan dengan promotor serumpunnya, sehingga menginduksi ekspresi gen dan produksi bakteriosin.

Di antara lantibiotik tertentu yang diatur seperti nisin dan subtilin, telah ditunjukkan bahwa bakteriosin ini juga beroperasi sebagai PP dan menginduksi sintesisnya sendiri, sedangkan PP dari bakteriosin biotik nonlantibiotik yang diatur (Kelas II) adalah peptida spesifik kecil yang secara eksklusif berperan dalam induksi. Dalam hal ini tiga gen biasanya ditemukan dalam struktur operon, tetapi konstelasi lain ada. Sistem pengaturan sistem plantarisin telah ditentukan secara menyeluruh, tetapi juga cukup unik karena dua pengatur respons ditemukan di sini. Hasil eksperimen secara mengejutkan menunjukkan bahwa dua regulator respons yang sangat homolog (PlnC dan PlnD, yang >75% serupa) menampilkan fungsi yang sangat berlawanan. Sementara, ekspresi berlebih dari transkripsi yang diaktifkan plnC dan produksi bakteriosin, ekspresi berlebih dari plnD menekan kedua proses ini. Regulasi negatif seperti itu belum diamati dalam sistem regulasi lain dari produksi bakteriosin, tetapi juga harus ditekankan bahwa sistem plantarisin adalah satu-satunya sistem yang diketahui sejauh ini yang memiliki dua regulator respons (Diep et al., 2001).

Sistem penginderaan kuorum mencakup pengaturan beberapa operon seperti dirinya sendiri, satu atau beberapa bakteriosin, operon transport, dan lain-lain. Dalam sistem plantarisin lima operon telah diidentifikasi, termasuk setidaknya dua operon bakteriosin, dan secara keseluruhan setidaknya 20 gen telah ditemukan berada di bawah regulasi ini (Diep et al., 2009). Sebuah studi transkripsi rinci dilakukan pada regulasi lima operon plantarisin (Diep et al., 2003). Sistem plantarisin telah diidentifikasi dalam sejumlah laktobasilus, tetapi dengan beberapa variasi. Banyak gen bakteriosin ditemukan umum pada spesies bakteri yang sama atau berbeda; namun, sering kali beberapa bakteriosin hilang saat yang baru memasuki sistem. Secara umum banyak bakteri mengelompokkan beberapa gen bakteriosin yang berbagi sistem transportasi dan juga sistem pengaturan tiga komponen seperti yang terlihat dengan plantarisin. Seseorang mungkin berspekulasi jika pengembangan bakteriosin baru terjadi ketika beberapa gen bakteriosin bertemu di inang dan kluster baru untuk membuat inang lebih kompetitif dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan biologis yang kompleks.

Lima (*pIn*) operon yang terlibat diekspresikan secara berbeda sehubungan dengan waktu dan kekuatan, dan feromon peptida memicu loop pengaktifan otomatis yang kuat dari unit pengatur (*pInABCD*) selama tahap awal induksi yang secara bertahap menyebabkan aktivasi yang kuat dari yang lain. operon. Transport operon (*pInGHSTUV*), yang terlibat dalam sekresi feromon dan bakteriosin, juga diekspresikan relatif awal pada induksi, tetapi dengan cepat dimatikan segera setelah ekspresi puncak, mungkin karena hanya diperlukan dalam jumlah katalitik. Penyelidikan lebih lanjut dari berbagai promotor mengungkapkan bahwa meskipun perbedaan halus dalam daerah promotor dapat menjelaskan regulasi diferensial yang diamati, kehadiran urutan promotor-proksimal hilir dalam satu promotor menyebabkan aktivitas puncak tertunda. Bagaimana fosforilasi mengatur aktivitas regulator respons *pIn* juga dinilai oleh mutagenesis langsung di situs fosforilasinya. Ditemukan bahwa dua regulator respons aktif pada dua tingkat yang berbeda: tingkat rendah ketika mereka tidak terfosforilasi dan tingkat tinggi ketika mereka terfosforilasi (Diep et al., 2003).

Dalam studi lain, situs pengikatan regulator respons dari sistem plantarcin diteliti. Dua pengulangan terbalik yang telah diidentifikasi

di wilayah -80 hingga -40 dimutagenisasi secara sistematis, dan studi pengikatan dilakukan. Situs pengikatan untuk dua regulator Pln terdiri dari dua pengulangan langsung 9-bp yang dipisahkan oleh urutan 13-nukleotida yang ditemukan dalam urutan promotor-proksimal dalam *regulator pln*.

Susunan promotor yang dilestarikan ini, ditemukan di antara banyak sistem pengaturan bakteriosin tiga komponen. Substitusi titik dalam urutan konsensus, terutama yang berada di posisi invarian, baik menghapuskan atau secara signifikan melemahkan pengikatan PlnC dan PlnD ke urutan pengikatan serumpunnya. Baik jejak DNase I dan sistem ekspresi reporter yang terdiri dari salah satu promotor pengatur bersama dengan gen -glucuronidase (*GUS*) mengkonfirmasi ketergantungan pada satu set utuh pengulangan yang terorganisir secara akurat untuk pengikatan regulator respons dan ekspresi gen (Risoen et al., 2001). Sebuah studi tentang sistem regulasi serupa lainnya mengkonfirmasi bagaimana promotor terlibat dalam regulasi berbasis kuorum penginderaan produksi sakac juga berbeda dalam kekuatan, kebocoran, dan waktu aktivitas mereka. Operon bakteriosin sakacin P diatur secara ketat, dan aktivitasnya meningkat lebih dari 1000 kali lipat setelah aktivasi (Risoen et al., 2000).

Mekanisme regulasi yang sama sekali berbeda terlihat pada produksi laktosin S, suatu lantibiotik yang diproduksi oleh *Lb. sakei*, yang sering ditemukan dalam produk daging fermentasi. Gugus gen yang mengkode laktosin S diatur menjadi dua operon dengan orientasi yang berlawanan, *lasAMNTUVPJW* (*lasA-W*) dan *lasXY*. Sementara, operon sembilan gen berisi mesin biosintetik termasuk laktosin S, imunitas, modifikasi, dan gen transpor, operon dua gen tampaknya terlibat dalam regulasi transkripsi kedua operon. Telah ditunjukkan bahwa inaktivasi *lasX* menghapus produksi laktosin S dengan menghambat transkripsi operon pengkodean S- laktosin (*lasA-W*). Studi tentang promotor yang berorientasi berbeda dan tumpang tindih dari dua operon dengan menggunakan gen reporter dengan ada dan tidak adanya *lasX* mengamati bahwa *LasX* merangsang promotor *lasA-X* dan mengarahkan ekspresi reporter sebanyak 5 hingga 6 kali lipat, sedangkan ekspresi reporter, yang diarahkan oleh promotor divergen, berkurang 1,5 hingga 2 kali lipat (Rawlinson et al., 2005).

Dengan kata lain, LasX adalah protein pengatur bifungsional yang bertindak sebagai aktivator *lasA-W* transkripsi dan sebagai penekan transkripsi *lasXY*. LasX milik keluarga Rgg dari aktivator transkripsional tropic pleio. Keluarga ini terwakili dengan baik di antara enterococci, lactococci, dan streptococci, di mana mereka mengatur berbagai fungsi, termasuk produksi mutacin II, lantibiotik yang diproduksi oleh *Str. mutans* (Qi et al., 1999).

5. Resistensi dan Adaptasi Bakteriosin

Meskipun bakteriosin adalah salah satu senyawa antibakteri paling kuat yang diketahui, kita dapat melihat berbagai kerentanan di dalamnya, dan juga dalam spesies, seperti yang ditunjukkan untuk empat bakteriosin dan variasi potensinya ketika tiga bakteriosin Kelas IIa dan nisin diuji (Katla et al., 2003). Studi ini *menunjukkan* bahwa kerentanan terhadap nisin bervariasi sekitar 390 ng/ml (antara 2 dan 781 ng/ml) antara 200 isolat alami *Li. monocytogenes* diuji. Untuk tiga bakteriosin Kelas IIa, nilai MIC bervariasi mendekati 100 kali lipat antara *Li yang paling sensitif dan yang paling tidak sensitif* isolat *monocytogenes*. Sakacin P berkisar antara 0,01-0,61 ng/ml, dan pediocin PA1a dan sakacin A masing-masing bervariasi antara 0,10 dan 7,34 dan 0,16 dan 44,2 ng/ml. Alam telah mengembangkan kerentanan yang berbeda terhadap bakteri dalam spesies yang sama dalam hal bakteriosin; namun, kami tidak tahu alasan intrinsik ini variasi resistensi.

Namun, ada beberapa penelitian yang mencoba menunjukkan dengan tepat latar belakang biologis untuk kerentanan bakteriosin yang berbeda. Diamati bahwa bakteri yang ditantang oleh sebagian besar bakteriosin sebenarnya mengembangkan resistensi, tetapi pada frekuensi yang *berbeda* dan pada tingkat yang berbeda. Bakteri cins kelas IIa adalah yang terbaik yang didokumentasikan untuk menciptakan bakteri resisten pada frekuensi tinggi (Vadyvaloo et al., 2004).

Hasil-hasil penelitian telah menunjukkan bahwa gen tertentu dalam bakteri dapat berkontribusi pada resistensi intrinsik pada bakteri, dan saat ini tiga jenis gen telah ditemukan untuk berpartisipasi dalam resistensi bawaan tersebut: gen yang *mengkodekan* komponen yang bertanggung jawab untuk selubung sel; gen yang mengkodekan elemen berbagai transporter; dan gen pengatur, khususnya, gen sistem dua

komponen. Telah ditunjukkan bahwa perubahan komposisi asam lemak di *Clostridia* dan *Listeria* membuat bakteri ini lebih tahan terhadap nisin serta memberikan resistensi silang terhadap bakteriosin lain (Vadyvaloo et al., 2004). *Lc* tahan nisin. Isolat *lactis* dapat menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ketebalan dinding sel septum. Penebalan ini berkorelasi dengan modifikasi asam lipoteichoic dengan peningkatan ester d-alanil dan galaktosa sebagai substituen di dinding sel, akibatnya menghasilkan lebih sedikit muatan negatif. Ini diusulkan sebagai mekanisme pertahanan utama *Lc. lactis* melawan nisin (Kramer et al., 2008). Bukti eksperimental menunjukkan bahwa protein pengikat mirip penisilin dapat berkontribusi pada isolat *Li yang resisten terhadap nisin. monocytogenes* juga diterbitkan (Gravesen et al., 2004).

Resistensi bakteriosin Kelas II dapat dimanifestasikan melalui perubahan komposisi membran (Limonet et al., 2002; Sakayori et al., 2003; Limonet et al., 2004). Transporter ABC dapat menjadi bagian dari imunitas bawaan beberapa lantibiotik dan juga beberapa bakteriosin Kelas II (Criado et al., 2006). Gen yang mengkode sistem kekebalan transporter ABC dari banyak lantibiotik biasanya disebut sebagai *lanEFG*. Studi resistensi nisin intrinsik dipelajari di *Li. monocytogenes* dan baru-baru ini ditunjukkan bahwa gen yang mengkode bagian permease dari transporter ABC bertanggung jawab atas resistensi nisin.

Ditunjukkan bahwa penghapusan gen ini membuat *Li. monocytogenes* 2- dan 4 kali lipat kurang tahan terhadap nisin dan galidermin, masing-masing (Collins et al., 2010a). Mutasi pada permease ini juga membuat strain lebih rentan terhadap sejumlah senyawa antimikroba lainnya, seperti bacitracin (8 kali lipat). Gen yang mungkin mengkode resistensi telurit (berdasarkan analisis homologi) juga telah terbukti terlibat dalam resistensi bawaan nisin, serta antimikroba lainnya. Pengurangan resistensi nisin bawaan adalah 4 kali lipat dalam penghapusan *telA* dari *Li. monocytogenes* (Collins et al., 2010). Sekali lagi, harus ditekankan bahwa baik *telA* dan *anrB* adalah protein yang umumnya melindungi bakteri terhadap banyak antimikroba, termasuk beberapa lantibiotik.

Molekul pengatur juga telah terbukti terlibat dalam resistensi bakteriosin, dan ini tidak mengejutkan karena mereka mengontrol gen fungsional lainnya termasuk gen yang mempengaruhi imunitas bawaan. Telah ditunjukkan bahwa mutasi pada faktor transkripsi -54 dan aktivator ManR dari *Li. monocytogenes* membuatnya resisten terhadap

bakteriosin Kelas IIa (Gravesen et al., 2002). Diketahui bahwa kedua protein pengatur ini diperlukan untuk secara aktif mentranskripsi reseptor bakteriosin ini dan akibatnya bakteri menjadi resisten ketika reseptor tidak dibuat (Diep et al., 2007). Faktor respons stres umum B mengontrol sejumlah gen stres, dan ketika B bermutasi di *Li. monocytogenes* menjadi lebih rentan terhadap nisin (Begley et al., 2006). Sistem regulasi dua komponen juga telah terbukti terlibat dengan resistensi bakteriosin. Dua histidin kinase (salah satu protein dari sistem dua komponen), S dan LisK, telah terbukti mempengaruhi imunitas bawaan *Li. monocytogenes* menjadi nisin (Cotter et al., 2002).

Resistensi spontan terhadap bakteriosin biasanya terlihat ketika bakteri sensitif terpapar bakteriosin. Secara khusus, resistensi bakteriosin Kelas IIa terhadap *Li. monocytogenes* telah menunjukkan frekuensi antara 10^{-6} dan 10^{-4} (Gravesen et al., 2002a). Tampaknya sebagian besar resistensi terhadap bakteriosin Kelas IIa berkaitan dengan reseptornya, bagian yang tertanam pada membran dari sistem man-PTS dan regulasi ekspresinya (Opsata et al., 2010). Sebuah analisis transkripsi rinci tentang bagaimana resistensi bakteriosin Kelas IIa melalui mutasi *man-PTS* mempengaruhi transkriptom *E. faecalis* baru-baru ini telah diterbitkan (Opsata et al., 2010). Juga, resistensi terhadap nisin sering terlihat dan dilaporkan bahwa *Li. monocytogenes* mengembangkan resistensi pada frekuensi antara 10^{-2} dan 10^{-7} setelah terpapar nisin (Gravesen et al., 2002a).

Di sisi lain, beberapa bakteriosin tampaknya secara konsisten lebih kuat dan mengembangkan resistensi lebih jarang, seperti yang terlihat pada antibiotik tradisional. Misalnya, lacticin 3147, lantibiotik dua peptida yang diproduksi oleh *Lc. lactis* dan efisien membunuh *Lc. lactis* IL1403, menciptakan koloni resisten IL1403 pada frekuensi antara 10^{-9} dan 10^{-8} saja (Guinane et al., 2006). Isolat dengan resistensi rendah ini dapat dibuat lebih tahan melalui paparan peningkatan konsentrasi bakteriosin secara bertahap. Juga telah dilaporkan bahwa resistensi terhadap satu bakteriosin juga mempengaruhi kerentanan terhadap bakteriosin lain (Naghmouchi et al., 2007).

Penting untuk disadari bahwa BAL penghasil bakteriosin telah menjadi bagian dari diet kita selama makanan fermentasi oleh BAL telah ada. Sebagian besar BAL bakteriosinogenik sebenarnya diisolasi dari makanan, dan sulit untuk melihat bagaimana kita dapat

menjauhkannya dari makanan kita sehari-hari. Selain itu, flora BAL usus kita juga termasuk penghasil bakteriosin potensial, seperti yang telah ditunjukkan dalam beberapa penelitian di mana BAL penghasil bakteriosin telah sering ditemukan dalam sistem pencernaan dan sampel tinja manusia dan hewan.

Banyak ulasan telah mencakup bidang luas aplikasi bakteriosin (Pieterse dan Todorov, 2010), dan terlepas dari fokus yang kuat pada aplikasi, kurangnya keberhasilan terlihat. Bakteriosin dapat dimasukkan ke dalam makanan untuk memperpanjang atau meningkatkan umur simpan dengan berbagai cara. BAL penghasil bakteriosin dapat digunakan sebagai kultur starter dalam produk fermentasi atau dapat ditambahkan ke makanan segar sebagai kultur pelindung. Sebagai alternatif, preparat bakteriosin dapat digunakan sebagai bahan dalam makanan, seperti yang terlihat pada NisaplinTM yang dikomersialkan, konsentrat nisin yang diberikan dalam basis susu tanpa lemak.

Bakteriosin digunakan sebagai pengawet makanan dengan keberhasilan yang terbatas, tetapi nisin merupakan pengecualian karena penggunaannya diterima dalam produk makanan tertentu di lebih dari 50 negara dan di banyak komoditas makanan. Produk bakteriosin lainnya juga telah diluncurkan di pasar makanan untuk meningkatkan keamanan pangan, tetapi tidak dengan tingkat keberhasilan yang sama. Namun, pengetahuan yang lebih besar tentang bagaimana mereka bekerja dan bagaimana memberikan senyawa tersebut ke makanan dan bakteriosin baru harus memberikan harapan untuk aplikasi yang lebih sukses. Aplikasi bakteriosin yang berhubungan dengan medis telah terbukti bermanfaat Nisin, serta lacticin 3147 telah terbukti efektif dalam melindungi terhadap mastitis bakteri, serta dalam mengobati mastitis (Twomey et al., 2000).

Makanan mengandung probiotik telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Produk tersebut, terutama diperkaya oleh bakteri hidup, seperti bifidobacteria dan lactobacilli, yang diklaim dapat meningkatkan kesehatan dan meningkatkan resistensi terhadap bakteri infeksius (Ouweland et al., 2002). Bakteri tersebut dijual sebagai suplemen mikroba dengan efek menguntungkan bagi konsumen. Sebagian besar probiotik termasuk dalam kelompok bakteri penghasil asam laktat dan biasanya dikonsumsi dalam bentuk yoghurt, susu fermentasi, atau makanan fermentasi lainnya (Fung et al., 2009), dan

telah ditunjukkan bahwa banyak probiotik juga dapat menghasilkan bac teriosin dalam kultur yang tersedia secara komersial. Pertanyaan terbukanya adalah, apakah produsen bakteriosin potensial ini benar-benar mampu memproduksi bakteriosin di lingkungan usus? Baru-baru ini, sebuah eksperimen elegan dilakukan pada pemberian pakan dengan probiotik penghasil bakteriosin *Lb. salivarius*, diikuti dengan pemberian *Li. monositogen*. Sementara, mencit kontrol mati, mencit yang mendapat penghasil bakteriosin bertahan (Corr et al., 2007). Ketika *Li.* patogen *mono cytogenes* dibuat kebal terhadap bakteriosin, mencit tidak dilindungi oleh probiotik penghasil bakteriosin dan mati. Eksperimen ini secara meyakinkan menunjukkan bahwa entitas aktif yang melindungi tikus dari *Li.* infeksi *monocytogenes* adalah bakteriosin. Temuan ini memberikan harapan tinggi untuk produksi probiotik penghasil bakteriosin dan aplikasi bakteriosin untuk melindungi atau bahkan memerangi infeksi bakteri.

6. Aspek Lainnya Mengenai Bakteriosin

Pengungkapan mesin biosintesis kompleks lantibiotik telah membuatnya menarik untuk menerapkan enzim modifikasi peptida dalam sintesis molekul dan protein baru. Melalui strategi seperti itu, seseorang harus dapat membuat molekul dengan sifat unik (misalnya, entitas resistensi protease, senyawa antimikroba, dan obat baru) untuk aplikasi industri dan medis.

Sintesis kimia peptida adalah teknik yang mapan, dan sering kali lebih mudah untuk mensintesis bakteriosin yang tidak dimodifikasi secara kimia daripada menggunakan proses fermentasi dan pemurnian. Ini tidak terjadi dengan lantibiotik, tetapi, baru-baru ini, Ross et al. melakukan sintesis dukungan padat dari laktosin S aktif, lantibiotik yang diproduksi oleh *Lb.* strain *sakei* (Ross et al., 2010). Peptida ini mengandung dua struktur lanthionine, serta empat residu dehidrasi (dua Dha dan dua Dhb) (Ross et al., 2010).

Dua (atau tiga) komponen sistem regulasi bakteriosin telah dikembangkan untuk aplikasi dalam kloning gen untuk mengontrol ekspresi gen; khususnya sistem induksi nisin telah digunakan secara luas dalam mengatur ekspresi gen (Kleerebezem et al., 1997). Selain itu, sistem pengaturan sakacin A dan sakacin P telah ditemukan berguna dalam mengatur ekspresi gen dari gen kloning (Diep et al., 2009).

Potensi antimikroba asam laktat adalah unik di antara mikroorganisme hidup, dan juga merupakan potensi besar dalam aplikasi yang masih dalam masa pertumbuhan. Namun, untuk sepenuhnya memanfaatkannya, sumber daya intelektual dan ekonomi yang cukup besar harus diinvestasikan dalam upaya semacam itu. Di saat kita melihat peningkatan masalah dengan penggunaan antibiotik tradisional, senyawa lain harus diselidiki lebih teliti dan kita harus melihat cara tersebut secara berbeda dari cara kita melihatnya hari ini. Senyawa yang secara khusus menargetkan patogen dan tidak mempengaruhi organisme lain dan berguna mungkin menguntungkan bagi inang (manusia atau hewan), seperti yang telah dilaporkan untuk thuricin CD yang tak mendapatkan *Cl. difficile* dan meninggalkan mikrobiota manusia sebagian besar tidak terpengaruh (Rea et al., 2010). Bakteri probiotik juga akan mendapat manfaat dari menjadi produsen bakteriosin; ini secara meyakinkan ditunjukkan pada tikus di mana mereka dilindungi oleh bakteri semacam itu terhadap *Li. infeksi monocytogenes*.

Efek bakteriosin dan BAL penghasil bakteriosin telah diteliti secara ekstensif pada banyak komoditas pangan dan sistem uji simulasi pangan, dan dengan efek yang baik, tetapi tampaknya tidak cukup untuk meyakinkan produsen pangan untuk memasukkannya ke dalam pangan. Mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Ketika diamati bahwa perpanjangan umur simpan makanan atau pengurangan organisme pembusuk atau patogen potensial dalam makanan tidak cukup besar, akan terlalu banyak biaya untuk menggunakan teknologi tersebut. Masa depan pasti akan membawa sistem baru dan lebih baik untuk pengiriman bakteriosin ke dalam makanan, yang akan membuat aplikasi mereka dalam makanan lebih menguntungkan.

PRODUKSI VITAMIN OLEH BAKTERI ASAM LAKTAT

Bakteri Asam Laktat (BAL) adalah kelompok mikroorganisme heterogen yang memiliki sejarah panjang digunakan sebagai kultur starter untuk elaborasi makanan fermentasi karena bakteri penting industri ini dapat meningkatkan keamanan, umur simpan, nilai gizi, rasa, dan kualitas secara keseluruhan dari produk fermentasi. Selain itu, BAL telah terbukti memberikan berbagai macam sifat yang bermanfaat, itulah sebabnya mereka sering digunakan sebagai mikroorganisme probiotik dalam berbagai produk pangan baru.

Selain sifat-sifat intrinsik yang bermanfaat, strain BAL tertentu memiliki kemampuan untuk memproduksi/melepaskan dan/atau meningkatkan senyawa bermanfaat tertentu dalam makanan. Bahan-bahan fungsional ini kadang-kadang disebut sebagai *nutraceuticals*, istilah yang pertama kali diciptakan pada tahun 1989 untuk menggambarkan “makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan/atau pengobatan penyakit.” Bahan-bahan ini dapat berupa makronutrien (seperti asam lemak tak jenuh yang ada dalam beberapa minyak), mikronutrien (seperti vitamin), atau senyawa nonnutrisi seperti enzim hidrolitik dan flavonoid) dan dapat secara alami ada dalam makanan (seperti omega-3), asam lemak dalam ikan atau vitamin C dalam buah jeruk, dll.) atau ditambahkan (yaitu, susu yang diperkaya dengan kalsium dan vitamin D, sereal yang diperkaya dengan asam folat, dan lain sebagainya (Hugenholtz dan Smid, 2002).

Karena BAL terlibat dalam persiapan berbagai makanan fermentasi dan karena status GRAS (Umumnya Diakui sebagai Aman), pemilihan galur yang menghasilkan *nutraceutical* sekarang menjadi tujuan utama dari beberapa kelompok penelitian. Di antara studi ini, produksi vitamin oleh BAL telah mendapatkan perhatian dari komunitas ilmiah. Telah terbukti bahwa makanan tertentu yang difermentasi dengan BAL mengandung vitamin B- kelompok tingkat tinggi sebagai hasil dari biosintesis mikroba. Untuk alasan ini, BAL (mikroorganisme tingkat makanan yang dipertimbangkan) adalah kandidat yang ideal untuk memberikan senyawa spesifik seperti vitamin ke dalam makanan. Pengayaan vitamin yang dihasilkan BAL pada makanan fermentasi ditunjukkan pada Tabel 3.1. Baru-baru ini juga telah dilaporkan bahwa BAL dan mikroorganisme menguntungkan lainnya memiliki potensi untuk memproduksi vitamin *in situ* di saluran gastrointestinal (GI) (LeBlanc et al., 2013).

Tabel 3.1 Pengayaan Vitamin oleh Bakteri Asam Laktat dalam Pangan Fermentasi

Strain	Vitamin	Produk
Lact. plantarum CRL 725	Riboflavin	<i>Soymilk</i>
Lact. acidophilus ATCC 314	Riboflavin	<i>Soymilk + vitamins</i>
Lact. acidophilus FTDC 8833	Riboflavin	<i>Soymilk + vitamins</i>
Lact. acidophilus FTDC 8633	Riboflavin	<i>Soymilk + vitamins</i>
Lactobacillus ssp + Leuconostoc mesenteroides	Riboflavin	<i>Idli</i> (Minuman khas India)
Lact. plantarum UNIFG1	Riboflavin	Pasta dan roti
Lact. fermentum PBCC11.5	Riboflavin	<i>Soymilk</i>
Lact. bulgaricus CRL 863 + Strep. thermophilus CRL 415 & 803	Folat	Yoghurt
L. Lactis		<i>Cucumber juice</i>
L. Lactis	Folat	<i>Watermelon juice</i>
Lact. reuteri CRL 1098	Folat B12	<i>Soymilk</i>

A. Vitamin Kelompok B (B-Kompleks)

Vitamin adalah mikronutrien yang penting untuk metabolisme semua organisme hidup. Mereka ditemukan sebagai prekursor ko-enzim intraseluler yang diperlukan untuk mengatur reaksi biokimia penting dalam sel. Mengingat ketidakmampuan sel mamalia untuk mensintesis biomolekul penting ini, pasokan vitamin eksogen tampaknya tak terelakkan untuk mencegah defisiensi nutrisi. Meskipun sebagian besar

vitamin hadir dalam berbagai makanan, kekurangan vitamin masih ada di banyak negara, termasuk negara industri.

Tiga belas vitamin saat ini diakui sebagai penting untuk kesehatan manusia dan diklasifikasikan menurut kelarutannya sebagai lemak (vitamin A, D, E, dan K) atau larut dalam air (vitamin C dan vitamin kelompok B). Vitamin B-kelompok (atau B-kompleks) termasuk thiamin, riboflavin, niacin, pyridoxin, asam pantotenat, biotin, folat, dan cobalamin. Setiap vitamin B-kelompok, secara kimiawi berbeda dan bertindak secara sinergis untuk menjaga homeostasis tubuh dengan memainkan peran utama dalam proses metabolisme seperti produksi energi dan sintesis sel darah merah. Vitamin B-kelompok, biasanya hadir dalam banyak makanan, dapat dengan mudah dihilangkan atau dihancurkan selama memasak dan pengolahan makanan, sehingga kekurangan mereka hadir di banyak masyarakat. Untuk alasan ini, banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang mewajibkan fortifikasi makanan tertentu dengan vitamin dan mineral tertentu.

Sebagai contoh, di Argentina industri makanan diwajibkan untuk membentengi semua tepung terigu untuk konsumsi manusia dengan zat besi, asam folat, thiamin, riboflavin, dan niacin untuk pencegahan anemia dan cacat tabung saraf selama perkembangan embrio. Namun, laporan resmi menunjukkan bahwa karena kurangnya kontrol regulasi, konsentrasi fortifikasi tidak selalu terpenuhi dan, akibatnya, kadar vitamin serum pada populasi umum hanya sedikit meningkat dan defisiensi subklinis masih bertahan.

Penjelasan rinci tentang sintesis mikroba dari tiga vitamin kelompok B yang paling relevan (riboflavin, folat, dan cobalamin) oleh BAL telah dibahas secara rinci sebelumnya (LeBlanc et al., 2010a) dan tidak akan menjadi fokus bab ini. Di sini, aplikasi terbaru dari mikroorganisme menguntungkan untuk meningkatkan konsentrasi vitamin melalui biosintesis mikroba akan dibahas sebagai alternatif yang menarik secara ekonomi untuk fortifikasi makanan wajib.

1. Riboflavin (Vitamin B2)

Riboflavin (vitamin B2) memainkan peran penting dalam metabolisme sel, menjadi prekursor ko-enzim Flavin Mononucleotide (FMN) dan Flavin Adenine Dinucleotide (FAD) yang keduanya bertindak sebagai

pembawa hidrogen dalam reaksi redoks biologis yang melibatkan enzim seperti NADH dehidrogenase. Setelah riboflavin diserap dalam tubuh manusia, sintesis ko-enzim flavin ini dikendalikan oleh hormon tiroid yang mengatur aktivitas enzim biosintetik flavin (Rucker et al., 2001).

Persyaratan riboflavin yang direkomendasikan untuk manusia bervariasi sehubungan dengan jenis kelamin, usia, dan keadaan fisiologis (seperti yang terjadi selama kehamilan dan menyusui). Orang dewasa normal, perlu mengonsumsi antara 0,9 dan 1,6 mg vitamin ini setiap hari karena tubuh manusia tidak memiliki simpanan riboflavin dan kelebihan asupan vitamin dihilangkan dalam urin. Meskipun terdapat dalam berbagai macam makanan, defisiensi riboflavin (ariboflavinosis) masih terjadi, baik di negara berkembang maupun negara industri (O'Brien et al., 2001; Blanck et al., 2002). Meskipun kasus ariboflavinosis yang parah tidak umum di sebagian besar masyarakat, manifestasi subklinis sering terjadi dan ini hanya dapat dideteksi dengan mengukur konsentrasi vitamin darah.

Produk susu tidak dianggap sebagai sumber vitamin esensial yang baik karena susu mengandung sekitar 1,2 mg riboflavin per liter, yang berarti bahwa rata-rata orang dewasa perlu mengonsumsi sekitar satu liter per hari untuk memenuhi kebutuhan harian. Tingkat konsumsi susu ini tidak normal di antara penduduk negara industri seperti Amerika Serikat, di mana konsumsi susu segar per kapita harian adalah sekitar 200 ml (Putman dan Allshouse, 2003). Dengan demikian, meningkatkan kadar riboflavin dalam susu merupakan usulan yang menarik untuk mencegah defisiensi pada populasi di mana konsumsi susu rendah.

Konsentrasi riboflavin terkadang dapat bervariasi dalam produk susu tertentu karena teknologi pemrosesan dan aksi mikroorganisme yang digunakan selama fermentasi. Kasus terakhir dapat bermanfaat karena telah ditunjukkan bahwa produk susu fermentasi seperti *buttermilk* dan yoghurt memiliki konsentrasi riboflavin yang jauh lebih tinggi (masing-masing 1,7 dan 2,0 mg/l) dibandingkan dengan susu non-fermentasi (1,2 mg/l). Peningkatan vitamin B₂ ini, disebabkan oleh aksi kultur starter penghasil riboflavin selama proses fermentasi (LeBlanc et al., 2011). Pemilihan kultur starter yang tepat dapat meningkatkan konsentrasi vitamin spesifik yang larut dalam air. Telah terbukti bahwa kultur starter yoghurt tertentu menurunkan konsentrasi

riboflavin, sedangkan yang lain dapat meningkatkan kadar vitamin esensial ini hingga 60% dari konsentrasi awal yang ada dalam susu nondifermentasi. Penggunaan galur penghasil riboflavin probiotik akan menjadi alternatif yang menarik untuk mendapatkan produk yang diperkaya dengan vitamin ini selain memberikan potensi efek menguntungkan bagi inang. Biosintesis riboflavin telah dijelaskan baik pada bakteri Gram (+) dan Gram (ÿ), dengan lebih rinci pada *Bacillus (B.) subtilis* (Perkins dan Pero 2002) dan *Escherichia coli* (Bacher et al., 1996). Biosintesis mikroba riboflavin dari prekursor guanasin trifosfat (GTP) dan D-ribulose 5-fosfat, terjadi melalui tujuh langkah enzimatik, yang telah ditinjau sebelumnya (Bacher et al., 2000).

Kemampuan memproduksi riboflavin dari 179 galur BAL, diisolasi dari berbagai produk susu fermentasi, dievaluasi (Juarez del Valle et al., 2014). Hanya 42 galur yang dapat tumbuh dalam media bebas riboflavin komersial setelah konsentrasi vitamin ini ditentukan dengan HPLC. Lima dari galur ini (*Lactobacillus fermentum* (dua galur), *L. plantarum*, *Streptococcus thermophilus*, dan *L. paracasei* subsp. *Paracasei*) telah dipilih sebelumnya karena kapasitasnya untuk menghasilkan konsentrasi riboflavin yang tinggi dalam media bebas B2 komersial ini. Ini kemudian diinokulasi dalam susu kedelai untuk mengevaluasi kemampuan mereka untuk tumbuh dalam matriks makanan ini untuk meningkatkan konsentrasi riboflavin yang rendah (309 ± 19 ng B2/ml). Hanya *Lak. plantarum* CRL725 mampu secara signifikan meningkatkan kadar riboflavin dalam susu kedelai, lebih dari dua kali lipat (700 ± 20 mg B2/ml) konsentrasi awal.

Dalam studi lain (Ewe et al., 2010), sepuluh strain *Lactobacillus* dievaluasi untuk kelangsungan hidup dan karakteristik pertumbuhannya dalam susu kedelai yang dilengkapi dengan vitamin B. Penulis ini menunjukkan bahwa penambahan vitamin B mendorong pertumbuhan semua laktobasilus dan juga merangsang sintesis riboflavin dan asam folat oleh laktobasilus dalam susu kedelai. *L. acidophilus* ATCC314 atau *L. acidophilus* FTDC 8833, digunakan sebagai starter kultur, meningkatkan konsentrasi riboflavin (657% dan 243%, masing-masing) dalam susu kedelai, dibandingkan dengan konsentrasi awal sebelum fermentasi 24 jam, sedangkan strain lain, seperti *L. acidophilus* FTDC 8833 dan *L. gasseri* FTDC 8131, mengonsumsi vitamin ini. Hasil ini mengkonfirmasi bahwa produksi/konsumsi riboflavin adalah sifat yang bergantung pada regangan.

Idli adalah makanan sarapan fermentasi yang sangat populer dikonsumsi di India yang sebagian besar terbuat dari beras hitam. Konsentrasi riboflavin, tiamin, dan folat meningkat selama fermentasi adonan *idli* karena adanya ragi, *Lactobacillus* ssp., dan *Leuconostoc mesenteroides* (Ghosh dan Chattopadhyay, 2012). Dalam hal riboflavin, konsentrasinya mencapai $7,6 \pm 0,8$ ng B₂/ml dibandingkan dengan konsentrasi awal ($2,2 \pm 1,1$ mg B₂/ml). Studi lebih lanjut, diperlukan untuk mengidentifikasi strain penghasil riboflavin dalam produk ini.

Selain pencarian galur penghasil riboflavin asli, dua strategi telah diterapkan untuk mengekspresikan riboflavin secara berlebihan oleh mikroorganisme: (i) pembuatan galur rekombinan yang mengekspresikan gen biosintetik riboflavin secara berlebihan, dan (ii) penggunaan galur tahan roseoflavin. Dalam strategi pertama, galur *Corynebacterium amoniagenes* yang menyimpan plasmid yang mengandung semua gen biosintetik riboflavannya direkayasa dan mengakumulasi riboflavin 17 kali lipat lebih banyak daripada galur inangnya. Dalam penelitian lain, strain *Lactococcus lactis* subsp. *cremoris* yang mengonsumsi riboflavin diubah menjadi “pabrik” riboflavin dengan mengekspresikan empat gen biosintesisnya secara berlebihan (Burgess et al., 2004). Meskipun menarik untuk memahami mekanisme yang terlibat dalam produksi riboflavin, galur rekayasa genetika ini belum dapat dimasukkan dalam produk makanan yang ditujukan untuk konsumsi manusia.

Di sisi lain, telah ditunjukkan bahwa mutan yang diisolasi berdasarkan resistensi mereka terhadap roseoflavin analog riboflavin beracun juga menunjukkan fenotipe produksi berlebih riboflavin. Selain itu, roseoflavin telah digunakan untuk memperoleh riboflavin konstitutif yang memproduksi lebih banyak strain *B. subtilis* (Perkins dan Pero, 2002), *L. lactis* (Burgess et al., 2004), *L. plantarum*, *Leuc. mesenteroides*, dan *Propionibacterium freudenreichii* (Burgess et al., 2006). Beberapa di antaranya telah terbukti memberikan efek menguntungkan pada hewan yang kekurangan vitamin dan dapat dimasukkan sebagai kultur starter baru (LeBlanc et al., 2006).

BAL diperoleh dari sampel tepung gandum durum dan disaring untuk varian tahan roseoflavin untuk mengisolasi galur alami yang memproduksi riboflavin (Capozzi et al., 2011). Dua riboflavin dari strain *L. plantarum* yang diproduksi berlebihan digunakan untuk persiapan roti (melalui fermentasi oleh pertama) dan pasta (menggunakan langkah

preferensi) untuk meningkatkan volume vitamin B₂. Pendekatan yang diterapkan menghasilkan peningkatan yang cukup besar dari kandungan vitamin B₂ (sekitar dua hingga tiga kali lipat peningkatan dalam pasta dan roti, masing-masing), sehingga mewakili aplikasi bioteknologi tingkat makanan yang nyaman dan efisien untuk produksi roti dan pasta yang diperkaya vitamin B₂. Aplikasi tersebut dapat diperluas ke berbagai makanan, pakan, dan minuman berbasis sereal.

Dalam sebuah penelitian baru-baru ini, satu strain *L. fermentum* yang diisolasi dari sourdough terbukti mampu menghasilkan riboflavin (Russo et al., 2014). Mutan resisten roseoflavin spontan diperoleh dengan mengekspos strain asli (bernama *L. fermentum* PBCC11) untuk meningkatkan konsentrasi roseoflavin. Lima belas mutan resisten roseoflavin spontan diisolasi, dan tingkat vitamin B₂ diukur dengan HPLC. Tujuh galur mutan menghasilkan konsentrasi vitamin B₂ lebih tinggi dari 1000 ng/ml, sedangkan tiga mutan tidak mampu memproduksi riboflavin secara berlebihan meskipun mereka mampu menahan tekanan selektif roseoflavin. Penjajaran wilayah pemimpin tulang rusuk PBCC11 dan turunannya hanya menunjukkan mutasi titik di dua lokasi tetangga elemen RFN (juga dikenal sebagai riboswitch FMN). Tidak ada mutasi yang terdeteksi pada galur turunan yang tidak memiliki fenotipe produksi berlebih. Strain produksi berlebih riboflavin terbaik, bernama *L. fermentum* PBCC11.5, dan strain induknya digunakan untuk fortifikasi roti.

Roti diproduksi menggunakan ragi co-inoculum dan *L. fermentum* PBCC11.5 menyebabkan peningkatan sekitar 2 kali lipat kandungan vitamin B₂ akhir dibandingkan dengan penggunaan strain tipe asli (Russo et al., 2014). Diperlihatkan bahwa *L. plantarum* CRL 725 mampu meningkatkan 2 kali lipat konsentrasi awal riboflavin dalam susu kedelai (Juarez del Valle et al., 2014). Varian resisten roseoflavin dari galur ini juga diperoleh dan dievaluasi dalam susu kedelai. Salah satu varian yang diperoleh mampu meningkatkan 6 kali lipat (1860 ± 20 mg/ml B₂) kadar riboflavin basal susu kedelai. Strain resisten roseoflavin yang mampu mensintesis riboflavin dalam susu kedelai merupakan strategi bioteknologi yang menarik dan layak secara ekonomi yang dapat diadaptasi oleh industri makanan untuk mengembangkan makanan fungsional baru yang diperkaya vitamin dengan daya tarik konsumen yang ditingkatkan.

Selain memperkenalkan strain penghasil riboflavin yang efisien, desain media fermentasi yang tepat dan kondisi pertumbuhan yang optimal sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam studi terbaru, efek kecepatan agitasi pada kinerja produksi riboflavin oleh rekombinan *B. subtilis* RF1 diselidiki dalam fermentasi *fed-batch* (Man et al., 2014). Selama fase awal proses fermentasi, kecepatan agitasi yang lebih rendah bermanfaat untuk pertumbuhan sel dan biosintesis riboflavin, sedangkan selama fase terakhir, kecepatan agitasi yang lebih tinggi (900 rpm) adalah yang paling menguntungkan. Dengan demikian, strategi kontrol kecepatan agitasi dua tahap diusulkan berdasarkan analisis kinetik, di mana kecepatan agitasi dikontrol pada 600 rpm dalam 26 jam pertama dan kemudian beralih ke 900 rpm untuk mempertahankan pertumbuhan sel yang tinggi dan produksi riboflavin yang tinggi selama keseluruhan proses fermentasi. Konsentrasi maksimum riboflavin mencapai 9400 ng/ml dalam 48 jam dengan menerapkan strategi ini, yang 20,5 dan 21,4% lebih tinggi dari hasil terbaik yang dikendalikan oleh kecepatan agitasi konstan (Man et al., 2014). Pengetahuan yang baik tentang fluks metabolisme juga penting untuk meningkatkan produksi riboflavin.

Dalam penelitian tersebut, *gapB* (yang mengkode untuk gliseraldehida-3-fosfat dehidrogenase yang bergantung pada NADPH), dan *fbp* (kode untuk fruktosa-1,6-bisfosfatase) diekspresikan secara berlebihan pada strain induk *B. subtilis* RH33. Peningkatan signifikan konsentrasi riboflavin (4890 mg/ml) diperoleh dalam kultur labu kocok ketika *gapB* dan *fbp* diekspresikan bersama (Wang et al., 2014). Hasil ini menyiratkan bahwa deregulasi glukoneogenesis adalah strategi efektif untuk produksi metabolit yang berasal langsung dari jalur pentosa fosfat, serta senyawa lain yang menuntut NADPH dengan glukosa sebagai sumber karbon di *B. subtilis* (Wang et al., 2014).

Selain itu, saluran pencernaan manusia dijajah oleh beragam mikroorganisme yang dikenal sebagai mikrobiota usus yang terlepas dari dampaknya pada fungsi manusia yang berbeda, memainkan peran penting dalam pencernaan makanan dan pemulihan energi, sementara itu juga dapat bertindak sebagai pemasok penting vitamin. Pada manusia, telah ditunjukkan bahwa anggota mikrobiota usus mampu mensintesis vitamin K, serta sebagian besar vitamin B yang larut dalam air, seperti biotin, cobalamin, folat, asam nikotinat, asam pantotenat,

piridoksin, riboflavin, dan tiamin. Berbeda dengan vitamin makanan, yang diserap dalam saluran proksimal dari usus kecil, penyerapan utama vitamin yang dihasilkan mikroba terjadi di usus besar (Said dan Mohammed, 2006).

Sejauh ini, informasi fragmentaris tersedia pada sintesis *de novo* riboflavin oleh bakteri enterik. Dalam kasus bifidobacteria, enzim yang dibutuhkan untuk biosintesis vitamin ini tampaknya sebagian atau seluruhnya tidak ada dari mayoritas genom bifidobacterial yang tersedia saat ini (Ventura et al., 2007). Namun, seseorang tidak dapat mengecualikan kemungkinan bahwa beberapa spesies mikroba yang hidup bersama mampu melakukan sintesis *de novo* (LeBlanc et al., 2013). Dengan ketersediaan sekuens genom yang semakin luas, tidak hanya mungkin untuk mengidentifikasi galur penghasil vitamin yang potensial, tetapi juga untuk memahami mekanisme yang saling terkait untuk biosintesisnya, yang semuanya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas penghasil vitamin di saluran cerna manusia.

2. Folat (Vitamin B₉)

Kehidupan manusia tidak dapat hidup tanpa folat karena vitamin kelompok B ini terlibat dalam fungsi penting dari metabolisme sel seperti replikasi DNA, perbaikan, dan metilasi, dan sintesis nukleotida, vitamin lain, dan beberapa asam amino. Folat memiliki sifat antioksidan yang melindungi genom dengan menghambat serangan radikal bebas DNA, selain perannya dalam perbaikan DNA dan mekanisme replikasi. Kekurangan folat telah terlibat dalam berbagai macam gangguan seperti Alzheimer (Luchsinger et al., 2007), penyakit jantung koroner, osteoporosis (Baines et al., 2007), peningkatan risiko payudara (Tjonneland et al., 2006) dan kanker kolorektal (Van Guelpen *et al.*, 2006), kinerja kognitif yang buruk, gangguan pendengaran, dan cacat tabung saraf (Durga et al., 2007b).

Asupan harian yang direkomendasikan (RDI) folat pada orang dewasa adalah 200-400 g (FAO/WHO 2002). Untuk wanita hamil, 400-600 g dianjurkan. Meskipun folat hadir dalam makanan manusia normal, defisiensi folat masih sering terjadi, bahkan di negara berkembang (Konings et al., 2001). Telah dinyatakan bahwa tingkat asupan folat tidak memadai di antara berbagai kelompok populasi termasuk

wanita usia subur (Morris dan Tangney, 2007). Studi seperti ini telah mewajibkan badan pemerintahan di banyak negara untuk menganjurkan suplementasi wajib makanan konsumsi massal dengan asam folat. Di Kanada dan Amerika Serikat, misalnya, fortifikasi tepung adalah wajib sejak tahun 1998 untuk mengurangi insiden malformasi tabung saraf pada bayi baru lahir.

Banyak negara lain kemudian mengembangkan program serupa. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, di Argentina fortifikasi tepung dengan vitamin tertentu, termasuk asam folat, telah diwajibkan sejak 2002. Bahkan dengan fortifikasi asam folat wajib, laporan tindak lanjut telah menunjukkan bahwa sepertiga wanita hamil dan menyusui mungkin tidak memenuhi kebutuhan folat mereka dari makanan saja (Sherwood et al., 2006). Di sisi lain, banyak negara belum mengadopsi program fortifikasi asam folat nasional karena potensi efek samping asam folat; khususnya, bahwa asupan tinggi dapat menunda diagnosis defisiensi vitamin B₁₂ (Bailey et al., 2003). Kekhawatirannya adalah bahwa asam folat ditambahkan pada tingkat, di mana individu dengan asupan folat rendah dapat memenuhi RDI folat untuk mencegah cacat tabung saraf (NTD) dan/atau menurunkan homosistein plasma; namun, yang lain, dengan asupan folat normal atau lebih tinggi dapat secara tidak sengaja terkena asupan asam folat yang berlebihan, yang berpotensi menutupi manifestasi hematologi awal vitamin B₁₂ (Sweeney et al., 2007).

Pertimbangan keamanan lain dari konsumsi asam folat berlebih yang disorot oleh FDA (*Food and Drug Administration*, 1996) termasuk potensi risiko yang tidak diketahui untuk wanita hamil, dan orang yang menggunakan obat anti-epilepsi dan anti-folat. FDA juga mencatat ketidakpastian mengenai efek paparan kronis yang meningkat pada anak-anak, yang kebutuhan folatnya lebih rendah daripada orang dewasa. Kekhawatiran lebih lanjut termasuk potensi untuk mempromosikan kanker (Kim, 2004) dan hipotesis bahwa paparan janin terhadap asam folat berlebih dapat mendukung pemilihan polimorfisme metil entetrahydrofolate, yang terkait dengan berbagai penyakit yang melemahkan (Lucock dan Yates, 2005). Folat alami, seperti yang diproduksi oleh tanaman dan mikroorganisme, tidak menyebabkan “penyembunyian” anemia pernisiiosa yang terjadi pada konsentrasi asam folat yang tinggi dan karenanya harus dihindari. Karena terjadinya

masalah yang terkait dengan program fortifikasi asam folat saat ini, para peneliti telah mencari metode baru untuk meningkatkan konsentrasi folat alami dalam makanan.

Susu bukanlah sumber yang kaya folat makanan dibandingkan dengan makanan lain; namun, seperti halnya riboflavin, konsentrasi folat dapat meningkat secara signifikan di banyak produk susu karena fermentasi mikrobial. Di antara produk susu, susu fermentasi dianggap sebagai matriks potensial yang baik untuk fortifikasi folat karena protein pengikat folat yang ada dalam susu meningkatkan stabilitas folat dan meningkatkan bioavailabilitas baik 5-methyltetrahydrofolate (bentuk alami vitamin yang paling dominan) dan asam folat (Verwei et al., 2003). Namun, karena potensi risiko fortifikasi dengan asam folat, elaborasi susu fermentasi yang mengandung peningkatan kadar folat alami, akan menjadi alternatif yang lebih cocok.

Jumlah asam folat yang ditemukan dalam susu sapi berkisar antara 20 hingga 60 g/l, sedangkan konsentrasinya dalam yoghurt (biasanya antara 50 dan 70 g/l) dapat ditingkatkan tergantung pada kultur starter yang digunakan dan kondisi penyimpanan. Tingkat ini tergantung pada strain *Strep. thermophilus* dan *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* digunakan, karena organisme yang terakhir telah terbukti menggunakan dan mendegradasi folat selama pertumbuhannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih kombinasi optimal dari jenis-jenis ini yang menghasilkan yoghurt yang dapat diterima secara organoleptik dengan konsentrasi asam folat yang meningkat secara bersamaan.

Dalam sebuah penelitian, *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* dan *Strep. termophilus* strain yang diisolasi dari yoghurt Argentina dan ditanam dalam media kultur bebas folat dan susu setelah itu produksi folat intraseluler dan ekstraseluler dievaluasi (Lai et al., 2012). Dari 92 galur BAL yang diisolasi awal yang diuji, 4 galur *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* dan 32 *Strep. thermophilus* mampu tumbuh tanpa adanya folat. Dari ini, *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* CRL863 dan *Strep. thermophilus* CRL415 dan CRL803 menghasilkan tingkat folat ekstraseluler tertinggi (antara 22 dan 135 g/l) dalam media bebas folat. Ketika digunakan untuk menyuntikkan susu, galur ini mampu meningkatkan konsentrasi folat awal hampir 90%.

Laporan di mana strain asli *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* terbukti menghasilkan folat alami. Dalam studi lanjutan, asam folat yang

sebelumnya diidentifikasi memproduksi *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (tiga strain) dan *Strep. thermophilus* (dua strain) digabungkan dan digunakan untuk mengelaborasi 15 yoghurt yang berbeda, yang masing-masing mengandung konsentrasi folat yang berbeda (Lai et al., 2013). Yoghurt yang dielaborasi dengan *L. bulgaricus* CRL871 dan dua strain *S. thermophilus* (CRL803 dan CRL415) memiliki konsentrasi folat yang jauh lebih tinggi (180 g/l) dibandingkan dengan susu (40 ± 10 g/l) dan yoghurt konvensional (80 ± 20 g/l). Hasil ini menunjukkan bahwa pemilihan strain yang rasional berguna dalam memperoleh yoghurt yang secara alami diperkaya dengan folat dengan peningkatan kandungan vitamin 4 kali lipat dibandingkan dengan susu yang tidak difermentasi dan peningkatan 2 kali lipat, dibandingkan dengan yoghurt konvensional.

Setelah hasil yang menjanjikan ini, kelompok yang sama ini menunjukkan bahwa penambahan kultur starter nonkonvensional (*L. amylovorus* CRL887) ke *L. bulgaricus* CRL871 dan *Strep.* strain *thermophilus* yang dipilih efisien dalam memproduksi yoghurt baru dengan konsentrasi folat yang lebih tinggi (260 g/l) membuat produk baru yang diperkaya bio ini menjadi alternatif yang sangat menarik untuk fortifikasi dengan asam folat kimia (Lai et al., 2014). Sebuah studi baru-baru ini telah menunjukkan bahwa manipulasi efektif aditif medium dan kondisi budi daya meningkatkan tingkat folat (164 ng/ml) dalam susu skim menggunakan *L. lactis* susp *cremoris*, isolat dari susu sapi mentah (Gangadharan dan Nampoothiri, 2011). Pentingnya kondisi anoksigenik pada pertumbuhan dan stabilitas folat, ditunjukkan pada riset tersebut.

Selain produk susu fermentasi, mikroorganisme mampu meningkatkan kandungan folat dalam berbagai macam makanan lainnya. Misalnya, fermentasi adonan gandum hitam untuk menghasilkan roti, sering disertai dengan peningkatan kandungan folat (Kariluoto et al., 2006). Dalam studi ini, peningkatan kandungan folat selama fermentasi terutama disebabkan oleh sintesis folat oleh ragi; BAL tidak menghasilkan folat, melainkan mengkonsumsinya. Variasi dalam kultur starter menyebabkan perbedaan besar dalam kandungan folat dari penghuni pertama tetapi efeknya telah sedikit diselidiki. Pemilihan strain yang tepat, yaitu menukar BAL yang mengonsumsi folat dengan yang memproduksi folat, dapat secara signifikan meningkatkan

kandungan folat dalam roti. Gangadharan dan Nampoothiri (2011) juga menunjukkan bahwa penggunaan *L. lactis* terbukti sangat baik pilihan untuk meningkatkan kandungan folat dalam jus mentimun dan semangka.

Studi yang lebih lengkap dilakukan pada dedak gandum, di mana 20 bakteri diisolasi dan diuji kemampuannya dalam memproduksi folat (Kariluoto et al., 2014). Produsen terbaik dicirikan sebagai *B. subtilis* ON4, *Chryseobacterium* sp. NR7, *Janthinobacterium* sp. RB4, *Pantoea agglomerans* ON2, dan *Pseudomonas* sp ON8. Perbedaan mencolok dalam distribusi folat di antara strain bakteri diungkapkan oleh analisis HPLC, di mana bentuk utama yang dihasilkan adalah tetrahydrofolate, 5,10-meteniltetrahydrofolat, 5-metiltetrahydrofolat, dan 5-formiltetrahydrofolat.

Peningkatan kandungan folat selama pertumbuhan bakteri, disertai dengan peningkatan proporsional dalam kandungan 5-metiltetrahydrofolat (5-MTHF) dan penurunan 5-formiltetrahydrofolat. Bentuk folat ini biasanya ada dalam makanan dan tidak menyebabkan efek sekunder yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dengan konsumsi bentuk kimia vitamin (asam folat). Dalam penelitian terbaru dari kelompok yang sama, ditunjukkan bahwa penambahan glukosa meningkatkan produksi 5-MTHF oleh *Strep. thermophilus* ABM5097, *L. reuteri*, dan *Propionibacterium* sp. ABM5378 (Kariluoto et al., 2014).

Dalam artikel lain, produksi ekstraseluler folat dan vitamin lainnya dievaluasi dalam kultur BAL yang diisolasi dari nukazuke, acar tradisional Jepang (Masuda et al., 2012). Di antara 180 isolat BAL yang diuji, dua galur *L. sakei* (CN-3 dan CN-28) dan satu strain *L. plantarum* (CN-49) menghasilkan folat ekstraseluler tingkat tinggi (lebih tinggi dari 100 g/l) dalam media kultur bebas folat. Namun, strain penghasil folat tidak menunjukkan toleransi terhadap konsentrasi tinggi garam dan alkohol, sangat membatasi penggunaannya dalam elaborasi nukazuke, meskipun mereka dapat digunakan dalam makanan fermentasi lainnya.

Selain itu, pemberian strain probiotik penghasil folat melalui oral dapat memberikan perlindungan yang lebih efisien terhadap peradangan dan kanker, baik dengan memberikan efek menguntungkan dari probiotik dan dengan memberikan folat ke sel kolon-rektal (Pompei et al., 2007). Pada manusia, folat yang dihasilkan oleh mikrobiota di usus halus diasimilasi oleh inangnya.

Meskipun diyakini bahwa mereka hanya memasok sebagian kecil dari semua folat yang diserap pada manusia (Bates 1993), kontribusi mikrobiota terhadap kebutuhan folat dari epitel usus pergantian sel yang tinggi masih belum diketahui. Mekanisme penyerapan folat luminal oleh sel-sel di usus besar manusia telah dilaporkan, menunjukkan bahwa folat yang diproduksi *in situ* oleh mikrobiota kolon dapat dimanfaatkan oleh sel-sel di epitel kolon. Baru-baru ini, telah ditunjukkan bahwa folat yang disintesis secara bakterial juga dapat diserap melalui usus besar dan dimasukkan ke dalam hati dan ginjal anak babi (Asrar dan O'Connor, 2005).

Para penulis ini memperkirakan bahwa sekitar 18% dari kebutuhan folat makanan untuk anak babi dapat dipenuhi oleh penyerapan folat di seluruh usus besar. Juga, peningkatan populasi *Bifidobacterium* usus, yang disebabkan oleh konsumsi ASI, telah berkorelasi dengan peningkatan status folat pada tikus. Oleh karena itu, bakteri di saluran usus mungkin dapat berkontribusi pada kebutuhan folat sel epitel kolon. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan apakah bakteri ini menghasilkan folat di lingkungan usus; bentuk di mana folat ini terjadi; ketersediaan folat ini untuk transportasi dan pemanfaatan oleh kolonisasi dari lumen; dan kontribusi mikrobiota usus terhadap kebutuhan folat total sel epitel kolon.

B. Probiotik In Situ

D'Aimmo et al., (2012) menyaring 19 strain bifidobacteria yang diisolasi sebagian besar dari kotoran manusia karena kemampuannya menghasilkan folat. Sepuluh galur tumbuh dalam media kultur bebas folat sintesis yang menunjukkan autotrofi folat dan menunjukkan auksotrofi folat dari sembilan galur yang tersisa. Hasil ini menyarankan bahwa bifidobacteria dapat berkontribusi pada asupan folat, baik dengan memproduksi vitamin ini secara langsung dalam makanan atau di usus.

Lactobacillus helveticus CD6 penghasil folat yang diisolasi dari susu fermentasi ditemukan menghasilkan 5-metil tetrahidrofolat (5-MeTHF), meskipun harus dinyatakan bahwa tingkat produksinya tidak diungkapkan dalam publikasi (Ahire et al., 2013). Strain ini kemudian dievaluasi untuk properti probiotik mengikuti pedoman WHO dan FAO. Ini menunjukkan kelangsungan hidup 90,61% pada kondisi yang sangat

asam (pH 2,0), kelangsungan hidup 90,66% di hadapan jus lambung sintesis, dan kelangsungan hidup 68% pada konsentrasi empedu 0,5% selama 24 jam. Sifat-sifat ini menjadikan strain ini kandidat ideal untuk menghasilkan folat secara langsung dalam kondisi GIT yang keras.

Penerapan *Lactobacillus* sebagai probiotik penghasil folat belum sepenuhnya dieksplorasi karena *L. plantarum* WCFS1, isolat GIT manusia, terbukti memiliki semua gen biosintesis folat dan tidak pernah dimasukkan dalam uji coba hewan untuk memberikan bukti kemampuannya memproduksi folat *in vivo* (Rossi et al., 2011). Tidak seperti *Lactobacilli*, beberapa strain *Bifidobacterium* penghasil folat telah dipilih, tetapi pelepasan vitamin dalam jumlah tinggi tampaknya tidak tersebar luas dalam genus. Percobaan pada hewan, mengkonfirmasi bahwa pemberian *bifidobacteria* penghasil folat secara positif mempengaruhi tingkat folat plasma, menunjukkan bahwa vitamin diproduksi *in vivo* oleh strain probiotik, dan diserap (Rossi et al., 2011). Dalam percobaan pada manusia, pemberian galur yang sama menghasilkan peningkatan yang signifikan dari konsentrasi folat dalam tinja (Strozzi dan Mogna 2008). Meskipun efek pada kadar plasma belum diselidiki, *bifidobakteri* penghasil folat dapat menyediakan sumber vitamin endogen komplementer dan dapat berkontribusi untuk mencegah defisiensi folat.

Menurut Sistem Genom Mikroba Terpadu (<http://www.microbesonline.org/>), lebih dari 3707 genom mikroba (termasuk lebih dari 50 genom BAL) telah diurutkan hingga saat ini, dengan beberapa proyek lain yang sedang berlangsung dan lebih banyak lagi dalam proses sedang diluncurkan. Dengan informasi dari proyek sekuensing ini, seperti yang diterbitkan oleh program Sekuensing Mikroba Institut Genom Bersama (http://genome.jgi-psf.org/mic_home.html), sekarang dimungkinkan untuk menganalisis genom bakteri tertentu secara *in silico* secara berurutan, untuk menentukan apakah mereka mengandung jalur metabolisme lengkap yang diperlukan untuk biosintesis vitamin *de novo*. Sejumlah alat yang berguna dapat ditemukan di internet yang sangat membantu dalam menganalisis genom mikroba. Salah satu situs yang paling berguna adalah **Genome Analysis and System Modeling Group** dari *Life Sciences Division of Oak Ridge National Laboratory* (<http://genome.ornl.gov/microbial/>). Situs ini berisi alat yang memungkinkan pengorganisasian gen ke dalam fungsi jalur metabolisme, kategori fungsional, distribusi taksonomi, dan sebagainya.

Dalam metabolisme subkategori kofaktor dan vitamin, dimungkinkan untuk melihat enzim mana yang ada dalam genom dibandingkan dengan jalur metabolisme referensi, sehingga memungkinkan pengguna untuk menentukan apakah mikroorganisme tertentu memiliki kemampuan untuk biosintesis vitamin B. (seperti riboflavin, folat, dan vitamin B₁₂) tanpa melakukan uji laboratorium. Alat serupa tersedia di database KEGG (Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) (<http://www.genome.jp/kegg/>).

Gen untuk biosintesis folat telah diidentifikasi dalam *L. lactis* (Sybesma et al., 2003), *L. plantarum* (Kleerebezem et al., 2003), dan di *L. delbrueckii* subsp. *bulgaricus* (van de Guchte et al., 2006). Jalur biosintetik pada BAL, mencakup tujuh langkah berurutan untuk mengubah prekursor guanisin trifosfat menjadi tetrahidrofolat. Namun, pada beberapa BAL yang tidak dapat mensintesis folat, beberapa gen yang terlibat dalam biosintesis folat kurang dalam genom; ini adalah kasus untuk *L. gasseri* (Wegkamp et al., 2004), *L. salivarius* (Claesson et al., 2006), *L. acidophilus*, dan *L. johnsonii* (van de Guchte et al., 2006).

Telah terbukti bahwa rekayasa metabolisme dapat digunakan untuk meningkatkan kadar folat dalam *L. lactis* (Wegkamp et al., 2007) dan *L. gasseri*. Strain penghasil folat yang diproduksi secara genetik dari *L. lactis* terbukti bermanfaat bagi hewan yang kekurangan folat (LeBlanc et al., 2010b). Folat yang diproduksi oleh BAL yang direkayasa secara genetik mewakili sumber yang tersedia secara hayati dari zat esensial berupa vitamin, karena ini mampu mengembalikan anemia megaloblastik parsial yang disebabkan oleh kekurangan folat dan meningkatkan kadar vitamin dalam darah. Dalam studi pelengkap, ditunjukkan bahwa BAL penghasil folat yang direkayasa secara genetik ini sama amannya dengan galur asli dan karenanya memerlukan studi lebih lanjut untuk memasukkannya ke dalam rantai makanan (LeBlanc et al., 2010c).

1. Vitamin B₁₂ (Cobalamin)

Istilah vitamin B₁₂ umumnya digunakan untuk menggambarkan jenis kobalt corrinoid, khususnya dari kelompok cobalamin (cbl). Dalam istilah yang ketat, vitamin B12 adalah bentuk vitamin yang diperoleh selama produksi industri dan tidak ada secara alami (Rucker et al., 2001). Sianida menstabilkan molekul selama prosedur ekstraksi dari kultur mikroba yang membentuk sianokobalamin. Dalam bentuk

alaminya, vitamin ini hadir terutama sebagai desoxyadenosilcobalamin (co-enzim B₁₂), metil cobalamin, pseudocobalamin, di antara bentuk lainnya. Secara struktural, molekul cobalamin dapat dibagi menjadi tiga bagian: cincin corrinic pusat dengan empat ligan ion kobalt; ligan superior (atau beta) yang terikat pada gugus adenosil atau metil; dan ligan bawah (atau alfa), biasanya dimethylb enzimidale (DMB); tetapi pada beberapa bakteri anaerob, adenin dan ligan lain juga dapat hadir, membentuk pseudocobalamin (atau pseudo- B₁₂) dan kofaktor aktif lainnya (Martens et al., 2002).

Hewan, tumbuhan, dan jamur tidak mampu menghasilkan cobalamin; itu adalah satu-satunya vitamin yang secara eksklusif diproduksi oleh mikroorganisme, terutama oleh anaerob (Smith et al., 2007). Selanjutnya, data biokimia dan genomik menunjukkan bahwa hanya sedikit bakteri dan archaea yang memiliki kemampuan untuk memproduksi vitamin ini (Rodionov et al., 2003). Hewan pemamah biak dewasa dan vegetarian yang ketat dapat memperoleh vitamin dalam bakteri khusus yang ada dalam rumen. Manusia tidak memiliki mikrobiota seperti itu di usus kecilnya dan harus menyerap ko-enzim dari sumber alami seperti daging hewan (terutama hati dan ginjal), ikan, telur, dan produk farmasi.

Kekurangan vitamin B₁₂ dapat menyebabkan manifestasi patologis yang berbeda yang mempengaruhi sistem hematopoietik, neurologis, dan kardiovaskular, antara lain. Salah satu bentuk ekstrem dari defisiensi B₁₂, yang dikenal sebagai anemia pernisiiosa, biasanya tidak terkait dengan diet, melainkan dengan masalah pada sistem lambung yang disebabkan oleh kurangnya produksi glikoprotein lambung yang disebut faktor intrinsik, yang memfasilitasi penyerapan vitamin di usus kecil. Karena kompleksitas biosintesis B₁₂ dan keterbatasan ruang lingkup bab ini, pembaca yang tertarik diundang untuk membaca ulasan luar biasa yang telah diterbitkan tentang subjek ini (Mera dan Escalante-Semerena 2012).


Dengan publikasi yang konstan dari sekuens genomik mikroba baru, dapat disimpulkan bahwa beberapa mikroorganisme tidak menghasilkan B₁₂ tetapi memiliki (menggunakan evaluasi *in silico*) kapasitas untuk mengangkut dan memanfaatkan B₁₂ (Rodionov et al., 2003), meskipun tidak selalu jelas di mana reaksi vitamin ini terlibat. Seperti ditunjukkan di atas, hanya bakteri dan archaea yang dapat

mensintesis B₁₂, meskipun relatif sedikit yang dapat mensintesisnya secara *de novo*. Salah satu organisme model pertama yang digunakan untuk mempelajari biosintesis B₁₂ adalah *Propionibacterium freudenreichii* yang digunakan dalam produksi industri vitamin ini. Namun, percobaan pertama dengan bakteri ini tidak membuahkan hasil karena ketidakstabilan biosintesis perantara (Battersby 1994).

Untuk menghindari masalah ini, langkah penting adalah penggunaan bakteri aerobik penghasil B₁₂ *Pseudomonas denitrificans* yang memungkinkan isolasi banyak zat antara dan karakterisasi sebagian besar gen yang terlibat dalam biosintesis vitamin ini (Battersby 1994; Thibaut et al. 1998). Studi-studi ini menyimpulkan bahwa biosintesis cobalamin dapat dilakukan baik dalam (i) aerobik atau tergantung oksigen atau (ii) anaerobik atau kondisi bebas oksigen. Rute anaerobik (Gambar 3.1), diamati pada galur *P. freudenreichii*, *Salmonella enterica*, dan *Bacillus megaterium*, dijelaskan (Escalante-Semerena, 2007). Masalah karakterisasi awal terutama disebabkan oleh fakta bahwa ion kobalt pusat dimasukkan ke dalam cincin corrinoid pada langkah awal yang menghasilkan zat antara tidak stabil yang sulit untuk diisolasi. Di sisi lain, dalam rute yang bergantung pada oksigen, kobalt dimasukkan pada tahap selanjutnya menciptakan zat antara yang lebih stabil.

2. Biosintesis Cobalamin oleh *Lactobacillus Reuteri*

Diketahui bahwa strain tertentu dari *L. reuteri* mampu memetabolisme gliserol dalam fermentasi bersama dengan glukosa. Enzim pertama dalam jalur metabolisme ini adalah gliserol dehidratase yang membutuhkan AdoCbl sebagai kofaktor. Dalam reaksi ini, gliserol diubah menjadi 3-HPA, yang kemudian direduksi oleh NADH menjadi 1,3-propanediol (1,3-PDL) yang dimediasi oleh 1,3- PDL:NAD oksidoreduktase. Diperlihatkan bahwa *L. reuteri* CRL1098 mampu memetabolisme gliserol dalam media bebas B₁₂, ini menjadi bukti tidak langsung pertama dari keberadaan cobalamin intraseluler di *L. reuteri* (Taranto et al., 2003). Analisis kromatografi ekstrak intraseluler *L. reuteri* CRL1098 mengungkapkan bahwa galur ini mampu menghasilkan senyawa dengan spektrum serapan yang sangat identik dengan kobalamin standar, tetapi dengan waktu elusi yang berbeda. Kehadiran cobalamin atau salah satu intermedietnya dalam ekstrak intraseluler galur ini dikonfirmasi menggunakan bioassay yang berbeda (Taranto et al., 2003).



Gambar 3.1 Intermediet utama dari sintesis biologis cobalamin. Panah dengan garis tidak lengkap menunjukkan adanya lebih dari tiga langkah enzimatik yang terlibat dalam memperoleh zat antara (LeBlanc et al., 2016).

Bukti genetik biosintesis cobalamin oleh *L. reuteri* CRL1098 kemudian diperoleh melalui penggunaan teknik biologi molekuler yang berbeda. Organisasi genetik (*gen tongkol* dan *cbi*) sangat mirip dengan *S. enterica* dan *Listeria innocua*. Penting untuk dicatat bahwa denominasi gen untuk biosintesis Cbl telah membingungkan karena beberapa peneliti telah menggunakan awalan yang berbeda, *cbi* dan *tongkol*, untuk menggambarkan gen di *P. denitrificans* dan *S. enterica*, masing-masing. Karena beberapa gen hadir di kedua rute biosintetik, ini dapat memiliki denominasi yang berbeda tergantung pada rute mana yang dijelaskan (Santos et al., 2007).

Cluster biosintesis genetik *L. reuteri* CRL1098 mengandung setidaknya 30 gen yang terlibat dalam sintesis *de novo* vitamin. Salah satu ciri khas dari kelompok *tongkol L. reuteri* adalah adanya gen *hem*

di tengah cluster. Pada organisme pernapasan *Listeria* dan *Salmonella* dengan kelompok *tongkol* serupa, gen *hem* dijelaskan di wilayah lain genom mereka. Kehadiran gen *hem* di *cluster tongkol* adalah karakteristik yang hanya diamati pada genom tertentu dari *Clostridium* (Rodionov et al., 2003).

Selain itu, analisis transkripsi dilakukan di *L. reuteri* CRL1098 menunjukkan bahwa tingkat tertinggi ekspresi kluster *tongkol* diamati pada fase pertumbuhan eksponensial akhir tanpa adanya cobalamin, meskipun keberadaan cobalamin eksogen hanya sebagian menekan ekspresi operon. Transkripsi sejumlah besar gen yang terlibat dalam sintesis cobalamin dalam penghuni pertama yang disiapkan dengan strain *L. reuteri* ATCC 55730 juga dijelaskan (Hüfner et al., 2008). Selain strain CRL 1098, *L. strain reuteri* juga terbukti mampu menghasilkan beberapa corrinoids seperti *L. reuteri* DCM 20016 (Santos et al., 2008), JCM1112 (Morita et al., 2008), dan CRL1324 dan 1327, galur yang diisolasi dari vagina.

Bioassay telah digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa *L. reuteri* CRL 1098 menghasilkan Cbl dalam urutan 50 g/l, yang merupakan jumlah sederhana dibandingkan dengan nilai yang diperoleh oleh galur yang digunakan dalam produksi industri yang melebihi 200 mg/l (Martens et al., 2002). Namun, nilai-nilai ini dapat dianggap memadai ketika kebutuhan harian vitamin B₁₂ diperhitungkan (2-3 g untuk orang dewasa) karena mereka dapat cukup untuk pengembangan makanan yang diperkaya dengan B₁₂. Kelemahan yang mungkin dalam perkembangan teknologi adalah bahwa bentuk utama dari corrinoid diproduksi secara anaerobiosis oleh *L. reuteri* adalah pseudocobalamin (Santos et al., 2007) yang, meskipun hadir sebagai ko-enzim di banyak bakteri anaerobik anaerobik dan fakultatif, tidak aktif pada hewan dan manusia. Studi kami menunjukkan bahwa dalam kondisi mikroaerofilik *L. reuteri* CRL1098 tidak hanya menghasilkan pseudo- B₁₂, tetapi juga sejumlah kecil corrinoid lain termasuk ko-enzim B₁₂ (Vera, 2007).

Di sisi lain, suplementasi dengan diet bebas B₁₂ dengan *L. reuteri* CRL1098 efektif dalam mencegah patologi yang disebabkan oleh defisiensi nutrisi vitamin B₁₂, baik pada mencit muda yang bunting maupun yang disapih (Molina et al., 2009). Meskipun hasil ini menggembirakan, penyelidikan kami diarahkan untuk memaksimalkan sintesis vitamin, terutama dalam bentuk aktifnya pada mamalia.

Oleh karena itu penting untuk mengkarakterisasi beberapa enzim kunci dalam biosintesis vitamin ini oleh *L. reuteri* CRL 1098, untuk membuka jalan bagi studi masa depan rekayasa metabolisme untuk meningkatkan produksi vitamin dan jumlah ko-enzim aktif. Gen *pduO* dari galur ini diekspresikan secara berlebihan, dan protein pengkode PduO dikristalisasi dan dikarakterisasi (St Maurice et al., 2007). Enzim ini terlibat dalam salah satu langkah terakhir biosintesis B₁₂: adenosilasi corrinoid, untuk menghasilkan ko-enzim aktif adenosil-cobalamin (Escalante-Semerena, 2007). Setelah studi ini, Vannini et al. (2011) melaporkan kloning dan ekspresi heterolog dari gen uroporphyrinogen-III-methyltransferase-synthase (*cobA/hemD*), yang mengkodifikasi enzim kunci dalam langkah awal biosintesis cobalamin di *L. reuteri* CRL 1098.

Sehubungan dengan aplikasi bioteknologi vitamin B₁₂, kemampuan minuman susu kedelai yang mengandung *L. reuteri* CRL1098 untuk mencegah patologi yang disebabkan oleh diet kekurangan B₁₂ dievaluasi menggunakan model murine eksperimental. Wanita hamil dibagi menjadi empat kelompok. Selain defisiensi B₁₂ dan kelompok kontrol, hewan dalam dua kelompok yang tersisa menerima susu kedelai non-fermentasi dan susu kedelai yang difermentasi dengan *L. reuteri* CRL 1098 dari akhir kehamilan hingga penyapihan. Pada akhir percobaan, betina dan keturunannya dikorbankan untuk menentukan parameter hematologi, imunologi, dan histologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian susu kedelai fermentasi mencegah perkembangan semua gejala yang diamati sebagai akibat dari defisiensi nutrisi B₁₂, baik pada mencit betina maupun pada keturunannya masing-masing. Perancangan pangan fungsional berbasis kedelai yang difortifikasi vitamin dengan strain *Lactobacillus* yang mampu menghasilkan senyawa dengan aktivitas B₁₂ merupakan terapi alternatif yang menarik untuk mencegah defisiensi vitamin (Molina et al., 2013).

Setelah deteksi produksi B₁₂ oleh *L. reuteri* CRL1098 dan studi kluster biosintesis cobalaminnya, urutan genomik dari dua galur *L. reuteri*, dengan karakteristik yang berbeda, dirilis oleh Joint Genome Institute: *L. reuteri* F275 (tipe pewarnaan DSM 20016) diisolasi dari kotoran manusia yang tidak mampu mengkolonisasi tikus dan *L. reuteri* 100-23 diisolasi dari ususi tkus. Anehnya, data genomik komparatif mengungkapkan bahwa galur yang diisolasi dari kotoran manusia (DSM 20016) menyajikan gugus biosintesis cobalamin yang juga

terkait dengan katabolisme anaerobik gliserol (atau 1,2-propanediol), sedangkan galur tikus (100-23) tidak mengandung *tongkol* atau gen metabolisme gliserol.

Berdasarkan hipotesis transfer horizontal kluster *tongkol-pdu*, diharapkan strain BAL lain juga akan menerima pulau genomik ini melalui salah satu dari banyak mekanisme transfer genetik. Menariknya, analisis genom BAL yang diurutkan menunjukkan bahwa hanya *L. reuteri* (DSM20016/JCM1112 dan ATCC55730) mengandung gen *pdu-tongkol*. Martin et al., (2005) mengkarakterisasi strain Lact yang memproduksi *reuterin*. *L. coryniformis* diisolasi dari susu kambing. Dengan menggunakan metode mikrobiologi, penulis ini menunjukkan bahwa galur tersebut mampu menghasilkan senyawa tipe kobalamin. Data genetik dan biokimia awal (Vannini et al., data tidak dipublikasikan), menunjukkan bahwa cluster *tongkol-pdu* akan menyebar di lactobacilli lain seperti *L. coryniformis*, dan *L. murinus*. Ketersediaan beberapa strain penghasil vitamin B₁₂ dan spesies BAL akan menjadi penting, tidak hanya untuk studi dasar di masa depan tentang produksi kobalamin, tetapi juga dalam studi evolusi terkait dengan akuisisi pulau genomik *tongkol-pdu*, dan aplikasi potensialnya pada pengembangan produk yang mengandung B₁₂.

Pembentukan vitamin larut air (vitamin B₁₂, vitamin B₆, riboflavin, tiamin, asam nikotinat, dan nikotinamida) selama fermentasi substrat padat tempe diselidiki. Penambahan *Citrobacter freundii* yang memproduksi vitamin B₁₂ dan *Klebsiella pneumonia* menghasilkan peningkatan vitamin B₁₂ yang aktif secara fisiologis (Keuth dan Bisping 1993). Pengaruh *Rhizopus* terhadap pembentukan vitamin B₁₂ oleh *C. freundii* juga diselidiki. Kandungan vitamin tempe yang diperoleh dengan fermentasi dengan kapang dan bakteri, tiga kali lebih tinggi dari fermentasi kontrol menggunakan *C. freundii*.

Dalam penelitian terbaru, sifat fungsional *L. fermentum* CFR 2195, diisolasi dari tinja bayi yang sehat, dievaluasi (Basavanna dan Prapulla 2013). Strain ini mampu mematuhi garis sel HT-29 dan Caco-2, menunjukkan aktivitas proteolitik yang tinggi dan, yang lebih menarik, produksi vitamin B₁₂ (29,45 ng/g biomassa kering) di bawah fermentasi terendam. Selain itu, produksi vitamin dievaluasi dalam BAL yang diisolasi dari nukazuke, acar tradisional Jepang (Masudo et al., 2012). Di antara 180 isolat BAL, satu strain *L. coryniformis* dan

salah satu *L. plantarum* mampu menghasilkan sekitar 2 g/l vitamin B₁₂. Meskipun tingkat ini tidak dianggap tinggi, penelitian ini menunjukkan bahwa properti penghasil vitamin B₁₂ harus dievaluasi dalam relung ekologi yang berbeda untuk menemukan galur penghasil B₁₂ tinggi yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk probiotik baru yang bertujuan mencegah

Dalam bab ini, studi terbaru yang menjelaskan BAL penghasil vitamin kelompok B telah ditinjau, menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi vitamin kelompok B dalam yoghurt dan susu fermentasi, dimungkinkan melalui pemilihan spesies mikroba dan kondisi budi daya yang bijaksana.

Diharapkan bahwa industri makanan akan mengambil langkah selanjutnya untuk menggunakan informasi ini untuk memilih vitamin memproduksi strain untuk digunakan sebagai kultur starter untuk produk fermentasi yang diperkaya vitamin yang ditujukan untuk populasi yang kekurangan vitamin. Produk semacam itu, akan memberikan manfaat ekonomi bagi produsen makanan karena peningkatan konsentrasi vitamin “secara alami” akan menjadi nilai tambah yang penting tanpa meningkatkan biaya produksi. Konsumen jelas akan mendapatkan keuntungan dari produk tersebut meningkatkan asupan vitamin mereka saat mengonsumsi mereka sebagai bagian dari diet normal mereka. Produksi vitamin *in situ* oleh mikrobiota asli atau galur probiotik telah menjadi strategi baru yang menarik untuk mencegah kekurangan vitamin.

BAKTERI ASAM LAKTAT DAN IMUNITAS MANUSIA

Saluran pencernaan manusia (*Gastrointestinal Tract* = GIT) mewakili area permukaan tubuh terbesar yang terpapar lingkungan eksternal. Area tersebut merupakan bagian yang terus ditantang oleh beragam antigen lingkungan, makanan, dan mikroba yang berasal dari flora enterik. Selain memfasilitasi pencernaan dan memungkinkan penyerapan nutrisi, GIT melakukan fungsi yang sangat kompleks dan halus untuk menunjukkan toleransi, baik terhadap antigen lingkungan yang tidak berbahaya, maupun terhadap flora enterik, tetapi pada saat yang sama meningkatkan respons imun yang agresif terhadap organisme patogen. Kegagalan untuk mengatur secara ketat respons ini menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap penyakit menular dan gangguan imunoinflamasi. Untuk melakukan fungsi-fungsi ini secara efisien, GIT dilengkapi dengan sistem kekebalan terbesar dalam tubuh.

Segera setelah lahir, sistem kekebalan bayi baru lahir belum matang dan naif secara fungsional. Sinyal yang diberikan oleh flora komensal dan antigen lingkungan memainkan peran sentral dalam perkembangan pascanatal dari sistem kekebalan usus dan pembentukan jalur imunoregulasi. Imunoregulasi yang rusak akibat paparan mikroba yang berkurang atau menyimpang selama awal kehidupan dikaitkan dengan peningkatan insiden gangguan atopik dan autoimun (Rook et al., 2005). Peran mikroflora usus dalam regulasi kekebalan juga disorot oleh pola yang berbeda dari mikroflora usus pada bayi dengan kecenderungan yang meningkat untuk mengembangkan penyakit atopik di kemudian hari dibandingkan dengan bayi yang sehat (Kalliomäki et al., 2001). Sedikit

yang diketahui tentang spesies bakteri atau molekul bakteri yang penting untuk perkembangan postnatal dan/atau aktivasi sistem imun mukosa. Bukti dari penelitian terbaru menunjukkan bahwa fungsi ini mungkin terkait dengan keberadaan jenis bakteri usus yang terbatas. Misalnya, kolonisasi hanya dengan *Bacteroides fragilis*, mikroorganisme usus di mana-mana, ditemukan efektif dalam mengarahkan organogenesis limfoid dan mengoreksi defisiensi sel T sistemik dan ketidakseimbangan Th1/Th2 pada tikus bebas kuman (Mazmanian et al., 2005).

Bukti yang muncul menunjukkan bahwa peradangan dan perubahan kapasitas kekebalan adalah akar penyebab sebagian besar gangguan infeksi, inflamasi, dan autoimun, termasuk penyakit metabolik. Dengan demikian, ada minat yang meningkat dalam mengembangkan strategi intervensi yang efektif dalam mengatur respons imun yang disregulasi atau diekspresikan secara berlebihan (respons Th1, Th2, Th17 terpolarisasi), dan meningkatkan kompetensi imun pada individu dengan fungsi imun yang kurang memadai. Studi selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa strain probiotik tertentu diberkahi dengan sifat imunomodulator spesifik dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi kekebalan dalam kesehatan dan penyakit. Probiotik didefinisikan sebagai mikroorganisme hidup yang, bila diberikan dalam jumlah yang cukup, memberikan manfaat kesehatan pada inangnya (*Food and Agriculture Organization/World Health Organization [FAO/WHO] 2001*). Strain bakteri yang paling umum digunakan sebagai probiotik adalah *Lactobacillus* dan *Bifidobacterium*.

A. Probiotik dan Modulasi Fungsi Kekebalan Tubuh

Efek asupan probiotik pada fungsi kekebalan telah menjadi subjek banyak penyelidikan pada subjek sehat dan subjek dengan gangguan imunoinflamasi. Hasil penelitian cukup heterogen, karena penggunaan protokol/desain eksperimental yang berbeda, strain probiotik, dosis dan durasi pengobatan, subjek penelitian, parameter kekebalan dan titik akhir penyakit yang diukur, serta faktor inang (seperti status kekebalan, genetik inang, gaya hidup). Namun, ada bukti tegas yang menunjukkan bahwa strain probiotik tertentu mampu mempengaruhi beragam fungsi kekebalan dalam kesehatan dan penyakit dan dapat digunakan secara efektif untuk mengoptimalkan kesehatan manusia.

1. Efek pada Imunitas Mukosa

a. Sel Epitel Usus

Satu lapisan sel epitel usus (IECs) memisahkan inang dari lingkungan eksternal. Selain melakukan fungsi penghalang, IEC memainkan peran penting dalam mengatur respons imun bawaan dan didapat di GIT. Mereka memiliki kapasitas untuk mengenali dan menanggapi berbagai bakteri dan produk bakteri dengan cara yang diskriminatif. Dengan demikian, status aktivasi dan fungsi regulasi IEC bergantung pada sifat rangsangan bakteri yang diterima. Beberapa penelitian *in vitro* telah menunjukkan bahwa stimulasi probiotik dari IECs mengarah pada pelepasan berbagai sitokin pro dan/atau anti-inflamasi tergantung pada strain probiotik yang digunakan. Misalnya, interleukin (IL)-8 adalah sitokin utama yang diproduksi oleh enterosit (HT 29 dan Caco-2) setelah terpapar *Lactobacillus* GG (Zhang et al., 2005), *L. sakei* (Haller et al., 2000), dan *L. plantarum* 299v (McCracken et al., 2002).

Sebaliknya, *L. reuteri* menghambat produksi IL-8 dalam sel HT-29 (Ma et al., 2004). DNA turunan VSL#3, campuran probiotik dengan kemanjuran yang terbukti melawan pouchitis dan kolitis ulserativa (UC), juga telah terbukti mengurangi ekspresi IL-8 di IECs; efeknya dimediasi melalui penghambatan aktivasi faktor nuklir B (NF κ B) (Jijon et al., 2004). Induksi toleransi imun terhadap *L. plantarum* yang tertelan pada manusia juga telah terbukti melibatkan modulasi jalur yang bergantung pada NF κ B di mukosa duodenum (van Baarlen et al., 2009). Bersama-sama, pengamatan ini menunjukkan bahwa, dengan menginduksi pelepasan berbagai sitokin dan kemokin oleh IEC, probiotik mampu mempengaruhi fungsi respons imun mukosa dan sistemik.

b. Fungsi Penghalang Mukosa Usus

Penghalang mukosa usus yang stabil sangat penting untuk menghambat transfer yang menyimpang dari antigen makanan dan mikrobial melintasi mukosa usus dan mencegah aktivasi respons imun yang tidak tepat dan merusak inang. Gangguan fungsi penghalang usus adalah ciri khas alergi makanan dan penyakit usus imunoinflamasi (Graschwitz dan Hogan, 2009).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi probiotik spesifik efektif dalam mencegah dan memperbaiki kerusakan mukosa yang disebabkan oleh alergen makanan (Rosenfeldt et al., 2003), obat anti inflamasi nonsteroid (Montalto et al., 2004) dan setelah syok hemoragik (Luyer et al., 2005). Probiotik telah terbukti memediasi efek ini dengan merangsang produksi IgA sekretori (sIgA) (Malin et al., 1996; Vujanen et al., 2005) dan molekul pertahanan inang lainnya seperti defensin (Schlee et al., 2008), melemahkan pro-inflamasi tanggapan (Pena et al., 2005; Sheil et al., 2004; Liu et al., 2010), menginduksi produksi musin (Mack et al., 2003) dan protein sitoprotektif (Yan et al., 2007), melindungi integritas persimpangan ketat (Montalto et al., 2004; Luyer et al., 2005), mempromosikan perbaikan jaringan (Yamaguchi et al., 2003; Otte dan Podolsky 2004), mengurangi adhesi bakteri dan penataan ulang sitoskeletal (Sherman et al., 2005), dan dengan mensekresi faktor trofik dan nutrisi.

c. Produksi IgA

sIgA adalah immunoglobulin utama yang ditemukan pada permukaan mukosa dan kadarnya dalam air liur banyak digunakan sebagai indikator imunitas mukosa (Albers et al., 2005). Hubungan antara kadar antibodi sIgA dan peningkatan kapasitas penetral virus dan peningkatan pembersihan virus (Colomina et al., 1998) juga telah dilaporkan. Dengan demikian, kurangnya sIgA nonspesifik pada permukaan mukosa atau ketidakmampuan untuk menghasilkan sIgA spesifik dapat menyebabkan peningkatan risiko infeksi dan gangguan inflamasi usus.

Banyak bakteri probiotik telah diuji kemampuannya untuk meningkatkan respons imun mukosa pada subjek manusia pada tahap kehidupan yang berbeda, mulai dari bayi sampai usia tua. Selama periode variabel setelah lahir, sistem kekebalan mukosa secara fungsional belum matang (Cummings et al., 2004). Misalnya, bayi baru lahir menunjukkan penurunan kapasitas untuk menghasilkan sel penghasil IgA. Jumlah sel penghasil IgA meningkat secara progresif sebagai respons terhadap stimulasi antigen usus terutama ketika asupan makanan oral dimulai dan mikrobiota usus terbentuk (Isolauri 2007). Fukushima et al. (1998) melaporkan bahwa anak-anak (berusia 15-31 bulan) yang diberi susu formula lanjutan yang mengandung *Bifidobacterium* menunjukkan kadar IgA total dalam tinja yang lebih tinggi selama intervensi dibandingkan

dengan kadar sebelum intervensi. Hasil serupa dilaporkan oleh Lara-Villoslada et al. (2007) pada anak-anak berusia 3-12 tahun yang diberi makan *L. coryniformis* CECT5711 dan *L. gasseri* CECT5714. Sebaliknya, Bakker-Zierikzee et al. (2006) tidak menemukan efek yang signifikan dari formula bayi yang dilengkapi dengan *B. animalis* BB12 pada sIgA tinja pada bayi berusia 0-32 minggu. Apakah ini karena strain dan dosis probiotik yang digunakan atau alasan lain tidak jelas.

Pengaruh probiotik pada imunitas mukosa pada orang dewasa yang sehat dan orang tua juga telah menjadi fokus dari banyak penelitian. Baru-baru ini, Kotani et al., (2010) dalam uji coba intervensi diet terkontrol plasebo acak-acak ganda yang melibatkan subjek lanjut usia menunjukkan bahwa konsumsi minuman air steril yang mengandung probiotik *L. pentosus* b240 yang dimatikan dengan panas efektif secara signifikan meningkatkan tingkat sekresi sIgA saliva rata-rata, serta konsentrasi sIgA. Ouwehand et al., (2009), menggunakan *L. acidophilus* NCFM dan intervensi diet laktitol pada subjek lanjut usia, melaporkan efek yang sama.

Dalam penelitian lain, pemberian *B. lactis* HN019 dan *L. rhamnosus* HN001 kepada ibu hamil yang dilakukan 2-5 minggu sebelum melahirkan dan dilanjutkan selama 6 bulan pada masa menyusui ditemukan secara signifikan meningkatkan kadar IgA (Prescott et al., 2008). Bertentangan dengan pengamatan ini, beberapa penelitian menggunakan strain yang berbeda (*L. johnsonii* La1, *B. animalis* ssp. *lactis* BB12 dan *L. paracasei* ssp. *paracasei* CRL431, *L. gasseri* CECT 5714 dan *L. coryniformis* CECT 5711) telah melaporkan tidak ada efek suplementasi probiotik pada tingkat imunoglobulin mukosa pada orang dewasa yang sehat. Efek diferensial pada anak-anak dan orang tua versus orang dewasa yang sehat memperkuat pandangan bahwa efek probiotik lebih menonjol pada kelompok populasi dengan fungsi kekebalan yang kurang optimal. sIgA memainkan peran kunci dalam perlindungan inang pada permukaan mukosa dan mempertahankan homeostasis mukosa.

2. Efek pada Imunitas Sistemik

a. Aktivitas Fagositosis

Kemampuan probiotik untuk meningkatkan aktivitas fagositosis leukosit darah tepi (monosit/makrofag dan sel polimorfonuklear (PMN)

pada subjek sehat, terutama dengan kompetensi imun yang kurang memadai, telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian pada manusia (Tabel 4.1).

Asupan *L. johnsonii* La1, *L. acidophilus* 74-2, *B. lactis* 420, *B. lactis* BB12, *L. rhamnosus* HN001, atau *B. lactis* HN019 menghasilkan peningkatan kapasitas fagositik leukosit darah tepi (PMN dan monosit) pada subjek sehat (Schiffrin et al., 1995; Donnet-Hughes et al., 1999; Gil et al., 2001a, 2001d; Klein et al., 2008). PMN menunjukkan peningkatan yang lebih besar secara signifikan dalam kapasitas fagositosis dibandingkan dengan monosit. Peningkatan aktivitas fagositosis bergantung pada dosis (Donnet-Hughes et al., 1999) dan dipertahankan selama beberapa minggu setelah penghentian asupan probiotik (Schiffrin et al., 1995; Gill et al., 2001a, 2001d). Dalam studi lain, *Lactobacillus* GG ditemukan menginduksi aktivasi neutrofil (meningkatkan ekspresi reseptor fagositosis CR1, CR3, FcγRI, dan FcγR) pada subjek sehat, tetapi menghambat aktivasi neutrofil pada subjek hipersensitif susu setelah pemberian susu (Pelto et al., 1998). Peningkatan ledakan oksidatif atau kapasitas mikrobisida sel PMN pada subjek yang diberi probiotik atau yoghurt juga telah ditunjukkan (Arunachalam et al., 2000; Mikes et al., 1995; Parra et al., 2004).

Tabel 4.1 Efek Probiotik Meningkatkan Kekebalan Tubuh

Intervensi	Efek kekebalan
Susu fermentasi yang mengandung <i>Lactobacillus rhamnosus</i> GG dan oligofruktosa selama 1 bulan (Amati et al., (2010))	IL-1, IL-6, dan IL-8
Dosis 2×10^8 CFU <i>L. salivarius</i> CECT5713 dalam kapsul selama 4 minggu (Sierra et al., 2010)	1. sel NK dan monosit meningkat 2. Serum imunoglobulin M, A, dan G meningkat 3. IL-10 meningkat
Minuman air steril yang mengandung <i>L. pentosus</i> b240 mati panas (4×10^9 sel) setiap hari selama 12 minggu (Kotani et al., 2010)	Secara signifikan perubahan sIgA yang lebih besar pada kelompok b240 dibandingkan kelompok plasebo selama periode intervensi.
Keju probiotik komersial mengandung sekitar 10^9 CFU/hari <i>L. rhamnosus</i> HN001 dan <i>L. acidophilus</i> NCFM selama 4 minggu (Ibrahim et al., 2010)	1. Peningkatan Sitotoksitas sel NK 2. Peningkatan Fagositosis
Yoghurt (90 g) difermentasi dengan <i>L. bulgaricus</i> OLL1073R-1 atau 100 ml susu setiap hari selama periode 8 atau 12 minggu (Makino et al., 2010)	Aktivitas sel NK pada kelompok yoghurt ($p = 0,028$)

Intervensi	Efek kekebalan
Kombinasi lactitol dan <i>L. acidophilus</i> NCFM selama dua kali sehari selama 2 minggu (Ouweland et al., 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsentrasi IgA tinja ditemukan berubah secara signifikan dari waktu ke waktu setelah koreksi untuk perbedaan awal. 2. Perubahan level PGE2 juga signifikan ($p = 0,028$).
Yoghurt probiotik (2 × 150 g) yang mengandung <i>L. johnsonii</i> La1 (dosis harian 109 CFU) selama 4 minggu (Schiffirin et al., 2009)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan endotoksin dan basal aktivitas fagositosis leukosit dalam plasma setelah asupan yoghurt pada kedua kelompok. 2. Peningkatan respons sitokin dan radikal bebas respons in vivo terkena monosit dan neutrofil, masing-masing. 3. Peningkatan kadar protein pengikat LPS plasma dan reseptor pengenalan pola LPS CD14 terlarut.
Yoghurt probiotik (300 g/ hari) ditambah dengan <i>L. acidophilus</i> 74-2 dan <i>B. lactis</i> 420 atau produk plasebo selama 5 minggu (Klein et al., 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan %Aktivitas fagosit (dari 92% hingga 95%) di granulosit dan monosit; tidak ada perubahan dalam aktivitas ledakan oksidatif mereka. 2. Tidak ada perubahan imun spesifik parameter (ekspresi CD3, CD19, CD4, CD8, CD16, dan CD56, CD57, CD3+HLA-DR, CD25, CD122, atau CD54).
Minuman berbasis oat dilengkapi dengan 109 CFU/hari <i>B. longum</i> 2C (DSM 14579) dan 46 (DSM 14583) (Ouweland et al., 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Korelasi negatif diamati antara tingkat Bifidobacterium spesies dan sitokin pro-inflamasi TNF-γ dan sitokin pengatur IL-10. 2. Adanya feses <i>B. longum</i> dan <i>B. animal</i> berkorelasi dengan penurunan serum IL-10. 3. Tingkat anti-inflamasi TGF-β1 meningkat dari waktu ke waktu di ketiga kelompok. 4. Adanya <i>B. breve</i> berkorelasi dengan kadar TGF-β1 serum yang lebih tinggi.
Suplemen harian <i>B. lactis</i> HN019 (6×10^9 /hari) atau <i>L. rhamnosus</i> HN001 (9×10^9 /hari) (Prescott et al., 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neonatus dari ibu yang mendapat probiotik memiliki kadar CB IFN-γ ($p = 0,026$), dibandingkan dengan kelompok plasebo. 2. Peningkatan Proporsi memiliki kadar IFN-γ darah yang terdeteksi ($p = .03$) dibandingkan dengan kelompok plasebo. 3. Kadar TGF-β1 pada ASI dini pada ibu yang menerima HN019 ($p = 0,041$) dan HN001 ($p = 0,075$). 4. Kadar IgA dalam ASI sebesar ibu yang menerima HN019 ($p = .008$) dan HN001 ($p = .011$). 5. Peningkatan Kadar CD14 plasma neonatus pada kelompok HN019 dibandingkan dengan plasebo.
Susu fermentasi dengan <i>L. casei</i> DN114001 selama 6 minggu (Ortiz- Andrelocchi et al., 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan limfosit T dan B dan peningkatan signifikan dalam aktivitas sel NK. 2. Penurunan TNF-α dalam ASI.

Intervensi	Efek kekebalan
<p>Minuman berbahan dasar susu mengandung baik <i>L. rhamnosus</i> GG ($1,6 \times 10^{10}$ CFU/hari), <i>B. animalis</i> ssp. <i>laktis</i> BB12 ($3,5 \times 10^{10}$ CFU/hari) atau <i>Propionibacterium freudenreichii</i> ssp. <i>shermanii</i> JS ($3,3 \times 10^{10}$ CFU/hari) atau minuman plasebo selama 3 minggu (Kekkonen et al., 2008)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar CRP serum yang sangat sensitif pada kelompok LGG dibandingkan dengan kelompok BB12 pada 3 minggu. 2. Peningkatan Serum tingkat CRP yang sangat sensitif pada kelompok LGG dan JS dibandingkan dengan kontrol (signifikansi tidak diberikan). 3. Tidak ada efek pada perubahan konsentrasi serum TNF-α, IL-6, IL-10, atau IFN-γ selama penelitian. 4. Tidak berpengaruh pada jumlah leukosit, monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, atau limfosit. 5. Penurunan Produksi TNF-α oleh <i>S. pyogenes</i> merangsang PBMC pada kelompok LGG dibandingkan dengan kontrol. Tidak ada efek pada produksi pada stimulasi dengan influenza A H2N3 atau LPS, atau dalam kelompok probiotik lainnya. 6. Penurunan Produksi IL-2 oleh influenza A PBMC yang distimulasi H2N3 pada kelompok BB12 dibandingkan dengan semua kelompok lain, tetapi tidak berpengaruh pada produksi pada stimulasi dengan <i>S. pyogenes</i> atau LPS, atau pada kelompok probiotik lainnya.
<p><i>L. rhamnosus</i> GG (10×10^9 CFU/hari), <i>L. rhamnosus</i> LC705 (10×10^9 CFU/hari) <i>B. breve</i> Bb99 (4×10^8 CFU/hari), atau <i>Propionibacterium freudenreichii</i> ssp. <i>shermanii</i> JS (4×10^9 CFU/hari), selama 2-4 minggu sebelum melahirkan (ibu). Bayi menerima setengah dari dosis ini selama 6 bulan pertama setelah lahir, ditambah 0,8 g galakto oligosakarida.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kadar protein C-reaktif plasma pada 6 bulan (yrisiko eksim dan penyakit alergi) 2. Peningkatan Konsentrasi IL-10 plasma pada 6 bulan 3. Peningkatan Total IgA plasma pada 6 bulan 4. Plasma IL-2, IL-4, IL-6, IFN-γ, dan TNF-α nilainya di bawah batas deteksi 5. Tidak ada efek pada ekspresi IL-12 atau IL-4R dalam sel mononuklear darah tali pusat 6. Tidak berpengaruh pada sekresi IL-2, IL-4, IL-5, IL-10, IL-13
<p><i>L. johnsonii</i> La1 NCC533 (109 CFU/hari selama 12 minggu) dan <i>S. thermophilus</i> (108 CFU/hari) (Marschan et al., 2008a,b)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan Serum TNF-α pada kelompok uji, tetapi tidak ada perbedaan antarkelompok. 2. Peningkatan Aktivitas fagositosis darah pada subjek dengan kadar awalnya rendah pada kelompok uji setelah 4 minggu, tetapi tidak ada perbedaan antara kedua kelompok. 3. Peningkatan Jumlah eritrosit pada 4 minggu. 4. Peningkatan Jumlah sel darah putih pada 12 minggu pada kelompok uji, tetapi tidak ada perbedaan antarkelompok.

Intervensi	Efek kekebalan
Yoghurt konvensional yang mengandung <i>L. bulgaricus</i> dan <i>S. thermophilus</i> atau produk probiotik (Max Defensas, Puleva Food SL) yang mengandung <i>L. coryniformis</i> CECT5711 dan <i>L. gasseri</i> CECT5714 selama 3 minggu (Lara-Villoslada et al., 2007)	Penghambatan adhesi <i>S. choleraesuis</i> pada musin usus secara signifikan lebih tinggi ($p < .05$) untuk air tinja dari anak-anak pada minggu ke 6 dibandingkan dengan sampel dari minggu ke 0 dan 3. Konsumsi probiotik juga terbukti meningkatkan konsentrasi IgA dalam feses dan saliva ($p < 0,05$).
<i>Bacillus polyfermenticus</i> ($3,1 \times 10^8$ CFU/hari selama 8 minggu) (Kim et al., 2006)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Konsentrasi IgG serum 2. Peningkatan % CD4+ (sel Th), CD8+ (sitotoksik) 3. Peningkatan sel T, dan CD56+ (sel NK) dalam darah 4. Tidak berpengaruh pada kadar IgA atau IgM serum 5. Tidak berpengaruh pada % sel T dan B dalam darah
Minuman fermentasi (80 ml) mengandung 4×10^{10} CFU <i>L. casei</i> Shirota (LcS) hidup selama 3 minggu (Takeda et al., 2006)	Kemampuan LcS untuk meningkatkan aktivitas sel NK dan menginduksi produksi IL-12 dikorelasikan dan penambahan anti-IL-12 antibodi monoklonal mengurangi peningkatan aktivitas sel NK yang dipicu oleh LcS.

Penuaan dikaitkan dengan penurunan kapasitas kekebalan dan peningkatan kerentanan terhadap penyakit menular dan kanker (Gill et al., 2001b). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan probiotik mampu mengembalikan penurunan fungsi sel fagosit yang berkaitan dengan usia (Gill 2003). Subjek berusia yang diberi susu yang mengandung *L. rhamnosus* HN001 atau *B. lactis* HN019 selama 3-6 minggu menunjukkan aktivitas fagositosis yang secara signifikan lebih tinggi daripada subjek yang diberi susu tanpa probiotik (Arunachalam et al., 2000; Gill et al., 2001a, 2001b; Gill dan Rutherford 2001; Sheih et al., 2001).

Sebuah studi baru-baru ini, (Ibrahim et al., 2010) yang melibatkan subjek lanjut usia (usia rata-rata 86 tahun) yang diberi keju probiotik (109 unit pembentuk koloni [CFU]/hari *L. rhamnosus* HN001 dan *L. acidophilus* NCFM selama 4 minggu) juga dilaporkan secara signifikan peningkatan aktivitas fagositosis granulosit dan monosit ($p < .001$), serta sitotoksitas *ex vivo* sel pembunuh alami (NK) ($p = .05$). Yang penting, subjek dengan status kekebalan pra-intervensi yang relatif buruk secara konsisten menunjukkan peningkatan yang lebih besar dalam fungsi sel fagositik dibandingkan subjek dengan fungsi kekebalan pra-intervensi yang memadai (Gill et al., 2001c).

Lebih lanjut, peningkatan kapasitas fagositosis juga berkaitan dengan usia, dengan subjek yang lebih tua dari 70 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan lebih besar dalam fungsi kekebalan daripada mereka yang berusia di bawah 70 tahun (Gill dan Rutherford 2001). Penting untuk dicatat, bahwa beberapa penelitian tidak menemukan efek asupan probiotik pada fungsi kekebalan alami (Spanhaak et al., 1998). Apakah ini disebabkan oleh kemampuan imunostimulator yang buruk dari strain probiotik yang digunakan, dosis suboptimal, viabilitas probiotik, atau alasan lain tidak diketahui.

Perbedaan yang bergantung pada strain dan dosis dalam kemampuan BAL untuk memodulasi fungsi imun didokumentasikan dengan baik (Donnet-Hughes et al., 1999). Kapasitas kekebalan yang terganggu pada siswa di bawah tekanan ujian didokumentasikan dengan baik. Marcos et al. (2004) menyelidiki pengaruh konsumsi kultur yoghurt ditambah *L. casei* DN-114001 setiap hari selama 6 minggu pada status kekebalan pada siswa yang muncul untuk ujian. Hasil penelitian menunjukkan efek pengobatan yang signifikan pada jumlah absolut limfosit dan sel CD56 selama penelitian 6 minggu. Hasil ini dengan jelas menunjukkan bahwa konsumsi probiotik dapat secara signifikan meningkatkan respons imun bawaan yang lebih buruk pada individu yang sehat, yang menunjukkan kegunaannya untuk tujuan profilaksis.

Penelitian terbatas pada bayi dan anak-anak karena invasif dari tes yang terlibat. Dalam penelitian terbaru pada bayi, Taylor et al. (2006) menyelidiki pengaruh pemberian probiotik *L. acidophilus* LAVRI-A1 (Lafti L10) pada penanda kekebalan bawaan pada bayi berusia 0-6 bulan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan produksi sitokin oleh sel mononuklear darah setelah distimulasi dengan Pansorbin atau lipopolisakarida (LPS). Juga, tidak ada perbedaan yang ditemukan dalam kapasitas penyajian antigen dari sel-sel imunokompeten pada bayi-bayi ini. Jadi, suplementasi probiotik untuk bayi tidak mengubah respon imun bawaan awal. Apakah kurangnya efek itu karena kapasitas imunomodulator dari strain probiotik yang digunakan, parameter kekebalan yang diukur, waktu pengambilan sampel atau alasan lain tidak jelas. Percobaan lebih lanjut, terutama menggunakan probiotik dengan efek imunomodulator yang diketahui, diperlukan untuk mengkonfirmasi pengamatan tersebut.

b. Aktivitas Sel NK

Pengaruh asupan probiotik pada aktivitas sel NK telah menjadi fokus dari banyak penelitian (Tabel 4.1). Ortiz-Andrellucchi et al. (2008) meneliti perubahan imunologi pada wanita yang baru melahirkan dan menyusui selama 6 minggu pertama menyusui setelah suplementasi dengan susu yang difermentasi dengan *L. casei* DN114001. Mereka melaporkan peningkatan signifikan ($p = 0,026$) sel NK dan peningkatan limfosit T dan B yang tidak signifikan selama masa nifas pada subjek yang diberi susu yang difermentasi dengan *L. casei*. Morimoto et al. (2005) menunjukkan bahwa konsumsi minuman *L. casei* Shirota (LcS) (4×10^{10} sel hidup/80 ml) juga efektif secara signifikan meningkatkan aktivitas sel NK pada perokok biasa (20–60 tahun). Takeda dan Okumura (2007), juga mengamati peningkatan signifikan aktivitas sel NK pada orang dewasa paruh baya yang sehat (30–45 tahun) dengan tingkat aktivitas sel NK alami yang relatif rendah, setelah suplementasi dengan probiotik yang sama. Peningkatan aktivitas sel NK (*ex vivo*) dan peningkatan persentase sel NK dalam darah tepi pada orang sehat setelah konsumsi yoghurt atau susu atau minuman fermentasi yang mengandung probiotik secara teratur juga telah ditunjukkan oleh orang lain (Makino et al., 2010; Sierra et al., 2010). Menariknya, seperti aktivitas fagositosis, peningkatan fungsi sel NK pada subjek lanjut usia, setelah asupan probiotik, secara signifikan berkorelasi dengan usia.

c. Kekebalan yang Diperoleh

Imunitas yang didapat terdiri dari respons yang diperantarai antibodi dan sel dan dicirikan oleh spesifisitas dan memorinya. Bukti terbaik untuk efek probiotik pada respons imun didapat berasal dari penelitian dengan vaksin virus dan bakteri (Tabel 4.2). Dalam studi acak, *double-blind*, terkontrol plasebo, subjek yang diberi yoghurt yang mengandung *L. rhamnosus* dan *L. paracasei* memiliki respons antibodi penetral virus yang jauh lebih tinggi (terutama IgA), setelah vaksinasi dengan virus polio hidup yang dilemahkan, dibandingkan dengan subjek yang diberi plasebo (susu yang diasamkan secara kimia). Kadar IgG dan IgA serum spesifik polio pada sukarelawan yang mengonsumsi yoghurt juga meningkat secara signifikan (de Vrese et al., 2001).

Dalam penelitian selanjutnya, de Vrese et al., (2005) meneliti efikasi vaksin polio pada orang dewasa sehat (20–30 tahun) yang

diberi probiotik *L. rhamnosus* GG (1010/hari) atau *L. paracasei* subsp. *paracasei* CRL431 (1010/hari) selama 5 minggu; subjek divaksinasi polio serotipe 1, 2, dan 3 setelah 8 hari penelitian. Titer yang diinduksi vaksin meningkat pada kedua kelompok probiotik terhadap semua serotipe. Titer IgA yang signifikan terhadap serotipe 1 ditemukan pada kelompok LGG. Sebaliknya, titer IgM terhadap serotipe 2 dan 3 lebih tinggi pada kelompok probiotik CRL431. Namun, Barat et al., (2008) tidak menemukan efek pada respons antibodi terhadap polio, bila diberikan dalam kombinasi dengan vaksin konjugat DTaP dan Hib, pada bayi yang sehat dan cukup bulan yang diberi *L. paracasei* subsp. *paracasei* galur F19. Sekali lagi rejimen vaksinasi (termasuk kelompok usia subjek) dan/atau strain probiotik dapat menjadi penyebab kurangnya efek.

Baru-baru ini, Soh et al., (2010) meneliti tanggapan antibodi terhadap vaksin hepatitis B (HepB) dan DTPa-HepB pada bayi yang diberikan probiotik atau plasebo. Peningkatan signifikan dalam respons antibodi terhadap antigen permukaan HepB pada subjek yang menerima probiotik dan dosis monovalen vaksin HepB dan DTPa-HepB, tetapi tidak setelah tiga dosis monovalen vaksin HepB diamati. Hasil ini menunjukkan efek imunostimulan tergantung jadwal vaksin dari probiotik. Efek probiotik pada respons terhadap vaksin bakteri juga telah menjadi subjek banyak penelitian.

Link-Amster et al., (1994) dan Dia et al., (2000) melaporkan secara signifikan lebih tinggi antibodi IgA serum spesifik *Salmonella* dan respons sel yang mensekresi IgA setelah vaksinasi pada subjek dewasa sehat yang diberi probiotik (*B. bifidum*, *L. acidophilus* La1, *Lactobacillus*). Konsisten dengan pengamatan ini, kecenderungan peningkatan kadar IgA anti-*Salmonella* pada subjek dewasa sehat yang diberikan LGG dan vaksin *Salmonella* oral dilaporkan oleh Fang et al., (2000). Aktivitas ajuvan imun yang bergantung pada strain dari tujuh strain probiotik yang diberikan bersama dengan vaksin *Vibrio cholera* (Ogawa, Inaba, dan Inaba Eltor) juga telah ditunjukkan (Paineau et al., 2008).

Pada anak-anak dengan indeks tinggi paparan alami mikroorganisme, tindakan adjuvant susu difermentasi dengan *S. thermophilus* atau *S. thermophilus* dan *L. casei* diuji dalam kombinasi dengan vaksin DTP-HiB atau vaksin anti-pneumokokus. Tidak ada perbaikan dalam respon antibodi yang diamati pada salah satu kelompok yang diteliti. Disarankan bahwa tingkat alami paparan mikroba awal yang tinggi pada

bayi dan anak-anak yang termasuk dalam kelompok sosial ekonomi rendah, yang tinggal di “lingkungan yang kurang higienis,” mungkin bertanggung jawab atas tidak adanya efek stimulasi kekebalan tambahan dalam menanggapi suplementasi probiotik (Perez et al., 2010).

Tabel 4.2 Responsivitas Probiotik terhadap Vaksin

Probiotik	Vaksin	Efek kekebalan
Susu rendah lemak yang difermentasi oleh <i>S. thermophilus</i> (produk kontrol) atau susu rendah lemak yang difermentasi oleh <i>S. thermophilus</i> dan <i>L. casei</i> (produk uji) (Perez et al., 2010)	Vaksin DTP-Hib atau vaksin antipneumokokus 23 valent	Tingkat imunoglobulin dan akuisisi isoagglutinin serupa pada kedua kelompok. Tidak ada perbedaan antara kelompok dalam tingkat antibodi baik sebelum atau sesudah vaksinasi.
Probiotik atau plasebo (Soh et al., 2010)	Dosis monovalen vaksin HepB pada 0, 1 bulan dan vaksin kombinasi DTPa-HepB.	Suplementasi probiotik meningkatkan respons antibodi permukaan HepB pada subjek yang menerima dosis monovalen vaksin HepB pada 0, 1 bulan dan vaksin kombinasi DTPa-HepB pada 6 bulan (plasebo: 187,97 [180,70-195,24], probiotik: 345,70 [339,41–351,99] mIU/ml) ($p = 0,069$), tetapi bukan mereka yang menerima tiga monovalen.
Minuman susu fermentasi, yang mengandung strain probiotik <i>L. casei</i> DN-114 001 dan fermentasi yoghurt (Actimel), atau produk susu kontrol <i>nonfermented</i> dua kali sehari selama 7 minggu (pilot) atau 13 minggu (konfirmasi) (Boge et al., 2009)	Tiga strain virus influenza yang menyusun vaksin H1N1, H3N2, dan B. Vaksinasi dilakukan setelah 4 minggu penelitian.	Titer antibodi spesifik influenza meningkat setelah vaksinasi, secara konsisten lebih tinggi pada kelompok produk probiotik dibandingkan dengan kelompok kontrol di bawah konsumsi produk. Dalam studi konfirmasi, titer terhadap strain B meningkat secara signifikan lebih banyak pada kelompok probiotik daripada pada kelompok kontrol pada 3, 6, dan 9 minggu pasca vaksinasi di bawah konsumsi produk ($p = 0,020$).

Probiotik	Vaksin	Efek kekebalan
<p>Lactobacillus fermentum (CECT5716) ($1 \text{ \AA} \sim 10^{10}$ CFU / hari) atau plasebo (metil selulosa) 2 minggu sebelum vaksinasi dan 2 minggu setelah vaksinasi (Olivares et al., 2007)</p>	<p>Vaksin influenza trivalen (A/Kaledonia Baru/20/99 [H1N1], A/ Fujian/411/2002 [H3N2], B/ Shanghai/361/2002 [B])</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. % Sel Th (CD4 +) dalam darah pada 4 minggu (juga dalam kelompok kontrol) 2. \uparrow % Sel sitotoksik T (CD8+) dalam darah pada 4 minggu (juga dalam kelompok kontrol) 3. \uparrow % sel T memori (CD3 + CD45RO +) dalam darah pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 (juga dalam kelompok kontrol) 4. \uparrow % Sel NK (CD56+) dalam darah pada 4 minggu 5. \uparrow Konsentrasi IL-12 dalam plasma sebelum vaksinasi (2 minggu) dan juga pada 4 minggu (juga dalam kelompok kontrol pada saat ini) 6. \uparrow Konsentrasi TNF-α dalam plasma pada minggu ke-2 dan minggu ke-4 7. \uparrow Total IgG dan IgM dalam plasma 8. \uparrow Anti-influenza spesifik-IgA dalam serum 9. Tidak berpengaruh pada: % sel T (CD3+) dalam darah 10. % Sel B (CD19+) dalam darah 11. IL-10 atau IFN-γ konsentrasi plasma (tetapi tren untuk konsentrasi \uparrow IFN-γ pada minggu 2 dan 4) 12. Total plasma IgA, atau igg anti-influenzaspecific atau IgM
<p>Tujuh strain probiotik milik genera Lactobacillus dan Bifidobacterium diuji secara terpisah. Setiap kapsul aktif mengandung $1 \text{ \AA} \sim 10^{10}$ CFU bakteri atau maltodekstrin (plasebo) (Paineau et al., 2008)</p>	<p>Vaksin terdiri dari fraksi antigenik Vibrio cholerae yang tidak aktif (Dukorals; SBL Vaccin AB, Stockholm, Swedia). Ini berisi fraksi dari tiga strain V. cholerae (Ogawa, Inaba, dan Inaba Eltor) dan toksin kolera rekombinan B; satu dosis vaksin terdiri dari ca. 10^{11} vibriions. Dosisnya adalah dua kapsul per hari selama 21 hari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antara hari 0 dan hari ke-21, IgG meningkat dalam dua kelompok probiotik, misalnya, Bifidobacterium lactis BI-04 dan L. acidophilus La-14, dibandingkan dengan kontrol ($p = 0,01$). Tren menuju perubahan signifikan dalam konsentrasi serum imunoglobulin dibandingkan dengan kontrol ($p < 0,1$) ditemukan untuk enam dari tujuh strain probiotik.

Bersama-sama studi tersebut, menunjukkan bahwa terlepas dari strain probiotik yang digunakan sebagai imunomodulator, antigen virus (Rotavirus, Polio, hepatitis B, dan Influenza) merespons lebih konsisten di semua kelompok umur yang diteliti (bayi, anak-anak, dewasa, dan orang tua). Namun, untuk vaksin polio, aksi probiotik tampaknya signifikan hanya bila digunakan sendiri daripada dalam kombinasi dengan vaksin lain (West et al., 2008). Di sisi lain, respons terhadap antigen bakteri (*Salmonella*, *Vibrio*, DTP-Hib) pada bayi dan anak-anak tergantung pada strain probiotik, serta pada tingkat paparan mikroba sebelumnya. Mekanisme yang tepat di mana probiotik meningkatkan respons imun spesifik tidak diketahui. Kemungkinan probiotik memediasi efek ini dengan mengatur pengenalan antigen dan fungsi sel efektor. Kemampuan probiotik untuk meningkatkan ekspresi reseptor pengenalan pola (misalnya, TLR), molekul MHC-II, dan molekul kostimulatori pada sel imunokompeten dan meningkatkan produksi sitokin imunoregulasi telah didokumentasikan dengan baik (Miettinen et al., 2008).

d. Efek pada Produksi Sitokin

Sitokin, dengan mengatur komunikasi sel-ke-sel, memainkan peran sentral dalam inisiasi, pemeliharaan utama, dan resolusi respons imun bawaan dan didapat. Misalnya, IL-12 dan IL-18 merangsang produksi interferon (IFN)- γ oleh sel T, B, dan NK dan IFN- γ meningkatkan kapasitas fagositik makrofag, menginduksi ekspresi MHC1 dan MHCII pada sel imunokompeten, meningkatkan sitotoksitas antitumor, mempromosikan fungsi sel T helper, dan meningkatkan imunogenisitas vaksin (Nussler dan Thomson 1992). Di sisi lain, faktor nekrosis tumor (TNF)- γ , bersama dengan IFN- γ , mempotensiasi toksisitas mikrobisida dan antitumor makrofag. IFN- γ memberikan perlindungan pada sel yang rentan terhadap invasi virus, dan IL-2 merangsang proliferasi dan diferensiasi sel NK dan B, dan berperan dalam induksi dan regulasi respons imun yang diperantarai sel-T (Gill 2003). IL-10 dan *Transforming Growth Factor* (TGF)- β 1 sangat penting untuk memulihkan homeostasis imunologis melalui regulasi Th1/respons imun Th2.

Jadi, untuk memahami mekanisme probiotik mempengaruhi fungsi berbagai sel imunokompeten, beberapa penelitian telah meneliti efek asupan probiotik pada produksi sitokin *in vivo* (serum/plasma) dan *ex vivo*. Sebagai contoh, beberapa penelitian telah melaporkan peningkatan kadar IFN- γ , IFN- γ , dan IL-2 pada subjek manusia yang diberi yoghurt dan/atau probiotik, dibandingkan dengan kelompok kontrol (Meyer et al., 2006). Peningkatan kadar IFN- γ darah tali pusat dan TGF- β 1 pada ASI awal pada ibu yang diberi *B. lactis* HN019 dan *L. rhamnosus* HN001 selama kehamilan (Prescott et al., 2008) dan peningkatan kadar IL-10 pada usia 6 bulan pada bayi yang diberi campuran *Bifidobacterium breve* Bb99 atau *Propionibacterium freudenreichii* ssp. *shermanii* (Marschan et al., 2008a,b) juga telah dilaporkan.

Dalam penelitian yang lebih baru yang melibatkan subjek lanjut usia, suplementasi dengan LGG bersama dengan oligofruktosa ditemukan meningkatkan produksi serum IL-1 β , IL-6, dan IL-8 (Amati et al., 2010). Ouwehand et al., (2008) melaporkan korelasi negatif antara tingkat spesies *Bifidobacterium* dalam tinja dan sitokin pro-inflamasi TNF- α dan sitokin pengatur IL-10 dalam sampel serum; adanya feses *B. longum* dan *B. animalis* berkorelasi dengan penurunan serum IL-10. Peningkatan kapasitas sel imunokompeten yang berasal dari subjek yang diberi probiotik, dibandingkan dengan subjek kontrol, untuk menghasilkan berbagai sitokin, setelah stimulasi mitogen *ex vivo*, juga telah dilaporkan (Gill et al., 2009). Bertentangan dengan pengamatan ini, beberapa penelitian telah menemukan sedikit atau tidak ada efek probiotik pada tingkat berbagai sitokin, termasuk IFN- γ pada subjek sehat (Olivares et al., 2006a); Takeda dan Okumura 2007. Variasi yang dilaporkan dalam tanggapan dapat disebabkan oleh perbedaan status kekebalan kelompok populasi yang diteliti, strain probiotik, serta dosis yang diberikan. Perbedaan strain-dependen dalam kemampuan probiotik untuk menginduksi sekresi sitokin dari sel imunokompeten didokumentasikan dengan baik (Miettinen et al., 1998; Niers et al., 2005).

B. Probiotik untuk Induksi Peningkatan Kekebalan Tubuh dan Ketahanan Penyakit

Sistem kekebalan yang berfungsi secara optimal sangat penting untuk kesehatan yang optimal. Defisiensi atau disregulasi fungsi imun

berhubungan dengan peningkatan predisposisi terhadap infeksi, inflamasi imun (alergi, penyakit inflamasi usus [IBD], dll.), dan penyakit autoimun dan kanker. Misalnya, peningkatan kerentanan kelompok populasi tertentu dengan kompetensi kekebalan yang kurang memadai, seperti individu dengan gangguan kekebalan, anak-anak, dan orang tua, terhadap infeksi saluran pencernaan dan pernapasan didokumentasikan dengan baik. Strategi saat ini untuk pencegahan dan pengelolaan penyakit menular bergantung pada penggunaan vaksin, antibiotik, dan antimikroba lainnya.

Namun, banyak dari vaksin tidak sepenuhnya melindungi, terutama pada kelompok populasi rentan seperti orang tua, dan penggunaan antibiotik yang sering dikaitkan dengan berbagai efek samping dan munculnya patogen yang resistan terhadap obat. Beberapa penelitian yang dirancang dengan baik, telah memberikan bukti tegas bahwa strain probiotik tertentu mungkin efektif dalam pencegahan dan/atau pengendalian infeksi saluran gastrointestinal, pernapasan dan urogenital, dan gangguan alergi. Bukti yang muncul juga menunjukkan bahwa imunomodulasi yang diinduksi probiotik mungkin terlibat secara sentral dalam memediasi banyak dari efek menguntungkan ini. Pada bagian berikut, kami memberikan gambaran tentang apa yang diketahui hingga saat ini mengenai hubungan antara imunomodulasi dan perlindungan penyakit yang dimediasi probiotik.

1. Infeksi Gastrointestinal

Kemanjuran profilaksis dan terapeutik probiotik, sebagai galur tunggal atau kombinasi dari beberapa galur, terhadap diare menular dan diare terkait antibiotik telah menjadi fokus dari banyak studi acak, tersamar ganda, terkontrol plasebo dan beberapa tinjauan sistematis dan metaanalisis (McFarland 2007). Meskipun heterogenitas yang signifikan antara studi, metaanalisis ini telah menyimpulkan bahwa strain probiotik spesifik efektif dalam memperpendek durasi diare menular akut, risiko diare perjalanan, dan kejadian diare terkait antibiotik dan diare yang didapat masyarakat. Misalnya, metaanalisis dari 34 uji coba tersamar, acak, terkontrol plasebo oleh Sazawal et al., (2006) menyimpulkan bahwa probiotik efektif dalam mengurangi diare terkait antibiotik sebesar 52%, risiko diare perjalanan sebesar 8%, dan diare akut dengan berbagai penyebab sebesar 34%. Juga ditemukan

bahwa pengobatan probiotik lebih efektif pada anak-anak (pengurangan risiko 57%) dibandingkan pada orang dewasa (pengurangan risiko 26%). Selanjutnya, efek perlindungan tidak berbeda secara signifikan di antara strain probiotik yang digunakan.

Studi tantangan infeksi pada hewan percobaan telah menunjukkan bahwa potensiasi yang diinduksi probiotik dari respons imun nonspesifik dan spesifik (Cross 2002) memainkan peran penting dalam perlindungan terhadap infeksi usus. Meskipun bukti yang signifikan untuk kemampuan probiotik spesifik untuk meningkatkan fungsi kekebalan pada subjek sehat, bukti langsung untuk ini pada manusia masih kurang. Hanya beberapa penelitian pada manusia hingga saat ini yang meneliti efek suplementasi probiotik pada hasil klinis dan fungsi kekebalan pada saat yang bersamaan.

Kaila et al., (1992) dan Majamaa et al., (1995) melaporkan bahwa pengurangan durasi diare menular akut pada anak-anak, setelah pemberian probiotik, disertai dengan peningkatan yang signifikan dalam frekuensi sirkulasi sel yang mensekresi IgG-, IgM-, dan IgA selama fase akut dan dengan peningkatan spesifik (sel penghasil antibodi IgA spesifik rotavirus dan kadar IgA serum anti-rotavirus) dan respons imun nonspesifik selama fase pemulihan. Lebih lanjut, kemanjuran yang lebih besar dari probiotik yang layak, dibandingkan dengan probiotik yang tidak aktif, terhadap diare virus akut juga dilaporkan karena kapasitas imunostimulornya yang superior; bayi yang menerima *Lactobacillus* GG yang viabel menunjukkan respons IgA serum anti-rotavirus yang lebih tinggi dan frekuensi respons sel yang mensekresi IgA spesifik-rotavirus yang lebih tinggi daripada subjek yang diberikan *Lactobacillus* GG yang tidak aktif (Kaila et al., 1995).

Demikian pula, hubungan antara pengurangan frekuensi pelepasan rotavirus dan peningkatan titer anti- rotavirus IgA dalam sampel tinja, setelah pemberian suplemen dengan *B. breve* juga telah dilaporkan (Araki et al., 1999). Penting untuk dicatat bahwa dalam penelitian yang dikutip di atas, peningkatan respons imun, setelah suplementasi probiotik, adalah sederhana dan dengan demikian relevansinya dengan hasil klinis masih belum jelas. Studi lebih lanjut, yang dirancang dengan baik yang menguji kemanjuran probiotik melawan infeksi usus, bersama dengan efeknya pada sistem kekebalan, sangat dibutuhkan untuk mengklarifikasi peran perlindungan yang dimediasi kekebalan terhadap infeksi usus.

2. Infeksi Ekstraintestinal

Kemampuan probiotik untuk meningkatkan respons imun di luar GIT telah merangsang minat untuk meneliti efek perlindungan probiotik terhadap infeksi di tempat ekstraintestinal. Fokus utama dari penyelidikan ini adalah pada pernapasan (terutama infeksi saluran pernapasan atas [URTI]) dan infeksi saluran kemih karena prevalensinya di seluruh dunia dan dampak kesehatan masyarakat yang tinggi.

3. Infeksi Saluran Pernapasan

Efektivitas probiotik terhadap infeksi saluran pernapasan telah menjadi fokus dari beberapa uji coba terkontrol selama beberapa tahun terakhir (Tabel 4.3). Hasil penelitian ini beragam karena penggunaan probiotik/produk yang berbeda, dosis probiotik, populasi penelitian, sifat agen infeksius, dan titik akhir klinis. Namun, ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa probiotik spesifik efektif dalam mengurangi kejadian, durasi, dan/atau keparahan infeksi pernapasan. Juga telah ditunjukkan bahwa perlindungan yang dimediasi probiotik terhadap infeksi saluran pernapasan, terutama URTI, dikaitkan dengan peningkatan beberapa respons imun.

Misalnya, Kazuyoshi et al., (2010) melaporkan bahwa insiden influenza dan demam yang lebih rendah secara signifikan pada subjek lanjut usia yang diberi BB536, dibandingkan dengan subjek kontrol, dikaitkan dengan fungsi sel fagosit dan aktivitas sel NK yang secara signifikan lebih tinggi. Hubungan antara peningkatan aktivitas sel NK dan risiko lebih rendah terkena flu pada subjek yang diberi yoghurt probiotik, dibandingkan dengan subjek yang diberi susu dilaporkan oleh Makino et al., (2010). Demikian pula, peningkatan kadar IgA, aktivitas fagositosis, dan jumlah sel T (CD4+ dan CD8+), bersama dengan penurunan insiden, durasi, dan/atau keparahan infeksi pernapasan telah dilaporkan oleh orang lain (Fukushima et al., 2007). Normalisasi flora usus yang terganggu pada anak-anak dengan infeksi saluran pernapasan akut akibat virus dan bakteri dan peningkatan fungsi sel T dan B, dan aktivitas sel NK setelah pemberian probiotik juga telah dilaporkan (Lykova et al., 2000).

Tabel 4.3 Probiotik dan Pencegahan Infeksi Saluran Pernapasan

Intervensi	Hasil Klinis	Korelasi Imunitas
Lactobacillus fermentum VRI-003 (PCC; 1,26 Å ~ 1010 setiap hari) selama 4 bulan. Cox et al., (2010)	Subjek yang menerima PCC memiliki hari yang jauh lebih sedikit dengan gejala pernapasan (30 versus 72; p < 0,001) dan penyakit pernapasan yang kurang parah.	1. Tidak ada perbedaan level IgA dan IgA1 atau level IL-4 dan IL-12. 2. Kultur darah dari kelompok PCC meningkat dua kali lipat lebih besar dalam IFN-γ dibandingkan dengan plasebo.
Subjek diberi makanan uji yang mengandung BB536 (1011 CFU) setiap hari selama 5 minggu (P1) dan juga diimunisasi dengan vaksin influenza pada minggu ke-3. Subjek kemudian diacak untuk menerima BB536 atau plasebo selama 14 minggu (P2). Kazuyoshi et al., (2010)	Subjek yang menerima BB536 selama P2 memiliki insiden influenza dan demam yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kelompok plasebo.	Kelompok BB536 telah menunjukkan aktivitas fagositik Neutrofil yang jauh lebih tinggi dan aktivitas sel NK selama P1. Selama P2, tanggapan ini menurun di kedua kelompok tetapi cenderung tetap lebih tinggi pada kelompok BB536.
Lactobacillus GG (10 ⁹ CFU/ hari) dalam 100 ml susu fermentasi atau plasebo selama 3 bulan. Hojsak et al., (2010)	1. Anak-anak yang menerima LGG telah secara signifikan mengurangi risiko URTI (RR 0,66), penurunan risiko URTI yang berlangsung lebih dari 3 hari (RR 0,57) dan jumlah hari yang jauh lebih rendah dengan gejala pernapasan (p < 0,001). 2. Tidak ada efek pada infeksi saluran pernapasan bawah.	Tidak dilaporkan
L. acidophilus NCFM, L acidophilus NCFM + B. animalis subsp. lactis Bi-07 atau plasebo dua kali sehari selama 6 bulan. Leyer et al., (2010)	Probiotik tunggal dan kombinasi mengurangi kejadian demam sebesar 53% (p = 0,0085) dan 72,5% (p = 0,0009), kejadian batuk sebesar 41,4% (p = 0,027) dan 62,1% (p = 0,005), dan rhinorrhea sebesar 28,2% (p = 0,68) dan 58,8% (p = 0,03). Penggunaan antibiotik dan durasi demam, batuk, dan rhinorrhea juga berkurang secara signifikan.	Tidak dilaporkan
Lactobacillus GG (10 ⁹ CFU dalam 100 ml susu fermentasi) atau plasebo. Hojsak et al., (2010)	<i>Significantly</i> mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan (RR 0,38) dan episode infeksi saluran pernapasan yang berlangsung >3 hari (RR 0,4).	Tidak dilaporkan

Intervensi	Hasil Klinis	Korelasi Imunitas
Milk-containing oligosaccharides (2.4 g/day) and <i>B. lactis</i> HN019 (1.9×10^7 CFU) or control milk for 12 months. Sazawal et al., (2010)	<i>Probiotics and Prebiotic (PP) administration reduced incidence of pneumonia by 24%, acute respiratory tract infections by 35%. Compared with the placebo group, children receiving PP had 16% and 5% reduction in days with severe illness and high fever, respectively.</i>	Tidak dilaporkan
Yoghurt yang difermentasi dengan <i>L. delbrueckii</i> spp. <i>bulgaricus</i> OLL1073R-1 (90 g/hari) atau susu (100 ml/hari) selama 8 atau 12 minggu. Makino et al., (2010)	Subjek yang menerima yoghurt probiotik memiliki risiko 2,6 kali lebih rendah (RR 0,39; p = 0,019) terkena flu biasa daripada mereka yang menerima susu. Asupan yoghurt probiotik dikaitkan dengan peningkatan aktivitas sel NK (p = 0,028).	Asupan yoghurt probiotik dikaitkan dengan peningkatan aktivitas sel NK (p = 0,028).
Minuman probiotik yang mengandung <i>L. rhamnosus</i> HN001 (10^{10} CFU / hari) atau plasebo selama 3 bulan. C.ceres et al., (2010)	Tidak ada perbedaan dalam jumlah dan durasi infeksi pernapasan akut, hari-hari ketidakhadiran atau penggunaan antibiotik antar kelompok. Juga, tidak ada perbedaan antara kelompok dalam tingkat deteksi <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> , dan <i>Streptococcus pyogenes</i> dalam sampel orofaringeal.	Peningkatan yang signifikan dalam tingkat sIgA pada kelompok HN001, dibandingkan dengan kontrol (p = 0,048).
Susu formula bayi dilengkapi dengan <i>Lactobacillus</i> GG dan <i>B. lactis</i> Bb-12 atau plasebo setiap hari sampai usia 12 bulan. Rautava et al., (2009)	1. Mengurangi kejadian otitis media (22% versus 50%) dan penggunaan antibiotik (31% versus 60%) pada kelompok probiotik selama 7 bulan pertama kehidupan 2. Insiden infeksi pernapasan berulang yang disebabkan, selama tahun pertama kehidupan, pada kelompok probiotik dibandingkan dengan plasebo (28% versus 55%).	Tidak dilaporkan
Susu fermentasi dengan <i>L. casei</i> atau plasebo selama 1 bulan (300 ml / harian) Tiollier et al., (2007)	Tidak ada perbedaan dalam kejadian infeksi saluran pernapasan, tetapi proporsi rhinopharyngitis yang jauh lebih besar pada kelompok probiotik.	Tingkat IgA dipertahankan dalam kelompok probiotik, tetapi menurun pada kelompok plasebo.
Susu fermentasi yang mengandung <i>L. johnsonii</i> LC1 atau plasebo. Fukushima et al., (2007)	Penurunan yang signifikan dalam persentase hari dengan infeksi dan frekuensi gejala pernapasan yang lebih rendah di kelompok probiotik.	1. ↓ kadar TNF-α dalam darah 2. ↑ Aktivitas fagositik leukosit darah pada subjek yang tingkat awalnya rendah pada kelompok LC1.

Intervensi	Hasil Klinis	Korelasi Imunitas
Probiotik (<i>Lactobacillus</i> dan <i>Bifidobacterium</i> spp.) ditambah vitamin dan mineral atau plasebo. Winkler et al., (2005)	Pengurangan ($p < 0,07$) dalam kejadian infeksi saluran pernapasan, skor gejala total $p = 0,12$, dan jumlah hari dengan demam ($p = 0,03$) pada kelompok probiotik.	Peningkatan yang signifikan dalam T-limfosit (termasuk CD4 + dan CD8 + sel) dan monosit.

Interferon (α dan γ) memainkan peran penting dalam perlindungan pejamu, terutama terhadap patogen/ infeksi virus intraseluler. Peningkatan kadar IFN- γ dalam darah dan peningkatan kapasitas leukosit darah untuk memproduksi IFN- γ *ex vivo* pada subjek yang diberi probiotik telah didokumentasikan dengan baik (Tabel 4.1). Selanjutnya, infeksi saluran pernapasan mengganggu kemampuan inang untuk menghasilkan IFNs. Suplementasi dengan probiotik juga ditemukan efektif dalam memulihkan kapasitas produksi IFN anak-anak dengan infeksi saluran pernapasan akut (Lykova et al., 2001).

Studi tantangan infeksi pada tikus telah menunjukkan bahwa penurunan patologi paru dan peningkatan pembersihan paru patogen dan tingkat kelangsungan hidup pada hewan yang diberi probiotik dikaitkan dengan peningkatan regulasi respons imun bawaan dan spesifik pernapasan (Alvarez et al., 2001; Racedo et al., 2006; Villena et al., 2008). Apakah suplementasi probiotik juga mempengaruhi respons imun bawaan dan spesifik pernapasan pada manusia masih belum diketahui. Namun, kemungkinan bahwa menjadi bagian dari sistem imun mukosa umum, sejumlah kecil sel imun tersensitisasi yang diinduksi di GIT mungkin menjadi rumah bagi mukosa saluran pernapasan tidak dapat diabaikan (Macpherson et al., 2008).

4. Infeksi Urogenital

Spesies *Lactobacillus* mendominasi flora vagina pada wanita sehat. Menipisnya lactobacilli, dikaitkan dengan peningkatan kerentanan terhadap infeksi saluran kemih dan vagina. Akibatnya, penggunaan probiotik untuk menjaga dan/atau mengembalikan keseimbangan mikroba vagina dan mencegah dan/atau mengobati infeksi urogenital telah menjadi fokus penelitian aktif. Hasil penelitian ini sangat bervariasi. Sementara, sejumlah kecil penelitian telah melaporkan manfaat terapeutik dan profilaksis dari strain probiotik tertentu, yang

lain hanya menemukan sedikit atau tidak ada manfaat sama sekali (Barrons dan Tassone 2008; Reid 2008). Apakah ini hanya karena perbedaan jenis, dosis, atau frekuensi pengobatan yang digunakan oleh berbagai penelitian atau alasan lain tidak jelas. Berbagai mekanisme di mana lactobacilli/probiotik memediasi efek perlindungan mereka, termasuk stimulasi kekebalan, telah disarankan. Namun, bukti langsung yang mendukung peran perlindungan yang dimediasi kekebalan masih terbatas dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

5. Kanker

Meskipun bukti kuat untuk aktivitas probiotik antikanker pada model hewan, bukti dari manusia masih sangat awal. Sejumlah kecil studi intervensi manusia skala kecil menggunakan biomarker risiko kanker usus besar menunjukkan bahwa probiotik dan sinbiotik dapat mengurangi risiko kanker. Misalnya, Ishikawa et al., (2005) melaporkan penurunan yang signifikan pada adenoma dengan atypia sedang atau berat setelah 4 tahun, pada pasien dengan adenoma yang direseksi dan Rafter dan rekan (2007) melaporkan pengurangan proliferasi kolorektal dan kapasitas air tinja untuk menginduksi nekrosis pada sel kolon, dan peningkatan fungsi penghalang epitel pada pasien polipektomi setelah suplementasi dengan probiotik atau sinbiotik. Suplementasi sinbiotik juga dikaitkan dengan peningkatan produksi IFN- γ pada pasien kanker dan penekanan sekresi IL-2 oleh sel mononuklear darah pada pasien polipektomi. Fungsi kekebalan lainnya tidak terpengaruh. Peningkatan persentase sel T helper dan penurunan persentase sel T supresor pada pasien dengan kanker kolorektal Dukes A yang diberikan *L. casei* Shiota juga telah diamati (Sawamura et al., 1994).

Efektivitas probiotik dalam mencegah kekambuhan kanker kandung kemih superfisial setelah reseksi transurethral juga telah ditunjukkan dalam sejumlah penelitian (Aso et al., 1992; Aso et al., 1995; Ohashi et al., 2002). Sebuah studi baru-baru ini, lebih lanjut menunjukkan bahwa suplementasi dengan probiotik *L. casei* yang diberikan dalam kombinasi dengan epirubicin, obat antikanker, secara signifikan lebih efektif daripada epirubicin saja dalam mengurangi kekambuhan tumor kandung kemih jangka panjang (Naito et al., 2008).

Beberapa mekanisme, termasuk stimulasi imun, di mana probiotik memediasi aktivitas antikanker telah diusulkan. Namun, perubahan

yang diamati dalam penelitian kanker yang melibatkan manusia sejauh ini relatif kecil, dan signifikansinya dalam perlindungan tidak jelas. Peningkatan signifikan dalam aktivitas sel NK, fungsi sel fagositik, dan respons sel T yang diamati pada subjek sehat, bersama dengan bukti signifikan dari penelitian pada hewan. Temuan tersebut mendukung peran mekanisme kekebalan dalam perlindungan (Matsuzaki et al., 2007). Bukti dari studi epidemiologi bahwa populasi dengan aktivitas sel NK rendah memiliki risiko kanker yang lebih tinggi daripada populasi dengan aktivitas sel NK menengah atau tinggi mendukung asumsi ini (Imai et al., 2000).

C. Probiotik dan Gangguan Imunoinflamasi

1. Alergi

Respon alergi berhubungan dengan respons imun agresif terhadap antigen lingkungan yang tidak berbahaya pada individu yang rentan secara genetik, dan ditandai dengan respon imun Th2 yang terpolarisasi: peningkatan kadar IgE dan pengikatan, serta aktivasi eosinofil. Pengurangan atau paparan mikroba yang tidak tepat di awal kehidupan telah dikaitkan dengan peningkatan prevalensi penyakit alergi. Saat lahir, sistem kekebalan bayi baru lahir terpolarisasi ke arah fenotipe Th1. Paparan antigen mikroba di awal kehidupan dianggap penting untuk pembentukan keseimbangan antara respons Th1/Th2. Akibatnya, kemanjuran probiotik dalam pencegahan dan/atau pengobatan penyakit alergi, terutama eksim atopik, telah menjadi subjek banyak penyelidikan dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil penelitian sangat bervariasi. Beberapa penelitian menunjukkan efek probiotik yang sangat signifikan (Wickens et al., 2008). Sementara, yang lain menemukan sedikit atau tidak ada efek sama sekali (Abrahamsson et al., 2007). Sebagai contoh, metaanalisis dari 10 uji coba terkontrol secara acak (melibatkan 678 anak dengan eksim) oleh Michail et al., (2008) menyimpulkan bahwa pemberian probiotik (strain tunggal atau campuran) secara signifikan lebih efektif dalam mengurangi indeks keparahan SCORAD dibandingkan dengan subjek yang tidak diberi probiotik. Selanjutnya, probiotik lebih efektif dalam mengobati penyakit atopik yang cukup parah dan efeknya tampaknya lebih besar pada pasien yang peka terhadap Ig. Bertentangan dengan

ini, Boyle et al., (2009) dari tinjauan sistematis dalam penelitian (781 pasien dengan eksim) menyimpulkan bahwa pemberian probiotik tidak berpengaruh signifikan terhadap gejala alergi dan efektif dalam mengurangi SCORAD hanya pada 5 dari 12 subjek. Alasan untuk hasil yang bervariasi dalam penelitian yang berbeda tetap kurang dipahami, tetapi kemungkinan mencakup faktor inang dan lingkungan, serta strain dan dosis probiotik yang digunakan.

Demikian halnya dengan efek pencegahan dengan probiotik juga telah menjadi subjek beberapa tinjauan dan metaanalisis. Dari metaanalisis dari lima studi yang melaporkan hasil untuk 1477 subjek, Osborn dan Sinn (2009) menemukan bahwa probiotik secara signifikan efektif dalam mengurangi risiko eksim bayi (RR 0,82). Namun, ketika analisis dibatasi pada penelitian yang melaporkan eksim atopik (dikonfirmasi dengan tes tusuk kulit atau IgE spesifik), temuan tersebut tidak lagi signifikan.

Studi yang melaporkan manfaat signifikan menggunakan suplemen probiotik yang mengandung *L. rhamnosus* terhadap bayi yang berisiko tinggi alergi. Tidak ada manfaat lain yang dilaporkan untuk penyakit alergi lainnya atau hasil hipersensitivitas makanan. Kemanjuran probiotik terhadap asma dan rinitis alergi sebagian besar masih belum terbukti, meskipun beberapa hasil yang menggembirakan untuk rinitis alergi telah dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir.

Semakin banyak bukti dari penelitian manusia dan hewan lebih lanjut menunjukkan bahwa probiotik memediasi efek antialergi mereka melalui aktivasi respons imun kontra regulasi Th2. Misalnya, sitokin yang diproduksi oleh sel pengatur Tr1 dan Th3 (masing-masing IL-10 dan TGF- β 1) memainkan peran penting dalam mengatur respons terpolarisasi Th1 dan Th2. Sel Th1 dan Th2 juga diketahui memiliki sifat kontra-regulasi. Peningkatan kadar TGF- β 1 dan IFN- γ dalam serum dan/atau ASI, setelah suplementasi dengan probiotik, pada subjek sehat dan alergi didokumentasikan dengan baik (Pessi et al., 2000; Prescott et al., 2005; Rautava et al., 2002). Peningkatan kemampuan strain probiotik spesifik untuk menginduksi sel pengatur yang menghasilkan TGF- β 1 dan IL-10 dan menghambat proliferasi dan produksi sitokin oleh sel T juga telah dilaporkan (Di Giacinto et al., 2005; Smit et al., 2005). Bertentangan dengan hal tersebut, Bottcher et al. (2008) melaporkan bahwa kadar TGF- β 1 yang rendah, daripada yang tinggi dalam kolostrium

dan susu dikaitkan dengan penurunan sensitivitas dan penurunan insiden eksim terkait IgE setelah suplementasi dengan probiotik. Mekanisme lain seperti penurunan imunogenisitas alergen potensial dan penguatan penghalang mukosa melalui stimulasi produksi sIgA yang diinduksi oleh probiotik juga diduga berperan.

2. Penyakit Radang Usus

Inflammatory Bowel Disease (IBD) termasuk penyakit Crohn (Rohn Disease = CD) dan pouchitis. Kondisi ini ditandai dengan pergeseran dari respons imun usus yang diatur secara ketat menjadi aktivasi sel imun yang tidak terkontrol dan produksi sitokin pro-inflamasi. UC terutama terbatas pada usus besar dan atau rektum, sedangkan CD terjadi sebagai lesi skip di setiap wilayah saluran usus. Pouchitis adalah peradangan reservoir ileum pada pasien dengan anastomosis anus ileal-pouch (prosedur bedah yang biasa digunakan untuk penanganan UC). Tidaklah banyak yang diketahui tentang etiologi IBD.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa IBD dihasilkan dari respons imun yang menyimpang, pada individu yang secara genetik rentan, terhadap anggota mikrobiota usus. Kondisi tersebut diduga didorong oleh sel T dan berhubungan dengan peningkatan produksi sitokin pro-inflamasi seperti TNF- α dan IFN- γ . Juga telah disarankan bahwa UC dikaitkan dengan dominasi respons tipe-Th2, sedangkan CD dikaitkan dengan polarisasi Th1. Peran sel TH17 dalam pelestarian IBD juga telah disarankan. Perbedaan komposisi mikrobiota usus pasien sehat versus IBD dan dalam tahap aktif dan tidak aktif IBD pada pasien yang sama (Nishikawa et al., 2009) juga telah dilaporkan. Karena probiotik diketahui memiliki kemampuan untuk mengembalikan keseimbangan mikroba usus, menstabilkan penghalang mukosa usus, dan memperbaiki respons imun Th1/Th2 yang terpolarisasi, kemanjurannya dalam IBD telah menjadi fokus dari beberapa penelitian. Namun, hanya sedikit dari uji coba ini yang merupakan uji coba terkontrol secara acak. Juga, sebagian besar percobaan ini telah dilakukan pada sejumlah kecil pasien yang menggunakan strain probiotik yang berbeda.

Ada bukti kuat bahwa preparat probiotik spesifik efektif dalam menginduksi remisi dan mengurangi tingkat kekambuhan UC. Sebuah metaanalisis dari 13 studi acak menyimpulkan bahwa probiotik,

dibandingkan dengan pengobatan plasebo/nonprobiotik, secara signifikan efektif dalam meningkatkan tingkat remisi (1,35-2,0) dan mengurangi tingkat kekambuhan UC (0,69) (Sang et al., 2010). Zigra et al., (2007) juga menunjukkan bahwa keamanan dan kemanjuran probiotik dalam menginduksi remisi UC mirip dengan yang diamati untuk terapi standar.

Ada juga bukti kuat untuk efektivitas probiotik, terutama VSL#3 (campuran beberapa strain probiotik) dalam mencegah serangan awal pouchitis, dan dalam mempertahankan remisi yang diinduksi antibiotik pada pasien dengan pouchitis berulang/refrakter (Vanderpool et al., 2008). Sebuah metaanalisis dari lima uji klinis acak terkontrol plasebo mengungkapkan rasio odds 0,04 (95% interval kepercayaan 0,01-0,14) mendukung kelompok perlakuan (Elahi et al., 2008). Bertentangan dengan penelitian di atas, kemanjuran probiotik terhadap CD masih belum terbukti. Hasil dari berbagai penelitian telah heterogen dan sulit untuk ditafsirkan.

Mekanisme utama di mana probiotik memediasi perlindungan terhadap IBD tampaknya melalui penguatan fungsi penghalang mukosa usus, pemulihan homeostasis imunologi melalui up-regulasi jalur imunoregulasi dan *down*-regulasi respons pro-inflamasi, dan pemeliharaan mikroba usus. keseimbangan. Misalnya, Ulisse et al., (2001) dan Lammers et al., (2005) melaporkan penurunan sitokin pro-inflamasi (TNF- α , IL-1 β , dan IFN- γ) dan peningkatan IL-10 dalam jaringan usus dari subjek dengan pouchitis setelah pengobatan dengan probiotik. Hubungan antara ekspresi IL-10 dan pencegahan flare-up UC kronis (Cui et al., 2004) dan perbaikan peradangan pada IBD yang diinduksi *Helicobacter hepaticus* pada model hewan (Pena et al., 2005), setelah pengobatan dengan probiotik, juga telah dilaporkan. Sebuah studi baru-baru ini lebih lanjut menunjukkan bahwa VSL#3 meningkatkan indeks aktivitas penyakit pouchitis dengan meningkatkan jumlah sel T regulator mukosa (Pronio et al., 2008).

3. Sindrom Iritasi Usus

Sindrom iritasi usus (*Irritable Bowel Syndrom* = IBS) adalah gangguan gastrointestinal multigejala dengan etiologi yang tidak diketahui. Disbiosis (perubahan dalam mikrobiota usus, pertumbuhan berlebih bakteri usus kecil), gastroenteritis virus akut, dan perubahan keadaan

inflamasi dan kekebalan di GIT telah disarankan untuk berperan dalam patogenesis IBS. Ketidakseimbangan antara IL-10 dan IL-12 pada pasien dengan IBS juga telah dilaporkan (O'Mahony et al., 2005).

Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa asupan probiotik mungkin bermanfaat dalam mengurangi gejala IBS (lihat juga Bab 23). Misalnya, tinjauan dari 14 uji coba terkontrol secara acak yang melibatkan pasien IBS yang diberi probiotik berbeda menemukan bahwa *Bifidobacterium infantis* 35624 efektif dalam meningkatkan gejala IBS secara global dan individual secara signifikan. Strain probiotik lainnya ditemukan tidak efektif. Tinjauan sistematis lain oleh Moayyedi et al. (2010) menemukan bahwa pengobatan probiotik memiliki efek yang signifikan dalam mengurangi gejala IBS dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengobati 4 (95% *confidence interval* 3-12,5). Mekanisme yang tepat di mana probiotik memediasi perlindungan terhadap IBS tidak diketahui. *B. infantis* dan *L. rhamnosus* GR1 plus *L. reutri* RC 14 ditemukan memediasi efeknya dengan menurunkan produksi IL-12 dan mengoreksi ketidakseimbangan IL-10/IL-12 (O'Mahony et al., 2005).

D. Mekanisme Probiotik yang Memediasi Efek Imunomodulator

Pengambilan sampel probiotik dari GIT terutama dimediasi oleh sel M, di atas folikel limfoid terorganisir, yang mengirimkannya ke sel penyaji antigen profesional (APC; makrofag dan sel dendritik) yang ada di kubah subepitel patch Peyer dan folikel limfoid. Kemampuan sel dendritik untuk secara efisien memperoleh antigen langsung dari lumen usus juga telah dilaporkan. Setelah diproses, APC menyajikan antigen ke sel B dan T. Aktivasi sel Th1 menghasilkan augmentasi imunitas yang diperantarai sel, sel Th2 dalam peningkatan respons antibodi (terutama IgE), dan sel regulasi T (Tr1 dan/atau Th3) dalam peredam/koreksi respons imun Th1/Th2 yang terlalu aktif, terkait dengan gangguan imunoinflamasi seperti IBD dan alergi, masing-masing. Sifat sekresi sitokin, fenotipe, dan status aktivasi APC yang menentukan apakah sel T naif berdiferensiasi menjadi sel T helper 1 (Th1), T-helper 2 (Th2), atau T regulator (Treg). Juga telah disarankan bahwa probiotik mengatur respons Th1/Th2 terpolarisasi melalui induksi energi sel T dan induksi toleransi yang bergantung pada IL-10 (Peppelenbosch

dan Ferreira 2009). Sel Th1 juga mengarahkan diferensiasi sel B ke sel penghasil IgA. Sel M juga telah menunjukkan kecenderungan untuk mengambil sampel antigen kompleks IgA yang selanjutnya mendorong produksi IgA.

Sinyal dari organisme probiotik, juga ditransmisikan ke epitel dan terlibat dalam pemeliharaan jaringan dan homeostasis imun. Mekanisme molekuler di mana probiotik atau produknya memodulasi aktivasi dan fungsi sel T, dan sifat komponen immunoaktif turunan probiotik yang bertanggung jawab untuk aksi imunomodulator tidak diketahui. Studi terbaru yang meneliti tanggapan transkriptomik *in vivo*, setelah suplementasi dengan probiotik, telah menunjukkan bahwa probiotik yang berbeda menginduksi jaringan dan jalur pengaturan gen yang berbeda di mukosa usus manusia dan bahwa variasi transkriptom orang-ke-orang yang besar ada di antara individu (van Baarlen et al., 2009).

Efek imunomodulator probiotik telah menjadi subjek penelitian ekstensif selama 20 tahun terakhir. Hasil penelitian ini, meskipun bervariasi, telah memberikan bukti kuat bahwa jenis probiotik tertentu mampu mempengaruhi beragam fungsi kekebalan dalam kesehatan dan penyakit. Dalam keadaan sehat, probiotik spesifik telah terbukti meningkatkan aktivitas sel NK dan aktivitas fagositosis makrofag dan sel PMN, merangsang produksi sIgA, meningkatkan imunogenisitas antigen/vaksin virus dan bakteri, dan memperkuat fungsi sawar usus.

Perbaikan telah terbukti jauh lebih besar pada subjek dengan status kekebalan pra-intervensi yang buruk dibandingkan dengan mereka yang memiliki fungsi kekebalan yang memadai. Bukti yang muncul juga menunjukkan bahwa stimulasi kekebalan yang diinduksi probiotik berkontribusi pada perlindungan inang terhadap penyakit menular. Mungkin, hal ini paling baik diilustrasikan oleh kemampuan strain probiotik spesifik untuk memediasi perlindungan terhadap infeksi ekstraintestinal, terutama saluran pernapasan. Hal ini diduga karena kemampuan probiotik untuk meningkatkan respons imun protektif pada bagian mukosa distal, serta imunitas sistemik. Namun, ada sedikit bukti langsung yang up-regulasi respons imun spesifik dan nonspesifik di situs mukosa distal dan meningkatkan titik akhir klinis pada manusia. Studi yang secara bersamaan mengukur titik akhir klinis dan aspek fungsi/korelasi imun yang relevan sangat diperlukan untuk

mengklarifikasi hal ini. Pada subjek dengan gangguan imunoinflamasi (seperti alergi dan penyakit inflamasi usus), profilaksis dan/atau kemanjuran terapeutik dari beberapa strain juga telah ditunjukkan.

Hasil-hasil penelitian, membuktikan bahwa probiotik memediasi efek menguntungkan mereka melalui induksi sel pengatur T dan/atau energi sel T. Namun, sedikit yang diketahui tentang komponen atau metabolit yang diturunkan dari probiotik dan mekanisme molekuler yang dengannya efek peningkatan kekebalan, antiinflamasi, dan imunoregulasi ini dimediasi dalam kesehatan dan penyakit.

Efek imunomodulator probiotik adalah strain spesifik dan dalam banyak kasus efek ini telah ditunjukkan hanya untuk sejumlah kecil strain. Dosis efektif, durasi, dan frekuensi pengobatan untuk berbagai strain untuk berbagai kondisi pada kelompok populasi yang berbeda juga masih harus ditentukan. Efek genetika inang dan komposisi mikrobiota usus terhadap responsivitas terhadap probiotik juga tidak diketahui. Pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi probiotik yang lebih manjur dan untuk mengembangkan probiotik yang dibuat khusus agar sesuai dengan genetika dan mikrobiota individu. Bidang penelitian ini, memiliki potensi untuk meminimalkan dampak penyakit menular dan imunoinflamasi di seluruh dunia, termasuk gangguan metabolisme, yang merupakan tantangan kesehatan masyarakat terbesar di era modern.



BAKTERI ASAM LAKTAT BAGI KESEHATAN DAN PRODUKTIVITAS HEWAN

Probiotik digunakan di beberapa sektor produksi hewan, yang meliputi produksi ternak (unggas, babi, dan ruminansia) untuk produksi daging, telur, dan atau susu, dan akuakultur untuk produksi ikan dan kerang. Tentu saja, masing-masing sektor ini memiliki karakteristik khusus sehubungan dengan spesies hewan (mamalia, burung, ikan, atau moluska), lingkungan (air laut atau air tawar, manajemen peternakan), jenis produksi (daging, telur, susu), dan patogen utama dan penyakit utama yang dihadapi pada setiap spesies. Oleh karena itu, meskipun beberapa tujuan umum untuk semua sektor produksi (misalnya, peningkatan hasil produksi, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan hewan), probiotik yang dipilih dan digunakan dapat bervariasi untuk setiap sektor. Oleh karena itu, bakteri dan khamir dapat ditemukan dalam formula probiotik. Tergantung pada spesies hewan, dan jenis produksi (misalnya, daging atau telur untuk unggas) dan periode kehidupan (awal kehidupan, penyapihan, dewasa pada mamalia), mikroba tertentu dipilih, misalnya ragi pada ruminansia dewasa dan lactobacilli pada babi dan unggas.

Probiotik pada awalnya digunakan sebagai aditif pakan untuk mengoptimalkan kinerja *zootechnical* dari kegiatan pertanian. Ketertarikan penggunaan probiotik dalam peternakan akhir-akhir ini meningkat untuk menghadapi tantangan baru seperti pelarangan *Antibiotik Growth Promotor* (AGP) (sejak 2006 di Uni Eropa). Selain itu, beberapa wabah penyakit bawaan makanan telah mendesak sektor pertanian untuk mengurangi bakteri patogen pada produk asal hewan (Gaggia et al., 2010). Pembawa patogen enterik dan paling sering tanpa

gejala memang merupakan sumber langsung kontaminasi karkas dan makanan selama proses tersebut.

Aplikasi probiotik baru ini sejalan dengan permintaan masyarakat yang besar pada pengurangan input (termasuk perawatan *phytosanitary* dan antibiotik) untuk pertanian yang lebih berkelanjutan. Kecenderungan ini telah mendorong upaya penelitian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan antibiotik dengan tetap mempertahankan standar sanitasi yang baik dan hasil produksi yang baik pada ternak. Pendekatan yang diadopsi termasuk penerapan praktik pertanian yang lebih baik dalam hal tindakan *zootechnical* dan higienis untuk menghindari penyakit menular dan untuk meningkatkan kesejahteraan hewan.

Selain itu, pengembangan dan penggunaan pengembangan vaksin dan seleksi genetik hewan juga terjadi di beberapa sektor. Selain strategi tersebut, konsep pengendalian biologis penyakit menular telah diselidiki. Ini didasarkan pada penggunaan strain bakteri sebagai penghalang biologis untuk mencegah atau bahkan mengobati infeksi. Penggunaan Bakteri Asam Laktat (BAL) pada ternak pertanian memberikan hasil yang menggembirakan dalam berbagai konteks dan terbukti secara signifikan meningkatkan kesehatan hewan secara keseluruhan dan hasil produksi. Efek menguntungkan dari BAL probiotik dilaporkan karena kapasitasnya untuk menghambat atau menghilangkan patogen melalui produksi asam organik, bakteriosin, dan senyawa antimikroba lainnya (Espeche et al., 2012).

BAL juga terbukti menghambat kolonisasi dan memodulasi dan merusak ekspresi virulensi pada beberapa patogen. *Last but not least*, BAL juga dapat memberikan efek menguntungkannya pada kesehatan inang melalui stimulasi kekebalan pertahanan inang yang memungkinkan pembersihan patogen atau pencegahan infeksi. Sebagian besar literatur ilmiah tentang manfaat kesehatan BAL difokuskan pada ekosistem usus (saluran pencernaan) dan vagina (saluran urogenital). Namun, berkat pengembangan alat biologi molekuler dan teknologi pengurutan baru, ekosistem lain sekarang sedang dijelaskan dan diselidiki untuk memahami peran dan dampaknya terhadap status kesehatan organ (misalnya, ekosistem susu, ekosistem rumen). BAL juga dapat memainkan peran yang bermanfaat di dalamnya.

Dampak ekosistem ini dan BAL pada kesehatan inang dan mekanisme yang mengatur hubungan dan interaksi mereka dengan

hewan inang masih kurang didokumentasikan dan dipahami. Basis molekuler dari efek probiotik sulit untuk diselidiki *secara in vivo*, tetapi dapat didekati melalui model hewan, kultur sel, dan uji *in vitro*. Studi semacam itu meningkatkan pengetahuan kami di lapangan dan membantu dalam menetapkan kriteria seleksi yang lebih baik untuk kandidat probiotik baru. Dalam bab ini, kami akan meninjau data terbaru tentang potensi BAL untuk meningkatkan produksi hewan dan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

A. Regulasi Penggunaan Probiotik bagi Kesehatan Hewan

Probiotik generasi pertama diidentifikasi seperti itu sebagian besar berdasarkan sejarah penggunaannya dan efek menguntungkan yang diamati (tetapi jarang ditunjukkan). Probiotik generasi kedua diajukan karena kriteria ilmiah yang kuat dan tunduk pada peraturan yang kuat, yang memerlukan demonstrasi tidak berbahayanya mikroba yang diusulkan, serta bukti efisiensinya sebelum menerima tuduhan kesehatan apa pun.

Menurut fungsi dan sifatnya, bahan tambahan untuk pakan ternak diklasifikasikan dalam satu atau beberapa kategori antara lain aditif teknologi, sensorik, nutrisi, atau *zootechnical*. Probiotik yang menargetkan kesehatan inang paling sering digunakan dalam bahan pakan ternak. Sebagian besar dari mereka membahas manfaat kesehatan untuk saluran pencernaan dan berafiliasi dengan kategori "zootechnical additives." Di Eropa, otorisasi mikroba yang digunakan sebagai aditif *zootechnical* untuk pakan tunduk pada peraturan yang ketat (1831/2003/ EC; EFSA, 2003). Aditif *Zootechnical*, didefinisikan sebagai "setiap aditif yang digunakan untuk mempengaruhi kinerja hewan dalam kesehatan yang baik atau digunakan untuk mempengaruhi lingkungan yang baik." Permohonan untuk persetujuan galur atau campuran beberapa galur harus mencakup (i) karakterisasi dan identifikasi molekuler pada spesies dan tingkat galur; dan (ii) demonstrasi kinerja zooteknik (untuk setidaknya satu karakteristik yang diberikan dalam definisi). Sebagai catatan, otorisasi dibatasi untuk spesies hewan target tertentu dan untuk kategori usia dalam spesies tersebut (EFSA, 2012). Selain kegunaan tersebut sebagai aditif pakan, aplikasi baru sekarang dieksplorasi dalam kesehatan hewan, untuk mencegah atau menyembuhkan infeksi urogenital dan susu.

B. Probiotik Bakteri Asam Laktat dan Prodiktivitas Hewan

BAL adalah kelompok bakteri yang heterogen, yang termasuk genus *Lactobacillus*, *Lactococcus*, *Enterococcus*, *Streptococcus*, *Leuconostoc*, dan *Oenococcus* sebagai anggota yang lebih dikenal. Karakteristik umum mereka adalah kemampuan mereka untuk menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir utama fermentasi. Mereka telah digunakan selama berabad-abad karena sifat teknologi dan fungsionalnya dalam fermentasi makanan. Sebagian besar spesies BAL memiliki status “*Generally Recognized as Safe*” diberikan oleh FDA, di AS dan status “*Qualified Presumption of Safety*” di Eropa).

Penggunaannya dalam produksi hewan telah menarik minat secara paralel dengan penggunaannya sebagai probiotik dalam konsumsi manusia. BAL memang digunakan sebagai probiotik untuk meningkatkan kesehatan hewan dan mencegah infeksi. Manfaat paling penting yang diharapkan dari probiotik BAL adalah efek pertumbuhan (tingkat pertumbuhan yang lebih baik dan peningkatan berat badan, BWG) melalui pemanfaatan pakan yang lebih baik dan pencernaan, dan kontrol biologis kolonisasi patogen. Mereka juga digunakan untuk meningkatkan produksi susu dan telur.

Definisi probiotik telah berkembang sejak maraknya pemanfaatannya pada berbagai keperluan. Probiotik pertama kali didefinisikan sebagai “Suplemen pakan mikroba hidup yang secara menguntungkan mempengaruhi hewan inang dengan meningkatkan keseimbangan mikroba ususnya” (Füller, 1989). Definisi baru oleh Organisasi Kesehatan Dunia (FAO/WHO, 2001), “mikroorganisme hidup, yang bila diberikan dalam jumlah yang memadai, akan memberikan manfaat kesehatan pada inang yang mengkonsumsinya,” membuka bidang baru penerapan probiotik di luar suplementasi pakan. Penggunaan BAL sebagai probiotik vagina dan susu memang sedang diselidiki.

Selain BAL, banyak mikroba probiotik diselidiki dan atau digunakan dalam pakan ternak (Tabel 3.1). Sediaan komersial tidak selalu menggunakan penunjukan taksonomi yang valid, meskipun indikasi yang jelas adalah wajib pada BAL produk. Di antara spesies non-BAL, *Bacillus* dan *Saccharomyces* adalah probiotik yang paling banyak digunakan pada ternak dan unggas.

1. Probiotik bagi Ruminansia

Pemeliharaan ternak ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba merupakan sektor produksi ternak yang sangat besar untuk produksi daging dan susu. Sasaran utama dan jenis probiotik pada ternak ruminansia, tergantung pada jenis produksi atau tahap perkembangan ternak. Pada ruminansia muda, target ini mencakup pematangan mikrobiota rumen yang optimal, penurunan risiko kolonisasi patogen, dan peningkatan keamanan pencernaan saat disapih. Pada sapi potong, penggunaan probiotik bertujuan untuk meningkatkan BWG, meningkatkan efisiensi pakan dan mengurangi asidosis. Pada sapi perah, probiotik digunakan untuk meningkatkan hasil dan kualitas susu dan efisiensi pakan, dan untuk meningkatkan kesehatan dengan membatasi asidosis (Caucheyras- Durand dan Durand, 2010).

Mikrobiota Ruminansia. Mikroba rumen sangat penting untuk produksi ternak ruminansia. Oleh karena itu, mikrobiota rumen kini diselidiki secara intensif melalui teknologi *New Generation Sequencing* (NGS) pada sapi, kambing, dan domba (Lee et al., 2012; Omoniyi et al., 2014). Hasil awal menunjukkan bahwa mikrobiota rumen jauh lebih kompleks dan beragam daripada sekum manusia (Morgavi et al., 2013). Dinamika mikrobiota rumen baru-baru ini, diselidiki menggunakan 454 sekuensing 16S RNA dan analisis selanjutnya dari unit taksonomi operasional (OTU) pada lima periode waktu antara 1 hari dan 2 tahun, dalam dua tahun pertama kehidupan pada sapi. Mikrobiota rumen menunjukkan perubahan besar dari awal kehidupan hingga dewasa, dengan kelimpahan Firmicutes (streptokokus) selama tiga hari pertama kehidupan dan penggantian genera aerob dan anaerob fakultatif dengan yang anaerob setelah hanya tiga hari kehidupan (Jami et al., 2013). Selain kelimpahan streptokokus, keberadaan BAL jarang dilaporkan. Sebagai catatan, dalam sebagian besar penelitian, metode yang digunakan tidak cukup diskriminatif (identifikasi pada filum atau tingkat genus) untuk mengidentifikasi spesies BAL secara tepat. Demikian pula, keberadaan BAL tidak dilaporkan dalam mikrobiota rumen anak sapi pra-ruminansia (Li et al., 2012).

Rumen sangat penting untuk pencernaan pakan pada ruminansia, kemungkinan hubungan antara komposisinya dan parameter fisiologis sekarang diselidiki. Hubungan antara komposisi mikroba rumen dan komposisi susu baru-baru ini ditunjukkan, dengan korelasi yang

jelas antara hasil lemak susu dan rasio filum Firmicutes terhadap Bacteroidetes (Jami et al., 2014). Selain itu, komposisi rumen juga merupakan parameter penting (tetapi bukan satu-satunya) dalam produksi gas rumah kaca metana pada ternak ruminansia (Morgavi et al., 2010). Pengetahuan yang lebih baik tentang mikrobiota kompleks ini akan membuka jalan bagi strategi (termasuk penggunaan probiotik) yang mempromosikan dengan lebih masiv dan efisien, untuk mengurangi ruminansia yang terkontaminasi.

Dua ekosistem lain, yaitu traktus genitalis dan ekosistem mammae, sekarang sedang dieksplorasi pada ruminansia. Organ inangnya (rahim dan vagina, serta ambing) memang bisa menjadi tempat infeksi yang menjadi sumber penyakit peripartum yang serius seperti metritis, endometritis, dan mastitis. Mikrobiota endogen dapat berfungsi di sini sebagai penghalang terhadap patogen dan mungkin juga berperan dalam imunomodulasi organ (Nader-Macias et al., 2008). Mikrobiota vagina sapi terdiri dari beberapa spesies BAL termasuk *Lactobacillus* spp., *Pediococcus* spp., *Leuconostoc* spp., dan *Weissella* spp., beberapa di antaranya diisolasi dan diuji kapasitas probiotiknya terhadap infeksi urogenital (Otero et al., 2000; Wang et al., 2013). Beberapa *Streptococcus* sp. dan *Lactobacillus* sp. strain dari vagina sapi sehat (Otero et al., 2006) telah diisolasi dan melaporkan hasil yang menjanjikan menggunakan isolat *Lactobacillus gasseri*, yang menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap *Staphylococcus aureus in vitro* (Otero dan Nader- Macias, 2006).

Mikrobiota uterus sapi juga baru-baru ini diselidiki dan menunjukkan keragaman besar pada sapi sehat dibandingkan dengan yang metrik dan endometritik. Terlepas dari status kesehatannya, mikrobiota uterus terutama terdiri dari anggota filum Bacteroidetes, Fusobacteria, Firmicutes, Proteobacteria, dan Tenericutes (Santos dan Bicalho, 2012). Mikrobiota susu masih kurang terdokumentasi pada ruminansia, meskipun ada peningkatan minat dalam komunitas ilmiah. Riset terbaru menunjukkan keragaman yang tinggi dalam mikrobiota susu yang diisolasi dari puncak puting susu, menggunakan teknik kultur independen seperti elektroforesis gel gradien denaturasi (DGGE) pada fragmen 16S RNA dan gen lain yang diperkuat PCR) (Braem et al., 2013). Pendekatan tersebut memungkinkan identifikasi *Lactococcus* sp., *Bifidobacterium* sp., dan *Propionibacterium* sp. dalam sampel puting susu sapi menyusui. Hal yang perlu diperhatikan, *Lactobacillus* sp.

tidak dilaporkan (Braem et al., 2012). *Pyrosequencing* dari 16S rRNA baru-baru ini digunakan untuk menggambarkan keragaman mikroba sampel susu sapi yang berasal dari bagian sapi yang tidak terpengaruh, dan mengungkapkan keberadaan lactobacilli (*L. acidophilus*, *L. reu teri*, dan *L. johnsonii*) dengan prevalensi rendah (Oikonomou et al., 2014).

Parameter Probiotik dan Zooteknik pada Ruminansia. Pada sapi, spesies mikroba yang paling umum digunakan sebagai probiotik adalah khamir. Karena kelebihan produksi asam laktat di usus dapat menyebabkan gangguan fatal. BAL, menurut definisi, kurang digunakan sebagai aditif pakan di sektor ini. Dalam peternakan sapi perah dan ternak, ragi probiotik (misalnya, *Saccharomyces cerevisiae*) meningkatkan kinerja dengan meningkatkan asupan bahan kering dan produksi susu (Jouany, 2006). Selain khamir, penggunaan *Bacillus* sp. strain (*B. subtilis* dan *B. licheniformis*) juga terbukti meningkatkan hasil dan komposisi susu pada domba (Kritas et al., 2006). Pada sapi potong, suplementasi pakan harian dengan ragi hidup terbukti meningkatkan parameter pertumbuhan (pertambahan harian rata-rata, berat akhir, asupan, BWG) (Lesmeister et al., 2004). Beberapa manfaat ini berkorelasi dengan keseimbangan mikrobiota rumen yang lebih baik (Silberberg et al., 2013).

Probiotik dan Pencegahan Penyakit pada Ruminansia. Diare Sebelum disapih, sapi perah rentan terhadap patogen seperti *Salmonella* spp. dan *Escherichia coli*, agen etiologi bakteri yang paling sering pada anak sapi selama minggu pertama kehidupan (Barrington et al., 2002). Diare yang dihasilkan dapat sangat mempengaruhi penampilan zootechnical mereka. BAL probiotik telah diuji untuk mencegah pembentukan bakteri patogen oportunistik dan untuk menjaga keseimbangan mikroba. Meskipun konsensus belum tercapai pada efisiensi nyata probiotik dalam mengurangi prevalensi penyakit gastrointestinal pada anak sapi (Ewaschuk et al., 2006), beberapa penelitian melaporkan bahwa penggunaan probiotik sebagai bahan tambahan pakan pada diet anak sapi untuk mengurangi kejadian diare. Probiotik dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alternatif antibiotik dalam pemeliharaan pedet (Signorini et al., 2012).

Asidosis. Asidosis ruminal sub-akut (*Subacute Ruminant Acidosis* = SARA) adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan ketidakstabilan ekosistem mikroba dan oleh fermentasi yang

menghasilkan laktat, butirat, dan/atau propionat daripada asetat (yaitu, laktat, butirat, dan propionat-SARA). Hal ini merupakan perhatian utama dalam kesehatan dan kesejahteraan ternak. Selain atau di samping penggunaan buffer kimia dan ionofor, penggunaan probiotik sebagai *feed additive* telah diteliti sebagai strategi untuk menyeimbangkan mikrobiota rumen dan fermentasi, menstabilkan pH rumen, dan oleh karena itu mencegah SARA. Sebagian besar probiotik yang digunakan dalam konteks ini mengandung ragi (terutama *S. cerevisiae*) sebagai mikroba aktif utama (Desnoyers et al., 2009).

Prevotella bryantii, spesies bakteri Gram negatif ditemukan dalam mikrobiota rumen, juga diteliti sebagai probiotik, tetapi terbukti tidak efektif dalam mencegah SARA pada sapi perah (Chiquette et al., 2012). Literatur ilmiah tentang probiotik bakteri yang mengandung BAL dan bakteri asam propionat (BAP) melaporkan hasil yang bervariasi dan terkadang bertentangan, yang dapat dikaitkan dengan ketidakstabilan mikrobiota. Penentuan awal jenis asidosis membantu dalam memilih mikroba probiotik yang paling relevan dan memastikan pencegahan yang lebih baik. Dengan demikian, terbukti bahwa kombinasi *Propionibacterium* sp. dan *L. plantarum* atau *L. rhamnosus* tidak efisien terhadap asidosis laktat sedangkan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam meminimalkan butirat dan propionat SARA (Lettat et al., 2012).

Infeksi Pascapersalinan. Mastitis dan metritis adalah penyakit inflamasi yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan merupakan komplikasi utama pascapersalinan. Meskipun kemajuan besar dalam manajemen ternak dalam hal prosedur kebersihan, penyakit menular tetap menjadi masalah ekonomi yang besar dan penyebab penggunaan antibiotik secara besar-besaran. Mastitis (infeksi ambing) dan metritis (infeksi rahim) adalah salah satu penyakit yang paling umum pada sapi perah, dan mempengaruhi kesejahteraan hewan, serta parameter produktivitas dan kesuburan. Saat ini tidak ada vaksin yang efisien untuk penyakit ini dan strategi kuratif terutama didasarkan pada antibioterapi. Ini berkontribusi pada risiko penyebaran resistensi antibiotik, yang selanjutnya dapat berdampak pada kesehatan hewan dan manusia, dan mendorong perlunya pengembangan strategi alternatif dan berkelanjutan.

Sapi perah memiliki kecenderungan untuk infeksi bakteri pada endometrium, yang menyebabkan metritis pada hingga 40% hewan

dalam waktu 10 hari setelah melahirkan. Endometritis kronis bertahan lebih dari tiga minggu pascapersalinan pada 20% sapi, dan endometritis subklinis mempengaruhi tambahan 15% hewan. Meskipun beberapa patogen terlibat dalam metritis, *E. coli* adalah patogen pertama dan paling umum yang diisolasi dari uterus postpartum, mendahului infeksi bakteri lain. Ini juga merangsang respons imun bawaan yang kuat dan peradangan endometrium. *Lactobacilli* hadir dalam mikrobiota vagina sapi sehat. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi kapasitas mereka untuk mencegah kolonisasi patogen melalui mekanisme seperti produksi zat antagonis seperti asam laktat, H_2O_2 , atau bakteriosin (Nader-Macias et al., 2008).

Mastitis mempengaruhi lebih dari 40% sapi perah menyusui. *E. coli*, *Streptococcus uberis*, dan *S. aureus* adalah salah satu patogen yang paling umum pada mastitis ruminansia. BAL diuji *in vivo* untuk menguji efisiensi infus calon probiotik di kelenjar susu sapi yang terinfeksi. Percobaan pertama infus *Lactobacillus* pada kelenjar susu sapi dengan *Somatic Cell Counts* (SCC) yang tinggi menghasilkan angka kesembuhan yang rendah dan peningkatan SCC. Dalam percobaan lain, sapi dengan mastitis subklinis atau klinis kronis diinfuskan dengan *Lactococcus lactis* DPC3147, yang sama efektifnya dengan pengobatan antibiotik, tetapi tidak berhasil menyembuhkan mastitis (Crispie et al., 2008). Respons sapi sehat terhadap infus *L. lactis* DPC3147 diselidiki lebih lanjut dan terbukti menghasilkan rekrutmen neutrofil polimorfonuklear (PMN) yang tinggi, peningkatan protein fase akut, amiloid susu A (Klostermann et al., 2008), pembentukan pembekuan dalam susu, dan peningkatan IL-1 β dan IL-8 (Beecher et al., 2009). Secara keseluruhan, Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *L. lactis* dapat memberikan efek preventif dan kuratif terhadap mastitis sapi.

BAL juga ditemukan di ekosistem endogen *foremilk* mentah dan di puting susu. Beberapa hasil penelitian melaporkan isolasi, identifikasi, dan karakterisasi BAL yang berpotensi melakukan penghambatan terhadap *S. aureus*, patogen mastitis utama. Pada pertengahan 2000-an, beberapa riset menunjukkan bahwa beberapa strain BAL (hanya 1 dari 102 isolat) menunjukkan sifat penghambatan terhadap patogen target, yang berkorelasi dengan produksi senyawa seperti bakteriosin (Espeche et al., 2009). Apakah galur tersebut memiliki potensi dalam pencegahan mastitis yang serupa dengan *L. lactis* DPC3147 harus ditentukan dengan eksperimen *in vivo* (Espeche et al., 2012).

Baru-baru ini, telah dilakukan penyelidikan mekanisme yang mendasari potensi pencegahan *L. galur casei in vitro*, menggunakan model interaksi tripartit antara *L. casei*, *S. aureus*, dan sel epitel susu sapi (bMEC). Dengan demikian tiga *L. galur casei* mampu menghambat, dengan cara yang bergantung pada regangan, adhesi dan internalisasi *S. aureus* ke dalam bMEC (Bouchard et al., 2013). Hasil ini menggembirakan karena internalisasi diduga terlibat dalam persistensi dan kronisitas mastitis *S. aureus*.

2. Probiotik bagi Babi

Babi dibiakkan pada dasarnya untuk produksi daging, paling sering dalam sistem intensif di mana penyakit seperti diare dan pneumonia menyebabkan hilangnya pertumbuhan dan peningkatan kematian, terutama pada anak babi pasca sapih. Efisiensi pakan merupakan parameter penting dalam peternakan babi untuk memberikan pertumbuhan yang optimal. *Antibiotics Growth Promotor* (AGP) digunakan secara luas sampai baru-baru ini dilarang dan memberi jalan bagi pengembangan strategi alternatif termasuk probiotik. Selain itu, sebagai hewan monogastrik, babi sering dijadikan model untuk studi tentang saluran pencernaan manusia. Mikrobiota usus mereka telah diselidiki dan ada banyak laporan tentang penggunaan dan efek probiotik pada kesehatan babi dan efisiensi *zootechnical*. Studi tentang probiotik pada babi telah dilaporkan dalam literatur sejak pertengahan 1990-an dan benar-benar dimulai pada awal 2000-an dengan laporan penggunaan probiotik pada parameter *zootechnical* dan pencegahan.

Seperti halnya ruminansia, sasaran utama dan jenis probiotik dalam pemeliharaan babi tergantung pada jenis produksi atau tahap perkembangan ternak. Pada induk babi yang sedang hamil, probiotik digunakan untuk meningkatkan pencernaan makanan, untuk membatasi sembelit, dan untuk mengurangi stres. Selama laktasi dan anak babi, probiotik direkomendasikan untuk meningkatkan ukuran dan viabilitas serasah, meningkatkan kualitas kolostrum, kualitas dan kuantitas susu, dan meningkatkan berat badan anak babi. Pada penggemukan babi, penggunaan probiotik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pakan, meningkatkan kualitas daging, dan mengurangi risiko diare.

Mikrobiota Babi. *Mikrobiota* usus babi baru-baru ini telah diselidiki melalui pyrosequencing dari area 16S rRNA dan terungkap bahwa BAL

hadir pada tingkat yang signifikan di dalamnya. Pada ileum babi muda (umur 26 hari), genus *Clostridium*, *Lactobacillus*, *Streptococcus*, *Helicobacter*, *Ruminococcus*, *Veillonella*, *Candidatus*, *Actinobacillus*, *Bacillus*, dan *Turicibacter* adalah 10 yang paling sering ditemui (berdasarkan frekuensi) (Dowd et al., 2008). Beberapa penelitian menyelidiki kerentanan mikrobiota ini terhadap cekaman (misalnya, penyapihan) dan atau patogen (misalnya, *Salmonella* sp.). Pendekatan yang bergantung pada kebiasaan menunjukkan bahwa penyapihan memang berkorelasi dengan perubahan mikrobiota usus kecil (Janczyk et al., 2007). Setelah disapih, populasi *Lactobacillus* meningkat (dengan *L. sobrius*/*L. amylovorus* sebagai spesies dominan) dan *Bifidobacterium* dan *E. coli* mengurangi. Temuan ini dikonfirmasi menggunakan amplifikasi gen 16S rRNA dan DGGE (Dowd et al., 2007).

Keragaman bakteri dalam kotoran babi bervariasi menurut usia, seperti yang ditunjukkan oleh penyelidikan longitudinal sampel tinja pada babi antara usia 10 dan 22 minggu. Namun, variasi ini sebagian besar disebabkan oleh komponen bakteri yang kurang melimpah dari feses dan lactobacilli tetap menjadi spesies dominan dalam sampel feses babi (Kim et al., 2011). Resistensi terhadap infeksi adalah salah satu peran penting yang dianggap berasal dari mikrobiota usus, dengan mikrobiota normal tidak termasuk patogen baik dengan menempati ceruk atau mengganggu patogen. Di sisi lain, mikrobiota usus dapat dipengaruhi oleh infeksi yang diukur dengan pengurutan gen 16S rRNA pada babi yang diuji secara eksperimental dengan *Salmonella enterica* serovar Typhimurium (Bearson et al., 2013). Penggunaan AGP seperti tylosin baru-baru ini terbukti menginduksi pergeseran populasi pada spesies mikrobiota usus yang melimpah dan kurang melimpah (Kim et al., 2012). Inokulum oral yang dibuat dari kotoran babi hutan dari kawanan kesehatan juga terbukti mempengaruhi komunitas mikroba pernapasan dan usus dan secara positif memodulasi respons imun sistemik pada tantangan dengan *Mycoplasma hyopneumoniae* (Schachtschneider et al., 2013).

Parameter Probiotik dan Zootechnical. Pada Babi, Enterococci secara khusus diselidiki untuk efek probiotiknya pada babi. *THT faecium* (strain NHRD IHARA) yang diisolasi dari usus babi yang sehat diuji secara oral pada anak babi setelah disapih dan terbukti meningkatkan kinerja pertumbuhan dan merangsang produksi imunoglobulin A (IgA) di usus

dan serum (Ihara et al., 2013). Hasil serupa baru-baru ini dilaporkan saat menggunakan sel yang dibunuh dengan panas dari strain ini (Sukegawa et al., 2014). Karena genus *Lactobacillus* merupakan komponen penting dari mikrobiota usus pada babi, penggunaan strain *Lactobacillus* sebagai probiotik telah mendapat perhatian yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai catatan, kelimpahan spesies lactobacilli yang agak spesifik dalam kotoran babi menjadikan penanda yang baik untuk kotoran babi. Riset terbaru mengusulkan menggunakan kuantifikasi *L. sobrius/ amylovorus* menggunakan PCR *real-time* untuk mengidentifikasi kontaminasi kotoran babi di permukaan air (Marti et al., 2010).

Probiotik dan Pencegahan Penyakit bagi Babi. Pengendalian penyakit menular pada peternakan babi merupakan elemen kunci dalam produksi pangan baik dari kesehatan hewan maupun dari sudut pandang kesehatan masyarakat. *L. plantarum* yang digunakan sebagai suplemen makanan babi neonatus menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan meningkatkan total populasi kelompok lactobacillus dalam usus babi yang disapih (Takahashi et al., 2007). Ketika diberikan bersama dengan maltodekstrin dan/ atau fruktooligosakarida (FOS), *L. plantarum* menurunkan jumlah *E. coli* O8:K88 dalam usus anak babi (Nemcova et al., 2007). Demikian pula kombinasi FOS dan *L. paracasei* secara signifikan meningkatkan jumlah *Bifidobacterium* spp., *Lactobacillus* spp., total anaerob dan aerob pada anak babi yang disapih dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan. Pemberian symbion tersebut juga secara signifikan menurunkan jumlah *Clostridium* dan *Enterobacterium* dalam kotoran anak babi (Bomba et al., 2002).

Spesies *Lactobacillus* lainnya memberikan efek menguntungkan pada kesehatan anak babi. *L. sobrius* (sinonim dari *L. amylovorus*, sekarang dianggap sebagai spesies tunggal) (Jakava-Viljanen et al., 2008) terbukti secara signifikan mengurangi jumlah ETEC di ileum ketika diberikan kepada anak babi setelah disapih. Secara paralel, penambahan berat badan harian meningkat pada anak babi yang menerima *L. sobrius* dibandingkan dengan kontrol (Konstantinov et al., 2008). Perawatan dengan *L. rhamnosus* GG (LGG) mengurangi diare yang disebabkan oleh *E. coli* K88 pada anak babi setelah disapih. Stimulasi pertahanan usus, modulasi mikrobiota usus, dan regulasi sitokin inflamasi adalah beberapa mekanisme yang mungkin terlibat dalam efek ini (Zhang dan Zhang, 2010).

Bifidobacteria, ketika diberikan bersama dengan lactobacilli segera setelah lahir, terbukti meningkatkan kolonisasi usus babi neonatus dengan mikrobiota komensal yang bermanfaat. Perlakuan ini membatasi beban patogen pada babi neonatus prematur, dan dengan demikian menurunkan kolonisasi oleh *Clostridium perfringens* dan mengurangi insiden dan keparahan enterokolitis nekrotikans (Siggers et al., 2008).

Meskipun mekanisme yang mendasari efek probiotik tersebut tidak sepenuhnya dijelaskan, diakui bahwa *B. lactis* dan *L. rhamnosus* dapat mengurangi adhesi patogen ke mukosa dan mengurangi keparahan gejala yang ditimbulkan oleh patogen pada mukosa usus seperti yang disebabkan oleh *Salmonella*, *E. coli*, dan *Clostridium* spp. pada babi, dan menjadi lebih efektif jika kedua spesies probiotik digunakan secara bersama (Collado et al., 2007). Dalam model babi, diare pasca penyapihan yang diinfeksi dengan *E. coli* dan rotavirus dapat dikurangi dengan pengobatan probiotik dengan *B. lactis* HN019 (Shu et al., 2001), sedangkan pada babi yang disapih, *B. animalis* subsp. *lactis* juga terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pertumbuhan dan memperbaiki rasio antra bifidobacteria dan *E. coli* di usus (Modesto et al., 2009).

Eksperimen *in vitro* menunjukkan bahwa *Ent. faecium* menurunkan empat unit log perbanyakkan virus flu babi (strain H1N1 dan H3N2) dalam garis sel makrofag babi. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa efek probiotik ini terjadi melalui perangkap adsorptif langsung virus influenza dan dengan memperkuat pertahanan bawaan pada tingkat sel (Wang et al., 2013). Meskipun hasil menarik diperoleh dengan *Ent. faecium* dalam model *in vitro* infeksi virus, tampaknya efek *Ent. faecium* secara *in vivo* pada pencegahan penyakit kurang menjanjikan sesuai hasil uji tantangan dengan bakteri patogen pada umumnya. Misal seperti *E. faecium* NCIMB 10415 tidak menunjukkan efek menguntungkan pada kinerja anak babi yang disapih yang ditantang dengan *Salmonella Typhimurium* dalam hal mengusir patogen dan respons imun humoral spesifik (*anti-Salmonella* IgG) dan nonspesifik (haptoglobin) (Kreuzer et al., 2012). Beberapa hasil penelitian bahkan melaporkan bahwa pada anak babi yang menerima *E. faecium* NCIMB 10415 dan ditantang dengan *Salmonella* serovar *Typhimurium* DT104, ekskresi tinja dan kolonisasi *Salmonella* di organ secara signifikan lebih besar pada kelompok yang diberi enterococci daripada kelompok kontrol. Selain itu, respons imun humoral (IgM dan IgA) terhadap *Salmonella* lebih besar pada

hewan kelompok probiotik dibandingkan hewan kontrol. Studi ini sebenarnya menunjukkan bahwa *E. faecium* meningkatkan perjalanan infeksi *Salmonella* pada anak babi yang disapih (Szabo et al., 2009). Bersama dengan kontroversi status GRAS *Enterococcus* sp., hasil terakhir ini mempertanyakan penggunaan enterococci sebagai probiotik dalam suplementasi pakan.

3. Probiotik bagi Unggas

Manfaat suplementasi pakan dengan mikroba hidup (bakteri atau ragi) dilaporkan dalam peternakan unggas pada kinerja dan kesehatan hewan. Khususnya, resistensi ayam terhadap infeksi bakteri (*C. perfringens*, *E. coli*, atau *Salmonella*), efisiensi pakan, produktivitas ayam petelur, dan kualitas telur telah dilaporkan (Chaucheyras-Durand dan Durand, 2010).

Mikrobiota Unggas. Mikrobiota usus ayam sangat beragam dan sekuensing RNA 16S menunjukkan bahwa mikrobiota ini terdiri dari lebih dari 900 dan 460 spesies yang setara dengan OTU dalam koleksi sekuens ayam dan kalkun (Wei et al., 2013). Di sepanjang saluran cerna (GIT) ayam (gizzard, duodenum, ileum, cecum), lactobacilli adalah spesies yang dominan (Stanley et al., 2013). Mereka mewakili lebih dari 68% mikrobiota ileum dan duodenum pada ayam. Dominasi tersebut diamati lebih awal setelah menetas, pada minggu-minggu pertama kehidupan, dan bertahan dalam mikrobiota dewasa.

Berbeda dengan mamalia, pada unggas, sekum adalah tempat fermentasi yang penting, tempat utama penyerapan air dan nutrisi dan fungsinya mempengaruhi kesehatan hewan dan kinerja pakan. Mikrobiota cecal mencerna makanan yang kaya akan pati, selulosa, dan polisakarida lain yang ada dalam biji-bijian dan sereal. Selain sangat penting bagi kesehatan ayam, sekum ayam dianggap sebagai reservoir patogen utama. Sampel feses ayam dianalisis menggunakan sekuensing 16S rRNA dan dibandingkan dengan bagian GIT lainnya (Sekelja et al., 2012). Penyelidikan ini menunjukkan bahwa mikrobiota tinja sangat bervariasi dari waktu ke waktu, menunjukkan bahwa pergeseran temporal dalam mikrobiota tinja adalah konsekuensi dari pengosongan periodik bagian GIT yang berbeda. Variasi yang disebabkan oleh pelepasan tersebut, merupakan fenomena yang umumnya diabaikan

dalam penelitian mamalia yang terbatas pada kotoran (Stanley et al., 2014).

Parameter Probiotik dan Zooteknik pada Unggas. Dalam produksi telur, probiotik digunakan sebagai aditif pakan untuk meningkatkan pencernaan nutrisi dan kinerja keseluruhan ayam (efisiensi pakan, produksi telur, dan kualitas telur) (Panda et al., 2003). Probiotik juga digunakan untuk secara positif memodulasi mikrobiota usus (Yu et al., 2008) dan kekebalan mukosa usus (Koenen et al., 2004). Probiotik juga diselidiki untuk kemungkinan perannya dalam mengubah metabolisme lipid ayam, seperti pengurangan kandungan kolesterol dalam kuning telur (Li et al., 2006) dan dalam serum (Kalavathy et al., 2003). Misalnya, suplementasi pakan dengan *P. acidilactici* MA18/5M pada ayam petelur terbukti meningkatkan bobot telur, ketebalan kulit telur, dan berat relatif, dan untuk meningkatkan rasio efisiensi pakan per kilogram telur. Perlakuan tersebut juga secara signifikan mengurangi jumlah telur yang pecah dan secara drastis mengurangi jumlah telur yang rusak (Mikulski et al., 2012).

Demikian pula, suplementasi dengan *L.* strain probiotik *salivarius* dan *B. subtilis* pada pakan ayam petelur menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam produksi telur, produksi telur harian, dan rasio telur rusak. Menariknya, efek positif ini diperoleh dengan pemanasan bakteri yang tidak aktif. Efek lain yang menarik diamati dalam penelitian ini adalah peningkatan titer antibodi terhadap virus flu burung pada sebagian besar kelompok perlakuan. Pada beberapa kombinasi yang diuji, titer antibodi terhadap virus Newcastle disease juga lebih tinggi. Suplementasi pakan dengan probiotik dapat secara positif mempengaruhi kinerja, kualitas telur, dan respons imun ayam petelur (Zhang et al., 2012). Sebagai catatan, beberapa dari kombinasi ini juga termasuk bakteri pembentuk spora (seperti *C. butyricum*, *B. subtilis*). Penggunaan pembentuk spora tersebut dalam persiapan probiotik harus memperhitungkan risiko penyebaran dan perkembangan spora dan pembusukan produk telur selama proses dan penyimpanannya. Risiko perkembangan bakteri pembusuk (kebanyakan pembentuk spora) memang menjadi perhatian serius dalam pengubahan telur (Techer et al., 2014).

Dengan demikian, BAL muncul sebagai kandidat yang paling menjanjikan dan lebih aman dalam penggunaan probiotik. Memang,

beberapa *Lactobacillus* spp. terbukti meningkatkan parameter kinerja (laju pertumbuhan, konversi pakan, dan kualitas daging). Suplementasi pakan dari diet broiler dengan strain *Lactobacillus* tertentu memang meningkatkan tingkat konversi pakan, BWG, dan mengurangi timbunan lemak perut (Kalavathy et al., 2003). Usus ayam yang sehat juga bisa menjadi sumber calon probiotik, seperti yang ditunjukkan untuk strain *L. reuteri*, *L. salivarius*, *E. faecium*, *B. animalis*, dan *P. acidilactici* yang diuji efikasinya terhadap BB, konsumsi pakan, dan rasio konversi pakan pada ayam pedaging. Formula probiotik tersebut, ketika diberikan dengan air dan pakan, menunjukkan efek pertumbuhan yang sebanding dengan pengobatan antibiotik (Mountzouris et al., 2007).

Probiotik dan Pencegahan Penyakit pada Unggas. *Salmonella* spp. adalah salah satu patogen yang paling banyak dipelajari di sektor kesehatan unggas karena ayam dan ayam dapat menjadi pembawa atau terinfeksi, dan akibatnya hal ini meningkatkan risiko kontaminasi di sepanjang rantai makanan. Selain itu, *Campylobacter jejuni*, *Listeria monocytogenes*, *E. coli* patogen, *Yersinia enterocolitica*, dan *C. perfringens* juga dianggap sebagai ancaman bagi kesehatan unggas dan manusia. Probiotik dianggap sebagai strategi yang relevan untuk mengendalikan pelepasan patogen dan menjaga mikrobiota usus yang seimbang dan sehat. Sebagian besar aplikasi probiotik pada unggas terkait dengan konsep pengecualian kompetitif (Schneitz, 2005). Suplementasi pakan dengan lactobacilli memang terbukti secara signifikan meningkatkan pemulihan ayam broiler neonatal setelah tantangan dengan *Salmonella* enteritidis (Higgins et al., 2008).

Selain BAL, beberapa spesies BAP yang digunakan dalam fermentasi susu dianggap sebagai kandidat probiotik yang baik untuk kesehatan manusia (Cousin et al., 2012). Anggota kelompok PAB diidentifikasi dalam mikrobiota GIT unggas dengan teknik yang bergantung pada kultur dan tidak bergantung pada kultur. Isolat *P. acidipropionici* dan *P. avidum* baru-baru ini diuji potensi probiotiknya pada unggas. PAB ini ditunjukkan untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek (SCFA) dalam model cecal *in vitro* pada konsentrasi yang cukup tinggi untuk menghambat *S. enterica* serovar Enteritidis. Selain itu, *P. acidipropionici* strain LET 105 juga mampu bersaing dengan *Salmonella* untuk situs adhesi pada mukosa usus dalam uji *ex vivo* (Arganaraz-Martinez et al., 2013).

Selain suplementasi pakan “klasik”, cara alternatif probiotik inokulasi *inovo* telah dieksplorasi sejak akhir 1990-an. Kolonisasi usus unggas memang dianggap terjadi setelah menetas. Namun, beberapa riset memberikan bukti ilmiah bahwa usus ayam dapat mengandung sejumlah kecil bakteri hidup sebelum menetas (Deeming, 2005). Karena mikrobiota usus yang seimbang dan melimpah dianggap sebagai penghalang yang baik terhadap patogen, maka terduga untuk membangunnnya lebih awal melalui inokulasi strain probiotik *secara in ovo*. Upaya pertama gagal karena kematian embrio yang tinggi. Selain itu, dibandingkan dengan pemberian probiotik oral, mereka menunjukkan tingkat perlindungan yang lebih rendah terhadap *Salmonella*. Kemajuan dalam teknik inokulasi *in ovo* sekarang memungkinkan inokulasi saluran pencernaan embrio unggas dengan bakteri eksternal sebelum menetas.

Pemberian *in ovo* dua galur lactococcus (*L. lactis* ssp. *lactis* SL1 dan *L. lactis* ssp. *cremoris* IBB SC1) terbukti memberikan efek positif yang sedikit namun signifikan pada daging unggas (konversi pakan yang lebih baik dan otot dada yang lebih besar) dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi perlakuan (Maiorano et al., 2012). Selain itu, pemberian *in ovo* *E. faecium* menghasilkan penurunan yang signifikan dalam jumlah anak ayam yang positif *Salmonella* Enteritidis setelah tantangan pada usia 4 hari (de Oliveira et al., 2014).

Tabel 3.1 Jenis mikroba yang digunakan sebagai probiotik pada peternakan

Kelompok	Genus dan Spesies
BAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lactobacillus: <i>L. acidophilus</i>, <i>L. amylovorus</i>, <i>L. brevis</i>, <i>L. casei</i> subsp. <i>casei</i> (<i>L. casei</i>), <i>L. crispatus</i>, <i>L. farmicinis</i>, <i>L. fermentum</i>, <i>L. murinus</i>, <i>L. plantarum</i> subsp. <i>plantarum</i> (<i>L. plantarum</i>), <i>L. reuteri</i>, <i>L. rhamnosus</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>L. Amylovorus/L. sobrius</i> 2. Lactococcus: <i>L. lactis</i> subsp. <i>cremoris</i> (<i>Streptococcus cremoris</i>), <i>L. lactis</i> subsp. <i>lactis</i> 3. Leuconostoc: <i>L. citreum</i>, <i>L. lactis</i>, <i>L. mesenteroides</i> 4. Pediococcus: <i>P. acidilactici</i>, <i>P. pentosaceus</i> subsp. <i>pentosaceus</i> 5. Streptococcus: <i>Strep. infantarius</i>, <i>Strep. salivarius</i> subsp. <i>salivarius</i>, <i>Strep. thermophilus</i> (<i>Strep. salivarius</i> subsp. <i>thermophilus</i>) 6. Enterococcus: <i>Ent. faecalis</i> (<i>Streptococcus faecalis</i>), <i>Ent. faecium</i> (<i>Streptococcus faecium</i>)

Kelompok	Genus dan Spesies
Bakteri Gram positif High G+C	1. Bifidobacterium : <i>B. animalis</i> subsp. <i>animalis</i> (<i>B. animalis</i>), <i>B. lactis</i> subsp. <i>lactis</i> (<i>B. lactis</i>), <i>B. longum</i> subsp. <i>longum</i> (<i>B. longum</i>), <i>B. pseudolongum</i> subsp. <i>pseudolongum</i> (<i>B. pseudolongum</i>), <i>B. thermophilum</i> 2. Propionibacterium : <i>P. freudenreichii</i> Sporulating
Bakteri Gram positif	1. Bacillus : <i>B. cereus</i> (<i>B. cereus</i> var. <i>toyoi</i>), <i>B. licheniformis</i> , <i>B. subtilis</i>
Bakteri Gram negatif	Prevotella : <i>P. bryantii</i>
Molds and Yeast	1. Saccharomyces : <i>S. cerevisiae</i> (<i>S. boulardii</i>), <i>S. pastorianus</i> (<i>S. carlsbergensis</i>) 2. Kluyveromyces : <i>K. fragilis</i> , <i>K. marxianus</i> 3. Aspergillus : <i>A. oryzae</i> , <i>A. niger</i> 4. Candida : <i>C. pintolopessi</i>

Permintaan masyarakat untuk sistem pertanian yang lebih berkelanjutan yang menyediakan produk hewani yang lebih aman dan berkualitas bagi penduduk telah meningkat pesat selama dekade terakhir. Hal ini menyebabkan peraturan sanitasi yang ketat dan penggunaan antibiotik yang terbatas dalam kedokteran hewan untuk menghindari munculnya resistensi antibiotik pada ternak dan konsumen. Pada ternak, probiotik muncul sebagai alternatif yang menarik untuk antibiotik sebagai suplemen pakan. Probiotik digunakan untuk meningkatkan kinerja *zootechnical* dan sebagian besar untuk mencegah berbagai gangguan pencernaan.

Mikroba yang digunakan pada ternak, terkadang digunakan secara empiris, sangat beragam dan termasuk khamir, bakteri Gram (-) dan Gram (+) termasuk pembentuk spora. Meskipun efek menguntungkan mereka diamati pada ternak dalam hal kinerja produksi dan/atau pencegahan penyakit pada hewan, nasib mereka di sepanjang rantai produksi harus dipertanyakan dan diamankan. Untuk menggunakan pembentuk spora dari kelompok *B. cereus*, misalnya, dapat bermanfaat di peternakan, tetapi mungkin memiliki efek merusak pada produk akhir hewan. Demikian pula, penggunaan enterococci, yang dilaporkan memperoleh penentu resistensi antibiotik dan terlibat dalam infeksi nosokomial pada manusia, dapat dipertimbangkan dengan hati-hati. Seperti dalam kesehatan manusia, BAL probiotik menjadi perhatian khusus karena status GRAS-nya dan karena menunjukkan hasil yang

menjanjikan dan/atau menunjukkan manfaat bagi kesehatan hewan. Upaya sekarang harus ditujukan untuk penjelasan mekanisme yang mendasari efek probiotik tersebut.

PROBIOTIK DAN PREBIOTIK



Fungsi biologis usus besar manusia, termasuk penyimpanan limbah dan penyerapan air, serta mineral penting. Namun, karena waktu transit yang lambat, pH yang mendekati netral, dan ketersediaan substrat, usus besar menyimpan flora mikro bakteri yang sangat kompleks dan beragam (Jaskari et al., 2004). Mikrobiota bakteri dalam usus besar manusia diperkirakan mengkompromikan 95% dari total sel dalam tubuh, mewakili 10¹² sel/g isi berat kering. Melalui aktivitas mikroflora residen, usus besar memainkan peran utama dalam nutrisi dan kesejahteraan inang (Alles et al., 1999). Modulasi diet flora usus manusia dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep makanan fungsional telah beralih dari suplementasi mineral dan vitamin ke situasi, di mana peningkatan fungsi usus (mikroba) adalah kekuatan pendorong utama saat ini. Usus besar adalah wilayah yang paling padat penduduknya dari saluran pencernaan dan karena itu merupakan target utama untuk intervensi diet tersebut.

Mikrobiota usus penduduk memfermentasi berbagai zat, terutama disediakan oleh makanan, yang tidak dapat dicerna oleh inang dalam usus kecil dan tersedia untuk fermentasi oleh mikroflora kolon. Ini termasuk pati resisten, polisakarida nonpati (serat makanan), oligosakarida, protein, asam amino, dll. Pada orang dewasa yang khas, sekitar 80 g makanan yang dicerna setiap hari mencapai usus besar dan oleh karena itu rentan terhadap fermentasi oleh flora usus. Dua jenis utama fermentasi yang dilakukan di usus adalah sakarolitik

dan proteolitik. Produk akhir utama metabolisme karbohidrat adalah asam lemak rantai pendek, asetat, propionat, dan butirrat. Produk tersebut dimetabolisme lebih lanjut secara sistemik atau lokal untuk menyediakan pembangkit energi bagi inang. Produk akhir fermentasi proteolitik termasuk senyawa fenolik, amina, dan amonia, yang semuanya beracun. Kolon proksimal (sisi kanan) pada dasarnya adalah tempat fermentasi sakarolitik, sedangkan bagian yang lebih distal (sisi kiri) terlihat lebih banyak fermentasi proteolitik.

Modulasi diet mikrobiota usus manusia adalah bidang topikal ilmu gizi. Hal ini didorong oleh fakta bahwa saluran pencernaan, terutama usus besar, sangat padat penduduknya. Tidak diragukan lagi, spesies usus tertentu bersifat patogen dan mungkin terlibat dalam timbulnya gangguan akut dan kronis. Bifidobacteria dan lactobacilli dianggap sebagai contoh konstituen mikroflora yang meningkatkan kesehatan. Lactobacilli dapat membantu pencernaan laktosa pada individu yang tidak toleran laktosa, mengurangi sembelit dan diare infantil, membantu melawan infeksi seperti salmonella, mencegah diare, dan membantu dalam sindrom iritasi usus besar (IBS) (Salminen et al., 1999). Bifidobacteria dianggap merangsang sistem kekebalan tubuh, menghasilkan vitamin B, menghambat pertumbuhan patogen, mengurangi kadar amonia darah dan kolesterol darah, dan membantu memulihkan flora normal setelah terapi antibiotik (Schoterman et al., 200).

Efek peningkatan kesehatan dari mikroflora mungkin termasuk imunostimulasi, perbaikan pencernaan dan penyerapan, sintesis vitamin, penghambatan pertumbuhan patogen potensial, pengurangan kolesterol, dan menurunkan distensi gas (Gibson et al., 195) Efek berbahayanya adalah produksi karsinogen, pembusukan usus, produksi toksin, diare/sembelit, kerusakan hati, dan infeksi usus. Namun, sebagian besar bakteri di usus bersifat jinak, dengan kemungkinan beberapa kelompok bermanfaat. Bifidobacteria dan lactobacilli dianggap termasuk dalam kategori yang terakhir ini dan merupakan target umum untuk intervensi diet yang meningkatkan kesehatan.

A. Aspek Umum Prebiotik

Modulasi diet flora usus manusia telah dilakukan selama bertahun-tahun. Pada manusia ada aspek positif dari fermentasi usus yang

dapat meningkatkan aspek tertentu dari kesehatan inang. Mikroflora mengandung bakteri tertentu yang dapat dianggap sebagai pendorong kesehatan dan juga patogen. Misalnya, bifidobacteria dan lactobacilli dapat membantu meningkatkan resistensi terhadap infeksi usus dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya (yang dapat menyebabkan gangguan usus akut dan kronis), mengurangi kadar lipid darah, meningkatkan respons imun, dan terlibat dalam perlindungan terhadap usus. kanker (Gibson dan Roberfroid, 1999). Hasil kesehatan yang pasti dan mekanisme efeknya secara bertahap terungkap, dan saat ini ada banyak minat untuk meningkatkan jumlah dan aktivitas bakteri ini di usus besar, sebaiknya dengan mengorbankan spesies yang lebih berbahaya. Cara di mana hal ini dapat dicapai adalah melalui suplementasi makanan.

Pendekatan alternatif telah diselidiki di mana bifidobacteria komensal dan/atau lactobacilli secara selektif dipromosikan oleh asupan substrat nonviable tertentu, yang dikenal sebagai prebiotik. Gibson dan Roberfroid [4] pertama kali menggambarkan prebiotik sebagai “bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang secara menguntungkan mempengaruhi inang dengan secara selektif merangsang pertumbuhan dan/atau aktivitas satu atau sejumlah bakteri di usus besar, dan dengan demikian meningkatkan kesehatan inang.” Karena diet adalah faktor utama yang mengendalikan mikroflora usus, komposisi mikroflora dapat diatur melalui makanan.

Substrat prebiotik secara selektif digunakan oleh komponen yang bermanfaat dari flora usus asli, tetapi tidak mendorong pertumbuhan patogen potensial seperti clostridia penghasil toksin, bakteroid proteolitik dan *Escherichia coli* toksigenik. Dengan cara ini, komposisi mikroflora yang “lebih sehat” diperoleh, di mana bifidobakteri dan/atau lactobacillus menjadi dominan di usus dan memberikan kemungkinan efek peningkatan kesehatan (mirip dengan situasi yang terjadi pada usus ba Agar substrat makanan dapat digolongkan sebagai prebiotik, diperlukan tiga kriteria: (a) substrat tidak boleh dihidrolisis atau diserap di lambung atau usus kecil, (b) harus selektif untuk bakteri komensal menguntungkan di usus besar seperti bifidobacteria, dan (c) substrat harus menginduksi efek luminal/sistemik yang menguntungkan di dalam inang.

Berbagai substrat asal makanan, atau diproduksi oleh inang, tersedia untuk fermentasi oleh mikroflora kolon. Melalui diet, pati resisten (RS) adalah yang paling penting secara kuantitatif. Polisakarida nonpati (NSP) membentuk kontribusi terbesar berikutnya dan termasuk substrat yang berasal dari tumbuhan seperti pektin, selulosa, hemiselulosa, guar, dan xilan. Gula dan oligosakarida seperti laktosa, laktulosa, rafinosa, stachyose, dan frukto-oligosakarida juga lolos dari penyerapan di usus kecil dan dimetabolisme oleh spesies bakteri kolon. Glikoprotein musin yang diproduksi oleh sel goblet di epitel kolon merupakan substansi endogen yang dominan yang difermentasi di kolon. Polisakarida muko terkait seperti kondroitin sulfat dan heparin serta sekresi pankreas dan bakteri juga tersedia untuk mikroflora usus. Akhirnya, protein dan peptida yang berasal dari makanan, dalam sekresi pankreas, atau diproduksi oleh bakteri juga tersedia di usus besar, meskipun pada tingkat yang lebih rendah daripada karbohidrat (Sanders, 1998).

Oleh karena itu, premis di balik prebiotik adalah untuk merangsang bakteri asli tertentu di usus daripada memperkenalkan spesies eksogen, seperti halnya probiotik. Menelan makanan yang mengandung karbohidrat yang tidak dapat dicerna yang difermentasi secara selektif oleh bakteri menguntungkan asli adalah prinsip prebiotik. Setiap komponen makanan yang mencapai usus besar utuh adalah prebiotik potensial, tetapi banyak minat dalam pengembangan prebiotik ditujukan pada oligosakarida yang tidak dapat dicerna seperti fructooligosaccharides (FOS), trans galactooligosaccharides (TOS), isomaltooligosaccharides (IMO), xylooligosaccharides (XOS), soyoligosakarida (SOS), glukooligosakarida (GOS), dan laktosukrosa. Sebaliknya, dimungkinkan untuk mengonsumsi prebiotik secara lebih alami melalui makanan.

Banyak buah dan sayuran mengandung oligosakarida prebiotik seperti FOS. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, pisang, asparagus, daun bawang, artichoke Yerusalem. Namun, situasi yang mungkin adalah bahwa tingkat terlalu rendah untuk memiliki efek yang signifikan. Data kami (tidak dipublikasikan) menunjukkan bahwa setidaknya 4 g/hari, tetapi lebih disukai 8 g/hari FOS akan diperlukan untuk secara signifikan meningkatkan bifidobacteria dalam usus manusia. Oleh karena itu, ada banyak nilai dalam pendekatan fortifikasi makanan.

Karena mayoritas bakteri yang tinggal di mikrobiota usus hadir di usus besar, prebiotik biasanya diarahkan ke bakteriologi usus yang lebih rendah. Setiap bahan makanan yang masuk ke usus besar adalah calon prebiotik, termasuk karbohidrat seperti pati resisten dan serat makanan serta protein dan lipid. Namun, prebiotik saat ini tampaknya terbatas pada oligosakarida yang tidak dapat dicerna di usus bagian atas dan tampaknya memberikan tingkat selektivitas fermentasi yang diperlukan, misalnya, diarahkan pada bifidobacteria.

Oligosakarida adalah gula yang terdiri dari sekitar 2 dan 20 unit sakarida, yaitu polisakarida rantai pendek. Beberapa terjadi secara alami di beberapa buah dan sayuran dan dapat diekstraksi, sementara yang lain dapat diproduksi secara komersial melalui hidrolisis polisakarida (misalnya, serat makanan, pati) atau melalui generasi enzimatik. Oligomer berikut telah disarankan memiliki potensi prebiotik (Gibson et al., 2000).

1. Laktulosa.
2. Fruktooligosakarida.
3. Galaktooligosakarida.
4. Oligosakarida kedelai.
5. Laktosukrosa.
6. Isomaltooligosakarida.
7. Glukooligosakarida.
8. Xilooligosakarida.
9. Palatinosa.

1. Struktur dan Fungsi Prebiotik

Daftar prebiotik yang diakui mewakili berbagai kimia karbohidrat. Meskipun demikian, kami masih memiliki sedikit pemahaman tentang hubungan struktur-fungsi dalam molekul-molekul ini. Selain itu, kami tidak memiliki data komparatif yang baik tentang fermentasinya properti (terutama pada tingkat spesies mikroba), dan tidak ada kemampuan prediktif dengan sehubungan dengan struktur karbohidrat baru yang diisolasi atau disintesis. Hal ini kemungkinan akan menghambat pengembangan produk baru berdasarkan konsep tersebut. Sifat prebiotik karbohidrat kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut.

- a. Komposisi monosakarida: Prebiotik yang diakui terutama dibangun dari glukosa, galaktosa, xilosa, dan fruktosa. Potensi prebiotik oligosaccharides yang tersusun dari monosakarida lain seperti arabinosa, rhamnosa, glukosamin, dan asam galakturonat tidak diketahui saat ini;
- b. Keterkaitan glikosidik: Keterkaitan antara residu monosakarida adalah faktor penting dalam menentukan selektivitas fermentasi dan pencernaan di usus kecil. Paradigma saat ini untuk fermentasi selektif prebiotik adalah sel terkait fructofuranosidase yang diisolasi dari bifidobakteria. Jika model ini berlaku untuk oligosakarida dan bakteri lain, maka spesifisitas keterkaitan glikosidase akan sangat penting. Maltosa bukan dikenal sebagai prebiotik dan dimetabolisme oleh *brush border* usus manusia. Isomaltoseglikosidase dan isomaltooligosaccharides, merupakan prebiotik. Keduanya terdiri dari ikatan sebuah glukosil, tetapi ikatan 1-6 di IMO membuat mereka sebagian resisten terhadap metabolisme di usus kecil dan memungkinkan terjadinya selektivitas fermentasi di usus besar.
- c. Berat molekul: Secara umum, polisakarida bukanlah prebiotik (Wang, 1993). Sebaliknya, semua prebiotik yang diketahui memiliki berat molekul rendah. Inulin memiliki berat molekul tertinggi, tetapi sebagian besar karbohidrat dalam inulin memiliki derajat polimerisasi (DP) sebesar 25 dengan rata-rata sekitar DP 14. Efek dari berat molekul pada sifat prebiotik dapat dilihat dari fakta bahwa xilan tidak selektif. Olano-Martin et al. telah menyelidiki efek ini secara lebih rinci dan menemukan peningkatan dalam selektivitas pada hidrolisis dekstran menjadi IMO dan pada hidrolisis pektin menjadi oligosakarida pektik (Olano-Martin, 2001). Hubungan yang tepat antara molekul berat dan selektivitas tidak diketahui saat ini untuk polisakarida/sistem oligosakarida.

2. Peningkatan Berat Molekul

Sebagian besar prebiotik saat ini, memiliki berat molekul yang relatif kecil, kecuali inulin. Seperti yang dibahas di atas, diyakini bahwa oligosakarida harus dihidrolisis oleh glikosidase bakteri yang terkait dengan sel sebelum penyerapan monosakarida yang dihasilkan. Oleh

karena itu, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa semakin lama oligosakarida, semakin lambat fermentasi dan karenanya semakin jauh efek prebiotik akan menembus ke seluruh usus besar. Sebagai contoh, inulin rantai panjang dapat memberikan efek prebiotik di daerah kolon yang lebih distal daripada yang lebih rendah berat molekul FOS, yang mungkin lebih cepat difermentasi di usus proksimal sakarolitik. Pendekatan ini telah menyebabkan bentuk industri campuran inulin/FOS dengan distribusi panjang rantai terkontrol (“Synergie II,” diproduksi oleh Orafiti, Tienen, Belgia), yang secara teori harus bertahan lebih jauh di belakang. Pendekatan ini mungkin sangat menjanjikan untuk membuat prebiotik yang lebih persisten.

3. Potensi Aplikasi Pangan

Konsep prebiotik saat ini adalah oligosakarida yang difermentasi secara selektif oleh bifidobacteria dan lactobacilli. Karena sulitnya mengkarakterisasi mikroflora kolon pada tingkat spesies, hampir semua data tentang sifat prebiotik oligosac charides berada pada perubahan mikroflora pada tingkat genus. Akan tetapi, sangat diinginkan untuk mengembangkan prebiotik yang ditargetkan pada spesies tertentu dari Bifidobacterium dan Lactobacillus. Prebiotik yang ditargetkan tersebut, dapat dipertimbangkan untuk beberapa aplikasi.

Sinbiotik dengan manfaat kesehatan yang pasti. Banyak jenis probiotik telah dikembangkan untuk memiliki manfaat kesehatan tertentu seperti stimulasi kekebalan atau aktivitas anti-patogen. Selain itu, strain probiotik komersial dipilih untuk karakteristik kelangsungan hidup mereka seperti ketahanan terhadap asam dan empedu dan sifat-sifatnya kemampuan untuk dibekukan-kering (Svensson et al., 1990). Ketersediaan prebiotik ditargetkan pada strain ini akan memungkinkan pengembangan versi sinbiotik dengan survivabilitas ditingkatkan dan kolonisasi dalam usus.

- a. Susu formula bayi: Telah lama diketahui bahwa flora usus bayi yang diberi ASI didominasi oleh bifidobacteria dan tidak demikian halnya dengan bayi yang diberi susu formula (Mitsuoka, 1990). Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan mengapa bayi diberi susu formula. peningkatan resistensi terhadap infeksi yang dialami kelompok terakhir. Jika prebiotik dapat dikembangkan

yang memiliki selektivitas khusus terhadap bifidobakteri yang ada dalam usus bayi yang diberi ASI, rangkaian baru makanan formula sinbiotik dapat dipertimbangkan.

- b. Makanan fungsional untuk orang tua: Di atas usia sekitar 55-60 tahun, jumlah bifidobakteri fekal telah terbukti menurun secara nyata dibandingkan dengan jumlah orang yang lebih muda (Kleessen et al., 1997). Penurunan bifidobakteri ini menjadi perhatian karena flora usus lansia alami mungkin telah dikompromikan melalui pengurangan jumlah bifidobakteri, mengakibatkan berkurangnya kemampuan untuk melawan kolonisasi dengan patogen yang menyerang. Prebiotik dapat berpotensi digunakan sebagai intervensi diet dalam upaya untuk mengembalikan keseimbangan mikroflora muda usus pada populasi lanjut usia, bersamaan dengan secara tidak langsung memberikan perlindungan antipatogenik.

Karena prebiotik mengeksploitasi penggunaan komponen makanan yang tidak dapat hidup untuk meningkatkan kesehatan usus, kisaran makanan yang dapat ditambahkan jauh lebih luas daripada probiotik, di mana kelangsungan hidup kultur perlu dipertahankan. Kondisi ini memiliki keuntungan bahwa stabilitas panas atau paparan oksigen tidak menjadi masalah. Dengan demikian, hampir semua makanan yang mengandung karbohidrat rentan terhadap suplementasi, contohnya ditunjukkan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Aplikasi Potensial Prebiotik sebagai Bahan Pangan untuk Meningkatkan Kesehatan Gastrointestinal

No	Bahan Pangan
1	Minuman dan susu fermentasi
2	Minuman kesehatan
3	Produk roti
4	Saus
5	Susu formula bayi dan makanan yang disapis
6	Sereal
7	Biskuit
8	Panganan, kue, makanan penutup
9	<i>Snack bar</i>
10	Sup

B. Aspek dan Aplikasi Terkait Kesehatan

Pendekatan prebiotik menganjurkan pemberian entitas *nonviable*. Saat ini, sebagian besar prebiotik dipilih berdasarkan kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan mikroorganisme penghasil asam laktat. Fructooligosaccharides (FOS), laktulosa, dan galactooligosaccharides (GOS) semuanya adalah prebiotik yang populer. Dalam penelitian pada manusia, setelah periode makan yang singkat, mereka merangsang bifidobacteria di usus bagian bawah. Demikian pula, laktulosa adalah prebiotik yang efisien, karena ditunjukkan melalui penggunaan probe molekuler dalam percobaan sukarelawan manusia (Tuohy et al., 2001).

Di Eropa, FOS, GOS, dan laktulosa telah terbukti menjadi prebiotik melalui berbagai percobaan yang telah dilakukan, sebagaimana dibuktikan oleh kemampuan mereka untuk mengubah komposisi flora usus setelah periode makan yang singkat. Roti pendek yang mengandung 7 g/d FOS diumpankan ke subjek manusia dan ditentukan efeknya pada bakteri tinja dibandingkan dengan plasebo (tanpa pemberian FOS). Sifat dari percobaan ini adalah pendekatan *cross over*, di mana para sukarelawan mengambil *shortbread* secara acak, baik mereka maupun para peneliti tidak menyadari yang mana yang tertelan. Selain itu, pendekatan bakteriologi dilakukan dengan menggunakan pendekatan penyelidikan (kultur-independen) yang mengandalkan perbedaan profil 16SrRNA untuk konfirmasi identitas. Data dengan jelas menunjukkan bahwa penggunaan FOS memberikan efek mendalam pada komposisi bifidobacteria feses. Sejumlah manfaat dapat dianggap berasal dari asupan prebiotik (Gibson et al., 2002).

1. Perlindungan terhadap Kanker Usus Besar

Beberapa penyakit umum pada usus besar manusia, muncul di usus besar bagian distal, terutama: kanker usus besar. Prebiotik telah didalilkan untuk menjadi pelindung terhadap perkembangan kasus kanker usus besar. Kanker paling umum kedua pada manusia adalah kanker usus besar dan diperkirakan bahwa tumor muncul 100 kali lebih sering di usus besar dibandingkan dengan usus kecil (Morotomi et al., 1990). Untuk alasan ini, banyak peneliti percaya bahwa flora mikro kolon memiliki peran penting dalam perkembangan kanker usus.

Diketahui bahwa beberapa spesies bakteri yang biasa ditemukan di usus besar menghasilkan karsinogen dan promotor tumor dari komponen makanan yang mencapai usus besar. Ketertarikan pada intervensi yang dimediasi diet pada kanker usus besar muncul karena sifat penyakit yang lambat dan progresif dan fakta bahwa kita dapat mempengaruhi mikrobiologi kolon melalui diet. Ada beberapa penelitian tentang penggunaan prebiotik dalam pencegahan kanker, terutama berfokus pada model hewan. Diperkirakan bahwa prebiotik dapat melindungi terhadap perkembangan kanker usus besar melalui setidaknya dua mekanisme.

- a. Produksi metabolit pelindung: Butirat adalah produk akhir fermentasi yang umum dan diketahui merangsang apoptosis pada garis sel kanker kolon, dan juga bahan bakar yang disukai untuk kolonosit yang sehat. Untuk alasan ini umumnya diyakini diinginkan untuk meningkatkan jumlah butirat yang terbentuk di usus besar. Beberapa prebiotik diketahui memiliki efek ini, meskipun harus diingat bahwa lactobacilli dan bifidobacteria tidak menghasilkan butirat. Produsen butirat yang dikenal di usus adalah clostridia dan eubacteria. Pengembangan prebiotik yang merangsang eubacteria, tetapi tidak berlaku bagi clostridia akan menjadi kondisi yang diharapkan.
- b. Subversi metabolisme kolon menjauh dari metabolisme protein dan lipid. Ada kemungkinan bahwa prebiotik akan menginduksi pergeseran metabolisme bakteri di usus besar menuju produk akhir yang lebih jinak. Target yang jelas akan menggeser metabolisme clostridia dan bacteroides dari proteolisis menjadi sakarolisis.

Bakteri asam laktat diyakini memiliki efek penghambatan pada beberapa bakteri yang menghasilkan enzim karsinogenik dan mereka sendiri. Selain itu, prebiotik secara tidak langsung dapat mengubah aktivitas enzim yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat, yaitu glucuronidase, enzim karsinogenesis, seperti halnya azoreductases, dan nitroreductases (Reddy, 1998).

Sampai saat ini, beberapa probiotik telah dievaluasi dalam percobaan hewan dan manusia. Inulin telah terbukti menghambat pembentukan fokus *crypt* yang menyimpang pada tikus. Penelitian pada manusia jumlahnya sedikit dan cenderung berfokus pada penanda

feses dari karsinogenesis daripada bersifat epidemiologis. FOS, GOS, dan pati resisten semuanya telah diselidiki. FOS telah ditemukan untuk mengurangi enzim genotoksik seiring dengan meningkatnya bifidobacteria, dan pati resisten telah ditemukan untuk mengurangi sterol, asam empedu sekunder, dan enzim genotoksik, meskipun tidak ada studi mikrobiologi yang dilakukan.

Namun, penelitian terbaru tentang GOS tidak menemukan perubahan signifikan pada bifidobacteria atau penanda karsinogenesis. Hasil ini mungkin pada pandangan pertama tampak anomali, karena GOS dikenal sebagai prebiotik. Namun, populasi awal bifidobacteria pada relawan cukup tinggi (9,2-9,4 log). Telah dicatat oleh Rycroft et al., (2001) bahwa besarnya respons terhadap prebiotik oleh bifidobacteria tergantung pada tingkat awal. Pengembangan prebiotik dengan tujuan mengurangi biomarker kanker, memerlukan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi penyakit mematikan tersebut.

2. Perlindungan terhadap Patogen

Bukti yang baik atas keberhasilan prebiotik, terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan ketahanan terhadap patogen dengan meningkatkan populasi bifidobacteria dan lactobacilli. Mikroorganisme yang mengeluarkan asam laktat dikenal karena sifat penghambatannya. Pada manusia, virus, protozoa, jamur, dan bakteri semuanya dapat menyebabkan gastroenteritis akut. Produk akhir metabolik seperti asam yang diekskresikan oleh mikroorganisme ini dapat menurunkan pH usus ke tingkat di bawah pH, di mana patogen dapat bersaing secara efektif. Juga, banyak spesies lactobacilli dan bifidobacteria yang mampu mengeluarkan antibiotik alami yang dapat memiliki spektrum aktivitas yang luas. Untuk bifidobacteria, beberapa spesies mampu memberikan efek antimikroba pada berbagai patogen usus Gram positif dan Gram negatif. Sebuah studi baru-baru ini pada tikus menunjukkan bahwa FOS dan inulin melindungi terhadap patogen enterik dan sistemik dan penginduksi tumor, termasuk patogen strain Verocytotoxin dari *Escherichia coli* O157 dan campylobacters. Infeksi virus memainkan peran utama, tetapi bakteri juga sangat penting.

Banyak upaya yang dilakukan untuk membersihkan rantai makanan mulai dari produksi hingga dikonsumsi. Mungkin cara yang

rasional untuk mengurangi beban keracunan makanan adalah dengan membentengi komponen tertentu dari flora usus sehingga menjadi jauh lebih tahan terhadap invasi. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan prebiotik yang menargetkan bifidobacteria dan/atau lactobacilli.

3. Peningkatan Penyerapan Kalsium

Konsumsi prebiotik kini diketahui memodulasi peningkatan penyerapan mineral (terutama kalsium). Usus halus dianggap sebagai tempat utama penyerapan kalsium pada manusia, namun diperkirakan bahwa jumlah yang signifikan diserap terjadi di sepanjang usus, dan keberadaan prebiotik memaksimalkan efek penyerapan kolon diinginkan.

Beberapa mekanisme telah didalilkan untuk peningkatan penyerapan kalsium yang diinduksi oleh prebiotik. Fermentasi prebiotik seperti inulin menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek (SCFA) yang signifikan, yang menyebabkan penurunan pH kolon lumenal. Kondisi ini kemungkinan akan meningkatkan kelarutan kalsium dan tingkat keseluruhan dalam usus. Fitat (myoinositol hexaphosphate) adalah komponen tanaman yang mencapai usus besar sebagian besar utuh. Hal ini juga membentuk kompleks yang stabil dan tidak larut dengan kation divalen, seperti kalsium, membuat mereka tidak tersedia untuk transportasi. Hasil fermentasi dalam metabolisme bakteri fitat, sehingga membebaskan kalsium. Dipostulasikan bahwa mekanisme pertukaran kalsium bekerja di usus besar.

Dalam sistem ini, SCFA memasuki usus besar dalam bentuk terprotonasi dan kemudian berdisosiasi di lingkungan intra seluler. Proton yang dibebaskan kemudian disekresikan ke dalam lumen untuk ditukar dengan ion kalsium. Sejumlah penelitian pada hewan menunjukkan bahwa prebiotik meningkatkan penyerapan kalsium dari usus besar dan mengurangi kehilangan dari jaringan tulang. [44] Namun, sangat sedikit penelitian pada manusia yang telah dilakukan. Dalam satu penelitian, memberikan makanan yang mengandung 40 g inulin per hari selama 28 hari untuk sembilan subjek sehat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penyerapan kalsium. Sebanyak 15 g inulin, FOS atau GOS yang lebih realistis, per hari yang diberikan kepada 12 subjek sehat selama 21 hari tidak menghasilkan efek signifikan pada penyerapan kalsium atau zat besi. Dalam studi

yang lebih baru, 12 remaja laki-laki (14-16 tahun) diberi makan 15 g FOS per hari selama 9 hari dalam uji coba terkontrol plasebo terhadap sukrosa (van den Heuvel et al., 1999). Data menunjukkan peningkatan 10,8% dalam keseimbangan kalsium tanpa efek yang signifikan pada ekskresi urin.

4. Efek pada Lipid Darah

Ada minat yang tinggi dalam industri makanan dalam mengembangkan makanan fungsional untuk memodulasi lipid darah seperti kolesterol dan trigliserida. Dipercaya secara luas bahwa peningkatan kadar kolesterol dalam darah merupakan faktor risiko penyakit jantung koroner, dengan lipoprotein densitas rendah (LDL) menjadi perhatian utama. Ada juga bukti bahwa bakteri asam laktat mungkin dapat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL. Mekanisme di mana bakteri asam laktat, dan karenanya, secara tidak langsung, prebiotik, mempengaruhi lipid darah tidak dipahami dengan jelas pada saat ini.

Ada kemungkinan bahwa beberapa bakteri asam laktat dapat secara langsung mengasimilasi kolesterol. Hal ini telah dihipotesiskan dari beberapa percobaan *in vitro* tetapi merupakan sumber pertentangan bahwa data tersebut bertentangan dan pengendapan kolesterol dengan garam empedu pada pH rendah dapat terjadi, memberikan hasil yang menyedihkan. Telah dilaporkan van den Heuvel et al., (1999) bahwa propionat yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri dari prebiotik menghambat pembentukan kolesterol LDL serum. Kesulitan dengan hipotesis ini adalah bahwa fermentasi bakteri prebiotik umumnya menghasilkan lebih banyak asetat daripada propionat, karena target bakteri asam laktat (*Lactobacilli*, *Bifidobacteria*) bukan produsen propionat. Selain itu, asetat adalah prekursor metabolik kolesterol dan karena itu cenderung meningkatkan, bukan menurunkan, kadar serum. Ada bukti bahwa FOS menurunkan tesis *de novo syn* dari trigliserida oleh hati. Cara terjadinya hal ini tidak sepenuhnya dipahami, tetapi efeknya tampaknya diberikan pada tingkat transkripsi. Ada juga kemungkinan bahwa prebiotik (seperti inulin) dapat memodulasi penghambatan sintesis trigliserida yang diinduksi insulin (Delzenne et al., 1999).

Studi pada manusia tentang sifat penurun lipid dari prebiotik ketika dikonsumsi pada dosis yang realistis (dapat ditoleransi) tidak jelas.

Hasilnya tidak konsisten, dan hanya FOS, inulin, dan GOS yang telah dipelajari dalam hal ini. Ada kemungkinan bahwa prebiotik lain dapat menyebabkan efek yang lebih konsisten, meskipun sampai mekanisme di balik efek diklarifikasi, dan ini akan tetap menjadi spekulasi.

5. Efek Immunologis

Bakteri asam laktat telah lama dianggap sebagai imunomodulator. BAL diperkirakan merangsang mekanisme pertahanan inang nonspesifik dan tipe sel tertentu yang terlibat dalam respons imun spesifik. Akibatnya sering terjadi peningkatan aktivitas fagositosis dan/atau peningkatan molekul imunologis, seperti IgA sekretorik, yang dapat mempengaruhi patogen seperti salmonella dan rotavirus. Sebagian besar perhatian dalam hal ini, telah dialihkan ke asupan probiotik bakteri asam laktat (Schiffirin et al., 1995) dan interaksi antara komponen dinding sel dan sel imun. Karena prebiotik memiliki tujuan akhir yang mirip dengan bakteri asam laktat (yaitu, komposisi mikrobiota usus yang lebih baik), efek serupa dapat terjadi melalui asupannya. Sebuah studi hewan baru-baru ini menunjukkan bahwa prebiotik berdampak pada fungsi kekebalan tubuh. Timbul pertanyaan apakah peningkatan fungsi kekebalan, bahkan melalui cara nonpathogenic, adalah sifat yang diinginkan. Pemahaman yang lebih rinci tentang respons imunologis terhadap perubahan tertentu dalam mikroflora kolon dapat membantu dalam pengembangan prebiotik dengan manfaat yang lebih diinginkan.

Mikroflora saluran pencernaan adalah kunci untuk nutrisi dan kesehatan inang. Modulasi mikroflora dapat terjadi melalui diet yang mengandung prebiotik. Pendekatan menggunakan diet untuk menginduksi perubahan mikroba menawarkan pendekatan yang sangat mudah menuju peningkatan kesehatan yang ramah konsumen dan efektif. Namun, jika kemajuan dalam penggunaan intervensi diet yang diarahkan pada bakteri usus tertentu akan dieksploitasi, diperlukan basis penelitian yang kuat.

Dalam perkembangannya, penting untuk menentukan efek kesehatan definitif terkait dengan asupan prebiotik. Hal ini sangat relevan mengingat penggunaannya yang luas. Sangat mungkin bahwa pencegahan gastroenteritis akut melalui fortifikasi komponen mikrobiota usus tertentu merupakan aspek penting. Selain itu, perlindungan yang

lebih baik dari gangguan usus yang lebih kronis yang telah dikaitkan dengan bakteri (penyakit radang usus, kanker usus besar, sindrom iritasi usus besar) juga dimungkinkan.

Mungkin juga kasus populasi sasaran tertentu, seperti bayi, orang tua, dan orang yang dirawat di rumah sakit, lebih rentan terhadap pendekatan ini. Manfaat kesehatan yang telah disarankan bervariasi, tetapi juga sangat penting. Selain studi sukarelawan manusia yang baik, kita juga perlu meningkatkan pemahaman mekanistik kita tentang efek kesehatan prebiotik. Diharapkan pendekatan prebiotik untuk pencegahan penyakit akan memiliki dasar yang lebih kuat. Hal ini akan mengarah pada keputusan yang lebih baik oleh dokter, ahli gizi, dan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

- Abriouel, H., C. M. Franz, N. Ben Omar, and A. Galvez. 2011. *Diversity and Applications of Bacillus Bacteriocins*. FEMS Microbiol Rev 35: 201–32.
- Ahire, J.J., Mokashe, N.U., Patil, H.J., and Chaudhari, B.L. (2013). *Antioxidative Potential of Folate Producing Probiotic Lactobacillus Helveticus CD6*. J Food Sci Technol 50, 26–34.
- Arganaraz-Martinez, E., Babot, J.D., Apella, M.C., and Perez, C.A. (2013). *Physiological and functional characteristics of Propionibacterium strains of the poultry microbiota and relevance for the development of probiotic products*. Anaerobe 23, 27–37.
- Asrar, F.M. and O'Connor, D.L. (2005). *Bacterially synthesized folate and supplemental folic acid are absorbed across the large intestine of piglets*. J Nutr Biochem 16, 587–593.
- Bacher, A., Eberhardt, S., Fischer, M. (2000). *Biosynthesis of vitamin B2 (riboflavin)*. Ann Rev Nutr 20, 153–167.
- Bailey, L.B., Rampersaud, G.C., and Kauwell, G.P. (2003). *Folic acid supplements and fortification affect the risk for neural tube defects, vascular disease and cancer: evolving science*. J Nutr 133, 1961S–1968S.
- Baines, M., Kredan, M.B., Usher, J. (2007). *The association of homocysteine and its determinants MTHFR genotype, folate, vitamin B12 and vitamin B6 with bone mineral density in postmenopausal British women*. Bone 40, 730–736.

- Bearson, S.M., Allen, H.K., Bearson, B.L. (2013). *Profiling the gastrointestinal microbiota in response to Salmonella: low versus high Salmonella shedding in the natural porcine host*. *Infect Gen Evol* 16, 330–340. *Lactic Acid Bacteria in Animal Production and Health* 155
- Beecher, C., Daly, M., Berry, D.P. (2009). *Administration of a live culture of Lactococcus lactis DPC 3147 into the bovine mammary gland stimulates the local host immune response, particularly IL-1beta and IL-8 gene expression*. *J Dairy Res* 76, 340–348.
- Begley, M., C. Hill, and R. P. Ross. (2006). *Tolerance of Listeria monocytogenes to cell envelope-acting antimicrobial agents is dependent on SigB*. *Appl Environ Microbiol* 72: 2231–4.
- Bohle, L. A., D. A. Brede, D. B. Diep, H. Holo, and I. F. Nes. (2010). *Specific degradation of the mucus adhesion-promoting protein (MapA) of Lactobacillus reuteri to an antimicrobial peptide*. *Appl Environ Microbiol* 76: 7306–9.
- Bomba, A., Nemcova, R., Gancarcikova, S. (2002). *Improvement of the probiotic effect of microorganisms by their combination with maltodextrins, fructo-oligosaccharides and polyunsaturated fatty acids*. *Brit J Nutr* 88 Suppl 1, S95–S99.
- Bouchard, D.S., Rault, L., Berkova, N. (2013). *Inhibition of Staphylococcus aureus invasion into bovine mammary epithelial cells by contact with live Lactobacillus casei*. *Appl Environ Microbiol* 79, 877–885.
- Bouhnik, Y., Flourie, B., Riottot, M., Bisetti, N., Gailing, M.F., Guibert, A. (1996). *Effects of fructooligosaccharides ingestion on faecal bifidobacteria and selected metabolic indexes of colon carcinogenesis in healthy humans*. *Nutr. Cancer*. 26, 21–29.
- Braem, G., De Vliegher S., Verbist, B. (2012). *Culture-independent exploration of the teat apex microbiota of dairy cows reveals a wide bacterial species diversity*. *Vet Microbiol* 157, 383–390.
- Braem, G., De Vliegher S., Verbist, B. (2013). *Unraveling the microbiota of teat apices of clinically healthy lactating dairy cows, with special emphasis on coagulase-negative staphylococci*. *J Dairy Sci* 96, 1499–1510.
- Brooijmans, R.J.W., de Vos, W.H., and Hugenholtz, J. (2009). *The electron transport chains of Lactobacillus plantarum WCFS1*. *Appl Environ Microbiol* 75, 3580–3585.

- Burgess, C., O'Connell-Motherway, M., Sybesma, W. (2004). *Riboflavin production in Lactococcus lactis: potential for in situ production of vitamin-enriched foods*. Appl Environ Microbiol 70, 5769–5777.
- Burgess, C.M., Smid, E.J., Rutten, G., and van Sinderen D. (2006). *A general method for selection of riboflavin-overproducing food grade microorganisms*. Microb Cell Fact 5, doi:10.1186/1475-2859-5-24.
- Capozzi, V., Menga, V., Digesu. (2011). *Biotechnological production of vitamin B2-enriched bread and pasta*. J Agric Food Chem 59, 8013–8020.
- Chatterjee, C., G. C. Patton, L. Cooper, M. Paul, and W. A. van der Donk. (2006). *Engineering dehydroamino acids and thioethers into peptides using lactacin 481 synthetase*. Chem Biol 13: 1109–17.
- Chatterjee, C., M. Paul, L. Xie, and W. A. van der Donk. (2005). *Biosynthesis and mode of action of lantibiotics*. Chem Rev 105: 633–84.
- Chaucheyras-Durand, F. and Durand, H. (2010). *Probiotics in animal nutrition and health*. Benef Microb 1, 3–9.
- Chen, Y., R. Shapira, M. Eisenstein, and T.J. Montville. (1997). *Functional characterization of pediocin PA-1 binding to liposomes in the absence of a protein receptor and its relationship to a predicted tertiary structure*. Appl Environ Microbiol 63: 524–31.
- Chiquette, J., Allison, M.J., and Rasmussen, M. (2012). *Use of Prevotella bryantii 25A and a commercial probiotic during subacute acidosis challenge in mid lactation dairy cows*. J Dairy Sci 95, 5985–5995.
- Claesson, M.J., van Sinderen, D., and O'Toole, P.W. (2008). *Lactobacillus phylogenomics – towards a reclassification of the genus*. Int J Syst Evol Microbiol 58, 2945–2954.
- Claisse, O. and A. Lonvaud-Funel. (2000). *Assimilation of glycerol by a strain of Lactobacillus collinoides isolated from cider*. Food Microbiol 17: 513–519.
- Cobos, E. S., V. V. Filimonov, A. Galvez, M. Maqueda, E. Valdivia, J. C. Martinez, and P. L. Mateo. (2001). *AS-48: A circular protein with an extremely stable globular structure*. FEBS Lett 505: 379–82.
- Collins, B., S. Joyce, C. Hill, P. D. Cotter, and R. P. Ross. (2010). *TelA contributes to the innate resistance of Listeria monocytogenes to nisin and other cell wall-acting antibiotics*. Antimicrob Agents Chemother 54: 4658–63.

- Corr, S. C., Y. Li, C. U. Riedel, P. W. O'Toole, C. Hill, and C. G. Gahan. (2007). *Bacteriocin production as a mechanism for the antiinfective activity of Lactobacillus salivarius UCC118*. Proc Natl Acad Sci U S A 104: 7617–21.
- Cotter, P. D., C. Hill, and R. P. Ross. (2005). *Bacteriocins: Developing innate immunity for food*. Nat Rev Microbiol 3: 777–88.
- Cousin, F.J., Foligne, B., Deutsch, S.M. (2012). *Assessment of the probiotic potential of a dairy product fermented by Propionibacterium freudenreichii in piglets*. J Agric Food Chem 60, 7917–7927.
- Criado, R., D. B. Diep, A. Aakra, J. Gutierrez, I. F. Nes, P. E. Hernandez, and L. M. Cintas. (2006). *Complete sequence of the enterocin Q-encoding plasmid pCIZ2 from the multiple bacteriocin producer Enterococcus faecium L50 and genetic characterization of enterocin Q production and immunity*. Appl Environ Microbiol 72: 6653–66.
- Crispie, F., Alonso-Gomez, M., O'Loughlin, C. (2008). *Intramammary infusion of a live culture for treatment of bovine mastitis: effect of live lactococci on the mammary immune response*. J Dairy Res 75, 374–384.
- D'Aimmo, M.R., Mattarelli, P., Biavati, B. (2012). *The potential of bifidobacteria as a source of natural folate*. J Appl Microbiol 112, 975–984.
- Datta, V., S. M. Myskowski, L. A. Kwinn, D. N. Chiem, N. Varki, R. G. Kansal, M. Kotb, and V. Nizet. (2005). *Mutational analysis of the group A streptococcal operon encoding streptolysin S and its virulence role in invasive infection*. Mol Microbiol 56: 681–95.
- de Oliveira, J.E., van der Hoeven-Hangoor, E., van de Linde, I.B. (2014). *In ovo inoculation of chicken embryos with probiotic bacteria and its effect on posthatch Salmonella susceptibility*. Poultry Sci 93, 818–829.
- Deeming, D.C. (2005). *Yolk sac, body dimensions and hatchling quality of ducklings, chicks and poults*. Brit Poultry Sci 46, 560–564.
- Dellaglio, F. and Felis G.E. (2005). *Taxonomy of lactobacilli and bifidobacteria*. In: *Probiotics and Prebiotics: Scientific Aspects*. ((ed.) G.W. Tannock), 1st edn, pp. 25–50. Caister Academic Press, Norfolk.
- Delzenne, N.M., Kok, N.N. (1999). *Biochemical basis of oligofructose-induced hypolipidaemia in animal models*. J. Nutr. 129, 1467S–1470S.
- Delzenne, N.M., Williams, C. M. (1999). *Actions of non-digestible carbohydrates on blood lipids in humans and animals*. In *Colonic*

- Microbiota, Nutrition and Health; Gibson, G.R., Roberfroid, M.B., Eds.; Kluwer: Dordrecht, pp 213–231.
- Desnoyers, M., Giger-Reverdin, S., Bertin, G. (2009). *Meta-analysis of the influence of Saccharomyces cerevisiae supplementation on ruminal parameters and milk production of ruminants*. J Dairy Sci 92, 1620–1632.
- Diaz, M., E. Valdivia, M. Martinez-Bueno, M. Fernandez, A. S. Soler-Gonzalez, H. Ramirez-Rodrigo, and M. Maqueda. (2003). *Characterization of a new operon, as-48EFGH, from the as-48 gene cluster involved in immunity to enterocin AS-48*. Appl Environ Microbiol 69:1229–36.
- Diep, D. B., M. Skaugen, Z. Salehian, H. Holo, and I. F. Nes. (2007). *Common mechanisms of target cell recognition and immunity for class II bacteriocins*. Proc Natl Acad Sci U S A 104: 2384–9.
- Dowd, S.E., Callaway, T.R. and Morrow-Tesch, J. (2007). *Handling may cause increased shedding of Escherichia coli and total coliforms in pigs*. Foodborne Path Dis 4, 99–102.
- Draper, L. A., K. Grainger, L. H. Deegan, P. D. Cotter, C. Hill, and R. P. Ross. (2009). *Cross-immunity and immune mimicry as mechanisms of resistance to the lantibiotic lacticin 3147*. Mol Microbiol 71: 1043–54.
- Dufour, A., T. Hindre, D. Haras, and J. P. Le Penne. (2007). *The biology of lantibiotics from the lacticin 481 group is coming of age*. FEMS Microbiol Rev 31: 134–67.
- Durga, J., Verhoef, P., Anteunis, L. J., Schouten, E., and Kok, F. J. (2007). *Effects of folic acid supplementation on hearing in older adults: a randomized, controlled trial*. Ann Int Med 146, 1–9.
- EFSA. (2012). *Guidance for the preparation of dossiers for zootechnical additives*. EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP). European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. EFSA J. 10, 2536.
- Endo, A. and Okada, S. (2008). *Reclassification of the genus Leuconostoc and proposals of Fructobacillus fructosus gen. nov., comb. nov., Fructobacillus durionis comb. nov., Fructobacillus ficulneus comb. nov. and Fructobacillus pseudoficulneus comb. nov.* Int J. Syst Evol Microbiol 58, 2195–2205.
- Escalante-Semerena, J.C. (2007). *Conversion of cobinamide into adenosylcobamide in bacteria and archaea*. J Bacteriol 189, 4555–4560.

- Espeche, M. C., Otero, M. C., Sesma, F., and Nader-Macias, M. E. (2009). *Screening of surface properties and antagonistic substances production by lactic acid bacteria isolated from the mammary gland of healthy and mastitic cows*. *Vet Microbiol* 135, 346–357.
- Espeche, M.C., Pellegrino, M., Frola, I. (2012). *Lactic acid bacteria from raw milk as potentially beneficial strains to prevent bovine mastitis*. *Anaerobe* 18, 103–109.
- Ewaschuk, J.B., Zello, G.A., and Naylor, J.M. (2006). *Lactobacillus GG does not affect D-lactic acidosis in diarrheic calves, in a clinical setting*. *J Vet Int Med* 20, 614–619.
- Ewe, J.A., Wan-Abdullah, W.N., and Liong, M.T. (2010). *Viability and growth characteristics of Lactobacillus in soymilk supplemented with B-vitamins*. *Int J Food Sci Nutr* 61, 87–107.
- Falsen, E., Pascual, C., Sjoed.n, B. (1999). *Phenotypic and phylogenetic characterization of a novel Lactobacillus species from human sources: description of Lactobacillus iners sp. nov.* *Int J. Syst Evol Microbiol* 49, 217–221.
- FAO/WHO. (2001). *Expert Consultation: "Health and Nutritional Properties of Probiotics in Food including Powder Milk with Live Lactic Acid Bacteria"* Cordoba (Argentina).
- Faye, T., D. A. Brede, T. Langsrud, I. F. Nes, and H. Holo. (2004). *Prevalence of the genes encoding propionicin T1 and protease-activated antimicrobial peptide and their expression in classical propionibacteria*. *Appl Environ Microbiol* 70: 2240–4.
- Felis, G.E. and Dellaglio F. (2007). *Taxonomy of lactobacilli and bifidobacteria*. *Curr Issues Intest Microbiol* 8, 44–61.
- Fimland, N., P. Rogne, G. Fimland, J. Nissen-Meyer, and P. E. Kristiansen. (2008). *Three-dimensional structure of the two peptides that constitute the two-peptide bacteriocin plantaricin EF*. *Biochim Biophys Acta* 1784: 1711–9.
- Food and Drug Administration (1996). *Food labeling: health claims and food label statements; folate and neural tube defects*. *Federal Register* 61, 8752–8807.
- Fukase, K., M. Kitazawa, A. Sano, K. Shimbo, H. Fujita, S. Horimoto, T. Wakamiya, and T. Shiba. (1988). *Total synthesis of peptide antibiotic nisin*. *Tetrahed Lett* 29: 795–798.

- Fung, W. Y., Y. P. Woo, W. N. Wan-Abdullah, R. Ahmad, A. M. Easa, and M. T. Liong. (2009). *Benefits of probiotics: Beyond gastrointestinal health*. *Milchwissenschaft* 64: 17–21.
- Gaggia, F., Mattarelli, P., and Biavati, B. (2010). *Probiotics and prebiotics in animal feeding for safe food production*. *Int J. Food Microbiol* 141 Suppl 1, S15–S28.
- Gangadharan, D. and Nampoothiri, K.M. (2011). *Folate production using Lactococcus lactis ssp cremoris with implications for fortification of skim milk and fruit juices*. *LWT - Food Sci Technol* 44, 1859–1864.
- Gänzle, M. G. (2004). *Reutericyclin: Biological activity, mode of action, and potential applications*. *Appl Microbiol Biotechnol* 64: 326–32.
- Garneau, S., C. A. Ference, M. J. van Belkum, M. E. Stiles, and J. C. Vederas. (2003). *Purification and characterization of brochocin A and brochocin B (10-43), a functional fragment generated by heterologous expression in Carnobacterium piscicola*. *Appl Environ Microbiol* 69: 1352–8.
- Ghosh D. and Chattopadhyay P. (2012). *Preparation of idli batter, its properties and nutritional improvement during fermentation*. *J Food Sci Technol* 48, 610–615.
- Gibson, G.R.; Berry Ottaway, P.; Rastall, R.A. 2000. *Prebiotics: New Developments in Functional Foods*. Oxford: Chandos Publishing Limited.
- Gibson, G.R., Roberfroid, M.B. (eds.). 1999. *Colonic Microbiota, Nutrition and Health*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
- Gibson, G.R., Roberfroid, M.B. (1995). *Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics*. *J. Nutr.* 125, 1401–1412. 5.
- Gong, X., L. A. Martin-Visscher, D. Nahirney, J. C. Vederas, and M. Duszyk. (2009). *The circular bacteriocin, carnocyclin A, forms anion-selective channels in lipid bilayers*. *Biochim Biophys Acta. Biomembr* 1788: 1797–803.
- Gravesen, A., B. Kallipolitis, K. Holmstrøm, P. E. Høiby, M. Ramnath, and S. Knöchel. (2004). *pbp2229- mediated nisin resistance mechanism in Listeria monocytogenes confers cross-protection to class IIa bacteriocins and affects virulence gene expression*. *Appl Environ Microbiol* 70: 1669–79.

- Hammes, W.P. and Vogel R.F. (1995). *The genus Lactobacillus*. In: The Genera of Lactic Acid Bacteria ((eds) B.J.B. Wood and W.H. Holzappel), 1st edn, pp. 19–55. Blackie Academic & Professional, Glasgow, UK.
- Hasper, H. E., B. de Kruijff, and E. Breukink. (2004). *Assembly and stability of nisin-Lipid II pores*. *Biochemistry* 43: 11567–75.
- Hasper, H. E., N. E. Kramer, J. L. Smith, J. D. Hillman, C. Zachariah, O. P. Kuipers, B. de Kruijff, and E. Breukink. (2006). *An alternative bactericidal mechanism of action for lantibiotic peptides that target lipid II*. *Science* 313: 1636–7.
- Haugen, H. S., G. Fimland, J. Nissen-Meyer, and P. E. Kristiansen. (2005). *Three-dimensional structure in lipid micelles of the pediocin-like antimicrobial peptide curvacin A*. *Biochemistry* 44: 16149–57.
- Henick-Kling, T. (1993). *Malolactic fermentation*. In: *Wine Microbiology and Biotechnology* ((ed.) G.H. Fleet), 1st edn, pp. 289–326. Amsterdam: Harwood Academic Publisher.
- Hollenbeck B.L. and Rice L.B. (2012). *Intrinsic and acquired resistance mechanisms in Enterococcus*. *Virulence* 3, 421–433.
- Higgins, S.E., Higgins, J.P., Wolfenden, A.D. (2008). *Evaluation of a Lactobacillus-based probiotic culture for the reduction of Salmonella enteritidis in neonatal broiler chicks*. *Poultry Sci* 87, 27–31.
- Höltzel, A., M. G. Gänzle, G. J. Nicholson, W. P. Hammes, and G. Jung. (2000). *The first low molecular weight antibiotic from lactic acid bacteria: Reutericyclin, a new tetramic acid*. *Angew Chem Int Ed Engl* 39: 2766–2768.
- Hugenholtz, J. and Smid, E.J. (2002). *Nutraceutical production with food-grade microorganisms*. *Curr Opin Biotechnol* 13, 497–507.
- Ihara, Y., Hyodo, H., Sukegawa, S. (2013). *Isolation, characterization, and effect of administration in vivo, a novel probiotic strain from pig feces*. *Anim Sci J* 84, 434–441.
- Jami, E., Israel, A., Kotser, A., and Mizrahi, I. (2013). *Exploring the bovine rumen bacterial community from birth to adulthood*. *Int Syst Microbiol Evol J* 7, 1069–1079.
- Jami, E., White, B.A., and Mizrahi, I. (2014). *Potential role of the bovine rumen microbiome in modulating milk composition and feed efficiency*. *PLoS One* 9, e85423.

- Janczyk, P., Pieper, R., Smidt, H., and Souffrant, W. B. (2007). *Changes in the diversity of pig ileal lactobacilli around weaning determined by means of 16S rRNA gene amplification and denaturing gradient gel electrophoresis*. FEMS Microbiol Ecol 61, 132–140.
- Jaskari, J., Kontula, P., Siitonen, A. Jousimies-Somer, H., Mattila-Sandholm, T., Poutanen, K. (1998). *Oat b-glucan and xylan hydrolysates as selective substrates for Bifidobacterium and Lactobacillus strains*. Appl. Microbiol. Biotech. 1998, 49, 175–181. 416.
- Jenssen, H. and R. E. W. Hancock. (2009). *Antimicrobial properties of lactoferrin*. Biochimie 91: 19–29.
- Johnsen, L., G. Fimland, and J. Nissen-Meyer. (2005). *The C-terminal domain of pediocin-like antimicrobial peptides (class IIa bacteriocins) is involved in specific recognition of the C-terminal part of cognate immunity proteins and in determining the antimicrobial spectrum*. J Biol Chem 280: 9243–50.
- Jouany, J.P. (2006). *Optimizing rumen functions in the close-up transition period and early lactation to drive dry matter intake and energy balance in cows*. Anim Reprod Sci 96, 250–264.
- Juarez del Valle, M., Lai.o, J., Savoy de Giori, G., and LeBlanc, J.G. (2014). *Use of lactic acid bacteria as a biotechnological strategy to increase riboflavin levels in soymilk*. Food Res Int 62, 1015–1019.
- Jung, G. (1991). *Lantibiotics: A survey*. In: G. Jung and H.-G. Sahl (ed.), Nisin and Novel Lantibiotics, p. 1–35.
- Jung, H.M., Liu, Q.M., Kim, J.K. (2013). *Lactobacillus ginsenosidimitans sp. nov., isolated from kimchi with the ability to transform ginsenosides*. Antonie van Leeuwenhoek 103, 867–876.
- Kalavathy, R., Abdullah, N., Jalaludin, S., and Ho, Y.W. (2003). *Effects of Lactobacillus cultures on growth performance, abdominal fat deposition, serum lipids and weight of organs of broiler chickens*. Brit Poultry Sci 44, 139–144.
- Kariluoto, S., Edelmann, M., Nystrom, L. (2014). *In situ enrichment of folate by microorganisms in beta-glucan rich oat and barley matrices*. Int J. Food Microbiol 176, 38–48.
- Killian, J. A. and G. von Heijne. (2000). *How proteins adapt to a membrane-water interface*. Trends Biochem Sci 25: 429–34.

- Kim, H.B., Borewicz, K., White, B.A. (2011). *Longitudinal investigation of the age-related bacterial diversity in the feces of commercial pigs*. *Vet Microbiol* 153, 124–133.
- Kim, K.A., Gu, W., Lee, I.A. (2012). *High fat diet-induced gut microbiota exacerbates inflammation and obesity in mice via the TLR4 signaling pathway*. *PLoS One* 7, e47713.
- Kjos, M., I. F. Nes, and D. B. Diep. (2009). *Class II one-peptide bacteriocins target a phylogenetically defined subgroup of mannose phosphotransferase systems on sensitive cells*. *Microbiology* 155: 2949–61.
- Kleerebezem, M., M. M. Beerthuyzen, E. E. Vaughan, W. M. de Vos, and O. P. Kuipers. (1997). *Controlled gene expression systems for lactic acid bacteria: Transferable nisin-inducible expression cassettes for Lactococcus, Leuconostoc, and Lactobacillus spp.* *Appl Environ Microbiol* 63:4581–4.
- Kleessen, B.; Sykura, B.; Zunft, H-J.; Blaut, M. (1997). *Effects of inulin and lactose on fecal microflora, microbial activity and bowel habit in elderly constipated persons*. *Am. J. Clin. Nutr.* 65, 1397–1402.
- Klostermann, K., Crispie, F., Flynn, J. (2008). *Intramammary infusion of a live culture of Lactococcus lactis for treatment of bovine mastitis: comparison with antibiotic treatment in field trials*. *J Dairy Res* 75, 365–373.
- Koenen, M.E., Kramer, J., van der Hulst R. (2004). *Immunomodulation by probiotic lactobacilli in layer- and meat-type chickens*. *Brit Poultry Sci* 45, 355–366.
- Konings, E.J., Roomans, H.H., Dorant, E., Goldbohm, R.A. (2001). *Folate intake of the Dutch population according to newly established liquid chromatography data for foods*. *Am J Clin Nutr* 73, 765–776.
- Konstantinidis, K.T. and Tiedje, J.M. (2005). *Towards a genome-based taxonomy for prokaryotes*. *J Bacteriol* 187, 6258–6264.
- Konstantinov, S.R., Smidt, H., Akkermans, A.D. (2008). *Feeding of Lactobacillus sobrius reduces Escherichia coli F4 levels in the gut and promotes growth of infected piglets*. *FEMS Microbiol Ecol* 66, 599–607.
- Kreuzer, S., Janczyk, P., Assmus, J. (2012). *No beneficial effects evident for Enterococcus faecium NCIMB 10415 in weaned pigs infected with Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104*. *Appl Environ Microbiol* 78, 4816–4825.
- Kritas, S. K., Govaris, A., Christodoulopoulos, G., and Burriel, A.R. (2006). *Effect of Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis*

- supplementation of ewe's feed on sheep milk production and young lamb mortality.* J Vet Med A 53, 170–173.
- Lai.o, J.E., Juarez del Valle, M., Savoy de Giori, G. and LeBlanc J. G. (2014). *Applicability of a Lactobacillus amylovorus strain as co-culture for natural folate bio-enrichment of fermented milk.* Int J. Food Microb 191, 10–16.
- Lai.o, J.E., LeBlanc, J.G., and Savoy de Giori, G. (2012). *Production of natural folates by lactic acid bacteria starter cultures isolated from artisanal Argentinean yogurts.* Can J Microbiol 58, 581–588.
- LeBlanc, J.G., Lai.o, J.E., Juarez del Valle. (2011). *B-group vitamin production by lactic acid bacteria - Current knowledge and potential applications.* J Appl Microbiol 111, 1297–309.
- LeBlanc, J.G., Milani, C., Savoy de Giori, G. (2013). *Bacteria as vitamin suppliers to their host: a gut microbiota perspective.* Cur Opin Biotechnol 24, 160–168.
- LeBlanc, J.G., Sybesma, W., Starrenburg, M. (2010). *Supplementation with engineered Lactococcus lactis improves the folate status in deficient rats.* Nutrition 26, 835–41.
- LeBlanc, J.G., Taranto, M.P., Molina, V., and Sesma, F. (2010). *B-group vitamins production by probiotic lactic acid bacteria.* In: Biotechnology of Lactic Acid Bacteria: Novel Applications ((eds) F. Mozzi, R. Raya, and G. Vignolo), Wiley-Blackwell, Ames, IA, USA, pp. 211–232.
- LeBlanc, J.G., Van Sinderen, D., Hugenholtz, J. (2010). *Risk assessment of genetically modified lactic acid bacteria using the concept of substantial equivalence.* Cur Microbiol 61, 590–595.
- Lee, H.J., Jung, J.Y., Oh, (2012). *Comparative survey of rumen microbial communities and metabolites across one caprine and three bovine groups, using bar-coded pyrosequencing and (1) H nuclear magnetic resonance spectroscopy.* Appl Environ Microbiol 78, 5983–5993.
- Lesmeister, K.E., Heinrichs, A.J., and Gabler, M.T. (2004). *Effects of supplemental yeast (Saccharomyces cerevisiae) culture on rumen development, growth characteristics, and blood parameters in neonatal dairy calves.* J Dairy Sci 87, 1832–1839.
- Lettat, A., Noziere, P., Silberberg, M. (2012). *Rumen microbial and fermentation characteristics are affected differently by bacterial probiotic supplementation during induced lactic and subacute acidosis in sheep.* BMC Microbiol 12, 142.

- Li, R.W., Connor, E.E., Li, C. (2012). *Characterization of the rumen microbiota of pre-ruminant calves using metagenomic tools*. Environ Microbiol 14, 129–139.
- Limonet, M., C. Cailliez-Grimal, M. Linder, A. M. Revol-Junelles, and J. B. Milliere. (2004). *Cell envelope analysis of insensitive, susceptible or resistant strains of Leuconostoc and Weissella genus to Leuconostoc mesenteroides FR 52 bacteriocins*. FEMS Microb Lett 241: 49–55.
- Lindgren, S. E. and W. J. Dobrogosz. (1990). *Antagonistic activities of lactic acid bacteria in food and feed fermentations*. FEMS Microb Rev 7(1–2): 149–63.
- Luchsinger, J.A., Tang, M.X., Miller, J. (2007). *Relation of higher folate intake to lower risk of Alzheimer disease in the elderly*. Arch Neurol 64, 86–92.
- Lucock, M. and Yates, Z. (2005). *Folic acid - vitamin and panacea or genetic time bomb?* Nature Rev Gen 6, 235–240.
- Luders, T., G. A. Birkemo, J. Nissen-Meyer, O. Andersen, and I. F. Nes. (2005). *Proline conformation-dependent antimicrobial activity of a proline-rich histone h1 N-terminal peptide fragment isolated from the skin mucus of Atlantic salmon*. Antimicrob Agents Chemother 49: 2399–406.
- Ludwig, W., Schleifer, K.H., and Whitman, W.B. (2009). *Revised Road map to the phylum Firmicutes*. In: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology ((eds) P. De Vos, G.M. Garrity, D. Jones, N.R. Krieg, W. Ludwig, F.A. Rainey.
- Lun, S. and P.J. Willson. (2005). *Putative mannose-specific phosphotransferase system component IID represses expression of suilysin in serotype 2 Streptococcus suis*. Vet Microb 105: 169–80.
- Lux, T., M. Nuhn, R. Hakenbeck, and P. Reichmann. (2007). *Diversity of bacteriocins and activity spectrum in Streptococcus pneumoniae*. J Bacteriol 189: 7741–51.
- Makarova, K., Slesarev, A., Wolf, Y. (2006). *Comparative genomics of the lactic acid bacteria*. Proc Natl Acad Sci USA 103, 15611–15616.
- Makarova, K.S. and Koonin, E.V. (2007). *Evolutionary genomics of lactic acid bacteria*. J Bacteriol 189, 1199–1208.
- Maldonado-Barragán, A., B. Caballero-Guerrero, E. Jiménez, R. Jiménez-Díaz, J. L. Ruiz-Barba, and J. M. Rodríguez. (2009). *Enterocin C, a*

- class IIb bacteriocin produced by *E. faecalis* C901, a strain isolated from human colostrum. *Int J Food Microbiol* 133: 105–112.
- Man, Z.W., Rao, Z.M., Cheng, Y.P. (2014). *Enhanced riboflavin production by recombinant Bacillus subtilis RF1 through the optimization of agitation speed*. *World J Microbiol Biotechnol* 30, 661–667.
- Maqueda, M., M. Sanchez-Hidalgo, M. Fernandez, M. Montalban-Lopez, E. Valdivia, and M. Martinez-Bueno. (2008). *Genetic features of circular bacteriocins produced by Gram-positive bacteria*. *FEMS Microbiol Rev* 32: 2–22.
- Martens, J.H., Barg, H., Warren, M.J., and Jahn, D. (2002). *Microbial production of vitamin B12*. *Appl Microbiol Biotechnol* 58, 275–285.
- Marti, R., Dabert, P., Ziebal, C., and Pourcher, A. M. (2010). *Evaluation of Lactobacillus sobrius/L. amylovorus as a new microbial marker of pig manure*. *Appl Environ Microbiol* 76, 1456–1461.
- Martin-Platero, A. M., E. Valdivia, M. Ruiz-Rodriguez, J. J. Soler, M. Martin-Vivaldi, M. Maqueda, and M. Martinez-Bueno. (2006). *Characterization of antimicrobial substances produced by Enterococcus faecalis MRR 10-3, isolated from the uropygial gland of the hoopoe (Upupa epops)*. *Appl Environ Microbiol* 72: 4245–9.
- Martin-Visscher, L. A., T. Sprules, L. J. Gursky, and J. C. Vederas. (2008). *Nuclear magnetic resonance solution structure of Pisl, a group B immunity protein that provides protection against the type IIa bacteriocin piscicolin 126, PisA*. *Biochemistry* 47: 6427–36.
- Martin, N. I., T. Sprules, M. R. Carpenter, P. D. Cotter, C. Hill, R. P. Ross, and J. C. Vederas. (2004). *Structural characterization of lacticin 3147, a two-peptide lantibiotic with synergistic activity*. *Biochemistry* 43: 3049–56.
- Martin, R., M. Olivares, M. L. Marin, J. Xaus, L. Fernandez, and J. M. Rodriguez. (2005). *Characterization of a reuterin-producing Lactobacillus coryniformis strain isolated from a goat's milk cheese*. *Int J Food Microbiol* 104: 267–77.
- Martin, R., Olivares, M., Marin, M.L. (2005). *Characterization of a reuterin-producing Lactobacillus coryniformis strain isolated from a goat's milk cheese*. *Int J Food Microbiol* 104, 267–277.
- Martinez, B., T. Bottiger, T. Schneider, A. Rodriguez, H. G. Sahl, and I. Wiedemann. (2008). *Specific interaction of the unmodified bacteriocin*

- Lactococcin 972 with the cell wall precursor lipid II*. Appl Environ Microbiol 74: 4666–70.
- Masuda, M., Ide, M., Utsumi, H. (2012). *Production potency of folate, vitamin B (12), and thiamine by lactic acid bacteria isolated from Japanese pickles*. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 76, 2061–2067.
- Mattarelli, P., Holzappel, W., Franz, M.A.P.C. (2014). *Recommended minimal standards for description of new taxa of the genera Bifidobacterium, Lactobacillus and related genera*. Int J Syst Evol Microbiol 64, 1434–1451.
- Mera, P.E. and Escalante-Semerena, J.C. (2012). *Multiple roles of ATP:cob(I)alamin adenosyltransferases in the conversion of B12 to coenzyme B12*. Appl Microbiol Biotechnol 88, 41–48.
- Mikulski, D., Jankowski, J., Naczmanski, J. (2012). *Effects of dietary probiotic (Pediococcus acidilactici) supplementation on performance, nutrient digestibility, egg traits, egg yolk cholesterol, and fatty acid profile in laying hens*. Poultry Sci 91, 2691–2700.
- Mitsuoka, T. (1990). *Bifidobacteria and their role in human health*. J. Indust. Microbiol. 6, 263–268.
- Modesto, M., D’Aimmo, M.R., Stefanini, I. (2009). *A novel strategy to select Bifidobacterium strains and prebiotics as natural growth promoters in newly weaned pigs*. Livestock Sci 122, 248–258.
- Molina, V., Medici, M., Font de Valdez, G., and Taranto, M.P. (2013). *Soybean-based functional food with vitamin B12-producing lactic acid bacteria*. J Funct Food 4, 831–836.
- Molina, V., Medici, M., Taranto, M.P. and Font de Valdez, G. (2009). *Lactobacillus reuteri CRL 1098 prevents side effects produced by a nutritional vitamin B12 deficiency*. J Appl Microbiol 106, 467–473.
- Moll, G. N., E. van den Akker, H. H. Hauge, J. Nissen-Meyer, I. F. Nes, W. N. Konings, and A. J. Driessen. (1999). *Complementary and overlapping selectivity of the two-peptide bacteriocins plantaricin EF and JK*. J Bacteriol 181: 4848–52.
- Morgavi, D.P., Forano, E., Martin, C. and Newbold, C.J. (2010). *Microbial ecosystem and methanogenesis in ruminants*.
- Morgavi, D.P., Kelly, W.J., Janssen, P.H. and Attwood, G.T. (2013). *Rumen microbial (meta)genomics and its application to ruminant production*. Animal 7 Suppl 1, 184–201.

- Morita, H., H. Toh, S. Fukuda, H. Horikawa, K. Oshima, T. Suzuki, M. Murakami, S. Hisamatsu, Y. Kato, T. Takizawa, H. Fukuoka, T. Yoshimura, K. Itoh, D. J. O'Sullivan, L. L. McKay, H. Ohno, J. Kikuchi, T. Masaoka, and M. Hattori. (2008). *Comparative genome analysis of Lactobacillus reuteri and Lactobacillus fermentum reveal a genomic island for reuterin and cobalamin production*. DNA Res 15: 151–61.
- Morita, H., Toh, H., Fukuda, S. (2008). *Comparative genome analysis of Lactobacillus reuteri and Lactobacillus fermentum reveal a genomic island for reuterin and cobalamin production*. DNA Res 15, 151–161.
- Morris, M.C. and Tangney, C.C. (2007). *Is dietary intake of folate too low?* Lancet 369, 166–167.
- Naghmouchi, K., E. Kheadr, C. Lacroix, and I. Fliss. (2007). *Class I/Class IIa bacteriocin cross-resistance phenomenon in Listeria monocytogenes*. Food Microbiol 24: 718–27.
- Nemcova, R., Bomba, A., Gancarcikova, S. (2007). *Effects of the administration of lactobacilli, maltodextrins and fructooligosaccharides upon the adhesion of E. coli O8: K88 to the intestinal mucosa and organic acid levels in the gut contents of piglets*. Vet Res Communic 31, 791–800.
- Nissen-Meyer, J., P. Rogne, C. Oppegard, H. S. Haugen, and P. E. Kristiansen. (2009). *Structure-function relationships of the non-lanthionine-containing peptide (class II) bacteriocins produced by gram-positive bacteria*. Curr Pharm Biotechnol 10: 19–37.
- Nizet, V., B. Beall, D. J. Bast, V. Datta, L. Kilburn, D. E. Low, and J. C. De Azavedo. (2000). *Genetic locus for streptolysin S production by group A streptococcus*. Infect Immun 68: 4245–54.
- Oikonomou, G., Bicalho, M.L., Meira, E. (2014). *Microbiota of cow's milk; distinguishing healthy, sub-clinically and clinically diseased quarters*. PLoS One. 9, e85904.
- Okuda, K., S. Yanagihara, T. Sugayama, T. Zendo, J. Nakayama, and K. Sonomoto. (2010). *Functional significance of the E loop, a novel motif conserved in the lantibiotic immunity ATP-binding cassette transport systems*. J Bacteriol 192: 2801–8.
- Olano-Martin, E.; Mountzouris, K.C.; Gibson, G.R.; Rastall, R.A. (2001). *Continuous production of oligosaccharides from pectin in an enzyme membrane reactor*. J. Food Sci. 66 (7), 966–971.

- Omoniyi, L.A., Jewell, K.A., Isah, O. A. (2014). *An analysis of the ruminal bacterial microbiota in West African Dwarf sheep fed grass- and tree-based diets*. J Appl Microbiol 116, 1094–1105.
- Oppgaard, C., J. Schmidt, P. E. Kristiansen, and J. Nissen-Meyer. (2008). *Mutational analysis of putative helixhelix interacting GxxxG-motifs and tryptophan residues in the two-peptide bacteriocin lactococcin G*. Biochemistry 47: 5242–9.
- Opsata, M., I. F. Nes, and H. Holo. (2010). *Class Iia bacteriocin resistance in Enterococcus faecalis V583: The mannose PTS operon mediates global transcriptional responses*. BMC Microbiol 10: 224.
- Otero, M.C. and Nader-Macias, M.E. (2006). *Inhibition of Staphylococcus aureus by H2O2-producing Lactobacillus gasseri isolated from the vaginal tract of cattle*. Anim Reprod Sci 96, 35–46.
- Otero, M.C., Morelli, L., and Nader-Macias, M.E. (2006). *Probiotic properties of vaginal lactic acid bacteria to prevent metritis in cattle*. Let Appl Microbiol 43, 91–97.
- Ouwehand, A. C., S. Salminen, and E. Isolauri. (2002). *Probiotics: An overview of beneficial effects*. Antonie van Leeuwenhoek 82: 279–89.
- Panda, A.K., Reddy, M.R., Rama Rao, S.V., and Praharaj, N.K. (2003). *Production performance, serum/yolk cholesterol and immune competence of white leghorn layers as influenced by dietary supplementation with probiotic*. Trop Anim Health Produc 35, 85–94.
- Pereira, E.M., Shuenck, R.P., Malvar, K.L. (2010). *Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus haemolyticus: methicillin-resistant isolates are detected directly in blood cultures by multiplex PCR*. Microbiol Res 165, 243–249.
- Perkins, J.B. and Pero, J. (2002). *Vitamin biosynthesis*. In: *Bacillus subtilis and its Closest Relatives from Genes to Cells*, ((eds) A. Sonenshein, J. Hoch, and R. Losick), ASM Press, Washington, D.C., pp. 271–286.
- Pieterse, R. and S. D. Todorov. (2010). *Bacteriocins—Exploring alternatives to antibiotics in mastitis treatment*. Braz J Microbiol 41: 542–62.
- Piper, C., P. D. Cotter, R. P. Ross, and C. Hill. (2009). *Discovery of medically significant lantibiotics*. Curr Drug Discov Technol 6: 1–18.
- Pompei, A., Cordisco, L., Amaretti, A. (2007). *Folate production by bifidobacteria as a potential probiotic property*. Appl Environ Microbiol 73, 179–185.

- Putman, J. and Allshouse, J. (2003). *Trends in U.S. per capita consumption of dairy products, 1909 to 2001: United States Department of Agriculture Economic Research Service.*
- Qi, F., P. Chen, and P. W. Caufield. (1999). *Functional analyses of the promoters in the lantibiotic mutacin II biosynthetic locus in Streptococcus mutans.* Appl Environ Microbiol 65: 652–8.
- Rawlinson, E. L., I. F. Nes, and M. Skaugen. (2002). *LasX, a transcriptional regulator of the lactocin S biosynthetic genes in Lactobacillus sakei L45, acts both as an activator and a repressor.* Biochimie 84: 559–67.
- Rawlinson, E. L., I. F. Nes, and M. Skaugen. (2005). *Identification of the DNA-binding site of the Rgg-like regulator LasX within the lactocin S promoter region.* Microbiology 151: 813–23.
- Rea, M. C., C. S. Sit, E. Clayton, P. M. O'Connor, R. M. Whittal, J. Zheng, J. C. Vederas, R. P. Ross, and C. Hill. (2010). *Thuricin CD, a posttranslationally modified bacteriocin with a narrow spectrum of activity against Clostridium difficile.* Proc Natl Acad Sci U S A 107: 9352–7.
- Risoen, P. A., M. B. Brurberg, V. G. Eijsink, and I. F. Nes. (2000). *Functional analysis of promoters involved in quorum sensing-based regulation of bacteriocin production in Lactobacillus.* Mol Microbiol 37: 619–28.
- Risoen, P. A., O. Johnsborg, D. B. Diep, L. Hamoen, G. Venema, and I. F. Nes. (2001). *Regulation of bacteriocin production in Lactobacillus plantarum depends on a conserved promoter arrangement with consensus binding sequence.* Mol Genet Genomics 265: 198–206.
- Rodionov, D.A., Vitreschak, A.G., Mironov, A.A., and Gelfand, M.S. (2003). *Comparative genomics of the vitamin B12 metabolism and regulation in prokaryotes.* J Biol Chem 278, 41148–41159.
- Rogne, P., G. Fimland, J. Nissen-Meyer, and P. E. Kristiansen. (2008). *Three-dimensional structure of the two peptides that constitute the two-peptide bacteriocin lactococcin G.* Biochim Biophys Acta 1784: 543–54.
- Ronimus, R.S. and Morgan, H.W. (2001). *The biochemical properties and phylogenies of phosphofructokinases from extremophiles.* Extremophiles 5, 357–373.
- Ross, A. C., H. Liu, V. R. Pattabiraman, and J. C. Vederas. (2010). *Synthesis of the lantibiotic lactocin S using peptide cyclizations on solid phase.* J Am Chem Soc 132: 462–3.

- Rossi, M., Amaretti, A., and Raimondi, S. (2011). *Folate production by probiotic bacteria*. *Nutrients* 3, 118–34.
- Roth, J.R., Lawrence, J.G., and Bobik, T.A. (1996). *Cobalamin (coenzyme B12): synthesis and biological significance*. *Ann Rev Microbiol* 50, 137–181.
- Rucker, R.B., Suttie, J.W., McCormick, D.B., and Machlin, L.T. (2001). *Handbook of Vitamins*. Marcel Dekker Inc., New York.
- Russo, P., Capozzi, V., Arena, M.P. (2014). *Riboflavin-overproducing strains of Lactobacillus fermentum for riboflavin-enriched bread*. *Appl Microbiol Biotechnol* 98, 3691–3700.
- Rycroft, C.E.; Jones, M.R.; Gibson, G.R.; Rastall, R.A. (2001). *A comparative in vitro evaluation of the fermentation properties of prebiotic oligosaccharides*. *J. Appl. Microbiol.* 91 (5), 878–887.
- Said, H.M. and Mohammed, Z.M. (2006). *Intestinal absorption of water soluble vitamins: an update*. *Curr Opin Gastroenterol* 22, 140–146.
- Salveti, E., Torriani, S., and Felis, G.E. (2012). *The genus Lactobacillus: a taxonomic update*. *Probiotics Antimicrob Prot* 4, 217–226.
- Salveti, S., Fondi, M., Fani, R. (2013). *Evolution of lactic acid bacteria in the order Lactobacillales as depicted by analysis of glycolysis and pentose phosphate pathways*. *Syst Appl Microbiol* 36, 291–305.
- Sanchez-Barrena, M. J., M. Martinez-Ripoll, A. Galvez, E. Valdivia, M. Maqueda, V. Cruz, and A. Albert. (2003). *Structure of bacteriocin AS-48: From soluble state to membrane bound state*. *J Mol Biol* 334: 541–549.
- Sanders, M.A. (1998). *Overview of functional foods: emphasis on probiotic bacteria*. *Int. Dairy J.* 8, 341–347.
- Santos, F., Vera, J.L., Lamosa, P. (2007). *Pseudovitamin B (12) is the corrinoid produced by Lactobacillus reuteri CRL1098 under anaerobic conditions*. *FEBS Lett* 581, 4865–4870.
- Santos, F., Vera, J.L., van der Heijden, R. (2008). *The complete coenzyme B12 biosynthesis gene cluster of Lactobacillus reuteri CRL1098*. *Microbiology* 154, 81–93.
- Santos, T.M. and Bicalho, R.C. (2012). *Diversity and succession of bacterial communities in the uterine fluid of postpartum metritic, endometritic and healthy dairy cows*. *PLoS One* 7, e53048.

- Schiffrin, E.J., Rochat, F., Link-Amster, H., Aeschlimann, J.M., Donnet-Hughes, (1995). *A. Immune system stimulation by probiotics*. J. Dairy Sci. 78, 1597–1606.
- Schneitz C. (2005). *Competitive exclusion in poultry—30 years of research*. Food Control 16, 657–667.
- Schnürer, J. and J. Magnusson. (2005). *Antifungal lactic acid bacteria as biopreservatives*. Trends Food Sci Technol 16: 70–8.
- Schoterman, H.C., Timmermans, H.J.A.R. (2000). *Galacto-oligosaccharides*. In Prebiotics and Probiotics; Gibson, G.R., Angus, F., Eds.; Leatherhead Food RA Publishing, Leatherhead, UK, pp 19–46.
- Sekelja, M., Rud, I., Knutsen, S.H., et al. (2012). *Abrupt temporal fluctuations in the chicken fecal microbiota are explained by its gastrointestinal origin*. Appl Environ Microbiol 78, 2941–2948.
- Sherwood, K.L., Houghton, L.A., Tarasuk, V., and O’Connor, D.L. (2006). *One-third of pregnant and lactating women may not be meeting their folate requirements from diet alone based on mandated levels of folic acid fortification*. J Nutr 136, 2820–2826.
- Siggers, R.H., Siggers, J., Boye, M., et al. (2008). *Early administration of probiotics alters bacterial colonization and limits diet-induced gut dysfunction and severity of necrotizing enterocolitis in preterm pigs*. J Nutr 138, 1437–1444.
- Signorini, M.L., Soto, L.P., Zbrun, M.V. (2012). *Impact of probiotic administration on the health and fecal microbiota of young calves: a meta-analysis of randomized controlled trials of lactic acid bacteria*. Res Vet Sci 93, 250–258.
- Silberberg, M., Chaucheyras-Durand, F, Commun, L. (2013). *Repeated acidosis challenges and live yeast supplementation shape rumen microbiota and fermentations and modulate inflammatory status in sheep*. Animal 7, 1910–1920.
- Sjogren, J., J. Magnusson, A. Broberg, J. Schnurer, and L. Kenne. (2003). *Antifungal 3-hydroxy fatty acids from Lactobacillus plantarum MiLAB 14*. Appl Environ Microbiol 69: 7554–7557.
- Smith, A.G., Croft, M.T., Moulin, M., and Webb, M.E. (2007). *Plants need their vitamins too*. Cur Opin Plant Biol 10, 266–275.
- Sriramulu, D. D., M. Liang, D. Hernandez-Romero, E. Raux-Deery, H. Lunsdorf, J. B. Parsons, M. J. Warren, and M. B. Prentice.

- (2008). *Lactobacillus reuteri* DSM 20016 produces cobalamin-dependent diol dehydratase in metabolosomes and metabolizes 1,2-propanediol by disproportionation. *J Bacteriol* 190: 4559–67.
- Stanley, D., Geier, M.S., Denman, S.E., et al. (2013). Identification of chicken intestinal microbiota correlated with the efficiency of energy extraction from feed. *Vet Microbiol* 164, 85–92.
- Stanley, D., Hughes, R.J., and Moore, R.J. (2014). Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease. *Appl Microbiol Biotechnol* 98, 4301–4310.
- Strom, K., J. Sjogren, A. Broberg, and J. Schnurer. (2002). *Lactobacillus plantarum* MiLAB 393 produces the antifungal cyclic dipeptides cyclo(*l*-Phe-*l*-Pro) and cyclo(*l*-Phe-*trans*-4-OH-*l*-Pro) and 3-phenyllactic acid. *Appl Environ Microbiol* 68: 4322–7.
- Sukegawa, S., Ihara, Y., Yuge, K., et al. (2014). Effects of oral administration of heat-killed *Enterococcus faecium* strain NHRD IHARA in post-weaning piglets. *Anim Sci J* 85, 454–460.
- Svensson, U. *Industrial perspectives*. In *Probiotics: A Critical Review*; Tannock, G., Ed.; Horizon Scientific Press: Wymondham, 1999; 57–64.
- Sweeney, M.R., McPartlin, J., and Scott, J. (2007). Folic acid fortification and public health: report on threshold doses above which unmetabolised folic acid appear in serum. *BMC Public Health* 7, 41–47.
- Sybesma, W., Starrenburg, M., Kleerebezem, M., et al. (2003). Increased production of folate by metabolic engineering of *Lactococcus lactis*. *Appl Environ Microbiol* 69, 3069–3076.
- Taranto, M.P., Vera, J.L., Hugenholtz, J., et al. (2003). *Lactobacillus reuteri* CRL1098 produces cobalamin. *J Bacteriol* 185, 5643–5647.
- Techer, C., Baron, F., Delbrassinne, L., et al. (2014). Global overview of the risk linked to the *Bacillus cereus* group in the egg product industry: identification of food safety and food spoilage markers. *J Appl Microbiol* 116, 1344–1358.
- Teuber M. (1995). *The genus Lactococcus*. In: *The Genera of Lactic Acid Bacteria* ((eds) B.J.B. Wood and W.H. Holzappel), 1st edn, pp. 173–175. Blackie Academic & Professional, Glasgow, UK.

- Tjonneland, A., Christensen, J., Olsen, A., et al. (2006). *Folate intake, alcohol and risk of breast cancer among postmenopausal women in Denmark*. Eur J Clin Nutr 60, 280–286.
- Twomey, D. P., A. I. Wheelock, J. Flynn, W. J. Meaney, C. Hill, and R. P. Ross. (2000). *Protection against Staphylococcus aureus mastitis in dairy cows using a bismuth-based teat seal containing the bacteriocin, lacticin 3147*. J Dairy Sci 83: 1981–8.
- Vadyvaloo, V., S. Arous, A. Gravesen, Y. Hechard, R. Chauhan-Haubrock, J. W. Hastings, and M. Rautenbach. (2004). *Cell-surface alterations in class IIa bacteriocin-resistant Listeria monocytogenes strains*. Microbiology 150: 3025–33.
- van Belkum, M. J., B. J. Hayema, R. E. Jeeninga, J. Kok, and G. Venema. (1991). *Organization and nucleotide sequences of two lactococcal bacteriocin operons*. Appl Environ Microbiol 57 (2): 492–8.
- van den Heuvel, E.; Muys, T.; van Dokkum, W.; Schaafsma, G. *Oligofructose stimulates calcium absorption in adolescents*. Am. J. Clin. Nutr. 1999, 69, 544–548.
- Van Guelpen, B., Hultdin, J., Johansson, I., et al. (2006). *Low folate levels may protect against colorectal cancer*. Gut 55, 1461–1466.
- Vandamme, P., Pot, B., Gillis, M., et al. (1996). *Polyphasic taxonomy, a consensus approach to bacterial systematics*. Microbiol Rev 60, 407–438.
- Vannini, V., Rodriguez, A., Vera, J.L., et al. (2011). *Cloning and heterologous expression of Lactobacillus reuteri uroporphyrinogen III synthase/methyltransferase gene (cobA/hemD): preliminary characterization*. Biotechnol Lett. 33, 1625–1632.
- Ventura, M., Canchaya, C., Fitzgerald, G.F., et al. (2007). *Genomics as a means to understand bacterial phylogeny and ecological adaptation: the case of bifidobacteria*. Antonie Van Leeuwenhoek 91, 351–72.
- Vera, J.L. (2007). *Biosintesis de cobalamina en Lactobacillus reuteri CRL 1098: Universidad Nacional de Tucumin (Argentina)*.
- Verwei, M., Arkbage, K., Havenaar, R., et al. (2003). *Folic acid and 5-methyltetrahydrofolate in fortified milk are bioaccessible as determined in a dynamic in vitro gastrointestinal model*. J Nutr 133, 2377–2383.
- Wang, X.; Gibson, G.R. *Effects of the in vitro fermentation of oligofructose and inulin by bacteria growing in the human large intestine*. J. Appl. Bacteriol. 1993, 75, 373–380.

- Wang, Y., Ametaj, B.N., Ambrose, D.J., and Ganzle, M.G. (2013). *Characterisation of the bacterial microbiota of the vagina of dairy cows and isolation of pediocin-producing *Pediococcus acidilactici**. BMC Microbiol 13, 19.
- Wegkamp, A., van Oorschot, W., de Vos, W.M. and Smid, E.J. (2007). *Characterization of the role of para-aminobenzoic acid biosynthesis in folate production by *Lactococcus lactis**. Appl Environ Microbiol 73, 2673–2681.
- Wei, S., Morrison, M., and Yu, Z. (2013). *Bacterial census of poultry intestinal microbiome*. Poultry Sci 92, 671–683.
- Williams, C.M. *Effects of inulin on lipid parameters in humans*. J. Nutr. 1999, 129, 1471S–1473S.
- Xie, L., L. M. Miller, C. Chatterjee, O. Averin, N. L. Kelleher, and W. A. van der Donk. 2004. *Lacticin 481: In vitro reconstitution of lantibiotic synthetase activity*. Science 303: 679–81.
- Zhang, C. and Zhang, W. (2010). *Escherichia coli K88ac fimbriae expressing heat-labile and heat-stable (STa) toxin epitopes elicit antibodies that neutralize cholera toxin and STa toxin and inhibit adherence of K88ac fimbrial E. coli*. Clin Vaccine Immunol 17, 1859–1867.
- Zhou, X., Ye, L., and Wu, J.C. (2013). *Efficient production of L-lactic acid by newly isolated thermophilic *Bacillus coagulans* WCP10-4 with high glucose tolerance*. Appl Microbiol Biotechnol 97, 4309–4314.

BIOGRAFI PENULIS



Fatmawati Nur. Putri bungsu pasangan berdarah Bugis yang lahir pada tanggal 3 Februari 1972 di Watampone. Penulis menekuni ilmu murni biologi pada jenjang S1 di Fakultas MIPA Jurusan Biologi Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis melanjutkan studi sebagai terapan bidang biologi, yaitu program S2 prodi Teknologi Lingkungan dengan aplikasi mikroba dalam pengolahan lingkungan sebagai konsentrasi yang dipilih, dan memperoleh gelar

Magister pada tahun 2003. Pada tahun 2004, mulai mengabdikan diri sebagai dosen tetap PNS yang ber-*homebase* pada prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Pada tahun 2005, diamanahkan untuk mengawal keterlaksanaan tridarma perguruan tinggi sebagai ketua jurusan hingga tahun 2013. Pada tahun 2017, menyelesaikan studi program doktor pada prodi Ilmu Kedokteran dengan konsisten menekuni kajian bakteriologi sesuai bidang ilmu yang diamanahkan pada prodi Biologi FST UIN Alauddin Makassar. Selain melaksanakan darma pendidikan, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas prodi Biologi, khususnya spesifitas bidang ilmu yang dialami. Hasil-hasil penelitian, telah didesiminasikan sebagai artikel jurnal ilmiah dan beberapa buku teks, baik yang berskala nasional maupun internasional dapat diakses pada akun *google scholar* <https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&pli=1&user=p7jjhMAAAAJ>.

Eksotisme **BAKTERI ASAM LAKTAT**

Buku ini merupakan respons atas ledakan temuan baru tentang Bakteri Asam Laktat (BAL) dari masa ke masa. Wawasan yang muncul dari studi dasar ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai inovasi yang mengarah pada pemanfaatan BAL dalam ragam aplikasi selain sekadar fermentasi makanan klasik, namun termasuk nilai eksotik BAL lainnya pada berbagai aspek kehidupan.

Melalui buku ini, Penulis memberikan pemaparan yang komprehensif mengenai bakteri asam laktat. Pembahasan diawali dengan materi mengenai taksonomi, metabolisme, dan biologi molekuler BAL. Kemudian, dibahas mengenai komponen anti mikroba dari bakteri asam laktat, produksi vitamin oleh bakteri asam laktat, bakteri asam laktat dan imunitas manusia, bakteri asam laktat bagi kesehatan dan produktivitas hewan, dan juga dibahas mengenai probiotik dan prebiotik.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id



Alauddin University Press

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI



9 786233 725125