

Ulfa Triyani • Hafsan

Mengungkap Misteri

(Interaksi antara Mikroba dan Tanaman)



MENGUNGKAP MISTERI

INTERAKSI ANTARA MIKROBA DAN TANAMAN

Ulfa Triyani, S.Si., M.Pd.

Dr. Hafsani, S.Si., M.Pd.

Alauddin University Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

All Rights Reserved

Mengungkap Misteri Interaksi Antara Mikroba dan Tanaman

Penulis:

Ulfa Triyani

Hafsan

Editor:

Eka Sukmawaty

Layouter:

Zaenal Abidin

Cetakan I: 2021

viii + 154 hlm.; 15,5 x 21 cm

ISBN:

Alauddin University Press

UPT Perpustakaan UIN Alauddin

Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong,
Samata, Kabupaten Gowa

Website: <http://ebooks.uin-alauddin.ac.id/>

SAMBUTAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Puji syukur kepada Allah swt. atas segala nikmat, rahmat, dan berkah-Nya yang tak terbatas. Salawat dan Salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw.

Di tengah situasi penuh keterbatasan karena masih dalam kondisi pandemi global Covid-19, karya buku “**Mengungkap Misteri Interaksi Antara Mikroba dan Tanaman**” yang kini hadir di tangan pembaca patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Apresiasi tersebut diperlukan sebagai bentuk penghargaan kita sebagai pembaca terhadap penulis yang dengan penuh kesungguhan hati, mampu menyelesaikan suatu naskah buku referensi yang berharga bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Sebagai Rektor, tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus kehormatan bagi kami, sebab pada tahun kedua kepemimpinan ini, karya ini dapat lahir melalui program **Gerakan Penulisan dan Penerbitan 100 Buku Referensi**. Hal ini, selain merupakan manifestasi dari salah satu Pancacita kepemimpinan kami, yakni Publikasi yang Aktif, juga sebagai dukungan kami terhadap lahirnya produktifitas berupa karya-karya akademik demi terciptanya suatu lingkungan akademik yang dinamis dan dipenuhi dengan khazanah keilmuan. Iklim akademik yang demikian itu dapat mendorong kepada hal-hal positif yang dapat memberi dampak kepada seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Tentu, hal ini juga perlu dilihat sebagai bagian dari proses *upgrading* kapasitas dan *updating* perkembangan ilmu pengetahuan sebagai ruh dari sebuah universitas.

Transformasi keilmuan yang baik dan aktif dalam sebuah lembaga pendidikan seperti UIN Alauddin Makassar adalah kunci bagi suksesnya pembangunan sumber daya manusia dan

pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini perlu dibarengi dengan kepemimpinan yang baik, keuletan, sikap akomodatif dan kolektif yang mampu mendorong peningkatan kapasitas dan kreatifitas sumber daya, dan menciptakan inovasi yang kontinu guna menjawab setiap tantangan zaman yang semakin kompleks. Apalagi, di tengah kemajuan pada bidang teknologi informasi yang kian pesat dewasa ini, hal-hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan. Semua berpulang pada tekad yang kuat dan usaha maksimal kita untuk merealisasikannya.

Karya ilmiah berupa buku referensi akan menjadi memori sekaligus *legacy* bagi penulisnya di masa datang. UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu institusi pendidikan yang memiliki *basic core* pengembangan ilmu pengetahuan, memiliki kewajiban untuk terus menerus memproduksi ilmu pengetahuan dengan menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang berkualitas sebagai kontribusinya terhadap kesejahteraan umat manusia.

Semoga ikhtiar para penulis yang berhasil meluncurkan karya intelektual ini dapat menjadi sumbangsih yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing demi kemajuan peradaban bangsa. Hanya kepada Allah jugalah kita berserah diri atas segala usaha dan urusan kita. Semoga Allah swt. senantiasa merahmati, memberkahi, dan menunjukkan jalan-Nya yang lurus untuk kita semua. *Amin*.

Makassar, 17 Agustus 2021

Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah swt. Sang Maha Berkehendak atas semesta dan segenap isinya. Syukur tak terhingga penulis panjatkan kepada-Nya karena telah menganugerahkan nikmat kesempatan sehingga penulis mampu menunaikan penyelesaian buku ini sebagaimana yang direncanakan.

Buku ini merupakan penjabaran atas kenyataan bahwa tanaman dalam memaksimalkan pertumbuhannya memiliki upaya khusus untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi, proteksi terhadap serangan organisme pengganggu, serta menghadapi kondisi fisik lingkungan yang kurang menguntungkan baginya. Usaha-usaha tersebut diyakini berkorelasi secara kuat dan langsung dengan hubungan simbiosisnya dengan mikroba. Intensi penyajian materi dalam buku referensi ini adalah untuk mendukung pemahaman yang utuh atas konsep dasar hubungan simbiosis tersebut sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai keperluan, khususnya dalam peningkatan produksi sektor agraria misalnya pemanfaatan mikroba sebagai biopestisida, perangsang perbungaan, dan kompleksitasnya sebagai *Plant Growth-Promoting*.

Buku referensi ini diselesaikan dengan menyisakan berbagai kekeliruan dan kelalaian yang menyebabkan karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya penulis memohon maaf yang setulus-tulusnya dan sangat mengharapkan rekomendasi perbaikan dari semua pihak demi keparipurnaan tulisan berikutnya. Kepada segenap pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis haturkan terima kasih yang mendalam. Semoga aktivitas kita ini mendatangkan kemaslahatan bagi segenap kita dan pembaca pada khususnya.

Makassar, Juli 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

<i>SAMBUTAN REKTOR</i>	iv
<i>PENGANTAR PENULIS</i>	vi
<i>DAFTAR ISI</i>	vii
<i>BAB I KOMPROMI TERITORI HABITAT MIKROBA-TANAMAN</i> ..	1
1. Rhizosfer sebagai habitat yang unik untuk komunikasi mikroba-tanaman	2
2. Komunikasi tanaman kepada mikroba	5
a. Pesan melalui senyawa biokimia.....	5
b. Pesan melalui faktor fisiologi.....	8
c. Pesan Melalui Interaksi Molekuler	10
3. Komunikasi mikroba kepada tanaman	13
a. Fitohormon	15
b. Ketersediaan Nutrisi	21
c. ACC Deaminase.....	29
d. Induksi resistensi sistemik	30
4. Komunikasi antar mikroba	31
a. N-Acyl-L-homoserine Lactones (N-AHLs).....	33
b. Kuinolon.....	34
c. Autoinducer-2 (AI-2)	35
d. Penginduksi Peptida otomatis	37
e. Indole	38
f. Diketopiperazine	40
g. Molekul Sinyal Difusi (DSM).....	41
5. Peran Pensinyalan Mikroba dalam Pengendalian Hayati ..	43
a. Produksi antibiotik	43
b. Hidrogen Sianida (HCN).....	43
c. Biosurfaktan	44

d. Enzim	45
BAB II INTERAKSI MIKROBA DAN TANAMAN	48
1. Interaksi Antar Mikroba	50
2. Interaksi Mikroba-Tanaman	51
a. Rhizosfer dan Eksudat Akar.....	52
b. Filosfer: Komunitas Tumbuhan dengan Mikrobioma.....	66
c. Endosphere.....	69
BAB III PENANGANAN STRESS BIOTIK DAN ABIOTIK OLEH MIKROBA ENDOFIT	72
1. Mekanisme Endofit Masuk ke Tanaman Inang.....	75
2. Pemacuan pertumbuhan tanaman oleh endofit.....	80
a) Produksi fitohormon oleh endofit.....	80
b) Pelarutan fosfat oleh endofit	81
c) Produksi siderofor oleh endofit	81
d) Fiksasi nitrogen oleh endofit.....	81
e) Sintesis senyawa aktif biologis.....	81
3. Peran endofit dalam pemenuhan nutrisi	83
4. Penanganan stres abiotik oleh endofit.....	84
a) Stres kekeringan.....	85
b) Tekanan salinitas.....	89
c) Tegangan suhu	92
5. Penanganan stres biotik oleh endofit.....	98
6. Aplikasi komersial dari endofit toleran stres	101
BAB IV.....	104
FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR	104
1. Konsep Umum Mikoriza.....	104
a) Kategori Simbiosis Mikoriza.....	105
b) Keragaman Taksonomi Fungi Mikoriza Arbuskular	106

c)	Morfologi dan Reproduksi	107
d)	Pembentukan Asosiasi Mikoriza Arbuskular.....	108
e)	Fungi mikoriza arbuskular dan perolehan Fosfat Anorganik .	108
f)	Fungi mikoriza arbuskular dan Stres Kekeringan	109
g)	Fungi mikoriza arbuskular dan stres logam berat.....	111
h)	Fungi mikoriza arbuskular dan stres salinitas	115
2.	Keberlanjutan dan Pertanian Berkelanjutan	122
3.	Interaksi Mikorizofer Menuju Pertanian Berkelanjutan ...	123
BAB V KOMPLEKSITAS MIKROBA SEBAGAI PLANT-GROWTH PROMOTING		126
1.	Mekanisme Pemacuan Pertumbuhan Tanaman.....	129
a)	Fitostimulasi.....	130
b)	Biofertilizer	131
c)	Kolonisasi Akar dan Kompetensi Rhizosfer	134
d)	Aktivitas Enzim	135
e)	Peningkatan Pertumbuhan Melalui Vitamin	136
f)	Aktivitas Biokontrol	136
g)	Detoksifikasi Polutan Organik dan Anorganik.....	137
h)	Peningkatan Aktivitas Fotosintesis	138
i)	Toleransi stres.....	139
2.	Aplikasi Plant Growth-Promoting Rhizobacteria	139
a)	Pemacuan Pertumbuhan Tanaman Dalam Kondisi Normal..	140
b)	Pemacuan Pertumbuhan Tanaman pada Cekaman Lingkungan	141
3.	Peran Konsorsium Bakteri dalam Kemajuan Pertanian..	143
4.	Karakter Bakteri untuk Pengembangan Formulasi	146
DAFTAR PUSTAKA		148

BAB I

KOMPROMI TERITORI HABITAT MIKROBA-TANAMAN



Komunikasi sebagai isyarat dalam berinteraksi antar makhluk hidup tidak hanya dilakoni oleh manusia melainkan tumbuhan, hewan, dan bahkan makhluk hidup terkecil, yaitu bakteri juga berkomunikasi satu sama lain. Gaya pesan antara mikroba dan tanaman menunjukkan bahwa eksudat akar memulai dan memodulasi dialog antara akar tanaman dan mikroba tanah. Selain itu, eksudat akar mempertahankan dan mendukung keragaman spesies mikroba yang sangat spesifik di rhizosfer tanaman tertentu, sehingga menunjukkan awal hubungan evolusi yang terjalin erat (Arora, 2013).

Keberlangsungan kehidupan setiap organisme di bumi sangat bergantung interaksi dengan organisme di sekelilingnya untuk menunjang semua aspek kehidupannya. Misalnya, tanaman membentuk asosiasi dengan tanaman di sekitarnya, mikroflora, dan mikrofauna, sebagaimana manusia mempertahankan asosiasi simbiosis dengan flora mikroba usus, yang sangat diperlukan untuk asimilasi nutrisi dan pengembangan sistem kekebalan bawaan. Sebagian besar asosiasi ini difasilitasi oleh sinyal kimia yang dipertukarkan antara inang dan simbion. Di rhizosfer yang meliputi akar tanaman dan area tanah di sekitarnya yang dipengaruhi oleh akar, tanaman menghasilkan bahan kimia untuk berkomunikasi secara efektif dengan organisme tanah di sekitarnya. Sebagai

organisme autotrofik, tumbuhan memainkan peran sentral dalam menopang semua bentuk kehidupan lainnya. Tidak seperti hewan, tumbuhan bersifat sesil, sehingga melepaskan serangkaian sinyal kimiawi untuk berinteraksi dengan organisme lain. Sistem akar, yang secara umum dianggap menyediakan topangan dan penyerapan nutrisi dan air, adalah pabrik kimia yang memediasi berbagai interaksi bawah tanah, termasuk asosiasi mutualistik dengan mikroba menguntungkan, seperti rhizobia, mikoriza, endofit, dan rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman (*Plant Growth-Promoting Rhizobacteria* = PGPR).

Pertukaran sinyal dilakukan oleh tumbuhan untuk merespon sinyal bakteri, dan bakteri untuk mengkoordinasikan ekspresi gen pada tingkat populasi dan komunitas. Selain itu, dinamika pertukaran sinyal dan signifikansi biologisnya juga diuraikan. Kajian interaksi mikroba kooperatif ini dapat dimanfaatkan sebagai bioteknologi dengan input rendah dan menjadi dasar bagi strategi untuk mengembangkan praktik ramah lingkungan yang berkelanjutan yang mendasar bagi stabilitas dan produktivitas ekosistem pertanian dan alam.


1. Rhizosfer sebagai habitat yang unik untuk komunikasi mikroba-tanaman

Menurut pandangan umum, rhizosfer merupakan area yang termasuk akar tanaman dan tanah di sekitarnya. Di rhizosfer, interaksi biologis dan kimiawi sangat beragam, kompleks, dan dinamis, terjadi antara akar tanaman, biota tanah (mikro), dan lingkungan fisikokimia tanah. Mitra autotrofik (tanaman) menyediakan aliran substrat dan energi di rhizosfer dan mendapatkan kembali nutrisi penting untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Biota tanah heterotrofik biasanya terbatas dalam

pasokan karbon dan energi, dan dengan demikian, urutan respons yang kompleks dimulai, yang pada waktunya juga mempengaruhi tanaman. Biota tanah (bakteri, fungi, dan mikrofauna) itu sendiri tertaut dalam jaring makanan, dan dengan demikian, interaksi tanaman dengan dunia mikroba serta mikro dan mesofauna penting untuk difahami, khususnya proses yang berlangsung di rhizosfer (Dodds & Whiles, 2020b; Enebe & Babalola, 2019; Finkel et al., 2017; Lugtenberg, 2015; Varma et al., 2020).

Dari sudut pandang tumbuhan, rhizosfer dicirikan oleh investasi tumbuhan dalam pengembangan arsitektur akar yang efektif dan penyerapan nutrisi mineral dan air dari tanah. Pada sistem perakaran, pengelupasan sel akar (khususnya pada ujung akar), kematian akar (sel rambut akar dan sel epidermis pada bagian akar yang lebih tua), dan pengeluaran senyawa karbon merupakan proses yang mendukung biota tanah dan sesuai dengan fungsinya. Pada fase awal pertumbuhan tanaman, kebutuhan utama yang adalah muncul kepentingan untuk mengintegrasikan kemampuan mikroba tanah dalam mengeksplorasi tanah demi ketersediaan nutrisi dan air yang dibutuhkan untuk perkembangan tanaman tersebut. Sebaliknya, sejumlah besar mikroba tanah memiliki karakteristik yang memungkinkan mereka berinteraksi secara lebih efisien dengan akar dan bertahan dalam kondisi kehidupan rhizosfer yang cukup menantang. Proses ini dapat dianggap sebagai proses evolusi mikro yang sedang berlangsung di lingkungan dengan kadar nutrisi yang rendah, yang cukup umum di ekosistem alami. Rhizosfer hanya dapat berhasil dikolonisasi dengan fasilitas akuisisi substrat yang efisien, mekanisme resistensi, serta sifat kompetitif yang sesuai. Dengan demikian, evolusi membentuk biota tanah agar sesuai dengan kondisi relung tertentu yang juga dicirikan oleh kota-kota tertentu berdasarkan keanekaragaman tumbuhan

dan lingkungan tanah. Selanjutnya, kolonisasi bagian dalam akar tanaman oleh mikroba endofit dan PGPR muncul sebagai tujuan yang paling menarik, karena di sana sumber hara tanaman dapat dieksplorasi lebih efektif lagi tanpa persaingan yang ketat dengan banyaknya mikroba lain yang menjajah permukaan dan lingkungan akar bagian lainnya. Tumbuhan membatasi atau mengarahkan perkembangan organisme yang tertarik dengan cara untuk mengendalikan tamu-tamu ini dengan mengeluarkan campuran zat yang cukup selektif yang menyediakan kondisi selektif untuk organisme rhizosfer (Arora, 2015; Dodds & Whiles, 2020a, 2020b; Pathma et al., 2020; Varma et al., 2020).



Gambar 1.1 Komunikasi antara tanaman-mikroba-mikroba di rhizosfer (Arora, 2015)

Rhizosfer merupakan mikrohabitat berpenduduk padat yang dicirikan oleh mutualisme, antagonisme, persaingan, bahkan

predasi di antara penghuninya. Oleh karena itu, organisme tanah memang mengalami lingkungan rhizosfer sebagai habitat mikro dengan peluang besar, tetapi tantangan besarnya adalah memahami dan mengeksplorasi beragam komunikasi dan pesan interaktif berkelanjutan di antara komunitas tanaman-mikroba-mikroba sebagaimana diilustrasikan pada gambar 1.1.

2. Komunikasi tanaman kepada mikroba

Tumbuhan adalah organisme multiseluler yang bersifat sesil, yang bergantung pada perkembangan dan perubahan metabolisme untuk pertumbuhan. Sistem akar menunjukkan plastisitas yang cukup besar dalam morfologi dan fisiologinya sebagai respons terhadap variabilitas dalam lingkungannya. Komunikasi ekstensif terjadi antara tanaman dan mikroba selama berbagai tahap perkembangan tanaman dimana molekul pemberi sinyal memainkan peran penting. Tanaman mampu mengenali senyawa turunan mikro dan menyesuaikan pertahanan dan respon pertumbuhannya sesuai dengan jenis mikroba yang ditemui. Interaksi tumbuhan-mikroba telah menjadi topik utama yang menarik yang terutama mencakup penggabungan interaksi fisiologis, biokimia, dan molekuler yang terjadi di rhizosfer.

a. Pesan melalui senyawa biokimia

Tanaman menghasilkan serangkaian senyawa biokimia dan molekul sinyal untuk mempertahankan diri terhadap organisme berbahaya dan untuk menarik organisme lain yang bermanfaat. Senyawa ini termasuk eksudat akar yang digunakan oleh bakteri tanah untuk energi dan produksi biomassa. Eksudat akar terutama termasuk dalam kategori berikut: berat molekul rendah, berat molekul tinggi, dan senyawa organik volatil. Akar memancarkan berbagai senyawa organik dengan berat molekul rendah termasuk

gula dan polisakarida sederhana (seperti arabinosa, fruktosa, glukosa, maltosa, manosa, oligosakarida), asam amino (seperti arginin, asparagin, aspartat, sistein, sistin, glutamin), organik asam (seperti asetat, askorbat, benzoat, asam malat), dan senyawa fenolik. Beberapa senyawa ini, terutama fenolat, mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan mikroba tanah di sekitarnya.

Selain itu, senyawa dengan berat molekul tinggi terdiri dari lendir dan karbondioksida, metabolit sekunder tertentu, alkohol, dan senyawa volatil. Eksudat tertentu seperti asam lemak, pengatur tumbuh, nukleotida, tanin, karbohidrat, poliasetil, dan vitamin dapat bertindak sebagai sinyal bagi mikroba sebagai sumber karbon untuk nutrisi mikroba, senyawa ini terlibat dalam proses tumbuhan primer atau sekunder dan juga dalam pertahanan tanaman (R. K. Singh et al., 2017)

Senyawa organik volatil secara aktif diproduksi dan digunakan sebagai “bahasa” tanaman yang canggih untuk berkomunikasi dengan mikroba. Tanaman melepaskan metabolit volatil seperti terpen, kelas terbesar dari metabolit sekunder tanaman, memiliki banyak perwakilan volatil. Mayoritas hemiterpen, monoterpen, seskuiterpen, dan bahkan beberapa diterpen memiliki tekanan uap yang cukup tinggi pada kondisi atmosfer normal untuk memungkinkan pelepasan yang signifikan di dalam tanah. Faktanya, karena sifat volatil dari senyawa ini, sangat menggoda untuk berspekulasi bahwa akar mengeluarkan volatil untuk dirasakan dengan cepat dan efektif oleh organisme lain seperti mikroba untuk menjalin komunikasi (Sharifi et al., 2018).

Beberapa sumber karbon dan non-karbon dilepaskan sebagai eksudat tumbuhan yang membentuk komunikasi unik antara mikroba rhizosfer. Sebagian besar karbon di rhizosfer akar adalah

hasil dari lisis kutikula atau sel permukaan yang pecah atau oleh abrasi mekanis. Pecahnya kutikula memungkinkan lendir dari sel-sel di permukaan akar memasuki matriks tanah dan membungkus koloid tanah di dekatnya untuk membentuk mucigel. Sumber karbon penting kedua di rhizosfer adalah bahan organik yang dimasukkan sebagai eksudat atau sekresi akar. Ada perbedaan yang tipis antara eksudasi akar dan proses sekresi. Akar tanaman juga mengeluarkan “baterai” protein untuk mempertahankan tanaman terhadap patogen tular tanah yang potensial.

Mekanisme sekresi protein tidak sepenuhnya dipahami, tetapi telah diungkap bahwa protein secara aktif disekresikan dari sel epidermis akar. Senyawa yang tidak mengandung karbon yang ada termasuk H^+ yang ada di mana-mana, ion anorganik, air, dan elektron. Meskipun jumlahnya lebih rendah pada eksudat akar daripada senyawa yang mengandung karbon, kehadirannya signifikan dalam memfasilitasi metabolisme internal dan proses eksternal yang berlangsung seperti penyerapan nutrisi.

Karakteristik fisik, biokimia, dan ekologi dari rhizosfer ditentukan oleh keseimbangan antara berbagai senyawa yang dilepaskan, waktu pelepasan, dan setiap zat unik yang diproduksi secara konstitutif atau dengan cara yang dapat diinduksi. Diperkirakan bahwa antara 20 dan 40% dari semua karbon yang terikat secara fotosintesis akhirnya dipindahkan ke rhizosfer, secara signifikan mempengaruhi populasi rhizosfer dengan mempengaruhi proses seperti penyerapan nutrisi dan air serta pembentukan interaksi yang menguntungkan dengan populasi mikroba tanah dan meningkatkan jumlahnya hingga 10–100 kali lipat. Dengan demikian rhizosfer merupakan sistem dinamis di mana interaksi dan komunikasi antara akar dan mikroba memainkan peran penting dalam mempertahankan pertumbuhan dan produktivitas tanaman

(Arora, 2013; Meena et al., 2017a; Sharifi et al., 2018; R. K. Singh et al., 2017).

b. Pesan melalui faktor fisiologi

Telah dilaporkan bahwa rhizosfer adalah lingkungan aktif yang distribusi sumber dayanya bervariasi seiring dengan usia, ruang, dan waktu. Eksudasi dari akar bersifat spesifik tanaman dan diterima secara umum untuk mencerminkan evolusi dan/atau adaptasi fisiologis spesifik terhadap kondisi habitat tanah tertentu termasuk status nutrisi, faktor modulasi redoks-pH, keasaman-kebasaaan, perubahan kelembaban yang cepat dan sering, suhu, iradiasi UV, dan kelembaban. Kelembaban dapat mempengaruhi konsentrasi nutrisi dan osmolaritas dan lingkungan tersebut dianggap cocok untuk kolonisasi mikroba. Asal dan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan dari perubahan pH yang dimediasi oleh akar baru-baru ini telah ditinjau lebih jauh. Daya reduksi adalah sifat akar tanaman yang telah lama diamati dan ditunjukkan dalam beberapa pendekatan berbeda, seperti reduksi oksida mangan yang tidak larut oleh akar. Meskipun asam biogenik lainnya dapat mempengaruhi pengasaman tanah dan proses pelapukan, penyerapan akar ion nutrisi, produksi asam organik, siklus redoks logam kekurangan elektron, dan sistem asam karbonat merupakan kontributor utama terjadinya pengasaman rhizosfer. Karena oksigen sangat aktif dikonsumsi di rhizosfer karena tingginya tingkat dekomposisi mikroba dan respirasi akar, gradien redoks yang curam dapat berkembang antara lingkungan akar dan tanah curah di sekitarnya. Sebaliknya, akar menyediakan rhizosfer dengan oksigen di tanah dan sedimen yang tergenang air. Akibatnya, bakteri pengoksidasi besi mengendapkan plak Fe sebagai pelapis teroksidasi pada permukaan akar.

Komunitas bakteri yang berasosiasi dengan jaringan akar berbeda secara signifikan dari komunitas bakteri di tanah rhizosfer. Hal ini menunjukkan pengenalan spesifik dan pemilihan nutrisi oleh komunitas bakteri pada akar, sebelum difusi nutrisi ke dalam tanah rhizosfer. Bakteri yang berkerabat dekat dengan spesies *Burkholderia* dan secara khusus mendominasi akar jagung (Hafsan et al., 2020) dan *Variovorax mendiami area* akar tanaman lobak. Beberapa bakteri seperti *Azospira*, *Dyadobacter*, *Kaistomonas*, *Sphingomonas*, dan *Streptomyces* secara khusus menjajah rhizosfer gandum. Bakteri-bakteri tersebut diketahui berinteraksi dengan tanaman dan dapat bertukar molekul sinyal dan memanfaatkan senyawa yang siap disekresikan. Kedekatannya dengan tanaman mungkin juga bermanfaat bagi tanaman, karena molekul reaktif bakteri dapat bertindak lebih efisien di sekitar akar. Hasil ini memberikan bukti bahwa spesies tanaman yang berbeda memilih komunitas bakteri yang berbeda pada jaringan akarnya. Faktor fisiologis memainkan peran penting dalam pelepasan eksudat tergantung pada keadaan fisiologis sel akar dan pada polaritas senyawa yang akan dikeluarkan. Senyawa berbobot molekul rendah intraseluler polar, termasuk asam amino dan karboksilat, ada yang bersifat anion dengan permeabilitas plasmalemma rendah. Eksudasi akar asam amino dan gula terjadi terutama secara pasif melalui difusi dan dapat ditingkatkan dengan pemberian tekanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi integritas membran termasuk kekurangan nutrisi (K, P, Zn), suhu ekstrim, atau stres oksidatif. Bahan kimia yang terkandung dalam eksudat akar, ketika dilepaskan dalam jumlah besar, umumnya masuk ke rhizosfer dan mengalami proses fisik (penyerapan), kimia (oksidasi logam), dan biologis (degradasi mikroba) di dalam tanah. Aktivitas biologis bahan kimia di rhizosfer dapat diubah dengan cepat karena terjadinya oksidasi kimia, kerusakan mikroba, atau imobilisasi

dengan mengikat partikel tanah secara ireversibel. Sintesis dan eksudasi alelokimia bersama dengan peningkatan produksi eksudat akar secara keseluruhan biasanya ditingkatkan selama kondisi stres yang dihadapi tanaman, seperti suhu ekstrim, kekeringan, dan paparan sinar UV. Tahap pertumbuhan tanaman merupakan faktor penting lain yang memberikan bentuk pada struktur komunitas rhizobakteri, sebagaimana yang dilaporkan dalam kasus rhizosfer kentang, bisa menjadi faktor terkuat yang mempengaruhi komunitas bakteri. Semua komunikasi dan hubungan khusus demikian dipertahankan karena kecocokan dalam reaksi fisiologis yang mengungkapkan hubungan yang intim di antara keduanya (Khalid et al., 2004).

c. Pesan Melalui Interaksi Molekuler

Akar tanaman memulai pembicaraan silang dengan mikroba tanah dengan menghasilkan sinyal yang dikenali oleh mikroba, yang pada gilirannya menghasilkan sinyal yang memulai kolonisasi. PGPR mencapai permukaan akar dengan motilitas aktif yang difasilitasi oleh flagella dan dipandu oleh respon kemotaksis. Hal ini menyiratkan bahwa kompetensi PGPR sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan lingkungan tertentu atau pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi atau spesies tanaman.

Kepadatan populasi dan keragaman mikroflora akar dapat mempengaruhi jumlah dan aktivitas rhizobakteri penginduksi resistensi. Quorum sensing (QS) di dalam dan di antara populasi bakteri adalah mekanisme pengaturan utama untuk menyesuaikan metabolisme mereka dengan kondisi atau perubahan lain dalam lingkungan biotik dan abiotik. Tanaman dapat memproduksi dan mengeluarkan berbagai senyawa yang meniru sinyal QS dari bakteri

dan dengan demikian, mengubah aktivitas bakteri di rhizosfer. Mekanisme molekuler koeksistensi antara tanaman dan mikroba menyiratkan fenomena tentang interaksi kompleks dan bermacam-macam antara tanaman-mikroba pada tingkat populasi, genomik, dan proteomik. Tanaman menghasilkan serangkaian senyawa kimia dan molekul sinyal untuk menarik mikroba yang bermanfaat. Hormon tanaman asam jasmonat (JA), asam salisilat (SA), dan etilen adalah pengatur utama kekebalan bawaan tanaman dan menarik fokus mikroba. Tanaman merespon dengan produksi campuran spesifik dari sinyal alarm ini.

Produksi sinyal-sinyal tersebut sangat bervariasi dalam kuantitas, komposisi, dan waktu dan menghasilkan aktivasi set diferensial gen yang berhubungan dengan pertahanan yang pada akhirnya menentukan sifat respons pertahanan terhadap patogen yang mengancam. Hormon tanaman lainnya, seperti asam absisat (ABA), brassinosteroid, dan auksin, juga telah dilaporkan berperan dalam pertahanan tanaman terhadap patogen. JA dan turunannya, secara kolektif disebut jasmonate (JAs), adalah regulator tanaman yang sangat populer. Peran regulasinya dalam berbagai aspek biologi tanaman telah mendapat perhatian yang cukup besar karena bertindak sebagai sinyal dalam respon seluler tanaman terhadap tekanan abiotik dan biotik yang berbeda dan dalam interaksi tanaman-mikroba. Meskipun peran JA dalam pertahanan tanaman telah didokumentasikan dengan baik, pentingnya JA dalam pertahanan melawan mikroba patogen baru dipertimbangkan baru-baru ini oleh fakta bahwa JA sering terakumulasi sebagai respons terhadap serangan patogen. Selain itu, respons yang bergantung pada JA dikaitkan dengan peningkatan ekspresi beberapa gen pertahanan yang mengkode protein antimikroba, seperti defensin

tanaman dan thionin (Arora, 2013; Dassen, 2018; Lugtenberg, 2015; R. K. Singh et al., 2017).

Molekul pemberi sinyal, seperti SA dan oksida nitrat, menginduksi akumulasi berbagai metabolit sekunder termasuk glukosinolat indol, fitoaleksin, dan alkamida, yang mungkin berperan dalam komunikasi dengan populasi mikroba. Perkembangan terbaru dari stable-isotope probing dan penerapannya untuk melacak C yang berasal dari tumbuhan menjadi nukleat mikroba atau penanda biokimia lainnya memberikan kesempatan untuk memahami keragaman fungsional komunitas bakteri terkait tanaman. Telah dilaporkan bahwa eksudat akar legum *Lotus japonicus* melepaskan senyawa sinyal strigolakton, 5-deoxystrigol. Strigolakton adalah kelompok lakton seskuiterpen dan juga muncul sebagai kemoatraktan. Mekanismenya adalah bahwa strigolakton yang keluar dari akar inang dapat memicu kaskade peristiwa molekuler dan seluler yang mengarah pada pembentukan struktur percabangan pra-hifa dalam mikoriza arbuskular. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penelitian telah dilakukan pada perubahan molekuler yang terjadi pada fungi mikoriza arbuskular selama tahap pra-simbiosis. Misalnya, flavone luteolin, yang disekresikan oleh bibit alfalfa (*Medicago sativa*) dan kulit biji yang memberikan salah satu sinyal penginduksi gen nodulasi pada *Rhizobium meliloti*.

Lektin dan flavonoid dikenal sebagai senyawa pensinyalan kunci dalam sejumlah interaksi tanaman-mikroba. Flavonoid bertindak sebagai kemoatraktan untuk bakteri *rhizobium* dan sebagai penginduksi spesifik dari gen nodulasi *rhizobium* (gen nod), yang terlibat dalam sintesis sinyal *lipo-chitooligosaccharide*, yang disebut faktor Nod. Flavonoid juga bertindak sebagai senyawa pemberi sinyal dalam simbiosis mikoriza dan dalam interaksi patogen

tanaman-tanah yang berbeda. Eksudat akar umumnya mengandung fenilpropanoid dan avonoid, yang disintesis dalam retikulum endoplasma dan dilepaskan ke dalam tanah. Dalam interaksi simbiosis legum-*Rhizobium*, flavonoid spesifik yang dihasilkan oleh akar legum meningkatkan laju pertumbuhan sel bakteri, mendorong pergerakan bakteri menuju tanaman, dan menginduksi transkripsi gen nodulasi rhizobium. Induksi gen nod tergantung pada konsentrasi flavonoid dalam eksudat akar. Selain bertindak sebagai zat pemberi sinyal untuk pembentukan hubungan simbiosis antara akar tanaman dan mikroba, senyawa lain dalam eksudat memainkan peran penting dalam penentuan struktur komunitas mikroba di rhizosfer tanaman. Meskipun mekanisme di mana senyawa ini diangkut dari retikulum endoplasma masih belum diketahui, ada kemungkinan bahwa mereka diangkut oleh vesikel yang berasal dari retikulum endoplasma yang menyatu dengan membran sel dan melepaskan isinya. Pesan serupa di mana tanaman berinteraksi dengan mikroba dibalas dan dikirim dari mikroba ke tanaman.

3. Komunikasi mikroba kepada tanaman

Antara akar dan tanah tempat tanaman tumbuh adalah lingkungan dengan inokulum mikroba berkepadatan tinggi, terdiri dari mikroba patogen dan menguntungkan. Dengan demikian, akar tanaman terus-menerus terpapar berbagai mikroba dan harus berinteraksi dan bertahan sesuai dengan jenis cekaman biotik yang ada. Interaksi menguntungkan tanaman secara kasar dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, mikroba yang berasosiasi dengan tanaman bertanggung jawab atas nutrisinya misalnya mikroba yang dapat meningkatkan suplai nutrisi mineral ke tanaman. Dalam hal ini, walaupun sebagian besar mungkin tidak berinteraksi langsung dengan tanaman, pengaruhnya terhadap parameter biotik dan

abiotik tanah tentu berdampak pada pertumbuhan tanaman. *Kedua*, adanya kelompok mikroba yang merangsang pertumbuhan tanaman secara tidak langsung dengan cara mencegah pertumbuhan atau aktivitas patogen. Mikroba tersebut disebut sebagai agen biokontrol, dan kelompok mikroba tersebut telah banyak didokumentasikan dengan baik. Kelompok *ketiga* melibatkan mikroba yang bertanggung jawab untuk promosi pertumbuhan langsung, misalnya, dengan produksi fitohormon. Banyak bakteri tanah memiliki kemampuan untuk mendorong pertumbuhan tanaman dan, oleh karena itu, sering disebut PGPR. Mekanisme yang berbeda terlibat, di mana fiksasi nitrogen atmosfer menjadi amonia oleh diazotrof telah dipelajari paling banyak. Selain memperbaiki nitrogen, *Azospirillum* mengeluarkan beberapa hormon tanaman yang terlibat dalam promosi langsung pertumbuhan tanaman. Mekanisme lain dari stimulasi pertumbuhan tanaman oleh PGPR adalah produksi 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase. Volatil 2,3-butanediol dan asetoin yang diproduksi oleh *Bacillus* juga meningkatkan pertumbuhan *A. thaliana*, yang menunjukkan interaksi fisik antara PGPR dan tanaman.

Mikroflora rhizosfer dapat bermanfaat bagi tanaman dengan meningkatkan toleransi terhadap cekaman abiotik seperti kekeringan, defisiensi nutrisi, dan toksisitas logam berat serta perlindungan terhadap patogen melalui antagonisme mikroba dan meningkatkan kapasitas pertahanan tanaman. Bagian berikut mencakup mekanisme PGPR tertentu di mana mikroba tanah berinteraksi dengan tanaman dan meningkatkan pertumbuhan tanaman.

a. Fitohormon

Berbagai macam mikroba yang ditemukan di rhizosfer mampu menghasilkan zat yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Produksi bakteri dan fungi dari fitohormon seperti auksin, sitokinin, dan giberelin dapat mempengaruhi proliferasi sel dalam arsitektur akar dengan kelebihan produksi akar lateral dan rambut akar dengan peningkatan berikutnya penyerapan nutrisi dan air. Oleh karena itu, keseimbangan antara auksin dengan sitokinin dan tempat akumulasi hormon di dalam tanaman dapat menentukan apakah interaksi mikroba dapat menguntungkan atau merugikan. Dalam lima tahun terakhir, sinyal tambahan dari mikroba telah dilaporkan berperan dalam proses morfogenetik tanaman. Pensinyalan dan fisiologi tanaman dipengaruhi oleh sintesis dan/atau degradasi hormon bakteri dengan cara yang berbeda, tergantung pada peran fisiologis hormon, pada rekalsitran jaringan tanaman terhadap perubahan dalam kumpulan hormon, dan pada besarnya atau sumber hormon yang dihasilkan oleh bakteri tersebut (Singh et al., 2017; Spaepen & Vanderleyden, 2011).

1) *Indole Acetic Acid (IAA)*

Telah diketahui dengan baik bahwa auksin secara kuantitatif merupakan fitohormon yang paling banyak disekresikan oleh genus *Azospirillum*, *Pseudomonas*, dan *Rhizobium* yang bertanggung jawab untuk stimulasi perkembangan sistem akar dan promosi pertumbuhan. Diperkirakan sekitar 80% rhizobakteri menghasilkan IAA misalnya produksi IAA oleh *Pseudomonas*, telah dikaitkan dengan promosi pertumbuhan tanaman, terutama inisiasi dan pemanjangan akar, dan memiliki peran tidak langsung dalam penekanan penyakit. Biosintesis IAA pada rhizobakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan. Secara khusus, produksi IAA meningkat pada kondisi pH yang lebih tinggi, karbon terbatas, dan

jumlah triptofan yang lebih tinggi. Sejauh ini, enam jalur untuk biosintesis IAA telah diidentifikasi pada rhizobakteri, lima di antaranya bergantung pada triptofan dan satu tidak bergantung pada triptofan. Alih-alih triptofan, jalur ini bergantung pada keberadaan indole-3-gliserolfosfat.

Temuan terbaru tentang peran IAA yang diproduksi fungi dalam sistem interaksi tanaman-fungi yang berbeda membuka adanya kemungkinan bahwa fungi dapat menggunakan IAA dan senyawa terkait untuk berinteraksi dengan tanaman sebagai bagian dari strategi kolonisasi mereka, yang mengarah pada stimulasi pertumbuhan tanaman dan modifikasi basal mekanisme pertahanan tanaman. Pada jagung (*Zea mays*) dan *A. thaliana*, inokulasi *Trichoderma* mempengaruhi arsitektur sistem akar, peningkatan pembentukan akar lateral dan pertumbuhan rambut akar yang terkait dengan peningkatan hasil tanaman. Mekanisme pensinyalan dimana *Trichoderma* mendorong pertumbuhan. Gen-gen yang terlibat dalam pengangkutan atau pensinyalan auksin diantaranya AUX1, BIG, EIR1, dan AXR1, ditinjau oleh berbagai peneliti bahwa gen-gen tersebutlah yang membantu dalam aktivitas pemacu pertumbuhan tanaman. Sebagian besar spesies *rhizobium* menghasilkan IAA dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan kadar auksin pada tanaman inang diperlukan untuk organogenesis bintil. Sintesis IAA dalam sel bakteri dipandu oleh molekul quorum sensing. Dalam *Pseudomonas chlororaphis*, GacS/GacA (sensor kinase GacS dan regulator respons GacA adalah anggota dari sistem dua komponen yang mengontrol produksi metabolit sekunder) bertindak sebagai pengatur biosintesis IAA yang bergantung pada triptofan. Keterlibatan RpoS dan GacS dalam produksi IAA lebih lanjut dikonfirmasi oleh ekspresi berlebih dari gen *rpoS* dan *gacS* dari *Pseudomonas fluorescens* dalam dua galur

Enterobacter cloacae. Pada spesies *Azospirillum*, RpoS tidak ada (RpoS tidak terdeteksi pada *roteobacteria*), dan dalam hal ini faktor sigma alternatif, RpoN dan RpoH, mengatur ekspresi IAA. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa mayoritas bakteri endofit yang diperoleh dari *Solanum nigrum* dan *Echinacea* sp adalah produsen IAA yang efisien dan meningkatkan pertumbuhan tanaman (Arora, 2015; Carlson et al., 2020; R. K. Singh et al., 2017).

2) Sitokinin

Mikroba tanah tertentu berpotensi menghasilkan sitokinin. Sitokinin adalah turunan purin yang mempromosikan dan mempertahankan pembelahan sel tanaman dan juga terlibat dalam berbagai proses diferensiasi termasuk pembentukan tunas, pertumbuhan akar primer, dan pembentukan kalus. Produksi sitokinin oleh PGPR telah didokumentasikan dengan baik dan berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan tanaman. Sebuah laporan baru-baru ini telah memberikan informasi penting tentang peran yang dimainkan oleh reseptor sitokinin di PGPR oleh *Bacillus megaterium*. Penghasil sitokinin, bakteri *B. megatarium* diketahui mampu mempromosikan produksi biomassa *A. thaliana* dan tanaman kacang-kacangan secara *in vitro* dan *in vivo*. Tumbuhan dan mikroba yang berhubungan dengan tumbuhan telah ditemukan mengandung lebih dari 30 senyawa pemacu pertumbuhan dari kelompok sitokinin. Hormon-hormon yang sangat aktif ini biasanya hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Berbagai organisme dilaporkan menghasilkan sitokinin, meskipun hanya pada tumbuhan tingkat tinggi yang menghasilkan sitokinin terbukti memiliki peran hormonal. Efek positif sitokinin pada pertumbuhan di seluruh tingkat tanaman telah ditunjukkan oleh identifikasi gen yang terlibat dalam persepsi dan pensinyalan sitokinin. Tiga sensor histidin kinase *A. thaliana*, yaitu: CRE1/ AHK4/ WOL, AHK2, dan

AHK3, telah terbukti bertindak sebagai reseptor sitokinin. Reseptor ini mengaktifkan ekspresi beberapa regulator respon dengan cara yang bergantung pada sitokinin. Inokulasi sitokinin menghasilkan strain *Paenibacillus polymyxa* di rhizosfer gandum tumbuh subur sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Mekanisme pertumbuhannya dengan mempromosikan perkecambahan biji, pembentukan tunas, pelepasan tunas dari dominasi apikal, stimulasi ekspansi daun, perkembangan reproduksi, dan penghambatan penuaan. Produksi sitokinin oleh *Azotobacter* dirangsang oleh berbagai senyawa alami. Juga diketahui bahwa hormon tanaman lainnya, seperti auksin, atau zat pengatur tumbuh lainnya terjadi di rhizosfer. Di sekitar akar tanaman, zat tersebut dapat memodifikasi efek sitokinin pada tanaman secara sinergis. Sitokinin juga telah dilaporkan memainkan peran penting dalam nodulasi legum oleh rhizobia. Rhizobia menghasilkan faktor Nod, sebuah molekul yang memicu sinyal spesifik di akar, menginduksi ekspresi gen tanaman yang terlibat dalam simbiosis (nodulin) dan pembelahan sel di korteks akar sehingga menimbulkan primordium nodul. Model nodulasi umum berdasarkan pensinyalan LHK1 (histidine kinase diperlukan untuk nodulasi) telah dijelaskan di mana sinyal dari bakteri simbiosis menginduksi akumulasi sitokinin yang mengikat LHK1 dalam sel kortikal akar yang memicu organogenesis nodul (Arora, 2015; Carlson et al., 2020; Chandran et al., 2020; R. K. Singh et al., 2017).

3) *Giberelin*

Giberelin disintesis oleh tumbuhan tingkat tinggi, fungi, dan bakteri. Giberelin merupakan asam diterpenoid yang terdiri dari residu isoprena (umumnya dengan empat cincin); sampai saat ini 136 giberelin yang berbeda telah diidentifikasi dan dikarakterisasi.

Mereka mempengaruhi pembelahan dan pemanjangan sel dan terlibat dalam beberapa proses perkembangan tanaman, termasuk perkecambahan biji, pemanjangan batang, pembungaan, pembentukan buah, dan penundaan penuaan di banyak organ dari berbagai spesies tanaman. Giberelin juga terlibat dalam mendorong pertumbuhan akar karena mereka mengatur kelimpahan rambut akar. Namun, dalam proses ini giberelin berinteraksi dengan fitohormon lain dan mengubah keseimbangan hormonal tanaman sehingga mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemampuan bakteri untuk mensintesis zat seperti giberelin pertama kali dijelaskan dalam *Azospirillum brasilense* dan *Rhizobium*. Sejak itu telah terdeteksi di berbagai genera bakteri yang menghuni sistem akar tanaman termasuk *Agrobacterium*, *Azotobacter*, *Arthrobacter*, *Azospirillum*, *Bacillus*, *Burkholderia*, *Clostridium*, *Flavobacterium*, *Micrococcus*, *Pseudomonas*, dan *Xanthomonas*. Perangsangan pertumbuhan oleh giberelin yang diproduksi oleh bakteri pemacu pertumbuhan tanaman telah dilaporkan oleh beberapa peneliti, dan efek positif pada biomassa tanaman ini sering dikaitkan dengan peningkatan kandungan giberelin dalam jaringan tanaman. Modifikasi konsentrasi giberelin pada tanaman adalah hasil dari (a) sintesis giberelin, (b) dekonjugasi glukosil giberelin, atau (c) aktivasi kimia giberelin tidak aktif oleh bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Oleh *Azospirillum*, beberapa penelitian telah mengkaraktirasi giberelin dengan kromatografi gas kapiler-spektrometri massa (GC-MS), yaitu, GA1, GA3, GA9, GA19, dan GA20. Produksi giberelin oleh *Azospirillum* dan *Bacillus* telah terlibat dalam peningkatan serapan Nitrogen (Arora, 2013, 2015; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017; Waqas et al., 2012).

4) ABA

ABA terlibat dalam proses pertumbuhan dan perkembangan fisiologis yang berbeda, seperti pembentukan tunas dan dormansi benih, pematangan buah, dan regulasi homeostatis di bawah tekanan abiotik. Jalur ini aktif pada tumbuhan tingkat tinggi, terutama pada kondisi cekaman abiotik seperti cekaman air dan salin. ABA memberikan kemampuan tanaman tingkat tinggi untuk beradaptasi di bawah tekanan melalui berbagai proses fisiologis dan molekuler yang mencakup penyesuaian osmotik, penutupan stomata, biosintesis protein terkait stres, dan regulasi ekspresi gen. Dapat dikatakan bahwa ABA dianggap sebagai sinyal akar sejati dalam kondisi stres air. *A. brasilense* menghasilkan jumlah ABA yang lebih tinggi ketika NaCl dimasukkan ke dalam media kultur. Inokulasi *A. thaliana* dengan *A. brasilense* menghasilkan peningkatan dua kali lipat dalam kandungan ABA tanaman. PGPR mensintesis ABA yang berfungsi untuk melindungi tanaman dalam kondisi stres dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. *Achromobacter xylosoxidans* dan *Bacillus pumilus* yang diisolasi dari akar bunga matahari (*Helianthus annuus*) menghasilkan ABA dalam jumlah yang signifikan dalam medium yang ditentukan secara kimia. Produksi ABA dalam media yang ditentukan secara kimia untuk *Lysinibacillus fusiformis*, *Bacillus subtilis*, *Brevibacterium halotolerans*, *Bacillus licheniformis*, *Bacillus pumilus*, *Achromobacter xylosoxidans*, dan *Pseudomonas putida* yang menunjukkan bahwa ABA memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan karakter bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Selain itu, ABA juga telah dideteksi dengan *radioimmuno assay* atau TLC pada supernatan kultur *Azospirillum* dan *Rhizobium*. Peran utama ABA dalam penutupan stomata telah ditetapkan dengan baik serta penyerapannya oleh dan transportasi di tanaman; keberadaannya di rhizosfer bisa menjadi sangat penting

untuk pertumbuhan tanaman di bawah lingkungan stres air, seperti yang ditemukan di iklim kering dan semi kering (Arora, 2013, 2015; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; Ramegowda & Senthil-Kumar, 2015; R. K. Singh et al., 2017).

5) *poliamina*

Senyawa baru yang terlibat dalam mendorong pertumbuhan tanaman oleh *Azospirillum* adalah *kadaverin poliamina* yang disintesis dari prekursor L-lisin. Poliamina adalah senyawa organik dengan berat molekul rendah yang memiliki dua atau lebih gugus amino primer. Poliamina berfungsi sebagai senyawa pengatur pertumbuhan. Salah satu contohnya adalah kadaverin, yang telah dikorelasikan dengan peningkatan pertumbuhan akar pada pinus dan kedelai sebagai respons terhadap cekaman osmotik dan pengendalian aktivitas stomata pada kacang *Vicia faba*. *A. brasilense*, yang digunakan sebagai inokulan gandum dan jagung di Argentina, diketahui menghasilkan poliamina seperti *spermidine*, *spermine*, dan *putrescine* dalam kultur dan juga menghasilkan kadaverin dalam medium yang ditentukan secara kimia yang ditambahkan dengan prekursor L-lisin dan pada tanaman padi yang diinokulasi (Arora, 2015; Meena et al., 2017a; Singh et al., 2017)

b. Ketersediaan Nutrisi

Mikroba tanah merupakan sumber dinamis yang besar dan penyerap nutrisi di semua ekosistem dan memainkan peran utama dalam siklus nutrisi, struktur tanah, pengurangan fitopatogen, dan perubahan lain dalam sifat tanah yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Keragaman mikroba dan fungsinya diperlukan selama pembentukan tanah dan mempertahankan kesuburan melalui: siklus dan interaksi yang kompleks. Faktanya, organisme terkecil bertanggung jawab untuk

mendaur ulang nutrisi seperti N, P, K, dan S dan membuat mineral ini tersedia untuk tanaman. Satu gram tanah pertanian yang subur diperkirakan mengandung 2,5 miliar bakteri selain organisme lain yang memainkan peran beragam. Atribut fungsional langsung termasuk fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, perolehan besi, pelarutan seng, dan mobilisasi kalium diperlukan untuk penyerapan nutrisi yang tidak larut dari tanaman. Unsur hara penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan juga mikroba serta merupakan faktor penting dalam pengendalian penyakit. Semua nutrisi penting dapat mempengaruhi keparahan penyakit. Namun, tidak ada aturan umum, karena nutrisi tertentu dapat mengurangi keparahan penyakit tetapi juga dapat meningkatkan keparahan penyakit atau memiliki efek yang sama sekali berlawanan di lingkungan yang berbeda (Arora, 2013; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017).

1) *Kelarutan Fosfat*

Fosfor (P) merupakan salah satu unsur hara makro utama bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fosfor ada dalam dua bentuk di tanah, sebagai fosfat organik dan anorganik. Untuk mengubah fosfat yang tidak larut (baik organik maupun anorganik) dalam bentuk yang dapat diakses oleh tanaman merupakan sifat penting bagi PGPR dalam meningkatkan hasil tanaman. Konsentrasi P terlarut dalam tanah biasanya sangat rendah, biasanya pada tingkat 1 ppm atau bisa lebih kurang. Tanaman mengambil beberapa bentuk P tetapi sebagian besar diserap dalam bentuk HPO_4 atau H_2PO_4 . Fenomena fiksasi P dan presipitasi dalam tanah umumnya sangat tergantung pada pH dan jenis tanah. Beberapa laporan telah mendokumentasikan pelepasan P mikroba dari sumber organik. Beberapa kelompok fungi dan bakteri, yang populer disebut sebagai mikroba pelarut fosfat, membantu

tanaman dalam mobilisasi bentuk fosfat yang tidak larut. mikroba pelarut fosfat meningkatkan solubilisasi fosfat tanah tetap, menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi, dan oleh karena itu digunakan sebagai pupuk hayati. Peningkatan yang signifikan dalam hasil biji-bijian diamati untuk beras, buncis, kedelai, dan kacang tunggak, dan juga peningkatan penyerapan fosfat oleh umbi kentang diamati ketika galur pelarut fosfat *Aspergillus awamori*, *Bacillus polymyxa*, dan *Pseudomonas striata* digunakan baik kultur tunggal atau dalam kombinasi tau konsorsium (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017; Wang et al., 2017; Yadav & Yadav, 2017).

Kelarutan senyawa fosfat anorganik oleh mikroba sangat penting secara ekonomi dalam nutrisi tanaman. Bakteri dari genus *Achromobacter*, *Agrobacterium*, *Bacillus*, *Enterobacter*, *Erwinia*, *Escherichia*, *Flavobacterium*, *Mycobacterium*, *Pseudomonas*, dan *Serratia* sangat efisien dalam melarutkan fosfat kompleks yang tidak tersedia menjadi ion fosfat anorganik yang tersedia. Di antara fungi *Penicillium* dan *Aspergillus* adalah pelarut fosfat yang paling kuat. Nematofungi *Arthrobotrys oligospora* juga memiliki kemampuan untuk melarutkan batuan fosfat. Umumnya mikroba pelarut fosfat menurunkan pH media baik dengan ekstrusi H⁺ atau dengan sekresi asam organik atau dengan pelepasan enzim fitase dan fosfatase.

Kemampuan mikroba pelarut fosfat untuk melarutkan fosfor pada konsentrasi ZnSO₄ tinggi yang menunjukkan potensinya sebagai pupuk hayati yang efisien. Kelompok utama lainnya dalam siklus fosfor dan mutualis dengan tanaman adalah fungi mikoriza. Di antara fungi mikoriza adalah simbiosis obligat lebih dari 80% tanaman terestrial. Sebagai ganti pengurangan karbon, fungi memasok tanaman dengan nutrisi mineral, terutama fosfor. Fungi

ini dilaporkan di hampir setiap habitat di mana tanaman dapat tumbuh. Beberapa peneliti melaporkan bahwa fosfat yang dilarutkan oleh bakteri dapat diserap secara lebih efisien oleh tanaman melalui jembatan yang dimediasi oleh mikoriza antara akar dan tanah di sekitarnya yang memungkinkan translokasi nutrisi dari tanah ke tanaman, bahkan ^{32}P radioaktif menunjukkan bahwa mikroba pelarut fosfat yang terkait dengan mikoriza arbuskular meningkatkan akumulasi mineral dalam jaringan tanaman. Mereka menyarankan bahwa *rhizobacteria* yang diinokulasi dapat melepaskan ion fosfat dari fosfat batuan yang tidak larut dan/atau sumber P lainnya, yang kemudian diambil oleh miselium mikoriza eksternal (Arora, 2013; Chandran et al., 2020).

2) *Produksi Siderofor*

Sebagian besar besi dalam tanah ditemukan dalam mineral silikat atau oksida besi dan hidroksida, bentuk yang tidak mudah digunakan oleh mikroba dan tanaman atau tidak dalam bentuk bioavailable. Bentuk besi yang tersedia secara hayati dapat didefinisikan sebagai bagian dari besi total yang dapat dengan mudah diasimilasi oleh organisme hidup. Sebagian besar besi dalam tanah terdapat dalam bentuk besi hidroksida yang sangat tidak larut; dengan demikian, besi bertindak sebagai faktor pembatas untuk pertumbuhan tanaman bahkan di tanah yang kaya besi. Ketersediaannya untuk organisme sangat terbatas karena oksidasi yang cepat dari besi (Fe^{2+}) menjadi besi (Fe^{3+}). Ion besi sangat tidak larut dalam kondisi fisiologis dan membuat akuisisi oleh mikroba tantangan yang cukup besar. Mikroba telah mengembangkan mekanisme khusus untuk asimilasi besi, termasuk produksi senyawa pengkelat besi dengan berat molekul rendah yang dikenal sebagai siderophores, yang mengangkut elemen ini ke dalam sel mereka. Siderophores telah terlibat baik

untuk peningkatan langsung dan tidak langsung pertumbuhan tanaman oleh mikroba rhizosfer. Oleh karena itu, sebagian besar mikroba mengeluarkan siderophores yang mengkelat besi yang kemudian diperoleh melalui reseptor membran.

Siderophores biasanya diproduksi oleh sejumlah besar genera bakteri termasuk *Aeromonas*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Rhizobium*, dan *Serratia*. Peran siderophores mikroba yang berhubungan dengan peningkatan daya pemicu pertumbuhan tanaman dan biokontrol ditunjukkan misalnya siderophores yang dihasilkan oleh berbagai bakteri dan fungi adalah siderophores hidroksamat (ferrichrome, deferoxamine, desferrioxamine-E, fusarinine-C, ornibactin), siderophores catecholate (enterobactin, bacillibactin, vibriobactin), dan ligan campuran (azobactin, pyoverdin, pyonichelin). Siderophores yang diperoleh dari *Pseudomonas* menunjukkan aktivitas antifungi terhadap fungi perusak tanaman, termasuk *Aspergillus niger*, *Aspergillus flavus*, *Aspergillus oryzae*, *Fusarium oxysporum*, *Macrophomina phaseolina*, dan *Sclerotium rolfsii*.

Saat ini, mikroba penghasil siderofor digunakan sebagai bioinokulan dan agen biokontrol untuk penggunaan pertanian. Telah disarankan bahwa kemampuan untuk menghasilkan siderophores spesifik dan/atau untuk memanfaatkan spektrum siderophores yang luas dapat berkontribusi pada kemampuan kolonisasi akar galur biokontrol. Selain itu, siderophores juga memediasi penyerapan besi oleh akar tanaman dalam kondisi yang membatasi besi. *R. meliloti* dan benih berbakteri *Bradyrhizobium japonicum* diketahui telah mengurangi infeksi *Macrophomina*, mekanisme yang terlibat adalah produksi siderophore yang menghambat pertumbuhan *M. phaseolina* dengan membuatnya kekurangan zat besi. Populasi mikroba yang berasosiasi dengan

akar tanaman dapat secara artifaktual mempengaruhi tingkat penyerapan Fe dan translokasi dari siderofor mikroba dan fitosiderofor. Serapan Fe meningkat menjadi 34 kali lipat lebih tinggi daripada tanaman yang tumbuh secara axenical ketika disuplai dengan 1 M Fe sebagai siderophore mikroba, ferrioxamine. Asil-L-homoserin lakton (AHL) juga telah dilaporkan memiliki peran lain selain fungsinya sebagai molekul sinyal. Produk terakhir terbukti mengikat besi dengan afinitas yang sebanding dengan siderophore bakteri yang diketahui, yang mungkin memainkan peran dalam aktivitas bakterisida molekuler yang diamati. *Pseudomonas aeruginosa* menghasilkan 2-heptyl-3-hydroxy-4(1H)-quinolone, sinyal quorum sensing yang mengatur banyak gen virulensi termasuk yang terlibat dalam pengikatan besi (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Kumar et al., 2018; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017; Yadav & Yadav, 2017)

3) Pelarutan Seng (Zn)

Konsentrasi Zn total dalam tanah umumnya cukup tetapi jumlah yang tersedia untuk tanaman tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Di sinilah peran bakteri yang mampu melarutkan senyawa Zn yang tidak larut dan meningkatkan ketersediaannya dalam larutan tanah, mirip dengan peran nutrisi P. Pada tumbuhan, lebih dari 90% Zn hadir dalam bentuk larut. Zn memainkan peran utama dalam metabolisme karbohidrat, melalui fotosintesis, dalam pembentukan sukrosa dan pati, metabolisme protein, integritas membran, metabolisme auksin, dan reproduksi. Secara umum, kelarutan Zn meningkat dengan penurunan pH, dan aktivitasnya menurun pada pengendapan sebagai hidroksida, fosfat, karbonat, dan silikat pada pH sedikit asam hingga basa. Seng memainkan peran penting dalam sintesis protein dan pati, dan oleh karena itu, konsentrasi seng yang rendah menginduksi

akumulasi asam amino dan gula pereduksi dalam jaringan tanaman. Pelarutan Zn mikroba sebelumnya difokuskan pada pelarutan yang dimediasi bakteri autotrofik, terutama oleh *Thiobacillus ferrooxidans* terutama dalam kaitannya dengan pencucian bijih logam. Studi-studi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga topik besar: pelarutan Zn terkait fitoekstraksi, pelarutan Zn terkait peningkatan nutrisi untuk sistem tanaman, dan pelapukan mineral Zn oleh fungi. Beberapa bakteri yang dapat melarutkan Zn termasuk *Microbacterium saperdae*, *Pseudomonas monteilii*, *Enterobacter cancerogenus*, *Pseudomonas fluorescens*, dan *Pseudomonas aeruginosa*. Mikroba-mikroba tersebut telah mengembangkan beberapa mekanisme untuk resistensi Zn dan detoksifikasi, termasuk (a) pengikatan logam ke membran luar, (b) penghabisan oleh sistem antiport, (c) penghabisan oleh ATPase tipe-P, (d) Zn- mengikat protein, dan (e) kompleksasi oleh asam organik. Metabolit mikroba dapat memiliki efek pada kelarutan bahan yang tidak larut ini. Seleksi dan inokulasi bakteri pelarut seng baik sendiri dalam minyak yang kaya akan seng asli atau bersama dengan senyawa seng tidak larut yang lebih murah, seperti ZnO atau ZnCO₃, akan menghasilkan banyak penghematan dalam budidaya tanaman, selain mengurangi pengeluaran untuk input pertanian (Meena et al., 2017a).

4) Fiksasi Nitrogen Biologis (BNF)

Molekul Nitrogen tidak dapat langsung diasimilasi oleh tanaman, tetapi harus tersedia dalam bentuk yang telah mengalami Fiksasi Nitrogen Biologis (BNF), suatu proses yang hanya dapat dikerjakan oleh sel prokariotik. BNF terutama terjadi di alam melalui pengikat nitrogen simbiosis termasuk legum-*Rhizobium*, asosiasi nonlegumes-*Frankia* dan bakteri tanah yang hidup bebas termasuk *Cyanobacteria*, *Azotobacter*, *Azospirillum*, *Klebsiella*, dan

Clostridium. Asosiasi ini memenuhi kebutuhan nutrisi biosfer dan bertanggung jawab untuk menghasilkan hampir dua pertiga dari nitrogen tetap setiap tahun. Flavonoid disinyalir sebagai molekul sinyal tanaman actinorhizal yang mempengaruhi pertumbuhan *Frankia* dan produksi faktor simbiosis *Frankia*, yang sifatnya masih belum diketahui kecuali memiliki beberapa kesamaan biokimia dengan *Rhizobium*. Bakteri diazotrofik lainnya, yang telah berulang kali diisolasi dari akar tanaman, terdiri dari bakteri pengikat nitrogen secara mikroaerob, *Acetobacter diazotrophicus*, *Herbaspirillum seropedicae*, dan *Azoarcus*. Sejauh ini, studi mengenai bakteri ini terutama berhubungan dengan pembentukan sifat endofit mereka. Spesies *Azorhizobium*, *Allorhizobium*, *Bradyrhizobium*, *Mesorhizobium*, *Rhizobium*, dan *Sinorhizobium* membentuk hubungan simbiosis yang erat dengan kacang-kacangan dengan merespons secara kemotaktik terhadap molekul flavonoid yang dilepaskan sebagai sinyal oleh inang legum. Senyawa tanaman ini menginduksi ekspresi gen nodulasi pada rhizobia, yang pada gilirannya menghasilkan sinyal lipochitooligosaccharide (LCO) yang memicu pembelahan sel mitosis di akar, yang mengarah pada pembentukan bintil. Nodul—tempat untuk fiksasi nitrogen simbiosis—terbentuk sebagai hasil dari serangkaian interaksi antara rhizobium dan tanaman polong-polongan. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan nodul pada akar legum termasuk kompatibilitas inang-mikrosimbion, kondisi fisikokimia tanah, dan adanya biomolekul yang diketahui dan tidak diketahui seperti flavonoid, polisakarida, dan hormon. Ini adalah dialog molekuler antara tanaman inang dan strain *Rhizobium* yang kompatibel yang berfungsi sebagai inisiasi pembentukan nodul. Genetika fiksasi nitrogen awalnya dijelaskan pada *Klebsiella oxytoca* strain M5a1 (pertama diidentifikasi sebagai *K. pneumoniae*). Dalam strain itu,

gen *nif* yang diperlukan untuk sintesis nitrogenase fungsional dikelompokkan dalam wilayah 24 kb. Sebagian besar rhizobium yang diuji adalah penghasil AHL. Spesies bakteri yang berbeda dapat menghasilkan AHL yang sama dengan struktur dan sifat yang serupa, menunjukkan bahwa terjadi pembicaraan silang antar populasi, dan terbukti bahwa quorum sensing melalui AHL membantu dalam pembentukan nodul dan memulai fenomena BNF. Keragaman bakteri pengikat nitrogen yang berasosiasi dengan tanaman polong-polongan dan non polong-polongan di habitat yang beragam telah banyak dilaporkan (Arora, 2015; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017).

c. ACC Deaminase

Ketika tanaman terkena stres, mereka dengan cepat merespon dengan reaksi kecil oleh etilen yang memulai respon protektif tanaman, seperti transkripsi gen yang berhubungan dengan patogenesis dan induksi resistensi yang didapat. Jika stres kronis atau intens, etilen kedua yang jauh lebih besar terjadi, biasanya 1-3 hari kemudian. Puncak etilen kedua ini menginduksi proses seperti penuaan, klorosis, dan absisi yang dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman yang signifikan. Pada tahun 1978, suatu enzim yang mampu mendegradasi prekursor etilen, ACC, menjadi amonia dan ketobutirat diisolasi dari *Pseudomonas*. Studi lebih lanjut menunjukkan adanya aktivitas ACC deaminase dalam berbagai mikroba tanah termasuk fungi *Penicillium citrinum* dan berbagai bakteri. ACC deaminase telah dilaporkan secara luas pada banyak spesies mikroba bakteri Gram-negatif dan Gram-positif termasuk endofit, bakteri rhizosfer dan fungi. ACC deaminase memetabolisme ACC akar menjadi ketobutyrate dan amonia dan mengendalikan produksi etilen yang sebaliknya menghambat pertumbuhan

tanaman melalui beberapa mekanisme. Produksi etilen yang berlebihan sebagai respons terhadap cekaman abiotik dan biotik menyebabkan penghambatan pertumbuhan akar dan akibatnya pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Sintesis etilen dirangsang oleh berbagai faktor/tekanan lingkungan, yang menghambat pertumbuhan tanaman. ACC deaminase PGPR ini meningkatkan pertumbuhan tanaman terutama di bawah kondisi stres dengan regulasi percepatan produksi etilen dalam menanggapi banyak tekanan abiotik dan biotik seperti salinitas, kekeringan, genangan air, suhu, patogenisitas, dan kontaminan. Aktivitas bakteri ACC deaminase relatif umum. *Rhizobium* yang telah diisolasi memiliki enzim ini yang membantu melindungi tanaman dari kondisi stres. Selain itu, proses lain seperti nodulasi legum dan pembentukan mikoriza di tanaman inang menyebabkan peningkatan lokal kandungan etilen. Dalam konteks ini, bakteri penghasil deaminase ACC, yang menurunkan kandungan etilen pada tanaman, dapat meningkatkan masing-masing nodulasi dan kolonisasi mikoriza. Peran ACC deaminase telah banyak ditinjau dalam pengelolaan stres (Arora, 2015; Carlson et al., 2020; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017)

d. Induksi resistensi sistemik

Volatil PGPR mungkin memainkan peran kunci dalam memunculkan induksi resistensi sistemik, misalnya; volatil yang disekresikan oleh *B. subtilis* dan *Bacillus amyloliquefaciens* mampu mengaktifkan jalur Induksi resistensi sistemik pada tanaman *A. thaliana*. Mayoritas bakteri yang mengaktifkan induksi resistensi sistemik tampaknya melakukannya melalui jalur independen SA yang melibatkan sinyal jasmonat dan etilen. Elisitasi induksi resistensi sistemik dalam bit gula oleh *B. mikoid* dan *B. pumilus* dikaitkan dengan peningkatan aktivitas peroksidase. Induksi

resistensi sistemik dapat dilakukan oleh banyak bakteri rhizosfer yang berbeda pada berbagai spesies tanaman. Namun, elisitasi yang berhasil didasarkan pada interaksi spesifik antara strain yang menginduksi dan tanaman inang. Proses demikian menunjukkan bahwa induksi resistensi sistemik dapat ditimbulkan dalam lobak oleh *P. fluorescens* selama kondisi ambien. Variasi dalam kemampuan mengekspresikan induksi resistensi sistemik diamati antara tanaman berbeda. Aksesori *A. thaliana* dalam induksi resistensi sistemik meningkatkan kekebalan bawaan tanaman melalui mekanisme yang ditentukan *priming*, yang memungkinkan tanaman bereaksi lebih cepat dan lebih kuat terhadap serangan patogen berikutnya. Tanaman prima tidak menunjukkan ekspresi gen yang berhubungan dengan pertahanan tanpa adanya serangan patogen. Sebaliknya, aktivasi pertahanan tanaman yang dipercepat terjadi setelah pengenalan patogen, memberikan respons pertahanan yang lebih kuat dan lebih cepat. Mekanisme induksi resistensi sistemik melibatkan ekspresi komponen pensinyalan seperti faktor transkripsi atau aktivasi protein kinase yang tetap tidak aktif sampai patogen dikenali. Molekul sinyal seluler asam azelaic diperlukan untuk aktivasi resistensi yang didapat secara sistemik di *A. thaliana* (Arora, 2015; Choudhary & Varma, 2016; Enebe & Babalola, 2019; Meena et al., 2017a; Pandey et al., 2012; R. K. Singh et al., 2017; Yadav & Yadav, 2017).

4. Komunikasi antar mikroba

Kompleksitas ekstrim interaksi yang dapat terjadi di rhizosfer melibatkan beberapa sesi interaktif mikroba. Diskusi di antara mikroba ini terjadi di rhizosfer melalui berbagai molekul sinyal yang membantu bakteri merasakan kondisi lingkungan mereka. Jalur pensinyalan yang diidentifikasi sejauh ini, dari sintesis dan pengenalan sinyal kimia hingga respons, melibatkan sejumlah kecil

gen pengatur. Kompleksitas komunikasi intra dan antarspesies menghasilkan pembentukan populasi rhizosfer.

Bakteri memiliki kemampuan untuk melakukan mekanisme canggih dalam mengoordinasikan ekspresi gen pada tingkat populasi dan komunitas melalui sintesis dan persepsi molekul yang dapat difusi. Karena konsentrasi sinyal yang dipancarkan dalam lingkungan terbatas mencerminkan jumlah sel bakteri per unit volume (umumnya kepadatan sel), jalur pengaturan seperti itu yang disebut *Quorum Sensing*. Namun, dalam lingkungan terbuka, konsentrasi sinyal mencerminkan jumlah sel bakteri dan koefisien difusi sinyal. Dalam lingkungan terbuka seperti itu, istilah penginderaan difusi berlangsung. Sebuah temuan tentatif baru-baru ini mencoba menyatukan kuorum dan penginderaan difusi, menemukan bahwa persepsi sinyal oleh sel (penginderaan efisiensi) dimodulasi oleh tiga faktor penting, yaitu kepadatan sel, sifat transfer massa (penginderaan difusi), dan distribusi spasial dari sel.

Di alam bakteri lebih mungkin tumbuh pada komunitas polimikroba daripada pada monokultur. Interaksi antara anggota komunitas diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan komunitas dan dapat melibatkan pensinyalan antarspesies yang dimediasi oleh molekul yang sama seperti yang digunakan dalam pensinyalan intraspesies. Selain pertukaran sinyal antara pasangan yang memanfaatkan molekul sinyal yang sama atau terkait, bakteri juga dapat menguping komunikasi organisme lain, memodulasi perilaku mereka sebagai respons terhadap sinyal sel-sel yang tidak mereka sintesis. Mekanisme quorum sensing bakteri didasarkan pada dua kelompok molekul sinyal yaitu turunan peptida yang khas untuk bakteri Gram-positif dan turunan asam lemak yang dimanfaatkan oleh bakteri Gram-negatif.

a. N-Acyl-L-homoserine Lactones (N-AHLs)

Molekul sinyal yang paling intensif diselidiki pada bakteri Gram-negatif terutama *Pseudomonas* adalah N-AHLs. Sistem quorum sensing bertanggung jawab untuk mengendalikan berbagai aktivitas, misalnya, produksi antibiotik, resistensi, konjugasi, replikasi, produksi penentu virulensi, sintesis eksoenzim, swarming, pembentukan biofilm, dan bioluminesensi, dan sistem quorum sensing homolog serupa telah dijelaskan di lebih dari 70 sistem quorum sensing yang berbeda. Spesies bakteri gram negatif. Molekul sinyal tipe AHL mengandung bagian lakton homoserin dan rantai samping asil lemak tergantung pada tipe molekul sinyal. Untuk sintesis AHL, S-adenosylmethionine dan protein pembawa asil-asil (acyl-ACP) diperlukan

Paradigma quorum sensing, pada tingkat molekuler, terdiri dari aktivitas dan kerjasama dua komponen. Yang pertama adalah sintase AHL (biasanya homolog LuxI atau LuxI) yang bertanggung jawab untuk sintesis konstitutif molekul sinyal. Yang kedua adalah protein pengatur (homolog LuxR dan/atau LuxR) yang mempromosikan transkripsi gen target, ketika terikat dengan AHL. Pengikatan AHL membutuhkan perubahan tiga dimensi dari protein pengatur dan pada gilirannya memungkinkan interaksinya dengan daerah DNA spesifik yang memungkinkan aktivasi transkripsi gen target. Dalam kebanyakan kasus, AHL bebas berdifusi ke lingkungan sekitar; namun, molekul AHL dengan rantai samping asil yang lebih panjang (lebih dari sepuluh karbon) dipindahkan dari sel ke lingkungan melalui sistem transpor aktif atau yang dibantu oleh pembawa dan berinteraksi dengan sel-sel di dekatnya. Bakteri tular tanah *Pseudomonas aureofaciens* bersaing dengan fungi tanah dari genus *Fusarium* dengan produksi fenazin antibiotik dan antifungi yang bergantung pada quorum sensing dan berbasis AHL yang

menekan pertumbuhan *Fusarium*. *P. aureofaciens* digunakan sebagai agen pelindung terhadap infeksi *Fusarium* pada tanaman. Contoh komunikasi positif antara bakteri yang berkerabat dekat menggunakan *P. putida* AHL sintase mutan. Contoh lain dari jenis komunikasi silang AHL ditunjukkan oleh *P. klorofil*, *P. chlororaphis* yang menghasilkan tiga antibiotik fenazin spektrum luas, asam fenazin-1-karboksilat kuning dan dua turunan 2-hidroksi oranye. Lokus biosintetik fenazin, terdiri dari delapan gen dalam satu operon, diatur langsung oleh sistem QS PhzR/PhzI. PhzI adalah sintase AHL yang menghasilkan hexanoyl homoserine lactone (HHL), dan PhzR adalah regulator transkripsi. Inaktivasi gen *phzI* pada galur mengakibatkan hilangnya produksi HHL dan pigmentasi oranye, yang merupakan penanda produksi fenazin pada galur ini. Produksi fenazin dapat dipulihkan dengan penambahan HHL eksogen (Arora, 2015; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017).

b. Kuinolon

P. aeruginosa menghasilkan molekul sinyal lain, 2-heptyl-3-hydroxy-4-quinolone, yang ditetapkan sebagai *Pseudomonas quorum sensing* (PQS) yang berasal dari anthranilate, zat antara dalam jalur biosintetik triptofan. Molekul ini merupakan anggota kelompok 4-kuinolon, yang paling dikenal untuk aktivitas antibiotik. Dilaporkan bahwa PQS diproduksi secara maksimal ketika kultur mencapai akhir fase stasioner pertumbuhan, lama setelah sistem Las dan Rhl (mengatur ekspresi gen virulensi dalam *Pseudomonas*) telah diaktifkan. Baru-baru ini, analisis langsung terhadap supernatan kultur dengan kromatografi cair dan spektroskopi massa mengungkapkan bahwa PQS diproduksi pada dasarnya selama fase stasioner awal pertumbuhan. Gen-gen yang diperlukan untuk sintesis PQS termasuk sebuah cluster di wilayah *phnAB*: *phnA* dan

phnB (sebelumnya terkait dengan biosintesis phenazine) mungkin mensintesis prekursor anthranilate dari chorismate, sementara pqsA mungkin terlibat dalam mengaktifkan anthranilate untuk sintesis PQS. Selain itu, pqsB, pqsC, pqsD, dan pqsH (penambahan tahap akhir gugus hidroksil) juga berperan dalam sintesis PQS. Gen lain, pqsE, dapat berpartisipasi dalam respons seluler terhadap PQS. Meskipun gen pqsL homolog pqsH dapat mengkodekan enzim yang juga bekerja pada PQS, fungsi pastinya belum jelas. pqsR mengkodekan anggota keluarga LysR dari regulator transkripsi. Transkripsi pqsH, gen yang diperlukan untuk sintesis PQS, sangat berkurang pada latar belakang mutan lasR. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa operon phnAB tunduk pada regulasi quorum sensing. Selain itu data microarray menunjukkan bahwa seluruh operon pqs dikendalikan oleh sistem Las. Menariknya, upregulasi ekspresi mvfR yang bergantung pada Las mendahului ekspresi operon pqs yang diinduksi AHL. PQS mengontrol ekspresi LasB dan menyebabkan induksi utama dari fusi rhII lacZ. PQS bertindak sebagai penghubung antara sistem quorum sensing Las dan RhI (autoinducing protein) hadir dalam *Pseudomonas* dengan mengatur RhII secara transkripsi dan mungkin tidak terlibat dalam penginderaan kepadatan populasi (Arora, 2015; Meena et al., 2017a).

c. Autoinducer-2 (AI-2)

Satu-satunya sistem pensinyalan sel ke sel yang diidentifikasi hingga saat ini yang digunakan bersama oleh bakteri Gram-positif dan Gram-negatif dimediasi oleh autoinducer-2 (AI-2). Beberapa genera bakteri penghasil AI-2 adalah *Bacillus*, *Escherichia*, *Enterococcus*, *Neisseria*, *Porphyromonas*, *Salmonella*, *Serratia*, *Staphylococcus*, dan *Vibrio*. Saat ini, ada daftar ekstensif genera bakteri di mana AI-2 memainkan peran penting dan pengaturan

termasuk gen yang mengkode faktor virulensi, produksi antibiotik, pembentukan biofilm, dan metabolisme karbohidrat. Semakin banyak bakteri yang menghasilkan AI-2 mengandung homolog LuxS yang menunjukkan bahwa AI-2 adalah bahasa universal untuk bahasa komunikasi antarspesies. Biosintesis AI-2 membutuhkan enzim LuxS, sedangkan persepsi AI-2 pada *Vibrio harveyi* membutuhkan protein pengikat AI-2 periplasmik LuxP dan sensor kinase LuxQ. LuxPQ adalah salah satu dari tiga sistem transduksi sinyal yang menyatu untuk mengontrol bioluminesensi.

LuxS memenuhi fungsi metabolisme sebagai komponen integral dari siklus metil teraktivasi, yang memberikan penjelasan alternatif untuk konservasi luasnya. Siklus metabolisme tersebut menyediakan gugus metil teraktivasi dalam bentuk SAM yang menghasilkan S-adenosylhomocysteine (SAH), suatu metabolit toksik. SAH dapat dihilangkan dengan salah satu dari dua rute tergantung pada baik dalam konversi satu langkah menjadi homosistein oleh SAH hidrolase atau dengan produksi S-ribosylhomocysteine (SRH) oleh Pfs nucleosidase (juga dikenal sebagai methylthioadenosine/SAH nukleosidase). SRH ini kemudian dibelah menjadi homosistein dan 4,5-dihidroksi-2,3-pentanedion (DPD) oleh LuxS. Jalur biosintetik yang mengarah ke DPD ini telah terbukti identik dalam banyak. Selanjutnya, siklisasi spontan DPD menghasilkan dua furanon epimerik. Ini menunjukkan bahwa beberapa turunan DPD aktif secara biologis. Oleh karena itu, fenotipe yang terkait dengan produksi AI-2 yang bergantung pada LuxS dapat dianggap sebagai respons perilaku sebenarnya dari populasi bakteri dengan pensinyalan sel ke sel atau sebagai hasil dari efek pleiotropik dari siklus metil aktif yang terganggu pada metabolisme seluler. Semakin banyak bakteri yang menghasilkan

AI-2 mengandung homolog LuxS, menunjukkan bahwa AI-2 adalah bahasa universal untuk komunikasi antarspesies.

Hubungan langsung antara LuxS dan AI-2 yang menunjukkan bahwa *P. aeruginosa* yang tidak memiliki gen luxS tidak menghasilkan AI-2 dan karena itu tidak berpartisipasi dalam interaksi mikroba dengan sel tetangga. Fitur baru dari molekul AI-2 telah dijelaskan *B. cereus*. Genom *B. cereus* mengandung gen yang mengkode sistem Lsr (gen seperti lsrR, yang mengkode regulator operon lsr, dan gen mirip lsrK dan lsrF), yang produknya diperlukan untuk mensintesis dan memproses AI-2 yang membantu menghentikan pembentukan biofilm (Arora, 2015).

d. Penginduksi Peptida otomatis

Banyak sistem pensinyalan sel-sel pada bakteri Gram-positif menggunakan peptida yang dimodifikasi sebagai sinyal untuk mengatur fungsi seperti virulensi dan kompetensi dan senyawa antimikroba seperti bakteriosin. Sebagian besar sinyal autoinducing peptide (AIP) dihasilkan oleh pembelahan dari peptida prekursor yang lebih besar dan modifikasi selanjutnya yang mencakup substitusi dengan gugus isoprenil dan pembentukan cincin lakton dan tiolakton serta lantionin. Pelepasan sinyal dari sel memerlukan pengekspor oligopeptida khusus, sedangkan persepsi sinyal dimediasi oleh sensor histidin kinase yang terletak di membran sitoplasma yang merupakan bagian dari sistem pengaturan dua komponen. Banyak bakteri Gram-positif berkomunikasi dengan beberapa peptida dalam kombinasi dengan jenis sinyal quorum sensing lainnya. Wilayah pensinyalan tertentu telah dipelajari dengan baik untuk sistem agr (pengatur gen aksesori) dalam sistem kompetensi *B. subtilis*.

Contoh klasik molekul sinyal peptida dilaporkan dalam *Xanthomonas oryzae pv. oryzae* (Xoo). Strain Xoo yang memproduksi elisitor AvrXa21 ekstraseluler memicu respons pertahanan inang dalam galur padi yang membawa gen resistensi Xa21. Meskipun molekul Xoo belum diisolasi, diketahui bahwa aktivitasnya bergantung pada delapan gen *rax* yang memberikan petunjuk tentang regulasi, sekresi, dan strukturnya. Aktivitas ekstraseluler AvrXa21 tergantung pada sistem dua komponen RaxRH, sistem sekresi RaxABC tipe I, dan RaxPQST, yang diperlukan untuk aktivasi dan transfer sulfat. Selanjutnya, aktivitas AvrXa21 diproduksi dengan cara yang bergantung pada kepadatan sel. Sifat-sifat ini telah mengarah pada anggapan bahwa AvrXa21 adalah peptida yang disekresikan yang bertindak sebagai molekul quorum sensing. Ekspresi operon *raxSTAB* dari Xoo dalam spesies terkait, *X. campestris pv. campestris*, menghasilkan aktivitas AvrXa21. Hal ini menunjukkan bahwa molekul inti AvrXa21 dilestarikan, yang mungkin penting dalam konteks pensinyalan antarspesies dalam xanthomonad. Studi biokimia, genetik, dan genomik telah menunjukkan bahwa bakteri mungkin mengandung beberapa sistem quorum sensing, menegaskan pentingnya komunikasi antar sel. Akhirnya, dalam beberapa kasus peptida yang berbeda dapat dikenali oleh reseptor yang sama, sementara juga reseptor hibrida telah dibangun yang merespon peptida baru atau menunjukkan respons baru (Arora, 2015).

e. Indole

Indole tersebar luas di lingkungan alam. Sejauh ini, setidaknya 85 spesies bakteri telah terbukti menghasilkan molekul ini dalam jumlah besar, termasuk bakteri Gram-positif dan Gram-negatif. Dalam penyelidikan tentang komunikasi bakteri, beberapa zat kimia telah diidentifikasi, dan masing-masing memiliki jalur biologis untuk

diuraikan. Indole adalah produk langsung dari katabolisme asam amino, sinyal dalam ekspor *multidrug*, penghambatan pembelahan sel, ketahanan stres, dan pembentukan biofilm. Mendasari pembentukan biofilm, pada dasarnya ada jaringan molekul sinyal dan protein. Efek indol sangat tergantung pada status anggota komunitas, dan sedikit perubahan dalam faktor pendukung (baik biotik atau abiotik) yang dapat memicu rantai peristiwa yang pada akhirnya mengakibatkan fluktuasi konsentrasi indol, yang pada gilirannya cocok dengan respons bakteri terhadap faktor yang berubah. Dalam perspektif evolusi, komposisi semacam ini dapat membantu bakteri dengan mudah dan tepat merespons berbagai perubahan lingkungan/ biologis dan memodulasi sel dengan tepat untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga mencapai tujuan akhir dari kelangsungan hidup dan interaksi semua organisme. Molekul Indol telah dibuktikan dapat memicu kaskade pensinyalan selama pembentukan biofilm. Selain itu masih dapat diproses lebih lanjut oleh bakteri untuk menghasilkan berbagai turunan yang mungkin terlibat dalam pembentukan biofilm. Sebagai contoh, banyak oksigenase bakteri yang dengan mudah mengubah indole menjadi senyawa teroksidasi, seperti 2-hidroksiindole, 3-hidroksiindole, 4-hidroksiindole, isatin, nila, isoidigo, dan indirubin yang berperan penting sebagai inhibitor/induser selama sintesis biofilm.

Turunan indole lain yang menjanjikan adalah IAA, yang telah dikenal sebagai fitohormon. Strain bakteri yang beragam menghasilkan IAA, terutama endofit yang berasosiasi dengan tumbuhan. Interaksi antara endofit penghasil IAA dan tanaman dapat menyebabkan efek pada asosiasi mereka beragam seperti patogenesis atau fitostimulasi. Sebagai contoh, endofit *Pantoea agglomerans* penghasil IAA yang diisolasi dari padi dapat beragregasi membentuk

symplasmata struktur mirip biofilm dan mempengaruhi fisiologi inangnya. Karena IAA dan indole secara metabolik saling berhubungan, ada kemungkinan terjadi persilangan dalam fungsinya juga. Poin ini telah dikonfirmasi oleh sel yang diberi perlakuan IAA dapat meningkatkan pembentukan biofilm dengan mempromosikan produksi matriks pembentuk biofilm trehalosa, lipopolisakarida (LPS), dan eksopolisakarida (EPS). Selain itu, IAA memicu peningkatan toleransi terhadap kondisi stres (kejutan panas dan dingin, iradiasi UV, kejutan osmotik dan asam, dan stres oksidatif) dan senyawa beracun (antibiotik, deterjen, dan pewarna). Penelitian terbaru pada *Rhizobium etli* menunjukkan bahwa penambahan IAA mengatur gen yang terlibat dalam pemrosesan sinyal tanaman, motilitas, dan perlekatan pada akar tanaman, yang dengan jelas menunjukkan peran yang berbeda untuk IAA dalam interaksi legum-*Rhizobium*. Pemicu IAA oleh strain bakteri dalam kondisi stres adalah karena pelepasan molekul quorum sensing dan meningkatkan karakter PGP. Peran ganda indole sebagai molekul sinyal, menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap patogen dan dalam pembentukan biofilm (Arora, 2015; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017b; R. K. Singh et al., 2017; Spaepen & Vanderleyden, 2011; Yadav & Yadav, 2017).

f. Diketopiperazine

Diketopiperazines (DKPs) adalah peptida siklik terkecil dan umumnya dibiosintesis dari asam amino oleh berbagai jenis mikroba. Bakteri dari genus *Bacillus* dikenal karena produksi DKP yang produktif. *B. subtilis* menghasilkan novel DKP cis-cyclo-(His,Leu) yang menunjukkan berbagai aktivitas antifungi terhadap fungi patogen tanaman, diperkirakan karena produksi antibiotik lipopeptida. Dalam penyaringan biologis, ekstrak *B. subtilis* menunjukkan aktivitas yang ampuh melawan bakteri patogen *Staphylococcus aureus* dan *P. aeruginosa*.

DKPs, yang awalnya diekstraksi dari supernatan kultur *B. subtilis*, *Citrobacter freundii*, *Enterobacter agglomerans*, *P. aeruginosa*, dan *Proteus mirabilis*, telah terbukti mempengaruhi quorum sensing dalam berbagai cara. DKP [cyclo(l-Pro-l-Met)] diproduksi oleh *E. coli* merangsang motilitas berkerumun *P. mirabilis* seefektif N-HSL. Sebaliknya, siklo(l-Pro-l-Tyr) (DKP lain) menghambat berkumpulnya sel-sel *Serratia liquefaciens* yang diatur oleh quorum sensing pada konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada yang diperlukan untuk menginduksi biosensor *E. coli*.

DKPs dapat meniru aksi N-AHL dengan berinteraksi dengan protein LuxR di, atau di dekat, situs pengikatan N-AHL (Degrassi et al. 2002). Juga telah ditunjukkan bahwa DKPs mempengaruhi transkripsi gen yang diatur fase diam spesifik dalam *E. coli*. Namun dalam beberapa kasus konsentrasi DKP yang diperlukan untuk melihat efek pada bakteri jauh lebih tinggi daripada tingkat N-AHL yang diperlukan untuk mengaktifkan sistem tertentu yang diteliti. DKPs juga memiliki efek biologis dan farmakologis pada sel organisme yang lebih tinggi, menunjukkan peran potensial mereka dalam komunikasi dengan sel tumbuhan dan hewan. Struktur, jalur, dan aktivitas biologis DKPs dari organisme laut yang menunjukkan aktivitas antimikroba (Arora, 2013; R. K. Singh et al., 2017).

g. Molekul Sinyal Difusi (DSM)

Bakteri berkomunikasi melalui sekresi dan penyerapan molekul sinyal difusi. Isyarat atau sinyal kimia ini sering digunakan oleh bakteri untuk mengkoordinasikan ekspresi fenotipik, dan mekanisme regulasi ini memberi mereka keunggulan kompetitif di lingkungan alami mereka. Contoh perilaku terkoordinasi dari bakteri laut yang diatur oleh sinyal termasuk berkerumun dan produksi exoprotease, yang penting untuk kolonisasi *niche* atau akuisisi nutrisi. Sintesis dan persepsi DSM membutuhkan produk dari kluster Rpf. Sintesis DSM bergantung pada RpfF, sedangkan sistem dua komponen yang terdiri dari sensor kinase RpfC dan regulator RpfG terlibat dalam persepsi DSM. Konservasi protein Rpf dan

keterkaitan struktur DSM dari bakteri yang berbeda menunjukkan pensinyalan spesies silang antara *xanthomonas*.

Dua temuan baru-baru ini telah memperluas cakupan pensinyalan antarspesies yang dimediasi oleh DSM. Temuan pertama menyangkut karakterisasi molekul sinyal yang terkait dengan DSM dari *Burkholderia cenocepacia*. Kultur supernatan *B. cenocepacia* mengandung senyawa dengan aktivitas seperti DSM, mampu mengembalikan biofilm dan produksi polisakarida ekstraseluler Xcc. Molekul sinyal ini *Burkholderia diffusible signal factor* (BDSF) diidentifikasi dengan spektrometri massa dan analisis NMR sebagai asam cis-2-decenoic, yang berbeda dari DSF tanpa adanya bagian metil bercabang. Sintesis BDSF bergantung pada homolog rpf yang ditemukan di *B. cenocepacia*. Dalam laporan kedua, menggambarkan pengaruh DSF pada perilaku *P. aeruginosa*, organisme yang tidak membawa kluster gen rpf dan tidak mengkode protein apa pun yang sangat terkait dengan Rpf. Ketika ditanam dalam kokultur dengan *Stenotrophomona maltophilia*, *P. aeruginosa* membentuk biofilm dengan arsitektur yang indah, berbeda dari pada arsitektur tak terdiferensiasi yang terlihat pada *P. aeruginosa* saja, di mana mereka mengontrol diferensiasi morfologis dan produksi metabolit sekunder melalui quorum sensing.

DSF tertentu termasuk Ca^{2+} yang diproduksi oleh fungi bertindak sebagai sinyal potensial untuk memulai interaksi mutualistik di rhizosfer. Asosiasi mikoriza memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang peran pensinyalan Ca^{2+} dalam simbiosis mikoriza arbuskular dan membantu berbagai mikroba rhizosfer untuk mengalami sensasi baru. Ca^{2+} teraktivasi kinase dapat mewakili simpul kunci dalam sirkuit pensinyalan Ca^{2+} , mampu membedakan marker Ca^{2+} yang berbeda dan memecahkan kode pesan Ca^{2+} menjadi respons yang berbeda dengan mikorisasi dan nodulasi (Arora, 2015; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017).

5. Peran Pensinyalan Mikroba dalam Pengendalian Hayati

a. Produksi antibiotik

Antibiosis umumnya dianggap sebagai salah satu karakteristik utama PGPR. Salah satu alasannya karena produksi antibiotik merupakan salah satu kriteria dalam skrining organisme untuk diteliti; produksi antibiotik baru-baru ini diakui sebagai fitur penting dalam pengendalian biologis penyakit tanaman oleh bakteri rhizosfer. Ada banyak laporan tentang produksi dan pentingnya metabolit antimikroba. Mikroba PGPR tertentu mampu mensintesis antibiotik dan antifungi serta enzim penghancur dinding sel fungi untuk bersaing dengan mikroba tanah lainnya selama kolonisasi akar untuk relung ekologi atau substrat. Rhizobakteri mampu menginduksi resistensi sistemik terhadap patogen dan cekaman abiotik pada tanaman inang (Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017; Vurukonda et al., 2018).

b. Hidrogen Sianida (HCN)

Sianida adalah metabolit sekunder yang diproduksi oleh anggota genus *Pseudomonas* dan *Chromobacterium*. HCN dan CO₂ terbentuk dari glisin yang dikatalisis oleh HCN sintase. PGPR menghasilkan HCN, yang dapat memiliki efek buruk pada pertumbuhan patogen tanah. Sintase HCN dari *Pseudomonas* mengoksidasi glisin dengan adanya akseptor elektron, misalnya, fenazin metosulfat. *P. fluorescens* adalah bakteri biokontrol aerobik, kolonisasi akar yang melindungi beberapa tanaman dari penyakit akar yang disebabkan oleh fungi tular tanah. Produksi HCN oleh *P. fluorescens* menekan terjadinya busuk akar hitam tembakau, yang disebabkan oleh *Thielaviopsis basicola* Mutan, Biosintesis HCN diatur oleh regulator transkripsional seperti FNR, ANR, yang meningkatkan ekspresi gen *hcnABC* dalam kondisi terbatas oksigen, seperti pada sistem hidroponik nonsirkulasi. Namun, sementara kondisi ini mendukung biosintesis HCN dan peran HCN yang lebih besar sebagai biokontrol, kondisi tersebut

tidak menghalangi produksi DAPG. Dalam kondisi yang sama, DAPG telah diisolasi dari rhizosfer tanaman tomat yang diinokulasi dengan *pseudomonas*. Produksi DAPG dan HCN oleh *Pseudomonas* berkontribusi pada pengendalian biologis terhadap bakteri penyebab penyakit pada tomat (Arora, 2015; Meena et al., 2017b; R. K. Singh et al., 2017).

c. Biosurfaktan

Biosurfaktan merupakan senyawa amfifilik yang dapat merusak membran sel, sehingga menyebabkan kebocoran dan sitolisis. Biosurfaktan memiliki aktivitas antimikroba terhadap berbagai organisme, termasuk patogen *Oomycetes*, *Pythium* dan *Phytophthora*, *Rhizoctonia*, serta sejumlah bakteri Gram-positif dan Gram-negatif seperti *S. aureus* dan *Proteus vulgaris*. Baru-baru ini, telah dilaporkan bahwa biosurfaktan telah diakui sebagai molekul bioaktif dengan aktivitas biosidal terhadap bakteri, virus, dan fungi. Beberapa peneliti melaporkan aktivitas antimikroba dari biosurfaktan (rhamnolipid dan lipopeptida) yang diperoleh dari *P. aeruginosa* terhadap fungi patogen dan beberapa bakteri Gram-positif. Mekanisme umum dimana surfaktan ini menghambat antagonis adalah melalui gangguan membran plasma sel bakteri dan ragi oleh akumulasi partikel intramembran dalam sel dan dengan demikian meningkatkan konduktansi listrik sel. Sintesis rhamnolipid oleh *P. aeruginosa* dilakukan oleh operon RHL dan beberapa gen tambahan diperlukan. Produksi rhamnolipid terjadi pada bakteri selama fase diam dan dipandu oleh molekul quorum sensing. Pengkodean kluster gen *rhl* untuk rhamnolipid mengandung dua gen tambahan yang mengkode protein pengatur (RhIR dan RhII). Protein ini memiliki kesamaan dengan autoinducer synthetase bakteri tipe LuxI. RhIR adalah aktivator transkripsi diduga dan protein RhII mengarahkan sintesis quorum sensing inducer N-butyryl-homoserine lactone. Sistem regulasi RhIR-RhII sangat penting untuk regulasi produksi rhamnolipid (Ron dan Roserberg 2001). Amphisin, suatu biosurfaktan yang diproduksi

oleh *Pseudomonas*, memiliki sifat PGP (sifat antifungi tidak langsung) dan menyebabkan penghambatan fungsi patogen tanaman dan mendorong pertumbuhan tanaman (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a; R. K. Singh et al., 2017; Verma & Gange, 2014).

d. Enzim

Mikroba tanah melepaskan enzim ekstraseluler untuk degradasi awal substrat dengan berat molekul tinggi seperti selulosa, kitin, pektin, dan lignin dan mineralisasi senyawa organik menjadi mineral N, P, S, dan unsur lainnya. Jumlah mikroba dan aktivitas enzim lebih tinggi di area rhizosfer daripada di tanah curah. Semakin dekat ke area tanah-akar, semakin tinggi jumlah dan aktivitas enzim. Diduga bakteri merupakan sumber utama histidinase. Mekanisme lain dimana rhizobacteria dapat menghambat fitopatogen adalah produksi enzim fosfatase, glukonase, dan dehidrogenase. Kitinase, protease, dan enzim litik dinding sel lainnya merupakan faktor antifungi penting yang dihasilkan oleh mikroba untuk membunuh fitopatogen di rhizosfer. Produksi enzim kitinase oleh pensinyalan AHL di contohkan dalam *Pseudomonas*, *Chromobacterium*, dan *Serratia*. Mikroba yang mampu melisiskan organisme lain tersebar luas di ekosistem alami. Lisis propagul dalam tanah adalah metode pengendalian biologis yang memuaskan secara logis karena dapat mengurangi kepadatan inokulum di dalam tanah.

Spesies *Pseudomonas* telah diketahui mengekskresikan kitinase dan 1,3-glukanase masing-masing untuk mencerna kitin dan glukon dinding sel fungi, dan menggunakannya sebagai sumber karbon dan energi dan juga dilaporkan menghasilkan berbagai metabolit antifungi. Penghasil glukonase dan actinomycetes PGP, bila digunakan dalam kombinasi, dapat secara signifikan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan juga menghambat pertumbuhan *Pythium aphanidermatum*. *S. marcescens* menghasilkan setidaknya tiga kitinase (ChiA, ChiB, ChiC), kitobiase, dan protein

pengikat kitin diduga (CBP21). Dapat dibayangkan, tetapi tidak pasti, bahwa kelima protein ini mewakili mesin kitinolitik bakteri yang lengkap. Mesin kitinolitik *S. marcescens* sangat menarik karena merupakan salah satu mesin kitinolitik berkarakteristik terbaik yang dikenal hingga saat ini. Struktur kristal ChiA, ChiB, dan kitobiase yang baru-baru ini ditentukan memberikan wawasan rinci tentang bagaimana serangkaian enzim kitinolitik alami dapat dibangun. Gen yang mengkode kitinase A, B, dan C telah diklon dan diurutkan dari empat galur *S. marcescens* yang berbeda. Meskipun telah dilakukan dengan upaya molekuler, Pencapaian dalam memahami regulasi genetik produksi kitinase *Serratia* belum maksimal sehingga masih membutuhkan kajian lebih jauh.

Antagonisme dapat dicapai dengan kompetisi, parasitisme, dan antibiotik atau dengan kombinasi dari cara-cara interaksi tersebut. Parasitisme melibatkan produksi beberapa enzim hidrolitik yang mendegradasi dinding sel fungi patogen. Pentingnya -1,3-glukanase dan kitinase sebagai enzim kunci bertanggung jawab untuk sel fungi dan lisis dan degradasi dinding sklerotik. Enzim ini telah terbukti diproduksi oleh beberapa fungi dan bakteri dan dapat dianggap sebagai faktor penting dalam pengendalian biologis.

Mekanisme *Trichoderma* menghambat patogen adalah dengan menempel pada hifa inang dengan melingkar, kait atau struktur seperti apresorium, dan menembus dinding sel inang dengan mensekresi enzim hidrolitik seperti proteinase dasar -1,3-glukanase dan kitinase actinomycetes, khususnya kitinase *Streptomyces*, telah terlibat sebagai antifungi terhadap berbagai fungi patogen tanaman. Aktivitas antifungi juga ditunjukkan dari purifikasi endochitinase dan exochitinase (chitobiosidase) yang dihasilkan oleh *Trichoderma harzianum*. Menggabungkan aktivitas endochitinase dan exochitinase (chitobiosidase) menghasilkan peningkatan sinergis aktivitas antifungi.

Keterlibatan kitinase dalam pengendalian *Sclerotium rolfsii* dengan teknik rekayasa genetika: gen chiA, yang mengkode kitinase utama

yang diproduksi oleh *Serratia*, diklon ke *E. coli*. Enzim yang dihasilkan oleh gen kloning menyebabkan ledakan *S. rolfsii* yang cepat dan ekstensif. Sediaan kitinase ini juga efektif dalam menurunkan kejadian penyakit yang disebabkan oleh *S. rolfsii* dalam kacang dan oleh *R. solani* dalam kapas di bawah kondisi rumah kaca (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017a, 2017b; Paul & Lade, 2014; Poindexter & Leadbetter, 1989; R. K. Singh et al., 2017; Verma & Gange, 2014).

BAB II

INTERAKSI MIKROBA DAN TANAMAN



Perubahan iklim akibat peningkatan yang sangat besar dalam produksi gas rumah kaca adalah fenomena yang tak terhindarkan. Karakteristik khas pertanian intensif modern di seluruh dunia, yaitu, aplikasi bahan kimia sintetis seperti pupuk, fungisida, herbisida, dan pestisida, telah dilaporkan sebagai sistem pertanian yang tidak berkelanjutan dan berdampak berbahaya pada kehidupan manusia atau hewan dan tanaman serta lingkungan secara umum. Ada kebutuhan yang mendasar untuk pasokan energi terbarukan. Dalam keadaan seperti itu, alternatif prospektif untuk penggunaan input kimia atau sintetis adalah inokulan mikroba, formulasi mikroba ramah lingkungan yang bertindak sebagai pupuk hayati, fitostimulan, dan/ atau agen biokontrol mikroba patogen.

Mikroba yang menguntungkan sejatinya tersedia di setiap gram tanah, dan sel mikroba juga dapat ditemukan secara luas di jaringan tumbuhan dan hewan. Mikroba melakukan berbagai aktivitas metabolisme yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri, dan sifat berguna dari inokulan mikroba tersebut dapat dimanifestasikan baik dengan dukungan langsung pertumbuhan tanaman melalui daur ulang nutrisi atau secara tidak langsung dengan mempertahankan tanaman dari fitopatogen, atau dengan memperkuat toleransi terhadap beberapa strain abiotik

pada tanaman, yang tumbuh di bawah faktor ekologis yang tidak optimal termasuk tanah, suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah, keasaman, salinitas, kekeringan, dan juga logam berat. Mikroba membangun informasi metagenom yang juga meluas ke luar dan dalam tubuh manusia. Mikroba juga mampu memainkan peran utama dalam pengembangan agregat tanah yang membantu dalam stabilisasi lapisan atas tanah dan peningkatan kegemburan tanah dan dapat membantu dalam detoksifikasi ekologi, pengolahan air limbah, dan lain sebagainya. Mekanisme yang diatur oleh mikroba dalam pengaturan proses fisiologis inangnya telah dipelajari secara komprehensif berdasarkan temuan terbaru tentang mikrobioma. Meskipun tidak ada penggambaran yang jelas dari keseluruhan fungsi mikrobioma tanaman, ada cukup konfirmasi bahwa komunitas tersebut terlibat dalam pengendalian infeksi, peningkatan pencapaian nutrisi, dan pengaruh toleransi stres. Jadi, saat ini, usaha penting sedang dilakukan pada berbagai penelitian untuk mengembangkan inokulan mikroba yang memiliki sifat pertumbuhan yang mendatangkan dampak positif dalam budidaya tanaman berkelanjutan yang ramah lingkungan. Sebagian besar mikroba tanah yang menguntungkan masih belum ditemukan, dan fungsi lingkungannya cukup tidak terbatas sampai saat ini. Dengan demikian, pengujian aktivitas mikroba yang sangat besar merupakan langkah mendasar menuju kemajuan teknologi inovatif untuk eksploitasi mikroba yang unggul untuk mewujudkan keberlanjutan di bidang pertanian. Keterlibatan mikroba dalam kombinasi dengan kemajuan dalam pencitraan digital, nanoteknologi, dan elektronik dapat memainkan peran kunci dalam memecahkan tantangan universal abad-abad mendatang yang disertai dengan perubahan iklim yang signifikan.


1. Interaksi Antar Mikroba

Populasi mikroba saling berhubungan dan menjalin hubungan satu sama lain dan dengan organisme yang lebih tinggi taksonnya. Biasanya hubungan tersebut terkait nutrisi, meskipun manfaat lain dapat diperoleh, dan hubungan tersebut dapat menjadi penting bagi kelangsungan hidup salah satu atau keduanya. Ada beberapa macam asosiasi, yaitu, amensalisme dan kompetisi, mutualisme, protooperation parasitisme, sinergisme dan komensalisme antara organisme. Odum (1971) telah mengelompokkan asosiasi mikroba sebagai berikut:

- Netralisme, di mana dua mikroba bekerja sepenuhnya secara otonom;
- Simbiosis, dua simbiosis saling mengandalkan dan saling menguntungkan;
- Protooperation, hubungan keuntungan timbal balik untuk dua spesies tetapi tanpa kerjasama yang wajib untuk kelangsungan hidup mereka;
- Komensalisme, di mana hanya satu spesies memperoleh keuntungan sementara yang lain tidak berubah;
- Kompetisi, situasi di mana ada represi satu organisme karena dua spesies berjuang untuk menggunakan O_2 , ruang, nutrisi, atau kebutuhan umum lainnya.
- Amensalisme, di mana satu spesies dirugikan sementara yang lainnya tidak terpengaruh (tidak untung dan tidak rugi), biasanya terkait dengan hasil produksi toksin;
- Parasitisme dan Predasi, serangan langsung dari satu individu ke individu lain, menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya;
- Sinergisme, asosiasi antara kedua spesies, yang tidak saling mengganggu, akan tetapi aktivitas masing-masing justru merupakan urutan yang saling menguntungkan.

2. Interaksi Mikroba-Tanaman

Tanaman berinteraksi dengan sejumlah besar mikroba yang ada di lapisan atas tanah dan ditemukan pada daun dan batang. Tanaman adalah sumber utama nutrisi bagi mikroba yang membutuhkan bahan organik sebagai sumber karbon utama. Tanaman menyediakan nutrisi melalui pelepasan daun, serbuk sari, atau melalui eksudat atau jaringan mati secara tidak langsung. Dalam beberapa kasus, nutrisi diberikan langsung ke mikroba yang membentuk hubungan dekat dengan tanaman. Asosiasi dengan tanaman dapat bervariasi, mulai dari yang sangat merusak tanaman, seperti patogen berbahaya melalui pertukaran, yang tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman, hingga yang menguntungkan seperti yang membentuk simbiosis dengan fungi mikoriza atau bakteri pengikat nitrogen. Untuk sebagian besar mikroba, asosiasi dengan tanaman yang tumbuh berkembang tidak lebih dari kolonisasi permukaan batang, daun, dan akar karena merupakan daerah di mana eksudat dapat diakses (Arora, 2013). Mikrobioma tersebut pada tumbuhan dapat membentuk komunitas yang berbeda, seperti yang berasal dari rhizosfer, endosfer, atau filosfer (Gambar. 2.1).



Gambar 2.1 Penggambaran skema sumber utama mikroba yang membentuk komunitas bersama tumbuhan: rhizosfer, endosfer, dan filosfer yang menunjukkan peran sumber ekologis untuk komposisi komunitas mikroba terhadap tanaman (Arora, 2013)

a. Rhizosfer dan Eksudat Akar

Rhizosfer merupakan perbatasan antara akar tanaman dan tanah di mana komunikasi di antara banyak invertebrata serta mikroba mempengaruhi pertumbuhan tanaman, siklus biogeokimia, dan relung yang sesuai bagi strain biotik dan abiotik. Zona ini diramalkan oleh mikroba dari berbagai jenis di sekitar akar, dinamakan sebagai rhizosfer. Akar mengeluarkan sejumlah besar gula, asam amino, hormon, dan vitamin, yang mendorong pertumbuhan fungi dan bakteri sehingga organisme-organisme tersebut sering membentuk mikrokoloni di permukaan akar. Akar umumnya mengandung sedikit atau bahkan tidak ada kolonisasi mikroba. Namun dengan

kemajuan dalam pertumbuhan tanaman di dalam tanah, eksudat akar, yang terdiri dari kombinasi 10 gula, 10 asam organik, sekitar 18 asam amino, lendir, dll, bersama dengan sel lain atau akar, dan itulah yang mempengaruhi kolonisasi mikroba. Bahan kimia dalam bentuk eksudat akar, yang dilepaskan di dekat rhizosfer tanaman, diketahui berasal dari kelompok karbohidrat, fenol, asam organik, protein, dan lipid bersama dengan komponen seluler lainnya. Eksudat akar telah dikelompokkan dan terutama diklasifikasikan ke dalam dua kelas utama, yaitu senyawa dengan berat molekul tinggi seperti polisakarida dan protein dan senyawa dengan berat molekul rendah seperti asam amino, asam organik, gula, senyawa fenolik, dan metabolit sekunder lainnya. Dari molekul-molekul ini, hanya sedikit yang terkait dengan pembentukan bagian-bagian penting dari komunitas mikroba (umumnya dimetabolisme oleh sejumlah besar organisme tanah, misalnya, glukosa), tetapi senyawa lain yang dilepaskan mampu mengaktifkan kelompok organisme yang tepat (yang terkait dengan pensinyalan dan taksi kemo, misalnya, flavonoid).

Komposisi kuantitatif dan kualitatif pancaran akar tanaman umumnya ditentukan oleh jenis tanaman, tahap perkembangan tanaman, kultivar, dan berbagai faktor lingkungan, termasuk pH tanah, suhu, jenis tanah, serta keberadaan mikroba di dalam tanah. Perbedaan ini membentuk komunitas mikroba di rhizosfer yang memiliki tingkat kekhususan tertentu untuk setiap spesies tanaman (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Hassan et al., 2019; Jacoby et al., 2017; Khare et al., 2020; Liu et al., 2020; Meena et al., 2017a, 2017b; R. K. Singh et al., 2017).

1) Mekanisme Eksudasi Akar

Komunitas tumbuhan menggunakan berbagai mekanisme transportasi untuk mengeksport dan memancarkan senyawa di

rhizosfer tanah. Biasanya, akar dapat melepaskan eksudat akar melalui mekanisme aktif atau pasif masing-masing melalui sekresi atau difusi. Mayoritas senyawa organik dengan berat molekul rendah dilepaskan dari tanaman melalui proses pasif. Molekul polar kecil dan tidak bermuatan dibangkitkan oleh difusi pasif langsung, suatu prosedur yang bergantung pada permeabilitas membran, polarisasi senyawa yang dikeluarkan, dan pH sitosol. Sel akar tanaman melepaskan zat tambahan, seperti polisakarida yang dihasilkan, protein, dan turunan metabolik lainnya, dengan bantuan berbagai protein yang terikat membran. Protein pembawa ini terdiri dari transporter kaset pengikat ATP (ABC), kelompok *multidrug* and *toxic compound extrusion* (MATE), keluarga super fasilitator kunci, dan keluarga transporter malat yang diaktifkan aluminium. Meskipun fungsi rinci dari protein transpor terikat membran ini tidak dinyatakan dengan baik, mereka telah dihubungkan dengan transfer berbagai senyawa ke dalam rhizosfer. Banyak gen MATE memainkan peran penting dalam mengeksport senyawa yang berbeda, seperti alkaloid yang berasal dari tumbuhan, senyawa beracun, antibiotik, anion sitrat, dan senyawa fenolik, keluar dari sel-sel akar tanaman, yang telah diidentifikasi dan dikarakterisasi dalam Arabidopsis dan sorgum (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Hassan et al., 2019; Jacoby et al., 2017; Khare et al., 2020; Liu et al., 2020; Meena et al., 2017b; R. K. Singh et al., 2017).

2) Interaksi Rhizosfer


Eksudat Akar dan Interaksi Tanaman-Mikroba

Dalam dekade terakhir, cara eksudat akar memediasi interaksi rhizosfer telah dipelajari secara ekstensif (Gambar 2.2). Fitokimia yang dikeluarkan oleh akar tanaman dapat mengintervensi sejumlah koneksi, seperti tanaman-tanaman, tanaman-mikroba,

dan tanaman-fauna. Interaksi ini berbeda dari netral hingga menguntungkan atau merugikan. Dalam beberapa kasus, mikroba dapat berubah dari patogen menjadi simbiosis tergantung pada kondisi lingkungan. Misalnya, rhizobia, bakteri pengikat nitrogen (N) simbiosis, berkisar dari simbiosis hingga interaksi netral dengan tanaman berdasarkan kadar nitrogen dalam tanah. Lebih lanjut, di bawah kondisi yang membatasi N, legum mengeluarkan lebih banyak flavon dan flavonol untuk menarik dan memulai simbiosis legum-rhizobia. Dengan cara yang sama, hubungan simbiosis mikoriza diatur oleh pertukaran nutrisi dan manfaat yang sama untuk setiap anggota. Seperti, misalnya, dalam percobaan pada *Medicago truncatula* Gaertn, ditemukan bahwa semakin banyak karbon yang diberikan kepada mitra mikoriza, mikoriza pada gilirannya memberi tanaman lebih banyak fosfor (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Hassan et al., 2019; Jacoby et al., 2017; Khare et al., 2020; Liu et al., 2020; Meena et al., 2017b; R. K. Singh et al., 2017)..

Fungsi Mikrobioma Rhizosfer

Mikroba dari rhizosfer memainkan peran penting dalam kekuatan ekologis tanaman inang. Proses mikroba yang memberikan peran signifikan di rhizosfer terdiri dari patogenesis, perlindungan tanaman/ peningkatan pertumbuhan, sintesis antibiotik, kolonisasi tanaman, dan daur ulang nutrisi agar tersedia bagi tanaman.



Gambar 2. 2 Eksudat akar mengintervensi sejumlah besar interaksi rhizosfer: pada tingkat spesies (sisi kanan), interaksi multitrofik (bawah), dan pada tingkat komunitas (sisi kiri) (Arora, 2013)

Interaksi tanaman-mikroba seperti demikian dapat dianggap menguntungkan, netral, atau merugikan tanaman, tergantung pada mikroba spesifik dan tanaman yang bersangkutan dan pada situasi lingkungan yang ada. Menjelajahi mikroba, dengan memilah-milah kemungkinan interaksi dengan komunitas tumbuhan, telah

membuka area baru yang menarik untuk eksperimen dalam penelitian rhizosfer.

3) Fungsi mikroba yang menguntungkan

Interaksi mikroba menguntungkan tanaman dapat kurang lebih dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, mikroba yang, bersama dengan tanaman, bertanggung jawab atas nutrisinya (misalnya mikroba yang menambah pasokan nutrisi mineral ke tanaman). Dalam hal ini, meskipun sebagian besar mikroba mungkin tidak berbaaur langsung dengan tanaman, dampaknya terhadap faktor abiotik dan biotik tanah tidak diragukan lagi berdampak pada pertumbuhan tanaman. Sekali lagi, ada kelompok mikroba, yang didokumentasikan sebagai agen biokontrol, yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara tidak langsung, melalui pencegahan aktivitas patogen. Kelompok ketiga yang terdiri dari mikroba, yang diketahui menghasilkan fitohormon, bertanggung jawab untuk promosi pertumbuhan tanaman secara langsung. Di sisi lain, tampaknya hubungan netral ditemukan secara luas di rhizosfer semua tanaman pangan. Saprofit bertanggung jawab untuk berbagai proses tanah penting, seperti mineralisasi nutrisi tanah terkait atau proses pergantian dan dekomposisi residu organik di tanah. Sementara organisme tersebut tidak menguntungkan atau merugikan tanaman secara langsung, tidak adanya mikroba tersebut pasti akan mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tanaman, dan kehadiran mereka jelas penting untuk dinamika tanah.

Bakteri, yang hidup di rhizosfer, mendukung pertumbuhan tanaman secara global dan disebut sebagai PGPR, yaitu rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Jumlah bakteri, yang dikenal sebagai PGPR, telah ditemukan meningkat akhir-akhir ini, karena berbagai penelitian lanjutan dalam taksonomi bakteri dan pemahaman yang

lebih baik mengenai mekanisme kerja berbagai PGPR, yang mencakup koleksi spesies tanaman yang lebih luas juga. Saat ini, PGPR terdiri dari anggota dari berbagai kelas taksonomi bakteri dan kita akan membahas beberapa contoh untuk menggambarkan cara fungsi dan keanekaragaman hayati komunitas bakteri tersebut. Berbagai macam PGPR yang bermanfaat telah dimanfaatkan secara menguntungkan untuk inokulasi tanaman tanaman yang mencakup anggota dari genus *Azospirillum*, *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Stenotrophomonas*, *Serratia* dan *Rhizobium*. *Rhizobium* dan beberapa fungi dari genus *Trichoderma*, *Coniothyrium*, dan *Ampelomyces* juga telah dijelaskan bermanfaat bagi tanaman inang. Cara kerja PGPR ini memiliki mekanisme yang kompleks untuk mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan tanaman. Penting di antaranya adalah biofertilisasi (meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman), fitostimulasi (peningkatan pertumbuhan tanaman melalui produksi fitohormon), dan biokontrol (pengendalian penyakit, terutama melalui produksi berbagai metabolit antibiotik serta antifungi dan enzim litik dan induksi pertahanan tanaman. tanggapan). Genus *Bacillus* dan *Pseudomonas* diketahui paling dominan di antara kelompok PGPR dari rhizosfer. Disebutkan bahwa dalam beberapa contoh mengenai hubungan baik individu antara tanaman dan mikroba, berbagai mekanisme sebenarnya terlibat di dalamnya. Fungsi promosi pertumbuhan tanaman langsung cukup rumit untuk dibedakan dari pengendalian penyakit, dan signifikansi komparatif pada metode tertentu dapat berbeda dalam sistem patogen yang berbeda.

Penghambatan Patogen

Bakteri dan fungi hidup di daerah akar dan mendapatkan nutrisi dari eksudat akar dan sel-sel akar yang mati. Persaingan di antara spesies mikroba di wilayah ini sangat ketat. Dalam perjuangan

untuk ketekunan dan keamanan di ceruk, bakteri menggunakan sejumlah strategi.

Antagonisme

Kolonisasi akar tidak hanya menghasilkan kepadatan penduduk PGPR yang tinggi dalam sistem akar, tetapi juga memberikan metabolit antagonis yang berkaitan dengan penghambatan langsung patogen tanaman. Ini termasuk penghambatan pertumbuhan mikroba, yaitu antibiosis, dengan penggunaan antibiotik difusibel atau senyawa organik volatil, biosurfaktan, dan racun dan mekanisme parasitisme, yang mungkin melibatkan sintesis enzim ekstraseluler yang dapat mendegradasi dinding sel, seperti kitinase dan 1,3-glukanase. Degradasi faktor patogenisitas untuk patogen, seperti zat beracun yang dilepaskan oleh organisme yang menguntungkan, juga telah dicatat sebagai mekanisme perlindungan. Untuk menunjukkan fungsi antibiotik dalam proses biokontrol, mutan yang terganggu dalam proses biosintesis atau mutan dengan kebiasaan produksi berlebih telah digunakan bersama-sama dengan, dalam beberapa kasus, gen reporter, atau probe telah digunakan untuk menjelaskan produksi senyawa yang efisien. di rhizosfer. Misalnya, strain *Bacillus subtilis* ditemukan mengembangkan sejumlah metabolit antifungi yang kuat, yaitu, kanosamine, zwittermicin A, dan lipopeptida dari famili fengycin, iturin, dan surfactin. Kelebihan sintesis protease ekstraseluler di *Stenotrophomonas maltophilia* W81, galur mutan, telah dilaporkan meningkatkan biokontrol *Pythium ultimum*. Pelepasan glukanase dan kitinase oleh spesies *Streptomyces* dan *Trichoderma* telah dilaporkan memainkan peran penting dalam miko-parasitisme fungi fitopatogenik.

Kolonisasi

Untuk semua koneksi tanaman-mikroba yang berkembang, kemampuan untuk menjajah habitat tanaman sangat penting. Sel bakteri yang berbeda dapat menempel pada permukaan dan, setelah pembelahan dan perbanyakkan sel, membentuk agregat padat yang biasanya disebut sebagai koloni makro atau biofilm. Langkah-langkah kolonisasi terdiri dari atraksi, deteksi, kepatuhan, incursi (mikroba patogen dan endofit saja), diikuti oleh kolonisasi dan pertumbuhan, serta beberapa strategi lain untuk pembentukan koneksi. Akar mulai berbicara silang dengan mikroba tanah dengan menghasilkan sinyal yang diterima oleh mikroba, yang pada gilirannya menghasilkan sinyal yang memicu kolonisasi. PGPR mencapai permukaan akar melalui motilitas aktif menggunakan flagela dan dipandu oleh respons kemotaktik. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan PGPR sangat bergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan situasi yang tepat atau pada kemampuannya untuk terbiasa dengan berbagai kondisi atau spesies tanaman. Pada sebagian besar kasus, setelah 2-3 minggu, populasi PGPR menurun secara progresif dengan waktu setelah inokulasi dari 107.109 sel per gram tanah kering menjadi 105.106 sel per gram tanah kering. Namun ambang populasi tersebut tetap memadai untuk memberikan efek positif. Akibatnya, kemampuan rhizosfer dari agen biokontrol melibatkan kolonisasi akar yang sukses bersama dengan kemampuan untuk hidup dan berkembang biak di sisi akar tanaman yang tumbuh dalam waktu yang lama, di hadapan mikroflora asli.

Kompetisi

Persaingan untuk sumber daya seperti oksigen dan nutrisi umumnya terjadi antara organisme yang menghuni tanah. Untuk biokontrol, terjadi persaingan, sedangkan antagonis bersaing

langsung dengan mikroba patogen untuk berbagai sumber daya.
Menghuni akar

mikroba bersaing untuk mendapatkan tempat yang sesuai pada permukaan akar. Persaingan untuk unsur hara, seperti karbon, dianggap bertanggung jawab atas kejadian fungistasis, yang mengarah pada penekanan perkecambahan spora fungi. Mengingat, kelimpahan komparatif substrat dari rhizosfer, khasiat penyerapan nutrisi, dan katabolisme oleh komunitas bakteri merupakan faktor utama untuk daya saing. Kapasitas untuk pertumbuhan yang cepat ketika substrat ditemukan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kompetensi rhizosfer, karena rhizobakteri menyebarkan banyak strategi metabolisme lainnya. Sebagai, misalnya, kapasitas untuk konversi ekstraseluler glukosa menjadi asam glukonat dan asam 2-ketoglukonat memungkinkan beberapa bakteri, bersama dengan beberapa spesies dari genera *Pseudomonas*, untuk berhasil menyita glukosa dan memberikan beberapa keuntungan agresif atas mikroba yang kekurangan kemampuan untuk memanfaatkan senyawa ini.

Kompetisi untuk elemen pelacak, seperti besi, seng, mangan, tembaga, dll, juga terjadi di tanah. Sebagai, misalnya, besi merupakan elemen yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan semua organisme yang ada dan kurangnya bentuk bioavailable di habitat tanah menghasilkan dan persaingan marah Siderofor, senyawa dengan berat molekul yang lebih rendah dan afinitas yang lebih tinggi untuk besi, disintesis oleh beberapa mikroba atau sebagian besar agen biokontrol untuk melarutkan dan mendapatkan ion besi secara kompetitif di bawah kondisi penahan besi yang selanjutnya membuat elemen tersebut tidak tersedia untuk mikroba lain. dari tanah yang tidak dapat berkembang tanpa besi. Mikroba, yang memiliki sifat produksi siderofor, sebaliknya,

dapat mengambil kompleks besi-siderofor dengan menggunakan reseptor tertentu yang terletak di membran sel luar. Penekanan patogen tular tanah dari berbagai tanaman, oleh *Pseudomonas*, melalui produksi siderophore juga telah dilaporkan oleh banyak penulis.

Induksi resistensi

Bakteri, berasosiasi dengan tanaman, mengurangi aksi patogen melalui antagonisme mikroba bersama dengan mengaktifkan tanaman untuk mekanisme pertahanan yang lebih baik, sebuah fenomena yang disebut "resistensi sistemik yang diinduksi".

Kadang-kadang, metode resistensi sistemik yang diinduksi, yang ditimbulkan oleh rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman, tumpang tindih sampai batas tertentu dengan resistensi yang didapat secara sistemik, yaitu, SAR patogen. Kedua mekanisme berdiri untuk kondisi peningkatan konfrontasi basal tanaman, yang tergantung pada senyawa sinyal seperti asam jasmonic, etilena, dan asam salisilat. Respons pertahanan alami terhadap tekanan dari asal biotik atau abiotik seperti stres fisik (panas atau beku), inokulasi oleh organisme patogen atau nonpatogen, dan molekul kimia dari asal alami atau sintetis ditunjukkan oleh semua tanaman.

Rhizobakteri Pemacu Pertumbuhan Tanaman

Sistem peningkatan kinerja tanaman oleh rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman PGPR terus dieksplorasi secara mendalam. Sejumlah inokulan PGPR yang dikomersialkan saat ini umumnya mendukung augmentasi pertumbuhan tanaman, melalui salah satu mekanisme berikut:

- Produksi bio-stimulan atau fitohormon
- Penghambatan infeksi tanaman sebagai bioprotektan

- Peningkatan perolehan nutrisi sebagai pupuk hayati

PGPR sebagai pupuk hayati bekerja baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyediakan unsur hara bagi tanaman inang dan mempengaruhi pertumbuhan akar dan morfologi tanaman secara positif atau melalui interaksi simbiosis tambahan yang menguntungkan. Contoh utama dari hubungan semacam itu adalah fiksasi nitrogen oleh bakteri. Simbiosis antara tanaman leguminosa dan rhizobia adalah salah satu contoh penting PGPR. Bakteri dari kelompok ini dapat memetabolisme eksudat akar yang terutama karbohidrat dan memasok nitrogen ke tanaman inang sebagai imbalan untuk produksi asam amino. Bakteri yang hidup bebas seperti *Azospirillum*, *Burkholderia*, dan *Stenotrophomonas* juga memiliki kemampuan mengikat nitrogen. Satu lagi unsur hara yang dapat diberikan kepada tanaman melalui oksidasi oleh bakteri adalah sulfat. Bakteri juga dapat memasok nutrisi tanaman dengan melepaskan fosfor dari sumber organik seperti fitat dan karenanya membantu dalam promosi pertumbuhan tanaman secara tidak langsung. Penggunaan *Azospirillum* menghasilkan peningkatan pertumbuhan akar dan aktivitas yang meningkatkan penyerapan fosfor bersama dengan unsur makro dan mikro lainnya. *Pseudomonas fluorescens* CHAO memiliki kemampuan mengasamkan lingkungannya dan melarutkan mineral fosfat, yang sangat bergantung pada kemampuannya memproduksi asam luconic.

Fitostimulasi

Fitostimulasi meningkatkan pertumbuhan tanaman secara langsung. Fitohormon [misalnya, produksi asam indole-3-asetat (IAA), auksin, sitokinin, dan giberelin] memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan tanaman. Fitohormon tersebut dapat diproduksi oleh tanaman itu sendiri maupun oleh mikroba sekutu

mereka, seperti, misalnya, *Azospirillum* spp., di samping kapasitasnya untuk mengikat nitrogen atmosfer. Spesies dari genera *Bacillus* dan *Pseudomonas* dapat mensintesis zat pengatur tumbuh atau fitohormon yang membantu tanaman memiliki jumlah akar halus yang lebih banyak yang memiliki efek meningkatkan daya serap permukaan akar tanaman untuk penyerapan air dan nutrisi. Mereka dapat menghasilkan fitohormon seperti giberelin, sitokinin, asam indoleasetat, dan penghambat produksi etilen. Asam indole-3-asetat adalah fitohormon yang terlibat dalam pembelahan sel, inisiasi akar, serta pembesaran sel tanaman. Auksin adalah fitohormon yang paling banyak secara kuantitatif, yang dikeluarkan oleh *Azospirillum* spp., dan sintesisnya, lebih disukai daripada fiksasi nitrogen, adalah faktor utama yang bertanggung jawab untuk mendorong perakaran tanaman yang banyak dan, dengan demikian, meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, bakteri yang berasosiasi dengan tanaman dapat mempengaruhi keseimbangan hormonal tanaman. Etilen adalah contoh penting untuk menggambarkan fakta bahwa stabilitas sangat penting untuk hasil hormon: pada tingkat yang lebih rendah, dapat mendukung pertumbuhan tanaman dalam beberapa spesies bersama-sama dengan tanaman *A. thaliana*, sedangkan umumnya dianggap sebagai penghambat terhadap perkembangan tanaman dan dikenal sebagai hormon penuaan. Pengaruh umum terhadap tanaman dapat bersifat langsung, yaitu melalui pemacu pertumbuhan tanaman, atau tidak langsung, yaitu melalui perbaikan nutrisi tanaman melalui perkembangan yang lebih baik dari akar tanaman, dan sulit untuk membedakannya. Peningkatan tingkat IAA akar untuk planlet pinus lodgepole, terinfeksi *Paenibacillus polymyxa*, serta konsentrasi akar dihidroksizeatin ribosida dalam kasus tanaman diinokulasi menggunakan *Pseudomonas fluorescens*, dapat diakreditasi untuk

orientasi sintesis hormon tanaman oleh spesies bakteri. Namun, penyerapan fitohormon yang disintesis bakteri tidak dapat dipisahkan, karena baik *P. polymyxa* dan *Pseudomonas* menghasilkan IAA dan sitokinin secara *in vitro*.

Fungsi Patogen

Eksudat akar dapat menarik populasi yang menguntungkan dan patogen yang mungkin virulen untuk beberapa inang. Banyak patogen, fungi dan bakteri, telah berevolusi dan menunjukkan tingkat spesifisitas inang yang lebih tinggi. Tanaman juga tidak lepas dari pertahanan. Faktanya, ditemukan bahwa sekitar 2% dari spesies fungi yang teridentifikasi mampu berkolonisasi pada tanaman sehingga dapat menyebabkan infeksi pada tubuh tanaman. Meskipun tanaman tetap berada dalam kontak konstan dengan patogen fungi, bakteri, atau virus yang ganas, kontaminasi yang berhasil hampir tidak dikenali. Ini karena konfrontasi umum yang bertentangan dengan sebagian besar patogen seperti itu, yang disebut sebagai "resistensi bukan inang" atau "resistensi horizontal," ditemukan di tubuh tanaman. Hal ini memperkuat konsep bahwa tanaman tidak selalu cocok sebagai target infeksi oleh kelompok patogen tertentu karena mekanisme oposisi refleksif yang terjadi setelah "ketidakcocokan dasar." Seperti mekanisme resistensi terdiri dari penghalang konfigurasi dan bahan kimia beracun yang ada di tanaman yang kuat, infeksi kemenangan terikat patogen tertentu, yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan faktor-faktor ini dan dengan demikian mengungkapkan "kecocokan dasar." Namun, bahkan jika kontak dikenali dengan tanaman, mikroba patogen sering dihadapkan dengan senyawa beracun bernama phytoanticipins. Frasa ini terdiri dari serangkaian komponen yang dibentuk oleh berbagai jalur biosintetik yang memperoleh karakteristik antimikroba. Metabolit

yang dihasilkan dari massa molekul rendah tersebut terutama disimpan dalam bentuk inert dalam organel atau vakuola dan dikeluarkan pada penghancuran sel. Sementara penghancuran integritas jaringan tanaman inang merupakan komponen mekanisme kolonisasi oleh tubuh fungi, fitoanticipin melambangkan strategi konfrontasi yang signifikan dalam melawan patogen tersebut. Meskipun, dalam beberapa kasus, tubuh patogen menaklukkan rintangan yang terbentuk sebelumnya dari tanaman inang dan dapat memperluas kontaminasi virulen yang mengarah pada penyakit pada tubuh tanaman.

Penyakit tanaman berpartisipasi langsung dalam pemberantasan harta benda biasa dari pertanian. Khususnya, patogen tular tanah memberikan lebih banyak kerugian, karena fungi tetap paling tidak bersahabat dari tanah. Efek merugikan mereka berkisar dari gejala tenang hingga bencana di mana seluruh ladang dengan hasil pertanian dapat hancur. Akibatnya, mereka menjadi ancaman yang gigih dan utama terhadap stabilitas ekosistem dan fungsi produksi pangan di seluruh dunia. Agen bakteri yang paling umum terdiri dari bakteri Gram-positif *Streptomyces scabies* dan bakteri Gram-negatif *Ralstonia* spp., *Erwinia carotovora*, dan *Pseudomonas*, Oomycetes dan fitopatogen fungi termasuk anggota dari genus *Rhizoctonia*, *Rhizopus*, *Fusarium*, *Pythium*, *Phytophthora*, dan *Verticillium*. Di antara patogen hutan, yang signifikan adalah fungi berfilamen seperti *Phytophthora* spp. dan *Armillariella* dan *Heterobasidion*.

b. Filosfer: Komunitas Tumbuhan dengan Mikrobioma

Komponen kedua dari interaksi tanaman-mikrobioma terdiri dari mikroba yang mengkolonisasi area di atas permukaan tanah atau bagian luar jaringan tanaman, yaitu filosfer. Filosfer adalah habitat alami dan banyak dihuni oleh mikroba yang umumnya merupakan mikroba aerobik. Terminologi ini umumnya digunakan untuk

menggambarkan area permukaan daun meskipun dapat diterapkan pada jaringan tanaman manapun.

Komunitas mikroba dari filosfer memiliki peran yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Melindungi komunitas tumbuhan dari serangan patogen, fiksasi nitrogen atmosfer, biosintesis fitohormon, penyerapan karbon, dll., adalah beberapa fungsi yang penting untuk praktik pertanian berkelanjutan. Komunitas filosfer terutama terdiri dari bakteri, alga, fungi, dan nematoda atau protozoa. Bakteri adalah komunitas yang paling banyak di antara mikroba ini yang ditemukan antara 10^5 dan 10^7 sel per cm^2 dari area filosfer. Komunitas ini terkadang dapat ditemukan jauh dari rhizosfer, sumber utama mikroba terkait tumbuhan, dan ditemukan menunjukkan tingkat kolonisasi yang lebih tinggi, sebagian besar didorong oleh pergerakan aliran udara serta vektor. Organisme dari filosfer dapat berkembang dan bertahan hidup bahkan di bawah lingkungan ekologi oligotrofik dengan radiasi ultraviolet, aksesibilitas nutrisi terbatas, dan kondisi pH, suhu, dan kelembaban yang bervariasi.

Udara bersama dengan aerosol, tanah, dan kelembaban adalah sumber utama yang membingkai komunitas dari filosfer. Interaksi antara faktor ekologi yang berbeda dapat mengubah komunitas mikroba dari filosfer. Struktur genom tanaman adalah salah satu pendorong utama, yang menentukan komposisi komunitas bakteri di filosfer di hutan beriklim sedang dan hutan tropis. Komunitas tanaman yang beragam menjangkar mikroba yang berbeda, karena penciptaan ceruk yang tepat dan keadaan terbatas yang diatur oleh aktivitas metabolisme yang diwariskan dan efisien dari tanaman. Keunikan filosfer dilaporkan pada tanaman kacang-kacangan, selada, mentimun, jagung, dan rerumputan dengan perubahan kelimpahan dan pembentukan komunitas bakteri.

Keterpencilan geologis juga merupakan pemain penting lainnya dalam mengonfigurasi komunitas mikroba di filosfer. Komunitas bakteri beragam yang ditambahkan oleh anggur memanipulasi keunggulan anggur yang dihasilkan. Dalam pandangan yang lebih komprehensif, perubahan intraspesifik dalam komposisi komunitas mikroba di filosfer dapat diperhatikan, terutama diatur oleh kondisi nutrisi heterogen, ditemukan di permukaan daun, di mana sumber karbon heterogen seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa mengarah ke kolonisasi mikroba yang tepat pada urat daun, daerah yang dekat dengan pelengkap eksterior dan stomata, heterogenitas tersebut dalam beberapa kasus didukung oleh asosiasi mikroba dalam biofilm yang merupakan karakteristik umum organisme dari filosfer, berfungsi sebagai pelindung dan agregator sel bakteri. dalam keadaan biasa yang tidak menyenangkan. Terlepas dari contoh tersebut, kemungkinan untuk mendeteksi inti untuk populasi mikroba dari filosfer yang menjajah tanaman inang, dari filum *Actinobacteria*, *Bacteroidetes*, *Firmicutes*, dan *Proteobacteria*. Filum ini terdiri dari mikroba yang paling banyak dan diperiksa dengan baik yang menandakan fakta bahwa penelitian tambahan mengenai masalah ini harus direncanakan untuk menilai peringkat taksonomi di luar filum. Akibatnya, inti ini diasumsikan terbuat dari mikroba yang menggambarkan sejarah evolusi bersama dengan komunitas tumbuhan, bersama dengan struktur inang yang melengkapi spesifikasi yang ditemukan di dalam sel bakteri. Cadangan mikroba tersebut dapat dimanfaatkan untuk keuntungan praktik pertanian yang mendukung gerakan dan asosiasi yang sinergis, yang dapat merangsang pertumbuhan dan/ atau pertahanan tanaman dalam melawan serangan komunitas patogen.

c. Endosphere

Keberadaan sel-sel mikroba di jaringan bagian dalam tanaman telah dijelaskan sejak lama sama seperti infeksi tanaman. Pada saat itu, mikroba di dalam jaringan tanaman merupakan individu yang mampu mengkontaminasi tanaman inang, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta kehilangan hasil. Asosiasi tersebut disebabkan karena aksesibilitas metode untuk mendeteksi koneksi mikroba waktu itu hanya mahir dalam membuat mikroba yang mudah dibudidayakan atau ditemukan dalam jumlah besar. Terjadinya infeksi mikroba nonpatogen dalam jaringan tanaman terungkap bahwa mikroba terdapat dalam jaringan tanaman yang diperiksa secara mikroskopis. Pemeriksaan tersebut tetap tidak diketahui sampai endofit didefinisikan. Endofit umumnya didefinisikan berdasarkan kemampuan untuk melihat sel-sel mikroba dari jaringan tanaman yang telah disterilisasi permukaan sebelumnya telah memberikan bagian dari siklus hidup mereka menjajah jaringan internal tanaman tanpa menyebabkan kerusakan nyata pada inang. Pada pemeriksaan yang lebih lengkap, endofit dibagi dalam subkelompok "wajib" dan "fakultatif" oleh para peneliti. Endofit, yang bergantung pada metabolisme inang melalui aktivitas vektor atau transmisi vertikal, diklasifikasikan sebagai obligat. Endofit, mereka yang hidup di permukaan luar tanaman inang di beberapa titik siklus hidup mereka, dikenal sebagai yang fakultatif. Mereka direkrut oleh tanaman inang dari komunitas tetangga dari massa tanah, terutama dari rhizosfer. Endofit terdapat di setiap jaringan dalam tumbuhan. Keberadaan endofit pada tanaman yang dikultur in vitro telah dijelaskan, di mana organisme tersebut tampaknya berhubungan erat dengan tanaman inang tidak dengan cara menjajah media kultur tetapi lebih disukai hidup di dalam jaringan tanaman menunjukkan bahwa endofit *Burkholderia* spp

yang mendominasi perakaran jagung (Hafsani et al., 2018) memiliki kapasitas untuk mengatur pertumbuhan patogen *Fusarium moniliforme*. Diazotrof endofit dari akar tebu mampu menghasilkan zat yang terkait dengan fungsi pemacu pertumbuhan tanaman dan dapat memancarkan asam amino dalam jumlah yang lebih besar yang dapat membantu nutrisi tanaman. Seluruh komunitas endofit dipengaruhi oleh terjadinya patogen dan timbulnya penyakit seperti klorosis beraneka ragam pada jeruk merupakan konsekuensi dari hubungan antara komunitas endofit dan patogen *X. fastidiosa* dan bukan dengan inangnya saja. Kemampuan endofit yang dikustomisasi secara genetik yang menghasilkan protein heterolog cry1Ac7 dapat mengendalikan *Diatraea saccharalis*, hama tebu. Meskipun banyak kemampuan individu telah dijelaskan untuk endofit, organisme tersebut, sebagai komunitas, cukup kompeten untuk beberapa fungsi lain yang tidak dapat dideteksi dari studi kasus terpisah pada mikroba.

Sejumlah penelitian dilakukan untuk menemukan asal usul organisme endofit. Asal usul mikroba, yang berada di rhizosfer atau yang terbawa benih, terkait erat dengan strategi pengawetan yang sama di dalam tanaman inang yang menegaskan difusi mikroba endofit antar tanaman. Bukti mekanisme penularan serta kelangsungan hidup endofit spesifik dan interaksinya dengan tubuh tumbuhan ditunjukkan melalui organisasi genomiknya. Ukuran dan asal-usul banyak genom endofit. Para ilmuwan mengaitkan gaya hidup mikroba dengan ukuran genom untuk mendeteksi penyimpangan dalam kondisi ekologis sebagai salah satu pendorong utama perluasan atau penyusutan genom. Endosimbion biasanya memiliki genom yang lebih padat, sementara bakteri dari relung dari berbagai kondisi ekologis seperti rhizosfer perlu menyimpan cache gen yang lengkap untuk bertahan hidup di bawah

situasi lingkungan yang beragam, yang mengarah ke dominasi genom yang lebih besar. Rupanya, endofit tampaknya cocok dengan bagian teori sebelumnya karena mereka ada di dalam tubuh tumbuhan, di mana lingkungan lebih aman dibandingkan dengan rhizosfer. Namun demikian, dengan mempertimbangkan asal dan transmisi endofit, dikatakan bahwa beberapa endofit harus berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda selama siklus hidup mereka ketika mereka tetap berada di luar tanaman inang. Penyimpangan yang lebih besar dalam ukuran genom bakteri endofit, yang menunjukkan bahwa komunitas endofit terdiri dari mikroba dari berbagai asal. Mereka yang memiliki genom lebih besar cenderung hidup di lingkungan yang bervariasi seperti tanah atau rhizosfer, dan yang memiliki genom lebih kecil akan ditransmisikan secara vertikal dalam lingkungan yang stabil.

BAB III

PENANGANAN STRES BIOTIK DAN ABIOTIK OLEH MIKROBA ENDOFIT



Lompatan kuantum dalam produksi tanaman menjadi tantangan seiring dengan populasi global yang terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan yang sehat dan bergizi juga meningkat. Namun, intensifikasi pertanian dengan penggunaan peralatan pertanian baru, varietas tanaman unggul, pengolahan tanah intensif, irigasi, pupuk kimia, pestisida, dan input manufaktur lainnya; telah berlangsung, seiring dengan kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Tetapi pendekatan-pendekatan ini seringkali berdampak buruk pada ekosistem pertanian yang mengakibatkan kehancuran ekologi dan kesuburan tanah yang cukup besar, kebutuhan irigasi yang tinggi, dll. Ekosistem global juga terancam oleh aktivitas buatan manusia lainnya seperti percepatan konversi lahan hutan menjadi lahan budidaya, perubahan tutupan lahan, gangguan sumber daya alam, dan pencemaran. Tren ini menekan lingkungan dan menghasilkan variasi iklim.

Perubahan iklim dan penyusutan lahan subur ini merupakan ancaman utama bagi produktivitas pertanian. Perubahan lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan, suhu ekstrim, atau salinitas tanah, dll, menyebabkan hilangnya hasil panen. Perubahan iklim telah muncul sebagai ancaman penting bagi ekosistem alam dan sumber utama untuk menciptakan stres. Ini bertindak sebagai stresor baik secara langsung maupun melalui interaksi dengan stresor lainnya. Suhu, kekeringan, salinitas, dan polusi logam berat merupakan faktor stres utama yang terkait

dengan perubahan iklim. Stres lingkungan secara sederhana diklasifikasikan sebagai stres abiotik dan biotik berdasarkan sifatnya. Terkadang cekaman abiotik mempengaruhi cekaman biotik dan menurunkan produktivitas tanaman. Namun, kedua tekanan tersebut dapat disebabkan oleh alam atau manusia. Efek utama dari cekaman ini adalah hilangnya keanekaragaman mikroba tanah, kesuburan tanah, dan kompetisi sumber daya hara yang mengakibatkan penurunan produktivitas pertanian.

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dicapai melalui pembelahan sel, pembesaran sel, dan diferensiasi. Ini melibatkan peristiwa genetik, fisiologis, ekologis, dan morfologis dan interaksi kompleks mereka. Kualitas pertumbuhan tanaman tergantung pada berbagai faktor pembatas abiotik dan biotik. Tanaman perlu mengatasi faktor-faktor ini untuk pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitasnya dan mampu mengatasi kondisi lingkungan yang merugikan ini dengan kemampuan metabolisme intrinsiknya. Seringkali tanaman mengatasi beban tekanan ini dengan dukungan mikrobioma yang mereka huni. Interaksi tanaman-mikroba merupakan bagian integral dari ekosistem yang memodulasi mekanisme lokal dan sistemik pada tanaman. Mereka memberikan dukungan mendasar bagi tanaman dalam memperoleh nutrisi, ketahanan terhadap penyakit, dan menoleransi cekaman abiotik. Mikroba yang menguntungkan baik membentuk asosiasi simbiosis di permukaan atau interaksi endofit di dalam bagian tanaman (Meena, 2018).

Seperangkat fitohormon dan jaringan pensinyalan terkait terlibat dalam memediasi aktivitas promosi pertumbuhan tanaman dan toleransi stres. Endofit mampu mensintesis hormon tanaman seperti asam indole-3-asetat (IAA), giberelin (GAs), dan sitokinin pada tanaman. Hormon tanaman gas etilen memediasi berbagai respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik mereka. Ini adalah hormon multifungsi yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dan respon pertahanan. Namun, itu juga menginduksi atau menghambat penuaan tanaman. Selain itu, konsentrasi etilen berlebih menyebabkan klorosis dan kematian tanaman berikutnya. Puncak biosintesis etilen berkaitan dengan

cekaman lingkungan dan proses pengaturannya bergantung pada konsentrasi dan interaksi kompleksnya dengan hormon lain. Sejumlah bakteri endofit terlibat dalam penurunan konsentrasi etilen tanaman melalui aksi enzim ACC deaminase, enzim yang memecah senyawa ACC, yang merupakan prekursor langsung etilen di semua tanaman tingkat tinggi. Endofit juga mempromosikan sintesis IAA. Di bawah salinitas tinggi, IAA menginduksi keluarga gen ACS yang meningkatkan produksi etilen dengan memanfaatkan 1-aminosiklopropana-1-karboksilat secara efektif. Fungi endofit *Phoma glomer*, dan *Penicillium* sp. secara signifikan mensekresi fitohormon, yaitu IAA dan GAs. Bakteri endofit *Pseudomonas putida* meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui sintesis tanaman auksin IAA. Bakteri endofit, *phingomonas* sp., diisolasi dari daun *Tephrosia apollinea* menghasilkan GAs dan IAA. Kekeringan memicu produksi asam absisat (ABA), yang pada gilirannya menyebabkan penutupan stomata dan menginduksi ekspresi gen yang berhubungan dengan stres. ABA terlibat dalam respons fisiologis penting yang diperlukan untuk adaptasi stres garam seperti homeostasis ion dan air, antioksidan fitohormon lainnya, dan produksi ROS mendokumentasikan bahwa ABA dan GA memainkan peran antagonis dalam mengendalikan banyak proses perkembangan. Endofit *Burkholderia kururiensis* mendorong pertumbuhan tanaman padi melalui produksi auksin tanaman, IAA (Spaepen & Vanderleyden, 2011)

Endofit adalah mikroba nonpatogen (fungi atau bakteri) terkait tanaman yang hidup di dalam lingkungan mikro inang. Mereka menginvasi ruang intraseluler atau interseluler kompartemen tanaman tanpa menyebabkan perubahan morfologi yang signifikan. Mereka terjadi di lingkungan sekitar tanaman inang dan terinfeksi melalui pola yang sama dengan mikroba patogen untuk masuk ke dalam tanaman. Mikroba endofit biasanya masuk ke dalam tanaman melalui bukaan alami seperti hidatoda, stomata dan lentisel, rambut akar, dan luka akibat kerusakan mekanis. Begitu mereka masuk ke dalam inang, mereka berhasil menjajah jaringan tanaman internal dan ditransmisikan ke generasi berikutnya melalui biji atau bagian tanaman vegetatif. Interaksi antara endofit dan tanaman inang dicirikan sebagai hubungan simbiosis. Saat ini,

entophytes menuntut perhatian yang memikat pada produktivitas pertanian, karena mereka mempromosikan pertumbuhan tanaman inang, meningkatkan penyerapan nutrisi mengendalikan/menolak penyakit tanaman, dan meningkatkan toleransi terhadap cekaman abiotik. Selain itu, mereka merupakan faktor penting yang mempengaruhi respon tanaman terhadap perubahan iklim.

1. Mekanisme Endofit Masuk ke Tanaman Inang

Sebuah endofit memasuki endosfer tanaman inangnya sebagian besar melalui tanah dan rhizosfer, dapat juga hadir sebagai endofit setelah diinokulasikan dengan sengaja. Urutan kejadian dalam kolonisasi tanaman oleh bakteri endofit umumnya mirip, terutama pada tahap awal, dengan yang diamati pada bakteri rhizosfer. Secara umum, kolonisasi akar oleh bakteri endofit dimulai dengan pengenalan senyawa spesifik yang dilepaskan dari jaringan akar. Misalnya, senyawa organik tertentu termasuk asam amino yang disekresikan oleh akar tomat dan dilaporkan berfungsi sebagai *chemoattractants* untuk *Pseudomonas fluorescens* strain WCS365. Setelah dilepaskan, bakteri merasakan molekul-molekul ini dan merespons lingkungan sekitarnya melalui sistem sensor dua komponen. Dalam sistem dua komponen tersebut, komponen pertama biasanya terdiri dari protein tunggal dengan domain transmembran input dan output dan tidak memiliki domain penerima, sedangkan komponen kedua hanya memiliki fosfotransfer histidin kinase. Sistem dua komponen ini telah dilaporkan bertanggung jawab atas pengenalan senyawa yang dikeluarkan akar yang pada akhirnya mengarah pada kolonisasi akar aktif. Di antara sistem pengaturan dua komponen, GacS/GacA hadir di beberapa *pseudomonas* dan bakteri enterik, di mana GacS berfungsi sebagai sensor kinase untuk mengenali sinyal lingkungan yang tidak diketahui dan GacA bertindak seperti pengatur transkripsi. Yang terakhir mengaktifkan sintesis metabolit sekunder dan enzim yang pada gilirannya mempromosikan kebugaran kolonisasi inang. Keterlibatan sistem satu komponen seperti faktor Nod juga dianggap berasal dari pengenalan rangsangan lingkungan. Sistem sensor/ respon satu dan dua komponen bersama-sama dengan sistem regulasi silang lainnya memungkinkan bakteri untuk

mengeksekusi pemrosesan informasi yang kompleks dan memungkinkan mereka untuk mengoordinasikan respons yang sesuai di lingkungan rhizosfer aktif.

Untuk interaksi bakteri dengan tanaman yang berjalan langgeng, beberapa sifat bakteri diperlukan yang membantu dalam menanggapi rangsangan lingkungan (regulator transkripsional), komunikasi (misalnya, *autoinducer*), adaptasi *niche*, adhesi, dan kolonisasi tanaman.

Regulator transkripsional mempengaruhi sejumlah respons fisiologis seperti proses transportasi, metabolisme gula dan asam amino, sintesis pilus, quorum sensing (QS), dan motilitas. Fungsi regulator transkripsi berperan dalam kolonisasi akar oleh bakteri. Sebuah percobaan yang mengintroduksi ujung transposon gen *hns* pada *Enterobacter cloacae*, yang meningkatkan ekspresi gen ketika galur itu terpapar ke akar Canola. Akibatnya, tingkat transkrip *hns* meningkat hingga dua kali lipat, dan galur mutan menunjukkan peningkatan kolonisasi akar dan mengalahkan galur asli dalam uji kompetisi langsung. Hasilnya adalah gen *hns* mengkode protein kecil seperti histon H-NS yang mengikat terutama pada sekuens DNA kaya AT yang ada dalam sekuens promotor.

Peran *quorum sensing* dalam interaksi mikroba-tanaman dapat difahami melalui pengembangan mutan dari endofit padi *Azospirillum lipoferum*, yang secara konstitutif mengekspresikan AttM laktonase yang mempromosikan sintesis protein yang terlibat dalam transportasi dan kemosensitivitas. Hal ini menunjukkan bahwa quorum sensing pada strain ini dikhususkan untuk fungsi kontrol yang berhubungan dengan kolonisasi akar. Molekul autoinducer sangat penting untuk komunikasi bakteri karena memiliki peran penting dalam kolonisasi endofit.

Untuk bertahan hidup dan tumbuh di dalam jaringan tanaman, bakteri harus dapat dengan cepat menyesuaikan metabolisme mereka dalam kisaran nutrisi yang tersedia. Analisis ekspresi gen yang telah dilakukan dari bakteri kolonisasi akar *Pseudomonas putida* dan mengamati peningkatan regulasi gen yang terlibat dalam adaptasi stres dan metabolisme di rhizosfer tanaman jagung.

Tercatat bahwa gen tertentu yang diregulasi terlibat dalam penyerapan senyawa “tersedia” seperti asam amino, poliamina, dipeptida, dan senyawa aromatik serta gen enzim yang terkait dengan tekanan seperti glutathione peroksidase dan asam lemak cis-trans isomerase dan detoksifikasi protein seperti pengangkut penghabisan diduga. Demikian pula, kelangsungan hidup bakteri tertentu di akar tanaman yang tumbuh di ekosistem tergenang memerlukan adaptasi terhadap kondisi anoksik. Dalam kondisi anoxic, tanaman padi juga membentuk oxic/ anoxic interfaces heterogen yang memungkinkan rhizobacteria dan endofit untuk melakukan proses fermentasi. Proses ini menyebabkan akumulasi asam laktat dan etanol di jaringan akar. Telah dilaporkan bahwa etanol bertindak sebagai sumber karbon untuk bakteri endofit *Azoarcus* sp., yang diketahui memiliki sepuluh gen dalam pengkodean genom untuk alkohol dehidrogenase. Setelah bakteri masuk ke permukaan akar, adhesinya dimediasi oleh komponen permukaan sel, yaitu polisakarida, pili, dan adhesin. Komponen-komponen ini ditemukan terlibat dalam *adhesi bakteri*.

Untuk *kolonisasi* di dalam jaringan tanaman, proses penting yang dikenal sebagai rhizodeposisi berperan yang membedakan mikroflora rhizosfer dari bioma tanah. Dalam hal ini, proses perkembangan tanaman dan aktivitas sekretori terperangkap dalam sistem akar. Sel-sel rhizodermis mensekresikan berbagai macam senyawa, termasuk asam organik, fitosiderofor, purin, nukleosida, gula, vitamin, asam amino, dan ion anorganik, dan tudung akar menghasilkan lendir polisakarida. Rhizodeposisi juga melibatkan pelepasan populasi khusus sel yang dikenal sebagai sel batas tutup akar di rhizosfer. Sel-sel batas tutup akar sebagian besar merupakan kontributor yang signifikan terhadap "efek rhizosfer" karena bahkan setelah pelepasan dari massa akar ke dalam tanah, populasi sel ini biasanya tetap hidup.

Perbanyak mikroflora tanah diduga dipicu oleh pengumpulan karbon organik dan nitrogen oleh akar karena bakteri tanah yang paling umum adalah organotrof. Studi yang dilakukan pada spesies *Arabidopsis* menunjukkan kemungkinan peran proteoglikan yang diturunkan dari sel dan protein *arabinogalactan* (AGP) dalam

perlekatan *Rhizobium* ke sel akar. Identifikasi dan karakterisasi AGP dari eksudat akar kacang polong menunjukkan kemampuan untuk menginduksi pembentukan biofilm oleh *R. leguminosarum* pada permukaan kaca buatan memberikan bukti kuat untuk perannya dalam perlekatan bakteri. Jenis tanah dan bakteri yang ada di dalam tanah memainkan peran penting pada komposisi komunitas bakteri endofit akar daripada genotipe inang. Oleh karena itu, efek bergantung genotipe inang utama tetapi tidak terlalu berperan dalam pemilihan komunitas bakteri yang menghuni akar *Arabidopsis*.

Interaksi antara tanaman-mikroba tidak sederhana untuk dipelajari pada tingkat molekuler, tetapi kemajuan terbaru di bidang alat dan teknik molekuler telah memungkinkan untuk mendapatkan wawasan tentang mekanisme interaksi dan mengetahui hasil interaksi. Metode protein autofluorescent (AFP) sekarang banyak digunakan untuk mempelajari interaksi tanaman-mikroba dan pembentukan biofilm. Teknik-teknik ini telah digunakan untuk mengidentifikasi dan menghitung mikroorganisme in situ pada permukaan tanaman dan di dalam tanaman. Salah satu strategi AFP tersebut menggunakan sistem penanda yang mengkode protein fluoresen hijau (GFP). GFP adalah biomarker AFP yang menguntungkan karena tidak memerlukan substrat atau kofaktor apa pun untuk berfluoresensi. Sistem reporter-Glucuronidase (GUS) juga digunakan untuk visualisasi kolonisasi endofit.

Seperti halnya bakteri, fungi endofit juga dapat memiliki peran yang signifikan pada kesehatan dan pertumbuhan tanaman juga memainkan peran penting dalam membentuk komunitas tanaman. Ada banyak fungi endosimbiotik yang dilaporkan terutama dengan rumput yang meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan banyak dari mereka memiliki fitur tambahan karena mereka menghasilkan alkaloid yang memiliki sifat insektisida. Secara sederhana, banyak fungi hidup dalam hubungan simbiosis dengan tanaman di mana fungi menyediakan nutrisi tambahan atau stimulator pertumbuhan atau menekan penyakit, dan sebagai imbalannya, tanaman menyediakan habitat dan hasil fotosintesis yang cocok untuk fungi.

Berdasarkan keterkaitan evolusi, taksonomi, inang tumbuhan, dan fungsi ekologis, fungi endofit diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu (i) endofit Clavicipitaceous (C-endofit juga dikenal sebagai tipe kelas 1), yang ditemukan sebagai endofit di beberapa jenis rumput, dan, (ii) endofit nonclavicipitaceous (NC-endofit), yang ditemukan di jaringan pakis, konifer, angiosperma, dan beberapa tanaman nonvaskular. Sampai saat ini, sebagian besar penelitian dilakukan hanya pada C-endofit. Alasan di balik bias ini adalah dampak bagi pertanian yang penting dari C-endofit dan kurangnya pengetahuan tentang konsekuensi lingkungan dari NC-endofit. C-endofit pada rumput termasuk spesies filogenetik tertentu dari endofit clavicipitaceous yang menunjukkan pertumbuhan rewel dalam kultur dan terbatas pada beberapa rumput musim dingin dan hangat. Umumnya endofit tersebut menunjukkan infeksi interseluler sistemik dalam pucuk tanaman. C-endofit menginfeksi secara vertikal, yaitu, tanaman induk meneruskan fungi ke keturunannya melalui infeksi benih. Endofit ini melakukan banyak fungsi penting seperti peningkatan biomassa tanaman, toleransi kekeringan, dan produksi bahan kimia beracun tertentu yang berbahaya bagi hewan dan mencegah herbivora.

Di sisi lain, NC-endofit sangat beragam dan terdiri dari setidaknya tiga kelas fungsional yang berbeda yaitu 2, 3 dan 4 menurut sejarah hidup dan signifikansi ekologisnya. Di antara ketiga kelas tersebut, endofit kelas 2 tumbuh di jaringan tanaman di atas dan di bawah tanah, sedangkan endofit kelas 3 dan 4 sebagian besar tumbuh di jaringan dan akar di atas tanah. NC-endofit telah dilaporkan dan diisolasi dari setiap garis keturunan tanaman darat dan semua ekosistem darat mulai dari daerah tropis hingga tundra. Selanjutnya, evolusi mutualisme dapat lebih dipahami dengan karakterisasi ekstensif interaksi endofit-tanaman yang berbeda. Misalnya, cara penularan (vertikal atau horizontal) diperkirakan sangat mempengaruhi evolusi dan keberlanjutan secara mutualisme. Dalam kasus endofit yang ditransmisikan secara vertikal, kebugaran kedua pasangan terhubung, dan hasil interaksi dapat diprediksi dan mutualisme akan bertahan. Di sisi lain, cara penularan horizontal membawa peluang bagi berbagai fungi yang menunjukkan gaya hidup simbiosis untuk kolonisasi tanaman. Oleh

karena itu, transmisi horizontal dapat mengurangi hubungan kebugaran antara spesies tertentu. Akibatnya, endofit kelas 2 ditularkan baik secara vertikal maupun horizontal, sedangkan endofit kelas 3 dan 4 hanya ditularkan secara horizontal.

2. Pemacuan pertumbuhan tanaman oleh endofit

a) Produksi fitohormon oleh endofit

Seperangkat fitohormon dan jaringan pensinyalan terkait terlibat dalam memediasi aktivitas promosi pertumbuhan tanaman dan toleransi stres. Endofit mampu mensintesis hormon tanaman seperti asam indole-3-asetat (IAA), giberelin (GAs), dan sitokinin pada tanaman. Hormon tanaman gas etilen memediasi berbagai respon tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik mereka. Hormon multifungsi tersebut mengatur pertumbuhan dan perkembangan serta respon pertahanan. Selain itu, juga menginduksi atau menghambat penuaan tanaman. Di sisi lain, konsentrasi etilen berlebih menyebabkan klorosis dan kematian tanaman. Puncak biosintesis etilen berkaitan dengan cekaman lingkungan dan proses pengaturannya bergantung pada konsentrasi dan interaksi kompleksnya dengan hormon lain.

Sejumlah bakteri endofit terlibat dalam penurunan konsentrasi etilen tanaman melalui aksi enzim ACC deaminase, enzim yang memecah senyawa ACC, yang merupakan prekursor langsung etilen di semua tanaman tingkat tinggi. Endofit juga mempromosikan sintesis IAA. Di bawah salinitas tinggi, IAA menginduksi gen ACS yang meningkatkan produksi etilen dengan memanfaatkan 1-aminosiklopropana-1-karboksilat secara efektif. Fungi endofit *Phoma glomer*, dan *Penicillium* sp. secara signifikan mensekresi fitohormon, yaitu IAA dan GAs.

Bakteri endofit *Pseudomonas putida* diketahui meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui sintesis hormon tanaman auksin IAA. Bakteri endofit, *phingomonas* sp. yang diisolasi dari daun *Tephrosia apollinea* menghasilkan GAs dan IAA. Kekeringan memicu produksi asam absisat (ABA), yang pada gilirannya menyebabkan

penutupan stomata dan menginduksi ekspresi gen yang berhubungan dengan stres. ABA terlibat dalam respons fisiologis penting yang diperlukan untuk adaptasi stres garam seperti homeostasis ion dan air, antioksidan fitohormon lainnya, dan produksi spesies oksigen reaktif. ABA dan GA memainkan peran antagonis dalam mengendalikan banyak proses perkembangan. Endofit *Burkholderia kururiensis* mendorong pertumbuhan tanaman padi melalui produksi auksin tanaman.

b) Pelarutan fosfat oleh endofit

Endofit mempromosikan aktivitas pelarutan fosfat. Fosfor ada berlimpah di tanah pertanian, tetapi sebagian besar tetap tidak tersedia sebagai bentuk yang tidak larut. Beberapa bakteri dan fungi endofit melepaskan asam organik ke dalam tanah, yang melarutkan kompleks fosfat dan mengubahnya menjadi orto-fosfat untuk mendukung penyerapan dan pemanfaatan tanaman.

c) Produksi siderofor oleh endofit

Siderophores adalah senyawa pengkelat besi molekul kecil yang dapat memanfaatkan besi untuk tanaman dan menghilangkan patogen besi. Selain itu, siderofor membantu tanaman yang kekurangan zat besi dalam memperbaiki nitrogen karena diazotrof membutuhkan Fe^{++} dan Mo sebagai kofaktor untuk sintesis dan fungsi nitrogenase.

d) Fiksasi nitrogen oleh endofit

Nitrogen adalah unsur nutrisi yang paling membutuhkan, tetapi tanaman tidak dapat mereduksi nitrogen atmosfer menjadi amonia. Beberapa endofit prokariotik memiliki kemampuan untuk memfiksasi nitrogen atmosfer. Selain itu, endofit secara langsung mengangkut nitrogen yang terikat secara biologis ke tanaman.

e) Sintesis senyawa aktif biologis

Bakteri endofit memasok vitamin esensial bagi tanaman. Produksi senyawa mirip auksin meningkatkan produksi dan perkecambahan benih. Juga endofit merupakan sumber fitokimia yang baik (dan metabolit sekunder yang aktif secara biologis, yang menghambat

patogen tanaman dan terlibat dalam berbagai metabolisme tanaman. Efek lain dari infeksi endofit pada tanaman inang termasuk penyesuaian osmotik, regulasi stomata, modifikasi morfologi akar, dan peningkatan penyerapan mineral (Tabel 3.1).

Tabel 3.1. Efek infeksi beberapa spesies endofit pada tanaman inangnya.

Tanaman inang	Spesies Endofit	Manfaat asosiasi
Padi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Burkholderia</i> sp. • <i>Herbaspirillum seropedicae</i> 	Increase in nitrogen fixation; Synthesis of indole-3-acetic acid (IAA)
Bit	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus pumilus</i> • <i>Chryseobacterium indologene</i> • <i>Acinetobacter johnsonii</i> 	Peningkatan konsentrasi karbohidrat
Tebu	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gluconacetobacter diazotrophicus</i> • <i>Herbaspirillum seropedicae</i> • <i>Herbaspirillum rubrisubalbicans</i> • <i>Azospirillum amazonense</i> • <i>Burkholderia</i> sp. 	Fiksasi nitrogen, menghasilkan siderofor, sintesis IAA, pelarutan fosfat
Kubis	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enterobacter</i> sp. • <i>herbaspirillum</i> sp. 	Promosi pertumbuhan
Jagung	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Asospirillum brasillense</i> • <i>Burkholderia cepacia</i> • <i>Bacillus subtilis</i> • <i>B. lentimorbus</i> • <i>Streptomyces</i> sp. • <i>Azospirillum lipoferum</i> 	Fiksasi nitrogen, Sintesis IAA
Kedelai	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> • <i>B. japonicum</i> • <i>Azospirillum brasillense</i> 	Produksi siderophore; aktivitas antifungi; fiksasi nitrogen

3. Peran endofit dalam pemenuhan nutrisi

Diazotrofik endofit *Klebsiella pneumoniae* 342 (Kp342), bakteri pengikat nitrogen (N) yang menghuni bagian dalam rumput tanpa menyebabkan penyakit diinokulasikan ke dalam gandum (*Triticum aestivum* L.). Asosiasi Kp342 membebaskan tanaman dari gejala defisiensi nitrogen (N) dan meningkatkan konsentrasi N total. Produksi nitrogenase reduktase di ruang antar sel korteks akar, oleh Kp342 menghasilkan lebih banyak pertumbuhan akar. Hal ini memungkinkan tanaman yang diinokulasi Kp342 menyerap sebagian besar N yang ada di tanah sehingga meningkatkan ketersediaan kandungan N dalam jaringan tanaman. Sebaliknya, tanaman yang tidak diinokulasi memiliki akar yang sangat kecil. Selain itu, inokulasi Kp342 meningkatkan berat kering pucuk dan konsentrasi klorofil. Dengan demikian, asosiasi Kp342-Trenton membebaskan tanaman gandum dari gejala defisiensi nitrogen.

Strain bakteri endofit dari genus *Enterobacter*, *Rahnella*, *Rhodanobacter*, *Pseudomonas*, *Stenotrophomonas*, *Xanthomonas*, dan *Phyllobacterium* berasosiasi dengan tanaman ubi jalar *Ipomoea batatas* (L.) Lam. mampu memfiksasi nitrogen, menghasilkan IAA, dan menunjukkan stres toleransi. Strain terkait inang ini diuji untuk memeriksa kemampuan di atas. Produsen IAA tumbuh dengan baik dengan adanya media bebas nitrogen dan memiliki gen subunit nitrogenase, *nifH*. IAA membantu meningkatkan produksi akar di sana dengan meningkatkan penyerapan nitrogen dari tanah. Studi-studi ini menunjukkan bahwa asosiasi endofit bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman dan perbaikan tanaman.

Endofit berperan penting dalam pelarutan fosfor (P) pada tanah asam merah. Endofit *Pantoea dispersa* yang diisolasi dari umbi singkong (*Manihot esculenta* Crantz) berpotensi melarutkan fosfor yang tidak larut bila diinokulasikan ke dalam tanah merah. Proses pelarutan disertai dengan produksi dua asam organik khusus, yaitu SA dan asam benzenaasetat. *P. dispersa* menghasilkan asam ini untuk melarutkan fosfor tidak larut yang ada di dalam tanah. Sifat pelarut fosfor mikroba ini dapat memicu komunitas mikroba dan dengan demikian membuat tanah menguntungkan untuk pertumbuhan tanaman. *Pyroverdines* yang diproduksi oleh

Pseudomonas fluorescens pada asosiasi dengan *A. thaliana* mendorong pertumbuhan tanaman di bawah kondisi kekurangan zat besi. *Pyoverdines* adalah siderophores (kelator besi besi afinitas tinggi) diekskresikan oleh bakteri di dalam tanah untuk memperoleh besi. Bahan kimia ini memodulasi ekspresi gen yang terkait dengan perkembangan dan perolehan zat besi (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Perubahan fisiologis pada contoh tanaman oleh keberadaan endofit

Endofit	Tanaman Inang	Perubahan fisiologis pada tumbuhan
<i>Pseudomonas</i> sp.	<i>Bacillus</i> , <i>Lysinibacillus</i>	Antioxidant enzyme activities, photosynthetic pigments, and low lipid peroxidation Siderophore, IAA, Gibberellic acid
<i>Prosopisstrom bulifera</i> (halophyte)	<i>O. sativa</i> , <i>Triticum aestivum</i>	Antioxidant enzyme activities, photosynthetic pigments, and low lipid peroxidation Siderophore, IAA, Gibberellic acid

4. Penanganan stres abiotik oleh endofit

Cekaman abiotik utama adalah kekeringan, suhu rendah/ tinggi, salinitas, cekaman logam berat, kondisi asam, cahaya berlebih, anaerobiosis, dan kelaparan nutrisi. Sesuai laporan FAO sekitar 20% dari lahan irigasi di negara berkembang telah rusak oleh genangan air atau salinitas. Kira-kira, 250 juta orang telah terkena dampak langsung dari penggurunan, dan hampir 1 miliar orang terancam. Cekaman abiotik utama, mekanisme merugikan pada tanaman, dan peran berbagai endofit dalam toleransi cekaman abiotik dijelaskan lebih lanjut (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Sahu et al., 2017; Waqas et al., 2012).

a) Stres kekeringan

Kekeringan adalah tekanan lingkungan yang umum tetapi kritis terhadap produktivitas tanaman. Tingkat keparahan kekeringan tidak dapat diprediksi karena tergantung pada banyak faktor seperti ketersediaan dan distribusi curah hujan, permintaan evaporasi, dan kapasitas penyimpanan kelembaban tanah. Penyerapan air diperlukan untuk semua tahap pertumbuhan tanaman. Cekaman kekeringan dianggap sebagai faktor pembatas pertumbuhan dan pengaruhnya berkisar dari tingkat morfologi hingga molekuler. Pada *Hordeum vulgare*, cekaman kekeringan menurunkan hasil gabah dengan mengurangi jumlah anakan, paku, dan gabah per tanaman dan berat gabah individu.

Pengurangan pertumbuhan sel adalah salah satu proses fisiologis yang paling sensitif terhadap kekeringan karena hilangnya tekanan turgor. Hal ini karena penurunan penyerapan air memungkinkan penurunan kadar air jaringan yang mengakibatkan hilangnya tekanan turgor. Juga di bawah tekanan angin, pemanjangan sel tumbuhan tingkat tinggi dapat dihambat oleh gangguan aliran air dari xilem ke sel pemanjangan di sekitarnya). Kelangkaan air menurunkan potensi air daun dan pembukaan stomata, mengurangi ukuran daun, menekan pertumbuhan akar, mengurangi jumlah, ukuran, dan viabilitas benih, menunda pembungaan dan pembuahan serta membatasi pertumbuhan dan produktivitas tanaman.

Efek utama dari kekeringan adalah pengurangan fotosintesis, yang timbul oleh penurunan ekspansi daun, gangguan mesin fotosintesis, penuaan daun prematur, dan penurunan terkait dalam produksi makanan. Ketika ketersediaan air tanah terbatas tanaman ditekan untuk menutup stomata mereka. Ini membatasi penyerapan CO₂ ke dalam daun yang menyebabkan akumulasi spesies oksigen reaktif, yang menyebabkan stres oksidatif. Akumulasi radikal bebas menginduksi perubahan fungsi membran, konformasi protein, peroksidasi lipid, dan akhirnya kematian sel. Efek penting lainnya dari draft adalah pada perolehan nutrisi oleh akar dan transportasinya. Penyerapan nutrisi anorganik yang lebih

rendah dapat disebabkan oleh gangguan penyerapan nutrisi dan aliran transpirasi yang berkurang.

1) Mekanisme toleransi cekaman kekeringan oleh tanaman

Toleransi kekeringan adalah mekanisme yang kompleks; melibatkan sejumlah proses fisiologis dan biokimia pada tingkat sel, jaringan, organ, dan seluruh tanaman. Mekanisme utama termasuk pengurangan kehilangan air dengan meningkatkan resistensi stomata, peningkatan penyerapan air dengan mengembangkan sistem akar yang besar dan dalam, akumulasi osmolit, sintesis osmoprotektan, dan daun yang lebih kecil dan sukulen untuk mengurangi kehilangan transpirasi. Fitohormon seperti auksin, sitokinin, gibberilin, etilen, dan ABA berperan penting dalam tanaman terhadap cekaman abiotik dalam kondisi stres. Selama cekaman air, tanaman mengalami serangkaian perubahan fisiologis dan molekuler, seperti peningkatan produksi etilen, perubahan kandungan klorofil, dan kerusakan alat fotosintesis yang menyebabkan terhambatnya fotosintesis. Auksin memiliki peran tidak langsung tetapi kunci dalam toleransi tegangan draft dengan meningkatkan pertumbuhan dan pembentukan akar lateral. IAA merupakan auksin paling aktif yang mengatur diferensiasi jaringan pembuluh, diferensiasi akar adventif dan lateral, pembelahan sel, dan pertumbuhan tunas selama cekaman kekeringan. ABA adalah fitohormon penting berikutnya, yang memperbaiki cekaman kekeringan melalui regulasi transkripsi gen terkait kekeringan dan konduktivitas hidrolik akar. Ini terlibat dalam regulasi air dengan mengendalikan penutupan stomata dan jalur transduksi sinyal. Toleransi cekaman kekeringan penting lainnya dari tanaman dikaitkan dengan akumulasi nutrisi mineral dan peningkatan sintesis osmoprotektan, yang merupakan bagian dari metabolisme normal tanaman. Akumulasi mineral ini membantu dalam retensi air dan pemeliharaan integritas struktural membran sel.

2) Pengurangan stres kekeringan oleh endofit

Hal ini didokumentasikan dengan baik bahwa endofit fungi memberikan beberapa tingkat toleransi kekeringan untuk tanaman.

Ini terlibat dalam penyesuaian konsentrasi osmolit inang atau aktivitas stomata. *Colletotrichum magna* dan *C. protuberate* memberikan toleransi kekeringan yang signifikan terhadap tanaman gandum, tomat, dan semangka. Asosiasi *Pseudomonas indica* ke akar kubis Cina mendorong pertumbuhan akar dan tunas dan juga pembentukan akar lateral. Ketika diizinkan untuk menjajah tanaman, eksperimen terkena polietilen glikol (bahan kimia untuk meniru stres kekeringan) aktivitas antioksidan seperti peroksidase (POX), katalase (CAT), dan superoksida dismutase (SOD) meningkat di daun dalam waktu 24 jam untuk mencegah atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh spesies oksigen reaktif (ROS). Dengan demikian, fungi endofit mencegah penurunan efisiensi fotosintesis dan degradasi protein klorofil dan tilakoid yang disebabkan oleh kekeringan. Selama cekaman kekeringan, tanaman terjahar mengekspresikan gen terkait kekeringan DREB2A, CBL1, ANAC072, dan RD29 pada daunnya. Selain itu, protein CAS, regulator penginderaan Ca^{2+} di membran tilakoid meningkat. Oleh karena itu, pada kondisi cekaman kekeringan aktivitas enzim antioksidan, ekspresi gen terkait kekeringan, dan CAS merupakan tiga target penting *P. indica* pada daun kubis Cina. Fungi endofit *Phoma glomerata* LWL2 dan *Penicillium* sp. LWL3 terhadap salinitas dan cekaman kekeringan, menunjukkan bahwa sosiasi simbiosis mengurangi stres dengan mengorbankan aktivitas glutathione tereduksi, CAT, peroksidase, dan polifenol oksidase. Di bawah kondisi stres, infeksi endofit secara signifikan mengatur stres melalui ABA yang diatur ke bawah, JA yang diubah, dan peningkatan asam salisilat (SA) pada tanaman mentimun inang.

Pada kondisi cekaman kekeringan jagung (*Zea mays* L) diinokulasi dengan *Azospirillum* spp. bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. *Azospirillum lipoferum* meningkatkan pertumbuhan jagung dengan produksi fitohormon seperti ABA, IAA, dan GAs. Hasilnya menunjukkan bahwa baik ABA dan GAs yang dihasilkan oleh endofit *Azospirillum* berkontribusi terhadap pengurangan cekaman kekeringan tanaman inang.

Kondisi lingkungan yang kurang baik mempengaruhi interaksi simbiosis antara tanaman *Lolium perenne* dengan fungi endofitnya *Neotyphodium* spp. Ketika infeksi endofit hadir tanaman menunjukkan kepekaan yang lebih tinggi terhadap kekeringan. Infeksi endofit secara signifikan mendorong perkembangan anakan reproduktif dan produksi benih. Fitur-fitur ini memberikan pengaruh yang menguntungkan pada tanaman untuk bertahan di situs di mana air merupakan faktor pembatas pertumbuhan. Adaptasi yang diinduksi oleh endofit juga meningkatkan berat kering akar dan rasio akar/tunas dan membantu tanaman menahan kondisi cekaman. Asosiasi fungi endofit *Acremonium coenophialum* dengan fescue tinggi *Festuca arundinacea* Schreb menghasilkan berbagai efisiensi ekologi untuk tanaman. Kolonisasi tinggi oleh cendawan mengikuti urutan alami perkecambahan biji fescue, kecambah dan pertumbuhan anakan. Tanaman tersebut ditandai lebih toleran terhadap tekanan abiotik lingkungan daripada rumput yang tidak terinfeksi. Toleransi terhadap cekaman air dimediasi dengan memodulasi sistem osmoregulasi yang menghasilkan peningkatan tekanan turgor seluler dalam jaringan. Mekanisme ini membantu menurunkan konduktansi stomata sehingga melindungi tanaman dari cekaman air. Selain itu, asosiasi fungi juga menyebabkan akumulasi pencegah serangga, racun, dan sinergisnya yang melindungi tanaman dari efek merusak patogen serangga. Efisiensi tanaman untuk menanam di tanah rendah nitrogen juga ditingkatkan karena fescue tinggi yang terinfeksi fungi mengandung polip. Peningkatan kadar glutamin sintetase memungkinkan kemampuan kompetitifnya untuk bertahan hidup pada nitrogen tanah yang rendah.

Untuk meningkatkan kelayakan ekonomi dan kelestarian lingkungan Poplar, mereka diinokulasi dengan konsorsium endofit. Tanaman yang diinokulasi menunjukkan fisiologi daun yang lebih baik dan mengurangi kerusakan oleh spesies oksigen reaktif. Simbiosis endofit tanaman memediasi produksi fitohormon [SA, ABA, IAA, asam jasmonic (JA), asam giberelin-3, epibrassinolides], yang membantu dalam promosi pertumbuhan dan toleransi stres pada tanaman inang. Strain mikroba terkait mengandung gen mikroba yang terlibat dalam biosintesis *trehalosa*, (R, R)-butana-2,

3-diol, dan asetoin. Aktivitas gen ini mengkodekan efek menguntungkan tanaman inang terhadap cekaman kekeringan sebagaimana tabel 3.2

Tabel 3.2. Toleransi cekaman kekeringan oleh tanaman yang dimediasi endofit.

Endofit	Tanaman Inang	Perubahan fisiologis pada tumbuhan
<i>Sinorhizobiummelilotii</i>	<i>Medicago sativa</i>	FeSOD dan CU/ZnSOD diatur ke atas
<i>Trichoderma hamatum</i>	<i>Theobroma cacao</i>	Kekeringan yang tertunda menyebabkan perubahan konduktansi stomata dan fotosintesis bersih
<i>Piriformospora indica</i>	<i>Brassica campestris</i>	Peningkatan tingkat peroksidase, katalase, dan superoksida dismutase
<i>Pantoea agglomerans</i>	<i>Saccharum officinarum</i>	IAA dan produksi prolin
<i>Trichoderma harzianum</i>	<i>Oryza sativa</i>	Meningkatkan regulasi gen aquaporin, dehydrin and malonaldehyde

b) Tekanan salinitas

Salinitas adalah salah satu faktor stres abiotik yang paling umum membatasi produktivitas tanaman dengan efek buruk dari perkecambahan biji dan sepanjang siklus hidup tanaman. Lebih dari 45 juta hektar lahan beririgasi di dunia telah dipengaruhi oleh salinitas, dan 1,5 juta hektar tidak berproduksi setiap tahun sebagai akibat dari tingkat salinitas yang tinggi di dalam tanah. Garam terakumulasi di dalam tanah melalui irigasi, pemupukan, pelapukan mineral, atau terkadang bermigrasi ke atas dari air tanah. Sebagian besar tanaman tanaman peka terhadap konsentrasi garam yang tinggi di dalam tanah. Pada konsentrasi garam yang rendah, hasil tanaman sedikit terpengaruh atau tidak terpengaruh sama sekali. Ketika konsentrasi meningkat, pertumbuhan tanaman dan hasil bergerak menuju nol. Garam ditemukan di tanah sebagai ion

bermuatan seperti Ca^{2+} (kalsium), Na^+ (natrium), K^+ (kalium), Cl^- (klorida), dan NO_3^- (nitrat) sebagian besar dalam kondisi yang berbeda. Banyak garam adalah nutrisi tanaman; kadar garam yang tinggi dalam tanah dapat mengganggu keseimbangan unsur hara dalam tanaman atau mengganggu penyerapan beberapa unsur hara. Misalnya, tanaman menunjukkan penurunan yang signifikan dalam penyerapan Fosfor (P) di tanah salin karena ion fosfat mengendap dengan ion Ca.

Tingkat salinitas yang tinggi mempengaruhi tanaman dalam berbagai cara: menyebabkan cekaman air di tanah yang menyebabkan cekaman osmotik, keracunan ion (N, Ca, K, P, Fe, Zn), gangguan nutrisi, perubahan proses metabolisme, disorganisasi membran, pengurangan pembelahan sel dan ekspansi, genotoksisitas, perubahan aktivitas enzim, DNA, RNA, dan sintesis protein, dan penghambatan mitosis. Bersama-sama, efek ini mengurangi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup tanaman. Misalnya, salinitas tanah menghasilkan aktivitas mikroba yang buruk karena efek toksik ion yang menyebabkan defisiensi nutrisi di tanah. Selain itu menyebabkan rendahnya potensi air dalam tanah yang mengakibatkan terjadinya cekaman osmotik sehingga tanaman sulit menyerap air dan unsur hara dari tanah. Selain itu menyebabkan efek buruk pada fiksasi nitrogen melalui penurunan produksi enzim nitrogenase yang bertanggung jawab untuk fiksasi nitrogen. Salinitas juga mempengaruhi fotosintesis; terutama melalui pengurangan kandungan klorofil dan konduktansi stomata, dan melalui penurunan efisiensi fotosistem II (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Ilangumaran & Smith, 2017; Meena et al., 2017b; Trouvelot et al., 2015; Waqas et al., 2012).

1) Mekanisme tanaman untuk mengatasi salinitas tanah

Tanaman biasanya mencoba menghindari lingkungan salin tinggi dengan menjauhkan jaringan tanaman sensitif dari zona salin tinggi atau dengan mengeluarkan ion dari akar atau memisahkan ion dari sitoplasma sel. Mekanisme ini secara ketat membatasi masuknya garam ke dalam tunas, tetapi mengalami penurunan pertumbuhan yang sangat banyak. Berikutnya adalah penyesuaian osmotik, yang

dicapai terutama dengan akumulasi natrium dan klorida tingkat tinggi di pucuk, disertai dengan sintesis sejumlah besar zat terlarut glisin betaine yang kompatibel. Toleransi terhadap stres salinitas menjamin pemeliharaan atau penyesuaian cepat homeostasis osmotik dan ionik di dalam sel. Salinitas, membatasi pertumbuhan, dan produktivitas tanaman di seluruh dunia. Stres garam pada tanaman menghasilkan berbagai macam perubahan fisiologis dan biokimia. Tanaman dengan konsentrasi garam tinggi seperti padi (*Oryza sativa* L.) varietas GJ-17 ketika diinokulasi dengan bakterium endofit *Pseudomonas pseudoalcaligenes* mengakibatkan akumulasi senyawa kuartener mirip prolin dan glisin betaine untuk mengurangi cekaman salinitas. Osmoprotektan yang diproduksi melawan salinitas ini memainkan peran penting dalam melindungi struktur subseluler dan menengahi penyesuaian osmotik pada tanaman yang stres.

2) Pengurangan stres salinitas oleh endofit

Asosiasi dua cendawan endofit Glomerata LWL2 dan *Penicillium* sp. LWL3 memprogram ulang pertumbuhan tanaman mentimun inang selama kondisi cekaman salin. Fitohormon yang dibantu mikroba GAs dan IAA secara signifikan mempromosikan biomassa tanaman dan atribut pertumbuhan terkait. Endofit yang ditandai inang ini memiliki potensi untuk mengasimilasi nutrisi penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium dibandingkan dengan tanaman yang tidak ditandai. Studi ini meneliti bahwa selama kondisi stres Asosiasi endofit mempromosikan rasio manfaat-inang pada tanaman mentimun dengan mengurangi toksisitas natrium dalam tanah. Asosiasi simbiosis ini mengurangi stres dengan menurunkan regulasi peningkatan konsentrasi ABA, JA, dan SA pada tanaman inang.

Tanaman jagung yang diinokulasi dengan fungi mikoriza arbuskular meningkatkan kapasitas antioksidan tanaman. Diusulkan bahwa asosiasi fungi mikoriza arbuskular meningkatkan efisiensi fotosistem II dan konduktansi stomata pada tanaman. Jika dibandingkan dengan tanaman nonmikoriza, akumulasi hidrogen peroksida, dan kebocoran elektrolit membran pada tanaman terkait

AM lebih rendah. Selain itu, produksi ROS dan fotorespirasi juga menurun. Aktivasi enzim antioksidan (SOD atau CAT) melindungi jagung dari stres oksidatif dan membantu mengatasi stres garam.

Tanaman tomat (*Solanum lycopersicum*) yang diberi perlakuan endofit *Bacillus pumilus* AM11 dan *Exiguobacterium* sp. AM25 menunjukkan aktivitas enzim antioksidan yang tinggi seperti POX, polifenol oksidase (PPO), dan CAT sebagai respons terhadap stres. CAT mengkatalisis konversi H₂O₂ menjadi air sementara POX dan PPO membantu mekanisme pertahanan dengan mengoksidasi kuinon. Tingkat tinggi enzim antioksidan secara signifikan mengurangi efek samping berbasis ROS seperti peroksidasi lipid, CAT, dan aktivitas peroksidase. Inokulasi strain bakteri endofit meningkatkan parameter pemacu pertumbuhan tanaman (biomassa), laju fotosintesis, akumulasi pigmen dibandingkan dengan tanaman yang tidak diberi tag.

c) Tegangan suhu

Perubahan iklim adalah penyebab utama tekanan suhu. Suhu dingin dan/atau panas merupakan penyebab utama kehilangan hasil panen. Pengaruh suhu tinggi pada tanaman terutama pada aktivitas fotosintesis. Selain itu, bertanggung jawab atas perubahan membran plasma dan kadar air (transpirasi), gangguan fotosintesis, disfungsi enzim, pengurangan pembelahan sel, dan pertumbuhan tanaman. Akibatnya, tanaman stres menunjukkan tingkat perkecambahan rendah, pertumbuhan terhambat, fotosintesis berkurang, dan mereka sering mati. Stres panas mengubah metabolisme pada tanaman dan karenanya memodulasi produksi antioksidan, metabolit sekunder, hormon, osmoprotektan, dan banyak biomolekul penting lainnya, yang membantu mempertahankan diri dari dampak suhu tinggi. Misalnya konsentrasi JA meningkat berlipat ganda selama kondisi stres. Tanaman memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks untuk toleransi panas. Tanaman menjalankan berbagai mekanisme penerima untuk mengatasi cekaman panas, yang meliputi produksi dan akumulasi enzim dan osmolit seperti protein kejutan panas (HSP20, HSP 60, HSP70, HSP 90, HSP100), dan enzim pemulung ROS seperti askorbat peroksidase dan CAT.

Suhu dingin juga merupakan faktor utama yang membatasi produktivitas dan distribusi geografis banyak spesies, termasuk tanaman pertanian penting. Tanaman tahan dingin meningkatkan toleransi pembekuannya pada paparan suhu rendah dan tidak beku dengan fenomena yang dikenal sebagai aklimatisasi dingin. Melalui ini, spesies tanaman tertentu telah memperoleh kemampuan untuk mentolerir suhu super-dingin atau beku dengan meningkatkan respon antibeku mereka dalam fotoperiode pendek

1) Pengurangan stres panas oleh endofit

Fungi endofit *Aspergillus japonicus* EuR-26 yang berpotensi mengurangi cekaman panas diisolasi dari gulma *Euphorbia indica* L. Strain hasil isolasi tersebut kemudian diinokulasikan pada bibit kedelai dan bunga matahari. Asosiasi tanaman dengan *A. japonicus* menunjukkan konsentrasi SA, IAA, flavonoid, dan akumulasi fenolat yang lebih tinggi; yang meningkatkan respon imun bibit di bawah kondisi stres termal. Diusulkan bahwa produksi fitohormon dan metabolit sekunder oleh asosiasi endofit membantu mengurangi stres panas dengan menegosiasikan aktivitas ABA, CAT, dan asam askorbat oksidase dalam kedelai dan bunga matahari. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi fungi endofit yang memiliki potensi untuk meningkatkan biomassa tanaman dan fitur pertumbuhan lainnya di bawah tekanan suhu tinggi (40°C) dibandingkan dengan tanaman bebas endofit

Bakteri perangsang pertumbuhan tanaman *Burkholderia phytofirmans* PsJN, mampu melakukan kolonisasi epifit dan endofit pada kentang selentingan dan tomat, dapat melindungi tanaman dari cekaman dingin dan panas. Plantlet inang menunjukkan peningkatan kadar pati, prolin, dan fenolat yang signifikan. PsJN juga dilaporkan untuk ekspresi ACC deaminase yang lebih tinggi yang menghidrolisis prekursor etilen 1-aminosiklopropana-1-karboksilat menjadi amonia dan ketobutirat, sehingga mengurangi efek destruktif dari suhu dan kekeringan dengan menurunkan produksi etilen pada tanaman.

2) Pengurangan stres dingin oleh endofit

Cedera embun beku sering terjadi pada tanaman yang sensitif terhadap dingin karena adanya bakteri epifit yang ada pada permukaan daun yang menyebabkan ketidakmampuan untuk pendinginan. Supercooling adalah proses dimana kerusakan membran akibat pembentukan kristal es dicegah. Aktivitas nukleasi es (strain es+) bakteri endofit adalah salah satu alasan utamanya untuk cedera beku, yang dapat dihambat dengan meningkatkan jumlah strain bakteri aktif nukleasi nonice. *Pseudomonas syringae*, bakteri endofit yang memiliki strain es+ adalah penyebab cedera beku di banyak tanaman sensitif dingin dan cedera beku yang disebabkan oleh bakteri ini dapat dihalangi oleh inklusi kompetitif preemptive bakteri strain es. Hal ini dimungkinkan, karena daun dan bunga yang lebih muda serta lembut memiliki jumlah *P. syringae* yang rendah dan persaingan dengan bakteri non-es dapat menurunkan beban mikroba sehingga mencegah cedera es dengan membantu pendinginan.

3) Penanganan stres terhadap logam berat

Logam yang terdapat dalam tanah disebut sebagai unsur hara mikro esensial untuk pertumbuhan normal tanaman (Fe, Mn, Zn, Cu, Mg, Mo, dan Ni) dan unsur non-esensial (Cd, Sb, Cr, Pb, As, Co, Ag, Se dan Hg) menyebabkan penurunan atau penghambatan pertumbuhan tanaman. Sebagian besar lahan pertanian di dunia sedikit atau sedang terkontaminasi oleh keracunan logam. Hal ini disebabkan oleh industrialisasi yang berkelanjutan, praktik pertanian intensif termasuk penggunaan pupuk jangka panjang, aplikasi lumpur dan irigasi yang buruk, dan aktivitas antropogenik. Logam berat ini memiliki dampak yang parah tidak hanya pada tanaman tetapi juga pada kesehatan manusia. Logam berat merupakan unsur logam yang tidak dapat terurai yang memiliki densitas lebih tinggi dari 4 g/cm³, dan juga beracun pada konsentrasi yang sangat kecil.

Batas peraturan kadmium (100 mg/kg) di tanah pertanian terus menerus melebihi karena beberapa aktivitas manusia. Tanaman yang terpapar Cd tingkat tinggi menyebabkan penurunan drastis

dalam penyerapan air dan nutrisi dan fotosintesis yang menyebabkan penghambatan pertumbuhan, klorosis, pencoklatan ujung akar, dan akhirnya kematian). Selain Cd, toksisitas seng (150-300 mg/kg) juga ditemukan di tanah yang terkontaminasi, yang juga menunjukkan efek yang sama seperti Cd. Kelebihan Zn juga bertanggung jawab atas defisiensi mangan, tembaga, dan fosfor pada pucuk tanaman. Kegiatan industri dan pertambangan telah berkontribusi pada kelebihan jumlah mikronutrien esensial tembaga (Cu) dalam tanah yang memainkan peran sitotoksik, menginduksi stres, dan menyebabkan cedera pada tanaman yang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, klorosis daun dan stres oksidatif. Timbal adalah elemen beracun lainnya yang melimpah keluar ke dalam tanah melalui pembuangan lumpur limbah, kegiatan peleburan dan penambangan, timah yang mengandung cat, kertas, pulp, bensin, dan bahan peledak. Ini memberikan efek buruk pada aktivitas enzim, menyebabkan ketidakseimbangan air, mengubah permeabilitas membran, dan mengganggu nutrisi mineral. Toksisitas Cobalt (Co) disebabkan oleh pengendapan dari pembakaran bahan bakar fosil, pemakaian paduan yang mengandung Co dan penyebaran lumpur limbah dan kotoran. melaporkan bahwa kadar Co yang tinggi membatasi konsentrasi Fe, jumlah klorofil, dan aktivitas protein dan CAT pada daun kembang kol. Pencemaran nikel (Ni) juga ditemukan di daerah tertentu oleh aktivitas manusia seperti pekerjaan pertambangan, emisi smelter, pembakaran batubara dan minyak, limbah, pupuk fosfat, dan pestisida. Kelebihan Ni^{2+} menyebabkan berbagai perubahan fisiologis dan gejala toksisitas seperti klorosis dan nekrosis pada spesies tanaman yang berbeda. Merkuri (Hg) adalah logam beracun berikutnya yang telah menjadi perhatian lingkungan yang kritis karena potensi efek ekologis yang merugikan. Di antara berbagai bentuk (HgS , Hg^{2+} , dan Hg bentuk ionik (Hg^{2+}) dominan di tanah pertanian. Tingkat toksik Hg^{2+} sangat fitotoksik terhadap sel tanaman dan menyebabkan cedera yang terlihat dan gangguan fisiologis pada tanaman. Kelebihan Hg^{2+} juga mengganggu aktivitas mitokondria dan menginduksi stres oksidatif dengan memodulasi generasi ROS yang menyebabkan gangguan lipid membran dan metabolisme seluler pada tanaman. Telah didokumentasikan

dengan baik bahwa Cr adalah agen toksik bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cr diangkut dan terakumulasi terutama di akar melalui ion pembawa seperti sulfat atau besi. Cr secara drastis mengurangi perkembangan batang dan daun selama tahap awal pertumbuhan tanaman. Toksisitas kromium menghambat pembelahan sel dan pemanjangan akar tanaman, mengakibatkan pemendekan panjang akar secara keseluruhan. Besi dan mangan adalah nutrisi penting dan memiliki banyak peran biologis penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tapi keduanya beracun ketika terakumulasi ke tingkat tinggi di tanah. Konsentrasi Mn yang tinggi dalam jaringan tanaman dapat mengubah aktivitas enzim dan hormon. Kelebihan zat besi menyebabkan produksi radikal bebas yang merusak struktur seluler dan merusak membran, DNA, dan protein.

Hambatan fisik merupakan mekanisme pertahanan awal pada tanaman terhadap logam seperti beberapa struktur morfologi seperti kutikula tebal, jaringan biologis aktif seperti trikoma, dan dinding sel. Sebagai langkah pertama untuk mengatasi keracunan logam, tanaman mengadopsi penghindaran atau pencegahan masuknya logam ke akar tanaman. Ini dapat dicapai dengan imobilisasi logam dengan asosiasi mikoriza atau sekuestrasi logam dengan memancarkan senyawa organik dari akar. Jika ion logam berat mengatasi hambatan biofisik dan memasuki jaringan dan sel, tanaman memulai beberapa mekanisme toleransi sebagai langkah berikutnya. Ini termasuk induksi metallochaperones atau chelators, seperti nicotianamine, spermine, putrescine, asam mugineic, asam organik, glutathione (phytochelatins, dan metallothionein atau eksudat seluler, seperti senyawa flavonoid dan fenolik, proton, panas protein kejut, dan asam amino spesifik, seperti prolin dan histidin, dan hormon seperti SA, JA, dan etilen. Biosintesis dari biomolekul seluler yang beragam ini secara efektif mentolerir atau menetralkan toksisitas logam.

4) Pengurangan stres logam oleh endofit

Micrococcus yunnanensis SMJ12, *Vibrio sagamiensis* SMJ18, dan *Salinicola peritrichatus* SMJ30 adalah populasi bakteri endofit yang

diisolasi dari jaringan *Spartina maritima* menunjukkan toleransi logam yang signifikan. Sebagian besar bakteri ini memberikan toleransi terhadap satu atau beberapa logam berat dan metaloid termasuk As, Cu, dan Zn—yang paling melimpah di jaringan tanaman dan tanah. Selain itu, strain ini juga menunjukkan beberapa sifat enzimatis (amilase, selulase, kitinase, lipase, dan protease) serta sifat pemacu pertumbuhan tanaman, termasuk fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, IAA, dan sintesis ACC deaminase, dan produksi siderophores. Endohytes yang direkayasa secara eksperimental dapat meningkatkan fitoremediasi polutan organik dan logam beracun. Endofit hasil rekayasa hayati *Burkholderia cepacia* VM1468 diinokulasi ke lupin kuning inang alaminya. Strain rekayasa biologis memproses dua karakter penting (1) plasmid pTOM-Bu61, yang mengkode degradasi trichloroethylene (TCE) konstitutif dan (2) sistem penentu resistensi ncc-nre Nikel (Ni). Inokulasi *Burkholderia cepacia* memiliki efek positif pertumbuhan tanaman dengan adanya logam beracun dan peningkatan 30% dalam biomassa akar diamati. Ini juga mengurangi jumlah trikloretilen melalui transpirasi dan meningkatkan penyerapan Ni. Inokulasi dengan *B. cepacia* VM1468 menghasilkan penurunan fitotoksitas Ni dan TCE.

Fitoremediasi polutan bandel dari lingkungan menghadirkan masalah yang signifikan karena mengakibatkan efek fitotoksik pada tanaman. Inokulasi tanaman dengan strain *Pseudomonas putida* VM1441 (pNAH7) menghasilkan perlindungan tanaman inang dari efek fitotoksik naftalena. Strain ini ditemukan sebagai penjajah akar yang efisien. Plasmid NAH7 yang ada pada galur ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan naftalena sebagai satu-satunya sumber karbon. Asosiasi endosimbiotik tanaman dengan strain ini memfasilitasi perkecambahan biji yang lebih tinggi, transpirasi tanaman, dan degradasi naftalena dibandingkan dengan tanaman yang tidak diinokulasi di tanah yang terkontaminasi.

Eksresi heterolog gen ketahanan nikel yang dikodekan ncc-nre di *Burkholderia cepacia* L.S.2.4 dan *Herbaspirillum seropedicae* LMG2284 disertai dengan penghilangan nikel dari pucuk dan akar

Lolium perenne. Kapasitas bakteri endofit ini untuk menghilangkan nikel melalui proses sekuestrasi atau biopresipitasi menawarkan manfaat yang menarik bagi tanaman inang terkait. Ketika diinokulasi ke tanaman inang, mereka mengubah spesiasi nikel dan karena itu mengurangi akumulasi ion beracun dalam sistem metabolisme tanaman. Inokulasi *Lolium perenne* dengan *H. seropedicae* LMG2284 yang memiliki gen resisten nikel *ncc-nre* menghasilkan penurunan konsentrasi nikel yang signifikan pada akar dan pucuk.

Bakteri pengurai hidrokarbon aromatik polisiklik *Microbacterium* dievaluasi untuk mendorong pertumbuhan gandum dan fenantrena dan dari tanah yang terkontaminasi logam berat. Strain memiliki permukaan sel meningkatkan kelarutan hidrokarbon aromatik polisiklik berair serapannya oleh akar dan mentranslokasikannya ke berbagai bagian udara dari Strain ini menghasilkan faktor pemacu pertumbuhan tanaman—IAA, siderophore, dan 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase dan memiliki kapasitas untuk melarutkan fosfat anorganik. Inokulasi panas dengan strain ditemukan secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan penghapusan fenantrena dan pirena dari tanah di lingkungan suhu rendah.

Pseudomonas fluorescens G10 dan *Microbacterium* sp G16 adalah dua bakteri endofit tahan timbal yang diisolasi dari akar lobak (*Brassica napus*) yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi logam berat. Kedua strain menjajah bagian dalam akar lobak setelah inokulasi. Kedua strain ini menunjukkan produksi IAA, siderophores, dan aktivitas 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase. Peningkatan serapan Pb yang larut dalam air dan produksi biomassa terlihat pada tanaman yang diinokulasi bakteri. Begitu berada di dalam tanaman, phytochelatin mengikat Pb dan membantu mekanisme detoksifikasi .

5. Penanganan stres biotik oleh endofit

Cekaman biotik pada tanaman disebabkan oleh patogen hidup antara lain virus, bakteri, fungi, nematoda, serangga, arakhnida, dan gulma. Tidak seperti agen stres abiotik, agen stres biotik secara

langsung dan cepat merusak nutrisi inangnya yang menyebabkan berkurangnya kekuatan tanaman. Stres biotik mempengaruhi setiap fase siklus hidup mereka: selama pembentukan bibit, pematangan tanaman, atau pengaturan biji-bijian atau buah. Cekaman biotik merupakan penyebab utama kerugian sebelum dan sesudah panen tanaman. Namun, ukuran faktor cekaman biotik yang menyebabkan hasil panen atau penurunan kualitas tergantung pada lingkungan dan dengan demikian bervariasi dari satu daerah ke daerah lain dan dari satu agroekologi ke agroekologi lainnya. Efek merugikan utama dari faktor biotik ini termasuk ketidakseimbangan regulasi hormonal, ketidakseimbangan nutrisi, dan gangguan fisiologis.

Pertahanan terhadap cekaman biotik meliputi hambatan fisik morfologi, senyawa kimia, dan protein dan enzim. Ini memberikan toleransi terhadap tekanan biotik dengan melindungi bagian tanaman dan dengan memberi mereka kekuatan dan kekakuan. Juga, dalam menanggapi serangan patogen tanaman memulai serangkaian tindakan metabolisme termasuk generasi ROS dan semburan oksidatif untuk membatasi penyebaran patogen. Juga, tanaman meningkatkan lignifikasi sel untuk memblokir invasi parasit dan mengurangi kerentanan inang. Fitohormon ABA dan etilena memberikan efek positif pada ketahanan cekaman biotik. Selama kondisi cekaman biotik, ABA bekerja secara antagonis dengan etilen dan melindungi tanaman dari serangan penyakit. Juga hormon steroid termasuk JA dan SA memainkan peran sentral dalam transduksi sinyal dan mekanisme pertahanan.

Endofit memainkan peran khusus untuk menjaga kesehatan tanaman, karena mereka dapat melindungi atau mempersiapkan tanaman terhadap cekaman biotik dan membantu dalam meningkatkan pertumbuhan dan hasil. Bakteri endofit *Pseudomonas fluorescens* yang berasosiasi dengan terong efektif menghambat patogen layu *Ralstonia solanacearum*. Dalam percobaan rumah kaca, bibit yang diberi PGPBE menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan penurunan 70% dalam kejadian layu. Penekanan penyakit pada tanaman terjajah ditingkatkan dengan produksi 2, 4-diacetylphloroglucinol (DAPG) metabolit

antimikroba yang diproduksi oleh isolat *Pseudomonas*. Produksi siderophores dan IAA juga dicatat yang menunjukkan bahwa bakteri endofit *Pseudomonas* terlibat dalam biokontrol dan promosi pertumbuhan terong. Interaksi simbiosis antara fungi endofit *Neotyphodium* spp dan rumput musim dingin memberikan ketahanan yang lebih besar terhadap mamalia dan serangga herbivora, patogen, dan nematoda. Asosiasi endofit dengan inang ini menghasilkan berbagai macam alkaloid atau merangsang rumput inang untuk mensintesis alkaloid dan metabolit sekunder lainnya yang melindungi simbiosis. Peningkatan kebugaran didokumentasikan untuk tuan rumah adalah karena akumulasi empat kelompok alkaloid: lolines, peramine, alkaloid ergot, dan lolitremis.

Strain endofit terkait akar lada hitam *Bacillus megaterium* (BmBP17) melindungi inang dari berbagai patogen. Aktivitas antimikroba BmBP17 dikaitkan dengan kelompok bahan kimia pirazin 2-etil-3-metil. Ini adalah senyawa kimia yang mudah menguap milik, hidrokarbon heterosiklik, sulfoksida dan ester. Mereka sebagian besar hadir dalam ekstrak pelarut BmBP17. Sifat antimikroba dari pirazin dapat dimanfaatkan untuk perlindungan tanaman. Endofit *Pseudomonas aeruginosa* strain BP35 yang terkait dengan lada hitam menunjukkan perlindungan yang signifikan terhadap infeksi yang dipimpin oleh *Phytophthora capsici* dan *Radopholus similis*. PaBP35 yang dikolonisasi secara efisien menghasilkan metabolit kimia rhamnolipid dan phenazine di dalam pucuk lada hitam. Sifat antimikroba dari senyawa tersebut melindungi semut pl+ dari serangan patogen. Phenazines dan rhamnolipid-biosurfactants adalah metabolit antimikroba yang diproduksi oleh *Pseudomonas aeruginosa* PNA1 sebagai respons terhadap patogen. Kemampuan galur endofitik ini digunakan sebagai strategi pengendalian hayati terhadap *Pythium splendens* dan *Pythium myriotylum* pada buncis (*Phaseolus vulgaris* L) dan cocoyam (*Xanthosoma sagittifolium* L Schott). Kolonisasi akar *Pseudomonas aeruginosa* PNA1 dengan kacang dan cocoyom menunjukkan efek penekan penyakit pada tanaman inang. Analisis mikroskopis mengungkapkan bahwa phenazine dan biosurfaktan menyebabkan disintegrasi hifa *Pythium*. Untuk selanjutnya

disimpulkan bahwa kedua metabolit ini bekerja secara sinergis dalam pengendalian *Pythium* spp. Jaringan akar tomat yang disterilisasi permukaan menghasilkan metabolit sekunder yang sangat toksik terhadap nematoda *Meloidogyne incognita*. Aktivitas antinematoda metabolit sekunder (bikaverin, 3-O-metil-8-Om + etil fusarubin, 8-O-metil fusarubin, anhydrofusarubin, dan fusarubin) sangat efektif terhadap parasit yang menetap. Sifat antibiotik dari metabolit sekunder ini mengendalikan nematoda parasit tanaman dan fungi patogen tanaman (Carlson et al., 2020; Chandran et al., 2020; Ilangumaran & Smith, 2017; Jochum et al., 2019; Liu et al., 2020; Waqas et al., 2012).

6. Aplikasi komersial dari endofit toleran stres

Endofit fakultatif yang menjajah akar *Piriformospora indica* memiliki potensi untuk digunakan di bidang pertanian, hortikultura, dan florikultura. Fungi berfilamen *P. indica* awalnya diisolasi dari rhizosfer beberapa tanaman *xerophytic*. Ini memiliki banyak manfaat inang, seperti promosi pertumbuhan tanaman, khususnya dalam kondisi cekaman nutrisi, dan toleransi terhadap berbagai cekaman abiotik serta cekaman biotik (patogen akar dan daun). Ini juga memberikan efek menguntungkan lainnya seperti asimilasi nitrat dan fosfat yang ditingkatkan, mempromosikan formasi akar dan rambut akar adventif, perubahan dalam metabolit sekunder, pengerasan tanaman kultur jaringan dan persiapannya sesuai untuk kondisi lapangan. Percobaan inokulasi asli menunjukkan *P. indica* memiliki kemampuan untuk menjajah akar tanaman dari kisaran inang yang luas, membentuk interaksi akar simbiosis dengan banyak tanaman tanaman, termasuk barley *Hordeum vulgare*, *Triticum aestivum*, *Saccharum officinarum*, dan sawi putih, dll. *P. indica* menunjukkan peningkatan toleransi terhadap berbagai patogen akar dan daun seperti jagung, tomat, gandum, dan barley. Selain itu, *P. indica* mampu mengekstrak, memobilisasi, dan mengangkut nutrisi dari tanah dan selanjutnya translokasi efisien ke bagian udara.

Endofit fakultatif *Epicoccum nigrum* dari tebu mampu menghasilkan senyawa yang menghambat pertumbuhan in vitro patogen tebu termasuk *Fusarium verticillioides*, *Ceratocystis*

paradoxa, *Colletotrichum falcatum*, dan *Xanthomomas albilineans*. *E. nigrum* juga dikenal karena aktivitas biokontrolnya terhadap patogen, seperti *Sclerotinia sclerotiarum* pada bunga matahari, *Pythium* pada kapas, bakteri fitoplasma pada apel, dan *Monilinia* spp. dalam buah persik.

Peramine, pyrrolopyrazine, yang merupakan senyawa yang berperan sebagai pencegah makan serangga yang kuat, disintesis oleh kelompok epichloe dari endofit fungi dalam chikungunya dengan inang rumput. Senyawa tersebut juga bertindak menghambat terhadap larva dan kumbang batang dewasa, *Listronotus bonariensis*, yang merupakan hama utama.

Beberapa fungi endofit kelas 2 dapat meningkatkan toleransi garam dan kekeringan pada dua varietas padi komersial, yang tidak teradaptasi terhadap cekaman tersebut. Selanjutnya, endofit ini mengurangi konsumsi air sebesar 20%–30% sekaligus meningkatkan laju pertumbuhan, hasil reproduksi, dan biomassa tanaman yang ditanam di rumah kaca.

Versi genetik bakteri endofit dari pohon poplar, yang secara alami memiliki kemampuan untuk mendegradasi 2, 4-D telah diinokulasi ke kacang polong untuk memeriksa tanda-tanda toksisitas 2, 4-D dan translokasinya ke jaringan udara tanaman. Inokulasi tanaman kacang polong dengan galur endofit *Pseudomonas putida* galur POPHV6 yang memiliki kemampuan mendegradasi 2,4-D melindungi tanaman berdaun lebar ini dari efek toksik herbisida tingkat tinggi. Hal ini memungkinkan tanaman diinokulasi untuk meningkatkan biomassa mereka, dan dengan demikian meningkatkan serapan tanaman 2, 4-D dari tanah. Begitu berada di dalam jaringan tanaman, 2, 4-D dengan cepat terdegradasi oleh biofilm endofit yang mengkolonisasi akar dan batang serta koloni mikro *P. putida* VM1450. Biofilm dan koloni mikro ini bertanggung jawab atas degradasi 2, 4-D di dalam jaringan rhizosfer, akar, dan batang/daun. Oleh karena itu, strain ini memungkinkan tanaman kacang polong untuk mempertahankan pertumbuhannya dan meningkatkan penghilangan xenobiotik melalui tingkat kolonisasi dan kompetensi yang tinggi di dalam tanaman.

Endofit telah diterapkan pada berbagai skala untuk mengobati polutan hidrofobik [benzena, etilbenzena, toluena, dan senyawa xilena (BTEX), pelarut terklorinasi, limbah amunisi nitrotoluena, dan nutrisi berlebih. Sejumlah bakteri endofit yang terdapat pada pohon poplar memiliki potensi untuk meningkatkan fitoremediasi. Mereka menunjukkan kemampuan untuk mendegradasi senyawa BTEX. BTEX adalah kontaminan yang sangat mudah menguap, dengan kelarutan tinggi, dan toksisitas. Rekayasa bakteri endofit yang dilengkapi dengan jalur degradasi yang tepat untuk meningkatkan degradasi toluena di dalam planta. Strain rekombinan dibuat oleh pendahuluan plasmid pendegradasi toluena pTOM *Burkholderia cepacia* G4 menjadi *B. cepacia* L.S.2.4, endofit alami lupin kuning. Setelah itu, bakteri endofit rekayasa rekombinan berhasil diinokulasi ke dalam benih lupin yang disterilkan permukaan. Strain endofit ini mendegradasi toluena dengan kuat, menghasilkan penurunan nyata dalam fitotoksitasnya. Berbagai macam fungi entomo-patogen mampu menjajah spesies tanaman yang berbeda dan memberikan perlindungan terhadap patogen tanaman dan juga hama serangga. Mereka adalah kelompok fungi penting dengan aplikasi industri hardcore. Mereka menunjukkan (misalnya, *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium anisopliae*) potensi yang menjanjikan untuk biokontrol serangga dan hama patogen di laboratorium dan uji lapangan. Berbagai teknik dapat digunakan untuk aplikasi eksternal endofit ke dalam tanaman inang. Inokulasi benih adalah metode yang paling cocok dibandingkan teknik lain seperti penyemprotan pada permukaan tanaman, penyiraman tanah, dll. Namun, keberhasilan teknik inokulasi tergantung pada sifat endofit (Aloo et al., 2020; Carlson et al., 2020; Legein et al., 2020; Liu et al., 2020; Mishra et al., 2020; Palepi et al., 2020; Pandey et al., 2012; Trouvelot et al., 2015; Vályi et al., 2016; Wang et al., 2017).

BAB IV

FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR



1. Konsep Umum Mikoriza

Secara global, cekaman asal abiotik dan biotik menghambat produksi pertanian, tetapi cekaman abiotik (misalnya, kekeringan, salinitas, defisiensi nutrisi, suhu ekstrim, dan keracunan logam berat) merupakan faktor utama stres tanaman dan kehilangan hasil panen. Ada kemungkinan bahwa populasi dunia akan melebihi kuota sembilan miliar pada tahun 2050. Mikrobioma rhizosfer merupakan fraksi utama dari simbiosis tanaman-mikroba, juga dianggap sebagai genom kedua tanaman. Tanah adalah cadangan mikroba utama yang mempengaruhi morfofisiologi tanaman inang, membuat tanaman tahan terhadap cekaman.

Hubungan simbiosis mikroba-tanaman memainkan peran kunci dalam pengembangan ekosistem darat, dan diyakini telah mendorong evolusi tanaman darat. Selain itu, simbiosis tanaman-mikroba (misalnya, interaksi mikoriza arbuskular) dapat merangsang tanaman inang, meningkatkan pasokan nutrisi, meningkatkan toleransi kekeringan dan salinitas, dan memicu resistensi terhadap penyakit. Namun, mekanisme genetik yang bertanggung jawab atas peningkatan toleransi tanaman terhadap cekaman belum dipahami.

Simbiosis mikroba-tanaman telah memodelkan asal usul, organisasi, dan evolusi semua kehidupan organik di Bumi. Simbiosis adalah mekanisme evolusi penting dalam asal-usul sel

eukariotik. Mikroba adalah makhluk hidup paling primitif di planet ini, yang asal usulnya, mereka telah memperoleh karakteristik dan kemampuan beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain, membangun hubungan yang beragam dalam bentuk dan fungsi. Di tengah banyaknya hubungan biologis yang ada di antara semua bentuk kehidupan di Bumi, simbiosis antara tanaman dan mikroba heterotrofik—simbiosis. Mikoriza merupakan hubungan mutualis yang paling terkenal antara fungi tanah dan akar. Sekitar 80% spesies tumbuhan berpembuluh membentuk asosiasi mikoriza antara akarnya dan fungi tular tanah. Fungi mikoriza arbuskular memberikan permukaan serap yang lebih luas daripada rambut akar dan dengan demikian membantu dalam penyerapan ion tidak bergerak (misalnya, fosfat, tembaga, dan seng) di dalam tanah, di luar zona penipisan.

Simbiosis ini dapat digunakan sebagai alat untuk prediksi keberlanjutan dalam sistem produksi. Fungi mikoriza telah terbukti menjadi inang pertumbuhan tanaman. Untuk mengevaluasi peran potensial fungi mikoriza arbuskular dalam meningkatkan kesuburan tanah, proyek penelitian tentang spesies fungi mikoriza arbuskular eksotik dan asli (harus dilakukan, dengan pendekatan terbaik yang diterapkan dalam sistem pertanian berkelanjutan).

a) Kategori Simbiosis Mikoriza

Diperkirakan bahwa simbiosis mikoriza terjadi pada sekitar 250.000 spesies tanaman di seluruh dunia, termasuk tanaman pertanian utama. Kelompok divergen dalam taksonomi simbiosis mikoriza telah diterima oleh pola morfologi yang berbeda terkait dengan adanya beberapa hifa ekstraradikal atau intraradikal.

Jenis utama dari interaksi fungi mikoriza tanaman adalah ektomikoriza, endomikoriza, dan ektendomikoriza (juga disebut pseudomikoriza), sesuai dengan bagaimana miselium fungi menjajah struktur akar. Di antara endomikoriza, jenis mikoriza arbuskular mewakili asosiasi tanaman-mikoriza yang paling dikenal, paling banyak dipelajari, dan paling melimpah, dengan dampak ekologis dan kepentingan ekonomi yang besar.

Fungi mikoriza arbuskular memiliki siklus hidup obligat, yang menerima fotosintesis (misalnya, karbohidrat) dari tanaman inang, sebagai imbalan untuk memasok tanaman inang dengan serapan ion (terutama penyerapan fosfor dan kalium dalam larutan tanah) dan air. Ion-ion diambil dari kolam tanah yang labil yang sama dari mana akar, melalui miselium ekstraradikal aktifnya, meningkatkan nutrisi tanaman inang dalam kondisi tanah dengan ketersediaan nutrisi rendah. Lompatan evolusi ini sangat penting untuk memungkinkan tanaman berpindah dari lingkungan akuatik ke habitat darat, di tanah yang zona penipisannya berkembang pesat setelah penyerapan unsur oleh organ seperti akar.

b) Keragaman Taksonomi Fungi Mikoriza Arbuskular

Studi tentang akar fosil dan bukti filogenetik Mikoriza muncul selama Periode Devon, mulai dari 462 hingga 352 juta tahun yang lalu. Periode ini dihubungkan dengan munculnya tumbuhan darat. Baru-baru ini, analisis molekuler filogenetik dari urutan gen RNA ribosom subunit kecil telah memisahkan fungi mikoriza arbuskular dari *Zygomycota* dan menempatkannya ke dalam filum baru *Glomeromycota*. Taksonomi konvensional fungi mikoriza arbuskular telah dilakukan pada dasar fitur morfologi spora mereka dan lapisan dinding sel. Taksonomi fungi mikoriza arbuskular hanya berdasarkan aspek-aspek ini tidak cukup untuk memperkirakan pola distribusi aktual kumpulan *Glomeromycota* di semua ekosistem. Klasifikasi fungi mikoriza arbuskular terbaru (sering diperbarui di situs web www.amfphylogeny.com) berisi empat ordo, 11 famili, dan 25 genera.

Baru-baru ini, kemajuan besar dalam studi genomik mikoriza arbuskular *Rhizophagus irregularis* telah dikomersilkan, menawarkan pendekatan baru untuk menyelidiki biologi simbiosis yang terjadi. Penggunaan alat molekuler belum mengungkapkan keragaman intraspesifik nyata dalam genom mikoriza arbuskular, yang masih perlu dipahami dengan jelas untuk spesies *glomeromycotan*.

Studi terbaru menggambarkan kekayaan mikoriza arbuskular di atas tanah, bukan kekayaan tanaman di bawah tanah. Hal ini

menafikkan kekayaan tumbuhan yang terkait dengan spesies tumbuhan dorman, spesies klon, dan spesies tumbuhan fana. Diperkirakan bahwa kekayaan mikoriza arbuskular lebih kuat terkait dengan kekayaan bawah tanah daripada kekayaan tanaman di atas tanah karena fungi tanah ini berasosiasi dengan akar tanaman. Yang paling penting, orang mungkin mengharapkan kekayaan mikoriza arbuskular lebih kuat berkorelasi dengan di bawah tanah daripada kekayaan tanaman di atas tanah karena fungi ini berasosiasi langsung dengan akar inang. Diketahui bahwa fungi mikoriza arbuskular dapat selektif terhadap jenis tanaman inangnya. Oleh karena itu, semakin besar nilai kekayaan akar tanaman, semakin besar pula keragaman relung ekologi atau habitat yang berpotensi mereka miliki.

Diperkirakan bahwa kekayaan mikoriza arbuskular lebih kuat terkait dengan kekayaan bawah tanah daripada kekayaan tanaman di atas tanah karena fungi tanah ini berasosiasi dengan akar tanaman. Yang paling penting, orang mungkin mengharapkan kekayaan mikoriza arbuskular lebih kuat berkorelasi dengan di bawah tanah daripada kekayaan tanaman di atas tanah karena fungi ini berasosiasi langsung dengan akar inang. Diketahui bahwa fungi mikoriza arbuskular dapat selektif terhadap jenis tanaman inangnya. Oleh karena itu, semakin besar nilai kekayaan akar tanaman, semakin besar pula keragaman relung ekologi atau habitat yang berpotensi mereka miliki.

c) Morfologi dan Reproduksi.

Pada Glomeromycota, spora besar melakukan reproduksi aseksual sebagai sel tunggal dengan beberapa ratus atau ribuan inti. Tidak ada fase teleomorfik yang diketahui untuk filum ini, tetapi analisis transkriptomik *Rhizophagus irregularis* saat ini telah mengungkapkan bahwa Glomeromycota memang memiliki informasi genom dasar untuk reproduksi seksual dan meiosis. Spesies telah dideskripsikan di Glomeromycota biasanya sebagai morfospesies Cakupan keragaman intraspesifik dalam genom masih perlu ditentukan dengan baik untuk spesies fungi glomeromycotan.

Genom fungi glomeromikotan menyajikan tingkat polimorfisme yang tinggi, dan genom besar dan aseksualitas fungi glomeromikotan tetap menjadi tantangan untuk memahami kompleksitas genom organisme ini. Poin penting lainnya untuk penelitian mikoriza adalah menyediakan konsep taksonomi spesies yang dapat diterima untuk Glomeromycota dan alat laboratorium untuk memungkinkan identifikasi dan deskripsi spesies yang mudah dan cepat dengan relevansi fungsional dalam kaitannya dengan simbiosis.

d) Pembentukan Asosiasi Mikoriza Arbuskular

Simbiosis mikoriza arbuskular dapat dipisahkan menjadi langkah-langkah yang berurutan, yang ditandai dengan tingkat perkembangan hifa fungi selama terjadi kolonisasi akar. Tahap "prasinbiotik" mengacu pada saling kecocokan, dan tahap "simbiosis", pembentukan hipopodium, mengacu pada pembentukan apresorium dan arbuskula. Tahap selanjutnya dari perkembangan asosiasi mikoriza arbuskular disebut "kolonisasi akar" dan mengacu pada perubahan fisiologi tanaman. Perubahan berkisar dari perubahan dalam keseimbangan hormonal dan profil transkripsi hingga metabolisme primer dan sekunder yang berubah, dan banyak dari perubahan tersebut terkait dengan mekanisme pertahanan, yang berkontribusi pada tanaman yang mempertahankan kontrol atas mitra simbiosis dan terakhir pembentukan jaringan mikoriza. Setelah pemenuhan semua langkah ini, tanaman harus mengontrol tingkat invasi fungi ke dalam akar untuk menghindari kolonisasi berlebihan dan drainase karbon, sehingga dapat mempertahankan interaksi yang terjalin pada tingkat mutualistik.

e) Fungi mikoriza arbuskular dan perolehan Fosfat Anorganik

Fosfat anorganik tanah (Pi) sangat penting untuk pertumbuhan dan fungsi yang tepat dari semua bentuk kehidupan, sehingga dalam kondisi alami, biasanya pertumbuhan dan hasil tanaman akan terpengaruh jika pasokan Pi terbatas. Salah satu strategi adalah meningkatkan permukaan akar-tanah untuk memaksimalkan akses

dan penyerapan Pi yang tersedia. Strategi kedua adalah melarutkan Pi yang terperangkap dalam kompleks mineral-organik.

f) Fungi mikoriza arbuskular dan Stres Kekeringan

Cekaman air dapat terjadi baik karena kelebihan air (yaitu banjir) atau kondisi kekurangan air (yaitu cekaman kekeringan). Pada kondisi terjadi cekaman kekeringan, kondisi air tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan normal tanaman, perkembangan mengakibatkan kekeringan/stress air. Hal ini menyebabkan dehidrasi sel dan ketidakseimbangan osmotik. Untuk mengatasi kekurangan air kondisi tersebut, tanaman telah mengembangkan sejumlah strategi yang semuanya ditujukan untuk optimalisasi penggunaan air seperti adaptasi morfologi, penutupan stomata untuk mencegah kehilangan air daun, pengaturan konduktivitas hidrolik, penyesuaian osmotik, pengurangan pertumbuhan dan laju fotosintesis. sendiri dan melawan efek yang merusak dari stres, tanaman telah mengembangkan mekanisme yang melibatkan induksi gen dan protein yang responsif terhadap stres.

Selain itu, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa asosiasi dengan tanaman dengan mikoriza arbuskular meningkatkan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan dan reproduktifitas dengan meningkatkan luas akar, biomassa tanaman, hidrasi jaringan tanaman dan penyerapan nutrisi dalam kondisi, sehingga memberikan ketahanan terhadap kekeringan. Beberapa pakar telah mengaitkan peningkatan pertumbuhan tanaman yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular dengan pembentukan jaringan hifa yang luas dan sekresi glomalin yang tidak hanya meningkatkan penyerapan air dan perolehan nutrisi tetapi juga memperkaya perkembangan struktural tanah, dan menstabilkan agregat dan struktur tanah, sehingga meningkatkan pembentukan tanah. Mekanisme utama yang diadopsi oleh fungi mikoriza arbuskular dalam mengurangi cekaman kekeringan meliputi penyerapan langsung dan translokasi air dan nutrisi mineral, penyesuaian osmotik yang lebih baik, pertukaran gas, transpirasi sehingga efisiensi penggunaan air dan perlindungan yang lebih sempurna terhadap kekeringan yang diinduksi kerusakan spesies reaktif

oksigen. Efek menguntungkan dari fungsi mikoriza arbuskular yang menjelajahi daerah yang lebih jauh, sehingga memberikan akses ke pori-pori berisi air yang tidak dapat diakses oleh akar. Jaringan hifa mikoriza arbuskular yang terkait dengan tanaman diperkirakan antara 1 dan 100 m/g tanah, sehingga meningkatkan kapasitas eksplorasi tanah yang sangat besar, sehingga menghasilkan perolehan air yang secara tidak langsung menambah kandungan air relatif tanaman dan fotosintesis menilai. Diperkirakan pula bahwa sekitar 20% penyerapan air akar yang diambil oleh akar tanaman yang mengandung mikoriza arbuskular disebabkan oleh adanya miselium fungi. Selain itu, modifikasi arsitektur akar dan konduktansi hidrolik yang diinduksi mikoriza arbuskular juga dapat dianggap sebagai sarana penting untuk memberikan ketahanan terhadap kekeringan. Sejauh ini, hal tersebut dianggap merupakan peran aquaporin dalam mengatur konduktansi hidrolik akar dan pergerakan air. Aquaporin adalah protein membran integral kecil yang membentuk saluran untuk memfasilitasi pergerakan pasif air dan molekul netral kecil menuruni gradien potensial air. Dalam kasus tanaman selada terkena kondisi cekaman kekeringan, inokulasi dengan *G. intraradices* atau dengan bakteri pemacu pertumbuhan tanaman *Pseudomonas mendocina* memodulasi ekspresi gen PIP2. Sebaliknya, fungsi mikoriza arbuskular meningkatkan pola ekspresi di bawah kondisi eksperimental yang serupa. Baru-baru ini, juga ditemukan bahwa peningkatan ekspresi dua gen aquaporin (GintAQPF1 dan GintAQPF2) di kedua sel kortikal akar yang memegang arbuskula dan miselia ekstraradikal pada tanaman *Zea mays* yang diinokulasi mikoriza arbuskular dalam kondisi stres.

Selain itu, dengan memperpanjang hifanya, fungsi mikoriza dinyatakan dapat meningkatkan perolehan nutrisi mineral termasuk Ca, Fe, K, Mg, P dan Zn, sehingga mengurangi defisiensi unsur-unsur vital yang disebabkan oleh kekeringan. Saat mengerjakan tanaman bunga matahari yang terkena cekaman kekeringan. Inokulasi dengan *G. mosseae* misalnya dapat meningkatkan ketersediaan P, sehingga meminimalkan dampak cekaman terhadap persentase minyak biji dan hasil minyak. Penulis selanjutnya menegaskan bahwa dengan meningkatkan

konduktivitas hidrolik akar, fungi mikoriza arbuskular meningkatkan serapan dan translokasi N, P dan K yang secara bersamaan menambah kadar protein pada tanaman yang terpapar kekeringan. Ketersediaan P yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular pada tanaman inang telah dilaporkan mengubah secara positif berbagai proses fisiologis termasuk parameter osmotik sel penjaga dan pergerakan stomata.

Hormon tanaman dianggap sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain peran yang disebutkan di atas, beberapa penelitian telah melaporkan peningkatan kadar asam absisat (ABA) pada mikorisasi yang mengatur aktivitas stomata tanaman dan meningkatkan efisiensi air dalam kondisi kekurangan air. Selain itu, untuk simbiosis mikoriza yang efektif, ABA diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan arbuskula. Dengan demikian, peningkatan kadar ABA pada tanaman yang mengalami stres mikoriza meningkatkan toleransi stres dan pada saat yang sama meningkatkan dan mempertahankan simbiosis AM. Setelah simbiosis terbentuk di dalam akar inang, fungi mikoriza arbuskular akan mengatur kadar ABA ketika tanaman terkena kondisi kekeringan. Dalam studi mereka, tercatat pula induksi gen *LsNCED2* yang diinduksi AM pada tanaman *Lactuca sativa* yang terpapar kekeringan, sehingga mengatur tingkat ABA tanaman. Selain itu, asosiasi mikoriza telah dinyatakan secara positif mengatur tingkat ekspresi gen tertentu seperti *P5CS* (gen yang terlibat dalam sintesis Pro) dan gen yang mengkode untuk embriogenesis akhir yang melimpah (LEA; terlibat dalam asosiasi ion, integritas membran, stabilisasi protein dan pelipatan dan respon pertahanan antioksidan) protein, sehingga secara langsung berkontribusi pada peningkatan toleransi kekeringan.

g) Fungi mikoriza arbuskular dan stres logam berat

Selain cekaman kekeringan dan cekaman salinitas, akumulasi logam beracun seperti kadmium (Cd), timbal (Pb), arsenik (As) dan merkuri (Hg) (yang secara alami tidak berfungsi secara biologis) di dalam tanah atau di dalam tanaman juga dipertimbangkan sebagai cekaman abiotik lain yang berdampak negatif terhadap kesehatan

lingkungan dan mengancam keberlanjutan produksi/ keberlanjutan pangan ekosistem. Logam berat tersebut dihasilkan oleh berbagai aktivitas alam serta oleh aktivitas antropogenik yang berbeda seperti peleburan logam, penggunaan dan drainase produk pertanian kimia (misalnya pupuk dan pestisida), pembuangan sisa penambangan dan pembakaran bahan bakar fosil. Logam-logam ini dikelompokkan ke dalam satu kategori unsur yang memiliki berat jenis $>5 \text{ g cm}^{-3}$. Beberapa dari logam ini merupakan mikronutrien esensial tanaman seperti Cu, Fe, Mn, Ni dan Zn dan diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang bermanfaat, sementara yang lain tidak diketahui fungsi biologisnya seperti Cd, Pd dan Hg. Unsur-unsur ini dapat diserap dalam partikel tanah atau tercuci ke dalam air tanah. Pada tingkat tinggi, logam berat telah diketahui menyebabkan gangguan beberapa morfologi, fisiologis, biokimia dan perubahan struktural pada tanaman termasuk penghambatan perkecambahan biji, penurunan pemanjangan akar, penghambatan pertumbuhan, gangguan homeostasis seluler, penekanan laju fotosintesis, klorosis daun dan daun prematur. penuaan. Selain itu, logam beracun telah dilaporkan tertranslokasi ke bagian tanaman yang berbeda di mana mereka mengganggu situs aktif banyak enzim termasuk fosfatase, ATPase dan antioksidan enzimatis, sehingga menghancurkan struktur protein dan mengganti elemen penting yang mengakibatkan gejala defisiensi. Seperti tekanan lainnya, toksisitas logam telah dianjurkan untuk meningkatkan penumpukan spesies oksigen reaktif, sehingga mengubah integritas dan stabilitas membran. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa logam berat, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, secara negatif mengganggu simbiosis legum-rhizobium dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kemampuan rhizobia untuk membentuk nodul pengikat N_2 .

Beberapa penelitian telah memvalidasi bahwa fungi mikoriza arbuskular memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman inang di tanah yang terkontaminasi logam. Namun, logam berat telah dijelaskan sangat mempengaruhi kolonisasi mikoriza. Studi telah mendokumentasikan bahwa kehadiran logam berat dalam konsentrasi berlebih tidak hanya mengurangi perkecambahan

spora, pertumbuhan miselia, tingkat kolonisasi dan sporulasi fungi ini tetapi juga menyebabkan dampak signifikan pada ekologi dan keanekaragamannya. Terlepas dari kenyataan ini, bahkan di tanah yang sangat terkontaminasi, kolonisasi fungi mikoriza arbuskular terjadi sehingga menginduksi efek menguntungkan pada tanaman inang yang stres. Selain itu, lebih dari 30 spesies fungi mikoriza arbuskular telah diidentifikasi di tanah yang terkontaminasi di seluruh dunia dan beberapa pada frekuensi tinggi, seperti *Paraglomus occultum*, *G. clarum*, *G. intraradices* dan *Scutellospora pellucida*. Studi lebih lanjut menggambarkan bahwa spora diisolasi dari tanah yang tercemar. Tanah tercemar logam berat dibandingkan dengan spora yang diisolasi dari tanah tidak tercemar. Resistensi yang terjadi secara alami seperti itu kemungkinan karena plastisitas fenotipik daripada perubahan genetik dalam spora karena toleransi hilang setelah satu generasi tanpa adanya logam berat.

Sejumlah penelitian telah menyoroati potensi fungi *glomeromycotan* dalam menyangga toksisitas logam dan meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas di tanah yang terkontaminasi logam. Namun, peran mikoriza dalam memberikan ketahanan logam pada tanaman inang tergantung pada beberapa faktor termasuk jenis spesies fungi mikoriza arbuskular, genotipe tanaman dan sifat serta jenis logam yang ada di dalam tanah. Misalnya, dalam salah satu studi mereka, Kemampuan kolonisasi yang lebih tinggi dari fungi mikoriza arbuskular dengan genotipe kacang merpati yang toleran daripada yang sensitif yang memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi pada yang pertama daripada yang terakhir.

Dalam salah satu studi, telah divalidasi bahwa spora ekstraradikal dan vesikel intraradikal fungi mikoriza arbuskular, diisolasi dari media yang diperkaya Cu, mengandung penumpukan ion toksik Cu yang tinggi. Selain itu, beberapa peneliti berpendapat vesikel dari miselium intraradikal berfungsi sebagai struktur penyimpanan untuk logam berat. Selain itu, dinding sel fungi terdiri dari kitin yang mengandung gugus amino bebas, hidroksil dan karboksil bermuatan negatif yang menunjukkan kemampuan mengikat yang

sangat efisien dengan ion logam beracun, sehingga menangkapnya dalam matriks tanah itu sendiri. Dalam salah satu penelitian dilaporkan bahwa konsentrasi yang lebih tinggi dari unsur Cu, Zn dan Cd yang sebagian terlokalisasi di dinding sel fungi *R. irregularis*. Selain itu, banyak fungi berfilamen telah digunakan secara komersial sebagai bio-sorben karena kecenderungannya untuk menyerap elemen jejak. Akibatnya, fungi mikoriza arbuskular telah divalidasi untuk menurunkan translokasi logam dari akar ke organ udara. Dalam salah satu penelitian menunjukkan bahwa dibandingkan dengan tanaman kacang merpati non-AM, kolonisasi dengan *F. mosseae* menyebabkan imobilisasi yang signifikan dari logam Cd dan Zn di akar sehingga menyebabkan translokasi ion beracun yang lebih rendah. Pada organ tanaman di atas tanah pada tanaman yang mengalami stres mikoriza. Demikian pula, kolonisasi dengan *R. intraradices* membatasi jumlah besar Pb di akar legum berkayu *Robinia pseudoacacia*, sehingga mencegah kerusakan di masa depan pada bagian di atas tanah. Namun dalam beberapa kasus, tanaman mikoriza seperti kacang merah telah dilaporkan menunjukkan peningkatan penyerapan logam berat dan transportasi akar-ke-tunas yaitu fitoekstraksi.

Setelah melampaui dinding fungi, mekanisme terkait pertahanan lainnya mulai beroperasi yang mencakup kompartementalisasi logam berat dalam vakuola, modifikasi proses transporter masuknya logam berat dan peningkatan penghabisan ion beracun melalui membran sel Vakuola fungi tampaknya memainkan peran penting dalam mengatur tingkat ion logam sitosol dengan detoksifikasi simultan ion yang berpotensi beracun. Selain itu, kelebihan ion logam dapat ditranslokasi ke wilayah vakuolar melalui aktivitas pengangkut logam tertentu seperti pengangkut Zn vakuolar (GintZnT1) atau pengangkut ABC (GintABC1). Di sisi lain, adsorpsi ion logam ke dinding sel tanaman atau fungi juga dapat dianggap sebagai mekanisme tambahan yang difasilitasi oleh khelasi logam oleh senyawa termasuk siderofor dan metallothionein (MT) yang disekresikan oleh fungi mikoriza atau senyawa turunan tanaman yang terdiri dari fitokhelatin (PC) atau fitat MT adalah polipeptida kaya sistein yang dapat mengkelat logam dan mempertahankan homeostasis atau sekuestrasi logam seluler

melalui pengikatan logam dengan gugus tiol (-SH) dari residu sisteinnya. Dalam salah satu penelitian, MT - GmarMT1 dan GintMT1 - telah dilaporkan memberikan toleransi yang lebih baik terhadap logam seperti Cd dan Cu masing-masing di *Gigaspora margarita* dan *Glomus intraradikal*.

Selain itu, banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa dengan mengatur tingkat enzim antioksidan seperti SOD, CAT dan POX, fungi mikoriza arbuskular menambah kapasitas ROS-scavenging tanaman di bawah kondisi stres logam, sehingga memberikan stress tolerance. Misalnya, tingkat SOD, CAT, POX dan GR yang lebih tinggi, serta rasio GSH/GSSG yang lebih tinggi pada tanaman kacang gude mikoriza dibandingkan dengan tanaman non-AM yang terpapar cekaman Cd dan Pb yang berkorelasi dengan pembentukan metabolit stres yang lebih rendah pada yang pertama daripada yang terakhir. Demikian pula bahwa mikorisasi dengan propagul *F. mosseae* melemahkan efek fitotoksik Cd dan Zn dalam nodul tanaman kacang merpati dengan cara yang bergantung pada genotipe dengan mengurangi serapan logam dan tingkat spesies oksigen reaktif dan dengan menambah respons pertahanan yang kemudian meningkatkan kemampuan fiksasi N₂ dari nodul dalam kondisi stres. Secara tidak langsung, dengan meningkatkan penyerapan air, perolehan nutrisi terutama P melalui hifanya, fungi mikoriza arbuskular memediasi pertumbuhan tanaman di bawah lingkungan yang terkontaminasi logam. Demikian pula, di bawah tekanan As, inokulasi dengan *F. mosseae* meningkatkan tingkat Kandungan air relatif (Relative Water content = RWC) dan Chl tanaman pada tanaman kacang polong yang terkolonisasi mikoriza arbuskular bila dibandingkan dengan tanaman non- mikoriza arbuskular. Penulis mengaitkan efek tersebut dengan augmentasi yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular dalam konten SS dan GB serta dengan peningkatan konten asam amino bebas (Free Amino Acid = FAA) dan Pro di bawah tekanan logam.

h) Fungi mikoriza arbuskular dan stres salinitas

Salinisasi tanah adalah kendala abiotik utama lainnya yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan

(a) menginduksi stres osmotik yang mengarah pada perubahan kapasitas asimilasi bersih, laju ekspansi daun, fotosintesis dan atributnya; (b) toksisitas ion spesifik yang mengganggu perolehan elemen mineral dan mengganggu homeostasis ionik; dan (c) stres oksidatif yang meningkatkan pembentukan spesies oksigen reaktif, sehingga memediasi kerusakan lipid, protein, dan asam nukleat;. Semakin banyak bukti yang menyoroti peran fungi mikoriza arbuskular sebagai penghilang stres dalam kondisi salin. Namun, simbiosis mikoriza telah sering didokumentasikan untuk meningkatkan ketahanan tanaman inang terhadap cekaman salinitas, dengan konsistensi yang lebih besar daripada cekaman kekeringan. Meskipun efek menguntungkan dari fungi mikoriza arbuskular tercatat di bawah tekanan salin, sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi tinggi garam terlarut dalam media perakaran berdampak negatif terhadap pembentukan simbiosis di sejumlah spesies tanaman karena efek negatif garam pada fungi dan tanaman inang. Misalnya, penulis menunjukkan bahwa konsentrasi garam yang tinggi menghambat perkecambahan spora/ propagul fungi serta pertumbuhan dan perkembangan hifa, sehingga secara negatif mempengaruhi kolonisasi fungi. Namun, tanaman inang dianggap lebih sensitif daripada fungi mikoriza arbuskular karena bahkan di tanah yang terganggu, propagul fungi mikoriza arbuskular tidak pernah hilang sepenuhnya, dan setiap kali kolonisasi fungi terjadi, bahkan dalam jumlah kecil, itu menginduksi efek menguntungkan pada tanaman inang yang stres. Selain itu, spesies fungi mikoriza arbuskular menunjukkan kemampuan kolonisasi yang berbeda, sehingga bervariasi dalam kemampuannya untuk mengurangi stres garam di antara genotipe tanaman. Misalnya, dalam salah satu penelitian, lab kami menunjukkan efektivitas yang lebih besar dari *R. irregularis* dalam mengurangi stres garam daripada *F. mosseae* pada genotipe kacang merpati. Selain itu, genotipe dengan persen kolonisasi dan responsivitas yang lebih tinggi menunjukkan toleransi stres yang lebih tinggi daripada genotipe dengan kemampuan lebih rendah untuk membentuk simbiosis fungi mikoriza arbuskular yang efektif.

Peningkatan kekuatan dan produktivitas tanaman seperti yang diamati pada kondisi stres garam pada tanaman yang diinokulasi

dengan fungsi mikoriza arbuskular tidak dapat menjadi hasil dari mekanisme tunggal tetapi sejumlah mekanisme berbeda yang beroperasi secara bersamaan di bawah kondisi salin yang mencakup peningkatan penyerapan nutrisi terutama efek yang diperantarai P, fungsi mikoriza arbuskular pada penyerapan air dan translokasi, peningkatan respon pertahanan (enzimatik serta antioksidan non-enzimatik), sintesis osmolit, kompartementalisasi atau pengurangan akumulasi ion beracun dan peningkatan sistem fotosintesis. Untuk mengurangi kondisi kekeringan fisiologis yang disebabkan oleh garam (suatu kondisi di mana tanaman tidak dapat memanfaatkan/ menyerap air dari rhizosfer karena konsentrasi garam terlarut yang lebih tinggi), inokulasi mikoriza meningkatkan konduktivitas hidrolis akar dengan mengubah morfologi akar secara struktural, spasial, kuantitatif dan temporal yang tidak hanya menghasilkan sistem akar yang lebih besar dan akar yang lebih baik arsitektur sistem pada tanaman mikoriza tetapi juga memungkinkan eksplorasi volume tanah yang besar, sehingga meningkatkan toleransi garam tanaman. Beberapa laporan telah menyoroti potensi fungsi mikoriza dalam mempertahankan status air yang lebih baik dan mempertahankan RWC yang lebih tinggi di atas tanaman non- mikoriza arbuskular di bawah kondisi tekanan osmotik. Baru-baru ini, telah dilaporkan RWC daun dan nilai kapasitas bertahan hidup yang lebih tinggi secara signifikan pada tanaman *Melilotus officinalis* yang diinokulasi dengan fungsi mikoriza arbuskular dibandingkan dengan tanaman non-mikoriza arbuskular di bawah berbagai cekaman garam.

Selain itu, peningkatan status air yang diperantarai fungsi mikoriza arbuskular juga dapat dikaitkan dengan pengaturan halus serapan air akar yang bergantung pada nilai Lpr , yang pada akhirnya bergantung pada fungsi aquaporin. Beberapa penulis telah mendokumentasikan bahwa fungsi mikoriza arbuskular memodifikasi pola ekspresi aquaporin tanaman inang dengan meningkatkan, menurun atau tanpa efek pada ekspresi aquaporin. Hasil tersebut menentukan bahwa setiap aquaporin memiliki fungsi spesifiknya di bawah setiap situasi stres lingkungan dan bahwa setiap tanaman akan merespons secara berbeda terhadap setiap fungsi yang berkoloni. Pada tahun 2007, telah dilaporkan bahwa dari

empat gen aquaporin, tiga gen PIP menunjukkan ekspresi yang lebih tinggi pada tanaman *Phaseolus vulgaris* yang diinokulasi dengan *G. intraradices* di bawah kondisi spesifik kekeringan, dingin dan salinitas. Selain itu, penurunan regulasi aquaporin tanaman seperti yang diamati pada tanaman mikoriza di bawah kondisi kekurangan air memungkinkan konservasi air dalam jaringan tanaman dan memperkuat efek menguntungkan dari fungi mikoriza arbuskular dalam mempertahankan status air yang lebih tinggi dari tanaman inang dalam kondisi yang merugikan. Selain itu, fungi mikoriza arbuskular telah dinyatakan mempengaruhi peristiwa seperti fosforilasi dan defosforilasi yang memungkinkan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan saluran, sehingga membantu dalam mengatur transportasi air.

Inokulasi fungi mikoriza arbuskular juga dapat memodulasi status air tanaman dengan mengumpulkan osmolit seperti FAA, Pro, GB, SS dan asam organik yang tidak hanya menurunkan potensial osmotik tetapi juga memungkinkan sel untuk mempertahankan proses terkait turgor. Dibandingkan dengan yang non-mikoriza arbuskular, peningkatan pembentukan protein terlarut dan FAA pada tanaman lada yang diinokulasi dengan *G. mosseae* ketika mengalami kondisi salin. Peningkatan yang dimediasi oleh fungi mikoriza arbuskular yang diamati pada tingkat Pro dan GB telah berkorelasi dengan pemeliharaan dan perlindungan membran tilakoid terhadap kerusakan spesies oksigen reaktif oleh beberapa penulis. Dalam salah satu penelitian, akumulasi Pro yang lebih tinggi pada tanaman buncis yang diinokulasi mikoriza dengan peningkatan substansial yang diamati pada enzim Pro anabolik – aktivitas P5CS dan GDH, dengan penurunan bersamaan pada enzim Pro katabolik – aktivitas ProDH di bawah berbagai tingkat stres garam, dengan akumulasi yang lebih tinggi tercatat dalam genotipe toleran daripada yang sensitif. Sebaliknya, akrual Pro yang lebih rendah pada tanaman mikoriza bila dibandingkan dengan tanaman non-mikoriza arbuskular di bawah berbagai tingkat stres garam yang dapat dianggap sebagai cerminan dari peningkatan resistensi garam pada tanaman mikoriza. Pada tingkat molekuler terungkap ekspresi pengkodean gen 1-pyrroline-5-carboxylate synthetase (LsP5CS) pada tanaman *Lactuca sativa* di bawah

berbagai perlakuan garam (0–100 mM NaCl) dan menunjukkan ekspresi LsP5CS yang lebih tinggi pada tanaman non- mikoriza arbuskular daripada tanaman mikoriza arbuskular pada 50 mM NaCl, meskipun pada 100 mM, levelnya serupa, menunjukkan bahwa tanaman yang diinokulasi mikoriza arbuskular mengalami jumlah stres yang lebih rendah bila dibandingkan dengan tanaman non-mikoriza arbuskular yang dapat dikreditkan ke mekanisme penghindaran garam utama yang beroperasi di yang pertama daripada yang terakhir.

Dalam studi lain juga terungkap bahwa peningkatan akumulasi GB yang dimediasi yang fungsi mikoriza arbuskular dengan penyesuaian osmotik dan proses fotosintesis efisien berikutnya yang beroperasi di tanaman jagung yang tertekan salinitas. Selain itu, penulis lebih lanjut mencatat penumpukan asam organik yang lebih tinggi pada tanaman yang mengalami stres mikoriza. Selain berperan sebagai osmoprotektan, asam organik telah dinyatakan untuk melawan kelebihan kation, sehingga mempertahankan homeostasis pH. Selain itu, kelebihanannya (terutama asam malat) dapat meningkatkan sintesis gula melalui fasilitasi pengiriman CO₂ ke siklus Calvin. Demikian pula, akumulasi SS juga telah dianggap sebagai strategi pertahanan lain yang digunakan oleh tanaman mikoriza di bawah salinitas. Gula dapat berperan untuk mencegah perubahan struktural dalam protein terlarut dan menjaga keseimbangan osmotik dalam sel tumbuhan, sehingga melindungi integritas membran. Akumulasi SS yang tinggi pada tanaman yang diberi mikoriza dapat dijelaskan oleh efek tenggelamnya fungsi yang menuntut gula dari jaringan pucuk, peningkatan laju fotosintesis dan senyawa C ke sistem akar, hidrolisis pati dan konsentrasi organik yang lebih tinggi. asam pada tanaman yang memiliki fungsi mikoriza arbuskular. Di masa lalu, banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa dengan mengubah aktivitas enzim biosintetik, kolonisasi fungsi menginduksi akumulasi trehalosa yang lebih tinggi, suatu osmoprotektan penting, sehingga melengkapi simbiosis legum-Rhizobium di bawah tekanan abiotik yang berbeda.

Selain mengurangi stres osmotik, kolonisasi tanaman inang dengan fungsi glomeromycotan telah dilaporkan mencegah translokasi Na⁺

ke jaringan pucuk dan secara bersamaan meningkatkan penyerapan K^+ dalam kondisi salin, dengan demikian menjaga keseimbangan ion dan mencegah gangguan proses seluler seperti sintesis protein. Para peneliti telah mengaitkan efek fungsi tersebut dengan kapasitasnya untuk menahan ion toksik dalam hifa fungi intraradikal atau dengan strategi kompartementalisasinya dalam vakuola sel akar yang mencegahnya diangkut ke dalam pucuk dan memastikan rasio K^+/Na^+ , Ca^{2+}/Na^+ dan NO_3^-/Cl^- yang lebih tinggi dalam jaringan, sehingga mengarah pada kelancaran fungsi metabolisme dari proses di pabrik. Selain itu, pemeliharaan rasio ionik yang lebih tinggi yang difasilitasi mikoriza arbuskular dicapai dengan mengatur ekspresi dan aktivitas transporter yang terlibat dalam penyerapan nutrisi seperti pompa K^+ , Na^+ dan H^+ yang menghasilkan kekuatan pendorong untuk transportasi ion. Selain transporter, masuknya ion dapat terjadi melalui cyclic Nucleotide-Gated Ion Channels (CNGC) yang telah diusulkan sebagai kandidat gen potensial untuk studi yang terkait dengan perbaikan stres garam pada tanaman mikoriza. Baru-baru ini, dungkap bahwa tingkat ekspresi diferensial untuk Na^+ , K^+ transportere. mungkin terlibat dalam mempertahankan homeostasis Na^+/K^+ di akar selama kolonisasi mikoriza arbuskular.

Selain K^+ , Ca^{2+} , ERM dari fungi mikoriza arbuskular, menunjukkan kemampuan untuk berkembang biak dan memanfaatkan daerah rhizosfer, sehingga merangsang penyerapan komponen mineral lainnya termasuk N, P, Mg, Cu, Fe dan Zn, sehingga mengurangi garam-induced mineral defisiensi. Namun, di antara mereka, P dianggap sebagai elemen terpenting yang diserap pada tingkat yang lebih tinggi oleh tanaman inang melalui aktivitas fungi yang menghasilkan berbagai enzim termasuk fosfatase, sehingga meningkatkan ketersediaan P di bawah tekanan NaCl. kondisi yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pemeliharaan integritas membran vakuolar dan memfasilitasi kompartementalisasi Na^+ di dalam vakuola. Akibatnya, berbagai peneliti telah berhipotesis/ mempertimbangkan perbaikan nutrisi P yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular sebagai mekanisme utama yang bertanggung jawab untuk meningkatkan toleransi pada tanaman yang diinokulasi mikoriza arbuskular dalam kondisi salin. Demikian pula,

perbaikan nutrisi P sering dikaitkan dengan peningkatan yang diamati pada laju pertumbuhan, produksi pertahanan antioksidan serta dengan nodulasi dan efisiensi fiksasi N₂ pada tanaman legum mikoriza yang terpapar lingkungan salin. Dalam salah satu penelitian, inokulasi dengan *F. mosseae* meningkatkan nodulasi akar dan menyebabkan fiksasi N₂ atmosfer yang lebih tinggi pada genotipe kacang merpati, sehingga memungkinkan tanaman mengatasi pengaruh buruk salinitas. Demikian pula, inokulasi dengan fungi mikoriza arbuskular tidak hanya meningkatkan warna merah muda leghaemoglobin (LHb) dan kandungan pigmen tetapi juga menyebabkan aktivitas nitrogenase (N₂ase) yang lebih tinggi, sehingga efisiensi fiksasi N₂ yang lebih tinggi pada tanaman mikoriza. Peningkatan yang diamati pada fiksasi N₂ dalam kacang faba untuk kolonisasi mikoriza yang mempercepat mobilisasi P, Fe, K dan mineral lain yang terlibat dalam sintesis kandungan N₂ase dan LHb. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa baik simbiosis mikoriza maupun simbiosis Rhizobium sering bekerja secara sinergis dan meningkatkan toleransi tanaman yang diinokulasi terhadap salinitas. Selain itu, dengan memfasilitasi penyerapan nutrisi termasuk K⁺, Ca²⁺ dan Mg²⁺, mikoriza mengurangi efek spesifik yang diinduksi garam pada degradasi klorofil (Chl) dan penuaan daun, sehingga meningkatkan konsentrasi Chl. Kolonisasi dengan *R. irregularis* meningkatkan tingkat asimilasi bersih dengan meningkatkan konduktansi stomata dan dengan melindungi proses fotokimia PS II terhadap stres garam. Selain itu, beberapa penelitian telah melaporkan bahwa fungi mikoriza meningkatkan serapan Si pada tanaman, sehingga memberikan ketahanan stres pada tanaman inang. Baru-baru ini, saat mengerjakan genotipe *Cicer arietinum* yang terpapar cekaman salinitas, peningkatan penyerapan elemen bermanfaat ini dalam kondisi cekaman tidak hanya memberikan ketahanan terhadap cekaman pada tanaman tetapi juga meningkatkan produktivitas tanaman.

Selain itu, peningkatan toleransi garam yang diperantarai fungi mikoriza arbuskular juga dapat dianggap berasal dari kemampuannya untuk menghilangkan penumpukan metabolit stres, sehingga mengurangi peroksidasi lipid membran dengan

meningkatkan tingkat senyawa pertahanan enzimatis dan non-enzimatis pada tanaman yang terpapar garam. Baru-baru ini, dalam salah satu penelitian, tercatat biomassa tanaman yang lebih tinggi di tanaman + fungi mikoriza arbuskular di bawah tekanan garam yang mereka anggap berasal dari peningkatan kemanjuran mesin pertahanan antioksidan dan daur ulang askorbat (ASA) dan glutathione (GSH) yang efisien yang dipertahankan keseimbangan redoks pada tanaman buncis mikoriza. Selanjutnya, penelitian telah melaporkan tingkat peroksidasi membran yang lebih rendah, sehingga menurunkan tingkat kebocoran elektrolit pada tanaman mikoriza dibandingkan dengan tanaman non-mikoriza di bawah tekanan garam. Selain itu, pengurangan peroksidasi lipid membran yang difasilitasi oleh fungi mikoriza arbuskular dan, karenanya, EL juga dapat dianggap berasal dari pemeliharaan rasio Ca^{2+}/Na^{+} yang lebih tinggi seperti yang dicatat dalam penelitian yang berbeda.

2. Keberlanjutan dan Pertanian Berkelanjutan

Dampak senyawa xenobiotik yang digunakan dalam pertanian intensif adalah masalah serius, kompleks, kontroversial, diperdebatkan secara luas oleh seluruh komunitas ilmiah dunia, dan tidak diragukan lagi terbukti menjadi ancaman berbahaya bagi ketahanan pangan, kesehatan manusia, dan kelestarian lingkungan. Masalah konsekuensi dari kontaminasi (misalnya, pengasaman tanah, ketidaksuburan tanah, residu hormon dan antibiotik, keracunan satwa liar, dan polusi air tanah, air permukaan, dan atmosfer) telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan, mempengaruhi kesehatan manusia dan hewan.

“Pembangunan berkelanjutan” berusaha memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Saat ini, tidak diragukan lagi ada kecenderungan untuk mengembangkan sistem pertanian yang kurang agresif terhadap lingkungan, berbasis teknologi ramah lingkungan, dan kurang bergantung pada input pertanian (misalnya, pupuk sintesis, herbisida, dan pestisida), untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. lingkungan, untuk

melestarikan dan meningkatkan kesehatan tanah, dan untuk menjamin kesehatan dan keamanan pangan. Untuk mencapai tujuan ini, sangat penting untuk mempromosikan kesehatan tanaman dan tanah—sifat yang merupakan hasil interaksi antara faktor fisikokimia dan biologis dan memungkinkan petani untuk memelihara tanah yang sehat dan produktif untuk tanaman tanpa merusak agroekosistem dan ekosistem.

Bagian dari komponen biologis "kesuburan tanah" terdiri dari beragam genetik dan fungsional tanah makro, meso, dan mikrobiota (misalnya, tanaman, rayap dan invertebrata lain, archaea, bakteri dan fungi nonsimbiotik, fungi dan bakteri simbiosis, dan protozoa). Komponen biologis tanah ini bertanggung jawab atas sejumlah besar layanan agroekosistem, termasuk siklus biogeokimia nutrisi tanaman, dan mendaur ulang elemen nutrisi utama dengan menguraikan residu organik Dalam sistem pertanian input rendah yang berkelanjutan, peran ekologis mikrobiota (rhizosfer dan nonrhizosfer) dalam menjaga kesehatan tanah dan kontrol biologis fitopatogen mungkin lebih penting daripada di pertanian tradisional.

3. Interaksi Mikorizofer Menuju Pertanian Berkelanjutan

Intensifikasi pertanian dan aktivitas antropogenik mempengaruhi kualitas tanah di semua tingkatan, termasuk fungsi mikrobiota tanah Istilah "rhizosfer"—diperkenalkan pertama kali oleh Hiltner (1904) digunakan untuk menggambarkan proporsi tanah yang dipengaruhi oleh akar, tetapi juga dapat diperluas untuk menggambarkan antarmuka akar-tanah yang dapat dipisahkan menjadi ektorhizosfer (tanah rhizosfer), rhizoplane (permukaan akar), dan endorhizosfer. Tanaman dan mikrobiomanya dapat dianggap sebagai "superorganisme" sebagian karena ketergantungannya pada mikrobiota tanah untuk fungsi dan sifat tertentu. Simbiosis mikoriza menginduksi transformasi sifat biologis dan edafik tanah di zona pengaruh mikoriza. Di zona pengaruh mikoriza (disebut mikorhizosfer), kemampuan fungi mikoriza arbuskular untuk mengendalikan patogen tular tanah sangat terkait dengan kapasitasnya untuk merangsang pembentukan bakteri

tanah hidup bebas yang menguntungkan, yang disebut sebagai “rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman” (PGPR), untuk biokontrol perkembangan patogen tanaman di dalam mikorisosfer sebelum infeksi akar. Gagasan bahwa tanaman liar menyimpan reservoir sifat genetik yang membantu memaksimalkan fungsi menguntungkan mikrobiota rhizosfer memberikan harapan besar untuk pemanfaatan dalam strategi pemuliaan tanaman yang bertujuan untuk mengoptimalkan interaksi tanaman-mikrobioma pada tanaman. Pengetahuan terperinci tentang bagaimana sifat-sifat supremasi tular tanah ini dikodekan dalam genom tanaman dan mikrobioma terkait tanaman akan berkontribusi pada desain tanaman masa depan yang, dalam kombinasi dengan pertanian mikroba khusus, dapat secara berkelanjutan meningkatkan produksi tanaman dengan sedikit input bahan kimia berbahaya.

Aplikasi inokulan mikoriza arbuskular dipandang sangat menarik, karena secara substansial akan mengurangi input pupuk dan pestisida. Penggunaan biostimulan pertanian dan hortikultura akan membutuhkan solusi yang disesuaikan secara lokal dan temporal. Teknologi bio-inokulum merupakan praktik pertanian yang penting, yang dapat digunakan dalam skala besar dalam pertanian berkelanjutan dan mungkin dapat meningkatkan produktivitas tanaman di bawah kondisi lingkungan yang merugikan. Tidak diragukan lagi, bahwa teknologi inokulum mikroba, yang ramah lingkungan, merupakan perspektif yang praktis dan menjanjikan di bidang pertanian berkelanjutan.

Penggunaan mikroba tanaman sebagai bio-fertilizer and bio-protector menawarkan opsi yang potensial untuk pertanian berkelanjutan terutama di bawah kondisi stres. Potensi fungi mikoriza arbuskular dalam mengatur pertumbuhan dan produktivitas tanaman dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Sekalipun, meskipun asosiasi tanaman-mikoriza arbuskular lebih tua dari 450 juta tahun, studi mendalam diperlukan pada tingkat molekuler, fisiologis dan biokimia untuk memiliki wawasan yang lebih baik tentang mekanisme yang mendasari yang terlibat dalam peningkatan toleransi stres yang diinduksi mikoriza arbuskular terhadap berbagai tekanan abiotik. Faktor penting lainnya yang

perlu dipertimbangkan termasuk pengetahuan yang baik tentang struktur komunitas fungi mikoriza arbuskular dari lingkungan tertentu dan evaluasi keragaman fungsional simbiosis ini sehingga dapat memanfaatkan potensi penuh mereka di bawah praktik remediasi yang berbeda. Menguraikan bagaimana mikroorganisme yang menguntungkan ini akan bertindak dan berinteraksi dengan akar genotipe tanaman inang serta dengan mikroba tanah lainnya di mikorhizosfer akan berkontribusi terhadap perancangan strategi pertanian berkelanjutan. (Arora, 2013; Chandran et al., 2020; Meena et al., 2017b; R. K. Singh et al., 2017; Smith & Read, 2008; Trouvelot et al., 2015; Vályi et al., 2016; Sukmawaty et al., 2016; Wang et al., 2017; Oktafitria et al., 2019; Mansir et al., 2021)

BAB V

KOMPLEKSITAS MIKROBA SEBAGAI PLANT-GROWTH PROMOTING



Zona di sekitar akar tanaman yang disebut rhizosfer merupakan wilayah aktivitas mikroba maksimum dibandingkan dengan tanah sekitarnya. Lingkungan ini merupakan habitat yang menguntungkan bagi pertumbuhan mikroba yang memberikan dampak potensial pada kesehatan tanaman serta kesuburan tanah. Sejumlah mikroba menguntungkan berasosiasi dengan sistem akar tanaman tingkat tinggi yang bergantung pada eksudat akar untuk kelangsungan hidup mereka. Di lingkungan tanah, khususnya di rhizosfer, tanaman sebagian besar dikolonisasi oleh mikroba (Aloo et al., 2020; Khalid et al., 2004; Mishra et al., 2020; Sellitto et al., 2021; Vályi et al., 2016; L. Wackett, 2013; L. P. Wackett, 2020; Wang et al., 2017).

Berbagai senyawa hadir dalam eksudat akar termasuk polisakarida dan protein memungkinkan bakteri untuk menjajah akar tanaman. Karena persaingan nutrisi, populasi mikroba yang memiliki kemampuan lebih baik untuk mendegradasi senyawa kompleks seperti kitin, selulosa, dan eksudat biji dapat bertahan lebih baik di lingkungan tersebut. Di antara populasi mikroba yang beragam, bakteri adalah mikroba yang paling melimpah yang secara kompetitif dan progresif menjajah akar tanaman. Di antara populasi bakteri yang besar ini, sejumlah strain bakteri dianggap sangat penting karena karakteristiknya yang beragam secara metabolik dan fungsional. Mereka adalah rizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman (PGPR) yang hidup bebas yang mendorong pertumbuhan tanaman melalui kolonisasi akar dan telah dipelajari

ekstensif karena efek optimis mereka pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. PGPR ini termasuk dalam beberapa genera penting termasuk *Serratia*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Burkholderia*, *Enterobacter*, *Erwinia*, *Klebsiella*, *Beijerinckia*, *Flavobacterium*, dan *Gluconacetobacter* (Hafsan et al., 2018). PGPR ini meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui berbagai mekanisme seperti mensintesis senyawa penting bagi tanaman dan memfasilitasi inang dalam penyerapan nutrisi dan juga melalui pencegahan penyakit. Mekanisme utama yang digunakan oleh PGPR dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mekanisme langsung dan tidak langsung.

Pelarutan fosfat dan produksi fitohormon dan siderofor adalah beberapa contoh dari promosi pertumbuhan langsung, sedangkan promosi pertumbuhan tidak langsung terjadi dengan menghambat pertumbuhan patogen tanaman. Selain mekanisme promosi pertumbuhan umum ini, PGPR juga melindungi tanaman dari efek merusak dari tekanan lingkungan dengan beberapa mekanisme tertentu. Ini termasuk menurunkan etilen yang diinduksi stres, produksi eksopolisakarida, mengatur penyerapan nutrisi, dan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan. Ada sejumlah laporan yang menunjukkan peran luar biasa dari populasi mikroba alami ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lingkungan normal maupun stres.

Promosi pertumbuhan tanaman yang lebih baik tergantung pada interaksi tanaman-mikroba yang positif. Interaksi tanaman-mikroba di bawah tanah lebih kompleks daripada yang terjadi di atas permukaan tanah, dan pemahaman tentang interaksi ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Interaksi tanaman-mikroba serta interaksi antara mikroba rhizosfer lainnya masih belum jelas, dan literatur menunjukkan bahwa sebagian besar interaksi ini bersifat kompleks. Pemahaman tentang ekologi mikroba, sifat pemacu pertumbuhannya, mekanisme aksi, dan aplikasinya untuk stimulasi pertumbuhan tanaman sangat penting untuk pemanfaatan maksimum populasi alami ini. Studi beragam PGPR penting tidak hanya untuk

memahami peran ekologis dan interaksinya dengan tanaman tetapi juga untuk aplikasi bioteknologi.

Fungi mikoriza arbuskular juga telah disarankan untuk memediasi pergerakan air melalui efeknya pada penyesuaian osmotik di tanaman yang dapat dicapai dengan mengakumulasi senyawa organik secara aktif termasuk prolin (Pro), gula larut (SS), glisin betaine (GB), dll. Dengan demikian, mikoriza arbuskular secara positif mengatur kadar air tanaman, turgor sel dan proses seluler terkait. Beberapa penelitian telah mendokumentasikan bahwa dengan memperoleh zat terlarut yang kompatibel (yaitu osmolit) seperti gula, fungi mikoriza arbuskular menurunkan potensi osmotik pada tanaman mikoriza yang mengalami cekaman kekeringan, sehingga memberikan ketahanan terhadap stres. Sebaliknya, banyak penelitian telah mendokumentasikan bahwa inokulasi dengan fungi mikoriza menyebabkan penurunan tingkat SS di beberapa tanaman yang terpapar kekeringan. Demikian pula, tanaman yang diinokulasi fungi mikoriza arbuskular telah didokumentasikan untuk mengakumulasi tingkat asam amino yang lebih tinggi terutama Pro yang kemudian meningkatkan toleransi kekeringan pada tanaman inang. Dalam salah satu penelitian, simbiosis fungi mikoriza arbuskular meningkatkan tingkat Pro sebesar 29, 38 dan 43% pada tanaman *Zea mays* yang terpapar kekeringan ketika diinokulasi dengan *Glomus mosseae* pada tiga konsentrasi yang berbeda. Namun, sebaliknya, banyak penelitian telah mendokumentasikan akumulasi Pro yang lebih rendah pada tanaman yang mengalami cekaman kekeringan mikoriza dibandingkan dengan tanaman non-mikoriza yang dapat dikorelasikan dengan kemampuan tanaman + mikoriza arbuskular dalam menangkal cekaman. Dalam studi lain melaporkan bahwa ketika diinokulasi dengan *Funneliformis mosseae*, tanaman *Poncirus trifoliata* mencatat akumulasi jaringan yang lebih rendah dari asam imino ini yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan dan produktivitas tanaman di bawah kondisi cekaman kekeringan. Penulis mendalilkan akrual Pro yang lebih rendah ini dengan penghambatan jalur sintesis glutamat dan jalur degradasi Pro yang ditingkatkan secara simultan. Namun meskipun ada perubahan dalam kadar zat terlarut utama, pemeliharaan turgor akar pada

mikorisasi selama cekaman kekeringan terkait dengan perubahan partisi air apoplastik/simplastik.


Studi lebih lanjut menggambarkan bahwa pengurangan stres kekeringan yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular juga dapat dikaitkan dengan peningkatan yang diamati dalam aktivitas antioksidan seperti superoksida dismutase (SOD), katalase (CAT) dan peroksidase (POX) pada tanaman yang tidak hanya menurunkan pembentukan metabolit toksik termasuk radikal superoksida, malondialdehid (MDA) dan hidrogen peroksida (H_2O_2) tetapi juga menjaga stabilitas dan integritas membran dan proses fisiologis tanaman penting lainnya di bawah kondisi stres. Misalnya, saat mengerjakan beras. Peningkatan yang dimediasi oleh mikoriza arbuskular dalam kinerja fotosintesis dalam kondisi stres yang mereka gabungkan dengan akrual senyawa antioksidan termasuk glutathione (GSH) yang tidak hanya menurunkan pembentukan H_2O_2 seluler tetapi juga mempertahankan stabilitas membran. Selain antioksidan dasar, flavonoid telah dilaporkan memainkan peran penting sebagai spsies oksigen reaktif, sehingga memberikan ketahanan kekeringan pada tanaman. Senyawa organik yang mudah menguap seperti isoprenoid, apocarotenoids dan strigolactones bertindak sebagai sistem perlindungan tambahan terhadap cekaman abiotik termasuk kekeringan.

1. Mekanisme Pemacuan Pertumbuhan Tanaman

Pemacuan pertumbuhan tanaman oleh PGPR adalah fenomena yang familiar bagi peneliti dan kalangan sebagian besar petani, dan peningkatan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh sifat-sifat tertentu dari rhizobakteri. Beberapa sifat ini sangat umum di antara spesies bakteri tertentu, namun sifat-sifat lain bisa saja bersifat spesifik terhadap beberapa spesies tertentu. Ada sejumlah mekanisme yang digunakan oleh PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman di lingkungan yang beragam kondisi. Secara umum, PGPR berfungsi sebagai fitostimulator, pupuk hayati, agen biokontrol, penjajah akar, dan pelindung lingkungan. Beberapa mekanisme penting dan berharga dibahas pada bagian berikut.

a) Fitostimulasi

Salah satu mekanisme promosi pertumbuhan langsung yang digunakan oleh PGPR adalah produksi fitohormon termasuk asam indol asetat, asam absisat, sitokinin, giberelin, dan etilen. Ada sejumlah laporan yang menganjurkan efektivitas zat pengatur tumbuh ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Fitohormon ini meningkatkan pertumbuhan tanaman berdasarkan efek positifnya pada pembelahan sel, pembesaran sel, perkecambahan biji, pembentukan akar, dan pemanjangan batang. Fitohormon mempengaruhi proses fisiologis tanaman dan memfasilitasi pertumbuhan tanaman dengan mengubah keseimbangan hormonal. Fitohormon ini sama-sama efektif dalam kondisi normal dan stres. Sebagai contoh, asam absisat ABA (ABA) membantu tanaman dalam kondisi stres dan memainkan peran penting dalam induksi fotoperiodik dari bunga. Pengamatan terhadap 35-50 % akar yang lebih panjang pada kanola yang diinokulasi dengan GR12-2 tipe liar dibandingkan dengan kontrol mutan dan tanpa inokulasi yang kekurangan IAA.



Gambar 5.1 Mekanisme PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman (Meena, 2017b)

Terdapat hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya IAA dalam pengurangan stres bunga matahari. Inokulasi benih dengan GR12-2 tipe liar menginduksi pembentukan akar tunggang yang 35-50 % lebih panjang dari akar dari benih yang diperlakukan dengan mutan defisiensi IAA dan akar dari benih yang tidak diinokulasi. Demikian pula, banyak *Pseudomonas*, *Bacillus*, dan *Azospirillum* spp. menghasilkan sitokinin dan giberelin, dan efek positif pada biomassa tanaman telah dilaporkan oleh hormon-hormon tersebut menunjukkan bahwa mekanisme utama yang digunakan oleh *Azospirillum* untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah produksi fitohormon. Meskipun fitohormon yang tersedia secara komersial juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan tanaman, namun, fitohormon yang diproduksi secara mikroba lebih efektif karena alasan bahwa ambang batas antara tingkat penghambatan dan stimulasi hormon yang diproduksi secara kimia rendah, sementara hormon mikroba lebih efektif berdasarkan kontinuitasnya.

b) Biofertilizer

Potensi PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan partisipasinya dalam siklus karbon, nitrogen, belerang, dan fosfor meningkatkan efektivitas PGPR dalam pertanian berkelanjutan. Penerapan PGPR untuk meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman merupakan praktik yang penting dan perlu dan sangat membantu untuk meningkatkan konsentrasi hara unsur-unsur esensial tertentu seperti N, P, K, Ca, Mg, Zn, Fe, dan Mn. Inokulasi kapas dengan PGPR menunjukkan peningkatan serapan N, P, K, dan Ca dan demikian pula inokulasi PGPR juga meningkatkan kandungan nutrisi jagung stres salinitas.

Konversi bentuk fosfor yang tidak larut menjadi bentuk yang tersedia untuk tanaman adalah mekanisme umum dari berbagai strain PGPR dan memainkan peran penting untuk memenuhi kebutuhan fosfor tanaman. Bakteri pelarut fosfat umum ditemukan di rhizosfer yang melarutkan fosfat anorganik dengan berbagai mekanisme seperti produksi asam organik dan anorganik, pelepasan ion H, dan produksi zat pengkelat dan melalui enzim

seperti fosfatase. Selain itu, eksopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri ini memiliki efek tidak langsung pada pelarutan fosfat dengan mengikat fosfor bebas. Juga diamati bahwa spesies yang tahan dingin mampu melarutkan P pada suhu rendah Aplikasi bakteri pelarut P dapat mengatasi masalah pengendapan P dalam tanah sehingga dapat meningkatkan ketersediaannya bagi tanaman. Peran PGPR untuk meningkatkan penyerapan makronutrien lainnya juga telah ditetapkan. Inokulasi *Pseudomonas* sp. memiliki kemampuan untuk merangsang penyerapan kalsium (Ca) menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam pertumbuhan tomat dan juga mengurangi busuk ujung buah tomat yang umumnya terjadi karena kekurangan Ca. Demikian pula, pelarutan biotit oleh bakteri pelarut mineral silikat seperti *Bacillus* sp. dapat meningkatkan ketersediaan K⁺ bagi tanaman.

Produksi siderophores senyawa pengkelat besi dengan berat molekul rendah secara langsung meningkatkan ketersediaan besi untuk tanaman dan secara tidak langsung melindungi tanaman dari organisme patogen. Siderofor memainkan peran penting dalam nutrisi besi tanaman melaporkan bahwa kompleks Fe-pyoverdine yang disintesis oleh *Pseudomonas fluorescens* C7 secara efisien diambil oleh *A. thaliana* yang menghasilkan peningkatan kandungan besi dalam jaringan tanaman dan pertumbuhan yang lebih baik. Demikian pula, strain bakteri meningkatkan pertumbuhan jagung melalui mekanisme biofertilisasi dan fitostimulasi.

Bakteri tertentu dapat memperbaiki nitrogen atmosfer dan membuatnya tersedia untuk tanaman. Hubungan simbiosis antara legum dengan bakteri pengikat nitrogen dan fiksasi nitrogen oleh bakteri yang hidup bebas tanpa membentuk asosiasi merupakan sumber nitrogen bagi tanaman. Koinokulasi PGPR dengan rhizobia menyebabkan efek positif pada fiksasi nitrogen, biomassa tanaman, dan hasil biji-bijian di berbagai tanaman seperti alfalfa, kedelai, dan kacang polong. Demikian pula *Azospirillum* sp. memiliki potensi untuk meningkatkan fiksasi nitrogen yang dapat menyumbang sekitar 70% dari total kebutuhan nitrogen tanaman

inang. Kehadiran bakteri tersebut juga meningkatkan kemampuan tanaman untuk menggunakan nitrogen secara efisien dan meminimalkan kehilangan leaching dan denitrifikasi. Beberapa genera penting dari bakteri tersebut termasuk *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, dan *Rhizobium*.

Seng juga merupakan nutrisi penting dan di tanah yang kekurangan, kelarutan Zn di dekat zona akar dapat mengurangi kekurangan bagi tanaman. Pelarutan Zn oleh *Gluconacetobacter diazotrophicus* yang terkait dengan tebu telah ditunjukkan oleh Inokulasi dengan *Burkholderia cepacia* meningkatkan serapan Zn, translokasinya dari akar ke pucuk, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Karena harga tinggi dan kekhawatiran lingkungan tertentu tentang pupuk kimia, penggunaan PGPR dalam bentuk pupuk hayati merupakan strategi pendukung yang efektif untuk menyediakan nutrisi tanaman. Penggunaan inokulan PGPR sebagai pupuk hayati memberikan dukungan yang menjanjikan untuk pupuk kimia. Selain itu penggunaan PGPR dengan pupuk anorganik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman sehingga dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi pupuk ini di satu sisi dan juga mengurangi kuantitasnya di sisi lain.

Produksi siderophores senyawa pengkelat besi dengan berat molekul rendah secara langsung meningkatkan ketersediaan besi untuk tanaman dan secara tidak langsung melindungi tanaman dari organisme patogen. Siderofor memainkan peran penting dalam nutrisi besi tanaman melaporkan bahwa kompleks Fe-pyoverdine yang disintesis oleh *Pseudomonas fluorescens* C7 secara efisien diambil oleh *A. thaliana* yang menghasilkan peningkatan kandungan besi dalam jaringan tanaman dan pertumbuhan yang lebih baik. Demikian pula, strain bakteri meningkatkan pertumbuhan jagung melalui mekanisme biofertilisasi dan fitostimulasi.

Bakteri tertentu dapat memperbaiki nitrogen atmosfer dan membuatnya tersedia untuk tanaman. Hubungan simbiosis antara legum dengan bakteri pengikat nitrogen dan fiksasi nitrogen oleh bakteri yang hidup bebas tanpa membentuk asosiasi merupakan

sumber nitrogen bagi tanaman. Koinokulasi PGPR dengan rhizobia menyebabkan efek positif pada fiksasi nitrogen, biomassa tanaman, dan hasil biji-bijian di berbagai tanaman seperti alfalfa, kedelai, dan kacang polong. Demikian pula *Azospirillum* sp. memiliki potensi untuk meningkatkan fiksasi nitrogen yang dapat menyumbang sekitar 70% dari total kebutuhan nitrogen tanaman inang. Kehadiran bakteri tersebut juga meningkatkan kemampuan tanaman untuk menggunakan nitrogen secara efisien dan meminimalkan kehilangan leaching dan denitrifikasi. Beberapa genera penting dari bakteri tersebut termasuk *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Pseudomonas*, dan *Rhizobium*.

Seng juga merupakan nutrisi penting dan di tanah yang kekurangan, kelarutan Zn di dekat zona akar dapat mengurangi kekurangan bagi tanaman. Pelarutan Zn oleh *Gluconacetobacter diazotrophicus* yang terkait dengan tebu menunjukkan bahwa Inokulasi dengan *Burkholderia cepacia* meningkatkan serapan Zn, translokasinya dari akar ke pucuk, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman

Karena harga tinggi dan kekhawatiran lingkungan tertentu tentang pupuk kimia, penggunaan PGPR dalam bentuk pupuk hayati merupakan strategi pendukung yang efektif untuk menyediakan nutrisi tanaman. Penggunaan inokulan PGPR sebagai pupuk hayati memberikan dukungan yang menjanjikan untuk pupuk kimia. Selain itu penggunaan PGPR dengan pupuk anorganik dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman sehingga dapat berguna untuk meningkatkan efisiensi pupuk ini di satu sisi dan juga mengurangi kuantitasnya di sisi lain.

c) Kolonisasi Akar dan Kompetensi Rhizosfer

Rhizosfer adalah habitat yang kompleks dengan perubahan temporal dan spasial di mana populasi tanaman dan mikroba berinteraksi satu sama lain dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor biotik dan abiotik. Keberhasilan bakteri untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman tergantung pada potensinya untuk menjajah akar tanaman. Efek signifikan dari inokulasi mikroba tidak dapat diperoleh kecuali lingkungan mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba yang diperkenalkan ini. Ketidakefektifan PGPR, terutama pada kondisi lapangan,

disebabkan oleh ketidakmampuannya mengkoloni akar tanaman dengan baik. Salah satu aspek kolonisasi akar yang lebih baik adalah kemampuan bakteri untuk bersaing dengan populasi mikroba asli. Sebagai mikroba yang paling melimpah, kemungkinan besar bakteri dapat menyebabkan efek yang besar pada fisiologi tanaman karena daya saingnya yang lebih baik untuk kolonisasi akar. Literatur menunjukkan bahwa strain PGPR tertentu memiliki kemampuan untuk mentolerir lingkungan yang tidak menguntungkan dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai populasi terbaik untuk mempromosikan produksi tanaman. Mikroba menggunakan strategi yang berbeda untuk kelangsungan hidup mereka di lingkungan. Keberhasilan strategi ini tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan kondisi nutrisi terbatas, pemanfaatan eksudasi akar yang efisien, serta interaksinya dengan tanaman. Di lingkungan tanah, kelangsungan hidup bakteri yang diinokulasi tergantung pada ketersediaan ceruk kosong, sehingga mereka dapat bersaing secara efektif dengan populasi mikroba asli yang diadopsi lebih baik. Telah diamati bahwa PGPR yang memiliki beberapa sifat tertentu seperti aktivitas ACC-deaminase dan produksi enzim antioksidan, eksopolisakarida, dan zat terlarut organik memiliki beberapa keunggulan selektif dibandingkan bakteri lain di bawah lingkungan stres. Berbagai senyawa, seperti protein permukaan dan polisakarida, memiliki peran yang baik dalam perlekatan bakteri ke akar tanaman, dan bakteri tersebut memiliki keunggulan kompetitif untuk menjajah akar tanaman karena ini exopolysaccharides membantu mereka untuk menempel dan menjajah akar karena bahan fi brillar yang secara permanen menghubungkan bakteri ke permukaan akar.

d) Aktivitas Enzim

Peningkatan pertumbuhan melalui aktivitas enzimatik adalah mekanisme lain yang digunakan oleh PGPR. Strain bakteri dapat menghasilkan enzim tertentu seperti selulase, ACCdeaminase, dan kitinase. Melalui aktivitas enzim-enzim tersebut, bakteri berperan sangat penting dalam pemacu pertumbuhan tanaman terutama untuk melindunginya dari cekaman biotik dan abiotik. Misalnya, pengurangan kadar etilen yang meningkat di bawah tekanan oleh aktivitas ACC-deaminase dan penekanan penyakit oleh aktivitas

kitinase adalah mekanisme umum yang digunakan oleh PGPR. Demikian pula, peningkatan pembentukan bintil oleh rhizobia mungkin karena produksi enzim hidrolitik seperti selulase yang dapat membuat penetrasi rhizobia ke dalam rambut akar menyebabkan peningkatan jumlah bintil.

e) Peningkatan Pertumbuhan Melalui Vitamin

Vitamin adalah faktor nutrisi organik yang mempengaruhi pertumbuhan organisme hidup. Selain vitamin yang ada dalam eksudat akar sebagai sumber pertumbuhan bakteri, spesies bakteri tertentu juga menghasilkan vitamin. Seperti sifat pemacu pertumbuhan lainnya dari PGPR, produksi vitamin juga menyebabkan efek positif pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemampuan kolonisasi akar lebih dari fluoresensi *Pseudomonas* penghasil vitamin telah diamati. Demikian pula, co-inokulasi *P. fluorescens* penghasil vitamin dan *Rhizobium* merangsang pertumbuhan dan fiksasi nitrogen simbiosis di tanaman semanggi

f) Aktivitas Biokontrol

Mekanisme biokontrol untuk menekan penyakit merupakan strategi penting melawan sejumlah patogen tanaman yang menyebabkan penurunan hasil panen. PGPR juga berperan sebagai agen biokontrol yang efektif dengan menekan efek penyakit. dan memberikan perlindungan bagi tanaman terhadap patogen berbahaya. PGPR menggunakan mekanisme tertentu termasuk kompetisi, produksi antibiotik, degradasi dinding sel fungi, dan penyerapan besi oleh produksi siderophores.

Enzim pendegradasi dinding sel sangat penting untuk mengendalikan fungsi fitopatogen. Kitinase, selulase, dan liase adalah enzim pengurai dinding sel fungi yang terkenal. Enzim ini memainkan peran yang sangat penting dengan menekan timbulnya penyakit. Adanya enzim kitinase pada *Pseudomonas* sp. menghambat pertumbuhan *Rhizoctonia solani* dengan cara mendegradasi dinding sel. Hidrogen sianida antibiotik volatil yang diproduksi oleh strain bakteri tertentu juga berperan dalam penekanan penyakit. Penekanan busuk hitam tembakau oleh

produsen HCN strain *Pseudomonas*. Produksi siderophores oleh bakteri mengurangi ketersediaan besi untuk fungi, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhannya melaporkan penekanan penyakit yang disebabkan oleh *Pythium* sp. karena siderophores yang menurunkan ketersediaan besi untuk pertumbuhan fungi. Ini juga merupakan fakta nyata bahwa fungi tidak dapat menyerap kompleks besi-siderofor yang menyebabkan tidak tersedianya besi untuk fungi patogen. Siderofor bakteri juga disarankan untuk terlibat dalam menginduksi resistensi sistemik (ISR) yang meningkatkan kapasitas pertahanan tanaman terhadap patogen. Peningkatan ISR dalam tomat telah dilaporkan oleh siderophores, pyochelin, dan pyocyanin. Demikian pula, sejumlah laporan telah menunjukkan efektivitas PGPR untuk meningkatkan ISR terhadap berbagai penyakit fungi dan virus. Resistensi sistemik juga dapat diinduksi oleh mekanisme dimana bakteri penginduksi dan patogen tetap terpisah tanpa menunjukkan interaksi langsung.

g) Detoksifikasi Polutan Organik dan Anorganik

Promosi pertumbuhan tanaman dengan inokulasi PGPR juga disebabkan oleh pengurangan dan peningkatan toleransi tanaman terhadap logam berat. Bakteri menggunakan mekanisme intra dan ekstra yang berbeda untuk mendetoksifikasi efek merugikan dari logam berat dalam jaringan mereka. Mekanisme ini meliputi produksi protein yang menyerap logam berat dan detoksifikasi dengan memasukkannya ke dalam vakuola. Mekanisme yang digunakan oleh PGPR untuk menoleransi dan mendetoksifikasi logam berat juga dapat bervariasi di antara spesies bakteri dan juga untuk logam yang berbeda. Misalnya, mikroba dapat mendetoksifikasi seng (Zn) dengan mengikatnya di membran luar, dengan memproduksi protein pengikat Zn, dan/atau dengan kompleksasi asam organik. Inokulasi bakteri mengakibatkan degradasi klorobenzoat dan pestisida dan peningkatan pertumbuhan tanaman dengan inokulasi PGPR di tanah yang sangat terkontaminasi.

Produksi siderophores oleh bakteri tahan logam memainkan peran penting dalam keberhasilan kelangsungan hidup dan pertumbuhan tanaman di tanah yang terkontaminasi dengan mengurangi dampak

stres logam berat pada tanaman. Juga, produksi enzim dan hormon tertentu yang memobilisasi logam berat dan interaksi tanaman-mikroba mempengaruhi proses bioremediasi. Sebagai contoh, inokulasi *Lupinus luteus* dengan *B. cepacia* tahan nikel yang direkayasa secara genetik menunjukkan konsentrasi nikel yang tinggi sekitar 30% lebih banyak daripada kontrol yang tidak diinokulasi. Penerapan bakteri tersebut dapat membantu untuk menghilangkan logam berat dari lingkungan.

h) Peningkatan Aktivitas Fotosintesis

Fotosintesis dianggap sebagai salah satu reaksi yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di bawah lingkungan stres, pengurangan fotosintesis terjadi yang mungkin disebabkan oleh penurunan ekspansi daun, penuaan daun dini, gangguan fotosintesis.

mesin, dan pengurangan terkait dalam produksi pangan. PGPR memungkinkan tanaman untuk mempertahankan pertumbuhannya dengan menyebabkan efek positif pada fotosintesis. melaporkan bahwa penurunan aktivitas fotosintesis mungkin disebabkan oleh tekanan osmotik dan penutupan stomata; namun, penerapan PGPR meminimalkan dampak negatif ini dan menyebabkan peningkatan fotosintesis yang tidak signifikan. peningkatan kandungan klorofil pada selasih cekaman kekeringan (*Ocimum basilicum* L.) dengan aplikasi PGPR. Lebih banyak peningkatan kandungan klorofil diamati di mana PGPR diterapkan dalam kombinasi daripada sendiri. Peningkatan panjang tunas, kandungan klorofil, dan berat kering diamati ketika tanaman pisang diinokulasi dengan PGPR. Menurut mereka, peningkatan pertumbuhan ini selain faktor-faktor lain kemungkinan disebabkan oleh akumulasi nitrogen yang lebih tinggi yang berkontribusi pada pembentukan klorofil yang akibatnya meningkatkan aktivitas fotosintesis. Peningkatan aktivitas fotosintesis di *Arabidopsis* oleh emisi volatil dari *Bacillus subtilis* mungkin karena akumulasi besi, karena besi sering menjadi ion pembatas dalam fotosintesis. Mereka juga mengamati bahwa ketika sinyal volatil bakteri ditarik, kapasitas fotosintesis dan kandungan besi kembali ke tingkat yang tidak diobati. Pentingnya besi telah didokumentasikan yang menunjukkan bahwa biogenesis

dari aparatus fotosintesis membuat tuntutan berat ketersediaan besi.

i) Toleransi stres

Karena sistem pensinyalan yang berkembang, mikroba membangun tingkat kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap tekanan lingkungan. Bakteri diketahui dengan kemampuannya untuk mentolerir kondisi stres karena susunan genetiknya yang luar biasa. Strain PGPR telah menunjukkan toleransi terhadap kondisi stres seperti salinitas dan kekeringan menunjukkan kemampuan resistensi yang besar, misalnya *Bradyrhizobium japonicum*. Meskipun adaptasi mikroba untuk situasi seperti itu sulit untuk dipahami. Namun, karena beberapa sifat khusus mereka yang memungkinkannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya, produksi eksopolisakarida (EPS) oleh bakteri yang melindungi sel mereka dari kondisi yang tidak menguntungkan dan meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Dalam studi sebelumnya, juga menunjukkan korelasi yang signifikan antara jumlah EPS yang dihasilkan oleh bakteri dan toleransi pengeringan mereka. Akumulasi poli- β -hidroksibutirat selama kondisi salin dan osmoprotektan lain seperti prolin dan ektoin (1,4,5,6-tetrahidro-2-metil-4-pirimidin asam karboksilat) adalah kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Terjadinya galur yang toleran terhadap cekaman semacam itu bisa sangat efektif untuk memperbaiki kesuburan tanah dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, dan penerapan galur tahan cekaman semacam itu juga bisa sangat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman di bawah cekaman lingkungan. Mekanisme tersebut tidak hanya menunjukkan kemampuan strain bakteri untuk bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan tanah tetapi juga memungkinkan mereka untuk bersaing secara efektif dengan populasi mikroba lainnya. Mekanisme ini bisa sangat berguna untuk menjaga kondisi tanah yang tepat dan mempromosikan pertanian berkelanjutan.

2. Aplikasi Plant Growth-Promoting Rhizobacteria

Karena kemampuan memacu pertumbuhan yang teruji, PGPR digunakan secara efektif untuk meningkatkan produksi tanaman.

Kemampuan PGPR dalam meningkatkan pertumbuhan telah diamati di laboratorium di bawah kondisi kontrol serta di rumah kaca alami dan kondisi lapangan. Perbaikan tanaman dengan inokulasi PGPR di bawah lingkungan normal dan lingkungan yang tidak menguntungkan telah ditinjau dan dikaji oleh para peneliti dari berbagai penjurur.

a) Pemacuan Pertumbuhan Tanaman Dalam Kondisi Normal

Penggunaan PGPR merupakan pendekatan biologis yang efektif untuk meningkatkan hasil panen dan diterapkan pada berbagai spesies pertanian. Inokulasi dengan PGPR mendorong pertumbuhan tanaman melalui produksi fitohormon, pelarutan fosfat, produksi siderofor, pengaturan kadar hormon, dan mekanisme tertentu lainnya yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Panjang akar canola, selada, tomat, barley, gandum, dan oat meningkat ketika benih tanaman ini diperlakukan dengan PGPR. Selain itu, juga telah dilaporkan bahwa akar tanaman yang diinokulasi lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan dengan kontrol yang tidak diberi perlakuan. Peningkatan pertumbuhan yang terjadi disebabkan oleh sifat bakteri yang umum dan tertentu, seperti yang terlihat dari penelitian yang menguji delapan galur PGPR untuk aktivitas pertumbuhannya dalam kedelai. Terbukti bahwa enam galur mendorong pertumbuhan lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, dan mereka mengamati bahwa galur ini mengandung aktivitas ACC-deaminase di samping karakteristik lainnya. Peningkatan pertumbuhan oleh PGPR juga telah dilaporkan dalam kondisi lapangan alami. Inokulasi dengan PGPR meningkatkan bobot kering daun, batang, dan bulir jagung. Inokulasi PGPR menyebabkan efek yang signifikan pada indeks luas daun dan indeks pertumbuhan tanaman. Sejumlah penelitian lain juga menunjukkan pentingnya PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman.

Banyak penelitian yang dilakukan oleh berbagai peneliti menunjukkan bahwa PGPR dapat digunakan sebagai pupuk hayati, dan dengan demikian, penggunaan pupuk kimia dapat dikurangi. Penerapan empat galur PGPR yang memiliki berbagai sifat pemacu pertumbuhan meningkatkan biomassa terong karena ketersediaan

dan serapan hara yang seimbang. Pemacu pertumbuhan ini juga dikaitkan dengan sifat pemacu pertumbuhan lainnya terutama asam indolasetat dan siderofor. Demikian pula dalam studi rumah kaca, penerapan enam strain bakteri pada tanaman jagung mendorong pertumbuhan akar dan tunas dan status nutrisi tanaman terutama nitrogen dan fosfor. Temuan tersebut menegaskan perspektif PGPR sebagai fitostimulator dan pupuk hayati untuk tanaman pertanian. Mikroba ini juga sama efektifnya untuk mendorong pertumbuhan pohon buah-buahan seperti apel, aprikot, stroberi, plum, dan murbei. Studi awal yang dilakukan oleh sebagian besar pekerja menunjukkan aktivitas pemacu pertumbuhan PGPR melalui beberapa mekanisme umum langsung dan tidak langsung; namun, produksi senyawa volatil oleh bakteri merupakan mekanisme pendorong pertumbuhan lainnya. Senyawa volatil yang dihasilkan oleh *Bacillus megaterium* memiliki aktivitas pemacu pertumbuhan yang besar pada *A. thaliana*. Berat segar tanaman yang diinokulasi dua kali lipat lebih banyak daripada yang tidak diinokulasi. Mereka mengemukakan bahwa 2-pentilfuran merupakan senyawa yang berperan penting dalam aktivitas pemacu pertumbuhan tanaman strain bakteri ini.

b) Pemacu Pertumbuhan Tanaman pada Cekaman Lingkungan Tekanan lingkungan adalah faktor yang paling membatasi produktivitas tanaman. Baik cekaman biotik dan abiotik termasuk salinitas, kekeringan, suhu ekstrim, dingin, logam berat, dan serangan serangga dan patogen adalah stres yang paling merugikan dan umum dihadapi tanaman di lingkungan alami. Tekanan ini mempengaruhi proses tanaman normal dalam satu atau lain cara dan karena itu menyebabkan penurunan yang signifikan dalam hasil panen. Inokulasi PGPR juga terbukti efektif untuk mengurangi dampak negatif dari tekanan tersebut. Selain meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam kondisi normal, PGPR memiliki potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dalam kondisi buruk. PGPR menggunakan berbagai mekanisme untuk memerangi tekanan ini dan memungkinkan tanaman untuk mempertahankan pertumbuhannya di bawah lingkungan stres (Gbr. 2.2). Ada sejumlah laporan yang menjelaskan efektivitas PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman di bawah lingkungan

stres. Strain PGPR ditemukan sama efektifnya untuk promosi pertumbuhan ini dalam lingkungan stres variabel seperti salinitas, kekeringan, logam berat, stres nutrisi, dan patogen.

Toleransi Stres Abiotik Rhizobacteria sebagai Agen Biokontrol

Di lingkungan tanah, terdapat sejumlah patogen tanaman yang menurunkan hasil panen. Meskipun patogen tanaman ini dapat dikendalikan dengan aplikasi bahan kimia dan menanam varietas tahan penyakit, namun, ada kekhawatiran lingkungan tertentu tentang penggunaan bahan kimia seperti sifat persistennya di tanah seperti serta akumulasi residu beracun bahan kimia ini di bagian makanan. Beberapa bahan kimia beracun ini telah dilarang karena sifatnya yang persisten. Demikian pula dalam kasus-kasus tertentu, ketahanan tanaman yang tahan secara genetik sering dipatahkan oleh patogen yang mengakibatkan penurunan hasil panen. Strategi alternatif untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan PGPR yang bertindak sebagai agen biokontrol berdasarkan mekanisme biokontrol tertentu seperti produksi antibiotik, produksi metabolit antifungi, penurunan ketersediaan zat besi untuk organisme patogen, produksi enzim pendegradasi dinding sel fungi dan melalui resistensi sistemik yang diinduksi. Sejumlah laporan menunjukkan efektivitas PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan melindunginya dari patogen. PGPR memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan fungi untuk penyerapan besi karena produksi siderophores. Siderofor ini memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap besi, dan bakteri dapat mengambil kompleks besi-siderofor. Dengan menggunakan mekanisme ini, PGPR menghambat pertumbuhan patogen dengan mengurangi ketersediaan besi dan oleh karena itu memberikan perlindungan pada tanaman terhadap penyakit.

Tinjauan tersebut menunjukkan efektivitas PGPR untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman di bawah lingkungan normal maupun stres. Promosi pertumbuhan tersebut disebabkan oleh mekanisme langsung dan tidak langsung tertentu yang digunakan oleh PGPR. Tergambar pula bahwa inokulasi benih atau bibit tanaman dengan galur yang paling menjanjikan yang

memiliki sifat pemacu pertumbuhan terbaik tidak hanya memungkinkan tanaman untuk mempertahankan pertumbuhan yang tepat tetapi juga menyebabkan dampak positif pada kesehatan tanah yang didiaminya.

3. Peran Konsorsium Bakteri dalam Kemajuan Pertanian

Meskipun tinjauan yang dibahas di atas menyoroti efektivitas rhizobakteri untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman di bawah lingkungan stres, namun, dalam kasus tertentu, hasil yang diperoleh di laboratorium tidak dapat direproduksi di lapangan. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya kualitas inokula dan/ atau ketidakmampuan bakteri untuk bersaing dengan populasi asli di bawah kondisi lingkungan yang merugikan. Variasi besar dalam respon tanaman terhadap PGPR di laboratorium dan uji lapangan menunjukkan bahwa potensi penuh rhizobacteria untuk mendorong pertumbuhan tanaman harus diselidiki lebih luas. Perlu dikembangkan inokulum yang efisien yang dapat bekerja lebih baik di bawah kondisi lapangan. Penerapan multistrain PGPR dalam kombinasi bisa lebih bermanfaat daripada strain tunggal. Telah dilaporkan bahwa ko-inokulasi dan kokultur mikroba memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi tugas dengan cara yang efisien daripada inokulasi strain tunggal. Setiap strain dalam konsorsium multistrain dapat bersaing secara efektif dengan populasi rhizosfer asli dan juga meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan mitranya. Kedua galur yang digunakan dalam suatu konsorsium menunjukkan bahwa masing-masing galur tidak hanya bersaing dengan sukses untuk pembentukan rhizosfer tetapi juga mendorong pertumbuhan tanaman. Koinokulasi *Rhizobium* dengan PGPR terbukti bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan nodulasi.

Aspek penting lainnya mengenai formulasi adalah bahan pembawa, yang berperan aktif dalam umur simpan formulasi. Ini membantu dalam stabilisasi dan perlindungan sel mikroba selama penyimpanan dan transportasi. Ini juga melindungi bahan aktif, yaitu mikroba dari kondisi lingkungan, dan meningkatkan aktivitasnya di lapangan. Berbagai bahan pembawa organik dan

anorganik digunakan untuk pengembangan formulasi Pembawa organik seperti gambut memiliki beberapa keuntungan karena kandungan nutrisinya yang lebih tinggi, dan, bagaimanapun, sterilisasi lengkap dengan uap sulit dilakukan, dan juga selama sterilisasi, produk sampingan beracun dihasilkan yang dapat menyebabkan penurunan populasi bakteri. Oleh karena itu, penggunaan pembawa anorganik mungkin merupakan strategi yang baik untuk meningkatkan efektivitas formulasi mikroba. Namun, efektivitas bahan pembawa anorganik ini mungkin juga berbeda, formulasi pembawa steril dan nonsteril secara signifikan meningkatkan pertumbuhan *Vigna mungo* dan *Triticum aestivum*. Aplikasi inokulan mikroba dalam bentuk butiran atau cairan juga mendapat banyak perhatian saat ini. Untuk mengoptimalkan pembentukan nodul, inokulan granular khususnya rhizobia dapat ditempatkan di bawah atau di samping benih dengan peralatan yang sesuai dengan kedalaman penyemaian dan ketersediaan kelembaban. Di sisi lain, karena aplikasi inokulan cair yang mudah, formulasi cair juga telah mencapai banyak popularitas. Namun, kedua jenis formulasi tersebut telah menunjukkan efektivitasnya untuk meningkatkan hasil biomassa kedelai. Mereka juga telah menunjukkan bahwa formulasi rhizobia dan PGPR memberikan respon yang lebih baik.

Penggunaan inokulan multistrain bisa menjadi strategi yang baik yang memungkinkan organisme berhasil bertahan hidup dan mempertahankan diri dalam komunitas. Studi mikroba yang dilakukan tanpa tanaman menunjukkan bahwa beberapa kombinasi memungkinkan bakteri untuk berinteraksi satu sama lain secara sinergis, menyediakan nutrisi, menghilangkan produk penghambatan, dan merangsang pertumbuhan satu sama lain melalui aktivitas fisik dan biokimia yang mungkin berdampak menguntungkan pada fisiologi mereka.

mempelajari efektivitas *Azospirillum*, *Azotobacter*, *seudomonas*, dan *Bacillus* sp. secara terpisah dan dalam kombinasi pada *Withania somnifera* selama dua tahun berturut-turut. Mereka mengamati bahwa konsorsium PGPR secara signifikan meningkatkan tinggi tanaman, panjang akar, dan kandungan


alkaloid pada *W. somnifera* bila dibandingkan dengan kontrol yang tidak diinokulasi dan inokulasi tunggal. Demikian pula, inokulasi ganda dengan *Azotobacter* dan *Azospirillum* secara signifikan meningkatkan berat kering total, indeks luas daun, dan indeks pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas*) meningkat secara maksimal di rumah kaca dan percobaan lapangan ketika tiga galur diterapkan bersama-sama. Koinokulasi memberikan peningkatan terbesar dan paling konsisten dalam berat pucuk, bobot akar, biomassa total, panjang pucuk dan akar, klorofil total, lebar pucuk, dan hasil biji. Demikian pula, konsorsium tiga strain memberikan kinerja terbaik dalam hal parameter pertumbuhan *Lycopersicum esculentum*. Mereka menunjukkan bahwa penggunaan pupuk hayati gabungan yang mengandung konsorsium bakteri merupakan inokulan yang sangat baik untuk kinerja pertumbuhan tanaman.

Sejauh pertumbuhan di bawah lingkungan stres yang bersangkutan, Konsorsium bakteri lebih efektif untuk menginduksi toleransi salinitas pada tanaman gandum. Mereka menganggapnya sebagai teknologi yang dapat diterima dan ramah lingkungan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan pabrik di bawah lingkungan stres. Mereka mengamati bahwa selain meningkatkan biomassa kering, gula larut, dan kandungan prolin, kandungan natrium gandum berkurang di bawah kondisi co-inokulasi tetapi tidak setelah inokulasi tunggal dengan salah satu strain atau dalam kontrol. Hasil menunjukkan bahwa ko-inokulasi dengan *B. subtilis* dan *Arthrobacter* sp. dapat mengurangi efek buruk dari salinitas tanah pada pertumbuhan gandum. Konsorsium bakteri juga efektif untuk melindungi tanaman dari penyakit di lapangan. Terbukti bahwa pengendalian efektif virus nekrosis pada bunga matahari dapat diperoleh dengan aplikasi formulasi bubuk dan cair dari konsorsium PGPR. Mereka menerapkan dua konsorsium bakteri yang terdiri dari *Pseudomona*, *Bacillus*, dan *Streptomyces* spp. Penurunan penyakit yang signifikan terjadi dengan peningkatan perkecambahan biji, tinggi tanaman, dan hasil panen. Mereka menunjukkan bahwa konsorsium PGPR menunjukkan rasio manfaat-biaya yang tinggi dibandingkan dengan praktik petani dan kontrol yang tidak diberi perlakuan.

4. Karakter Bakteri untuk Pengembangan Formulasi

Meskipun sejumlah besar strain mikroba dapat digunakan untuk pengembangan formulasi dan juga kinerjanya diamati, namun ada beberapa kendala untuk komersialisasi inokulan mikroba tersebut. Salah satu tantangan dalam pengembangan inokulan PGPR secara komersial adalah pemilihan galur yang memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan populasi asli dan juga memiliki kemampuan untuk mempertahankan pertumbuhan mereka di bawah lingkungan yang tidak menguntungkan.

Aspek terpenting dalam hal ini adalah pemilihan galur-galur yang memiliki spesifikasi tanaman inang serta adaptasi terhadap kondisi tanah dan iklim. Organisme dengan sifat unggul seperti unggul dalam pelarutan fosfat, produksi fitohormon, kolonisasi akar, siderofor, dan produksi asam indolasetat merupakan karakteristik yang dianggap penting untuk dimiliki strain mikroba sebagai bioinokulan yang ideal.



Gambar 5.2. Effect of PGPR on the sustainability of agriculture system (Arora, 2013)

Untuk mengembangkan formulasi PGPR yang sesuai, selain sifat-sifat pemacu pertumbuhan yang telah disebutkan, bakteri harus memiliki kemampuan untuk mentolerir kondisi lingkungan yang ekstrim seperti kekeringan, panas, salinitas, dan logam beracun. Formulasi tersebut harus memiliki kompetensi rhizosfer yang tinggi dan kompatibilitas dengan rhizobakteri lain. Bakteri tersebut juga harus memiliki kemampuan multiplikasi dan spektrum aksi yang luas. Tambahan untuk memahami karakteristik lain, PGPR juga harus memiliki viabilitas yang tinggi dan umur simpan yang baik. Efektivitas biaya, umur simpan, dan sistem pengiriman adalah aspek yang sangat penting yang harus diingat saat menyiapkan formulasi mikroba agar lebih fungsional dan ekonomis (Arora, 2013; Carlson et al., 2020; Haskett et al., 2021; Hassan et al., 2019; Ilangumaran & Smith, 2017; Khalid et al., 2004; Miransari, 2014; Paul & Lade, 2014; VIMAL et al., 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Aloo, B. N., Mbega, E. R., & Makumba, B. A. (2020). Rhizobacteria-Based Technology for Sustainable Cropping of Potato (*Solanum tuberosum* L.). *Potato Research*, 63(2), 157–177. <https://doi.org/10.1007/s11540-019-09432-1>
- Arora, N. K. (2013). Plant microbe symbiosis: Fundamentals and advances. In *Plant Microbe Symbiosis: Fundamentals and Advances* (pp. 1–459). <https://doi.org/10.1007/978-81-322-1287-4>
- Arora, N. K. (2015). Plant Microbes Symbiosis: Applied Facets. In N. K. Arora (Ed.), *Plant Microbes Symbiosis: Applied Facets*. Springer.
- Carlson, R., Tugizimana, F., Steenkamp, P. A., Dubery, I. A., Hassen, A. I., & Labuschagne, N. (2020). Rhizobacteria-induced systemic tolerance against drought stress in *Sorghum bicolor* (L.) Moench. *Microbiological Research*, 232, 126388. <https://doi.org/10.1016/j.micres.2019.126388>
- Chandran, V., Shaji, H., & Mathew, L. (2020). Endophytic microbial influence on plant stress responses. In *Microbial Endophytes* (pp. 161–193). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819654-0.00007-7>
- Choudhary, D. K., & Varma, A. (2016). Microbial-mediated Induced Systemic Resistance in Plants. In D. K. Choudhary & A. Varma (Eds.), *Microbial-Mediated Induced Systemic Resistance in Plants*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-0388-2>
- Dassen, S. (2018). Diversity relations of plants and soil microbes. In *Diversity relations of plants and soil microbes*.
- Dodds, W. K., & Whiles, M. R. (2020a). Chapter 9 - Microbes and Plants. In *Freshwater Ecology*.
- Dodds, W. K., & Whiles, M. R. (2020b). Microbes and Plants. In *Freshwater Ecology* (pp. 211–249). Elsevier.

<https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813255-5.00009-0>

- Enebe, M. C., & Babalola, O. O. (2019). The impact of microbes in the orchestration of plants' resistance to biotic stress: a disease management approach. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 103(1), 9–25. <https://doi.org/10.1007/s00253-018-9433-3>
- Finkel, O. M., Castrillo, G., Herrera Paredes, S., Salas González, I., & Dangl, J. L. (2017). Understanding and exploiting plant beneficial microbes. *Current Opinion in Plant Biology*, 38, 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2017.04.018>
- Hafsan, Agustina, L., Natsir, A., & Ahmad, A. (2020). The stability of phytase activity from burkholderia sp. Strain HF.7. *EurAsian Journal of BioSciences*, 14(1), 973–976.
- Hafsan, H., Nurhikmah, N., Harviyanti, Y., Sukmawati, E., Rasdianah, I., Muthiadin, C., Agustina, L., Natsir, A., & Ahmad, A. (2018). The Potential of Endophyte Bacteria Isolated from Zea mays L. as Phytase Producers. *Journal of Pure and Applied Microbiology*, 12(3), 1277–1280. <https://doi.org/10.22207/JPAM.12.3.29>
- Haskett, T. L., Tkacz, A., & Poole, P. S. (2021). Engineering rhizobacteria for sustainable agriculture. *The ISME Journal*, 15(4), 949–964. <https://doi.org/10.1038/s41396-020-00835-4>
- Hassan, M., McInroy, J., & Kloepper, J. (2019). The Interactions of Rhizodeposits with Plant Growth-Promoting Rhizobacteria in the Rhizosphere: A Review. *Agriculture*, 9(7), 142. <https://doi.org/10.3390/agriculture9070142>
- Ilangumaran, G., & Smith, D. L. (2017). Plant Growth Promoting Rhizobacteria in Amelioration of Salinity Stress: A Systems Biology Perspective. *Frontiers in Plant Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01768>
- Jacoby, R., Peukert, M., Succurro, A., Koprivova, A., & Kopriva, S. (2017). The Role of Soil Microorganisms in Plant Mineral Nutrition—Current Knowledge and Future Directions. *Frontiers in Plant Science*, 8.

<https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01617>

- Jochum, M. D., McWilliams, K. L., Borrego, E. J., Kolomiets, M. V., Niu, G., Pierson, E. A., & Jo, Y.-K. (2019). Bioprospecting Plant Growth-Promoting Rhizobacteria That Mitigate Drought Stress in Grasses. *Frontiers in Microbiology*, *10*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02106>
- Khalid, A., Arshad, M., & Zahir, Z. A. (2004). Screening plant growth-promoting rhizobacteria for improving growth and yield of wheat. *Journal of Applied Microbiology*, *96*(3), 473–480. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2003.02161.x>
- Khare, E., Tyagi, S., & Patil, K. S. (2020). Language of plant-microbe interactions in rhizospheric ecosystems. In *Molecular Aspects of Plant Beneficial Microbes in Agriculture* (pp. 59–76). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818469-1.00005-5>
- Kumar, P., Thakur, S., Dhingra, G. K., Singh, A., Pal, M. K., Harshvardhan, K., Dubey, R. C., & Maheshwari, D. K. (2018). Inoculation of siderophore producing rhizobacteria and their consortium for growth enhancement of wheat plant. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, *15*, 264–269. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2018.06.019>
- Leguin, M., Smets, W., Vandenheuvel, D., Eilers, T., Muyshondt, B., Prinsen, E., Samson, R., & Lebeer, S. (2020). Modes of Action of Microbial Biocontrol in the Phyllosphere. *Frontiers in Microbiology*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01619>
- Liu, H., Brettell, L. E., Qiu, Z., & Singh, B. K. (2020). Microbiome-Mediated Stress Resistance in Plants. *Trends in Plant Science*, *25*(8), 733–743. <https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.03.014>
- Lugtenberg, B. (2015). Principles of Plant-Microbe Interactions. In B. Lugtenberg (Ed.), *Principles of Plant-Microbe Interactions: Microbes for Sustainable Agriculture*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-08575-3>
- Mansir, F., Hafsan, Sukmawaty, E., & Masriany. (2021). *Jurnal*

- Biotek*. 9(1), 22–32. <https://doi.org/0.24252/jb.v9i1.20984>
- Meena, V. S. (2018). Role of rhizospheric microbes in soil: Stress management and agricultural sustainability. In *Role of Rhizospheric Microbes in Soil: Stress Management and Agricultural Sustainability* (Vol. 1). <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5402-7>
- Meena, V. S., Mishra, P. K., Bisht, J. K., & Pattanayak, A. (2017a). Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture. In V. S. Meena, P. K. Mishra, J. K. Bisht, & A. Pattanayak (Eds.), *Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture* (Vol. 2). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-5343-6>
- Meena, V. S., Mishra, P. K., Bisht, J. K., & Pattanayak, A. (2017b). Applications in Crop Production and Protection. In *Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture* (Vol. 2).
- Miransari, M. (2014). Use of Microbes for the Alleviation of Soil Stresses, Volume 1. In M. Miransari (Ed.), *Use of Microbes for the Alleviation of Soil Stresses, Volume 1*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9466-9>
- Mishra, P., Mishra, J., Dwivedi, S. K., & Arora, N. K. (2020). Microbial Enzymes in Biocontrol of Phytopathogens. In *Microbial Enzymes in Biocontrol of Phytopathogens* (pp. 259–285). https://doi.org/10.1007/978-981-15-1710-5_10
- Palepi, M., Jumini, J., Syaffrudin, S., & Syaffrudin, S. (2020). Pengaruh Jenis Mikoriza dan Jumlah Populasi Tanaman Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Jagung Manis (*Zea mays* L.). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 4(1), 91–99. <https://doi.org/10.17969/jimfp.v4i1.10341>
- Pandey, P. K., Yadav, S. K., Singh, A., Sarma, B. K., Mishra, A., & Singh, H. B. (2012). Cross-Species Alleviation of Biotic and Abiotic Stresses by the Endophyte *Pseudomonas aeruginosa* PW09. *Journal of Phytopathology*, 160(10), 532–539. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0434.2012.01941.x>
- Pathma, J., Raman, G., Kennedy, R. K., & Bhushan, L. S. (2020).

- Recent Advances in Plant-Microbe Interaction. In *Microbial Diversity, Interventions and Scope* (pp. 23–49). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-4099-8_2
- Paul, D., & Lade, H. (2014). Plant-growth-promoting rhizobacteria to improve crop growth in saline soils: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 34(4), 737–752. <https://doi.org/10.1007/s13593-014-0233-6>
- Poindexter, J. S., & Leadbetter, E. R. (1989). Bacteria in Nature. In J. S. Poindexter & E. R. Leadbetter (Eds.), *Bacteria in Nature*. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0803-4>
- Ramegowda, V., & Senthil-Kumar, M. (2015). The interactive effects of simultaneous biotic and abiotic stresses on plants: Mechanistic understanding from drought and pathogen combination. *Journal of Plant Physiology*, 176, 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.jplph.2014.11.008>
- Sahu, P. K., Gupta, A., Lavanya, G., Bakade, R., & Singh, D. P. (2017). Bacterial Endophytes: Potential Candidates for Plant Growth Promotion. In *Plant-Microbe Interactions in Agro-Ecological Perspectives* (Vol. 1, pp. 611–632). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5813-4_31
- Sellitto, V. M., Zara, S., Fracchetti, F., Capozzi, V., & Nardi, T. (2021). Microbial Biocontrol as an Alternative to Synthetic Fungicides: Boundaries between Pre- and Postharvest Applications on Vegetables and Fruits. *Fermentation*, 7(2), 60. <https://doi.org/10.3390/fermentation7020060>
- Sharifi, R., Lee, S.-M., & Ryu, C.-M. (2018). Microbe-induced plant volatiles. *New Phytologist*, 220(3), 684–691. <https://doi.org/10.1111/nph.14955>
- Singh, D. P., Singh, H. B., & Prabha, R. (2017). Plant-Microbe Interactions in Agro-Ecological Perspectives. In D. P. Singh, H. B. Singh, & R. Prabha (Eds.), *Plant-Microbe Interactions in Agro-Ecological Perspectives* (Vol. 2). Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-6593-4>
- Singh, R. K., Singh, P., Li, H. B., Yang, L. T., & Li, Y. R. (2017). Soil-plant-microbe interactions: Use of nitrogen-fixing bacteria for

- plant growth and development in sugarcane. In *Plant-Microbe Interactions in Agro-Ecological Perspectives* (Vol. 1). https://doi.org/10.1007/978-981-10-5813-4_3
- Smith, S. E., & Read, D. (2008). The symbionts forming arbuscular mycorrhizas. In *Mycorrhizal Symbiosis* (pp. 13–41). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-012370526-6.50003-9>
- Spaepen, S., & Vanderleyden, J. (2011). Auxin and Plant-Microbe Interactions. *Cold Spring Harbor Perspectives in Biology*, 3(4), a001438–a001438. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a001438>
- Trouvelot, S., Bonneau, L., Redecker, D., van Tuinen, D., Adrian, M., & Wipf, D. (2015). Arbuscular mycorrhiza symbiosis in viticulture: a review. *Agronomy for Sustainable Development*, 35(4), 1449–1467. <https://doi.org/10.1007/s13593-015-0329-7>
- Vályi, K., Mardhiah, U., Rillig, M. C., & Hempel, S. (2016). Community assembly and coexistence in communities of arbuscular mycorrhizal fungi. *The ISME Journal*, 10(10), 2341–2351. <https://doi.org/10.1038/ismej.2016.46>
- Varma, A., Tripathi, S., & Prasad, R. (2020). Plant Microbe Symbiosis. In A. Varma, S. Tripathi, & R. Prasad (Eds.), *Plant Microbe Symbiosis*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-36248-5>
- Verma, V. C., & Gange, A. C. (2014). Advances in Endophytic Research. In V. C. Verma & A. C. Gange (Eds.), *Advances in Endophytic Research*. Springer India. <https://doi.org/10.1007/978-81-322-1575-2>
- Vimal, S. R., Singh, J. S., Arora, N. K., & Singh, S. (2017). Soil-Plant-Microbe Interactions in Stressed Agriculture Management: A Review. *Pedosphere*, 27(2), 177–192. [https://doi.org/10.1016/S1002-0160\(17\)60309-6](https://doi.org/10.1016/S1002-0160(17)60309-6)
- Vurukonda, S. S. K. P., Giovanardi, D., & Stefani, E. (2018). Plant Growth Promoting and Biocontrol Activity of *Streptomyces* spp. as Endophytes. *International Journal of Molecular Sciences*, 19(4), 952. <https://doi.org/10.3390/ijms19040952>

- Wackett, L. (2013). Microbial biocontrol agents: An annotated selection of World Wide Web sites relevant to the topics in Microbial Biotechnology. *Microbial Biocontrol Agents: An Annotated Selection of World Wide Web Sites Relevant to the Topics in Microbial Biotechnology*, 6(4). <https://doi.org/10.1111/1751-7915.12065>
- Wackett, L. P. (2020). Microbial biocontrols in agriculture. *Microbial Biotechnology*, 13(3), 814–815. <https://doi.org/10.1111/1751-7915.13569>
- Wang, W., Shi, J., Xie, Q., Jiang, Y., Yu, N., & Wang, E. (2017). Nutrient Exchange and Regulation in Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis. *Molecular Plant*, 10(9), 1147–1158. <https://doi.org/10.1016/j.molp.2017.07.012>
- Waqas, M., Khan, A. L., Kamran, M., Hamayun, M., Kang, S.-M., Kim, Y.-H., & Lee, I.-J. (2012). Endophytic Fungi Produce Gibberellins and Indoleacetic Acid and Promotes Host-Plant Growth during Stress. *Molecules*, 17(9), 10754–10773. <https://doi.org/10.3390/molecules170910754>
- Yadav, A., & Yadav, K. (2017). How endophytes benefit plants? Indirectly beneficial mechanisms Plants cope with a series of unfavourable environmental and biotic Exploring the potential of endophytes in agriculture: a minireview. *Adv Plants Agric Res*, 6(4).



Ulfa Triyani. Perempuan kelahiran Sorong pada tanggal 03 Maret 1986, mulai mendidaskasikan diri pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sebagai dosen tetap. Penulis diamanahkan untuk membina matakuliah Mikrobiologi Tanah. Selama ini bergabung dalam bonggol keilmuan Mikrobiologi dalam rangka mengembangkan instrumen pembelajaran. Selain menyelenggarakan darma pengejaran, penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Beberapa hasil penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah terpublikasi pada jurnal ilmiah dan dapat diakses pada laman http://bit.ly/Ulfatriyani_google scholar.



Hafsan. Wanita berkebangsaan Indonesia kelahiran Sabah, Malaysia pada 12-9-1981, merupakan putri keenam dari delapan bersaudara dari pasangan bersuku Bugis, Muhammad Sapile dan Hasnawiah. Penulis dianugerahi tiga orang putra dan putri buah pernikahan dengan seorang putra Bugis kelahiran Pangkep Sulawesi Selatan. Penulis menekuni ilmu murni biologi pada jenjang S1 di Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar pada tahun 2000-2004. Bantuan studi dari beasiswa BPPS diperoleh untuk melanjutkan studi ke jenjang S2 pada Program studi Pendidikan Biologi Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang sejak tahun 2005-2007. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S3 pada program Doktor Ilmu Pertanian di Universitas Hasanuddin, konsentrasi agrobioteknologi dengan disertasi membahas pemanfaatan enzim mikroba dalam industri peternakan. Jenjang karir penulis dimulai sejak tahun 2004 pada jurusan Biologi Universitas Cokroaminoto sebagai dosen tetap yayasan dan aktif hingga tahun 2010. Pada akhir tahun 2009-sekarang, sebagai dosen tetap pada Jurusan Biologi Fakultas sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Bidang ilmu yang ditekuni dalam darma pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah sejalan dengan matakuliah binaan yaitu Bioteknologi, dan lebih mengarah pada pemanfaatan enzim mikroba. Beberapa publikasi ilmiah baik pada tingkat nasional maupun internasional dapat diakses pada ID orcid: <https://orcid.org/0000-0001-5821-0164>.



Alauddin University Press

Alamat:

UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36
Romangpolong, Samata,
Kabupaten Gowa.

Your barcode
{ ISBN }