

**ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI DONAT WORTEL
(*Daucus carota L.*) SEBAGAI ALTERNATIF PERBAIKAN GIZI
PADA MASYARAKAT**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUNAWWARAH

NIM: 70200112088

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi yang disusun oleh **Munawwarah** NIM **70200112088** ini telah kami setujui untuk diajukan pada **Ujian Skripsi** Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata-Gowa, Januari 2017


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Syarfaini, SKM., M.Kes


Pembimbing II



Nurdiyana S, SKM., MPH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat



ALAUDDIN
MAKASSAR

Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes

NIP:19790525 200901 1 019


LEMBAR PENGESAHAN HASIL

Naskah hasil yang disusun oleh **Munawwarah** NIM **70200112088** ini telah kami setujui untuk diajukan pada **Seminar Hasil** Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Samata-Gowa, 24 November 2016


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Syarfaini, SKM., M. kes


Pembimbing II



Nurdiyanah, S, SKM., MPH

Mengetahui

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat



Hasbi Ibrahim, SKM., M. Kes

NIP:19790525 200901 1 019


LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL

Naskah Skripsi yang disusun oleh **Munawwarah NIM 70200112088** ini telah kami setuju untuk diajukan pada **Ujian Proposal** Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Progran Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.


Samata-Gowa, Agustus 2016

Tim Pembimbing

Pembimbing I


Syarfaini, SKM., M.Kes


Pembimbing II


Nurdianah, S, SKM., MPH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes

NIP:19790525 200901 1 019

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan karunia serta hidayah-Nya, sebuah tugas yang cukup berat telah penulis selesaikan dengan segala kemampuan yang dimiliki penulis meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan mengalami hambatan maupun kesulitan sejak dari persiapan hingga menjelang penyelesaian.

Namun berkat dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materi hingga syukur Alhamdulillah skripsi ini dapat terwujud sebagaimana adanya.

Penulis hanturkan banyak terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mendidik, memberikan dorongan, motivasi, materi, senantiasa mendoakan, serta untuk pengorbanan yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis haturkan banyak terima kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Syarfaini, SKM., M.Kes selaku Pembimbing I telah memberikan petunjuk, bimbingan, dukungan, saran dan semangat kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada tahap penulisan skripsi ini.
5. Nurdiyanah, SKM., M.PH selaku Pembimbing II telah memberikan petunjuk, bimbingan, dukungan, saran dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dwi Santi Damayati SKM., M.Kes selaku Penguji Akademik, dan Bapak Dr. H. Supardin, M.HI selaku Penguji Keislaman, yang telah memberikan saran dan kritik yang sangat bermanfaat demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu.
8. Para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas keikhlasannya memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi, serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dan para dosen jurusan tata boga UNM yang senantiasa membimbing dan bersedia meluangkan waktu bersama peneliti.
10. Teman-teman jurusan kesehatan masyarakat, terutama konsentrasi Gizi yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari penyusunan skripsi sampai selesai.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya dengan segenap upaya dan sepercik sumbangsih semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Makassar, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif	4
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan Umum.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Donat.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Zat Gizi.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Uji Organoleptik	44
E. Kerangka Konsep.....	47
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian..	50
B. Pendekatan Penelitian..	50
C. Objek Penelitian.....	52
D. Metode Pengumpulan Data..	52
E. Instrument Penenlitian.....	53
F. Validasi Dan Reliabilitas Instrument..	61

G. Keterbatasan penelitian	62
H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Hasil Penelitian	64
B. Pembahasan.....	71
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kandungan Zat Gizi Wortel dalam 100 Gram.....	16
Tabel 2.2	Kandungan tepung teridu dalam 100 gram.....	21
Tabel 3.1	Tingkat Penerimaan Konsumen.....	58
Tabel 3.2	Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan.....	61
Tabel 4.1	Kadar Zat Gizi Karbohidrat dalam 100 Gram Donat Wortel.....	64
Tabel 4.2	Kadar Zat Gizi Protein Dalam 100 Gram Donat Wortel.....	65
Tabel 4.3	Kadar Zat Gizi Lemak dalam 100 Gram Donat Wortel.....	65
Tabel 4.4	Kadar Zat Gizi Vitamin A Dalam 100 Gram Donat Wortel.....	66
Tabel 4.5	Kadar Zat Gizi Beta Karoten Dalam 100 Gram Donat Wortel.....	66
Tabel 4.6	Penilaian Mutu Hedonik Terhadap Warna,Aroma,Tekstur dan Rasa.....	67
Tabel 4.7	Uji Mutu Hedonic dalam Donat Wortel.....	68
Tabel 4.8	Uji Over All Mutu Hedonik dalam Donat Wortel.....	69
Tabel 4.9	Uji Hedonik dalam Donat Wortel.....	70

ABSTRAK

Nana : Munawwarah

Nim : 70200112088

**Judul : Analisis Kandungan Zat Gizi Donat Wortel (*Daucus carota L*)
Sebagai Alternatif Perbaikan Gizi Pada Masyarakat**

Donat merupakan panganan yang digoreng yang biasanya dibuat dari adonan tepung terigu, gula, dan mentega dan merupakan makanan yang populer dan banyak digemari masyarakat pada berbagai golongan usia. Dalam penelitian ini bahan baku yang digunakan pada donat adalah wortel (*Daucus carota L*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin A dan β karoten) dan uji organoleptik pada produk donat wortel (*Daucus carota L*).

Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) karena diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan homogen dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental dengan menggunakan desain true-eksperimen. Metode yang digunakan untuk donat wortel (*Daucus carota L*) dengan perbandingan kelompok eksperimen 1:0 (100 gr tepung terigu), 1:1 (50 gr tepung terigu dan 50 gr wortel), 3:1 (75 gr terigu dan 25 gr wortel), dan 1:3 (25 gr tepung dan 75 gr wortel).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 perlakuan konsentrasi berbeda dengan penambahan wortel (*Daucus carota L*) yaitu 1:0; 1:1; 3:1 dan 1:3 dengan 3 kali pengulangan. Hasil Penelitian Karbohidrat 56,96% protein 6,72%. lemak 11,22%, vitamin A 5314,86 IU, beta karoten 9566,75%. Uji organoleptik paling disukai dan bermutu baik perlakuan 3:1. Uji Friedman $P < 0,05$ terhadap aroma, rasa, warna dan mutu overall. Rekomendasi produk terbaik berdasarkan zat gizi dan uji organoleptik dari keempat sampel adalah perbandingan 3:1 dan 1:3

Jadi disarankan bagi masyarakat agar dapat membuat donat wortel (*Daucus carota L*) untuk menjadi makanan layak konsumsi sebagai makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi perharinya.

Kata Kunci : Donat , Wortel (*Daucus Carota L*), Zat Gizi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wortel (*Daucus carrota L*) adalah tumbuhan jenis sayuran umbi yang biasanya berwarna jingga atau putih dengan tekstur serupa kayu. Bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel adalah tumbuhan biennial (siklus hidup 12 - 24 bulan) yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh setinggi sekitar 1 m dengan bunga berwarna putih. Rasanya renyah, agak manis dan enak dimakan langsung mentah-mentah, warna umbinya yang kuning kemerah-merahan itu mempunyai kadar Carotene A (provitamin A) yang sangat tinggi selain sumber vitamin A, umbi wortel juga mengandung vitamin B, vitamin C, Mineral (Mehrir, 2012: 12)

Wortel (*Daucus Carota L*) termasuk 22 jenis sayuran komersial yang dihasilkan Indonesia. Produktifitas wortel di Indonesia masih rendah. Pada tahun 1985 hasil rata-rata wortel nasional baru mencapai 9,43 ton/hektar, kemudian pada tahun 1986 hanya 8,90 ton/ha, dan tahun 1991 sekitar 12,89 ton/ha dan jika dibandingkan dengan produktifitas wortel pada tahun 2009-2010 sudah ada peningkatan yaitu 14,86 pada tahun 2009 dan 14,87 pada tahun 2010 dan meningkat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 15,97 ton/ha (Chaerah,2014:16).

Sayuran merupakan komoditas penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral. Produksi sayuran di Indonesia meningkat setiap tahun dan konsumsinya tercatat 44 kg/kapita/tahun. Di Sulawesi

Selatan, rata-rata konsumsi sayuran baru mencapai 35,43 kg/kapita/ tahun, masih jauh dari standar konsumsi harapan sehat sebesar 75 kg/kapita/ tahun (M.taufik, 2012: 43)

Adapun beberapa Produksi sayuran di sulawesi selatan yang paling tinggi adalah kubis dengan produksi 17,35 ton/ha, kembang kol sebanyak 9, 24 ton/ha wortel sebanyak 8,48 ton/ha, kentang sebanyak 6,32 ton/ha, sawi sebanyak 5,42 ton/ha dll. Kabupaten Gowa merupakan salah satu sentra produksi wortel terbesar di Sulawesi Selatan, dengan rata-rata luas panen 163 ha dan produksi berkisar antara 9489 ton dan 15 637 ton. Gowa merupakan penghasil wortel tertinggi di Sulawesi selatan yaitu sebanyak 39,74 ton/ha dibanding dengan Kabupaten Bantaeng dan Enrekang yang masing-masing memproduksi wortel sebanyak 0,36 ton/ha dan 15 ton/ha. (M.taufik, 2012 :46)

Wortel merupakan sayuran penting dan paling banyak ditanam diberbagai tempat. Kegunaan awalnya hanyalah sebagai obat, tetapi sekarang wortel telah menjadi sayuran utama dan umumnya dikenal karena kandungan α - dan β -karotennya. Kedua jenis karoten ini penting dalam gizi manusia sebagai provitamin A. Selain kandungan provitamin A yang tinggi, wortel juga mengandung vitamin C dan vitamin B serta mengandung mineral terutama kalsium dan fosfor Selain itu di dalam wortel juga terkandung pektin yang baik untuk menurunkan kolesterol darah. Pada wortel juga terdapat serat yang tinggi bermanfaat untuk mencegah terjadinya konstipasi(Mehrir, 2012 :15)

Wortel diketahui banyak mengandung protein, karbohidat, lemak, serat, beta-karoten(provitamin A), vit. B, vit. C, glutation, mengandung Ca, Mg, Fe, P, S dan Cl. Dengan kandungannya tersebut, Wortel berkhasiat untuk membantu menurunkan

tekanan darah tinggi, mengencangkan kulit muka, kolesterol tinggi, kanker pankreas, kanker paru-paru, hepatitis, dan mencegah stroke. (Mehrir, 2012 :15)

Wortel merupakan tanaman yang dikenal memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi, mudah didapatkan dan manfaatnya sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Tanaman ini salah satunya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah penurunan serta pencegahan permasalahan gizi mikro yaitu KVA (Kurang Vitamin A) karena memiliki kandungan provitamin A yaitu β -karoten yang tinggi (Mehrir, 2012 :16)

Disamping kaya akan vitamin A wortel juga kaya akan sumber vitamin C, vitamin K, serat, dan potassium, dengan zat-zat yang dikandungnya tersebut, wortel diyakini para ahli kesehatan dapat melindungi tubuh dari resiko serangan penyakit jantung dan kanker, serta meningkatkan kesehatan mata. Selain dinikmati dalam bentuk sayur atau lalab, wortel kerap pula dinikmati dalam bentuk jus atau olahan-olahan lainnya (Mehrir, 2012 :16)

Namun selama ini wortel belum dimanfaatkan secara optimal, karena hanya dimanfaatkan dalam pengolahan sayur seperti sup, tumis, dan capcay dan juga sebagian besar masyarakat tidak menyukai mengkonsumsi wortel. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan konsumsi wortel pada masyarakat alternatifnya adalah dengan mengolahnya menjadi bahan tambahan untuk pembuatan kue donat.

Donat (*doughnuts* atau *donut*) adalah panganan yang digoreng, yang biasanya dibuat dari adonan tepung terigu, gula, telur dan mentega. Donat memiliki variasi rasa yang dihasilkan dari taburan di atasnya, bisa dari gula halus, disiram cokelat cair, ditaburi cokelat butir dan lain sebagainya. Karena itu donat tidak hanya disukai oleh kalangan dewasa tapi juga sangat disukai oleh anak-anak. Penggunaan wortel diharapkan agar masyarakat tetap bisa mendapatkan asupan gizi dan merasakan khasiat

dari sayuran ini dengan cara yang enak. Saat ini donat merupakan salah satu kue populer favorit masyarakat dunia. Bahkan di Amerika sendiri, saat ini lebih dari 10 juta donat diproduksi setiap tahun (Zuhrina, 2011 :34)

Bahan utama pembuatan donat adalah tepung terigu, sehingga diharapkan dengan penambahan wortel dapat memperbaiki kandungan gizi donat terutama kandungan α karoten, β karoten, Vitamin A, Vitamin B, Vitamin C dan Air. Dan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu yang merupakan bahan impor dan menduduki porsi terbesar dalam pembuatan donat.

Memodifikasi donat dengan wortel juga dapat memberikan manfaat yang besar. Kandungan vitamin A dalam wortel berguna untuk memberikan ketahanan tubuh dalam menanggulangi penyakit mata, dan masalah- masalah kesehatan lainnya di Indonesia serta β karoten yang sangat bermanfaat untuk penderita KEK (Khusna, 2014:9)

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana analisis kandungan zat gizi donat wortel (*Daucus Carota L*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat”?

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Zat gizi

Definisi operasional: Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan.

Kriteria objektif: pada penelitian ini dilakukan analisis kadar zat gizi yang terdapat dalam donat wortel. Adapun zat gizi yang dianalisis secara kuantitatif yaitu:

a. Kadar karbohidrat

Kadar karbohidrat merupakan jumlah karbohidrat total donat wortel, yang dianalisis dengan menggunakan metode *luff schrol*.

b. Kadar protein

Kadar protein merupakan jumlah protein total pada donat wortel, yang dianalisis dengan menggunakan metode *Kjedahl*.

c. Kadar lemak

Kadar lemak merupakan jumlah lemak total pada donat wortel, yang dianalisis dengan menggunakan metode *Gravimetri*.

d. Kadar vitamin A

Kadar vitamin A merupakan jumlah vitamin A total pada donat wortel, yang dianalisis dengan menggunakan metode Spektrofotometri UV-VIS.

e. Kadar β Karoten

Kadar β Karoten merupakan jumlah β Karoten total pada donat wortel, yang dianalisis dengan menggunakan metode Spektrofotometri Absorpsi Atom Serapan (AAS).

2. Wortel

Definisi operasional: Wortel (*Daucus carota L.*) merupakan salah satu jenis sayuran yang berwarna orange cerah yang memiliki kontur kulit halus dan segar.

Kriteria objektif : Wortel yang digunakan adalah wortel yang berumur 3 bulan, berwarna orange terang. Dalam pemilihan harus dihindari wortel yang luka, lecet, dan memar, karena wortel dengan kondisi seperti itu akan cepat busuk.

3. Uji Organoleptik

Definisi operasional: Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk

Kriteria objektif : Interval presentase dan kriterian kesukaan:

- a) 81 – 100 = sangat suka
- b) 61 – 80 = suka
- c) 41 – 60 = tidak suka
- d) < 41 = sangat tidak suka

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang digunakan penulis sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah:

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
1	Dwinda Hanindya Nisaul Khusna (2014)	Kandungan β karoten dan daya terima pada broenis dengan tambahan wortel	Hasil analisis statistik menggunakan uji <i>One Way Anova</i> dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata kandungan β -karoten brownies dengan atau tanpa penambahan wortel dengan <i>value</i> (0,00) < 0,05. Sedangkan untuk hasil analisis daya terima terhadap aroma <i>p</i> (0,000), warna <i>p</i> (0,000), tekstur <i>p</i> (0,000), rasa <i>p</i> (0,000) dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05 dapat diketahui <i>p</i> aroma, warna, rasa dan tekstur < α (0,05) sehingga dapat dijelaskan bahwa pada aroma, warna, rasa dan tekstur brownies dengan atau tanpa

			penambahan wortel ada perbedaan yang signifikan dalam daya terima anak-anak usia sekolah dasar.
2	Chaerah Amiruddin (2013)	Pembuatan Tepung Wortel(<i>Daucus carrota L</i>) Dengan Variasi Suhu Pengering	Penelitian ini berisi Perubahan kadar air sangat dipengaruhi oleh perbedaan ketebalan dan suhu dimana menyebabkan laju pengeringan yang dihasilkan berbeda sehingga kadar air yang dihasilkan juga berbeda. Semakin tebal sampel yang dikeringkan maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kesetimbangan lingkungan semakin lama, Kandungan β -karoten pada tepung wortel (<i>Daucus carrota L</i>) yang memberikan hasil paling baik diperoleh pada suhu pengeringan 45 °C. Dilihat dari nilai β -karoten yang tinggi (1,62%), kadar air (9% bb), rendemen (1,19%). Perubahan volume total berbanding lurus terhadap lama pengeringan dimana semakin lama pengeringan yang dilakukan maka bahan yang dikeringkan semakin menyusut.
3	Andi Rizkie dkk (2012)	Usaha Pembuatan Donat Wortel Sebagai Alternif Penganan Sehat	Hasil Penjualan Donat Wortel dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada penjualan pertama Donat Wortel yang terjual sebanyak 22 donat dari 27 donat yang diproduksi dengan harga Rp 1.500. Hasil yang didapat sebesar Rp 33.500. Pada penjualan kedua Donat Wortel yang terjual sebanyak 28 donat dari 28 donat yang diproduksi dengan harga Rp 1.500.

			<p>hasil yang didapat sebanyak Rp 34.000. Penjualan ketiga Donat Wortel yang terjual sebanyak 52 donat dengan harga Rp 1500. Hasil yang didapat sebanyak Rp 44.000. Dari penjualan pada awalnya mengalami kerugian karena pembelian alat-alat untuk produksi. Pada penjualan kedua dan ketiga mengalami keuntungan karena adanya penambahan hasil produk.</p>
4	Ria Noviar Triana	<p>Karakteristik Sensori Donat dengan Penambahan Emulsifier Mono-Diasilgliserol dari Fully Hydrogenated Palm Stearin</p>	<p>Penambahan emulsifier pada sampel donat tidak terhadap kadar air tetapi dapat meningkatkan derajat pengembangan donat yang dihasilkan. Penambahan emulsifier MDAG dari FHPS 0.3% memperbaiki mutu eksternal dan internal donat yang dihasilkan seperti atribut aroma, rasa dan tekstur dibandingkan donat kontrol dan donat dengan penambahan emulsifier komersial. Donat dengan penambahan emulsifier MDAG dari FHPS 0.3% memiliki nilai total mutu donat yang paling tinggi dibandingkan donat dengan formula lainnya. Karakteristik mutu donat yang baik menurut penelitian ini adalah memiliki warna kulit coklat muda dan agak mengkilap, penyebaran warna kulit seragam, bentuk bulat simetris, karakter kulit utuh, crumb berwarna putih, matriks crumb baik, beraroma donat segar, rasa manis, tidak ada rasa terigu, tekstur halus, tidak liat dan mudah ditelan yang dimiliki oleh donat dengan penambahan emulsifier MDAG dari FHPS 0.3%.</p>

5	Dyah dwi sayekti (2014)	Pengaruh penambahan <i>puree</i> wortel (<i>daucus carota l.</i>) Dan waktu fermentasi terhadap hasil jadi bika ambon	Berdasarkan hasil analisa laboratorium kimia BBKI kandungan gizi pada bika ambon wortel tersaji di Tabel 4.9, kandungan vitamin A yang terkandung dalam bika ambon wortel sebesar 66,3 mg/100g atau 66.300 SI, sedangkan kandungan β -karoten yang terkandung dalam bika ambon wortel sebesar 86,4 mg/100g atau 86400 μ g/100g. Jumlah ini setara dengan jumlah vitamin A sebesar 144.000 SI/100g (1 SI vitamin A = 0,6 μ g β -karoten).
6	Bima budi p (2014)	Pengaruh substitusi bekatul (rice bran) terhadap sifat organoleptik donat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Substitusi bekatul berpengaruh nyata terhadap keempukan, warna, rasa, dan kesukaan donat, tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap aroma donat. Berdasarkan uji Duncan perlakuan substitusi bekatul 20% dan 40% lebih empuk, lebih putih, dan lebih disukai dibandingkan substitusi bekatul 60% dan 80%; akan tetapi produk dari formulasi substitusi bekatul 20% lebih tidak berasa bekatul dan gurih dibandingkan 40%, 60%, dan 80%. (2) Produk donat yang disukai adalah donat dengan substitusi bekatul 20% dan 40%. Kandungan serat substitusi bekatul 20% adalah 1.28% dan kandungan serat substitusi bekatul 40% adalah 2.36%
7	Tansari Dewi (2014)	Kualitas es krim dengan kombinasi wortel	Hasil pada penelitian kombinasi wortel (<i>Daucus carota L.</i>) dan tomat (<i>Lycopersicum esculentum Mill.</i>) memberikan perbedaan kualitas berupa peningkatan kadar betakaroten dan kadar

		(daucus carota l.) Dan tomat (lycopersicum esculentum mill.)	sukrosa pada es krim. Kombinasi wortel (Daucus carota L.) dan tomat (Lycopersicum esculentum Mill.) yang memberikan kualitas terbaik berdasarkan kadar betakaroten dan tingkat kesukaan panelis adalah es krim dengan formulasi wortel : tomat sebesar 3 : 3.
8	Hadi Suprpto (2012).	Pengaruh substitusi ubi jalar ungu (ipomoea batatas l.) Dan Media penggorengan terhadap mutu donat ubi jalar ungu.	Hasil pada penelitian ini adalah Substitusi ubi jalar ungu pada tepung Terigu berpengaruh nyata terhadap kadar air, Kadar abu, kadar antosianin, serta seluruh Karakteristik hedonik meliputi warna, rasa, Aroma dan tekstur dari donat ubi jalar ungu. Semakin tinggi jumlah ubi jalar ungu yang Ditambahkan maka semakin tinggi pula kadar Air, abu, dan antosianinnya, serta kesukaan Panelis terhadap warna, rasa, aroma dan Tekstur donat ubi jalar ungu.
9	Atina Travianita dkk.	Nilai gizi donat yang dimodifikasi dengan jagung dan Bayam.	Hasil pada penelitian ini adalah kandungan gizi dalam pembuatan donat jagung bayam, terjadi pula penurunan kandungan energi dan karbohidrat. Terjadi penurunan energi sebesar 99,67 kkal pada donat jagung bayam A1, 97,67 kkal pada donat jagung bayam A2, dan 101,67 kkal pada donat jagung bayam A3. Terjadi pula penurunan karbohidrat sebesar 20,7 gr pada donat jagung bayam A1, 20,34 gr pada donat jagung bayam A2, dan 21,43 gr pada donat jagung bayam A3.

10	Rosalin putri khotmasari. (2013)	Pengaruh substitusi tepung talas Belitung (<i>xanthosoma sagittifolium</i>) terhadap tingkat pengembangan dan daya terima donat	Hasil pada penelitian ini adalah Donat dengan substitusi tepung talas belitung 0%, 10% dan 20% memiliki tingkat pengembangan sebesar 158,5%, 154.2% dan 134,%.Tingkat kesukaan konsumen yang paling banyak diminati oleh panelis adalah donat dengan substitusi tepung talas belitung 20%. Terdapat perbedaan daya terima warna sebesar 3,90, aroma 3,73, rasa 3,27, tekstur 2,97, dan keseluruhan sebesar 3,40 dari donat yang dibuat dari substitusi tepung talas belitung. Donat talas ternyata lebih diminati tanpa adanya substitusi.
----	----------------------------------	---	--

Beberapa penelitian diatas merupakan penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebelum peneliti melakukan penelitian ini, perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian donat wortel sebelumnya telah ada tetapi penelitian tersebut hanya fokus kepada penjualan, sedangkan penelitian ini fokus kepada kandungan zat-zat gizi yang terkandung dalam prodak donat wortel sehingga bias memperbaiki status gizi pada masyarakat.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kandungan zat gizi donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui kadar karbohidrat pada donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

- 2) Untuk mengetahui kadar protein pada donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.
- 3) Untuk mengetahui kadar lemak pada donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.
- 4) Untuk mengetahui kadar vitamin A pada donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.
- 5) Untuk mengetahui kadar β karoten pada donat wortel (*Daucus Carota L.*) sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi langsung dengan mengembangkan akademik dan sebagai bahan informasi guna memperluas wawasan dan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dibidang gizi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan khasanah pengetahuan islam bagi pembaca.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang donat wortel sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Wortel

1. Deskripsi Wortel

Wortel atau Carrot (*Daucus carota L.*) bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari luar negeri yang beriklim sedang (sub tropis). Menurut sejarahnya, tanaman wortel berasal dari Timur Dekat dan Asia Tengah. Tanaman ini ditemukan tumbuh liar sekitar 6.500 tahun yang lalu (Amiruddin, 2013 :15)

Menurut Berlian Nur *et al.* (2003) tanaman wortel dalam tata nama atau sistematika (*Taksonomi*) tumbuh-tumbuhan wortel diklasifikasi sebagai berikut:



Divisi	: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub divisi	: Angiospermae (biji terdapat dalam buah)
Kelas	: Dicotyledonae (biji berkeping dua atau biji belah)
Ordo	: Umbelliferales
Famili	: Umbelliferae / Apiaceae / Ammiaceae
Gesnus	: Daucus
Species	: Daucus carota L.

Cahyono (2002 :17) mengatakan bahwa pada awalnya hanya dikenal beberapa varietas wortel, namun dengan berkembangnya peradaban manusia dan teknologi, saat ini telah ditemukan varietas-varietas baru yang lebih unggul daripada generasi-generasi sebelumnya. Varietas-varietas wortel terbagi menjadi tiga kelompok yang didasarkan pada bentuk umbi, yaitu tipe Imperator, Chantenay, dan Nantes.



Tipe Imperator memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung runcing (menyerupai kerucut), panjang umbi 20-30 cm, dan rasa yang kurang manis sehingga kurang disukai oleh konsumen.



Tipe Chantenay memiliki umbi berbentuk bulat panjang dengan ujung tumpul, panjang antara 15-20 cm, dan rasa yang manis sehingga disukai oleh konsumen.



Tipe Nantes memiliki umbi berbentuk peralihan antara tipe Imperator dan tipe Chantenay, yaitu bulat pendek dengan ukuran panjang 5-6 cm atau berbentuk bulat agak panjang dengan ukuran panjang 10-15 cm.

Dari ketiga kelompok tersebut, varietas yang termasuk ke dalam kelompok Chantenay yang dapat memberikan hasil (produksi) paling baik, sehingga paling banyak dikembangkan.

Tanaman wortel berupa rumput yang menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbi di dalam tanah. Batangnya pendek dan berakar tunggang yang fungsinya berubah menjadi umbi bulat dan memanjang. Bagian umbi yang memanjang berwarna kemerahan-merahan inilah yang dikonsumsi (Setiawan,1995 :32). Rasanya renyah, agak manis dan enak dimakan langsung mentah-mentah. Warna umbinya yang kuning kemerah-merahan itu mempunyai kadar Carotene A (provitamin A) yang sangat tinggi selain sumber vitamin A, umbi wortel juga mengandung vitamin B, vitamin C, Mineral (Cahyono, 2002 :17)

Batangnya sangat pendek seolah-olah tidak tampak. Sementara akar tunggangnya dapat berubah bentuk dan fungsinya sebagai penyimpanan cadangan makanan atau disebut umbi. Secara alami tanaman wortel dapat berbunga dan berbuah (berbiji). Bunga wortel berbentuk payung ganda sedangkan biji-bijinya berbentuk kecil dan berbulu. Biji-biji ini dapat digunakan sebagai alat-alat bahan perbanyakan wortel secara generatif (Cahyono, 2002 :17)

Di Indonesia wortel umumnya ditanam di dataran tinggi pada ketinggian antara 1000-1200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Meskipun demikian wortel dapat pula ditanam di dataran medium yang ketinggiannya lebih dari 500 mdpl, namun produksi dan kualitasnya kurang memuaskan. Tanaman wortel membutuhkan lingkungan tumbuh yang suhu udaranya dingin dan lembab. Di negara-negara yang beriklim sedang (subtropis) perkecambahan benih wortel membutuhkan suhu minimum 9°C dan maksimum 20°C. Namun untuk pertumbuhan dan produksi umbi yang optimal membutuhkan suhu udara antara 15,6° - 21,1°C. Suhu udara yang terlalu tinggi (panas) seringkali menyebabkan umbinya kecil-kecil (abnormal) dan warnanya pucat atau

kusam. Sebaliknya bila suhu terlalu rendah (sangat dingin), maka umbi yang terbentuk menjadi panjang dan kecil (M.taufik, 2012 :45)

Tabel 2.1 kandungan zat gizi wortel dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Satuan	Jumlah
Energi	Kcal	42
Protein	Gr	0.93
Lemak	Gr	0.24
Karbohidrat	Gr	9.58
Serat	Gr	2.8
Abu	Gr	0.97
Gula Total	Gr	4.74
Pati	Gr	1.43
Air	Gr	88.29
Kalsium	Mg	33
Besi	Mg	0.30
Magnesium	Mg	12
Fosfor	Mg	35
Kalium	Mg	320
Natrium	Mg	69
Seng	Mg	0.24
Tembaga	Mg	0.045
Mangan	Mg	0.143
Flour	Mcg	3.2
Selenium	Mcg	0.1
Vitamin C	Mg	6,00
Vitamin A	Iu	16.706,00
Vitamin B	Mg	0.06
Vitamin E	Mg	0.66
Vitamin K	Mcg	13.2
Karoten Beta	Mcg	8285
Karoten Alpha	Mcg	3477

Sumber: USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2007)

Tanaman wortel ditanam sepanjang tahun, baik musim hujan maupun kemarau asalkan kebutuhan airnya tercukupi. Karena itulah komoditi selalu tersedia setiap saat di pasaran. Umur panen wortel tergantung pada jenisnya. Pada umumnya tanaman wortel varietas local dapat dipanen setelah berumur sekitar 3 bulan atau 90-97 hari

setelah tanam, biasanya pada saat daun tua berjumlah 3-5 helai. Wortel varietas hibrida seperti red sky dan terracotta dipanen pada umur 100-125 gr per buah, panjang sekitar 15-20 cm, diameter umbi 2-4 cm. Untuk menjaga agar hasil panen tidak menurun mutunya, berkayu dan rasanya pahit, sehingga tidak disukai oleh konsumen dan akan menurunkan harganya. umbi segar per hektar (Cahyono, 2002 :20)

2. Manfaat Wortel

Daun tanaman wortel juga memperbaiki pencernaan makanan, mencegah pembentukan endapan dalam saluran kencing dan memperkuat organ – organ penting yang lain (jantung, paru – paru, mata dan hati). Selain itu daun tanaman wortel juga dapat di olah menjadi sari daun wortel yang dapat digunakan sebagai obat luar untuk mengobati gatal – gatal pada kulit, jerawat dan noda – noda hitam pada wajah. Sedangkan rimpang atau akarnya dapat mengobati pada cacing kremi, memelihara kesehatan mata, pencernaan, dan sebagai obat luar untuk luka bakar (Cahyono, 2002 :20)

Warna orange tua pada wortel menandakan kandungan β -karoten yang tinggi. Makin jingga warna wortel, makin tinggi kadar β -karotennya. Kadar β -karoten yang terkandung dalam wortel lebih banyak dibanding kangkung, caisim dan bayam. β -karoten ini dapat mencegah dan mengatasi kanker, darah tinggi, menurunkan kadar kolesterol dan mengeluarkan angin dari dalam tubuh. Kandungan tinggi antioksidan karoten juga terbukti dapat memerangi efek polusi dan perokok pasif (Cahyono, 2002 :21)

Senyawa karoten (Pro-vitamin A) yang akan di ubah dalam tubuh menjadi vitamin A sehingga dapat mencegah penyakit rabun senja. β -karoten yang menyebabkan warna oranye pada wortel bisa juga menimbulkan warna kekuningan

pada kulit manusia yang kebanyakan minum jus atau perasan wortel. Meskipun demikian warna kuningnya berbeda dengan yang menderita sakit kuning demikian pula warna matanya tidak kuning (Cahyono, 2002 :21).

Kandungan potasiumnya yang tinggi bisa menetralkan keasaman darah yang kelewat tinggi pada pecandu rokok, alkohol dan pemakai obat-obatan berbahaya. Potasium yang terkandung dalam wortel juga berpotensi untuk membantu menjinakkan racun, terutama logam berat yang ditimbulkan polusi udara. Makan wortel paling sedikit lima kali setiap minggu dapat menurunkan risiko terkena stroke sebesar 68 persen (Cahyono, 2002 :21).

Dengan demikian apabila dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, wortel akan dapat meningkatkan kesehatan dan ketahanan terhadap berbagai macam penyakit. Selain itu, juga dapat meningkatkan energi dan produktivitas kerja, karena umbi wortel dapat memperkuat organ – organ tubuh (Febriana, 2012 :13)

Dalam al-Qur'an manusia dianjurkan untuk mengonsumsi buah-buahan sebagai salah satu sumber zat gizi. Allah swt berfirman dalam QS al-Mu'minun/23:19.

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاقِهِ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾

Terjemahnya:

Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan (Kemenag, 2010 :343)

Bukan hanya apa yang disebut oleh ayat yang lalu yang merupakan anugrah Allah, masih banyak yang lain. Di sini dikemukakan bahwa “lalu setelah kami menurunkan air dari langit dan menyimpannya di bumi, kami tumbuhkan untuk kamu, wahai umat manusia, dengannya, yakni dengan perantara air itu, aneka ragam

kebun seperti kebun-kebun kurma dan anggur, dan kamu peroleh di dalamnya, yakni di dalam kebun-kebun itu, buah-buahan yang banyak dan sebagian darinya kamu makan (Shihab, 2009 :346)

Kata (فَوَاكِهَ) fawakih bentuk jamak dari kata fakihah yang biasa diterjemahkan buah. Kata ini terambil dari kata fakiha yang berarti lezat/nyaman. Apa yang masuk kedalam jika tujuannya untuk mengenyangkan misalnya nasi ia dinamai tha'am. Tetapi jika tujuannya untuk kelezatan dan kenyamanan, ia dinamai fakihah. Ada makanan yang berfungsi sebagai makanan yang mengenyangkan sekaligus untuk kelezatan, seperti dalam masyarakat Arab misalnya kurma dan pisang di beberapa negara Afrika. Ada juga yang berfungsi sebagai makanan kelezatan atau sebagai makanan penutup dan pencuci mulut (Shihab, 2009 :347)

Adapun penafsiran dari ayat di atas adalah bahwa Allah mengeluarkan bagi manusia melalui air hujan yang Dia turunkan dari langit ke kebun dan taman-taman, dimana didalam kebun-kebun itu terdapat pohon kurma dan anggur, hal ini berdasarkan kondisi geografis yang terjadi pada negeri Hijaz dan tidak ada pula bedanya dengan yang terjadi pada wilayah-wilayah lainnya, semua buah-buahan yang ada didalamnya, termasuk sebagian nikmat Allah yang membuat mereka tidak mampu mensyukuri nikmat Allah dengan dengan syukur yang sebenar-benarnya (Shihab, 2009 :347)

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, manusia sangat dianjurkan untuk memakan buah-buahan yang kaya akan zat gizi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan kita sendiri, dimana itu semua bisa dengan mudah kita dapatkan disekitaran kita.

B. Tinjauan Umum Tentang Donat

1. Sejarah donat

Pada tahun 1968, stan American Donut di Djakarta Fair (sekarang disebut Pekan Raya Jakarta) merupakan perintis donat yang digoreng dengan mesin otomatis. Sejak itu, American Donut memiliki tradisi tahunan membuka stan di Pekan Raya Jakarta hingga sekarang.

Pada tahun 1985, Dunkin' Donuts membuka gerai pertama di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat yang terus berkembang menjadi lebih dari 200 gerai di berbagai kota di Indonesia. Yang kemudian diikuti dengan donat-donat waralaba asing lainnya seperti Master Ring, Master Donut, dan Mister Donut.

2. Deskripsi Donat

Donat (Donut dalam bahasa Inggris) adalah sejenis cake mini dengan bentuk yang khas, yaitu berlubang di tengah seperti cincin, dan berbentuk bulat jika diisi sesuatu. Donat memiliki sejarah yang cukup panjang sejak kemunculannya pertama kali hingga mencapai penampilannya saat ini. Para arkeolog Amerika menemukan beberapa peninggalan yang menggambarkan adanya jenis makanan berbentuk donat pada zaman pra sejarah. Namun diduga keras bahwa donat berasal dari daerah di Belanda yaitu Manhattan, dan disana donat dinamakan 'olykoeks' atau kue yang digoreng. Saat ini donat merupakan salah satu kue populer favorit masyarakat dunia. Bahkan di Amerika sendiri, saat ini lebih dari 10 juta donat diproduksi setiap tahun (Zuhrina, 2011 :12)

Donat yang dikreasikan oleh para ahli kuliner, harus selalu digoreng dalam minyak banyak dengan panas tertentu agar warna donat kuning kecoklatan dan matang merata. Sebenarnya donat sudah cukup lezat dengan hanya taburangula halus saja.

Donat dengan aroma yang harum, saat disantap terasa garing namun empuk dan tidak berminyak adalah donat yang akan selalu dicari para penggemarnya.

3. Tinjauan Tentang Bahan Penyusun Donat

a. Tepung Terigu

Terigu menurut kekerasannya dikenal pula sebagai gandum jenis keras dan gandum jenis lunak. Tipe gandum sangat berpengaruh terhadap karakteristik tepung yang dihasilkan. Tepung gandum jenis lunak menghasilkan adonan yang cenderung lebih sedikit air, lebih lunak dan kurang elastis. Gandum jenis keras umumnya mempunyai kandungan protein yang tinggi cenderung mengabsorpsi sejumlah besar air dan lebih elastis. Dalam pembuatan kue jenis tepung terigu biasanya digunakan tepung terigu yang mengandung kadar protein sedang (sekitar 8%-10%) (Rochimiwati, 2011 :35)

Tabel 2.1 kandungan tepung terigu dalam 100 gram

Komposisi Zat Gizi	Kandungan Gizi
Karbohidrat	75g
Protein	12g
Lemak	1g
Natrium	0%
Vitamin A	10%
Vitamin B1	30%
Vitamin B2	40%
Vitamin B3	10%
Vitamin D3	10%
Asam Folat	50%
Zat Besi	20%
Seng	30%

b. Air

Air adalah bahan yang terpenting dalam proses pembuatan roti, karena hanya dengan air dimungkinkannya terjadi suatu adonan roti. Hidrasi adalah fungsi utama dari air dalam pembuatan roti, m

engikat protein membentuk gluten dan mengikat pati membentuk gel dengan adanya panas. Air juga berfungsi sebagai pelarut dari bahan-bahan lainnya misalnya: garam, gula, susu, dan lain sebagainya (Rochimiwati, 2011 :38)

c. Yeast (ragi)

Yeast atau ragi adalah sebangsa mikroorganisme dari jenis *Saccharomyces Cerevisiae*. Yeast berfungsi untuk mengembangkan adonan dengan menghasilkan gas CO₂ dan memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkan dan juga memberi rasa dan aroma pada pati. Polyeast dalam mengembangkan adonan adalah dengan melepaskan gas CO₂ hasil fermentasinya. Gas ini kemudian akan menguap dalam kondisi pemanasan. Yeast mempunyai suhu optimal fermentasi, yaitu 25-30°C (maksimum 35-47°C) dan dengan derajat keasaman 4-4.5. Di atas suhu tersebut aktivitas yeast makin lama makin turun hingga akhirnya tidak ada sama sekali (Matz, 1992).

d. Gula

Gula pasir atau sukrosa mengalami perubahan, mula-mula mencair dengan adanya pemanasan suhu tinggi yang melebihi titik lebur sukrosa. Kemudian membentuk caramel yang teksturnya liat dan cepat keras. Selain itu gula pasir mempunyai sifat humektan yang dapat mengikat air sehingga dengan banyaknya gula pasir yang ditambahkan kedalam campuran maka semakin banyak pula air yang diikatnya,


akibatnya kadar air produk menjadi rendah yang berpengaruh pada tekstur produk sekaligus sebagai bahan pengawet (Kisman,2000 :65)

Pada proses pembuatan “donat” gula yang dibutuhkan berkisar 200gram atau 15% dari berat bahan (Zuhrina, 2011 :14)

4. Pembuatan Donat

Berikut resep standar pembuatan donat yaitu, 1kg tepung terigu, 11 g ragi instant, 100 g gula pasir, 75 g mentega, 100 ml air dingin, 1000 ml minyak goreng, 2 bungkus ceres dan 100 g gula putih bubuk.

1. Dalam wadah, campur tepung,parutan wortel, gula,mentega, ragi instant, aduk rata, dan air dingin, uleni hingga rata dan setengah kalis.
2. Uleni terus hingga kalis elastis.
3. Bagi adonan, bulatkan. Diamkan 20 menit, hingga mengembang.
4. Lubangi tengahnya, menjadi bentuk donat, segera goreng sampai kuning hingga kecoklatan dalam minyak yang berbeda setiap formulasi.
5. Angkat, tiriskan. Taburi gula donat, atau hias dengan cokelat (ceres) atau dengan gula putih bubuk sebagai variasi rasa.



Gambar 2.1 Resep Standar Pembuatan Donat

C. Tinjauan Umum Tentang Zat Gizi

Istilah gizi atau ilmu gizi dikenal Indonesia pada tahun 1950-an, sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris “*nutrition*”. Kata gizi sendiri berasal dari kata *ghidza* dalam bahasa Arab, yang berarti makanan. Kata *ghidza* dalam dialek Mesir dibaca gizi. Sementara itu ada juga yang menerjemahkan kata *nutrition* menjadi nutrisi (Muchtadi, 2009: 3)

Ilmu gizi disebut juga sebagai ilmu pangan, zat-zat gizi dan senyawa lain yang terkandung dalam bahan pangan. Reaksi interaksi serta keseimbangannya yang dihubungkan dengan kesehatan dan penyakit (Muchtadi, 2009 :3)

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan

kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi. (Supariasa, 2012 :17) Sedangkan Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan (Almatsier, 2009 :3)

(Syarfaini, 2012 :5) pengelompokan zat gizi menurut kebutuhan terbagi dalam dua golongan besar yaitu makronutrien (zat gizi makro) dan mikronutrient (zat gizi mikro).

1. Zat gizi makro

Zat gizi makro merupakan komponen terbesar dari susunan diet yang berfungsi untuk menyuplai energi dan zat-zat esensial (pertumbuhan sel/jaringan), pemeliharaan aktivitas tubuh. Yang termasuk zat gizi makro adalah karbohidrat (hidrat arang), lemak, protein (zat putih telur), makromineral dan air. Zat gizi makro sebagai sumber energi dapat diuraikan secara timbal balik, dalam hal ini karbohidrat menghasilkan 4 Kkal/g, lemak 9 Kkal/g dan protein 4 Kkal/g.

1. Karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya.

Semua karbohidrat terdiri atas unsur-unsur Carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), yang pada umumnya mempunyai rumus kimia $C_n(H_2O)_n$. Rumus umum ini memberi kesan zat karbon yang diikat dengan air (dihidrasi), sehingga diberi nama karbohidrat.

a. Karbohidrat dalam makanan (Jauhari, 2013 :42)

1) Jenis-jenis karbohidrat

Karbohidrat yang terdapat di dalam makanan pada umumnya hanya tiga jenis, ialah monosakarida, disakarida dan polisakarida. Mono dan disakarida terasa manis, sedangkan polisakarida tidak mempunyai rasa (tawar). Di dalam bahan makanan nabati terdapat dua jenis polisakarida, yaitu yang dapat dicerna dan yang tidak dapat dicerna, yang dapat dicerna adalah zat tepung (amilum) dan dekstrin. Yang tidak dapat dicerna ialah selulosa, pentosan dan galaktan. Polisakarida di dalam bahan makanan hewani dapat dicerna dan disebut glikogen. Tidak ada polisakarida hewani yang tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia. Disakarida di dalam bahan makanan juga hanya ada tiga jenis yang mempunyai arti gizi, ialah sukrosa, maltose dan laktosa. Laktosa hanya dijumpai pada hewani, yaitu merupakan jenis gula di dalam air susu, baik susu ibu maupun susu hewan. Sukrosa dan maltose terutama terdapat di dalam bahan makanan nabati.

Akhirnya monosakarida di dalam makanan juga hanya ada tiga jenis yang mempunyai arti gizi, ialah glukosa, fruktosa dan galaktosa. Galaktosa merupakan komponen yang karakteristik bagi gula hewani pada laktosa, yang terdapat di dalam air susu. Di dalam polisakarida, satuan dasarnya ialah glukosa. Kalau polisakarida dihidrolisis total, akan terurai menjadi molekul-molekul glukosa.

2) Sumber Karbohidrat

Sumber utama karbohidrat di dalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hanya sedikit saja yang termasuk bahan makanan hewani. Di dalam

tumbuhan karbohidrat mempunyai dua fungsi utama, ialah sebagai simpanan energy dan sebagai penguat struktur tumbuhan tersebut. Yang merupakan sumber energy terutama terdapat dalam bentuk zat tepung (amilum) dan zat gula (mono dan disakarida). Timbunan zat tepung terdapat di dalam biji, akar dan batang. Gula terdapat di dalam daging buah atau di dalam cairan tumbuhan di dalam batang (tebu).

Karbohidrat penguat struktur tumbuhan terdapat sebagai selulosa di dalam dinding sel. Perbedaan khas antara sel tumbuhan dan sel hewan, ialah bahwa pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang mengandung selulosa, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Melainkan terdapat selaput sel (membran sel), yang terdiri atas protoplasma yang mengalami modifikasi. Karbohidrat nabati di dalam makanan manusia terutama bersal dari timbunan, yaitu biji, batang dan akar. Sumber yang kaya akan karbohidrat umumnya termasuk bahan makanan pokok.

Karbohidrat hewani berbentuk glikogen, terutama terdapat dalam otot (daging) dan hati. Namun demikian jumlahnya terbatas dan setelah binatang mati, glikogen mengalami penguraian sehingga di dalam daging praktis menjadi nol, ketika sampai di dapur untuk dimasak.

Adapula jenis-jenis yang mengandung cukup banyak karbohidrat seperti pisang, sawo, nangka, sukun dan kelewih. Bahan makanan pokok biasanya merupakan sumber utama karbohidrat, karena selain tinggi kadar amilumnya, juga dapat dimakan dalam jumlah besar oleh seseorang tanpa menimbulkan keluhan (misalnya merasa nek, mual). Bahan makanan pokok di Indonesia dapat berupa beras (serealia), akar, dan umbi, serta ekstrak tepung seperti sagu.

b. Fungsi Karbohidrat

1) Fungsi karbohidrat di dalam tubuh

Di dalam tubuh karbohidrat merupakan salah satu sumber utama energy. Dari tiga sumber utama energy yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat merupakan sumber energy yang paling murah. Karbohidrat yang tidak dapat dicerna, memberikan volume kepada isi usus, dan rangsangan mekanis terjadi, melancarkan gerakan peristaltik yang melancarkan aliran bubur makanan melalui saluran pencernaan serta memudahkan pembuangan tinja.

Karbohidrat juga merupakan bagian dari struktur sel, dalam bentuk glikoprotein. Simpanan energy di dalam otot dan hati terdapat sebagai glikogen, salah satu bentuk karbohidrat yang mudah dimobilisasikan bila badan memerlukan banyak energy. Cadangan karbohidrat ini tidak begitu besar, sehingga cepat menjadi susut.

2) Fungsi karbohidrat di dalam hidangan

Di dalam hidangan, karbohidrat memudahkan pemberian bentuk kepada makanan, misalnya dalam bentuk kue. Dalam proses fermentasi, karbohidrat penting sekali dan mempunyai sifat-sifat khusus untuk mendapatkan hasil olah yang disukai konsumen. Jika dipanaskan pada suhu tinggi, karbohidrat menjadi caramel yang memberi aroma khusus. Kerjasama antara karbohidrat dan protein tertentu di dalam tepung terigu memberikan hasil bakar (roti) yang empuk seperti spons.

Mono dan disakarida berfungsi sebagai pemanis di dalam makanan. Rasa manis merupakan kualitas kecap yang disenangi manusia sejak lahir. Untuk makanan rendah kalori rasa manis didapat dengan menggunakan zat pemanis

sintetik yang tidak menghasilkan energy. Pemanis sintetik yang telah lama dikenal ialah sakharin dan siklambat. Bahan pemanis siklambat sudah tidak dipergunakan lagi di beberapa negara, karena terdapat indikasi memberikan efek samping yang merugikan tubuh. Oleh produsennya, siklambat telah ditarik dari peredaran pasar pada tahun 1970.

Sakharin masih dipergunakan, tetapi memberikan rasa sisa pahit di rongga mulut. Zat-zat pemanis sintetik ini beberapa puluh kali bahkan ratus kali lebih manis dibandingkan dengan rasa manis sukrosa (gula pasir) yang menjadi standar pengukur, sehingga cukup dipergunakan kuantum yang sangat kecil untuk mencapai derajat manis yang biasa dikehendaki dalam makanan.

c. Kebutuhan karbohidrat sehari

Bila tidak ada karbohidrat, asam amino dan gliserol yang berasal dari lemak dapat menjadi glukosa untuk keperluan energy di otak dan system saraf pusat. Oleh sebab itu, ada ketentuan tentang kebutuhan karbohidrat sehari untuk manusia. Untuk memelihara kesehatan, WHO (1990) menganjurkan agar 50-65% konsumsi energy total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana (Almatsier, 2009 :44)

d. Penentuan karbohidrat dalam pangan

Dalam penetapan kadar karbohidrat, ada beberapa metode yang paling sering digunakan antara lain Luff Schrool, by difference dan Anthrone.

Metode Luff Schrool merupakan salah satu metode yang baik digunakan untuk menentukan kadar karbohidrat dan resmi ditetapkan oleh BSN dalam SNI 01-1891-1992. Dalam sebuah penelitian dinyatakan bahwa metode *Luff Schrool* merupakan metode terbaik mengukur kadar karbohidrat dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.

Metode *Luff Schrool* mempunyai kelemahan yang terutama disebabkan oleh komposisi yang konstan (Raffa, 2013 :15).

Pada metode by difference, kadar karbohidrat pada bahan pangan dapat diketahui dengan menghitung presentase yang tersisa setelah semua komponen lain telah diukur. Metode by difference ini dapat menghasilkan nilai yang salah karena ada kemungkinan terjadi akumulasi kesalahan dari metode-metode yang digunakan untuk mengukur komponen lain, dan kemungkinan adanya komponen non-karbohidrat yang terukur yang menyebabkan penyimpangan yang lebih besar (Raffa, 2013 : 18).

Sedangkan pada metode Anthrone dapat diterapkan pada semua jenis bahan makanan. Penggunaan metode Anthrone untuk analisis total karbohidrat mulai berkembang sejak penggunaannya pada tahun 1946 untuk uji kuantitatif. Prinsip dasar metode *Anthrone* adalah senyawa *Anthrone* akan bereaksi secara spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat menghasilkan warna biru kehijauan yang khas. Kelebihan metode *Anthrone* yaitu dalam hal sensitifitas dan kesederhanaan ujinya. Sedangkan kekurangannya yaitu ketidakstabilan dari reagen (*Anthrone* yang dilarutkan dalam asam sulfat) sehingga perlu dilakukan persiapan reagen yang baru setiap hari (Raffa, 2013 :21).

2. Protein

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Nama protein berasal dari kata Yunani *protebos*, yang artinya yang pertama atau yang terpenting. Molekul protein mengandung unsure-unsur C,H,O dan unsur khusus, yang terdapat di dalam protein dan tidak terdapat di dalam molekul karbohidrat dan lemak ialah Nitrogen (N).

Protein merupakan zat gizi yang paling banyak terdapat di dalam tubuh. Protein merupakan bagian dari semua sel-sel hidup. Hampir setengah jumlah protein terdapat di otot, 1/5 terdapat di tulang, 1/10 terdapat di kulit, sisanya terdapat di jaringan lain dan cairan tubuh.

a. Sumber protein

Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik, dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas ikan dan kerang. Sumber protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya seperti tempe dan tahu, serta kacang-kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi. Padi-padian dan hasilnya relatif rendah dalam protein, tetapi karena dimakan dalam jumlah banyak, memberi sumbangan besar terhadap konsumsi protein sehari. Seperti telah dijelaskan terdahulu protein padi-padian tidak komplit, dengan asam amino pembatas lisin.

Menurut catatan Biro Pusat tahun 1999, rata-rata 51,4% konsumsi protein penduduk sehari berasal dari padi-padian. Bahan makanan hewani kaya dalam protein bermutu tinggi, tetapi hanya 18,4% konsumsi protein rata-rata penduduk Indonesia. Bahan makanan nabati yang kaya dalam protein adalah kacang-kacangan. Kontribusinya rata-rata terhadap konsumsi protein hanya 9,9%. Sayur dan buah-buahan rendah dalam protein, kontribusinya rata-rata terhadap konsumsi protein adalah 5,3%. Gula, sirup, lemak dan minyak murni tidak mengandung protein.

b. Fungsi protein

Fungsi protein di dalam tubuh sangat erat hubungannya dengan hidup sel. Dapat dikatakan bahwa setiap gerak hidup sel selalu bersangkutan dengan fungsi protein. Dalam penyuluhan dan pendidikan gizi ditekankan fungsi protein sebagai zat

pembangun. Selain itu protein berfungsi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, menggantikan sel-sel yang mati dan aus terpakai, sebagai protein struktural. Sebagai badan-badan anti, protein juga berfungsi dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan berbagai mikroba dan zat toksik lain yang datang dari luar dan masuk ke dalam *milieu interieur* tubuh.

Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Boleh dikatakan bahwa semua proses metabolik (reaksi biokimia) diatur dan dilangsungkan atas pengaturan enzim, sedangkan aktivitas enzim diatur lagi oleh hormon, agar terjadi hubungan yang harmonis antara proses metabolisme yang satu dengan yang lain. Protein juga merupakan salah satu sumber utama energi bersama-sama karbohidrat dan lemak.

Dalam bentuk kromosom, protein juga berperan dalam menyimpan dan meneruskan sifat-sifat keturunan dalam bentuk genes. Di dalam genes ini tersimpan codon untuk sintesa protein enzim tertentu, sehingga proses metabolisme diturunkan dari orang tua kepada anaknya dan terus kepada generasi-generasi selanjutnya (Sediaoetama, 2010 :4).

Melihat betapa pentingnya fungsi protein, sudah selayaknya bila protein ini diberikan perhatian khusus dalam penyediaan pangan bagi anak-anak maupun orang dewasa.

c. Kebutuhan protein

Komposisi protein yang mengandung unsur karbon menjadikan protein sebagai bahan bakar sumber energi. Apabila tubuh tidak menerima karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh maka protein akan dibakar untuk sumber energi. Dalam hal ini, keperluan tubuh akan energi lebih

diutamakan sehingga sebagian protein tidak dapat digunakan untuk membentuk jaringan. Protein mensuplai 4 kalori pergram, tetapi secara ekonomi sumber energi yang berasal dari protein lebih mahal dibandingkan dengan sumber energi yang berasal dari lemak dan karbohidrat. Sebagai dasar perhitungan kecukupan protein = 10-15 % dari total suplai kalori. Misalnya 10% dari kecukupan energi = 210 kalori = 52,5 gram protein.

d. Penentuan Protein dalam pangan

Dalam penetapan kadar protein, ada beberapa metode yang paling sering digunakan antara lain Kjeldahl, Biuret dan N-Amino (Titrasi Formol).

Metode Kjeldahl merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Protein merupakan senyawa makromolekul kompleks yang terdiri dari unsur C, H, O, N, S, dan dalam bentuk kompleks mengandung unsur P. Penetapan kadar protein dengan metode Kjeldahl merupakan metode empiris (secara tidak langsung) yaitu melalui penetapan kadar N dalam bahan. Dengan metode ini senyawa-senyawa bernitrogen yang lain selain protein juga terukur sebagai protein sehingga metode ini sering disebut penentuan protein kasar.

Metode ini cocok digunakan secara semimikro, sebab hanya memerlukan jumlah sampel dan pereaksi yang sedikit dan waktu analisa yang pendek, selain itu metode kjedahl mempunyai presisi yang tinggi dalam penentuan protein dalam makanan. Tahapan analisis protein dengan metode Kjeldahl meliputi destruksi, destilasi, dan titrasi. Destruksi bertujuan melepaskan unsur N dari protein yang diubah menjadi amonium sulfat. Pada tahap destilasi amonium sulfat diubah menjadi amoniak yang ditangkap oleh larutan asam standar berlebih. Sisa asam yang tidak bereaksi

dengan amoniak dititrasi, sehingga dapat diketahui jumlah amoniak dari N protein sampel (Itp, 2012 :7)

Penentuan kadar protein dengan metode biuret didasarkan pada pengukuran serapan cahaya berwarna ungu dari protein yang bereaksi dengan pereaksi biuret dimana yang membentuk kompleks adalah protein dengan ion Cu^{2+} yang terdapat dalam pereaksi biuret dalam suasana basa. Semakin tinggi intensitas cahaya yang diserap oleh spektrofotometer, maka semakin tinggi pula kandungan protein yang terdapat dalam zat tersebut. Keuntungan metode ini yaitu bahan yang digunakan relatif murah, akan tetapi kelemahan dari metode ini adalah sensitifitas terhadap bahan yang diidentifikasi rendah sehingga diperlukan bahan dalam jumlah yang tidak sedikit (Tohar, 2013 :14).

Metode titrasi formol adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kadar protein dalam suatu bahan. Titrasi formol hanya tepat digunakan untuk menentukan suatu proses terjadinya pemecahan protein dan kurang tepat untuk penentuan jenis protein. Metode titrasi formol ini secara ekonomis, murah, cepat dan tidak memerlukan keahlian khusus, walaupun metode ini termasuk dalam metode konvensional (Tohar, 2013 :18).

3. Lemak

Lemak/minyak merupakan persenyawaan kimia yang mengandung unsur karbon (C), hydrogen (H), dan Oksigen (O) seperti juga pada karbohidrat, hanya bedanya terletak pada jumlah dan susunannya. Lemak/minyak mengandung lebih banyak karbon dan lebih sedikit oksigen daripada karbohidrat. Sehingga lemak memiliki tenaga lebih banyak bila dibandingkan dengan karbohidrat (1 gram lemak menyumbangkan 9 kalori) (Minarno, 2008 :13)

Al-Quran sebagai acuan pertama mengisyaratkan penggunaan minyak dalam makanan, sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Mu'minun/23 : 20.

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبَّغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan (Kemenag, 2010 :343)

Kata **طُورِ سَيْنَاءَ** berasal dari kata **طُور** yang berarti gunung dan **سَيْنَاءَ** yang diperselisihkan maknanya, ada yang berpendapat bahwa **saind** artinya cahaya karena digunung itulah Nabi Musa as mendengar firman Allah dan berbicara dengannya, ada yang memahami bahwa **saind** berarti indah/diberkati atau nama pohon yang banyak ditemukan disana. Thursina berada digunung Sinai Mesir, tidak jauh dari teluk Aqabah dan terusan Suez (Shihab, 2009 :347)

Pohon zaitun termasuk salah satu karunia Allah swt yang sangat besar karena ia merupakan jenis pohon kayu berumur ratusan tahun. Manusia dapat mengambil buahnya untuk masa yang sangat panjang. Selain itu zaitun juga mengandung zat garam, zat besi dan forforus yang merupakan bagian makanan terpenting bagi manusia. Dari buah zaitun dapat dihasilkan minyak yang pada umumnya digunakan sebagai bahan makanan. (Shihab, 2009 :348)

Pemakan makanan bagi orang-orang yang makan memiliki pengertian sebagai pembangkit selera (bumbu) bagi mereka yang menggunakannya untuk makan. Di alam lemak terbanyak berupa trigliserida yang tersusun atas persenyawaan antara asam lemak dan gliserol.

Dalam bahan makanan lemak berbentuk globula-globula lemak. Komponen ini penting sebagai sumber energi dan asam lemak esensial. Disamping itu lemak juga

berperan penting sebagai pelarut vitamin A, D, E dan K. Pada tubuh hewan dan manusia, lemak yang berlebihan dapat disimpan dalam depot-depot lemak. Perbedaan yang menonjol pada lemak dan minyak adalah bentuknya pada suhu kamar. Lemak umumnya berbentuk padat sedangkan minyak berbentuk cair. Bentuk padat atau cair ini dipengaruhi kandungan asam lemaknya.

Butiran lemak dapat membentuk emulsi dengan air, misalnya air pada air susu, mentega (hewan) dan margarin (tumbuhan). Beberapa bahan pangan yang berlemak atau berminyak cenderung untuk mengikat oksigen bebas (oksidasi). Terjadinya oksidasi inilah yang mengakibatkan kerusakan bahan pangan yang disebut tengik (*rancidity*). Oleh karena itu perlu ditambahkan antioksidan guna mencegah reaksi oksidasi tersebut.

Lemak tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam pelarut kimia seperti petroleum eter, etil eter, kloroform atau benzena. Terdapat tiga jenis lemak yakni lemak sederhana, lemak gabungan/majemuk dan derivat lemak. Lemak sederhana adalah lemak netral (trigliserida) dan malam (*waxes*). Trigliserida tersusun atas satu gliserol dan tiga asam lemak.

Ketiga asam lemak itu bisa dari jenis yang sama atau dapat pula dari jenis yang berbeda. Malam adalah senyawa alkohol (selain gliserol) dan asam lemak, umumnya bersifat lunak daripada lemak. Malam tidak mempunyai peranan dalam makanan, namun banyak digunakan dalam industry (Minarno, 2008 :14).

Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak. WHO menganjurkan konsumsi lemak sebanyak 15-30% kebutuhan energy total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Diantara lemak yang dikonsumsi sehari dianjurkan

paling banyak 10% dari kebutuhan energy total berasal dari lemak jenuh dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda. Konsumsi kolesterol dianjurkan adalah kurang dari 300 mg sehari (Syarfaini, 2012 :98)

Dalam penetapan kadar lemak, ada beberapa metode yang paling sering digunakan antara lain soxhlet dan gravimetri. Prinsip analisis kadar lemak dengan metode soxhlet adalah lemak diekstrak dengan pelarut lemak seperti petroleum eter, petroleum benzena, dietil eter, dan lain-lain. Lemak yang ada dalam pelarut dipisahkan dengan cara menguapkan pelarut, sehingga berat lemak dapat diketahui. Kelebihan metode ini yaitu pelarut yang digunakan masih utuh, dapat digunakan untuk pemisahan bahan lain. dikatakan masih utuh karena dalam penguapan dengan rotary evaporator hasil yang diperoleh memisahkan pelarut yang ada dalam filtrat. Namun, metode ini kurang efektif karena harga pelarut mahal dan lemak yang diperoleh harus dipisahkan dari pelarutnya dengan cara diuapkan (ITP, 2012 :8)

Metode gravimetri merupakan proses isolasi serta penimbangan suatu unsur atau senyawa tertentu dari unsur tersebut dalam bentuk yang sempurna mungkin. Bagian besar penetapan-penetapan pada gravimetri menyangkut perubahan unsur atau radikal yang akan ditetapkan menjadi sebuah senyawa yang murni dan stabil yang dapat dengan mudah diubah menjadi satu bentuk yang sesuai dan ditimbang. Pemisahan unsur-unsur atau senyawa pada metode gravimetri dapat dilakukan dengan cara pengendapan. Kekurangan metode ini yaitu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan kelebihanannya yaitu bahan penyusun zat telah diisolasi.

2. Mikronutrient (zat gizi mikro)

Zat gizi mikro bukan merupakan senyawa pembangun atau sumber energi, namun demikian zat gizi mikro memiliki peranan penting dalam tubuh. Yang termasuk zat gizi mikro :

a. Vitamin A

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. Secara luas, vitamin A merupakan nama genetik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor/ provitamin A/karetinoid yang mempunyai aktivitas biologik sebagai retinol (Syarfaini, 2012 :142)

Vitamin A esensial untuk pemeliharaan kesehatan dan kelangsungan hidup. Di seluruh dunia (WHO, 1991), di antara anak-anak prasekolah diperkirakan terdapat sebanyak 6-7 juta kasus baru xeroftalmia tiap tahun, kurang lebih 10% di antaranya menderita kerusakan kornea. Diperkirakan pada satu waktu sebanyak tiga juta anak-anak buta karena kekurangan vitamin A, dan sebanyak 20-40 juta kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan. Di samping itu kekurangan vitamin A meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan dan diare, meningkatkan angka kematian karena campak, serta keterlambatan pertumbuhan. Beberapa fungsi vitamin A, yaitu untuk penglihatan, pertumbuhan dan perkembangan, diferensiasi selular, reproduksi, dan kekebalan tubuh (Syarfaini, 2012 :142)

Vitamin A ditemukan dalam bahan-bahan makanan yang berlemak. Provitamin A adalah pigmen berwarna kuning. Vitamin A pada umumnya stabil terhadap panas, asam dan alkali dan mempunyai sifat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara dan akan rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar dan lemak yang sudah tengik. Contoh bahan makanan yang banyak mengandung karoten adalah

sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning, ubi jalar dan waluh (Erna, 2011: 26).

Kebutuhan vitamin A yang direkomendasikan adalah untuk bayi 0-12 bulan 350 RE, anak-anak 1-3 tahun 350 RE, anak-anak 4-6 tahun 360 RE, anak-anak 7-9 tahun 400 RE, untuk wanita dewasa 500 RE, laki-laki dewasa 500-700 RE, bumil + 200 RE, dan buteki + 300-350 RE. Anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan lebih banyak memerlukan zat gizi, termasuk vitamin A. Nama lain vitamin A ialah axerofthol dan retinol (Syarfaini, 2012 :147)

Hal ini berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat 31 tentang larangan berlebihan dan sebaiknya sesuai yang dibutuhkan tubuh.

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

... makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Kemenag, 2010 :154)

Dan makanalah makanan halal, enak, bermanfaat lagi bergizi berdampak baik serta minumlah apa saja yang kamu sukai selama tidak memabukkan, tidak juga mengganggu kesehatan kamu dan janganlah berlebih-lebihan dalam segala hal baik dalam beribadah, demikian pula dalam makan dan minum atau apa saja, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran baik orang berlebihan dalam hal apapun (Shihab, 2009 :87)

Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata

bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2009 :87)

Menurut Ibnu Abbas bahwa makna yang terkandung didalam ayat ini adalah makan dan minumlah sesukamu selagi engkau hindari dua hal yaitu berlebih-lebihan dan sombong. Sebagaimana dalam sebuah Hadits yang di riwayatkan oleh Imam nasai dan imam Turmudzi yaitu :

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأَ آدَمِيَّ وَعَاءٌ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ يَحْسِبُ ابْنُ آدَمَ أَكْلَاتٍ يُقِمُّنْ صَلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثْ لِطَعَامِهِ وَتُلُثْ لِشَرَابِهِ وَتُلُثْ لِنَفْسِهِ.

Artinya :

Dari Miqdam bin Ma'di Karib, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih buruk yang diisi oleh seorang manusia selain perutnya. Cukuplah anak Adam itu memakan makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat melakukan yang demikian, hendaklah sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk pernafasannya". (Shahih: Ibnu Majah 3349).

b. β Karoten

Beta Karoten juga dikenal dengan Pro vitamin A merupakan senyawa karotenoid bertanggung jawab untuk memberikan pigmen oranye pada beberapa jenis buah-buahan dan sayuran. Beta Karoten merupakan antioksidan yang kuat yang dapat melawan radikal bebas dalam tubuh, beta karoten telah terbukti mampu membantu melindungi terhadap kanker dan penuaan. Selain itu, jenis vitamin ini juga sebagai prekursor vitamin A. Beta-karoten adalah vitamin larut lemak dan dapat terbentuk secara alami, jadi beberapa makanan dengan lemak seperti minyak zaitun atau kacang-kacangan dapat membantu penyerapan beta karoten.

Kekurangan Beta karoten dapat menyebabkan kebutaan malam, rambut rontok, iritasi kulit dan mata kering atau meradang. Senyawa ini membantu menjaga kesehatan kulit dan juga memainkan peran penting dalam kesehatan mata. Individu yang mengkonsumsi tingkat yang diperlukan beta-karoten dapat menurunkan risiko penyakit arteri koroner, stroke, degenerasi makula, dan penyakit terkait usia lainnya. Untuk itu kita perlu mencukupi beta karoten dalam tubuh kita. Beta karoten dapat kita temukan pada makanan jenis buah buahan mau pun sayuran terutama pada buah buahan dan jenis sayuran yang memiliki warna orange. Beberapa makanan yang mengandung beta karoten yang cukup tinggi di antaranya adalah ubi, wortel, bayam, labu, melon, cabe merah, aprikot, kacang polong dan brokoli. (Koster S.K 2008 :19)

Beta karoten yang kita konsumsi sangat bermanfaat terhadap kesehatan kita. Salah satu manfaat yang bisa kita peroleh dari beta karoten adalah untuk mengurangi oksidasi LDL atau kolesterol jahat sehingga dapat menurunkan risiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Selain itu beta karoten juga bermanfaat dalam mengurangi masalah pernafasan seperti asma, bronkitis dan emfisema. (Koster S.K 2008 :19)

Beta karoten juga baik dalam mengurangi terjadinya kanker, hal itu karena beta karoten memiliki sifat antioksidan sehingga dapat melawan radikal bebas yang menjadi pemicu tumbuhnya sel kanker. Selain itu beta karoten juga dapat mengaktifkan kelenjar timus yang merupakan kelenjar yang dapat memberikan perlindungan terhadap tubuh kita dari berbagai serangan virus. Manfaat lainnya dari beta karoten adalah membantu mencegah diabetes dan radang sendi. Selain itu, beta karoten juga dapat mengatasi permasalahan kulit seperti kulit kering, penyakit eksim, dan psoriasis serta mencegah kerusakan oksidatif dan mencegah terjadinya gangguan mata. (Koster S.K 2008 :20)

Beta karoten juga perlu dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Jika tidak jenis vitamin ini akan memberikan efek samping terutama jika dikonsumsi dalam jumlah tinggi dan dalam jangka panjang. Kelebihan betakaroten akan memberikan efek samping pada kulit dimana akan berubah warna menjadi warna kuning terutama pada telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Selain itu jumlah tinggi dari beta karoten juga akan mengakibatkan diare, pusing dan nyeri sendi. (Koster S.K 2008 :20)

Mengonsumsi Beta karoten tentu harus teratur dan dengan dosis yang tepat. Lalu berapakah dosis yang benar untuk mengonsumsi beta karoten?. Dosis beta karoten yang diperlukan seseorang berbeda beda tergantung usia dan kondisi seseorang. Sebaiknya, sebelum mengonsumsi jenis vitamin ini, kita berkonsultasi dengan dokter, akan tetapi secara umum dosis yang diperlukan oleh anak-anak usia 1-4 tahun adalah 60-90mg/hari, usia 8-9 tahun 90-120mg/hari. Sedangkan usia 9-12 tahun, dosis yang diperlukan adalah 120-150mg/hari, usia 13-16 tahun dosis yang diperlukan adalah 150-180mg/hari, dan untuk usia 16 tahun ke atas adalah 180 mg/ hari. (Koster 2008 :21)

Mengenai kandungan zat gizi di dalam makanan, al-Qur'an memberi kita petunjuk untuk mengkaji atau memperhatikan tentang kandungan zat gizi dalam makanan, Allah berfirman dalam QS Abasa/80 : 24:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Terjemahnya :

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (Kemenag,2010 :585)

Pada ayat diatas manusia disuruh melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana pertalian hidupnya dengan bumi tempat dia berdiam ini: “Maka cobalah memandang manusia kepada makanannya.” (ayat 24). Perhatikanlah dari mana datangnya makanan

itu dan bagaimana tingkat-tingkat pertumbuhannya sehingga makanan itu telah ada saja dalam piring terhidang di hadapannya.

Pada ayat diatas sudah sangat jelas makna yang terkandung didalamnya bahwa Allah swt memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan makanan yang akan kita konsumsi, dalam artian memperhatikan makan halal dan baik untuk kita konsumsi, dimana makanan halal disini adalah yang baik menurut syariat islam sedangkan baik adalah dalam hal kesehatan.

Menurut Sediaoetama (2010: 20), fungsi zat makanan secara umum ialah :

1. Sebagai sumber energi atau tenaga
2. Menyokong pertumbuhan badan
3. Memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak atau aus terpakai
4. Mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan, misalnya keseimbangan air, asam-basa dan keseimbangan mineral di dalam cairan tubuh
5. Berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit, misalnya sebagai antitoksin dan antibodi lainnya.

Adapun penggolongan bahan makanan berdasarkan fungsi dari zat gizinya

- a. Zat gizi penghasil energi yaitu karbohidrat, lemak dan protein. Zat gizi penghasil energi ini sebagian besar dihasilkan oleh bahan makanan pokok.
- b. Zat gizi pembangun sel, terutama diduduki oleh protein, sehingga bahan pangan lauk-pauk tergolong dalam bahan makanan sumber zat pembangun.
- c. Zat gizi pengatur; ke dalam kelompok ini termasuk vitamin dan mineral. Maka bahan pangan sumber mineral dan vitamin ialah sayur dan buah termasuk golongan bahan makanan sumber zat gizi pengatur.

D. Tinjauan Umum Tentang Uji Organoleptik

Penilaian organoleptik yang disebut juga penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu cara penilaian yang sudah sangat lama dikenal dan masih sangat umum digunakan. Metode penilaian ini banyak digunakan karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Dalam beberapa hal penilaian dengan indera bahkan memiliki ketelitian yang lebih baik dibandingkan dengan alat ukur yang paling sensitif. Penerapan penilaian organoleptik pada prakteknya disebut uji organoleptik yang dilakukan dengan prosedur tertentu. Uji ini akan menghasilkan data yang penganalisisan selanjutnya menggunakan metode statistika (Zuhrina, 2011 :45).

Indera yang berperan dalam uji organoleptik adalah indera penglihatan, penciuman, pencicipan, peraba dan pendengaran. Panel diperlukan untuk melaksanakan penilaian organoleptik dalam penilaian mutu atau sifat-sifat sensorik suatu komoditi, panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel ini terdiri atas orang atau kelompok yang bertugas menilai sifat dari suatu komoditi. Orang yang menjadi anggota panel disebut panelis (Zuhrina, 2011 :45).

Uji hedonik atau uji kesukaan merupakan salah satu jenis uji penerimaan. Uji hedonik merupakan suatu kegiatan pengujian yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang panelis yang mana memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan atau ketidaksukaan konsumen tersebut terhadap suatu produk tertentu. Panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan. Tingkat kesukaan ini disebut skala hedonik contoh tingkat tersebut adalah seperti sangat suka, suka, agak suka, netral, agak tidak suka, tidak suka, dan sangat tidak suka.

Uji hedonik paling sering digunakan untuk menilai komoditi sejenis atau produk pengembangan secara organoleptik. Jenis panelis yang bisa digunakan untuk

melakukan uji hedonik ini adalah panelis yang agak terlatih dan panelis tidak terlatih. Penilaian dalam uji hedonik ini bersifat spontan. Ini berarti panelis diminta untuk menilai suatu produk secara langsung saat itu juga pada saat mencoba tanpa membandingkannya dengan produk sebelum atau sesudahnya. Dalam penilaian organoleptik dikenal tujuh macam panel, yaitu panel perseorangan, panel terbatas, panel terlatih, panel agak terlatih, panel tidak terlatih, panel konsumen dan panel anak-anak. Perbedaan ketujuh panel tersebut didasarkan pada keahlian dalam melakukan penilaian organoleptik. (Rahayu, 1998 :18)

1. Panel Perseorangan

Panel perseorangan adalah orang yang sangat ahli dengan kepekaan spesifik yang sangat tinggi yang diperoleh karena bakat atau latihan-latihan yang sangat intensif. Panel perseorangan sangat mengenal sifat, peranan dan cara pengolahan bahan yang akan dinilai dan menguasai metode-metode analisa organoleptik dengan sangat baik. Keuntungan menggunakan panelis ini adalah kepekaan tinggi, bias dapat dihindari, penilaian efisien. Panel perseorangan biasanya digunakan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak terlalu banyak dan mengenali penyebabnya.

2. Panel Terbatas

Panel terbatas terdiri dari 3-5 orang yang mempunyai kepekaan tinggi sehingga bias lebih dapat dihindari. Panelis ini mengenal dengan baik faktor-faktor dalam penilaian organoleptik dan mengetahui cara pengolahan dan pengaruh bahan baku terhadap hasil akhir.

3. Panel Terlatih

Panel terlatih terdiri dari 15-25 orang yang mempunyai kepekaan cukup baik. Untuk menjadi panelis terlatih perlu didahului dengan seleksi dan latihan-latihan. Panelis ini dapat menilai beberapa rangsangan sehingga tidak terlampau spesifik.

4. Panel Agak Terlatih

Panel agak terlatih terdiri dari 15-25 orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetahui sifat-sifat tertentu. Panel agak terlatih dapat dipilih dari kalangan terbatas dengan menguji datanya terlebih dahulu. Sedangkan data yang sangat menyimpang boleh tidak digunakan dalam keputusannya.

5. Panel Tidak Terlatih

Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang awam yang dapat dipilih berdasarkan jenis suku-suku bangsa, tingkat sosial dan pendidikan. Panel tidak terlatih hanya diperbolehkan menilai sifat-sifat organoleptik yang sederhana seperti sifat kesukaan, tetapi tidak boleh digunakan dalam uji pembedaan. Panel tidak terlatih biasanya terdiri dari orang dewasa dengan komposisi panelis pria sama dengan panelis wanita.

6. Panel Konsumen

Panel konsumen terdiri dari 30 hingga 100 orang yang tergantung pada target pemasaran komoditi. Panel ini mempunyai sifat yang sangat umum dan dapat ditentukan berdasarkan perorangan atau kelompok tertentu.

7. Panel Anak-anak

Panel yang khas adalah panel yang menggunakan anak-anak berusia 3-10 tahun. Biasanya anak-anak digunakan sebagai panelis dalam penilaian produk-produk pangan yang disukai anak-anak seperti permen, es krim dan sebagainya.

Cara penggunaan panelis anak-anak harus bertahap, yaitu dengan pemberitahuan atau dengan bermain bersama, kemudian dipanggil untuk diminta responnya terhadap produk yang dinilai dengan alat bantu gambar seperti boneka snoopy yang sedang sedih, biasa atau tertawa.

E. Kerangka Konsep


1. Dasar Pemikiran Variabel

Keadaan gizi merupakan salah satu factor yang sangat menentukan kesehatan oleh karena itu keadaan gizi masyarakat merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Adanya diversifikasi atau keanekaragaman pangan merupakan salah satu faktor penting dalam tersedianya pangan alternatif yang bergizi. wortel mempunyai gizi yang cukup lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral.

Dalam pembuatan donat wortel, penggorengan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan, dalam pengeringan terjadi pemanasan sehingga zat gizi kemungkinan akan hilang atau berkurang.


2. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti

Adapun pola pikir variabel yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Pikir

3. Rancangan Penelitian



Gambar 2.3 Rancangan Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah adalah penelitian kuantitatif lapangan, disebut sebagai kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian analisis zat gizi donat wortel dilaksanakan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar. Sementara itu Uji Organoleptik dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis rancangan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) karena diterapkan pada percobaan yang dilakukan pada lingkungan homogen (atau dapat dianggap homogen), misalnya percobaan-percobaan yang dilaksanakan di laboratorium dimana pengaruh lingkungan secara nisbi lebih mudah dikendalikan. Perlu dijelaskan disini bahwa yang disebut "lingkungan" adalah faktor-faktor lain diluar faktor yang sedang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif dengan menggunakan desain true-eksperimen, Dikatakan true-eksperimen karena, mengikuti seluruh prosedur dan syarat eksperimen terutama dalam : kontrol variabel, pemberian manipulasi (formulasi) dan pengujian hasil. Semua variabel dikontrol, kecuali variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen.

Kelompok eksperimen diberi formulasi khusus (variabel yang akan diuji akibatnya), sedang kelompok kontrol diberi formulasi lain (yang biasa dilakukan) dan hasilnya dibandingkan dengan kelompok eksperimen. Pengukuran/pengujian menggunakan instrumen baku (tes standar). Setelah menentukan metode yang baik, selanjutnya dilakukan formulasi atau pengkomposisian donat tanpa wortel dan wortel dengan formulasi berikut

- a. kelompok kontrol 1:0, dimana pada formulasi ini tidak menggunakan campuran wortel ,disini cuma menggunakan tepung terigu sebanyak 100g,
- b. kelompok eksperimen
 1. 1:1 pada formulasi ini menggunakan bahan dasar 50g tepung terigu dan 50g wortel.
 2. 3:1 pada formulasi ini menggunakan 75g tepung terigu dan 25g wortel.
 3. 1:3 pada formulasi ini menggunakan bahan dasar sebanyak 25g tepung terigu dan 75g wortel. Formulasi terhadap bahan tersebut dilakukan dengan *food processor* sehingga dihasilkan donat wortel.

Model true-eksperimen yang digunakan yaitu *Posttest Only Control Group Design*, Dalam ini rancangan ini, memungkinkan peneliti mengukur pengaruh formulasi (intervensi) pada kelompok eksperimen dengan cara membandingkan kelompok tersebut dengan kelompok kontrol. Tetapi rancangan ini tidak memungkinkan peneliti untuk menentukan sejauh mana atau seberapa besar perubahan itu terjadi, sebab *pretest* tidak dilakukan untuk menentukan data awal (Notoatmodjo, 2010). Bentuk rancangan ini sebagai berikut

	Formulasi	Posttest
R (Kelompok Eksperimen)	X	02 02
R (Kelompok Kontrol)		

Pada penelitian ini dilakukan uji laboratorium untuk mengetahui kadar total kandungan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, dan β karoten), serta daya terima melalui uji organoleptik dalam donat wortel.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah buah wortel. Adapun wortel yang digunakan adalah wortel yang masih segar, masih muda dengan umur panen 3 bulan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu :

1. Dokumentasi, dengan mencari data dan menganalisis dokumen-dokumen berupa catatan, buku, jurnal penelitian, dan sebagainya.
2. Uji Laboratorium yaitu melakukan eksperimen melalui serangkaian percobaan tertentu dengan menggunakan alat-alat atau fasilitas yang tersedia di laboratorium penelitian. Pengujian laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang kadar total kandungan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak, vitamin A dan β karoten) donat wortel.
3. Uji organoleptik yaitu melakukan uji hedonik dan uji mutu hedonik yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu produk baik dari segi aroma, warna, tekstur dan rasa.


E. Instrumen Penelitian

1. Instrumen yang digunakan untuk pembuatan sampel

a. Donat Wortel

Alat yang digunakan untuk membuat sampel yaitu, pisau, wadah, parut keju, wajan, spatula, piring, sendok, timbangan dan stopwatch. Bahan yang digunakan yaitu wortel, tepung terigu, gula, ragi instan dan air.

Formulasi 1:1 dengan resep tepung terigu (50g), wortel (50g), gula pasir (1sdm), fermifan (½sdt), mentega (1sdm) dan air secukupnya. Formulasi 1:3 dengan resep tepung terigu (25g), wortel (75g), fermifan (½sdt), 1sdm mentega. Formulasi 3:1 dengan tepung terigu (75g), wortel (25g), fermifan (½ sdt), gula pasir (1½sdm), dan mentega (1 sdm), air secukupnya



Gambar 3.1 Alur Penelitian

1. Dalam wadah, campur tepung, parutan wortel, gula, mentega, ragi instant, aduk rata, dan air dingin, uleni hingga rata.
2. Uleni terus hingga kalis elastis selama 20 menit setiap formulasi.
3. Diamkan selama 45 menit hingga mengembang
4. Bagi adonan, bulatkan. Diamkan 30 menit, hingga mengembang.
5. Lubangi tengahnya, menjadi bentuk donat, segera goreng sampai kuning hingga kecoklatan dalam minyak yang berbeda setiap formulasi namun dengan suhu yang sama yaitu dengan suhu 110°C
6. Angkat, tiriskan.

2. Kadar Karbohidrat metode *luff scrool*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar karbohidrat sebagai berikut :

- a. Sampel ditimbang dengan seksama kurang lebih 5 gram kedalam labu ukur
- b. Tambahkan HCL 0,1 sebanyak 100 mL
- c. Hubungkan dengan kondensor selama 3 jam menggunakan autoklaf, setelah itu dinginkan
- d. Uji Ph, siapkan beker gelas, bilas dengan aquadest, pindahkan sampel karbohidrat ke beker
- e. Tambahkan indikator PP tetes demi tetes, dan siapkan Ph meter
- f. Larutkan dengan NaOH hingga mencapai PP 5,5
- g. Tuangkan ke labu ukur 250 mL, himpitkan dengan aquadest kemudian homogenkan dan saring menggunakan kertas ssaring
- h. Filtrate 1 mL larutan sampel himpitkan dilabu ukur 10 mL dengan aquadest, kemudian tuang kedalam Erlenmeyer dan tambahkan 15 mL aquadest, dan 25 mL luff scrool

- i. Campuran dipanaskan dengan nyala yang tetap diusakan agar larutan dapat mendidih dalam waktu 3 menit, dididihkan terus sampai 10 menit
- j. Dinginkan, (jangan dikocok)
- k. Setelah dingin, tambahkan 15 mL KI 20%, H₂SO₄ 25% sebanyak 25 ml kemudian titrasi dengan Tio hingga kuning mudah
- l. Teteskan amilum 10 tetes, titrasi kembali dengan tio secara perlahan hingga warna putih susu
- m.

$$\text{Kadar Glukosa} = \frac{\text{Glukosa dari tabel (mg)} \times \text{fp}}{\text{Bobot sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$\text{Kadar Karbohidrat} = 0,95 \times \text{Kadar glukosa}$$

Keterangan : fp = Faktor pengencer = 100

3. Kadar Protein metode *Kjedahl*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar protein sebagai berikut :

- a. Timbang bahan kira-kira 0,5 gram menurut besarnya kandungan protein. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam labu kjehdal.
- b. Tambahkan 1 sendok selenium mix atau campurkan 25 ml H₂SO₄.
- c. Panaskan diatas hotplat dalam lemari asam sampai terjadi larutan yang berwarna jernih dan uap SO₂ hilang.
- d. Tambahkan aquadest sebanyak 250 dan 1ml PP 0,1% kedalam ekstrak sampel tersebut
- e. Tambahkan NaOH pellet sampai berubah warna menjadi pink keungu-unguan kemudian destilasi

- f. Destilat ditampug dalam 20 ml larutan asam borat 3%. Lakukan destilasi sampai destilat mecapai 100ml
- g. Setelah selesai destilasi, tambahkan indicator BCG/conway sebanyak 3 tetes, hingga warna hijau
- h. Titrasi sampel dengan HCL 0,1 N hingga berubah warna menjadi pink
- i. Hasil yang diperoleh kemudian dimasukkan dalam rumus:

$$\%N = \frac{(V.titrasi\ sampel - Vol.titrasi\ blank) \times N\ HCL \times 14.007}{mg\ bobot\ sampel} \times 100\%$$

- j. % protein = % N x faktor konversi

Keterangan

% N = Nitrogen

N HCL = Normalitas HCL

Faktor konversi = 6,25

4. Kadar Lemak metode *Gravimetri*

Prosedur kerja dalam penentuan kadar lemak sebagai berikut :

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik, corong, waterbath, oven, labu alas bulat, Erlenmeyer, beaker, desikator dan aluminium foil.

b. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah n-heksan.

c. Prosedur Kerja

- 1) Timbang sampel 2 gr bungkus dengan aluminium foil
- 2) Keringkan di oven 105⁰ C
- 3) Dinginkan
- 4) Tambahkan petroleum eter 20 ml
- 5) Diamkan selama 30 menit

- 6) Ulangi langkah 4 dan 5 sebanyak 3 kali
- 7) Ekstraksi dengan n-heksan menggunakan krotafavor
- 8) Tampung ekstrak pada labu alas bulat
- 9) dinginkan di desikator
- 10) Timbang wadah lemak dan wadah tanpa lemak

d. Perhitungan:

$$\% \text{ Lemak} = \frac{B-A}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

Keterangan :

A = Labu Lemak Kosong

B = Labu Lemak + Lemak Setelah Ekstraksi

5. Analisis kadar vitamin A dan Beta Karoten metode *Spektrofotometri UV-Vis*.

a. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spektrovotometri UV-Vis, gelas ukur, bulb, neraca analitik, corong pisah,botol you C, dan kertas saring.

b. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah acetone dan n-heksan

c. Prosedur Kerja

- 1) Gerus sampel, timbang 5 gr.
- 2) Ekstraksi dengan n-heksan 100 ml
- 3) Pekatkan ekstrak dengan 10 ml di waterbath
- 4) Ekstraksi lagi dengan n-heksan hingga 100 ml
- 5) Uji di spektrofotometri Uv-Vis

6. Uji Organoleptik

Uji organoleptik atau uji sensori adalah penilaian yang menggunakan indera. Jenis uji organoleptik yang digunakan adalah uji kesukaan atau hedonik menyatakan suka dan tidaknya terhadap suatu produk. Kesan mutu hedonik lebih spesifik daripada sekedar suka atau tidak suka. Mutu hedonik dapat bersifat umum yaitu baik dan buruk dan bersifat spesifik seperti empuk atau keras untuk nasi, renyah atau liat untuk mentimun (Rahayu, 1998)

Terdapat 11 tingkatan nilai untuk mengukur tingkat kesukaan konsumen dengan skor yang paling rendah adalah 1 dan skor yang paling tinggi adalah 11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tingkat Penerimaan Konsumen

Hedonik	
Aroma	
1	Sangat-Sangat Tidak Suka Sekali
2	Sangat-Sangat Tidak Suka
3	Sangat Tidak Suka
4	Tidak Suka
5	Agak Tidak Suka
6	Biasa
7	Agak Suka
8	Suka
9	Sangat Suka
10	Sangat Sangat Suka
11	Sangat-Sangat Suka Sekali

Untuk penilaian kesukaan atau analisis sifat sensoris suatu komoditi diperlukan alat instrumen, alat yang digunakan terdiri dari orang atau kelompok orang yang disebut panel, orang yang bertugas sebagai panel disebut panelis.

a. Panelis

Kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak membedakan jenis kelamin
- 2) Sehat (tidak sakit)
- 3) Tidak buta warna
- 4) Tidak dalam keadaan lapar (pukul 09.00-11.00 WITA)

b. Pelaksanaan penilaian

- 1) Waktu dan tempat

Dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar.

- 2) Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah donat wortel dengan empat formulasi. Sedangkan alat yang digunakan adalah formulir penilaian dan alat tulis.

c. Langkah-langkah pada uji daya terima

- 1) Mempersilahkan Panelis untuk duduk di ruangan yang telah disediakan.
- 2) Membagikan sampel dengan kode sesuai variasi, formulir penilaian dan alat tulis.
- 3) Memberikan penjelasan singkat kepada panelis tentang cara memulai dan cara pengisian formulir.
- 4) Memberikan kesempatan kepada panelis untuk memulai dan menuliskan penilaian pada lembar fomulir penilaian.
- 5) Mengumpulkan formulir yang telah diisi oleh panelis.

d. Analisis Data

Untuk mengetahui daya terima dari panelis dilakukan analisis diskriptif kualitatif persentase yaitu kualitatif yang diperoleh dari panelis harus dianalisis dahulu untuk dijadikan data kuantitatif yang diolah menggunakan SPSS. Skor nilai untuk

mendapatkan persentase dilakukan berdasarkan kriteria penilaiin tiap uji hedonik. Skor nilai untuk mendapatkan persentase dirumuskan sebagai berikut (Ali, 1993: 86) :

$$\% = n/N \times 100\%$$

Keterangan:

% = Skor persentase

n = Jumlah skor yang diperoleh

N = Skor ideal (skor tertinggi x jumlah panelis)

Untuk mengubah data skor persentase menjadi nilai kesukaan konsumen, analisisnya sama dengan analisis dengan analisis kualitatif dengan nilai yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Nilai tertinggi = 11 (sangat suka)

Nilai terendah = 1 (tidak suka)

Jumlah kriteria yang ditentukan = 11 kriteria

Jumlah panelis = 36 orang

a. Skor maximum = Jumlah panelis x nilai tertinggi

$$= 36 \times 11 = 396$$

b. Skor minimum = Jumlah panelis x nilai terendah

$$= 36 \times 1 = 36$$

c. Persentase maximum = (Skor Max)/(Skor Max) x 100%

$$(396)/(396) \times 100\% = 100\%$$

d. Persentase minimum = (Skor Min)/(Skor Max) x 100%

$$= (36)/(396) \times 100\% = 9\%$$

- e. Rentangan = Persentase max–Persentase min
 = 100% - 9% = 91%
- f. Interval presentase = Rentangan : Jumlah kriteria
 = 91 : 11 = 8,27% = 8%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka dapat dibuat interval persentase dan kriteria kesukaan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Interval Persentase dan Kriteria Kesukaan

Persentase	Kriteria Kesukaan
92-100	Sangat-sangat suka sekali
83-91	Sangat-sangat suka
74-82	Sangat suka
65-73	Suka
56-64	Agak suka
47-55	Biasa
38-46	Agak tidak suka
29-37	Tidak suka
20-28	Sangat tidak suka
11-19	Sangat-sangat tidak suka
2-10	Sangat-sangat tidak suka sekali

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen

1. Validasi

Validitas mengarah kepada ketepatan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu instrument evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara tepat (Wahyuni, 2012 :24)

Dalam penelitian ini, alat-alat yang digunakan dalam serangkaian uji coba analisis kandungan zat gizi merupakan peralatan yang sudah sesuai standar dan metode yang digunakan adalah metode yang telah baku sesuai Standar Nasional Indonesia

(SNI). Sedangkan pengukur dalam penelitian ini merupakan orang yang telah ahli dalam melakukan analisis kandungan zat gizi.

2. Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hal ini berarti menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten atau tetap asas (*ajeg*) bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Notoatmodjo, 2010 :69)

Dalam penelitian ini, reliabilitas yang dimaksud adalah peralatan yang digunakan dan prosedur kerja. Dalam laboratorium, untuk melakukan suatu uji, terdapat standar prosedur kerja untuk berbagai jenis pengujian. Untuk menguji reliabilitasnya maka dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali untuk menunjukkan bahwa instrument yang digunakan secara berulang menghasilkan hasil yang sama.

G. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yaitu

1. Dalam proses pembuatan donat wortel menggunakan alat penggorengan yang manual yang tidak memiliki suhu. Sehingga peneliti harus melakukan matching waktu dan matching suhu dengan manual pada proses pengolahannya.
2. Kurangnya pengetahuan peneliti tentang kimia secara dalam sehingga menyebabkan kesalahan pada saat meneliti yang menyebabkan hasil penelitian sedikit berbeda pada β karoten.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari penelusuran menggunakan dokumentasi dan berdasarkan hasil pengujian laboratorium akan diolah dan disajikan secara sistematis, sejalan dengan rumusan masalah yang selanjutnya akan dilakukan analisis kemudian dibandingkan dengan teori yang terkait. Dalam memudahkan dan mempercepat proses pengolahan data, penulis menggunakan komputerisasi dengan menggunakan program Microsoft Excel, selanjutnya data yang telah di analisis disajikan dalam bentuk tabel dan narasi .

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan mengecek secara berulang-ulang, mencocokkan dan membandingkan data dari berbagai sumber termasuk dari hasil uji laboratorium dan dokumentasi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian analisis kandungan zat gizi donat wortel dilaksanakan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Instalasi Kimia Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode yang sesuai dengan SNI 01-2891-1992 dan ditunjang dengan alat-alat di laboratorium yang memadai sedangkan untuk uji organoleptik dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Universitas Negeri Makassar dengan bantuan 36 panelis ahli dengan beberapa parameter dan kriteria penilaian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai oktober tahun 2016, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat gizi pada donat wortel dan daya terima donat wortel tersebut.

Adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Karbohidrat Dalam 100 Gram
Donat wortel Tahun 2016

Sampel	Karbohidrat (%)			
	1:0	1:1	3:1	1:3
Percobaan 1	57,12	50,57	53,69	34,72
Percobaan 2	56,82	51,27	54,56	36,52
Percobaan 3	56,13	53,69	56,07	36,53
Rata-rata	56,96	50,74	54,77	35,93

Sumber : Data Primer, 2016

Data tabel 4.1 menunjukkan bahwa kadar karbohidrat tertinggi terdapat pada formulasi 1:0 yaitu sebanyak 56,96% dan pada formulasi 3:1 sebanyak 54,77%, selanjutnya pada formulasi 1:1 sebanyak 50,74%, dan formulasi 1:3 sebanyak 35,93%.

Tabel 4.2
Hasil Pemeriksaan Kadar Zat Gizi Protein Dalam 100 Gram
Donat Wortel Tahun 2016

Sampel	Protein (%)			
	1:0	1:1	3:1	1:3
Percobaan 1	7,71	6,28	6,91	5,00
Percobaan 2	7,01	5,86	6,41	5,19
Percobaan 3	7,20	5,99	6,84	5,41
Rata-rata	7,11	6,02	6,72	5,20

Sumber : Data Primer, 2016

Data tabel 4.2 menunjukkan bahwa kadar protein tertinggi terdapat pada formulasi 1:0 yaitu sebanyak 7,11%, pada formulasi 3:1 sebanyak 6,72% selanjutnya pada formulasi 1:1 sebanyak 6,02%, dan formulasi 1:3 sebanyak 5,20%.

Tabel 4.3
Kadar Zat Gizi Lemak Dalam 100 Gram
Donat Wortel tahun 2016

Sampel	Lemak (%)			
	1:0	1:1	3:1	1:3
Percobaan 1	9,28	10,70	11,52	7,96
Percobaan 2	10,37	9,74	10,65	8,24
Percobaan 3	8,82	10,34	11,50	8,16
Rata-rata	9,79	10,26	11,22	8,12

Sumber : Data Primer, 2016

Data tabel 4.3 menunjukkan bahwa kadar lemak tertinggi terdapat pada formulasi 3:1 yaitu sebanyak 11,2%, kemudian selanjutnya pada formulasi 1:1 sebanyak 10,26% selanjutnya pada formulasi 1:0 9,79%, dan formulasi 1:3 sebanyak 8,12%.

Tabel 4.4
Hasil Pemeriksaan Kadar Vitamin A Dalam 100 Gram
Donat Wortel Tahun 2016

Sampel	Vitamin A (IU)			
	1:0	1:1	3:1	1:3
Percobaan 1	522,91	2948,06	1681,69	5307,89
Percobaan 2	605,56	3498,79	1694,56	5300,19
Percobaan 3	589,27	3184,35	1699,38	5336,50
Rata-rata	527,58	3210,40	1691,88	5314,86

Sumber : Data Primer, 2016

Data tabel 4.4 menunjukkan bahwa kadar vitamin A tertinggi terdapat pada formulasi 1:3 yaitu sebanyak 5314,86 IU kemudian selanjutnya pada formulasi 1:1 sebanyak 3210,40 IU selanjutnya pada formulasi 3:1 sebanyak 1691,88 IU dan formulasi 1:0 sebanyak 527,58 IU.

Tabel 4.5
Hasil Pemeriksaan Kadar β Karoten dalam 100 Gram
Donat Wortel Tahun 2016

Sampel	β Karoten (μg)			
	1:0	1:1	3:1	1:3
Percobaan 1	941,23	5306,51	3027,05	9554,20
Percobaan 2	1090,02	6297,83	3050,20	9549,34
Percobaan 3	1060,68	5731,84	3058,88	9605,70
Rata-rata	1030,64	5778,72	3045,38	9566,75

Sumber : Data Primer, 2016

Data tabel 4.5 menunjukkan bahwa kadar β Karoten tertinggi terdapat pada formulasi 1:3 yaitu sebanyak 9566,75 μg , kemudian selanjutnya pada formulasi 1:1 sebanyak 5778,72 μg , selanjutnya pada formulasi 3:1 sebanyak 3045,38 μg dan formulasi 1:0 sebanyak 1030,64 μg .

Tabel 4.6
Keterangan Penilaian Mutu Hedonik Terhadap
Warna, Aroma, Tekstur Dan Rasa

Mutu Hedonik							
Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
1	Coklat Sangat Gelap	1	Sangat Tidak Harum	1	Sangat Keras	1	Sangat Tidak Enak
2	Coklat Gelap	2	Tidak Harum	2	Keras	2	Tidak Enak
3	Coklat Agak Gelap	3	Agak Tidak Harum	3	Agak Keras	3	Agak Tidak Enak
4	Coklat Agak Terang	4	Biasa	4	Biasa	4	Biasa
5	Coklat Agak Terang	5	Agak Harum	5	Agak Tidak Keras	5	Agak Enak
6	Coklat Terang	6	Harum	6	Tidak Keras	6	Enak
7	Coklat Sangat Terang	7	Sangat Harum	7	Sangat Tidak Keras	7	Sangat Enak

Pada tabel 4.6, untuk skala penilai mutu hedonik terhadap warna, aroma, tekstur dan rasa memiliki range skor 1-7. untuk skor 1 adalah nilai terendah dan skor 7 adalah nilai tertinggi. Nilai tengah atau median skor 4, digunakan untuk mengelompokkan nilai mutu hedonik, dimana skor <4 dikatakan buruk, dan >4 dikatakan baik.

Tabel 4.7
Uji Mutu Hedonik dalam Donat Wortel (*Daucus carota L*)

formulasi	Mutu Hedonik							
	Warna		Aroma		Tekstur		Rasa	
	K	S	K	S	K	S	K	S
1:0	coklat agak gelap	3,8	Biasa	4,5	Agak keras	3,1	Biasa	4,6
1:1	Coklat Netral	4,1	Biasa	4,5	Biasa	4,1	Biasa	4,8
3:1	Coklat Netral	4,5	Biasa	4,9	Biasa	4,4	Agak enak	5,0
1:3	Coklat Gelap	3,6	Biasa	4,9	Biasa	4,0	Biasa	4,9

Sumber: Data Primer, 2016

Keterangan : K : Kriteria

S : Skor

< 4 : kurang baik

> 4 : baik

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa mutu hedonik yang baik dengan skor >4 dalam donat wortel (*Daucus carota L*) terdapat pada formulasi 3:1 yaitu 4,5 dengan kriteria warna coklat netral, pada aroma terdapat pada formulasi 1:3 dan 3:1 yaitu 4,9 dengan kriteria biasa, pada tekstur terdapat pada formulasi 3:1 yaitu 4,4 dengan kriteria biasa, dan pada rasa yaitu 3:1 yaitu 5,0 dengan kriteria agak enak.

Tabel 4.8
Uji Over All Mutu Hedonik dalam Donat Wortel (*Daucus carota L*)

Formulasi	Ovel all mutu hedonik	
	Skor	Kriteria
1:0	4,7	Biasa
1:1	4,8	Biasa
3:1	4,9	Biasa
1:3	4,7	Biasa

Sumber: Data Primer, 2016

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa uji over all mutu hedonik dalam donat wortel (*Daucus carota L*) dari 4 formulasi semua memiliki skor >4 dengan kriteria biasa, dimana pada uji over all mutu hedonik paling tinggi pada formulasi 3:1 dengan skor 4,9.



Tabel 4.9
Uji Hedonik dalam Donat Wortel (*Daucus carota L*)

Hedonik	Formulasi											
	1:0			1:1			3:1			1:3		
	P	S	%	P	S	%	P	S	%	P	S	%
Sangat-sangat tidak suka sekali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat-sangat tidak suka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat tidak suka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak suka	2	8	2	4	16	4	0	0	0	2	8	2
Agak tidak suka	2	10	2	2	10	2	3	15	3	4	20	5
Biasa	15	90	22	8	48	12	10	60	15	4	24	6
Agak suka	6	42	10	9	63	15	7	49	12	14	98	24
Suka	7	56	14	10	80	20	11	88	22	7	56	14
Sangat suka	3	27	6	3	27	6	4	36	9	4	36	9
Sangat-sangat suka	1	10	2	0	0	0	0	0	0	1	10	2
Sangat sangat suka sekali	0	0	0	0	0	0	1	11	2	0	0	0
Total	36	243	58	36	217	42	36	259	63	36	252	62

Sumber: Data Primer, 2016

Keterangan : P: Panelis

S : Skor

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, dapat diketahui bahwa total skor tertinggi dalam donat wortel (*Daucus carota L*) terdapat pada formulasi 3:1 dengan total skor 259 (63%) dengan kriteria agak suka, dan terendah pada formulasi 1:1 dengan total skor 217 (42%) dengan kriteria agak tidak suka.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Donat Wortel

a. Kadar Karbohidrat

Sumber utama karbohidrat didalam makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan sumber energi utama terdapat dalam bentuk zat tepung (amylum) dan zat gula (mono dan disakarida).

Berdasarkan hasil analisis karbohidrat dari beberapa sampel donat., diketahui yang memiliki kandungan karbohidrat paling tinggi adalah pada donat dengan formulasi 1:0 dimana memiliki kandungan karbohidrat sebanyak 56,96%, kemudian pada sampel donat wortel terdapat pada formulasi 3:1 yaitu dengan komposisi 75 gr terigu dan 25 gr wortel mengandung kadar gizi karbohidrat sebanyak 56,69% per 100 gram donat. Sedangkan yang memiliki kandungan karbohidrat terendah adalah formulasi 1:3 yaitu dengan komposisi 25 gram terigu tdan 75 gram wortel mengandung kadar gizi sebanyak 35,93% per 100 gram donat.

Tingginya kandungan karbohidrat pada formulasi 1:0 dikarenakan pada formulasi ini komposisi yang digunakan adalah 100 gram terigu, dimana pada terigu itu sendiri mengandung karbohidrat sebanyak 75 g, sedangkan kandungan karbohidrat dalam donat wortel (*Daucus carota L.*) formulasi 3:1 dikarenakan kedua bahan utama dari produk ini sama-sama mengandung karbohidrat yang tinggi. Dimana wortel mengandung karbohidrat sebesar 9,30 gr dalam 100 gr wortel. Sedangkan tepung mengandung karbohidrat sebesar 75g dalam 100g.

Pada formulasi 1:3 yang mengandung karbohidrat terendah yaitu sebanyak 35,93% dikarenakan bahan dasar pada formulasi ini didominasi oleh wortel yaitu

sebnyak 75gram wortel dan 25gram tepung terigu dimana wortel itu sendiri hanya mengandung 9,30gr dalam 100g wortel.

Pada semua formulasi dapat dilihat bahwa terjadi penurunan kadar karbohidrat, dimana pada formulasi 1:0 hanya mengandung karbohidrat sebanyak 56,96 % sedangkan diketahui bahwa kandungan karohidrat pada tepung terigu itu sendiri memili kandungan karbohidrat sebanyak 75g dalam 100 gram, yang kemudian ditambahkan bahan lainnya yang juga mengandung karbohidrat seperti halnya permifan, hal ini disebabkan oleh Penggunaan suhu yang tinggi dapat merusak molekul-molekul karbohidrat sehingga nilai gizinya menurun, selain itu pengolahan yang melibatkan pemanasan yang tinggi pada karbohidrat terutama gula akan mengalami karamelisasi (pencoklatan non enzimatis) yang juga bisa menyebabkan kerusakan yang ekstensif.

Hal ini sesuai dengan pendapat Martunis (2012) dalam Akmal, (2014). bahwa semakin tinggi suhu, kadar karbohidrat (pati) akan semakin menurun. Hal ini diduga karena perlakuan suhu yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya sebagian molekul karbohidrat pada saat proses pengolahan.

Berdasarkan AKG 2013, besar kadar karbohidrat yang sebaiknya dikonsumsi dalam sehari untuk balita umur 1-3 tahun yaitu 155 gr, untuk anak sekolah umur 7-9 tahun 254gr, untuk perempuan usia 19-29 adalah sebanyak 309 gr dan untuk ibu hamil sebesar 349 gr . Hal ini menunjukkan bahwa kadar karbohidrat dalam donat wortel 3:1 sudah dapat memenuhi sekitar 35% untuk balita usia 1-3 tahun , untuk anak sekolah umur 7-9 tahun dipenuhi sekitar 21,6%, untuk perempuan usia 19-29 tahun dipenuhi sebesar 17,7% dan untuk ibu hamil terpenuhi sebesar 15,6% dari angka kecukupan

karbohidrat. Untuk memelihara kesehatan, WHO menganjurkan agar 50-65% konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% berasal dari gula sederhana.

b. Kadar Protein

Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang relatif sama dengan karbohidrat dan lemak, yaitu sama-sama terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi bagi protein unsur-unsur ini ditambah lagi dengan unsur nitrogen, dan ditemukan pula mineral. Molekul protein tersusun dari asam amino 12 sampai 18 macam asam amino yang saling berhubungan. Protein dibutuhkan tubuh untuk melakukan fungsinya sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh dan sebagai pemberi.

Berdasarkan hasil analisis protein dari sampel donat, diketahui bahwa yang memiliki kandungan protein tertinggi adalah formulasi 1:0 dengan komposisi 100 gram tepung terigu tanpa ada tambahan wortel, mengandung kadar gizi protein sebanyak 7,11% dan pada sampel donat itu sendiri terdapat pada formulasi 3:1 yaitu sebanyak 6,72% sedangkan kandungan protein terendah terdapat pada formulasi 1:3 yaitu sebanyak 5,20%.

Zat gizi protein dalam 100 gram tepung terigu yaitu 10 gr, lebih tinggi dibandingkan dengan protein yang terdapat pada wortel yaitu hanya sebesar 0,93 gr. Perbedaan kandungan protein didasari pada teknik pengolahan setelah menjadi produk donat. Sebagian besar kandungan protein akan terdenaturasi pada suhu 55⁰-75⁰C. Sebagaimana diketahui dalam pembuatan donat dilakukan proses penggorengan pada saat pengolahan dengan suhu yang cukup tinggi yaitu 120⁰C.

Teknik pengolahan dengan cara merebus atau menggoreng berdasarkan penelitian Sundari, dkk (2015) penggunaan suhu yang relatif tinggi pada proses penggorengan yang mengakibatkan kerusakan protein yang lebih besar dibandingkan pada bahan pangan yang dikukus. Pengolahan bahan pangan sangat mempengaruhi kerusakan yang terjadi pada protein. Semakin tinggi suhu dan semakin lama waktu pengolahan semakin tinggi kerusakan protein yang terjadi pada bahan pangan tersebut. Penggunaan suhu 180⁰C-300⁰C pada penggorengan akan menyebabkan kerusakan yang cukup besar atau bisa menurunkan nilai gizi protein.

Berdasarkan AKG 2013, besar kadar protein yang sebaiknya dikonsumsi dalam sehari untuk balita umur 1-3 tahun yaitu 26 gr, untuk anak sekolah usia 7-9 tahun sebanyak 49gr, untuk perempuan usia 19-29 adalah sebanyak 56 gr dan untuk ibu hamil sebesar 79 gr . Hal ini menunjukkan bahwa kadar protein dalam donat wortel 3:1 sudah dapat memenuhi sekitar 25,8% untuk balita 1-3 tahun , untuk anak sekolah usia 7-9 tahun sebanyak 13,7%, untuk perempuan usia 19-29 tahun dipenuhi sebesar 12% dan untuk ibu hamil terpenuhi sebesar 8,5 % dari angka kecukupan protein.

Dengan adanya kandungan protein pada donat wortel, maka donat tersebut dapat digunakan sebagai alternatif dan makanan tambahan meskipun memiliki kandungan protein yang tergolong rendah, namun dapat kita penuhi dengan konsumsi makanan lainnya karena fungsi utama protein sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Kartasapoetra dan Marsetyo (2008) mengemukakan bahwa protein berfungsi sebagai zat pembangun bagi pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, sebagai pengatur kelangsungan proses di dalam tubuh, sebagai pemberi tenaga dalam keadaan energi kurang tercukupi oleh karbohidrat dan lemak.

c. Kadar Lemak

Lemak dalam makanan mempunyai peranan yang penting sebagai sumber tenaga. Bahkan dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, lemak dapat menghasilkan tenaga yang lebih besar, yaitu dari 1 gr lemak diperoleh 9 kkal.

Berdasarkan hasil analisis lemak dari beberapa sampel donat wortel (*Daucus carota L*), diketahui yang memiliki kadar lemak tertinggi yaitu pada formulasi 3:1 dengan komposisi 75 gram tepung terigu dan 25 gram wortel dengan jumlah kadar total 11,22% sedangkan kandungan lemak terendah pada formulasi 1:3 yaitu 8,12 % dengan komposisi tepung terigu 25 gram dan wortel sebanyak 75 gram.

Bahan baku dalam donat ini yaitu tepung dan wortel mengandung kadar lemak yang rendah yaitu tepung terigu yang digunakan hanya mengandung lemak 1 gram dan kandungan lemak pada wortel sebesar 0,24 gram akan tetapi yang menyebabkan meningkatnya kadar lemak pada donat wortel (*Daucus carota L*) dipengaruhi oleh proses penggorengan dan komposisi bahan lain diluar bahan baku, seperti margarin dan minyak goreng yang memiliki kadar lemak tinggi.

Berdasarkan (AKG, 2013), besar kadar lemak yang sebaiknya dikonsumsi dalam sehari untuk balita umur 1-3 tahun yaitu 44 gr, untuk anak sekolah usia 7-9 tahun sebanyak 72gr, untuk perempuan usia 19-29 adalah sebanyak 75 gr dan untuk ibu hamil sebesar 85 gr . Hal ini menunjukkan bahwa kadar lemak dalam donat wortel dimana kandungan lemak tertinggi terdapat pada formulasi 3:1 sudah dapat memenuhi sekitar 25% untuk 1-3 tahun , untuk anak sekolah usia 7-9 tahun sekitar 15,6%, untuk perempuan usia 19-29 tahun dipenuhi sebesar 14,9% dan untuk ibu hamil terpenuhi sebesar 13,2 % dari angka kecukupan lemak

Konsumsi lemak sebanyak 15-30 % kebutuhan energi total dianggap baik untuk kesehatan. Jumlah ini memenuhi kebutuhan akan asam lemak esensial dan untuk membantu penyerapan vitamin larut lemak. Di antara lemak yang dikonsumsi sehari-hari dianjurkan paling banyak 10% dari kebutuhan energi total berasal dari lemak jenuh, dan 3-7% dari lemak tidak jenuh ganda.

d. Kadar Vitamin A

Di dalam tubuh Vitamin A disimpan dalam hati berkisar antara 100 – 1000 IU per gram dalam jaringan. Orang yang sehat bahkan dapat menyimpan Vitamin A sebesar 500.000 IU dalam hatinya (Muchtadi, 2008)

Berdasarkan hasil analisis kadar vitamin A dari beberapa sampel donat wortel (*Daucus carota L*), diketahui kadar vitamin A pada beberapa sampel donat, formulasi 1:0 mengandung vitamin A sebesar 572,58 IU, dengan bahan yang digunakan pada formulasi ini adalah 100 gram tepung terigu tanpa tambahan wortel. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 1:1 mengandung kadar vitamin A sebesar 3210,40 IU, dengan komposisi 50 gram tepung terigu dan 50 gram wortel. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 3:1 mengandung kadar vitamin A sebesar 1691,88 IU dengan komposisi tepung terigu 75 gram dan wortel 25 gram. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 1:3 mengandung kadar vitamin A sebesar 5314,86 IU dengan komposisi tepung terigu 25 gram dan wortel 75 gram.

Tingginya kandungan vitamin A donat wortel (*Daucus carota L.*) pada formulasi 1:3 dikarenakan komposisi wortel yang mendominasi. Dimana wortel mengandung vitamin A sebesar 16.706,00 IU dalam 100 gr wortel. Terjadinya penurunan kandungan vitamin A dari bahan dasar sebelum pengolahan dengan hasil setelah pengolahan disebabkan karena proses penggorengan saat perlakuan dimana

vitamin A itu sendiri rusak pada suhu 60°C sedangkan suhu yang digunakan pada penelitian ini adalah 110°C, oleh karena itu kandungan vitamin pada donat wortel setelah pengolahan memiliki banyak penurunan.

Berdasarkan AKG 2013, kebutuhan vitamin A yang direkomendasikan adalah untuk anak-anak 7-9 tahun sebanyak 500 RE (1665 IU), untuk wanita dewasa 500 RE (1665 IU), dan ibu hamil sebanyak 850 RE (2830,5 IU), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada produk donat wortel semua memenuhi kebutuhan vitamin A yang telah disarankan namun yang paling mendekati disini adalah formulasi 3:1 dimana formulasi ini dapat memenuhi kebutuhan vitamin A pada anak sekolah usia sebanyak 98,4%, untuk wanita dewasa sebanyak 98,4% dan untuk ibu hamil sebesar 60%.

Pemenuhan zat gizi vitamin A dapat diperoleh dari beragam makanan yang dimakan. Diantaranya dalam produk donat wortel (*Daucus carota L*). Dalam produk donat wortel ini yang memiliki kadar Vitamin A per 100 gram donat paling tinggi adalah formulasi 1:3 dengan kadar total vitamin A sebesar 5314,86 IU, namun yang sesuai dengan kebutuhan vitamin A perharinya adalah pada formulasi 3:1 dengan kandungan vitamin A sebesar 1691,88 IU.

e. Kadar β Karoten

Berdasarkan hasil analisis kadar beta karoten pada donat wortel (*Daucus carota L*), formulasi 1:0 mengandung beta karoten sebesar 1030.64 μg , dengan bahan yang digunakan pada formulasi ini adalah 100 gram tepung terigu tanpa tambahan wortel. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 1:1 mengandung kadar beta karoten sebesar 5778,72 μg , dengan komposisi 50 gram tepung terigu dan 50 gram wortel. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 3:1 mengandung kadar beta karoten sebesar

3045,36 µg dengan komposisi tepung terigu 75 gram dan wortel 25 gram. Donat wortel (*Daucus carota L*) formulasi 1:3 mengandung kadar beta karoten sebesar 9566,75 µg dengan komposisi tepung terigu 25 gram dan wortel 75 gram.

Pada data tersebut dapat kita lihat bahwa pada beberapa sampel donat kandungan beta karoten tertinggi terdapat pada formulasi 1:3 yaitu sebanyak 9566,75 µg dan yang terendah yaitu pada formulasi 1:0 yaitu sebanyak 1030.64 µg. Tingginya kandungan beta karoten dalam donat wortel (*Daucus carota L.*) pada formulasi 1:3 dikarenakan komposisi wortel yang mendominasi. Dimana wortel mengandung beta karoten sebesar 8285 µg dalam 100 gr wortel dan kemudian ditambah lagi kandungan beta karoten dari bahan-bahan lainnya seperti minyak goreng dan margarin yang juga mengandung beta karoten.

Adapun tentang adanya perbedaan hasil yang terlalu jauh antara percobaan pertama, kedua, ketiga pada formulasi 1:1 adalah karena disebabkan oleh faktor pada saat menghomogenkan sampel yang tidak bisa dikontrol oleh peneliti, karena pada dasarnya menghomogenkan sampel makanan tidak mudah dikontrol sebagaimana mengontrol sampel air dan juga disebabkan oleh pergantian larutan yang sebelumnya tidak diketahui dasarnya. Pergantian larutan aseton menjadi n-heksan merupakan penyebab dari berbedanya hasil penelitian yang dilakukan, dimana kedua larutan ini memiliki perbedaan dari segi kepolarannya dimana aseton sebagai larutan polar dan N-heksan termasuk larutan nonpolar yang tentunya akan mempengaruhi hasil dari penelitian.

Hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Dyah Tri Wahyuni (2015) yang mengatakan bahwa semakin non polar pelarut dan semakin lama ekstraksi maka karoten dan aktivitas antioksidan semakin meningkat, dari hasil penelitian yang

dilakukannya membuktikan bahwa kepolaran n-heksan lebih mendekati kepolaran karoten. N- heksan dan karoten keduanya memiliki sifat kimia nonpolar oleh karena itu n-heksan lebih baik digunakan untuk karoten disbanding dengan aseton dan petroleum eter (Wahyuni, 2015).

Kemampuan suatu pelarut melarutkan senyawa tergantung pada sifat kepolaran pelarut, pelarut non polar akan melarutkan senyawa non polar dan sebaliknya. Berinteraksinya senyawa karoten dengan pelarut disebabkan karena terdispersinya molekul-molekul senyawa karotenoid didalam molekul-molekul pelarut. Senyawa karoten cenderung larut sempurna apabila pelarut yang digunakan bersifat non polar karena senyawa karotenoid bersifat non polar (Purnamasari, 2013)

Berdasarkan keputusan BPOM, asupan maksimal beta karoten orang Indonesia adalah sebesar 20.000 IU atau sebanyak 6000 mcg, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada produk donat wortel semua memenuhi kebutuhan vitamin A yang telah disarankan namun yang paling mendekati disini adalah formulasi 1:1 dimana formulasi ini dapat memenuhi kebutuhan beta karoten sebesar 96,3% dari kebutuhan beta karoten perharinya. Pada formulasi 1:3 melebihi batas konsumsi yang wajar dimana kandungan beta karotennya sebanyak 9566,75 µg. Ketika mengkonsumsi beta karoten terlalu berlebihan maka hal itu tidak baik bagi kesehatan.

Dalam Al-Qur'an Allah SWT memerintahkan manusia memakan makanan yang halal lagi baik, sebagaimana firmanNya Q.S Al-Maidah / 5 : 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Departemen Agama RI, 2007: 122).

Dalam ayat ini Allah menegaskan perintah memakan yang halal, dan dengan demikian melalui ayat ini dan ayat sebelumnya yang menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pula praktik-praktik keberagaman yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal yakni bukan yang haram lagi baik, lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Yang dimaksud dengan makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan apa pun (Shihab, 2009)

Ayat diatas memerintahkan kita sebagai manusia memakan makan yang halal lagi baik, dimana halal disini maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan agama kita dan baik adalah makan yang baik menurut kesehatan.

2. Uji Organoleptik Donat

a. Uji Mutu Hedonik Kriteria Warna dalam Donat

Daya terima atau preferensi makanan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesukaan atau ketidaksukaan individu terhadap suatu jenis makanan. Diduga tingkat kesukaan ini sangat beragam pada setiap individu, sehingga akan berpengaruh terhadap konsumsi pangan.

Suatu bahan yang dinilai bergizi, enak, dan teksturnya sangat baik tidak akan dimakan apabila memiliki warna yang tidak sedap dipandang atau memberi kesan telah menyimpang dari warna yang seharusnya. Warna makanan yang menarik dan tampak alamiah dapat meningkatkan cita rasa (Akmal, 2014)

Berdasarkan penilaian panelis terhadap warna donat wortel (*Daucus carota L*) adalah warna coklat gelap untuk formula 1:0 dengan total skor 3,8, untuk formula 1:1 berwarna coklat netral dengan total skor 4,1, untuk formula 1:3 berwarna coklat gelap dengan total skor 3,6 serta formula 3:1 berwarna coklat netral dengan total skor 4,5.

Penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria warna skornya 4,0. Mengacu pada hal itu warna yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap donat adalah formula 1:1 dan 3:1. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya warna orange pada wortel.

Warna merupakan elemen yang sangat penting dalam seni lukis, karena warna sebagai efek cahaya yang memberi kesan pada mata, sehingga dapat menghadirkan karakter dari suatu bentuk yang secara psikologis mempengaruhi perasaan. Hal ini tidak jauh berbeda dalam proses membuat makanan, warna mampu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi konsumen (Gulendra, 2010).

Rupa lebih banyak melibatkan indera penglihatan dan merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah bahan pangan diterima atau tidak oleh konsumen, karena makanan yang berkualitas (rasanya enak, bergizi dan teksturnya baik) belum disukai konsumen bila rupa bahan pangan tersebut memiliki rupa yang kurang menarik dilihat oleh konsumen untuk menilai (Minarno, 2008)

b. Uji Mutu Hedonik Kriteria Aroma dalam Donat

Aroma/bau merupakan salah satu parameter yang menentukan rasa enak suatu makanan. Dalam banyak hal, aroma/bau memiliki daya tarik tersendiri untuk menentukan rasa enak dari produk makanan itu sendiri. Dalam industri pangan, uji terhadap aroma dianggap penting karena cepat dapat memberikan penilaian terhadap

hasil produksinya, apakah produksinya disukai atau tidak disukai oleh konsumen (Soekarto, 1990 dalam Hidayat, 2014).

Aroma yang disebarkan oleh makanan merupakan daya tarik yang sangat kuat dan mampu merangsang indera penciuman sehingga membangkitkan selera. Timbulnya aroma makanan disebabkan oleh terbentuknya senyawa yang mudah menguap sebagai akibat atau reaksi karena pekerjaan enzim atau dapat juga terbentuk tanpa bantuan reaksi enzim (Zuhrina, 2011).

Berdasarkan penilaian panelis terhadap aroma donat wortel untuk semua formula memiliki aroma biasa dengan total skor 1:0 dan 1:1 masing-masing 4,5 serta 1:3 dan 3:1 masing-masing 4,9. Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria aroma skornya 4,0. Mengacu pada hal itu aroma yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap donat adalah semua formula namun yang lebih tinggi skornya adalah formula 3:1 dan 1:3. Komposisi wortel dapat mempengaruhi aroma terhadap donat.

Aroma makanan dalam banyak hal menentukan enak atau tidaknya makanan bahkan aroma atau bau-bauan lebih kompleks dari pada rasa dan kepekaan indera pembauan biasanya lebih tinggi dari indera pencicipan bahkan industri pangan menganggap sangat penting terhadap uji bau karena dapat dengan cepat memberikan hasil penilaian apakah produk disukai atau tidak (Rahayu, 1998)

c. Uji Mutu Hedonik Kriteria Tekstur dalam Donat

Tekstur adalah nilai raba pada suatu permukaan, baik itu nyata maupun semu. Suatu permukaan mungkin kasar, halus, keras atau lunak, kasar atau licin. Konsistensi atau tekstur makanan juga merupakan komponen yang turut menentukan cita rasa makanan karena sensitifitas indera cita rasa dipengaruhi oleh konsistensi makanan.

Makanan yang berkonsistensi padat atau kental akan memberikan rangsangan lebih lambat terhadap indera manusia.

Berdasarkan penilaian panelis terhadap tekstur donat wortel untuk formula 1:0 bertekstur agak tidak keras dengan total skor 3,1, formula 1:1,1:3 dan 3:1 bertekstur biasa dengan masing-masing total skor 4,1, 4,0 dan 4,4. Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria tekstur skornya 4,0. Mengacu pada hal itu tekstur yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap DONAT adalah formula 1:1,1:3 dan 3:1. Meningkatnya komposisi wortel dalam produk olahan donat memberikan dampak peningkatan kadar air, sehingga tekstur menjadi halus dan lunak (tidak keras). Sejalan dengan pernyataan (*Chin dkk*, 2004 dalam Adiningsih 2012), kekerasan produk berkurang dengan meningkatnya kadar air pada bahan.

Banyak hal yang mempengaruhi tekstur pada bahan pangan antara lain: rasio kandungan protein, lemak, jenis protein, suhu pengolahan, kadar air dan aktivitas air. Tekstur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen terhadap suatu produk pangan. Tekstur merupakan sekelompok sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen struktural bahan pangan yang dapat dirasakan (Purnomo, 1995).

Umumnya konsumen menyukai makanan yang mempunyai tekstur yang tinggi. Alasannya karena konsumen menyukai bahan pangan yang agak basah serta mudah dikunyah. Jadi kebasahan, empuk, mudah dikunyah, merupakan faktor tekstur yang dikehendaki (Purnomo 1995).

d. Uji Mutu Hedonik Kriteria Rasa dalam Donat

Rasa merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keputusan konsumen dalam menerima atau menolak suatu produk makanan adalah parameter rasa. Rasa dimulai melalui tanggapan rangsangan kimiawi oleh indera pencicip (lidah),

sampai akhirnya terjadi keseluruhan interaksi antara sifat-sifat aroma, rasa, dan tekstur sebagai keseluruhan rasa makanan. Agar suatu senyawa dapat dikenali rasanya, senyawa tersebut harus larut dalam air liur sehingga dapat mengadakan hubungan mikrovillus dan impuls yang terbentuk dikirim melalui syaraf ke pusat syaraf.

Dengan rasa tersebut, konsumen dapat memutuskan menerima atau menolak produk tersebut. Ada 4 jenis rasa dasar yang dikenali yaitu: manis, asin, asam, dan pahit. Sedangkan rasa lainnya merupakan perpaduan dari rasa dasar (Soekarto, 1985).

Berdasarkan penilaian panelis terhadap rasa donat wortel untuk formula 1:0, 1:1 dan 1:3 memiliki rasa biasa dengan masing-masing total skor 4,6, 4,8 dan 4,9 sedangkan formula 3:1 memiliki rasa agak enak dengan total skor 5,0. Berdasarkan penilaian mutu hedonik, nilai median dari mutu hedonik kriteria rasa skornya 4,0. Mengacu pada hal itu rasa yang sesuai dengan kriteria panelis terhadap donat adalah formula 3:1.

Menurut Mega (2006) menyatakan bahwa rasa merupakan faktor yang sangat menentukan keputusan akhir konsumen untuk menerima atau menolak suatu produk. Meskipun warna dan aroma suatu produk baik tetapi rasanya tidak enak maka makanan tersebut akan ditolak.

Adapun uji *over all* mutu hedonik berfungsi untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai baik tidaknya produk donat tersebut. Berdasarkan uji mutu hedonik secara keseluruhan dapat dilihat penilaian panelis pada donat wortel (*Daucus carota L.*) Untuk semua formulasi untuk formula pada pengujian ini memiliki kriteria biasa dengan masing-masing total skor 1:0 dan 1:3 4,7, 1:1 memiliki total skor 4,8, dan 3:1 memiliki total skor 4,9. Dapat dilihat secara keseluruhan produk donat yang dianggap paling baik diantara keempat formula adalah formula 3:1.

e. Hasil Uji Hedonik dalam Donat

Uji hedonik digunakan untuk menilai tingkat kesukaan panelis terhadap produk donat wortel. Berdasarkan uji hedonik dapat dilihat penilaian panelis pada donat wortel untuk formula 1:0 memiliki skor sebanyak 243 9(58%) dengan kategori biasa, formulasi 1:1 dengan total skor 217 (42%) dengan kategori agak tidak suka, formulasi 3:1 dengan total skor 259 (63%) dengan kategori agak suka dan formulasi 1:3 dengan skor 252(62%) dengan kategori agak suka, pada data tersebut dapat diketahui uji hedonik dalam donat wortel terdapat pada formulasi 3:1 dengan total skor sama yaitu 259 (63%) dengan kriteria agak suka, dan terendah pada formulasi 1:1 dengan total skor 217 (42%) dengan kriteria agak tidak suka.

f. Uji Statistik


Perhitungan statistika dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pemberian substitusi terhadap mutu dari donat wortel, jenis uji yang digunakan komperatif berpasangan karena penelitian lebih dari dua kelompok, karena data tidak terdistribusi normal ($P < 0,05$) maka menggunakan uji *friedman*. Kriteria kemaknaan dari uji *friedman* ($P < 0,05$) bermakna, dan ($P > 0,05$) tidak bermakna.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian wortel pada donat bermakna ($P < 0.05$) terhadap warna, artinya pemberian wortel pada olahan donat wortel mempengaruhi kualitas warna dari donat itu sendiri.

Hasil penelitian menunjukkan pemberian wortel pada donat wortel bermakna ($P < 0.05$) terhadap aroma, artinya pemberian wortel pada olahan donat wortel mempengaruhi kualitas aroma dari donat itu sendiri. Hasil penelitian kriteria tekstur menunjukkan pemberian donat pada donat wortel tidak bermakna ($P > 0.05$) terhadap tekstur, artinya pemberian wortel pada olahan donat wortel tidak mempengaruhi

kualitas tekstur dari otak-otak itu sendiri. Hasil penelitian kriteria rasa menunjukkan pemberian wortel pada donat wortel tidak bermakna ($P < 0.05$) terhadap rasa, artinya pemberian wortel pada olahan donat wortel mempengaruhi kualitas rasa dari donat itu sendiri.

Hasil penelitian uji statistik *over all* mutu hedonik menunjukkan pemberian wortel pada donat wortel bermakna ($P < 0.05$) artinya pemberian wortel pada donat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dari donat. Selanjutnya hasil penelitian pada uji hedonik menunjukkan pemberian donat pada donat wortel berpengaruh nyata ($P < 0.05$) terhadap daya terima atau tingkat kesukaan panelis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan :

1. Kadar karbohidrat tertinggi sampel donat wortel (*Daucus carota L*) terdapat pada formulasi 1:0 yaitu sebanyak 56,96%,
2. Kadar protein tertinggi pada beberapa sampel donat wortel (*Daucus carota L*) terdapat pada formulasi 1:0 sebanyak 7,11 %,
3. Kadar lemak dalam 100 gram produk donat wortel (*Daucus carota L*) paling banyak pada formulasi 3:1 dengan kandungan lemak sebanyak 11,22%.
4. Kadar vitamin A dalam 100 gram produk donat wortel (*Daucus carota L*) paling banyak pada formulasi 1:3 dengan kandungan vitamin A sebanyak 5314,86 IU.
5. Kadar beta karoten dalam 100 gram produk donat wortel (*Daucus carota L*) paling banyak pada formulasi 1:3 dengan kandungan beta karoten sebanyak 9566,75 μg .
6. Uji hedonik dan uji mutu hedonik terhadap donat wortel paling disukai oleh ke 36 panelis yang mempunyai skor tertinggi dengan kategori agak enak adalah donat wortel dengan formulasi 3:1
7. Uji Friedmen untuk analisa organoleptik menunjukkan ada pengaruh kualitas donat wortel dari aspek aroma, rasa ,warna, mutu overall, mutu hedonik dan uji hedonik sedangkan dari aspek tekstur tidak ada pengaruh.

8. Rekomendasi produk pada zat gizi makro yaitu formulasi 3:1 dan pada zat gizi mikro 1:3, dimana kedua formulasi ini memiliki kriteria agak enak pada uji hedonik dengan masing-masing skor 3:1(63%) dan 1:3 (62%)

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, pentingnya untuk melakukan beberapa diversifikasi pangan untuk meningkatkan daya tarik masyarakat mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk memperbaiki status gizi masyarakat.
2. Bagi masyarakat dapat membuat donat wortel (*Daucus carota L*) untuk menjadi makanan layak konsumsi sebagai makanan tambahan guna memenuhi kebutuhan zat gizi perharinya.
3. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang zat gizi lain yang terkandung dalam produk donat wortel (*Daucus carota L*) dan perlunya penambahan bahan pangan lainnya dan mengubah proses pengolahan produk berbahan dasar bahan alami yang memiliki kandungan air tinggi sehingga dapat meningkatkan daya terima terhadap donat serta senantiasa lebih mengacu pada prospek Islam guna mengembangkan pendapat masyarakat ditinjau dari segi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almatsier, S. (2009). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta :Pt Gramedia Pustaka Utama. Buku.
- Asgar. A dan Musaddadd D 2006 *Optimalisasi Cara,Suhu, dan Lama Blansing Sebelum Pengeringan Pada Wortel*. Jurnal Hortikultural
- Amiruddin, C. (2013). *Pembuatan Tepung Wortel (Daucus Carrota L) Dengan Variasi Suhu Pengering,*
- Akg. (2013). *Angka Kecukupan Gizi (Akg)*
- Cahyono. (2002). *Wortel Teknik Budidaya Analisis Usaha Tani*, Kanisius Yogyakarta.
- Dhian J.(2009). *Pengaruh Lama Ekstraksi Terhadap kadar Beta Karoten Pada Wortel (Daucus Carota l) dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri UV-VIS*. Laporan Penelitian. Yogyakarta. FMIPA.UNY
- Febriana. (2012). *Kandungan Zat Gizi Wortel Dan Manfaatnya*. Pdf.
- ITP, Tim Dosen P. (2012). *Modul Praktikum Biokimia Dan Analisis Bahan Pangan*. Malang: *Ilmu Dan Teknologi Pangan*, Thp-Ftp Universitas Brawijaya.
- Kemenag. (2010). *Alqur'an Dan Terjemahan*. Jakarta.Wali
- Khusna, D. Hanindya Nisaul. (2014). *Kandungan Beta Karoten Dan Daya Terima Pada Bronis Dengan Tambahan Wortel*, 53(9), 1689–1699. [Http://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004](http://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004)
- Levina (2013). *Pengaruh Public Relations Dan Brand Image Terhadap Intensi Membeli (kasus : j . Co donuts & coffee)*
- Mehrir. (2012). *Sejarah Wortel*, [Http://Www.Kawungaten.Com/2012/11/Sejarah Wortel.Html](http://www.kawungaten.com/2012/11/Sejarah-Wortel.html). Jurnal Sejarah Wortel.
- Minarno. (2008). *Gizi Dan Kesehatan Prespektif Al-Qur'an Dan Sains*. Malang: Uin_Malang Press.
- Muchtadi, D. (2008). *Pengantar Ilmu Gizi*. Bandung :Alfabeta
- M.Taufik. (2012). *Strategi Pengembangan Agribisnis Sayuran Di Sulawesi Selatan*, 31(Adiyoga 1999).
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*.Jogjakarta: Rineka Cipta

- P, b. B. (2014). *Pengaruh substitusi mocaf (modified cassava flour) dan penambahan puree wortel (daucus carota l) terhadap sifat organoleptik martabak asrul bahar abstrak*, 3, 212–221.
- Purnamasari, N. (2013). *Pengaruh Jenis Pelarut dan Variasi Suhu Pengering Spray Dryer terhadap Kadar Karotenoid kapang Oncom Merah (Neurospora sp.)*. *Jurnal Teknosains Pangan*, vol 2. No, 107–114.
- Rahayu, W. P. (1998). *Penuntun Praktikum Penilaian Organoleptik*. Bogor Ipb.
- Rezky, a. (2012). *Usaha pembuatan donat wortel sebagai alternatif panganan sehat*. *Journal of chemical information and modeling*, 53(9), 1689–1699. [Http://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004](http://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004)
- Rochimiwati. (2011). *Pembuatan Aneka Jajanan Pasar Dengan Substitusi Tepung Wortel Untuk Anak Baduta*. Media Pangan Gizi, Vol Xi.
- Rosida (2008). *Pengaruh Substitusi Tepung Wortel Dan Lama Penggorengan Vakum Terhadap Karakteristik Keripik Wortel Simulasi*. *Jurnal Teknologi Pertanian*
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alqur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Supariasa, Nyoman Dkk (2012). *Penilaian Status Gizi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Syarfaini. (2012). *Dasar Dasar Ilmu Gizi*. Makassar, Alauddin University Press
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2013). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Press.
- Wahyuni, D. tri. (2015). *Pengaruh Jenis Pelarut dan Lama Ekstraksi terhadap Ekstrak Karoten Labu Kuning dengan Metode Gelombang Ultrasonik*. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, vol.3 No 2, 390–401.
- Winarno, F. G., 1986, *Kimia Pangan dan Gizi*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Zuhrina. (2011). *Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Pisang Raja Terhadap Daya Terima Kue Donat*. Skripsi.



L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Jl. Daeng Tata Raya Parang Tambung Makassar
Telp. 0411-864935 , Fax. 0411-861507
Laman : www.unm.ac.id.

SURAT KETERANGAN

Nomor 5553 /UN36.2/DL/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dr. H. Syahrul, M.Pd.
NIP : 196210051987021001
Jabatan : Pembantu Dekan I FT UNM

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : Munawwarah
NIM : 70200112088
Program Studi : Kesehatan Masyarakat

telah melaksanakan penelitian di Laboratorium Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar dengan judul:

**“Analisis Kandungan Gizi Donat Wortel (*Daucus Carrota L*) Sebagai Alternatif
Perbaikan Gizi pada Masyarakat”**

Penelitian dilaksanakan bulan Oktober – November 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 18 November 2016

a.n. Dekan
Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Syahrul, M.Pd.
NIP 196210051987021001





UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR: TAHUN 2016

TENTANG

PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL

JURUSAN/PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat atas nama: Munawwarah NIM: 70200112088 tertanggal 29 Agustus 2016 perihal permohonan ujian seminar Proposal pada 1 September 2016 yang berjudul Analisis kandungan zat gizi donat wortel sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk ujian Seminar Proposal
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian tersebut maka perlu dibentuk panitia ujian
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran terhadap Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU)
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 219C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Penguji Ujian Seminar Proposal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
Pembimbing I : Syarfaini, SKM., M.Kes
Pembimbing II : Nurdianah S, SKM., MPH
Penguji I : Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes
Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI
2. Penguji bertugas melaksanakan ujian kepada mahasiswa yang tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samata

Wada tanggal : 29 Agustus 2016



Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NIP. 1950203 198312 1 001

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
- 2. Para Pembimbing dan Penguji;
- 3. Arsip.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 324 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL
JURUSAN/PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN AKADEMIK 2015/2016
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Jurusan Kesehatan Masyarakat atas nama: Munawwarah NIM: 70200112088 tertanggal 24 November 2016 perihal permohonan ujian seminar Hasil pada 28 Nopember 2016 yang berjudul Analisis kandungan zat gizi donat wortel sebagai alternatif perbaikan gizi pada masyarakat

Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut di atas telah memenuhi persyaratan untuk ujian Seminar Hasil
 2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian tersebut maka perlu dibentuk panitia ujian
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran terhadap Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 9. Keputusan Menteri Agama Keuangan RI Nomor 330/PMK.05 Tahun 2008 tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU)
 10. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 219C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Penguji Ujian Seminar Hasil Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 Pembimbing I : Syarfaini, SKM., M.Kes
 Pembimbing II : Nurdiyanah S, SKM., MPH
 Penguji I : Dwi Santy Damayati, SKM., M.Kes
 Penguji II : Dr. H. Supardin, M.HI

2. Penguji bertugas melaksanakan ujian kepada mahasiswa yang tersebut diatas.
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
 4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kutipan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 25 November 2016

Dekan



Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.
 NIP 195502031983121001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Para Pembimbing dan Penguji;
3. Arsip.

LAMPIRAN



Sampel wortel 25g



Wortel 50g



Wortel 75g



Terigu 25g

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



Terigu 50g



Terigu 75g



Persiapan sampel



penimbangan sampel



Pemanasan sampel KH



Pengaturan pH



Penyaringan Sampel



Blanko Karbohidrat



Sampel Protein



Destruksi Sampel



Proses Destilasi



Blanko Protein



Sampel Lemak



Ekstraksi Lemak



Sampel Vit.A dan karoten



Proses Ekstraksi vit.A



Hasil ekstraksi



Penyaringan



Uji Organoleptik



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 12442/S.01P/P2T/09/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 280/Un.06/FKIK/PP.00.9/09/2016 tanggal 06 September 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUNAWWARAH**
Nomor Pokok : 70200112088
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS KANDUNGAN ZAT GIZI DONAT WORTEL SEBAGAI ALTERNATIF PERBAIKAN GIZI PADA MASYARAKAT "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 September s/d 16 Oktober 2016**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 06 September 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

