

UJI AKTIVITAS ANTI JAMUR EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH

NANAS (*Ananas comosus*) TERHADAP *Candida albicans*



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ASRIANI HASIL

70100116050

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriani Hasil
NIM : 70100117050
Tempat / Tgl Lahir : Apoleang, 15 Oktober 1997
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pondok Putri Azhumi Samata, Gowa
Judul : Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Etanol Kulit Buah
Nanas (*Ananas comosus*) Terhadap *Candida albicans*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 2 November 2022

Penulis

Asriani Hasil
NIM. 70100116050

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Etanol Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus*) Terhadap *Candida albicans* yang disusun oleh **Asriani Hasil, NIM. 70100116050**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada 10 November 2022 M yang, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Gowa, 10 November 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Apt. Nursyamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm, M.Sc	(.....)
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Dra. Audah Mannan, M. Ag.	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan
Ilmu Kesehatan UIN Alauddin
Makassar.



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A. M. Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Anti Jamur Ekstrak Etanol Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus*) Terhadap *Candida albicans* ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta H. Muh. Hasil S.Pd.I dan Hj. Suriani yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan bantuan, dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta keluarga besar ku tercinta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M. Ag. Selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Prof. Dr. Wahyuddin Naro, M.Hum. Selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag. Selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Fais Satrianegara, S.KM., MARS. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Apt. Surya Ningsih, S.Si M.Si. Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Apt. Nursyamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. Selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
11. Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. Selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.

12. Apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm, M.Sc. Selaku pembimbing II yang senantiasa selalu membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si Selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
14. Dra. Audah Mannan, M.Ag Selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Keluarga besar Farmasi 2016 (Digoxin) yang telah memberikan bantuan support dan semangat sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
16. Keluargaku Tercinta terutama Saudara Firazh Ahmadilla Ma'ga yang banyak membantu dan memberikan support kepenulis sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
17. Seluruh Panitia Seminar yang selalu mengarahkan dan mengingatkan kami demi berjalannya seminar dari proposal hingga sidang skripsi.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, 2 November 2022

Penulis

Asriani Hasil

70100116050



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Peneliti	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
A. Uraian Tanaman.....	6
B. Uraian Jamur	16
C. Ekstraksi Simplisia.....	29
D. Tinjauan Islam	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	43
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Populasi dan Sampel Penelitian	44
D. Instrumen Penelitian	44

E. Prosedur Kerja.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Hasil Penelitian.....	48
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	59
PERHITUNGAN DOSIS.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72




DAFTAR TABEL

1. Kriteria Interpretasi Pengaruh dan Resistensi Aktivitas Antijamur menurut CLSI.....48
2. Hasil maserasi ekstrak kulit Nanas (*Ananas comosus*).....48
3. Hasil pengujian aktivitas antijamur ekstrak etanol 70% kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap jamur candida albicans pada medium PDA.....49



DAFTAR GAMBAR

1. Daun dan Buah Nanas (*Ananas comosus*).....5
2. Jamur *Candida albicans*9
3. Hasil Pengambilan Sampel Kulit Nanas (*Ananas comosus*) dan Proses Pengeringan Selama kurang lebih 2 minggu.....67
4. Hasil ekstraksi Sampel Kulit Nanas (*Ananas comosus*).....69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4. Bagan Skema Kerja	59
Lampiran 5. Perhitungan Dosis	66
Lampiran 7. Dokumentasi Pembuatan Ekstrak.....	67
Lampiran 8. Dokumentasi Pembuatan Sediaan Uji	68
Lampiran 9. Dokumentasi Pengujian Pada Mikroba Uji	70



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Asriani Hasil
Nim : 70100116050
Judul Penelitian : Uji aktivitas Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas comosus*)
Terhadap Jamur *Candida albicans*

Pemanfaatan kulit buah nanas sebagai obat tradisional saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat tentang pemanfaatan kulit buah nanas. Kulit buah nanas banyak mengandung senyawa antioksidan seperti senyawa fenolik serta flavonoid. Senyawa tersebut memiliki potensi sebagai antikanker. Nanas adalah tanaman yang banyak mengandung vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalori, zat besi, dan enzim bromelin. Enzim bromelin merupakan enzim proteolitik yang dapat memecah molekul protein. Metode yang digunakan untuk mendapatkan senyawa yang terdapat pada kulit buah nanas adalah dengan cara ekstraksi. Dalam melakukan ekstraksi, jenis metode ekstraksi dan jenis pelarut yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil ekstraksi yang akan didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antijamur oleh ekstrak etanol kulit nanas terhadap jamur *Candida albicans*. Hasil yang didapatkan bahwa tidak adanya zona hambat yang terbentuk pada pengujian ini, yang diduga disebabkan karena adanya kontaminasi pada jamur uji.

Kata kunci : *Candida albicans*, ekstraksi, maserasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Nama Mahasiswa : Asriani Hasil
Nim : 70100116050
Judul Penelitian : Uji aktivitas Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas comosus*)
Terhadap Jamur *Candida albicans*

*The use of pineapple peel as a traditional medicine is currently not widely known by the public about the use of pineapple skin. Pineapple skin contains a lot of antioxidant compounds such as phenolic compounds and flavonoids. These compounds have potential as anticancer. Pineapple is a plant that contains lots of vitamin C, minerals, protein, carbohydrates, phosphorus, calories, iron, and bromelain enzymes. Bromelain is a proteolytic enzyme that can break down protein molecules. The method used to obtain the compounds contained in the skin of the pineapple is by extraction. In carrying out the extraction, the type of extraction method and the type of solvent used greatly affect the extraction results to be obtained. This study aims to determine the antifungal activity of ethanol extract of pineapple peel against the fungus *Candida albicans*. The results obtained were that there was no inhibition zone formed in this test, which was thought to be due to contamination in the test fungus samples*

Keywords: *Candida albicans*, extraction, maceration

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki iklim tropis, dengan keadaan lingkungan yang lembab dan hangat. Kondisi ini sangat ideal bagi pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme, salah satunya adalah jamur (Rahmadina dkk., 2021). Penduduk di daerah tropis seperti di Indonesia sangat rentan terkena infeksi jamur pada kulit dikarenakan suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi. Kondisi ini merupakan lingkungan yang sangat sesuai untuk pertumbuhan jamur. Penyakit infeksi jamur pada kulit sering dijumpai yang disebabkan oleh pola hidup yang kurang bersih, dan didukung dengan iklim tropis dengan kelembapan udara yang tinggi, sanitasi kurang, atau lingkungan padat penduduk yang mendukung pertumbuhan jamur (Melinda dkk., 2019).

Penyakit infeksi jamur mengalami peningkatan, hal ini dapat disebabkan oleh patogen sistemik maupun oportunistik seperti penyakit AIDS, penyakit neoplastik, lansia, terapi immunosupresif, transplantasi organ dan tindakan operasi. Kejadian tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas akibat infeksi jamur. Infeksi jamur pada manusia tidak mudah untuk ditangani dibandingkan dengan infeksi bakteri. Jamur merupakan mikroorganisme yang termasuk golongan eukariotik dapat menginfeksi manusia yaitu pada permukaan tubuh maupun mukosa. Infeksi jamur pada manusia tidak mudah untuk ditangani dibandingkan dengan infeksi bakteri (Narti, 2021).

Fungi yang merugikan dapat menyebabkan penyakit, salah satunya adalah *Candida albicans*. Penyakit yang disebabkan oleh *Candida* disebut kandidiasis. Kandidiasis merupakan infeksi yang paling sering diantara seluruh infeksi jamur pada manusia. *C. albicans* merupakan organisme komensal umum dalam usus,

mulut dan vagina. Jamur ini menyebabkan spektrum penyakit yang luas seperti sariawan mulut, vaginitis endokarditis dan septikemia. Pada kandidiasis superfisial akan mengalami peningkatan *Candida* yang menyebabkan kerusakan pada kulit, sehingga terjadi invasi lokal oleh *yeast* dan *pseudohyphae*. Pada kandidiasis sistemik *Candida* masuk ke aliran darah ketika imunitas sedang lemah, dari sistem sirkulasi *Candida* dapat menginfeksi ginjal dan jantung (Wahyuningsih, 2018).

Penduduk Indonesia masih banyak memanfaatkan tumbuhan sebagai pengobatan alternatif karena dipercayai memiliki efek samping yang sedikit. Pemanfaatan tumbuhan obat ini biasanya dijadikan sebagai jamu gendong, suplemen makanan, bahan baku kosmetik, obat herbal maupun sebagai bahan baku dalam industri makanan dan minuman. Tanaman Nanas (*Ananas comosus*) merupakan tanaman yang menjadi komoditas terbesar kedua setelah pisang dalam perdagangan buah tropik. Tanaman dari keluarga *Bromeliaceae* ini banyak diolah sebagai bahan baku industri seperti pembuatan selai, manisan, sirup dan dodol disamping dikonsumsi sebagai buah segar (Anggraeni dkk., 2021).

Seiring perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, pemakaian dan pendayagunaan obat tradisional di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Obat-obatan tradisional kembali digunakan masyarakat sebagai salah satu alternatif pengobatan. Obat tradisional yang berasal dari tumbuhan dan bahan-bahan alami murni memiliki efek samping, tingkat bahaya dan resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan obat kimia. Beberapa kalangan masyarakat sudah memanfaatkan buah nanas sebagai obat tradisional karena kulit buah nanas dapat bekerja sebagai anti fungi (Razak dan Lubis, 2020).

Kulit nanas merupakan limbah hasil olahan industri nanas yaitu sisa dari daging dan buah nanas. Kulit nanas mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, steroid, dan alkaloid yang mampu

menghambat jamur (Juariah dkk., 2018). Berdasarkan jurnal Uji Aktivitas Antifungi Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas comosus*) Terhadap Pertumbuhan *Pityrosporum ovale* dan *Candida albicans* Penyebab Ketombe oleh (Muhammad Yusuf, 2020) bahwa potensi antifungi dari kulit nanas disebabkan adanya senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) salah satunya yaitu Bromelin. Bromelin memiliki kemampuan aktivitas anti jamur dan flavanoid yang berperan sebagai antioksidan dalam melindungi kulit dari berbagai pertumbuhan jamur (Wiyati & Tjitraresmi, 2018). Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian Uji Aktivitas Ekstrak Kulit nanas *Ananas comosus* terhadap jamur *Candida albicans*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Ekstrak Etanol kulit nanas *Ananas comosus* memiliki aktivitas antifungi terhadap jamur *Candida albicans*
2. Berapakah konsentrasi Ekstrak Etanol kulit nanas *Ananas comosus* yang dapat menghambat jamur *Candida albicans*.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak etanol kulit nanas *Ananas comosus* memiliki aktivitas antifungi terhadap jamur *Candida albicans*
2. Untuk mengetahui berapakah konsentrasi Ekstrak Etanol kulit nanas *Ananas comosus* yang dapat menghambat jamur *Candida albicans*.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan kulit buah nanas sebagai anti bakteri dan anti fungi.

2. Memberikan informasi secara ilmiah kepada para bidang kesehatan ataupun peneliti untuk dapat melakukan penemuan senyawa baru dari kulit buah nanas.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup

1. Definisi Operasional

Terdapat berbagai macam istilah pada judul skripsi ini, diantaranya:

a. Ekstrak

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai.

b. Ekstraksi

Ekstraksi merupakan proses penyarian dimana terjadi perpindahan massa zat aktif, yang semula berada didalam selk ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari.

c. *Candida albicans*

adalah jamur yang terdapat pada kulit, saluran pencernaan, serta organ genital yang dapat menyebabkan infeksi.

d. Antijamur

Antijamur merupakan obat yang digunakan untuk seseorang yang menderita infeksi jamur

e. Aktivitas

Aktivitas merupakan kemampuan Ekstrak etanol kulit buah nanas dalam menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah fitokimia dan mikrobiologi farmasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Uraian Tanaman



Gambar 1. Buah dan daun Nanas (*Ananas comosus*)

1. Klasifikasi Tanaman

Secara taksonomi klasifikasi tanaman buah nanas adalah sebagai berikut:

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Liliopsida
Subkelas	: Monocotyledonae
Ordo	: Angiospermae
Famili	: Bromeliaceae
Genus	: <i>Ananas</i>

Spesies : *Ananas comosus*

Nanas berasal dari Brazilia (Amerika Selatan) di kawasan lembah sungai Parana, Paraguay. Bangsa Indian diduga melakukan seleksi dari berbagai jenis nanas sehingga diperoleh jenis *Ananas comosus* yang enak dimakan dan sekaraag dibudidayakan secara luas di seluruh dunia. Buah nanas yang mempunyai arti komersial adalah smooth *Cayenne*, *Queen*, *Spanish* dan *Abacaxi* (Akrinisa dkk., 2019).

Buah nanas (*Ananas comosus*) adalah satu diantara tanaman buah yang populer di masyarakat Indonesia. Buah nanas cukup mudah dan cocok untuk dibudidayakan dengan iklim tropis di Indonesia. Buah nanas ternyata mempunyai nilai ekspor, ini terbukti dari besarnya peluang pasar di luar negeri. Saat ini pemasaran buah nana tidak hanya dalam bentuk segar tetapi juga dalam bentuk pangan olahan, misalnya nanas segar tetapi juga dalam bentuk pangan olahan misalnya nanas kalengan, dodol. Nanas merupakan komoditi buah yang menjadi unggulan Indonesia. Hal ini karena nanas merupakan buah yang memiliki volume ekspor paling tinggi di Indonesia (Destriana dkk., 2021).

Nanas (*Ananas comosus*) telah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia. Nanas mempunyai kontribusi 8% dari produksi buah segar di dunia, dan Indonesia merupakan negara penghasil nanas segar dan olahan terbesar ketiga setelah Thailand dan Filipina (Yowandita, 2019).

Nanas (*Ananas comosus*) merupakan salah satu komoditas buah unggulan ke tiga Indonesia. Indonesia sebagai penghasil nanas terbesar di Asia Tenggara setelah Filipina dan Thailand. Produksi nanas Indonesia pada tahun 2015 sebesar

1,76 juta ton, pada tahun 2016 sebesar 1,85 juta ton dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,08 juta ton (Kurniati dkk., 2021).

Tanaman nanas adalah salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satu faktor yang mendukung pembudidayaan nanas di Indonesia adalah iklim tropis yang cocok sebagai syarat tumbuh tanaman nanas. Berdasarkan bentuk daun dan buah dikenal terdapat 4 jenis nanas, yaitu (Media, 2009 dalam Sari dkk., 2022):

1. *Cayenne*. Nanas *Cayenne* ditandai dengan ciri-ciri daun yang halus, daunnya tidak berduri, serta memiliki buah yang besar.
2. *Queen*, memiliki bentuk daun yang pendek, terdapat duri yang tajam pada daunnya, memiliki bentuk buah yang lonjong seperti kerucut.
3. *Spanish*. Nanas jenis ini memiliki ciri-ciri daun panjang kecil, pada daunnya terdapat duri yang halus hingga kasar, serta buahnya bulat dengan mata datar.
4. *Abacaxi*. Nanas jenis ini ditandai dengan daunnya yang panjang seta berduri kasar, memiliki buah yang berbentuk silindris atau berbentuk layaknya piramida.

Nanas yang banyak dikembangkan di perkebunan Indonesia adalah jenis *Cayenne* dan *Queen*. Nanas golongan *Spanish* banyak dikembangkan di wilayah kepulauan India Barat, Puerto Rico, Mexico, juga di Malaysia (Media, 2009 dalam Sari dkk., 2022).

Salah satu komoditas tanaman yang hasil buahnya banyak dimanfaatkan untuk olahan makanan adalah buah nanas. Rasa buah nanas yang nikmat saat dimakan secara langsung, buah ini sering diolah dalam beragam bentuk atau jenis makanan. Perusahaan-perusahaan dan pabrik atau industri dalam skala yang besar

membutuhkan pasokan buah nanas dalam jumlah yang banyak. Berbagai bentuk olahan makanan yang dimanfaatkan dari buah nanas antara lain keripik, selai, sirup, sari buah dan olahan lainnya. Budidaya nanas tentu menjadi prospek atau peluang usaha yang menjanjikan, serta berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Beberapa peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya nanas juga tidak jauh berbeda dengan peralatan yang digunakan dalam budidaya tanaman buah lainnya, antara lain pengadaan bibit nanas, cangkul, keranjang panen nanas, timbangan, pompa air, *hand sprayer*, gerobak dorong, sewa lahan, golok dan sabit, timbah, selang air dan gunting. Tersedianya peralatan tersebut membuat bisnis budidaya nanas semakin maksimal (Wiguna dkk., 2020).

Dalam proses budidaya nanas, terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Langkah-langkah budidaya nanas antara lain (Khairani dkk., 2015):

1. Persiapan lahan, yakni dengan melaksanakan kegiatan pembukaan lahan. Apabila lahan yang hendak digunakan ditumbuhi rerumputan liar, maka dilaksanakan pembukaan lahan dengan membat rumput-rumput liar atau meracuni rumput liar kemudian membakar rumput liar tersebut. Pada umumnya petani akan menjaga lahannya saat membakar sampah rumput liar. Namun, saat membakar rumput liar harus menjaga lahan agar tidak terjadi kebakaran lahan, terutama apabila lahan tersebut merupakan tanah gambut.
2. Pengolahan tanah dengan membolak-balik tanah menggunakan cangkul atau traktor. Hal ini dilakukan agar sisa rerumputan yang masih tersisa di permukaan tertimbun dan menjadi pupuk bagi tanaman. Pengolahan tanah biasanya dilakukan pada awal musim hujan, untuk menjaga kelembapan tanah.

3. Pembibitan. Umumnya pembibitan dilakukan dengan dengan melakukan seleksi bibit. Sebelum ditanam, bibit anakan dicabut terlebih dahulu dan dipilih atau diseleksi secara manual oleh petani untuk mengetahui bibit anakan yang baik dan layak untuk ditanam. Bibit yang baik mempunyai daun-daun yang tampak tebal penuh berisi, bebas hama dan penyakit serta pertumbuhannya relatif seragam. Ada beberapa jenis bibit anakan yang digunakan oleh petani yaitu anakan buah, anakan tangkai dan anakan batang bahkan ada juga yang menggunakan mahkota buah nenas. Anakan yang paling dominan digunakan oleh petani adalah anakan batang, karena berdasarkan keterangan dari petani anakan batang merupakan anakan yang lebih cepat mengeluarkan putik dan cepat berproduksi dibandingkan dengan anakan lainnya.
4. Penanaman. Digunakan mengikuti teknik penanaman awal setelah pembukaan lahan yaitu menanam kembali bibit anakan didekat bibit induk.
5. Penyiangan merupakan kegiatan membersihkan kebun nenas dari rumput liar dan gulma pesaing. Tujuan dilakukan penyiangan untuk menghindari terjadinya perebutan air, unsur hara, dan sinar matahari antara gulma dengan tanaman nenas.
6. Pemupukan pada tanaman nenas penting sebagai penyedia unsur hara yang kurang atau bahkan tak tersedia ditanah menjadi tersedia untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Beberapa contoh pemupukan seperti urea, TSP, KCl, NPK, dan pupuk abu.
7. Obat perangsang (ethrel) merupakan obat yang digunakan untuk merangsang pembungaan, pemasakan atau pematangan buah. Pemberian ethrel dilakukan ketika tanaman nenas berumur 8 bulan. Dosis yang

digunakan petani yaitu 3 cc ethrel (3 ml) di campurkan dengan 15-18 liter air.

8. Pemanenan. Tanaman nenas dapat dipanen setelah berumur 12-24 bulan. Nanas yang pertama ditanam dari awal pembukaan lahan dapat dipanen umur 12-14 bulan dan pada tahun kedua, nenas dapat dipanen pada umur 10-12 bulan apabila kebun rajin dibersihkan, dipupuk sesuai anjuran dan diberi obat perangsang (ethrel). Ciri-ciri buah nenas yang siap dipanen yaitu mahkota buah terbuka, tangkai buah mengkerut, mata buah lebih mendatar, warna bagian dasar buah kuning dan timbul aroma nenas yang harum dan khas. Pemanenan buah nenas biasanya dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan parang/sabit, sarung tangan dan keranjang.

Buah nenas mengandung sumber antioksidan seperti senyawa fenolik serta flavonoid, dimana memiliki potensi sebagai antikanker. Senyawa fenolik merupakan fitokimia dimana seluruh zat terbuat dari derivat senyawa fenol. Kandungan senyawa fenolik pada buah nenas berfungsi sebagai antioksidatif karena mengandung antioksidan, serta sebagai antikanker dan antiinflamasi (Widyanto dkk., 2020).

Nanas adalah tanaman yang memiliki buah yang banyak mengandung vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalori, zat besi, vitamin (A, B), kandungan magnesium, kalsium, natrium. Nanas mempunyai bagian yang bersifat buangan yaitu kulit yang memiliki tekstur kasar/tidak rata dan terdapat duri kecil di permukaannya. Kulit buah nenas dibuang begitu saja sebagai limbah, padahal sebenarnya kulit nenas mengandung zat aktif diantaranya adalah antosianin, vitamin C, flavonoid, dan enzim bromelin (Putri dkk., 2021).

Untuk mengurangi limbah kulit nanas tersebut, pengolahan ke produk yang berharga menggunakan teknik yang ramah lingkungan sangat diperlukan. Kulit nanas banyak mengandung flavonoid dan bromelin. Selain itu kulit nanas mengandung senyawa tanin, oxalat, dan pitat. Flavonoid dapat menyebabkan penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Selain itu flavonoid juga menghambat metabolisme energi dari bakteri. Oleh karena itu flavonoid merupakan komponen antibakteri yang potensial. Bromelin merupakan enzim proteolitik yang dapat memecah molekul protein. Bromelin dapat memutus ikatan protein pada bakteri sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Aktivitas, spesifisitas dan produksi dari enzim bromelin lebih banyak pada bagian kulit nanas dibandingkan dengan buah dan batang (Husniah dan Gunata, 2020).

Senyawa kimia yang terkandung dalam pecut kuda antara lain alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, saponin, fenolik, triptenoid, dan glikosid (Suhirman, 2015).

a. Alkaloid

Alkaloid berfungsi sebagai antibakteri dengan mengganggu komponenn pembentuk dinding sel bakteri sehingga lapisan dinding sel bakteri tidak terbentuk secara utuh (Utami dan Desty, 2013). Alkaloid adalah senyawa-senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan, bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai sistem lingkar heterosiklik dengan nitrogen sebagai hetero atomnya (Sumardjo, 2009).

Alkaloid murni mengandung aktivitas antimikobakteri. Ditemukan 23 senyawa murni alkaloid yang memiliki aktivitas antimikobakteri. Semua alkaloid diekstraksi dari berbagai bagian tanaman seperti akar, rimpang dan semuanya berasal dari karbazol dan alkaloid indol. Salah satu alkaloid yang ditemukan

adalah indoloquinoline yang memiliki aktivitas yang signifikan terhadap *M. fortuitum*. Selain itu, alkaloid benzoksazol yang merupakan metabolit laut juga memiliki aktivitas yang kuat terhadap *Micobacterium tuberculosis* (Kumar *et al*, 2010).

Unsur-unsur penyusun alkaloid adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Alkaloid yang struktur kimianya tidak mengandung oksigen hanya ada beberapa saja. Ada pula alkaloid yang mengandung unsur lain selain keempat unsur yang telah disebutkan. Adanya nitrogen dalam lingkaran pada struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid tersebut bersifat *alkali*. Oleh karena itu, golongan senyawa-senyawa ini disebut alkaloid (Sumardjo, 2009).

Tumbuhan dikotil adalah sumber utama alkaloid. Cara ekstraksi digunakan untuk mendapatkan alkaloid dari tumbuh-tumbuhan. Kini beberapa alkaloid dengan struktur kimia yang sederhana telah dapat dibuat secara sintesis di dalam laboratorium (Sumardjo, 2009).

Beberapa cara telah digunakan untuk mengidentifikasi alkaloid, misalnya mikroskopik kristal, kelarutan dalam berbagai jenis pelarut, spektrum absorpsi dan perputaran optis atau sifat farmakologis. Reaksi warna juga sering digunakan walaupun tidak spesifik (Sumardjo, 2009).

Alkaloid yang sampai saat ini telah dikenal digolongkan atau diklasifikasikan atas beberapa cara. Cara-cara yang umum dipakai ialah membagi alkaloid berdasarkan struktur kimia, sumber-sumber tumbuhan yang diperoleh, atau aktivitas farmakologis (Sumardjo, 2009).

b. Flavonoid

Merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut polar seperti etanol, menthanol, butanol, dan aseton. Flavonoid adalah golongan terbesar dari senyawa fenol. Senyawa fenol memiliki kemampuan antibakteri

dengan cara mendenaturasi protein yang menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri (Cushnie & Lamb, 2011).

Merupakan senyawa polar yang umumnya mudah larut dalam pelarut polar seperti etanol, menthanol, butanol, dan aseton. Flavonoid adalah golongan terbesar dari senyawa fenol. Senyawa fenol memiliki kemampuan antibakteri dengan cara mendenaturasi protein yang menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri (Cushnie & Lamb, 2011).

Flavonoid memiliki sifat antioksidan. Senyawa ini berperan sebagai penangkap radikal bebas karena mengandung gugus hidroksil. Karena bersifat sebagai reduktor, flavonoid dapat bertindak sebagai donor hidrogen terhadap radikal bebas (Silalahi, 2006).

Flavonoid dapat membentuk kompleks (kelat) dengan ion logam transisi, misalnya besi, sehingga tidak lagi bertindak sebagai prooksidan. Dengan demikian, oksidasi vitamin C dapat dicegah (Silalahi, 2006).

Senyawa flavonoid seperti quersetin, mortin, mirisetin, kaempferol, asam tanat, dan asam elagat merupakan antioksidan kuat yang dapat melindungi makanan dari kerusakan oksidatif (Silalahi, 2006).

Flavonoid banyak terdapat di dalam tumbuhan, terutama daun teh, bawang, apel, dan anggur merah. Konsumsi banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya akan flavonoid akan menurunkan resiko kanker dan PJK (Silalahi, 2006).

c. Tanin

Tanin merupakan senyawa fenol yang memiliki berat molekul besar yang terdiri dari gugus hidroksi dan beberapa gugus yang bersangkutan seperti karboksil untuk membentuk kompleks kuat yang efektif dengan protein dan beberapa makromolekul. Fungsi tanin pada tanaman salah satunya untuk

melindungi tanaman tersebut dari gangguan hewan lain. Tanin disebut juga zat antinutrisi. (Yusi, 2018).

Tanin merupakan senyawa yang mempunyai berat molekul 500-3000 dan mengandung sejumlah besar gugus hidroksi fenolik yang memungkinkan membentuk ikatan silang yang efektif dengan protein dan molekulmolekul lain seperti polisakarida, asam amino, asam lemak dan asam nukleat (Hidayah, 2016).

Tanin dibagi menjadi dua kelompok yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin yang mudah terhidrolisis merupakan polimer gallic dan ellagic acid yang berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan tanin terkondensasi merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-karbon berupa catechin dan gallocatechin (Hidayah, 2016).

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (Robinson, 1995). Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel (Cowan, 1999). Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati (Sari, 2011).

d. Steroid

Steroid adalah salah satu kelas utama dari lipid yang memiliki struktur yang sama sekali berbeda dari kelas-kelas lipid yang lain. Fitur utama dari steroid adalah tiga sistem cincin sikloheksan dan satu siklopentana dalam sistem cincin yang menyatu. Pada steroid ada berbagai gugus fungsional yang mungkin

menempel. Fitur utama, seperti dalam semua lipid, yakni sejumlah besar karbon-hidrogen yang membuat senyawa non-polar. Steroid paling dikenal dan paling banyak dalam tubuh adalah kolesterol. Kolesterol ini adalah senyawa utama yang ditemukan di batu empedu dan garam empedu. Kolesterol juga berkontribusi terhadap pembentukan deposit pada dinding dalam pembuluh darah. Deposit tersebut akan mengeras dan menghambat aliran darah. Kondisi ini, yang dikenal sebagai aterosklerosis yang menyebabkan berbagai penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi (Sumbono, 2016).


Steroid adalah keluarga lipid yang mencakup kolesterol, hormon steroid, dan garam empedu. Steroid merupakan molekul amphipathik (mengandung daerah baik hidrofobik dan hidrofilik). Steroid dasar terdiri dari tiga cincin beranggotakan enam atom C (sikloheksana) dan satu cincin beranggota lima atom C. Cincin sikloheksana masing-masing memiliki konformasi kursi. Beberapa jenis lipid yang berbentuk steroid yakni: kolesterol, estradiol, testosteron, vitamin D, ergosterol, progesteron dan estrogen (Sumbono, 2016).

2. Uraian Jamur

1. Klasifikasi Jamur

Secara taksonomi klasifikasi Klasifikasi Jamur adalah sebagai berikut

Kerajaan	: Fungi
Filum	: Ascomycota
Kelas	: Saccharomycetes
Ordo	: Saccharomycetales
Family	: Saccharomycetaceae
Genus	: Candida
Spesies	: <i>Candida albicans</i>




Gambar 2. Jamur *Candida albicans*

Candida albicans merupakan bagian dari mikroba flora normal yang beradaptasi dengan baik untuk hidup pada manusia terutama pada saluran pencernaan dan kulit. *Candida albicans* penyebab kandidiasis yang merupakan infeksi jamur dengan insiden tertinggi disebabkan oleh infeksi oportunistik (Lina dkk., 2020).

Insiden dermatofita salah satunya dari jenis *Candida albicans* yang terjadi, telah meningkat di negara-negara berkembang. Faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan jamur ini diantaranya dari toilet, makanan yang kurang sehat, pergaulan bebas, kurangnya perhatian dalam menjaga higienitas di tempat umum seperti toilet umum, toilet tempat bekerja dan toilet lainnya. Beberapa penelitian telah melaporkan mengenai keberadaan jamur *Candida* sp di air, misalnya dalam air toilet di sekolah, toilet umum, kolam renang dan tempat lainnya. Keseimbangan *Candida albicans* tergantung dari berbagai faktor yang dapat meningkatkan jumlah populasi, sehingga dapat menimbulkan penyakit yang disebut Kandidiasis. Kandidiasis biasa ditemukan pada penderita dengan kondisi

sistem imun yang buruk, seperti pada diabetes dan dapat juga diderita pada orang yang menggunakan air pada fasilitas umum secara bersama-sama sehingga penyakitnya disebut *Water Bath Dermatitis*. Fasilitas umum yang digunakan bersama-sama memiliki potensi yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang menunjang pertumbuhan jamur, misalnya toilet (Indrayati dan Sari, 2018).

Candida memiliki lebih dari 150 spesies dan terdapat 17 spesies yang dapat menginfeksi manusia. Infeksi candida superfisial maupun sistemik yang terjadi pada manusia terutama disebabkan oleh *Candida albicans* yaitu sekitar 70-80% dan diikuti oleh *Candida tropicalis* 30-40% (Mutiawati, 2016).



Gambar 3. Jamur *Candida albicans*

Jamur *Candida albicans* adalah organisme komensal dan flora normal yang berperan dalam keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh kita, serta ditemukan dalam traktus intestinal, kulit, dan traktus genita urinaria. *Candida albicans* secara makroskopis berbentuk bulat, lonjong atau bulat lonjong. Koloninya pada medium padat sedikit menonjol dari permukaan medium, dengan permukaan halus, licin atau berlipat-lipat, berwarna putih kekuningan dan berbau ragi. Besar koloni bergantung pada umur. Pada tepi koloni dapat dilihat hifa semu sebagai benang-

benang halus yang masuk ke dalam medium. Pada medium cair jamur biasanya tumbuh pada dasar tabung (Indrayati dan Sari, 2018).

Pengamatan makroskopis ditemukan koloni jamur *Candida albicans* berbentuk bulat, berwarna putih dengan tepian halus dan rata, koloni juga tampak basah dan cembung. Ciri-ciri tersebut merupakan ciri-ciri makroskopis jamur *Candida albicans* yaitu berbau asam, mempunyai koloni seperti ragi, berwarna putih dan permukaannya cembung (Safitri dan Qurrohman, 2022). Ciri koloni pada jamur *Candida albicans* berwarna putih kekuningan, berbentuk bulat, permukaan sedikit cembung, halus, licin dan terkadang terlihat seperti berlipat-lipat terutama pada koloni yang sudah tua (Ratnawati dkk., 2016 dalam Fajari dan Qurrohman, 2016).

Candida albicans merupakan salah satu flora normal tubuh yang beradaptasi dengan baik untuk hidup pada manusia, terutama pada saluran pencernaan, urogenital, dan kulit. *Candida albicans* penyebab kandidiasis yang merupakan infeksi jamur dengan insiden tertinggi disebabkan oleh infeksi oportunistik. Jamur ini telah dikenal dan dipelajari sejak abad ke-18 yang menyebabkan penyakit yang dihubungkan dengan ke-higienisan yang buruk. Jamur *Candida* tumbuh dengan cepat pada suhu 25-37°C pada media perbenihan sederhana sebagai sel oval dengan pembentukan tunas untuk memperbanyak diri, dan spora jamur disebut blastospora atau sel ragi/sel khamir. Morfologi mikroskopis *C. albicans* memperlihatkan *pseudohyphae* dengan *cluster* di sekitar blastokonidia bulat bersepta Panjang berukuran 3-7x3-14 µm. Jamur membentuk hifa semu/pseudohifa yang sebenarnya adalah rangkaian blastospora yang bercabang, juga dapat membentuk hifa sejati. Pseudohifa dapat dilihat dengan media perbenihan khusus. *Candida albicans* dapat dikenali dengan kemampuan

untuk membentuk tabung benih/*germ tubes* dalam serum atau dengan terbentuknya spora besar berdinding tebal yang dinamakan *chlamyospore* (Mutiawali, 2016).

Infeksi *Candida albicans* pada manusia dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni: kandidiasis superfisial, kandidiasis mukokutan, dan kandidiasis sistemik. Kandidiasis superfisial merupakan jenis kandidiasis yang dapat menyerang mukosa, kulit, dan kuku. Kandidiasis mukokutan merupakan jenis kandidiasis yang melibatkan kulit dan mukosa rongga mulut atau mukosa vagina. Pada kandidiasis sistemik dapat terjadi pada traktus respirasi bawah dan urinaria yang dapat menyebabkan kandidaemia. Beberapa penemuan diklinis yang berkaitan dengan infeksi *C. albicans* antara lain; pseudomembran candidiasis, erythematous candidiasis, candida leukoplakia, denture stomatitis, angular cheilitis, median rhomboid glositis dan oral kandidiasis yang terkait HIV. Daerah di rongga mulut yang paling sering terlibat adalah lidah, palatum, dan mukosa bukal. Jamur *C. albicans* dapat menyebabkan penyakit infeksi kandidiasis dan membanjiri sistem pertahanan *host* karena memiliki beberapa faktor virulen yang terlibat dalam patogenesisnya (Lestari, 2010).

Jamur *Candida albicans* termasuk dalam jenis jamur yang termasuk flora normal, yang dapat hidup di dalam rongga mulut, saluran pencernaan dan vagina. Jamur *Candida albicans* ini dapat berubah menjadi jamur yang bersifat patogen, jika terjadi perubahan dalam diri pejamu atau orang yang berisiko terinfeksi penyakit. Perubahan yang terjadi pada pejamu tersebut dapat bersifat lokal maupun sistemik. Penyakit kandidiasis ini dapat membentuk lesi yang dapat berkembang pada rongga mulut penderita, tetapi lokasi yang paling sering untuk ditumbuhi lesi kandidiasis adalah mukosa bukal, lipatan mukosa bukal, orofaring

dan lidah. Kandidiasis yang bersifat akut atau kronis yang tidak segera dirawat dan diobati, dapat berkembang menjadi kandidiasis leukoplakia yang bersifat pra ganas. Kandidiasis jenis ini dapat berkembang dan kemudian mengakibatkan karsinoma sel skuamosa. Selain itu, kandidiasis dapat berkembang menjadi infeksi sistemik melalui aliran getah bening yang menyerang organ vital seperti ginjal, paru-paru, otak dan dinding pembuluh darah yang bersifat fatal (Hakim dan Ramadhian, 2015).

Kandidiasis merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh jenis mikroorganisme jamur *Candida albicans*. Sekitar 85-95% infeksi kandidiasis oral disebabkan oleh jamur *Candida albicans* yang biasanya melekat pada mukosa labial, mukosa bukal, dorsum lidah, dan daerah palatum. *Candida albicans* tidak hanya dapat tumbuh pada rongga mulut, tetapi juga dapat tumbuh pada saluran pencernaan, pernafasan dan genital Wanita (Sari dkk., 2019).

Kandidiasis atau kandidosis adalah infeksi yang disebabkan oleh jenis fungi dari genus *Candida* (Sardi dkk., 2013). Terdapat sekitar 600.000 spesies fungi, namun hanya 0,1% atau 600 spesies fungi yang dapat menyebabkan patogen di manusia. Jenis fungi yang paling umum terdapat pada manusia adalah spesies *Candida*, dan fungi yang paling banyak dijumpai adalah *Candida albicans*. *Candida albicans* merupakan fungi polimorfik yang berada sebagai komensal pada jaringan mukosa, selain itu juga terdapat spesies *Candida* lain yaitu *Candida glabrata*, *Candida parapsiosis*, *Candida tropicalis*, dan *Candida krusei* (Tania, 2020).

Candida albicans adalah jamur penyebab 50-90% kandidiasis pada manusia. *Candida albicans* merupakan patogen komensal dan dapat menjadi oportunistis, pada saluran gastrointestinal, orofaring, dan alat kelamin wanita (Novilla dkk., 2017). *Candida albicans* dianggap sebagai spesies jamur yang paling patogen dan menjadi penyebab terbanyak penyakit kandidiasis. Kandidiasis adalah penyakit jamur yang menyerang kulit, rambut, kuku, selaput lendir dan organ dalam yang disebabkan oleh berbagai genus *Candida*. Spesies yang banyak ditemukan pada manusia adalah *Candida albicans*. Kandidiasis adalah suatu penyakit akut atau sub akut yang disebabkan oleh *Candida albicans* atau kadang-kadang oleh spesies lain yang dapat menyerang berbagai jaringan tubuh (Nita, 2013 dalam Indrayati dan Sari, 2018).

Insiden kandidiasis masih sangat tinggi di dunia dan 70% dari kandidiasis disebabkan *Candida albicans*. *Candida albicans* merupakan fungi oportunistik penyebab sariawan. Kandidiasis menyumbangkan angka morbiditas tinggi dan motilitas dalam jumlah jutaan dari individu di dunia. Kandidiasis pada vagina terjadi pada 75% wanita di usia reproduktif setara dengan 39 juta terinfeksi tiap tahun. Infeksi *Candida* juga umum bermanifestasi oral pada infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dengan 50% pasien HIV positif dan 90% pasien AIDS mengalami kandidiasis oral, selain itu genus ini menyebabkan penyakit mukosal. Dari 400.000 penyakit kandidiasis yang disebabkan karena *Candida albicans* di seluruh dunia menyebabkan 46-75% kematian (Tania, 2020).

Kandidiasis adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur genus *Candida*. Spesies terbanyak penyebab kandidiasis adalah *Candida albicans*. *Candida albicans* merupakan flora normal yang hidup di rongga mulut, saluran

pencernaan, dan vagina. Flora normal bersifat komensal namun apabila adanya perubahan fisiologis pada tubuh pejamu atau pertahanan tubuh menurun, maka keseimbangan flora normal akan terganggu dan mengakibatkan sifat komensal kandida ini berubah menjadi patogen. Angka prevalensi kandidiasis tergolong tinggi di negara berkembang, dan banyak terjadi di daerah tropis dengan kelembaban udara yang tinggi. Kasus kandidiasis di Indonesia menempati urutan ketiga dalam insidensi dermatomikosis (Itsa dkk., 2018).

Kandidiasis merupakan suatu jenis penyakit yang dapat menyerang manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur berjenis candida. Infeksi penyakit ini yang menjangkit penderita dapat berupa infeksi yang tergolong dalam kategori berat atau infeksi yang bersifat invasif. Infeksi penyakit ini dapat berkembang menjadi penyakit kandidemia, kandidiasis diseminata, endocarditis, meningitis, endofalmitis, serta infeksi yang dapat terjadi pada organ tubuh bagian dalam lainnya. Penyakit kandidiasis yang berupa infeksi oleh jamur merupakan penyakit yang tidak bisa dianggap sepele dan ringan. Pada beberapa jenis *Candida* bahkan dapat menurunkan sistem imun pada manusia atau hewan yang dijangkit. Penyakit ini sangat mudah menular, menyebar dan menjangkit manusia dan hewan lain, faktor penyebab penyakit ini juga berkaitan erat dengan kehidupan manusia seperti faktor iklim dan faktor kebersihan, serta pola hidup yang kurang bersih dan sehat. Jenis penyakit kandidiasis juga beragam, namun dapat digolongkan secara umum menjadi tiga jenis yaitu yang menyerang mulut (*Candidiasis Thrush*), vagina (*Candiasis Vulvogonal*), dan kulit (*Candidiasis Cutaneous*) (Panjaitan dkk., 2021).

Pertumbuhan yang terlalu pesat dari jamur *Candida albicans* dapat menyebabkan infeksi pada vagina yang disebut kandidiasis vaginitis. Infeksi ini

sering kali terjadi akibat penggunaan air seperti toilet yang mengandung *Candida* sp. Setelah defekasi, dapat tercemar dari kuku atau air yang digunakan untuk membersihkan diri. *Candida albicans* sering menimbulkan vaginitis pada wanita dengan gejala utama fluor albus yang sering disertai rasa gatal (Indrayati dan Sari, 2018).

Candida albicans merupakan patogen oportunistik yang merupakan fungi pleomorfik, yaitu mikroorganisme yang memiliki kemampuan mengubah bentuk dan ukuran akibat respon terhadap lingkungannya, yaitu menjadi bentuk yeast atau hifa/filamen. Kemampuan *Candida albicans* untuk mengubah morfologi antara yeast dan bentuk filamen merupakan kondisi penting bagi kemampuan patogenitasnya di permukaan mukosa inangnya (Tania, 2020).

Sebagai organisme komensal, *albicans* memiliki kemampuan untuk menghindari (*escape*) dari perondaan imun (*surveillance*) inangnya. Pada awalnya *Candida* akan menempel pada sel inang melalui bentuk yeast yang hidup normal di permukaan kulit dan mukosa tanpa menimbulkan respon imun inangnya. Pembentukan hifa dapat melakukan invasi dan infiltrasi pada jaringan dan berperan terhadap patogenitas penyakit. Formasi hifa ini dapat membentuk biofilm yang berfungsi sebagai perlindungan dari terapi antifungi, *escape* sel-sel pathogen dari sistem imun dan sebagai sumber infeksi maupun kekambuhan infeksi *Candida albicans* (Tania, 2020).

Infeksi yang disebabkan oleh jamur patogen pada rambut, kuku, epidermis dan mukosa disebut sebagai infeksi jamur superfisial. Infeksi jamur jarang sekali menyebabkan keadaan yang berbahaya, meski demikian penyakit ini tidak dapat disepelekan karena distribusi di seluruh dunia, frekuensi, transmisi antar individu, dan morbiditasnya. Penyebab infeksi jamur salah satunya yaitu *Candida albicans*.

Candida albicans merupakan mikroflora di tubuh manusia yang dapat ditemukan di traktus gastrointestinal, membran mukosa dan kulit. Pertumbuhan organisme yang berlebihan menyebabkan timbulnya gejala. Infeksi candida disebut kandidiasis, gejala yang muncul bergantung pada area tubuh yang terinfeksi. Saat ini penggunaan obat antijamur sintetis sering digunakan untuk mencegah penyakit infeksi yang disebabkan oleh jamur terutama oleh jamur *C. albicans* (Ahmad dan Asep, 2018).

Menurut Maysaroh dan Mariza (2021), keputihan atau yang disebut *white discharge*, *vaginal discharge*, *leukore*, atau *flour albus*, merupakan peristiwa keluarnya cairan putih (bukan darah) dari daerah kemaluan. Berdasarkan gejalanya, keputihan ini dapat bersifat fisiologi maupun patologis. Keputihan yang bersifat fisiologis yakni keputihan yang keluar karena proses alami dalam tubuh dan merupakan salah satu tanda dari ovulasi wanita. Gejala dari keputihan jenis ini adalah tidak berbau, jernih, tidak gatal, dan tidak perih. Menurut Marhaeni (2016), faktor-faktor yang dapat menyebabkan keputihan fisiologis adalah sebagai berikut:

- a) Bayi yang baru lahir kira-kira 10 hari, keputihan ini akibat pengaruh hormon estrogen dari ibu
- b) Masa *menarche* atau pertama kalinya haid datang, keadaan iniditunjang oleh hormon estrogen
- c) Masa di sekitar ovulasi karena produksi kelenjar-kelenjar rahim dan pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron
- d) Seorang wanita yang terangsang secara seksual. Cairan yang dikeluarkan ini digunakan sebagai pelumas dalam senggama
- e) Kehamilan yang mengakibatkan meningkatnya suplai darah ke vagina dan mulut rahim, serta penebalan dan melunaknya selaput lender vagina

- f) Akseptor kontrasepsi pil yang mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dapat meningkatkan lendir servik menjadi lebih encer
- g) Pengeluaran lendir yang bertambah pada wanita yang sedang menderita penyakit kronik

Sementara itu, keputihan yang bersifat patologis adalah jenis keputihan abnormal yang timbul karena infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Keputihan jenis ini merupakan tanda dari adanya kelainan alat reproduksi sehingga jumlah, warna, dan baunya perlu diperhatikan. Keputihan abnormal ini menjadi indikasi dari berbagai penyakit, seperti vaginitis, kandidiasis, dan trikomoniasis, yang merupakan salah satu dari gejala Penyakit Menular Seksual (PMS). Keputihan juga merupakan indikasi dari adanya infeksi di dalam rongga panggul seperti infeksi pada saluran telur yang disertai sakit perut yang hebat. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan (warna berbeda sesuai dengan penyebab dari keputihan), terasa gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Menurut Marhaeni (2016), faktor-faktor yang memicu keputihan abnormal adalah:

- a) Aktivita fisik yang terlalu tinggi mengakibatkan pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebih. Peningkatan penggunaan energi ini akan menurunkan ekskresi hormon estrogen yang berperan untuk menjaga keasaman vagina. Jumlah asam laktat yang sedikit akan menyebabkan bakteri, jamur, maupun parasit mudah berkembang.
- b) Ketegangan fisik yang berakibat pada stress dapat menyebabkan naiknya hormon adrenalin yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran hormon estrogen terhambat. Hal ini akan berakibat pada sedikitnya asam laktat pada vagina yang menyebabkannya mudah terinfeksi.

- c) Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi.

Keputihan fisiologis dan patologis mempunyai dampak pada wanita. Keputihan fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga dapat memengaruhi rasa percaya dirinya. Keputihan patologis yang berlangsung terus menerus akan mengganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian saluran indung telur yang dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan kongenital, lahir prematur (Marhaeni, 2016).

Sementara itu, keputihan yang bersifat patologis adalah jenis keputihan abnormal yang timbul karena infeksi jamur, bakteri, maupun virus. Keputihan jenis ini merupakan tanda dari adanya kelainan alat reproduksi sehingga jumlah, warna, dan baunya perlu diperhatikan. Keputihan abnormal ini menjadi indikasi dari berbagai penyakit, seperti vaginitis, kandidiasis, dan trikomoniasis, yang merupakan salah satu dari gejala Penyakit Menular Seksual (PMS). Keputihan juga merupakan indikasi dari adanya infeksi di dalam rongga panggul seperti infeksi pada saluran telur yang disertai sakit perut yang hebat. Keputihan yang tidak normal ditandai dengan jumlah yang banyak, berwarna putih seperti susu basi, kuning atau kehijauan (warna berbeda sesuai dengan penyebab dari

keputihan), terasa gatal, perih, dan disertai bau amis atau busuk. Menurut Marhaeni (2016), faktor-faktor yang memicu keputihan abnormal adalah:

- d) Aktivitas fisik yang terlalu tinggi mengakibatkan pengeluaran energi karena terlalu memaksakan tubuh untuk bekerja berlebih. Peningkatan penggunaan energi ini akan menurunkan ekskresi hormon estrogen yang berperan untuk menjaga keasaman vagina. Jumlah asam laktat yang sedikit akan menyebabkan bakteri, jamur, maupun parasit mudah berkembang.
- e) Ketegangan fisik yang berakibat pada stress dapat menyebabkan naiknya hormon adrenalin yang mengakibatkan penyempitan pembuluh darah sehingga aliran hormon estrogen terhambat. Hal ini akan berakibat pada sedikitnya asam laktat pada vagina yang menyebabkannya mudah terinfeksi.
- f) Keputihan yang abnormal banyak dipicu oleh cara wanita dalam menjaga kebersihan dirinya, terutama alat kelamin. Kegiatan kebersihan diri yang dapat memicu keputihan adalah penggunaan pakaian dalam yang ketat dan berbahan nilon, cara membersihkan alat kelamin (cebok) yang tidak benar, penggunaan sabun vagina dan pewangi vagina, penggunaan pembalut kecil yang terus menerus di luar siklus menstruasi.

Keputihan fisiologis dan patologis mempunyai dampak pada wanita. Keputihan fisiologis menyebabkan rasa tidak nyaman pada wanita sehingga dapat memengaruhi rasa percaya dirinya. Keputihan patologis yang berlangsung terus

menerus akan mengganggu fungsi organ reproduksi wanita khususnya pada bagian saluran indung telur yang dapat menyebabkan infertilitas. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, Kematian Janin dalam Kandungan (KJDK), kelainan kongenital, lahir prematur (Marhaeni, 2016).

Penyebab keputihan salah satunya yaitu jamur *Candida albicans*. Secara alamiah, keputihan normal terjadi ketika menjelang atau sesudah menstruasi. Namun jika kurangnya menjaga kebersihan di areaewanitaan atau stress dapat memicu timbulnya penyakit ini. Apabila keputihan tidak normal (patologis) dibiarkan saja tanpa diobati atau dengan kata lain tidak segera diberikan penanganan, akibatnya infeksi bisa menjalar masuk ke dalam rahim sampai menginfeksi ovarium. Oleh sebab itu, penderita perlu memeriksakan organ dan saluran reproduksi ke pelayanan kesehatan agar diketahui penyebab patologisnya untuk dilakukan pencegahan serta penanganan yang tepat (Tivani dan Amananti, 2020).

3. Ekstraksi Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman dan eksudat tanaman, simplisia hewani adalah simplisia berupa hewan utuh bagian hewan atau zat yang dihasilkan hewan yang masih belum berupa zat kimia murni, sedangkan simplisia mineral adalah simplisia yang berasal dari bumi, baik telah diolah ataupun belum, tidak berupa zat kimia murni Hanani, 2015: 10).

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian hampir semua pelarut diuapkan dari massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Hanani, 2015: 10).

Ekstraksi merupakan proses penyarian senyawa dari matriks atau simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Peran ekstraksi dalam analisis fitokimia sangat penting karena sejak tahap awal hingga akhir menggunakan proses ekstraksi. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam proses ekstraksi antara lain ekstraktan adalah pelarut yang digunakan untuk ekstraksi, rafinat adalah larutan senyawa yang akan diekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan tergantung pada jenis, sifat fisik, dan sifat kimia kandungan senyawa yang akan diekstraksi. (Septiningsih, 2008: 24).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan yang berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu (Hanani, 2015: 10).

Ekstraksi dilakukan untuk menyari zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Senyawa aktif terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu untuk menarik senyawa aktif tersebut (Harbone, 1987)

Tujuan ekstraksi adalah memisahkan bahan padat dan bahan cair suatu zat dengan bantuan pelarut. Ekstraksi dapat memisahkan campuran senyawa dengan berbagai sifat kimia yang berbeda. Ekstraksi bahan alam umumnya dilakukan

untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Depkes RI, 1995)

Metode ekstraksi menggunakan pelarut ada 2 yaitu:

a. Metode Dingin

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada senyawa termolabil yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi dengan ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki keterbatasan kelarutan pelarut pada suhu ruangan.

Terdapat sejumlah metode ekstraksi, yang paling sederhana adalah ekstraksi dingin. Keuntungan cara ini merupakan metode ekstraksi yang mudah karena tidak dipanaskan sehingga kemungkinan kecil bahan alam menjadi terurai.

Penggunaan pelarut dengan peningkatan kepolaran bahan alam secara berurutan memungkinkan pemisahan bahan-bahan alam berdasarkan kelarutannya (dan polaritasnya) dalam pelarut ekstraksi. Hal ini sangat mempermudah proses isolasi. Ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa yang terekstraksi. (Heinrich *et al*, 2004).

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam proses ekstraksi yaitu rasio bahan terhadap pelarut, waktu ekstraksi, jumlah tahapan kontak (frekuensi ekstrak), temperatur saat ekstraksi, ukuran partikel, tipe pelarut, serta teknik pengadukan (Febrina dkk., 2015 dalam Anwar dkk., 2021). Jenis pelarut yang dipilih adalah salah satu faktor yang memengaruhi ekstraksi. Jenis pelarut dapat memengaruhi hasil kadar zat aktif serta pelarut yang digunakan dapat

menghasilkan proses ekstraksi yang optimal. Hasil rendemen ekstrak, mutu ekstrak dan kadar senyawa aktif yang dihasilkan adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan proses ekstraksi (Noviyanty dkk., 2019 dalam Elvansi dan Vifta, 2022).

Ekstrak cair diperoleh dari ekstraksi yang masih mengandung sebagian besar cairan penyari. Ekstrak kental didapat apabila sebagian besar cairan penyari diuapkan, sedangkan ekstrak kering diperoleh jika sudah tidak mengandung cairan penyari (Septiningsih, 2008: 24).

Etanol merupakan cairan penyari yang bersifat universal yaitu dapat melarutkan senyawa polar maupun non polar. Etanol adalah senyawa yang mudah menguap, jernih (tidak berwarna), berbau khas, dan dapat menyebabkan rasa terbakar pada lidah. Etanol mudah menguap baik pada suhu rendah maupun pada suhu tinggi, mudah terbakar serta larut dalam air dan semua pelarut organik. Etanol dipilih sebagai cairan penyari karena lebih selektif dibandingkan dengan air. Etanol juga memiliki keuntungan lain yaitu tidak beracun, netral, absorpsi baik, dapat bercampur dengan air pada segala perbandingan, dapat memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut dan tidak memerlukan panas yang tinggi untuk pemekatan (Hanani, 2015: 10)

Adapun jenis-jenis ekstraksi diantaranya sebagai berikut:

1. Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi dan keseimbangan (Hanani, 2015: 10).

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan dengan merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup. Pengadukan dilakukan dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Kelemahan dari maserasi adalah prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ekstraksi secara menyeluruh juga dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut yang dapat berpotensi hilangnya metabolit. Beberapa senyawa juga tidak terekstraksi secara efisien jika kurang terlarut pada suhu kamar (27°C). Ekstraksi secara maserasi dilakukan pada suhu kamar (27°C), sehingga tidak menyebabkan degradasi metabolit yang tidak tahan panas (Departemen Kesehatan RI, 2006).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai untuk skala kecil atau skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan sampel dan pelarut kedalam wadah yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi adalah memakai waktu yang cukup lama, dan memungkinkan banyak senyawa yang hilang. Selain itu beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar, tetapi disisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa yang bersifat termolabil (Hanani, 2015: 10).

Salah satu metode ekstraksi yang mudah, sederhana dan sering dilakukan adalah maserasi. Maserasi merupakan proses penyaringan simplisia dengan cara perendaman menggunakan pelarut pada temperatur kamar. Jenis pelarut yang

digunakan dalam proses ekstraksi sangat memengaruhi hasil ekstraksi. Pelarut air dan etanol merupakan pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi bahan-bahan alami disebabkan pelarut air bersifat polar dan etanol merupakan pelarut semi polar yang dapat mengekstrak zat warna dengan baik. Pelarut metanol merupakan pelarut yang bersifat universal yang mampu mengikat semua komponen yang terdapat pada tumbuhan bahan alam, baik yang bersifat non polar, semi polar dan polar (Leny, 2006 dalam Putri dkk., 2020). Etanol sebagai pelarut memiliki kemampuan dalam mengekstrak senyawa aktif yang lebih banyak dibandingkan jenis pelarut organik lainnya. Titik didih yang rendah pada pelarut etanol yakni 79°C sehingga panas yang dibutuhkan lebih sedikit untuk proses pemekatan (Sudarmadji, 2003 dalam Lestiono dkk., 2020).

Istilah maserasi berasal dari bahasa latin yaitu *macerare*, yang berarti “merendam”. Merupakan proses paling tepat dimana simplisia yang sudah halus memungkinkan untuk direndam dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat menjadi mudah larut (Ansel, 1989).

Maserasi merupakan metode penyarian sederhana serta digunakan untuk sampel yang memiliki senyawa aktif yang mudah larut dalam cairan penyari. Proses ini dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari atau pelarut yang sesuai.

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung senyawa aktif. Senyawa aktif akan larut dikarenakan perbedaan konsentrasi antara intra sel dan ekstra sel, sehingga konsentrasi yang pekat akan didesak keluar. Proses ini terjadi secara terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara diluar dan didalam sel.

Kelebihan metode ini adalah alat dan cara yang digunakan sangat sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan maupun tidak

tahan terhadap pemanasan. Kelemahannya adalah menggunakan banyak pelarut (Leba, 2017).

2. Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana silinder yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetasan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) (Septiningsih, 2008: 24).

Perkolasi merupakan proses mengekstraksi senyawa terlarut dari jaringan selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup sesuai, baik untuk ekstraksi pendahuluan maupun dalam jumlah besar (Departemen Kesehatan RI, 2006).

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel terus menerus dialiri oleh pelarut yang baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau keseluruhan area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Septiningsih, 2008: 24).

3. Sokletasi

Sokletasi merupakan proses ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus soxhlet sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendinginan balik. Caranya serbuk bahan ditempatkan pada tabung klonsong dengan dibungkus oleh jertas saring, kemudian ditempatkan alat soxhlet yang telah dipasang labu dibawahnya. Tambahkan pelarut sebanyak 2 kali siklus. Pasang pendingin balik, panaskan labu, ekstraksi berlangsung minimal 3 jam dengan interval sirkulasi kira-kira 15 menit (Septiningsih, 2008: 24).

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi dengan prinsip pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian menguap ke atas dan melewati pendingin udara yang akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan yang akan terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa samping soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang berulang itulah yang menghasilkan ekstrak yang baik (Departemen Kesehatan RI, 2006).

Sokletasi dilakukan dengan pemanasan pelarut. Uap pelarut yang dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinyu akan membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke dalam labu dengan membawa analit. Proses ini berlangsung secara kontinyu. Pelarut yang digunakan dapat diuapkan kembali dan dipisahkan dari analit. Sokletasi dapat dihentikan dengan cara menghentikan pemanasan (Leba, 2017).

Metode ini dilakukan dengan menempatkan sampel didalam kertas saring, diletakkan pada tabung klonsong yang ditempatkan diatas labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan kedalam labu dan suhu

penangas diatur dibawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus menerus berada pada titik didih (Septiningsih, 2008: 24).

4. Destilasi uap

Destilasi uap memiliki proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Septiningsih, 2008: 24).

Proses destilasi lebih banyak digunakan untuk senyawa organik yang tahan pada suhu yang cukup tinggi, yang lebih tinggi dari titik didih pelarut yang digunakan.

5. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas relative konstan dengan adanya pendinginan balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali. Sehingga dapat termasuk proses ekstraksi yang sempurna.

Ekstraksi dengan metode refluks digunakan untuk simplisia dengan kandungan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Alat refluks ini terbuat dari bahan gelas dimana bagian tengahnya dilengkapi dengan lingkaran gelas yang berbentuk spiral atau bola. Untuk mengekstraksi bahan dimasukkan kedalam labu alas bulat bersama cairan penyari kemudian dipanaskan. Cairan penyari ini akan

mendidih, menguap dan berkondensasi pada pendingin tegak, lalu turun kembali pada labu dan sekaligus mengekstraksi kembali. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sampai bahan tersari sempurna. Pengerjaan ini dilakukan sebanyak 3-4 kali selama 3-4 jam (Depkes, 2006).

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Kerugian metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Hanani, 2015: 10).

4. Tinjauan Islam

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satunya sebagainya bahan pengobatan. Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan obat, dari berbagai macam tumbuhan tersebut diperlukan ilmu pengetahuan untuk mengetahui manfaatnya.

Manusia dan tumbuh-tumbuhan sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Banyak sekali nilai manfaat yang didapatkan oleh manusia dari tumbuh-tumbuhan namun masih banyak pula tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar kita yang belum diketahui manfaatnya. Keberadaan tumbuhan tersebut merupakan berkah Allah SWT yang diberikan kepada seluruh makhluknya.

Segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Salah satunya yaitu sebagai bahan pengobatan. Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan pengobatan. Dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan untuk mengetahui manfaatnya.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Al-An'am/6: 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (99)

Terjemahannya:

“Dan Dialah (Allah) yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Menurut tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah Swt yang menguraikan kumpulan hal-hal dengan menegaskan bahwa Dialah Allah yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan deras yang banyak dari langit, dan menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, Allah Swt telah menciptakan segala tanaman, butir yang berlimpah padahal sebelumnya hanya satu biji atau benih (Shihab, 2009).

Dalam kitab *al-Muntakhab fi at-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, terutama pada daun. Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah sumber semua kehidupan (Shihab, 2009).

Di bagian akhir ayat ini disebutkan *unzhuru ila tsamarihi idza atsmara wa yan'ih* (perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah, dan kematangannya). Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan (botani) yang sampai saat ini mengandalkan metode pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya dan ditutup dengan *liqaumin yu'minun* (bagi kaum yang beriman), ia ditutup dengan demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman. Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada Allah, pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat (Shihab, 2009).

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat menyadarkan kita bahwasanya Allah Swt yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya, dapat menurunkan air hujan yang dibutuhkan makhluk hidup yang ada di bumi sehingga dapat menumbuhkan serta mengembangbiakkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, dan pada tumbuhan terdapat daun yang memiliki berbagai kandungan senyawa dimanfaatkan oleh manusia yang digunakan sebagai obat-obatan.

Adapun ayat yang lain surah Al-Imran ayat 190-191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ {190} الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ {191}

Terjemahannya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka". (Q.S Ali-Imran: 190-191).

Sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaanya juga dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur sepanjang tahun yang dapat kita rasakan langsung pengaruh panas matahari, dinginnya malam, dan pengaruhnya pada flora dan fauna, dan sebagainya merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan ke-Esaan Allah swt, kesempurnaan pengetahuan, dan kekuasaanya.

Dengan memikirkan pergantian siang dan malam mengikuti terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semua itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual secara akademis fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Allah tidaklah menciptakan fenomena itu sia-sia (Depkes, 2009).

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي
عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً
إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً". رواه البخاري

Artinya:

“Muhammad Ibnu Mutsanna berkata kepada kami dari Abu Ahmad Azubairi dari Umar Ibnu Sa’id bin Abi Husain berkata: berkata kepada saya Ata’ bin Abi Rabah dari sahabat Abi Hurairah RA dari Nabi Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya pula” (H.R. Al-Bukhari).

Berdasarkan hadis ini telah ditegaskan bahwa semua penyakit yang diturunkan oleh Allah Swt masing-masing memiliki obat sebagai penyembuh. Dengan adanya hadis dan penjelasan dalam Al-Qur’an maka hendaknya selalu

meyakini dan berusaha agar mencari dan mempelajari dalam penemuan obat baru untuk setiap penyakit.

Dari ayat dan hadis diatas maka dapat dipahami adanya perintah kepada manusia untuk memperhatikan bumi yang diartikan bahwa diperintahkan untuk menemukan dan meneliti kegunaan dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup yang dipergunakan salah satunya sebagai pengobatan yang merupakan anugerah dari Allah SWT. Dalam hal ini pemanfaatan tanaman nanas yang memiliki kandungan senyawa yang berpotensi sebagai anti jamur.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorium berdasarkan model penelitian yaitu *true experiment* masuk dalam *post test only control design*.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrobiologi.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Agustus-September 2022.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan penelitian analisis kualitatif.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian, sampel penelitian yang digunakan adalah kulit buah nanas (*Ananas comosus*),

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan adalah Autoklaf (*Hirayama*), batang pengaduk, bejana maserasi, bunsen, blender, cawan petri, cawan porselin, chamber (*Lamag*), Erlenmeyer, gelas ukur, gelas kimia, Inkubator (*Memmert*), kamera, Laminar Air Flow (LAF) (*ESCO*), lemari pendingin (*Modena*), Mangkok kaca, ose bulat, Oven (*Memmert*), sendok besi, sendok tanduk, tabung reaksi, toples kaca, pipet

mikro (*Socorex*), *rotary evaporator* (*Heidolph*), timbangan analitik (kern), water bath, dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu Air suling (*Aqua destillata for injeksi*), aluminium foil, biakan murni jamur *Candida albicans*, DMSO (*dimethyl sulfoxide*), ekstrak kulit buah Nanas (*Ananas comosus*), etanol 70%, kertas cakram, kertas saring, kapas, ketokonazol 2%, kertas perkamen, SDA (*Sabouraud Dekstro agar*), PDA (*Potato dekstrore Agar*).

E. Prosedur Kerja

1. Penyiapan Sampel

a. Pengambilan Sampel

Sampel kulit buah nanas (*Ananas comosus*), diambil dari Makassar, tepatnya di pasar Pabaeng-baeng.

b. Pengolahan Sampel

Sampel kulit buah nanas (*Ananas comosus*), dicuci dan dibersihkan dari kotoran yang melekat, kemudian dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan diudara terbuka tanpa terkena cahaya matahari langsung atau diangin-anginkan hingga kering.

c. Pembuatan Ekstrak

Simplisia Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus*), disiapkan sebanyak 500 g lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan cairan penyari etanol 70% hingga simplisia terbasahi seluruhnya bagian pelarut. Wadah maserasi ditutup dan disimpan. Selanjutnya didiamkan selama 3x24 jam. Hasil maserasi kemudian disaring dengan kertas saring. Filtrat dan ampas dipisahkan dalam wadah yang berbeda, ampas yang didapatkan dimaserasi kembali dengan menggunakan pelarut yang sama sebanyak 3 kali, proses ini dilakukan hingga

cairan penyari tidak dapat menarik senyawa yang terdapat dalam sampel atau telah jenuh. Seluruh filtrat yang telah didapatkan dikumpulkan dan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator, kemudian diangin-anginkan hingga kering dalam desikator. Ekstrak yang telah diperoleh kemudian ditimbang dan dicampurkan dengan DMSO 10%, kemudian dibuat dalam konsentrasi 5%, 10%, dan 15%.

d. Sterilisasi alat

Semua alat yang akan digunakan dalam penelitian ini harus disterilisasi terlebih dahulu sebelum digunakan.

2. Pembuatan Media Uji Mikroba

a). Pembuatan Medium Agar Miring

Ditimbang medium potato dextrose agar (PDA) sebanyak 0,78 g kemudian dilarutkan dengan aquadest sebanyak 20 ml menggunakan Erlenmeyer (39 g/ 1000 ml). setelah itu dihomogenkan dengan batang pengaduk diatas penangas air hingga mendidih dan diperoleh larutan jernih. Diambil medium sebanyak 5 ml dan dituang pada masing-masing tabung reaksi steril kemudian ditutup menggunakan aluminium foil. Media tersebut disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Kemudian dibiarkan pada suhu ruang selama ± 30 menit hingga media memadat pada kemiringan 30°. Media agar miring digunakan untuk inokulasi jamur.

b). Peremajaan dan inokulasi jamur uji

Isolat *Candida albicans* diambil dengan jarum ose steril kemudian ditanamkan pada media *potato dextrose agar* (PDA) dengan cara menggores secara zig-zag diatas permukaan medium agar miring, mulai dari ujung bagian bawah sampai ujung bagian atas. Lalu diinkubasi pada temperatur 37°C selama 18-24 jam, dan didapatkan koloni jamur.

c). Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2%

Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2% dengan cara ditimbang ketokonazol sebanyak 2 gram kemudian dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 8 ml lalu dihomogenkan.

d). Pembuatan kontrol negatif DMSO 10%

Pembuatan kontrol negatif DMSO 10% dengan cara dipipet DMSO sebanyak 10 ml dan dilarutkan dengan aquadest steril sebanyak 90 ml kemudian dihomogenkan.

e). Pembuatan media *sabouraud dextrose agar* (SDA)

Pembuatan media *sabouraud dextrose agar* (SDA) dilakukan dengan cara ditimbang *sabouraud dextrose agar* (SDA) sebanyak 3,25 gram kemudian dilarutkan dengan aquadest sampai 50 ml, suspensi yang dihasilkan kemudian dipanaskan hingga jernih. Campuran tersebut disterilisasi dalam autoklaf pada temperature 121°C selama ± 15 menit. Media dituang kedalam cawan petri steril masing-masing 10 ml secara aseptik, lalu diamkan hingga memadat.

f). Pembuatan media *Potato dextrose agar* (PDA)

Pembuatan media *Potato dextrose agar* (PDA) dilakukan dengan cara ditimbang *Potato dextrose agar* (PDA) sebanyak 1,95 gram, kemudian dilarutkan dengan aquadest sampai 50 ml suspensi yang dihasilkan kemudian dipanaskan hingga jernih. Campuran tersebut disterilisasi dalam autoklaf pada temperature 121°C selama ± 15 menit. Media dituang kedalam cawan petri steril masing-masing 10 ml secara aseptik, lalu diamkan hingga memadat.

3. Penentuan Aktivitas Sampel

Diambil tabung reaksi dari autoklaf yang berisi media *sabouraud dextrose agar* (SDA) dan media *Potato dextrose agar* (PDA) Sebanyak 10 ml kemudian dituang media pada masing-masing cawan petri steril, lalu didiamkan selama

beberapa menit hingga media memadat, setelah itu jamur uji diambil dengan menggunakan cotton swab lalu digoreskan diatas permukaan medium yang telah memadat secara merata, kemudian dicelupkan kertas cakram (*paper disc*) pada masing-masing konsentrasi (5%, 10% dan 15%), kontrol positif ketokonazol 2% dan kontrol negatif DMSO 10%, setelah itu diletakkan pada permukaan medium, lalu diinkubasi selama 3 kali 24 jam pada temperature 37°C, setelah itu hasil dibaca dengan cara mengukur diameter zona hambat pada media uji menggunakan jangka sorong. Diameter zona hambat yang terbentuk dibaca menurut tabel *The Clinical and Laboratory Standards Institute* (CLSI).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi kulit Nanas (*Ananas comosus*)

Simplisia Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus*), disiapkan sebanyak 500 g lalu dimasukkan ke dalam wadah maserasi, direndam dengan cairan penyari etanol 70% hingga simplisia terbasahi seluruhnya bagian pelarut, kemudian disaring dan diuapkan di evaporator, kemudian diperoleh ekstrak kental dilihat pada (tabel 1).

Tabel 1. Hasil maserasi ekstrak kulit Nanas (*Ananas comosus*).

Sampel	Pelarut	Berat Ekstrak
Kulit Nanas (<i>Ananas comosus</i>)	Etanol 70%	15 gram

2. Uji Aktivitas anti fungi ekstrak kulit nanas

Tabel 2. Kriteria Interpretasi Pengaruh dan Resistensi Aktivitas Antijamur menurut CLSI

Diameter zona hambat (mm)			
Lemah	Sedang	Kuat	Sangat Kuat
≤ 5 mm	5-10 mm	11-20 mm	≥ 20 mm

Parameter zona hambat menurut tabel CLSI pada kategori lemah ≤ 5 mm, kategori sedang 5-10 mm, kategori kuat 11-20 mm, dan kategori sangat kuat ≥ 20 mm.

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% kulit nanas terhadap jamur *Candida albicans* sebagaimana yang tercantum pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil pengujian aktivitas antijamur ekstrak etanol 70% kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap jamur *Candida albicans* pada medium PDA.

NO.	Nama Sampel	Hasil/Diameter			Kategori
		1	2	3	
1.	Ekstrak Kulit Nanas 5%	-	-	-	Tidak Menghambat
2.	Ekstrak Kulit Nanas 10%	-	-	-	Tidak Menghambat
3.	Ekstrak Kulit Nanas 15%	-	-	-	Tidak Menghambat
4.	Kontrol Positif Ketokonazol	-	-	-	Tidak Menghambat
5.	Kontrol Negatif DMSO	-	-	-	Tidak Menghambat

B. Pembahasan

Buah nanas mengandung sumber antioksidan seperti senyawa fenolik serta flavonoid, dimana memiliki potensi sebagai antikanker. Senyawa fenolik merupakan fitokimia dimana seluruh zat terbuat dari derivat senyawa fenol. Kandungan senyawa fenolik pada buah nanas berfungsi sebagai antioksidatif karena mengandung antioksidan, serta sebagai antikanker dan antiinflamasi (Widyanto dkk., 2020).

Nanas adalah tanaman yang memiliki buah yang banyak mengandung vitamin C, mineral, protein, karbohidrat, fosfor, kalori, zat besi, vitamin (A, B), kandungan magnesium, kalsium, natrium. Nanas mempunyai bagian yang bersifat

buangan yaitu kulit yang memiliki tekstur kasar/tidak rata dan terdapat duri kecil di permukaanya. Kulit buah nanas dibuang begitu saja sebagai limbah, padahal sebenarnya kulit nanas mengandung zat aktif diantaranya adalah antosianin, vitamin C, flavonoid, dan enzim bromelin (Putri dkk., 2021).

Untuk mengurangi limbah kulit nanas tersebut, pengolahan ke produk yang berharga menggunakan teknik yang ramah lingkungan sangat diperlukan. Kulit nanas banyak mengandung flavonoid dan bromelin. Selain itu kulit nanas mengandung senyawa tanin, oxalat, dan pitat. Flavonoid dapat menyebabkan penghambatan terhadap sintesis asam nukleat. Selain itu flavonoid juga menghambat metabolisme energi dari bakteri. Oleh karena itu flavonoid merupakan komponen antibakteri yang potensial.

Penelitian tentang aktivitas antifungi dari ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap pertumbuhan *Candida albicans* dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar dengan teknik kertas cakram (*paper disc*) dengan tujuan untuk menentukan potensi aktivitas antifungi ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap pertumbuhan *Candida albicans* penyebab keputihan. Pada penelitian ini, menggunakan *Sabouraud Dextrose Agar* (SDA) dan medium *Potato Dextrose Agar* (PDA) yang merupakan media pertumbuhan atau sumber nutrisi bagi pertumbuhan jamur uji (Malonda dkk., 2017; Onggo, 2015).

Kontrol positif yang digunakan pada penelitian ini yaitu ketokonazol 2%. Hal ini berdasarkan karena ketokonazol merupakan antijamur turunan imidazol yang berspektrum luas dan bersifat fungistatik, obat ini menghasilkan kadar plasma yang cukup untuk menekan aktivitas berbagai jenis jamur (Ganiswarna, 2016). Dari hasil yang didapatkan bahwa kontrol positif memiliki kategori zona

hambat sangat kuat pada pertumbuhan jamur *Candida albicans* dibandingkan dengan ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*). Juariah dkk., (2018) menyatakan bahwa ketokonazol sering digunakan sebagai antijamur. Mekanisme kerja ketokonazol dalam penghambatan pertumbuhan jamur dengan menghasilkan kadar plasma yang cukup untuk menekan aktivitas berbagai jenis jamur, melalui biosintesis ergosterol dalam sel jamur dengan menghambat enzim sitokrom P450 sehingga menyebabkan terganggunya sintesis ergosterol yang merupakan komponen penting dari membrane sel jamur.

DMSO 10% digunakan sebagai kontrol negatif karena untuk mengetahui pengaruh pelarut terhadap pertumbuhan jamur uji, sehingga dapat diketahui bahwa aktivitas yang ditunjukkan oleh ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) adalah zat yang terkandung dalam sampel, bukan berasal dari pelarut yang digunakan, selain itu DMSO merupakan pelarut organik dan tidak bersifat bakterisidal, selain itu pelarut ini dapat melarutkan hampir semua senyawa polar maupun nonpolar (Rianto, 2018). Dari hasil pengujian DMSO 10% pada penelitian ini tidak menunjukkan adanya zona hambat yang dihasilkan pada pertumbuhan jamur *Candida albicans* dibandingkan dengan ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) dan kontrol positif Ketokonazol 2%.

Hasil pengujian zona hambat pada *Candida albicans* menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) pada konsentrasi 5% memiliki kategori tidak menghambat, konsentrasi 10% kategori zona tidak menghambat, pada konsentrasi 15% kategori tidak menghambat, kontrol positif ketokonazol tidak menghambat dan kontrol negatif DMSO 10% tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap pertumbuhan jamur dikarenakan jamur *Candida albicans*

terkontaminasi.

Pada penelitian Yusuf dkk. (2022) menyatakan bahwa ekstrak etanol kulit nanas dengan konsentrasi 15% memiliki aktivitas antijamur *Candida albicans*. Penelitian yang dilakukan oleh Ekene dkk., (2021) bahwa ekstrak methanol dari kulit nanas pada jamur uji *Candida albicans* membentuk zona hambat sebesar $9 \pm 0,99$ mm. Aktivitas antifungi dari ekstrak etanol kulit nanas disebabkan adanya senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) salah satunya yaitu Bromelin. Bromelin berpotensi dalam menunjukkan aktivitas anti jamur (Wiyati & Tjitraresmi, 2018). Flavanoid pada kulit nanas berperan sebagai antioksidan yang berpotensi dalam memberikan perlindungan pada kulit nanas dari ancaman berbagai pertumbuhan jamur (Damogalad dkk., 2013).

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan aktivitas antijamur yang tidak menghambat pertumbuhan jamur *Candida albicans*. Hal ini diduga disebabkan karena adanya kontaminasi pada jamur uji *Candida albicans* yang digunakan. Kontaminasi diduga dapat disebabkan karena penyimpanan dan penggunaan alat sebelumnya yang kurang steril, serta kurangnya kualitas jamur uji yang menyebabkan tercampurnya kontaminasi (Aini dkk., 2018). Kontaminasi inilah yang menyebabkan tidak adanya zona bening (zona hambat) yang terbentuk pada sampel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) tidak memiliki aktivitas sebagai antifungi pada pertumbuhan jamur *Candida albicans* dikarenakan jamur yang digunakan terkontaminasi.

B. Saran

Diharapkan kepada penelitian selanjutnya untuk mengidentifikasi mikroba uji sebelum digunakan dan mengembangkan penelitian ini dengan pengujian ekstrak etanol kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap mikroorganisme jenis lain dan dengan konsentrasi yang berbeda maupun dengan metode yang lainnya. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat agar dapat lebih memanfaatkan kulit nanas sebagai pengobatan tradisional dibandingkan penggunaan obat-obat sintesis yang dapat mengakibatkan efek samping.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R., & Mardiyarningsih, A. (2018). Potensi minyak atsiri ratus vagina dengan kombinasi lengkuas merah (*Alpinia purpurata* K. Schum), kayu manis (*Cinnamomum burmanii* Blume) dan daun sirih hijau (*Piper bettle* L) sebagai antifungi terhadap *Candida albicans* secara in Vitro. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 13(4), 43-57.
- Akrinisa, J. A. M., Mp, S., & Arpah, M. (2019). Keragaman Morfologi Tanaman Nanas (*Ananas Comosus* (L) Merr) Di Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Agro Indragiri*, 4(1), 34-38.
- Anggraeni, S., Apridamayanti, P., & Nugraha, F. Penentuan Kadar Kalium Pada Kulit Pisang (*Musa paradisiaca* L.) dan Kulit Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr.) Sebagai Sumber Mikronutrien. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 5(1).
- Anwar, K., Istiqamah, F., & Hadi, S. (2021). Optimasi Suhu dan Waktu Ekstraksi Akar Pasak Bumi (*Eurycoma longifolia* Jack.) Menggunakan Metode RSM (response surface methodology) dengan Pelarut Etanol 70%. *Jurnal Pharmascience*, 8(1), 53-64.
- Destriana, R., Nurnaningsih, D., Alamsyah, D., & Sinlae, A. A. J. (2021). Implementasi Metode Linear Discriminant Analysis (LDA) Pada Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Nanas. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 3(1), 56-63.
- Elvansi, M. E., & Vifta, R. L. (2022). PENENTUAN KADAR FLAVONOID TOTAL EKSTRAK DAUN RAMBAI LAUT DENGAN VARIASI PELARUT EKSTRAKSI (*Sonneratia caseolaris* L.). *Indonesian Journal of Pharmacy and Natural Product*, 5(1), 12-18.
- Fajari, M. S. N. A., & Qurrohman, M. T. (2021). EFEKTIVITAS VARIASI KONSENTRASI TEPUNG TALAS SEBAGAI MEDIA ALTERNATIF PERTUMBUHAN JAMUR *Candida albicans*. *Journal of Indonesian Medical Laboratory and Science (JoIMedLabS)*, 2(2), 185-197.
- Hakim, L., & Ramadhian, M. R. (2015). Kandidiasis oral. *Jurnal Majority*, 4(9), 53-57.

- Husniah, I., & Gunata, A. F. (2020). Ekstrak Kulit Nanas sebagai Antibakteri. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 2(1), 85-90.
- Indrayanti, B. (2019). Pengaruh Larutan Bonggol Nanas (*Ananas Comosus* L. Merr) Dan Daun Sirih (*Piper Betle* L.) Dalam Menurunkan Jumlah Kuman Pada Peralatan Makan Bakso Gerobak. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika Dan Masyarakat*, 18(2), 160-165.
- Indrayati, S., & Sari, R. I. (2018). Gambaran *Candida albicans* Pada bak Penampung Air di Toilet SDN 17 Batu Banyak Kabupaten Solok. *JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal)*, 5(2), 133-138.
- Juariah, S., Irawan, M. P., & Yuliana, Y. (2018). Efektifitas Ekstrak Etanol Kulit Nanas (*Ananas Comosus* L. Merr) terhadap *Trichophyton mentagrophytes*. *JOPS (Journal Of Pharmacy and Science)*, 1(2), 1-9.
- Juariah, S., Melyanti, R., Irawan, M. P., Sukri, S., Marlida, Y., & Suharti, N. (2020). In Vitro Effect of Pineapple (*Ananas comosus* L. Mer) Core extract on Growth of *Candida albicans*. *Solid State Technology*, 63(5), 2203-2210.
- Khairani, K., Yulida, R., & Yusri, J. (2015). Analisis Usahatani Nenas di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Analysis Of Pineapple Farming In Kualu Nenas Village Sub-district Of Tambang Kampar Regency. *Jurnal Ilmiah Pertanian*, 11(2), 9-18.
- Lestari, P. E. (2015). Peran faktor virulensi pada patogenesis infeksi *Candida albicans*. *STOMATOGNATIC-Jurnal Kedokteran Gigi*, 7(2), 113-117.
- Lestiono, L., Kresnamurti, A., Rahmad, E., & Ansyori, M. R. (2020). Aktivitas analgesik ekstrak etanol bulu babi (*Echinometra mathaei*) pada Mencit putih jantan. *Journal of Herbal, Clinical and Pharmaceutical Science (HERCLIPS)*, 1(02), 6-11.
- Marhaeni, G. A. (2016). Keputihan pada wanita. *Jurnal Skala Husada: The Journal of Health*, 13(1).
- Maysaroh, S., & Mariza, A. (2021). Pengetahuan Tentang Keputihan Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 104-108.
- Melinda, T., Assegaf, S. N., Mahyarudin, M., & Natalia, D. (2019). Aktivitas anti jamur ekstrak etanol daun kesum (*Polygonum minus* Huds.) terhadap

- jamur Trichophyton mentagrophytes. *Majalah Kedokteran Andalas*, 42(3S), 48-56.
- Mutiawati, V. K. (2016). Pemeriksaan mikrobiologi pada *Candida albicans*. *Jurnal kedokteran syiah kuala*, 16(1), 53-63.
- Narti, S. (2021). Peningkatan Daya Hambat Daun Manukan (*Rhinacanthus Nasutus* (L) Kurz) Terhadap Jamur *Candida Albicans* Secara In Vitro. *JUMANTIKA (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(3), 270-276.
- Novilla, A., Nursidika, P., & Mahargyani, W. (2017). Komposisi asam lemak minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil) yang berpotensi sebagai anti kandidiasis. *EduChemia (Jurnal Kimia dan Pendidikan)*, 2(2), 161-173.
- Panjaitan, Z., Hafizah, H., Ginting, R. I., & Amrullah, A. (2021). Perbandingan Metode Certainty Factor dan Theorema Bayes dalam Mendiagnosa Penyakit Kandidiasis pada Manusia Menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA BUDIDARMA*, 5(3), 1097-1106.
- Putri, M. A., Purwati, E., & Safitri, C. I. N. H. (2021, August). Formulasi dan Uji Mutu Fisik Sabun Padat Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas comosus* L.). In *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* (Vol. 13, pp. 275-281).
- Putri, R. M. A., Yuanita, T., & Roelianto, M. (2019). Daya anti bakteri ekstrak kulit nanas (*Ananas comosus*) terhadap pertumbuhan bakteri *Enterococcus faecalis* Antibacterial potency of pineapple peel extract (*Ananas comosus*) on *Enterococcus faecalis* growth. *Conservative Dentistry Journal*, 6(2), 1-6.
- Rahmadina, R. (2021). Inventarisasi Jamur di Taman Hutan Raya (Tahura) Berastagi Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Klorofil: Jurnal Ilmu Biologi dan Terapan*, 5(1), 8-14.
- Rahmawati, I., Maulida, R., & Aisyah, S. (2021). Potensi Antibakteri Sediaan Sabun Cair Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas comosus* L. Merr.) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25923. *Jurnal Farmasi & Sains Indonesia*, 4(2), 1-11.
- Razak, A., & Lubis, M. (2020). Uji Efektivitas Daya Hambat Pertumbuhan Jamur Dermatofita Oleh Ekstrak Buah Nanas. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(4), 6-10.


- Razak, A., & Lubis, M. (2020). Uji Efektivitas Daya Hambat Pertumbuhan Jamur Dermatofita Oleh Ekstrak Buah Nanas. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 5(4), 6-10.
- Safitri, A. N., & Qurrohman, M. T. (2022). PERBANDINGAN PERTUMBUHAN JAMUR *Candida albicans* PADA MEDIA ALAMI JAGUNG, SINGKONG DAN UBI JALAR KUNING. *Journal of Indonesian Medical Laboratory and Science (JoIMedLabS)*, 3(2), 97-107.
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41-53.
- Sari, N. K. Y., Permatasari, A. A. A. P., & Sumadewi, N. L. U. (2019). Uji Aktivitas Anti Fungi Ekstrak Daun Kamboja Putih (*Plumeria acuminata*) Terhadap Pertumbuhan Jamur *Candida albicans*. *Jurnal Media Sains*, 3(1).
- Sari, R. I. P., & Zaini, E. (2022). Isolasi dan karakterisasi serbuk enzim bromelin dari batang nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr.): isolation and characterization of bromelin enzyme powder from Pineapple Stem (ANANAS COMOSUS (L.) MERR). *Medical Sains: Jurnal Ilmiah Kefarmasian*, 7(4), 751-758.
- Tania, P. O. (2020). Mekanisme Escape dan Respon Imun innate terhadap *Candida albicans*. *Jurnal Ilmiah Kedokteran Wijaya Kusuma*, 9(1), 60-76.
- Wahyuningsih, R. (2018). Pengaruh Daun Trembilungan (*Begonia hirtella* Link) Terhadap *Candida albicans*. *Jurnal Borneo Cendekia*, 2(1), 89-98.
- Waznah, U., Rahmasari, K. S., & Ningrum, W. A. (2021). Bioaktivitas Ekstrak Kulit Buah Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr.) dalam Sabun Cuci Piring sebagai Antibakteri terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*. *MPI (Media Pharmaceutica Indonesiana)*, 3(4), 227-234.
- Widyanto, R. M., Putri, J. A., Rahmi, Y., Proborini, W. D., & Utomo, B. (2020). Aktivitas Antioksidan dan Sitotoksisitas in vitro Ekstrak Metanol Buah Nanas (*Ananas comosus*) pada Sel Kanker Payudara T-47D. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 8(2), 95-103.
- Wiguna, M., Hardi, H., Dasrol, D., Silalahi, S. P., Hasan, M. A., Faradisty, A., & Mulyani, I. (2020, December). Pemanfaatan potensi lokal buah Nanas untuk meningkatkan perekonomian keluarga di Kecamatan Bangko

- Pusako Kabupaten Rokan Hilir. In *Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 2, pp. 471-477).
- Wiyati, P. I., & Tjitraresmi, A. (2018). Karakterisasi, Aktivitas Dan Isolasi Enzim Bromelin Dari Tumbuhan Nanas (*Ananas sp.*). *Farmaka*, 16(2).
- Yowandita, R. (2019). Pembuatan jelly Drink Nanas (*Ananas comosus* L) Kajian Tingkat Kematangan Buah Nanas dan Konsentrasi Penambahan Karagenan Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Organoleptik. *Jurnal Pangan dan Agroindustri*, 6(2).
- Yusuf, M., Alyidrus, R., Irianti, W., & Farid, N. (2020). Uji Aktivitas Antifungi Ekstrak Etanol Kulit Nanas (*Ananas comosus* (L.) Merr) Terhadap Pertumbuhan *Pityrosporum ovale* dan *Candida albicans* Penyebab Ketombe. *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar*, 15(2), 311-318.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur penelitian







Lampiran 2. Skema Proses Ekstraksi Sampel Kulit Nanas (*Ananas comosus*)

Lampiran 3. Pembuatan Media Uji

a. Pembuatan Medium Agar miring



b. Peremajaan dan inokulasi jamur uji**c. Pembuatan kontrol positif Ketokonazol 2%****d. Pembuatan kontrol negatif DMSO 10%**

e. Pembuatan media sabouraud dextrose agar (SDA)**f. Pembuatan media Potato dextrose agar (PDA)**

Media dituang kedalam cawan petri steril masing-masing 10 ml secara aseptik, didiamkan hingga memadat

Lampiran 4. Penentuan Aktivitas Sampel

Diambil tabung reaksi dari autoklaf yang berisi media sabouraud dextrose agar (SDA) dan Potato dextrose agar (PDA) Sebanyak 10 ml

Dituang media pada masing-masing cawan petri steril

Didiamkan selama beberapa menit hingga media memadat

Diambil jamur uji dengan menggunakan cotton swab lalu digoreskan diatas permukaan medium yang telah memadat secara merata

Kemudian dicelupkan kertas cakram (*paper disc*) pada masing-masing konsentrasi (5%, 10% dan 15%), kontrol positif ketokonazol 2% dan kontrol negatif DMSO 10%

Diletakkan pada permukaan medium

Setelah itu hasil dibaca dengan cara mengukur diameter zona hambat pada media uji menggunakan jangka sorong.

Diinkubasi selama 2 kali 24 jam pada temperatur 37°C



PERHITUNGAN DOSIS

A. Perhitungan Dosis Ekstrak Kulit Buah nanas

$$\text{Konsentrasi 5\%} = \frac{5 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} \times 10 \text{ ml} = 0,5 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Konsentrasi 10\%} = \frac{10 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} \times 10 \text{ ml} = 1 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Konsentrasi 15\%} = \frac{15 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} \times 10 \text{ ml} = 1,5 \text{ mg/ml}$$

$$\text{Ketokonazol 2\%} = \frac{2 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} \times 10 \text{ ml} = 0,2 \text{ mg/ml}$$

$$\text{DMSO 10\%} = \frac{5 \text{ ml}}{100 \text{ ml}} \times 100 \text{ ml} = 5 \text{ ml}$$

Lampiran 5. Gambar Penelitian

a. Preparasi Sampel dan Pembuatan Ekstrak



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

Keterangan :

- a. Sampel kulit Nanas (*Ananas comosus*)
- b. Sortasi kering atau pemotongan kecil-kecil sampel kulit Nanas (*Ananas comosus*)
- c. Proses Maserasi atau perendaman dengan cairan penyari etanol 70% selama 3x24 jam.
- d. Proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring.
- e. Proses penguapan menggunakan alat Rotary Evaporator
- f. Diperoleh ekstrak kental

B. Pembuatan Medium



(a)



(b)



(c)



(d)

Keterangan

- a. Penimbangan medium PDA dan
 - b. Medium PDA dilarutkan dengan aquadest steril
 - c. Medium PDA dipanaskan hingga jernih
 - d. Medium PDA dituang ke dalam cawan petri
- B. Pengujian aktivitas Ekstrak kulit nanas terhadap Jamur *Candida albicans*



(a)



(b)



(c)




(d)

Keterangan:


- a. Medium PDA diberikan jamur *Candida albicans*
- b. Paper Disk Blank direndam dengan ekstrak kulit nanas (*Ananas comosus*) dengan konsentrasi 10%
- c. Paper Disk Blank direndam dengan Kontrol Positif
- d. Paper Disk Blank diberikan ke Medium PDA yang bersisi jamur *candida albicans*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

C. Hasil Pengujian aktivitas Ekstrak kulit nanas terhadap Jamur *Candida albicans*



(a)



(b)



(c)

Keterangan:

- a. Medium PDA 1 yang berisi Jamur *Candida albicans* dan diletakkan Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%, Kontrol positif Ketokonazol, dan DMSO
- b. Medium PDA 2 yang berisi Jamur *Candida albicans* dan diletakkan Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%, Kontrol positif Ketokonazol dan DMSO
- c. Medium PDA 3 yang berisi Jamur *Candida albicans* dan diletakkan Paper disk yang berisi Ekstrak kulit nanas konsentrasi 5 %, 10%, 15%, Kontrol positif Ketokonazol dan DMSO

BIOGRAFI PENULIS



Asriani Hasil, akrab disapa RIA dilahirkan di Apoleang, 15 oktober 1997. Anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan bapak H.HASIL dan ibu Hj. SURIANI. Pendidikan dasar ditempuh di SDN 1 MOSSO pada tahun 2004 dan menyelesaikan pada tahun 2010, kemudian Pendidikan tingkat lanjut ditempuh di SMPN 1 Sendana pada tahun 2010 dan menyelesaikan pada tahun 2013. Pendidikan tingkat menengah (sederajat) ditempuhnya di SMAN 1 Sendana pada tahun 2013 dan menyelesaikan pada tahun 2016. Sekarang penulis merupakan salah seorang Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Itu merupakan suatu kesyukuran yang diberikan Allah SWT kepada penulis, semoga kesuksesan akan diraihinya kelak. Amin.