

**HUBUNGAN PERILAKU MAKAN DAN ASUPAN GIZI DENGAN  
KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADONGKO KECAMATAN BARRU 2022**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan  
Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar

**OLEH :**

**AYU ADIYANTI**

**70200117090**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Adiyanti  
Nim : 70200117090  
Tempat / Tgl Lahir : Takkalasi, 7 Juni 1998  
Jurusan / Peminatan : Kesehatan Masyarakat / Gizi  
Fakultas : Kedokteran dan ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Andi Tonro IV Nomor 14  
Judul : Hubungan Perilaku Makan Dan Asupan Gizi Dengan  
Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Posyandu Lansia  
Wilayah Kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru  
2022.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 16 Januari 2023  
Penyusun



Ayu Adiyanti  
NIM 70200117090

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Perilaku Makan dan Asupan Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lanjut Usia Wilayah Kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru 2022" yang disusun oleh Ayu Adiyanti, NIM: 70200117090, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Januari 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 16 Januari 2023  
23 Jumadil Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Yusmaidah Jayadi, S.Gz., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Prof. Dr. Muliati Amin, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Syarfaini, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing II : Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah SWT atas kehadiratnya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kami shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah SAW sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Hubungan Perilaku Makan dan Asupan Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru”** guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun kekurangan dalam skripsi ini merupakan keterbatasan dari penulis sebagai manusia dan hamba Allah SWT dimana kesempurnaan semata-mata hanyalah milik Allah Swt namun dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai usaha dan kerja keras yang telah penulis lakukan dan berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dengan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada ibunda tercinta Nasriah, wanita yang paling sabar dan tidak pernah kenal Lelah, do'a yang tidak pernah putus, serta saudaraku dan keluarga besarku dengan tulus mendoakan memberikan dukungan dari segi moril dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, MA,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Djalauddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Dr. Hj Gemy Nesity Handanyani., S.Si., M. Si., Apt selaku Wakil Dekan I, Dr. H. M.Fais Satrianegara, SKM., MARS selaku Wakil Dekan II, serta Prof. Dr.Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


3. Abd. Majid Hr. Lagu, SKM., M. Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Sukfitriany Syahrir, SKM., M. Kes, selaku sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Hj. Syarfaini, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing I dan Irviani, SKM., M.Kes selaku Dosen Pembimbing II dengan telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yusmaindah Jayadi, S.Gz., M.kes selaku Dosen Penguji Kompetensi dan Prof. Muliati Amin, M. Ag selaku Dosen Penguji Integrasi Keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Prodi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses studi. Serta segenap staf Tata Usaha di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang banyak berjasa dalam proses penyelesaian administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Puskesmas Padongko Barru dan para petugas Posyandu Lansia yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selamamelakukan penelitian.
8. Teristimewa kepada keluarga besar penulis, Suryadi dan Surianti selaku Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan memberikan kasih sayang kepada penulis mulai dari kecil sampai sekarang. Fitri Aulia selaku sepupu penulis yang telah memberikan dukungan, semangat serta perhatian kepada penulis. Tanpa cinta dari keluarga mungkin skripsi ini tidak dapat diselesaikan.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat,terkhusus peminat Gizi 2017, teman-teman PBL serta teman-teman seperjuangan KKN angkatan 65 yang mengabdikan di Kabupaten Barru yang telah memberikan semangat, kritik dan saran serta dukungan kepada penulis.
10. Teman seperjuangan skripsi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang penulis lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, penulis menghaturkan doa kepada Allah Swt semoga diberikan balasan olehnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin Yarabba Alaamiin.

Gowa, 16 Januari 2023

Penulis



( Ayu Adiyanti )

UNIVERSITAS ISLAM NE  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Hipotesis.....	6
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	17
G. Manfaat Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hipertensi .....	19
B. Tinjauan Umum Lanjut Usia.....	29
C. Tinjauan Umum Asupan Gizi .....	31
D. Tinjauan Umum Perilaku Makan .....	33
E. Metode Pengukuran Konsumsi Pangan .....	36
F. Kerangka Teori.....	38
G. Kerangka Konsep.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Lokasi Penelitian .....	40

B. Desain Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel .....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrument Penelitian .....	42
F. Teknik Pngolahan Data .....	42
G. Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan.....	58
C. Keterbatasan Penelitian.....	69
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b>	Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	8
<b>Tabel 1.2.</b>	Kajian Pustaka .....	16
<b>Tabel 2.1.</b>	Klasifikasi Tekanan Darah pada Usia Dewasa .....	30
<b>Tabel 2.2.</b>	Kategori Ambang Batas IMT untuk Indonesia .....	36
<b>Tabel 2.3.</b>	Klasifikasi Usia Lansia Menurut WHO .....	40
<b>Tabel 2.4.</b>	AKG Lansia.....	43
<b>Tabel 2.5.</b>	Jumlah Bahan Makanan Rata-Rata Sehari .....	44
<b>Tabel 2.6.</b>	Makanan yang Tidak Dianjurkan Oleh Pendertia Hipertensi .....	45
<b>Tabel 2.7.</b>	Makanan yang Dianjurkan Oleh Pendertia Hipertensi .....	46
<b>Tabel 4.1.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin.....	59
<b>Tabel 4.2.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Umur.....	59
<b>Tabel 4.3.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori IMT.....	60
<b>Tabel 4.4.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Hipertensi.....	60
<b>Tabel 4.5.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Pengetahuan.....	61
<b>Tabel 4.6.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Sikap.....	61
<b>Tabel 4.7.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kategori Praktik.....	62
<b>Tabel 4.8.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Energi.....	62
<b>Tabel 4.9.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Lemak.....	63
<b>Tabel 4.10.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Karbohidrat.....	63
<b>Tabel 4.11.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Serat.....	64
<b>Tabel 4.12.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Asupan Natrium.....	65
<b>Tabel 4.13.</b>	Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Pengertaahuan dengan Hipertensi Lansia .....	65

<b>Tabel 4.14.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Sikap dengan Hipertensi Lansia . . . . .	66
<b>Tabel 4.15.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Praktik dengan Hipertensi Lansia . . . . .	67
<b>Tabel 4.16.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Asupan Energi dengan Hipertensi Lansia . . . . .	68
<b>Tabel 4.17.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi Lansia . . . . .	69
<b>Tabel 4.18.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi Lansia . . . . .	70
<b>Tabel 4.19.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Asupan Serat dengan Hipertensi Lansia . . . . .	71
<b>Tabel 4.20.</b> Distribusi Frekuensi Berdasarkan Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi Lansia . . . . .	72

## ABSTRAK

**Nama : Ayu Adiyanti**

**Nim : 70200117090**

**Judul Skripsi : Hubungan Perilaku Makan dan Asupan Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.**

---

Hipertensi merupakan penyakit yang mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat dan menjadi faktor pemicu penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, dan lain-lain yang saat ini menjadi momok penyebab kematian nomor satu di dunia. Menurut model rancangan status gizi lansia, diduga lansia yang telah didiagnosa hipertensi terjadi karena kurangnya kesadaran dalam memperoleh status gizi yang seimbang. Analisis faktor terhadap perilaku makan lansia di posyandu lansia Kelurahan Sumpang Binangae secara umum ada pada level kurang dengan rata-rata 1,29 dari skala empat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku makan dan asupan gizi terhadap kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lanjut usia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan analitik dan desain *cross sectional*. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia yang memeriksakan kesehatannya di Posyandu Lansia di wilayah kerja Puskesmas Padongko Kabupaten Barru. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik proporsional sampling, dengan jumlah sampel yang didapat adalah 49 lansia.

Data dianalisis dengan menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan ( $p=0.663$ ), sikap ( $p=0.708$ ), praktik ( $p=0.203$ ), asupan energi ( $p=0.224$ ), asupan lemak ( $p=0.150$ ), asupan karbohidrat ( $p=0.579$ ) dan asupan serat ( $p=0.232$ ) dengan kejadian hipertensi pada lansia. Sedangkan pada asupan natrium, terdapat hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia ( $p=0.029$ ). Pencegahan dan penanggulangan hipertensi pada lansia dapat dilakukan dengan memperhatikan asupan makanan baik kuantitas maupun kualitas gizinya, melakukan kegiatan fisik atau olahraga, dan mengelola stress dengan baik.

**Kata Kunci:** Hipertensi, Lansia, Perilaku Makan, Asupan Gizi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Pada penurunan angka kelahiran hidup dan peningkatan usia harapan hidup menyebabkan jumlah lansia di dunia membumbung tinggi. Hipertensi atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit tekanan darah tinggi adalah keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal. Seseorang dinyatakan mengalami penyakit hipertensi bila tekanan sistolik mencapai di atas 140 mmHg dan tekanan diastolik di atas 90 mmHg (Adriani & Wirjatmadi, 2012). Menurut data gambaran Usaha Harapan Hidup (UHH) adanya peningkatan setiap tahunnya dan diperkirakan terjadinya peningkatan perbandingan pada lanjut usia di dunia, dengan persentase 67,7% di tahun 2010 hingga 71,9% di tahun 2025. Seiring bertambahnya usia, tekanan darah semakin bertambah, karena pembuluh darah dapat mengalami penebalan yang akan menyebabkan pembentukan kolagen pada lapisan otot. Hal inilah yang bisa membuat pembuluh darah menyempit dan menjadi kaku, pada akhirnya tekanan darah pada lanjut usia semakin tinggi dan saat di atas umur 60 tahun, dengan prevalensi 60% hingga 80% dari jumlah lansia, kemudian diperkirakan dua dari tiga lansia dapat memicu hipertensi (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2018, satu miliar orang di penjuru dunia menderita hipertensi pada tahun 2018 dan diperkirakan 7,5 juta orang meninggal, terhitung sekitar 12,8% dari semua kematian yaitu akibat hipertensi (WHO, 2018). Menurut *American Heart Association* (AHA) yang dikutip dalam penelitian

(Langingi, 2021) yaitu sepertiga orang dewasa telah menderita hipertensi, bahkan dapat diperkirakan akan selalu meningkat 7,2% atau sekitar 83,5 juta orang di tahun 2030.

Menurut WHO *South East Asia Region*, diperkirakan 30% penduduk di Asia menderita hipertensi, dimana salah satunya adalah Indonesia yang prevalensinya lebih tinggi dibandingkan dengan negara Asia lainnya (WHO, 2018). Menurut Depkes RI di tahun 2013, menyebutkan bahwa pada daerah Asia Tenggara terdapat 36% dewasa yang mengidap penyakit hipertensi dan 1,5 juta orang per tahunnya terbunuh oleh hipertensi. Dibandingkan dengan data Riskesdas 2018, prevalensi Penyakit Tidak Menular menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Menurut Riskesdas di tahun 2018, hipertensi yang terjadi di Indonesia yang diketahui melalui pengukuran pada usia  $\geq 18$ , dari 34,1% yang telah didiagnosis oleh dokter berjumlah 8,36%. Sedangkan prevalensi hipertensi menurut jenis kelamin, pada laki-laki sebanyak 31,34% dan perempuan sebanyak 36,85%, serta di daerah perkotaan 34,43% sedangkan pedesaan 33,72% (Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan, 2018).

Dalam Riskesdas tahun 2018, provinsi Sulawesi Selatan telah diperoleh diagnosa dokter dan minum obat anti hipertensi yang memiliki prevalensi sebesar 7,22% pada penduduk usia  $\geq 18$  tahun dan menurut hasil intervensi dengan prevalensi warga usia  $\geq 18$  tahun yaitu sebanyak 31,68%. Sedangkan prevalensi hipertensi di Kabupaten Barru berdasarkan diagnosa oleh dokter atau minum obat anti hipertensi memiliki perbandingan prevalensi sebesar 33,59% yang didominasi oleh penduduk usia  $\geq 18$  tahun (Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan,

2018). Pada tahun 2019, penyakit hipertensi ini menduduki peringkat 10 besar dalam penyakit terbanyak di Puskesmas Padongko (Dinas Kesehatan Kabupaten Barru, 2019).

Hipertensi pada lanjut usia sebagian besar merupakan Hipertensi Sistolik Terisolasi (HST), meningkatnya tekanan sistolik menyebabkan besarnya kemungkinan timbulnya kejadian stroke dan infark myocard bahkan walaupun tekanan diastoliknya dalam batas normal (*isolated systolic hypertension*) (Erwin dalam Kadulli, 2012). Menurut (Udjianti, 2011) yang dikutip dalam penelitian (Ernawati, 2016), pemeriksaan penunjang untuk pasien hipertensi atas dampak yang terjadi dapat dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium seperti cek kadar glukosa, urinalisa (mengetahui protein dalam urine, darah dan glukosa), kadar kolesterol atau trigliserida dan asam urat. Lalu, ada pula pengecekan berupa EKG untuk menilai adanya hipertrofi miokard, pola strain, gangguan konduksi atau disritmia dan photo dada yaitu untuk menunjukkan destruksi klasifikasi pada area katup, pembesaran jantung.

Menurut (Kartika, 2011) yang dikutip dalam penelitian (Fitri, 2015) penatalaksanaan non farmakologis yang berperan dalam keberhasilan penanganan hipertensi adalah dengan memodifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup yang dianjurkan dalam penanganan hipertensi antara lain mengurangi berat badan bila terdapat kelebihan ( $BMI \geq 27$ ), diet rendah kalori dianjurkan bagi orang dengan kelebihan berat badan atau obesitas yang berisiko menderita hipertensi, olahraga dan aktifitas fisik, mengurangi asupan garam, diet rendah lemak jenuh, diet tinggi serat, tidak merokok, istirahat yang cukup.

Salah satu faktor risiko tekanan darah tinggi adalah gaya hidup, termasuk perilaku makan dan asupan gizi. Pengertian dari perilaku makan itu sendiri merupakan suatu aktivitas yang menghubungkan manusia dan makanan. Apa yang dimaksud dengan makanan tidak selalu terkait dengan jumlah serta jenis makanan saja, tetapi juga perasaan dan kecenderungan yang akan muncul di sekitar makanan. Perilaku makan dipisahkan menjadi informasi atau pengetahuan, mentalitas (sikap), dan praktik yang spesifik terhadap makanan dan komponen yang terkandung di dalamnya (penerimaan suplemen), penanganan makanan, dan sebagainya (Benaroch et al., 2011).

Menurut (Mulyati, 2012) yang dikutip dalam penelitian (Ilham et al., 2019), asupan zat gizi lansia baik mikro maupun makro dapat mempertahankan gizi yang seimbang dimana ada keterkaitannya untuk mencegah kerusakan fungsi organ. Asupan makanan ini diharapkan dapat menutupi kebutuhan dan kondisi gizi pada lansia dengan membiasakan diri menjaga pola makan yang baik, menjauhi pola makan yang buruk seperti mengonsumsi makanan yang kaya akan kolesterol, alkohol, mempertahankan kesehatan dan menunda datangnya penyakit seperti penyakit hipertensi, jantung koroner, dan diabetes melitus akibat obesitas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan (Kartiningrum, 2018), dapat disimpulkan bahwa sebanyak 33 orang diambil sebagai sampel, terdapat 54,5% responden yang perilaku makannya tidak baik, dan 60,6% responden didiagnosa mengalami hipertensi. Hasil dari regresi logistik tersebut menunjukkan perilaku makan sangat memiliki pengaruh terhadap kejadian hipertensi. Pada lansia dengan perilaku makan yang tidak baik bisa saja terkena penyakit hipertensi dengan 5,25 kali lebih berisiko daripada lansia dengan perilaku makan yang baik. Berdasarkan uraian

tersebut, apabila lansia memiliki perilaku makan cenderung tidak baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatannya. Maka dari itu, lansia juga harus memiliki bekal seperti pengetahuan, sikap, dan tindakan dalam mengkonsumsi makan bergizi. Hal ini juga akan mempengaruhi nutrisi dan zat gizi yang akan masuk ke dalam tubuh lansia yang bertujuan untuk proses peningkatan kualitas hidup dan penuaan yang sehat.

Berdasarkan hasil survei lokasi pada tanggal 8 April 2021 dan peta faktor determinan status gizi lansia di posyandu lansia Kelurahan Sumpang Binangae, terdapat gambaran faktor determinan yaitu karakteristik, status kesehatan, perilaku dan konsumsi pangan pada lansia. Keadaan status kesehatan Posyandu Lansia mempunyai jenis penyakit umum yang cukup menonjol, salah satunya yaitu hipertensi. Menurut model rancangan status gizi lansia, diduga lansia yang telah didiagnosa hipertensi terjadi karena kurangnya kesadaran dalam memperoleh status gizi yang seimbang. Analisis faktor terhadap perilaku makan lansia di posyandu lansia Kelurahan Sumpang Binangae secara umum ada pada level kurang dengan rata-rata 1,29 dari skala empat. Artinya, perilaku makan yang ditunjukkan oleh lansia terutama terhadap jenis makanan, porsi makan, dan pengetahuan pola makan, hanya sekitar 47% dari sikap yang diharapkan (Data Status Gizi Posyandu Lansia, 2019).

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, peneliti merasa perlunya melakukan penelitian yang berhubungan dengan perilaku makan dan asupan gizi terhadap usia lanjut di Kelurahan Sumpang Binangae, Kabupaten Barru. Praktik perilaku makan dan asupan gizi yang kurang diperhatikan oleh masyarakat di daerah ini dapat menjadi faktor pendukung terjadinya hipertensi pada lansia. Analisis tersebut secara kuantitatif sangat jelas dalam perilaku makan dan asupan gizi.

Sebagaimana telah dikemukakan hasil analisis sebelumnya, maka peneliti



bermaksud ingin mengetahui “Hubungan perilaku makan dan asupan gizi dengan kejadian hipertensi pada lanjut usia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru 2022”

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Apakah ada hubungan antara perilaku makan dan asupan gizi dengan kejadian hipertensi pada lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru?”

### ***C. Hipotesis***

#### 1. Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Terdapat atau adanya hubungan antara asupan gizi dan perilaku makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.

#### 2. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak terdapat hubungan antara asupan gizi dan perilaku makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.

*D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif*

**Tabel 1.1**  
**Tabel Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

No.	Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kreteria Objektif	Jenis Data
1	Kategori umur lansia	Lama hidup responden dalam tahun sampai dilakukan penelitian	Kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usia pertengahan/pra lansia (<i>middle age</i>) : 45-59 tahun</li> <li>2. Lanjut usia (<i>ealderly</i>) : 60-74 tahun</li> <li>3. Lanjut usia tua (<i>old</i>) : 75-90 tahun</li> <li>4. Usia sangat tua (<i>very old</i>) : &gt; 90 (WHO, 2013)</li> </ol>	Nominal

Asupan Gizi					
2.	Tingkat konsumsi karbohidrat, <i>energy</i> , lemak, dan serat.	Jumlah penggunaan <i>energy</i> , karbohidrat, lemak, dan serat normal sehari-hari didapat dari transformasi jumlah makanan yang dikonsumsi responden setiap hari (per hari). Diperkirakan hal ini menggunakan teknik <i>food recall</i> 24 jam lalu dibandingkan dengan nilai % dari AKG.	<i>Food Recall</i> 24 Jam (2 kali dalam sepekan, <i>week day</i> dan <i>weekend</i> )	Klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi empat dengan cut of points masing-masing sebagai berikut: Baik: $\geq 100\%$ Sedang: 80-99% Kurang: $< 80\%$ (Supriasa, <i>et al.</i> , 2002)	Ordinal
3.	Tingkat konsumsi natrium	Jumlah penggunaan natrium yang normal untuk sehari-hari didapat dari transformasi jumlah makanan yang dikonsumsi responden setiap hari (per hari). Diperkirakan hal ini memakai teknik <i>food recall</i> 24 jam lalu dibandingkan dengan nilai % dari AKG.	<i>Food Recall</i> 24 Jam (2 kali dalam sepekan, <i>week day</i> dan <i>weekend</i> )	a. Cukup : bila asupan natrium = 2400 magNa/hari b. Kurang : bila asupan natrium $< 2400$ magNa/hari c. Lebih : bila asupan natrium $> 2400$ magNa/hari (Almatsier, 2005)	Ordinal

<b>Perilaku Makan</b>					
4.	Sikap dan praktik terhadap makanan sehat dan bergizi	Suatu respon yang dilakukan oleh seseorang terhadap makanan, meliputi sikap, praktik, pengolahan makanan, serta unsur-unsur yang terkandung dalam makanan tersebut (zat gizi).	Kuesioner	<p>Sikap dan praktik terhadap makanan dapat dikategorikan apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Positif : jika skor responden nilai <math>T \geq \text{mean } T</math>.</li> <li>2. Negatif : jika skor responden mempunyai nilai <math>T \leq \text{mean } T</math> (Azwar, 2011)</li> </ol> <p>Jumlah skor ideal yang diperoleh :</p> <p>Pernyataan positif:</p> <p>S = 4 SS = 3 TS = 2 STS = 1</p> <p>Pernyataan negatif</p> <p>S = 1 SS = 2 TS = 3 STS = 4</p>	Nominal

5.	Pengetahuan terhadap makanan sehat dan bergizi	Untuk mengukur sejauh mana pengetahuan responden terhadap makanan bergizi melalui angket dengan memberikan pertanyaan kepada responden terhadap materi yang ingin diukur.	Kuesioner	<p>Pengetahuan makan bisa dikategorikan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tingkat pengetahuan makannya tinggi apabila skor total 7-10.</li> <li>Tingkat pengetahuan makannya rendah apabila skor total 1-3.</li> </ol> <p>Pemberian skor sebagai berikut (Azwar, 2011):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Skor 0 adalah jawaban salah.</li> <li>Skor 1 adalah jawaban benar.</li> </ol>	Nominal
<b>Dependen</b>					
6.	Tekanan darah tinggi (hipertensi)	Apabila seseorang dikatakan hipertensi apabila tekanan darah sistolik $\geq 140$ mmHg atau tekanan darah diastolik $\geq 90$ mmHg.	Tensimeter digital	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seseorang dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistolik nya <math>\geq 140</math> mmHg atau lebih, dan diastolik nya <math>\geq 90</math> mmHg atau lebih.</li> <li>Seseorang tidak terkena hipertensi jika tekanan darah diastolik nya <math>&lt; 140</math> mmHg dan tekanan diastolik nya <math>&lt; 90</math> mmHg ( JNC VII dalam Smeltzer, 2013).</li> </ol>	

*E. Kajian Pustaka*

**Tabel 1.2**  
**Tabel Kajian Pustaka**

No.	Peneliti/Penulis	Judul	Publikasi	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Dezi Ilham, Harleni Harleni, Siska Ratu Miranda	Hubungan Asupan Gizi dan Pola Makan dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Puskesmas Lubuk Buaya Padang	Volume 2 Nomor 1, Tahun 2019	Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan status gizi, pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2019.	Metode penelitian ini bersifat analitik dengan <i>desain cross sectional</i> , di laksanakan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang dari bulan Desember 2018 sampai bulan Juli 2019.	Tidak ada hubungan asupan gizi dengan kejadian hipertensi. Diketahui ada hubungan pola makan lemak dengan kejadian Hipertensi. Diketahui ada hubungan pola makan natrium dengan kejadian Hipertensi. Diketahui tidak ada hubungan pola makan kalium dengan kejadian Hipertensi pada lansia di wilayah kerja puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2019.
2.	Deborah Simamora, Martha Irene Kartasurya,	Hubungan Asupan Energi, Makro dan	Volume 6, Nomor 1, Januari 2018	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui	Besar sampel dalam penelitian ini adalah	Ada hubungan asupan lemak dengan

	Siti Fatimah Pradigdo.	Mikronutrien Dengan Tekanan Darah pada Lanjut Usia (Studi di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Wening Wardoyo Ungaran, Tahun 2017)	(ISSN: 2356-3346)	hubungan antara asupan energi, makro dan mikronutrien dengan tekanan darah pada lanjut usia kabupaten minahasa tahun 2020.	26 lansia dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> .	tekanan darah sistolik dan diastolik pada lanjut usia. Tidak ada hubungan asupan energi, asupan natrium, asupan kalsium, dan asupan magnesium dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pada lanjut usia.
3.	Anggun A. Manawan, A. J. M. Rattu, Maureen I. Punuh.	Hubungan Antara Konsumsi Makanan Sumber Karbohidrat, Lemak, dan Natrium dengan Kejadian Hipertensi di Desa Tandengan Satu Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa	Vol. 5 No. 1 Februari 2016	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara konsumsi makanan sumber karbohidrat, lemak, dan natrium dengan kejadian hipertensi di Desa Tandengan Satu Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa	Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> dengan besar sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 94 orang.	Berdasarkan hasil analisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi, yaitu tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi yaitu terdapat hubungan antara asupan lemak

						dengan kejadian hipertensi. Berdasarkan hasil analisis hubungan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi terdapat hubungan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi.
4.	Istiqamah, Ari Widyarni, Siska Dhewi	Hubungan Pengetahuan dan Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021	Volume 3, Nomor 1, Juni 2018	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja UPT Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.	Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pra lansia yang berkunjung pada poli umum pada bulan Januari-April tahun 2021 sebanyak 577 pra lansia dan jumlah sampel penelitian 85 responden. Teknik pengambilan sampel accidental sampling.	Ada hubungan pengetahuan (p-value=0,001) dan pola makan (p-value=0,001) dengan kejadian hipertensi pada lansia di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Marabahan Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021.
5.	Mohammad Lutfi, Luluk Fauziyah. J, Alvin Abdillah	Hubungan Antara Diet Tinggi Serat dengan Derajat	Volume 5, Nomor 5, Agustus 2019	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status	Jumlah populasinya 57 responden, sampel penelitiannya	Hasil penelitian menunjukkan diet tinggi serat cukup



		Hipertensi pada Lansia di wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Bangkalan		gizi dengan derajat hipertensi pada lansia.	adalah 50 responden. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, instrumen yang digunakan adalah kuesioner diet tinggi serat dan lembar observasi.	dengan derajat hipertensi berat. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p value $(0,001) < \alpha (0,05)$ artinya hubungan antara diet tinggi serat dengan derajat hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Bangkalan
6.	Frida Saragih, Flora Sijabat, Sri Dearmaita Purba, Gita Sonia Sianturi, Monika Ginting	Hubungan pengetahuan dan Sikap Lansia Dengan Pencegahan Hipertensi Di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai	Volume 5, Nomor 1 April, Tahun 2021	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap lansia dengan pencegahan hipertensi di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai 2019.	Jenis penelitian yaitu deskriptif korelasi dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah semua lansia di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai yang berjumlah 178. Pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive Sampling	Hasil uji statistik menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dan sikap lansia dengan pencegahan hipertensi di UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai dengan p value 0.000. Berdasarkan penelitian ini bahwa jika pengetahuan dan sikap lansia baik akan mempengaruhi pencegahan

					sehingga sampel menjadi 35 orang.	hipertensi dengan baik juga.
7.	Asrinawaty, Norfai	Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Hipertensi Lansia Di Posyandu Lansia Kakaktua Wilayah Kerja Puskesmas Pelambuan	Vol 1 No.1, Juni 2014	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan status gizi dengan kejadian hipertensi lansia di posyandu lansia wilayah kerja puskesmas pelambuan tahun 2013.	Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan pendekatan <i>Cross Sectional</i> . Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien lansia sebanyak 60 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah <i>Stratified sampling random</i> .	Berdasarkan uji statistik yang dilakukan terdapat hubungan yang bermakna antara status gizi dengan kejadian hipertensi lansia ( $p = value = 0,031$ ). Nilai $p value < 0,05$ sehingga $H_0$ ditolak yang artinya ada hubungan antara status gizi dengan kejadian hipertensi lansia.
8.	Dezi Ilham, Harleni Harleni, Siska Ratu Miranda	Hubungan Status Gizi, Asupan Gizi Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Lubuk Buaya Padang	Vol. 2 No. 1 Tahun 2019	Tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan status gizi, pola makan (natrium, lemak, kalium) dan riwayat keluarga dengan kejadian	Metode penelitian ini bersifat analitik dengan Desain <i>Cross Sectional</i> , di laksanakan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya Padang dari bulan Desember	Hasil penelitian diketahui (62,7%) mengalami hipertensi, (47,5%) memiliki status gizi lebih, sebagian besar (76,3%) lansia asupannya lemak sering, (78,0%)

			<p>hipertensi pada lansia di wilayah kerja puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2019.</p>	<p>2018 sampai bulan Juli 2019. Populasi penelitian adalah lansia hipertensi usia <math>\geq 60-74</math> tahun sebanyak 271 orang dengan sampel 59 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik <i>simple random sampling</i>.</p>	<p>memiliki pola makan natrium sering, (83,1%) memiliki pola makan kalium sering, dan (66,1%) memiliki riwayat pada keluarga. Ada hubungan asupan makan lemak, asupan makan natrium dan riwayat keluarga dengan kejadian Hipertensi di wilayah kerja puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2019. Tidak ada hubungan status gizi dan pola makan kalium wilayah kerja puskesmas Lubuk Buaya Padang tahun 2019.</p>
--	--	--	---	--	---

Pada hasil penelitian di atas, untuk menganalisis relevansi penelitian yang terdahulu, peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. Relevansi tersebut menyangkut tujuan, serta fokus variabel independen yaitu perilaku makan dan asupan gizi. Pada penelitian di atas, tidak berfokus pada kedua hal tersebut, dan hanya meneliti salah satu variabel tersebut dengan status gizi saja. Selain itu terdapat perbedaan yaitu pada kriteria sampel dimana peneliti kali ini mengambil seluruh sampel untuk dijadikan responden, sedangkan penelitian di atas terdapat kriteria umur yang akan dijadikan sebagai responden.

#### ***F. Tujuan Penelitian***

##### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui hubungan asupan gizi dan perilaku makan terhadap kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lanjut usia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru 2022.

##### **2. Tujuan Khusus**

- a. Mendeskripsikan persentase perilaku makan asupan gizi terhadap hipertensi pada lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.
- b. Mendeskripsikan persentase asupan gizi terhadap hipertensi pada lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.
- c. Menganalisis hubungan perilaku makan terhadap hipertensi pada lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.
- d. Menganalisis hubungan asupan gizi terhadap hipertensi pada lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru.

#### ***E. Manfaat Penelitian***

Agar tercapainya tujuan di atas, maka diharapkan mendapatkan manfaat, sebagai berikut:

### **1. Manfaat bagi Peneliti**

Menerapkan pengetahuan yang diperoleh di universitas dan berkontribusi dengan pengetahuan dan pengalaman ilmiah.

### **2. Manfaat bagi Institusi**

Penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat digunakan sebagai landasan dalam menjaga status kesehatan lansia, khususnya hipertensi.

### **3. Manfaat bagi Masyarakat**

Penelitian ini nantinya bisa bermanfaat untuk pengetahuan dan informasi bagi masyarakat khususnya untuk lansia agar selalu menjaga pola makan dan makan makanan yang bergizi seimbang serta mencegah terjadinya hipertensi, khususnya pada lansia.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### *A. Tinjauan Teori Terkait Hipertensi*

##### **1. Pengertian Hipertensi**

Hipertensi yang terjadi pada lanjut usia, sebagian besar adalah HST atau hipertensi sistolik terisolasi dan pada umumnya merupakan hipertensi primer. Hipertensi HST maupun kombinasi sistolik dan diastolik merupakan suatu faktor risiko morbiditas serta mortalitas bagi seorang lansia. Faktor utama dari hipertensi pada lansia dapat berdampak pada kejadian gagal jantung, stroke, dan penyakit koroner, di mana peran tersebut dapat diperkirakan sangat berpengaruh dan lebih besar dampaknya dibandingkan pada seseorang dengan umur lebih muda (Martin dalam Kuswarhani, 2006).

Dapat pula diartikan hipertensi, yaitu jika tekanan darah di pembuluh darah meningkat secara kronis karena jantung memompa lebih keras untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh serta oksigen. Pada penetapan kasus hipertensi, kriteria yang diambil pada penetapan khusus ini merujuk pada kriteria diagnosis oleh JNC (*Joint National Committee*) VII 2003, yaitu hasil pengukuran tekanan darah sistolik  $\geq 140$  mmHg atau tekanan darah diastolik  $\geq 90$  mmHg. Kriteria JNC VII 2003 hanya berlaku untuk umur  $\geq 18$  tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

##### **2. Patofisiologi Hipertensi**

Dalam hal patofisiologi yang menangani penyempitan serta pelepasan pembuluh darah ini terletak di fokus vasomotor, tepatnya di medula otak. Dimulai oleh neuron saraf simpatis dari fokus vasomotor, berjalan melalui sumsum tulang belakang, kemudian pada saat itu meninggalkan sumsum tulang belakang ke ganglia simpatis di dada dan daerah perut. Dalam rangsangan fokus vasomotor

diteruskan sebagai kekuatan impuls yang nantinya bergerak melalui sistem simpatis akan mengarah ke ganglia simpatis. Neuron preganglion akan menghantarkan asetilkolin yang dapat memperkuat filamen saraf postganglionik ke dalam vena, dimana dengan kedatangan norepinefrin, vena dapat berkontraksi. Faktor lain seperti ketegangan dan ketakutan bisa mempengaruhi reaksi pembuluh darah terhadap peningkatan vasokonstriksi. Orang yang mengalami hipertensi ini sangat sensitif terhadap norepinefrin, meskipun tidak ada yang tahu mengapa hal ini dapat terjadi (Corwin, 2009).

Di saat yang sama, sementara itu sistem saraf simpatis dapat menghidupkan pembuluh darah karena dorongan gairah dan kelenjar adrenal juga akan dikuatkan, dan kemudian tindakan vasokonstriksi akan dinamis. Adrenalin yang menghasilkan vasokonstriksi adalah medula adrenal, sedangkan pada korteks adrenal akan mensekresi kortisol serta steroid-steroid yang bisa membentengi reaksi vasokonstriktor dalam vena. Vasokonstriksi yang akan menyebabkan aliran darah ke ginjal berkurang dan dapat menyebabkan datangnya renin. Renin ini dapat memperkuat perkembangan angiotensin I yang kemudian akan diubah menjadi angiotensin II, di mana vasokonstriktor padat dapat menggerakkan pelepasan aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon ini akan menyebabkan pemeliharaan natrium dan air pada tubulus ginjal yang dapat menyebabkan ekspansi volume intravaskular. Variabel-variabel ini umumnya dapat memicu suatu kondisi tekanan darah tinggi atau hipertensi (Corwin, 2009).

Sebagai pemikiran gerontologis, perubahan yang mendasar dan fungsional dalam kerangka pembuluh darah tepi memiliki tanggung jawab atas perubahan pada tekanan darah yang akan terjadi oleh lansia. Perkembangan pada proses ini mencakup aterosklerosis, yaitu hilangnya keserbagunaan jaringan ikat serta berkurangnya tugas pelepasan otot polos pada pembuluh darah, dengan demikian

hal ini bisa mengurangi distensi dan kemampuan untuk meregangkan pembuluh darah. Dengan demikian, berkurang kemampuannya untuk menampung volume darah yang telah dipompa oleh jantung yang menyebabkan penurunan hasil kardiovaskular serta obstruksi tepi yang meluas terjadi pada aorta dan arteri (Smeltzer, 2013).

### 3. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi pada dewasa menurut darah menurut JNC VII dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Klasifikasi Tekanan Darah pada Usia Dewasa**

Kategori	Sistolik	Diastolik
Normal	< 120	< 80
Prehipertensi	120-139	80-89
Hipertensi derajat 1	140-159	90-99
Hipertensi derajat 2	≥ 160	≥ 100

*Sumber: (Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, 2009).*

Penatalaksanaan hipertensi sebagai berikut:

- a. Dianggap sebagai tekanan darah normal, apabila sistolik kurang atau setara dengan 140 mmHg serta diastolik kurang atau setara dengan 90 mmHg.
- b. Dianggap sebagai tekanan darah perbatasan, jika sistolik nya 141-149 mmHg dan diastolik nya 91-94 mmHg.
- c. Dianggap hipertensi, apabila sistolik lebih menonjol atau setara dengan 160 mmHg dan diastolik yang lebih menonjol dari atau setara dengan 95 mmHg.

### 4. Faktor Risiko Hipertensi

Faktor risiko merupakan variabel atau kondisi yang berdampak pada peningkatan infeksi atau kondisi kesehatan. Ada faktor risiko yang dapat



mempengaruhi terjadinya hipertensi, yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor hipertensi yang dapat diubah (Bustan, 2007).

**a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah**

1) Usia

Usia sangat penting untuk siklus degeneratif, hipertensi sudah jelas banyak ditemukan pada orang dewasa. Usia bisa saja mempengaruhi terjadinya kejadian hipertensi. Dengan bertambahnya usia, bahaya terjadinya hipertensi ternyata sangat mengkhawatirkan sehingga prevalensi hipertensi pada lansia sangat rentan, yaitu sekitar 40% yang meninggal pada usia sekitar 65 tahun. Pada lansia, hipertensi ditemukan secara jelas sebagai peningkatan tekanan pada diastolik sebagai bagian dari tekanan darah yang pasti digunakan dalam menentukan ada atau tidaknya hipertensi. Pergerakan hipertensi ini dimulai dari pra-hipertensi pada usia dewasa 10-30 tahun (dengan peningkatan curah jantung) kemudian, berlanjut ke hipertensi dini pada usia dewasa 20-40 tahun (di mana obstruksi tepi terbentuk) kemudian, hipertensi pada usia 30-50 tahun dan selanjutnya dapat terjadi komplikasi pada usia 40-60 tahun (Prasetyaningrum, 2014).

2) Jenis Kelamin

Tingkat kejadian pada hipertensi juga dapat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Pria dua kali cenderung mengalami kenaikan denyut nadi sistolik daripada wanita, karena pria memiliki gaya hidup yang biasanya akan memicu hipertensi. Namun, setelah wanita akan memasuki masa menopause, prevalensi tekanan darah tinggi pada wanita semakin lama akan semakin meningkat (Prasetyaningrum, 2014).

Prasetyaningrum (2014) mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki peluang yang sama untuk kejadian hipertensi dalam perjalanan hidupnya, baik itu pria ataupun wanita. Padahal, pria lebih berisiko terkena hipertensi dibandingkan

wanita sebelum usia 45 tahun. Lagi pula, pada usia 65 tahun, wanita lebih berisiko terkena hipertensi daripada pria. Kondisi seperti ini disebabkan oleh hormon. Wanita yang telah memasuki masa *menopause* akan lebih berisiko terhadap berat badan yang dapat mengakibatkan risiko tekanan darah tinggi (Prasetyaningrum, 2014).

### 3) Keturunan (genetik)

Untuk seseorang yang orang tuanya penderita hipertensi, seseorang itu kemungkinan besar akan menjadi penderita hipertensi, dimana kasus hipertensi esensial ini didapatkan dari latar belakang atau riwayat keturunannya. Latar belakang atau keturunan yang mengalami hipertensi juga dapat menyebabkan risiko hipertensi, terlebih lagi hipertensi primer. Hal ini terkait dengan peningkatan kadar sodium intraseluler dan proporsi kalium terhadap sodium yang lebih rendah pada usia lanjut yang telah menderita hipertensi dibandingkan pada individu tanpa latar belakang keluarga hipertensi (Prasetyaningrum, 2014).

## **b. Faktor risiko yang dapat dikontrol**

### 1) Merokok dan konsumsi Alkohol

Pada rokok terdapat zat sintetis yang tidak aman untuk tubuh, contohnya yaitu nikotin serta karbon monoksida yang dihirup dari rokok dan dapat merusak aliran darah serta menyebabkan hipertensi. Saat seseorang merokok, jantung akan berdenyut dengan cepat, sehingga meningkatkan kerja oksigen di otot jantung (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). Sedangkan dengan *alcohol*, ada bukti bentrok antara keuntungan dan bahayanya. Para ahli menyetujui bahwa dengan mengkonsumsi minuman keras yang tidak perlu akan meningkatkan tingkat hipertensi, sirosis hati, dan kerusakan jantung (Wetherill, 2001). Minuman keras yang dikonsumsi juga dapat membahayakan kesehatan, karena dapat memicu

campuran katekolamin, yang dapat menyebabkan hipertensi (Prasetyaningrum, 2014).

Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara tegas bahwa manusia sudah diperintahkan untuk memilih makanan yang akan di konsumsinya baik itu dari sisi kehalalan maupun kualitas makanan/minuman tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Hadist yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَا ضَرَرَ وَلَا إِضْرًا

*Dari Ibnu 'Abbas berkata bahwa Rasulullah bersabda: "Tidak boleh membahayakan (diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan orang lain." (HR. Ibnu Majah).*

Hadis ini menjelaskan bahwa kata *dharar* berarti tujuan dari hukum yang ditetapkan Allah dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi hamba-Nya, dimana asap rokok itu sendiri dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sedangkan larangan untuk mengkonsumsi alkohol dijelaskan pada Q.S Al-Ma'idah/5:90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ  
وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Ma'idah/5:90).*

Mengenai pengharaman khamr, para ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini merupakan tahap terakhir dalam menentukan hukum meminum khamr. Dengan menurunkan Q.S Al-Ma'idah/5:90, Allah SWT menegaskan keharaman meminum

alkohol, miras atau minuman beralkohol. Khamr atau minuman beralkohol dilarang karena dibalik kemanfaatannya alkohol juga memiliki kemudharatan. Di Indonesia, alkohol adalah penyebab tindak kriminal seperti perampokan, perkosaan, dan pembunuhan. Juga, penyebab kecelakaan lalu lintas dan keretakan rumah tangga.

## 2) Indeks Masa Tubuh (IMT)

Terdapat penelitian yang mengemukakan bahwa ada hubungan antara IMT dan hipertensi. Individu yang *overweight* umumnya akan mengalami hipertensi yang lebih tinggi daripada individu tipikal berat badannya normal. *Mechanism* di mana individu yang *overweight* biasanya akan menderita hipertensi secara tidak diketahui, hal ini bisa jadi karena seseorang yang *overweight* makan lebih banyak mengonsumsi natrium (garam) dan lebih sedikit mengonsumsi kalium, sehingga dapat berakibat peningkatan tekanan darah karena beberapa pola makan yang kurang baik. Terlebih lagi, individu yang *overweight* umumnya akan sensitif terhadap insulin. Oposisi insulin ini dapat mendorong peningkatan konsentrasi natrium dan pemeliharaan garam serta air. Berat badan itu sendiri terkait dengan tingkat lipid yang tak terbantahkan dalam darah, glukosa yang berlebihan, dan denyut nadi yang meningkat (Adriani & Wirjatmadi, 2012).

$$\text{IMT} = \frac{\text{Berat badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{Tinggi badan (m)}}$$

Pada batas ambang batas indeks massa tubuh akan ditentukan dengan mengacu pada pengaturan FAO/WHO, yang akan mengakui batasan antara pria dan wanita. Untuk mengamati tingkat kekurangan energi atau tingkat berat badan seseorang, WHO telah menyarankan adanya satu ambang batasan di antara pria dan wanita. Pengaturan yang digunakan yaitu menggunakan ambang batasan pria untuk klasifikasi kurus tingkat berat dan menggunakan batasan wanita untuk klasifikasi

gemuk tingkat berat. Untuk Indonesia, keunggulan dari ambang batas dapat berubah lagi tergantung pada pengalaman klinis dan eksplorasi yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang (Supariasa et al., 2001).

Dan dapat disimpulkan bahwa, pada ambang batas IMT untuk Indonesia yaitu seperti tabel berikut:

**Tabel 2.2. Kategori Ambang Batas IMT untuk Indonesia**

<b>Kategori</b>		<b>IMT</b>
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	< 17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0-18,4
Normal		18,5-25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	25,1-27,0
	Kelebihan berat badan tingkat berat	> 27,0

*Sumber : (Supariasa et al., 2001).*

Berat badan yang berlebih atau obesitas berisiko langsung dengan peningkatan tekanan darah, terutama tekanan darah sistolik dimana risiko relatif untuk menderita hipertensi pada orang gemuk 5 kali lebih tinggi untuk menderita hipertensi dibandingkan dengan orang yang mempunyai berat badan normal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

Di dalam al-Qur'an Allah telah menjelaskan bahwasanya manusia tidak boleh berlebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal makanan. Hal itu terdapat pada QS. Al-A'raf/7: 31 yang berbunyi:

يَبْنِي ۡءَادَمَ خُدُوۡا زِيۡنَتَكُمْ عِنۡدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوۡا  
وَأَشْرَبُوۡا وَلَا تُسْرِفُوۡا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيۡنَ

M A K A S S A R

Terjemahnya:

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (QS Al A'raf/7:31).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT melarang kepada manusia untuk tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, baik itu mengkonsumsi makan dan minum ataupun menggunakan pakaian yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena, hal tersebut senada dengan gizi yang ada dalam makanan, apabila mengkonsumsi gizi secara berlebihan dapat menyebabkan kegemukan dan *obesitas*. Obesitas sendiri adalah salah satu faktor terjadinya berbagai penyakit degeneratif dalam tubuh salah satunya adalah hipertensi.

### 3) Stress

Stress atau *depression* (keputusasaan, kemarahan, penghinaan, ketakutan, tanggung jawab) dapat memperkuat ginjal untuk mengirimkan hormon adrenalin serta membuat jantung bekerja lebih cepat, sehingga tekanan darah akan meningkat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ، فَرَدَّدَ مَرَارًا، قَالَ: لَا تَغْضَبْ

Terjemahannya:

Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, dan berkata, "Berilah wasiat kepadaku." Rasulullah SAW menjawab, "Jangan marah!" orang ini mengulangi lagi, Rasulullah kembali menjawab, "Jangan kau marah!"

Menurut Mehmet (2010) yang dikutip dalam penelitian (Lazuardini I, 2019), marah merupakan sebuah kata yang tendensinya kearah negatif, sehingga pikiran-pikiran manusia terdoktrin untuk tidak marah diterapkan. Bila ditinjau dari aspek kesehatan, meluapkan marah atau menahannya sama-sama memiliki pengaruh yang membahayakan kesehatan. Sebuah studi di Amerika menjelaskan bahwa marah dan menahan marah memiliki bahaya yang sama terhadap kesehatan,

meskipun berbeda tingkat keparahannya. Manusia jika sedang dikuasai amarah maka pada saat itu dia sedang berada dalam kondisi yang sangat lengah. Lebih dari itu, dia juga dalam kondisi dikuasai syahwat. Apabila manusia sedang dikuasai syahwat, hal itu akan membuat imannya jadi lemah.

Jadi, bukan hanya masalah perasaan, tetapi emosi-emosi tersebut dapat menaikkan tekanan darah, mengganggu mekanisme perbaikan dalam tubuh, menyempitkan pembuluh darah yang mengakibatkan sulit untuk dialiri darah. Menahan marah juga memiliki pengaruh bagi kesehatan. Gangguan pernafasan dan hipertensi dapat mempengaruhi tubuh yang sehat ketika seseorang menahan marah yang tidak terkendali, karena pada kondisi tertentu dapat mengakibatkan ledakan marah terjadi dan lebih sulit untuk dikontrol (Mehmet dalam Lazuardini I, 2019).

#### 4) Latihan Fisik (olahraga)

Adanya kegiatan fisik ini sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh terutama paru-paru dan jantung. Beberapa contoh latihan fisik yang dapat dilakukan adalah berkultivasi, bergerak seperti naik turun tangga, berenang, bersepeda, dan yoga. Hal ini juga dapat memberikan kesehatan pada pembuluh darah dan dapat mencegah hipertensi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

#### 5) Faktor Asupan Garam

Keseimbangan air dalam sistem pembuluh darah merupakan salah satu fungsi dari natrium. Sebagian besar natrium berasal dari makanan berupa garam dapur, *monosodium glutamate*, dan *baking pop*. Mengonsumsi natrium dapat meningkatkan volume darah yang ada pada tubuh, berarti jantung perlu bekerja lebih antusias agar tekanan darah dapat meningkat (Astuti dalam Aristi et al., 2020).

#### 6) Kolesterol

*Cholesterol* merupakan komponen penting dalam perbaikan aterosklerosis, yang kemudian menyebabkan peningkatan obstruksi vaskuler tepi yang dapat

menyebabkan peningkatan tekanan darah. Dampak peningkatan tekanan darah ini telah dibuktikan untuk membangun kadar kortisol, meningkatkan volume trombosit, dan meningkatkan kekentalan darah (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013).

## **B. Lanjut Usia**

### **1. Definisi Lanjut Usia**

*Aging* adalah suatu proses berkurangnya kapasitas jaringan dengan cara bertahap untuk memperbaiki dirinya sendiri dan mengikuti konstruksi serta kapasitasnya yang biasa, sehingga dapat bertahan dari infeksi, kerusakan dan penyakit. Beberapa spekulasi menjelaskan mengapa seseorang bisa menua. Hipotesis utamanya adalah *wear* dan *tear*, di mana hipotesis ini menggabungkan kerusakan DNA, glikosilasi, radikal bebas, dan glikosilasi (Martono, 2009).

Menua atau menjadi tua merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam daur hidup manusia. Seseorang mengalami penuaan jika telah melewati tiga fase kehidupan. Ketiga fase tersebut disebutkan dalam Aqur'an surah Ar-rum ayat 54, didalamnya dijelaskan bahwa Allah SWT membagi fase umur manusia kepada tiga bagian, yaitu lemah (bayi), kemudian kuat (remaja), kemudian lemah dan beruban (tua) (Martono, 2009).

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

Terjemahnya:

*“Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan-Mu kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan-Mu lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha kuasa.” (QS. Ar-Rum/30:54)*



## 2. Klasifikasi Lansia

Menurut (WHO, 2013) lanjut usia dicirikan tergantung pada usia sekuensial (kronologis) atau alamiah (biologis), klasifikasi lansia adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Klasifikasi Lansia Menurut WHO**

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Usia (tahun)</b>
Pra lanjut usia ( <i>middle age</i> )	45-59
Lanjut usia ( <i>elderly</i> )	60-74
Lanjut usia tua ( <i>old</i> )	75-90
Usia sangat tua ( <i>very old</i> )	>90

Sumber: WHO (2013).

## 3. Hipertensi pada Lansia

Hipertensi pada lanjut usia tidak seperti hipertensi yang diderita oleh remaja atau dewasa pada umumnya, karena patogenesis pada lansia sedikit berbeda dengan hipertensi di usia dewasa. Beberapa faktor yang dapat memicu kejadian hipertensi pada lanjut usia adalah (Martono, 2009):

- a. Pengaruh yang diperluas terhadap konsumsi natrium, di mana usia lebih sensitif terhadap kenaikan dan penurunan kadar natrium.
- b. Berkurangnya elastisitas pembuluh darah perifer karena sistem pematangan akan memperluas obstruksi pembuluh darah yang akhirnya hanya akan mengarah pada hipertensi sistolik.
- c. Perubahan ateromatosa karena sistem penuaan yang menyebabkan kerusakan endotel yang terus membingkai di berbagai sitokin dan kemudian pada saat itu, menyebabkan reabsorpsi natrium di tubulus ginjal, memperluas perjalanan sklerosis di pembuluh darah tepi serta kondisi lain yang menyebabkan naiknya tekanan darah.
- d. Sistem penuaan dapat menyebabkan penurunan kadar renin karena

berkurangnya jumlah nefron pada tubuh. Interaksi ini menyebabkan pola hipertensi-glomerular-sklerosis-hipertensi yang berlangsung tanpa henti.

### **C. Asupan Gizi Lansia**

#### **1. Pengertian Asupan Gizi**

*Nutritional intake* (asupan gizi) adalah ukuran suplemen yang diperoleh dari makanan yang dimakan yang diperlukan tubuh untuk melengkapi kapasitasnya, khususnya untuk memberikan energi, membuat dan menjaga jaringan serta mengontrol siklus nutrisi penting di tubuh. Lanjut usia diharapkan untuk tetap fokus pada asupan makanan bergizi meskipun lanjut usia tidak mengalami pertumbuhan serta perkembangan. Ini karena para lanjut usia benar-benar membutuhkan asupan nutrisi dasar untuk menggantikan sel-sel yang rusak dan dapat mengikuti sistem kekebalan mereka (Soekarti et al., 2011).

Pada hakikatnya, suplemen nutrisi yang dibutuhkan oleh lanjut usia adalah protein, *carbohydrates*, *fats*, *minerals*, *vitamins*, *water* dan *fiber* dengan cukup yang disesuaikan keadaan lanjut usia itu sendiri serta mencegah penyakit degeneratif dan kemungkinan kekurangan asupan gizi (Soekarti et al., 2011).

#### **2. Asupan Makanan**

*Food intake* (asupan makanan) adalah komponen dasar yang dapat menentukan nutrisi seseorang. Seseorang dengan status gizi yang baik pada umumnya memiliki penggunaan makanan yang baik. Pada asupan yang baik atau status gizi yang ideal terjadi ketika tubuh mendapatkan jumlah yang asupan gizi cukup dari suplemen yang digunakan secara efektif, sehingga memungkinkan perkembangan aktual, kesehatan mental, batas kerja dan kesejahteraan yang sehat yang terjadi ketika tubuh membutuhkan zat-zat penting. Kondisi status gizi yang berlebih terjadi ketika tubuh mendapat suplemen dengan jumlah yang ekstrim

sehingga bisa menimbulkan dampak yang *toxic* atau merusak. Masalah gizi yang disebabkan oleh faktor sekunder dan primer. Variabel utama adalah titik di mana komposisi pada makanan seseorang tidak sesuai dalam jumlah dan kualitas karena tidak adanya pasokan makanan, distribusi makanan yang tidak berdaya, ketidaktahuan, pola makan yang buruk, dll. Sedangkan variabel sekunder mencakup semua unsur-unsur yang mencegah suplemen sampai ke sel-sel tubuh nanti makanan dikonsumsi (Soekarti et al., 2011).

### 3. Kebutuhan Gizi Lansia Sesuai AKG

AKG yang disarankan adalah ukuran dari setiap suplemen dasar yang harus dikonsumsi dalam makanan harian untuk mencegah kekurangan gizi. AKG dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas fisik, serta kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui. AKG pada lansia adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4. Angka Kecukupan Gizi Lansia**

Kelompok umur	Energi (kkal)	Protein (g)	Lemak (g)	Karbohidrat (g)
Laki-laki				
50-64 tahun	2150	65	60	340
65-80 tahun	1800	64	50	275
Perempuan				
50-64 tahun	1800	60	50	280
65-80 tahun	1500	58	45	230

Sumber: (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

### 4. Jenis Menu dan Bahan Makanan pada Lansia

Jumlah rata-rata bahan makanan sehari bagi lansia berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 2004, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5. Jumlah Bahan Makanan Rata-rata Sehari**

Bahan Makanan	Perempuan (1550 kkal)		Laki-laki (1900 kkal)	
Nasi	3 ½ p	3 ¾ gls	5 ½ p	5 ½ gls
Ikan	2 p	2 ptg	2 p	2 ptg
Tempe	2 p	2 ptg	2 p	2 ptg
Sayur	3 p	3 gls	3 p	3 gls
Buah	4 p	4 ptg/bh	4 p	4 ptg/bh

Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan jenis asupan seperti buah-buahan yang baik dikonsumsi . Hal itu terdapat pada QS. Al-Mu'minun/23:19 yang berbunyi:

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

*“Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.” (QS. Al-Mu'minun/23:19).*

#### **D. Perilaku Makan**

##### **1. Pengertian Perilaku Makan**

Perkembangan aktivitas yang membentuk hubungan antara manusia dengan makanan disebut juga dengan perilaku makan. Makanan yang disebutkan tidak hanya dikaitkan dengan banyak (jumlah) atau jenis makanan, akan tetapi cenderung pada perasaan serta kebiasaan yang dihubungkan oleh tindakan pada makanan. Selanjutnya, perilaku makan ini sendiri adalah reaksi individu terhadap makanan sebagai kebutuhan dasar sepanjang kehidupan sehari-hari. Perilaku ini mencakup

informasi (pengetahuan), perspektif (sikap), dan praktik terhadap makanan dan komponennya (nutrisi), penanganan makanan, dan lainnya (Benaroch et al., 2011).

Perilaku makan adalah reaksi tunggal terhadap makanan. Dikutip dalam penelitian (Qurniawati, 2018), Irianto (2007) merekomendasikan bahwa ada beberapa standar untuk makan dengan sehat, khususnya pengulangan makan beberapa kali (pagi, sore, malam), jumlah yang cukup (yang ditunjukkan oleh berat badan, jenis kelamin, usia dan jenis tindakan secara terpisah), porsi makan yang disesuaikan, makanan seperti pati, lemak, protein, air, mineral, sayuran dan produk alami, serta minum enam gelas air per hari setiap harinya.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:168 tentang perilaku makan yang baik yaitu:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah/2:168)

Bahkan Nabi SAW mempertegas lagi mengenai perilaku makan dalam hadist:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكْلَاتٍ يُقْمَنُ  
صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَتُلُتْ لَطْعَامُهُ، وَتُلُتْ لَشْرَابِهِ، وَتُلُتْ لِنَفْسِهِ

Terjemahnya:

Dari Al-Miqdām bin Ma'dikarib -radīyallāhu 'anhu- secara marfū', “Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus melebihi itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk

*minumannya dan sepertiga untuk nafasnya.”*

## **2. Tahapan Perilaku**

Seorang terapis psikologi pendidikan, Soekidjo Notoatmodjo yang dikutip dalam penelitian (Qurniawati, 2018) bahwa ia mengenal tiga macam perilaku, yaitu *affective, cognitive, psychomotor*. Kemudian, pada saat itu juga ada ahli pendidikan di Indonesia, ketiga ruang tersebut diubah menjadi cipta (kognitif), rasa (afektif), dan karsa (psikomotor). Selain itu, dalam jangka panjang, berbagi perilaku untuk tujuan instruktif pendidikan dan membentuknya sebagai berikut:

### **a. Pengetahuan (*Knowledge*)**

Sebuah pengetahuan dapat diperoleh dari pembelajaran, pengalaman, waktu serta situasi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi, beradaptasi dengan situasi dan suasana baru sebagai awal serta bekal untuk mempelajari hal-hal baru. Pengetahuan juga harus bisa mempengaruhi suatu sikap dan tindakan yang baik untuk mencegah dan mengatasi masalah yang akan dihadapi. Pengetahuan juga bermaksud memberikan informasi yang terjadi setelah seseorang mempersepsikan suatu objek tertentu. Persepsi ini dapat dilakukan melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa serta peraba. Perilaku seseorang yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

### **b. Sikap (*Attitude*)**

Sikap adalah kemampuan atau keinginan untuk bertindak dan ini bukan pelaksanaan alasan tertentu. Sikap untuk situasi ini dapat dilihat sebagai tingkat efek positif dan negatif yang sesuai dengan psikologis. Pengaruh positif merupakan

akibat yang menyenangkan, sedangkan pengaruh negatif merupakan akibat yang tidak diinginkan (tidak menyenangkan).

Perspektif pada sikap ini dapat mempengaruhi pengalaman suatu individu dan muncul dari hati, kecenderungan yang diinginkan dan dampak pengaruh di sekitar orang tersebut, karena hal seperti itu diciptakan oleh perkembangan dorongan mental. Suka atau tidaknya terkait dengan kecenderungan seseorang untuk menanggapi suatu objek. Sikap juga merupakan ekspresi dari nilai atau pandangan seseorang terhadap kehidupan.

### **c. Tindakan (Praktik)**

Suatu sikap yang tidak sepenuhnya harus diakui dalam suatu kegiatan atau tindakan (*overt behavior*). Untuk memahami suatu perilaku, untuk berubah menjadi suatu tindakan yang nyata, diperlukan variabel pendukung atau kondisi yang memberdayakan, termasuk struktur. Kemudian seseorang yang telah mengetahui peningkatan stimulus dan membuat penilaian tentang hal yang diketahuinya, lalu melakukan atau melatih apa yang diketahui atau yang akan dilakukan (nilai besar). Ini bisa disebut praktik kesehatan.

### **E. Metode Pengukuran Konsumsi Pangan**

Terdapat beberapa metode untuk mengukur konsumsi makanan per individu menurut (Supariasa et al., 2001) yaitu sebagai berikut :

#### **1. Metode Food Recall 24 Jam**

Pada metode *food recall* 24 jam ini dilengkapi dengan mencatat ukuran atau jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, metode ini diminta dengan sangat hati-hati dan menggunakan alat ukuran rumah tangga atau URT seperti sendok, gelas, piring, dan sebagainya, serta format lain yang biasa

digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

## **2. Metode *Estimated Food Records***


Metode ini dapat dikatakan dengan "*diary record*" atau "*food record*". Dalam teknik tersebut, responden diharapkan untuk mencatat semua makanan yang telah dikonsumsi (dimakan dan diminum) oleh responden sebelum makan dalam URT (ukuran keluarga) atau berat (gram) untuk jangka waktu tertentu dari 2-4 hari berturut-turut, termasuk strategi kesiapan makanan serta pengolahannya.

## **3. Metode *Food Frequency***

Pada metode *food frequency* ini yang diperoleh yaitu informasi tentang frekuensi penggunaan berbagai sumber makanan atau makanan yang telah diatur selama periode/waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan atau waktu yang lama. Survei tersebut berisi rundown sumber makanan atau bahan makanan dan frequency pemanfaatan sumber makanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Bahan makanan yang tercatat dalam survei adalah yang dimakan setiap hari, jarang, tidak pernah dan sering dikonsumsi oleh responden.




### F. Kerangka Teori



Bagan 1: Modifikasi Notoadmojo, 2010 ; Bloom, 1974. Van Strein ; Elfhag & Morey, 2008.

### G. Kerangka Konsep



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Penelitian dan pengambilan data ini akan dilakukan dari bulan Juli hingga Agustus 2022. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru, tepatnya di posyandu wilayah kerja Puskesmas Padongko, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru.

#### ***B. Desain Penelitian***

Pada desain penelitian semacam ini adalah tinjauan deskriptif kuantitatif dengan metodologi *cross sectional* dimana informasi yang mengidentifikasi variabel bebas serta terikat yang dikumpulkan pada saat yang bersamaan (Martono, 2009).

#### ***C. Populasi dan Sampel.***

##### **1. Populasi**

Populasi pada penelitian ini, yaitu lansia yang memeriksakan kesehatannya di posyandu lansia Kelurahan Sumpang Binangae pada tahun 2022 yang berjumlah 59 lansia.

##### **2. Sampel**

Sampel merupakan bagian dari populasi. Adapun teknik sampel pada penelitian ini yaitu dengan teknik proporsional sampling, yaitu semua pra lansia dan lansia yang berkunjung ke posyandu lansia dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dipilih menjadi sampel (Martono, 2009). Jumlah sampel yang didapat adalah 49 lansia yang memeriksa kesehatannya di Posyandu Lansia Kelurahan Sumpang Binangae tahun 2022.

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi sampel adalah sebagai berikut.

a. Kriteria inklusi :

- 1) Lansia yang terdaftar dalam posyandu lansia Kelurahan Sumpang Binangae tahun 2022.
- 2) Bersedia untuk menjadi responden.

b. Kriteria eksklusi :

- 1) Responden yang memiliki riwayat dimensia.
- 2) Responden yang bungkuk.
- 3) Responden yang memiliki gangguan pendengaran dan gangguan bicara.
- 4) Responden yang menggunakan kursi roda.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti langsung melalui upaya pengambilan data dengan terjun langsung di lapangan menggunakan teknik wawancara langsung sesuai jadwal instansi terkait dan *door to door* dengan responden menggunakan kuesioner yang sudah dipersiapkan, pengukuran tekanan darah secara langsung dengan menggunakan tensimeter digital yang dilakukan oleh petugas posyandu lansia, dan responden diwawancarai berdasarkan kuesioner. Pada saat *Nutritional Intake Interview*, jika responden mengalami kesulitan mengingat secara keseluruhan kebiasaan mengkonsumsi makanan responden dalam tiga bulan terakhir, responden diperbolehkan untuk menjawab sebanyak yang mereka ingat saja (Martono, 2009).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder mendukung data yang dibutuhkan peneliti untuk melengkapi data penelitian yang dibutuhkan. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari masing-masing posyandu atau instansi terkait seperti buku kontrol lansia dan literatur terkait (Martono, 2009).

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian dapat berfungsi sebagai alat penduga untuk informasi tentang bagaimana perilaku makan dan status kesehatan pada lanjut usia. Instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut (Martono, 2009):

1. Untuk mengukur/melihat tekanan darah menggunakan *tensimeter digital*.
2. Kuesioner responden yang nantinya digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai umur, jenis kelamin, dan IMT.
3. Kuesioner terkait perilaku makan
4. Formulir *food recall 24 hours*.
5. Buku foto makanan.

### ***F. Teknik Pengolahan Data***

Semua data akan diolah secara manual melalui proses tahapan-tahapan. Dimulai dengan *editing, coding, entry data, cleaning data*, tabulasi data, kemudian dianalisis dengan aplikasi *nutrisurvey*, SPSS, lalu dianalisis kembali berdasarkan variabel (Martono, 2009).

#### 1. *Editing*

Editing merupakan tahapan penyuntingan data yang akan dilakukan di lapangan dengan tujuan supaya data yang didapat telah diisi secara lengkap dan benar oleh responden.

## 2. *Coding*

Pengkodean ini dilakukan dengan cara memberikan angka atau nomor pada data. Hal ini dimaksud agar memudahkan pengolahan dan analisis data.

## 3. *Entry data*

Pada tahap ini, data kuesioner yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam sistem kerja PC menggunakan program SPSS yang biasa digunakan untuk pengolahan data.

## 4. *Cleaning data*

Tahap ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar mempertimbangkan kembali data dan informasi yang telah dimasukkan ke dalam sistem kerja PC. Dengan asumsi adanya kesalahan seperti data yang hilang, bertentangan, dan data tersebut dapat segera diubah atau diperbaiki.

## 5. *Tabulasi data*

Tabulasi data merupakan tahap terakhir dimana data yang terkumpul kemudian dianalisis kembali dengan menggunakan teknik statistik yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan program aplikasi SPSS.

## **G. *Analisis Data***

### 1. Analisis Data Univariat

Analisis univariat ini berfungsi untuk melihat kecambuhan dan tingkat variabel dependen, khususnya hipertensi dan faktor independen adalah asupan makanan dan perilaku makan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

### 2. Analisis Data Bivariat

Analisis bivariante berfungsi untuk melihat hubungan antara variabel dependen, khususnya hipertensi dengan variabel independen, yaitu asupan gizi dan perilaku

makan. Lalu, untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara dua faktor (independen (x) dan dependen (y)) pemeriksaan menggunakan uji *chi square* digunakan, melalui program SPSS untuk melihat hubungan dengan nilai total bermakna ( $p < 0,05$ ). Jika *p-value* yang diperoleh di bawah 0,05, maka terdapat hubungan yang bermakna (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019)



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Barru merupakan salah satu dari 24 kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan berada pada pesisir pantai barat Selat Makassar dengan panjang garis pantai 78 Km. Kabupaten ini memiliki luas Wilayah 1.174,72 Km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 174.323 jiwa dan terletak pada 4°00`-5°35` Lintang Selatan dan 199°35`-119°49` Bujur Timur. Wilayahnya bagian Barat daratan Pulau Sulawesi sekitar kurang lebih 102 Km sebelah utara Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif Kabupaten Barru terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (ibukota kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu, yang terdiri dari 14 kelurahan dan 40 desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- d. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Sumpang Binangae merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Barru Kabupaten Barru dengan luas 1,8 Km<sup>2</sup>. Kelurahan Sumpang Binangae memiliki pantai



yang biasa digunakan dalam pengamatan hilal awal bulan oleh instansi-instansi terkait, pantai tersebut yaitu Pantai Sumpang Binangae dengan titik koordinat lintang  $-4.402153$  atau  $4^{\circ}24'7,75''$  LS, dan bujur  $119,604065$  atau  $119^{\circ}36'14,63''$  BT.

## 2. Hasil Univariat

### a. Karakteristik Lansia

#### 1) Jenis kelamin

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Jenis Kelamin	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-laki	12	24.5
Perempuan	37	75.5
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa frekuensi terbesar berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 37 lansia (75.5%). Sedangkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 12 lansia (24.5%).

#### 2) Kategori Umur

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Umur Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Usia Pertengahan (middle age)	28	57.1
Lanjut usia (elderly)	19	38.8
Lanjut usia tua (old)	2	4.1
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa distribusi pengkategorian umur lansia Sumpang Binangae menunjukkan bahwa sebanyak 28 responden (57.1%)

termasuk kategori usia pertengahan (*middle age*). Sedangkan untuk kategori lanjut usia (*elderly*) sebanyak 19 responden (38.1%) , dan lansia tua (*old*) ada sebanyak 2 responden (4.1%).

### 3) IMT

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan IMT Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

IMT	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurus	2	4.1
Normal	36	73.5
Gemuk	11	22.4
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa IMT lansia Sumpang Binangae dengan kategori kurus sebanyak 2 lansia (4.1%), normal sebanyak 36 lansia (73.5%), dan gemuk sebanyak 11 (22.4%).

### b. Hipertensi

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Kategori Hipertensi	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Hipertensi	40	81.6
Tidak Hipertensi	9	18.4
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa status hipertensi sebagian besar lansia di Sumpang Binangae yang menderita hipertensi yaitu sebanyak 40 lansia (81.6%). Sedangkan lansia yang tidak hipertensi sebanyak 9 lansia (18.4%).

**c. Pengetahuan**

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Pengetahuan Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

<b>Kategori Pengetahuan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pengetahuan Rendah	2	4.1
Pengetahuan Tinggi	47	95.9
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100.0</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa pengetahuan lansia dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 47 lansia (95.9%). Sedangkan dengan kategori rendah yaitu sebanyak 2 lansia (4.1%).

**d. Sikap**

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Sikap Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

<b>Kategori Sikap</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persentase (%)</b>
Negatif	18	36.7
Positif	31	63.3
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa sikap terhadap makan lansia dengan kategori positif yaitu sebanyak 31 lansia (63.3%). Sedangkan dengan kategori negatif yaitu sebanyak 18 lansia (36.7%).

**e. Praktik**

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Praktik Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Kategori Praktik	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Negatif	9	18.4
Positif	40	81.6
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa praktik lansia terhadap makan dengan kategori positif yaitu sebanyak 40 lansia (81.6%). Sedangkan dengan kategori negatif yaitu sebanyak 9 lansia (18.4%).

#### f. Tingkat Konsumsi Asupan Energi

Tabel 4.8

#### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Asupan Energi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.

Kategori Asupan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	1	2.0
Cukup	5	10.2
Baik	43	87.8
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 43 lansia (87.8%). Sedangkan pada kategori cukup sebanyak 5 lansia (10.2%) dan kurang sebanyak 1 lansia (2%).

#### g. Tingkat Konsumsi Asupan Lemak

Tabel 4.9

#### Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Asupan Lemak Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.

Kategori Asupan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	3	6.1
Cukup	5	10.2
Baik	41	83.7
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi lemak berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 41 lansia (83.7%), kategori cukup sebanyak 5 lansia (10.2%), dan kategori kurang ada sebanyak 3 lansia (6.1%).

#### h. Tingkat Konsumsi Asupan Karbohidrat

**Tabel 4.10**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Asupan Karbohidrat Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Kategori Asupan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	5	10.2
Sedang	3	6.1
Baik	41	83.7
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi karbohidrat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 41 lansia (83.7%), kategori sedang sebanyak 3 lansia (6.1%), dan pada kategori kurang ada sebanyak 5 lansia (10.2%).

#### i. Tingkat Konsumsi Asupan Serat

**Tabel 4.11**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Asupan Serat Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Kategori Asupan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Kurang	44	89.8
Cukup	3	6.1
Baik	2	4.1
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori kurang pada tingkat konsumsi serat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 44 lansia (89.8%) dan kategori cukup sebanyak

3 lansia (6.1%). Sedangkan pada kategori baik hanya sebanyak 2 lansia (4.1%).

**j. Tingkat Konsumsi Asupan Natrium**

**Tabel 4.12**

**Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kategori Tingkat Asupan Natrium Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022.**

Kategori Asupan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Lebih	35	71.4
Kurang	11	22.4
Cukup	3	6.1
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori lebih pada tingkat konsumsi natrium berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 35 lansia (71.4%) dan kategori kurang sebanyak 11 lansia (22.4%). Sedangkan pada kategori cukup hanya sebanyak 3 lansia (6.1%).

**3. Analisa Bivariat**

**a. Perilaku Makan**

**1) Hubungan Antara Pengetahuan dengan Hipertensi pada Lansia**

**Tabel 4.13**

**Distribusi Hubungan Antara Pengetahuan dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022**

Pengetahuan	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	n	%			
Rendah	2	100	0	0	2	100	0.663
Tinggi	38	80.9	9	19.1	47	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.13 mengenai hubungan antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 47 responden dengan pengetahuan tinggi lebih banyak yang mengalami hipertensi

yaitu 38 (80.9%) responden, sedangkan dari 2 responden dengan pengetahuan rendah yang mengalami hipertensi hanya terdapat 2 (100%) responden. Hasil analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.663. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan lansia dengan hipertensi.

### 2) Hubungan Antara Sikap dengan Hipertensi pada Lansia

Tabel 4.14

Distribusi Hubungan Antara Sikap dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022

Sikap	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	N	%			
Negatif	14	77.8	4	22.2	18	100	0.708
Positif	26	83.9	5	16.1	31	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.14 mengenai hubungan antara sikap dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 18 responden dengan sikap negatif lebih banyak yang mengalami hipertensi yaitu 14 (77.8%) responden dan yang tidak hipertensi sebanyak 4 (22.2%) responden. Sedangkan dari 31 responden dengan sikap positif, lansia yang mengalami hipertensi sebanyak 26 (83.9%) responden dan tidak hipertensi sebanyak 5 (16.1%) responden. Hasil analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.708. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap terhadap makan lansia dengan hipertensi.

### 3) Hubungan Antara Praktik dengan Hipertensi pada Lansia

Tabel 4.15

Distribusi Hubungan Antara Praktik dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022

Praktik	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	N	%			
Negatif	6	66.7	3	33.3	9	100	0.203
Positif	34	85.0	6	15.0	40	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Selanjutnya, mengenai hubungan antara praktik makan dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 9 responden dengan praktik makan negatif lebih banyak yang mengalami hipertensi yaitu 6 (66.7%) responden, dan yang tidak hipertensi sebanyak 3 (33.3%) responden. Sedangkan dari 40 responden dengan praktik makan positif lebih banyak yang mengalami hipertensi, yaitu 34 (85.0%) responden, dan di bandingkan dengan yang tidak mengalami hipertensi yaitu 6 (15.0%) responden. Hasil analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.203. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara praktik terhadap makan lansia dengan hipertensi.

#### d. Asupan Gizi

##### 1) Hubungan Asupan Energi dengan Hipertensi Lansia.

Tabel 4.16



**Distribusi Hubungan Antara Asupan Energi dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022**

Asupan Energi	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		N	%	
	n	%	n	%			
Kurang	1	100	0	0	1	100	0.224
Sedang	5	100	0	0	5	100	
Baik	34	79.1	9	20.9	43	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.16 mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 1 responden yang asupan energinya kurang terdapat 1 (100%) responden yang hipertensi dan pada kategori sedang yang mengalami hipertensi sebanyak 5 (100%) responden. Sedangkan dari 43 responden dengan kategori asupan energi baik, lansia yang mengalami hipertensi sebanyak 34 (79.1%) responden dan tidak hipertensi sebanyak 9 (20.9%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.224. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan kejadian hipertensi pada lansia.

## 2) Hubungan Asupan Lemak dengan Hipertensi Lansia.

Tabel 4.17

**Distribusi Hubungan Antara Asupan Lemak dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022**

Asupan Lemak	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		N	%	
	n	%	N	%			
Kurang	3	100	0	0	3	100	0.150
Sedang	5	100	0	0	5	100	
Baik	32	78.0	9	22.0	41	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.17 mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 7 responden yang asupan lemaknya kurang terdapat 7 (100%) responden yang hipertensi, dan kategori sedang yang mengalami hipertensi sebanyak 5 (100.0%) responden. Sedangkan dari 41 responden dengan kategori asupan lemak baik, lansia yang mengalami hipertensi sebanyak 32 (78.0%) responden dan tidak hipertensi sebanyak 9 (22.0%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.150. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi pada lansia.

### 3) Hubungan Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi Lansia.

Tabel 4.18

Distribusi Hubungan Antara Asupan Karbohidrat dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022

Asupan Karbohidrat	Tekanan Darah				Total		p*
	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	N	%	N	%			
Kurang	5	100	0	0	5	100	0.579
Sedang	2	66.7	1	33.3	3	100	
Baik	33	80.5	8	19.5	41	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.18 mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 1 responden yang asupan karbohidratnya dalam kategori kurang yang mengalami hipertensi sebanyak 5 (100%) responden, dan kategori sedang yang mengalami hipertensi sebanyak 2 (66.7%) responden. Sedangkan dari 41 responden dengan kategori asupan karbohidrat baik, lansia yang mengalami hipertensi sebanyak 33 (80.5%) responden dan tidak hipertensi sebanyak 8 (19.5%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.579. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi pada lansia.

#### 4) Hubungan Asupan Serat dengan Hipertensi Lansia.

**Tabel 4.19**  
**Distribusi Hubungan Antara Asupan Serat dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022**

Tekanan Darah	Total	p*
---------------	-------	----

Asupan Serat	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%	
	n	%	n	%			
Kurang	37	84.1	7	15.9	44	100	0.232
Sedang	1	33.3	2	66.7	3	100	
Baik	2	100	0	0	2	100	
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100	

Berdasarkan tabel 4.19 mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 44 responden yang asupan seratnya kurang terdapat 37 (84.1%) responden yang hipertensi dan yang tidak hipertensi sebanyak 7 (15.9%) responden. Sedangkan dari 3 responden dengan kategori asupan serat sedang, lansia yang mengalami hipertensi hanya sebanyak 1 (80.5%) responden dan kategori baik yang hipertensi sebanyak 2 (100%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.232. Dikarenakan nilai  $p > 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan serat dengan kejadian hipertensi pada lansia.

#### 5) Hubungan Asupan Natrium dengan Hipertensi Lansia.

**Tabel 4.20**  
**Distribusi Hubungan Antara Asupan Natrium dengan Hipertensi Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae Tahun 2022**

Tekanan Darah	Total	$p^*$
---------------	-------	-------

Asupan Natrium	Hipertensi		Tidak Hipertensi		n	%
	n	%	N	%		
Lebih	31	88.6	4	11.4	36	100
Kurang	6	54.5	5	45.5	11	100
Cukup	3	100	0	0	3	100
Jumlah	40	81.6	9	18.4	49	100

Berdasarkan tabel 4.20 mengenai hubungan antara asupan gizi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae menunjukkan bahwa, dari 36 responden yang asupan natriumnya lebih terdapat 31 (88.6%) responden yang hipertensi dan yang tidak hipertensi sebanyak 4 (11.4%) responden. Sedangkan dari 11 responden dengan kategori asupan natrium kurang, lansia yang mengalami hipertensi hanya sebanyak 6 (80.5%) responden dan kategori cukup yang hipertensi sebanyak 3 (100%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.029. Dikarenakan nilai  $p < 0.05$ , maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia.

## B. Pembahasan

### 1. Hubungan Antara Perilaku Makan dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae.

Penyakit tekanan darah tinggi salah satunya dapat disebabkan oleh kesalahan pada perilaku makannya. Penyebab dari kesalahan perilaku makan pada hipertensi antara lain makan dalam bentuk siap saji, makanan yang mengandung pengawet, mengonsumsi makanan yang mengandung garam atau natrium, makan-makanan yang berlemak (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Dikutip dalam penelitian Arisandi dkk, Nelwa (2019) menjelaskan bahwa upaya penanganan penyakit darah tinggi bisa dilakukan menggunakan cara menjaga perilaku makan lansia,

menghindari makanan olahan dalam bentuk kaleng dan dalam bentuk siap saji (Arissandi et al., 2019).

Berdasarkan hasil distribusi pengetahuan responden, hasil penelitian ini diketahui bahwa, dari 47 responden dengan pengetahuan tinggi ternyata masih banyak lansia yang mengalami hipertensi yaitu 38 (80.9%) responden. Hasil analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.663 dimana nilai  $p > 0.05$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan lansia dengan hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lia Nurmilatun S, Nurhaedar Jafar, (2019) yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi ( $p$ -value 0,332).

Pada kasus pengetahuan yang tinggi tetapi masih ada lansia yang mengalami hipertensi, diasumsikan bahwa kejadian hipertensi ini tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan saja, tetapi ada faktor lain seperti keturunan atau asupan gizi berlebih. Secara umum pengetahuan lansia sudah masuk kategori tinggi karena lansia pada umumnya sudah mendengar mengenai dasar-dasar gizi seimbang namun saat melakukan wawancara, banyak lansia yang tidak mengetahui jumlah kebutuhan rata-rata zat gizi yang harus dipenuhi setiap harinya sesuai dengan angka kecukupan gizi. Contohnya, apabila ditinjau dari hasil analisis kuesioner distribusi pengetahuan, lansia yang menjawab benar pada pernyataan “Konsumsi air minum sebanyak 1 gelas perhari mampu memenuhi kebutuhan air dalam tubuh” dan sebanyak 38 (77.6%) lansia masih menjawab “Benar” padahal pada orang dewasa, konsumsi air putih yang disarankan yaitu sekitar delapan gelas berukuran 230 ml atau 2 liter per hari.

Menurut Lia Nurmilatun S, Nurhaedar Jafar (2019) pengetahuan responden yang baik kemungkinan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya pengalaman,

serta sarana informasi. Pengetahuan tidak hanya didapat secara formal melainkan juga melalui pengalaman. Selain itu pengetahuan juga didapat melalui sarana informasi yang tersedia di rumah, seperti radio, *smartphone*, dan televisi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil distribusi sikap responden, hasil penelitian ini diketahui dari 31 responden, lansia yang memiliki sikap positif lebih banyak mengalami hipertensi, yaitu sebanyak 26 (83.9%) responden, sedangkan yang tidak hipertensi hanya sebanyak 5 (16.1%) responden. Hasil pada analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.337 dimana  $p > 0.05$ , yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan hipertensi pada lansia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijaya (2011) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan sikap dengan tingkat kejadian hipertensi pada lansia di Dusun 14 Sungapan Tirtorahayu Galur Kulon Progo Yogyakarta yang ditunjukkan dengan nilai  $p$  0,283 yang lebih besar dari 0,05.

Dalam penelitian ini, masih banyak lansia yang memiliki sikap positif namun masih terkena hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian hipertensi pada lansia, seperti asupan gizi terutama pada asupan natrium dan stress. Apabila ditinjau dari hasil analisis kuesioner, pada pernyataan “Lansia boleh menggunakan penyedap rasa (MSG seperti; royco, ajinomoto, sasa, dll) pada makanan” dan didapat bahwa sebanyak 87,8% responden menjawab “Setuju”. Stress juga menjadi salah satu pemicu terjadinya hipertensi, dimana stress ini dapat meningkatkan pembentukan senyawa yang membahayakan dalam tubuh, mempercepat pompa kerja jantung untuk mengalirkan darah keseluruhan tubuh sehingga tekanan darah meningkat dan dapat menyebabkan terjadinya serangan jantung dan stroke. Stress membuat saraf simpatis aktif mengakibatkan aktivitas kekuatan tekanan darah dan curah jantung bekerja cepat (Prasetyaningrum, 2014).

Berdasarkan hasil distribusi praktik responden, hasil penelitian ini diketahui bahwa 34 (85.0%) responden dengan praktik yang positif lebih banyak yang mengalami hipertensi, dan tidak mengalami hipertensi yaitu 6 (15.0%) responden. Hasil analisis *Fisher Exact Test* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.663 dimana  $p > 0.05$ , yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara praktik dengan hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Soesanto et al., (2010) dimana hasil uji statistik dengan uji *Chi Square* diperoleh nilai  $p = 0,067$  yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara praktik makan terhadap kejadian hipertensi lanjut usia dalam mengendalikan kesehatannya.

Hal ini diasumsikan bahwa adanya faktor lain yang dapat memicu hipertensi, seperti kurangnya aktivitas fisik lansia, pola makan, dan merokok/mengonsumsi kafein berlebih. Apabila ditinjau dari hasil analisis kuesioner, pernyataan yang paling menonjol adalah “Saya selalu sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas” dan 77.5% lansia menjawab “Tidak pernah”. Hal ini dikarenakan saat di pagi hari lansia tidak memiliki waktu yang banyak untuk memasak dan memang sudah terbiasa tidak sarapan. Lalu, pada pernyataan “Saya sulit untuk mengikuti anjuran makan makanan yang beraneka ragam dan sehat” dan terdapat 77.6% responden yang menjawab “Selalu”. Hal ini dikarenakan lansia di Kelurahan Sumpang Binangae ini lebih menyukai mengonsumsi ikan asin sebagai lauk-pauk karena proses pengolahannya yang cepat dan mudah didapat. Terakhir, sebagian besar responden mengonsumsi kopi dan makanan instan (mie instan dan *junk food*). Kafein yang terdapat pada kopi dapat meningkatkan kadar plasma hormon yang diketahui dapat meningkatkan keadaan tekanan darah oleh responden yang di karenakan hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya hipertensi. Mereka yang senang makan makanan instan, berlemak, dan gurih



berpeluang besar terkena hipertensi. Kandungan Na (natrium) dalam garam yang berlebihan dapat menahan air (retensi) sehingga meningkatkan jumlah volume darah. Akibatnya jantung harus bekerja keras memompa darah dan tekanan darah menjadi naik. Inilah yang menyebabkan hipertensi (Soesanto et al., 2010).

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang makanan yang baik dan tidak. Diantara ayat tersebut terdapat di dalam surat Al-A'râf/7: 157 berbunyi :

وَحُلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرَمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Artinya :

....”dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk” ... (Q.S Al-A'raf/7: 157)

Yang dimaksud dari hadist di sini adalah sebaiknya kita konsumsi makan makanan yang baik, bergizi lagi sesuai dengan selera dan kondisi yang memakannya. Selain itumakna baik di sini juga bisa diartikan berkhasiat pada tubuh manusia, mengandung zat-zat yang menumbuhkan, menyuburkan dan menjadikan manusia lebih sehat (Satrio, 2021).

## **2. Hubungan Antara Asupan Gizi dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Kelurahan Sumpang Binangae.**

Menurut Wirakusumah (2002) dalam (Anita, 2016) asupan gizi yang tepat berperan dalam menciptakan kesehatan lanjut usia secara optimal. Jenis makanan yang menyebabkan hipertensi yaitu makanan yang siap saji yang mengandung pengawet, kadar garam yang terlalu tinggi dalam makanan, kelebihan konsumsi lemak.

Pada distribusi hubungan antara asupan energi dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae, ada sebanyak 34 (79.1%) responden dengan kategori asupan energi baik tetapi masih mengalami hipertensi. Hasil analisis *Spearman*

diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.224 dimana nilai  $p > 0.05$ , yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan energi dengan kejadian hipertensi pada lansia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Simamora (2018) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara tingkat kecukupan energi dengan tekanan darah sistolik dan diastolik pada respondennya. Ada beberapa sampel yang asupan energinya baik tetapi masih mengalami hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi tidak hanya dipengaruhi oleh asupan energi saja tetapi ada faktor lain seperti kolesterol dan asupan gizi lainnya. Tingkat kecukupan energi tidak memiliki hubungan secara langsung terhadap hipertensi, tetapi jika seseorang mengonsumsi energi yang masuk melalui makanan melebihi energi yang dikeluarkan, maka dapat terjadi kelebihan energi. Kelebihan energi ini akan diubah menjadi lemak yang menyebabkan terjadinya obesitas dan dapat memicu hipertensi (Corwin, 2009).

Berdasarkan hasil distribusi hubungan asupan lemak dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae, bahwa sebanyak 32 (78.0%) responden dengan kategori asupan lemak yang baik tetapi masih mengalami hipertensi, sedangkan yang tidak hipertensi hanya sebanyak 9 (22.0%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.150 dimana  $p > 0.05$ , berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan lemak dengan kejadian hipertensi pada lansia. Hal ini sejalan dengan penelitian Kristina Rosalia & Wahyuni (2021) yang menyatakan bahwa secara statistik hubungan kecukupan lemak dengan kejadian hipertensi tidak signifikan ( $p > 0.05$ ).

Lemak yang ada di dalam hidangan memberikan kecenderungan untuk meningkatkan kolesterol darah, terutama lemak hewani yang mengandung lemak jenuh. Kolesterol yang tinggi ini sangat berkaitan dengan peningkatan prevalensi penyakit

hipertensi (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2013). Pada penelitian ini, meskipun pada penderita hipertensi memiliki asupan lemak baik, namun apabila ditinjau berdasarkan hasil analisis *nutrisurvey* dimana asupan lemaknya dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh, terdapat 87.2% lansia mengonsumsi lemak jenuh dan lansia juga mengakui selalu menggoreng makanan dengan minyak yang sudah dipakai 4-5 kali, dimana minyak jelantah ini termasuk dalam asam lemak jenuh. Anjuran konsumsi lemak perhari sesuai Permenkes (2013) tentang percantuman kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan dan siap jadi adalah 20-25% per hari atau setara dengan 67 gram/orang/hari. Kadar lemak trans dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah karena banyaknya lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Keadaan seperti ini dapat memacu jantung untuk memompa darah lebih kuat sehingga memicu kenaikan tekanan darah (Corwin, 2009).

Berdasarkan hasil distribusi hubungan asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae, bahwa responden dengan kategori asupan karbohidrat baik, ternyata masih banyak lansia yang mengalami hipertensi yaitu sebanyak 33 (80.5%) responden. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.579 dimana nilai  $p > 0.05$ , berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi pada lansia. Penelitian sejalan dengan penelitian Manawan dkk (2016) dimana hasil analisisnya diperoleh nilai  $p = 0,392$  ( $p > 0,05$ ), yang artinya tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian hipertensi.

Dalam penelitian ini, terdapat lansia yang mengalami hipertensi, padahal asupan karbohidratnya baik. Hal ini diasumsikan bahwa terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian hipertensi, seperti kolesterol dan asupan natrium berlebih.

Pada penderita hipertensi yang memiliki asupan karbohidrat yang baik, namun saat ditinjau berdasarkan hasil analisis *nutrisurvey* dengan menggunakan metode *food recall* saat wawancara, makanan yang mengandung karbohidrat yang paling sering dikonsumsi adalah biskuit dan *crekers* dengan frekuensi makan tertinggi pada 5-6 kali/minggu dan setelah dianalisis ternyata biskuit dan *creakers* ini mengandung natrium yang tinggi yaitu 75 mg per keping. Komposisi makanan seperti karbohidrat diduga memiliki peran penting dalam kejadian hipertensi, mengingat keduanya akan di metabolisme menjadi trigliserida dan LDL (*Low Density Lipoprotein*) apabila kadarnya terlalu berlebihan. Mengonsumsi karbohidrat berlebih dapat menyebabkan kadar trigliserida dalam darah meningkat sehingga menyebabkan karbohidrat diubah menjadi lemak. Kadar lemak yang tinggi dapat menyebabkan erosklerosis yang akhirnya akan menyebabkan terjadinya hipertensi (Prasetyaningrum, 2014).

Berdasarkan hasil distribusi hubungan asupan serat dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae, dari 44 responden yang asupan seratnya kurang terdapat 37 (84.1%) responden yang hipertensi dan masih ada 2 (100%) responden yang asupan seratnya baik tapi masih hipertensi. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.232, dimana nilai  $p > 0.05$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan serat dengan kejadian hipertensi pada lansia. Hal ini sejalan dengan penelitian Lutfi (2019) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara konsumsi serat dengan derajat hipertensi pada lansia di Puskesmas Kecamatan Bangkalan ( $p=0.110$ ).

Pada penelitian ini, masih ada lansia yang mengalami hipertensi padahal asupan seratnya baik, hal ini diasumsikan bahwa hipertensi berkaitan dengan pengaruh asupan zat gizi lain dan aspek *life style* (Derryl, 2008). Kondisi alam yang masih membudaya

dimasyarakat Sumpang Binangae menyebabkan penderita hipertensi masih enggan untuk mengonsumsi makanan tinggi serat dan lebih menyukai ikan asin maupun makanan yang asin sebagai makanan sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan banyak lansia yang jarang mengonsumsi sayur dan buah yang beragam. Dari hasil analisis *nutrisurvey*, makanan yang paling sering dikonsumsi oleh lansia adalah pisang, bayam, kangkung, daun singkong, dan pepaya.

Terakhir, berdasarkan hasil distribusi hubungan asupan natrium dengan kejadian hipertensi lansia di Kelurahan Sumpang Binangae, dari 36 responden yang asupan natriumnya lebih terdapat 31 (88.6%) responden yang hipertensi dan 3 (100%) responden yang asupan natriumnya baik tetapi masih hipertensi. Hasil analisis *Spearman* diperoleh nilai  $p$  sebesar 0.029 berarti nilai  $p < 0.05$ , berarti terdapat hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Manawan (2016) yaitu hasil dari uji statistik terdapat hubungan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi lansia di Desa Tandengan Satu Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa, di peroleh  $p=0,000$  ( $p<0,05$ ).

Untuk lansia yang asupan natriumnya baik tetapi masih hipertensi, kemungkinan besar dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kolesterol atau lemak jenuh, stress, konsumsi alkohol, dan gaya hidup yang kurang sehat (Kholifah et al., 2013). Sumpang Binangae yang terkenal dengan pulau garam, penyajian masakan asin sudah menjadi makanan sehari-hari yang dikonsumsi para lansia. Kebiasaan ini bukan hanya terjadi selama beberapa generasi, bukan hanya sebatas kebudayaan melainkan mengonsumsi masakan asin merupakan kebutuhan lansia. Sehingga sangat sulit merubah kebiasaan tersebut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Abasa/80: 24, yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Q.S. Abasa/80: 24)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT senantiasa mengingatkan manusia untuk memperhatikan makanannya, sebagaimana Ia telah menyiapkan bermacam-macam makanan yang bergizi sehingga memenuhi kebutuhannya.

Dalam penelitian ini, meskipun pada penderita hipertensi memiliki asupan natrium yang cukup, namun saat ditinjau dari hasil analisis *nutrisurvey*, masih banyak lansia yang makan makanan asin, mie instan atau *junk food*, dan gorengan yang mengandung lemak trans. Selain itu, makan dengan lauk yang digoreng dengan minyak jelantah (sisa minyak yang dipakai 3-4 kali) dan beranggapan bahwa minyak tersebut masih layak di gunakan, serta masih banyaknya lansia yang konsumsi minum minuman yang mengandung kafein seperti kopi. Terakhir, konsumsi makanan asin pada masakan, hal ini dikarenakan masakan akan terasa hambar atau kurang sedap jika diberi sedikit garam dan mengonsumsi ikan asin dengan frekuensi 2 kali (5,284 mg) perhari yang melewati ambang batas kategori konsumsi natrium sesuai AKG pada lansia. Anjuran konsumsi garam perhari sesuai Permenkes (2013) tentang persentase kandungan gula, garam, dan lemak pada pangan olahan dan siap jadi adalah 5 gram/orang/hari atau setara dengan 1 sendok teh.

Allah. SWT berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 100, yang berbunyi:

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya:

*“Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan." (Q.S al-Maidah/5: 100)*

Menurut Satrio (2021) maksud dari surah ini adalah tidaklah sama nilainya di sisi Allah dan dampaknya di kemudian hari antara sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang baik, yang membahayakan dengan yang bermanfaat, yang rusak dengan yang baik, yang haram dengan yang halal, dan yang zalim dengan yang adil, meskipun kuantitas yang buruk itu lebih menarik hati, karena yang sedikit tetapi berkualitas adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi tidak berkualitas. Sama halnya dengan konsumsi makanan, jika makanan yang sedikit tetapi halal, bermanfaat, dan bergizi adalah lebih baik kita mengonsumsi makanan daripada yang banyak tetapi haram dan merugikan kesehatan.

### ***C. Keterbatasan Penelitian***

1. Jumlah subjek penelitian terbatas, yaitu 49 lansia dan hanya berfokus pada wilayah kerja Puskesmas Padongko, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada kelompok subjek yang lebih besar.
2. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan jumlah pertanyaan yang cukup banyak, dan banyak lansia yang tidak fasih berbahasa Indonesia, sehingga lansia sangat sulit menjawab pertanyaan dalam kuesioner tersebut dan peneliti juga membantu dalam membaca pertanyaan dengan bahasa daerah sehingga dalam hal ini banyak menyita waktu yang lama.
3. Alat pengukur tekanan darah pada lansia yaitu Tensimeter digital, sehingga perlu dilakukan 2 kali pengukuran untuk hasil yang akurat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan perilaku makan dan asupan gizi dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia wilayah kerja puskesmas Padongko di Kecamatan Barru, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian persentase perilaku makan lansia, diperoleh hasil bahwa pengetahuan lansia dengan kategori tinggi yaitu sebanyak 47 lansia (95.9%). Sedangkan dengan kategori rendah yaitu sebanyak 2 lansia (4.1%). Lalu, berdasarkan hasil penelitian pada persentase sikap diperoleh hasil bahwa sikap terhadap makan lansia dengan kategori positif yaitu sebanyak 31 lansia (63.3%). Sedangkan dengan kategori negatif yaitu sebanyak 18 lansia (36.7%). Terakhir, berdasarkan hasil penelitian persentase praktik, diperoleh hasil bahwa praktik lansia terhadap makan dengan kategori positif yaitu sebanyak 40 lansia (81.6%). Sedangkan dengan kategori negatif yaitu sebanyak 9 lansia (18.4%).
2. Berdasarkan hasil penelitian persentase pada asupan gizi lansia, menunjukkan sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi energi berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 43 lansia (87.8%). Sedangkan pada kategori cukup sebanyak 5 lansia (10.2%) dan kurang sebanyak 1 lansia (2%). Pada persentase asupan lemak, menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi lemak berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 41 lansia (83.7%), kategori cukup sebanyak 5 lansia (10.2%), dan kategori kurang ada sebanyak 3 lansia (6.1%). Pada tingkat asupan karbohidrat



menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam kategori baik pada tingkat konsumsi karbohidrat berdasarkan Angka Kecukupan Gizi yaitu sebanyak 41 lansia (83.7%), kategori sedang sebanyak 3 lansia (6.1%), dan pada kategori kurang ada sebanyak 5 lansia (10.2%). Pada tingkat asupan serat, lebih banyak lansia ada dalam kategori kurang yaitu sebanyak 44 lansia (89.8%), kategori cukup sebanyak 3 lansia (6.1%) dan kategori baik hanya sebanyak 2 lansia (4.1%). Terakhir, pada tingkat asupan natrium, sebagian besar responden dalam kategori lebih yaitu sebanyak 35 lansia (71.4%), kategori kurang sebanyak 11 lansia (22.4%) dan pada kategori cukup hanya sebanyak 3 lansia (6.1%).

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku makan seperti sikap, praktik, dan pengetahuan dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Padongko Kabupaten Barru.
4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan energi, lemak, karbohidrat, dan serat dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Padongko Kabupaten Barru. Terdapat hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia di wilayah kerja Puskesmas Padongko Kabupaten Barru.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan perilaku makan dan asupan gizi dengan kejadian hipertensi pada lansia di posyandu lansia wilayah kerja puskesmas Padongko di Kecamatan Barru, maka dapat terdapat beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan rutin minimal 2 kali seminggu untuk mengecek tekanandarah lansia di posyandu lansia.

2. Menerapkan diet rendah garam dan konsumsi makanan tinggi serat untuk mencapai tekanan darah mendekati normal agar tidak terjadi komplikasi yang lebih berat.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan. Penelitian lanjutan diharapkan dapat memisahkan antara asupan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Selain itu, diusahakan memperbesar sampel penelitian sehingga hasilnya lebih akurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, M., & Wirjatmadi, B. (2012). *Peran Gizi dalam Status Kehidupan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. (2016). *Hubungan Status Nutrisi Dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Ambulu Kabupaten Jember 2016*. 25, 390–392.
- Arissandi, D., Setiawan, christina T., & Wiludjeng, R. (2019). Hubungan Perilaku Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia. *Jurnal Borneo Cendekia*, 3(2), 40–46.
- Aristi, D. L. A., Rasni, H., Susumaningrum, L. A., Susanto, T., & Siswoyo, S. (2020). Hubungan Konsumsi Makanan Tinggi Natrium dengan Kejadian Hipertensi pada Buruh Tani di Wilayah Kerja Puskesmas Panti Kabupaten Jember. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(1), 53–60.
- Benaroch, A., Perez, S., & Perales, J. (2011). Factors Influencing Adolescent Eating Behaviour: Application and Validation of a Diagnostic Instrument. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 9, 1219–1244.
- Bustan, M. N. (2007). *Epidemiologi: Penyakit Tidak Menular* (Revisi, 2). Rineka Cipta.
- Corwin, E. J. (2009). *Buku Saku: Patofisiologi Edisi 3* (E. Pakaryaningsih (ed.); 3rd ed.). EGC.
- Data Status Gizi Posyandu Lansia. (2019). Status Gizi Lansia Berdasarkan Peta Pengaruh Faktor Determinan Pada Peserta dan Bukan Peserta Posyandu Lansia Sumpang Binangae. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 156–169.
- Derryl Sugianty. (2008). *Hubungan asupan karbohidrat, protein, lemak, natrium dan serat dengan tekanan darah pada lansia*.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Barru. (2019). *Laporan Data Profil Kesehatan Puskesmas Kabupten Barru*.
- Ernawati. (2016). *Hubungan Aktivitas Fisik dengan Perubahan Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi*. August, 8–52.
- Fitri, R. D. (2015). Diagnose Enforcement And Treatment Of High Blood Pressure.
- Ilham, Dezi, Harleni, & Miranda, S. R. (2019). Hubungan Status Gizi, Asupan Gizi Dan Riwayat Keluarga Dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia Di Puskesmas Lubuk Buaya Padang. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis*, 2(1), 1–7.
- Indonesia, K. K. R. (2015). Pedoman Gizi Seimbang. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*., 1–96.
- Kadulli. (2012). *Proposal Hipertensi Pada Lnjut Usia*.
- Kartiningrum, E. D. (2018). Perilaku Makan dengan Kejadian Hipertensi pada Lansia di Desa Gayaman Mojoanyar Mojokerto. *Jurnal Keperawatan Malang (JKM)*, 3(1), 1–6.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Riset Dasar Kesehatan 2013*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Permenkes RI No 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Masyarakat Indonesia* (Vol. 23, Issue 3, p. 2019).
- Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan. (2018). Laporan Provinsi Sulawesi Selatan Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan* (Vol. 110, Issue 9).
- Kholifah, F. N., Bintanah, S., & Handarsari, E. (2013). *Serat dan Status Gizi Kaitannya dengan Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang*. 21–30.
- Kristina Rosalia, M., & Wahyuni, Y. (2021). *Relationship between the Level of Monounsaturated Fat, Mineral, and Nutritional Status with the Incidence of Hypertension in Posbindu PTM Puskesmas Tajur Tangerang City*. 143–152.
- Kuswarhani, R. . T. (2006). Penatalaksanaan Hipertensi pada Lanjut Usia. *Bagian Penyakit Dalam FK. Unud, RSUP Sanglah Denpasar*, 7(Jnc Vi), 135–140.
- Langingi, A. R. C. (2021). Hubungan Status Gizi dengan Derajat Hipertensi pada Lansia di Desa Tombolango Kecamatan Lolakengan. *Community of Publishing In Nursing*, 9(1).
- Lazuardini I, H. A. (2019). Relevansi Hadis Larangan Marah dengan Kesehatan Mental. *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(1), 81.
- Lia Nurmilatun S, Nurhaedar Jafar, S. F. (2019). *Hubungan Perilaku Gizi Seimbang Dengan Kejadian Hipertensi Pada Guru Sekolah Menengah Di Kota Makassar Tahun 2017*.
- Manawan, A., Rattu, A. J. M., & Punduh, M. I. (2016). Hubungan Antara Konsumsi Makanan Sumber Karbohidrat, Lemak, dan Natrium dengan Kejadian Hipertensi di Desa Tandengan Satu Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa. *Pharmakon Jurnal Ilmiah Farmasi*, 5(1), 340–347.
- Martono, H. H. (2009). *Buku Ajar Boedhi-Darmojo : Geriatri (Ilmu Kesehatan Usia Lanjut)* (K. Pranaka (ed.)). Balai Penerbit.
- Masyarakat, D. G. dan K. (2013). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Raja Grafindo Persada.
- Organization, W. H. (2018). Prevalensi Hipertensi. *WHO*.
- Prasetyaningrum, Y. I. (2014). *Hipertensi Bukan untuk Ditakuti* (D. Ari & T. Y (eds.)). FMedia.
- Qurniawati, D. (2018). Hubungan Perilaku Makan Dan Status Gizi Pada Lansia Di Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo. *UNY Journal*, 1, 13–20.
- Satrio, M. A. F. (2021). Makanan Sehat Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Azhar. *In Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 1, Issue 1).
- Simamora, D., Pradigdo, K., Irene, M., & Fatimah, S. (2018). Hubungan Asupan Energi, Makro dan Mikronutrien dengan Tekanan Darah pada Lanjut Usia 2017. *Jurnal Kesehatan*

*Masyarakat (e-Journal)*, 6(1), 426–435.

Smeltzer, S. C. (2013). *Buku Ajar Keperawatan Medical Bedah Volume 1*. EGC.

Soekarti, M., Soetardjo, S., & Almatsier, S. (2011). *Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan*. Gramedia Pustaka Utama.

Soesanto, E., Istiarti, T., & Pietojo, H. (2010). Praktik Lansia Hipertensi dalam Mengendalikan Kesehatan Diri di Wilayah Puskesmas Mranggen Demak. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 5(2), 127–139.

Stefhany, E. (2012). *Hubungan Pola Makan, Gaya Hidup dan Indeks Massa Tubuh pada Pra lansia dan Lansia di Posbindu Kelurahan Depok Jaya 2012*. Universitas Indonesia.

Supariasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar, I. (2001). *Penilaian Status Gizi*. Penerbit Buku Kedokteran (EGC).

Wetherill, D. (2001). *Yang Perlu Anda Ketahui Penyakit Jantung* (Cetakan 1). Elekmedia Komputindo.



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### KUESIONER PENELITIAN



### HUBUNGAN PERILAKU MAKAN DAN ASUPAN GIZI DENGAN KEJADIAN HIPERTENSI PADA LANSIA DI POSYANDU LANSIA WILAYAH KERJA PUSKESMAS PADONGKO KECAMATAN BARRU 2021

No. Responden

#### Sebelum mengisi:

- 1) Mohon bantuan dan kesediaannya untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada.
  - 2) Mohon menjawab pertanyaan dengan jujur dan sesuai hati nurani.
- 

#### A. KUESIONER IDENTITAS

1. Nama Lengkap :
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
3. Tanggal Lahir :
4. Usia : tahun

#### B. DATA ANTROPOMETRI

1. Berat Badan : kg
2. Tinggi Badan : cm

#### C. HASIL PENGUKURAN TEKANAN DARAH

1. Sistolik :
2. Diastolik :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KUESIONER I

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada jawaban yang dianggap sesuai dengan sikap/perilaku anda!

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

No	Sikap	Skala Jawaban			
		SS	S	KS	TS
1.	Lansia harus tidur dan istirahat dengan cukup				
2.	Stress (banyak beban pikiran) tidak berpengaruh terhadap meningkatnya tekanan darah.				
3.	Mengonsumsi makanan mengandung santan baik untuk lansia				
4.	Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi itu adalah penyakit berbahaya. (hipertensi)				
5.	Lansia tidak boleh menggunakan penyedap rasa (MSG seperti; royco, ajinomoto, sasa, dll) pada makanan				
6.	Penderita hipertensi harus makan makanan yang tinggi serat (sayur dan buah yang cukup).				
7.	Penderita hipertensi harus makan makanan yang berlemak tinggi.				
8.	Lansia boleh mengonsumsi rokok/alkohol/minum kopi.				
9.	Lansia perlu menjaga pola makan.				
10.	Penderita hipertensi tidak harus memeriksakan tekanan darah ke petugas kesehatan secara rutin.				



## KUESIONER II

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (√) pada jawaban !

B = Benar

S = Salah

No	Pengetahuan	Skala Jawaban	
		B	S
1	Pusing, susah tidur dan mata berkunang-kunang itu merupakan gejala dari hipertensi.		
2	Orang yang mengalami obesitas (kegemukan) berisiko tinggi terserang penyakit hipertensi.		
3	Melakukan olah raga secara teratur merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan hipertensi.		
4	Keturunan merupakan salah satu faktor risiko yang dapat diubah.		
5	Konsumsi alkohol dan kopi yang berlebih dapat menyebabkan hipertensi		
6	Mengonsumsi makanan yang rasanya hambar (sedikit garam) tidak baik untuk lansia.		
7	Bahan pangan yang mengandung serat yang baik untuk lansia adalah sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh.		
8	Lansia diperbolehkan mengonsumsi daging kambing		
9	Makan makanan yang mengandung MSG tidak boleh dikonsumsi oleh penderita hipertensi.		
10	Konsumsi air minum sebanyak 1 gelas perhari mampu memenuhi kebutuhan air dalam tubuh lansia.		

ALAUDDIN  
MAKASSAR

### KUESIONER III

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda (x) pada optional a, b, atau, c!

No.	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN		
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
1.	Saya selalu makan 3 kali dalam sehari.			
2.	Saya selalu sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas.			
3.	Saya sering mengonsumsi makanan instan (mie instan dan <i>junk food</i> ) karena bisa memenuhi kebutuhan gizi.			
4.	Setiap hari saya mengonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi.			
5.	Sulit untuk mengikuti anjuran beraneka ragam makanan dan sesuaimakanan sehat.			
6.	Konsumsi garam tidak perlu dihindari pada penderita hipertensi.			
7.	Saya memeriksakan tekanan darah secara teratur tiap bulan danmengontrol pola makan.			
8.	Saya mengurangi kebiasaan merokok sehari-hari dan minum alkohol.			
9.	Jika saya telah istirahat cukup tetapi masih terasa pusing, saya akan segera minum obat anti hipertensi.			
10.	Saya sering minum kopi setiap hari.			


**FORMULIR FOOD RECALL**

**Hari 1 / 2 / 3**

Nama Responden :

Tanggal :

Waktu Makan(jam)	Nama Makanan	Banyaknya		Konversi				
		URT	gr	Energi (kkal)	KH (gr)	Lemak (gr)	Natrium (mg)	Serat (gr)



*Lampiran 2. Master Tabel*

NO	Data Personal			Kat. Hipertensi	IMT	Kategori Perilaku Makan		
	Nama	Jenis Kelamin	Umur			Sikap	Praktik	Pengetahuan
1	F	1	60	1	21.4	1	2	2
2	BT	2	59	1	19.7	1	2	2
3	SY	2	78	1	18.6	2	2	2
4	RV	2	60	1	23.8	2	2	2
5	AR	2	60	1	23.6	2	2	2
6	ZR	2	68	1	20.9	2	2	2
7	MA	2	75	1	20.6	2	2	2
8	DS	2	60	1	20.4	2	2	2
9	DI	2	68	2	24.8	2	2	2
10	JL	1	57	1	23.8	1	1	2
11	MP	1	60	1	23.1	1	1	2
12	ML	2	56	1	27.1	2	2	2
13	STR	2	60	1	23.2	1	2	2
14	SN	2	67	2	19.8	2	2	2
15	CH	2	53	1	21.8	2	2	2
16	CYP	2	59	1	24.0	1	2	2
17	RZ	1	65	1	21.5	1	1	2
18	NDA	2	60	1	26.3	1	2	1
19	LIA	2	54	1	20.2	2	2	2
20	KIL	2	58	1	27.1	1	2	2
21	YO	2	60	1	19.1	2	2	2
22	NE	2	60	1	29.0	1	2	2
23	EK	2	60	1	22.7	2	2	2
24	ZU	2	58	1	22.6	2	2	1
25	KML	2	57	1	21.2	2	2	2
26	STB	2	57	1	22.9	2	2	2
27	KN	1	59	2	25.2	2	1	2
28	ASR	2	58	2	18.1	1	2	2
29	NIY	2	60	2	18.1	2	2	2
30	SNA	2	58	1	25.3	1	2	2
31	RH	1	56	2	25.2	1	1	2
32	MJ	1	60	1	26.1	2	1	2
33	SA	2	57	2	19.4	2	2	2
34	DIL	2	58	1	19.0	1	2	2
35	SI	2	60	1	18.6	2	2	2

36	YO	2	58	1	24.4	2	2	2
37	SA	1	59	1	22.0	2	2	2
38	C	2	57	1	30.2	2	2	2
39	AM	2	59	1	20.2	2	2	2
40	SF	1	59	1	23.5	2	1	2
41	I	2	58	1	19.5	1	2	2
42	NU	2	60	1	26.7	2	2	2
43	NO	2	59	1	20.5	2	2	2
44	MU	2	56	1	24.2	2	2	2
45	D	1	60	2	27.3	1	1	2
46	AR	1	58	1	23.0	2	1	2
47	BN	1	59	2	24.4	1	2	2
48	SRC	2	58	1	20.5	2	2	2
49	FTA	2	56	1	21.5	1	2	2

No	NAMA	Energi		Lemak		Karbohidrat		Serat		Natrium	
		% AKG	Kat.	% AKG	Kat	% AKG	Kat	% AKG	Kat	% AKG	Kat
1	F	64.93	1	66.9	1	72.74	2	28.8	1	301.67	2
2	BT	82.40	2	62.6	1	106.24	3	50.76	1	389.33	1
3	SY	132.04	3	153.6	3	133.21	4	58.04	2	345.15	1
4	RV	220.11	3	291.9	3	145.94	4	105.12	3	356.61	1
5	AR	143.49	3	156.8	3	118.35	4	73.04	1	346.10	1
6	ZR	129.66	3	151.7	3	108.95	3	62.16	1	400.95	1
7	MA	80.95	2	83.8	2	104.01	2	48.8	1	346.44	1
8	DS	113.91	3	107.3	3	110.58	4	58.52	1	342.99	3
9	DI	113.95	3	132.3	3	101.60	4	44.16	1	192.74	2
10	JL	123.44	3	150.4	3	104.34	4	44.3	1	393.93	1
11	MP	129.98	3	150.0	3	108.49	4	43.53	1	371.03	1
12	ML	110.63	3	180.5	3	106.39	1	36.24	1	364.60	1
13	STR	137.15	3	144.0	3	129.77	4	61.72	1	349.34	1
14	SN	144.16	3	124.3	3	149.33	4	67.96	1	222.95	2
15	CH	123.64	3	113.9	3	126.18	4	74.16	1	348.60	1
16	CYP	112.60	3	81.4	2	106.44	4	41.08	1	357.39	1
17	RZ	117.73	3	122.4	3	111.64	4	34.37	1	384.26	1
18	NDA	105.70	3	106.9	3	103.96	4	64.72	1	343.99	1
19	LIA	159.42	3	205.7	3	118.30	4	64.8	1	378.37	1
20	KIL	117.17	3	112.9	3	127.28	4	60.8	1	345.74	1
21	YO	88.31	2	106.4	3	79.93	2	37.64	1	346.33	1
22	NE	137.26	3	110.0	3	115.90	4	70.44	1	287.68	2
23	EK	132.23	3	149.9	3	109.87	4	62.56	1	348.06	1
24	ZU	134.99	3	144.8	3	135.21	4	57.64	1	338.24	2

25	KML	171.46	3	201.1	3	142.90	4	76.24	1	377.29	1
26	STB	165.63	3	203.4	3	138.56	4	78.6	1	345.82	1
27	KN	145.33	3	203.4	3	122.59	4	80.17	2	383.70	1
28	ASR	132.50	3	183.7	3	93.56	3	45.4	1	353.53	1
29	NIY	140.32	3	230.9	3	111.66	4	69.68	1	186.19	2
30	SNA	137.89	3	129.9	3	153.76	4	58.32	1	254.31	2
31	RH	142.42	3	173.5	3	131.06	4	69.4	1	384.47	1
32	MJ	119.98	3	146.2	3	121.59	4	45.1	1	369.28	3
33	SA	149.04	3	188.8	3	132.21	4	84.52	2	347.88	1
34	DIL	136.62	3	163.9	3	115.12	4	50	1	357.67	1
35	SI	123.82	3	90.2	2	131.01	4	59.28	1	361.10	1
36	YO	148.94	3	154.6	3	143.31	4	68.16	1	343.99	1
37	SA	98.65	2	81.7	2	127.82	4	36.27	1	408.24	1
38	C	117.46	3	106.8	3	107.37	4	45.04	1	345.74	1
39	AM	115.14	3	107.9	3	110.37	4	72.4	1	342.92	3
40	SF	123.04	3	103.3	3	129.15	4	57.1	1	374.81	1
41	I	133.60	3	89.9	2	161.08	4	50.48	3	339.39	1
42	NU	102.56	3	129.2	3	74.59	2	47.28	1	355.58	1
43	NO	151.53	3	165.0	3	119.84	4	60.48	1	360.68	1
44	MU	181.45	3	215.2	3	149.26	4	70.32	1	374.99	1
45	D	124.15	3	132.5	3	128.54	4	55.27	1	199.99	2
46	AR	92.05	2	52.9	1	150.35	4	48.9	1	258.38	2
47	BN	124.20	3	130.4	3	175.46	4	63.97	1	192.51	2
48	SRC	175.22	3	202.3	3	170.84	4	54.64	1	232.76	2
49	FTA	169.90	3	267.1	3	158.02	4	68.49	1	348.89	1

**Keterangan :**

Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

Kategori Hipertensi : 1. Hipertensi 2. Tidak Hipertensi

Kategori Perilaku Makan

Sikap & Praktik : 1. Negatif 2. Positif

Pengetahuan : 1. Rendah 2. Tinggi

Kategori Asupan Gizi

Energi, Lemak, Karbohidrat, Serat : 1. Kurang 2. Cukup 3. Baik

Natrium : 1. Lebih 2. Kurang 3. Cukup

*Lampiran 3*

**KODE ETIK PENELITIAN**

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

B.292/KEPK/FKIK/VII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : AYU ADIYANTI  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Hubungan perilaku makan dan asupan gizi dengan kejadian hipertensi pada lanjut usia di posyandu lansia wilayah kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru"**

*"The relationship between eating behavior and nutritional intake with the incidence of hypertension in the elderly at the posyandu for the elderly in the work area of the Padongko Health Center, Barru District"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023.

*This declaration of ethics applies during the period July 5th, 2022 until July 5th, 2023.*

July 5th, 2022  
Professor and Chairperson,

  
Dr. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

*Lampiran 4*

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**



SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: / Kel.SB/VII/2022

**Yang bertanda tangan di bawah ini**

Nama : Hasdianah  
Pangkat / Gol : Penatalaksanaan poslan  
Jabatan : Ketua RT 1 Lompomajang

**Dengan ini menyatakan bahwa**

Nama : Ayu Adiyanti  
NIM : 70200117090  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melakukan penelitian dengan judul "Hubungan Perilaku Makan dan Asupan Gizi dengan Kejadian Hipertensi Pada Lansia di Posyandu Lansia Wilayah Kerja Puskesmas Padongko Kecamatan Barru 2022."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumpang Binangae, 16 Agustus 2022

Ketua RT 1 Lompomajang  
Penatalaksanaan Posyandu Lansia







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R