

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU
HAMIL DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS MAKASSAR
TANGGAL 12 JANUARI-23 FEBRUARI
TAHUN 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan jurusan DIII kebidanan Fakultas kedokteran Dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

DEWI ASTIKA
NIM: 70400118023

**JURUSAN DIII KEBIDANAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Astika
Nim : 70400118023
Tempat/Tgl.Lahir : Sangatta, 22 April 2000
Jur/Prodi/Konsentrasi : D3 Kebidanan
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Pada Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Antang Perumnas Makassar Tanggal 12 Januari – 23 Februari Tahun 2022

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata-Gowa, 21 July 2022

Penyusun

DEWI ASTIKA
NIM.70400118023

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Dewi Astika

Nim : 70400118023


Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Antang Perumnas Makassar Tanggal 12 Januari-23 Februari.


Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata, 28 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Zelna Yuni Andryani, S.ST, M.Keb
NIP: 19890328 201903 2 018


Dr. dr. Hj. Dewi Setiawati, Sp. OG.M. Kes
NIP : 19810621 200604 0 005

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di puskesmas Antang Perumnas Makassar Tanggal 12 Januari-23 Februari 2022. Yang disusun oleh Dewi Astika Nim : 70400118023, Mahasiswa Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam uji Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, 29 Juli 2022, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 28 Juli 2022

29 zulhijjah 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
Sekretaris : Firdayanti, S.SiT, M.Keb
Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani, S.ST, M.K eb
Pembimbing II : Dr.dr.Hj. Dewi Setiawati, Sp.OG, M.kes
Penguji I : Anieq Mumti'ah Al-kautzar S.ST, M.Keb
Penguji II : Dr.Rahmi Damis, M.Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.

Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan karunianya kepada kita semua sehingga segala aktivitas yang dikerjakan dapat bernilai ibadah disisinya. Salam dan taslim semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang-meneran sehingga penuli dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul „**Manajemen asuhan Kebidanan Antenatal Care pada Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di Puskesmas Antang Perumas Kota Makassar Tahun 2022**”. Karya ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir pendidikan di jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari penulisan maupun penyajian. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan guna memperbaiki kesalahan yang ada. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Bapak (Muslimin) dan Ibu (Nurmiati) serta saudara saya (Kakak adi, Kakak roni, Desi, Chayril, Syahrul) atas dukungan moral, materi dan doa yang tak terhingga.
2. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D sebagai Rector Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Kepada ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
4. Kepada Ibunda Firdayanti, S.ST., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
5. Kepada Ibunda Anieq Mumthi'ah AlkautZar, S.ST., M. Keb selaku sekretaris prodi kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
6. Kepada Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M. Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
7. Kepada Dr. dr. Dewi Setiawati, S.POG, M.Kes selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya demi membantu, membimbing dan memberikan support arahan bagi penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini
8. Kepada Ibu Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan saya tambahan ilmu agama serta memberikan masukan dan saran yang bersifat islamiah pada karya tulis ilmiah sehingga penulis dapat mengetahui hubungan kasus yang penulis angkat dan kaitannya dengan islam.
9. Segenap dosen terkhususnya para dosen prodi kebidanan dan para staf

akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, bimbingan dan motivasi selama masa studi.

10. Kepada puskesmas dan petugas kesehatan puskesmas perumnas antang yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam pelaksanaan dan penyelesaian studi kasus yang dilakukan
11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan laporan penelitian ini.
12. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan saran dan masukan khususnya angkatan 2018

Akhir kata penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kesehatan.

Samata-Gowa, 21 July 2022

Penyusun

DEWI ASTIKA
NIM.70400118023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Ruang lingkup pembahasan.....	5
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	10
1. Definisi Kehamilan.....	11
2. Proses Kehamilan.....	17
3. Tanda –tanda Kehamilan.....	22
4. Patofisiologi Kehamilan.....	25
5. Perubahan fisiologi pada ibu hamil.....	28
B. Tinjauan khusus tentang Hiperemesis Gravidarum.....	28


1. Pengertian Hiperemesis gravidarum.....	29
2. Etiologi	30
3. Patologis	31
4. Patofisiologi.....	32
5. Tanda dan gejala.....	33
6. Klarifikasi	37
7. Penatalaksanaan.....	42
C. Tinjauan umum tentang hyperemesis gravidarum tingkat I.....	42
1. Pengertian	42
2. Tanda dan gejala.....	42
3. patologis.....	43
4. penalaksanaan.....	44
D. Proses manajemen asuhan kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	45
2. Langkah-langkah Manajemen Asuhan Kebidanan.....	49
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	51
BAB III STUDI KASUS	52
A. Manajemen Asuhan Kebidanan dengan 7 langkah varney	64
B. Pendekomentasian Hasil Asuhan Kebidanan.....	80
BAB IV PEMBAHASAN.....	92
A. Langkah I. Identifikasi data dasar	82
B. Langkah II. Identifikasi diagnose/masalah aktual.....	84
C. Langkah III. Identifikasi diagnose/masalah potensial.....	85

D. Langkah IV. Tindakan segera atau kolaborasi.....	86
E. Langkah V. Rencana tindakan	88
F. Langkah VI. Implementasi	92
G. Langkah VII. Evaluasi hasil asuhan.....	92
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Dokumentasi
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan)
- Lampiran III : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi selatan) Kepada Bupati Gowa.
- Lampiran IV : Surat izin Rekomendasi Penelitian dari Bupati Gowa /Kepala Badan Kesbang Dan Politik Kabupaten Gowa Kepada puskesmas Antang Perumnas Makassar
- Lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Antang Perumnas Makassar
- Lampiran VI : Surat Keterangan Layak Etik
- Lampiran VII : Daftar Riwayat Hidup



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH TAHUN 2022

Dewi Astika, 70400118023

Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani

Pembimbing II : Dewi Setiawati

Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar Tahun 2022

Mual muntah berlebihan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, dimana kejadian ini dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan, mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I (Syamsuddin Syahril, 2018).

Kehamilan dengan komplikasi mual dan muntah merupakan gejala umum yang terjadi pada sekitar 70% sampai 85% dari seluruh kehamilan. Insidensi terjadinya kasus hiperemesis gravidarum sebesar 0,8% sampai 3,2% dari seluruh kehamilan atau sekitar 8 sampai 32 kasus per 1000 kehamilan (Nisak Ana Zumatum dan Wigati Atun, 2018). Sehingga tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Antang Perumnas sesuai dengan kebutuhan dan wewenang bidan, menggunakan metode manajemen asuhan kebidanan 7 langkah Varney dan SOAP.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny "K", menunjukkan bahwa ibu dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I berlangsung secara normal dan baik. Setelah dilakukan asuhan selama 43 hari dengan melakukan kunjungan ANC sebanyak 6 kali, diperoleh keadaan ibu normal, semua hasil pemeriksaan dalam batas normal, dan tidak ditemukannya masalah potensial seperti hiperemesis gravidarum tingkat II, gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain.

Kesimpulan dari studi kasus dengan melakukan pengkajian berupa anamnesis dan pemantauan pada ibu dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I di Puskesmas Antang Perumnas tanggal 12 Januari – 23 Februari 2022, pengkajian yang dilakukan berlangsung secara normal dan telah dilakukan pendokumentasian terkait semua tindakan yang telah dilakukan dan informasi yang telah didapatkan dari klien yang telah dilaksanakan pada ibu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kasus yang didapatkan.

Kata Kunci : Kehamilan, Hiperemesis Gravidarum Tingkat I, 7 Langkah Varney



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, YEAR 2022

Dewi Astika, 70400118023

Supervisor I : Zelna Yuni Andryani

Supervisor II : Dewi Setiawati

The Antenatal Midwifery Care Management for Pregnant Women with Hyperemesis Gravidarum Level I at Antang Public Health Center of Makassar in 2022

Excessive nausea and vomiting are considered to be the complications of pregnancy which may affect the health of a mother and the growth and development of fetus. These problems could be detected and prevented during pregnancy. However, nausea and vomiting are the most common disorders encountered by women in the first trimester of their pregnancy (Syamsuddin Syahril, 2018).

Nausea and vomiting have been the common symptoms of pregnancy that occur in about 70% to 85% of pregnant women. In terms of hyperemesis gravidarum, the proportion of the occurrence is approximately 0.8% to 3.2% of all pregnancies or about 8 to 32 cases per 1000 pregnancies (Nisak Ana Zumatum and Wigati Atun, 2018). The major purpose of this study was to provide midwifery care management to pregnant women with the case of Hyperemesis Gravidarum Level I at Antang Public Health Center in Peruman Makassar. The treatments given were in accordance with midwifery procedures by using the 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure.

The results of this case study indicated that the patient condition with Hyperemesis Gravidarum was considered to be normal and could be well treated. Moreover, there were 43 days of caring given to the patient with 6 times of ANC visits. Based on the monitoring process, it was suggested that the patient was in good condition where all examination results were within normal limits. In addition, the potential problems such as nutritional disorders, metabolic disorders, infectious diseases and other issues were not found.

This study concludes that anamnesis and monitoring of the patient with Hyperemesis Gravidarum Level I were conducted at the Antang Perumnas Health Center on 12 January – 23 February 2022. During the treatment, all the procedures and examination were properly carried out by the health workers. There were no problems found, and therefore it could be suggested that the findings of this study have aligned with previous research and theories.

Key Words: Pregnancy, Hyperemesis Gravidarum Level I, 7-stage of Varney

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Federasi Obsetri Ginekologi Internasional, kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan terbagi 3 trimester dimana trimester kesatu berlangsung 12 minggu, trimester kedua 15 minggu (minggu ke 13-27), minggu ketiga 13 minggu (minggu ke 28-40). (Prawihardjo, 2016).

Kehamilan adalah suatu proses fisiologi yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki laki dan sel kelamin perempuan. Dengan kata lain,kehamilan adalah pembuahan ovum oleh spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin (Ariantika dan Fatimah, 2019).

Mual muntah berlebihan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, dimana kejadian ini dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan,mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I (Syamsuddin Syahril, 2018).

Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil sampai mengganggu pekerjaan sehari hari karena umumnya

keadaan menjadi buruk, karena terjadi dehidrasi. Penyebab hyperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan disebabkan oleh adanya peningkatan hormon estrogen dan Hormon Chorionic Gonadotrophin (HCG), pada umumnya wanita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan ini, meskipun demikian gejala mual dan muntah yang berat dapat berlangsung sampai 4 bulan. Sehingga, pekerjaan sehari hari menjadi terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. (Nadyah, 2013).

Kehamilan dengan komplikasi mual dan muntah merupakan gejala umum yang terjadi pada sekitar 70% sampai 85% dari seluruh kehamilan. Insidensi terjadinya kasus hyperemesis gravidarum sebesar 0,8% sampai 3,2% dari seluruh kehamilan atau sekitar 8 sampai 32 kasus per 1000 kehamilan (Nisak Ana Zumatan dan Wigati Atun, 2018).

WHO (World Health Organization) memperkirakan setiap tahunnya 500.000 ibu meninggal sebagai akibat langsung dari kehamilan. Ironisnya sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan teknologi sederhana. Kesukaran dalam mengukur kematian ibu sudah lama menjadi kendala dalam menyadarkan para perencana kesehatan dan pihak lainnya akan besarnya masalah serta penyebabnya, sehingga menghambat intervensi yang efektif dalam porsi yang memadai. Lebih dari dua pertiga kejadian kehamilan masih berada dalam perlindungan/pertolongan para dukun yang mudah dimengerti mempunyai tingkat keamanan yang rendah (WHO, 2018).

Berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) terakhir tahun 2017, angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2015 telah turun

keposisi 305/100.000 kelahiran terhadap hidup di tahun 2010 berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) terakhir yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai,AKI menunjukkan jumlah kematian perempuan saat hamil, melahirkan atau masa nifas (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017).

Ibu hamil yang mengalami hyperemesis mencapai 12,5% dari seluruh jumlah kehamilan di dunia dengan angka kejadian yang beragam yaitu mulai dari 0,3% di swedia, 0,5% di California, 0,8% di Canada, 10,8% di china, 0,9% Di Norwegia, 2,2% di Pakistan, dan 1,9% di turki, sedangkan angka kejadian hyperemesis gravidarum di Indonesia adalah mulai dari 1-3% dari seluruh kehamilan. Masuroh dan Retnosari,2016). Kehamilan dengan komplikasi dengan komplikasi hyperemesis gravidarum berdasarkan data provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 dari 43 puskesmas di kota Makassar sebanyak 26.722 orang atau 62,9(9% (Dinkes Makassar, 2018).

Menurut Dinas kesehatan kota Makassar cakupan pelayanan antenatal pertama kali tanpa memandang trimester kehamilan meningkat dari 93,8% pada tahun 2017 menjadi 98,09% pada tahun 2018 dan yang mengalami hiperemesis gravidarum sekitar 20,3% dari 184 163 ibu hamil (Dinkes RI, 2018).

Mual dan muntah pada kehamilan berlebih atau hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan ibu hamil, namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, bayi berat lahir rendah, kelahiran prematur serta malformasi pada bayi baru lahir.Kejadian

pertumbuhan janin terhambat (Intrauterine Growth Retardation/ IUGR) meningkat pada wanita hamil dengan hiperemesis gravidarum (Ardani, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari puskesmas Antang Perumnas Makassar, Jumlah ibu hamil yang mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I pada tahun 2019 sebanyak 26 orang dari 135 ibu hamil, dan Angka kejadian hiperemesis gravidarum tingkat I ditahun 2020 sebanyak 31 orang dari 143 ibu hamil.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas masalah hiperemesis gravidarum dengan menggunakan “ Asuhan Kebidan Antenatal Care dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar dengan harapan dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi klien.

B. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, rumusan masalah pembahasan dalam penulisan proposal ini adalah bagaimana penerapan asuhan kebidanan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Melakukan asuhan kebidanan antenatal care dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar menggunakan pendekatan asuhan kebidanan sesuai wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

Melakukan pengkajian data dengan hiperemesis gravidarum tingkat Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.

- a. Melakukan identifikasi diagnosa/ masalah aktual dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- b. Melakukan antisipasi diagnosa atau masalah potensial dengan hiperemesis gravidarum tingkat Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- c. Melakukan tindakan segera rujukan atau kolaborasi dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- d. Melakukan rencana asuhan kebidanan dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- e. Melakukan asuhan kebidanan dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- f. Melakukan evaluasi asuhan kebidanan dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.
- g. Melakukan dokumentasi semua temuan dan tindakan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan dengan hiperemesis gravidarum Tingkat I Di Puskesmas Antang Perumnas Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan kesehatan ibu dan anak penurunan angka kematian ibu yang masih cukup tinggi dengan meningkatkan kualitas pelayanan dalam asuhan kebidanan patologi, terkhusus dalam penanganan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

Sebagai salah satu sumber informasi bagi kebijakan dan pelaksanaan program baik ditempat penelitian dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program antenatal care terutama pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I.

2. Manfaat institusi

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi rekan rekan Mahasiswa program studi Kebidanan Diploma III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan memperkaya ilmu dan pengetahuan serta acuan bagi penulis atau peneliti selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

Proses penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah wawasan dalam asuhan

kebidanan khususnya mengenai antenatal care dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

E. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, jurnal, media internet yang berhubungan dengan masalah yang digunakan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney (2003), dengan tujuh langkah Varney yang meliputi : identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah actual, identifikasi diagnosa atau masalah potensial, tindakan segera rujukan atau kolaborasi, rencana asuhan atau intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang diberikan, dalam pengumpulan data dan pengkajian data menggunakan teknik antara lain:

a. Anamnesa

Melakukan tanya jawab atau diskusi dengan ibu, suami keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Tujuan dilakukan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan fisik. Adanya kelainan dan kenyamanan fisik ibu. Dilakukan secara sistematis yaitu secara berurutan yang dimulai dari kepala sampai kaki (head to toe meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi)

3. Studi dokumentasi

Dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari status kesehatan ibu yang bersumber dari catatan dokter, bidan, perawat, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Diskusi

Melakukan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yaitu bidan maupun dokter yang menangani langsung pasien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

BAB I, pada bab ini terdapat pendahuluan, latar belakang, ruang lingkup, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini terdapat tinjauan umum kehamilan, tinjauan khusus hiperemesis gravidarum tingkat I,

BAB III, pada bab ini terdapat studi kasus, akan menguraikan tentang 7 varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah actual, identifikasi atau diagnosa potensial, tindakan segera rujukan atau kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi, serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

BAB IV menjelaskan makna hasil penelitian. Pembahasan membahas ada tidaknya kesenjangan antara teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada bab V yaitu penutup, akan memberikan kesimpulan dan saran

dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang didapatkan dari hasil asuhan.

Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah dijadikan rujukan dalam penulisan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan merupakan masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari). Kehamilan di bagi atas 3 semester yaitu; kehamilan trimester pertama mulai 0-14 minggu, kehamilan trimester kedua mulai 14-28 minggu, kehamilan trimester ketiga mulai 28-42 minggu. (Yuli, 2017).

Kehamilan adalah suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan keturunan sehingga menghasilkan janin yang tumbuh dalam rahim seorang wanita (Imelda fitri dan rizki natia wiji, 2019).

Kehamilan adalah suatu proses fisiologi yang terjadi pada perempuan akibat adanya pembuahan antara sel kelamin laki laki dan sel perempuan. Dengan kata lain, kehamilan adalah pembuahan ovum spermatozoa, sehingga mengalami nidasi pada uterus dan berkembang sampai kelahiran janin (Ariantika dan fatimah, 2019).

Proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pembentukan plasenta, sampai tumbuh kembang hasil konsepsi (Indri Yasa Utami, 2020).

Kehamilan merupakan suatu proses fisiologi hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum.

Tubuh berkembang didalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu (Agustine, dkk, 2019).

2. Proses Kehamilan

Proses kehamilan merupakan proses yang berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi (pengeluaran sel telur), spermatozoa, pembuahan (konsepsi), nidasi, plasentasi.

a. Ovulasi

Ovulasi biasanya terjadi kira kira 14 hari sebelum menstruasi yang akan datang,dengan kata lain di antara dua haid yang berurutan, indung telur akan mengeluarkan ovum. Setelah ovulasi sel sel granulosa dari dinding folikel mengalami perubahan dan mengandung zat warna kuning disebut luteum yang mengeluarkan hormon estrogen dan progesteronbila terjadi konsepsi korpus luteum akan menjadi korpus luteum graviditatum dan bila tak ada konsepsi menjadi korpus luteum menstruationum.

b. Spermatozoa

Spermatogonium berasal dari sel primitif tubulus menjadi spermatosit pertama, menjadi spermatosit kedua, sampai akhirnya menjadi spermatozoa.

Secara embrional, spermatogonium berasal dari sel sel primitif tubulis testis. Pada masa pubertas di bawah pengaruh sel sel interstial leyding. Sel sel spermatogenesis ini mulai aktif mengadakan mitosis dan terjadilah spermatogenesis. Urutan pembuahan spermatogenesis ;

- a) Spermatogonium (membelah dua)
- b) Spermatisit pertama (membelah dua)
- c) Spermatisit kedua (membelah dua)
- d) Spermatid, kemudian tumbuh menjadi
- e) Spermatozoa (sperma)

Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa yang ratus yang dapat mencapai tuba fallopi, spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama 3 hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan konsepsi.

c. Pembuahan (konsepsi)

Pembuahan adalah suatu peristiwa penyatuan antara sel mani dengan sel telur di tuba fallopi, umumnya terjadi di ampulla tuba, pada hari ke sebelas sampai empat belas dalam siklus menstruasi. Wanita mengalami ovulasi (peristiwa matangnya sel telur) sehingga siap untuk dibuahi, bila saat ini dilakukan coitus, sperma yang mengandung kurang lebih seratus sepuluh sampai seratus dua puluh juta sel sperma di pancarkan ke bagian atas dinding vagina terus naik ke serviks dan melintas uterus menuju tuba fallopi disinilah ovum dibuahi.

Hanya satu sperma yang telah mengalami proses kapitasi yang dapat melintasi zona pelusida dan masuk ke vitelus ovum. Setelah itu, zona pelusida mengalami perubahan sehingga tidak dapat dilalui oleh sperma lain. Proses ini diikuti oleh penyatuan ke dua pronuklei yang disebut zigot, yang terdiri atas acuan genetic dari wanita dan pria.

Pembuahan mungkin akan menghasilkan xx zigot menurunkan bayi perempuan dan xy zigot menurunkan bayi laki laki.

Menurut Rustan Mochtar 1998, dalam buku Elisabet Siwi Walyani 2018, dalam beberapa jam setelah pembuahan, mulailah pembelahan zigot selama tiga hari sampai stadium morula. Hasil konsepsi ini tetap digerakkan ke arah rongga rahim oleh arus dan getaran rambut getar (silia) serta kontraksi tuba. Hasil konsepsi tuba dalam kavum uteri tingkat blastula.

d. Nidasi

Nidasi adalah masuknya atau tertanamnya hasil konsepsi ke dalam endometrium. Blastula diselubungi oleh satu sampai disebut trofoblas, yang yang mampu menghancurkan dan mencairkan jaringan. Ketika blastula mencapai rongga rahim, jaringan endometriom berada dalam sekresi. Jaringan endometrium ini banyak mengandung sel sel desidua yaitu sel sel besar yang mengandung banyak banyak glikogen serta mudah dihancurkan oleh trofoblas. Blastula dengan bagian yang berisi massa sel dalam (inner cell mass) akan mudah masuk kedalam desidua, menyebabkan luka kecil yang kemudian sembuh dan menutup lagi.

Itulah sebabnya kadang kadang pada saat nidasi terjadi sedikit perdarahan akibat luka desidua (tanda hartman). Umumnya nidasi terjadi pada depan atau belakang rahim (kurpus) dekat fundus uteri. Bila nidasi telah terjadi, dimulailah diferensiasi sel sel blastula. Sel lebih kecil yang

terletak dekat ruang exocoelema membentuk entoderm dan yolk sac sedangkan sel sel yang tumbuh besar menjadi endoterm dan membentuk ruang amnion. Maka terbentuklah suatu lempeng embrional (embrional plate) di antara amnion dan yolk sac.

Sel sel trofoblas mesodermal yang tumbuh disekitar mudigah (embrio) akan melapisi bagian dalam trofoblas. Maka terbentuklah sekat korionik (chorionik membrane) yang kelak menjadi korion. Sel sel trofoblas tumbuh menjadi dua lapisan yaitu sititrofoblas (sebelah dalam) dan sinsitio trofoblas (sebelah luar).

Villi koriales yang berhubungan dengan desidua basalis tumbuh bercabang cabang dan disebut korium krodosum sedangkan yang berhubungan dengan desidua kapsularis kurang mendapat makanan sehingga akhirnya menghilang disebut chorion leave.

Allah sudah menjelaskan dalam Q,S Al. Mu`minun/23:12-14 tentang perkembangan janin dalam rahim.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا
 فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati pati

itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik". (Q.S Al-Mu'minun ayat 12-14)

Tafsir Q.S Al-Mu'minun ayat 12-14. Dan kemudian kami menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nuthfah, yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbhi mereka, lalu menetap dalam Rahim-rahim kaum wanita. Kemudian air nuthfah itu menjadi alaqah, yaitu gumpalan darah merah. Lalu selepas empat puluh hari, kami ciptakan alaqah menjadi mudghah, yaitu gumpalan daging sebesar satu suapan yang di kunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi tulang-tulang, lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu kami menciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu (Tafsir Al- Mukhtashar).

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia di ciptakan dari tanah. Yang Allah kemudian Allah meniupkan roh kepadanya. Melalui gumpalan darah Allah jadikan tulang belulang lalu Allah lengkapi dengan

pengelihatannya dan pendengarannya dan menyempurnakan ciptanya agar kalian bersyukur, namun sedikit sekali yang bersyukur.

Selanjutnya pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari saripati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang di anugerahkan ibu saat kehamilan janinnya.

e. Plasentasi

Pertumbuhan dan perkebangan desidua sejak terjadi karena pengaruh hormon terus tumbuh sehingga makin lama menjadi tebal. Desidua adalah mukosa rahim pada kehamilan yang terbagi atas :

a) Desidua basalis

Terletak di antara hasil konsepsi dan dinding rahim, disini plasentater bentuk.

b) Desidua kapsularis

Meliputi hasil konsepsi ke arah rongga rahim yang lama kelamaan bersatu dengan desidua vera karena obliterasi.

c) Meliputi lapisan dalam dinding rahim lainnya

Rasulullah Shallallahu ,alaihi wa sallam dalam satu hadits shahih bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعٍ،

Terjemahnya ;

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari segumpal darah selama itu pula selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh padajarin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya”.(H.R Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas“ud Radhiyallahu ,anhu).

Adanya janin dalam rahim ibu, turut mempengaruhi kondisi fisik sang ibu, seorang ibu yang sedang hamil mengalami banyak perubahan baik perubahan fisik maupun psikologi. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu yang sedang hamil.

3. Tanda-tanda kehamilan

a. Pengertian tanda tanda kehamilan

Tanda tanda kehamilan adalah sekumpulan tanda atau gejala yang timbul dan pada wanita hamil yang terjadi karena adanya perubahan fisiologi dan psikologi pada masa kehamilan.

b. Macam macam tanda kehamilan

Menurut marjati, 2011 dalam buku Elisabeth Siwi Walyani, 2018 untuk dapat menegakkan kehamilan ditetapkan dengan melakukan penilaian terhadap beberapa tanda dan gejala kehamilan.

a). Tanda dugaan hamil

1) Amenorea (berhentinya menstruasi)

Konsepsi dan nidasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel de graaf dan ovulasi sehingga menstruasi tidak terjadi. Lamanya amenorea dapat diinformasikan dengan memastikan hari pertama haid terakhir (HPHT), dan digunakan untuk memperkirakan usia kehamilan dan tafsiran persalian. Terapi, amenorhea juga dapat disebabkan oleh penyakit kronik tertentu, tumor pituitari, perubahan dan faktor lingkungan, malnutrisi, dan biasanya gangguan emosional seperti ketakutan akan kehamilan.

2) Mual dan muntah

Pengaruh ekstrogen dan progesteron terjadi pengeluaran asam lambung yang berlebihan dan menimbulkan mual dan muntah yang terjadi terutama pada pagi hari yang disebut morning sicknes. Dalam batas tertentu hal ini masih fisiologis, tetapi bila terlampau sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang di sebut dengan hiperemesis gravidarum.

3) Ngidam (menginginkan makanan tertentu)

Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu, keinginan yang demikian disebut ngidam. Ngidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan dan akan menghilang dengan tuanya kehamilan.

4) Syncope (pingsan)

Terjadinya gangguan sirkulasi ke daerah kepala (sentral) menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan syncope atau pingsan. Hal ini sering terjadi terutama jika berada pada tempat keramaian, biasanya akan hilang setelah 16 minggu.

5) Kelelahan

Sering terjadi pada trimester pertama, akibat dari penurunan kecepatan basal metabolisme (basal metabolisme rate-BMR) pada kehamilan yang akan meningkat seiring pertambahan usia kehamilan akibat aktivitas metabolisme hasil konsepsi.

6) Payudara tegang

Estrogen meningkatkan perkembangan sistem duktus pada payudara, sedangkan progesteron menstimulasi perkembangan sistem alveolar payudara. Bersama hormon ini menimbulkan pembesaran payudara, menimbulkan perasaan tegang dan nyeri selama dua bulan pertama kehamilan, pelebaran puting susu, serta pengeluaran kolostrum.

7) Kontipasi atau obstipasi

Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus (tonus otot menurun) sehingga kesulitan untuk BAB.

8) Pigmentasi kulit

Pigmentasi terjadi usia kehamilan lebih dari 12 minggu. Terjadi akibat pengaruh hormon kortikosteroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

b) Tanda kemungkinan hamil

Tanda kemungkinan adalah perubahan-perubahan fisiologis yang dapat diketahui oleh pemeriksa dengan melakukan pemeriksaan fisik pada wanita hamil.

- 1) Pembesaran perut, terjadi akibat pembesaran uterus. Hal ini terjadi pada bulan keempat kehamilan.
- 2) Tanda hegar, tanda hegar adalah pelunakan dan dapat ditekannya isthimus uteri.
- 3) Tanda goodell, adalah pelunakan serviks. Pada wanita yang tidak hamil serviks seperti ujung hidung, sedangkan pada wanita hamil lunak seperti bibir.
- 4) Tanda Chadwick, perubahan warna menjadi keunguan pada vulva dan mukosa vagina termasuk juga porsio dan serviks.
- 5) Tanda Piskasek, merupakan pembesaran uterus yang tidak simetris. Terjadi karena ovum berimplantasi pada daerah dekat dengan kornu sehingga daerah tersebut berkembang lebih dulu.

- 6) Kontraksi braxton hicks, merupakan peregangan sel sel otot uterus, akibat meningkatnya actomysin didalam otot uterus.
 - 7) Teraba ballotement, ketukan yang mendadak pada uterus menyebabkan janin bergerak dalam cairan ketuban yang dapat dirasakan oleh tangan pemeriksa.
 - 8) Pemeriksaan tes biologis kehamilan (planotest) positif, pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin (hCG) yang di produksi oleh sinsiotropoblastik sel selama kehamilan.
- c) Tanda pasti hamil
- Tanda pasti hamil adalah tanda yang menunjukkan langsung keberadaan janin, yang dapat dilihat langsung oleh pemeriksa
- 1) Gerakan janin dalam rahim, gerakan janin ini harus diraba dengan jelas oleh pemeriksa. Gerakan janin baru dapat dirasakan pada usia kehamilan sekitar 20 minggu.
 - 2) Denyut jantung janin, dapat didengar pada usia 12 minggu dengan menggunakan alat fetal electrocardiograf (misalnya dopler).
 - 3) Bagian bagian janin, yaitu bagian besar janin (kepala dan bokong)serta bagian kecil janin (lengan dan kaki) dapat diraba jelas pada usia kehamilan lebih tua (trimester terakhir).
 - 4) Kerangka janin, dapat dilihat dengan foto rontgen maupun USG.

4. Patofisiologi Kehamilan

Proses terjadi kehamilan mulai dari pertemuan sel sperma dan ovum. Secara sederhana kehamilan diartikan sebagai kondisi dimana terdapat janin didalam tubuh wanita akibat aktivitas seksualitas dengan pasangan. Pembuahan terjadi dalam rentang 1 minggu dari ibu selesai haid atau pada 14 hari sebelum siklus haid berikutnya. Inilah dikatakan masa subur dari calon ibu, dalam waktu 7-10 hari berikutnya sel telur yang sudah dibuahi akan tertanam (implantasi) pada dinding uterus dinamakan kehamilan.

Secara umum, proses terjadinya kehamilan dibagi menjadi 2 fase sebelum embrio terbentuk dan proses setelah embrio terbentuk. Proses terjadinya kehamilan dimulai dari awal FSH (Folikel Stimulating Hormon) yang merangsang beberapa folikel menjadi matang dalam kisaran waktu \pm 2 minggu. Saat sel telur matang, ukurannya akan menjadi 3 kali lipat dari ukuran normal. Dan hanya satu folikel yang dominan dalam satu siklus pematangan tersebut.

Selanjutnya sel telur akan lepas dari dinding telur dan dikenal dengan istilah ovulasi. Sel telur yang telah matang tersebut selanjutnya akan ditangkap oleh fimbriae. Selanjutnya akan menuju ke saluran telur menuju ke tuba fallopi. Di tempat tersebut, sel telur akan menunggu kedatangan sperma untuk dibuahi. Jika sperma masuk ke tuba fallopi dan bertemu dengan ovum yang sudah matang maka terjadilah pembuahan yang disebut konsepsi atau fertilitas. Sel telur yang telah berhasil di buahi oleh

sperma akan membelah diri dan bergerak kembali menuju ke dalam rongga uterus dan selanjutnya melekat pada mukosa uterus dan melakukan proses menetap yang disebut nidasi atau implementasi.

Sel telur telah melekat akan terus tumbuh dan berkembang dan membentuk rambut-rambut halus yang berfungsi menyerap gizi ke dalam uterus sebagai sumber energy dalam menjamin pertumbuhannya. Pada hari kelima, sel telur keluar dari indung telur dan mulai membentuk saraf. Selanjutnya, janin akan membentuk otak dan sum-sum 1 dan dilanjutkan dengan terbentuknya jantung, otot sampai ke pembuluh darah. Sementara itu, dalam perut ibu akan terbentuk plasenta atau ari-ari yang berperan selayaknya selimut dan menutupi tubuh janin (Ariantika dan Fatimah, 2019).

Plasenta terbentuk di usia kehamilan 3 minggu. Plasenta mengandung pembuluh darah ibu atau meternal dan juga embrio, melalui embrio janin atau plasenta mendapatkan nutrisi dari ibunya, melalui organ ini juga terjadi pertukaran gas respirasi dan juga pembuangan hasil metabolisme janin. Jadi tidak berlebihan plasenta dianggap sebagai jembatan yang menyatukan ibu dan janinnya (Dartiwen dan Yani, 2019).

Berikut ini gambaran proses pembuahan :

- a. Ovum yang dilepas oleh ovarium disapu oleh mikrofilamen-mikrofilamen fimbria fundibulum tuba ke arah ostium tuba abdominalis, dan di salurkan terus ke arah medial. Di tengah tengahnya dijumpai nukleas yang berada dalam metafase pada pembelahan pematangan

kedua, terapung apung dalam sitoplasma yang kekuning kuningan yakni vitelus. Vitelus ini mengandung banyak zat karbohidrat dan asam amino.

- b. Fertilisasi adalah penyatuan ovum dan spermatozoa yang biasanya berlangsung di ampulla tuba. Hanya spermatozoa yang telah mengalami proses kapasitasi mampu melakukan penetrasi membran sel ovum. Untuk mencapai ovum, spermatozoa harus melewati korona radiata (lapisan sel di luar ovum) dan zona pelusida (suatu bentuk glikoprotein ekstraselular) yaitu dua lapisan yang menutupi dan mencegah ovum mengalami fertilisasi lebih dari satu spermatozoa.
- c. Spermatozoa yang telah masuk ke vitelus kehilangan membran nukleusnya, yang tinggal hanya pronukleusnya, sedangkan ekor spermatozoa dan mitokondrianya berdegenerasi.
- d. Dalam beberapa jam setelah pembuahan terjadi, mulailah pembelahan zigot. Hal ini dapat berlangsung oleh karena sitoplasma ovum mengandung banyak asam amino dan enzim. Segera setelah pembelahan ini terjadi, pembelahan-pembelahan terjadi selanjutnya berjalan dengan lancar, dan dalam tiga hari terbentuk suatu kelompok sel yang sama besarnya. Hasil konsepsi berada dalam stadium morula.
- e. Dalam hasil konsepsi yang sama ini, hasil konsepsi disalurkan terus ke pars isthmica dan pars interstitialis tuba (bagian-bagian tuba yang sempit) dan disalurkan terus ke arah kavum uteri oleh arus serta getaran silia pada permukaan sel-sel tuba dan kontraksi tuba. (Sarwono Prawirohadjo, 2016)

5. Perubahan Fisiologi Pada Ibu Hamil

Perubahan fisiologis pada ibu hamil trimester I,II,III;

1. Sistem reproduksi

a. Uterus

Uterus akan mengalami pembesaran di bulan bulan pertama di bawah pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Pembesaran itu disebabkan:

- a) Peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah
- b) Hyperplasia hiperrofi
- c) Perkembangan desidua

Tabel 2.1

Perbedaan Uterus Normal dan Uterus Hamil

Uterus Normal	Uterus Hamil
Berat / : 30 gr	Berat : pada 40 minggu menjdai 1000 gr
Ukuran : 7-7,5 cm x 5,2 diatas cm x 2,5 Cm	Ukuran 20 cm x 5,2 cm x 2,5 cm
Bentuk: alfokat	Bentuk : 4 bln => bulat Akhir hamil => lonjong telur
Besar: Telur ayam	Besar : 8 minggu => telur bebek 12 minggu : telur angsa (TFU teraba diatas smpisis) tanda hegar ismus panjang dan lebih lunak 16 minggu: sebesar kepala bayi atau tinju orang dewasa

Sumber : Tuti dan Mega 2019

b. Serviks uteri

Pada satu bulan setelah konsepsi serviks sudah mulai mengalami pelunakan dan sianosis yang signifikan. Perubahan perubahan ini terjadi karena peningkatan vaskularitas dan edema serviks keseluruhan. (andina vita sutanto, 2018).

c. Vulva dan Vagina

Peningkatan estrogen mengakibatkan vaskularisasi yang menyebabkan vulva vagina merah sehingga tampak kebiru-biruan. Jaringan ikat vagina mengalami retensi air dan elektrolit sehingga menjadi longgar. Mukosa menebal sedangkan otot polos mengalami hipertrofi.

Sekresi meningkat, sel epitel meningkat kadar glikogen yang berintraksi dengan bakteri dodrlein sehingga dapat mengubah kadar asam basa (ph 3-6) yang dapat digunakan sebagai pencegahan perlindungna terhadap organisme tertentu termasuk candida albicans.

d. Ovarium

Selama kehamilan ovulasi berhenti dan pematangan folikel-folikel baru ditunda. Biasanya hanya satu korpus luteum yang ditemukan pada wanita hamil. Struktur ini berfungsi maksimal selama 6-7 minggu pertama kehamilan 4-5 minggu pascaevolusi dan setelah itu tidak banyak berkontraksi dalam produksi progesterone. (Yuni fitriana, 2018).

e. Payudara

Payudara akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama masa kehamilan sebagai persiapan masa laktasi, ada beberapa hormon yang mempengaruhi pertumbuhan payudara yaitu hormon, estrogen progesteron, dan somatomammotropin.

Estrogen memengaruhi sistem saluran kelenjar payudara (menimbulkan hipertrofi), progesterone menambah sel-sel asinus pada payudara, somatomammotropin mempengaruhi pertumbuhan sel asinus sehingga terjadi produksi kasein laktalbumin dan laktoglobulin, sedangkan gabungan progesterone dan somatomammotropin menyebabkan perubahan pada timbunan lemak sekitar asinus/alveolus, hiperpigmentasi areola mammae, penonjolan kelenjar montgomery dan pembuluh darah sekitar payudara menonjol. (Himatulloh dkk, 2019).

f. Sistem Pencernaan (traktus digestivus)

Pada awal dimulainya kehamilan (pada umumnya usia kehamilan 8 minggu), terdapat perasaan mual (nausea), yang disebabkan oleh karena kadar hormon estrogen meningkat. Akibat dari peningkatan hormon progesteron, tonus otot-otot polos saluran cerna menurun, sehingga motilitas (daya gerak) seluruh saluran cerna juga berkurang. Makanan lebih lama berada di dalam lambung dan apa yang telah dicernakan lebih lama berada dalam usus-usus. Mual

muntah biasanya terjadi pada pagi hari, yang disebut morning sickness (Setiawati Dewi, 2020).

g. Sistem Perkemihan (traktus urinarus)

Pada kehamilan trimester pertama, kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga timbul sering kencing keadaan ini hilang dengan makin tuanya kehamilan dan janin mulai turun kebawah pintu atas panggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan kembali (Setiawati Dewi, 2020).

B. Tinjajaun Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum

1. Pengertian Hiperemesis Gravidarum

Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan pada wanita hamil sehingga sehari sehari terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. (Norma & Dwi, 2017).

Hiperemesis adalah mual dan muntah yang terjadi pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 20 minggu. (tim Fakultas kedokteran Universitas Padjadjaran, 2017).

Hiperemesis gravidarum adalah emesis gravidarum yang berlebihan sehingga menimbulkan gejala klinis serta mengganggu kehidupan sehari-hari. (Arantika dkk, 2019).

Menurut Winknosastro, 2005 mengatakan bahwa hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang berlebihan pada ibu hamil. Seorang ibu memuntahkan segala yang dimakan dan di minumnya hingga

berat badan ibu sangat turun, turgo kulit kurang diurese dan timbul aseton dalam air kencing.

Salah satu masalah yang terjadi pada masalah kehamilan yang biasa meningkatkan derajat kesakitan adalah terjadinya gestosis pada masa kehamilan dan salah satu gestosis dalam kehamilan adalah hiperemesis gravidarum. (rukiah dan yulianti, 2019).

Menurut verberg, Gillott Al-Fardan & Grudzinskas 2005, dalam buku Arisiani dan Hastuti 2020 Hiperemesis gravidarum tidak hanya mengancam kehidupan wanita hamil. Namun juga dapat menyebabkan efek samping pada janin seperti abortus, berat bayi rendah, kelahiran prematur, serta malformasi pada bayi baru lahir.

2. Etiologi

Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik, juga tidak ditemukan kelainan biokimia, perubahan-perubahan anatomi yang terjadi pada otak, jantung, hati dan, susunan saraf yang di sebabkan oleh kurangnya vitamin serta zat-zat lain akibat kelemahan tubuh karena makan dan minum beberapa faktor predisposisi dan faktor lain yang telah ditemukan sebagai berikut ;

- a. Faktor predisposisi yang dikemukakan adalah primigravida, mola hidatidosa dan kehamilan ganda. Frekuensi yang tinggi pada mola hidatidosa kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormone

memegang peranan karena pada kedua keadaan tersebut hormone khorionik gonadotropin dibentuk berlebihan.

- b. Masuknya vili khonalis dalam sirkulasi maternal dan perubahan-perubahan metabolic akibat hamil serta resitensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan ini merupakan faktor organic.
 - c. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak, juga disebut sebagai salah satu faktor organic.
 - d. Faktor psikologis, memegang peranan yang penting pada penyakit ini, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan takut akan kehamilan ada persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian kesukaran hidup.
 - e. Faktor adaptasi dan hormonal, pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum dapat di masukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dan anemia.
- (Rukiyah & Yulianti 2019).

3. Patologis

Menurut Prawirohadjo 2005, belah mayat pada mayat wanita yang meninggal kerana hiperemesis gravidarum menunjukkan kelainan kelainan pada berbagai alat dalam tubuh yang juga dapat ditemukan pada malnutrisi oleh beberapa macam :

- a. Pada hati yang tampak degenerasi lemak tanpa nekrosis yang terletak senrilobulr, kelainan ini nampaknya tidak menyebabkan kematian di anggap sebagai akibat muntah yang terus menerus tetapi separuh penderita yang meninggal karena hiperemesis gravidarum menunjukkan gambaran mikroskopi hati yang normal.
- b. Pada jantung menjadi nampak lebih kecil daripada biasanya dan beratnya atrofi dan sejalan dengan lamanya penyakit kadang kadang ditemukan perdarahan su-endokardial.
- c. Di otak dapat ditemukan enesefalopati wernicke yaitu dilatasi kapiler perdarahan kecil di daerah korpora milaria vertikel ketiga dan keempat
- d. Ginjal tampak pucat dan degenerasi lemak dapat ditemukan pada tuli kortoli.

4. Patofisiologis

Hiperemis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis pakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan timbulnya asam seton-asetik, asam hidroksibutirik dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan karena muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang natrium dan klorida darah turun, demikian pula klorida air kemih. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah zat makanan dan oksigen jaringan

mengurang pula dan timbulnya zat metabolik yang toksik. (Rukiyah & Yulianti, 2019).

Perasaan mual adalah akibat dari meningkatnya kadar estrogen, oleh karena keluhan ini terjadi pada trimester pertama pengaruh fisiologik hormone estrogen ini tidak jelas, mungkin berasal dari sistem saraf pusat akibat berkurangnya pengosongan lambung. Penyesuaian terjadi pada kebanyakan wanita hamil. Meskipun demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-bulan.

Didalam tubuh terjadi peradangan lambung sehingga menyebabkan terjadi iritasi pada lambung dan menyebabkan peradangan di lambung yang diakibatkan oleh tingginya asam lambung, setelah terjadi peradangan lambung, maka tubuh akan merangsang pengeluaran zat yang disebut vas aktif yang menyebabkan permeabilitas kapiler pembuluh darah naik. Sehingga menyebabkan lambung menjadi oedema (bengkak) dan merangsang reseptor tegangan dan merangsang hipotalamus untuk muntah.

5. Tanda dan gejala

Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum yang khas adalah sebagai berikut :

- a. Muntah hebat
- b. Haus, mulut kering
- c. Dehidrasi
- d. Mulut berbau
- e. Berat badan menurun

- f. Keadaan umum menurun
- g. Suhu bertambah
- h. Ikterus
- i. Kesadaran menurun
- j. Pemeriksaan laboratorium, hipokalemia, asidosis dalam urine ditemukan protein aseton urobilinogen pertambahan porfilin dan silinder positif.

Gejala dan tanda penyakit biasanya dimulai setelah 5-6 minggu dan kemudian berangsur angsur membaik sendiri sekitar minggu ke 12. Pada bentuk ringan pasien hanya merasa mual atau muntah pada pagi hari saja, sementara pada siang hari sudah membaik, oleh karena itu penyakit ini disebut juga morning sickness. Keadaan ini tidak mempengaruhi keadaan umum penderita (Tim Fakultas Kedokteran Padjajaran, 2017).

6. Diagnosis

- a. Amenore yang disertai muntah hebat (segala yang dimakan dan diminum akan dimuntahkan), pekerjaan sehari-hari terganggu, dan haus hebat.
- b. Fungsi vital : nadi meningkat 100 kali permenit, tekanan darah menurun pada keadaan berat, subfebril dan gangguan kesadaran (apatis-koma).
- c. Fisik : dehidrasi, keadaan berat, kulit pucat, ikterus, sianosis, berat badan menurun, porsi lunak pada vagina touche, uterus besar sesuai besarnya kehamilan.
- d. Laboratorium : kenaikan relatif hemoglobin dan hematokrit shift to the left, benda keton dan proteuria.

7. Klasifikasi hiperemesis gravidarum

1. Hiperemesis gravidarum tingkat I (ringan)

a. Pengertian

Hiperemesis gravidarum tingkat I adalah mual dan muntah berlebihan pada ibu hamil namun masih masuk pada kategori hiperemesis ringan.

b. Gejala

- 1) Mual dan muntah terus menyebabkan penderita lemah
- 2) Tidak mau makan
- 3) Berat badan turun
- 4) Nyeri pada epigastrium
- 5) Nadi + 100x/m, tensi turun
- 6) Turgor kulit turun, lidah kuning, mata cekung. (Norma & Dwi, 2017)

2. Hiperemesis Gravidarum Tingkat II (sedang)

a. Pengertian

Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah mual dan muntah yang hebat menyebabkan keadaan umum penderita lebih parah, apatis, turgor mulai jelek, lidah kuning dan kotor, nadi kecil dan cepat, suhu badan naik, ikhterus ringan, berat badan turun, mata cekung, tekanan rendah, hemokonsentrasi, oliguria, dan konstipasi. Dapat pula terjadi asetonuria, dan dari napas keluar bau aseton (Suryaningrat, 2016).

b. Gejala

- 1) Mual dan muntah hebat menyebabkan keadaan umum penderita parah
- 2) Lemas, apatis
- 3) Turgor kulit jelek, lidah kening dan kotor
- 4) Nadi kecil dan cepat, suhu badan naik, tensi turun
- 5) Ikhterus ringan
- 6) Berat badan turun, mata cekung
- 7) Hemokonsentrasi, oliguria, konstipasi
- 8) Dapat pula terjadi asetonuria, dan napas dari napas keluar bau aseton (Norma & Dwi, 2017).

c. Penatalaksanaan

Penanganan hiperemesis gravidarum harus di rumah sakit sebagai berikut :

- 1) Kadang-kadang pada beberapa wanita, hanya tidur di rumah sakit saja, telah banyak mengurangi mual dan muntahnya.
- 2) Isolasi, penderita sebaiknya dalam kamar tersendiri yang tenang tetapi cerah dan perdarahan udara baik, bebas bau, tau dibatasi hanya boleh dokter dan perawat yang boleh masuk sampai muntah berhenti dan penderita mau makan dengan tidak memberikan makan dan minum selama 24 jam kadang hal ini saja tanpa pengobatan khusus telah mengurangi mual dan muntah.
- 3) Terapi psikologik, berikan pengertian bahwa kehamilan adalah suatu hal yang wajar, normal, dan fisiologis, jadi tidak perlu takut dan khawatir. Cari dan coba hilangkan faktor psikologis seperti keadaan sosial ekonomi, pekerjaan dan lingkungan.

- 4) Cairan parental, cairan sebaiknya menggunakan larutan yang memiliki karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% bila perlu dapat ditambah vitamin dan kalium khususnya vitamin B kompleks dan vitamin C serta bila kekurangan protein dapat diberikan asam amino secara intravena untuk menambah kalori yang berkurang dan makanan yang didapat per oral sekaligus mencegah kekurangan elektrolit.
- 5) Pemberian obat menggunakan seda aktif (Phenobarbital) , vitamin B6 dan B1 anti muntah (drammaming, avomi) antasida (Suryaningrat,2016).

3. Hiperemesis Gravidarum tingkat III Berat

a. Pengertian

Hiperemesis gravidarum tingkat III merupakan keadaan umum lebih parah dan sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu dan tensi turun, komplikasi yang terjadi pada susunan syaraf yang dikenal sebagai ensefalopati wernicke dengan gejala enystagmus, diplopia, dan perubahan mental.

b. Gejala

- 1) Keadaan umum jelek
- 2) Kesadaran sangat menurun
- 3) Sampai koma
- 4) Nadi kecil, halus dan cepat

- 5) Suhu badan naik dan tensi turun
- 6) Icterus
- 7) Komplikasi yang sangat fatal terjadi pada susunan syaraf pusat (enselopi wernicke) dengan adanya nystagmus, diploopia, perubahan mental (Norma & Dwi, 2017).

c. Penatalaksanaan

Penanganan hiperemesis gravidarum tingkat III diperlukan tambahan cairan prenatal yang cukup elektrolit, karbohidrat dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan gram, cairan fisiologik sebanyak 2-3 liter sehari bila perlu dapat ditambah kalium dan vitamin C dan bila ada kekurangan protein dapat diberikan pula asam amino secara intravena.

Hiperemesis gravidarum tingkat III harus di rawat inap dirumah sakit

- 1) Istirahat baring
- 2) Isolasi dan terapi psikologis
- 3) Penambahan cairan, berikan infuse dekstroa atau glukosa 5-10% sebanyak 2-3 liter dalam 24 jam
- 4) Observasicairan masuk dan keluar dengan pemasangan kateter
- 5) Observasi keadaan umum dan vital
- 6) Terapi alternatif

8. Penatalaksanaan

a. Pencegahan

Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perludilaksanakan dengan jalan memberikan penerangan tentang kehamilan dan persalinan

sebagai suatu proses yang fisiologi memberikan keyakinan bahwa mual dan muntah kadang kadang muntah merupakan gejala yang fisiologis pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan bulan, menganjurkan mengubah makanan sehari hari dengan jumlah kecil, tetapi sering. Waktu bangun pagi jangan segera turun dari tempat tidur, tetapi dianjurkan untuk makan roti atau biskuit dengan teh hangat lebih dulu.

Makanan yang berminyak dan berbau lama sebaiknya dihindarkan. Makanan dan minuman disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Dianjurkan memakan makanan banyak mengandung gula (Rukiyah dan Yulianti, 2019).

b. Obat-Obatan

Penatalaksanaan mual dan muntah dalam kehamilan tergantung pada beratnya gejala. Gejala yang ringan biasa diatasi dengan pola diet hingga pengobatan alternatif, rawat inap, dan pengobatan parental. Pengobatan terhadap hiperemesis gravidarum dapat berupa terapi farmakologis dan non farmakologis. Obat yang diberikan pada ibu hamil dapat berupa anti muntah seperti B6, vosear, metoclopramide atau primperan dengan pertimbangan agar mudah diminum oleh ibu hamil.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Soa, Amelia, dan Octaviani, 2018 bahwa pemberian rebusan jahe merah dan daun mint lebih efektif dalam mengurangi mual dan muntah saat kehamilan dibandingkan jeruk nipis dan madu. Menurut Nugrahani, 2017 menyatakan bahwa pemberian seduhan jahe lebih efektif dibandingkan

dengan jus buah jeruk bali untuk mual muntah pada ibu hamil trimester I, permen jahe juga mampu menurunkan emesis gravidarum.

Apabila dengan cara tersebut keluhan dan gejala tidak berkurang maka diperlukan pengobatan sedative yang diberikan phenobarbital vitamin yang di anjurkan yaitu vitamin B1 dan B2 yang berfungsi untuk mempertahankan kesehatan saraf, jantung, otot serta meningkatkan pertumbuhan dan perbaikan sel dan B6 berfungsi menurunkan keluhan atau gangguan mual muntah bagi ibu hamil dan juga membantu dalam sintesa lemak untuk pembentukan sel darah merah. antihistamika juga dianjurkan pada keadaan lebih berat diberikan antimemetik. Seperti disklorin hidrokloride, avomin.

c. Diet

- 1) Diet hiperemesis I diberikan pada hiperemesis tingkat III. Makanannya hanya berupa roti kering dan buah-buahan. Cairan tidak diberikan bersama makanan tetapi 1-2 jam sesudah makan. Makanan ini kurang dalam zat-zat gizi kecuali vitamin C karena itu hanya diberikan selama beberapa hari.
- 2) Diet hiperemesis II diberikan bila ada rasa mual dan muntah berkurang secara berangsur-angsur mulai diberikan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Minuman tidak diberikan bersama makanan. Makanan ini rendah dalam semua zat-zat gizi kecuali vitamin A dan D.
- 3) Diet hiperemesis III diberikan kepada penderita dengan hiperemesis ringan. Menurut kesanggupan penderita minuman boleh diberikan

bersmaan dengan makanan. Makanan ini cukup dalam semua zat gizi kecuali kalsium (Taufan Nugroho, 2018).

Setelah terjadi pembuahan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan sehingga dia merobek rahim dimana ia berdempet dan memakannya sehingga darah mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan saripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya dengan lahap memakannya.

Adapun ayat yang menjelaskan makanan yang di anjurkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah/2 ayat ke 168.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ ۱۶۸

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.(Q.S Al-Baqarah ayat ke 168)

Tafsir Q.S Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memprolehnya. Dan selain halal makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman dan tidak berlebihan. Makanan yang dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Waspadailah usaha setan yang selalu berusaha menjerumuskan manusia dengan segala tipu daya-nya. Allah mengingatkan bahwa sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu, wahai manusia (Tafsir Al-Mukhtashar).

d. Isolasi

Isolasi dilakukan dalam kamar yang tenang, cerah dan peredaran udara yang baik. Hanya dokter dan perawat yang boleh keluar masuk kamar sampai muntah berhasil berhenti dan pasien mau makan. Catat cairan yang masuk dan keluar dan tidak diberikan makan dan minum selama 24 jam. Kadang-kadang dengan isolasi saja sudah cukup membuat gejala-gejala akan hilang atau berkurang tanpa pengobatan.

e. Terapi Psikologik

Perlu diyakinkan pada pendeita bahwa penyakit dapat di sembuhkan, hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan, kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik yang kiranya dapat

menjadi penyebab penyakit. Bantuan positif dalam mengatasi permasalahan psikologis dan sosial dinilai cukup signifikan dalam kemajuan keadaan umum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

1. Pengertian hiperemesis gravidarum tingkat I

Hiperemesis gravidarum tingkat I yaitu mual dan muntah lebih dari tiga kali sehari dengan ketonuria (keton dalam urin) dan kehilangan berat badan lebih dari 5% berat badan sebelum hamil (Yulia Fauziyah, 2012).

Hiperemesis gravidarum tingkat I adalah mual dan muntah berlebihan pada ibu hamil namun masih masuk pada kategori hiperemesis ringan (Norma & Dwi, 2017).

2. Tanda dan Gejala

- 1) Mual dan muntah terus menyebabkan penderita lemah
- 2) Tidak mau makan
- 3) Berat badan turun
- 4) Nyeri pada epigastrium
- 5) Nadi + 100x/m, tensi turun
- 6) Turgor kulit turun, lidah kuning, mata cekung (Norma & Dwi, 2017).

3. Patofisiologis

Hiperemesis gravidarum ini dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis pakai untuk keperluan energi karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, terjadilah ketosis dengan timbulnya asam seton-asetik, asam hidroksibutirik dan aseton dalam darah. Kekurangan

cairan yang diminum dan kehilangan cairan karena muntah menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang natrium dan klorida darah turun, demikian pula klorida air kemih. Selain itu dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi, sehingga alirandarah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan jumlah zat makanan dan oksigen jaringan mengurang pula dan timbulnya zat metabolik yang toksik. (Rukiyah & Yulianti, 2019).

Perasaan mual adalah akibat dari meningkatnya kadar progesteron, oleh karena keluhan ini terjadi pada trimester pertama pengaruh fisiologik hormone estrogen ini tidak jelas, mungkin berasal dari sistem saraf pusat akibat berkurangnya pengosongan lambung. Penyesuaian terjadi pada kebanyakan wanita hamil. Meskipun demikian mual dan muntah dapat berlangsung berbulan-bulan.

4. Etiologi

Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik, juga tidak ditemukan kelainan biokimia, perubahan-perubahan anatomi yang terjadi pada otak, jantung, hati dan, susunan saraf yang di sebabkan oleh kurangnya vitamin serta zat-zat lain akibat kelemahan tubuh karena makan dan minum beberapa faktor predisposisi dan faktor lain yang telah ditemukan sebagai berikut ;

- a. Faktor predisposisi yang dikemukakan adalah primigravida, mola hidatidosa dan kehamilan ganda. Frekuensi yang tinggi pada mola hidatidosa kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormone

memegang peranan karena pada kedua keadaan tersebut hormone khorionik gonadotropin dibentuk berlebihan.

- b. Masuknya vili khonalis dalam sirkulasi maternal dan perubahan-perubahan metabolic akibat hamil serta resitensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan ini merupakan faktor organic.
- c. Alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak, juga disebut sebagai salah satu faktor organic.
- d. Faktor psikologis, memegang peranan yang penting pada penyakit ini, rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan takut akan kehamilan ada persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, dapat menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai pelarian kesukaran hidup.
- e. Faktor adaptasi dan hormonal, pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum dapat di masukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dan anemia. (Rukiyah & Yulianti 2019).

5. Penatalaksanaan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I

Penderita dengan mual dan muntah yang ringan di anjurkan untuk makan dalam porsi yang kecil. Tidak usah menganjurkan makanan tertentu yang di anggap sehat karena untuk ibu hamil dengan komplikasi hiperemesis gravidarum, makanan yang di terima dan masuk adalah makanan yang terbaik.

Meskipun begitu makanan yang berlemak tetaplah di larang untuk ibu dengan hiperemesis gravidarum karena pada umumnya dapat menyebabkan mual. Makanan ini di selingi dengan biskuit, roti kering

dengan setelah bangun tidur pada pagi hari dan sebelum tidur pada siang hari.

Memberikan obat untuk pasien hiperemesis gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sehingga dapat dipilih obat yang tidak bersifat teratogenic (dapat menyebabkan cacat bawaan pada bayi). (Wahid, 2017).

D. Proses Manajemen Asuhan kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Varney (2007) proses manajemen asuhan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai sebuah metode dengan mengorganisasikan pemikiran dan tindakan-tindakan dengan urutan yang logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberian asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan yang berfokus pada klien.

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka berpikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelayanan dan evaluasi. (Susanto dan Yuni, 2019)

2. Tujuan Utama Asuhan Kebidanan

Tujuan utama asuhan kebidanan adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi dalam mengurangi kesakitan dan kematian. Asuhan kebidanan berfokus pada :

Pencegahan, promosi, kesehatan yang bersifat holistik diberikan dengan cara yang kreatif dan fleksibel, suportif, peduli, bimbingan, monitor, dan pendidikan berpusat pada perempuan, asuhan yang berkesinambungan, sesuai keinginan dan tidak otoriter, serta menghormati pilihan perempuan. (Surachmindari & Yulifah, 2013).

3. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah yaitu :

a. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Adalah sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Pasien adalah sumber informasi yang akurat disebut juga sumber data primer. Adapun data yang didapat dari anggota keluarga disebut sumber data sekunder.

Menetapkan kejadian hiperemesis gravidarum tidak sulit yaitu dengan menentukan kehamilan dengan muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Muntah yang terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat.

Pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat I didapat data subjektif kehamilan mual dan muntah setiap makan dengan frekuensi ± 8 x/sehari hingga mengganggu aktivitas. Pada anamnesa diketahui setelah usia kehamilan 10 minggu merupakan gejala yang khas untuk hiperemesis gravidarum.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda dan gejala hiperemesis gravidarum tingkat I dengan ciri-ciri: keadaan umum lemah, kesadaran apatis, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah turun, nadi meningkat, napas berbau aseton, pada pemeriksaan fisik dilihat berat badan makin menurun saat sebelum kehamilan, mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus, bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor, turgor jelek, gejala hemokonsentrasi dinilai dari urin berkurang.

Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium akan dilakukan pemeriksaandarah yaitu hemoglobin, hematokrit, golongan darah, dan kadar estriol. Pada urin kemungkinan ditemui protein, aceton dan kadar estriol yang berkurang, dan reduksi.

b. Langkah II : Interpensi Diagnosa Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpensi yang benar atas data data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang telah dapatkan diintervensikan sehingga dapat menemukan diagnisa dan masalah yang spesifik.

Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I dapat diketahui berdasarkan kehamilan dengan muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi, keadaan umum lemah, kesadaran apatis, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah turun, nadi meningkat, napas berbau aseton, pada pemeriksaan fisik dilihat berat badan makin menurun saat sebelum kehamilan, mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit icterus, gejala hemokonsentrasi dinilai dari urin berkurang, terjadi gangguan saat BAB.

Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium akan dilakukan pemeriksaan darah yaitu hemoglobin, hematokrit, golongan darah, dan kadar estriol. Pada urin akan didapatkan keton (+), jumlah urin kurang, mulut berbau aseton dan kadar estriol yang berkurang, dan reduksi.

c. Langkah III : Diagnosis/ Masalah Potensial

Langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila mungkin diberikan pencegahan, sambil mengamati klien, dan bersiap jika diagnosa/masalah potensial ini benar benar terjadi.

Masalah potensial yang bisa timbul pada kasus ibu dengan hiperemesis gravidarum tingkat I yang terus berlanjut bisa menyebabkan

komplikasi hiperemesis gravidarum tingkat II, antara lain gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain.

Dampak yang di timbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu semakin lemah dan lelah serta dapat mengakibatkan gangguan asam basa dan gangguan hepar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin.

d. Langkah IV : Mengidentifikasi Perlunya Tindakan Segera Atau Kolaborasi

Dalam penanganannya terkadang bidan dihadapkan pada situasi yang memerlukan tindakan segera. Bidan harus melakukan tindakan segera untuk menyelamatkan pasien, namun terkadang ada tindakan yang membutuhkan tindakan segera sambil menunggu instruksi dokter, atau konsultasi dengan tenaga kesehatan lain. Bidan sangat di tuntut untuk mampu memberikan evaluasi keadaan pasien agar asuhan yang diberikan tepat dan aman.

e. Langkah V : Intervensi Atau Rencana Asuhan

Langkah ini melakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang diberikan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum yaitu merencanakan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberitahuan kepada keluarga agar keluarga mengetahui kondisi kehamilan ibu. Pemeriksaan penunjang salah satu untuk menegakkan diagnosa.

Setiap rencana harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien juga akan melaksanakan rencana tersebut. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan yang menyeluruh ini harus rasional dan benar benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang up to date.

Tindakan yang akan di ambil pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I adalah menganjurkan ibu untuk makan dan minum sedikit sedikit tapi sering agar tetap mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil, serta menghindari makan dan minum yang dapat memicu mual dan muntah. Seperti makanan makanan yang berminyak dan pedas. serta pemberian vitamin per-oral B6 untuk mengurangi rasa mual dan muntah ibu.

Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan jangan melakukan pekerjaan yang berat hal itu bertujuan untuk otot dapat berileksasi dan mengurangi kerja jantung. serta isolasi ibu di ruangan dapat memberikan ibu suasana yang nyaman.

e. Langkah VI : Implementasi Atau Pelaksanaan Asuhan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh yang telah di uraikan pada langkah kelima, dilakukan secara sistematis dn efisien. Perencanaan ini biasa dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya.

f. Langkah VII : Evaluasi

Langkah ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum tingkat I kemungkinan terjadi kekurangan nutrisi dan cairan pada bayi, jika sepanjang kehamilan ibu menderita hiperemesis gravidarum maka kemungkinan bayi akan mengalami BBLR, IUGR, Prematur hingga terjadi abortus.

4. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan SOAP

Pendokumentasian SOAP adalah metode pendokumentasian yang sederhana namun mengandung semua unsur data dan langkah yang dibutuhkan dalam asuhan kebidanan.

a. Data Subjektif (S)

Data subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang klien, ekspresi klien mengenai kekhawatiran dan keluhan yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan dengan diagnosa yang dialami klien. Data subjektif akan menguatkan diagnosa yang akan disusun. Catatan medik dan informasi klien serta keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data subjektif.

b. Data Objektif (O)

Data objektif merupakan data yang di ambil dari hasil observasi secara langsung yang di lakukan oleh bidan atau petugas kesehatan lainnya. Hasil yang di dapat adalah hasil dari pemeriksaan fisik klien, pemeriksaan laboratorium, catatan medis dan informasi yang di dapat dari keluarga atau orang lain. Data objektif akan membuktikan gejala dan diagnosis yang berhubungan dengan keadaan klien.

c. Asesement (A)

Merupakan pendokumentasian dari hasil analisis dan intervensi atau kesimpulan dari data subjektif dan data objektif. Yang meliputi diagnosa masalah, antispasi diagnosa atau masalah potensial, perlunya tindakan segera atau kolaborasi.

d. Planning (P)

Membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang, rencana asuhan disusun berdasarkan dari hasil analisis dan interpretasi data bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi klien sebaik mungkin dan mempertahankan rencana asuhan ini mencapai target rencana dalam batas waktu tertentu.

Planning juga mencantumkan evaluasi dari efek tindakan yang telah di ambil untuk menilai efektivitas asuhan hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus nilai tindakan.

BAB III
STUDI KASUS
MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY“K”DENGAN
HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 10-12 MINGGU
DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS MAKASSAR
TANGGAL 12 JANUARI-23 FEBRUARI
TAHUN 2022

Nomor Regiter : 1234xx
Tanggal Masuk : 12 januari 2022, pukul 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 12 januari 2022,pukul 10.00WITA
Nama Pengkaji : Dewi Astika

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama : Ny “K” / Tn “R”
Umur : 23 tahun/ 25 tahun
Nikah/Lamanya : 1x/± 3 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga /Karyawan swasta
Alamat : Jln. Ahmad No 15 Blok IV

B. Keluhan utama

Mual, muntah, pusing dan nyeri ulu hati sebulan lalu.

C. Riwayat Keluhan Utama

1. Setiap mengatakan makan dan minum dimuntahkan kembali.
2. Ibu mengatakan dalam sehari muntah ± 8 x/hari disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas sejak 2 hari yang lalu.

D. Riwayat kesehatan yang lalu

1. Ibu mengatakan tidak ada riwayat alergi makanan dan obat.
2. Ibu mengatakan tidak ada ketergantungan obat, alkohol dan rokok.
3. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit keturunan seperti asma DM, hipertensi, jantung, dan lain-lain.

E. Riwayat kesehatan keluarga

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun misalnya, penyakit hipertensi, jantung, asmadan DM.

F. Riwayat reproduksi

1. Riwayat menstruasi

Menarche : 14 tahun

Siklus : 28-35 hari

Lamanya : 3-7 hari

Dismenorea : Tidak ada

2. Riwayat kehamilan sekarang

- a. G1 P0 A0

b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) : 28 November 2021

c. Hari tafsiran persalinan (HTP) : 04 September 2022.

3. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

G. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

1. Pola nutrisi, Sebelum Hamil : ibu makan 3 kali sehari dengan porsi sedang. Setelah Hamil : ibu mengatakan nafsu makan berkurang selama kehamilan disertai mual dan muntah. Minum 6-7 gelas sehari.
2. Pola eliminasi, Sebelum Hamil : BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan berwarna kuning serta BAK 5-6 kali sehari berwarna kuning jernih. Setelah Hamil : BAB konsistensi keras dengan warna coklat kehitaman dan BAK warna kuning seperti teh.
3. Pola istirahat, Sebelum Hamil : tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur malam 6-8jam. Selama Hamil : tidak mempengaruhi jam tidur.

H. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu lemah.
- b. Turgor kulit kurang baik.
- c. Tinggi badan : 152 cm.
- d. Berat badan sebelum hamil : 74 kg
- e. Berat badan setelah hamil : 71 kg
- f. Lila : 33 cm
- g. Tanda-tanda vital
 - a) Tekanan Darah 110/70 mmHg.
 - b) Suhu 37,5°C
 - c) Nadi 80x/menit.

b) Suhu 38°C.

d) Pernapasan 22x/menit.

2. Pemeriksaan fisik

a. Mata

Inspeksi : mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus.

b. Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.

c. Leher

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan pembengkakan pada leher.

Palpasi : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar limfe dan thyroid.

d. Ekstremitas atas dan bawah

Inspeksi : simetris kiri dan kanan.

Palpasi : reflex patella (+) kiri dan kanan, tidak ada oedema dan varises.

e. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran sama.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan tampak striae livide.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan.

- Leopold I : belum teraba.

- Leopold II s/d IV : tidak dilakukan.

4. Pemeriksaan penunjang

Hb : 15,5 gr%

USG : - CRL 1,18 cm

- GA 6 minggu 3 hari.

Plano test : (+)

Protein urine : -

Glukosa : -

I. Riwayat sosial ekonomi, psikologi dan spiritual.

1. Ini pernikahan ibu yang pertama dengan suaminya ± 3 tahun.
2. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya.
3. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.
4. Suami dan keluarga senang dengan kehamilannya.
5. Keluarga menunggu kehamilan ini.
6. Ibu dan keluarga selalu berdoa semoga kehamilannya berjalan dengan lancar sampai proses persalinan hingga ibu dan bayinya sehat dan selamat.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIP0A0, gestasi 9 minggu 1 hari,,keadaan ibu lemah dengan hyperemesis gravidarum tingkat I.

Masalah : mual dan muntah.

1. GIP0A0

DS:

- a. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran.
- b. Ibu pernah melakukan pemeriksaan menggunakan USG.

DO :

- a. Tampak striae livide
- b. Pada hasil pemeriksaan USG diketahui CRL adalah 1,18 cm.

Analisa dan interpretasi data

- a. Pada primigravida timbul garis-garis memanjang atau serong pada perut kadang pula terdapat pada payudara dan paha yang disebut striae gravidarum. Pada primigravida warnanya membiru disebut striae livide sedangkan pada multigravida warna garis putih agak mengkilat seperti jaringan perut yang disebut linea albicans atau striae alba.
- b. Salah satu tanda pasti kehamilan adalah pemeriksaan dengan alat canggih seperti USG, (Manuaba, 2010).
- c. Crown Rump Length (CRL) adalah keterangan yang menunjukkan ukuran jarak dari ujung kepala hingga ujung kaki janin. Umumnya digunakan di awal kehamilan.

2. Gestasi 9 minggu 1 hari

DS:

- a. Ibu mengatakan haid terakhir pada 28 November 2021.
- b. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 2 bulan.
- c. Ibu pernah melakukan pemeriksaan menggunakan USG.

DO:

Analisa dan interpretasi data

Selama masa hamil nafsu makan berkurang, sekresi usus berkurang, fungsi hati berubah dan absorpsi nutrisi meningkat. Aktivitas peristaltik (motilitas) menurun akibatnya bising usus berkurang sehingga terjadi stagnasi isi lumen usus disampaikan ke korteks serebri kemudian tidak dipersepsikan sebagai rasa penuh diperut sehingga berdampak pada rasa mual dan muntah serta nafsu makan.

Penurunan nafsu makan akibat mual atau muntah yang merupakan akibat perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar progesteron, estrogen dan human chorionic gonadotropin (hCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung menurun dan pengosongan lambung melambat. Refluks esofagus, penurunan motilitas lambung dan penurunan motilitas lambung serta penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap terjadinya mual dan muntah (Runiari, 2010).

LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial: Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin serta Antisipasi terjadinya Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.

DS : Ibu merasa mual setiap makan.

DO :

- a. Keadaan lemah
- b. Tanda-tanda vital :

Tekanan darah : 110/70 mmHg Nadi : 80x/menit
 Suhu : 36,8°C Pernapasan : 22x/menit.

Analisa dan interpretasi data

Muntah berlebihan sehingga suplai cairan dan makanan kurang apabila berlangsung lama tanpa pengobatan menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dalam rahim dengan manifestasi klinisnya (Manuaba, 2010).

Hyperemesis gravidarum tingkat I yang tidak diberikan asuhan dengan baik dapat mengakibatkan hyperemesis gravidarum tingkat II.

LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukan tindakan Segera Rujukan dan Kolaborasi.

LANGKAH V : INTERVENSI

Tujuan:

- a. Proses kehamilan berjalan normal.
- b. Ibu dan janin dalam keadaan baik.
- c. Hiperemesis gravidarum tingkat I teratasi.
- d. Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Kriteria:

- a. Tidak lagi mengalami mual dan muntah.
- b. TTV dalam batas normal.

Tekanan Darah :Diastol 60-90, sistol 100-130 mmHg.

Nadi : 60-90 x/menit.

Suhu : 36,5-37,5°C.

Pernapasan : 16-24x/menit.

- c. Ibu dapat beraktivitas seperti biasa.

Rencana tindakan :

1. Jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Rasional: Agar ibu dan keluarga mengetahui serta mengerti kondisi kehamilannya.

2. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Rasional : Nutrisi yang adekuat sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin didalam kandungan.

3. Anjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta hindari makan dan minum yang berbau menyengat.

Rasioanal: Dengan mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit tapi sering akan dapat mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil serta menghindari makanan yang berbau yang dapat memicu ibu untuk mual dan muntah seperti makanan yang terlalu pedis misalnya ayam rica-rica dan sebagainya.

4. Anjurkan ibu untuk makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Rasional: Menghindari rangsangan mual dan muntah yang berlebihan serta mencegah hipoglikemia.

5. Anjurkanibu untuk perbanyak minum air putih.

Rasional: Minum air yang cukup apat membantu peristaltik usus sehingga dapat mencegah konstipasi.

6. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat.

Rasional: Istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat memberikan relaksasi otot dan mengurangi beban kerja jantung.

7. Obserasi tanda-tanda vital.

Rasional: Untuk menilai perkembangan sebagai indikator dalam membantu mengevaluasi tindakan selanjutnya.

8. Berikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Rasional: Agar ibu tidak cemas terhadap kondisi yang sedang dialaminya.

9. Anjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Rasional: Dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah swt ibu akan merasa lebih tenang sehingga ibu dapat menerima kondisinya bahwa semuanya adalah berkah dan suatu anugrah yang diberikan Allah swt dan Allah swt tidak perna membebani hambanya di luar dari kemampuannya.

LANGKAH VI :IMPLEMENTASI

Tanggal 12 Januari 2022, Jam 10:05 WITA

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bernutrisi.

3. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsinya.

5. Menganjurkan perbanyak minum air putih.

Hasil : Ibu minum air putih \pm 1000 ml.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat.

Hasil : Ibu bersedia melaksanakannya.

7. Mengobservasi TTV.

Tekanan darah : 110/70 mmHg Nadi : 80 x/menit. Suhu :
36,8°C. Pernapasan : 22 x/menit.

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih baik dan lebih tenang dengan kondisinya.

9. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ayat Allah swt.

LANGKAH VII :EVALUASI

Tanggal 12 Januari 2021, jam 10:15 wita

1. Keadaan umum ibu lemah.
2. Ibu masih mual dan muntah setiap kali makan dan minum.
3. Mata cekung, konjungtiva pucat dan sclera sedikit ikterus.
4. Tanda-tanda Vital

Tekanan darah : 110/70 mmhg, Nadi : 80x/menit, Suhu : 36,8°C,
pernapasan : 22x/menit.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADANY”K”
DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I GESTASI 10-12
MINGGU DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS MAKASSAR
TANGGAL 12 JANUAR TAHUN 2022**

Nomor Regiter : 1234xx
Tanggal Masuk : 12 januari 2022 pukul 09.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 12 januari 2022 pukul 10.00WITA
Nama Pengkaji : Dewi Astika

DATA SUBJEKTIF (S)

A. Identitas istri/suami

Umur : 23 tahun/ 25 tahun
Nama : Ny “K” / Tn “R”
Nikah/Lamanya : 1x/± 3 tahun
Suku : Makassar/Makassar
Agama : Islam/Islam
Pendidikan : SMA/SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga /Karyawan swasta
Alamat : Jln. Ahmad No 15 Blok IV

B. Keluhan utama

1. Ibu merasa mual dan muntah ± 8 kali/hari sejak 2 hari yang lalu disertai pusing hingga mengganggu aktivitas.
2. Setiap makan dan minum dimuntahkan kembali

3. Tidak ada riwayat alergi makanan dan obat-obatan, tidak pernah menderita hipertensi, jantung, asma, DM, penyakit menular seperti HIV/AIDS, dll.
4. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran.
5. Haid terakhir tanggal 28 November 2022 .
6. Ibu mengatakan pernah melakukan pemeriksaan USG di salah satu rumah sakit.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah.
 2. Turgor kurang baik.
 3. Tinggi badan : 152 cm.
 4. Berat badan sekarang : 71 kg.
 5. Tanda-tanda vital:

Tekanan Darah : 110/70 mmHg	Nadi : 80x/menit
Suhu : 36.8°C	Pernapasan : 22x/menit
 6. Mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus.
 7. Bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.
 8. Pemeriksaan penunjang

USG : CRL 1,18 cm	GA 6 minggu 3 hari.
-------------------	---------------------
- Plano test : (+)
- Hb : 15,5 gr%
- Protein urine : -

ASSESSMENT (A)

Masalah aktua: GIP0A0, gestasi 9 minggu 1 hari, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat I.

Masalah potensial: Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

PLANNING (P)

Tanggal 12-Januari-2022, jam 10 : 05 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Hasil: Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bernutrisi.

3. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak

Hasil: Ibu bersedia melakukannya.

4. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil: Ibu bersedia mengkonsumsinya.

5. Menganjurkan perbanyak minum air putih.

Hasil: Ibu minum air putih \pm 1000 ml.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat.

Hasil: Ibu bersedia melaksanakannya.

7. Mengobservasi TTV.

Tekanan darah: 110/70 mmHg Nadi : 80 x/menit.

Suhu : 36,8°C. Pernapasan : 22 x/menit.

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil: Ibu merasa lebih baik dan lebih tenang dengan kondisinya.

9. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat ayat Allah swt.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH JLN AHMAD N0 15 BLOK IV
ANTANG TANGGAL 17 JANUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang.
2. Nafsu makan mulai membaik.
3. Masih sedikit pusing.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah
2. kesadaran Composmentis
3. Turgor kulit mulai baik.
4. Tanda-tanda vital:
Tekanan Darah : 100/70 mmHg. Nadi : 79x/menit.
Suhu : 37,2°C. Pernapasan : 24x/menit.
5. Wajah ibu tampak pucat.
6. Mata masih cekung.
7. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah masih agak kotor.

ASSESMEN (A)

Masalah aktual : GIP0A0, gestasi 9 minggu 6 hari, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat I

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

PLANNING (P)

Tanggal 17 Januari 2022, Jam 10:00 WITA

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah lebih baik dari sebelumnya.
Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.
2. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.
Hasil : Ibu mengkonsumsi sayur dan buah buahan
3. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.
Hasil : Ibu bersedia melakukannya.
4. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.
Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.
5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.
Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.
6. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.
Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

7. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 6 kali.

8. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

9. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat Allah swt.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH DI JLN AHMAD N0 15 BLOK IV
ANTANG TANGGAL 24 JANUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan mulai berkurang.
2. Nafsu makan mulai membaik.
3. Masih sedikit pusing.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 80x/menit.

Suhu : 36,8°C. Pernapasan : 22x/menit.

4. Wajah ibu tampak segar.
5. Mata tidak cekung.
6. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah bersih.

ASSESMEN (A)

Masalah aktual :GIP0A0, gestasi 10 minggu 1 hari, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 24 Januari 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 4 kali.

3. Mengobservasi TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 80x/menit.

Suhu : 36,8°C. Pernapasan : 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

5. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

7. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

8. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

9. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang saat membaca ayat Allah swt.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH DI JLN AHMAD N0 15 BLO IV
ANTANG TANGGAL 31 JANUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang.
2. Nafsu makan mulai baik.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmHg.

Nadi : 80x/menit

Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22x/menit.

4. Wajah ibu tampak segar.
5. Mata tidak cekung.
6. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah bersih.

ASSESSMENT (A)

Masalah aktual : G1P0A0, gestasi 10 minggu 6 hari, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 31 Januari 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 4 kali.

3. Mengobservasi TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 80x/menit.

Suhu : 36,8°C. Pernapasan : 22x/menit.

4. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

5. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

7. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

8. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

9. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH DI JLN AHMAD N0 15 BLOK
IV ANTANG TANGGAL 07 FEBRUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual.
2. Nafsu makan baik.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV
Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 80x/menit.
Suhu : 36,8°C. Pernapasan : 22x/menit.
4. Wajah ibu tampak segar.

ASSESSMENT (A)

Masalah aktual :GIPOA0, 11 minggu, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 07 februari 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Tekanan Darah : 110/70 mmHg. Nadi : 80x/menit.

Suhu : 36,6°C. Pernapasan : 20x/menit.

3. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

4. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

6. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 6-8 jam, dan jangan melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia untuk istirahat yang cukup.

7. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

8. Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu:

- a. Sakit kepala menetap.
- b. Wajah dan tungkai oedema.

- c. Mual dan muntah berlebihan.
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari.
- f. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam.
- g. Ketuban Pecah Dini (KPD).
- h. Oedema
- i. Kejang.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

9. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senantiasa mengingat dan berdoa kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH DI JLN AHMAD N0 15 BLOK
IV ANTANG TANGGAL 14 FEBRUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual.
2. Nafsu makan ibu baik.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis.
3. Observasi TTV

Tekanan Darah : 100/60 mmHg. Nadi : 78x/menit.

Suhu : 36,6°C. Pernapasan : 20x/menit

ASSESMENT (A)

Masalah aktual : GIP0A0, gestasi 11 minggu 6 hari, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 14 february 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Tekanan Darah: 100/60 mmHg. Nadi: 78x/menit.

Suhu : 36,6°C.

Pernapasan: 21x/menit.

3. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

6. Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu:

- a. Sakit kepala menetap.
- b. Wajah dan tungkai oedema.
- c. Mual dan muntah berlebihan.
- d. Nyeri perut yang hebat
- e. Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari.
- f. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam.
- g. Ketuban Pecah Dini (KPD).
- h. Oedema
- i. Kejang.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

7. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada Allah SWT.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA
NY”K” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I
KUNJUNGAN RUMAH DI JLN AHMAD N0 15 BLOK
IV ANTANG TANGGAL 21 FEBRUARI 2022**

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan Sudah tidak muntah dan masih sedikit mual
2. Nafsu makan ibu baik.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran Composmentis
3. Observasi TTV

Tekanan Darah :100/60 mmHg.

Nadi :78x/menit.

Suhu :36,6°C.

Pernapasan :20x/menit

ASSESMEN (A)

Masalah aktual :GIP0A0, gestasi 12 minggu 1 hari, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 21 februari 2022, jam 10:00 wita

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Mengobservasi TTV

Tekanan Darah :100/60 mmHg.

Nadi :78x/menit

Suhu :36,6°C.

Pernapasan :21x/menit.

3. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

4. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup minimal 1-2 jam pada siang hari dan 6-8 jam pada malam hari, serta menganjurkan ibu untuk tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet Fe 1x sehari atau 90 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia pada masa kehamilan.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi tablet fe.

6. Menjelaskan kepada ibu tanda bahaya pada kehamilan, yaitu:

- a. Sakit kepala menetap.
- b. Wajah dan tungkai oedema.
- c. Mual dan muntah berlebihan.
- d. Nyeri perut yang hebat.
- e. Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari.
- f. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam.
- g. Ketuban Pecah Dini (KPD).
- h. Oedema.
- i. Kejang.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

7. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu, serta menganjurkan ibu untuk senangtiasa mengingat dan berdoa kepada allah swt.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesesuaian dan kesenjangan antara teori hasil studi pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “K” dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas Makassar tanggal 12 Januari sampai 23 Februari 2022.

Penulis akan menguraikan 7 Langkah Varney dalam penerapan asuhan kebidanan secara teoritis dan alasan nyata yang dimulai dari indentifikasi data dasar, merumuskan diagnosa atau masalah actual dan potensial, tindakan segera/kolaborasi/rujukan, perencanaan dan pelaksanaan asuhan serta evaluasi asuhan kebidanan yang terjadi pada kasus Ny”K”.

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

Pada langkah ini berisi semua informasi yang lengkap dan akurat dari semua sumber yang berkaitan dengan keadaan klien. Yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah hasil pengumpulan data dengan melakukan anamnesa yang dapat menggambarkan keadaan klien. Sedangkan data objektif adalah hasil data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan klien.

Pada proses pengumpulan data dasar, penulis tidak menemukan hambatan yang berarti, karena pada saat melakukan anamnesa pada Ny “K” maupun keluarga serta bidan yang berada di dalam ruangan saat itu dapat memberikan informasi secara terbuka dan klien juga sangat kooperatif sehingga dapat

memudahkan klien untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Pengkajian data dasar yang dilakukan pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I dilakukan pertama kali pada saat ibu memasuki ruangan anc. Pengkajian meliputi anamnesis yang langsung diperoleh dari ibu sendiri. Pengkajiannya berupa identitas ibu dan suami, keluhan utama, riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, riwayat menstruasi, riwayat keluarga berencana, serta data tentang psikologis, ekonomi, sosial, spiritual dan data pola kebiasaan sehari-hari. Pengkajian data objektif didapatkan melalui pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang menyatakan bahwa hiperemesis gravidarum tingkat I adalah mual muntah berlebih yang merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin, dimana kejadian ini dapat dideteksi dan dicegah pada masa kehamilan, mual dan muntah merupakan gangguan yang paling sering dijumpai pada kehamilan trimester I (Syamsuddin Syahril, 2018). Penurunan nafsu makan akibat mual atau muntah yang merupakan akibat perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar progesteron, estrogen dan human chorionic gonadotropin (hCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan otot polos pada system gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung menurun dan pengosongan lambung melambat. Refluks esofagus, penurunan

motilitas lambung dan penurunan motilitas lambung serta penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap terjadinya mual dan muntah (Runiari, 2010). Selain itu, ibu juga dianjurkan memperbanyak berdoa dan berzikir kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan dan dijauhkan dari masalah-masalah selama menjalani masa kehamilannya.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “K” Pada tanggal 12 Januari didapatkan bahwa ibu mengalami mual dan muntah sejak sebulan lalu namun bertambah sering ± 8 x/hari selama 2 hari disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas ibu sebagai ibu rumah tangga. Hal ini juga mengakibatkan ibu mengalami penurunan berat badan sebanyak 3 kg. kemudian di tanggal 17 Januari didapatkan ibu mual dan muntah sebanyak ± 6 kali. Di tanggal 24 dan 31 Januari keluhan yang dirasakan ibu masih sama. Mual dan muntah yang didapatkan sebanyak ± 4 kali. Dan di tanggal 07 dan 14 Februari ibu mengatakan sudah tidak muntah tetapi masih merasa mual dan sedikit pusing tetapi di tanggal 14 Februari ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing. Terakhir di tanggal 21 Februari ibu mengatakan sudah tidak muntah namun hanya tinggal sedikit mual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus tidak ditemukan adanya kesenjangan.

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada Ny “K” didapatkan data subjektif dan data objektif yang dapat dilihat untuk menegakkan diagnosa sebagai berikut: Ny “K” dengan GIP0A0, gestasi 8 minggu 8 hari, intrauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat I. Masalah yang dirasakan ibu adalah cemas karena mual dan muntah.

Pada kunjungan pertama tanggal 12 Januari 2022 masalah utama yang di dapatkan ibu adalah ibu merasa mual dan muntah \pm 8 kali sehari dan disertai dengan rasa pusing. Kemudian ibu mengatakan setiap makan dimuntahkan kembali. kemudian kunjungan di tanggal 17 dan 24 Januari ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang, nafsu makan mulai membaik dan ibu mengatakan masih sedikit pusing. Kunjungan di tanggal 31 Januari ibu mengatakan mual dan muntah berkurang, nafsu makan membaik. Lalu kunjungan di tanggal 07 dan 14 Februari ibu mengatakan muntah berkurang tetapi masih sedikit merasa mual, nafsu makan juga membaik. Terakhir kunjungan di tanggal 21 Februari ibu mengatakan sudah tidak muntah tapi masih sedikit mual, nafsu makan ibu baik.

Menetapkan diagnosa hiperemesis gravidarum tidak sukar, dengan menentukan kehamilan, muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi (Manuaba, 2014).

Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum tingkat I apabila muntah terus menerus sehingga menimbulkan dehidrasi ditandai dengan turgor kulit turun, nafsu makan berkurang, berat badan turun, mata cekung dan lidah kering. Pada epigastrium terjadi nyeri karena asam lambung meningkat dan terjadi regurgitasi ke esofagus, nadi meningkat dan tekanan darah turun, frekuensi nadi sekitar 100 x/menit, tampak lemah dan lemas (Rahmawati, 2011). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial yang berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I masalah yang bisa saja terjadi adalah Antisipasi gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Teori menjelaskan muntah yang terjadi terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat (Manuaba, 2014).

Masalah potensial yang dapat terjadi pada kehamilan dengan hyperemesis gravidarum yaitu pada ibu dan janin sebagai berikut:

Pada ibu hamil dengan usia muda perlu tambahan gizi yang banyak karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga untuk

berbagi dengan janin yang sedang dikandungnya. Sedangkan untuk ibu hamil dengan usia tua perlu energi yang besar karena fungsi organ yang semakin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung.

Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang kehamilan si ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayinya mengalami BBLR, IUGR, Prematur hingga terjadi abortus (Wiknjosastro, 2007).

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kejadian hyperemesis gravidarum dengan BBLR pada ibu bersalin. Namun berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny “K” tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin.). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kesenjangan antara teori dan studi kasus.

D. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi/Rujukan

Pada langkah ini bidan juga harus merumuskan tindakan segera untuk menyelamatkan ibu, yang mampu dilakukan secara mandiri dan bersifat rujukan. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat I kondisi-kondisi yang harus diantisipasi seperti abortus, gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain.

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada Ny“K” tidak ditemukan adanya data pendukung yang memerlukan tindakan segera, kolaborasi dan rujukan. Selama melakukan pengkajian dan pemantauan kondisi ibu di peroleh hasil kasus hyperemesis gravidarum tingkat I dan tidak ada komplikasi yang menyertai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus yang dilakukan pada Ny“K” tidak ada ditemukan kesenjangan.

E. Langkah V : Rencana Tindakan/ Intervensi

Pada langkah ini direncanakan asuhan kebidanan yang ditentukan oleh langkah-langkah yang telah diuraikan di atas. Pada manajemen asuhan kebidanan suatu tindakan yang komprehensif dilakukan termasuk atas indikasi yang timbul berdasarkan kondisi klien, rencana tindakan harus di setujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya. Dalam membuat rencana tindakan, dibuat berdasarkan tujuan dan kriteria yang akan dicapai. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi klien (diagnosa, masalah aktual dan masalah potensial).

Sasaran dalam perencanaan asuhan pada kasus Ny “K” berdasarkan pada diagnosa pada kasus ibu hyperemesis gravidarum tingkat I serta mencegah terjadinya masalah potensial yang kemungkinan bisa terjadi. Untuk mencapai tujuan yaitu proses kehamilan berjalan normal, ibu dan janin dalam keadaan baik, hiperemesis gravidarum tingkat I teratasi, antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Pada kasus Ny “K” rencana asuhan yang diterapkan antara lain, pemantauan tanda-tanda vital, pemantauan muntah dan ajuran pemenuhan nutrisi, zat besi serta beri motivasi untuk psikologis ibu.

Pada pengkajian kasus yang dilakukan pada Ny “K” Pada tanggal 12 Januari rencana tindakan yang akan diberikan adalah menjelaskan pada ibu tentang hasil pemeriksaan yang di dapat, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi selama kehanilan, anjurka ibu untuk makan sedikit sedikit tapi sering, anjurkan ibu untuk makan selingan seperti biskit dan roti kering, anjurkan ibu untuk perbanyak minum air putih, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat, memeriksa tanda-tanda vital, memberi dukungan dan motivasi kepada ibu, anjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri pada Allah sw. Kemudian kunjungan ditanggal 12, 24 dan 31 Januari rencana tindakan yang di berikan adalah menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik, Mengobservasi muntah, Mengobservasi ttv, Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan, menganjurkan ibu untuk makan dan porsi sedikit tapi sering serta menghindari mkanan yang terlalu berbumbu atau berlemak, anjurkan ibu makan selingan seperti biscuit dan roti kering, anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam 6-8 jam, anjurkan ibu untuk rajin mengkonsumsi tablet fe 1X sehari atau 900 tablet selama masa kehamilan untuk mencegah anemi selama masa kehamilan,.

memberikan dukungan dan motivasi pada ibu, anjurkan ibu untuk tetap mengingat Allah swt. Dan memperbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah seperti berdzikir, bersholawat, dan mendengar lantunan ayat suci.

Kemudian di tanggal 07 Februari rencana tindakan yang diberikan adalah mengobservasi ttv, memberikan health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama masa kehamilan, menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan yang terlalu berbumbu dan berlemak, menganjurkan ibu makan selingan seperti biskuit dan roti kering, menjelaskn pada ibu 9 tanda bahaya kehamilan, serta memberi motivasi pada ibu untuk senangtiasa berdoa dan mengingat allah swt dengan berdzikir, bersholawat dan mengaji.

kunjungan di tanggal 14 Februari Mengobservasi ttv, memberikan health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi selama masa kehamilan, menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan yang terlalu berbumbu dan berlemak, menganjurkan ibu makan selingan seperti biskuit dan roti kering, menjelaskn pada ibu 9 tanda bahaya kehamilan, serta memberi motivasi pada ibu untuk senangtiasa berdoa dan mengingat allah swt dengan berdzikir, bersholawat dan mengaji.

Terakhir kunjungan di tanggal 21 Februari mengobservasi ttv, memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung baik, anjurkan ibu untuk tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 6-8 jam serta mengurangi pekerjaan yang terlalu berat,

menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi tablet Fe 1X sehari atau 90 tablet selama selama masa kehamilan untuk mencegah terjadinya anemia selama masa kehamilan, Menjelaskan pada ibu tentang tanda bahaya selama masa kehamilan yaitu sakit kepala menetap, wajah dan tungkai oedema, mual muntah berlebih, nyeri perut hebat, pergerakan janin kurang dari 10X dalam sehari, perdarahan pervaginam.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan selama proses pengkajian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rencana asuhan sesuai dengan teori memiliki persamaan dengan kasus yang telah dilakukan pengkajian.

F. Langkah VI : Implementasi

Pada langkah ini menerpakan semua rencana asuhan yang telah direncanakan pada langkah sebelumnya. Implementasi dapat dilaksanakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan ibu serta kerja sama dengan tim petugas kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada tinjauan kasus yang telah dilakukan pada Ny "K", implementasi asuhan yang telah direncanakan diberikan sejak ibu masuk ke dalam ruangan anc. Dimulai dari kunjungan di Puskesmas pada tanggal 12 Januari 2022 pada saat itu ibu mengalami mual muntah berlebih sejak 2 hari yang lalu Asuhan yang dilaksanakan yaitu mengobservasi keadaan umum ibu, tanda-tanda vital,

menganjurkan ibu makan makanan bernutrisi Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak. Konseling tentang zat besi. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering. Menganjurkan perbanyak minum air putih. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Semua rencana asuhan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang telah diharapkan karena ibu maupun keluarga sangat kooperatif dan dapat menerima kedatangan peneliti untuk menjalankan proses penkajian yang akan dilakukan pada ibu. Begitupun dengan petugas kesehatan di ruang anc Puskesmas Antang Perumnas. Dari hasil pemeriksaan telah disampaikan pada ibu bahwa kondisi ibu saat ini lemah kesadaran composments, ttv dalam batas normal. Selain itu, ibu juga sudah memahami dan mau melakukan semua yang telah dinajurkan seperti pola makan pada ibu, terutama makan makanan yang bernutrisi dan makan sedikit tapi sering dan menghindari makanan dan minuman yang terlalu berbau menyengat.

Kunjungan kedua di rumah klien pada tanggal 17 Januari 2022 ibu mengatakan mual muntah mulai berkurang, nafsu makan membaik, dan ibu masih sedikit pusing. Ttv dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 100/70 mmH, Nadi : 79x, Suhu : 37,2°C, Pernapasan : 24x/i. wajah ibu tampak pucat dan merasa cemas dengan keadaannya, Mengajarkan pada ibu untuk makan sedikit tapi sering dan menghindari makanan dan minuman yang terlalu menyengat, makan makanan yang bernutrisi, makan makanan selingan seperti biskuit dan roti kering,

Kunjungan ketiga dirumah klien pada tanggal 24 Januari 2022 ibu mengatakan mual muntah berkurang dari $\pm 8x$ sehari menjadi $\pm 4x$ sehari, Ttv dalam batas normal yaitu Tekanan Darah : 110/70 mmH, Nadi : 80x, Suhu : 36,8°C, Pernapasan : 22x/i. . Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Kunjungan keempat di rumah klien pada tanggal 31 Januari 2022 ibu mengatakan mual muntah berkurang, nafas makan baik, ttv dalam batas normal Tekanan Darah : 110/70 mmH, Nadi : 80x, Suhu : 36,8°C, Pernapasan : 22x/i.

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Kunjungan kelima tanggal 07 februari 2022 ibu mengatakan mual muntah bekuang, nafas makan baik, ttv dalam batas nomal Tekanan Darah 110/70 mmH, Nadi : 80x, Suhu : 36,6°C, Pernapasan : 20x/i. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

Kunjungan ketujuh tanggal 21 februari 2022 ibu mengatakan mual muntah bekuang, nafsu makan baik, ttv dalam batas nomal Tekanan Darah 100/60 mmH, Nadi : 80x, Suhu : 36,6°C, Pernapasan : 20x/i. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat, Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu: Sakit kepala menetap, Wajah dan tungkai oedema, Mual dan muntah berlebihan, Nyeri perut yang hebat, Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam, Ketuban Pecah Dini (KPD). Oedema dan Kejang. ,Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah SWT. Perbanyak amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan seperti berdzikir, bersholawat, mendengarkan lantunan ayat suci dan lain sebagainya.

G. Langkah VII : Evaluasi

Evaluasi merupakan akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dan merupakan penilaian keberhasilan asuhan klien berdasarkan masalah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada saat sebelum asuhan, klien menyetujui tindakan yang akan dilakukan, pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny "K" didapatkan hiperemesis gravidarum tingkat I yang dialami oleh ibu mulai membaik dan kembali norma.

Berdasarkan teori dan study kasus pada Ny"K" jika di bandingkan maka tidak ditemukan kesenjangan antara teori dan kasus pada Ny "K".

BAB V

PENUTUP

Setelah membahas dan menguraikan kasus pada Ny „K“ dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas yang dilakukan tanggal 12 Januari 2022 sampai 21 Februari 2022, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu :

A. Kesimpulan

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data pada Ny „K“ dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Hasil analisis yang diperoleh pada Ny „K“ meliputi umur 23 tahun , G1P0A0 dengan hyperemesis gravidarum tingkat I.
2. Telah dilakukan identifikasi diagnose/masalah aktual pada Ny „K“ dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. masalah aktual Hiperemesis Gravidarum tingkat 1.
3. Telah dilakukan identifikasi diagnose/masalah potensial pada Ny „K“ dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Hasil yang di dapat dari interpretasi data pada Ny „K“ masalah potensial gangguan perkembangan dan pertumbuhan janin.
4. Telah dilakukan identifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Ny„K“ dengan Hiperemesis Gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Didapatkan bahwa tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera, kolaborasi, dan rujukan.

5. Telah dilakukan perencanaan asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny „K“ dengan Hiperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Berdasarkan diagnose/masalah aktual dan potensial yang didapat yaitu intervensi yang diberikan adalah memberi tahu pada klien hasil pemeriksaan dan keadaan klien, menganjurkan klien makan makanan bernutrisi, pemantauan Tanda tanda vital, mengobservasi mual muntah, menganjurkan ibu makan sedikit tapi sering, menganjurkan ibu untuk menghindari makanan yang terlalu berlemak atau berminyak, menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup, memberi tahu ibu tanda dan bahaya selama kehamilan, dan menganjurkan ibu untuk senantiasa berdoa dan berdzikir kepada allah agar diberikan kesehatan.
6. Telah dilaksanakan asuhan kebidanan yang telah direncanakan pada Ny „K“ dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Dengan perencanaan asuhan kebidanan dapat dilaksanakan sebelumnya dengan baik dan tidak ada hambatan.
7. Telah dilakukan evaluasi dari hasil asuhan kebidanan yang telah dilaksanakan pada Ny „k“ dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas. Adapun hasil dari semua perencanaan asuhan yang telah dilaksanakan tidak ada hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua hasil dari pengkajian dan tindakan asuhan kebidanan yang telah dilakukan pada Ny „K“ dengan hyperemesis gravidarum tingkat I di puskesmas antang perumnas yang dibuat dalam bentuk 7 langkah varney dan soap .

B. Saran

1. Untuk klien

- a. Tentunya diharapkan setiap ibu dengan hyperemesis gravidarum tingkat I dapat mengaplikasikan semua yang telah dianjurkan seperti makan sedikit sedikit tapi sering dan menghindari makanan yang terlalu berminyak dan berlemak untuk mengurangi jumlah mual dan muntah.
- b. Diharapkan keterlibatan suami/keluarga dalam perawatan untuk membantu ibu mengurangi jumlah kecemasan akibat mual dan muntah yang dialami.

2. Untuk Bidan

- a. Sebagai petugas kesehatan kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan wewenang bidan dan manajemen kebidanan sebagai pertanggung jawaban apabila nantinya ada gugatan.
- b. Tentunya diharapkan seorang bidan dalam memberikan pelayanan kepada klien dapat menerapkan manajemen kebidanan serta pendokumentasian asuhan sebagai bukti pertanggung jawaban atas segala tindakan yang telah dilakukan dan menjadi bukti apabila nantinya ada gugatan Dalam memberikan pelayanan dan memberikan tindakan tentunya dilakukan atas sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan klien.

3. Untuk Institusi

Dengan mengetahui permasalahan yang dapat timbul pada masa kehamilan, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta perkembangan sesuai prosedur dalam memberikan asuhan dalam pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan dalam memecahkan suatu masalah dalam kebidanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ani T. P, dkk (2020). Efektivitas Pemberian Sari Kurma Terhadap Kelancaran Produksi ASI Ibu Post Partum DI RSKIA SITTI FATIMAH MAKASSAR. *Jurnal Antara Kebidanan*. Vol 3.No. 1. Hal 11-20.
- Ariantika, Pertiwi & Fatimah (2019). *Patalogi Kehamilan Memahami Berbagai Penyakit & Komplikasi kehamilan*. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Dartiwen dan Yani.(2019). Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Penerbit: Andi.Jakarta.
- Dartiwen dan Yanti Nurhayanti.(2019). Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Penerbit: Andi. Yogyakarta.
- Farkhiyah,N& Izzatul, A. (2019). Ketergantungan Kunjungan Antenatal Care Di Wilayah Kerja Pusekesmas Slawi Kabupaten Tegal Jurnal Kebidanan Vol.3 No. 1
- Fitri, Imelda & Wiji, Rizki Natia. (2019). Gizi Reproduksi.Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Indriyani T (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Di RSUD Dr. Drajat Prawinegara Kabupaten Serang Tahun 2017. *Jurnal Akademi Keperawatan Karya Jaya*. Vol. 4 No.1.
- Kurniati, D, & Rahmawati, I (2018). Resiko Tinggi Kehamilan Terhadap Komplikasi Persalinan Di Rumah Bersalin Tri Tunggal Jakarta Utara. *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol.41, No.58.

- Nita Norma & Mustika Dwi, Asuhan Kebidanan Patologi Teori Dan Tinjauan Kasus, Penerbit: Nuha Medika, 2017.
- Padjadjaran T. F. (2017). Obstetri Patologi Ilmu Kesehatan Reproduksi Edisi 3. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Pratiwi, A M & Fatimah (2019). Patologi Kehamilan Memahami Berbagai Penyakit & Komplikasi Kehamilan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Prawihardjo, S. (2017). Ilmu Kebidanan. Jakarta: Bina Pustaka sarwono Prawihardjo.
- Rasida, N.A. (2020).Kupas Tuntas Hiperemesis Gravidarum Mual Muntah berlebihan Dalam Kehamilan. Jakarta Barat: One Peach Media.
- Rofiah, S, dkk.(2019). Studi Fensomena Kejasian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I. *Jurnal Riset Kesehatan*.8 (1) 2019.
- Rukiyah, A. Y & Lia, Y. (2019). Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Meternal Dan Neonatal Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Setiawati Dewi. (2020). Fisio-Patologi Kehamilan,Persalinan dan Kasih Sayang Universal. Makassar: Alauddin Uniriversity Press.
- Suryanigrat, E. (2016). Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II Di RSUD Ibu Dan Anak Pertiwi . Makassar (ID).
- Walyani, Elisabeth S. (2016). Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan. Yogyakarta: Pustaka baru Press.
- Wahid, M. K. (2017). Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Patologi Pada Ny “D” Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat I Gestasi 16-18 Minggu Di RSUD syekh Yusuf Gowa Makassar (ID).

LAMPIRAN



PENDOCUMENTASIAN





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : kcsbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 12 Januari 2022

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 63 -II/BKBP/I/2022

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **25324/S.01/PTSP/2022**, Tanggal 11 Januari 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **DEWI ASTIKA**
NIM / Jurusan : 70400118023 / Kebidanan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin
Tanggal pelaksanaan : **12 Januari s/d 23 Februari 2022**
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa
Judul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui Email Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com.

a.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANGPOL
u.b.
SEKERTARIS,

DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19730607 199311 1 001

Tembusan :

1. Walikota Makassar di Makassar (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (sebagai laporan);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25324/S.01/PTSP/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-68/FKIK/PP.00.9/01/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **DEWI ASTIKA**
Nomor Pokok : 70400118023
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Januari s/d 23 Februari 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 11 Januari 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Ir. H. DENNY IRAWAN SAARDI.,M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19620624 199303 1 003

Terbusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar) di Makassar;
2. *Pertinggal*.

SIMAP PTSP 11-01-2022



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Nomor : 25324/S.01/PTSP/2022
Halaman : 2 (3)

Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710
MAKASSAR

Nomor : 440/69/PSDK //2022
Lamp :
Perihal : Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas.....

Di -

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No : 070/71
/- II-BKBP//2022,tanggal 14 Januari 2022 ,maka bersama ini disampaikan kepada
saudara bahwa :

Nama : Dewi Astika
NIM : 70400118023
Jurusan : Kebidanan
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care
pada ibu hamil dengan Hiperemesis Gravidarum
Tingkat I

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara pimpin
pada tanggal 12 Januari 2022 s/d 23 Februari 2022

Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 17 Januari 2022

Pt. Kepala Dinas Kesehatan
Kota Makassar



Dr. Nulsaidah Sirajuddin

Pangkat : Pembina

NIP : 19730112 2006042012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS

Jln. Lasuloro Raya Blok I No. 19 Perumnas Antang Kode Pos : 90234
Tlp.(0411) 492490 Call Center:085104551301 Email :anperpkm@gmail.com



SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/038 /PKM-ANPER/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Puskesmas Antang Perumnas menerangkan bahwa Mahasiswa Jurusan Kebidanan UIN Alauddin Makassar, atas nama :

DEWI ASTIKA

NIM : 70400118023

BENAR telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah kerja kami sejak Tanggal 12 Januari 2022 s/d 23 Februari 2022 dengan judul penelitian " *Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Dengan Hyperemesis Gravidarum Tingkat I* "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 24 Februari 2022

Kepala Puskesmas Antang Perumnas

PKM ANTANG
PERUMNAS

drg. Iri. SULPIAH

NIP. 197210292006042013



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.050/KEPK/FKIK/I/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : DEWI ASTIKA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title



**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL DENGAN
HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT I DI PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS MAKASSAR"**

***"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE ANTENATAL CARE IN PREGNANT WOMEN WITH
HYPEREMESIS GRAVIDARUM LEVEL 1 AT PUSKESMAS ANTANG PERUMNAS MAKASSAR"***

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023
This declaration of ethics applies during the period January 5., 2022 until January 5,2023

January 5, 2022
Professor and Chairperson,

DR. Dr. Syairah, Sp.A., M.Kes


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Dewi Astika
Nim : 70400112023
TTL : Sangatta, 22 April 2000
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Ayah : Muslimin
Ibu : Nurmiati

B. Riwayat Pendidikan

SD NEGERI 004 SANGATTA SELATAN : 2006-2012
SMP NEGERI 004 SANGATTA SELATAN : 2012-2015
SMA NEGERI 1 SANGATTA SELATAN : 2015-2018