

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
02 AGUSTUS - 24 AGUSTUS 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Kebidanan Jurusan DIII Kebidanan
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

DURATUL HIKMA

NIM: 70400119018

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Duratul Hikma
Nim : 70400119018
Tempat/Tanggal Lahir : Lengko Padang, 20 Oktober 2002
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas/Diploma : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “A” Dengan Kista Ovarium Di RS Bhayangkara Makassar 02 Agustus – 24 Agustus 2022.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan sangat penuh keyakinan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini adalah benar hasil karya fikiran sendiri, jika kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 03 Oktober 2022

Penyusun

DURATUL HIKMA
NIM: 70400119018


PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Duratul Hikma
Nim : 70400119018
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "A"
Dengan Kista Ovarium di RS Bhayangkara Makassar 02 Agustus-24
Agustus 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 03 Oktober 2022

Pembimbing I


Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb
NIP : 198903282091032018

Pembimbing II


Firdayanti, S.SiT., M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 001

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “A” Dengan Kista Ovarium di RS Bhayangkara Makassar 02 Agustus – 24 Agustus 2022”, yang disusun oleh Duratul Hikma Nim 70400119018. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 03 Oktober 2022**, bertepatan dengan **Tanggal 07 Rabiul Awal 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 03 Oktober 2022

07 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:


Ketua : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
Sekertaris : Firdayanti, S.SiT, M.Keb
Pembimbing 1 : Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb
Pembimbing 2 : Firdayanti, S.SiT, M.Keb
Penguji 1 : Dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomedik
Penguji 2 : Dr. Nurkhalis A Ghaffar, M.Hum

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar


Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrohmatullahi wabarokatuh

Bismillahirrahmanirrahim “Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab (Al-Qur’an) kepada hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok; sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisi-Nya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.” (QS. Al-Kahfi: 1-2)

Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun diakhirat beserta seluruh keluarganya, keturunannya, sahabat-sahabatnya, juga kepada aulia Allah, syuhada, shiddiqiin, orang-orang saleh, dan para pengikutnya, dari golongan mu’minin dan mu’minat, muslimin dan muslimat hingga akhir zaman.

Berkat ridho dan inayah-Nya karya tulis yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan perimenopause pada Ny “A” dengan Kista Ovarium di RS Bhayangkara Makassar” ini dapat diselesaikan guna memperoleh gelar ahli madya Kebidanan pada Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Berbagai hambatan penulis hadapi selama penulisan karya tulis ilmiah ini, namun berkat bimbingan arahan, dan bantuan moril maupun materil yang tulus dari berbagai pihak maka hambatan tersebut dapat teratasi.

Terima kasih yang sangat spesial dan tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta, “Ayahanda” Burhan dan “Ibunda” Didi, beliau-beliau layaknya pelita sebagai penerang hidup dengan penuh kasih sayang mereka mencintai anaknya serta doa-doa yang tidak pernah putus dengan penuh keikhlasan sehingga Allah swt selalu memberi keberkahan hidup serta kelapangan hati kepada penulis dalam menuntut ilmu. Kepada kedua adikku tersayang Budiman dan Sanuria Insaniyah, kupersembahkan karya sederhana ini kepada kalian, sebagai wujud cinta dan terima kasih karena telah mengajarkan penulis tentang arti kasih sayang. Kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis, Syukran Jaziila.

Dalam penyelesaian KTI ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Makassar.
2. Kepada Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp(A), M.Kes sebagai Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku Ketua Jurusan Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar.
4. Ibunda Anieq Mumthi'ah Al Kautzar, S.ST., M.Keb selaku sekretaris Prodi Kebidanan di Universitas Islam Negeri Makassar

5. Ibunda Zelna Yuni Adryani S.ST., M.Keb sekaligus pembimbing I yang telah membimbing karya tulis ilmiah ini dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibunda Firdayanti, S.SiT., M.Keb selaku pembimbing II yang telah membimbing karya tulis ilmiah dan telah menuntun, mendidik, mengajarkan, dan senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibunda dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomedik selaku selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Ayahanda Dr. Nurkholis A Ghaffar, S.Ag., M.Hum selaku penguji II integrasi ilmu islam yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
9. Segenap dosen tekhususnya para dosen Prodi Kebidanan dan Para Staf Akademik Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis selama dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini berlangsung.
10. Kepada seluruh keluarga yang selalu memberikan nasehat, dan masukan untuk kebaikan penulis sendiri. Terima kasih untuk selalu menjadi alasan penulis untuk tetap berpendidikan.

11. Semua pihak yang peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Akhir kata penulis berharap semoga apa yang telah penulis susun dalam laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak Amiin.

Akhirul Kalam, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang DIII Kebidanan. Penulis menyadari Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun guna menyempurnakan penulisan Karya Tulis Ilmiah selanjutnya. Terima Kasih.

Samata-Gowa,03 Oktober 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perimenopause	9
B. Tinjauan Umum Tentang Kista Ovarium	24
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	54
D. Pendokumentasian Dalam Bentuk Soap	59

BAB III STUDI KASUS

A. Manajemen Asuhan Kebidanan	61
1. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	61
2. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual	67
3. Langkah III. Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial	79
4. Langkah IV. Tindakan Segera.....	71
5. Langkah V. Rencana Tindakan.....	71
6. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan	75
7. Langkah VII. Evaluasi	77
B. Pendokumentasian SOAP Tanggal 02 Agustus 2022	78
C. Pendokumentasian SOAP Tanggal 03 Agustus 2022	83
D. Pendokumentasian SOAP Tanggal 04 Agustus 2022	87
E. Pendokumentasian SOAP Tanggal 05 Agustus 2022	90
F. Pendokumentasian SOAP Tanggal 06 Agustus 2022	93
G. Pendokumentasian SOAP Tanggal 10 Agustus 2022	97
H. Pendokumentasian SOAP Tanggal 17 Agustus 2022	100
I. Pendokumentasian SOAP Tanggal 24 Agustus 2022	103
J. Matriks Kunjungan	106

BAB IV PEMBAHASAN

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	114
B. Langkah II .Identifikasian Diagnosa/Masalah Aktual	117
C. Langkah III .Antisipasi Diagnosa/Masalah Potensial	119
D. Langkah IV. Tindakan Segera	120
E. Langkah V. Rencana Tindakan.....	122
F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan	124
G. Langkah VII. Evaluasi	126


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI GAMBAR


Gambar 2.1 Fase-fase Menopause	11
Gambar 2.2 Kista Ovarium	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas Yang Lalu.....	40
Tabel Matriks Kunjungan Pada Ny “A” Dengan Kista Ovarium	117



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Keterangan Layak Etik
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
- Lampiran III : Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada RS Bhayangkara Makassar.
- Lampiran IV : Surat Izin Diterima Melakukan Penelitian Dari RS Bhayangkara Makassar.
- Lampiran V : Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari RS Bhayangkara Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2022

Duratul Hikma, 70400119018

Supervisor I : Zelna Yuni Andryani

Supervisor II : Firdayanti

Perimenopause Midwifery Care Management in Mrs. A with the Case of Ovarian Cysts at Bhayangkara Hospital, Makassar, August 2nd to 24th, 2022

Perimenopause refers to the time during which women's body makes the natural transition to menopause, marking the end of the reproductive years occurring mostly at the age of 45-55 years. The major problem found during perimenopause is ovarian cysts, namely the abnormal lumps in the ovaries. Based on WHO data in 2020, it was apparent that the cases of ovarian cysts reached (79.8%), while IDHS data showed that the occurrences of ovarian cysts reached (37.2%). At the same time, based on the data of South Sulawesi Provincial Health Office, the occurrences of ovarian cysts for people in the regency varied namely those aged 12-24 reaching (21.2%); aged 25-44 reaching (33.8%), and aged 45-64 reaching (14.1%). Moreover, the data from Bhayangkara Hospital Makassar showed that the occurrences of ovarian cysts underwent a gradual fall from 35.2% in 2019, 34.1% in 2020, and only 24.1% in 2021.

The major purpose of this study was to carry out perimenopausal midwifery care management for Mrs. A with the case of ovarian cysts at Bhayangkara Hospital of Makassar in 2022. The study was conducted for around 6 weeks where the 7-stage of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure were employed.

This study revealed that Mrs. A, who was 48 years old, experienced ovarian cysts with several signs such as lower abdominal pain, menstrual problem, pain in stomach, and high anxiety. Several measures were taken to overcome the problem such as cystectomy surgery, pharmacological therapy and listening to the murrotal of al-Qur'an. In addition, Midwives also played an important role in providing reproductive health care to the patient.

This study concluded that the care provided was considered to be successful, with removal of the cyst and the reduced of the pain. It was also apparent that no signs of infection were found, and the surgical wound was dry and healed. Therefore, this study concluded that there were no theoretical gaps found from this research.

Key Words : Perimenopause, Ovarian Cyst, 7-stages of Varney

ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2022

Duratul Hikma, 70400119018

Pembimbing I : Zelna Yuni Andryani

Pembimbing II : Firdayanti

“Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “A” Dengan Kista Ovarium Di RS Bhayangkara Makassar Tanggal 02-24 agustus 2022”

Perimenopause merupakan masa peralihan antara sebelum dan sesudah menopause, terjadi pada usia 45-55 tahun. Masalah pada perimenopause diantaranya kista ovarium, yaitu suatu benjolan abnormal pada ovarium. Berdasarkan data *WHO* tahun 2020 kista ovarium mencapai (79,8%), data SDKI kejadian kista ovarium mencapai (37,2%), Dinas kesehatan provinsi sulawesi selatan kejadian kista ovarium umur 12-24 mencapai (21,2%), umur 25-44 mencapai (33,8%), dan umur 45-64 mencapai(14,1%). Sedangkan data RS Bhayangkara Makassar kejadian kista ovarium 2019 mencapai (35,2%), 2020 mencapai (34,1%), 2021 mencapai (24,1%)

Tujuan dari penelitian ini yaitu Melakukan Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny “A” Dengan Kista Ovarium di RS Bhayangkara Makassar tahun 2022 selama ± 6 minggu dengan melakukan pendekatan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Pada Ny “A” dengan kista ovarium usia 48 tahun mengalami nyeri perut bagian bawah, tidak mengalami haid tiap bulan, perut terasa penuh dan kecemasan. Tindakan dilakukan dengan operasi kistektomi, terapi farmakologis serta mendengarkan murrotal al-Qur’an. Bidan berperan memberikan asuhan kesehatan reproduksi kepada individu.

Kesimpulan dari studi kasus menunjukkan bahwa asuhan yang diberikan berhasil, dengan pengangkatan kista, nyeri berkurang, tidak ada nanah dan tanda-tanda infeksi, luka bekas operasi kering dan membaik. Studi kasus disimpulkan tidak ada kesenjangan teori dengan didapatkan di lapangan.

Kata Kunci : Perimenopause, Kista Ovarium, 7 Langkah Varney

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ruang lingkup kesehatan diantaranya yaitu kesehatan reproduksi yang merupakan bagian penting dari kehidupan, karena dapat membantu untuk mempunyai keturunan biologis (Ratnawati, 2018). Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi merupakan faktor risiko terjadinya masalah kesehatan. Salah satu gangguan kesehatan reproduksi adalah kista ovarium (Dewinta, 2020).

Kista ovarium adalah kumpulan cairan yang berkembang pada ovarium. Akumulasi cairan ini ditutupi oleh selaput yang terbentuk dari lapisan terluar indung telur. Kista ovarium ialah salah satu jenis penyakit reproduksi yang menyerang wanita. Kista adalah jenis gangguan yang dapat digambarkan sebagai pertumbuhan jinak sel otot polos di dalam ovarium yang mempengaruhi wanita usia subur dan memungkinkan dapat menjadi kanker. (Fatkhayah, 2019).

Menurut World Health Organization (WHO) 2020, terdapat 14.896 kasus dengan keganasan ovarium dengan jumlah kematian mencapai 9.581. Pada tahun 2018, terdapat 13.310 kasus kista ovarium di Indonesia dengan case fatality rate 7.842 orang meninggal karena komplikasi dan keganasan yang muncul karena gejala yang tidak dirasakan pasien hingga terjadi metastasis (Khoiria et al., 2020).

Menurut *Globocan* pada tahun 2018, terdapat 295.414 wanita di seluruh dunia

didiagnosa menderita kista ovarium dan 4,4% kematian diantaranya terkait dengan kanker. Menurut kategori WHO, jenis kista yang paling banyak ditemukan ialah *serface epitel stromal tumors* dengan 67 pasien (79,8 %). (Freddie Bray., *et al.*, 2018)

Kista Ovarium ini sendiri bisa menyerang semua wanita, dari usia sangat muda hingga tua. Usia ≤ 25 tahun dan ≥ 45 tahun, bahkan ibu perimenopause ≥ 45 tahun lebih sering ditemukan kista karena keganasan sementara pada usia produktif sering dengan kelainan jinak.

Berdasarkan survei Demografi Kesehatan Indonesia, kejadian kista ovarium telah mencapai 37,2%, dengan 23.400 kematian dan 13.900 kematian, umumnya pada wanita usia 20-40, remaja atau di bawah usia 20 tahun, jarang terjadi (Susianti, 2017). Dalam kebanyakan kasus, kista ovarium jinak mudah diobati. Pada usia perimenopause, risiko kista ovarium ganas adalah 1: 1000 (Farahani dkk., 2017).

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh Dinkes Sulawesi Selatan dari bulan Januari hingga Desember 2013, 146 pasien ginekologi dan 31 pasien kista ovarium (21,2%) berusia 12 hingga 24 tahun, usia 25 hingga 44 tahun. 124 pasien dengan ginekologi penyakit kista ovarium hingga 42 pasien (33,8%), usia 45 hingga 64 tahun hingga 134 pasien ginekologi, 19 pasien dengan kista ovarium (14,1%) dan pasien berusia 65 tahun ke atas tidak memiliki kista ovarium. (Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2015).

Berdasarkan data dari RS Bhayangkara Makassar tahun 2019 penderita Kista Ovarium rawat inap sebanyak 19 penderita (6,76%) dan terjadi peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 27 penderita (9,60%) dan terjadi penurunan pada tahun 2021 sebanyak 23 penderita (8,18%). Kunjungan rawat jalan untuk kista ovarium meningkat sebesar 80 penderita (28,4%) pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 sebanyak 69 penderita (24,5%) dan pada tahun 2021 sebanyak 45 penderita (16,01%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa insiden kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar masih tinggi sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan kasus kista ovarium.

Berdasarkan data tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul Manajemen asuhan kebidanan perimenopause pada wanita perimenopause dengan kista ovarium, agar kedepannya dengan adanya deteksi dini tentang penyakit kistik ovarium pada ibu perimenopause saat pemeriksaan awal dengan adanya gejala dapat membantu meningkatkan mutu kesehatan ibu perimenopause dan mengurangi kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi pada wanita.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup penulisan Karya Ilmiah yaitu: Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Pada Ny "A" Dengan Kista Ovarium Di RS Bhayangkara Makassar.

C. Tujuan Penulisan

a. Tujuan umum

Memberikan asuhan kebidanan perimenopause dengan kista ovarium berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang otoritatif.

b. Tujuan Khusus

- a. Dilakukan pengkajian dan analisis data dasar ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- b. Dirumuskannya diagnosa/masalah aktual ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- c. Dirumuskannya diagnosa/masalah potensial ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaborasi ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- g. Diketuinya hasil tindakan yang telah dilakukan ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar
- h. Didokumentasikannya semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan ibu perimenopause pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar

D. Manfaat Penulisan

1) Manfaat praktis

Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan Diploma III ilmu kedokteran dan kesehatan dan rumah sakit, dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada wanita perimenopause dengan kista ovarium.

2) Manfaat Bagi Institusi

Memungkinkan institusi memberikan pelayanan medis yang nyata dan bermanfaat kepada masyarakat sebagai bahan masukan untuk pengembangan program pendidikan.

3) Manfaat Ilmiah

Hasil penulisan ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan.

4) Manfaat penulis

Penelitian ini adalah suatu pengalaman akademik yang berkesan dan prosesnya dapat menambah pengetahuan tentang metode penelitian yang didapatkan selama perkuliahan dan wawasan perimenopause terkait dengan kista ovarium, yang akan menjadi referensi bagi penulis di masa depan.

E. Metode Penulisan

Metode penulisan yang diterapkan pada penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut:

1) Studi sastra

Literatur yang beragam, berisi data dari jurnal perimenopause internasional dan nasional tentang kasus kista ovarium dan pembaca dari berbagai sumber.

2) Studi Kasus

Melakukan studi kasus yang ada dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan, yaitu pengkajian, perumusan diagnosa/masalah aktual dan potensial, kolaborasi, perencanaan, implementasi, evaluasi asuhan kebidanan klien perimenopause dengan kista ovarium, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode ini.

a. Anamnesa

Penulis melakukan sesi tanya jawab dengan klien dan keluarganya yang dapat menjelaskan informasi yang dibutuhkan

b. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data klien yang lengkap (pemeriksaan head to toe), dimulai dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan

penunjang diagnostik lainnya dengan menggunakan format penilaian yang telah disepakati sebelumnya melakukan pemeriksaan fisik.

c. Pengkajian psikososial

Kaji status psikososial dengan mengevaluasi keadaan emosional pasien, reaksi terhadap apa yang mereka rasakan dan pola interaksi dengan anggota keluarga.

d. Studi Dokumenter

Dengan mempelajari status klien berdasarkan catatan medik yang berkaitan dengan kasus klien.

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

Bab 1 meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan.

Bab II memberikan gambaran tentang definisi perimenopause, gambaran spesifik identifikasi kista, manajemen asuhan kebidanan, dan gambaran umum tentang kista ovarium.

Bab III study kasus, menjelaskan 7 langkah varney meliputi identifikasi dasar, diagnosa/identifikasi masalah aktual, identifikasi/masalah potensial, tindakan dan kolaborasi segera, rencana tindakan atau intervensi, implementasi dan evaluasi serta pendokumentasian (SOAP).

Bab IV pembahasan, dibahas perbandingan kesenjangan antara teori dan asuhan kebidanan dan praktik di RS Bhayangkara Makassar.

Bab V penutup, menyajikan simpulan dan saran dari asuhan yang dilakukan. Kesimpulan tersebut merupakan inti dari pembahasan asuhan kebidanan perimenopause dengan kista ovarium. Saran ialah alternatif pemecahan masalah dan tanggapan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perimenopause

1. Pengertian Perimenopause

Peri-menopause ialah masa transisi antara usia reproduksi dan senium. Periode ini, biasanya disebut premenopause, berusia antara 46 dan 50 tahun dan ditandai dengan ketidakaturan siklus menstruasi dan darah menstruasi relatif banyak dan lama. Perimenopause adalah bagian dari premenopause sebelum terjadinya menopause (Kusmiran, 2016).

Peri-menopause adalah periode pra-menopause dimana gejala endokrin, biologis dan klinis muncul sebagai permulaan perubahan dari menopause dan termasuk 1 tahun atau 12 bulan setelah menopause. Perubahan perimenopause dan proses penuaan meliputi pola perdarahan berubah, hot flashes, gangguan istirahat, perubahan atrofi, gangguan psikologis, gangguan berat badan, kulit, seks, dan fungsi tiroid. (Varney, 2016).

Perimenopause adalah kondisi fisiologi terhadap perempuan yang sudah memasuki proses penuaan (*aging*) yang ditandai turunnya kadar hormon estrogen pada ovarium (Sulistiawati dan Proverawati, 2017).

Perimenopause ialah keadaan fisiologis perempuan yang memasuki masa tua dan adanya penurunan kadar hormon estrogen di ovarium.

(Sulistiawati dan Proverawati, 2017). Perimenopause merupakan periode bolak-balik antara pramenopause dan menopause, yang ditandai dengan ketidakteraturan siklus menstruasi dan perubahan fisiologis yang terkait, termasuk periode 12 bulan setelah menopause. (Zulkarnaen, 2016).

Perimenopause adalah masa transisi antara pramenopause dan menopause, dimulai sekitar usia 45-55 tahun dengan timbulnya gejala dan ketidakteraturan menstruasi. Masa perimenopause terdiri atas pramenopause (usia 45-49), menopause (usia 49-51), dan postmenopause (usia 52-55). Selama periode ini, hormon tertentu estrogen, progesteron dan hormon terkait reproduksi lainnya meurun, menyebabkan berbagai penyakit yang mengganggu sehari-hari dan mempengaruhi kualitas hidup. (Salim, 2015).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, Perimenopause adalah masa peralihan antara pramenopause dan menopause dimana gejala endokrin, biologis, dan klinis muncul sebagai permulaan menopause dan berlangsung selama 1 tahun atau 12 bulan pertama setelah terjadinya menopause.

Perimenopause adalah fase klimakterium. Klimakterium merupakan masa transisi antara masa reproduksi dan masa senium, sebagai berikut:

a. Pramenopause

pramenopause adalah masa menstruasi sebelum berakhir, sebelum adanya gejala. Pra-menopause terjadi di usia 40 tahun.


b. Perimenopause ialah periode sebelum, selama, dan setelah menopause.

c. Menopause

Menopause adalah kondisi selama 12 bulan seorang perempuan yang tidak mengalami menstruasi, dengan tanda menopause hingga mencapai usia tua. Menopause terjadi antara usia 45 dan 51 tahun.

d. Pascamenopause atau postmenopause

Pasca-menopause yaitu periode pada kehidupan perempuan setelah periode berhenti selama satu tahun.



Gambar 2.1 Fase-fase Menopause (Ali Baziad, 2015)

2. Hormon Dalam Tubuh Wanita

Hormon yang berperan dalam sistem reproduksi adalah:

a. Estrogen

Estrogen dibuat di indung telur. Estrogen dapat menyebabkan proliferasi atau tumbuhnya sel-sel pada jaringan labia, vagina, rahim, tuba fallopi, dan payudara, sehingga menghasilkan ciri perkembangan seks perempuan: payudara, lekuk tubuh, pembentukan rambut vagina. Estrogen dapat membantu siklus menstruasi dengan membuat ketebalan dinding

endometrium dan menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina untuk mengakomodasi penetrasi sperma. Ada tiga jenis estrogen: estradiol, estron dan estriol, tetapi estradiol ialah estrogen terkuat yang dihasilkan ovarium dan terlibat dalam perkembangan payudara. Estron yaitu estrogen yang lebih lemah daripada estradiol. Estron diproduksi oleh ovarium dan jaringan diposa. Estron adalah estrogen terlemah.

b. Progesteron

Hormon ini dihasilkan oleh korpus luteum. Progesteron diproduksi oleh plasenta saat seorang wanita hamil. Pembentukan dan pelepasan progesterone dirangsang oleh *Luteinizing Hormone* (LH) fungsinya untuk menerima hasil konsepsi. Kadar progesterone dipertahankan selama trimester pertama kehamilan hingga plasenta dapat memproduksi *Hormone Chorionic Gonadotrophine* (HCG).

c. Hormon pelepas gonadotropin (GnRH)

Hormon yang disekresikan hipotalamus di otak. GnRH merangsang terlepasnya *Follicle-Stimulating Hormone* (FSH) di kelenjar pituitari, ketika tinggi kadar estrogen, estrogen memberikan umpan balik ke hipotalamus, sehingga kadar GnRH rendah dan sebaliknya.

d. FSH dan LH

Follicle Stimulating Hormone dan Leutinizing Hormone disebut hormon gonadotropin dan diproduksi di lobus anterior kelenjar hipofisis setelah dirangsang oleh GnRH, FSH mematangkan folikel dan LH

memecah folikel matang untuk melepaskan telur. Kemudian folikel ini menjadi korpus luteum, yang dipertahankan pada jangka waktu tertentu oleh LH.

3. Fisiologi Perimenopause

Penuaan pada wanita dimulai sekitar usia 40 tahun. Saat lahir, wanita memiliki sekitar 750.000 folikel, tetapi jumlah tersebut akan menurun seiring bertambahnya umur, yang akhirnya mencapai beberapa ribu saat menopause. Seiring bertambahnya usia, terutama pada periode perimenopause, folikel menjadi lebih resisten terhadap stimulasi gonadotropin. Ini memperlambat tumbuhnya folikel, ovulasi, dan terbentuknya korpus luteum dalam siklus indung telur. 25% wanita di atas usia 40 tahun alami siklus menstruasi anovulasi. Resistensi folikel terhadap gonadotropin menyebabkan turunnya produksi estrogen dan tingginya kadar hormon gonadotropin. Tingkat tinggi gonadotropin tersebut tidak memiliki umpan balik pada sumbu hipotalamus dan hipofisis karena tingkat estrogen turun. Secara endrokinologis adanya perubahan hormonal, tetapi tidak ada kriteria khusus untuk mengukur kadar hormon dalam menentukan tahap awal dan akhir transisi menopause (Nandryni, 2019).

4. Patofisiologi Perimenopause

Fungsi ovarium adalah untuk menciptakan kehidupan dan menampung produksi yang dibuahi manusia. Hormon ovarium merangsang pertumbuhan,

diferensiasi dan fungsi organ reproduksi dari pubertas hingga dewasa, mempersiapkan wanita untuk tugas yang sangat penting ini. Kehamilan menempatkan tuntutan yang tinggi pada semua organ, sehingga semua organ vital utama dan fisiologi dipengaruhi secara positif oleh estrogen.

Dalam studi ovarium manusia, kehilangan yang cepat dimulai apabila jumlah total seluruh folikel sekitar 25.000, mencapai jumlah perempuan normal umur 37 hingga 38 tahun. Kehilangan ini dikaitkan dengan peningkatan FSH yang kecil namun signifikan dan penurunan inhibin, kehilangan dipercepat dengan peningkatan stimulasi FSH. Ini merupakan termasuk tingkatan FSH, mencerminkan turunnya kualitas dan potensi folikel dan turunnya sekresi inhibin, dan produk sel granulosa memiliki efek umpan balik negatif pada sekresi FSH oleh hipofisis.

Sebuah study di Australia menunjukkan adanya peningkatan FSH dikaitkan dengan turunnya inhibin B saja. Hubungan dekat terbalik antara FSH juga inhibin menunjukkan bahwa inhibin adalah indeks sensitif volume folikel dan dengan demikian pengukuran FSH adalah penilaian klinis inhibin. Dengan demikian, perubahan usia reproduksi yang terlambat (penurunan inhibin menyebabkan peningkatan FSH) mencerminkan penurunan reaktivitas folikel dan fungsi indung telur pada perempuan yang lebih tua. Turunnya sekresi inhibin oleh folikel dimulai sekitar usia 35 tahun, tetapi menurun tajam setelah 40 tahun. Hal ini tercermin dari turunnya kesuburan yang terjadi dengan bertambahnya umur.

Perimenopause merupakan FSH pascamenopause (>20 IU/L) yang dapat diamati bahkan dengan perdarahan haid yang sedang berlangsung, akan tetapi kadar LH tetap dalam kisaran normal. Terkadang, pembentukan dan fungsi korpus luteum terjadi, dan perempuan perimenopause lebih rentan pada kehamilan yang tidak diketahui sampai kadar FSH (> 20 IU/L) dan LH (> 30 IU/L) meningkat. Diindikasikan, bahkan demikian, durasi insufisiensi ovarium setelah pemulihan fungsi ovarium dapat bervariasi.

Selain itu, karena tidak ada folikel imatur yang muncul saat ovulasi, korpus luteum tidak berkembang dan sejumlah besar progesteron tidak diproduksi. Perubahan yang paling menonjol pada endokrin adalah peningkatan yang drastis dari konsentrasi FSH serum, yang dapat melebihi tingkat folikel awal yang umumnya lebih tinggi dari puncak praovulasi. Tingkat LH sedikit meningkat dan tidak selalu di atas konsentrasi puncak masa subur.

Tingkatnya FSH dan LH disebabkan oleh gangguan umpan balik penghambatan. dikarenakan terlalu sedikit atau tidak adanya responsif sel folikel, sehingga indung telur tidak dapat merespon gonadotropin yang akibatnya, dihasilkannya sejumlah besar hormon estrogen wanita, progesteron dan inhibin. Peran spesifik inhibin terlihat dari peningkatan besar FSH. Pelepasan LH hanya diatur oleh steroid seks, sedangkan inhibin merupakan faktor umpan balik ovarium utama untuk pelepasan FSH. (Kahwati, 2013; Widjanarko, 2014).

Sastrawinata dan Winkjosastro (2016), secara endrokinologis periode perimenopause ditandai dengan kadar estrogen yang menurun dan peningkatan pelepasan gonadotropin. Gejala klinis defisiensi dari estrogen meliputi terganggunya neurotropik (vasomotor), psikatri, dan somatik.

5. Gejala-Gejala Perimenopause

a. Gangguan vasomotor

Hot flashes dan rasa panas dari dada sampai wajah membuat wajah, leher berkeringat dan merah. Flushing disebabkan karena peningkatan aliran darah ke vena, wajah, leher, dada dan pinggang bagian bawah. Alasan untuk ini adalah peningkatan pelepasan hormon adrenalin dan neurotensin oleh tubuh perempuan. Sementara itu, pelepasan hormon selain adrenalin berkurang, menyebabkan peningkatan vasodilatasi dan kehangatan kulit. Hot flashes terjadi beberapa kali sehari dan intensitasnya bervariasi dari orang ke orang. Dalam situasi yang parah, hot flashes dapat terjadi hingga 20 kali per hari. Apabila hot flashes muncul di malam hari, bisa menyebabkan seorang wanita terganggu saat beristirahat

b. *Dryness vaginal* (kekeringan vagina)

Gangguan seksual menjadi lebih umum seiring bertambahnya usia. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan di vagina, meliputi kering yang membuat sel epitel vagina lebih tipis dan lebih rentan terhadap kerusakan,

menyebabkan rasa sakit di sekitar vagina saat berhubungan, kecemasan atau kondisi tubuh menjadi buruk.

c. Turunnya daya ingat dan hipersensitivitas

Apabila kadar estrogen rendah dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak. Neurotransmitter di otak termasuk dopamin, serotonin, dan endorfin. Neurotransmitter ini menopang kehidupan. Dopamin bekerja dalam mempengaruhi emosi, sistem kekebalan tubuh dan tingkat seks. Tingkat dopamin dipengaruhi suasana hati serta aktivitas istirahat. Endorfin melakukan fungsi yang berkaitan dengan memori dan emosi yaitu rasa sakit dan nyeri. Produksi endorfin menurun selama perimenopause. Ini disebabkan ketika kadar estrogen dalam darah menjadi rendah. Rendahnya kadar endorfin, dopamin, dan serotonin menyebabkan terganggunya ingatan dan perubahan suasana hati yang dapat membuat suasana hati berubah-ubah.

d. Inkontinensia urin

Penipisan jaringan kandung kemih dan saluran kemih diakibatkan rendahnya kadar estrogen. Ini mengurangi kontrol kandung kemih dan membuatnya sulit untuk menahan urin.

e. Siklus haid tidak teratur

Perdarahan adalah keluarnya darah dari vagina dan biasanya muncul pada awal menopause. Perdarahan diamati selama beberapa bulan dan akhirnya terhenti, ini disebut dengan gejala peralihan. Jika perdarahan

menjadi parah, disarankan untuk melakukan tes agar memastikan tidak ada perdarahan.

f. Adanya perubahan kulit

Sinar matahari merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi perubahan kulit pada wanita selama masa menopause. Perubahan lainnya termasuk kulit kering, keringat berlebih, kerutan, perubahan fungsi pelindung dan penipisan kulit. Karena lemak subkutan juga berkurang, kendor pada kulit dan rentan terbakar sinar matahari, mengakibatkan pigmentasi.

Ayat Al-Qur'an telah menjelaskan tentang perubahan yang dialami pada masa perimenopause. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Yasin/36: 68 yang berbunyi :

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahan:

“Dan barang siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian (Nya). Maka apakah mereka tidak memikirkan?” (Kementerian Agama, 2019)

Wahbah az-Zuhaili menafsirkan bacaan Al-Wajiz sebagai berikut
 Tidakkah mereka pikir bahwasanya dzat yang berkuasa atas hal itu, memiliki kekuasaan terhadap sesuatu di masa depan, seperti menghapus, mengubah, dan dibangkitkan sehingga mereka beriman? “Dan orang yang Kami

panjangkan usianya, Kami ubah bentuk fisik dan kondisinya dari kuat menjadi lemah dan cerdas menjadi pikun. (Agus Effendi dan Bahrudin Fanani, 2005).

Abdurrahman bin Nashir as-Sa' dalam tafsir as-sa'di menafsirkan bahwa Allah berfirman "Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya," ini diantara orang-orang dari: "keadaan pertama di mana dia diciptakan, yaitu lemah, lemah pikiran, lemah kekuatan. "tidakkah mereka berpikir bahwa orang-orang itu cacat (lemah) dalam segala hal?" maka gunakanlah kekuatan dan kecerdasan mereka untuk menyerahkan mereka kepada rabbnya. (Abdurrahman, asy Syaikh bin Nashir as-Sa'di, 2006).

Tafsir singkat Surat Yasin Ayat 68 Kementrian Agama Republik Indonesia menafsirkan sebagai berikut "Dan ingatlah wahai keturunan Adam, barangsiapa yang Kami panjangkan usianya maka Kami akan kembalikan dia pada awal kejadiannya. Saat itu ia kembali lemah dan kurang akal seperti anak kecil, sehingga ia tidak lagi melakukan ibadah yang berat. Jadi mengapa mereka tidak memahami dan memanfaatkan peluang selagi masih muda" (Kementrian Agama, 2019).

Berdasarkan beberapa penafsiran yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang Allah ciptakan dan dipanjangkan umurnya sehingga memasuki masa perimenopause akan mengalami perubahan psikis dan psikologis yang dimana adanya perubahan bentuk fisiknya, perubahan kulit, keadaan dari kuat jadi lemah, penurunan daya ingat, kecerdasan menurun dan juga perubahan fungsi dan sistem kerja organ

lainnya yang meliputi gangguan vasomotor, dryness vaginal (kekeringan pada vagina), dan ketidakaturan siklus haid.

6. Perubahan Yang Dialami Saat Perimenopause

a. Perubahan Hormon

Saat perimenopause dimulai, aktivitas folikel di indung telur mulai menurun. Ketika indung telur gagal memproduksi sel telur dan berhenti menghasilkan estradiol, kelenjar pituitari mencoba merangsang indung telur agar memproduksi estrogen, meningkatkan produksi FSH dan LH. Perubahan tersebut terjadi 3 tahun sebelum menopause, tetapi turunnya produksi estrogen oleh indung telur tidak terjadi sampai sekitar 6 bulan sebelum menopause. Tingkat hormon androgenik seperti androstenedion dan testosteron juga turun, tetapi ini sulit dideteksi selama menopause.

7. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gejala Perimenopause

a. Faktor psikologi

Kondisi mental seseorang wanita mempengaruhi terjadinya menopause. Status wanita pekerja yang belum menikah mempengaruhi perkembangan psikologis mereka.

b. Faktor budaya dan lingkungan

Lingkungan juga mempengaruhi kesehatan, stres, pola pikir dan pendidikan seorang. Lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana perempuan beradaptasi dengan diri mereka sendiri.

c. Faktor sosial ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi akan mempengaruhi kondisi fisik, kesehatan dan pendidikan seseorang. Jika faktor ini cukup, beban fisiologis juga berkurang.

d. Usia menarche

Usia menarche wanita yang rentan mengalami menarche lebih tua atau lebih lama sebelum menopause.

e. Usia melahirkan

Sebuah studi Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston menemukan bahwa perempuan yang berusia 40-an akan mengalami menopause yang lebih lama. Ketika kehamilan dan persalinan menopause tertunda, dapat memperlambat penuaan tubuh dan sistem kerja organ reproduksi.

f. Pemakaian kontrasepsi

Kontrasepsi wanita mempengaruhi menopause seseorang yang dimana menekan kerja dari indung telur. Perempuan yang menggunakan kontrasepsi hormonal akan lebih lama memasuki masa menopause.

g. Status gizi

Salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap menopause dini adalah mengkonsumsi makanan sembarangan. Pola hidup sehat merupakan cara pencegahan menopause dini meliputi tidak merokok,

makan makanan bergizi dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat yaitu bengkoang atau pepaya, kedelai, dan kacang merah.

Adapun surah Al-Qur'an yang menerangkan anjuran memakan makanan yang halal dan bergizi (baik) yaitu surah al-Baqarah/2:168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Kementerian Agama, 2019)

Dalam surah al-Baqarah ayat 168 [2], setiap orang dianjurkan untuk makan makanan yang halal dan bergizi (baik). Hal ini karena baik untuk tubuh dalam jangka panjang dan dapat menunjang aktivitas sehari-hari di dunia. Menurut sebagian ulama, kata *kulu* dalam ayat ini bukanlah kewajiban melainkan anjuran untuk dilaksanakan (hampir menjadi kewajiban). (M. Quraishy Shihab, 2012)

Anjuran untuk makan makanan halal dan bergizi (baik) berasal dari Allah karena tidak semua yang ada di dunia ini otomatis halal. Dia menciptakan ular berbisa yang tidak dimaksudkan untuk dimakan, tetapi digunakan sebagai obat. Ada burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman (M. Quraish Shihab, 2012).

Karena itu, tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan halal, karena bumi tidak diciptakan untuk manusia saja, tetapi sebagian besar isinya digunakan untuk kepentingan manusia. Oleh karena itu, orang-orang yang diberkahi karunia akal dan wahyu oleh Allah diperintahkan untuk memilah makanan halal. Tidak hanya halal menurut syariat, tetapi juga bergizi (baik) untuk kesehatan. Makanan halal di sini berarti makanan yang tidak haram, yaitu makanan yang diharamkan dalam Islam. Ada dua jenis makanan yang diharamkan: makanan yang haram berdasarkan bahannya seperti daging babi, bangkai dan darah, dan makanan yang haram berkaitan dengan perolehan: misalnya pangan yang tidak diizinkan untuk di konsumsi atau digunakan oleh pemiliknya. Makanan halal tidak termasuk dalam kedua jenis makanan tersebut. (M. Quraish Shihab, 2012)

Sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa anjuran makan makanan halal dan bergizi (baik) berlaku untuk semua umat manusia, termasuk siapa saja. Seolah-olah Allah berfirman, “Hai orang-orang muslim dan kafir, makan makanan halal dan bertindak sesuai hukum, karena itu bermanfaat bagi kehidupan duniawi kalian.” (M. Quraish Shihab, 2012).

Berdasarkan tafsir tersebut, maka dapat dipahami bahwa konsumsi makanan halal dan bergizi (baik) dianjurkan. Ayat ini juga secara khusus mengajarkan kita untuk memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita dan tidak makan berlebihan.

8. Penatalaksanaan Perimenopause

Penatalaksanaan ini dapat mengurangi atau menghilangkan gejalanya, dan bukan menghentikan kondisi dari perimenopause. Obat yang dipakai dalam mengobati gejala perimenopause yaitu:

- a) Pil merupakan terapi pengganti hormon estrogen, pilihan pengobatan yang paling efektif adalah estrogen tempel pada kulit, gel atau krim mampu hilangkan hot flash perimenopause.
- b) Obat-obatan bentuk krim dan tablet yang dimasukkan ke dalam vagina mampu membantu mengurangi ketidaknyamanan dan kering pada vagina saat berhubungan seks.
- c) Gejala hot flash pada menopause atau pada wanita dapat menggunakan antidepresan seperti golongan selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) dengan gangguan mood.
- d) Obat yang mampu mengurangi hot flash pada wanita adalah gabapentin, yang dimana dapat digunakan oleh perempuan yang tidak memakai terapi pengganti hormon estrogen disebabkan oleh kesehatan tertentu.

B. Tinjauan Umum Tentang Kista Ovarium

1. Pengertian Kista Ovarium

Kista ovarium adalah benjolan pada indung telur yang dapat menyebabkan pembesaran perut bagian bawah, dan jika disertai kista ovarium

saat hamil akan tampak seolah-olah ada perlekatan saat kehamilan mulai membesar (Prawirohardjo, 2016).

Menurut Nugroho 2014, Kista Ovarium ialah struktur tidak normal yang berisi zat gas, cair, atau setengah padat dan dapat tumbuh dimanapun dalam tubuh dan dinding luar kantung terlihat seperti sebuah kapsul. Biasanya kista indung telur dapat berupa kantong dimana tidak bersifat kanker dan materialnya yaitu berisi cairan atau setengah cair.

Kista ovarium merupakan tumor jinak ginekologi pada wanita yang sering ditemui pada masa reproduksi. Penyebab kista ovarium adalah gangguan pembentukan hormon di hipotalamus, hipofisis, dan indung telur. Kista ovarium sendiri dapat menjadi ganas yang disebut dengan kanker ovarium. Kista ovarium terletak di indung telur yang berisi cairan dan normalnya berukuran kecil . (Nugroho, 2014)



Gambar 2.2. Kista Ovarium (Bobak dan Jensen 2015)

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan, kista Ovarium yaitu salah satu tumor jinak yang dapat menyebabkan benjolan tidak normal di

abdomen bawah yang berisi cairan abnormal seperti udara, nanah, dan cairan kental.

2. Etiologi

Menurut Setyorini 2014, salah satu penyebab terjadinya kista ovarium adalah gangguan pembentukan hormon di hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Ada beberapa faktor risiko yang berhubungan dapat mempengaruhi timbulnya kista ovarium antara lain:

a. Faktor Umur

Pada perempuan usia subur kista dapat menjadi ganas yang dimana bisa terjadi pada usia sebelum menarche dan ≥ 45 tahun. (Manuaba, 2016). Widyarni 2020 dari hasil penelitian menunjukkan adanya kaitan antara umur dan kejadian kista ovarium, yaitu uji Spearman's Rho dengan adanya hubungan $p\text{-value } (0,033) < \alpha = 0,05$ dan nilai korelasi koefisien ($r=225$). Dengan responden usia beresiko banyak mengalami kista ovarium dibandingkan responden dengan umur tidak beresiko, dan paling sering terjadi antara usia 20-50, Hal ini dikarenakan dengan bertambahnya usia dapat menurunkan kinerja organ dan kekuatan tubuh yang dapat mudah terkena berbagai penyakit.

b. Faktor genetik

Salah satu faktor penting untuk menentukan apakah seorang tersebut memiliki risiko terkena kista ovarium 1,6% adalah faktor gen. jika seorang

wanita mempunyai anggota keluarga yang menderita kista, akan meningkat risiko terjadinya kista ovarium sebesar 4% hingga 5% (Rasjidi, 2015). Gen dalam tubuh kista dapat berkembang menjadi kanker yaitu protoonkogen yang dimana bisa menjadi onkogen yaitu gen yang mampu menimbulkan sel kanker, yang dapat dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat.

c. Faktor hormon

Ketidakeimbangan antara hormon estrogen dan progesteron dapat menyebabkan terjadinya kista ovarium, hal ini dimungkinkan karena menggunakan obat yang dapat memengaruhi ovulasi dan obat pelangsing yang memiliki sifat diuretik. Terbentuknya kista fungsional disebabkan oleh stimulasi hormon gonadotropin atau disebabkan oleh sensitivitas terhadap hormon gonadotropin yang berlebihan. FSH (Folikel Stimulating) dan HCG (Human Chorionik Gonadotropin) termasuk hormon gonadotropin. Seseorang dengan kelebihan hormon estrogen atau progesteron akan menimbulkan terjadinya penyakit kista (Kurniawati, dkk. 2015)

d. Faktor lingkungan

Penyebab terjadinya kista yaitu faktor lingkungan, adanya infeksi bakteri dan virus dari penyumbatan saluran yang berisi cairan dan zat dioksin dari asap pabrik serta pembakaran gas motor yang dapat menurunkan kekebalan tubuh manusia, sehingga menimbulkan tumbuhnya

kista, Faktor makanan; kelebihan lemak yang tidak sehat dapat berpengaruh terhadap zat lemak yang tidak dapat dipecah dalam proses metabolisme yang kemudian berpengaruh terhadap timbulnya kista ovarium dan juga faktor gen (Andang, 2013).

e. Merokok dan mengkonsumsi alkohol

Merokok dan meminum minuman keras merupakan gaya hidup tidak sehat yang dialami oleh semua manusia. Gaya hidup yang tidak sehat akibat merokok dan minum minuman beralkohol menyebabkan gangguan kesehatan, kanker, gangguan peredaran darah, kemandulan, cacat janin, dan lainnya. (Kurniawati, 2015).

f. Mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi dan serat

Penimbunan zat-zat berbahaya dalam tubuh disebabkan karena konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga serat. Sehingga sel-sel darah dalam tubuh yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran pencernaan di dalam peredaran darah dan dapat mengakibatkan tidak bekerjanya sistem organ dengan baik sehingga terjadinya obesitas, konstipasi, dan lainnya. (Kurniawati, 2015). Sebagaimana penelitian oleh (Widyarni, 2020) kaitan antara pola makan dan kejadian kista ovarium yang bersifat sedang dan hasil uji Spearman's Rho, menunjukkan adanya hubungan dengan $p\text{-value } (0,004) < \alpha = 0,05$ dan nilai korelasi koefisien ($r=343$). Yang artinya responden dengan pola makan yang buruk

memungkinkan bisa mengalami risiko terbesar terjadinya kista ovarium dibandingkan dengan responden dengan pola makan yang baik.

g. Sosial Ekonomi Yang Rendah

Salah satu faktor pemicu penyebab terjadinya kista adalah sosial ekonomi yang rendah, meskipun demikian sosial ekonomi yang tinggi dapat juga terkena penyakit kista ovarium, dikarenakan apabila seorang tidak mengatur pola hidup yang sehat. (Kurniawati, 2015).

h. Stres dan kurang olahraga

Stres merupakan faktor risiko penyebab terjadinya kista, dikarenakan jika seseorang mengalami stres akan memicu untuk melakukan tindakan yang merugikan kesehatannya misalnya, mengkonsumsi alkohol, rokok, seks bebas, dan lain sebagainya. (Kurniawati, 2015)

Kegiatan yang dapat menyehatkan tubuh adalah dengan berolahraga. Jika seorang kurang melakukan olahraga maka akan terjadi penimbunan lemak di sel-sel tubuh manusia yang dapat memicu terhambatnya peredaran darah oleh jaringan lemak yang tdk berfungsi secara benar. (Kurniawati, 2015)

i. Faktor reproduksi

Menstruasi di usia dini (menarche dini) dapat menyebabkan terjadinya kista ovarium yaitu pada usia 11 tahun dan atau (< 12 tahun), umumnya anak perempuan mendapatkan haid pada usia 10 hingga 11 tahun. Menstruasi yang tidak teratur adalah faktor risiko timbulnya kista

ovarium. (Manuaba, 2016). Hal ini sejalan dengan teori (Shannon M G, 2017) yang mengemukakan riwayat reproduksi seseorang menjadi faktor terbesar risiko terkena kista ovarium, menarche dini, serta menopause yang terlambat dapat menyebabkan tingginya risiko terkena kista indung telur.

3. Patofisiologi Kista Ovarium

Adanya interaksi antara hipotalamus, hipofisis, ovarium dan endometrium menyebabkan terjadinya ovulasi. Kelenjar hipofisis merangsang terjadinya perkembangan dan pematangan folikel di ovarium. Saat berlanjut, rangsangan yang dirasakan panca indera diteruskan ke kelenjar hipofisis anterior melalui aliran portal hipotalamohipofisial. Sampainya di kelenjar hipofisis anterior, GnRH berikatan dengan sel gonadotropin sehingga merangsang keluarnya FSH (*Follicle Stimulating Hormone*) dan LH (*Luteinizing Hormone*), dimana FSH dan LH dapat menghasilkan hormon estrogen dan progesteron (Nurarif, 2016).

Ketika tubuh wanita tidak menghasilkan jumlah hormon hipofisis yang benar, maka ovarium tidak akan berfungsi dengan normal yang dimana dapat terjadi timbunnya folikel yang terbentuk dengan buruk dalam indung telur, sehingga folikel itu gagal alami pematangan dan gagal dalam melepaskan ovum. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan kista di ovarium, dan terjadinya infertilitas pada wanita. (Manuaba, 2016).

4. Klasifikasi

Menurut Yatim (2014), kista ovarium bisa berkembang di korpus luteum yang bersifat non neoplastik dan neoplastik. Beberapa kista ovarium jinak terbagi dalam golongan non-neoplastik dan neoplastik.

Menurut golongan non-neoplastik, klasifikasi kista ovarium sebagai berikut:

a. Kista Ovarium Non neoplastik (Fungsional)

Jenis kista ini biasa terjadi pada wanita usia reproduksi yang disebabkan oleh hormon dan menghilang dengan sendirinya setelah satu hingga dua siklus haid. Kista ini seperti kista folikuler, kista korpus luteum, dan kista tekalutein. Yang dimana tidak memerlukan pembedahan. (Rasjidi dkk, 2015)

1) Kista Folikel

Kista ini berkembang dari folikel normal yang melepaskan sel telur didalamnya. Ovarium terbentuk kantung berisi cairan atau lendir. (Faisal Yatim, 2014).

Kista ini berasal dari folikel degraf yang tidak berovulasi, tetapi terus tumbuh menjadi kista folikel, atau dari beberapa folikel primer yang tumbuh dibawah pengaruh esterogen dan kemudian berkembang menjadi kista tanpa melalui proses normal atresia. Kemungkinan terdapat satu kista atau lebih, biasanya berdiameter 1-1½ cm. Kista yang tumbuh dengan sendirinya bisa sebesar jeruk. Bagian dalam yang tipis dari

dinding terdiri dari beberapa lapisan sel granulosa, namun, tekanan dalam kista menyebabkan lapisan ini mengalami atrofi. Cairan didalam kista jernih dan sering mengandung esterogen. Oleh karena itu, kista dapat menyebabkan ketidakteraturan menstruasi. Kista folikel dapat menyusut dan menghilang secara sponta, atau dapat pecar dan menghilang.

Untuk kista ovarium, timbul pertanyaan apakah kista yang di derita itu neoplasma atau kista folikel. Jika kista berdiameter 5 cm atau kurang, kista folukuler biasanya dapat ditunggu dahulu karenakista ini akan hilang ddengan sendirinya dalam 2 bulan. (Prawirohardjo, 2016).

2) Kista korpus luteum

Kista jenis ini lebih jarang dan lebih besar dari kista fungsional. Kista ini akan mengeluarkan darah ketika sel telur dilepaskan dan dapat pecah seiring berjalannya waktu sehingga menyebabkan pendarahan dan memerlukan pembedahan untuk mengatasinya, hal ini disebabkan oleh rasa sakit yang parah. (Faisal Yatim, 2014).

3) Kista theka-lutein

Hal ini disebabkan over stimulasi theka lutein oleh kadar gonadotropin yang bersikulasi akibat kehamilan ektopik, mola hidatidosa, terapi hormon esterogen, atau koriokarsinoma (Sinclair, 2014).

4) Kista polikistik

Menurut Yatim (2014), ovarium polikistik ditemukan pada 5- 10% wanita perimenopause. Ini terjadi akibat dari kegagalan perkembangan folikel dan dimana ovulasi tidak terjadi. Pasien polikistik ini juga sering terlihat bintil, peningkatan androgen dan peningkatan prolactin darah (hiperprolaktinemia). Publikasi lain menunjukkan bahwa sindrom polikistik terjadi pada 5-10% wanita perimenopause. Kejadian ini berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon yang terjadi pada usia tersebut. Wanita yang menderita penyakit polikistik dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Keluhan sedikitnya darah haid yang keluar (oligo-menorrea).
- b. Tidak ada perdarahan menstruasi (amenore).
- c. Tidak ada ovulasi.
- d. Mandul.
- e. Berjerawat.

5) Kista inklusi germinal

Kista ini dihasilkan dari intususepsi dan pemisahan bagian kecil epitel embrionik pada permukaan ovarium. Kista ini sering terjadi pada wanita yang lebih tua dan jarang melebihi diameter 1 cm. kista ini biasanya di temukan secara kebetulan selama pemeriksaan histologi ovarium dan diangkat selama operasi. Kista ini terletak di bawah permukaan ovarium. Dindingnya terdiri dari satu lapis *epitel kuboid* atau

hipotoraks, dan isinya berupa cairan serosa bening. (Prawirohardjo, 2016).

b. Kista neoplastic jinak

1) Kistoma ovary simpleks

Kista ini memiliki permukaan yang rata dan halus, biasanya bertangkai, dan dapat berukuran besar. Dinding kista tipis dan cairan di dalam kista jernih, dan sangat kuning. Indung kista menunjukkan lapisan epitel kuboid. Karena adanya tangkai, dapat terjadi puntiran dengan gejala yang tiba-tiba. Kista diduga merupakan suatu kista dinamoma serosa yang kehilangan epitel kelenjarnya karena terkena cairan di dalam kista. Namun, terdiri dari pengangkatan kista dengan ovariektomi dan jaringan yang diangkat harus segera diperiksa secara histologi untuk menentukan apakah terjadi keganasan. (Prawirohardjo, 2016).

2) Adenoma ovarium kistik serosa

Kista serosa menyebabkan 20-50% dari semua tumor ovarium dan 35-40% dari semua kanker ovarium. Sekitar 70% tumor serosa adalah jinak, 5-10% memungkinkan keganasan dan 20-25% ganas.

Kistadenoma serosa paling sering terjadi pada wanita antara usia 30 dan 50 tahun, dan karsinoma serosa terjadi pada wanita diatas usia 40 tahun. Tumor dapat berkembang mengisi rongga perut, tetapi biasanya beratnya antara 4,5 dan 9 kg, beberapa gejala telah dilaporkan. Kista serosa

biasanya ditemukan selama pemeriksaan panggul rutin. Kista ini tidak menghasilkan hormon.

Kista awalnya berbilik tunggal, serosa, berisis cairan kekuningan pucat, dan memiliki kapsul fibrosa halus. Kemudian, pertumbuhan multikuler dan papiler muncul di permukaan dalam dan luar. Secara histologis, tumor serosa terdiri dari sel epitel bersilia (sel kuboid atau kolumnar bawah) yang menyerupai tuba fallopi. Massa keras berkapur, kecil, granular, tajam (badan psammoma) sering ditemukan dalam kista. Kista ini berdiferensiasi baik (terutama pada wanita muda) namun lesi yang tidak berdiferensiasi lebih sering terjadi pada pasien yang lebih tua. (Benson dan Pernoll, 2013).

3) Kista denoma ovarium musinosom

Asal usul tumor ini belum diketahui secara pasti. Menurut Meyer, hal itu mungkin muncul dari teratoma di mana satu faktor mengalahkan yang lain dalam pertumbuhan. (Prawirohardjo, 2017).

4) Kista endometrioid

Kista ini biasanya unilateral dengan permukaan yang halus. Dinding bagian dalam memiliki satu lapisan sel yang mirip dengan lapisan epitel endometrium. Kista ini, ditemukan oleh Sartesson pada tahun 1969, tidak ada kaitan dengan endometriosis ovarium. (Prawirohardjo, 2016).

Pentingnya neoplasma endometrioid tidak terletak pada frekuensinya (sekitar 5%). Namun, karena potensi keganasan (sekitar

20% dari semua karsinoma ovarium). Kanker endometrioid biasanya terjadi pada wanita antara usia 40 dan 60 (Benson dan Pernoll, 2013).

5) Kista dermoid

Faktanya kista dermoid adalah teratoma kistik yang jinak dimana struktur ektodermal yang berdiferensiasi penuh seperti kulit, rambut, gigi, dan epitel produk sebaceous berwarna putih kekuningan, menyerupai lemak. Mengenai histogenesis kista dermoid, teori yang banyak di pegang adalah melalui proses partenogenetik. Kista dermoid paling sering terjadi pada usia reproduksi awal (usia 18 hingga 30 tahun). Kista dermoid bisa sangat kecil, tapi kebanyakan juga mencapai 0,5 dan bisa jauh lebih besar. (Benson dan Pernoll, 2013).

5. Gejala Secara Umum

Kebanyakan kista ovarium tumbuh tanpa gejala atau adanya ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan biasanya terjadi ketika kista tumbuh dan mempengaruhi organ lainnya, menyebabkan kesulitan buang air kecil dan ketidaknyamanan usus, gerakan kaki, gangguan pencernaan, kesemutan dan bengkak. (Andang, 2013)

Menurut Faisal Yatim (2014) gejala kista yang umum terjadi antara lain:

- a) Nyeri terus menerus di rongga panggul dengan sedikit gatal
- b) Nyeri saat berhubungan intim atau nyeri panggul saat bergerak

c) Nyeri terjadi segera setelah selesainya siklus menstruasi. Pendarahan menstruasi tidak normal. Pendarahan mungkin lebih lama atau lebih pendek, siklus teratur tanpa perdarahan menstruasi, atau siklus menstruasi tidak teratur.

d) Pembesaran perut

Menurut Manuaba (2016) gejala (ketidaknyamanan) tumor ovarium antara lain:

- 1) Tumor kecil yang membesar mungkin terlihat selama pemeriksaan rutin. Tumor dengan diameter sekitar 5 cm dianggap tidak berbahaya kecuali terlihat pada wanita pascamenopause (baik perimenopause atau pascamenopause). Ukuran tumor bisa mendorong ke segala arah, sehingga sulit buang air kecil dan besar, rasa berat di perut bagian bawah, dan teraba kista di perut.
- 2) Gejala ketidakseimbangan hormon, ovarium merupakan sumber hormon wanita, sehingga tumor yang tumbuh dapat mempengaruhi sekresi hormon sehingga menimbulkan gejala klinis berupa gangguan pola dan gejala akibat tumor yang mensekresi hormon.
- 3) Manifestasi klinis akibat komplikasi tumor. Gejala komplikasi kista berupa infeksi kista ovarium (demam, sakit perut, kembang dan nyeri, pasien merasa sakit), torsi atau gejala perut yang parah secara tiba-tiba dengan keadaan umum penderita baik).

6. Diagnosa

a. Anamnesis

Anamesa/Anamnesis adalah praktik tanya jawab antara pasien dan tenaga kesehatan lain yang berwenang untuk mengumpulkan informasi tentang keluhan dan penyakit pasien.

b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik bertujuan untuk memeriksa kondisi fisik pasien dan mengumpulkan data. Pemeriksaan fisik meliputi:

- 1) Inspeksi, adalah pemeriksaan yang memeriksa seluruh tubuh secara rinci dan sistematis.
- 2) Palpasi, adalah pemeriksaan fisik yang melibatkan palpasi bagian tubuh yang terlihat tidak normal.
- 3) Perkusi, adalah tes fisik yang dilakukan dengan mengetuk daerah tertentu di bagian tubuh dengan jari atau alat dan kemudian mendengarkan resonansi untuk menguji ketahanannya.
- 4) Auskultasi, adalah pemeriksaan fisik dengan mendengarkan suara yang dihasilkan oleh proses fisiologi atau patologis dalam tubuh, biasanya menggunakan stetoskop.

c. Pemeriksaan penunjang/tambahan

Pemeriksaan penunjang adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk suatu indikasi tertentu guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap. Pemeriksaan penunjang untuk kista ovarium yaitu sebagai berikut:

- 1) Laparaskopi: untuk menentukan asal dan sifat tumor, apakah tumor itu berasal dari ovarium dan apakah jenis tumornya jinak atau ganas.
- 2) Pemeriksaan USG (USG): untuk menentukan letak, batas, dan permukaan tumor dari perut atau vagina, tentukan apakah tumor berasal dari ovarium, rahim, atau kandung kemih, dan apakah tumor kistik atau padat. Ultrasonografi kista ovarium menunjukkan struktur kistik yang sangat ekolusen, melingkar (kadang-kadang oval) dengan dinding tipis/kera/licin, dan batas posterior kista lebih besar dari dinding anterior. White echo, kista ini memiliki ruang tunggal (tanpa septum) atau banyak ruang (septum-septum). Karena komponen darah di dalam kista.
- 3) Foto rontgen: Menentukan adanya hidrotoraks dengan atau tanpa cairan abnormal di dada, seperti gigi pada tumor.
- 4) Tes penanda tumor: Tes petanda tumor (tumor marker) CA 125 adalah protein dengan kadar yang sangat tinggi dalam sel tumor, terutama kanker ovarium. Sel-sel ini kemudian diproduksi oleh sel-sel jinak sebagai respon terhadap keganasan.

7. Komplikasi Kista Ovarium

Menurut Wiknjosastro (2016), komplikasi berikut dapat terjadi pada kista ovarium diantaranya:

a) Karena perkembangan kista ovarium

Tumor di perut bagian bawah dapat menyebabkan perut membesar. Tekanan pada organ disekitarnya disebabkan oleh ukuran atau lokasi kista dalam perut. Kista besar dalam perut dapat menyebabkan rasa penuh/berat dalam perut, jika tumor menekan kandung kemih akan menyebabkan masalah buang air kecil.

b) Karena komplikasi kista ovarium

1) Pendarahan ke dalam kista

Karena biasanya berkembang secara bertahap, kista berangsur-angsur membesar, memperbesar luka, dan menimbulkan gejala klinis yang minimal. Namun, jika terjadi pendarahan hebat, kista bisa tumbuh dengan cepat dan mengakibatkan sakit perut.

2) Torsi

Torsi (melilit) mempengaruhi ovarium, tuba falopii, atau ligamentum rotundum pada uterus. Peristiwa ini dapat menyebabkan infark, peritonitis, dan kematian. Torsi biasanya unilateral dan dapat berhubungan dengan kista atau kanker, TAO, atau massa yang tidak melekat, atau dapat terjadi pada ovarium normal. Kejadian torsi ini paling sering terlihat pada wanita usia subur. Gejala termasuk tiba-tiba,

sakit hebat diperut bagian bawah, mual dan muntah. Masa nyeri tekan terlihat di sisi yang terkena. Demam dan leukositosis dapat terjadi. Laparoskopi adalah pengobatan pilihan, adneksa dilepaskan (dipelintir), viabilitas dinilai, dan adneksa gangrene dihilangkan. Kista yang ada juga diangkat dan dievaluasi secara histologi.

3) Infeksi kista

Jika terjadi di dekat kista, terdapat sumber kuman patogen.

4) Ruptur

Pecahnya kista folikel akan menyebabkan nyeri akut jangka pendek. pecahnya kista korpus luteum yang sangat vaskularisasi dapat menyebabkan perdarahan yang mengancam jiwa. Nyeri akut tidak dapat dibedakan dari ruptur kehamilan ektopik, tetapi HCG serum negatif. Nyeri panggul difus dikonfirmasi pada pemeriksaan panggul dan sering unilateral pada sisi yang terkena. Ultrasonografi dapat dilakukan untuk memastikan diagnosis dan mendeteksi massa adekna kistik kompleks dengan cairan bebas di sekum. Mendeteksi adanya kehamilan intrauterin dan mengurangi kemungkinan kehamilan ektopik. Operasi pengangkatan kista diperlukan jika pasien secara hemodinamik tidak stabil atau diagnosis tidak pasti. Jika masa kehamilan kurang dari 12 minggu, korpus luteum harus diangkat. Kehamilan dipertahankan dengan suplementasi progesteron.

5) Perubahan keganasan

Setelah dilakukan eksisi kista, pemeriksaan mikroskopis dilakukan untuk kemungkinan perubahan keganasan. Karena kista ovarium berkembang setelah menopause, cenderung menjadi kanker (maligna). Faktor-faktor ini membuat pemeriksaan pelvik sangat penting.

8. Cara Pencegahan Kista Ovarium

Menurut Nugroho (2014), cara pencegahan penyakit kista adalah:

- a) Perbanyak konsumsi sayur dan buah, yang banyak mengandung vitamin dan mineral yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh.
- b) Pertahankan pola hidup sehat, terutama hindari merokok dan berolahraga.
- c) Jaga kebersihan area sekitar wanita untuk mencegah infeksi dari mikroba dan bakteri sekitarnya.
- d) Kurangi makanan berlemak tinggi. Makan makanan berlemak tinggi pada semua individu dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon, terutama hormon stres kortisol, dan obesitas.
- e) Gunakan kontrasepsi oral dan yang mengandung adanya hormon progesteron untuk meminimalisir risiko terjadinya kista karena dapat mengganggu produksi ovum.

9. Penatalaksanaan Kista Ovarium

a) Observasi/pemantauan

Kebanyakan kista ovarium biasanya membentuk kista fungsional dimana telur dilepaskan dari ovarium pada setiap ovulasi dan kantung residu terbentuk untuk menempatkan telur. Kista ini biasanya menyusut dengan sendirinya setelah 1 hingga 3 bulan. Oleh karena itu, dokter merekomendasikan konsultasi lanjutan setelah 3 bulan untuk memastikan bahwa kista benar-benar telah menyusut (Yatim, 2014).

b) Pemberian hormon

Mengobati gejala hormon hiperandrogenik dengan pemberian obat pil antiandrogen (kombinasi estrogen-progesteron) dapat ditambahkan antiandrogen progesterone cyproterone acetat (Yatim, 2014).

c) Perawatan bedah atau pembedahan

Metode ini harus mempertimbangan usia pasien, gejala, dan ukuran kista. Kista fungsional dan wanita yang sedang menstruasi biasanya tidak menjalani operasi. Namun, jika hasil USG menunjukkan bahwa kista tersebut berukuran besar dan bukan merupakan kista fungsional, biasanya dokter menyarankan operasi pengangkatan kista. Jika dokter menemukan kista, kanker ovarium jarang berkembang, namun dokter sering mengangkat kista dengan pembedahan. Namun wanita berusia 50 dan 70 memiliki risiko lebih tinggi terjadi kanker. Menurut Yatim 2014, prinsip pengobatan kista adalah sebagai berikut:

- 1) Jika kista kecil (misalnya, seukuran permen) dan pemeriksaan sonogram tidak menunjukkan tanda-tanda proses ganas, dokter biasanya melakukan kistektomi per laparoskopi. Dengan demikian, laparoskopi dimasukkan ke dalam rongga panggul dengan membuat sayatan kecil di dinding perut, dengan sayatan searah rambut kemaluan.
- 2) Jika kista sangat besar, pengangkatan kista biasanya dilakukan dengan laparotomi. Teknik ini dilakukan dengan anestesi umum. Kista dapat diperiksa untuk proses ganas dengan laparotomi, operasi untuk pengangkatan ovarium dan saluran tuba dan jaringan lemak serta kelenjar getah bening di sekitarnya.

Adapun metode operasi kista adalah sebagai berikut:

- a) Laparaskopi dilakukan dengan anestesi umum. Sayatan di dinding perut sekitar 1 cm. Laparaskopi memungkinkan untuk melihat kedua bagian rongga perut dan bagian anterior rongga panggul. Dengan menggunakan kombinasi alat insisi (koagulator), bedah listrik, USG, operasi ultrasound atau penggunaan sinar laser, fibroid diangkat dan dinding rahim kaya akan vaskularisasi untuk mencegah perdarahan.

Untuk mengatasi komplikasi di perlukan teknik khusus. (Yatim, 2014).

- b) Laparotomi adalah operasi yang dilakukan dimana lapisan perut dibuka. Laparotomi merupakan salah satu jenis operasi di rahim, operasi pada saluran tuba, dan operasi pada ovarium.
- c) Oovarietomi adalah pengangkatan ovarium.

d) Histerektomi

Histerrektomi ialah prosedur pilihan diangkatnya rahim. Histerektomi dapat dilakukan secara abdomen atau pervaginam. Yang terakhir jarang dilakukan karena rahim harus lebih kecil dari telur angsa dan tidak ada perlekatan di sekitar, dengan adanya prolaps uteri memfasilitasi intervensi bedah. Untuk mencegah kanker serviks, histerektomi total biasa dilakukan. Histerektomi supravaginal dilakukan hanya jika secara teknis sulit untuk mengangkat rahim secara keseluruhan. (Prawirohardjo, 2016)

Berdasarkan pembahasan tersebut tentang kista ovarium, cara menghilangkan kista yaitu: laparaskopi, laparotomi, ooforektomi, dan histerektomi. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menegaskan yaitu satu penyakit tidak di turunkan oleh Allah kecuali dia menurunkan obatnya. Rasulullah SAW berkata kepada orang arab Badui yang bertanya kepadanya, yang artinya: “sesungguhnya Allah tidak menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.” (HR. Ahmad Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadis ini dalam Zawa'id-nya. (takhrij Al-arnauth atas zadul ma'ad, 4/12-13).

Sebagaimana dalam surat Al-Isra'/17:82 Allah menerangkan bahwasanya Ia menurunkan Al-Qur'an yang didalamnya terdapat obat bagi berbagai penyakit.

﴿٨٢﴾ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar (obat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian“ (Kementerian Agama, 2019)

Secara umum, ayat-ayat di atas berarti, “Al-Qur'an merupakan rahmat bagi orang-orang beriman sebagaimana Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat penawar keraguan dan penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka.”

Kata شِفَاءٌ *syifa'* biasanya berarti kesembuhan atau obat, dan juga digunakan untuk arti pembebasan dari kekurangan atau tidak berbahaya dalam memperoleh manfaat. Menurut Thabathaba'i hal ini mengungkapkan bahwa Al-Qur'an memiliki kegunaan untuk obat penawar berbagai penyakit jiwa yang pada manusia, terkhusus pada orang yang beriman. Tanggapan ini bertolak belakang dengan tanggapan sebagian ulama yang mengartikan bahwasanya ayat Al-Qur'an juga dapat menyembuhkan penyakit fisik. Mereka merujuk pada banyak riwayat yang diperdebatkan nilai dan

maknanya, termasuk riwayat oleh Ibn Mardawaih melalui sahabat Nabi Saw Ibn Mas'ud ra, bahwa nabi menyuruh seorang yang dadanya sedang sakit untuk membaca Al-Qur'an. (M. Quraish Shihab, 2012)

Menurut Quraish Shihab, jika hadis ini benar riwayatnya tidak menunjukkan pada penyakit fisik, tetapi penyakit mental/jiwa yang menyerang tubuh, atau yang biasa disebut penyakit psikosomatis. Tidak jarang merasa sesak nafas atau dada tertekan karena ketidakseimbangan mental. (M. Quraish Shihab, 2012)

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sayyid Thanthawi, seorang sufi besar bernama Al-Hasan Al-Bsri, berdasarkan riwayat Abu Ash Sheikh, mengatakan: "*Allah jadikan Al-Qur'an sebagai obat terhadap penyakit hati, dan tidak menjadikannya obat untuk penyakit jasmani.*" (M. Quraish Shihab: 2012).

Thabathaba'i memahami fungsi Al-Qur'an sebagai obat dalam menghilangkan berbagai keraguan, pertanyaan dan alasan bahwa bukti yang disajikan dapat menembus hati beberapa orang. Inilah sebabnya mengapa Al-Qur'an dicirikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Singkatnya Al-Qur'an anugrah yang kaya akan kebajikan dan berkah yang ditawarkan oleh Allah SWT bagi mereka yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang ditentukan didalamnya. (M. Quraisy Shihab 2012).

Al-Qur'an dengan demikian mengandung penawar dan rahmat bagi ketakutan manusia. Bagi seseorang untuk hidup bahagia, untuk jiwa yang sehat dan agar orang terhindar dari rasa takut dan kecemasan. (M. Quraisy Shihab 2012)

Berdasarkan penjelasan dari hadits dan ayat Al-Qur'an di atas dapat disimpulkan tidak semua penyakit diturunkan oleh Allah, kecuali Allah yang menurunkan obatnya dan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penawar penyakit jiwa yang diderita oleh orang-orang sehingga terciptanya keadaan fisik yang tenang, keadaan aman, damai dan rileks.

Sebagaimana pada pasien perimenopause dengan kista ovarium akan mengalami kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan dengan kondisi yang dialaminya, mendengarkan murrotal Al-Qur'an bisa merangsang gelombang delta yang dapat membuat pendengar merasakan tenang dan damai. Selain itu, mendengarkan murrotal Al-Qur'an mengurangi hormon stres dan mengaktifkan endorfin alami, membuat orang merasa lebih tenang, meminimalkan rasa takut, dan cemas, serta bertambahnya biokimiawi tubuh dengan mengurangi tekanan darah, pernapasan, detak jantung, denyut nadi, dan kegiatan gelombang otak.

10. Perawatan *Pre Operasi* dan *Post Operasi*

Persiapan pasien sebelum operasi (pre operasi) antara lain: persiapan kondisi fisik, mental, yang merupakan hal yang sangat penting dalam

mengurangi faktor risiko yang disebabkan oleh pembedahan. (Sjamsuhidajat, Prasetyono, dan Riwanto, 2017).

1) Siap fisik

Salah satu asuhan yang dilakukan pada pasien sebelum operasi adalah pasien dalam kondisi baik, cairan dan elektrolit yang seimbang, kebutuhan nutrisi, tidak makan dan minum (puasa), kebersihan diri atau personal hygiene, dan kandung kemih dalam keadaan kosong.

2) Siap mental

Dalam menghadapi operasi pasien akan merasa kecemasan dan khawatir terhadap suntikan, nyeri luka, anestesi, atau bahkan kemungkinan terjadi kecacatan dan kematian. Oleh karena itu dibutuhkan persiapan mental untuk pasien, dukungan dan motivasi dari keluarga dan juga tim kesehatan membantu dalam kesembuhan dan kesiapan klien untuk menghadapi tindakan pembedahan.

Perawatan yang akan diberikan pada pasien sesudah operasi (post operasi) menurut Johnson (2016) adalah sebagai berikut:

a. Merawat luka insisi sesudah tindakan operasi (post operasi)

Dapun prinsip yang harus diterapkan yaitu:

- 1) Balutan luka operasi bisa dibuka di hari pertama setelah pembedahan.
- 2) Luka operasi harus di periksa pasca pembedahan hingga pasien dipersilahkan untuk pulang.

- 3) Balutan luka operasi yang basah atau mengeluarkan cairan di segerakan untuk diganti.
- 4) Pembalutan luka operasi diberikan dengan teknik aseptik.

b. Berikan cairan

Setelah operasi pasien di haruskan untuk berpuasa 24 jam pertama, oleh karena itu cairan infus yang mengandung elektrolit harus di berikan cukup banyak sehingga tidak terjadi gejala hipotermia, dehidrasi, dan masalah pada organ lain. Biasanya jumlah tetesan tergantung dengan kondisi dan juga kebutuhan pasien, yang dimana cairan dekstro yang diperlukan sekitar 5-10%, garam fisiologis, dan ringer laktat (RL) secara bergantian, dan biasanya sekitar 20 tetes/menit. Berikan transfusi darah atau pocked cell sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi kadar hemoglobin darah rendah.

c. Rasa nyeri

Nyeri yang timbul dirasakan pada daerah operasi dalam waktu 24 jam pertama, obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit dan penenang perlu diberikan diantaranya pemberian suntik intramuskuler (IM) pethidin dosis 100 hingga 150 mg atau morpin 10 hingga 15 mg atau dengan per infus dan obatan lainnya.

d. Pergerakan/pemindahan posisi (mobilisasi)

Mobilisasi adalah suatau kegiatan atau pergerakan atau perpindahan posisi yang dilakukan pasien setelah beberapa jam setelah operasi, agar

dapat membantu dalam penyembuhan klien. Misalnya seperti bergerak miring kiri dan kanan yang dimulai pada 6 dan 10 jam pertama setelah pasien sadar dari pembedahan. Latihan nafas yang dilakukan sedini mungkin dengan tidur terlentang setelah sadar, di hari kedua klien bisa melakukan latihan duduk sekitar 5 menit dengan menarik nafas dalam. selanjutnya posisi tidur diubah jadi setengah duduk atau semi fowler secara berturut-turut, begitupun hari selanjutnya klien dianjurkan belajar duduk dalam sehari, belajar jalan dan berjalan sendiri di hari ketiga sampai kelima sesudah operasi.

e. Pemasangan kateter

Pemasangan kateter bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan pada klien dan sara nyeri akibat kandung kemih yang penuh. Dengan demikian pemasangan kateter (balon kateter) sangat diperlukan sekitar 24 atau 48 jam bahkan lebih lama sesuai dengan jenis operasi yang dilakukan. Dengan metode ini urine bisa ditampung dan diukur dengan kantong plastik secara periodik

f. Memberikan Obat

Obat adalah suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, memperelok badan manusia (Anief, 2010). Besarnya efektifitas obat tergantung biosis dan kepekaan

organ tubuh. Setiap orang berbeda kepekaan dan kebutuhan dosis obatnya. Tetapi secara umum dapat dikelompokkan, yaitu dosis bayi, anak-anak, dewasa dan orang tua (Djas 2015, dalam Kasibu 2017).

1. Cefotaxim adalah obat antibiotik untuk mengobati berbagai macam penyakit infeksi bakteri. Cefotaxim termasuk dalam golongan antibiotik sefalosporin yang bekerja dengan cara membunuh bakteri dan menghambat pertumbuhannya, cefotaxim juga bisa mencegah infeksi pada luka operasi.
2. Metrinidazole antibiotik untuk menangani penyakit infeksi bakteri, seperti bakteri vaginosis, penyakit menular seksual, atau infeksi organ atau jaringan perut, termasuk peritonitis. Selain itu obat ini juga bisa digunakan untuk menangani infeksi parasit tertentu, seperti trikomoniasis atau amebiasis. Dosis dan lama penggunaan metrinidazole akan ditentukan oleh dokter sesuai bentuk obat, jenis infeksi, serta kondisi kesehatan dan usia pasien.
3. Ketorolak adalah obat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat. Obat ini sering digunakan setelah operasi atau prosedur medis yang bisa menyebabkan nyeri.
4. Ranitidin adalah obat yang digunakan untuk mengobatigejala atau produksi asam lambung berlebih. Beberapa kondisi yang dapat ditangani ranitidin adalah tukak lambung, penyakit maag, penyakit asam lambung (GERD), dan sindrom Zollinger-Ellison.

5. Asam sulfatferosus adalah suplemen zat besi yang digunakan untuk mengobati atau mencegah kekurangan kadar zat besi.
6. Cefadroxil adalah obat antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri di tenggorokan, tonsil, kulit, atau saluran kemih. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pencegahan infeksi jantung sebelum dilakukan operasi gigi atau tindakan medis tertentu.
7. Meloxicam merupakan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri dan gejala radang pada beberapa kondisi. Obat ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat kimia yang akan menyebabkan munculnya tanda dan gejala radang, ermasuk bengkak dan nyeri, saat tubuh mengalami cedera.
8. Asam mefenamat adalah obat untuk meredakan nyeri. Obat ini bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam pembentukan prostaglandin. Prostaglandin akan memicu munculnya gejala dan tanda radang saat tubuh mengalami cedera atau luka.
9. Vornero tab adalah suplemen yang mengandung asam folat dan vitamin. Suplemen ini digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin B1, B6, B12, vitamin E, dan asam folat.
10. Tablet penambah darah merupakan tablet salut gula yang mengandung zat besi dan asam folat. Penggunaan antibiotik yang senbarangan atau tidak tepat penakarannya dapat menggagalkan pengobatan dan dapat menimbulkan bahaya, seperti sensitasi,

resistensi, dan suprainfeksi. Setelah digunakan secara topikal, banyak obat dapat menimbulkan kepekaan berlebihan atau sensitasi, pemakai menjadi hipersensitif. Bila kemudian obat yang sama digunakan secara sistemis, misalnya melalui oral atau parental, maka ada kemungkinan terjadinya suatu reaksi alergi. Gejalanya berupa gatal-gatal, kemerahan, bintol-bintol, tetapi kadang-kadang juga lebih hebat, seperti demam, kelainan darah, bahkan syok anafilaksis fatal.

g. Perawatan yang rutin

Hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran antara lain:

- 1) TTV, diantaranya: tekanan darah (TD), nadi, pernafasan, dan suhu.
- 2) Jumlah cairan yang masuk dan keluar.
- 3) Pemeriksaan lainnya sesuai jenis operasi dan kasus klien.

C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan Helen Varney mendefinisikan pemikiran dan perilaku yang berdasarkan ilmu pengetahuan, temuan, dan keterampilan, urutan logis dan perilaku asuhan dan logika untuk pengambilan keputusan yang relevan dengan klien yang dituju. Proses yang digunakan sebagai metode pengorganisasian ke dalam tahapan-tahapan yang logis.

1. Menurut Helen Varney proses manajemen kebidanan,terdapat 7 langkah yaitu:

a. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Dilakukannya pengumpulan data informasi klien yang didapatkan dari berbagai macam sumber yang diharap dapat memberi penjelasan yang tepat dan benar. Adapun data secara garis besar dibagi atas data subjektif dan objektif. Data subjektif didasarkan atas riwayat medis dan anamnesa pasien (identitasnya pasien, riwayat hamil terakhir, riwayat haid, riwayat keluarga berencana, riwayat kesehatan masa lalu atau pasca kelahiran, riwayat medis yang lalu dan saat ini, riwayat ekonomi, psikologi dan spiritual). Data objektif menggambarkan dokumentasi yang sudah dilakukan pada pasien yang meliputi pemeriksaan penunjang laboratorium), TTV, periksa fisik terfokus dengan cara inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi.

Pada kasus perimenopause dengan kista ovarium saat dilakukan anamnesa ibu mengatakan merasa nyeri pada pelvis serta sedikit rasa gatal, rasa nyeri sewaktu berhubungan, rasa nyeri saat menstruasi, dan terasa berat dibagian bawah, serta selalu BAK dan BAB.

Dalam pemeriksaan fisik pasien didapatkan abdomen terlihat buncit dan sebagian abdomen ibu terlihat membesar, dari pemeriksaan palpasi didapatkan adanya benjolan yang keras di badomen bagian bawah dan teraba tumor atau kista di perut. Pada pemeriksaan penunjang meliputi Laparaskopi, Ultrasonografi (USG) dan pemeriksaan laboratorium.

Dengan beberapa kriteria pasien: Usia $\leq 40-50$ tahun, riwayat pola makan yang buruk, riwayat pendidikan yang rendah, riwayat sosil ekonomi rendah, riwayat reproduksi, riwayat kesehatan keluarga, dan pasien rawat inap.

b. Langkah II: Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Melakukan identifikasi diagnosa atau masalah dalam kebutuhan pasien sesuai dengan interpretasi data yang dikumpulkan. Adapun data dasar yang didapatkan diinterpretasikan untuk menemukan masalah dan diagnosa tertentu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang yaitu laparaskopi ditemukan asal tumor atau kista dari indung telur dan apakah tumor atau kista itu jinak/ganas, pada pemeriksaan USG tumor atau kista itu berasal dari ovarium, dilihat sebagai bentuk kistik bulat (kadang oval), echolucent dilihat dengan adanya dinding tipis/tegas/licin, terlihat bintik-bintik echo dari dinding depannya lebih putih. Sedangkan pada pemeriksaan darah ditujukan untuk mencari adanya protein yang disebut CA-125 yang dimana konsentrasi protein tersebut terhadap sel tumor atau kista terkhusus kanker indung telur.

Berdasarkan analisis hasil pemeriksaan penunjang tersebut, diagnosa kebidanan yang dapat ditegakkan ialah: pasien perimenopause dengan kista ovarium.

c. Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Selanjutnya mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial berdasarkan masalah yang telah didapatkan. Tahap ini memerlukan estimasi dan pencegahanyang dilakukan jika memungkinkan, sementara memantau pasien bidan bersiap jika terjadi diagnosa atau masalah potensial.

Pada perimenopause dengan kista ovarium ini perlu dilakukan antisipasi apabila mengalami masalah potensial yaitu torsion, infeksi terhadap tumor, ruptur dan perubahan keganasan yang dimana kemungkinan untuk berubah menjadi kanker (maligna)

d. Langkah IV: Tindakan Segera

Tahap ini tenaga kesehatan dan dokter segera mengidentifikasi yang mungkin dapat terjadi sehingga dilakukannya kerjasama atau kolaborasi dan tindakan sesegera mungkin bersama tim medis berdasarkan keadaan pasien.

Kasus kista ovarium pada perimenopause antisipasi yang dilakukan adalah bekerjasama dengan dokter bedah, apabila pasien mendadak mengalami nyeri hebat di perut bagian bawah, mual dan muntah, demam, terjadi leukositosis, timbul nyeri yang akut, dan dapat menyebabkan perdarahan yang mengancam jiwa segera dilakukan tindakan.

e. Langkah V: Rencana Tindakan

Tahap ini yaitu membuat rencana asuhan komprehensif, dilakukan berdasarkan langkah sebelumnya. Ini adalah perkembangan yang didapatkan dari masalah atau diagnosa yang sedang terjadi atau terestimasi,

termasuk juga dalam pengumpulan tambahan informasi dan data dasar yang tertinggal.

Kasus kista ovarium pada perimenopause rencana asuhan yang akan diberikan, adalah: sebelum operasi meliputi; siap fisik: dilakukan perawatan seperti pemeriksaan keadaan umum pasien, cairan dan elektrolit yang seimbang, pemenuhan nutrisi, kebersihan diri, dan kandung kemih dalam keadaan kosong. siap mental; dalam menghadapi operasi pasien harus siap mental, dikarenakan pasien akan merasa cemas dan khawatir dengan penyuntikan, rasa nyeri, anestesi, dan juga kemungkinan terjadi kecacatan atau kematian. Memberikan support dan dukungan serta selalu memberi semangat dari pihak keluarga maupun tenaga kesehatan dapat membantu ibu dalam menghadapi kondisinya; sedangkan post operasi meliputi; Perawatan luka insisi/post operasi, pemberian cairan dapat mengatasi terjadinya hipotermia, dehidrasi, dan juga masalah pada organ lain, Mobilisasi (miringkan tubuh ke kanan dan kiri, latihan pernafasan, latihan duduk atau latihan jalan), kateterisasi, pemberian obat-obatan, perawatan rutin meliputi pemeriksaan tekanan darah (TD), nadi, pernafasan, dan suhu, penentuan jumlah cairan yang masuk dan yang keluar serta pemeriksaan lain berdasarkan metode operasi dan kasus itu sendiri.

f. Langkah VI: Implementasi Asuhan kebidanan

Melakukan prosedur perencanaan, secara tepat dan keamanan pasien, pelaksanaannya dapat dilakukan bidan atau berkolaborasi bersama tenaga

medis lainnya. Seorang bidan perlu menetapkan prosedur yang tepat untuk pengurangan waktu pengobatan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pada pasien.

Pada tahap ini keseluruhan asuhan telah ditetapkan di langkah ke lima dilakukan dengan tepat dan benar. Keseluruhan dapat dilaksanakan bidan dan jga pasien sendiri serta anggota medis lainnya. Walaupun bidan tidak melaksanakan sendiri tetapi ia tetap bertanggung jawab dalam terarahnya pelaksanaan, (seperti memastikan semua langkah telah benar dilakukan).

g. Langkah VII: Evaluasi

Merupakan tahap akhir untuk menilai ketepatan pemberian dari perencanaan yang meliputi terpenuhinya akan bantuan berdasarkan masalah dan diagnosa yang ada.

pengevaluasian keefektifitasan dalam pemberian asuhan yaitu apakah kebutuhan dipenuhi, dan pemenuhan kebutuhan benar terpenuhi, nyeri berkurang, dan keadaan umum ibu baik berdasarkan kebutuhan yang telah diketahui pada masalah atau diagnosa.

D. Pendokumentasian SOAP

Varney mengatakan pola pikir bidan saat menghadapi klien saat berhadapan klien mencakup 7 langkah untuk diketahui orang lain mengetahui apa yang telah dilakukan oleh bidan melalui proses pemikiran yang sistematis.

a. *Subyektif (S)*

Mendokumentasikan hasil pendataan berdasarkan anamnesa atau tanya jawab.

b. *Obyektif (O)*

Hasil pendokumentasian pemeriksaan fisik klien (Keadaan umum, kesadaran, tanda vital, pemeriksaan fisik), hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan diagnostik lainnya untuk merumuskan fokus data untuk mendukung asuhan.

c. *Assessment (A)*

Mendokumentasikan hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif.

a. Mendiagnosis masalah.

b. Mengantisipasi potensi diagnosis/masalah.

c. Tindakan cepat.

d. *Planning (P)*

Mendokumentasikan tindakan dan hasil evaluasi perencanaan sesuai dengan *assessment*.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
02 AGUSTUS-24 AGUSTUS 2022

No Register : 336xxx
Tanggal Masuk Rumah Sakit : 02-08-2022 pukul : 08.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 02-08-2022 pukul : 08.35 WITA
Tanggal Operasi : 03-08-2022 pukul : 08.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

A. Langkah I (Identifikasi Data Dasar)

1. Identitas

Nama : Ny “A”/Tn “K”
Umur : 48 tahun /50 tahun
Nikah/ Lamanya : 1x/± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/SMK
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

2. Keluhan utama

Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah dan tidak mengalami haid tiap 4 bulan

3. Riwayat keluhan utama

Ibu mengatakan timbul keluhan nyeri perut bagian bawah dan perut terasa penuh dirasakan sejak 1 minggu yang lalu lama keluhan yang dirasakan ibu ± 15 menit tiap harinya, sifat keluhan yang dirasakan sering hilang dan timbul sehingga sangat mengganggu aktifitas ibu sehari-hari.

4. Riwayat Kesehatan Yang Lalu

- a. Tidak ada riwayat penyakit menular seperti Heptitis B, TBC, dan HIV/AIDS
- b. Tidak ada riwayat penyakit menurun seperti Jantung, DM, Hipertensi dan kista
- c. Tidak ada riwayat penyakit alergi terhadap makanan maupun obat-obatan

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

Dari pihak ibu maupun bapak (orang tua) tidak ada riwayat penyakit keturunan seperti Jantung, DM, Hipertensi dan Kista

6. Riwayat Reproduksi

a. Riwayat Menstruasi

- 1) Menarche : 14 tahun
- 2) Siklus Haid : 28-35 hari
- 3) Lamanya : 5-7 hari
- 4) Banyaknya : 4-5 kali ganti pembalut dalam sehari
- 5) Teratur/tidak teratur : Ibu mengatakan haidnya tidak teratur sejak menggunakan kontrasepsi

6) Sifat darah : Ibu mengatakan kadang encer dan kadang menggumpal

7) Dismenorhea : ibu mengatakan mengalami nyeri yang hebat

7. Riwayat Obstetri

Kehamilan, Persalinan, dan Nifas yang lalu

Hamil ke	Umur kehamilan	Jenis persalinan	Penolong	Jenis kelamin	Bb lahir	Nifas	
						Laktasi	Komplikasi
1.	Aterm	Normal	Dukun	Perempuan	-	Asi	-
2.	Aterm	Normal	Dukun	Laki-laki	-	Asi	-

8. Riwayat KB

Ibu mengatakan pernah menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan sejak 1 tahun yang lalu

9. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan

a. Nutrisi

Ibu mengatakan sering mengkonsumsi makanan instan atau junkfood seperti bakso, mie instan, gorengan dan lain sebagainya

Sebelum Sakit

Makan : 3 x sehari

Porsi : 1 piring

Keluhan : tidak ada

Minum : 4-8 gelas

Jenis : air putih, teh

Keluhan : tidak ada

Selama Sakit

Makan : 3 x sehari
 Porsi : 1 piring
 Keluhan : nyeri perut bagian bawah
 Minum : 4-8 gelas
 Jenis : air putih, the
 Keluhan : tidak ada

b. Eliminasi

BAB : 1 x sehari
 Konsistensi : lembek
 Warna : kuning kecoklatan
 BAK : 4-6 x sehari
 Warna : kuning jernih

c. Istirahat

Sebelum Sakit

Siang : ± 2 jam
 Malam : ± 8 jam

Selama Sakit

Siang : ± 2 jam
 Malam : ± 7 jam

- d. Aktivitas : Ibu mengatakan melakukan aktivitas sebagai ibu rumah tangga seperti menyapu, mencuci dan mengepel

e. Personal Hygiene

Mandi : 2 x sehari

Sikat Gigi : 2 x sehari

Membersihkan Kelamin : setiap sudah BAK dan BAB dan setiap kali mandi

Mengganti Pakaian Dalam : 2x sehari atau setiap kali basah

f. Data Psikologi

Ibu mengatakan merasa cemas dan takut dengan kondisinya saat ini

g. Data Sosial Budaya

Ibu mengatakan tidak mengikuti adat kebiasaan di daerah tempat tinggalnya yang bisa mengganggu kesehatannya.

h. Ketaatan Beribadah

Ibu mengatakan teratur menjalankan sholat lima waktu

i. Data Ekonomi

Penghasilan keluarga cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya rumah sakit ditanggung oleh keluarga.

j. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan Umum

Keadaan Umum : Ibu tampak lemah dan cemas

Kesadaran : Composmentis

Berat badan : 52 cm

Tinggi badan : 150 cm

Tanda-tanda Vital

Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Pernapasan : 20x / menit

Nadi : 80x / menit

Suhu : 36,7°c

2. Pemeriksaan Head to toe terfokus

a. Wajah

Tampak pucat, tidak ada oedema dan nyeri tekan

b. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kanan bawah perut ibu, dan adanya nyeri tekan.

3. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan Laboratorium

Hasil: Hemoglobin : 12,8 gr %

b. Rontgen

Tanggal : 02 agustus 2022

Jenis : Rontgen Thorax

Kesan : Dalam batas normal

c. Pemeriksaan USG oleh dr "S"

Tanggal : 02 agustus 2022

Hasil : Tampak massa Kista ukuran +/- 2,5x2,5x2,5 cm

Pemeriksaan CA-125 (Normal : ≥ 35 U/ mL)

Hasil : CA-125 → 34,26 U/mL yang berarti tidak ada keganasan pada ovarium

B. Langkah II (Identifikasi / Masalah Aktual)

1. Diagnosa : Ny “A” dengan Kista Ovarium

Data Subjektif :

Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah dan perut terasa penuh pada bagian kanan bawah perut.

Data Objektif :

- a. Palpasi : Terdapat massa pada bagian bawah sebelah kanan perut ibu.
- b. USG : Terdapat benjolan atau masa pada perut bagian bawah.
- c. Pemeriksaan CA-125 (Normal : ≥ 35 U/ mL)

Hasil : CA-125 → 34,26 U/mL yang berarti tidak ada keganasan pada ovarium

Analisa dan Interpretasi Data :

Adanya nyeri, massa dan benjolan pada bagian bawah perut ibu dan hasil

USG ibu mengalami kista ovarium

2. Masalah Aktual

- a. Nyeri pada perut bagian bawah

Data Subjektif :

- 1) Ibu mengatakan merasa nyeri pada bagian kanan bawah perut.
- 2) Ibu megatakan nyerinya mengganggu aktivitas sehari-hari.

Data Objektif :

- 1) Wajah ibu terlihat menahan sakit dan meringis saat bergerak
- 2) Nyeri tekan pada abdomen

Analisa dan Interpretasi Data:

Salah satu gejala yang dapat disebabkan oleh pertumbuhan kista ovarium adalah rasa sakit atau nyeri di bagian bawah tempat kista terimplementasi. Nyeri yang dirasakan klien dapat disebabkan oleh puntiran batang (torsi), robeknya dinding kista atau infeksi kista sehingga menimbulkan gejala seperti nyeri perut, nyeri tekan pada perut dan gangguan aktivitas sehari-hari, tetapi keadaan umum dari pasien cukup baik kecuali sakitnya (Manuaba, 2016).

b. Kecemasan

Data Subjektif

- 1) Ibu mengatakan merasa tidak nyaman dan merasa cemas dengan kondisinya sekarang
- 2) Ibu sering menanyakan tentang keadaanya

Data Objektif

- 1) Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat ditekan pada daerah perut
- 2) Wajah ibu terlihat menahan sakit dan cemas

Analisa dan Interpretasi data

Adanya benjolan atau kista di perut mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan pasien dan memberikan dukungan emosional untuk membantu rasa sakitnya hilang setelah dilakukannya operasi.

Kurangnya pengetahuan tentang kondisinya menyebabkan kecemasan, yang merangsang hipotalamus memproduksi hormon adrenalin dan kurangnya pengetahuan dan informasi tentang kista ovarium dapat mengganggu mekanisme coping pasien dalam menghadapi kondisi tersebut. Pasien wanita yang mengalami kista ovarium mempengaruhi keadaan mental klien akibat rasa sakit dan nyeri yang dialami, ketidakmampuan untuk mengatasinya dan menimbulkan rasa cemas terhadap kondisinya (Corvin, 2015).

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa / Masalah Potensial)

1. Masalah Potensial : Perdarahan intra tumor, putaran tangkai/torsi, infeksi pada tumor, ruptur, dan perubahan keganasan.

Data Subjektif

1. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah
2. Ibu mengatakan nyeri pada perut saat ditekan

Data Objektif

Ekspresi wajah ibu tampak meringis saat bergerak

Analisa dan Interpretasi Data:

Nyeri pertama yang dirasakan biasanya berupa benjolan pada perut bagian bawah yang melekat erat pada jaringan disekitarnya akibat terpuntirnya kista, dan pasien mengeluh nyeri yang sangat hebat. (Yatim, 2014).

Jika kista ovarium tidak ditangani secara cermat diperiksa dan dipantau sesegera mungkin, kista ovarium ini dapat menyebabkan banyak masalah meliputi pecahnya kista ovarium dengan perdarahan akut dan mengakibatkan pendarahan bebas bisa terus menerus berlangsung ke dalam rongga peritoneum yang terus menimbulkan rasa sakit disertai tanda abdomen akut. Kista ovarium sendiri dapat berubah kearah ganas yang dapat menyebabkan kematian pada penderitanya dikarenakan penyakit kista ovarium disebut jug dengan silent killer (secara diam-diam dapat menyebabkan kematian). Banyak perempuan yang tidak mengetahui bahwa sudah terkena kista dan menyadari apabila kista sudah teraba dan menjadi bedar. (Prawirohardjo,2016).

D. Langkah IV (Tindakan Segera)

Kolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk operasi dan pengobatan

E. Langkah V (Rencana Tindakan)

Diagnosa aktual : Ny "A" dengan Kista Ovarium

Masalah aktual : Nyeri pada perut bagian bawah kanan dan merasa cemas

Tujuan:

1. KU klien membaik
2. Rasa nyeri pada abdomen berkurang atau teratasi dengan tindakan pengangkatan kista ovarium
3. Kecemasan Teratasi
4. Tidak terjadi komplikasi dan keganasan

Kriteria :

1. KU pasien membaik
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - a. Tekanan darah
 - Sistolik : 90-130 mmHg
 - Diastolik : 60-90 mmHg
 - Nadi : 70-90 x / menit
 - Pernafasan : 16-24 x / menit
 - Suhu : 36,5°C – 37,5°C
3. Ibu tidak merasakan nyeri pada abdomen
4. Ekspresi wajah pasien menjadi tenang dan ceria
5. Ibu tegar menghadapi operasi dan sudah siap

Intervensi tanggal 02 agustus 2022

Pukul: 08:40 WITA

1. Jelaskan pada ibu dan keluarga tentang kondisi serta penyakitnya

Rasional: Penjelasan keadaan pasien akan membantu pasien untuk mengetahui/mengenalinya serta dapat mengurangi kecemasan.

2. Berikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor penyebab terjadinya kista ovarium pada ibu yaitu gangguan hormonal, faktor umur, gaya hidup yang tidak sehat seperti terpapar dengan asap rokok dan mengkonsumsi makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dan lain sebagainya.

Rasional: Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kista ovarium.

3. Jelaskan pada ibu tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter untuk tindakan pengobatan dan operasi.

Rasional: Agar ibu dan keluarga mengerti dan mau bekerja sama dengan petugas serta dapat mengambil keputusan terhadap tindakan yang akan dilakukan.

4. Lakukan *informed consent* pada ibu dan keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan

Rasional: Informed consent penting untuk membantu melancarkan tindakan medis, mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi, mempercepat pemulihan dan penyembuhan penyakit, meningkatkan mutu

pelayanan serta melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tuntutan hukum.

5. Observasi KU pasien dan Tanda-tanda Vital sesuai permintaan dokter atau 4 jam sekali bila ditemukan salah satu tanda vital yang tidak normal atau 5-15 menit bila ditemukan tanda vital tidak stabil atau beresiko mengalami perubahan fisiologi secara cepat pada klien post operasi

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk menilai kondisi pasien dan untuk menentukan prosedur tindakan yang akan dilakukan.

6. Observasi tetesan infuse RL

Rasional: Infuse RL dapat mengembalikan cairan tubuh yang hilang atau keluar

7. Lakukan klisma

Rasional: Klisma dilakukan untuk membersihkan kolon dan merangsang pengeluaran feses/tinja (BAB) sebelum dilakukan tindakan operasi.

8. Lakukan sceren atau pencukuran rambut pubis

Rasional: Untuk membersihkan dan mempermudah dalam menjalankan proses operasi serta mencegah terjadinya infeksi eksternal

9. Melakukan medikasi luka jahitan post operasi menggunakan balutan kasa steril baru yaitu: membuka heparix yang dibasahi NaCl, membuka kasa yang menutupi luka bekas operasi, luka dibersihkan NaCl, mengeringkan luka dengan kasa steril, mengolesi luka bekas jahitan menggunakan betadine dan

memberikan supratul, dan menutup luka bekas operasi menggunakan kasa steril.

Rasional: untuk menjaga bekas jahitan agar tetap kering dan terhindar dari kotoran

10. Anjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum kecuali air putih mulai jam 00.00 WIB sampai operasi akan dilakukan

Rasional: Untuk mengistirahatkan alat-alat pencernaan dalam tubuh, khususnya lambung dan usus untuk memudahkan dilakukannya tindakan operasi.

11. Berikan support dan motivasi kepada ibu agar ibu yakin akan kesembuhannya

Rasional: Agar ibu merasa diberikan dukungan dan perhatian sehingga mampu menerima keadaanya.

12. Anjurkan pasien dan keluarga untuk senantiasa berdoa dan berdzikir

“*Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wani'mannasir*” yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung” dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an demi kelancaran

proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani pasien serta menghilangkan kecemasan pada saat menjalani operasi, sebagaimana dalam (QS Ar-Rad: 28)

Allah swt berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahan

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang”.

Rasional : Berdoa, berdzikir, dan mendengarkan lantunan ayat suci al-Qur’an dapat membantu pasien lebih sabar dan tegar dengan keadaannya yang dapat membantu proses tindakan yang akan dilakukan, rencana operasi.

F. Langkah VI (Implementasi Asuhan Kebidanan)

Tanggal 02 Agustus 2022

Pukul: 08:40 WITA

1. Menjelaskan kepada pasien dan keluarga tentang keadaannya serta penyakitnya

Hasil: Terlaksana, pasien dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan

2. Memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor penyebab terjadinya kista ovarium yaitu gangguan hormonal, faktor umur, gaya hidup yang tidak sehat seperti terpapar dengan asap rokok, mengkonsumsi makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dan lain sebagainya.

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kista ovarium

3. Menjelaskan pada pasien tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter untuk tindakan Pengobatan dan operasi

Hasil: Terlaksana, pasien serta keluarga sudah siap dan bersedia

4. Melakukan informed consent kepada pasien dan keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan

Hasil: Terlaksana, pasien dan pihak keluarga menyetujui untuk setiap tindakan yang akan dilakukan

5. Mengobservasi infuse RL dengan 28 tpm

Hasil: Terlaksana, infus telah terpasang pada tangan kanan pasien

6. Melakukan pemasangan klisma

Hasil: Telah dilakukan dan pasien bersedia

7. Melakukan sceren atau pencukuran rambut pubis

Hasil: Pasien bersedia dan tindakan pencukuran telah dilakukan

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum kecuali air putih mulai jam 00.00 WIB sampai operasi akan dilakukan

Hasil: pasien bersedia mengikuti setiap instruksi yang telah diberikan oleh petugas kesehatan

9. Memotivasi dan berikan support pada ibu agar ibu yakin akan kesembuhannya

Hasil: Terlaksana, ibu serta keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan pasien dan keluarga untuk senantiasa berdoa dan berdzikir "*Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wani'mannasir*" yang artinya cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung" dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an demi kelancaran proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani pasien serta menghilangkan

kecemasan pada saat menjalani operasi, sebagaimana dalam (QS Ar-Rad: 28) Allah swt berfirman yang artinya “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram”.

Hasil: Terlaksana, ibu dan keluarga merasa bahagia dan tidak cemas lagi dengan keadaannya sekarang

G. Langkah VII (Evaluasi)

Tanggal 02 Agustus 2022

Pukul: 08:40 WITA

1. KU ibu masih lemas
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-tanda Vital

Tekanan Darah	: 130/80 mmHg	Pernafasan	: 20 x/i
Nadi	: 80x/i	Suhu	: 36,7°C
4. Ibu mengatakan nyerinya hilang timbul
5. Ibu tampak cemas

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY "A" DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 02 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 02 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Agustus 2022 Pukul : 08.35 WITA
Tanggal Operasi : 03 Agustus 2022 Pukul : 08.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny "A" / Tn "K"
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/ SMK
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri pada perut bagian bawah
2. Ibu mengatakan sudah berhenti menstruasi sejak 4 bulan yang lalu
3. Ibu mengeluh perut terasa penuh dirasakan sejak 1 minggu yang lalu
4. Ibu merasa cemas dengan keadaannya sekarang

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu tampak lemah dan cemas
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-tanda Vital

Tekanan Darah : 130/80 mmHg

Nadi : 80x/i

Pernafasan : 20x/i

Suhu : 36,7°c

4. Pemeriksaan head to toe
 - a. Wajah: Tampak pucat, cemas, tidak ada oedema dan nyeri tekan
 - b. Abdomen: Tidak ada bekas operasi, terdapat massa pada kanan bawah perut ibu, dan adanya nyeri tekan.

Pemeriksaan Penunjang

- a. Laboratorium

Hemoglobin : 12,8 gr %

b. USG Oleh dr. "S"

Hasil : Tampak massa Kista ukuran +/- 2,5x2,5x2,5 cm

C. Assesment (A)

Diagnosa aktual : Ny. A umur 48 tahun dengan Kista Ovarium

Masalah aktual : Nyeri perut bagian bawah sebelah kanan dan kecemasan

Masalah potensial : Antisipasi Perdarahan intra tumor, putaran tangkai/torsi, infeksi pada tumor, robek dinding kista, dan perubahan keganasan. Lakukan kolaborasi dengan dokter Sp.OG untuk pemberian obat-obatan serta tindakan kemoteraphi.

D. Planning (P)

Tanggal 02 Aguatus 2022

Pukul : 15.30 - 22.30 WITA

1. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang keadaanya serta penyakitnya

Hasil: Terlaksana, pasien dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan oleh bidan

2. Memberikan pengetahuan kepada ibu dan keluarga mengenai faktor penyebab terjadinya kista ovarium pada ibu yaitu gangguan hormon, faktor usia, gaya hidup yang tidak sehat seperti terpapar dengan asap

rokok, mengkonsumsi makanan yang siap saji/jung food seperti bakso, mie instant dan sebagiannya.

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti serta bersedia untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya kista ovarium.

3. Menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk tindakan pengobatan dan operasi.

Hasil: Terlaksana, pasien serta keluarga sudah siap dan bersedia

4. Melakukan *informed consent* kepada ibu dan keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan

Hasil: Terlaksana, pasien dan pihak keluarga menyetujui untuk setiap tindakan yang akan dilakukan

5. Melakukan pemasangan infuse RL pada ibu dengan 28 tpm

Hasil: Terlaksana, Infuse dengan cairan RL telah terpasang pada tangan kanan ibu

6. Melakukan pemasangan klisma / huknah tinggi pada ibu

Hasil: Telah dilakukan dan pasien bersedia

7. Melakukan screne atau pencukuran rambut pubis pada ibu untuk persiapan operasi

Hasil: Ibu bersedia dan pencukuran telah dilakukan

8. Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum kecuali air putih mulai jam 00.00 WITA sampai operasi akan dilakukan

Hasil: Ibu bersedia mengikuti setiap instruksi yang telah diberikan oleh

petugas kesehatan/ bidan

9. Memotivasi dan memberi support pada ibu agar ibu yakin akan kesembuhannya

Hasil: Terlaksana, ibu serta keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

10. Menganjurkan pasien dan keluarga untuk senantiasa berdoa dan berdzikir "*Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wani'mannasir*" yang artinya "cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong dan Dia adalah sebaik-baik pelindung" disetiap waktu demi kelancaran proses pengobatan dan operasi yang akan dijalani pasien

Hasil: Terlaksana, ibu dan keluarga merasa bahagia dan tidak cemas lagi dengan keadaannya sekarang

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 03 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 02 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Operasi : 03 Agustus 2022 Pukul : 08.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 03 Agustus 2022 Pukul : 14.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny “A” / Tn “K”
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/SMK
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan merasakan nyeri pada luka bekas operasi
2. Ibu mengatakan belum bisa bergerak dengan bebas dan hanya bisa sedikit miring
3. Ibu mengatakan cemas dengan keadaanya

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak
4. Pemeriksaan TTV

Tekanan Darah : 120/80 mmHg

Nadi : 88 x/i

Pernafasan : 18 x/i

Suhu : 36,8°C

5. Terpasang dower kateter
6. Pemeriksaan Fisik terfokus
 - a. Mata: Simetris, sklera putih dan konjungtiva merah muda
 - b. Abdomen: Tampak luka bekas operasi masih basah, adanya nyeri tekan
 - c. Ekstremitas atas : Tidak ada oedema, dan tidak nyeri tekan
 - d. Genetalia: terpasang dower kateter

C. *Assesment (A)*

Ny "A" umur 48 tahun hari pertama dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan

D. *Planning (P)*

Tanggal 03 Agustus 2022

Pukul: 14.00 WITA

1. Mengobservasi Keadaan Umum ibu

Hasil: ibu masih berbaring di tempat tidur dengan wajah meringis bila sedikit bergerak

2. Menjelaskan kepada ibu bahwa penyebab nyeri yang dialami ibu sekarang adalah karena terputusnya kontinuitas jaringan otot dan serabut akibat regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan tidak cemas lagi dengan keluhan yang dirasakan sekarang

3. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat : Dextrose 5% (2:1) dengan 28 tetes permenit.

Hasil: Terlaksana, tidak ada sumbatan pada selang infus

4. Mengobservasi pengeluaran urine

Hasil: urine ibu sebanyak 400 ml tertampung di dalam urine bag

5. Memberitahu ibu bahwa ibu belum boleh makan sebelum bisa flatus/kentut

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Memberitahu ibu bahwa tetap menjaga luka operasinya tetap kering dan tidak boleh terkena air sampai dilakukan pengangkatan jahitan

Hasil: Ibu mengerti dan akan menjaga lukanya tetap kering

7. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan miring ke kanan dan ke kiri secara bergantian

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukan mobilisasi

8. Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup untuk mengembalikan stamina dan tenaga ibu yaitu dengan tidur siang 1-2 jam dan tidur malam 7-8 jam

Hasil: Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan bersedia untuk Istirahat.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE**PADA NY "A" DENGAN KISTA OVARIUM****DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR****TANGGAL 04 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 02 Agustus 2022 Pukul : 11.20 WITA
Tanggal Operasi : 03 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Pengkajian : 04 Agustus 2022 Pukul : 09.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. "A" / Tn. "K"
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/ SMK
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi
2. Ibu mengatakan sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan
3. Ibu mengatakan merasa pusing
4. Ibu mengatakan sudah flatus tapi belum BAB

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Pemeriksaan TTV
Tekanan Darah : 120/70 mmHg Pernafasan : 19x/i
Nadi : 86x/i Suhu : 36,7°C
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah: ekspresi wajah tampak meringis
 - b. Abdomen: luka operasi masih basah dan nyeri tekan pada abdomen
 - c. Genetalia: terpasang dower kateter
 - d. Extremitas atas: terpasang infus RL 28 tpm pada tangan sebelah kanan

C. Assesment (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari kedua dengan nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi

D. Planning (P)

Tanggal 04 Agustus 2022

Pukul : 10.00 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu

Hasil: ibu mengerti dan merasa senang

2. Memberitahu ibu bahwa ibu sudah diperbolehkan makan

Hasil: ibu mengerti dan merasa senang

3. Memberikan suntikan obat pada pukul 10.00 Wita yaitu Cefotaxime 1 mg, Metrinidazole 0,5 gr, ketorolac 1 ampul, ranitidin 1 ampul di berikan secara intravena dan di lanjutkan setiap 8 jam kecuali cefotaxime 11 gr setiap 12 jam

Hasil: Injeksi telah dilakukan

4. Menganjurkan serta mengajarkan kepada ibu untuk tetap melakukan mobilisasi yaitu dengan bergerak miring ke kiri dan ke kanan atau dengan duduk

Hasil: Ibu mengerti dan ibu sudah melakukan mobilisasi dengan mencoba duduk dan bergerak

5. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan mengganti pakian jika basah atau kotor

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Memberikan support kepada ibu untuk tetap berdoa dan bertawakal dan tetap optimis akan kesembuhannya

Hasil: Ibu mengerti

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE**PADA NY "A" DENGAN KISTA OVARIUM****DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR****TANGGAL 05 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 02 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Operasi : 03 Agustus 2022 Pukul : 08.00 WITA
Tanggal Pengkajian : 05 Agustus 2022 Pukul : 09.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny "A" / Tn. "K"
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/ SMK
Pekerjaan : IRT/ Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif

1. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan sering miring dan duduk
2. Ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing
3. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi
4. Ibu mengatakan sudah BAB
5. Ibu mengatakan infus dan kateter sudah di lepas

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-Tanda Vital

Tekanan Darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/i

Pernafasan : 20x/i

Suhu : 36,7°C

4. Pemeriksaan fisik terfokus

Wajah: ekspresi wajah ibu baik

Abdomen: luka operasi masih basah dan ada nyeri tekan pada abdomen

C. Assesment (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari ketiga dengan nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi

D. Planning (P)

Tanggal 05 Agustus 2022

Pukul : 10.00

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan

Hasil: ibu mengerti

2. Memberitahu ibu bahwa penatalaksanaan pemberian obat-obatan seluruhnya diganti oral yaitu Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Meloxicam 3x1

Hasil: Ibu Mengerti

3. Mengajarkan kepada ibu dan keluarga untuk melakukan mobilisasi dengan mencoba berjalan-jalan di sekitar tempat tidur , serta keluarga membantu ibu saat melakukan mobilisasi.

Hasil: Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya

4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan mengganti pakian jika basah atau kotor

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap beristirahat yang cukup dengan tidur siang minimal 1-2 jam dan tidur malam minimal 7-8 jam agar menjaga kondisinya tetap stabil

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

6. Memberikan support kepada ibu untuk tetap berdoa dan bertawakal dan tetap optimis akan kesembuhannya

Hasil: Ibu mengerti

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 06 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 06 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Operasi : 06 Agustus 2022 Pukul : 08.35 WITA
Tanggal Pengkajian : 06 Agustus 2022 Pukul : 09.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. “A” / Tn. “K”
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMK
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang
2. Ibu sudah bisa berjalan diskitar tempat tidur

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Tanda-Tanda Vital

Tekanan darah : 110/80mmHg

Nadi : 80x/i

Pernafasan : 19x/i

Suhu : 36,7°c

4. Pemeriksaan fisik terfokus

Abdomen: nyeri tekan sudah berkurang

C. Assesment (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari ke empat dengan nyeri berkurang

D. Planning (P)

Tanggal 06 Agustus 2022

Pukul: 14.00 WITA

1. Mengobservasi balutan luka operasi yaitu dengan membersihkan luka bekas operasi

Hasil: Tampak luka operasi mulai membaik

2. Melakukan medikasi luka jahitan *post* operasi menggunakan balutan kasa steril baru

Hasil: medikasi sudah dilakukan, keadaan luka masih basah dan tidak terdapat pus

3. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) pada proses penyembuhan

Hasil: ibu mngerti dan telah melakukan mobilisasi dengan secara bertahap

4. Menganjurkan pada ibu untuk tetap makan makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian,protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan

Hasil: ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya

5. Memotivasi ibu agar tetap rutin mengkonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Meloxicam 3x1

Hasil: ibu bersedia untk minum obatnya secara rutin

6. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri


Hasil: ibu mengerti dan bersedia mnegikuti anjuran yang telah diberikan

7. Memberitahu ibu bahwa ibu teah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah pulih

Hasil: ibu mengerti dan merasa senang karena diperbolehkan pulang

8. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang 4 hari lagi untuk memastikan keadaanya atau bila ada keluhan

Hasil: ibu mengerti dan bersedia melakukannya



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 10 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
 Tanggal MRS : 10 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
 Tanggal Operasi : 10 Agustus 2022 Pukul : 08.35 WITA
 Tanggal Pengkajian : 10 Agustus 2022 Pukul : 14.00 WITA
 Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. “A” / Tn. “K”
 Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
 Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
 Suku : Makassar / Makassar
 Agama : Islam / Islam
 Pendidikan : SMA / SMK
 Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
 Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang
2. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan bebas

3. Ibu sudah bisa berjalan disekitar rumahnya

B. Data Objektif (O)

1. KU ibu baik

2. Kesadaran Composmentis

3. Ekspresi wajah cerah

4. Tanda-Tanda Vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/i

Pernafasan : 20x/i

Suhu : 36,6°c

5. Tidak ada nanah dan tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi

C. Assesment (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari ke delapan dengan nyeri berkurang

D. Planning (P)

Tanggal 10 Agustus 2022

Pukul: 14.00 WITA

1. Mengobservasi balutan luka operasi yaitu dengan perlahan membuka perban dan bersihkan luka jahitan dengan kassa steril dibasahi NaCl

Hasil: Tampak luka operasi sudah membaik dan mulai kering

2. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dalam proses penyembuhan

Hasil: ibu mngerti dan sudah melakukan mobilisasi dengan secara bertahap

3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian,protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan

Hasil: ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya

4. Memotivasi ibu agar tetap rutin mengkonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Mefenamat 500 mg 1x1 tiap 12 jam, vornero tab 1x1 tiap 24 jam, dan tablet penambah darah 1x1 tiap 24 jam

Hasil: ibu bersedia untuk minum obatnya secara rutin

5. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri

Hasil: ibu mengerti dan bersedia mnegikuti anjuran yang telah diberikan

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANA PERIMENOPOUSE
PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM
DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR
TANGGAL 17 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 17 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Operasi : 17 Agustus 2022 Pukul : 08.35 WITA
Tanggal Pengkajian : 17 Agustus 2022 Pukul : 14.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. “A” / Tn. “K”
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMK
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang
2. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan bebas

- Ibu sudah bisa berjalan disekitar rumahnya

B. Data Objektif (O)

- KU ibu baik
- Kesadaran Composmentis
- Tanda-Tanda Vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80x/i

Pernafasan : 20x/i

Suhu : 36,6°c

- Pemeriksaan fisik terfokus

Wajah : Ekspresi wajah cerah

Abdomen : Nyeri tekan sudah berkurang, tidak ada tanda-tanda infeksi dan luka operasi mulai mengering

C. Assesment (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari ke 15 dengan nyeri berkurang

D. Planning (P)

17 Agustus 2022

Pukul: 14:10 WITA

- Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dan tidak ada tanda-tanda infeksi

Hasil: ibu mengerti dan merasa tenang

2. Mengajukan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian, protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan

Hasil: ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya

3. Memotivasi ibu agar tetap rutin mengonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Mefenamat 500 mg 1x1 tiap 12 jam, vornero tab 1x1 tiap 24 jam, dan tablet penambah darah 1x1 tiap 24 jam

Hasil: ibu bersedia untuk minum obatnya secara rutin

4. Mengajukan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri

Hasil: ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran yang telah diberikan

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE**PADA NY "A" DENGAN KISTA OVARIUM****DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR****TANGGAL 24 AGUSTUS 2022**

No. Register : 336xxx
Tanggal MRS : 24 Agustus 2022 Pukul : 08.30 WITA
Tanggal Operasi : 24 Agustus 2022 Pukul : 08.35 WITA
Tanggal Pengkajian : 24 Agustus 2022 Pukul : 16.00 WITA
Nama Pengkaji : Duratul Hikma

1. Identitas Istri / Suami

Nama : Ny. "A" / Tn. "K"
Umur : 48 Tahun / 50 Tahun
Nikah / Lamanya : 1x / ± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMK
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

A. Data Subjektif (DS)

1. Ibu mengatakan nyerinya sudah sangat berkurang
2. Ibu mengatakan sudah bebas bergerak
3. Ibu mengatakan sudah bisa berjalan disekitar rumahnya

B. Data Objektif (DO)

1. KU ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Tanda-Tanda Vital
 - Tekanan darah : 110/80 mmHg
 - Nadi : 80x/i
 - Pernafasan : 20x/i
 - Suhu : 36,7°c
4. Pemeriksaan fisik terfokus
 - a. Wajah: Ekspresi wajah cerah
 - b. Abdomen: Nyeri tekan sudah berkurang, tidak ada tanda-tanda infeksi dan luka operasi mulai mengering

C. Assesmant (A)

Ny "A" umur 48 tahun dengan kista ovarium post operasi kistektomi kanan hari ke 22 dengan nyeri berkurang

D. Planning (P)

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu
Hasil: ibu mengerti

2. Mengajukan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian, protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan

Hasil: ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya

3. Mengajukan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri

Hasil: ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran yang telah diberikan

4. Memberitahu kepada ibu jika ada keluhan yang dirasakan segera datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia ke pusat pelayanan kesehatan terdekat jika ada keluhan

MATRIKS KUNJUNGAN PERIMENOPOUSE PADA NY “A” DENGAN KISTA OVARIUM

Identitas Pasien

Nomor Register : 336xxx
Nama : Ny “A”/Tn “K”
Umur : 48 tahun /50 tahun
Nikah/ Lamanya : 1x/± 24 tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA/SMK
Pekerjaan : IRT/Wiraswasta
Alamat : Jl. Kumala xxx

Kunjungan	Hari, Tanggal, Jam dan Tempat	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
1.	02 Agustus 2022, pukul 08.30 wita di RS Bhayangkara Makassar	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah dan tidak mengalami haid tiap 4 bulan dan perut terasa penuh dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, lama keluhan ± 15 menit, sifat keluhan yang dirasakan sering hilang dan mengganggu aktifitas ibu sehari-hari. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> KU ibu tampak lemah dan cemas, Kesadaran Composmentis Tanda-tanda Vital: <ol style="list-style-type: none"> TD: 130/80 mmHg Nadi: 80x/i Pernafasan: 20x/i Suhu: 36,7°C Pemeriksaan head to toe <ol style="list-style-type: none"> Abdomen: Terdapat massa pada kanan bawah perut ibu, dan adanya nyeri tekan. Pemeriksaan Penunjang <ol style="list-style-type: none"> USG Oleh dr. "S" Hasil: Tampak massa Kista ukuran +/- 2,5x2,5x2,5 cm 	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang keadaan dan penyakitnya Menjelaskan kepada pasien tindakan yang akan dilakukan yaitu kolaborasi dengan dokter Sp. OG untuk tindakan operasi dan pengobatan. Melakukan <i>informed consent</i> kepada ibu dan keluarga untuk setiap tindakan yang akan dilakukan Melakukan pemasangan infuse RL pada ibu dengan 28 tpm Menganjurkan ibu untuk melakukan puasa yaitu tidak makan dan minum kecuali air putih mulai jam 00.00 WITA sampai operasi akan dilakukan 	<ol style="list-style-type: none"> Terlaksana, pasien dan keluarga mengerti dengan penjelasan yang telah diberikan oleh bidan Terlaksana, pasien serta keluarga sudah siap dan bersedia Terlaksana, pasien dan pihak keluarga menyetujui untuk setiap tindakan yang akan dilakukan Terlaksana, Infuse dengan cairan RL telah terpasang pada tangan kanan ibu Ibu bersedia mengikuti setiap instruksi yang telah diberikan oleh petugas kesehatan/ bidan

2.	03 Agustus 2022, pukul 14.00 wita di RS Bhayangkara Makassar	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan merasakan nyeri pada luka bekas operasi Ibu mengatakan belum bisa bergerak dengan bebas dan hanya bisa sedikit miring Ibu mengatakan cemas dengan keadaanya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> KU ibu baik, Kesadaran Composmentis, Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> Tekanan Darah: 120/80 mmHg Nadi: 88 x/i Pernafasan: 18 x/i Suhu: 36,8°C Terpasang dower kateter Pemeriksaan Fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> Abdomen: Tampak luka bekas operasi masih basah, adanya nyeri tekan Ekstremitas atas : terpasang infus, tidak ada oedema, dan tidak nyeri tekan Genetalia: terpasang dower kateter 	<ol style="list-style-type: none"> Mengobservasi Keadaan Umum ibu dan menjelaskan kepada ibu penyebab nyeri Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat : Dextrose 5% (2:1) dengan 28 tetes permenit. Mengobservasi pengeluaran urine Memberitahu ibu bahwa ibu belum boleh makan sebelum bisa flatus/kentut Memberitahu ibu bahwa tetap menjaga luka operasinya tetap kering dan tidak boleh terkena air sampai dilakukan pengangkatan jahitan Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan mobilisasi dini dengan miring ke kanan dan ke kiri secara bergantian Menganjurkan kepada ibu untuk istirahat yang cukup. 	<ol style="list-style-type: none"> ibu masih berbaring di tempat tidur dengan wajah meringis bila sedikit bergerak Terlaksana, tidak ada sumbatan pada selang infus urine ibu sebanyak 400 ml tertampung di dalam urine bag Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan Ibu mengerti dan akan menjaga lukanya tetap kering Ibu mengerti dan bersedia melakukan mobilisasi Ibu mengerti dan bersedia
3.	04 Agustus 2022, pukul 09.00 wita di RS	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi Ibu mengatakan sudah bisa miring ke kiri dan ke kanan Ibu mengatakan merasa pusing 	<ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dan memberitahu ibu bahwa ibu sudah diperbolehkan makan Memberikan suntikan obat pada pukul 10.00 Wita 	<ol style="list-style-type: none"> ibu mengerti dan merasa senang Injeksi telah dilakukan Ibu mengerti dan ibu sudah melakukan mobilisasi dengan

	Bhayangkara Makassar	<p>4. Ibu mengatakan sudah kentut tapi belum BAB</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. Kesadaran Composmentis 3. Pemeriksaan TTV <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan Darah: 120/70 mmHg b. Pernafasan: 19x/i c. Nadi: 86x/i d. Suhu: 36,7°C 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah: ekspresi wajah tampak meringis b. Abdomen: luka operasi masih basah dan nyeri tekan pada abdomen c. Genetalia: terpasang dower kateter d. Ekstremitas atas: terpasang infus RL 28 tpm pada tangan sebelah kanan 	<p>yaitu Cefotaxime 1 mg, Metrinidazole 0,5 gr, ketorolac 1 ampul, ranitidin 1 ampul di berikan secara intravena dan di lanjutkan setiap 8 jam kecuali cefotaxime 11 gr setiap 12 jam</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menganjurkan serta mengajarkan kepada ibu untuk tetap melakukan mobilisasi 4. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan mengganti pakian jika basah atau kotor 5. Memberikan support kepada ibu untuk tetap berdoa dan bertawakal dan tetap optimis akan kesembuhannya 	<p>mencoba duduk dan bergerak</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ibu mengerti dan bersedia melakukannya 5. ibu mengerti
4.	05 Agustus 2022, pukul 09.00 wita di RS Bhayangkara Makassar	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan sering miring dan duduk 2. Ibu mengatakan sudah tidak merasa pusing 3. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka bekas operasi 4. Ibu mengatakan sudah BAB 5. Ibu mengatakan infus dan kateter sudah di lepas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan dan memberitahu ibu bahwa penatalaksanaan pemberian obat-obatan seluruhnya diganti oral yaitu Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Meloxicam 3x1 2. Mengajarkan kepada ibu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti 2. Ibu dan keluarga mengerti dan bersedia melakukannya 3. ibu mengerti dan bersedia melakukannya 4. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

		<p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. Kesadaran Composmentis 3. Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan Darah: 110/70 mmHg b. Nadi: 80x/i c. Pernafasan: 20x/i d. Suhu: 36,7°c 4. Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah: ekspresi wajah ibu baik b. Abdomen: luka operasi masih basah dan ada nyeri tekan pada abdomen 	<p>dan keluarga untuk melakukan mobilisasi dengan mencoba berjalan-jalan di sekitar tempat tidur</p> <p>Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga personal hygiene dengan mengganti pakian jika basah atau kotor</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap beristirahat yang cukup 4. Memberikan support kepada ibu untuk tetap berdoa dan bertawakal dan tetap optimis akan kesembuhannya 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ibu mengerti
--	--	---	--	---

5.	<p>06 Agustus 2022, pukul 09.00 wita di RS Bhayangkara Makassar</p>	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang 2. Ibu sudah bisa berjalan disekitar tempat tidur <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. Kesadaran Composmentis 3. Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan darah: 110/80mmHg b. Nadi: 80x/i 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengobservasi balutan luka operasi yaitu dengan membersihkan luka bekas operasi 2. Melakukan medikasi luka jahitan <i>post</i> operasi menggunakan balutan kasa steril baru 3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap makan makanan yang bergizi 4. Memotivasi ibu agar tetap 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tampak luka operasi mulai membaik 2. medikasi sudah dilakukan, keadaan luka masih basah dan tidak terdapat pus 3. ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya 4. ibu bersedia untuk minum obatnya secara
----	---	--	--	---

		<p>c. Pernafasan: 19x/i d. Suhu: 36,7°C</p> <p>4. Pemeriksaan fisik terfokus</p> <p>1. Abdomen: nyeri tekan sudah berkurang</p>	<p>rutin mengkonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Meloxicam 3x1</p> <p>5. Memberitahu ibu bahwa ibu telah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah pulih</p> <p>6. Menganjurkan kepada ibu untuk melakukan kunjungan ulang 4 hari lagi untuk memastikan keadaanya</p>	<p>rutin</p> <p>5. ibu mengerti dan merasa senang karena diperbolehkan pulang</p> <p>6. ibu mengerti dan bersedia melakukannya</p>
--	--	---	--	--

6.	<p>10 Agustus 2022, pukul 14.00 wita di RS Bhayangkara Makassar</p>	<p>DS:</p> <p>1. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang</p> <p>2. Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan bebas</p> <p>3. Ibu sudah bisa berjalan disekitar rumahnya</p> <p>DO:</p> <p>1. KU ibu baik</p> <p>2. Kesadaran Composmentis</p> <p>3. Ekspresi wajah cerah</p> <p>4. Tanda-Tanda Vital</p> <p>a. Tekanan darah: 110/70 mmHg</p> <p>b. Nadi: 80x/i</p>	<p>1. Mengobservasi balutan luka operasi yaitu dengan perlahan membuka perban dan bersihkan luka jahitan dengan kasa steril dibasahi NaCl</p> <p>2. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya mobilisasi dini dalam proses penyembuhan</p> <p>3. Menganjurkan pada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi</p> <p>4. Memotivasi ibu agar tetap</p>	<p>1. Tampak luka operasi sudah membaik dan mulai kering</p> <p>2. ibu mngerti dan sudah melakukan mobilisasi dengan secara bertahap</p> <p>3. ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya</p> <p>4. ibu bersedia untuk minum obatnya secara rutin</p>
----	---	--	--	---

		<p>c. Pernafasan: 20x/i d. Suhu: 36,6°c</p> <p>5. Tidak ada nanah dan tanda-tanda infeksi pada luka bekas operasi</p>	<p>rutin mengkonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Mefenamat 500 mg 1x1 tiap 12 jam, vornero tab 1x1 tiap 24 jam, dan tablet penambah darah 1x1 tiap 24 jam</p> <p>5. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup</p>	<p>5. ibu mengerti dan bersedia mnegikuti anjuran yang telah diberikan</p>
7.	<p>17 Agustus 2022, pukul 14.00 wita di RS Bhayangkara Makassar</p>	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengatakan nyeri bekas operasi mulai berkurang Ibu mengatakan sudah bisa bergerak dengan bebas Ibu sudah bisa berjalan disekitar rumahnya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> KU ibu baik Kesadaran Composmentis Tanda-Tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> Tekanan darah: 110/70 mmHg Nadi: 80x/i Pernafasan: 20x/i Suhu: 36,6°c Pemeriksaan fisik terfokus <ol style="list-style-type: none"> Wajah : Ekspresi wajah cerah Abdomen: Nyeri tekan sudah berkurang, tidak ada tanda-tanda 	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan penjelasan kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dan tidak ada tanda-tanda infeksi Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi Memotivasi ibu agar tetap rutin mengkonsumsi obat oral yang telah diberikan agar mempercepat penyembuhan yaitu Asam Mefenamat 500 mg 1x1 tiap 12 jam, vornero tab 1x1 tiap 24 jam, dan tablet penambah darah 1x1 tiap 24 jam Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga 	<ol style="list-style-type: none"> Ibu engerti dan merasa tenang Ibu bersedia makan makanan bergizi demi kebbaikannya Ibu bersedia untuk minum obatnya secara rutin Ibu mengerti dan bersedia mnegikuti anjuran yang telah diberikan

		infeksi dan luka operasi mulai mengering	kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri	
8.	24 Agustus 2022, pukul 16.00 wita di RS Bhayangkara Makassar	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengatakan nyerinya sudah berkurang 2. Ibu mengatakan sudah bebas bergerak 3. Ibu mengatakan sudah bisa berjalan disekitar rumahnya <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KU ibu baik 2. kesadaran composmentis 3. Tanda-tanda Vital <ol style="list-style-type: none"> a. Tekanan darah: 110/80 mmHg b. Nadi: 80x/i c. Pernafasan: 20x/i d. Suhu: 36,7°c\ 4. Pemeriksaan fisik terfoku <ol style="list-style-type: none"> a. Wajah Ekspresi wajah cerah b. Abdomen: nyeri tekan sudah berkurang, tidak ada nanah dan tanda-tanda infeksi dan luka operasi mulai mengering. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil pemeriksaan pada ibu 2. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung karbohidrat yaitu nasi, roti, umbi-umbian, protein yaitu telur, ikan, tempe dan tahu, vitamin dan mineral yaitu sayur dan buah-buahan 3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan tetap menjaga kebersihan diri 4. Memberitahu kepada ibu jika ada keluhan yang dirasakan segera datang ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu mengerti dan merasa tenang 2. ibu bersedia untuk makan makanan yang bergizi demi kebaikannya 3. Ibu mengerti dan bersedia mengikuti anjuran yang telah diberikan 4. Ibu mengerti dan bersedia ke pusat pelayanan kesehatan terdekat jika ada keluhan

Sumber: Data Primer

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan asuhan kebidanan pada Ny “A” dengan kista ovarium di RS Bhayangkara Makassar dengan menggunakan sistem manajemen asuhan kebidanan Varney yang terdiri dari tujuh langkah: pengumpulan data dasar, diagnosa atau identifikasi masalah, dan identifikasi potensial, tindakan segera, perencanaan asuhan yang komprehensif, pelaksanaan rencana dan penilaian.

Adapun penatalaksanaannya sebagai berikut:

A. Langkah I. Identifikasian Data Dasar

Tahap ini yaitu pemeriksaan dimulai dengan pendataan dari pasien dan anggota keluarga, kemudian melakukan pemeriksaan, meraba (palpasi), ketukan (perkusi) dan mendengarkan (auskultasi), pemeriksaan klinis, rontgen, dan ultrasonografi.

Berdasarkan pengkajian data subjektif pada Ny “A” dengan kista ovarium ibu mengatakan umur 48 tahun riwayat pola nutrisi makan ibu mengatakan sering mengkonsumsi makanan instan atau jangfood seperti bakso, mie instan, gorengan, dan manisan. Riwayat menstruasi ibu mengatakan haidnya tidak teratur, ibu mengatakan mengalami nyeri yang hebat. Serta merasa khawatir dan cemas dengan keadaanya.

Berdasarkan tinjauan kasus mengkonsumsi makanan instan atau junkfood seperti makanan yang tinggi lemak dan juga serat dapat menimbulkan zat-zat berbahaya dalam tubuh. Sehingga sel-sel darah dalam tubuh yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran pencernaan di dalam peredaran darah dan dapat mengakibatkan tidak bekerjanya sistem organ dengan baik. Sebagaimana penelitian oleh Widyarni, 2020 kaitan antara pola makan dan kejadian kista ovarium yaitu responden dengan pola makan yang buruk memungkinkan bisa mengalami risiko tersebar terjadinya kista ovarium dibandingkan dengan responden dengan pola makan yang baik.

Ketidakseimbangan hormon bisa menyebabkan menstruasi tidak teratur, ada dua hormon yang berperan yaitu: estrogen dan progesterone yang dimana hormone estrogen yang memengaruhi kesuburan dan siklus haid, dan progesterone yang membantu mengatur sistem reproduksi dalam mempersiapkan proses kehamilan termasuk siklus haid. Apabila salah satu hormon tersebut bermasalah, maka siklus haid akan terganggu. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kista ovarium. Terbentuknya kista fungsional disebabkan oleh stimulasi hormon gonadotropin atau disebabkan oleh sensitivitas terhadap hormon gonadotropin yang berlebih. FSH (Folikel Stimulating) dan HCG (Human Chorionik Gonadotropin) termasuk hormon gonadotropin. Seseorang dengan kelebihan hormon estrogen atau progesteron akan menimbulkan terjadinya penyakit kista (Kurniawati, dkk. 2015).

Berdasarkan pengkajian data objektif Ny "A", didapatkan dari pemeriksaan fisik pasien dalam keadaan lemah dan cemas, kesadaran menurun, dan pada pemeriksaan seluruh tubuh tampak wajah dengan inspeksi dan palpasi pasien pucat, tidak terdapat oedema dan nyeri perut, luka bekas operasi tidak ada, terdapat benjolan atau massa di perut kanan bawa dengan nyeri tekan. Berdasarkan hasil tes laboratorium, HB: 12,8g%, ultrasonografi: nampak massa kista ukuran $\pm 2,5 \times 2,5 \times 2,5$ cm.

Adapun keluhan utama pasien adalah rasa nyeri pada bagian bawah perut, perut terasa penuh dari 1 minggu yang lalu, dengan durasi ± 15 menit, keluhan dirasakan hilang timbul dan sangat mengganggu kegiatan sehari-hari pasien. Tanda serta gejala dari kista ovarium adalah perut membesar, perut kembung/berat, nyeri perut, serta kesulitan buang air kecil dan besar akibat pembesaran kista itu sendiri.

Beberapa tanda dan gejala kista ovarium adalah sering mengalami nyeri panggul, biasanya kondisi ini akan dirasakan pada pinggul di bagian bawah kanan atau kiri tempat di area ovarium. Kista ovarium ini bisa menyebabkan rasa penuh pada daerah abdomen dikarenakan ukuran atau lokasi kista dalam perut sehingga menyebabkan adanya nyeri saat di tekan.

Kista ovarium ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor usia, dimana kista ovarium muncul pada wanita usia reproduksi antara usia 45 dan 55 tahun. Pada Ny "A" umur 48 tahun beresiko terkena kista ovarium yang dimana seiring bertambahnya usia resistensi folikel terhadap gonadotropin menyebabkan turunnya produksi estrogen dan tingginya kadar hormon gonadotropin. Tingkat tinggi gonadotropin tersebut tidak memiliki umpan balik pada sumbu hipotalamus dan hipofisis karena tingkat estrogen turun.

B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa /Masalah Aktual

Bidan perlu mengidentifikasi berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan yaitu diagnosa/masalah meliputi data subjektif dan objektif didapatkan dari hasil kaji yang telah dilakukan.

Pemeriksaan penunjang kasus Ny "A" dengan kista ovarium mengungkapkan data subjektif juga objektif yang mendukung diagnosa kista ovarium. Menurut data subjektif yang didapatkan dari pasien, ibu merasa nyeri di bagian bawah perut, merasa penuh di perut, adanya nyeri saat di tekan, dan ibu merasa khawatir dengan kondisinya.

Data objektif yang diperoleh yaitu pemeriksaan fisik dimana kondisi umum pasien tampak lemah dan cemas, kesadaran ibu composmentis, dari pemeriksaan head to toe dengan inspeksi dan palpasi wajah tampak pucat, tidak ada oedema. Tidak ada bekas luka operasi, adanya massa dan nyeri

tekan pada kuadran kanan bawah perut ibu. Hasil pemeriksaan klinis menunjukkan HB: 12,8g%, ultrasonografi: massa kista ukuran +/- 2,5 x 2,5 x 2,5 cm.

Sebagian besar ukuran kista ovarium fungsional adalah 2-5 cm, meski demikian tak menutup kemungkinan ukurannya mencapai 8-12 cm. kista menjadi masalah ketika tidak hilang, pecah, ukuran yang membesar, maupun dapat menghalangi suplai darah ke ovarium. Selain itu kista juga dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang dapat memperburuk keadaan penderita. Seperti perdarahan kedalam kista, torsi, infeksi kista, ruptur dan perubahan keganasan

Bersamaan dengan teori penelitian bahwa tanda dan gejala kista ovarium adalah nyeri bagian bawah perut, perut membesar, perut terasa penuh, berat pada perut bagian bawah, gangguan miksi yang disebabkan oleh kista yang menekan kandung kemih sehingga menyebabkan masalah buang air kecil, serta di perut bagian bawah teraba benjolan atau massa.

Diagnosa kista ovarium dapat ditegakkan pada saat pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG bertujuan untuk menentukan letak, batas, dan permukaan kista dari perut atau vagina, dan apakah kista tersebut berasal dari ovarium, rahim atau kandung kemih.

Berdasarkan tinjauan kasus secara umum tidak terdapat kesenjangan baik teori maupun kasus yang didapatkan di lapangan.

C. Langkah III. Antisipasi Diagnosa/ Masalah Potensial

Menentukan potensi masalah/diagnosis yang teridentifikasi. Pada tinjauan kasus kista ovarium, menunjukkan bahwa kemungkinan diagnosa kista ovarium adalah infeksi kista, torsi, ruptur kista, dan perubahan keganasan (Wiknjosastro, 2017).

Kista ovarium jika tidak diatasi secara cepat akan menyebabkan infeksi kista, karena adanya sumber bakteri patogen. Torsi (melilit) diantaranya indung telur, saluran tuba, atau ligamentum rotundum pada rahim.

Apabila keadaan ini dibiarkan dapat menyebabkan infark yang dimana kondisi ketika aliran darah di otak terhambat, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak. Peritonitis atau peradangan pada peritoneum yaitu selaput tipis yang membatasi dinding perut bagian dalam dan organ-organ perut, serta kematian.

Adapun komplikasi lainnya adalah ruptur yang dimana dapat menyebabkan timbulnya nyeri yang akut dan singkat serta dapat menyebabkan perdarahan yang mengancam jiwa.

Perubahan keganasan, setelah dilakukan eksisi kista pemeriksaan ulang dilakukan untuk melihat kemungkinan perubahan keganasan. Karena kista ovarium berkembang setelah menopause, cenderung menjadi kanker (maligna).

Berdasarkan data dari studi kasus Ny. "A" kemungkinan diagnosa potensial kista ovarium meliputi perdarahan, putaran tangkai/torsio, infeksi kista, ruptur, dan keganasan. Kemungkinan kasus Ny "A" yang terdiagnosa tidak terjadi.

Dengan demikian, tidak adanya kesenjangan baik teori maupun kasus, karena diagnosis potensial dalam kasus ini yaitu keganasan pada ovarium.

D. Langkah IV. Tindakan Segera

Adapun data yang menunjukkan keadaan emergensi di mana bidan segera mengambil bertindak untuk keselamatan pasien, dan sebagian data menunjukkan situasi di mana tindakan segera diperlukan sambil menunggu arahan dokter, menunjukkan situasi yang memerlukan konsultasi dengan tenaga medis lainnya. Bidan mengevaluasi kondisi pasien dalam menentukan perawatan yang paling tepat. Untuk kista ovarium yang memerlukan penanganan segera oleh Dokter Sp. OG untuk penanganan lebih lanjut (Mufdillah, dkk, 2012).

Pasien dengan kista ovarium menjalani operasi kistektomi perlaparaskopi, pemeriksaan klinis, USG, pemasangan infus RL, pengobatan dan observasi bekerjasama dengan dr. SpOG.

Operasi kistektomi perlaparaskopi merupakan operasi yang paling umum dilakukan untuk jenis kista jinak seperti kista dermoid. Operasi pengangkatan hanya melibatkan kista dan meninggalkan jaringan ovarium

yang normal, operasi ini dilakukan ddengan terlebih dahulu menempatkan kista di dalam kantong yang telah ditempatkan di rongga panggul. Kantong akan membantu untuk mengumpulkan tumpahan yang dapat terjadi apabila kista dibuka secara tidak sengaja saat histerektomi. Sayatan dibuat pada kista untuk memisahkan kista dari ovarium secara lengkap. Akan tetapi, karena dinding kista bisa menjadi sangat tipis atau menempel padat dengan ovarium. Apabila ini terjadi, kandungan isi yang terdapat didalam kista dapat disedot dan kistektomi dilakukan dengan ovarium yang masih berada di dalam kantong. Kantong dengan kista beserta isinya kemudian ditutup dan diangkat melalui sayatan yang sedikit agak membesar di umbilikus. Panggul dan perut kemudian dicuci dengan bersih. Jika ovarium terdapat cacat yang besar, ovarium dapat diperbaiki dengan jahitan.

Dilakukannya pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik yang dimana ini merupakan sebuah proses dari seorang ahli medis memeriksa tubuh pasien untuk menemukan tanda klinis penyakit yang akan membantu penegakan dagnosis. Kemudian akan dilakukan pemasangan infus RL yang bertujuan untuk mempertahankan hidrasi pada pasien rawat inap yang tidak dapat menahan cairan, serta akan diberikan pengobatan dan juga pengobservasian keadaan pasien.

Oleh karena itu tidak adanya ketidaksesuaian dari teori maupun kasus, karena segera dilakukan kerjasama dengan dr. SpOG.

E. Langkah V. Rencana Tindakan

Dalam merencanakan asuhan komprehensif seperti yang ditentukan pada langkah sebelumnya. Yang merupakan kelanjutan dari diagnosis atau pengobatan masalah yang telah teridentifikasi atau diprediksi dan memungkinkan konversi data yang tidak lengkap diselesaikan pada langkah ini. Rencana ini dibuat berdasarkan diagnosis, masalah, dan kebutuhan.

Dalam tinjauan kasus kista ovarium, penanganan kista ovarium umumnya terdiri dari operasi pengangkatan kista. Ny "A" dengan kista ovarium perencanaan yang dilakukan adalah: menjelaskan kondisi dan penyakit kepada ibu dan anggota keluarga yang akan membantu pasien memahami kondisi dan penyakitnya, serta mengurangi rasa cemas.

Meakukan *informed consent* pada pasien dan keluarga untuk setiap prosedur yang dilakukan agar melancarkan setiap tindakan medis yang dilakukan, untuk mengurangi efek samping dan juga masalah yang kemungkinan terjadi, dapat membantu kecepatan pemulihan dan kesembuhan dari penyakit yang diderita, sehingga meningkatnya mutu pelayanan serta terlindunginya kemungkinan tuntutan hukum untuk tim medis.

Berikan penjelasan pada pasien dan keluarga tentang faktor penyebab ibu terkena kista ovarium yang meliputi: gangguan hormonal, faktor umur, pola hidup yang kurang sehat misalnya terkena asap rokok dan makanan siap saji atau junk food seperti bakso, mie instant dan lain sebagainya agar

ibu paham dan siap untuk menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan timbulnya kista ovarium.

Memberikan penjelasan pada pasien mengenai prosedur yang akan dilaksanakan yaitu tindakan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat dan pembedahan secara kistektomi perlaparaskopi sehingga pasien dan keluarga siap untuk bekerjasama dengan tim kesehatan dalam pengambilan keputusan terhadap prosedur yang akan dilaksanakan.

Mengobservasi keadaan umum ibu dan TTV berdasarkan intruksi dokter sekitar 4 jam dan 5 atau 15 menit jika ditemukan tanda vital tidak normal dan stabil atau beresiko terjadi perubahan fisiologi dengan cepat pada pasien setelah operasi.

Observasi tetesan infus ringer laktat untuk pengembalian cairan tubuh yang hilang. Lakukan klisma untuk pembersihan kolon dan rangsang keluarnya feses (BAB) sebelum tindakan operasi, melakukan sceren atau mencukur rambut pubis agar dengan mudah dalam melaksanakan prosedur operasi serta pencegahan terjadinya infeksi eksternal.

Menganjurkan pasien untuk berpuasa atau tidak minum dan makan terkecuali air putih dari jam 00.00 WIB sampai dengan operasi dilakukan guna untuk mengistirahatkan alat pencernaan tubuh, terkhusus lambung dan juga usus agar mempermudah tindakan operasi.

Berikan support dan motivasi kepada ibu untuk kesembuhannya serta anjurkan ibu dan keluarga selalu berdo'a dan berdzikir kepada Allah yang

dimana dzikir adalah salah satu amalan yang sangat disukai oleh Allah dan sangat bermanfaat untuk ketenangan jiwa, datangnya rahmat, serta mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang memiliki banyak manfaat yaitu menurunkan tingkat stress, menstabilkan tekanan darah dan detak jantung, membantu memusnahkan sel-sel kanker sebagaimana dokter spesialis Lebanon menyatakan bahwa al-qur'an memiliki efek luar biasa terhadap sel-sel tubuh. Irama-irama khas yang keluar dari bacaan ayat suci al-qur'an mampu meningkatkan aktivitas sel-sel sehat dan membangkitkan sistem imun yang melemah agar dapat bertempur melawan sel-sel tumor atau kanker yang paling berbahaya sekali. Selain itu manfaat mendengarkan lantunan ayat suci al-qur'an adalah dapat menghilangkan kecemasan pada saat menjalani operasi.

Berdasarkan perencanaan asuhan kebidanan yang sudah diberikan pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dan kasus yang ada.

F. Langkah VI. Implementasi Asuhan Kebidanan

Pengimplementasikan rencana asuhan komprehensif dijelaskan pada langkah V. Rencana ini dapat dilakukan bidan, klien atau anggota medis yang lain. Bidan tidak hanya sendiri dalam melakukannya, tetapi mereka berugas dalam terarahnya pelaksanaan yang dapat meningkatkan kualitas asuhan pada pasien kista ovarium.

Implementasi tindakan kista ovarium pada Ny “A” dilaksanakan secara cepat dan tepat oleh petugas kesehatan guna untuk menghindari komplikasi kista ovarium yang dimana disetujui oleh pasien dan keluarga.

Tindakan yang dilakukan seperti kolaborasi dengan dokter untuk dilakukannya operasi kistektomi, observasi infus RL dengan 28 tpm, pemasangan klisma, observasi KU dan TTV 4 jam sekali atau 5 hingga 15 menit jika adanya perubahan fisiologi pasien sesudah operasi secara cepat melakukan sceren atau pencukuran rambut pubis dan puasa dari jam 00.00 WITA sampai operasi dilakukan.

Pada studi kasus Ny “A” ibu terdiagnosa kista ovarium kanan, dan dengan dilakukan tindakan kistektomi per laparaskopi. Setelah dilakukan tindakan pembedahan pasien didiagnosa dengan kista dermoid yang merupakan tumor kistik ovarium. Namun bisa terjadi transformasi keganasan, dan sering terjadi pada ibu dengan usia diatas 40.

Tindakan kista ovarium dengan operasi kistektomi per laparaskopi terkhusus kista dermoid jadi pilihan yang pertama. Kasus kista ovarium pada Ny “A”, perencanaan keseluruhan tindakan teraksankan dengan baik tanpa adanya hambatan dikarenakan kolaborasi dan penerimaan yang baik dari pasien serta dukungan keluarga dan petugas kesehatan ruangan perawatan ginekologi/nifas RS Bhayangkara Makassar.

G. Langkah VII. Evaluasi

Evaluasi adalah tahap terakhir dalam prosedur manajemen kebidanan yang menilai tercapainya tujuan, menetapkan ciri/ciri atau kriteria, dan menentukan apakah intervensi yang telah dilaksanakan telah memenuhi tujuan.


Untuk melakukan evaluasi Ny “A” dengan kista ovarium yang perlu terevaluasi adalah pemantauan secara berkala kondisi pasien, pemberian obat-obatan, melakukan mobilisasi, menjaga kebersihan diri (personal hygiene), dan konsumsi makanan bergizi untuk kesehatannya.

Hasil akhir yang diperoleh pada kasus Ny “A” dengan kista ovarium tanggal 6 Agustus 2022. Pasien dalam kondisi baik, nyeri perut berkurang, klien sudah bisa bergerak dan juga duduk, klien dapat berjalan di tempat tidur, klien sudah buang air kecil dan klien diperbolehkan untuk pulang dan menyarankan lakukan kunjungan kembali 1 minggu kemudian untuk pemeriksaan kondisinya dan apabila terdapat keluhan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022 Ny. “A” melakukan kunjungan ulang RS Bhayangkara Makassar ibu dalam keadaan baik, mampu bergerak, nyeri tekan sudah berkurang dan nanah tidak ditemukan dan tidak ada tanda-tanda terjadinya infeksi.

Tanggal 24 Agustus 2022 ibu dalam keadaan baik, nyeri berkurang setelah operasi, dapat bergerak bebas dan berjalan disekitar rumah, luka operasi tampak membaik, tidak ada nanah dan tanda-tanda infeksi.

Oleh karena itu tidak terdapat kontraindikasi teori dan kasus mengenai asuhan dan tindakan operasi kistektomi per laparaskopi serta hasil tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan dari tenaga kesehatan.



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil studi kasus yang didapatkan dan pembahasan tentang asuhan kebidanan dengan kista ovarium pada Ny “A” di RS Bhayangkara Makassar, peneliti menyimpulkan bahwa dapat membantu meningkatkan pelayanan kebidanan khususnya pada pasien perimenopause dengan kista ovarium.

A. Kesimpulan

1. Hasil kaji yang didapatkan pada Ny “A” yaitu: data subjektif: pasien mengatakan bagian bawah perut mengalami nyeri, abdomen terasa penuh, tidak mengalami haid tiap bulan, dan kecemasan dengan kondisinya, dan data subjektif di dapatkan sebagai berikut: adanya massa di abdomen bawah kanan, terdapat nyeri tekan dan tampak dari USG massa kista ukuran: 2,5x2,5x2,5 cm.
2. Diagnosa/masalah aktual pada Ny “A” adalah kista ovarium, dengan masalah kecemasan.
3. Diagnosa potensial pada Ny “A” berpotensi terjadi perdarahan, torsi, infeksi pada kista, ruptur, dan perubahan keganasan.
4. Kasus Ny “A” dengan kista ovarium yaitu dilakukannya kolaborasi dengan dokter SpOG.

5. Langkah ke-V pada kasus Ny “A” adalah penyampaian hasil pemeriksaan dan penjelasan untuk tindakan operasi, asuhan praoperasi: memberikan pengetahuan tentang terjadinya kista ovarium pada ibu, observasi keadaan umum dan TTV ibu, observasi tetesan infus, melakukan klisma, melakukan sceren, melakukan puasa sampai operasi dilakukan, memberikan support pada klien dan keluarga serta senantiasa berdoa pada Allah untuk kesembuhannya, serta tindakan operasi oleh tim dokter
6. Asuhan yang sudah diberikan pada Ny “A” adalah tindakan operasi kistektomi perlaparaskopi.
7. Hasil dari tindakan evaluasi yang telah dilakukan pada Ny “A” dengan kista ovarium yaitu operasi berjalan dengan lancar dan luka sembuh tanpa ada nanah dan tanda-tanda infeksi

B. Saran

Berdasarkan analisis kasus dan pembahasan kasus, penulis dapat memberikan beberapa kontribusi dan saran yang bermanfaat.

1. Pasien dan Keluarga

Pasien dan juga keluarga diharapkan mewaspadaai adanya gangguan pada sistem reproduksi terkhusus pada ibu perimenopause dengan kista ovarium, yang dimana dapat membantu pasien dalam perawatan di rumah.

Keluarga harus mengetahui adanya tanda dan gejala dari kista ovarium untuk diketahuinya secara dini jika terdapat tanda dan gejala kista.

2. Institusi dan Akademik

Diharapkan untuk institusi dan akademik dapat berkontribusi untuk memberikan fasilitas seperti sumber buku mengenai gangguan pada sistem reproduksi terkhusus kista ovarium. Ini membantu penulis dan mahasiswa lain menemukan bahan referensi untuk tulisan karya selanjutnya.

3. Profesi

Dapat meningkatnya kualitas pelayanan terhadap pasien dan memberikan respon yang cepat, tepat dan komprehensif pada klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian Agama RI. 2019
- Al-Zuhayly, Wahbah, *al- Fiqh al-Islami Adilatuh*, diterjemahkan Agus Effendi dan Bahruddin Fanani, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet.6, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Abdurrahman, asy Syaikh bin Nashir as-sa'di, 2006, *Tafsir al-Karimir Rahman Fi Tafsiril Kalamil Mannan*, (Beirut: Mu'asasah ar-Risalah)
- American cancer society, *What is Ovarian Cancer?* [interet]. 2014 [cited 2022 jan 14]. P. 1-14. Link: <https://www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/about/what-is-ovvarian-cancer.html>
- Al Kautzar, Mumthi'ah, Anieq. Dkk. 2021. *Kesehatan Perempuan*. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Amseke, Victoranto, Fredericksen, dan Dian, Diarfah, Andi. 2021. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Perkembangan*. Provinsi Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Andang, Tantrini. 2013. *45 Penyakit Musuh Kaum Perempuan*. Yogyakarta: Rapha Publishing
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P. 2016. *Moleculer Biology of The Cell*. New York: Garland Publishing.
- Ana Ratnawati, A., PER., Pend., S, Kep., Ns., M. K. (2018). *Asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem reproduksi* (ummi athiyah fitroh (ed.); pustaka ba). PT. Pustaka baru
- Anief, M., 2010. *Penggolongan Obat*. 10th, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.9-10.
- Bobak, Jensen, (2015). *Buku Ajar Keperawatan Dan Maternitas*, Alih Bahasa Maria A. Wijayarini, Peter I. Anugrah (Edisi 4). Jakarta: EGC
- Bray Freddie, dan Ferlay, Jacques. Dkk, Global cancer statistic 2018; *GLOBOCCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185*

- countries.CA Cancer J Clin.* 2018;68(6):394-424. Link: <https://doi.org/10.3322/caac.21492>. Diakses 10 maret 2022. Jam: 20:00
- Benson Ralp C dan Martin L. Pernol. 2013. *Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta:EGC
- Baziad A (1), 2015. *Menopause dan Andropouse*. ^{1st} ed. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Corvin, E.J. 2015. *Penyakit Kandungan*. Fitramaya, Yogyakarta
- Dewinta, Ni Made Nanda (2020). *Gambara asuhan keperawatan post operasi kista ovarium dengan nyueri aku*. url: <http://repository.poltekkesdenpasar.ac.id/eprint/5094>
- Data RS Bhayangkara Makassar. 2019. *Jumlah Kejadian Kista Ovarium*
- Data RS Bhayangkara Makassar. 2020. *Jumlah Kejadian Kista Ovarium*
- Data RS Bhayangkara Makassar. 2021. *Jumlah Kejadian Kista Ovarium*
- Fatkhayah, Natiqotul. 2019. *Faktor Risiko Kejadian Kista Ovarium Pada Wanita Usia Reproduksi di Rskia Kasih Ibu Kota Tegal*. Prodi D-3 Kebidanan Stikes Bhakti Mandala Husada Slawi. BHAMADA, JITK, Vol. 10, No. 1, April 2019. Link: <http://ojs.stikesbhamadaslawi.ac.id/>. Diakses 10 maret 2022. Jam: 20:00
- Farahani, L., Morgan, S., Datta, S. 2017. Reprint of: *Benign Ovarian Cysts*.
- Grabosch. Shannon. M. *Ovarian cysts. Gynecologic Oncology Magee-Womery. Hospital. University. of. Pittsburgh Medical Center*. 2017. Diakses 01 maret 2022.jam:00:04
- Heffner, Kinda J & Schrust DJ. *Al. a glamor sistem reproduksi*. Edisi kedu. Jakarta: Erlangga Medical series, 2015
- Kasibu, 2017. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Masyarakat dengan Tindakan Pemakaian Obat Resep dan Tanpa Resep Dokter di Kelurahan Kota Maksu II Kecamatan Medan Area*. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara
- Kurniawaty. (2019) *Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Usia Subur Dengan Pencegahan Kista Ovarium DI Wilayah Kerja Puskesmas Rawasari Kota Jambi Tahun 2014*. *Scientia Journal*, 3(2),103-108

- Kusmiran. 2016. *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta; Salemba Medika
- Khoiria Nikmatul, dan Wahyu, indriati, Dwi. dkk. (2020). *Prevalence and Associated Factors of Ovarian Cyst Malignancy: A Cross-sectional Based Study in Surabaya: Malaysian Journal of Medicine and Health sciences* (eISSN 2636-9346). Link: <https://medic.upm.edu.my/>. Diakses 10 Maret 2022. Jam: 20:21
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2012.
- Muhammad Abdul ‘Aziz al-Khalidy, *al Istisyfa’ bil Qur’an, Dar al-Kutub al-Ilmiyah*, Beirut Libanon, 1990
- Manuaba. 2016. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB*. Jakarta: EGC
- Nugroho, Taufan. 2014. *Obstetri dan Ginekologi*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Nurarif H. Amin & Kusuka Hari. 2016. *Aplikasi Asuhan Keperawatan Berdasarkan Diagnosa medis dan NANDA (month American Nuraini Diagnosis Association) NIC-NoC*. Mediaction Publishing
- Proverawati, A. & Sulistyawati, E. (2017). *Menopause dan sindrom premenopause*. Yogyakarta: Muha Medika
- Prawihardjo, Sarwono 2016. *Ilmu Kebidanan* :PT. Bina Pustaka. Sarwono Prawirohardjo
- Prawihardjo, Sarwono 2016. *Buku Acuan Nasional Onkologi Ginekologi*: PT. Bina Pustaka. Sarwono Prawirohardjo
- Rasjidi Imam, 2015, *Kanker Servis Dalam Buku Epidemiologi Kanker Pada Wanita*. Jakarta, Daging Sero. Hal 165-166
- Susianti, Sari, A.I. 2017. Potensi Sirsak (*Annona Muricata*) sebagai pencegahan kista ovarium. *Journal of Majority*, 6(2):18-22
- Setyorini,A. (2014). *Kesehatan Reproduksi dan Pelayanan Keluarga Berencana*. In Kista (1st ed.,pp.101-103). Bogor:Penerbit IN MEDIA
- Sjamsuhidajat, R., Prasetyono, T., dan Riwanto, I. 2017. *Buku Ajar Ilmu Bedah: Masalah Pertimbangan Klinis Bedah dan Metode Pembedahan*. Jakarta: EGC

- Salim, Rosa, Amanda. (2015). *Complicated Perimenopause*. PT Gramedis.
- Savitri, Putu, Raka, Sanistia, Sania. Dkk, *Karakteristik Penderita Kista Ovarium di Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar Periode 1 Januari Sampai 30 Juni 2018*. Edusi: Jurnal Medika Udayana, Vol. 9 No.3, Maret, 2020. Link: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eum> doi:10.24843.MU.2020.V9.i3.p15. Diakses 03 juli 2022
- Varney, Halen. *Ilmu Kebidanan (Vaarney's Midwifery 3rd .ed)*. Bandung: Sekeloa Publisher. 2016
- Widyarni, Ari. 2020. *Faktor Resiko kejadian Kista Ovarium Di Poliklinik Kandungan dan Keidanan Rumah Sakit Islam Banjarmasin*. Edusia : Dinamka Kesehatan Jurnal Kepidanan dan Keperawatan Vol 11 no. 1 juli 2020. url: <http://Ojs,dinamikakesehatan.unism.ac.id>. Diakses 10 maret 2022. Jam: 20:15
- Widjanarko, B. 2014. *Menopause*.
- Wiknjosastro, Haifa. 2017. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Winkjosastro, H. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta; Yayasan Bina Pustaka Sarwono prawirohardjo, 2017
- WHO. 2020. *World Health Statistic 2020*. World Health Organization.
- World Health Organization. Indonesia source GLOBOCAN 2018 [Internet], Vol. 256, *International Agency for Research on Cancer*, 2019. Available from: <http://gco.iarc.fr/>. Diakses 10 maret 2022. Jam: 20:10
- Yatim, Faisal. 2014. *Penyakit Kandungan, Myoma Uteri Kanker Rahim dan Indung Telur, Kista, serta gangguan lainnya*. Jakarta: Pustaka Populer Obor
- Zulkarnaen, Y. 2016. *Gejala-gejala Wanita Perimenopause*. Palembang: Departemen Obstetri dan Ginekologi RSMH/Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang

LAMPIRAN

Pendokumentasian Kunjungan Rumah



Kunjungan hari ke 6



Kunjungan hari ke 17



Kunjungan hari ke 24



Gambar Kista Ovarium



Gambar jahitan post operasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 53 Makassar
 Kampus II: Jalan H.M. Yasir Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: fik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2750/Un.06/FKIK/PP.00.9/06/2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 29 Juni 2022

Kepada Yth :
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Duratul Hikmah
 N I M : 70400119018
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar Ahli Madya. Adapun judul karya tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Perimenopause Dengan Kista Ovarium."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.
 2. Firdayanti, S.SiT., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin/persetujuan kode etik .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nasthy Handayani

Tembusan :
 -Dekan FKIK UINAM

Permohonan Pengajuan Kode Etik
 (29 Juni 2022)

ALAUDDIN
MAKASSAR



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.D.075/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : DURATUL HIKMA
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERIMENOPOUSE PADA NY "X" DENGAN
 KISTA OVARIUM DI RS BHAYANGKARA MAKASSAR TAHUN 2022"**


**"MANAGEMENT OF PERIMENOPAUSAL MIDWIFERY CARE FOR MRS "X" WITH
 OVARIAN CYSTS AT BHAYANGKARA HOSPITAL MAKASSAR IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
This declaration of ethics applies during the period August 5, 2022 until August 5, 2023.

August 5, 2022
 Professor and Chairperson.


 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.

M A K A S S A R
 Keterangan Layak Etik
 (05 Agustus 2022)


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Lingsi No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
 Website: dik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3767 Un.06-FKIK/PP.00.9/06/ 2022 Gowa, 30 Juni 2022
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 Di
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Duratul Hikma
 N I M : 70400119018
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
 Semester : VI (Enam)
 Alamat : Samata

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis ilmiah :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Perimenopause Dengan Kista Ovarium."

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andryani A, S.ST.,M.Keb.
 2. Firdayanti S, SIT , M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Rumah Sakit Bhayangkara terhitung mulai tanggal 4 Juli-23 Juli 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.

Wassalam
 Dekan 

 Syatirah

Tembusan :
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(07 Juli 2022)

M A K A S S A R



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 4969/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Kepala RS Bhayangkara Tk. II
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2762/Un.06-FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: DURATUL HIKMA
Nomor Pokok	: 70400119018
Program Studi	: Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. H.M.Yasin Lumopo No 36, Remangi Polong-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA PERIMENOPAUSE DENGAN KISTA OVARIUM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juli s/d 07 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Bertinggal.

Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(07 Juli 2022)

A L A U D D I N
M A K A S S A R

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 620 / UI / 2022 / Rumkit			Diterima Tanggal : 11 / 7 / 2022 Pukul :		Wita
CATATAN URTU			ISI DISPOSISI		
Kepada Yth : Karumkit Bhayangkara Makassar			Waka Rumkit		
Surat dari : Kepala BMS (MITSY)			PPK		
: Prj. S. S. S.			Komite Medik		
Nomor : 4969 / S. 01 / P. 154 / 2022			Subbag Wasintern		
Tanggal Surat : 7 Juli 2022			Ur Wasbin		
Perihal : Izin melakukan penelitian di RS Bhayangkara Makassar			Ur Wasopsyan		
			Subbid Yanmeddokter		
			Komite Keperawatan		
			Ur Yanmed		
			Ur Yanwat		
			Ur Yandokter		
			Subbid Jangmedum		
			Ur Jangmed		
			Ur Jangum		
			Laboratorium		
Diteruskan kepada			Radiologi		
Tanggal			Rehab Medik		
Paraf			Instalasi Farmasi		
			Instalasi Gizi		
			Loundry		
			CSSD		
			IPPRS		
			Subbagrenmin		
			Urmintu		
			Urren		
			Urkeu		
			Logistik		
			Ranmor		
			Subbag Binfung		
			Ur SIM & RM		
			Ur Diklit		
Wakarumkit	11/7/22	H	P		

Surat Izin Diterima Melakukan Penelitian Dari RS Bhayangkara Makassar
 (11 Juli 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

**KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
 BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
 RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR**



SURAT - KETERANGAN

Nomor : S.Ke/ 70 / XI / KES.2.6 / 2022 / Rumkit

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
 Pangkat / NRP : AKP / 69120379
 Jabatan : KAUR DIKLIT SUBBAG BINFUNG
 Kesatuan : RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR

Dengan ini menerangkan bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keterangan ini telah melakukan penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 7 November 2022

a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.



DARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

LAMPIRAN SURAT KARUMKIT BHAYANGKARA
 NOMOR : S.Ke/ 70 / XI / KES.2.6 / 2022 / Rumkit
 TANGGAL : 7 November 2022

**DAFTAR NAMA YANG TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
 DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA MAKASSAR**

NO	NAMA	STAMBUK	JUDUL
1.	DARATUL HIKMAH	704001190018	MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA PERIMENOPAUSE DENGAN KISTA OVARIUM DI RS. BHAYANGKARA MAKASSAR

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : 7 November 2022

a.n. KARUMKIT BHAYANGKARA MAKASSAR
 KASUBBAG BINFUNG
 u.b.



DARDIN, S.Kep Ns, M.Kep
 AJUN KOMISARIS POLISI NRP 69120379

Surat Keterangan Selesai Penelitian dari RS Bhayangkara Makassar
 (07 November 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Duratul Hikma
 Nim : 70400119018
 T.T.L : Lengko Padang, 20 Oktober 2002
 Suku : Flores
 Agama : Islam
 Alamat : Lengko Padang, Flores, Nusa Tenggara Timur
 Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Burhan
 b. Ibu : Didi

B. Riwayat Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Temba Lajar : 2007-2013
 Madrasah Tsanawiyah Negeri Manggarai Timur : 2013-2016
 Madrasah Aliyah Negeri Manggarai Timur : 2016-2019
 UIN Alauddin Makassar : 2019-2022