

STUDI LITERATUR AKTIVITAS FARMAKOLOGI TUMBUHAN

BAWANG DAYAK (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

FISKAL ARDIAN
NIM : 70100116066

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fiskal Ardian
Nim : 70100116066
Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 10 April 1998
Jurusan : Farmasi
Alamat : Balikpapan
Judul : Studi Literatur Aktivitas Farmakologi Tumbuhan
Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau, dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini tidak sah dan melanggar hukum.

Makassar, 14 November 2022

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FISKAL ARDIAN
70100116066
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Studi Literatur Aktivitas Farmakologi Tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)” yang disusun oleh Fiskal Ardian, NIM : 70100116066, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 November 2022 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 14 November 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc	(.....)
Penguji I	: Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Literatur Aktivitas Farmakologi Tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia L. Merr*)**” yang disusun oleh **Fiskal Ardian, NIM : 70100116066**, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 November 2022 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 November 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaludin, Sp.A., M.Kes (.....)

Sekretaris : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si (.....)

Pembimbing I : Haeria, S.Si., M.Si (.....)

Pembimbing II : Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc (.....)

Penguji I : Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A (.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes

NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Studi Literatur Aktivitas Farmakologi Tumbuhan Bawang Dayak (*Eluetherine palmifolia* L. Merr)” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyelesaian penelitian dan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang selalu membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini.

Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, ibunda Dr. Hj. Winarsih, M.Pd. dan ayahanda Kol. H. Mustafa Mas, S.T., M.H. yang tidak pernah berhenti untuk terus memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dengan seluruh kasih sayangnya, baik berupa moril terlebih lagi dalam bentuk materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik. Untuk saudara-saudaraku yang sangat luar biasa Muhammad Iqbal Danarto dan Bima Panglima, serta sahabat-sahabatku yang sangat luar biasa Kiori Akbar Kurniawan, Bima Wahyu Aditya, Fariz Bayu Taufik Azhar dan Yoki Priyo Yusmiko beserta keluarga besarku tercinta yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. Fais Satrinegara, S.KM., MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Haeria, S,Si., M.,Si selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.

13. Bapak apt. Asrul Ismail S.Farm., M.Sc selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Ibu apt. Mukhriani, S.Si., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Ibu Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A selaku Penguji Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Farmasi, atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang telah diberikan hingga saat ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 14 November 2022

Penulis

FISKAL ARDIAN
70100116066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II METODE.....	5
2.1 Strategi Pencarian Literatur.....	5
2.1.1 Framework.....	5
2.1.2 Kata kunci.....	7
2.1.3 Database.....	7
2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	7
2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitas.....	8
2.3.1 Hasil Pencarian dan Seleksi Studi.....	8
2.3.2 Daftar Artikel Hasil Pencarian Artikel.....	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS.....	13
3.1 Hasil.....	14
3.2 Analisis.....	14
BAB IV PEMBAHASAN.....	28
4.1 Tinjauan Teoritis Tumbuhan Bawang Dayak.....	28
4.1.1 Klasifikasi Tumbuhan.....	28
4.1.2 Nama Daerah atau Nama Lain.....	29
4.1.3 Morfologi Tumbuhan.....	29
4.2 Pembahasan Hasil.....	30

4.2.1 Kandungan Fitokimia.....	30
4.2.1.1 Anthraquinone	38
4.2.1.2 Naphthalene.....	38
4.2.1.3 Naphthoquinone	39
4.2.1.4 Flavanoid.....	39
4.2.1.5 Tanin.....	40
4.2.1.6 Alkaloid.....	40
4.2.1.7 Saponin.....	41
4.2.1.8 Steroid/Terpenoid.....	41
4.2.1.9 Fenolik.....	41
4.2.1.10 Glikosida	42
4.2.2 Bioaktivitas.....	42
4.3 Tinjauan Teori Bioaktivitas Tumbuhan Bawang Dayak.....	44
4.3.1 Antibakteri.....	44
4.3.2 Antioksidan	46
4.3.3 Antikanker	47
4.3.4 Kardiovaskular	48
4.3.5 Antiosteoporosis	49
4.3.6 Antimalaria.....	50
4.3.7 Antidiabetes.....	51
4.3.8 Antijamur	54
4.4 Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan Bawang Dayak	55
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Framework.....	5
Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	7
Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur.....	8
Tabel 4. Daftar artikel yang dianalisis.....	9
Tabel 5. Hasil Analisis.....	14
Tabel 6. Kandungan Senyawa <i>Eleutherine palmifolia</i>	30
Tabel 7. Bioaktivitas <i>Eleutherine palmifolia</i>	42



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Kerangka Penelitian.....6

Gambar 2. (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Situs Pencarian Pustaka.....	67
Lampiran 2. Daftar artikel yang dianalisis.....	73
Lampiran 3. Gambar Tumbuhan Bawang Dayak.....	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Fiskal Ardian
Nomor Induk Mahasiswa : 70100116066
Judul Penelitian : Studi Literatur Aktivitas Farmakologi Tumbuhan
Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)

Latar belakang Tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) merupakan tanaman herbal fungsional yang telah banyak diteliti untuk berbagai kandungan fitokimia dan bioaktivitasnya dalam memelihara kesehatan tubuh maupun mengobati penyakit. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui kandungan senyawa fitokimia yang terkandung dalam tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) serta bioaktivitasnya. **Metode** pada penelitian ini yaitu menggunakan metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari database atau *search engine* yang digunakan yaitu *Google scholar, pubmed, dan sciencedirect*. **Hasil** dari analisis jurnal ditemukan 249 jurnal kemudian dilakukan identifikasi, skringing, dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian dari 22 jurnal ditemukan 108 kandungan senyawa fitokimia yang terdapat dalam tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr). Senyawa anthraquinone, naphthalene dan naphthoquinone adalah konstituen utama dari tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr). Terdapat pula beberapa bioaktivitas dari tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) diantaranya sebagai antibakteri, antioksidan, antikanker, antiosteoporosis, antimalaria, antidiabetes, antijamur dan penyakit kardiovaskular. **Kesimpulan** tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) memiliki banyak kandungan fitokimia yang bermanfaat serta memiliki beberapa bioaktivitas yang berpotensi sebagai alternatif pengobatan.

Kata kunci : Bawang Dayak, *Eleutherine palmifolia*, *bioactivities, phytochemical Compounds*.

ABSTRACT

Name : Fiskal Ardian
Student ID Number : 70100116066
Research Title : Literature Study of Pharmacological Activity of
Dayak Onion (*Eleutherine palmifolia* L. Merr)

Background *Eleutherine palmifolia* is a functional herbal plant that has been widely studied for various purposes. Phytochemical content and bioactivity in maintaining body health or treat disease. **Destination** this study was to determine the content of phytochemical compounds contained in the *Eleutherine palmifolia* plant and its bioactivity. **Method** in this research is using the PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) method that match the inclusion and exclusion criteria of the database or search engine used are Google scholar, pubmed, and sciencedirect. **Results** of journal analysis found 249 journals then identification, screening, by looking at the inclusion and exclusion criteria. Research results from 22 journals found 108 phytochemical compounds contained in *Eleutherine palmifolia* plants. Anthraquinone, naphthalene and naphthoquinone are the main constituents of the *Eleutherine palmifolia* plant. There is also some bioactivity of *Eleutherine palmifolia* plants include: antibacterial, antioxidant, anticancer, antiosteoporosis, antimalarial, antidiabetic, antifungal and cardiovascular disease. **Conclusion** *Eleutherine palmifolia* contains many useful phytochemicals and has several bioactivities that have potential as alternative treatments.

Keywords : Bawang Dayak, *Eleutherine palmifolia*, bioactivities, phytochemical Compounds.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis kesehatan yang dialami oleh masyarakat diseluruh Dunia terkait pandemi COVID-19 tahun 2020 mampu mengubah kehidupan manusia, salah satunya yaitu mengenai kesehatan tubuh. Peningkatan sistem kekebalan (*immune*) tubuh yang menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah penularan COVID-19. Sistem kekebalan tubuh dapat ditingkatkan dengan salah satunya yaitu memanfaatkan/mengonsumsi tanaman obat yang memiliki efek farmakologis. Beberapa efek/aktivitas farmakologis tersebut seperti: sebagai antiinflamasi, antikanker, antidiabetes, antimikroba, antihipertensi dan antivirus. Salah satu jenis tanaman obat yang telah banyak dikembangkan, khususnya di daerah Kalimantan karena manfaatnya, yaitu bawang dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) sebagai tanaman obat. Bahkan, sekarang tanaman tersebut sudah mulai dikembangkan untuk daerah di luar Kalimantan, seperti di daerah Jawa dan Bali. (Ekawati, 2020)

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang di kenal memiliki keanekaragaman obat tradisional yang dibuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia, termasuk tanaman obat di Indonesia terdapat sekitar 35.000 jenis tanaman dan 8000 diantaranya memiliki khasiat obat. Keanekaragaman sumberdaya hayati bumi Indonesia diperkirakan menempati urutan kedua di Dunia. (Jumiarni, 2017)

Kalimantan masih memiliki potensi sumberdaya alam hayati yang melimpah. Potensi hutan dan tanaman masih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

bagian dari kehidupan mereka, baik sebagai sumber bahan makanan maupun sebagai sumber bahan obat alternatif. Banyak tanaman yang banyak memiliki manfaat tapi harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan, baik karena pembukaan lahan baru maupun untuk lahan pertambangan. Salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif oleh masyarakat Kalimantan adalah bawang dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr). (Prayitno, 2018)

Eleutherine palmifolia adalah tanaman herbal yang termasuk dalam famili Iridaceae, merupakan pangan fungsional yang dapat dimakan yang tersebar di Amerika, Asia Tenggara dan Afrika Selatan. Umbi merah tanaman ini telah umum digunakan dalam masakan Asia dan juga telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan berbagai penyakit diantaranya yaitu penyakit jantung, diabetes, kanker payudara, hipertensi, stroke, gangguan seksual, dan terutama gangguan coroner. (Chen et al, 2019)

Eleutherine palmifolia merupakan tanaman yang berasal dari Amerika Latin dan tersebar ke Asia. Tanaman ini secara turun temurun telah digunakan masyarakat Dayak Kalimantan sebagai tanaman obat alternatif. Kandungan metabolit sekunder tanaman ini antara lain alkaloid, flavonoid, tanin, glikosida, steroid/triterpenoid, saponin, fenolik, polisakarida, dan azulen. Selain itu umbi tanaman ini mempunyai berbagai aktivitas farmakologi, yaitu antioksidan, aktivitas tabir surya, antiinflamasi, antidiabetes, antiagregasi platelet, antibakteri, antijamur, antikanker, dan antiamoeba (Naspiah, 2014)

Bagian bawang dayak yang sering digunakan adalah bagian umbi, selain itu daun juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat alternatif. Salah satu senyawa utama yang terkandung dalam bawang dayak, di antaranya adalah golongan

naftakuinon dan beberapa turunannya. Naftakuinon banyak dihubungkan dengan aktivitas antijamur, antiparasit, antivirus, antimikroba, antioksidan dan antikanker. Senyawa fitokimia hasil isolasi yang terkandung pada umbi bawang dayak diantaranya elecanacin, eletherine, eletherol, eleuthoside B, isoeletherine, eleuthone, eletherinone dan isoeleuthoside C (Prayitno, 2018)

Kebutuhan lahan yang meningkat akibat pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat menjadi ancaman bagi keanekaragaman hayati. Islam telah mengajarkan kepada kita untuk melakukan konservasi agar alam dan ekosistem dapat terjaga. Islam mengajarkan untuk melakukan perlindungan keanekaragaman hayati mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya sebagai tanaman obat yang ditunjukkan melalui al-Qur'an dan hukum Islam (Amanda et al, 2021)

Melihat pentingnya tanaman *Eleutherine palmifolia* bagi masyarakat dengan banyaknya aktivitas farmakologi yang ditunjukkan, maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pengetahuan tentang kandungan fitokimia dan aktivitas farmakologi dari tumbuhan bawang dayak dengan tujuan dapat menjadi landasan bagi penelitian yang lebih lanjut terkait pembuatan dan pengembangan sediaan obat dari tumbuhan bawang dayak. Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian melalui studi literatur tentang aktivitas farmakologi tumbuhan bawang dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) untuk mendapatkan gambaran dalam mengembangkan bawang dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) sebagai tanaman obat.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana aktivitas farmakologi Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) menurut penelitian yang telah dilaporkan ?
- 1.2.2 Apa kandungan senyawa fitokimia dari Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui aktivitas farmakologi dari Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr).
- 1.3.2 Untuk mengetahui senyawa fitokimia dari Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat terhadap potensi yang dimiliki tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr).

1.4.2 Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan obat tradisional dari tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr).

BAB II METODE

2.1 *Strategi Pencarian Literatur*

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian penelitian dengan menggunakan teknik mengumpulkan data, menyeleksi, membaca dan menganalisa data, serta menarik kesimpulan dari data pustaka dan kajian kepustakaan yang diolah dalam proses penelitian.


2.1.1 Framework


Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (Population, Interventions, Comparison dan Outcome)

Tabel 1. *Framework*

P	I	C	O
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode penentuan senyawa fitokimia dan aktivitas farmakologi Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Perbedaan aktivitas farmakologi Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr) antar penelitian	Aktivitas farmakologi dan kandungan fitokimia Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut :





Gambar 1. Kerangka penelitian

2.1.2 Kata kunci

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu Aktivitas Farnakologi Tumbuhan Bawang Dayak, Senyawa Bioaktif Tumbuhan Bawang Dayak, *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*, *Compounds of Eleutherine palmifolia*.

2.1.3 Data base atau search engine

Data base atau search engine yang digunakan dalam penelusuran artikel yaitu *Google Scholar*, *PubMed* dan *Science direct*.

2.2 Kriteria Inklusi dan Eksklusi dalam Seleksi Studi

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada table dibawah ini :

Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021) 2. Subjek penelitian yaitu Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr) 3. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> 4. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serrial Number</i> (ISSN) atau <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) 5. Ketersediaan naskah <i>full text & open access</i> 6. Berbahasa Indonesia atau Bahasa Inggris 7. Jurnal telah terindeks sinta atau quartil	1. Jurnal yang sama 2. Metode penelitian tidak jelas

2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitatif

2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi

Berdasarkan hasil pencarian artikel dari *data base* atau *search engine* yang digunakan maka didapatkan artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi untuk selanjutnya diidentifikasi secara rinci seperti yang terdapat pada table berikut :

Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur

Data base	Kata Kunci	Jumlah Artikel		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
Google Scholar	Aktivitas Bawang Dayak	10	8	5
	Kandungan Bawang Dayak			
	<i>Bioactivities of Eleutherine palmifolia</i>			
	<i>Compounds of Eleutherine palmifolia</i>			
Science Direct	Aktivitas Bawang Dayak	90	72	10
	Kandungan Bawang Dayak			
	<i>Bioactivities of Eleutherine palmifolia</i>			
	<i>Compounds of Eleutherine palmifolia</i>			
PubMed	Aktivitas Bawang Dayak	29	40	7
	Kandungan Bawang Dayak			
	<i>Bioactivities of Eleutherine palmifolia</i>			
	<i>Compounds of Eleutherine palmifolia</i>			
Total artikel yang akan dianalisis dan dibahas				22

2.3.2 Daftar hasil pencarian artikel

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah yang memuat judul, penulis dan tahun, nomor ISSN/DOI, database dan kriteria jurnal :

Tabel 4. Daftar artikel yang dianalisis

No	Judul	Penulis dan Tahun	ISSN/DOI	Database	Kriteria Jurnal
1.	Heat assisted extraction of phenolic compounds from <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) bulb and its bioactive profiles using response surface methodology	Ammar et al., 2020	0926-6690	Science direct	Q1
2.	Evaluation of the genotoxicity and mutagenicity of isoeleutherin and eleutherin isolated from <i>Eleutherine plicata</i> herb. Using bioassays and in silico approaches	Laura et al., 2021	1878-5352	Science direct	Q1
3.	Influence of Extracting Solvents on its Antioxidant Properties of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Anggi et al., 2016	2319-4464	PubMed	Q1
4.	Anticoagulant Activity of Dayak Onion Bulb (<i>Eleutherine bulbosa</i>) Extract on Human Blood Samples	Anik et al., 2021	2580-4936	Google scholar	S4
5.	Effects of Dayak Onion Bulbs (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb on Bone Development of the Hipoestrogen Model Rat	Anton & Riza, 2018	0975-3575	Google scholar	Q3

6.	Antiosteoporosis Effects of 70% Ethanollic Extract Combination of Dayak Onion Bulbs (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb) and Cowpea (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.) on the Hypoestrogen Rats	Anton & Renita, 2019	0975-3575	Google scholar	Q3
7.	Toxicity evaluation of <i>Eleutherine plicata</i> Herb. extracts and possible cell death mechanism	Antonio et al., 2021	2214-7500	Science direct	Q1
8.	<i>Eleutherine americana</i> as a growth promotor for infant intestinal microbiota	Atchara et al., 2013	1075-9964	Science direct	Q2
9.	New Naphthalene Derivatives from the Bulbs of <i>Eleutherine americana</i> with Their Protective Effect on the Injury of HUVECs	Chen et al., 2018	14203049	PubMed	Q1
10.	New naphthoquinones derivatives from the edible bulbs of <i>Eleutherine americana</i> and their protective effect on the injury of human umbilical vein endothelial cells	Chen et al., 2019	0367-326X	Science direct	Q1
11.	Hyperglycemic control and diabetes complication preventive activities of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr.) bulbs extracts in alloxan-diabetic rats	Febrinda et al., 2014	19854668	PubMed	Q3

12.	Oral Glucose Tolerance Activity of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr.) Bulbs Extract Based on the Use of different Extraction Method	Islamudin et al., 2018	10.5530/Pj.2018.1.10	Google scholar	S3
13.	Antibacterial activity of <i>Eleutherine bulbosa</i> against multidrug-resistant Bacteria	Laxmipriya et al., 2015	2211-5587	Science direct	Q1
14	The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of <i>Eleutherine palmifolia</i> (L). Merr Bulbs Against <i>Candida albicans</i> and <i>Trichophyton mentagrophytes</i>	Masfria et al., 2019	1857-9655	PubMed	Q3
15.	<i>In Vitro</i> Phytochemical and Inhibitory Potential Tests of Buton Forest Onion Extract (<i>Eleutherine palmifolia</i>) on <i>Vibrio harveyi</i>	Munaeni et al., 2017	1978-3477	PubMed	Q1
16.	Antagonistic activity of <i>Eleutherine palmifolia</i> Linn	Kalidass et al., 2012	22221808	Science direct	Q4
17.	α -Glucosidase inhibitors from the bulb of <i>Eleutherine Americana</i>	Tomohiro et al., 2011	0308-8146	Science direct	Q1
18.	Naphthoquinones isolated from <i>Eleutherine plicata</i> herb: in vitro antimalarial activity and molecular modeling to investigate their binding modes	Valdicley et al., 2020	1554-8120	PubMed	Q2

19.	The Potential of Buton Forest Onion <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. Extract as a Prebiotic and an Antioxidant	Waode et al., 2020	13385178	Science direct	Q3
20.	Effect in white shrimp <i>Litopenaeus vannamei</i> of <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. Powder on immune genes expression and resistance against <i>Vibrio parahaemolyticus</i> infection	Waode et al., 2020	1050-4648	Science direct	Q1
21.	Effects of Inhibition Cell Cycle and Apoptosis of Sabrang Onion extract (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.) on Breast Cancer Cells	Yanti et al., 2014	0974-4304	PubMed	Q3
22.	The Effect of Ethanolic Extract of Dayak Onion (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr) Tuber on Blood Glucose and Insulin Level of Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rat.	Yaturra madhan et al., 2019	2320-4850	Google scholar	Q4

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.3.2 Hasil

Pada pencarian jurnal melalui database *google scholar* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas Bawang Dayak, Kandungan Bawang Dayak, *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*, dan *Compounds of Eleutherine palmifolia*. Diperoleh sebanyak 18 jurnal yang sesuai dengan judul.

Pada pencarian jurnal melalui database *science direct* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas Bawang Dayak, Kandungan Bawang Dayak, *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*, dan *Compounds of Eleutherine palmifolia*. Diperoleh sebanyak 162 jurnal yang sesuai dengan judul.

Pada pencarian jurnal melalui database *pubmed* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas Bawang Dayak, Kandungan Bawang Dayak, *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*, dan *Compounds of Eleutherine palmifolia*. Diperoleh sebanyak 69 jurnal yang sesuai dengan judul.

Hasil identifikasi dari ketiga database pencarian berdasarkan kata kunci yang ditetapkan maka ditemukan 249 jurnal, kemudian setelah dilakukan identifikasi, skrining, dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi, jurnal yang memenuhi syarat hanya terdapat 56 jurnal. Sehingga untuk analisis jurnal diperoleh sebanyak 22 jurnal.

3.2 Analisis

Tabel 5. Hasil Analisis

No	Judul Penulis dan Tahun	Population	Intervention	Comparsion	Outcome	
					Kandungan fitokimia	Bioaktivitas
1.	Heat assisted extraction of phenolic compounds from <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) bulb and its bioactive profiles using response surface methodology (Ammar et al., 2020)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol. Metode pengujian senyawa ekstrak diuji dengan <i>response surface methodology</i> (RSM) kemudian senyawa dianalisis melalui HPLC. Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antioksidan di uji melalui free radical scavenging activity assay (DPPH) dan scavenging activity assay (ABTS)	Penentuan kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas antioksidan	Analisis HPLC mengungkapkan delapan konstituen biologis aktif seperti eleutherine, asam galat, asam klorogenat, quercetin, kaempferol, rutin, epicatechin gallate, dan myricetin.	Sebagai antioksidan
2.	Evaluation of the genotoxicity and mutagenicity of	Tumbuhan Bawang Dayak	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui	Penentuan kandungan senyawa	Hasil fraksinasi ekstrak etanol menunjukkan isoeleutherine Rf =	Genotoksisitas dan mutagenisitas isoeleutherin dan

	isoeleutherin and eleutherin isolated from <i>Eleutherine plicata</i> herb. Using bioassays and in silico approaches (Laura et al., 2021)	(<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	metode refluks dengan etanol 96. Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi dengan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antikanker di uji melalui metode in silico.	kimia dan bioaktivitas antikanker	0,40 dan eleutherine Rf = 0,50	eleutherin menunjukkan interaksi senyawa ini dengan TOPO II.
3.	Influence of Extracting Solvents on its Antioxidant Properties of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr) (Anggi et al., 2018)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol. Metode pengujian senyawa penentuan kandungan fenolik total (TPC) dan pengujian kandungan flavonoid total (TFC). Metode pengujian bioaktivitas penentuan aktivitas antioksidan total menggunakan uji DPPH.	Penentuan senyawa kimia dan aktivitas antioksidan.	TPC ekstrak berkisar dari $\pm 50,9.150$ mg GAE/g DM untuk etanol 100% hingga $20,05 \pm 0,06$ mg GAE/g DM untuk 70% metanol. TFC ekstrak yang diperoleh 2.79 ± 0.32 mg QE/ g DM for 100% ethanol to 15.03 ± 0.11 mg QE/ g DM for 70% methanol.	Hasil uji DPPH menunjukkan ekstrak menghasilkan aktivitas antioksidan.
4.	Anticoagulant Activity of <i>Dayak</i> Onion Bulb (<i>Eleutherine bulbosa</i>)	Tumbuhan Bawang Dayak	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui	Penentuan aktivitas koagulan pada	Umbi mengandung senyawa eleutherinol	Ekstrak umbi Bawang Dayak pada konsentrasi

	<p>Extract on Human Blood Samples</p> <p>(Anik et al., 2021)</p>	<p>(<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>metode maserasi dengan pelarut etanol 96.</p> <p>Metode pengujian senyawa analisis pembekuan darah dengan menambahkan ekstrak dilakukan dengan metode in vitro.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas aktivitas koagulan melalui uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji Levene dan analisis melalui uji post hoc.</p>	<p>sampel darah manusia.</p>	<p>turunan naphthoquinone.</p>	<p>10, 12,5, 16, 25, dan 50% memiliki aktivitas antikoagulasi terhadap darah manusia.</p>
5.	<p>Effects of Dayak Onion Bulbs (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb on Bone Development of the Hipoestrogen Model Rat</p> <p>(Anton & Riza, 2018)</p>	<p>Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 70.</p> <p>Metode pengujian senyawa tikus putih betina sebanyak 36 ekor Sprague-Dawley dibagi menjadi 6 kelompok. Semua 6 kelompok menerima CMC Na 0,5% (grup palsu), CMC Na 0,5% (kelompok negatif),</p>	<p>Penentuan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai anti osteoporosis</p>	<p>Ekstrak etanol 70% umbi bawang dayak mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, steroid/triterpenoid, dan kuinon.</p>	<p>Sebagai antiosteoporosis</p>

			<p>tamoxifen (kelompok positif), tiga taraf dosis ekstrak umbi bawang dayak yaitu dosis 8 mg/200 g, 12 mg/200 g, dan 18 mg/200 g.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas dilakukan pengukuran kadar kalsium tulang, berat tulang, dan panjang tulang dengan Spektrofotometri Serapan Atom.</p>			
6.	<p>Antiosteoporosis Effects of 70% Ethanol Extract Combination of Dayak Onion Bulbs (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb) and Cowpea (<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.) on the Hypoestrogen Rats</p> <p>(Anton & Renita, 2019)</p>	<p>Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol.</p> <p>Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi menggunakan LC-MS/MS dan pemisahan menggunakan KLT.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas pada hewan coba dilakukan evaluasi parameter (Kalsium</p>	<p>Penentuan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai anti osteoporosis.</p>	<p>Hasil identifikasi dengan LC-MS/MS lima senyawa yang paling banyak terkandung dalam ekstrak umbi bawang dayak adalah 2,4,7-Trihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene, cuspidatumin A, dendromoniliside E, liquiritigenin, dan natsudaidain.</p>	<p>Kombinasi umbi bawang dayak dan ekstrak kacang tunggak dapat dikembangkan menjadi obat osteoporosis.</p>

			tulang tibia tikus dan berat tulang tibia tikus) selanjutnya dilakukan analisis histologi dan analisis statistic (uji homogenitas dan uji distribusi normal.			
7.	Toxicity evaluation of <i>Eleutherine plicata</i> Herb. extracts and possible cell death mechanism (Antonio et al., 2021	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi umbi disekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96. Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi menggunakan High Performance Liquid Chromatographic (HPLC) dan Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Metode pengujian bioaktivitas uji toksisitas melalui in vitro dan in vivo	Penentuan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai antimalarial.	Tumbuhan Bawang Dayak mengandung senyawa naphthoquinones dan turunannya eleutherin, eleutherol, dan isoeleutherin.	Sebagai antimalarial
8.	<i>Eleutherine americana</i> as a growth promotor for infant intestinal microbiota	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine</i>	Metode ekstraksi umbi disekstraksi melalui metode maserasi.	Penentuan bioaktivitas sebagai antimikroba	Ekstrak umbi Bawang Dayak terdiri dari gula total 6,20 g/100	Sebagai antimikroba dan sebagai prebiotik potensial yang

	(Atchara et al., 2013)	<i>palmifolia</i> L. Merr)	<p>Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi menggunakan spektrometer massa kromatografi cair (LC-MS) dan dianalisis menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC).</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas uji antimikroba dilakukan secara in vitro</p>		g dan gula pereduksi 1,55 g/100 g berdasarkan berat kering.	dapat ditambahkan sebagai bahan dalam makanan fungsional.
9.	New Naphthalene Derivatives from the Bulbs of <i>Eleutherine americana</i> with Their Protective Effect on the Injury of HUVECs (Chen et al., 2018)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	<p>Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut metanol pada suhu kamar selama 24 jam.</p> <p>Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT), penentuan struktur senyawa dengan UV, IR, H-NMR, C-NMR, H-H COSY,</p>	Penentuan senyawa kimia dan aktivitas antidiabetes.	Hasil isolasi mendapatkan senyawa eleutherol A-C dan eleuthinone B-C.	Sebagai antidiabetes

			HSQC, HMBC, NOESY dan HR-ESI-MS. Metode pengujian bioaktivitas senyawa diuji menggunakan metode MTT			
10.	New naphthoquinones derivatives from the edible bulbs of <i>Eleutherine americana</i> and their protective effect on the injury of human umbilical vein endothelial cells (Chen et al., 2019)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut metanol. Metode pengujian senyawa ekstrak diidentifikasi dengan kromatografi lapis tipis (KLT) dan dianalisis menggunakan HPLC	Penentuan kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai anti kardiovaskular	Tujuh turunan naphthoquinone baru eleutherine A-G	Senyawa eleutherine dapat memberikan efek terhadap penyakit kardiovaskular.
11.	Hyperglycemic control and diabetes complication preventive activities of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr.) bulbs extracts in alloxan-diabetic rats (Febrinda et al., 2014)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol. Metode pengujian senyawa ekstrak diuji dengan Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antiabetes dilakukan	Penentuan kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai antidiabetes	Hasil pengukuran NMR menunjukkan adanya eleutherinoside A, eleuthoside B, dan eleutherol.	Sebagai antidiabetes

			dengan metode in vitro dan in vivo.			
12..	Oral Glucose Tolerance Activity of Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr.) Bulbs Extract Based on the Use of different Extraction Method (Islamudin et al., 2018)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi, refluks dan soxhlet dengan pelarut metanol. Metode pengujian bioaktivitas Pengukuran penurunan glukosa darah dilakukan dengan menggunakan tes toleransi glukosa oral in vivo dan dianalisis menggunakan perbandingan statistik (Two-Way-ANOVA).	Penentuan bioaktivitas sebagai antidiabetes	Berdasarkan masing-masing hasil ekstraksi diperoleh rendemen sebesar 8,636% (metode refluks), 11,87% (metode maserasi), dan 14,023% (metode soxhlet).	Sebagai antidiabetes
13.	Antibacterial activity of <i>Eleutherine bulbosa</i> against multidrug-resistant Bacteria (Laxmipriya et al., 2015)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etil asetat, kloroform, butanol, etanol dan air. Metode pengujian senyawa dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis (KLT)	Penentuan kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai antibakteri.	Beberapa senyawa aromatik dan glikosidanya seperti eleutherinone, eleutherine, isoeleutherine, eleutherol, (R)-4-hydroxyeleutherin, eleuthone, isoeleuthoside C, eleutherinol 8-	Sebagai antibakteri terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> and <i>Shigella boydii</i>

			Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antibakteri di lakukan menggunakan metode cawan agar.		O-BD-glukosida terdapat dalam Bawang Dayak.	
14.	<i>In Vitro</i> Phytochemical and Inhibitory Potential Tests of Buton Forest Onion Extract (<i>Eleutherine palmifolia</i>) on <i>Vibrio harveyi</i> (Munaeni et al., 2017)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96% pada suhu kamar selama 24 jam. Metode pengujian senyawa skiring fitokimia melalui metode visualisasi warna. Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antibakteri melalui uji potensi hambatan (metode difusi agar) dilanjutkan dengan metode in vitro (metode co-culture)	Penentuan kandungan senyawa kimia dan aktivitas antibakteri.	Hasil uji fitokimia menunjukkan adanya senyawa flavonoid, tanin, saponin, kuinon, steroid dan triterpenoid, namun negatif atau tidak mengandung senyawa alkaloid dengan menggunakan pereaksi Dragendorff, Meyer dan Wagner.	Sebagai antibakteri terhadap bakteri <i>Vibrio harveyi</i>
15.	The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of <i>Eleutherine palmifolia</i> (L). Merr Bulbs Against <i>Candida</i>	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine</i>	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode perkolasi dengan pelarut n heksan.	Penentuan bioaktivitas sebagai antijamur.	Ekstrak n-heksan dari Bawang Dayak mengandung senyawa steroid/terpenoid sedangkan umbi kering	Ekstrak n-heksan Bawang Dayak memiliki aktivitas antijamur yang lebih kuat

	<i>albicans</i> and <i>Trichophyton mentagrophytes</i> (Masfria et al., 2019)	<i>palmifolia</i> L. Merr)	Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antijamur di uji terhadap <i>Candida albicans</i> dan <i>Trichophyton mentagrophytes</i> dengan metode difusi menggunakan kertas cakram.		memiliki golongan senyawa yang lengkap, yaitu alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, glikosida, dan steroid/ terpenoid.	terhadap <i>Trichophyton mentagrophytes</i> dan <i>Candida albicans</i> .
16.	Antagonistic activity of <i>Eleutherine palmifolia</i> Linn (Kalidass et al., 2012)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol. Metode pengujian senyawa ekstrak dianalisis dengan Kromatografi gas spektrometri massa (GC-MS). Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antimikroba dilakukan dengan metode cawan agar.	Penentuan kandungan senyawa kimia dan bioaktivitas sebagai antimikroba.	Ekstrak etanol umbi menunjukkan adanya Fenol, Sterol, Protein, Steroid, Tanin, Gula pereduksi dan Terpenoid	Ekstrak etanol Bwang Dayak resisten terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Acinetobacter baumannii</i>
17.	α -Glucosidase inhibitors from the bulb of <i>Eleutherine Americana</i>	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine</i>	Metode ekstraksi umbi diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol.	Penentuan kandungan senyawa kimia dan	Penentuan struktur dengan analisis massa dan NMR mengungkapkan	Sebagai antidiabetes

	(Tomohiro et al., 2011)	<i>palmifolia</i> L. Merr)	Metode pengujian senyawa ekstrak di uji dengan kromatografi dan analisis menggunakan HPLC. Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antidiabetes dilakukan dengan NMR	bioaktivitas sebagai antidiabetes.	bahwa senyawa yang diisolasi ini adalah eleutherol, eleutherinosida A,dan eleutosida B	
18.	Naphthoquinones isolated from <i>Eleutherine plicata</i> herb: in vitro antimalarial activity and molecular modeling to investigate their binding modes (Valdicley et al., 2020)	Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)	Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan palarut etanol selama 7 hari. Metode pengujian senyawa ekstrak dievaluasi menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi dengan detektor susunan dioda (HPLC-DAD). Metode pengujian bioaktivitas aktivitas antimalarial secara in vitro kemudia dilakukan molekuler docking.	Penentuan senyawa kimia dan aktivitas antimalarial.	Analisis HPLC-DAD menunjukkan adanya senyawa naftokuinon, eleutherine,dan isoeletherine yang berpotensi sebagai antiplasmodial.	Sebagai antiplasmodial/ Antimalarial.
19.	The Potential of Buton Forest Onion	Tumbuhan Bawang	Metode ekstraksi sampel diekstraksi	Penentuan senyawa	Tingginya kemampuan antioksidan dalam	Sebagai antioksidan.

	<p><i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. Extract as a Prebiotic and an Antioxidant</p> <p>(Waode et al., 2020)</p>	<p>Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96% selama 48 jam.</p> <p>Metode pengujian senyawa ekstrak oligoskaria ditentukan menggunakan HPLC.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas aktivitas BFOE dalam stimulasi pertumbuhan probiotik dianalisis menggunakan metode spektrofotometri dan aktivitas antioksidan diuji melalui metode DPPH.</p>	<p>kimia dan aktivitas antioksidan.</p>	<p>penelitian ini diduga karena pengaruh senyawa fitokimia yang terkandung dalam BFOE seperti golongan xanthone, isoquinolines, naphtalenes, dan phenolic.</p>	
20.	<p>Effect in white shrimp <i>Litopenaeus vannamei</i> of <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. Powder on immune genes expression and resistance against <i>Vibrio parahaemolyticus</i> infection</p> <p>(Waode et al., 2020)</p>	<p>Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas suplementasi ekstrak diberikan pada hewan coba <i>Litopenaeus vannamei</i></p>	<p>Penentuan bioaktivitas sebagai antibakteri</p>	<p>Beberapa poliketida seperti eleutherinol (eleutherinol-8-OD-glucoside) dan isoeleuthoside C (dihydroisoeleutherin-5-OD-gentiobioside) ditemukan dalam Bawang Dayak.</p>	<p>Sebagai antibakteri terhadap <i>Vibrio Parahaemolyticus</i></p>

21.	<p>Effects of Inhibition Cell Cycle and Apoptosis of Sabrang Onion extract (<i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb.) on Breast Cancer Cells</p> <p>(Yanti et al., 2014)</p>	<p>Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut n-heksana, etil asetat dan etanol.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas uji sitotoksik (menggunakan uji kolorimetri MTT) kemudian sampel dianalisis menggunakan uji flowcytometry.</p>	<p>Penentuan bioaktivitas sebagai antikanker.</p>	<p>Umbi bawang sabrang mengandung naphthoquinonens dan turunannya seperti elecanacine, eleutherine, eleutherol, eleuthernone yang berkhasiat sebagai antikanker.</p>	<p>Sebagai antikanker.</p>
22.	<p>The Effect of Ethanolic Extract of Dayak Onion (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr) Tuber on Blood Glucose and Insulin Level of Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rat.</p> <p>(Hasni et al., 2019)</p>	<p>Tumbuhan Bawang Dayak (<i>Eleutherine palmifolia</i> L. Merr)</p>	<p>Metode ekstraksi sampel diekstraksi melalui metode maserasi dengan pelarut etanol 96 selama dua hari, filtrat dipisahkan menggunakan rotary evaporator, Ekstrak etanolik kental umbi bawang dayak (EEDOT) ditempatkan dalam gelas kimia dan ditutup dengan aluminium foil, kemudian disimpan dalam freezer untuk pencegahan kerusakan.</p>	<p>Penentuan bioaktivitas sebagai antidiabetes.</p>	<p>Ekstrak bawang dayak paling efektif menurunkan kadar glukosa darah dan meningkatkan konsentrasi insulin plasma secara signifikan pada dosis 500 mg/kg bb.</p>	<p>Ekstrak etanol umbi bawang dayak menunjukkan aktivitas penurunan kadar glukosa darah dan peningkatan konsentrasi insulin plasma pada tikus wistar diabetes yang diinduksi streptozotocin.</p>

			<p>CMC (0,5%) digunakan sebagai pelarut.</p> <p>Metode pengujian bioaktivitas antidiabetes menggunakan pengamatan kadar glukosa menggunakan glukometer (Easy Touch). Analisis konsentrasi insulin plasma ditentukan menggunakan Insulin Elisa Kit (Chem Cruz).</p>		
--	--	--	---	--	--

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Teoritis Tumbuhan Bawang Dayak

Tinjauan teori tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) mulai dari kalifikasi tumbuhan, gambar tumbuhan, nama daerah atau nama lain, morfologi tumbuhan dan kandungan tumbuhan.

4.1.1 Klasifikasi tumbuhan

Klasifikasi dari tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) yaitu.



Gambar 3. *Eleutherine palmifolia* L. Merr

Regnum : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledoneae

Bangsa : Liliales

Suku : Iridaceae

Marga : Eleutherine

Spesies : *Eleutherine palmifolia* L. Merr

Sinonim : *Eleutherine americana*, *Eleutherine bulbosa*

(Tjitrosoepomo, 2010).

Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr), adalah tanaman herbal yang termasuk dalam famili Iridaceae, merupakan pangan fungsional yang dapat dimakan yang tersebar di Amerika, Asia Tenggara dan Afrika Selatan. Umbi merah tanaman ini telah umum digunakan dalam masakan Asia dan juga telah lama digunakan sebagai obat tradisional untuk pengobatan berbagai penyakit. (Deli Chen, 2019)

4.1.2 Nama daerah atau nama lain

Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) merupakan tanaman khas Kalimantan. Tanaman ini sudah turun temurun dipergunakan oleh masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Potensi Bawang Dayak sebagai tanaman obat multifungsi sangat besar sehingga perlu ditingkatkan penggunaannya sebagai bahan obat modern. Di Indonesia dan Negara lain tumbuhan Bawang Dayak di kenal dengan nama-nama yang berbeda. Beberapa nama daerah yang khas, diantaranya: Bawang Hutan (palu), Bawang Dayak (Balikpapan), Bawang Kapal (sumatera), Bawang Siyem (sunda), Bawang Sabrang (jawa), Bawang hantu/kambe (dayak) dan Ralle' (jeneponto). (Liem, 2014)

4.1.3 Morfologi tumbuhan

Bawang dayak memiliki bentuk yang serupa dengan bawang merah pada umumnya. Bentuk daun bawang dayak tunggal dan berhadapan, panjang meruncing (acicular) dan berwarna hijau muda, pangkal daun meruncing (acute), ujung daun meruncing (acuminate), tulang daun paralel dan sejajar, serta permukaan daun atas dan bawah sejajar (glabrous). Pada umumnya tanaman bawang dayak berukuran kurang dari 1 meter (Indrawati, 2013)

Umbi bawang dayak mirip dengan bentuk umbi bawang merah pada umumnya yang berlapis-lapis. Ketebalan umbi bawang dayak lebih bervariasi dibandingkan dengan umbi bawang merah yang lapisan bulbusnya agak lembek. Aroma yang dimiliki umbi bawang dayak juga tidak terasa menyengat dan tidak menyebabkan mata menjadi perih (Indrawati, 2013)

Bawang dayak memiliki bentuk akar serabut yang melingkar. Pertumbuhan akar bawang dayak juga sangat cepat, dalam kurun waktu 45 hari akar bawang dayak dapat memenuhi bagian pot berukuran 45 cm (Indrawati, 2013)

Bunga bawang dayak mirip dengan bunga anggrek tanah yang berwarna putih. Dengan 5 buah kelopak berbentuk mungil. Sehingga banyak yang memanfaatkan bawang dayak bukan hanya sebagai tanaman obat, tetapi juga sebagai tanaman hias (Indrawati, 2013)

4.2 Pembahasan hasil

4.2.1 Kandungan Fitokimia

Tabel 6. Kandungan Senyawa *Eleutherine palmifolia*

No	Kandungan fitokimia	Referensi
1.	(-)-3-[2-(acetyloxy)propyl]-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphtoquinone	(Insanu et al., 2014)
2.	(R)-4-hydroxyeleutherine	(Ammar et al., 2021) (Laxmipriya et al., 2015)
3.	1, 2-dihydroxy-8-methoxy-3-methyl-anthra-9, 10-quinone	(Insanu et al., 2014)
4.	1,2-dihydroxy-8-methoxy-3-methylanthraquinone	(Insanu et al., 2014)

5.	1,3,6-trihydroxy-8-methylantraquinone	(Insanu et al., 2014)
6.	1,4-naphthoquinone derivative- 2-(4-methoxyphenylthio)-5,8-dimethoxy-1,4-naphthoquinone	(Antonio et al., 2021)
7.	1,5-dihydroxy-3-methylantraquinone	(Insanu et al., 2014)
8.	1-Heptadecanamine	(Kalidass et al., 2012)
9.	2,4(1H,3H)-pyrimidinedione,dihydro	(Kalidass et al., 2012)
10.	2,4,7-Trihidroksi-9,10-dihidrofenantrena	(Anton et al., 2019)
11.	2,5-dimethyl-10-hydroxynaphtopyrone 8-O- β -glucopyranoside	(Insanu et al., 2014)
12.	2-acetyl-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-anthrax-quinone	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014)
13.	3,2-acetyloxy prophyll-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphthoquinone	(Insanu et al., 2014)
14.	3,4,8-trimethoxy-1-methylantraquinone-2-carboxylic acid methyl ester	(Insanu et al., 2014)
15.	3,4-dihydro-1,3-dimethyl-1-H-naphthol (2,3) pyran-5,10,dione	(Insanu et al., 2014)
16.	4,8-dihydroxy-3-methoxy-1-methyl antraquinone-2-carboxylic acid methyl ester	(Insanu et al., 2014)
17.	4-hydroxy-eleutherin	(Insanu et al., 2014)

18.	6,8-dihydroxy-3,4-dimethoxy-1-methyl-anthraquinone-2-carboxylic acid methyl ester	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014)
19.	8-hydroxy-3,4-dimethoxy-1-methylantra quinone-2-carboxylic acid methyl ester	(Insanu et al., 2014)
20.	9,10-dihydro-8-hydroxy-3,4-dimethoxy-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid methyl ester	(Insanu et al., 2014)
21.	9,9-dihydroxy-8,8-dimethoxy-1-dimethyl-1H, 1H-[4,4]bis[naphtha[2,3-c]funanyl]-3,3-Dione	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014)
22.	9-hydroxy-8-methoxy-1-methyl-1, 3-dihydronaphtho [2, 3-c] furan-4-O-β-D-glucopyranoside	(Insanu et al., 2014)
23.	9-methoxy-1, 3-dimethyl-1H-naphtho [2, 3-c] pyran-5, 10-dione	(Insanu et al., 2014)
24.	9-Octadecene,1,1-dimethoxy	(Kalidass et al., 2012)
25.	Acetic acid	(Atchara et al., 2013)
26.	Alkaloid	(Anton et al., 2018) (Masfria et al., 2019) (Yaturramadhan et al., 2019) (Waode et al., 2020)
27.	Anthraquinone	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Chen et al., 2019) (Islamudin et al., 2018)
28.	Benzeneethanamine,2-fluro-beta	(Kalidass et al., 2012)
29.	Benzyl alcohol,alpha,-(1-amino)	(Kalidass et al., 2012)
30.	Butyric acid	(Atchara et al., 2013)

31.	Chlorogenic acid	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
32.	Cuspidatumin A	(Anton et al., 2019)
33.	Cyclohexane, (1,2-dimethylbutyl)	(Kalidass et al., 2012)
34.	Cyclohexane, hexyl	(Kalidass et al., 2012)
35.	Cyclohexanecarbonyl Chloride	(Kalidass et al., 2012)
36.	Decane	(Kalidass et al., 2012)
37.	Dendromonilisida E	(Anton et al., 2019)
38.	Dihydroeleutherinol	(Insanu et al., 2014)
39.	Dihydroisoeleutherin-5-O- β -D-gen-tiobioside	(Ammar et al., 2021)
40.	Elecanacin	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Yanti et al., 2014)
41.	Eleucanainones A	(Ammar et al., 2021)
42.	Eleucanainones B	(Ammar et al., 2021)
43.	Eleucanarol	(Insanu et al., 2014)
44.	Eleutherin A	(Chen et al., 2019)
45.	Eleutherin B	(Chen et al., 2019)
46.	Eleutherin C	(Chen et al., 2019)
47.	Eleutherin D	(Chen et al., 2019)
48.	Eleutherin E	(Chen et al., 2019)
49.	Eleutherin F	(Chen et al., 2019)
50.	Eleutherin G	(Chen et al., 2019)
51.	Eleutherine	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020) (Insanu et al., 2014) (Laura et al., 2021) (Antonio et al., 2021) (Islamudin et al., 2018) (Laxmipriya et al., 2015) (Yanti et al., 2014) (Chen et al., 2018)

52.	Eleutherinol	(Insanu et al., 2014) (Anik et al., 2021) (Anton et al., 2018) (Anton et al., 2019)
53.	Eleutherinol-8-O- β -D-glucoside	(Ammar et al., 2021) (Laxmipriya et al., 2015)
54.	Eleutherinone	(Ammar et al., 2021) (Islamudin et al., 2018) (Laxmipriya et al., 2015) (Yanti et al., 2014)
55.	Eleutherinoside A	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Febrinda et al., 2014) (Tomohiro et al., 2011)
56.	Eleutherinoside B	(Insanu et al., 2014)
57.	Eleutherol	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Antonio et al., 2021) (Febrinda et al., 2014) (Laxmipriya et al., 2015) (Tomohiro et al., 2011) (Yanti et al., 2014)
58.	Eleutherol A	(Ammar et al., 2021) (Chen et al., 2018)
59.	Eleutherol B	(Ammar et al., 2021) (Chen et al., 2018)
60.	Eleutherol C	(Ammar et al., 2021) (Chen et al., 2018)
61.	Eleuthinone A	(Insanu et al., 2014)
62.	Eleuthinones B	(Ammar et al., 2021) (Chen et al., 2018)
63.	Eleuthinones C	(Ammar et al., 2021) (Chen et al., 2018)
64.	Eleuthone	(Ammar et al., 2021) (Laxmipriya et al., 2015)

65.	Eleuthoside A	(Insanu et al., 2014) (Islamudin et al., 2018)
66.	Eleuthoside B	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Febrinda et al., 2014) (Islamudin et al., 2018) (Tomohiro et al., 2011)
67.	Eleuthoside C	(Insanu et al., 2014) (Islamudin et al., 2018)
68.	Eleuthraquinone A	(Insanu et al., 2014)
69.	Eleuthraquinone B	(Insanu et al., 2014)
70.	Epicatechin Gallate	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
71.	Erythrolaccin	(Insanu et al., 2014)
72.	Ethanol,2-(2-Aminoethoxy)	(Kalidass et al., 2012)
73.	Fenantrena	(Anton et al., 2019)
74.	Fenolik	(Anton et al., 2018) (Kalidass et al., 2012) (Waode et al., 2020) (Chen et al., 2018)
75.	Flavanoid	(Ammar et al., 2020) (Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Anton et al., 2018) (Anton et al., 2019) (Masfria et al., 2019) (Yaturramadhan et al., 2019) (Waode et al., 2020) (Chen et al., 2018) (Munaeni et al., 2017)
76.	Gallic acid	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
77.	Glikosida	(Anton et al., 2018) (Anton et al., 2019) (Febrinda et al., 2014)

		(Masfria et al., 2019) (Yaturramadhan et al., 2019)
78.	Glycyl-di-alanine	(Kalidass et al., 2012)
79.	Hongconin	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014)
80.	Hydrazinecarboxamide	(Kalidass et al., 2012)
81.	Hydroxyurea	(Kalidass et al., 2012)
82.	Isoeleutherine	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Laura et al., 2021) (Antonio et al., 2021) (Laxmipriya et al., 2015) (Chen et al., 2018)
83.	Isoeleutherol	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014)
84.	Isoeleuthoside C	(Ammar et al., 2021) (Laxmipriya et al., 2015)
85.	Kadsuric acid	(Insanu et al., 2014)
86.	Kaempferol	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
87.	Kuinon	(Anton et al., 2018) (Antonio et al., 2021) (Waode et al., 2020) (Munaeni et al., 2017)
88.	Lactic acid	(Atchara et al., 2013)
89.	Liquiritigenin	(Anton et al., 2019)
90.	Myricetin	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
91.	Naphthalene	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Chen et al., 2019) (Febrinda et al., 2014) (Tomohiro et al., 2011) (Chen et al., 2018)

92.	Naphthoquinone	(Ammar et al., 2021) (Insanu et al., 2014) (Laura et al., 2021) (Anik et al., 2021) (Anton et al., 2018) (Anton et al., 2019) (Antonio et al., 2021) (Chen et al., 2019) (Yanti et al., 2014) (Chen et al., 2018)
93.	Natsudaïdan	(Anton et al., 2019)
94.	Oligosakarida	(Waode et al., 2020)
95.	Phlobatannins	(Kalidass et al., 2012)
96.	Propionic acid	(Atchara et al., 2013)
97.	Proteins	(Kalidass et al., 2012)
98.	Quercetin	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
99.	Reducing sugars	(Kalidass et al., 2012)
100.	Rutin	(Ammar et al., 2021) (Ammar et al., 2020)
101.	Saponin	(Anton et al., 2018) (Masfria et al., 2019) (Yaturramadhan et al., 2019) (Munaeni et al., 2017)
102.	Siklododekanol,1-aminometil-Propane	(Kalidass et al., 2012)
103.	Steroid	(Anton et al., 2018) (Masfria et al., 2019) (Kalidass et al., 2012) (Munaeni et al., 2017)
104.	Sterols	(Kalidass et al., 2012)
105.	Stigmasterol-3-O- β -D-glucopyranoside	(Insanu et al., 2014)
106.	Tanin	(Anton et al., 2018) (Masfria et al., 2019) (Kalidass et al., 2012) (Munaeni et al., 2017)

107.	Terpenoid	(Kalidass et al., 2012) (Waode et al., 2020)
108.	β -sitosterol	(Insanu et al., 2014)
109.	Ziganein	(Tedjo et al., 2017) (Kalidass et al., 2012) (Ammar et al., 2021)

Pada hasil skrining dari 22 jurnal yang ada, terdapat 109 senyawa fitokimia yang terkandung pada tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr). Penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pada 22 jurnal yang diteliti, diantaranya persamaan kandungan senyawa fitokimia yang teridentifikasi di berbagai jurnal sedangkan perbedaannya terdapat pada senyawa yang sama namun diidentifikasi dengan konsentrasi yang berbeda pada berbagai jurnal tersebut.

Hasil skrining juga menunjukkan adanya senyawa-senyawa mayor yang terkandung dalam tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) diantaranya :

4.2.1.1 Anthraquinone

Senyawa antrakuinon merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam biosintesisnya berasal dari turunan fenol, termasuk senyawa kristal bertitik leleh tinggi, dapat larut dalam pelarut organik dan basa dengan membentuk warna violet merah. Senyawa antrakuinon dan turunannya juga sering ditemukan berwarna kuning sampai jingga. Senyawa antrakuinon memiliki beberapa fungsi dalam bidang kesehatan yaitu sebagai antijamur, antimalaria, antibakteri, antikanker dan antioksidan (Ulfah et al., 2018)

4.2.1.2 Naphthalene

Naftalena merupakan hidrokarbon aromatis polisiklik (HAP) yang terdiri atas dua cincin benzen. Dalam kadar tertentu, naftalen menghambat

respirasi pada mitokondria sehingga mengakibatkan terhambatnya konsumsi oksigen pada beberapa organisme karena merupakan derivat dari cincin bensen, maka senyawa HAP mempunyai energi resonansi yang tinggi. Hal ini mengakibatkannya pada kondisi alami bersifat stabil dan persisten (Firdausi et al., 2015)

4.2.1.3 Naphthoquinone

Naftokuinon adalah senyawa fenolik yang tersebar luas dalam tanaman, jamur dan bakteri. Contoh dari naftokuinon adalah plumbagin, Lawson dan alkanin. Naftokuinon di biosintesis melalui jalur yang berbeda, yaitu melalui jalur asetat dan mevalonate yang dipadukan dengan jalur sikimat (Nollet et al., 2018)

Umbi bawang dayak dipercaya mengandung berbagai senyawa aktif yang ampuh menggempur berbagai macam penyakit. Sebut saja senyawa golongan naftokuinon yang terkandung dalam umbi tanaman ini. Oleh karena itu wajar bila umbi tanaman ini terkenal sebagai obat untuk berbagai macam penyakit. Senyawa naftokuinon biasanya digunakan antara lain sebagai antimikroba dan antioksidan (Gayatri et al., 2017)

Hasil skrining fitokimia juga menunjukkan adanya kandungan metabolit sekunder yang terkandung dalam tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) diantaranya :

4.2.1.4 Flavonoid

Flavonoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan. Flavonoid umumnya terdapat pada tumbuhan dibagian daun, akar, buah, bunga, batang dan kulit batang. Flavonoid bagi tumbuhan berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit dan lingkungan sekitarnya, sedangkan fungsi flavonoid bagi tubuh manusia untuk mencegah penyakit

kardiovaskuler, sebab flavonoid adalah senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidatif yang berperan dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas yang reaktif. (Minanti et al., 2017)

4.2.1.5 Tanin

Tanin merupakan zat organik yang sangat kompleks dan terdiri dari senyawa fenolik yang banyak terdapat pada bermacam-macam tumbuhan, antara lain : pinang, akasia, gabus, bakau, pinus dan gambir. Umumnya tannin tersebar hamper pada seluruh bagian tumbuhan seperti pada bagian kulit kayu, batang, daun dan buah. Tanin merupakan senyawa aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa khasiat diantaranya astringent, antidiare, antibakteri dan aktioksidan. Tanin biasanya juga disebut asam tanat atau glotanat. Tannin mempunyai aktivitas antioksidan menghambat pertumbuhan tumor dan menghambat enzim seperti reserve transcriptase dan DNA topoisomerase . Kegunaan lain tannin dibidang industry adalah untuk penyamak kulit. (Rezky, 2015)

4.2.1.6 Alkaloid

Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen, yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan, terutama angiosperm. Lebih dari 20% spesies angiosperm mengandung alkaloid. Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman, seperti bunga, biji, daun, ranting, akar dan kulit batang. Alkaloida umunya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. (Retno, 2016)

4.2.1.7 Saponin

Saponin merupakan suatu glikosida yang memiliki aglikon berupa sapogenin. Saponin dapat menurunkan tegangan permukaan air, sehingga akan mengakibatkan terbentuknya buih pada permukaan air setelah dikocok. Struktur kimia saponin merupakan glikosida yang tersusun atas glikon dan aglikon. Bagian glikon terdiri dari gugus gula seperti glukosa, fruktosa, dan jenis gula lainnya. (Fulka, 2018)

Saponin merupakan suatu glikosida yaitu campuran karbohidrat sederhana dengan aglikon yang terdapat pada bermacam-macam tanaman. Saponin dibedakan berdasarkan hasil hidrolisisnya menjadi karbohidrat dan sapogenin, sedangkan sapogenin terdiri dari dua golongan yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin banyak dipelajari terutama karena kandungannya kemungkinan berpengaruh pada nutrisi. (Arif, 2015)

4.2.1.8 Steroid/Terpenoid

Steroid merupakan senyawa penting dalam pengobatan. Keberadaannya sebagai salah satu diantara golongan senyawa metabolit sekunder diharapkan menjadi konstituen kimia yang memberi nilai pengobatan pada suatu tumbuhan. Steroid merupakan salah satu golongan senyawa metabolit sekunder. Golongan senyawa tersebut diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteri, antifungi, dan antidiabetes. (Nasrudin et al., 2017)

4.2.1.9 Fenolik

Senyawa fenolik merupakan kelompok senyawa terbesar yang berperan sebagai antioksidan alami pada tumbuhan. Senyawa fenolik memiliki satu (fenol) atau lebih (polifenol) cincin fenol, yaitu gugus hidroksi yang terikat pada cincin aromatis sehingga mudah teroksidasi dengan menyumbangkan

atom hidrogen pada radikal bebas. Kemampuannya membentuk radikal fenoksi yang stabil pada reaksi oksidasi menyebabkan senyawa fenolik sangat potensial sebagai antioksidan. Senyawa fenolik alami umumnya berupa polifenol yang membentuk senyawa eter, ester, atau glikosida, antara lain flavonoid, tanin, tokoferol, kumarin, lignin, turunan asam sinamat, dan asam organik polifungsional. (Crescentiana, 2018)

4.2.1.10 Glikosida

Banyak metabolit sekunder tanaman di alam muncul sebagai glikosida. Pada tanaman, glikosida sebagian besar berasal dari post modifikasi metabolit sekunder yang dikatalisis oleh enzim tanaman, glikosiltransferase. Modifikasi lebih lanjut dari glikosida sering terjadi, seperti oksidasi, asilasi, dan degradasi. (Rahadianti, 2019)

Glikosida dapat terikat pada senyawa metabolit sekunder dan mempunyai efek farmakologi yang berbeda, contohnya glikosida fenolik, glikosida kumarin, glikosida kromon, glikosida flavonoid, glikosida antrakuinon, glikosida saponin, glikosida jantung, glikosida sianogenik, dan tioglikosida. Senyawa tersebut memiliki aktivitas yang berbeda dan perlu diperhatikan juga efek samping dari senyawa glikosida tersebut. (Rahadianti, 2019)

4.2.2 Bioaktivitas

Tabel 7. Bioaktivitas *Eleutherine palmifolia*

No	Senyawa	Bioaktivitas	Referensi
1.	Naphthoquinone, Eleutherine, Fenolik, Flavanoid	Antioksidan	(Ammar et al., 2020) (Anggi et al., 2018) (Waode et al., 2020)
2.	Naphthoquinone Eleutherine, Elecanacine,	Antikanker	(Laura et al., 2021) (Yanti et al., 2014)

	Eleuthernone, Isoeleutherine,		
3.	Naphthoquinone, Eleutherine, Eleutherinol,	Kardiovaskular	(Anik et al., 2021) (Chen et al., 2019)
4.	Naphthoquinone, Eleutherinol, Flavanoid, Tanin, Alkaloid, Saponin, Steroid, Kuinon,	Antiosteoporosis	(Anton & Riza, 2018) (Anton & Renita, 2019)
5.	Naphthoquinone, Eleutherine, Eleutherol, Isoeleutherine	Antimalaria	(Antonio et al., 2021) (Valdicley et al., 2020)
6.	Eleutherine, Eleutherol, Eleutherinone Isoeleutherine, Isoeleuthoside C, Flavanoid, Fenolik, Sterol, Phlobatannins, Steroid, Tanin	Antibakteri	(Atchara et al., 2013) (Kalidass et al., 2012) (Laxmipriya et al., 2015) (Waode et al., 2020) (Munaeni et al., 2017)
7.	Naphthalene, Eleutherine, Eleutherol, Eleutherinoside A, Eleuthoside B, Flavanoid, Alkaloid, Glikosida, Saponin	Antidiabetes	(Febrinda et al., 2014) (Islamuddin et al., 2018) (Tomohiro et al., 2011) (Yaturramadhan et al., 2019) (Chen et al., 2018)
8.	Steroid/Triterpenoid	Antijamur	(Masfria et al., 2019)

Pada hasil skrining 22 jurnal dengan melihat bioaktivitas yang ditunjukkan pada tanaman Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) terdapat berbagai penelitian yang telah mengungkapkan efek bioaktivitas yang berbeda, khususnya yang telah dibahas dalam jurnal terbukti memiliki aktivitas sebagai antioksidan (Ammar et al., 2020) (Anggi et al., 2018) (Waode et al., 2020), antikanker (Laura et al., 2021) (Yanti et al., 2014), kardiovaskular (Anik

et al., 2021) (Chen et al., 2019), antiosteoporosis (Anton & Riza, 2018) (Anton & Renita, 2019), antimalaria (Antonio et al., 2021) (Valdicley et al., 2020), antimikroba (Atchara et al., 2013) (Kalidass et al., 2012) (Laxmipriya et al., 2015) (Waode et al., 2020) (Munaeni et al., 2017), antidiabetes (Febrinda et al., 2014) (Islamuddin et al., 2018) (Tomohiro et al., 2011) (Yaturramadhan et al., 2019) (Chen et al., 2018), antijamur (Masfira et al., 2019).

4.3 Tinjauan Bioaktivitas Tumbuhan Bawang Dayak

4.3.1 Antibakteri

Agen antibakteri menghambat pertumbuhan dan reproduksi bakteri patogen. Juga, dapat mencegah atau membunuh bakteri, sehingga mencegah infeksi bakteri dan penyakit bakteri. Agen antibakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis entitas kimia yang digunakan untuk desain obat dan mekanisme aksi pada bakteri seperti penghambatan sintesis dinding sel bakteri, penghambatan nukleat bakteri sintesis asam, dan penghambatan sintesis protein. (Dorababu, 2020)

Eleutherine palmifolia adalah tumbuhan obat tradisional yang telah lama digunakan oleh masyarakat Dayak sebagai bahan obat alternative dalam pengobatan berbagai penyakit karena aktivitas farmakologinya. Salah satu aktivitas farmakologi yang dihasilkan oleh tumbuhan Bawang dayak yaitu aktivitas antibakteri (Kalidass et al., 2012)

Eleutherine palmifolia dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri dibuktikan bahwa ekstrak *Eleutherine palmifolia* menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam respons kekebalan dan mengembangkan resistensi terhadap infeksi *Vibrio parahaemolyticus* pada udang putih *Litopenaeus vannamei* dengan konsentrasi 12,5 g/kg setelah 30 hari. Respon imun, seperti jumlah total hemosit, aktivitas fenoloksidase, ledakan pernapasan, dan jumlah

bakteri total, menunjukkan peningkatan yang signifikan dan aktivitas ekspresi gen seperti prophenoloksidase (proPO), protein pengikat lipopolisakarida dan -1,3-glukan. *Eleutherine palmifolia* juga bisa menekan *V. parahaemolyticus* di usus, hepato-pankreas, dan otot, sehingga meningkatkan tingkat kelangsungan hidup udang putih (Waode et al., 2020). Penelitian lain menjelaskan ekstrak etanolik umbi *Eleutherine palmifolia* terbukti secara signifikan menghambat pertumbuhan *Vibrio harveyi* tergantung dosis dibandingkan dengan kloramfenikol. Diameter penghambatan meningkat sebanding dengan konsentrasi, sementara studi fitokimia mengungkapkan kandungan flavonoid, alkaloid, kuinon, dan triterpenoid (Waode et al., 2017). Penelitian lain menjelaskan bahwa ekstrak umbi *Eleutherine palmifolia* dan ekstrak oligosakarida menunjukkan potensi prebiotik pada pertumbuhan mikrobiota usus bayi dan mendorong produksi asam lemak pendek. Temuan mengusulkan bahwa ekstrak umbi *Eleutherine palmifolia* dapat ditambahkan sebagai pangan fungsional karena potensi prebiotiknya (Atchara & Supayang, 2013). Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa ekstrak butanol dari *Eleutherine palmifolia* menunjukkan zona hambat yang baik terhadap *S. Aureus* dan *Shigella boydii* dibandingkan dengan gentamisin dan ciprofloxacin (Laxmipriya & Sujogya, 2015). Penelitian lain terkait aktivitas antibakteri *Eleutherine palmifolia* menjelaskan evaluasi fitokimia kualitatif dari *Eleutherine palmifolia* mengungkapkan adanya Fenol, Sterol, Phlobatannins, Protein, Steroid, Tanin dan gula pereduksi. Ekstrak menunjukkan aktivitas antimikroba yang lebih tinggi dibandingkan dengan antibiotik standar. Kontrol yang menjanjikan atas resisten methicillin *Stafilokokus aureus* dan *Acinetobacter baumannii* ditemukan. Analisis GC-MS dari ekstrak tumbuhan

menunjukkan adanya Decane, Cyclohexane,(1, 2-dimetilbutil) dan Sikloheksanakarbonil Klorida (Kalidass et al., 2012).

4.3.2 Antioksidan

Antioksidan adalah molekul yang dapat berinteraksi dan menghambat inisiasi atau propagasi reaksi berantai pengoksidasi yang dihasilkan oleh radikal bebas reaktif sebelum molekul vital rusak. Antioksidan dapat menghambat reaktivitas radikal bebas melalui beberapa mekanisme termasuk donasi hidrogen, radikal scavenging dan singlet oxygen quenching. Antioksidan terjadi secara alami dan melalui proses kimia sintetik. (Kitima et al., 2018)

Tumbuhan Bawang Dayak terdiri dari tiga kelompok senyawa utama yaitu, naftalena, antrakuinon dan naftokuinon. Secara farmakologi senyawa kimia yang terkandung dalam Bawang Dayak dapat menghasilkan aktivitas antioksidan (Ammar et al., 2020).

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dengan IC50 nilai 1,48 μ g/mL dibandingkan dengan asam askorbat dalam uji DPPH. Aktivitas antioksidan yang kuat merangsang pertumbuhan bakteri probiotik seperti *Pseudoalteromonas piscicida* 1Ub dan *Bacillus* sp. NP5, menunjukkan bahwa ekstrak *Eleutherine palmifolia* bisa menjadi agen prebiotik dan antioksidan yang potensial. Penelitian menjelaskan bahwa umbi *Eleutherine palmifolia* menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat dalam pengujian DPPH dan ABTS di bawah kondisi ekstraksi yang dioptimalkan pada 75,2% dan 74,9% dibandingkan dengan Trolox (Waode et al., 2020). Dalam penelitian lain dijelaskan bahwa 70% metanol menunjukkan pelarut yang paling efektif untuk mengekstraksi polifenol dari *Eleutherine palmifolia*, dengan kandungan fenol dan flavonoid masing-masing 20 mg GAE/g DW dan 15,03 mg QE/g DW

dibandingkan dengan asam galat dan quercetin. Selain itu, aktivitas pemulungan radikal DPPH mengungkapkan IC₅₀ nilai 39,06 µg/mL (Anggi et al., 2016). Analisis kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) mengungkapkan beberapa senyawa bioaktif seperti fenolik dan flavonoid, secara sinergis menghasilkan aktivitas antioksidan yang tinggi. Selain itu, ditunjukkan bahwa aktivitas antioksidan dari *Eleutherine palmifolia* (Ammar et al., 2020).

4.3.3 Antikanker

Kanker adalah gangguan kompleks yang melibatkan pertumbuhan sel abnormal dan berpotensi untuk menyerang atau menyebar ke bagian lain dari tubuh. Sel-sel kanker kehilangan kontrol normal mereka pada pembelahan sel dan berkembang menjadi massa sel yang tidak diinginkan yang disebut tumor yang sering menjadi ganas dan menyerang bagian lain dari tubuh melalui darah atau sistem getah bening dengan proses yang disebut metastasis. (Yoshiyuki et al., 2018)

Umbi Bawang Dayak merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah yang dikenal juga dengan nama bawang dayak atau bawang hantu, Tanaman ini telah digunakan secara turun temurun oleh masyarakat Dayak sebagai tanaman obat untuk berbagai jenis penyakit seperti kanker payudara dan usus besar, hipertensi, diabetes melitus, hiperkolesterol. stroke. Umbi bawang sabrang mengandung naphthoquinone dan turunannya seperti elecanacine, eleutherine, eleutherol, eleuthernone yang berkhasiat sebagai antikanker (Yanti et al., 2014).

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas antikanker dibuktikan dalam penelitian dengan ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi bertingkat menggunakan pelarut berdasarkan tingkat kepolarannya. Pelarut yang digunakan adalah n-heksana, etil asetat dan etanol. Ekstrak diuji terhadap

T47D dengan metode MTT dan siklus sel dengan menggunakan flow cytometry metode. Hasil uji sitotoksik pada perlakuan dengan sel T47D memberikan IC50 nilai ekstrak n heksana bawang dayak (NESO), ekstrak etil asetat bawang dayak (EAESO), dan ekstrak etanol bawang dayak (EESO) berturut-turut pada 265.023 g/ml, 147.124 g/ml dan 3782.29 g/ml. Selanjutnya EEABS diuji untuk siklus sel, hasilnya adalah Penghambatan siklus sel pada G0-G1 fase dengan persentase 40,88% (Yanti et al., 2014). Penelitian lain melaporkan hasil simulasi docking dan MD menunjukkan bahwa senyawa mampu berinteraksi dengan residu yang ada di dalam kantong pengikat enzim. Sepanjang lintasan MD, senyawa menunjukkan stabilitas molekul dan hasil energi bebas membuktikan bahwa senyawa membentuk kompleks yang stabil dengan TOPO II. Hasil ini memberikan wawasan baru tentang potensi genotoksik dan mutagenik isoeleutherin dan eleutherin (Laura et al., 2021).

4.3.4 Kardiovaskular

Penyakit Kardiovaskular (CVD) adalah gangguan jantung dan sistem peredaran darah. Ini adalah seperangkat penyakit heterogen yang penyebab utama perkembangannya paling sering adalah aterosklerosis. CVD adalah penyakit kronis yang berkembang secara bertahap sepanjang hidup, dan tidak menunjukkan gejala untuk waktu yang lama. Biasanya hanya penyakit lanjut yang menimbulkan gejala atau gejala pertama bisa berupa kematian mendadak. Selama bertahun-tahun mereka telah menjadi penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. (Zaninovic et al., 2018)

Tujuh turunan naphthoquinone baru, bernama eleutherins AG (1–7), diisolasi dari umbi yang dapat dimakan dari *Eleutherine americana*, yang termasuk dalam famili Iridaceae. Salah satu manfaat dari turunan

naphthoquinone dapat dikembangkan menjadi bahan pengobatan penyakit kardiovaskular (Chen et al., 2019).

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas terhadap penyakit kardiovaskular, dimana senyawa yang diisolasi 1–7 dievaluasi dengan uji MTT untuk efek perlindungannya terhadap cedera HUVEC yang disebabkan oleh glukosa. Mereka semua terbukti meningkatkan viabilitas sel pada konsentrasi 5, dan senyawa 1 dan 2 menunjukkan aktivitas yang paling ampuh, meningkatkan viabilitas sel dari 54,8 menjadi 86,7% dan 88,5%, masing-masing. Dibandingkan dengan aktivitas senyawa 1–7, kelompok epoksi yang terletak di C-4a/10a dapat secara signifikan meningkatkan efek perlindungan senyawa terhadap kerusakan HUVECs. Cincin beranggota tujuh juga dapat meningkatkan aktivitas senyawa secara moderat (Chen et al., 2019).

4.3.5 Antiosteoporosis

Osteoporosis adalah penyakit kronis, yang didefinisikan sebagai gangguan tulang yang ditandai dengan penurunan kekuatan tulang, yang mempengaruhi individu yang terkena untuk patah tulang. Diagnosis osteoporosis dapat dibuat berdasarkan fraktur yang terjadi tanpa trauma yang signifikan atau kepadatan mineral tulang yang rendah yang diukur dengan dual energy X-ray absorptiometry. (Luiz et al., 2015)

Eleutherinol merupakan turunan naftokuinon yang memiliki afinitas kuat untuk berikatan dengan reseptor alfa estrogen (ER α). Senyawa ini dapat ditemukan pada Umbi bawang dayak. Selain itu salah satu kandungan metabolit sekunder yang ada pada bawang dayak dapat menghasilkan aktivitas farmakologi sebagai antiosteoporosis (Anton & Riza, 2018)

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas antiosteoporosis bahwa efek sinergis dari ekstrak *Eleutherine palmifolia* dan ekstrak kacang tunggak

secara signifikan meningkatkan kadar kalsium dan berat tulang pada tikus yang diovariectomi. Kombinasi ekstrak juga dapat mengurangi tingkat lemak di sumsum tulang tikus, menunjukkan bahwa aplikasi potensial dapat diekstrapolasi lebih lanjut dalam manajemen osteoporosis pada wanita pascamenopause (Anton & Renita, 2018). Demikian pula dalam penelitian lain dijelaskan bahwa *Eleutherine palmifolia* secara signifikan meningkatkan tingkat kalsium, berat badan, dan panjang tulang pada tikus hipoestrogenik dibandingkan dengan kelompok yang diinduksi tamoxifen (Anton & Riza, 2019).

4.3.6 Antimalaria

Malaria adalah suatu penyakit mematikan disebabkan oleh protozoa genus *Plasmodium* dengan manifestasi berupa demam, anemia dan pembesaran limpa. Di sana adalah empat spesies *Plasmodium* utama yang bertanggung jawab untuk menimbulkan malaria di manusia : *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium ovale*, dan *Plasmodium malariae*. Gejala khas penyakit ini adalah demam tinggi intermiten, menggigil, dan sakit kepala akut. (Aarzo et al., 2021)

Plasmodium falciparum adalah penyebab malaria dan telah menjadi resisten terhadap obat yang digunakan untuk mengobati penyakit tersebut. Oleh karena itu, pengembangan senyawa baru dengan aktivitas antimalaria menjadi mendesak. Spesies tanaman, seperti Bawang Dayak kaya akan naphthoquinone, dapat memberikan zat baru yang menunjukkan aktivitas antimalarial dan berfungsi sebagai alternatif untuk pengobatan penyakit ini (Valdicley et al., 2020).

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas antimalaria, dibuktikan bahwa IC₅₀ nilai ekstrak etil asetat ($10,22 \pm 2.32 \mu\text{g/mL}$), eleutherin

($10,45 \pm 3.13 \mu\text{g/mL}$), isoeleutherin ($8,70 \pm 2.45 \mu\text{g/mL}$), dan fraksi S2 (eleutherin + isoeleutherin, $3,67 \pm 1.01 \mu\text{g/mL}$) diekstraksi dari umbi *Eleutherine palmifolia* menunjukkan aktivitas anti-plasmodial yang baik dibandingkan dengan kontrol positif, klorokuin ($0,023 \pm 0,009 \mu\text{g/mL}$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa senyawa naphthaquinone eleutherin dan isoeleutherin bertanggung jawab terhadap aktivitas antiplasmodial. Analisis *in silico* melalui molecular docking menunjukkan bahwa isoeleutherin dan eleutherin berpotensi sebagai obat antimalaria, sehingga menyebabkan kerusakan mitokondria pada parasite (Valdicley et al., 2020). Penelitian lain menjelaskan bahwa hewan yang diobati dengan EEEp dan FDMEp, dengan dosis tunggal dan berulang, tidak menunjukkan perubahan klinis, hematologi, atau biokimia, menunjukkan bahwa mereka aman. Penelitian menjelaskan toksisitas *Eleutherine palmifolia* terkait dengan naftokuinon dan melibatkan jalur pensinyalan yang berbeda, seperti stres oksidatif, menginduksi apoptosis, alkilasi DNA, dan stabilisasi kompleks topoisomerase II-DNA. Studi ini menunjukkan melalui docking molekuler, untuk pertama kalinya, bahwa naphthoquinones (eleutherin, eleutherol, dan isoeleutherin) dapat mengaktifkan caspase-8 yang menghasilkan kemungkinan apoptosis, karena interaksi senyawa ini dengan enzim. Oleh karena itu, senyawanya dapat menjadi kandidat yang menjanjikan untuk pengembangan antimalarial (Antonio et al., 2021).

4.3.7 Antidiabetes

Diabetes adalah sekelompok penyakit metabolic yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Hiperglikemia kronis diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Gangguan sekresi insulin dan defek kerja insulin sering

terjadi bersamaan pada pasien yang sama, dan seringkali tidak jelas kelainan mana, jika salah satunya, merupakan penyebab utama hiperglikemia. (American Diabetes Association, 2013)

Flavonoid yang terdapat pada bawang dayak mampu mengembalikan fungsi jaringan pankreas dengan cara meningkatkan pelepasan insulin melalui sel β , sehingga dapat menurunkan kadar gula darah dan juga dapat meningkatkan sensitivitas sel perifer terhadap insulin. Senyawa aktif lain yang terdapat pada bawang dayak adalah eleutherol, eleutherinoside A dan eleuthoside B. Eleutherinoside A pada bawang dayak paling berperan dalam mengatasi DM, juga dilaporkan mampu menghambat enzim alpha glukosidase (enzim yang berfungsi untuk memecah pati dan disakarida). (Yaturramadhan et al., 2019).

Eleutherine palmifolia menunjukkan aktivitas antidiabetes bahwa turunan naftalena baru yang diisolasi dari *Eleutherine palmifolia* seperti eleutherol A, B, dan C, eleuthinone B, dan C menunjukkan efek perlindungan terhadap sel endotel vena umbilikalis manusia (HUVECs) yang diinduksi oleh kadar glukosa tinggi, secara in vitro. Selanjutnya, tiga senyawa lain yang diketahui, yaitu hongconin, Karwinaphthol A, dan dihydroisoeleutherin, juga menunjukkan efek perlindungan yang sama dibandingkan dengan kontrol positif, manitol. Dengan demikian, temuan menunjukkan efek terapeutik potensial dari senyawa yang diisolasi dari *Eleutherine palmifolia* terhadap hiperglikemia (Chen et al., 2018). Dalam penelitian lain dilaporkan bahwa asupan ekstrak air *Eleutherine palmifolia* dan etanol menunjukkan peningkatan berat badan tikus yang diinduksi aloksan dibandingkan dengan tikus diabetes. Namun, peningkatan berat badan pada kelompok yang diobati dengan diabetes mirip dengan kelompok yang tidak diobati dengan diabetes, menunjukkan

bahwa asupan ekstrak tidak mempengaruhi berat badan secara keseluruhan. Tingkat glukosa serum darah pada tikus diabetes mengungkapkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kelompok non-diabetes yang tidak diobati setelah 28 hari. Namun, asupan ekstrak bohlam berair dan etanol secara signifikan meningkatkan kadar glukosa darah pada tikus diabetes tetapi tidak menimbulkan efek pada tikus non-diabetes, menunjukkan bahwa ekstrak sangat selektif. Ekstrak berair dan etanol juga mengurangi kolesterol total (TC) ($62,55 \pm 11,53$ mg/dL, $55,03 \pm 15,92$ mg / dL) dan lipoprotein densitas rendah (LDL) ($32,70 \pm 7,92$ mg/dL, $41,78 \pm 10,72$ mg/dL) secara signifikan pada tikus diabetes daripada tikus diabetes yang diobati dengan glibenklamid ($90,45 \pm 6,25$ mg/dL, $77,33 \pm 10,75$ mg/dL, masing-masing). Fungsi ginjal juga ditingkatkan karena kadar albumin serum meningkat secara signifikan dengan pemberian cairan ($4,16 \pm 0,54$ mg/dL) dan etanol ($4,69 \pm 1,02$ mg / dL) ekstrak berbeda dengan kelompok diabetes yang tidak diobati ($2,71 \pm 0,33$ mg/dL), dan tidak ada toksisitas hati yang diamati. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan laporan obat berbasis bukti untuk penggunaan tradisional umbi *Eleutherine palmifolia* dikalangan masyarakat Dayak setempat untuk mengelola diabetes dengan menghambat enzim alfa-glukosidase yang dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial (Febrinda et al., 2014). Dalam penelitian lain dilaporkan bahwa ekstrak metanol dari *Eleutherine palmifolia* menggunakan tiga metode ekstraksi yang berbeda menunjukkan penurunan tingkat toleransi glukosa pada tikus albino Swiss. Hasil penelitian menunjukkan penurunan yang signifikan dengan metode refluks dan maserasi, dengan persentase kadar glukosa masing-masing 62,2% dan 74,6% pada 90 menit pasca perawatan, berbeda dengan kontrol positif, glibenklamid ($55,17\% \pm 9,55$) (Islamudin et al., 2018). Penelitian lain menyebutkan senyawa terisolasi seperti eleutherinoside

A yang diekstraksi dari *Eleutherine palmifolia* ekstrak metanol terbukti menjadi penghambat -glukosidase yang kuat secara in vitro, dengan IC₅₀ dari 0,5 mM. Eleutherol dan eleuthoside B juga berhasil diisolasi tetapi menunjukkan tindakan penghambatan yang lebih sedikit pada aktivitas -glukosidase (IC₅₀ > 1,0 mM). Penelitian menunjukkan bahwa eleutherinoside A adalah senyawa penghambat utama untuk aktivitas -glukosidase, meskipun penghambatannya relatif rendah dibandingkan dengan glukosidase yang tersedia secara komersial seperti acarbose. Selain itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam mencari alternatif baru untuk manajemen diabetes (Tomohiro et al., 2011). Penelitian lain juga menjelaskan pemberian ekstrak bawang dayak sebagai bentuk terapi pada diabetes, walaupun belum mampu meningkatkan kadar insulin secara signifikan, namun telah menunjukkan kecenderungan peningkatan kadar insulin pada dosis yang lebih tinggi yaitu 500 mg/bb. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol umbi bawang dayak menunjukkan aktivitas penurunan kadar glukosa darah dan peningkatan konsentrasi insulin plasma pada tikus wistar diabetes yang diinduksi streptozotocin (Yaturramadhan et al., 2019).

4.3.8 Antijamur

Jamur adalah organisme komensal dan flora normal yang berperan dalam keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh kita, serta ditemukan dalam traktus intestinal, kulit, dan traktus genita urinaria. Selain bermanfaat, jamur juga menyebabkan penyakit ringan hingga berbahaya. Jamur menginfeksi berbagai makhluk hidup termasuk tumbuhan, hewan, dan jamur lainnya. Jamur patogen manusia menyebabkan penyakit serius termasuk aspergillosis, kandidiasis, coccidioidomycosis, cryptococcosis, dan sebagainya. (Dorababu, 2020)

Eleutherine palmifolia mengandung senyawa naphthoquinone yang dikenal sebagai antimikroba, antijamur, antivirus dan antiparasit. Senyawa yang terkandung dalam tumbuhan Bawang Dayak terbukti dapat memberikan daya hambat untuk *Candida albicans* dan *Trichophyton mentagrophytes* (Masfria et al., 2019).

Eleutherine palmifolia diketahui memiliki aktivitas antijamur, dijelaskan bahwa bahwa ekstrak *Eleutherine palmifolia* n-heksana menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap *Candida albicans* dan *Trichophyton mentagrophytes* pada konsentrasi 200 mg/mL dan 20 mg/mL. Penghambatan mikroba menunjukkan zona diameter jernih 19,48 mm dan 21,02 mm untuk *C. Albicans* dan *T. mentagrophytes*, masing-masing, menunjukkan aktivitas anti-mikroba yang unggul. Ekstrak menginduksi perubahan permeabilitas membran terhadap patogen, menyebabkan kematian sel dan pembentukan (Masfria et al., 2019).

4.4 Tinjauan Islam Tentang Penggunaan Obat dari Bahan Alam

Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Agama merupakan sumber ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran agama.

Pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan ilmu pengetahuan terus dilakukan dan hasilnya selalu menunjukkan betapa menakjubkannya isi kandungan Al-Qur'an. Salah satunya yaitu penjelasan terkait khasiat tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dalam pencegahan dan pengobatan berbagai jenis penyakit. Beberapa tumbuhan terbukti memiliki potensi yang luar biasa. Eksplorasi mendalam diperlukan untuk mengetahui khasiat-khasiat dari berbagai tumbuhan. Allah Swt menciptakan beraneka ragam tumbuhan dari jenis bentuk dan manfaatnya yang

berbeda-beda bagi manusia. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat di bawah ini.

Di dalam firman Allah Swt. dalam QS. Thaha/ 20: 53 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّى ۝۳

Terjemahnya :

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu dibumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam” (Kementerian Agama, 2019)

Ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah Swt. menurunkan air dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang beragam jenisnya, dengan adanya tumbuhan yang beraneka ragam jenis ini tentunya memiliki kandungan fitokimia yang beragam pula. Tumbuhan melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan energi yang nantinya digunakan dalam berbagai proses. Zat-zat hasil fotosintesis tersebut nantinya akan digunakan untuk melakukan aktivitas kehidupan. Tumbuhan juga menghasilkan metabolisme sekunder yang berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut dari lingkungannya seperti serangan dari serangga, bakteri, jamur dan jenis pathogen lainnya. Dari tanaman yang bervariasi atau beragam jenisnya baik berbeda famili ataupun spesies akan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda pula. Metabolit sekunder yang berbeda dapat mempunyai manfaat yang sama atau berbeda, tergantung proses biokimiawi yang dipengaruhi. Tentunya hal ini merupakan bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat tertentu agar dapat dimanfaatkan dalam pengobatan (Shihab, 2002).

Berdasarkan ayat diatas dapat dikatakan bahwa Allah Swt telah menurunkan dari langit yaitu air hujan. Dimana air hujan tersebut mampu menumbuhkan

beragam jenis tumbuhan. Salah satu dari beragam tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai bahan alternative dalam pengobatan berbagai penyakit. Salah satu tumbuhan obat tersebut adalah tumbuhan Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) yang memiliki berbagai macam khasiat yang dapat digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit.

Demikian pula berbagai jenis tumbuhan di muka bumi ini belum diketahui manfaatnya secara jelas. Tetapi Allah Swt menjelaskan dalam QS. Asy-Syuara/26:7, maka dari itu manusia diperintahkan untuk belajar dan menggali serta meneliti manfaat dari tumbuhan yang Allah swt ciptakan terutama dalam hal pengobatan untuk menyembuhkan penyakit.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝

Terjemahannya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementerian Agama, 2019).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika manusia mau berpikir dan merenungkan ciptaan Allah Swt di langit dan di bumi, tentu mereka akan sadar. Akan tetapi, hati mereka sudah tertutup dan mata mereka sudah buta, sehingga mereka tetap tidak beriman (Kementerian Agama, 2019).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan makna ayat tersebut menjelaskan ke-Maha Perkasaan Allah Swt, Maha Agung serta Maha Kuasa yang telah menciptakan bumi dan menumbuhkan di dalamnya tumbuh-tumbuhan yang baik berupa tanam-tanama, buah-buahan, dan hewan (Ad-Dimasyqi, 2002).

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diambil pelajaran bahwa Allah Swt menciptakan berbagai jenis tumbuhan di muka bumi ini dengan manfaat yang besar salah satunya sebagai sumber pengobatan, maka dari itu perlu dilakukan penelitian

dalam hal pengembangan tumbuhan sebagai sumber pengobatan salah satunya adalah Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr).

Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan sehingga dalam Al-Quran dan hadis ditemukan banyak referensi tentang kesehatan. Persoalan kesehatan adalah hal yang penting dalam Islam. Terganggunya kesehatan membuat seseorang tidak dapat menajalankan kewajiban dan tugas-tugasnya dengan maksimal. Oleh karena itu penting untuk mempelajari perihal kesehatan menurut pandangan Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. serta mencontoh apa yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah saw. hal ini sesuai dengan hadis Nabi saw.

Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ بُعَاءً

Artinya :

“Setiap penyakit ada obatnya, jika obat dari suatu penyakit itu tepat, ia akan sembuh dengan izin Allah swt.” (HR. Muslim, no. 4084)

Hadits di atas mengisyaratkan dianjurkannya obat. Al Qadhi berkata, “Hadits-hadits ini mengandung sejumlah ilmu agama dan dunia, kebenaran ilmu pengobatan, bolehnya berobat secara global, dan dianjurkannya hal-hal yang disebutkan dalam hadits-hadits yang disebutkan oleh Imam Muslim terkait pengobatan. Hadits ini juga sebagai sanggahan terhadap orang yang mengingkari berobat, yaitu mereka dari kalangan sufi sesat dengan mengatakan, bahwa segala sesuatu tergantung qadha dan qadar sehingga tidak perlu berobat. Hujjah para ulama mereka meyakini bahwa Allah-lah yang berbuat, sementara berobat juga termasuk takdir Allah (An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, 2011).

Dalam hadits lain yang serupa Rasulullah saw. bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu,,anhu, dari Nabi saw., Beliau bersabda: *“Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melaikan Dia pula yang menurunkan obatnya”* (HR. Al-Bukhari, no.5246).

Hadits tersebut dapat diketahui bahwa dalam penyembuhan penyakit bukan berarti upaya manusia untuk meraih kesembuhan tidak diperlukan karena hal tersebut banyak dijelaskan dalam berbagai hadits Nabi Muhammad saw. yang memerintahkan untuk berobat karena dari suatu penyakit yang diberikan oleh Allah Swt. pasti ada obatnya maka dari itu kita harus berusaha mencari obat tersebut dan atas izin-Nya akan disembuhkan dari penyakit tersebut dan perlu diketahui bahwa obat dan dokter hanya sarana kesembuhan, sedangkan yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah Swt.

Hadits tersebut menegaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, untuk itu kita dituntut untuk mencari pengobatan terhadap penyakit yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang kami lakukan. Rasulullah saw. menegaskan bahwa obat tersebut ada, namun dibutuhkan orang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan penelitian serta menemukannya.

Berdasarkan hadits tersebut dijelaskan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Salah satu tumbuhan obat tradisional yang diketahui memiliki khasiat dalam mengobati berbagai penyakit adalah tumbuhan Bawang Dayak.

BAB V

PENUTUP

1.1 *Kesimpulan*

1. Identifikasi hasil dari 22 jurnal yang telah diteliti terdapat 108 kandungan senyawa yang dimiliki tumbuhan Bawang Dayak yaitu, (-)-3-[2-(acetyloxy)propyl]-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphthoquinone, (R)-4-hydroxyeleutherine, 1, 2-dihydroxy-8-methoxy-3-methyl-anthra-9,10-quinone, 1,2-dihydroxy-8-methoxy-3-methylanthraquinone, 1,3,6-trihydroxy-8-methylanthraquinone, 1,4-naphthoquinone derivative- 2- (4-methoxyphenylthio)-5,8-dimethoxy-1,4-naphthoquinone, 1,5-dihydroxy-3-methylanthraquinone, 1-Heptadecanamine, 2,4(1H,3H) pyrimidinedione,dihydro, 2,4,7-Trihidroksi-9,10-Dihidrofenantrena, 2,5-dimethyl-10-hydroxynaphtopyrone 8-O- β -glucopyranoside, 2-acetyl-3,6,8-trihydroxy-1-methyl-anthrax-quinone, 3,2-acetyloxy propyl-2-hydroxy-8-methoxy-1,4-naphthoquinone, 6,8-dihydroxy-3,4-dimethoxy-1-methyl-anthraquinone-2-carboxylic acid methyl ester, 8-hydroxy-3,4-dimethoxy-1-methylantra quinone-2-carboxylic acid methyl ester, 9,10-dihydro-8-hydroxy-3,4-dimethoxy-9,10-dioxo-2-anthracene carboxylic acid methylester, 9,9-dihydroxy-8,8-dimethoxy-1-dimethyl- 1H, 1H-[4,4]bis[naphtha[2,3-c]funanyl]-3,3-dione, 9-hydroxy-8-methoxy-1-methyl-1, 3-dihydronaphtho [2, 3-c] furan-4-O- β -D-glucopyranoside, 9-methoxy-1, 3-dimethyl-1H-naphtho [2, 3-c] pyran-5, 10-dione, 9-Octadecene,1,1-dimethoxy, Acetic acid, Alkaloid, Anthraquinone, Benzeneethanamine,2-fluro-beta, Benzyl alcohol,alpha,-(1-amino), Butyric acid, Chlorogenic acid, Cuspidatumin A, Cyclohexane, (1,2-dimethylbutyl), Cyclohexane, hexyl, Cyclohexanecarbonyl Chloride, Decane,

Dendromonilisida E, Dihydroeleutherinol, Dihydroisoeleutherin-5-O- β -D-gen-tiobioside, Elecanacin, Eleucanainones A-B, Eleucanarol, Eleutherin A-G, Eleutherine, Eleutherinol, Eleutherinol-8-O- β -D-glucoside, Eleutherinone, Eleutherinoside A-B, Eleutherol, Eleutherol A-C, Eleuthinone A-C, Eleuthone, Eleuthoside A-C, Eleuthraquinone A-B, Epicatechin Gallate, Erythrolaccin, Ethanol,2-(2-Aminoethoxy), Fenantrena, Fenolik, Flavanoid, Gallic acid, Glikosida, Glycyl-di-alanine, Hongconin, Hydrazinecarboxamide, Hydroxyurea, Isoeleutherine, Isoeleutherol, Isoeleuthoside C, Kadsuric acid, Kaempferol, Kuinon, Lactic acid, Liquiritigenin, Myricetin, Naphthalene, Naphthoquinone, Natsudaian, Oligosakarida, Phlobatannins, Propionic acid, Proteins, Quercetin, Reducing sugars, Rutin, Saponin, Siklododekanol,1-aminometil-Propane, Steroid, Sterols, Stigmasterol-3-O- β -D-glucopyranoside, Tanin, Terpenoid, β -sitosterol dan Ziganein.

2. Terdapat beberapa bioaktivitas yang dapat ditimbulkan oleh tumbuhan Bawang Dayak diantaranya dapat digunakans sebagai antioksidan, antibakteri, antikanker, penyakit kardiovaskular, antiosteoporosis, antimalarial, antidiabetes dan antijamur.

1.2 Saran

Hasil penelitian ini tentunya membutuhkan penelitian lanjutan dengan cara konprehensif dan eksperimental guna mengembangkan informasi yang dikumpulkan terkait kandungan dan bioaktivitas tumbuhan bawang dayak menjadi sebuah sediaan atau produk yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bentuk upaya peningkatan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aarzoo et al. (2021). Structure Activity Relationship in β -Carboline Derived Anti-malarial Agents. *European Journal of Medicinal Chemistry*, 1-47.
- Amanda et al. (2021). Konservasi Keanekaragaman Hayati Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam. *PISCES : Proceeding of Integrative Science Education Seminar Vol. 1*, 307-313.
- American Diabetes Association. (2013). Diagnosis and Classification of Diabetes. *Diabetes Care Journal, Vol 36*, S67-S74.
- Ammar, Akram et al. (2020). Heat assisted extraction of phenolic compounds from *Eleutherine bulbosa* (Mill.) bulb and its bioactive profiles using response surface methodology. *Industrial Crops & Products*, 1-8.
- Anggi, Regiana et al. (2018). Influence of Extracting Solvents on its Antioxidant Properties of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr). *International Journal of Chemical & Petrochemical Technology*, 1-10.
- Anik, Handayati et al. (2021). Anticoagulant Activity of Dayak Onion Bulb (*Eleutherine bulbosa*) Extract on Human Blood Samples. *Health Notions*, 46-48.
- Antonio, Rafael et al. (2021). Toxicity evaluation of *Eleutherine plicata* Herb. extracts and possible cell death mechanism. *Toxicology Reports*, 1480–1487.
- Arif, Rachman et al. (2015). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Saponin Ekstrak Metanol Daun Binahong (*Anredera cordifolia* (Ten.) Steenis). *Program Studi Farmasi, FMIPA, Universitas Pakuan, Bogor.*, 1-6.
- Atchara, Nuphet et al. (2013). *Eleutherine americana* as a growth promotor for infant intestinal microbiota. *Anaerobe*, 14-19.
- Chen, Deli et al. (2018). New Naphthalene Derivatives from the Bulbs of *Eleutherine americana* with Their Protective Effect on the Injury of HUVECs. *Molecules*, 1-9.
- Chen, Deli et al. (2019). New naphthoquinones derivatives from the edible bulbs of *Eleutherine americana* and their protective effect on the injury of human umbilical vein endothelial cells. *Fitoterapia*, 46-52.
- Crescentiana, Durhanian et al. (2018). Uji Kandungan Fenolik Total dan Pengaruhnya terhadap Aktivitas Antioksidan dari Berbagai Bentuk Sediaan

- Sarang Semut (*Myrmecodia pendens*). *Jurnal Farmasi dan Ilmu Kefarmasian Indonesia*, 62-68.
- Dorababu, Atukuri. (2020). Recent update on antibacterial and antifungal activity of quinoline scaffolds. *Arch Pharm*, 1-20.
- Ekawati, R. (2020). Respon Hasil dan Kadar Total Flavonoid Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr) terhadap Pemberian Naungan. *Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi*, 112–116.
- Febrinda, A et al. (2014). Hyperglycemic control and diabetes complication preventive activities of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) bulbs extracts in alloxan-diabetic rats. *International Food Research Journal*, 1405-1411.
- Firdausi et al. (2015). Study of Electrooptics Behaviour of Naphthalene and Anthracene. *Berkala Fisika*, 113-116.
- Fulka, Nurzaman et al. (2018). Identification of Saponin Content in Red Frangipani (*Plumeria rubra* L.) Extract and Surfactant Potency in Cosmetic Preparations. *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, 85-93.
- Gayatri et al. (2017). Potensi Ekstrak Etanol Bawang Dayak (*Eleutherine americana* Merr.) sebagai Protektor Diameter Tubulus Seminiferus Mencit (*Mus musculus*) Balb/C yang di Induksi Timbal Asetat. *Jurnal Biosains Pascasarjana* , 189-196.
- Indrawati. (2013). *Bawang Dayak si Umbi Ajaib Penekhluk Aneka Penyakit*. Jakarta: PT. Agromedia Pustaka.
- Islamudin, Ahmad et al. (2018). Oral Glucose Tolerance Activity of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) Bulbs Extract Based on the Use of different Extraction Method. *Pharmacogn Journal*, 49-54.
- Jumiarni, W. O. (2017). Eksplorasi Jenis Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Muna Di Permukiman Kota Wuna. *Traditional Medicine Journal*, 45–56.
- Kalidass, Subramaniam et al. (2012). Antagonistic activity of *Eleutherine palmifolia* Linn. *Asian Pacific Journal of Tropical Disease*, S491-S493.
- Kitima et al. (2018). Paper Based DPPH Assay for Antioxidant Activity Analysis. *Analytical Sciences*, Vol 34, 795-800.

- Laura, Ana et al. (2021). Evaluation of the genotoxicity and mutagenicity of isoeleutherin and eleutherin isolated from *Eleutherine plicata* herb. Using bioassays and in silico approaches. *Arabian Journal of Chemistry*, 103084-103094.
- Laxmipirya, Padhi et al. (2015). Antibacterial activity of *Eleutherine bulbosa* against multidrug-resistant Bacteria. *Journal of Acute Medicine*, 53-61.
- Liem, W. (2014). Isolasi dan karakterisasi komponen kimia ekstrak etil asetat umbi bawang dayak (*Eleutherine Americana* (Aubl) Merr) Asal Kota Palu. *Skripsi. Program Studi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Makassar.*
- Luiz et al. (2015). The epidemiology and management of postmenopausal osteoporosis: a viewpoint from Brazil. *Dove Press Journal*, 583-591.
- Masfria et al. (2019). The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of *Eleutherine palmifolia* (L). Merr Bulbs Against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*. *Macedonian Journal of Medical Sciences*, 1-6.
- Minanti et al. (2017). Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavanoid Pada Daun Sembukan (*Paederia foetida* L) Serta Uji Aktivitasnya Sebagai Antioksidan. *Jurna Kimia 11*, 43-48.
- Munaeni, Waode et al. (2017). In Vitro Phytochemical and Inhibitory Potential Tests of Buton Forest Onion Extract (*Eleutherine palmifolia*) on *Vibrio harveyi*. *Microbiology Indonesia*, 75-80.
- Naspiah, N. (2014). Review Article: Tiwai Onion (*Eleutherine americana* Merr.), multifunction plant. *Indonesian Journal of Applied Sciences*, 18–30.
- Nasrudin et al. (2017). Isolasi Senyawa Steroid Dari Kulit Akar Senggugu (*Clerodendrum serratum* L. Moon). *Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi*, 1-9.
- Nollet et al. (2018). Food Analysis and Properties Series Phenolic Compounds in Food Characterization and Analysis. *CRC Press Taylor & Francis Group.*
- Prayitno, Budi. (2018). Optimasi potensi bawang dayak (*Eleutherine* sp.) sebagai bahan obat alternatif. *Jurnal Pendidikan Hayati*, 149–158.
- Rahadiani, K. e. (2019). Peran Senyawa Flavanoid dan Glikosida Jantung Dalam Aktivitas Kardiotonik. *Farmaka Suplemen* , 58-65.

- Retno, N. (2016). Alkaloid Compound Identification of *Rhodomyrtus tomentosa* Stem as Biology Instructional Material for Senior High School X Grade. *Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia*, 231-236.
- Rezky, F. (2015). Penentuan Jenis Tanin dan Penetapan Kadar Tanin dari Buah Bungur Muda (*Lagerstroemia speciosa* Pers.) Secara Spektrofotometri dan Permanganometri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 1-20.
- Riza & Anton. (2018). Effects of Dayak Onion Bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb on Bone Development of the Hypoestrogen Model Rat. *Pharmacogn Journal*, 299-303.
- Renita & Anton. (2019). Antiosteoporosis Effects of 70% Ethanolic Extract Combination of Dayak Onion Bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb) and Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) on the Hypoestrogen Rats. *Pharmacogn Journal*, 632-638.
- Shihab, M. (2006). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati.
- Tjitrosoepomo. (2010). *Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tomohiro, Ieyama et al. (2011). α -Glucosidase inhibitors from the bulb of *Eleutherine Americana*. *Food Chemistry*, 308-3011.
- Ulfah et al. (2018). Sintesis Senyawa Turunan Antrakuinon Menggunakan Vanilil Alkohol dan Ftalat Anhidrida. *Jurnal Kimia Khatulistiwa*, 25-32.
- Valdicley, Valey et al. (2020). Naphthoquinones isolated from *Eleutherine plicata* herb: in vitro antimalarial activity and molecular modeling to investigate their binding modes. *Medicinal Chemistry Research*, 1-8.
- Waode, Munaeni et al. (2020). Effect in white shrimp *Litopenaeus vannamei* of *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. Powder on immune genes expression and resistance against *Vibrio parahaemolyticus* infection. *Fish and Shellfish Immunology*, 218-227.
- Waode, Munaeni et al. (2020). The Potential of Buton Forest Onion *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. Extract as a Prebiotic and an Antioxidant. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*, 107-111.

- Yanti, Fitri et al. (2014). Effects of Inhibition Cell Cycle and Apoptosis of Sabrang Onion extract (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.) on Breast Cancer Cells. *International Journal of PharmTech Research*, 1392-1396.
- Yaturramadhan, Hasni et al. (2019). The Effect of Ethanolic Extract of Dayak Onion (*Eleutherine palmifolia* L. Merr) Tuber on Blood Glucose and Insulin Level of Streptozotocin-Induced Diabetic Wistar Rat. *Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development*, 38-42.
- Yoshiyuki et al. (2018). Anticancer Activity in Honeybee Propolis: Functional Insights to the Role of Caffeic Acid Phenethyl Ester and Its Complex With γ -Cyclodextrin. *Sage Journals*, Vol 17, 867-873.
- Zaninovic et al. (2018). Management of Measurable Variable Cardiovascular Disease' Risk. *Bentham Sciences Publisher*, 153-161.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Situs pencarian pustaka

The screenshot shows a Google Scholar search for "Aktivitas bawang dayak". The search results are sorted by relevance and show four articles. The first article is "Penentuan Aktivitas antioksidan ekstrak etanol bulbus **bawang dayak** (*Eleutherine americana* Merr.)" by EM Kuntorini, MD Astuti, published in Jurnal Ilmiah Berkala Sains dan Terapan. The second article is "Struktur anatomi dan **aktivitas** antioksidan bulbus **bawang dayak** (*Eleutherine americana* Merr.) dari daerah Kalimantan Selatan" by EM Kuntorini, MD Astuti, LH Nugroho, published in Berkala Penelitian Hayati. The third article is "Uji **aktivitas** antijamur ekstrak etanol umbi **bawang dayak** (*eleutherine americana* (aubl.) merr. ex k. heyne.) terhadap trichophyton mentagrophytes secara in vitro" by W Christopher, D Nafala, published in Jurnal Kesehatan. The fourth article is "Uji **Aktivitas** Antioksidan Umbi **Bawang Dayak** (*Eleutherinebulbosa* Merr.)" by KM Yulawati, published in Prosiding Farmasi.

Kata kunci : Aktivitas bawang dayak

The screenshot shows a Google Scholar search for "Kandungan bawang dayak". The search results are sorted by relevance and show three articles. The first article is "Pertumbuhan, Produksi Umbi dan **Kandungan** Flavonoid **Bawang Dayak** dengan Pemberian Pupuk Daun" by R Ekawati, published in Agrosintesa Jurnal Ilmu Budidaya Pertanian. The second article is "Optimasi Potensi **Bawang Dayak** (*Eleutherine* Sp.) Sebagai Bahan Obat Alternatif" by B Prayitno, BH Mukti, published in Jurnal Pendidikan Hayati. The third article is "Penetapan kadar flavonoid total ekstrak etanol 70% daun **bawang dayak** (*eleutherine palmifolia* L.) dengan metode spektrofotometri UV-VIS" by E Kumalasari, MA Nazir, published in Jurnal Insan Farmasi. There is also a fourth article snippet from researchgate.net about the growth, production, and flavonoid content of **bawang dayak**.

Kata kunci : Kandungan bawang dayak

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan scholar.google.com

Google Scholar bioactivities of Eleutherine palmifolia

Articles About 125 results (0.10 sec) My profile My library

Any time
Since 2022
Since 2021
Since 2018
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

include patents
 include citations

Create alert

Effect of ultrasonic assisted extraction on Dayak onion powder extraction (*Eleutherine palmifolia*) [PDF] iop.org
Y. Hendrawan, E.H. Herdiningsih, ... Series: Earth and ... 2020 - iopscience.iop.org
... Dayak onion (*Eleutherine palmifolia*) is a typical plant of Central Borneo, Indonesia, which ... It has **bioactivity** as an antioxidant. Extraction using the ultrasonic assisted extraction (UAE) ...
☆ Save 99 Cite Cited by 2 Related articles All 4 versions

Compound identification and anticancer activity of Ethyl Acetate fraction from Bawang Sabrang (*eleutherine palmifolia* (L.) Merr.) on HeLa cervical cancer cell line [PDF] uin-malang.ac.id
R. Mutiah, R.A. Kristanti, E. Susanti, ... Journal of Cancer ... 2019 - repository.uin-malang.ac.id
... *palmifolia* bulbs was extracted by maceration. The extraction with ... ethyl acetate fraction had the highest **bioactivity**. IC50 values of ... *palmifolia* bulbs is potential to be developed as an ...
☆ Save 99 Cite Cited by 6 Related articles All 9 versions

Hyperglycemic control and diabetes complication preventive activities of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) bulbs extracts in alloxan-diabetic rats.
A.E. Febrinda, N.D. Yuliana, E. Ridwan, ... International Food ... 2014 - search.ebscohost.com
Abstract Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) is ... extracts (EPE) of *Eleutherine palmifolia* L. Merr. bulbs to ... justify the traditional use of *Eleutherine palmifolia* L. Merr. ...
☆ Save 99 Cite Cited by 55 Related articles All 3 versions

[HTML] The antibacterial activity of dayak onion (*Eleutherine palmifolia* (L.) merr) towards pathogenic bacteria [HTML] nih.gov
T.D. Harita, A. Asnani - Tropical life sciences research, 2018 - ncbi.nlm.nih.gov
... Effectiveness of garlic dayak (*Eleutherine palmifolia*) extract inhibits the growth of bacteria Escherichia coli. Faculty of Medicine and Health Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic ...
☆ Save 99 Cite Cited by 29 Related articles All 6 versions

The effect of dayak onion (*Eleutherine palmifolia* (L.) merr) tuber extract against ... [PDF] researchgate.net

Kata kunci : *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan scholar.google.com

Google Scholar compounds of Eleutherine palmifolia

Articles About 883 results (0.06 sec) My profile My library

Any time
Since 2022
Since 2021
Since 2018
Custom range...

Sort by relevance
Sort by date

Any type
Review articles

include patents
 include citations

Create alert

New Wnt/ β -Catenin Signaling Inhibitors Isolated from *Eleutherine palmifolia*
X.L. Li, T. Ohtsuki, T. Koyano, ... Chemistry-An Asian ... 2009 - Wiley Online Library
... As a result, we found that *Eleutherine palmifolia* (Indiaceae) selectively suppressed TCF/ β -catenin transcriptional activity (45% inhibition at 5 μ g mL⁻¹) and its active **constituents** were ...
☆ Save 99 Cite Cited by 72 Related articles All 6 versions


[HTML] The antibacterial activity of dayak onion (*Eleutherine palmifolia* (L.) merr) towards pathogenic bacteria [HTML] nih.gov
T.D. Harita, A. Asnani - Tropical life sciences research, 2018 - ncbi.nlm.nih.gov
... Since not all bioactive **compounds** which have antibacterial activities ... **compounds** from the Dayak onion. Hence, the purpose of this research was to extract the antibacterial **compounds** ...
☆ Save 99 Cite Cited by 29 Related articles All 6 versions

[PDF] The effect of extraction methods of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. MERR) against TLC profiles and sunscreen activities [PDF] unmul.ac.id
I. Ahmad, M. Arifuddin, L. Rijal - Int J PharmTech Res, 2016 - repository.unmul.ac.id
A research has been conducted on the effect of extraction methods of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr) against TLC profiles and sunscreen activity. The study aims to ...
☆ Save 99 Cite Cited by 22 Related articles All 2 versions


Antagonistic activity of *Eleutherine palmifolia* Linn [PDF] researchgate.net
K. Subramaniam, S. Suriyamoorthy, F. Wahab, ... Asian Pacific Journal of ... 2012 - Elsevier
... Acidic **compounds** ... determine the inhibition zones of *Eleutherine palmifolia* bulb ethanolic extract. The ... showed that at least 17 **compounds** were present in ethanolic extract of *Eleutherine* ...
☆ Save 99 Cite Cited by 21 Related articles All 4 versions

Oral glucose tolerance activity of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) bulbs extract based on the use of different extraction method [PDF] phcogj.com
I. Ahmad, N.S.S. Ambaryati, N. Indhyani, ... Pharmacognosy ... 2018 - phcogj.com
... Moreover, based on the best our knowledge, the pure of the active **compound** as antidiabetic

Kata kunci : *Compunds of Eleutherine palmifolia*



Kata kunci : Aktivitas bawang dayak



Kata kunci : Kandungan bawang dayak

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov bioactivities of eleutherine palmifolia Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Found 1 result for *bioactivities of eleutherine palmifolia* Save Email Send to Display options

Review > Int J Mol Sci. 2021 Jun 23;22(13):6747. doi: 10.3390/ijms22136747.

Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. Bulb: Review of the Pharmacological Activities and Its Prospects for Application

Ammar Akram Kamarudin¹, Nor Hafiza Sayuti¹, Norazalina Saad², Nor Asma Ab Razak¹, Norhaizan Mohd Esa^{1,3}

Affiliations + expand
PMID: 34201683 PMCID: PMC8268349 DOI: 10.3390/ijms22136747
Free PMC article

Abstract

Natural product is an excellent candidate for alternative medicine for disease management. The bulb of *E. bulbosa* is one of the notable Iridaceae family with a variety therapeutic potential that is widely cultivated in Southeast Asia. The bulb has been used traditionally among the Dayak

FULL TEXT LINKS
FULL TEXT OPEN ACCESS MDPI
Full text PMC

ACTIONS
Cite Favorites

SHARE
Twitter Facebook LinkedIn

PAGE NAVIGATION

Kata Kunci : *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov compounds of eleutherine palmifolia Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS

RESULTS BY YEAR
2009 2022

TEXT AVAILABILITY
 Abstract
 Free full text
 Full text

ARTICLE ATTRIBUTE
 Associated data

3 results Page 1 of 1

1 **The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of *Eleutherine palmifolia* (L.) Merr Bulbs Against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*.**
Masfria M, Tampubolon MSA.
Open Access Maced J Med Sci. 2019 Nov 14;7(22):3777-3780. doi: 10.3889/oamjms.2019.502. eCollection 2019 Nov 30.
PMID: 32127974 Free PMC article.
AIM: This research aimed to determine the characteristics of dried bulbs of *Eleutherine palmifolia*, the group of active chemical compounds contained in n-hexane extract of *Eleutherine palmifolia* bulbs and the antifungal activity of n-hexane extr ...

2 **The Antibacterial Activity of Dayak Onion (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr) towards Pathogenic Bacteria.**
Harlita TD, Oedjiono, Asnani A.
Trop Life Sci Res. 2018 Jul;29(2):39-52. doi: 10.21315/lsr.2018.29.2.4. Epub 2018 Jul 6.
PMID: 30112140 Free PMC article.
Antibacterial activity of indigenous Dayak onion (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr) was investigated.

Kata kunci : *Compunds of Eleutherine palmifolia*

The screenshot shows the ScienceDirect website interface. At the top, there are navigation links for "Journals & Books", "Register", and "Sign in". The search bar contains the text "aktivitas bawang dayak". Below the search bar, it says "Find articles with these terms" and "Advanced search". The main content area displays "No results found. Please check for typos, or use fewer terms or fields." The footer includes links for "About ScienceDirect", "Remote access", "Shopping cart", "Advertise", "Contact and support", "Terms and conditions", and "Privacy policy". There is also a "RELX" logo and a "FEEDBACK" button.

Kata kunci : Aktivitas bawang dayak

The screenshot shows the ScienceDirect website interface with search results for "kandungan bawang dayak". The search bar contains the text "kandungan bawang dayak". Below the search bar, it says "Find articles with these terms" and "Advanced search". The main content area displays "1 result found". On the left, there are "Refine by:" options for "Years" (2014 (1)) and "Subject areas" (Arts and Humanities (1), Social Sciences (1)). The search results list a "Research article" titled "Amalan Perubahan Tradisional Masyarakat Melayu Sarawak" from "Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15 May 2014, ...". The authors listed are "Rosnah Mustafa, Radina Mohd Deli, ... Wan Robiah Meor Osman". There is a "Download PDF" link. Below the article, there is a "Sign in" button and a message: "Want a richer search experience? Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options." At the bottom, it says "Display: 25 50 100 results per page" and "Page 1 of 1". The footer includes links for "About ScienceDirect", "Remote access", "Shopping cart", "Advertise", "Contact and support", "Terms and conditions", and "Privacy policy". There is also a "RELX" logo and a "FEEDBACK" button.

Kata kunci : Kandungan bawang dayak

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan | scienceirect.com | Journals & Books | Register | Sign in

Find articles with these terms

Advanced search

5 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2022 (1)
- 2021 (1)
- 2020 (1)

Show more

Article type

- Research articles (4)
- Book chapters (1)

Publication title

- Industrial Crops and Products (1)
- Journal of Ethnopharmacology (1)
- Acta Ecologica Sinica (1)

Show more

Research article
 Heat assisted extraction of phenolic compounds from **Eleutherine** bulbosa (Mill.) bulb and its **bioactive** profiles using response surface methodology
 Industrial Crops and Products, 24 December 2019, ...
 Ammar Akram Kamarudin, Norhaizan Mohd. Esa, ... Nor Asma Ab. Razak

Research article
 Induction of apoptosis by **Eleutherine** bulbosa (Mill.) Urb. bulb extracted under optimised extraction condition on human retinoblastoma cancer cells (WER1-Rb-1)
 Journal of Ethnopharmacology, 21 October 2021, ...
 Ammar Akram Kamarudin, Nor Hafiza Sayuti, ... Norhaizan Mohd Esa

Want a richer search experience?
 Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

FEEDBACK

Kata kunci : *Bioactivities of Eleutherine palmifolia*

Safari File Edit Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan | scienceirect.com | Journals & Books | Register | Sign in

Find articles with these terms

Advanced search

7 results sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2022 (1)
- 2020 (1)
- 2016 (1)

Show more

Article type

- Research articles (6)
- Book chapters (1)

Publication title

- Journal of Ethnopharmacology (2)
- Industrial Crops and Products (1)
- Food Chemistry (1)

Show more

Research article
 Antagonistic activity of **Eleutherine palmifolia** Linn
 Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 2017, ...
 Kalidass Subramaniam, Sembian Suriyamoorthy, ... Gilbert Ross Rex


Research article
 Heat assisted extraction of phenolic **compounds** from **Eleutherine** bulbosa (Mill.) bulb and its bioactive profiles using response surface methodology
 Industrial Crops and Products, 24 December 2019, ...
 Ammar Akram Kamarudin, Norhaizan Mohd. Esa, ... Nor Asma Ab. Razak

Want a richer search experience?
 Sign in for article previews, additional search fields & filters, and multiple article download & export options.

FEEDBACK

Kata kunci : *Compounds of Eleutherine palmifolia*


Lampiran 2. Daftar artikel yang dianalisis



Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

International Journal of Chemical & Petrochemical Technology (IJCPT)
ISSN(P): 2277-4807; ISSN(E): 2319-4464
Vol. 6, Issue 2, Apr 2016, 1-10
© TJPRC Pvt. Ltd.

 **TRANS STELLAR**
Journal Publications • Research Consultancy

INFLUENCE OF EXTRACTING SOLVENTS ON ITS ANTIOXIDANT PROPERTIES OF BAWANG DAYAK (*ELEUTHERINE PALMIFOLIA L. MERR*)

ANGGI REGIANA AGUSTIN, SITTI FAIKA & YI-HSU JU
Department of Chemical Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan

ABSTRACT

Bawang dayak (Eleutherine palmifolia L. Merr) is an indigenous plant in Borneo, Indonesia, traditionally used by Dayak tribes to treat degenerative diseases such as diabetes mellitus and cancer. In this study, 2.5 gram of sample powdered was extracted using 100 ml of deionized water, methanol in various concentrations (30%, 50%, 70%, 90%, and 100% v/v), absolute ethanol, acetone, and ethyl acetate at 40°C for 6 h. The antioxidant activity, total phenolic content (TPC) and total flavonoid content (TFC) of the freeze-dried E. palmifolia extracts were investigated using various in vitro assays. The extract obtained by 70% methanol in deionized water showed the strongest antioxidant activity (IC50 39.06±2.33 µg/mL) and DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) radical scavenging activity, while absolute acetone extract showed the weakest antioxidant activity (IC50 235.90±2.12 µg/mL). Aqueous methanol (70% methanol) also was most effective in extracting polyphenol (phenolic content of 20.05±0.06 mg gallic acid equivalent/g of dry sample weight and flavonoid content of 15.03±0.11 mg quercetin equivalent/g of dry sample weight), while absolute ethanol, acetone, ethyl acetate and water were less effective in extracting polyphenol. The highest extraction yield was obtained by using water (21.40±0.04 %). These results suggest that E. palmifolia is a potential source of natural antioxidant for food and dietary applications with a potential to reduce oxidative stress.

Halaman 1 / 10


Original Article

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Health Notions, Volume 5 Number 2 (February 2021) ISSN 2580-4936

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/hn50202>
<http://heanoti.com/index.php/hn>

 **HEALTH NOTIONS**

RESEARCH ARTICLE
URL of this article: <http://heanoti.com/index.php/hn/article/view/hn50202>

Anticoagulant Activity of Dayak Onion Bulb (*Eleutherine bulbosa*) Extract on Human Blood Samples

Anik Handayati^{1(C*)}, Syamsul Arifin², Monica Putji Astuti³
¹Department of Medical Laboratory Technology, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Indonesia; anik_handayati@yahoo.co.id (Corresponding Author)
²Department of Medical Laboratory Technology, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Indonesia
³Department of Medical Laboratory Technology, Poltekkes Kemenkes Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

Cardiovascular disease can occur due to disruption of the hemostatic system by forming blood clots in blood vessels, or commonly known as deep vein thrombosis. The curative action that has been carried out in the form of heparin anticoagulant administration had many side effects such as bleeding, hematuria, thrombocytopenia, and hypersensitivity; therefore, alternative anticoagulant ingredients such as onion bulbs have emerged. Dayak onion bulb (*Eleutherine bulbosa*) is known to contain eleutherinol compound, which has anticoagulant activity. This study aims to determine the potential anticoagulant activity of Dayak onion bulbs extract (*Eleutherine bulbosa*) on human blood samples. This anticoagulant activity test was carried out by observing the length of time for blood clotting in the extract treatment group with several concentrations (0, 10, 12.5, 16, 25, and 50%) by Clotting Time (Lee-White) method. The results showed a significant delay in blood coagulation time in the group treated with Dayak onion bulbs extract as increasing the concentration. About 50% Dayak onion bulb extract was showed a twofold increase in blood coagulation time than that of no extract administration. So that, Dayak bulb onion has the opportunity to be an alternative natural anticoagulant.

Keywords: anticoagulants; Dayak onion bulbs (*Eleutherine bulbosa*); clotting time

INTRODUCTION

The mechanism of hemostasis is divided into three stages, namely vasoconstriction of blood vessels, cellular reactions to platelet plug formation, and biochemical reactions of fibrin formation. If the blood vessels are injured, there will be vasoconstriction of the blood vessels in order to reduce blood flow to the blood vessels. This condition triggers the formation of a platelet plug due to the attachment of platelet clusters in the blood vessels⁽¹⁾. This hemostatic system if it is obstructed or excessive, will contribute to problems in the form

Halaman 1 / 10

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Pharmacogn J. 2018; 10(2): 299-303
A Multidisciplinary Journal in the Field of Natural Products and Pharmacognosy
www.phcogj.com | www.jurnalmedicosci.org | www.aibhoj.net

Original Article

Effects of Dayak Onion Bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb) on Bone Development of the Hypoestrogen Model Rat

Anton Bahtiar*, Riza Annisa

ABSTRACT
Background: Eleutherinol is a naphthoquinone derivative that has strong affinity to bind with estrogen alpha receptors (ER α). This compound can be found in Dayak Onion Bulbs (*Eleutherine bulbosa* Mill.). **Objective:** The purpose of this study is to analyze the effects of Dayak Onion Bulbs extract on the growth of the bone of hypoestrogen model rat. **Methods:** A total of 36 female white rats of *Sprague-Dawley* were divided into 6 groups. All 6 groups receive CMC Na 0.5% (*sham group*), CMC Na 0.5% (negative group), tamoxifen (positive group), three level of dayak onion bulbs extract doses namely dose 8 mg/200 g, 12 mg/200 g, and 18 mg/200 g. All groups, except the sham, is ovariectomized to obtain the conditions of hypoestrogen. After ovariectomy, all rats were evaluated for the success of ovariectomy on day 35, followed by the administration of the extracts by oral administration for 21 days. After 21 days administration, the level of bone calcium, bone weight, and bone length were measured by Atomic Absorption Spectrophotometry. **Results:** Dayak onion bulbs extract at dose 3 (18 mg/200 g BW) could increase significantly bone calcium level, bone weight, and bone length of hypoestrogen rat. **Conclusion:** The results showed that Dayak onion bulbs extract could be developed to be a drug for menopause woman in the future.
Key words: Dayak onion bulbs, Bone calcium level, Bone weight, Bone length, Hypoestrogen, Menopause.

Anton Bahtiar*, Riza Annisa
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, Depok, 16424 West Java, INDONESIA.
Correspondence
Anton Bahtiar
Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy of Universitas Indonesia, Faculty of Pharmacy, Universitas Indo-

INTRODUCTION
Menopause is a condition of low estrogen hormone produced by the ovaries in the end of the menstrual cycle. Menopause occurs in women in the age range of 45 and 55 years old.¹ Decreased levels of estrogen hormone in postmenopausal women will show some symptoms that may arise can be classified into intake of calcium and vitamin D, and side effects of some drugs.⁵ Various symptoms that arise after menopause can be overcome with the use of hormone replacement therapy (HRT). Hormone replacement therapy works as non-selective and agonist to all estrogen receptors, thus increasing the proliferation of all estrogen-

Halaman 11 / 1854

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Pharmacogn J. 2019; 11(4):632-638.
A Multidisciplinary Journal in the Field of Natural Products and Pharmacognosy
www.phcogj.com

Original Article

Antiosteoporosis Effects of 70% Ethanolic Extract Combination of Dayak Onion Bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb) and Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.) Walp.) on the Hypoestrogen Rats

Anton Bahtiar*, Renita Dewi

ABSTRACT
Introduction: Cowpea and Dayak onion bulbs extracts were proven to have an effect on bone, cause by the content of daidzein and eleutherinol which has been known to have an affinity to bind with estrogen receptor selectively. The objective of this study to determine the effects of Dayak onion bulbs and cowpea extract combination on the level of bone calcium, bone weight, and the scoring of bone marrow fat in the hypoestrogen rats compared with the single dose of cowpea extract. **Material and Methods:** This study used 32 female, white Sprague-Dawley rats were divided into eight groups. The SHAM group was given CMC 0.5%; the negative group was given CMC 0.5%, the positive group was given raloxifene 1.08 mg/200 g BW, cowpea group was given cowpea extract 100 mg/200 BW. The dose variation was given 70% ethanolic extract combination of Dayak onion bulbs and cowpea with four doses variation 36 mg/200 g; 100 mg/200 g BW, 18 mg/200 g; 100 mg/200 g BW, 9 mg/200 g; 100 mg/200 g BW, and 4.5 mg/200 g; 100 mg/200 g BW. Ovariectomy was performed on all groups except the SHAM to obtain the condition of hypoestrogen. Four weeks after the surgery, the rats were treated with an oral administration of extract daily for 28 days. Determination of the levels of tibia bone calcium, tibia bone weight, and the scoring of tibia bone marrow fat counted on day 29. **Results:** The result showed that Dayak onion bulbs and cowpea extract combination were able to elevate the level of bone calcium and bone weight significantly, and reduced the scoring of bone marrow fat higher than a single dose of cowpea extract. **Conclusions:** The results showed that Dayak onion bulbs and cowpea extract combination could be developed to be a drug for osteoporosis in the future.
Key words: Antiosteoporosis, Bone calcium, Bone marrow fat, Bone weight, Cowpea, Dayak onion bulbs, Raloxifene.

Anton Bahtiar*, Renita Dewi
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok 16424, INDONESIA.
Correspondence
Anton Bahtiar
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, Kampus UI, Depok 16424, INDONESIA.
Phone no: +62 21 7864049;
Fax: +62 21 7863433;
E-mail: anton.bahtiar@farmasi.ui.ac.id

History

- Submission Date: 17-12-2018;
- Review completed: 22-03-2019;
- Accepted Date: 06-04-2019.

DOI : 10.5530/pj.2019.11.101
Article Available online
http://www.phcogj.com/V11/I4
Copyright

Halaman 7 / 7

have been well documented to promote increased bone mass. The physiological functions of estrogenic

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Toxicology Reports 8 (2021) 1480-1487

Contents lists available at ScienceDirect

Toxicology Reports

journal homepage: www.elsevier.com/locate/toxrep

Toxicity evaluation of *Eleutherine plicata* Herb. extracts and possible cell death mechanism

Antonio Rafael Quadros Gomes^a, Natasha Costa da Rocha Galucio^{b,c},
 Kelly Cristina Oliveira de Albuquerque^d, Heliton Patrick Cordovil Brigido^a,
 Everton Luiz Pompeu Varela^{d,e}, Ana Laura Gadelha Castro^b, Valdicley Vieira Vale^a,
 Marcelo Oliveira Bahia^f, Rommel Mario Rodriguez Burbano^{b,f}, Fábio Alberto de Molfeta^g,
 Liliane Almeida Carneiro^h, Sandro Percario^{d,e}, Maria Fani Dolabela^{a,c,d,*}

^a Postgraduate Program in Pharmaceutical Innovation, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^b Postgraduate Program in Genetics and Molecular Biology, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^c Postgraduate Program in Pharmaceutical Sciences, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^d Postgraduate Program in Biodiversity and Biotechnology, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^e Oxidative Stress Research Laboratory, Institute of Biological Sciences, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^f Postgraduate Program in Neuroscience and Cell Biology, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^g Postgraduate Program in Chemistry, Federal University of Pará, Av. Augusto Corrêa, 1, Guamá, 66075-110, Belém, PA, Brazil
^h National Primate Center, Rodovia Br 316, Km. 7, 67-030-000, Ananindeua, PA, Brazil

ARTICLE INFO

Handling Editor: Dr. Aristidis Tsatsakis

Keywords:
Eleutherine plicata
 Toxicity
 Isoeleutherin
 Eleutherin
 Eleuthero

ABSTRACT

Eleutherine plicata has been shown to be a promising medicinal plant, and its activity has been associated with naphthoquinones. The present study aimed at evaluating the cytotoxicity, genotoxicity, and oral toxicity of the ethanol extract (EEE), dichloromethane fraction (FMDEP) of *E. plicata*, and isoeleutherin. For the cytotoxicity evaluation, the viability test (MTT) was used. Genotoxicity was assessed through the Comet assay (alkaline version), acute and subacute oral toxicities were evaluated. The antioxidant capacity of the samples in the well Halamane cells was tested with *E. plicata* and isoeleutherin. Furthermore, the participation of caspase-8 in the possible mechanism of action of isoeleutherin, eleutherin, and eleuthero was also investigated through a

Halaman 1 / 6

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Anaerobe 20 (2013) 14-19

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Anaerobe

journal homepage: www.elsevier.com/locate/anaerobe

***Eleutherine americana* as a growth promotor for infant intestinal microbiota**

Atchara Nuphet Phoem^{a,b}, Supayang Piyawan Voravuthikunchai^{a,b,*}

^a Department of Microbiology, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand
^b Natural Products Research Center, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Hat Yai, Songkhla 90112, Thailand

ARTICLE INFO

Article history:
 Received 22 February 2012
 Received in revised form 17 January 2013
 Accepted 23 January 2013
 Available online 30 January 2013

Keywords:
Eleutherine americana
 Fermentation
 Growth-promoting activity
 Infant intestinal microbiota
 Prebiotic oligosaccharides
 Short chain fatty acid



ABSTRACT

Eleutherine americana extract and its oligosaccharides extract were demonstrated for their growth-promoting activities on mixed infant intestinal microbiota and individual bacterial species including *Bacteroides*, bifidobacteria, clostridia, and lactobacilli. Fermentation of all the substrates resulted in about 1–2 log increase in the numbers of bifidobacteria belonging to the dominant infant gut microbiota. The highest levels of the bacterial populations were resulted from the oligosaccharides extract. The oligosaccharides extract stimulated the growth of bifidobacteria in mixed and individual populations by increasing their numbers from 9.63 to 12.08 and 5.80 to 8.85 log cfu/ml, respectively within 48 h. In addition, *Bacteroides* populations were enhanced by fermentation of *E. americana* extract. Increase in lactobacilli level was observed from fermentation by a single bacterial species, but not from the mixed cultures. Fermentation of the extract, oligosaccharides extract, and commercial fructo-oligosaccharides by both mixed and individual intestinal microbiota resulted in increase in the production of short chain fatty acids. Acetic acid production was predominant, followed by lactic acid and minor amount of propionic and butyric acids. The highest production of acetic acid was resulted from the oligosaccharides extract. Increase in the acetic acid in mixed and individual species of bifidobacterial populations ranged from 1.21 to 34.26 and 1.02–25.21 mM, respectively. This study showed that *E. americana* can be considered as a potential prebiotic which may be supplemented as an ingredient in functional foods.

Halaman 1 / 6

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Article

New Naphthalene Derivatives from the Bulbs of *Eleutherine americana* with Their Protective Effect on the Injury of HUVECs


De-Li Chen ^{1,†}, Mei-Geng Hu ^{2,†}, Yang-Yang Liu ¹, Rong-Tao Li ¹, Meng Yu ^{1,2}, Xu-Dong Xu ² and Guo-Xu Ma ^{1,2,*}

¹ Hainan Branch of Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medicinal Sciences & Peking Union Medical College (Hainan Provincial Key Laboratory of Resources Conservation and Development of Southern Medicine), Haikou 570311, China; chendeli9999@163.com (D.-L.C.); eadchris@163.com (Y.-Y.L.); lrt199@126.com (R.-T.L.); jokeryml@163.com (M.Y.)

² Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, No. 151, Malianwa North Road, Haidian District, Beijing 100193, China; humeigeng@outlook.com (M.-G.H.); xdxu2012@163.com (X.-D.X.)

* Correspondence: gxml@implad.ac.cn or mgxfl8785@163.com; Tel.: +86-010-5783-3296


† These authors contributed equally to this work.

Received: 25 July 2018; Accepted: 19 August 2018; Published: 22 August 2018 

Abstract: Five new naphthalene derivatives, named Eleutherols A-C (1-3) and Eleuthinones B-C (4,5), together with three known compounds were isolated from the bulbs of *Eleutherine americana*. Their structures were elucidated on the basis of spectroscopic analysis including HR-ESI-MS, 1D and 2D NMR techniques. These compounds exhibited a potent effect against the injury of human umbilical vein endothelial cell (HUVECs) induced by high concentrations of glucose in vitro.

Keywords: *Eleutherine americana*; naphthalene derivatives; HUVECs

Halaman 1 / 9



Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Fitoterapia 132 (2019) 46–52

Contents lists available at ScienceDirect

 **Fitoterapia** 

journal homepage: www.elsevier.com/locate/fitote

New naphthoquinones derivatives from the edible bulbs of *Eleutherine americana* and their protective effect on the injury of human umbilical vein endothelial cells

Deli Chen ^{a,1}, Jing Qiao ^{a,b,1}, Zhaocui Sun ^b, Yangyang Liu ^a, Zhonghao Sun ^b, Nailiang Zhu ^b, Xudong Xu ^b, Junshan Yang ^b, Guoxu Ma ^{a,b,*}

^a Hainan Branch Institute of Medicinal Plant Development (Hainan Provincial Key Laboratory of Resources Conservation and Development of Southern Medicine), Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, Haikou 570311, China

^b Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences, Peking Union Medical College, No. 151, Malianwa North Road, Haidian District, Beijing 100193, China

ARTICLE INFO

Keywords:
 Iridaceae family
Eleutherine americana
 Naphthoquinone derivatives
 Biosynthetic pathway
 HUVECs

ABSTRACT

Seven new naphthoquinone derivatives, named eleutherins A-G (1-7), were isolated from the edible bulbs of *Eleutherine americana* (Hang-Cong), which belongs to the Iridaceae family. Their structures were elucidated on the basis of spectroscopic analysis including high-resolution-electron spray ionization-mass spectrometry (HR-ESI-MS) and 1D and 2D nuclear magnetic resonance (NMR) techniques. The absolute configurations of compounds 1-4 were determined by experimental and calculated data. Additionally, a hypothetical biosynthetic pathway of 1-7 was postulated. All the isolates were evaluated for their protective effect against the injury of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) in vitro. Eleutherins A and B (1-2) showed a potential protective effect on microvessels.

1. Introduction

Halaman 1 / 7



Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

International Food Research Journal 21(4): 1405-1411 (2014)
Journal homepage: <http://www.ifrj.upm.edu.my>

Hyperglycemic control and diabetes complication preventive activities of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) bulbs extracts in alloxan-diabetic rats

^{1,2}Febrinda, A. E., ¹Yuliana, N. D., ⁴Ridwan, E., ³Wresdiyati, T. and ¹Astawan, M.

¹Department of Food Science and Technology, IPB Darmaga Campus, PO BOX 220, Bogor Agricultural University, Bogor 16680, Indonesia
²Department of Plantation Product Processing Technology, Samarinda State Agricultural Polytechnic, Samarinda 75131, Indonesia
³Department of Anatomy, Physiology and Pharmacology, Faculty of Veteriner Medicine, Bogor Agricultural University, Bogor 16680, Indonesia
⁴The Center of Applied Technology of Health and Clinical Epidemiology, Bogor 16111, Indonesia

Article history
Received: 7 January 2014
Received in revised form: 7 February 2014
Accepted: 8 February 2014

Abstract
Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) is traditionally used to cure diabetes mellitus and other diseases by Dayak tribes in Kalimantan Island, Indonesia, despite there is no scientific reports on its anti-diabetic activity both *in-vitro* or *in-vivo*. The study aimed to evaluate the ability of aqueous (EPA) and ethanolic extracts (EPE) of *Eleutherine palmifolia* L. Merr. bulbs to control hyperglycemic condition in alloxan-induced diabetic rats. Treatment with 100 mg/kg EPA or EPE for 28 days: (1) maintained the body weight of diabetic rats similar to those of non diabetic rats, (2) significantly reduced blood serum glucose level as compared to untreated-diabetic rats, (3) significantly had higher blood serum insulin level as compared to untreated-diabetic rats, (4) significantly had lower blood serum total cholesterol and LDL levels compared to untreated-diabetic rats. The data of ¹H and 2D NMR spectra of EPE revealed the existence of eleutherinoids A, eleutherinoids B, and eleuthanol previously reported to be present

Keywords
Eleutherine palmifolia (L.) Merr.
Bawang dayak
Diabetes
Antioxidant

Halaman 1 dari 8 | Lihat | Cetak | Unduh

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Pharmacogn J. 2018; 10(1): 49-54
A Multidisciplinary Journal in the Field of Natural Products and Pharmacognosy
www.phocog.com | www.journalweb.com | www.phocog.net

Original Article

Oral Glucose Tolerance Activity of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.) Bulbs Extract Based on the Use of different Extraction Method

Islamudin Ahmad¹, Neneng Siti Silfi Ambarwati², Niken Indriyanti¹, Yurika Sastyarina¹, Laode Rijai³, Abdul Mun'im⁴

Islamudin Ahmad¹, Neneng Siti Silfi Ambarwati², Niken Indriyanti¹, Yurika Sastyarina¹, Laode Rijai³, Abdul Mun'im⁴
¹Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan, 75119, INDONESIA.
²Faculty of Engineering, Universitas Negeri Jakarta, East Jakarta, 13220 INDONESIA.
³Pharmaceutical Research and Development Laboratory of FARMAKA TROPIS, Faculty of Pharmacy, Mulawarman University, Samarinda, East Kalimantan, 75119, INDONESIA.
⁴Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, Depok, West Java, 16424, INDONESIA.

Correspondence
Islamudin Ahmad
Gedung Administrasi Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Jalan Penajam, Kampus UNMUL, Gunung Kelua, Samarinda, East Kalimantan, 75119, INDONESIA.

ABSTRACT
Background: Bulbs of Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.; Synonym: *Eleutherine americana* L. Merr) from family Iridaceae is widely found and grown in Kalimantan island. The local tribe "Dayak" commonly consume this plant and become a traded commodity in traditional markets. This plant is trusted to treat various diseases. **Objective:** The present study aims to determine the effect of blood glucose reduction from bulbs of Bawang Dayak based on the use of different extraction methods using oral glucose tolerance test. **Method:** Dried sample was extracted with methanol using maceration, reflux, and Soxhlet method, respectively. The measurement of blood glucose reduction was performed using oral glucose tolerance test *in vivo* method and was analyzed using statistical comparison (Two-Way-ANOVA). **Results:** Based on the each extraction results was obtained yields of as 8.636% (reflux method), 11.87% (maceration method), and 14.023% (soxhlet method). While the results of blood glucose lowering effect on each extract were used, there were significant differences in statistical tests and organ index. **Conclusion:** This result is a preliminary stage and the information is invaluable for further research.
Key words: Bawang Dayak, *Eleutherine palmifolia* L. Merr, Bulbs of plant, Extraction method, Oral glucose tolerance test.

INTRODUCTION
Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* L. Merr.; Synonym: *Eleutherine americana* L. Merr.) is a plant from family Iridaceae that widely found in Kalimantan island, Indonesia. Traditionally the used as a medicinal plant for treatment of diabetes mellitus, even the chemical compounds they contain not all have the same properties. So need to do the extraction process by the desired target. A suitable method is required to separate the optimal target metabolites from the plant.

Halaman 1 dari 8 | Lihat | Cetak | Unduh

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Asian Pacific Journal of Tropical Disease (2012)S491–S493 S491

Contents lists available at ScienceDirect

Asian Pacific Journal of Tropical Disease

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apjtd

Document heading

Antagonistic activity of *Eleutherine palmifolia* Linn

Kalidass Subramaniam*, Sembian Suriyamorthy, Femina Wahab, Febina Bernice Sharon, Gilbert Ross Rex

Department of Biotechnology, School of Biotechnology and Health Sciences, Karunya University (Karunya Institute of Technology and Sciences) Karunya Nagar, Coimbatore-641114, Tamil Nadu, India

ARTICLE INFO

Article history:
Received 5 June 2012
Received in revised form 27 June 2012
Accepted 8 October 2012
Available online 28 October 2012

Keywords:
Eleutherine palmifolia Linn
Antibacterial
Antifungal
Antibiogram pattern

ABSTRACT

Objective: The aim of the present study was to investigate the phytochemical constituent and the *in vitro* antimicrobial activity of the wonderful medicinal herb *Eleutherine palmifolia*. **Methods:** *Eleutherine palmifolia* bulb was extracted with ethanol. The extract was evaluated for their phytochemical constituents and their antimicrobial activity against the multidrug resistant pathogens following the standard protocols. The active drug principle present in the extract was analysed by GC-MS. **Results:** The qualitative phytochemical evaluation of the *Eleutherine palmifolia* bulb revealed the presence of Phenols, Sterols, Phlobatannins, Proteins, Steroids, Tannins and Reducing sugar. The extract showed higher antimicrobial activity in comparison to the standard antibiotics. A promising control over methicillin resistant *Staphylococcus aureus* and *Acinetobacter baumannii* was found. GC-MS analysis of the plant extract showed the presence of Decane, Cyclohexane, (1, 2-dimethylbutyl) and Cyclohexanecarbonyl Chloride etc. **Conclusions:** The present investigation reveals that the plant *Eleutherine palmifolia* bulb may act as potent source of antimicrobial agent against methicillin resistant *Staphylococcus aureus* and *Acinetobacter baumannii*.

1. Introduction

Eleutherine palmifolia is a herb from Irtimateae, a botanical

organism that is intrinsically virulent than strains of *Staphylococcus aureus* that have no antibiotic resistance, but resistance does make MRSA infection more difficult

Halaman 1 / 3

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Journal of Acute Medicine 5 (2015) 53–61

www.e-jacme.com

Original Research

Antibacterial activity of *Eleutherine bulbosa* against multidrug-resistant bacteria

Laxmipriya Padhi, Sujogya Kumar Panda*

Department of Zoology, North Orissa University, Takatpur, Baripada, Odisha 757003, India

Received 5 October 2014; revised 6 May 2015; accepted 25 May 2015
Available online 26 July 2015

Abstract

Background: Recent interest in plant-based medicine is justified, as synthetic antioxidants and antibiotics suffer from several drawbacks. Plant extracts have been shown to possess health promoting properties, and they exert no selective physiological pressure on the pathogens that can result in development of drug resistance. The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of *Eleutherine bulbosa* plant extracts against a series of multidrug-resistant (MDR) bacteria by calculating zones of inhibition, minimum inhibitory concentrations (MICs), minimum bactericidal concentrations (MBCs) and time–kill kinetics.

Methods: Dried bulb powder of *E. bulbosa* was extracted with five solvents (ethyl acetate, chloroform, butanol, ethanol and water) to select the best extractant for subsequent isolation of bioactive compounds to use against a battery of MDR bacteria.

Results: Butanol was found to be the best extractant with a MIC ranging from 46 µg/mL to 187 µg/mL. Butanol and aqueous extracts showed higher zones of inhibition in comparison with standard antibiotics gentamicin and ciprofloxacin. Thin layer chromatography (TLC)-bioautography was carried out with the butanol extract against *Staphylococcus aureus* and *Shigella boydii*. A synergistic effect was established against *S. boydii* by combining the chloroform extract with gentamicin.

Conclusion: The bulb extracts of *E. bulbosa* exhibited significant antibacterial activity. Further study is necessary to characterize the antibacterial compounds of this plant for use in clinical applications.

Copyright © 2015, Taiwan Society of Emergency Medicine. Published by Elsevier Taiwan LLC. All rights reserved.

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Open Access Maced J Med Sci electronic publication ahead of print,
published on November 14, 2019 as <https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.502>

ID Design Press, Skopje, Republic of Macedonia
Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences.
<https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.502>
e-ISSN: 1857-9655
Herbal Medicine in Pharmaceutical and Clinical Sciences

ID Design
P r e s s

The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of *Eleutherine palmifolia* (L.) Merr Bulbs Against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*

Masfria Masfria^{*}, Mitra S. A. Tampubolon

Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Indonesia

Abstract

Citation: Masfria M, Tampubolon MSA. The Antifungal Activity of n-Hexane Extract of *Eleutherine palmifolia* (L.) Merr Bulbs Against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*. Open Access Maced J Med Sci. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2019.502>

Keywords: Antifungal; *Eleutherine palmifolia* bulbs; *Candida albicans*; *Trichophyton mentagrophytes*

***Correspondence:** Masfria Masfria, Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, Universitas Sumatera Utara, Medan 20155, Indonesia. E-mail: masfria@guu.ac.id

Received: 25-Sep-2019; Revised: 17-Oct-2019; Accepted: 18-Oct-2019; Online first: 14-Nov-2019

Copyright: © 2019 Masfria Masfria, Mitra S. A. Tampubolon. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

AIM: This research aimed to determine the characteristics of dried bulbs of *Eleutherine palmifolia*, the group of active chemical compounds contained in n-hexane extract of *Eleutherine palmifolia* bulbs and the antifungal activity of n-hexane extract of *Eleutherine palmifolia* bulbs against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*.

METHODS: The *Eleutherine palmifolia* bulbs were extracted by percolation method using n-hexane solvent. The extract was tested for its antifungal activity against *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes* by diffusion method using paper discs.

RESULTS: The characterisation of dried *Eleutherine palmifolia* bulbs were obtained water content 9.38%, water-soluble extract content 12.15%, ethanol-soluble extract content 14.48%, total ash content 0.91%, and acid insoluble ash content 1.75%. The phytochemical content showed alkaloid, flavonoid, tannin, saponin, glycoside, and steroid. The antifungal activity of *Eleutherine palmifolia* bulbs n-hexane extract against the *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes* showed the inhibition diameter of 19.48 and 42.20 mm for *Candida albicans* and *Trichophyton mentagrophytes*, respectively.

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

MICROBIOLOGY
INDONESIA
ISSN 1978-3477, e-ISSN 2087-8575
Vol.11, No.3, September 2017, p 75-80

Available online at
<http://jurnal.permi.or.id/index.php/mionline>
DOI: 10.5454/mi.11.3.1

In Vitro Phytochemical and Inhibitory Potential Tests of Buton Forest Onion Extract (*Eleutherine palmifolia*) on *Vibrio harveyi*

WAODE MUNAENI^{1,2*}, ARMAN PARIAKAN¹, MUNTI YUHANA², MIA SETIAWATI², AND LA ODE BAYTUL ABIDIN¹

¹Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, Universitas Halu Oleo, Jalan Kampus Hijau Bumi Tridharma, Kendari, Sulawesi Tengah, Indonesia;
²Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, Institut Pertanian Bogor, Jalan Dramaga, Bogor, Indonesia.

The objectives of this study were to analyze phytochemical content of buton forest onion extract and to test the inhibitory potential of buton onion extract on the growth of *Vibrio harveyi* bacteria at different doses. Test parameter included: (1) Phytochemical test through the method of color visualization, (2) Inhibitory potential test using two methods namely agar diffusion and co-culture. Treatment of dose consisted of positive control/K+ (Chloramphenicol 30 mg mL⁻¹), negative control/K- (Sterile Aquadest) and treatment of extract included A (20 mg mL⁻¹), B (40 mg mL⁻¹), C (60 mg mL⁻¹), D (80 mg mL⁻¹). Qualitatively, result of phytochemical test showed that buton forest onion extract contained flavonoid, tannin, saponin, quinone, steroid and triterpenoid compounds. Result of inhibitory potential test indicated that treatment D exhibited the highest inhibitory potential, while the minimum inhibitory potential was found in treatment A. The best co-culture test result was also found in treatment D. The extract of buton forest onion in this study showed its capability in inhibiting the growth of *V. harveyi*

Key words: *Eleutherine palmifolia*, inhibitory potential, phytochemical, *Vibrio harveyi*

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kandungan fitokimia dari ekstrak bawang hutan buton dan menguji daya hambat ekstrak bawang hutan buton terhadap pertumbuhan bakteri *Vibrio harveyi* dengan dosis berbeda. Parameter uji meliputi: (1) Uji fitokimia dengan metode visualisasi warna, (2) Uji daya hambat menggunakan dua metode yaitu metode *diffusi agar* dan metode kultur bersama. Perlakuan dosis terdiri dari kontrol positif/K+ (Chloramphenicol 30 mg mL⁻¹), kontrol negatif/K- (Aquadest steril) dan perlakuan ekstrak meliputi A (20 mg mL⁻¹), B (40 mg mL⁻¹), C (60 mg mL⁻¹), D (80 mg mL⁻¹). Hasil uji fitokimia secara kualitatif menunjukkan bahwa ekstrak bawang hutan buton mengandung flavonoid, tanin, saponin, quinon, steroid dan triterpenoid. Uji daya hambat terbesar terdapat pada perlakuan D, sedangkan daya hambat minimum terdapat pada perlakuan A. Perlakuan terbaik dari uji kultur bersama juga ditemukan pada perlakuan D. Ekstrak bawang hutan buton pada

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Food Chemistry 128 (2011) 308–311

Contents lists available at ScienceDirect

Food Chemistry

journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchem

α -Glucosidase inhibitors from the bulb of *Eleutherine americana*

Tomohiro Ieyama, Maria D.P.T. Gunawan-Puteri, Jun Kawabata*

Division of Applied Bioscience, Graduate School of Agriculture, Hokkaido University, Kita-ku, Sapporo 060-8589, Japan

ARTICLE INFO

Article history:
 Received 16 June 2010
 Received in revised form 5 February 2011
 Accepted 4 March 2011
 Available online 9 March 2011

Keywords:
 Indonesian herb
 α -Glucosidase inhibitor
 Diabetes
Eleutherine americana

ABSTRACT

One effective way to treat diabetes is by suppressing carbohydrate digestion due to the utilisation of α -glucosidase inhibitors (AGIs). The determination of prospective herbs, done *in vitro* using enzyme assay, resulted in the finding of *Eleutherine americana*, which showed a potent inhibitory activity. A 50% aqueous methanol-soluble extract of bulbs of *E. americana* was chromatographed successively and the active fractions were further purified with preparative high performance liquid chromatography (HPLC) to isolate active compounds against α -glucosidase. Structure determination by mass and NMR analysis revealed that these isolated compounds were eleutherol (1), eleutherinoside A (2), and eleuthoside B (3) based on comparisons with the reference data. Considering the amount and the inhibitory activity of each naphthalene in the whole extracts, the bulb of *E. americana* inhibitory activity against α -glucosidase might be a result of compound 2 (IC₅₀ = 0.5 mM, yield = 5 mg/50 g plant sample, with a characteristic structure which has never been found in other AGIs. AGIs play an important role for the treatment of diabetes, therefore these results may suggest novel alternatives for diabetes treatment management.

© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disorder characterised by ... AGIs might be a reasonable option as a first-line drug in the

Halaman 1 / 4

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Medicinal Chemistry Research
<https://doi.org/10.1007/s00044-019-02498-z>

ORIGINAL RESEARCH

Check for updates

Naphthoquinones isolated from *Eleutherine plicata* herb: in vitro antimalarial activity and molecular modeling to investigate their binding modes

Valdicley Vieira Vale¹ · Jorddy Neves Cruz² · Giselle Maria Rachid Viana³ · Marinete Marins Póvoa³ · Davi do Socorro Barros Brasil^{1,2} · Maria Fani Dolabela¹

Received: 15 October 2019 / Accepted: 30 December 2019
 © Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2020

Abstract

Plasmodium falciparum is the cause of malaria and has become resistant to the drugs used to treat the disease. Therefore, the development for novel compounds with antimalarial activity has become urgent. Plant species, such as naphthoquinone-rich *Eleutherine plicata*, may provide novel substances that exhibit antimalarial activity and serve as an alternative for the treatment of this disease. From this plant species, ethanol extracts were obtained, fractionated, and the isolated substances eleutherin, and isoeleutherin were characterized by nuclear magnetic resonance. There *in vitro* activity against *Plasmodium falciparum* was examined using the traditional Microtest method using the extract, fractions, and isolated molecules. Eleutherin and isoeleutherin showed the best activity toward the parasite with IC₅₀ values of 10.45 and 8.70 μ g/mL, respectively. Characterization of the binding mode of the compounds with a target enzyme and identification of the molecular interactions were revealed via molecular docking results. Eleutherin and isoeleutherin interacted with highly conserved residues from the binding cavity of the cytochrome bc₁ complex, a protein found in mitochondria. Therefore, the eleutherin and isoeleutherin naphthoquinones showed antiplasmodial activity with a similar mechanism to that of atovaquone were able to interact with the cytochrome bc₁ complex, and showed promise for antimalarial treatments.


Keywords *Eleutherine plicata* · Naphthoquinones · Antimalarial activity · Molecular modeling

Halaman 1 / 8


Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Telusuri di Drive



JMBFS
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
International peer-reviewed scientific online journal




Published by
Faculty of
Biotechnology and
Food Sciences

THE POTENTIAL OF BUTON FOREST ONION *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. EXTRACT AS A PREBIOTIC AND AN ANTIOXIDANT

Waode Munaeni^{1,2}, Widanarni Widanarni¹, Munti Yuhana^{3*}, Mia Setiawati¹, Aris Tri Wahyudi³

Address(es):
¹Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor 16680, Indonesia.
²Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, Halu Olo University, Kendari 93232, Indonesia.
³Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor 16680, Indonesia.

*Corresponding author. yuhanamunti@gmail.com doi: 10.15414/jmbfs.2020.10.1.107-111

<p>ARTICLE INFO</p> <p>Received 18. 5. 2019 Revised 24. 3. 2020 Accepted 31. 3. 2020 Published 1. 8. 2020</p> <p>Regular article</p> <p> ACCESS</p>	<p>ABSTRACT</p> <p>The aim of this study was to analyze the potential of Buton forest onion extract (BFOE) <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. as a prebiotic and an antioxidant. Buton forest onion was extracted using 96% ethanol by maceration method. The prebiotic content of BFOE was determined using high performance liquid chromatography (HPLC). The ability of BFOE as a prebiotic was analyzed the growth of <i>Pseudalteromonas piscicida</i> 1Ub and <i>Bacillus</i> sp. NP5 and its resistance to artificial gastric acid and α-amylase. Antioxidant activities were determined using 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). Results indicate that the content of the oligosaccharides of BFOE including inulins, fructooligosaccharides (FOS), galactooligosaccharides (GOS), and raffinoses was 2.1%, 10%, 1% and 7.5%, respectively. The mixed oligosaccharides were found capable to stimulate the growth of <i>P. piscicida</i> 1Ub and <i>Bacillus</i> sp. NP5. The optimum BFOE concentration to stimulate the growth of probiotics was 1.25 mg/mL (0.17 \pm 0.02 and 0.21 \pm 0.00). The mixed oligosaccharides were also resistant to hydrolysis of artificial gastric acid and α-amylase, with maximum hydrolysis percentages of</p>
---	---

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

Fish and Shellfish Immunology 102 (2020) 218–227

Contents lists available at ScienceDirect



ELSEVIER

Fish and Shellfish Immunology

journal homepage: www.elsevier.com/locate/fsi



Full length article

Effect in white shrimp *Litopenaeus vannamei* of *Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb. Powder on immune genes expression and resistance against *Vibrio parahaemolyticus* infection

Waode Munaeni^{1,2,3,*}, Widanarni^{1,2,3}, Munti Yuhana³, Mia Setiawati¹, Aris Tri Wahyudi³


¹ Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor, 16680, Indonesia
² Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Marine Science, Halu Olo University, Kendari, 93232, Indonesia
³ Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Science, IPB University (Bogor Agricultural University), Bogor, 16680, Indonesia


<p>ARTICLE INFO</p> <p>Keywords: Immune genes expression Immune responses <i>Eleutherine bulbosa</i> <i>Litopenaeus vannamei</i> <i>Vibrio parahaemolyticus</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p>This study investigated the influence of <i>Eleutherine bulbosa</i> (Mill.) Urb. on the immune responses, bacterial population in the intestines, and resistance of white shrimp, <i>Litopenaeus vannamei</i>, against infection with <i>Vibrio parahaemolyticus</i>. Shrimp were fed with three dosages of powder, at 6.25 g kg⁻¹ (P6.25), 12.5 g kg⁻¹ (P12.5), and 25 g kg⁻¹ (P25). One dosage of the crude extract was provided, 1.25 g kg⁻¹ (E1.25), and the controls without administration of <i>E. bulbosa</i> consisted of a positive control (PC) and a negative control (NC). Feed supplementation was carried out for 30 days; then shrimp from all treatments were challenged by intramuscular injection with <i>V. parahaemolyticus</i> (10⁸ cfu/mL), except for the NC. The results showed that supplementation with the powder and extract of <i>E. bulbosa</i> for 30 days resulted in significantly higher ($P < 0.05$) immune responses (total hemocyte count (THC), phenoloxidase activity (PO), respiratory bursts (RBs)), gene expression (prophenoloxidase (proPO), lipopolysaccharide- and β-1,3-glucan-binding protein (LGBP)), and total bacterial count (TBC) compared to PC/NC. In post challenge testing, there were significantly higher levels for THC, PO, RBs, proPO, LGBP, and PE (peroxinetin), and the treatments were able to suppress <i>V. parahaemolyticus</i> in the intestines, hepatopancreas, and muscles and to reduce damage to the muscles and hepatopancreas. The survival rate with P12.5 was significantly higher compared to the other treatments. It was concluded that the shrimp reared with the powder and extract of <i>E. bulbosa</i> had increased immunity and resistance against <i>parahaemolyticus</i> infection, with the highest being the P12.5 treatment.</p>
---	--

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com





International Journal of PharmTech Research
CODEN (USA): IJPRIF ISSN : 0974-4304
Vol.6, No.4, pp 1392-1396, Aug-Sept 2014

Effects of Inhibition Cell Cycle and Apoptosis of Sabrang Onion extract (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.) on Breast Cancer Cells

Yanti Fitri^{1*}, Rosidah², Edi Suwarso³

^{1,2,3} Pharmacology Laboratory, Pharmacology Department,
Faculty of Pharmacy, North Sumatera University, Indonesia.

*Corres.author: fitriyanti94@yahoo.co.id
+6285260061608

Abstract: Sabrang onion bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.) a typical plant in Central Kalimantan, also known as dayak onion or ghost onion. This plant has been used for generations by Dayak community as a medicinal plant for various types of diseases such as breast cancer and colon, hypertension, diabetes mellitus, hipercholesterol, strokes. Sabrang onion bulbs containing phytonens and its derivatives such as eleanacine, eleutherine, eleutherol, eleutherone, and eleutherin. This study aimed to determine the cytotoxic effect of leaf extract Sabrang onion bulbs (*Eleutherine bulbosa* (Mill.) Urb.) and cell cycle

Halaman 1 / 5

Lihat Riwayat Penanda Jendela Bantuan

drive.google.com

yaturramadhan et al Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development. 2019; 7(4): 38-42

Available online on 15.08.2019 at <http://ajprd.com>



Asian Journal of Pharmaceutical Research and Development

Open Access to Pharmaceutical and Medical Research

© 2013-19, publisher and licensee AJPRD, This is an Open Access article which permits unrestricted non-commercial use, provided the original work is properly cited



Open Access Research Article

THE EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT OF DAYAK ONION (*Eleutherine palmifolia* (L) MERR) TUBER ON BLOOD GLUCOSE AND INSULIN LEVEL OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC WISTAR RAT

Yaturramadhan Hasni^{1*}, Dalimunthe Aminah¹, Widyawati Tri²

¹Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
²Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

Objectives: The current investigation was conducted to examine the ability of ethanolic extract from onion dayak (*Eleutherine palmifolia* (L) Merr) tuber to reduce blood glucose and increase insulin production in streptozotocin-induced diabetic wistar rat.

Materials and Methods: Extraction was accomplished using maceration method with 96% ethanol. Antidiabetic activity was evaluated using observation of blood glucose levels utilize glucometer (Easy Touch). Analysis of insulin plasma concentration was determined utilize the Insulin Elisa Kit (Chem Cruz).

Results: The administration of dayak onion extract as a form of therapy in diabetes, although it has not been able to increase insulin levels significantly, but has shown a tendency to increase insulin levels at higher doses of 500 mg/bw.

Conclusion: Ethanolic extract from dayak onion tuber exhibited activity of decrease blood glucose level and increase plasma insulin concentration in streptozotocin-induced diabetic wistar rat.

Keywords: *Eleutherine palmifolia*, dayak onion tuber, diabetic, streptozotocin

Lampiran 3. Gambar Tanaman Bawang Dayak



BIOGRAFI PENULIS



Fiskal Ardian yang akrab dipanggil Fiskal, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Kol. H. Mustafa Mas, S.T., M.H. dan Dr. Hj. Winarsih, M.Pd. Lahir di Balikpapan, 10 April 1998. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Persatuan No. 36. Memulai pendidikan di TK Kartika VI-6 Balikpapan. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN Kemayoran 01 Jakarta Pusat. Setelah 6 tahun mengenyam pendidikan, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Banjarmasin, dan lanjut di SMA Negeri 5 Balikpapan. Memiliki hobi memasak dan traveling. Saat ini telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan program studi Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R