

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR
PADA BAYI NY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KARYA TULIS ILMIAH (KTI)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Diploma
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

FITRIANI
NIM: 70400119013

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fitriani
Nim : 70400119013
Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 13 Maret 1999
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Juli 2022

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Fitriani
70400119013

M A K A S S A R

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Fitriani
Nim : 70400119013
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny "R" Dengan Hiperbilirubin di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 27 Juli 2022


Pembimbing I

Pembimbing II



Zema Yuni Andryani, S.ST., M.Keb

NIP : 198903282091032018



Andi Dian Diarfah, M.Psi. Psikolog

NIP : 199003032019032014

ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny “R” Dengan Hiperbilirubin Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022”, yang disusun oleh Fitriani : 70400119013, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 Juli 2022, bertepatan dengan Tanggal 28 Dzulhijjah 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).



Samata, 27 Juli 2022
28 Dzulhijjah 1443 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
Sekertaris : Firdayanti, S.SiT., M.Keb
Pembimbing 1 : Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb
Pembimbing 2 : Andi Dian Diarfah, M.Psi, Psikolog
Penguji 1 : Dr. Bd. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb
Penguji 2 : Prof Dr. Kasim Salenda, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Rasa syukur dan bahagia yang tak akan habis penulis curahkan atas segala kebaikan Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan kelancaran, pembimbingan, petunjuk serta kasih dan sayang yang telah dilimpahkan-Nya. Sholawat dan salam yang dihaturkan penulis sedalam-dalamnya kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Alhamdulillah akhirnya penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny.”R” Dengan Hiperbilirubin Di RSUD Syekh Yusuf Gowa” dengan bantuan Allah ta'ala dan Rahmat-Nya yang begitu luas.

Dengan segenap rendah diri dan sadar bahwa penulis begitu menyadari Karya Tulis Ilmiah ini, dalam konteks disiplin ilmu begitu jauh dari kata sempurna dan penyusunan serta rangkaian kata yang masih terbilang banyak kekurangan. Hal ini tentu disebabkan karena kemampuan, keuletan, serta pengetahuan penulis yang masih begitu minim dan terbatas. Namun, karena berkat bantuan dan petunjuk dari Allah Subhana Wa Taala, doa orangtua dan support dari semua pihak hingga penulis dapat menuntaskan Karya Tulis Ilmiah ini. Rasa tulus dan hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua saya, Ibunda Marsia dan Ayahanda Muhammad Akbar sebab tanpa dorongan, doa, pengorbanan serta kasih sayang takterbatas dari beliau akhirnya penulis mampu menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga beliau selalu diberi umur Panjang, kesehatan, dan lindungan dari yang maha kuasa Allah Subhana Wa Ta'ala.

Ucapan terimakasih dan apresiasi yang begitu istimewa penulis haturkan sedalam-dalamnya untuk penasehat akademik sekaligus pembimbing I yaitu Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST.,M.Keb serta pembimbing II penulis yaitu Ibu Andi Dian Diarfah, S.Psi.M.,Psi.Psikolog yang sabar dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan yang begitu baik sehingga penulis mampu menyelesaikan Karya

Tulis Ilmiah ini yang InsyaAllah diharapkan mampu memberikan manfaat untuk para pembacanya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhana Wa Ta'ala, diberi apapun yang menjadi hajat beliau, serta terimakasih dan rasa bangga untuk beliau. Tak pernah lupa penulis ucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.
2. Ibu Dekan Fakultas FKIK yaitu Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes.
3. Ibu Ketua Prodi Kebidanan yaitu Ibu Firdayanti, S.ST.,M.keb serta sekretaris jurusan yaitu Ibu Anieq Mumthi'ah Al-Kautsar, S.ST.,M.Keb.
4. Kepada Ibu Penguji I Dr. Hj. Sitti Shaleha, S.Si.T., SKM., M.Keb dan Bapak Penguji II Prof. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I. Untuk arahan bimbingan, motivasi, serta saran untuk penulis yang membangun dan memberi semangat.
5. Segenap semua Ibu Dosen Jurusan Kebidanan untuk bantuan, ilmu, pengetahuan dan bimbingan selama penulis menjalani pendidikan di Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.
6. Seluruh Staf jurusan Kebidanan FKIK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dengan rasa sabar kepada penulis dalam menyelesaikan urusan-urusan akademik selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Kebidanan FKIK UINAM.
7. Kepada Bapak Zainuddin Jufri, SKM, MARS selaku Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa
8. Kepada Ibu Hj. Eliati Paturungi, S. Kep.Ns.,M.Kep selaku Ketua Diklat RSUD Syekh Yusuf Gowa
9. Kepada Kepala Ruangan Perinatalogi beserta staf-stafnya yang sudah membantu dan membimbing penulis dalam melaksanakan penelitiannya.
10. Kepada Kepala Ruangan serta staf-staf Rekam medik di RSUD Syekh Yusuf Gowa yang telah membantu dalam pengambilan data dan studi kasus yang penulis butuhkan.

11. Terimakasih kepada para guru penulis dari TK sampai pendidikan diploma yang telah menjadi orang tua kedua dan membantu segala proses pencapaian ilmu penulis.
12. Terimakasih kepada teman-teman yang begitu tercinta L19AMEN Kebidanan 2019 atas dukungan, motivasi, dan teriakan semangat yang tidak ada habisnya, terimakasih telah memberikan kesan terbaik dalam arti sebuah persahabatan.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...

Makassar, Juli 2022

Penulis

Fitriani

70400119013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah	ii
Halaman Persetujuan Karya Tulis Ilmiah	iii
Halaman Pengesahan Karya Tulis Ilmiah.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Lingkup Penulisan	5
C. Tujuan Penulisan	5
D. Manfaat Penulisan	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Pengaturan Penulisan	8

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir	10
1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal.....	10
2. Karakteristik Bayi Baru Lahir Normal.....	12
3. Adaptasi Fisiologis BBL Terhadap Kehidupan Diluar Uterus....	13

4. Apgar Score.....	14
5. Penilaian Bayi Baru Lahir.....	15
6. Menyusui.....	18
B. Tinjauan Khusus Tentang Hiperbilirubin	
1. Definisi.....	21
2. Etiologi.....	24
3. Patofisiologi.....	27
4. Klasifikasi Hiperbilirubin.....	30
5. Manifestasi Klinis.....	30
6. Pemeriksaan Penunjang.....	32
7. Manajemen Terapi.....	34
8. Komplikasi.....	36
9. Mencegah Hiperbilirubin pada Bayi Baru Lahir.....	36
C. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37
2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan.....	37
3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	41

BAB III STUDI KASUS

Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Pada Bayi Ny. “R” Dengan Hiperbilirubin Di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2022-13 Juli 2022

A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar.....	43
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	49
C. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial.....	52
D. Langkah IV. Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi.....	53

E. Langkah V. Rencana Asuhan	53
F. Langkah VI. Penatalaksanaan	56
G. Langkah VII. Evaluasi.....	57
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 01 Juli 2022.....	59
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 02 Juli 2022.....	66
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 05 Juli 2022.....	70
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 08 Juli 2022.....	74
Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan	
Tanggal 13 Juli 2022.....	78
Dokumentasi Kunjungan.....	82
BAB IV PEMBAHASAN	
1. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	84
2. Lngkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Actual	86
3. Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial	87
4. Langkah IV. Perlunya Tindakan Segera/ Kolaborasi	88
5. Langkah V. Rencana Asuhan.....	88
6. Langkah VI. Penatalaksanaan.....	89
7. Langkah VII. Evaluasi	92


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Apgar Skor.....	15
Table 2.2 Penyebab Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir	26



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan
- Lampiran 2 : Keterangan Layak Etik
- Lampiran 3 : Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian Di RSUD Syekh Yusuf Gowa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



ABSTRACT

Name: Fitriani /D3

Hyperbilirubinemia is a clinical phenomenon due to the high production and low excretion of bilirubin, which causes the yellow color on the sclera and skin.

The major purpose of this research was to investigate and conduct amidwifery care management on a newborn with the case of hyperbilirubinemia at the general hospital of Syech Yusuf Gowa in 2022. The 7-stage of Varney management approach was employed in this study.

The findings of this study indicated that in the caring management given to the baby "R" with the case of pathological hyperbilirubinemia, there were no obstacles and problems found by the health workers. The monitoring was carried out several times in 5 visits for a 13-day period. During the care, the baby's skin and sclera had been apparent to be yellow since June 24th, 2022. In addition, the baby's reflexes in sucking and swallowing were weak since June 23rd, 2022. On June 25th, the total bilirubin from LAB examination was 11.77 mg/dL. After the treatments were given, it was apparent that the baby's skin and sclera were no longer yellow, while the bilirubin levels were back to normal on July 13th, 2022.

This study was conducted by utilizing the 7-stage of Varney management approach and SOAP documentation procedure. This study showed that the analysis on patient's condition was conducted in order to check the bilirubin's levels. Afterwards, treatments were given based on the correct procedures. It was noticeable that there was no kernicterus during the conduct of treatments. Therefore, it could be concluded that the findings of this study aligned with the previous studies and theories.

Key Words: Hyperbilirubinemi, 7-stage of Varney

ABSTRAK

Nama: Fitriani /D3

Hiperbilirubin merupakan fenomena klinis akibat tingginya produksi dan rendahnya ekskresi bilirubin, yang menimbulkan warna kuning pada sklera dan kulit.

Penelitian ini bertujuan agar dapat melaksanakan Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Dengan Hiperbilirubin di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tahun 2022 dengan menerapkan manajemen 7 langkah Varney.

Hasil dari studi kasus yang dilakukan pada bayi “R” dengan hiperbilirubin patologi, yaitu tidak ditemukannya hambatan selama asuhan yang diberikan. Pemantauan dilakukan sebanyak 5 kunjungan selama 13 hari. Selama dilkukannya asuhan, didapatkan kulit dan sklera bayi berwarna kuning sejak tanggal 24 Juni 2022, refleks hisap dan menelan bayi lemah sejak tanggal 23 Juni 2022 dan pada saat dilakukan pemeriksaan LAB tanggal 25 Juni 2022 hasil bilirubin total 11,77 mg/dL dan asuhan terakhir tanggal 13 Juli 2022 kulit dan sklera bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah kembali normal.

Kesimpulan dari studi kasus yaitu 7 langkah Varney dan SOAP yang digunakan untuk proses penyelesaian masalah kebidanan telah dilaksanakan pengkajian dan analisa data pada kasus By “R” dengan hiperbilirubin pada bayi baru lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa tahun 2022 dan dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan terhadap By “R” dengan hasil tidak terjadi kern ikterus dan tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

Kata Kunci : Hiperbilirubin, 7 Langkah Varney.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemantauan kehamilan berguna dalam penilaian kondisi pasien secara keseluruhan, mengidentifikasi penyakit selama hamil, mengidentifikasi masalah pada saat hamil, dan menilai resiko yang akan terjadi. Kesehatan ibu penting karena akan mempengaruhi kesehatan janin pula. Maka dari itu, ibu hamil sangat diwajibkan untuk memeriksakan kehamilannya secara berkala.

Resiko gizi buruk pada ibu hamil dapat menempatkan janinnya sebagai kasus hiperbilirubin, yaitu gangguan yang dapat mempengaruhi kesehatan janin. Defisit nutrisi pada ibu hamil dapat berdampak pada perkembangan organ janin, termasuk hati dan produksi bilirubin. Salah satu cara untuk mencegah hiperbilirubin adalah dengan memeriksakan kehamilan ibu secara rutin agar dapat diperiksa kesehatannya, dan memberikan perawatan kepada ibu.

Parameter standar kesehatan dalam sebuah negara salah satunya yaitu angka kematian bayi dan balita. Bayi yang baru saja dilahirkan ke dunia dan membuka awal hidupnya di luar kandungan sampai berusia 28 hari dianggap sebagai bayi baru lahir. Bayi dan balita bisa meninggal karena berbagai dampak. Salah satunya adalah bayi dengan kadar bilirubin yang meningkat. bayi baru lahir dengan gejala hiperbilirubin merupakan kasus yang paling banyak dijumpai di berbagai instansi kesehatan. Terutama pada bayi baru lahir tidak cukup bulan,

mengakibatkan keterlambatan proses pematangan hati. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemungkinan besar akan berdampak buruk bahkan bisa berakibat fatal.

Jumlah meninggalnya Bayi merupakan proporsi bayi baru lahir yang meninggal sebelum berumur 1 tahun, dinyatakan per 1.000 kelahiran hidup (UNICEF, 2020). Menurut data WHO, jumlah meninggalnya bayi di wilayah ASEAN (Association of South East Asia Nations) pada tahun 2019 sebesar 28,2 per 1000 kelahiran hidup (World Health Organization, 2020). Setiap tahun, kern ikterus menyebabkan lebih dari 100.000 kematian dan banyak kasus kerusakan otak seumur hidup di negara-negara ASEAN. Lebih dari 75 % kematian ini terjadi di sub-Sahara Afrika, Asia Tenggara dan Indonesia, wilayah termiskin di dunia.

Tidak semua anak yang baru lahir dapat menjalani kehidupannya di luar kandungan. Jumlah meninggalnya Bayi di Indonesia terdiri dari 24 per 1000 kelahiran hidup, dan Angka Kematian Neonatus adalah 15 per 1000 kelahiran hidup, menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (Profil Kesehatan Indonesia, 2018). Data indikator AKB menunjukkan tren penurunan, dengan nilai turun dari 68 pada tahun 1991 menjadi 24 pada tahun 2017, mewakili penurunan sebesar 3,93 % per tahun. Angka kematian bayi meningkat drastis selama pandemi COVID-19; dari 26.000 kasus pada 2019 menjadi 44.000 kasus pada 2020, meningkat hampir 40% (Kompas, 2021).

Menurut data profil kesehatan Indonesia (2019), bayi yang baru lahir dan berat badan dibawah batas normal (BBLR) sebanyak 7.150 (35,3 persen)

kematian neonatus, sedangkan bayi baru lahir dengan asfiksia sebanyak 5.464 (27,0 persen) (Kemenkes RI, 2020). Menurut penelitian Lilik Susilowati, prematuritas, berat badan lahir rendah, dan hipoksia ditemukan berhubungan dengan prevalensi hiperbilirubin (Susilowati, 2017). Dengan 181 bayi yang berada di RS antara Januari dan Maret terdapat 57 bayi mengalami hiperbilirubin, Novi Pratiwi melakukan penelitian di unit perinatologi RS Aulia pada tahun 2019 yang mengungkapkan prevalensi hiperbilirubin pada bayi baru lahir adalah 31% (Novi Pratiwi, 2019).

Penyakit kuning merupakan manifestasi klinis utama dari hiperbilirubin, yaitu kadar bilirubin yang meningkat didalam darah disebabkan oleh alasan biologis dan klinia. Kondisi ini terjadi pada > 85% bayi baru lahir dengan usia kelahiran normal yang masih dirawat pada minggu awal kehidupannya. Pigmen kuning bilirubin yang banyak di sklera dan kulit dengan hiperbilirubin membuat bayi tampak kuning. Pergantian eritrosit yang cepat dan fungsi hati bayi baru lahir yang belum sempurna sering menyebabkan kondisi ini.

Penyakit kuning atau hiperbilirubin pada bayi dapat disebabkan oleh disfungsi hati yang tidak stabil pada bayi yang baru saja dilahirkan. Kurang lebih 60-80 persen bayi baru lahir mengalami hiperbilirubin, yang biasanya dapat disembuhkan dan tidak berbahaya. Hiperbilirubin berat dapat bersifat berbahaya dalam beberapa keadaan dan, jika tidak diobati, dapat mengakibatkan kerusakan otak seumur hidup akibat penumpukan bilirubin serebral. Kondisi yang dikenal sebagai gangguan spektrum kernikterus, dinamai berdasarkan deposisi histologis

bilirubin di ganglia basalis, yang menyebabkan palsy serebral, tuli, dan gangguan bahasa sebagai gejala. Hal ini dapat mengakibatkan kematian dalam keadaan fatal. Hiperbilirubin yang tidak diketahui keadaannya dapat menyebabkan kernikterus.

Kematian bayi baru lahir di Sulawesi Selatan tahun 2018 terdapat 799 kasus, dengan jumlah meninggalnya bayi yang baru saja dilahirkan 530 per 1000 kelahiran hidup. Ditahun 2019, terdapat 714 kematian BBL, lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang tercatat 468 kematian bayi baru lahir untuk setiap 1000 kelahiran hidup. (Profil Dinas Kesehatan Prov Sulsel 2020).

Berdasarkan temuan awal di Ruang rekam medis Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, kasus hiperbilirubin pada tahun 2019 sebanyak 11 bayi dari 178 kelahiran bayi, meningkat menjadi 15 bayi dari 196 kelahiran bayi pada tahun 2020, dan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 16 bayi dari 210 kelahiran. Kondisi fisik bayi dapat dijadikan indikator awal hiperbilirubin berdasarkan temuan wawancara dengan petugas kesehatan di ruang rekam medis, dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan setelah mendapat persetujuan dari dokter. Dari kasus ini diketahui bahwa 5 kasus dari 42 bayi hiperbilirubin dengan hasil pemeriksaan bilirubin total 20 mg/dL disebabkan oleh infeksi hati dan ibu memiliki riwayat hepatitis sehingga perlu dilakukan fototerapi ganda (Blue Light). setiap 1 kali 24 jam atau bahkan sampai tiga kali setiap 24 jam, tindakan ini akan memberikan dampak pada biaya pengobatan bayi yang cukup tinggi. Namun tindakan fototerapi ini dapat menurunkan kadar bilirubin.

Berdasarkan data yang telah dirangkum, maka peneliti mengangkat kesimpulan bahwa hiperbilirubin sering disebabkan oleh kombinasi pergantian sel darah merah yang cepat dan ketidakmatangan fungsi hati bayi baru lahir, juga karena perawatan ibu yang tidak memadai selama kehamilan. Jika tidak segera ditangani, penumpukan bilirubin serebral akan menyebabkan kerusakan otak yang berlangsung lama bahkan bisa berakibat fatal. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui “Manajemen Asuhan Kebidanan pada Bayi Baru Lahir Dengan Hiperbilirubin” di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa karena ditahun sebelumnya terjadi peningkatan kejadian hiperbilirubin.

B. *Lingkup Penulisan*

Penatalaksanaan asuhan bidanan pada bayi baru lahir terhadap hiperbilirubin di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa menjadi pokok bahasan skripsi ini.

C. *Tujuan Penulisan*

Penulisan KTI berusaha untuk:

1. Tujuan Umum

Dapat bertindak atas asuhan bidanan yang sesuai dengan kewenangan bidan untuk memberikan manajemen asuhan kebidanan pada bayi baru lahir Dengan Hiperbilirubin.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pendalaman data bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- b. Dirumuskannya penetapan masalah sebenarnya pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- c. Dirumuskannya penetapan masalah potensial pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- d. Dilakukannya tindakan segera dan kolaboratif pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- e. Diterapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.
- g. Dievaluasinya seluruh pelaksanaan yang diberikan pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.

- h. Didokumentasikannya seluruh hasil yang diperoleh dan tindakan yang sudah dilakukan kepada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin sampai dengan usia kurang lebih 20 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa tahun 2022.

D. Manfaat Menulis

Manfaat penulisan dalam skenario yang disebutkan di atas adalah:

1. Manfaat bagi institusi

Dalam rangka memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa khususnya yang berada di jurusan kebidanan, sebagai bahan referensi atau pengembangan. Hal ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya untuk mengembangkan proyek penelitian masa depan dan membuat perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya.

2. Manfaat bagi tenaga kesehatan

Untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang lebih baik, penulis berpendapat bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber daya bagi para profesional medis untuk mendapatkan informasi dan kemampuan baru dalam memberikan asuhan kebidanan.

3. Manfaat bagi pembaca

Peneliti berharap KTI ini dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai bayi baru lahir dengan hiperbilirubin, sehingga dapat memberikan

pengobatan dini untuk mencegah kern ikterus yang berakibat pada kematian bayi baru lahir.

4. Manfaat bagi penulis

Peneliti berpendapat bahwa penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang kasus hiperbilirubin pada bayi dan menambah pengetahuan yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Tinjauan Literatur

Membaca dan menelaah buku, jurnal dan literatur yang berhubungan dengan hiperbilirubin.

2. Studi kasus

Penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui tujuh langkah proses manajemen asuhan kebidanan Helen Varney, yang meliputi langkah-langkah berikut: mengumpulkan data mendasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/potensi masalah, tindakan segera dan kolaborasi, intervensi, pelaksanaan, dan evaluasi. Penulis menggunakan teknik anamnesis untuk mendapatkan data yang reliabel; dalam teknik ini, penulis mewawancarai ibu, ayah, dan anggota keluarga lainnya yang mampu menambahkan informasi.

3. Studi Dokumentasi

Pencatatan status pasien, seperti catatan dari dokter atau bidan, adalah sumber dari penelitian yang melihat kasus pasien tertentu.

4. Diskusi

Menunaikan wawancara terhadap pihak keluarga pasien, serta terhadap pembina lapangan praktik serta lembaga yang membantu dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

F. Pengaturan Penulisan

Metodologi penulisan yang dipakai untuk membuat proposal tersebut terdiri atas:

BAB I meliputi Latar Belakang, Jangkauan Penulisan, Tujuan Penulisan, Kelebihan Penulisan, Proses Penulisan, dan pengaturan dalam Penulisan.

BAB II, Penulis mencantumkan gambaran umum bayi baru lahir dan pelayanan antenatal sedini mungkin serta gambaran umum bayi baru lahir berdasarkan persepsi islam, ulasan tentang hiperbilirubin khususnya, serta pandangan islam terhadap penyakit tersebut, dan prosedur manajemen asuhan kebidanan.

BAB III menguraikan tujuh langkah Varney, termasuk langkah I mengumpulkan informasi dasar, dan langkah II untuk mendiagnosa atau menentukan masalah aktual, III untuk mengidentifikasi diagnosis dan masalah potensial, IV untuk tindakan segera dan kolaborasi, V untuk mengembangkan

intervensi atau rencana tindakan, VI untuk pelaksanaan atau implementasi, dan VII untuk mengevaluasi hasil asuhan kebidanan serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Praktik yang digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa dalam memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin dibandingkan dengan gap antara teori dan asuhan kebidanan pada BAB IV.

Bab ini diakhiri dengan BAB V, yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari perawatan yang diberikan serta semua informasi yang dipelajari dari hasil perawatan. Literatur ilmiah yang digunakan sebagai sumber penulisan kemudian dicantumkan dalam daftar pustaka pada bagian ini.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Bayi Baru Lahir (BBL)

1. Pengertian Bayi Baru Lahir Normal dan Antenatal Care (ANC)

a. Bayi Baru Lahir Normal

Rukiyah dan Julianti (2010) mengutip, bayi baru lahir normal adalah bayi yang dilahirkan pervaginam dengan presentase belakang kepala, dimana usia kehamilan antara 38-42 minggu, beratnya antara 2.500-4.000 gram saat lahir, memiliki Apgar Score 7 atau lebih tinggi, dan bebas dari kelainan cacat bawaan.

Tidak ada batasan tertentu untuk dikatakan bayi namun ia belum lama dilahirkan. Pada masa ini manusia terlihat lucu dan menggemaskan tetapi juga mudah mengalami kematian (Jaya, 2016).

Bayi baru lahir, adalah bayi yang kisaran usianya antara usia 0 hingga 28 hari. Untuk dapat bertahan hidup secara sehat, bayi baru lahir perlu mengalami perubahan fisiologis berupa perkembangan, adaptasi dan toleransi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).

Definisi bayi baru lahir normal adalah sebagai berikut, bayi yang lahir pada usia kehamilan 37 sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir antara 2.500 sampai dengan 4.000 gram, tanpa memerlukan teknologi bantu, dengan Apgar Score > 7 , dan tidak ada kelainan atau cacat bawaan.

Kita sebagai seorang muslim telah diberikan petunjuk tentang kehidupan ini, yang berada didalam Al-qur'an dan Al-Haditz salah satunya adalah bagaimana penciptaan manusia terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12-14

ALLAH Subana Wa Ta'ala berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا
النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ
خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya, Kami telah menghadirkan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Lalu Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kuat (Rahim). Kemudian air mani itu Kami ubah menjadi sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.” (Q.S. Al-Mu'minun/23:12-14).

Dalam sabda Abu Abdurrahman Abdullah Bin Mas'ud, “Setiap orang di antara kamu dikumpulkan dalam rahim ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging. selama 40 hari.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang shaleh dan dibenarkan. Dia kemudian diperintahkan untuk memilih di antara empat hal: meletakkan makanannya, kematiannya, perbuatannya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Seorang malaikat kemudian dikirim kepadanya, dan Roh

kemudian ditiupkan ke dalam dirinya. Ada orang-orang di antara kamu yang mengerjakan amalan ahli surga sampai hanya sehasta memisahkan mereka dari surga, tetapi ada suatu syarat yang telah dipaksakan bagi mereka: jika mereka melakukan perbuatan seperti anggota neraka, maka mereka akan disiksa. dikirim ke neraka (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Antenatal Care (ANC)

Antenatal Care (ANC) adalah program pemantauan kehamilan yang digunakan untuk menilai kesehatan ibu secara keseluruhan, mengidentifikasi penyakit terkait kehamilan dini, dan mengidentifikasi bahaya terkait kehamilan. Asuhan antenatal adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk menghasilkan suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman juga memuaskan (Dewi Setiawaty, 2013).

Pemeriksaan kehamilan dimaksudkan untuk memantau perkembangan kehamilan dan keadaan janin, menjamin kesejahteraan ibu dan kesehatan janin serta perkembangan janin, meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik, mental dan sosial ibu dan janin, mengidentifikasi masalah atau kelainan sejak dini dan kemungkinan komplikasi kehamilan, serta mempersiapkan kehamilan dan persalinan aman dan dengan masalah seminimal mungkin baik ibu maupun janin.

7 kriteria minimal asuhan kehamilan meliputi pengukuran tekanan darah, tinggi fundus uteri, vaksin Tetanus Toxoid (TT) lengkap,

pemberian suplemen zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan, dan pemeriksaan infeksi menular seksual.

2. Karakteristik Bayi Baru Lahir Normal

- a. Setelah tenang, pernapasan melambat menjadi kira-kira 40 kali per menit dari napas cepat di menit awal sekitar 80 kali per menit.
- b. Karena vernix caseosa telah terbentuk dan menutupi jaringan subkutan, sehingga kulit tampak halus dan kemerahan.
- c. Rambut lanugo tidak terlihat.
- d. Kukunya agak lemah dan panjang.
- e. Genetalia: Testis telah turun (laki-laki) dan labia mayora telah menutupi labia minora (perempuan).
- f. Refleks menelan dan hisap sepenuhnya terbentuk.
- g. Refleks moro yang baik.
- h. Eliminasi baik; selama 24 jam pertama, urin dan mekonium akan keluar, meconium berwarna hitam kecoklatan.
- i. PBL 48-52 cm, lingkar dada 30-38 cm, dan lingkar kepala 33-35 cm, dan BBL 2.500–4.000 gram.
- j. Setelah menit pertama, detak jantung turun menjadi 120-140 denyut per menit dari rata-rata 180 denyut per menit.

3. Adaptasi Fisiologis BBL terhadap Kehidupan di Luar Rahim

a. Sistem Pernapasan

Plasenta memberikan oksigen ke janin saat berada di dalam rahim, dan paru-paru menyediakannya setelah lahir. Pada hari-hari menjelang persalinan, cairan paru janin aterm berkurang. Faktanya, bayi yang belum lahir bisa bernapas di dalam rahim. Namun air ketuban tidak masuk kedalam alveoli paru.

b. Metabolisme

Pada dini hari, konversi karbohidrat memberikan energi segar. Pada hari kedua, lemak dibakar untuk menyediakan energi. Setelah memulai mendapatkan susu sekitar hari keenam, 40% energi disediakan oleh karbohidrat dan 60% oleh lemak.

Dalam beberapa jam pertama setelah lahir, kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mengonsumsi makanan dan ASI terbatas, tetapi ASI masih merupakan sumber lipid dan karbohidrat bagi bayi. Karena hubungan yang buruk antara esofagus bagian bawah dan lambung, muntah sering terjadi, terutama pada anak kecil dan bayi yang telah mengonsumsi karbohidrat. Volume perut untuk bayi cukup bulan dibatasi kurang dari 30 cc. Kapasitas perut akan meningkat seiring bertambahnya usia. Risiko diare meningkat pada bayi baru lahir karena usus mereka kurang mampu menyimpan air dibandingkan orang dewasa dan karena

mereka masih tumbuh dan tidak mampu melindungi dari bahan kimia berbahaya.

c. Peredaran darah

Darah dari bayi harus melewati paru-paru setelah lahir untuk menyerap oksigen dan kemudian beredar ke seluruh tubuh, memasuk oksigen ke jaringan. Hal ini harus dilakukan agar dapat memberikan sirkulasi yang optimal untuk mendukung kehidupan di luar kandungan.

4. Apgar Score

a. Apgar Score

Kesehatan umum bayi baru lahir dapat dinilai sangat jauh setelah lahir dengan menggunakan Apgar score, yang merupakan metode cepat dan sederhana (Prawirohardjo: 2002). Pemeriksaan ini diperlukan untuk mengetahui apakah bayi baru lahir mengalami asfiksia atau tidak. Apgar score dihitung dengan mengevaluasi kondisi bayi baru lahir menggunakan lima kriteria langsung dengan nilai 0, 1, dan 2. Kemudian dihasilkan angka antara 0 dan 10 dengan menggabungkan kelima kriteria tersebut. Hasil penilaian ini dapat digunakan untuk menentukan apakah bayi baru lahir sehat (Apgar score: 7-10), menderita asfiksia ringan (Apgar score: 4-6), atau asfiksia berat. (Peringkat Apgar 0-3) Prawirahardjo (2002).

b. Kriteria Skor Apgar

Tabel 2.1 Kriteria Apgar Score

TANDA	SCORE		
	0	1	2
<i>Apperance</i>	<i>Seluruh tubuh biru</i>	<i>Tubuh merah Ekstremitas biru</i>	<i>Seluruh tubuh merah</i>
<i>Pulse (denyut nadi)</i>	<i>Tidak ada</i>	<i><100x per menit</i>	<i>>100x per menit</i>
<i>Grimace (Refleks)</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Meniru perubahan (menyeringai)</i>	<i>Bersin/menangis</i>
<i>Activity (tonus otot)</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Ekstremitas sedikit tertekuk</i>	<i>Gerakan aktif</i>
<i>Respiration (pernapasan)</i>	<i>Tidak ada</i>	<i>Lemah</i>	<i>Menangis</i>

5. Penilaian Bayi Baru Lahir

a. Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir

Metode pemeriksaan ini meliputi inspeksi visual, palpasi, perkusi (mengetuk), dan auskultasi (pendengaran).

1) Pemeriksaan Kulit

Periksa vernix, warna kulit, tanda lahir,

2) Periksa Kepala

Periksa hubungan antara mata dan kepala, periksa ubun-ubun raba adanya cekungan atau cairan pada ubun-ubun, periksa sutura (pada perabaan sutura masih terbuka), periksa adanya molase atau

tidak, mengukur lingkaran kepala dimulai dari oksipito sampai frontal, kisaran normal lingkaran kepala adalah 33-35 cm.

3) Pemeriksaan mata

Periksa mata bayi untuk menilai apakah ada tanda-tanda infeksi, bersihkan mata bayi dengan kapas DTT (High Level Disfection), periksa pupil, dan reaktivitas terhadap cahaya, berikan salep mata (Eritromisin zalf).

4) Periksa Telinga

Periksa kesimetrisan telinga, daun telinga terbentuk sempurna atau tidak, ada tidaknya serumen.

5) Periksa Hidung

Periksa simetri lubang hidung, periksa polip, bersihkan jalan napas.

6) Periksa Mulut

Selama bayi menyusu periksa refleks hisapnya, bibir dan langit-langit, terjadi sumbing atau tidak.

7) Periksa Leher

Periksa kelenjar yang membesar

8) Periksa Dada

Periksa gerakan napas dan detak jantung dalam irama atau tidak, perhatikan apakah ada tarikan dinding dada, perhatikan puting susu simetris atau tidak dan terbentuk atau tidak.

9) Periksa Abdomen

- a) Palpasi abdomen, apakah ada kelainan.
- b) Keadaan tali pusat, perhatikan warna dan bau tali pusat.

10) Periksa Alat Genetalia

- a) Untuk bayi laki-laki, periksa apakah testis berada di dalam skrotum.
- b) Untuk bayi perempuan periksa labia mayora apakah sudah menutupi labia minora atau belum
- c) Observasi adanya pseudomenorrhea (cairan putih yang kental).

11) Cek Anus

Periksa saluran anus. Langkah ini tidak diperlukan jika bayi telah mengeluarkan mekonium.

12) Periksa Bahu, Lengan dan Tangan

- a) Hitung jari pada tangan bayi dengan cara menyentuh telapak tangan bayi dengan jari Anda.
- b) Bayi akan menggenggam tangan dengan kuat untuk mengangkat tubuhnya.

13) Pemeriksaan Refleks

- a) Lakukan Pemeriksaan Refleks Root
 1. Letakkan ujung jari Anda di dekat bibir atau pipi bayi.
 2. Bayi akan berbalik menghadap stimulus dan mulutnya akan terbuka.

b) Lakukan Pemeriksaan Refleksi Mengisap

Bayi Mengisap dan Menelan. Untuk merangsang mulut bayi, tempatkan sebagian besar areola payudara ke dalam mulut bayi.

c) Lakukan tes Refleksi Toniknreck

Jika Anda membaringkan bayi di perut ibunya, bayi akan memutar kepalanya ke samping atau ke belakang dan mengangkat kepala, lehernya seolah-olah dia sedang mengangkat dirinya sendiri.

d) Lakukan Pemeriksaan Refleksi Moro

1. Angkat kepala bayi 30 derajat di atas permukaan meja pemeriksaan sambil menggendongnya dalam posisi setengah duduk.
2. Bayi akan menunjukkan reaksi pelukan dengan cepat memperluas dan menculik ekstremitas atas mereka, diikuti oleh adduksi dan fleksi lebih lambat.

e) Lakukan Pemeriksaan Refleksi Babinsky

Mulailah dengan memijat telapak kaki dari tumit ke atas, uleni sisi lateral telapak kaki ke atas sebelum menelusuri telapak kaki dengan jari. Sebagai tanggapan, bayi akan melenturkan ibu jarinya ke arah punggungnya dan hyperextend semua jari-jari kakinya.

6. Menyusui

ASI adalah sumber nutrisi terbaik untuk bayi baru lahir. ASI mengandung antibodi yang dibutuhkan bayi untuk melawan infeksi, menjadikannya makanan terbaik dan paling penting untuk bayi, menurut banyak penelitian. Kolostrum diduga dapat menurunkan terjadinya hiperbilirubin fisiologis, dan menyusui dini efektif untuk bayi.

Ayat berikut ini merupakan arahan dari ALLAH Subhana Wa Ta'ala kepada para ibu, mendorong mereka untuk menyusui anaknya dengan sempurna selama dua tahun. Bukan tanpa sebab, pemberian ASI selama dua tahun merupakan bukti bahwa ajaran Islam sangat mengutamakan gizi yang diberikan kepada bayi. Kesehatan bayi membaik ketika ASI diberikan selama dua tahun.

ALLAH Subhana Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

M A K A S S A R

Terjemahnyanya:

“Susuilah anak-anakmu wahai ibu dengan jangka waktu minimal 2 tahun, untuk ibu yang ingin menyusui dengan perfec. Dan wajib bagi seorang bapak memenuhi nafkah dan pakaian anak dan istrinya dengan cara yang lazim. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya melebihi dari kemampuannya. Tidaklah kedua orang tua merasa susah karena anaknya. Ahli waris juga mempunyai hak seperti itu pula. Apabila keduanya hendak melepas ASI dengan persetujuan dan hasil diskusi antara kedua orang tua, maka halal bagi keduanya. Apabila seorang ibu ingin menyusukan anaknya kepada ibu-ibu lain, maka tidak ada larangan bagimu mengeluarkan upah dengan cara yang lazim. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah/2 : 233).

Dalam tafsir Al-Misbah Surah Al-Baqarah ayat 233 diatas disebutkan bahwa “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna” kata Ibu dalam ayat tersebut menggunakan Alwaalidats yang menurut Quraish Shihab berarti ibu secara umum, tidak harus ibu kandung. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya air susu ibu untuk pertumbuhan anak hingga tidak harus diperoleh dari ibu kandung. Namun air susu ibu kandung tentu lebih diutamakan, karena membantu mendekatkan ikatan batin antara ibu dengan anak.

Kemudian terkait lamanya menyusui anak dalam tafsir Ahkam pada surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dalam tafsir Kemenag dikatakan hal ini berarti membolehkan ibu menyusui anaknya kurang dari dua tahun, apabila bersepakat dalam diskusi suami istri. Hal tersebut berlaku jika ada alasan khusus seperti, anjuran dokter untuk mempersingkat waktu menyusui demi kesehatan ibu maupun bayi. Namun Al-qur’an tetap menganjurkan dengan penekanan, untuk

menyusui. Mengutip tafsir al-Misbah, dari penggalan ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa tolak ukur menyusui anak adalah selama dua tahun, tidak lebih.

Selain membicarakan tentang anjuran menyusui anak, surah Al-Baqarah ayat 233 juga membahas tentang tugas ayah selama masa pertumbuhannya. Dalam hal ini ayah wajib menanggung nafkah istri dan anaknya dengan dengan cara yang baik, serta sesuai kemampuannya. Alasan mengapa harus suami yang menanggung disini menurut Quraish Shihab merupakan kebaikan yang timbal balik karena istri sudah menyusui, maka suami yang memenuhi kebutuhannya. Selain itu anak nanti akan mendapat nasab dari ayahnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban ayah untuk menafkahi dan mendidik anaknya menjadi hamba Allah dengan jiwa yang baik, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan air susu ibu demi kebaikan tumbuh kembangnya. Kewajiban ibu dan ayah dalam menjalankan tugasnya tidak dibebani melainkan sesuai kemampuan mereka saja dalam hal ini tidak ada paksaan didalamnya.

B. Ikhtisar Khusus Tentang Hiperbilirubin

1. Definisi

Bilirubin merupakan pigmen terapiol berbentuk kristal berwarna kuning-orange akibat peristiwa oksidasi-reduksi yang terjadi pada sistem retikuloendotelial, yang merupakan tahap akhir pemecahan heme (Kosim, 2012). Sel darah merah biasanya rusak, itulah yang menghasilkan bilirubin.

Hati memproduksi bilirubin, yang kemudian dikirim sebagai empedu atau alat bantu pencernaan lainnya ke dalam usus (Mendri dan Prayogi, 2017).

Peningkatan kadar bilirubin serum di atas tingkat normal dalam darah dikenal sebagai hiperbilirubin. Kasus ini kerap timbul pada bayi baru lahir, termasuk bayi sehat dan prematur. Bayi dengan hiperbilirubin akan memiliki kulit kuning atau ikterik. Hiperbilirubin didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana kadar bilirubin meningkat dengan nilai normal yang tergantung kemada usia kehamilan atau berat lahir serta usia paska natal dalam jam dan secara klinis membutuhkan fototerapi atau transfusi tukar.

Sebagai akibat dari peningkatan kadar bilirubin serum yang berlebihan, hiperbilirubin dapat mempengaruhi bayi baru lahir dan menyebabkan penyakit kuning, atau kulit dan mata menguning. Salah satunya, kelainan bawaan yang menyebabkan penyakit kuning yaitu hiperbilirubin akibat peningkatan kadar bilirubin serum (Imron, 2015). Bayi dengan hiperbilirubin yang sering dikenal dengan penyakit kuning akan memiliki kulit dan sklera yang kuning karena tingginya kadar bilirubin dalam darah (Mendri dan Prayogi, 2017).

Tali pusat bayi biasanya memiliki kadar bilirubin indirek 1-3 mg/dL dan peningkatan kurang dari 5 mg/dL setiap hari. Pada hari kedua dan ketiga, rona bayi baru lahir sering menjadi kuning. Pada hari keempat, mencapai puncaknya hingga 5-6 mg/dL, dan dari hari ketiga hingga kelima, secara bertahap menurun. Hari kelima hingga ketujuh akan terlihat penurunan kadar

bilirubin hingga kurang dari 2 mg/dL. Kondisi ini disebut sebagai hiperbilirubin fisiologis pada bayi baru lahir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan bayi yang tidak normal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubin. Baik akibat dari ibu maupun dari bayinya sendiri. Selama kehamilan, ibu yang mengabaikan kesehatannya berisiko mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin. Karena bayi membutuhkan energi yang cukup untuk tumbuh kembangnya yang bersumber dari asupan makanan yang ibu dapatkan selama hamil, ibu hamil yang kekurangan gizi misalnya dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang janin. Janin membutuhkan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan, yang berkurang ketika konsumsi makanan ibu berkurang. Ini dapat memiliki efek pada bayi, termasuk fungsi hati yang tidak stabil, penurunan ekskresi, kerentanan terhadap infeksi, hipoglikemia, dan kondisi lainnya. Jika tidak dipenuhi akan berisiko secara fisik, bisa sakit bahkan menimbulkan kematian. Simaklah surah Al-Maidah ayat 87-88:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾
 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai anak adam yang beriman, janganlah kamu haramkan sesuatu yang demikian itu Allah telah halalkan bagimu, dan berhati-hatilah atas sikap berlebih-lebihan. Sungguh ALLAH benci terhadap orang yang berlebih-lebihan. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai

rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”(Q.S Al-Maidah: 87-88).

Berdasarkan ayat diatas, terdapat teguran dalam penentuan porsi makanan yang cukup. Kebutuhan asupan gizi ibu hamil berbanding dua kali lipat sebelum hamil. Maka dari itu sangat dianjurkan bagi ibu hamil menjaga pola makan yang sehat dan bergizi. Hal tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Rasulullah Muhammad Shallahu Alaihi Wasallam: “Cukupkanlah kebutuhan perut ibu hamil melalui pemberian makanan seperti sayur agar janinnya tetap dalam kondisi baik-baik saja”.

Amatan ringkas tentang kesempurnaan nutrisi menganjurkan ibu hamil untuk mengonsumsi 4-5 paket dalam 1 hari dengan menu sehat seimbang. Yaitu terdiri atas nasi, laukpauk hewani, laukpauk nabati, sayuran dan buah-buahan. Menurut Provesor Hans Heinrich Reckeweg, M.D., pakar toksikologi dalam bukunya berjudul Biological Therapy vol.1 No. 2, mengatakan bahwa kaum barat yang tidak memperhatikan dan mencontoh adab makan yang diajarkan oleh islam, pada akhirnya akan mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Namun mereka yang mematuhi aturan dan adab makan menurut islam akan sehat serta mereka yang mengikuti cara makan Barat yang buruk akan sakit.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadits yang berbunyi “ dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai

Allah Azza Wa Jalla dari pada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan.” (HR. Muslim).

2. Etiologi

Prevalensi hiperbilirubin pada bayi baru lahir disebabkan oleh disfungsi hati, yang mencegah hati melakukan yang terbaik untuk mengubah bilirubin menjadi air, empedu, dan urobilinogen, yang kemudian diekskresikan ke dalam usus. Penyakit kuning pada bayi disebabkan oleh peningkatan kadar bilirubin plasma. Kondisi yang dikenal sebagai hiperbilirubin disebabkan oleh peningkatan sintesis bilirubin sebagai akibat dari kelimpahan sel darah merah, yang rusak lebih cepat. Hiperbilirubin juga dapat disebabkan oleh penurunan absorpsi hepatic, penurunan konjugasi hepatic, dan peningkatan sirkulasi enterohepatic. Hiperbilirubin juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi ibu selama kehamilan, seperti KEK, nutrisi yang tidak mencukupi, riwayat hepatitis, dan masalah mental ibu.

Menurut teori ada beberapa faktor penyebab terjadinya hiperbilirubin pada bayi baru lahir yaitu faktor maternal diantaranya inkompabilitas ABO dan RH, juga pemberian ASI. Kemudian faktor neonatus diantaranya bayi kurang bulan atau usia gestasi, dan BBLR, dan terakhir adalah faktor perinatal seperti infeksi, hipoglikemia serta jenis persalinan (Sukadi, 2012);(Sastroasmoro S et al, 2004). Hal ini didukung juga oleh penelitian

yang dilakukan oleh Lilik Susilowati bahwa ada hubungan prematuritas, induksi persalinan, BBLR dan asfiksia dengan kejadian hiperbilirubin. (Susilowati, 2017).

Nelson (2011) mengidentifikasi empat kategori penyebab penyakit kuning atau hiperbilirubin pada BBL:

a. Produksi Bilirubin yang Berlebihan

Bayi yang baru lahir tidak dapat dengan aman mengeluarkan lebih banyak dari ini. Beberapa penyebab peningkatan hemolisis pada Rh termasuk inkompatibilitas darah AB0, golongan darah lain, kekurangan enzim G6-PD, piruvat kinase, perdarahan tertutup, dan infeksi.

b. Gangguan dalam Proses Penyerapan dan Konjugasi Hati

Infeksi, hipoksia, asidosis, atau kekurangan enzim glukuronil transferase semuanya dapat menyebabkan penyakit ini (sindrom Crigler-Najjar). Faktor lainnya adalah kekurangan protein. Protein Y, yang sangat penting untuk penyerapan bilirubin oleh sel-sel hati.

c. Gangguan Transport Bilirubin

Hati menerima bilirubin yang telah dikaitkan dengan albumin dalam darah. Obat-obatan seperti salisilat dan sulfafurazole dapat mempengaruhi pengikatan bilirubin ke albumin. Peningkatan kadar bilirubin tidak langsung bebas, yang mudah diserap oleh sel-sel otak, disebabkan oleh kekurangan albumin.

d. Gangguan Ekskresi

Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyumbatan di dalam atau di luar hati. Kelainan kongenital biasanya merupakan penyebab kelainan ekstrahepatik. Infeksi atau kerusakan hati lainnya dari sumber lain sering mengakibatkan obstruksi hati.

Tabel 2.2 Penyebab Hiperbilirubin Pada Bayi Baru Lahir

Basis	Alasan
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi bilirubin 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakcocokan Darah janin (Rh, ABO)
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemecahan bilirubin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Defisiensi enzim kongenital • Berdarah schfahematoma tertutup, memar). sepsis,
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jumlah hemoglobin 	<ul style="list-style-type: none"> • Polisitemia (transfusi kembar-ke-kembar, SGA) • Penjepitan tali pusat yang terlambat
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan sirkulasi enterohepatik 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan bagian muonium, sindrom muonium ileus muonium plug. • Puasa atau telat minum • Atrsia atau stenosis usus
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan klirens bilirubin 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketidakdewasaan
<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan dalam produksi atau aktivitas Hridine 	<ul style="list-style-type: none"> • Gangguan metabolisme/endokrin
<ul style="list-style-type: none"> • Difosfoglukoroil 	

- Perubahan fungsi hati dan perfusi (kemampuan konjugasi)
- Asfiksia, hipoksia, hipotermia, sepsi (juga proses inflamasi)
- Obat-obatan dan hormon (novobiacin, pregnanediol)
- Stasis bilier (hepatitis, sepsis)
- Beban bilirubin yang berlebihan sering berat

3. Patofisiologi

a. Pembentukan Bilirubin

Bilirubin merupakan hasil katabolisme heme melalui proses reaksi oksidasi-reduksi berupa pigmen kristal jingga. Biliverdin yang dibentuk dari heme merupakan hasil dari langkah oksidasi pertama oleh enzim heme oksigenase. Enzim heme oksigenase sebagian besar terdapat dalam sel hati dan organ lain. Pada reaksi tersebut juga terbentuk besi yang digunakan kembali untuk pembentukan hemoglobin dan karbon monoksida (CO) yang di ekskresikan kedalam paru. Biliverdin kemudian akan direduksi menjadi bilirubin oleh *enzim biliverdin reduktase*.

Biliverdin bersifat larut dalam air dan secara cepat akan diubah menjadi bilirubin melalui reaksi biliverdin reduktase. Bilirubin bersifat lipofilik dan terikat dengan hidrogen serta pada pH normal bersifat tidak larut. Jika tubuh akan mengekskresikannya, diperlukan mekanisme transport dan eliminasi bilirubin. Pada bayi baru lahir, sekitar 75% produksi bilirubin berasal dari katabolisme hemoglobin dari eritrosit

sirkulasi. Satu gram hemoglobin akan menghasilkan 34 mg bilirubin dan 25% sisanya berasal dari pelepasan hemoglobin karena eritropoesis yang tidak efektif didalam sumsum tulang, jaringan yang mengandung protein heme (mioglobin, sitokrom, katalase, proksidase) dan heme bebas yang disebut early labelled bilirubin.

b. Transportasi Bilirubin

Bilirubin dibentuk dalam sistem retikuloendotelial kemudian dilepaskan ke sirkulasi dan akan berikatan dengan albumin. Bayi baru lahir mempunyai kapasitas ikatan plasma yang rendah terhadap bilirubin karena konsentrasi albumin yang rendah dan kapasitas ikatan molar yang kurang. Bilirubin yang terikat pada albumin serum ini bersifat non polar dan tidak larut dalam air, kemudian akan ditransportasi ke sel hepar. Bilirubin yang terikat dengan albumin tidak dapat memasuki susunan saraf pusat dan bersifat non toksik. Albumin mempunyai afinitas yang tinggi terhadap obat-obatan yang bersifat asam seperti penisilin dan sulfonamid. Sehingga obat-obat tersebut bersifat kompetitor karena menempati tempat utama pelekatan albumin untuk bilirubin. Selain itu adapula obat-obatan yang dapat melepaskan bilirubin dari albumin dengan cara menurunkan afinitas albumin, antara lain adalah digoksin, gentamicin, dan furosemide.

c. Intake Bilirubin ke Hati

Saat bilirubin-albumin mencapai membran hepatosit, albumin akan terikat reseptor permukaan sel. Setelah itu, melalui membran sel yang berkaitan dengan ligandin (Protein Y) atau protein ikatan sitosolik lainnya, bilirubin akan ditransfer ke dalam sel. Keseimbangan antara jumlah bilirubin yang masuk ke sirkulasi dari sintesis *denovo*, resirkulasi enterohepatik, perpindahan bilirubin antar jaringan, pengambilan bilirubin oleh sel hati, dan konjugasi bilirubin akan menentukan konsentrasi bilirubin tak terkonjugasi dalam serum, baik pada keadaan normal ataupun tidak normal.

Hiperbilirubin fisiologi dipengaruhi oleh kapasitas pengambilan hepatic bilirubin tak terkonjugasi yang berkurang. Hal ini disebabkan oleh defisiensi konjugasi bilirubin dalam menghambat transfer bilirubin dari darah ke empedu selama 3-4 hari pertama kehidupan. Walaupun demikian, defisiensi ambilan ini dapat pula menyebabkan hiperbilirubin terkonjugasi ringan pada minggu kedua kehidupan saat konjugasi bilirubin hepatic mencapai kecepatan normal yang sama dengan orang dewasa.

d. Konjugasi Bilirubin

Bilirubin tak terkonjugasi dikonversikan menjadi bilirubin terkonjugasi yang larut dalam air di retikulum endoplasma dengan bantuan enzim uridin difosfat glukuronosil transferase (UDPG-T).

Katalisis oleh enzim ini akan mengubah formasi menjadi bilirubin monoglukoronida yang selanjutnya akan dikonjugasi menjadi bilirubin diglukoronida. Substrat yang digunakan untuk transglukoronidase kanalikuler adalah bilirubin monoglukoronida. Enzim ini akan memindahkan satu molekul asam glukoronida dari satu molekul bilirubin monoglukoronida ke yang lain dan menghasilkan pembentukan satu molekul bilirubin diglukoronida.

Bilirubin ini kemudian diekskresikan ke dalam ke dalam kulit empedu . sedangkan satu molekul bilirubin tak terkonjugasi akan kembali ke retikulum endoplasmik untuk rekonjugasi berikutnya. Pada keadaan peningkatan beban bilirubin yang dihantarkan ke hati akan terjadi retensi bilirubin tak terkonjugasi seperti halnya pada keadaan hemolisis kronik yang berat dimana pigmen yang tertahan adalah bilirubin monoglukoronida.

4. Klasifikasi Hiperbilirubin

a. Hiperbilirubin Fisiologis

Hiperbilirubin pada bayi baru lahir yang fisiologi tidak terlihat pada bayi baru lahir dalam satu hari pertama setelah dilahirkan. Hiperbilirubin fisiologis memiliki kadar bilirubin total harian maksimum 5 mg/dL. Pada bayi cukup bulan, hiperbilirubin alami mencapai puncak 3 hari atau setelah lahir pada tingkat bilirubin darah 6-8 mg/dL. Kadar

bilirubin serum akan naik menjadi 2 sampai 3 mg/dL dalam 72 jam pertama setelah lahir, kemudian turun menjadi 3 mg/dL pada hari ke-5. tidak muncul dalam 24 jam pertama. Setelah hari ke-5, kadar bilirubin serum secara bertahap kembali normal antara hari ke-11 dan ke-12. Bayi berat lahir rendah (BBLR) atau bayi prematur memiliki puncak bilirubin dalam 120 jam pertama, meningkatkan bilirubin darah sebesar 10-15 mg/dL.

b. Hiperbilirubin Patologi

Gejala pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin patologi muncul dalam 24 jam pertama setelah dilahirkan. Hiperbilirubin patologi menyebabkan peningkatan harian kadar bilirubin total darah lebih dari 5 mg/dL. Dibandingkan dengan bayi cukup bulan, yang kadar bilirubinnya naik 12 mg/dL, kadar bilirubin total darah bayi prematur naik menjadi 15 mg/dL. Hiperbilirubin biasanya berlangsung lebih dari dua minggu pada bayi prematur dan kira-kira satu minggu pada bayi cukup bulan.

5. Manifestasi Klinis

Jika bayi baru lahir tampak icterus atau berwarna kuning dan memiliki kadar bilirubin serum 5 mg/dL atau lebih tinggi, maka bayi tersebut dikatakan mengalami hiperbilirubin. Akumulasi bilirubin indirek pada kulit yang mengakibatkan hiperbilirubin memberikan warna kuning atau jingga pada

kulit. Biasanya menyebabkan warna kuning kotor atau kuning kehijauan pada hiperbilirubin tak terkonjugasi.

Bayi baru lahir dengan hiperbilirubin dapat mengembangkan penyakit kuning yang mempengaruhi kulit, selaput lendir, kuku, atau sklera pada bayi baru lahir. Penyebab hiperbilirubin dalam 24 jam pertama termasuk hemolisis bayi, sepsis, atau ibu dengan riwayat diabetes atau infeksi. Hiperbilirubin fisiologis biasanya bermanifestasi pada hari kedua atau ketiga, memuncak pada hari ketiga hingga keempat, dan menurun pada hari kelima hingga ketujuh.

Bilirubin indirect atau terkonjugasi yang mengalami pengendapan mengakibatkan hiperbilirubin tampak kuning cerah atau orange. Kulit bayi dengan hiperbilirubin direk atau bilirubin tak terkonjugasi akan menyebabkan kulit pada bayi baru lahir tampak keruh atau kuning kehijauan. Hanya hiperbilirubin berat yang dapat terlihat jelas perbedaan ini.

Ridha (2014) menyatakan bahwa bayi dikatakan mengalami hiperbilirubin jika terjadi salah satu gejala berikut:

- a. Bilirubin menyebabkan sklera, lendir, kulit, atau organ lain tampak kuning.
- b. 24 jam pertama kehidupan dipengaruhi hiperbilirubin.
- c. Dalam 24 jam, konsentrasi bilirubin meningkat 5 mg/dL atau lebih.
- d. 10 mg/dL peningkatan serum bilirubin pada bayi baru lahir cukup bulan dan 12,5 mg/dL pada bayi baru lahir prematur.
- e. Penyakit kuning yang disertai dengan hemolisis.

f. Berat badan lahir kurang dari 2000 gram, kehamilan kurang dari 36 minggu, hipoksia, masalah pernapasan, infeksi dari trauma kepala lahir, hipoglikemia, dan hiperkarbia semuanya berhubungan dengan hiperbilirubin.

6. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang diperlukan untuk membantu membuat jelasnya suatu sebab penyakit, dalam menentukan identitas, saat terkena gejala sampai saat meninggal. Pemilihan pemeriksaan penunjang sesuai indikasi kasus, dalam suatu kasus dapat dilakukan satu macam pemeriksaan penunjang atau lebih. Pengambilan sampel, pengiriman dan pemeriksaan barang bukti medis adalah spesifik untuk masing-masing pemeriksaan penunjang.

a. Pemeriksaan darah rutin

Pemeriksaan Darah Lengkap (Complete Blood Count / CBC) yaitu suatu jenis pemeriksaan penyaring untuk menunjang diagnosa suatu penyakit dan atau untuk melihat bagaimana respon tubuh terhadap suatu penyakit. Disamping itu juga pemeriksaan ini sering dilakukan untuk melihat kemajuan atau respon terapi pada pasien yang menderita suatu penyakit infeksi. Pemeriksaan Darah Lengkap biasanya disarankan kepada setiap pasien yang datang ke suatu Rumah Sakit yang disertai dengan suatu gejala klinis, dan jika didapatkan hasil yang diluar nilai normal biasanya dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik terhadap gangguan

tersebut, sehingga diagnosa dan terapi yang tepat bisa segera dilakukan. Lamanya waktu yang dibutuhkan suatu laboratorium untuk melakukan pemeriksaan ini berkisar maksimal 2 jam.

Pemeriksaan Darah Lengkap terdiri dari beberapa jenis parameter pemeriksaan, yaitu:

- 1) Hemoglobin
- 2) Hematokrit
- 3) Leukosit (White Blood Cell / WBC)
- 4) Trombosit (platelet)
- 5) Eritrosit (Red Blood Cell / RBC)
- 6) Indeks Eritrosit (MCV, MCH, MCHC)
- 7) Laju Endap Darah atau *Erithrocyte Sedimentation Rate (ESR)*
- 8) Hitung Jenis Leukosit (Diff Count)
- 9) Platelet Disribution Width (PDW)
- 10) Red Cell Distribution Width (RDW)

Adapun sampel darah yang digunakan yaitu darah vena. Agar dapat diperoleh spesimen darah yang syarat uji laboratorium, maka pengambilan sampel darah harus dilakukan dengan benar, mulai dari persiapan, pemilihan jenis koagulan, pemilihan letak vena, tehnik pengambilan sampai dengan pelabelan sampel. Pengambilan sampel tidak boleh dilakukan pada lengan yang terpasang infus, jika salah satu lengan terpasang infus maka pengambilan harus dilakukan pada lengan yang lain

yang tidak terpasang infus. Jika kedua lengan terpasang infus dilakukan pengambilan pada vena kaki. Darah vena diperoleh dengan jalan pungsi vena. Darah vena diambil dengan cara melakukan penusukan pada pembuluh darah vena, darah akan masuk pada ujung spuit, dilanjutkan dengan menarik torak atau piston sampai volume darah yang dikehendaki sekitar 3 – 5 ml. Vena yang cukup besar dan letaknya superficial. Pada orang dewasa biasanya vena difosa cubiti sedangkan pada anak-anak dan bayi diambil pada: Vena Jugularis Externa, Vena Femolaris (paha), Vena Sinus Sagitalis Superior (kepala).

b. Pemeriksaan bilirubin

Metode pemeriksaan bilirubin total ada dua, yaitu: Metode Jendrassik-Grof dan Colorimetric Test-Dichloroaniline (DCA). Metode Jendrassik-Grof memiliki prinsip: Bilirubin bereaksi dengan DSA (*Deazotized sulphanic acid*) dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Daya serap warna dari senyawa ini dapat langsung dilakukan terhadap sampel bilirubin pada panjang gelombang 578 nm. Bilirubin glukoronida yang larut dalam air dapat langsung bereaksi dengan DSA, namun bilirubin yang terdapat di albumin yaitu bilirubin terkonjugasi hanya dapat bereaksi jika ada akselerator. Total bilirubin: bilirubin direk + bilirubin indirek.

Sedangkan metode Colorimetric Test- Dichloroaniline (DCA) Prinsipnya adalah total bilirubin direaksikan dengan dichloroanilin terdiazotisasi membentuk senyawa azo yang berwarna merah dalam larutan

asam, campuran khusus (Detergen Enables) sangat sesuai untuk menentukan bilirubin total. Reaksi : Bilirubin + ion diazonium membentuk azobilirubin dalam suasana asam (Seswoyo,2016).

7. Manajemen Terapi

Suriadi dan Yuliani menyarankan berikut ini sebagai pengobatan terapeutik untuk bayi baru lahir dengan hiperbilirubin:

a. Pemberian antibiotik

Jika infeksi merupakan penyebab hiperbilirubin pada bayi, diberikan antibiotik.

b. Fototerapi

Jika bayi mengalami hiperbilirubin patologi, fototerapi dapat digunakan. Melalui foto-oksidasi bilirubin dari biliverdin, fototerapi mengurangi bilirubin di kulit melalui feses dan urin. Disamping itu pada terapi sinar fototerapi ditemukan peningkatan konsentrasi bilirubin indirek dalam cairan empedu duodenum dan menyebabkan bertambahnya pengeluaran cairan empedu ke dalam usus sehingga peristaltik usus meningkat dan bilirubin akan keluar bersama feses. Terapi sinar juga berupaya menjaga kadar bilirubin agar tidak terus meningkat sehingga menimbulkan resiko yang lebih fatal.

Terdapat beberapa komplikasi fototerapi pada bayi meliputi tinja lembek, kepanasan, dehidrasi dan sindrom bayi perunggu (perubahan kulit

bayi coklat keabu-abuan dan gelap), denyut jantung dan pernapasan tidak teratur (Fajria, 2014: 42).

c. Fenobarbital

Fenobarbital dapat meningkatkan konjugasi dan menyebabkan hati mensekresikan bilirubin. Peningkatan sintesis protein, yang dapat meningkatkan kemampuan albumin untuk mengikat bilirubin, meningkatkan sintesis glukuronil transferase di hati, yang dapat meningkatkan bilirubin terkonjugasi dan pembersihan pigmen empedu di hati. Namun, fenobarbital lebih jarang direkomendasikan untuk mengobati bayi baru lahir dengan hiperbilirubin.

d. Transfusi Tukar

Ketika bayi dengan hiperbilirubin tidak dapat diobati dengan fototerapi, maka lakukan transfusi tukar.

8. Komplikasi

Jika tidak diobati, hiperbilirubin pada bayi dapat menyebabkan ensefalopati bilirubin (komplikasi serius). Pada kasus yang lebih parah, hiperbilirubin pada bayi baru lahir dapat menyebabkan kern ikterus, yang meliputi cerebral palsy, kerusakan saraf, keterbelakangan mental, hiperaktif, bicara lambat, koordinasi otot yang buruk, dan isak tangis bernada tinggi. Menurut American Academy of Pediatrics (2004), bayi biasanya mengalami gejala sisa berupa palsy serebral atetoid berat, gangguan pendengaran,

kelumpuhan pandangan ke atas, dan displasia dental enamel sebagai akibat dari manifestasi klinis kern ikterus pada hiperbilirubin kronis. tahap ensefalopati bilirubin. Kondisi neuropatologi yang dikenal sebagai kern ikterus ditandai oleh pigmen bilirubin pada beberapa area otak, termasuk ganglia basal, pons, dan otak kecil.

Menurut American Academy of Pediatrics (2004), ensefalopati bilirubin akut terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Kelesuan, hipotonisitas, gerakan bayi terbatas, dan refleks mengisap yang lemah adalah ciri utama dari periode awal.
- b. Fase menengah, yang ditandai dengan demam dan iritasi ringan dan peningkatan tonus (retrocollis dan opisthotonus).
- c. Tahap akhir ditandai dengan tangisan bernada tinggi, pingsan atau koma, peningkatan nada, ketidakmampuan untuk makan, dan kejang sesekali.

9. Mencegah Hiperbilirubin pada Bayi Baru Lahir

Hiperbilirubin dapat dicegah sejak masa kehamilan ibunya, yaitu dengan cara pengawasan yang baik dan pemeriksaan kehamilan yang teratur untuk mencegah sedini mungkin terjadinya masalah baik pada ibu maupun janinnya salah satunya adalah hiperbilirubin. Untuk menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan anjurkan setiap ibu hamil untuk melakukan kunjungan antenatal komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali

selama kehamilan. Selain itu anjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter untuk deteksi kelainan medis secara umum minimal satu kali.

Pelayanan antenatal sangat diperlukan dalam pemantauan pertumbuhan janin dan kesehatan ibu oleh tenaga profesional sesuai dengan standar minimal pelayanan antenatal yang meliputi 5T yaitu timbangan berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, pemberian imunisasi TT, ukur tinggi fundus uteri, dan pemberian tablet Fe minimal 90 tablet selama masa kehamilan. Tujuan dilakukannya pelayanan antenatal adalah untuk menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat. Memantau kemungkinan adanya resiko kehamilan dan perencanaan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan resiko tinggi.

C. Proses Tata Laksana Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Tata laksana Asuhan Kebidanan

Dalam bidang kebidanan, tata laksana bidanan merupakan penerapan metodis untuk memecahkan masalah yang dimulai dengan pengumpulan data dasar (baik informasi subjektif maupun objektif) yang dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan, diagnosis aktual dan potensial, implementasi, dan evaluasi.

2. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan

Menurut Helen Varney, ada tujuh langkah untuk mengelola praktik kebidanan:

a. Langkah I (Perampungan Data Awal)

Tahap ini menetapkan jalan untuk tahap selanjutnya. Sangat penting untuk memilih data informasi yang sesuai analisis menyangkut karakter orang yang kompleks.

Untuk mendapatkan informasi kita perlu menggali:

1) Anamnesa, antara lain:

Bertanggung jawab atas semua data yang dikumpulkan. Ketika bayi mengalami hiperbilirubin, orang tua mungkin akan mengeluh bahwa kulit dan mata bayinya berwarna kuning atau perutnya membuncit. Bayi juga mungkin lemah dan menolak ASI, yang dapat meningkatkan produksi bilirubin.

2) Pemeriksaan fisik

Tanda vital, kesehatan pasien secara keseluruhan, dan pemeriksaan fisik yang dapat mencakup palpasi, inspeksi dan pemeriksaan sesuai kebutuhan. Jika bayi mengalami hiperbilirubin, kulit dan skleranya tampak kuning, perutnya terlihat buncit atau kembung, refleks menghisapnya terganggu, dan hatinya lemah.

b. Langkah II (Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual)

Masalah yang tepat diidentifikasi dalam langkah ini, tergantung pada informasi dan kebutuhan pasien yang dikumpulkan. Untuk membuat diagnosis dan masalah yang spesifik, data dasar yang telah dikumpulkan diinterpretasikan. Berdasarkan informasi dasar yang dikumpulkan, seperti kulit dan sklera bayi yang kuning, pembesaran perut, dan peningkatan kadar bilirubin, maka diidentifikasi adanya kasus hiperbilirubin. Mengajarkan ibu untuk tetap sabar dan berdoa, perbanyak berdzikir karena sungguh kesabaran dan keikhlasan itu dapat kita peroleh dengan memngingat Allah Subhana Wa ta'ala. Sesungguhnya Allah maha baik lagi penyayang.

c. Langkah III (Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial)

Kita memperoleh potensi masalah dalam langkah ini. Berdasarkan daftar masalah dan diagnosa yang ditemukan. Langkah ini membutuhkan tinjauan kedepan dan jika memungkinkan dilakukannya pencegahan.

Masalah yang mungkin terjadi pada kasus hiperbilirubin adalah kernikterus, yaitu kerusakan otak yang disebabkan oleh penempelan bilirubin terkonjugasi ke otak dan dapat menyebabkan kondisi yang sangat fatal. Menjelaskan kepada ibu untuk tetap bersabar dalam menghadapi masalah ini dan selali berbaik sangka terhadap Allah Subhana Wa Ta'ala.

d. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi)

Beberapa keadaan mengarahkan pada kasus yang serius, bidan mungkin perlu mengambil tindakan secepatnya untuk penolongan pertama pada bayi, sambil menunggu instruksi dari dokter. Mungkin juga panggilan untuk konsultasi dengan tenaga medis lainnya. Keadaan setiap pasien dievaluasi oleh bidan untuk memilih asuhan pasien yang paling tepat. Tahap ini menggambarkan bagaimana proses manajemen kebidanan berlangsung. Untuk melanjutkan pengobatan hiperbilirubin, seperti memantau kesehatan umum bayi dan tanda-tanda vital, menyusui, fototerapi, dan memeriksa kadar bilirubin, intervensi segera diperlukan. Dorong keluarga pasien agar selalu tenang dan memohon pertolongan kepada Allah untuk diberi keselamatan kepada anaknya.

e. Langkah V (Rencana Asuhan)

Asuhan komprehensif direncanakan dalam langkah ini berdasarkan hasil dari langkah-langkah sebelumnya. Ketika pasien mengalami hiperbilirubin, pengobatan yang disarankan adalah memantau kesehatan umum dan tanda-tanda vitalnya, memberi bayi ASI, dan melakukan tes laboratorium rutin untuk memastikan bahwa kadar bilirubin mereka tidak lebih tinggi dari 5 mg/dL. Tutup mata dan alat kelamin bayi selama 15 hingga 30 menit antara pukul 07.00 dan 08.00, dan jauhkan bayi dari sinar matahari secara langsung. Bekerja sama dengan dokter anak untuk memberikan fototerapi jika terjadi hiperbilirubin patologi. Orang tua

dihimbau untuk melatih kesabaran dan berdoa untuk kesejahteraan anak mereka.

f. Langkah VI (Penatalaksanaan)

Fase ini melibatkan implementasi yang efektif dan aman dari rencana asuhan yang komprehensif sebagaimana diuraikan dalam langkah lima. Bidan atau profesional kesehatan lainnya dapat melakukan beberapa perencanaan ini. Meski tidak bekerja sendiri, bidan tetap memiliki tugas mengawasi pelaksanaannya dalam rangka meningkatkan standar asuhan pada bayi hiperbilirubin. Bidan juga harus menyarankan orang tua untuk gigih dan sabar saat merawat bayi mereka.

g. Langkah VII (Evaluasi)

Pada fase ini, efektivitas asuhan yang diberikan dinilai, termasuk apakah kebutuhan terpenuhi sesuai dengan masalah yang diidentifikasi oleh diagnosis. Jika rencana tersebut mengatasi masalah dan diagnosis pasien, maka rencana tersebut dapat dianggap berhasil. Bidan dapat diberi kesempatan untuk menilai proses asuhan selain hasil asuhan. Dengan penuh harapan diinginkan hasil evaluasi harus sesuai dengan evaluasi keseluruhan. Seperti dengan hiperbilirubin, diantisipasi bahwa persyaratan ini akan terpenuhi, kadar bilirubin akan turun, kesehatan bayi secara keseluruhan akan sangat baik, dan refleks menghisap dan gerak akan kuat. Orang tua pasien diberi semangat untuk tetap berdoa demi keselamatan bayinya.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Tahapan Varney dan proses pencatatan asuhan kebidanan dengan metode Subjective, Objective, Assessment, Planning (SOAP) dengan melampirkan catatan kemajuan merupakan acuan sikap yang dilakukan bidan dalam asuhan kebidanan.

- a. **S** (Subyektif) adalah hasil dari diperolehnya riwayat pasien, baik langsung dari pasien maupun langsung dari keluarga pasien.
- b. **O** (Objektif) Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tanda vital, pemeriksaan fisik lengkap dari kepala sampai kaki, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan (pemeriksaan laboratorium darah, urin, feses, dan cairan tubuh).
- c. **A** (assessment) adalah penerapan diagnosis aktual dan potensial dari hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif.
- d. **P** (Planning) adalah keseluruhan tata laksana diagnosis obstetri yang telah ditetapkan sesuai dengan tuntutan yang telah diantisipasi.

Berikut adalah beberapa perencanaan untuk bayi dengan hiperbilirubin:

Kunjungan I: Mengamati tanda-tanda vital bayi, mengetahui kesehatan bayi secara keseluruhan, menentukan berat badan bayi, menjaga bayi tetap hangat, menjaga kebersihan diri, dan memberikan cairan dan nutrisi seperti ASI sesuai kebutuhan bayi. membantu petugas laboratorium dalam menentukan kadar bilirubin bayi, meminta ibu menilai tingkat kepeduliannya terhadap bayi dalam skala satu sampai sepuluh, dan memberikan dukungan

psikologis dengan memperbanyak dzikir, mendoakan bayi, dan rajin beribadah . sholat lima waktu dan sholat sunnah lainnya.

Kunjungan II: Menanyakan keluhan orang tua, mengevaluasi kesehatan bayi secara keseluruhan, mengamati setiap keadaan umum bayi, melakukan penimbangan bayi, menjaga bayi tetap hangat, menjaga kebersihan diri bayi, dan memberikan cairan dan nutrisi bayi, seperti ASI, sesuai kebutuhan . bekerja sama dengan staf LAB untuk menentukan kadar bilirubin bayi dan dengan dokter untuk menentukan tindakan terbaik. menegaskan tingkat kepedulian ibu terhadap anaknya, karena tingkat stres ibu juga berdampak pada kesehatan anaknya.

Kunjungan III : Sama seperti kunjungan ke-2.

Kunjungan IV: Menanyakan kepada orang tua tentang kesehatan bayi, mengevaluasi kondisi anak secara keseluruhan, mengamati tanda-tanda vital, menimbang berat badan, melakukan pemanasan, memastikan kebersihan diri anak, dan mengedukasi orang tua tentang kesehatan anak.

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR PATOLOGI
PADA BAYI NY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
01 JULI 2022 – 13 JULI 2022

No. Reg : 589XXX
Tanggal Masuk : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 01 Juli 2022 Pukul : 11.00 WITA
Nama Pengkaji : Fitriani

A. Langkah I (Identifikasi data dasar)

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : By “R”
Tanggal Lahir : 23 Juli 2022
Usia : 8 Hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Dua

b. Orang Tua

Nama : Ny "R" / "S"
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dato Panggantungang

2. Keluhan Utama

- a. Ibu pasien mengeluh khawatir dengan keadaan anaknya yang berwarna kuning sejak tanggal 24 Juni 2022
- b. Ibu pasien mengatakan anaknya tidak mau menyusu sejak tanggal 23 Juni 2022 dan refleks menghisapnya kurang baik.
- c. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan pasien bayi "R" telah di fototerapi pada tanggal 25 dan 26 juni 2022 dengan hasil LAB tanggal 27 juni didapatkan bilirubin total 11,77 mg/dL dan pada tanggal 28 juni 2022 didapatkan hasil LAB dengan bilirubin total 22 mg/dL.

- d. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan pasien bayi “R” di rawat inkubator sejak tanggal 23 Juni 2022.
- e. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan pasien bayi “R” di opname sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai sekarang.

3. Riwayat Obstetri

- a. Menurut ibu pasien, ini adalah anak keduanya, dan dia belum pernah mengalami abortus sebelumnya.
- b. Menurut ibu pasien, hari pertama haid terakhir pada 3 Oktober 2021.
- c. Ibu pasien mengatakan tidak pernah mengalami penyakit yang berat selama hamil.
- d. Ibu pasien mengatakan selama hamil dirinya malas makan sehingga menyebabkan berat badannya naik hanya 5 kg selama hamil.
- e. Menurut ibu pasien, dia hanya minum obat penambah darah yang dianjurkan oleh bidan selama kehamilannya.
- f. Ibu pasien mengatakan tidak rutin melakukan pemeriksaan kehamilan selama hamil karena sering bepergian jauh.
- g. Ibu pasien mengatakan bahwa saat hamil, dia konsisten melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak dan jongkok untuk mengepel lantai.

h. Menurut ibu pasien, selama trimester ketiga, ibu sering melakukan kegiatan santai seperti jalan-jalan pagi di sekitar rumah.

4. Riwayat Persalinan

Ibu pasien mengatakan bahwa dirinya melahirkan pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 12.10 WITA, di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, dibantu oleh bidan, dengan cara spontan, bayi lahir tunggal, berat bayinya waktu lahir 1.800 gram dan panjang badannya 44 cm, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan warna kulit bayi kemerahan.

5. Riwayat Kesehatan Keluarga

- a. Menurut ibu pasien, keluarganya tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti TBC, hepatitis, atau PMS, juga tidak memiliki penyakit keturunan seperti hipertensi atau diabetes.
- b. Ibu pasien mengaku tidak pernah mengalami penyakit kuning.

6. Pola Kebiasaan Pasien

a. Pola Nutrisi

ASI dan susu formula diberikan secara oral setiap tiga jam menggunakan sonde dalam jumlah hingga 40 cc sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.

b. Pola Eliminasi

Pasien sering buang air kecil 6 sampai 7 kali dalam sehari dengan warna bening dan 4 sampai 5 kali BAB dalam sehari dengan warna kuning gelap.

c. Pola Aktifitas

Gerakan bayi lemah.

d. Pola Kebersihan Diri

Pasien dibersihkan sekali dalam sehari menggunakan kasa setiap jam 07.00-08.00.

e. Pola Istirahat

Bayi biasanya tidur dalam satu hari \pm 20 jam. Dimana pada malam hari hingga \pm 10 jam dan pada siang hari bayi tidur \pm 10 jam.

7. Riwayat Sosial, Psikologi dan Ekonomi Orang Tua

- a. Ibu terlihat cemas ketika melihat bayinya. Ibu mengatakan tingkat kecemasannya jika di beri angka 1-10 ia berada pada tingkat 7.
- b. Ibu dan keluarga bahagia atas kelahiran bayinya.
- c. Ibu mengatakan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena memiliki kartu KIS.

8. Data Spiritual Orang Tua

- a. Ibu pasien selalu berdoa kepada Allah Subhana Wa Ta'ala demi kesembuhan anaknya.
- b. Ibu mengatakan tidak pernah meninggalkan shalat fardhunya.

9. Pemeriksaan

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Keadaan umum bayi lemah
- c. Kesadaran non komposmentis

d. Gestasi 37 minggu 4 hari

e. Tanda-tanda vital ibu

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 67x/i

Pernapasan : 23x/i

Suhu : 36,4°C

f. Tanda-tanda vital bayi

HR : 148x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,6°C

g. Pemeriksaan *Head to Toe* pada bayi

Kepala : Tidak ada sucsadenum.

Wajah : Simetris

Mata : Simetris, konjungtiva merah muda, sclera ikterik.

Hidung : Tidak ada sekret

Mulut : Bibir sianosis,

Telinga : Simetris, tidak ada serumen

Leher : Tidak ada pembesaran kelenjar

Dada : Puting susu terbentuk, pernapasan sesuai gerakan dada

Abdomen : Peristaltik (+) tali pusat sudah puput dan tidak ada tanda-tanda infeksi

Genitalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis

Ekstremitas : Simetris kiri dan kanan, Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10 % sejak tanggal 23 Juni 2022.

Kulit : Tampak kuning.

h. Refleksi

Refleksi *morrow* : Kuat, apabila dikejutkan, lengan dan kaki terangkat.

Refleksi *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan di telapak tangan bayi, secara spontan bayi akan menggenggam.

Refleksi *sucking* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif.

Refleksi *rooting* : Lemah, ketika pipi bayi di sentuh ia akan menoleh kearah sentuhan tersebut.

Refleksi *swallowin* : Lemah, bayi tidak dapat menelan dengan baik.

i. Pemeriksaan Antropometri

Berat Badan Lahir : 1.800 gram

Berat Badan Sekarang : 1.950 gram

Panjang Badan Lahir : 44 cm

Lingkar Kepala : 26 cm

Lingkar Dada : 26 cm

Lingkar Perut : 27 cm

j. Eliminasi

Urin : Buang air kecil dalam sehari biasanya 7-8 kali

Mekonium : Dalam sehari bayi buang air besar biasanya 3-4 kali, berwarna kuning gelap, konsistensi lembek.

k. Hasil Pemeriksaan LAB

Tanggal 27 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 11,77 mg/dL

Gula darah : 110 mg/dL

Tanggal 28 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 22 mg/dL

Gula darah : 110 mg/Dl

B. Langkah II (Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual)

Diagnosa Aktual : By "R", Bayi cukup bulan (BCB), Kecil masa kehamilan (KMK), BBLR dengan hiperbilirubin patologi.

1. BCB, KMK

Data Subjektif :

a. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 03 Oktober 2021

b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 23 juni 2022

Data Objektif :

- a. BBL : 1.800 gram
- b. PBL : 44 cm

Analisa dan interpretasi data:

- 1) Bayi cukup bulan adalah mereka yang lahir antara 37 dan 42 minggu kehamilan. Menurut temuan penelitian dalam kasus bayi "R," yang lahir pada tanggal 23 Juni 2022, pada usia kehamilan 37 minggu dan 4 hari dari hari pertama periode menstruasi terakhir ibu pada 3 Oktober 2021, bayi tersebut memenuhi syarat sebagai bayi cukup bulan (BCB).
- 2) Bayi yang lahir sesuai masa kehamilan memiliki berat antara 2500 sampai 4000 gram dan memiliki usia kehamilan antara 37 sampai 42 minggu (Sarwono, 2014: 414). Menurut temuan penelitian dalam kasus bayi "R" yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu 4 hari dan beratnya 1.800 gram merupakan suatu kondisi dimana didiagnosa sebagai Kecil Masa Kehamilan berdasarkan kurva berat badan bayi "R" yang memiliki usia kehamilan 37 minggu 4 hari sementara berat badan lahir bayi "R" dibawah batas normal yaitu 1.800 gram.

2. BBLR

Data Subjektif:

- a. Ibu pasien mengatakan bahwa dirinya melahirkan pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 12.10 WITA, di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf

Gowa, dibantu oleh bidan, dengan cara spontan, bayi lahir tunggal, berat bayinya waktu lahir 1.800 gram dan panjang badannya 44 cm.

Data Objektif:

- b. Taksiran persalinan tanggal 10 Juli 2022, berat badan sekarang 1950 gram dengan panjang badan lahir 44 cm. Refleks menghisap dan menelan lemah, bayi dirawat di inkubator dan diberi intake ASI dan susu formula secara oral menggunakan sonde.

Analisa dan Interpretasi Data

Dilihat dari berat badan lahir bayi yaitu 1.800 gram, menandakan bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah. Berdasarkan teori Fauziah 2013 mengatakan bayi berat lahir rendah atau BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan antara 1.500-2.500.

3. Hiperbilirubin Patologi

Data Subjektif :

- a. Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning
- b. Ibu mengatakan bayinya malas menyusu sejak lahir

Data Objektif :

- a. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 27 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi	: 0,24 mg/dL
Bilirubin terkonjugasi	: Riagen LAB tidak tersedia
Bilirubin total	: 11,77 g/dL

- b. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 28 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Riagen LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 22 g/dL

Analisa dan interpretasi data

Suatu kondisi yang dikenal sebagai hiperbilirubin patologi terjadi ketika kadar bilirubin serum total meningkat lebih dari 5 mg/dL per hari. Tingkat bilirubin darah akan meningkat 12 mg/dL pada bayi baru lahir cukup bulan.

Kulit kuning, sklera ikterik, peningkatan konsentrasi bilirubin darah, pemeriksaan peristaltik abdomen, feses berwarna kuning gelap, tidak mau minum, suction lemah, dan refleks menelan yang abnormal merupakan tanda dan gejala bayi baru lahir dengan hiperbilirubin.

4. Gangguan pemenuhan nutrisi

Data Subjektif :

- a. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusu sejak tanggal 23 juni 2022.

Data Objektif :

- a. Refleks menghisap dan menelan bayi lemah.

Analisa dan interpretasi data:

Bayi yang menolak untuk mengonsumsi ASI dan bayi dengan refleks menghisap dan menelan yang lemah adalah dua masalah yang paling sering dialami bayi hiperbilirubin. Menurut temuan evaluasi dan pemeriksaan

yang dilakukan pada kasus bayi "R", bayi tidak mau minum dan memiliki refleks yang buruk untuk mengisap dan menelan.

C. Langkah III (Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial)

1. Diagnose potensial : Kern icterus

Data Subjektif :

- a. Ibu pasien mengatakan kulit bayinya terlihat kuning.
- b. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusu / minum.

Data Objektif :

- a. Kulit bayi tampak kuning gelap.
- b. Refleks menghisap dan menelan lemah.
- c. Bibir sianosis
- d. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 27 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Riagen LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 11,77 mg/dL

- e. Hasil pemeriksaan LAB pada tanggal 28 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Riagen LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 22 mg/dL

Analisa dan interpretasi data :

Ini akan mengakibatkan konsekuensi yang serius karena bilirubin dapat menumpuk di otak, yang dikenal sebagai kernikterus, jika bayi dengan hiperbilirubin tidak ditangani dengan tepat dan kadar bilirubin meningkat.

D. Langkah IV (Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi)

Bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya seperti dokter anak untuk dilakukannya tindakan fototerapi dan pemberian obat.

E. Langkah V (Rencana Asuhan)

Diagnosa aktual : Bayi "R", BCB, KMK, dengan hiperbilirubin patologi.

Masalah aktual : Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi

Tujuan : Hiperbilirubin dan masalah gangguan pemenuhan nutrisi bayi teratasi.

Kriteria :

1. Keadaan Umum bayi lemah
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal :

HR : 120-160x/i

Pernapasan : 40-60x/i

Suhu : 36,2 - 37,2°C

3. Refleks hisap daan menelan lemah
4. Kulit bayi tampak kuning gelap.

Intervensi tanggal 01 Juli 2022, jam : 11.05 WITA

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air yang mengalir setiap melakukan tindakan dan sesudahnya.

Rasional : untuk menghindari kejadian infeksi

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Rasional : agar ibu mengetahui keadaan bayinya.

3. Berikan intake ASI sesering mungkin dan susu formula 40 cc tiap 3 jam

Rasional : Karena bilirubin membutuhkan banyak cairan untuk mengurai dirinya, penting untuk memberikan ASI atau susu formula yang cukup yaitu 40 cc per 3 jam untuk menurunkan kadar bilirubin dan juga mengatasi BBLR Bayi.

4. Pastikan bayi tetap dalam keadaan hangat.

Rasional : Untuk mempertahankan suhu bayi.

5. Lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter.

Ampicillin 100 mg/ 12 jam/ Intra Vaskuler, Gentamicin 10 mg/ 24 jam/ Intra Vaskuler.

Rasional : Sebagai antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi.

6. Lakukan pemberian infus dextrosa 10% atas instruksi dokter

Rasional : Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi

7. Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk menentukan tindakan apa yang akan diberikan.

Rasional : Agar dapat mengambil langkah yang tepat dalam penanganan bayi

“R” dengan hiperbilirubin dan penanganan BBLRnya.

8. Berikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi ”R” tentang kondisi bayi “R” saat ini.

Rasioanal : Untuk meningkatkan pemahaman, mengurangi rasa cemas, agar keluarga mengetahui kondisi bayi “R” saat ini.

9. Lakukan *informat consent* atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk dilakukan tindakan fototerapi dan rawat inkubator.

Rasional : Sebagai bukti tertulis keluarga menyetujui tindakan medis yang akan dilakukan.

10. Lakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi Selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan rawat inkubator.

Rasional : Untuk menurunkan kadar bilirubin dan mengubah bilirubin menjadi bentuk larut dalam air kemudian disekresikan melalui empedu atau urin. Dan rawat inkubator untuk penanganan BBLRnya.

11. Menjaga personal hygiene dengan mengganti pakaian bayi setiap kali lembab, mewashlap bayi sekali sehari pada pagi hari.

Rasional: Agar bayi merasa nyaman.

12. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Rasional: Untuk memantau keadaan mental ibu pasien agar kesehatannya juga tetap terjaga.

13. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Rasional: Untuk mengurangi tingkat kecemasan dan kekhawatiran ibu dan keluarga.

14. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Rasional: Agar bayinya diberi kesembuhan oleh Allah Subhana Wa Ta'ala

15. Menganjurkan ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Rasional: Agar diberi perlindungan oleh Allah Subhana Wa Ta'ala dan merupakan salah satu terapi penenang jiwa.

F. Langkah VI (Penatalaksanaan)

Tanggal 01 Juli 2022, pukul : 11.05 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi.

Hasil : terlaksana, tangan telah dicuci.

2. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang telah dilakukan

Hasil : Keadaan Umum bayi lemah

3. Memberikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI 40 cc per 3 jam melalui mulut dengan menggunakan sonde. Tindakan ini dilakukan sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.

4. Menjaga Kehangatan bayi

Hasil : Terlaksana, mengganti popok dan baju bayi jika basah.

5. Melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter

Ampicilin 100 mg/ 12 jam/ Intra Vaskuler

Gentamicin 10 mg/ 24 jam/ Intra Vaskuler

Hasil : Telah diberikan secara Intra Vaskuler, infeksi tidak terjadi.

6. Melakukan pemberian infus dextrosa 10%.

Hasil : Terlaksana, Nutrisi terpenuhi

7. Melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk menentukan tindakan apa yang akan diberikan.

Hasil: Dokter menginstruksikan untuk melakukan Fototerapi untuk keadaan bayi dengan hiperbilirubin dan Rawat Inkubator untuk penanganan BBLRnya.

8. Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang kondisi bayinya saat ini

Hasil : Ibu merasa cemas dengan kondisi bayinya saat ini.

9. Memberikan Informed consent atau persetujuan dengan pihak keluarga untuk melakukan tindakan fototerapi dan rawat inkubator.

Hasil : Ibu dan keluarga setuju untuk dilakukan fototerapi dan rawat inkubator.

10. Melakukan tindakan Fototerapi atas instruksi dokter dan rawat inkubator

Hasil :Terlaksana, telah dilakukan fototerapi sejak tanggal 25 dan 26 Juni 2022 dan rawat inkubator sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.

11. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di washlap setiap pagi hari.

12. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat kecemasannya sekarang berada pada angka delapan

13. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Hasil: Terlaksana, ibu merasa sedikit tenang

14. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti dan mulai mendoakan bayinya

15. Menganjurkan ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

G. Langkah VII (Evaluasi)

Tanggal 01 Juli 2022, jam : 14.10 WITA

1. Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi.
2. Keadaan umum bayi lemah

Tanda-tanda vital :

HR :133x/i

P : 45x/i

S : 36,9°C

3. Kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi ditandai dengan bayi minum ASI 40cc per 3 jam melalui mulut dengan menggunakan sonde sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.
4. Bayi telah dibedong
5. Telah diberikan injeksi ampisilin atas instruksi dokter 100 mg/ 12 jam/IV

dan injeksi gentamicin 10 mg/ 24 jam/ IV sejak tanggal 23 Juni 2022 dan inveksi tidak terjadi.

6. Telah diberikan infus dextrosa 10% sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini, nutrisi terpenuhi.
7. Telah dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak dan dokter menginstruksikan melakukan tindakan fototerapi dan rawat inkubator.
8. Ibu dan keluarga telah mengerti tentang kondisi bayinya.
9. Ibu dan keluarga menyetujui pemberian tindakan fototerapi dan rawat inap.
10. Telah dilakukan tindakan fototerapi pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022 serta rawat inkubator sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.
11. Popok bayi selalu diganti setiap kali kotor dan basah.
12. Tingkat kecemasan ibu masih tinggi yaitu berada di angka delapan.
13. Ibu masih sedikit cemas dengan kondisi bayinya.
14. Ibu dan keluarga berdoa untuk kesembuhan bayinya.
15. Ibu dan keluarga merasa lebih tenang setelah shalat dan berdzikir.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI
PADA BY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 01 JULI 2022**

No. Reg : 589xxxx
Tanggal MRS : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 01 Juli 2022 Pukul : 11.00 WITA
Nama Pengkaji : Fitriani

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi “R”
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022
Usia : 8 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Kedua

b. Orang Tua

Nama : Ny “R” / “S”
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dato Panggantungang

Data Subjektif (S)

1. Ibu pasien mengatakan khawatir dengan keadaan bayinya karena kulit bayinya berwarna kuning sejak tanggal 24 juni 2022
2. Ibu pasien mengatakan bayinya malas menyusu sejak tanggal 23 Juni 2022
3. Ibu pasien mengatakan memberikan bayinya ASI dan dibantu susu formula setiap 3 jam dengan jumlah 40 cc menggunakan sonde sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.
4. Ibu pasien mengatakan bahwa pasien merupakan anaknya yang kedua dan tidak ada riwayat keguguran sebelumnya.
5. Ibu pasien mengatakan melahirkan bayinya yang kedua pada tanggal 23 Juni 2022, pukul 12.10 WITA, di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusus Gowa, ditolong oleh bidan, secara spontan, bayi lahir tunggal, dengan berat badan lahir 1.800 dan panjang badan lahir 44 cm, keadaan bayi baru lahir segera menangis dan kulit bayi kemerahan.
6. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak pernah sakit dan tidak menderita penyakit apapun.
7. Ibu pasien mengatakan selama hamil dirinya malas makan yang menyebabkan berat badannya naik hanya 5 kg selama hamil.
8. Ibu pasien mengatakan selama hamil dirinya tidak rutin melakukan pemeriksaan

kehamilan dikarenakan sering bepergian jauh.

9. Ibu pasien mengatakan selama hamil tidak mengkonsumsi obat apapun selain yang diberikan bidan.
10. Ibu pasien mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 03 Oktober 2021
11. Ibu pasien mengatakan dalam keluarga tidak ada penyakit menurun dan tidak ada riwayat PMS.
12. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan Keadaan Umum bayi lemah, refleks menghisap dan menelan lemah, kulit bayi berwarna kuning, bayi ditempatkan di *inkubator* sejak tanggal 23 Juni 2022.
13. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayi “R” dipasang infus dextrose 10% sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.
14. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayi “R” di rawat inkubator sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.
15. Perawat perinatology di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayi “R” telah diberi fototerapi pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022.
16. Ibu pasien mengatakan menggunakan KIS untuk biaya perawatan.
17. Ibu pasien berdoa kepada Allah SWT agar bayinya diberi kesembuhan.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Keadaan umum bayi lemah
3. Kesadaran non composmentis
4. Gestasi 37 minggu 4 hari
5. Tanda-tanda vital ibu:

Tekanan darah : 120/80 mmHg

Nadi : 67x/i

Pernapasan : 23x/i

Suhu : 36,4°C

6. Tanda-tanda vital bayi:

HR : 148x/i

Pernapasan : 48x/i

Suhu : 36,6 °C

7. Pemeriksaan *head to toe*

Kepala : Rambut tebal berwarna hitam dan tidak ada *caput Sucsadenum*

Wajah : Simetris, tidak ada oedema

Mata : Simetris kiri dan kanan konjungtiva merah muda, sclera kuning.

Hidung : Tidak ada polip dan secret

Mulut : Bibir sianosis, tidak ada kelainan

Telinga : Simetris kiri dan kanan, tidak ada serumen

Leher : Tidak ada benjolan.

Dada : Putting susu terbentuk, pernapasan sesuai gerakan dada.

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tandainfeksi.

Genitalia : Testis sudah turun semua, terdapat lubang pada penis.

Anus : Terdapat lubang pada anus.

Ekstremitas atas : Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan, terpasang infus dextrosa 10 % 15 TPM pada tangan sebelah kanan sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.

Ekstremitas bawah: Jari-jari lengkap, tidak ada kelainan.

Kulit : Tampak kuning.

8. Refleksi

Refleksi *morrow* : Kuat, apabila dikagetkan lengan kaki terangkat.

Refleksi *grasping* : Kuat, apabila benda diletakkan ditelapak kaki bayi secara spontan bayi akan menggenggam.

Refleksi *suckhing* : Lemah, pada saat diberi susu tidak dapat menghisap secara aktif.

Refleksi *rooting* : Lemah, apabila menyentuh pipi bayi akan menoleh sentuhan.

Refleksi *swallowing* : Lemah, bayi tidak dapat menelan secara aktif.

9. Pengukuran Antropometri

Berat Badan Lahir : 1.800 gram

Berat Badan Sekarang : 1.950 gram

Panjang Badan Lahir : 44 cm

Lingkar Kepala : 26 cm

Lingkar Dada : 26 cm

Lingkar Perut : 27 cm

10. Eliminasi

Urin : pasien buang air kecil dalam 1 hari biasanya 7-8 kali.

Mekonium : pasien buang air besar dalam 1 hari biasanya 3-4 kali, dengan konsistensi lembek berwarna kuning gelap.

11. Pemeriksaan Penunjang

Tanggal 27 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 11,77 mg/dL.

Gula Darah : 110 mg/dL

Tanggal 28 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 22 mg/dL.

Gula Darah : 110 mg/dL

Assesment (A)

Diagnosa aktual : Bayi "R", BCB, KMK, BBLR, dengan hiperbilirubin patologi.

Masalah aktual : Gangguan kebutuhan pemenuhan nutrisi

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya kern ikterus

Lakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan.

Planning (P)

Tanggal 01 Juli 2022, pukul : 11.05 WITA

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil : Terlaksana, tangan telah dicuci.

2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu dan tanda-tanda vital bayi dalam batas normal.

Hasil : Ibu mengerti dengan keadaan bayinya

3. Memberikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula tiap 3jam

Hasil : Terlaksana, telah diberikan intake ASI

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil : Pakaian bayi tetap terpasang saat tidak di fototerapi dan popok bayi telah diganti.

5. Melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter

Ampicilin 135mg/ 12 jam/ Intra Vaskuler

Gentamicin 13mg/ 24 jam/ Intra Vaskuler

Hasil : Telah diberikan secara Intra Vaskuler, ineksi tidak terjadi.

6. Melakukan pemberian infus dextrosa 10%

Hasil : Telah diberikan infus dextrosa sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini, Nutrisi terpenuhi.

7. Melakukan kolaborasi dengan dokter untuk menentukan tindakan apa yang akan diberikan

Hasil : Dokter menginstruksikan untuk melakukan tindakan fototerapi dan rawat inkubator.

8. Memberikan informasi dan penjelasan tentang hasil pemeriksaan pada keluarga bayi "R" tentang kondisi bayi "R" saat ini.

Hasil : Terlaksana, ibu pasien mengerti

9. Memberikan informat consen kepada ibu dan keluarga untuk meminta persetujuan pemberian tindakan fototerapi dan rawat inkubator.

Hasil : Ibu dan keluarga menyetujui tindakan yang akan dilakukan.

10. Melakukan tindakan fototerapi dan rawat inkubator atas instruksi dokter

Hasil : Terlaksana, telah dilakukan fototerapi pada tanggal 25 dan 26 Juni 2022 dan dilakukan rawat inkubator sejak tanggal 23 Juni 2022 hingga saat ini.

11. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di walshap setiap pagi hari.

12. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat keemasannya sekarang berada pada angka delapan.

13. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Hasil: Terlaksana, ibu merasa sedikit tenang

14. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti

15. Menganjurkan kepada ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI
PADA BY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 02 JULI 2022**

No. Reg : 589xxx
Tanggal MRS : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 02 Juli 2022 Pukul : 12.15 WITA

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi “R”
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022
Usia : 9 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Kedua

b. Orang tua

Nama : Ny “R” / “S”
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dato Panggantungang

Data Subjektif (S)

1. Petugas di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf gowa mengatakan keadaan umum bayi lemah, kulit dan sclera bayi masih kuning.
2. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek dan berwarna kuning gelap, dan BAK berwarna kuning jernih.

Data Objektif (O)

1. Keadaan Umum bayi sedang
2. Tanda-tanda vital

HR	: 138x/i
Pernapasan	: 54x/i
Suhu	: 36.8 °c
3. Berat Badan Sekarang : 1.950 gram
4. Pemeriksaan fisik terfokus

Kepala : rambut tebal, berwarna hitam dan tidak ada benjolan

Mata : konjungtiva merah muda dan sclera kuning

Dada : pernafasan sesuai gerakan dada

Abdomen : tali pusat telah putus, tidak ada tanda-tanda infeksi

Ekstremitas : Masih terpasang infus dextrosa 10% pada tangan bayi sebelah kanan.

Kulit : tampak kuning

5. Refleks

Refleks *sucking* : Lemah

Refleks *rooting* : Lemah

Refleks *swallowing* : Lemah

6. Eliminasi

BAB (+) warna kuning gelap, konsistensi lunak

BAK (+) warna kuning jernih

7. Pemeriksaan penunjang

Tanggal 27 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 11,77 mg/dL

Gula Darah : 110 mg/dL

Tanggal 28 Juni 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : 0,24 mg/dL

Bilirubin terkonjugasi : Reagen di LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 22,0 mg/dL

Gula Darah : 110 mg/dL

ASESSMENT (A)

Diagnosa aktual : Bayi Ny "R" dengan Hiperbilirubin patologi

Diagnosa potensial : Potensi terjadinya kern ikterus

PLANNING (P)

Tanggal 02 Juli 2022 pukul : 12.20 WITA

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : terlaksana, tangan telah dicuci

2. Menyampaikan kepada ibu tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan tanda-tanda vital bayi dalam batas normal.

Hasil: Ibu mengerti dengan kondisi bayinya

3. Membrikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula tiap 3 jam.

Hasil: terlaksana, intake ASI telah diberikan

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil: terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti.

5. Melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter

Ampicilin 100 mg/ 12 jam/ Intra Vaskuler

Gentamicin 10 mg/ 24 jam/ Intra Vaskuler

Hasil : Telah diberikan secara Intra Vaskuler, dan inveksi tidak terjadi.

6. Melakukan pemberian infus dextrosa 10%

Hasil : Terlaksana, Nutrisi terpenuhi

7. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil: bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek berwarna kuning gelap dan

BAK berwarna jernih.

8. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di washlap setiap pagi hari.

9. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat kecemasannya sekarang berada pada angka tujuh

10. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Hasil: Terlaksana, ibu merasa sedikit tenang

11. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti dan mulai mendoakan bayinya

12. Menganjurkan kepada ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI PATOLOGI
PADA BY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN PATOLOGI
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 05 JULI 2022**

No. Reg : 589XXX
Tanggal MRS : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 05 Juli 2022 Pukul : 15.00 WITA
Nama Pengkaji : Fitriani

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi “R”
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022
Usia : 12 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Kedua

b. Orang Tua

Nama : Ny “R” / “S”
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
 Alamat : Jl. Dato Panggantungang

Data Subjektif (S)

1. Petugas di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan keadaan umum bayi sedang, kulit dan sklera bayi masih kuning, bayi sudah buang air besar dan buang air kecil. Feses berwarna kuning gelap, konsistensi lembek, urine berwarna kuning jernih.
2. Petugas di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan kadar bilirubin bayi "R" mulai menurun dibuktikan oleh hasil LAB pada tanggal 05 Juli 2022 kadar bilirubin total adalah 20,13 mg/dL.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi sedang
2. Tanda-tanda vital

HR : 125x/i

Pernapasan : 40x/i

Suhu : 36,6°C

3. Berat Badan Sekarang : 2200 gr.

4. Pemeriksaan fisik terfokus

Mata : Konjungtiva merah muda sklera tampak kuning.

Dada : Gerakan dada senada dengan pernapasan

Abdomen : Peristaltik (+), tali pusat sudah jatuh, tidak ditemukan infeksi.

Ekstremitas : Sudah tidak lagi di infus.

Kulit : Tampak kuning.

5. Refleksi

Refleksi suckhing : Sedang

Refleksi rooting : Sedang

Refleksi swallowing : Sedang

6. Eliminasi

BAB (+) warna kuning gelap, konsistensi lunak

BAK (+) warna kuning jernih

7. Pemeriksaan penunjang

Tanggal 05 Juli 2022

Bilirubin tak terkonjugasi : -

Bilirubin terkonjugasi : Riagen LAB tidak tersedia

Bilirubin total : 20,13 mg/dL

ASESSMENT (A)

Diagnosa aktual : Bayi Ny "R" dengan Hiperbilirubin patologi

Diagnosa potensial : Potensi terjadinya kern ikterus

PLANNING (P)

Tanggal 05 Juli 2022 jam : 15.10 WITA

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan.

Hasil : terlaksana, tangan telah dicuci

2. Memberitahu kepada ibu bahwa keadaan bayinya sudah lebih baik dari sebelumnya dan tanda vital bayi dalam batas normal.

Hasil: Ibu mengerti

3. Membrikan intake ASI sesering mungkin atau susu formula sebanyak 40 cc tiap 3 jam.

Hasil: terlaksana, telah diberikan intake ASI

4. Mengupayakan agar bayi tetap hangat

Hasil: terlaksana, pakaian bayi yang digunakan kering dan bersih.

5. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) atas instruksi dokter.

Hasil: bayi difototerapi dengan tidak memakai baju, mata dan alat kelamin bayi ditutupi menggunakan kasa pada tanggal 04 Juli 2022

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil: bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek berwarna kuning gel dapan BAK berwarna jernih

7. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di washlap setiap pagi hari.

8. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat kecemasannya sekarang berada pada angka

lima

9. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Hasil: Terlaksana, ibu merasa sedikit tenang

10. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti dan mulai mendoakan bayinya

11. Menganjurkan ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI NORMAL
PADA BY “R” DENGAN HIPERBILIRUBIN
DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA
TANGGAL 08 JULI 2022**

No. Reg : 589XXX
Tanggal MRS : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 08 Juli 2022 Pukul : 08.10 WITA
Nama Pengkaji : Fitriani

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi “R”
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022
Usia : 15 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Kedua

b. Orang Tua

Nama : Ny “R” / “S”
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jl. Dato Panggantungang

Data Subjektif (S)

1. Petugas di ruang perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan keadaan umum bayi baik, kulit dan sclera bayi sudah tidak kuning, bayi sudah BAB dan BAK, feses berwarna kuning gelap, konsistensi lembek, urin berwarna kuning jernih.
2. Petugas di ruang perinatology Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa mengatakan kadar bilirubin bayi "R" sudah menurun dibuktikan oleh hasil LAB pada tanggal 08 Juli 2022 yaitu kadar bilirubin total 4 mg/dL.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. TTV
HR : 136x/i
Pernapasan : 47x/i
Suhu : 36,7°C
3. Berat Badan Sekarang : 2.300 gram
4. Pemeriksaan fisik terfokus
Mata : Konjungtiva merah muda sklera tampak putih.
Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Ekstremitas : Tidak ada kelainan.

Kulit : Tampak kemerahan.

5. Refleks

Refleks suckling : Kuat

Refleks rooting : Kuat

Refleks swallowing : Kuat

6. Eliminasi

BAB (+) warna kuning gelap, konsistensi lunak

BAK (+) warna kuning jernih

7. Pemeriksaan penunjang

Bilirubin tak terkonjugasi : 0

Bilirubin terkonjugasi : -

Bilirubin total : 4 mg/dL

ASESSMENT (A)

Diagnosa aktual : Bayi Ny "R" dengan keadaan normal.

Diagnosa potensial : -

PLANNING (P)

Tanggal 08 Juli 2022 jam : 08.15 WITA

1. Mencuci tangan menggunakan sabun dibawah air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil : terlaksana,

2. Memberitahu ibu bahwa keadaan bayi baik dan tanda-tanda vital bayi dalam batas normal.

Hasil : Ibu mengerti

3. Mempertahankan pemberian intake ASI atau susu formula.

Hasil: Terlaksana

4. Menjaga kehangatan bayi

Hasil: terlaksana, pakaian dan popok bayi telah diganti.

5. Melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Hasil: bayi difototerapi dengan tidak memakai baju, mata dan alat kelamin bayi ditutupi menggunakan kasa pada tanggal 07 Juli 2022.

6. Mengobservasi BAB dan BAK bayi

Hasil: bayi sudah BAB dengan konsistensi lembek berwarna kuning gelap dan BAK berwarna jernih

7. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di washlap setiap pagi hari.

8. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat keemasannya sekarang berada pada angka empat.

9. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga

Hasil: Terlaksana, ibu merasa senang dengan kondisi bayinya yang sudah membaik.

10. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti

11. Menganjurkan kepada ibu untuk terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI NORMAL
KUNJUNGAN DI RUMAH NY “R”
TANGGAL 13 JULI 2022

No. Reg : 589XXX
Tanggal MRS : 23 Juni 2022 Pukul : 12.10 WITA
Tanggal Pengkajian : 13 Juli 2022 Pukul : 15.40 WITA
Nama Pengkaji : Fitriani

1. Identitas

a. Bayi

Nama Bayi : Bayi “R”
Tanggal Lahir : 23 Juni 2022
Usia : 20 hari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Anak Ke : Kedua

b. Orang Tua

Nama : Ny “R” / “S”
Usia : 28 tahun / 30 tahun
Nikah/Lamanya : 1 kali / ± 5 tahun
Suku : Bugis / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMA / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl. Dato Panggantungang

Data Subjektif (S)

1. Ibu mengungkapkan rasa syukur dan kesenangannya atas kondisi bayinya yang semakin membaik
2. Ibu mengungkapkan tingkat kecemasannya sekarang menurun menjadi 3%.
3. Ibu mengungkapkan warna kulit dan mata bayinya sudah tidak kuning lagi.
4. Ibu merasa bahagia karena bayinya kuat menyusu.

Data Objektif (O)

1. Keadaan umum bayi baik
2. Tanda-tanda vital
 - HR : 133xi
 - Pernapasan : 45x/i
 - Suhu : 36,7°C
3. Berat Badan Sekarang : 2.540 gram

4. Pemeriksaan fisik terfokus

Mata : Konjungtiva meraah muda sklera tampak putih.

Dada : Pernapasan sesuai dengan gerakan dada.

Abdomen : Tali pusat sudah puput, tidak ada tanda-tanda infeksi.

Ekstremitas : Tidak ada kelainan, infus sudah dilepas

Kulit : Tampak kemerahan.

5. Refleksi

Refleksi suckhing : Kuat

Refleksi rooting : Kuat

Refleksi swallowing : Kuat

6. Eliminasi

BAB (+) coklat kehitaman, konsistensi lembek

BAK (+) warna kuning jernih

ASESSMENT (A)

Bayi Ny. "R" dengan keadaan normal

PLANNING (P)

Tanggal 13 Juli 2022 jam : 15.45 WITA

1. Mencuci tangan dibawah air mengalir menggunakan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi

Hasil : Terlaksana

2. Mengabarkan kepada ibu bahwa berat badan bayinya semakin bertambah

Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang

3. Mengajarkan kepada ibu bahwa bayinya harus tetap diberi ASI secara on theman

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

4. Mengajarkan ibu untuk tetap memantau kebersihan dan kekeringan bayinya dengan cara mengganti pakaian bayi setiap kali basah dan memberi alas pada

tempat tidur bayi serta jauhkan bayi dari kipas angin atau AC.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Memberi tahu ibu tanda-tanda bahaya pada bayi seperti:
 - a. Bayinya terlihat engap-engap atau pernapasan bayi $>60x/i$
 - b. Bayi demam, dimana suhunya mencapai $< 36,5^{\circ}C$ atau $> 37,5^{\circ}C$
 - c. Bagian kulitnya tidak berwarna seperti biasanya
 - d. Bayi malas minum
 - e. Kejang
 - f. Bayi tidak pernah buang air kecil dalam 1 hari dan tidak pernah buang air besar dalam 3 hari

Hasil: Ibu paham dengan penjelasan

6. Menganjurkan kepada ibu untuk mengontrol kesehatan bayinya dengan membawa bayinya ke Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat apabila terdapat salah satu dari tanda bahaya bayi baru lahir.

Hasil: Ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

7. Menjaga personal hygiene

Hasil: Terlaksana, popok bayi di ganti setiap kali kotor dan lembab, dan bayi selalu di walshap setiap pagi hari.

8. Menanyakan kepada ibu pasien seberapa tinggi tingkat kecemasan terhadap bayinya jika menggunakan perbandingan angka satu sampai sepuluh

Hasil: Ibu mengatakan tingkat kecemasannya sekarang berada pada angka tiga.

9. Memberikan dukungan psikologis kepada ibu dan keluarga


Hasil: Terlaksana, ibu merasa senang

10. Mengajarkan kepada ibu doa-doa untuk kesembuhan bayinya

Hasil: Ibu mengerti

11. Mengajarkan kepada ibu agar terus berdzikir dan shalat 5 waktu

Hasil: Ibu mengerti



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas asuhan kebidanan yang diberikan pada bayi “R” yang mengalami hiperbilirubin di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa menggunakan model tujuh langkah manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, yang meliputi pengumpulan data dasar, identifikasi diagnosa atau masalah yang sebenarnya, identifikasi diagnosis atau masalah potensial, kebutuhan untuk tindakan segera atau kolaborasi, perencanaan perawatan yang komprehensif, dan perencanaan dan evaluasi implementasi. Berikut adalah prosesnya:

1. Langkah I (Pengumpulan data dasar)

Pada langkah ini, kami mengumpulkan data pasien yaitu data subjektif dan objektif dari berbagai sumber. Dokumentasi pengumpulan data pasien berdasarkan anamnesis dideskripsikan dengan menggunakan data subjektif.

Berdasarkan hasil pengkajian dan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus bayi “R” dengan hiperbilirubin patologi melalui anamnesis, ibu pasien mengaku khawatir dengan kondisi bayinya karena kulit bayinya menguning sejak 24 Juni 2022. ibu pasien mengaku bahwa bayinya cukup bulan, dan ketika diperiksa kondisi umum bayi ditemukan dalam kondisi baik.

Menurut hipotesis hiperbilirubin patologi kadar bilirubin akan meningkat dan mencapai 12 mg/dL pada bayi baru lahir cukup bulan dan 10 mg/dL pada bayi baru lahir prematur pada tahap penilaian. Menurut hasil laboratorium pada

bayi hiperbilirubin bila kadar bilirubin masing-masing meningkat 10 mg/dl pada bayi BBLR dan 12 mg/dl pada bayi cukup bulan. Penatalaksanaan hiperbilirubin yang tidak efektif dapat menyebabkan kern ikterus dan yang lebih penting masalah mental.

Hiperbilirubin patologi ditandai dengan hiperbilirubin yang terjadi dalam 24 jam pertama kehidupan, kadar bilirubin serum total lebih besar dari 10 mg/dl, peningkatan bilirubin harian minimal 5 mg/dl, konsentrasi bilirubin serum lebih dari 10 mg/dl pada bayi di bawah 37 Minggu dan 12 mg/dl pada bayi cukup bulan, serta penyakit kuning yang berhubungan dengan hemolisis (ketidakcocokan darah, defisiensi enzim (Maulidia, 2014:40).

Etiologi hiperbilirubin pada bayi baru lahir mungkin independen atau karena sejumlah penyebab, termasuk masalah dengan penyerapan hati dan konjugasi, masalah transportasi, masalah ekskresi, obstruksi saluran pencernaan, dan kurangnya ASI.

Pemberian ASI dapat dilakukan sesegera mungkin dengan jumlah cairan dan nutrisi yang cukup untuk mengatur kadar bilirubin pada bayi baru lahir. Peningkatan motilitas usus adalah manfaat menyusui sesegera mungkin. Bayi baru lahir membutuhkan antibodi, protein, karbohidrat, lipid, dan vitamin dalam ASI karena beta glukuronidase yang ada dalam ASI mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam lemak, menyebabkan kadar bilirubin tidak langsung meningkat dan akhirnya diserap kembali oleh usus. Antara delapan dan dua belas menyusui per hari adalah rentang frekuensi menyusui yang ideal.

Ketidakkocokan ABO-Rh, peningkatan jumlah sel darah merah, penyakit, dan ASI yang tidak mencukupi merupakan faktor risiko hiperbilirubin pada bayi. Oleh karena itu, pada titik ini, tidak ada perbedaan antara teori dan kasus aktual.

2. Langkah II (Identifikasi diagnosis atau masalah yang sebenarnya)

Pada langkah ini, kebutuhan klien dan diagnosis atau masalah yang sesuai ditentukan berdasarkan interpretasi yang tepat dari data yang dikumpulkan. Dengan menganalisis data fundamental yang dikumpulkan, masalah atau diagnosis spesifik ditemukan.

Berdasarkan temuan evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan pada bayi "R", ibu pasien mengaku khawatir dengan kesehatan anaknya karena kulit bayinya sudah mulai menguning sejak 24 Juni 2022. Ibu pasien juga mengatakan bahwa HPHT terjadi pada tanggal 03 Oktober 2021, dan bayi tersebut lahir pada tanggal 23 Juni 2022. Ibu pasien menyatakan bahwa berat badan lahir bayi adalah 1.800 gram. Dengan usia kehamilan 37 minggu 4 hari, kurva pertumbuhan berat badan bayi "R" tidak sesuai dengan masa kehamilan (KMK), dan pada saat pemeriksaan, kondisi bayi secara keseluruhan kurang baik. Refleks hisap dan menelan lemah, sklera dan kulit tampak kuning, dan kadar bilirubin total 11,77 mg/dL saat dilakukan pemeriksaan LAB pada 27 Juni 2022.

Menurut Maryani, hiperbilirubin pada bayi baru lahir ditandai dengan sklera ikterik, kulit kuning, peningkatan konsentrasi bilirubin serum 10 mg/dL pada bayi prematur (BBLR) dan 12 mg/dl pada bayi baru lahir cukup bulan, dan

penurunan berat badan hingga 5 persen selama perjalanan. dari satu hari. Asupan kalori rendah, asfiksia, hipoksia, sindrom gangguan pernapasan, perut buncit, tinja berwarna dempu, pembesaran hati, penolakan untuk minum ASI, lesu, lemah refleks mengisap dan menelan lemah. Ini semua adalah tanda bahwa bayi mengalami hiperbilirubin. Ibu dan keluarga diminta untuk terus mendoakan bayinya dan bersabar atas apa yang telah dialami bayinya. sehingga teori dan kasus aktual saat ini sepenuhnya tidak ada kesenjangan.

3. Langkah III (Identifikasi diagnosis atau potensi masalah)

Fase ini melibatkan identifikasi masalah atau diagnosa yang telah dibuat. Saat mengamati klien, fase ini melibatkan antisipasi. Jika pencegahan dilakukan, bidan dituntut untuk siap jika ada potensi masalah.

Dalam kasus bayi "R," perawatan umum diamati, dan terapi cahaya segera diberikan untuk mencegah kemungkinan masalah (kern ikterus). Ini adalah hasil dari penanganan yang hati-hati, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan harian kadar bilirubin yang terdeteksi selama pemeriksaan.

Bilirubin dapat menumpuk di otak, suatu kondisi yang dikenal sebagai kern ikterus, jika hiperbilirubin patologi tidak diobati secara efektif dan kadar bilirubin semakin meningkat. Gangguan yang dikenal sebagai hiperbilirubin terjadi ketika kadar bilirubin naik ke titik di mana kern ikterus yang jika tidak ditangani dengan benar, dapat menyebabkan gangguan mental. Karena efek toksik bilirubin pada sistem saraf pusat, situasi hiperbilirubin yang tidak diobati dapat

menyebabkan masalah serius seperti kern ikterus. Komplikasi hiperbilirubin yang paling serius merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi. Ini memiliki efek jangka panjang pada kualitas hidup, termasuk cerebral palsy, tuli bernada tinggi, dan kelumpuhan.

Penatalaksanaan yang tepat dari tenaga kesehatan diharapkan dapat menghindari hiperbilirubin terutama dengan pengawasan antenatal yang baik dan pertolongan persalinan yang aman serta diarahkan oleh asuhan ibu, sehingga dapat menurunkan kejadian hiperbilirubin pada bayi baru lahir. Hiperbilirubin pada bayi baru lahir yang dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Ingatkan orang tua untuk tetap istiqomah dan beriman dalam ketakwaan kepada Allah SWT. Sehingga pada langkah ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan apa yang terjadi di lahan.

4. Langkah IV (Perlu tindakan atau kolaborasi segera)

Beberapa data menunjukkan skenario mendesak di mana bidan harus segera bertindak untuk memastikan keselamatan bayi, sementara data lain menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sambil menunggu perintah dokter dan juga meminta konsultasi dengan tim medis lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan ibu pasien pada kasus bayi "R", ibu mengatakan prihatin dengan kondisi anaknya karena kulit bayi menguning sejak 24 Juni 2022, bayi berhenti menyusu sejak 23 Juni , 2022, kesehatan bayi secara keseluruhan lemah, kulit dan skleranya tampak kuning,

refleks menghisap dan menelannya lemah sejak 23 Juni 2022, dan pada 27 Juni 2022 kadar bilirubin total 11,77 g/dL. Bidan akan bekerja sama dengan dokter anak untuk memberikan fototerapi dan pengobatan.

Bidan menilai setiap kondisi pasien untuk mengidentifikasi tindakan terbaik. Hiperbilirubin pada bayi baru lahir memerlukan intervensi cepat dengan dokter anak untuk fototerapi, serta koordinasi dengan tenaga medis lain yaitu petugas LAB, perawat, dan dokter (Mufdillah, et al. 2012). Anjurkan ibu dan keluarganya untuk tetap ikhlas dan sabar sambil memohon kepada Allah untuk menyembuhkan bayinya. Sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan contoh nyata di lapangan saat ini.

5. Langkah V (Merencanakan perawatan komprehensif)

Berdasarkan temuan fase sebelumnya, rencana perawatan menyeluruh dikembangkan dalam fase ini. Pengelolaan diagnosis atau masalah yang direkam atau diantisipasi berlanjut pada tahap ini, yang juga merupakan saat reformasi data parsial dapat diselesaikan. Rencana ini disusun sesuai dengan diagnostik, masalah, dan persyaratan.

Untuk bayi "R" yang mengalami hiperbilirubin patologi, persiapannya antara lain mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh bayi, memeriksa kesehatan umum dan tanda vital setiap tiga jam, memberikan ASI atau susu formula 40 cc setiap tiga jam, menjaga bayi tetap hangat, memberikan injeksi sesuai petunjuk (ampisilin 100 mg/12 jam/Intra Vaskuler dan injeksi gentamisin

10 mg/24 jam/Intra Vaskuler), memberikan injeksi dextrosa 10%, bekerja sama dengan dokter anak untuk menyelesaikan fototerapi, (fototerapi ringan diberikan selama 24 jam dan istirahat 2 jam)

Ketika bayi mengalami hiperbilirubin patologi, pengobatan yang direkomendasikan adalah pengamatan kondisi keseluruhan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengawasi kondisi bayi agar tidak memburuk hingga mengakibatkan kern ikterus, memenuhi kebutuhan nutrisi bayi karena enggan minum, melindungi bayi dari dehidrasi ringan, bekerja sama dengan dokter anak, memantau feses dan buang air kecil, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Menurut Suriadi dan Yuliani, perencanaan asuhan yang diberikan kepada bayi dengan hiperbilirubin meliputi pemberian antibiotik jika hiperbilirubin disebabkan oleh infeksi, pemberian ASI atau susu formula, fototerapi dimana tindakan ini dapat menurunkan kadar bilirubin, dan transfusi untuk pengobatan. disebabkan oleh eritrosit yang sensitif terhadap antibodi. Orang tua diminta untuk bersabar dengan banyak berdzikir dan berdoa untuk anaknya. Sehingga tidak ada masalah antara praktek lapangan dan teori saat ini.

6. Langkah VI (Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan)

Pada langkah ini, rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota kesehatan yang lain.

Pada kasus bayi "R" dengan kasus hiperbilirubin patologi, penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 01 Juli 2022 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menjaga kehangatan, melakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter, ampicilin 100 mg/12 jam/IV dan injeksi gentamicin 10 mg/24 jam/IV, memberikan infus dextrosa 10%, dan melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan rawat inkubator. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 02 Juli 2022 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberi intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan bayi untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan tanggal 05 Juli 2022 adalah cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi, mengobservasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, memberikan intake ASI atau susu formula 40 cc tiap 3 jam, menimbang berat badan untuk memantau pertumbuhan bayi, menjaga kehangatan bayi, dan tetap melakukan tindakan fototerapi. Penatalaksanaan yang dilakukan pada tanggal 08 Juli 2022 yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, mendampingi visite dokter spesialis anak dan bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberitahu keluarga

bayi bahwa bayi sudah dianjurkan untuk pulang, memberikan HE pada orang tua bayi.

Meskipun bidan tidak melakukannya sendiri tetapi bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan mutu dan asuhan pada bayi dengan hiperbilirubin patologi. Pada tahap ini penulis tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga pasien dan dukungan dari petugas kesehatan di ruangan perinatologi Syekh Yusuf Gowa.

Pelaksanaan yang dilakukan pada bayi dengan hiperbilirubin patologi adalah fototerapi, transfusi tukar dan pemberian ASI secara optimal. Fototerapi adalah sinar yang diberikan pada bayi untuk mengubah bilirubin menjadi bentuk yang larut dalam air untuk disekresikan melalui empedu atau urin sedangkan transfusi tukar dilakukan apabila fototerapi tidak dapat mengendalikan kadar bilirubin. Transfusi tukar merupakan cara yang dilakukan dengan tujuan mencegah peningkatan kadar bilirubin dalam darah, pemberian transfusi tukar apabila kadar bilirubin 20 mg/dl, kenaikan kadar bilirubin yang cepat yaitu 0,3-1 mg/jam, anemia berat dengan gejala gagal jantung. Pemberian ASI secara optimal perlu diingat bahwa bilirubin dapat dipecah apabila bayi mengeluarkan feses dan urin. Sehingga pemberian ASI harus diberikan karena ASI sangat efektif dalam memperlancar BAB dan BAK. Namun demikian, pemberiannya harus tetap dalam pengawasan dokter.

Diharapkan penatalaksanaan yang baik dari tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya hiperbilirubin dengan pengawasan antenatal yang baik serta pertolongan persalinan yang aman dan berpedoman pada asuhan sayang ibu sehingga mampu menurunkan angka kejadian hiperbilirubin pada bayi baru lahir, karena jika tidak ditanggulangi dengan baik maka bayi hiperbilirubin akan meninggal dan dampak yang terjadi apabila mengalami hiperbilirubin dapat mengalami keterbelakangan mental. Menganjurkan orang tua untuk terus berikhtiar dan sabar dalam mendampingi bayinya. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata.

7. Langkah VII (Evaluasi)

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan yaitu pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan identifikasi dalam masalah dan diagnosis.

Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi "R" dengan hiperbilirubin patologi yang dilakukan selama 5 kali kunjungan. Kunjungan pertama tanggal 01 Juli 2022, berdasarkan masalah yang dialami pasien akan ditangani dengan pemenuhan kebutuhan nutrisi yaitu pemberian nutrisi ASI dan susu formula menggunakan sonde sebagai perangsang refleks hisap dan menelan pada bayi serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi dan pemberian obat-obatan. Kemudian evaluasi pada kunjungan kedua tanggal 02 Juli 2022 KU bayi lemah, refleks hisap dan menelan

bayi lemah, kebutuhan nutrisi bayi sudah terpenuhi dan tindakan fototerapi masih dilakukan untuk menurunkan kadar bilirubin. Pada kunjungan ketiga tanggal 05 Juli 2022 keadaan bayi sudah mengalami kemajuan dan mulai membaik ditandai dengan sklera dan kulit bayi sudah mulai tidak menguning dan kadar bilirubin bayi sudah menurun. Kunjungan keempat tanggal 08 Juli 2022 bayi sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.300 gram, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning dan kadar bilirubin sudah normal yaitu 4 mg/dL, bilirubin indirect sudah tidak ditemukan, pasien sudah diperbolehkan untuk pulang. Kunjungan kelima dilakukan di rumah ibu pasien pada tanggal 13 Juli 2022 keadaan bayi sudah baik, refleks hisap dan menelan kuat, kebutuhan nutrisi terpenuhi ditandai dengan berat badan bayi naik menjadi 2.540 gram, sklera dan kulit sudah tidak kuning. Sehingga pada tahap ini tidak terjadi kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang sesuai dengan masalah dan diagnosis klien, juga benar dalam pelaksanaannya. Dengan harapan, hasil evaluasi proses sama dengan hasil evaluasi secara keseluruhan. Pada teori bayi dengan hiperbilirubin keadaan yang ingin dicapai adalah KU bayi baik, kenaikan berat badan bayi, warna kuning pada kulit bayi sudah tidak terlihat, kebutuhan cairan terpenuhi, refleks hisap baik.

Pada keadaan normal kadar bilirubin indirek pada tali pusat bayi baru lahir yaitu 1-3 mg/dL dan terjadi peningkatan kurang dari 5 mg/dL per 24 jam.

Bayi baru lahir biasanya akan tampak kuning pada hari kedua dan ketiga dan memuncak dihari keempat dengan kadar 5-6 mg/dL dan akan turun pada hari ketiga sampai hari kelima. Pada hari kelima sampai hari ketujuh akan terjadi penurunan kadar bilirubin sampai dengan kurang dari 2 mg/dL. Pada kondisi ini bayi baru lahir dikatakan mengalami hiperbilirubin fisiologis.

Gejala pada bayi baru lahir dengan hiperbilirubin patologi muncul dalam 24 jam pertama setelah dilahirkan. Hiperbilirubin patologi menyebabkan peningkatan harian kadar bilirubin total darah lebih dari 5 mg/dL. Dibandingkan dengan bayi cukup bulan, yang kadar bilirubinnya naik 12 mg/dL, kadar bilirubin total darah bayi prematur naik menjadi 15 mg/dL. Hiperbilirubin biasanya berlangsung lebih dari dua minggu pada bayi prematur dan kira-kira satu minggu pada bayi cukup bulan.

Orang tua bayi diminta untuk tetap berdoa untuk kesehatan bayinya. Pada tahap ini tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus nyata.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah penulis temukan dalam studi kasus dan pembahasan pada asuhan kebidan bayi “R” dengan hiperbilirubin patologi di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis menarik kesimpulan dan saran yang mungkin dapat berguna untuk peningkatan pelayanan asuhan kebidanan khususnya pada bayi dengan hiperbilirubin.

A. KESIMPULAN

1. Dalam melakukan pengumpulan data dasar pada bayi “R” dengan hiperbilirubin patologi dilaksanakan dengan mengumpulkan data subjektif yang diperoleh dari hasil wawancara dimana ibu pasien mengatakan kulit bayinya kuning dan malas minum susu, data objektif diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti kulit bayi dan sklera bayi tampak kuning, refleks hisap dan menelan bayi lemah serta data penunjang yang diperoleh dari pemeriksaan LAB yaitu bilirubin total 11,77 mg/dL.
2. Identifikasi diagnosa atau masalah aktual dilakukan dengan pengumpulan data secara teliti dan akurat, sehingga didapatkan diagnosa kebidanan pada bayi “R”, BCB, KMK, BBLR dengan hiperbilirubin patologi yang disertai dengan masalah kekurangan cairan, kebutuhan mersangsang refleks hisap dengan cara pemberian nutrisi dengan menggunakan sendok.
3. Diagnosa potensial pada kasus ini tidak muncul karena penanganan yang cepat

dan tepat.

4. Perlunya tindakan segera dan kolaborasi, dalam langkah ini dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi sinar diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam) dan memenuhi kebutuhan cairan yaitu 40 cc per 3 jam.
5. Merencanakan asuhan yang menyeluruh, pada kasus ini rencana asuhan yang dilakukan cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi, observasi KU bayi dan tanda-tanda vital tiap 3 jam, berikan intake ASI atau susu formula tiap 3 jam, jaga kehangatan bayi, lakukan pemberian injeksi atas instruksi dokter ampicilin 135 mg/12 jam/IV dan gentamicin 13 mg/24 jam/IV, memberikan infus dextrosa 10%, melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis anak untuk melakukan tindakan fototerapi 2x24 jam (fototerapi diberi selama 24 jam dan istirahat 2 jam).
6. Melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pada bayi "R" merupakan pelaksanaan dari rencana tindakan.
7. Evaluasi, setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 5 kali kunjungan pada kasus bayi "R" dengan hiperbilirubin patologi didapat hasil KU bayi baik, refleks menghisap dan menelan kuat, sklera dan kulit bayi sudah tidak kuning, kebutuhan nutrisi tercukupi, berat badan bayi naik menjadi 2.540 gram, dan kadar bilirubin menurun.
8. Penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus nyata di lapangan.

B. SARAN

Berdasarkan tinjauan kasus dan pembahasan kasus, penulis memberikan sedikit masukan atau saran yang diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi rumah sakit

Diharapkan lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan asuhan pada bayi agar dapat proses penyembuhan khususnya pada bayi dengan hiperbilirubin patologi dan mencegah terjadinya komplikasi.

2. Bagi institusi

Diharapkan agar institusi pendidikan dapat lebih meningkatkan dan menambah referensi sehingga dapat membantu penulis atau mahasiswa yang akan mengamil kasus yang sama.

3. Bagi profesi

Meningkatkan mutu penanganan dan pelayanan bagi bayi dengan hiperbilirubin patologi secara cepat, tepat dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Atika, M. V. dan Jaya, p. 2015. *Buku Ajar Kebidanan Pada Neonatus, Bayi, dan Balita*. Jakarta: CV. Trans Info Media.
- Data Rekam Medik. 2022. *Bayi Baru Lahir Dengan Hiperbilirubin*. RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. 2020. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Fadliyanur. 2018. Tafsir Dan Hadits Tenatik Tentang Kesehatan. Alfalah, Vol XVIII. Nomor 1.Hal 137.
- Fauziah, A, dan Sudatri. 2013. *Asuhan Neonatus Resiko Tinggi dan Kegawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Heryanti, An'nisa, Dkk. 2020. Efektifitas terapi *Caring Support Neobil* Terhadap Perubahan Kadar Bilirubin Serum Total Hiperbilirubin Pada Neonatus.Volume 12, Nomor 1.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2013. Indiksi Terapi Sinar Pada Bayi Menyusu Yang Kuning.Public Article.
- Jalaluddin Syatirah. 2018. *Buku Transmisi Vertikal Virus Hepatitis B*. Alauddin University Pres.
- Kemenkes RI. 2020. *Profil Kesehatan Indonesia*.
- Khusna, N. 2013. Faktor Resiko Neonatus Bergolongan Darah A atau B Dari Ibu Bergolongan Darah O Terhadap Kejadian Hiperbilirubin. Jurnal Kedokteran Di Ponegoro.
- Marmi,Rahardjo. 2016. *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Maryunani Anik. 2013. *Asuhan Bayi Dengn Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Matindas Stefry, Dkk. 2017. Hiperbilirubin Pada Neonatus. Jurnal Biomedik, volume 5, Nomor 1, hlm. 4-10.
- Mendri, N. K. dan Prayogi, A.S. 2017. *Asuhan Keperawatan Pada Anak Sakit dan Bayi Resiko Tinggi*. Pustaka Baru Press: Yogyakarta.

- Nelson, W. E. Dkk. 2011. *Ilmu Kesehatan Anak*. Edisi 15 Vol. 1. Jakarta: EGC.
- Ngatisya. 2012. *Perawatan Anak Sakit* Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Pratiwi Novi. 2020. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperilirubin Pada Bayi Baru Lahir Di Perinatologi RS Aulia Jagakarsa Jakarta. Perpustakaan Universitas Esa Unggul. Jakarta.
- Prawirahardjo. 2014. *Ilmu Kebidanan*. PT Bina Pustaka Sarwono. Prawirahardjo: Jakarta
- Ridha, H. N. 2014. *Buku Ajar Keperawatan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukiyah, Lia Julianti, Dkk. 2012. *Asuhan Neonatus Bayi Dan Anak Balita*. CV. Trans Info Media: Jakarta Timur.
- Shaleha Sitti. 2012. *Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi Dan Balita*. Alauddin University Pres.
- Sampurna A.T.M. 2020. Modul Tata Laksana Hiperbilirubin. Airlangga University Press.
- Setiyani Astuti, Sukei, Dkk. 2016. *Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah*. Jakarta Selatan.
- Setiyawati Dewi. 2013. *Buku Saku Dasar-Dasar Obstetri*. Alauddin University Pres.
- Simanulang Poniya, dkk. 2021. Pengetahuan dan Sikap Ibu Tentang Hiperbilirubin Pada Bayi yang Menjalani Blue Light Therapy. *Jurnal Darma Agung Husada*. Volume 8, Nomor 1, Hal 31.
- Shihab M. Quraish. 2012. *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati: Jakarta.
- Sukadi A. 2012. *Hiperbilirubinemia*. Dalam: Kosim MS, Yunanto A, Dewi R, Sarosa GI, Usman A, Penyunting. *Buku Ajar Neonatologi*. Edisi 1. Jakarta: IDAI.
- Suriadi dan Yuliani, R. 2018. *Asuhan Keperawatan Pada Anak* Edisi 2. CV Agung Seto: Jakarta.
- Susilowati L. 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Hiperbilirubin Pada Neonatus Di RSB Permata Hati. *Jurnal Resik*. Volume 9, Nomor 1, Hal 15.
- Unicef. 2020. *Unicef-Who: Angka Kematian Bayi*.
- Yulianti Nila Trisna, dan Ningsi Sam Karmilan Lestari. 2019. *Asuhan Kebidanan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. Cendekia Publisher: Makassar.

LAMPIRAN

Kunjungan I



(02 Juli 2022)

Kunjungan II



(05 Juli 2022)

Kunjungan III



(08 Juli 2022)

Kunjungan IV



(13 Juli 2022)



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE UNIVERSIT
 AS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.071/KEPK/FKIK/VII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:

The research protocol proposed by

Peneliti utama

FITRIANI

Principal In Investigator

Nama Institusi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Name of the Institution

Dengan judul

Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARD LAHIR DENGAN
 HIPERBILIRUBIN DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA TAHUN 2022"**

**"MANAGEMENT OF MIDWIFERY CARE FOR NEWBORNS WITH
 HYPERBILIRUBINEMIA AT SYEKH YUSUF GOWA HOSPITAL IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

This declaration of ethics applies during the period July 1, 2022 until July 1, 2023

18, 2022
 Dr. Syakirah, Sp.A., M.Kes
 Dr. Syakirah, Sp.A., M.Kes

Keterangan Layak Etik
 18 Juli 2022

ALAUDDIN
 MAKASSAR



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **4233/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Gowa
Perihal : **izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2478/Un.06-FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FITRIANI**
Nomor Pokok : **70400119013**
Program Studi : **Kebidanan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (D3)**
Alamat : **Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang pblong-Gowa**
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR DENGAN HIPERBILIRUBIN DI
RSUD SYEKH YUSUF GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **28 Juni s/d 28 Juli 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Juni 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.

Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
(28 Juni 2022)



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Sungguminasa, Telepon 0411 – 866536, Fax.0411 -840892
 Website : rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id, email : raugowa_sykhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92111

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : 023/Diklat. RSUD-SY/ VII /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Menerangkan bahwa :

N a m a : Fitriani
N i m : 70400119013
Institusi : UIN Alauddin Makassar

Telah melaksanakan Penelitian di Ruang Perinatologi Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan Judul * *Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Dengan Hiperbilirubin di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa* “ pada Tanggal 01 Juli 2022 S/D 13 Juli 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 18 Juli 2022

An. Ketua Diklat
 Koordinator Bagian Penelitian

Hj. Eliati Patunngi, S. Kep. Ns. M. Kep
 NIP. 19690407 199103 2 008

M A K A S S A R

Surat Keterangan Penelitian Di RSUD Syekh Yusuf Gowa
 (18 Juli 2022)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Fitriani
 Nim : 70400119013
 T.T.L : Kupang, 13 Maret 1999
 Suku : Bugis - Makassar
 Agama : Islam
 Alamat : Selayar
 Nama Orang Tua :
 a. Ayah : Muh. Akbar
 b. Ibu : Marasia

B. Riwayat Pendidikan

SD. Inpres Kembangmiati : 2006-2012
 SMP Negeri 2 Benteng Selayar : 2012-2015
 SMA Negeri 1 Taka Bonerate : 2015-2018
 UIN Alauddin Makassar : 2019-2022