

**UJI AKTIVITAS PEREDAMAN RADIKAL BEBAS DPPH (*1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil*) DAN POTENSI TABIR SURYA EKSTRAK  
ETIL ASETAT RIMPANG LEMPUYANG GAJAH  
(*ZINGIBER ZERUMBET* (L). SMITH)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih**

**Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi**

**Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan**

**UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**HARIRATUL JANNAH**

**NIM : 70100116021**

**JURUSAN FARMASI**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hariratul Jannah  
NIM : 70100116021  
Tempat/tgl. Lahir : Bulukumba, 12 Juni 1998  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Perumahan Aeropala Residence  
Judul : Uji Aktivitas Peredaman Radikal Bebas DPPH  
(*1,1-Difenil-2-Pikrilhidrazil*) Dan Potensi Tabir  
Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang  
Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Smith)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Romangpolong, November 2022  
Peneliti,

**HARIRATUL JANNAH**  
**NIM: 70100116021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Peredaman Radikal Bebas DPPH (1,1,-diphenyl-2-picrylhidrazyl) dan Potensi Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumber* (L) Smith.)” yang disusun oleh Hariratul Jannah, NIM: 70100116021, Mahasiswa jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 09 November 2022 yang bertepatan dengan tanggal 14 Robi’ul Akhir 1444 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

**Samata, 09 November 2022**

**14 Robi’ul Akhir 1444 H**

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.  
Sekretaris : apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.  
Pembimbing I : apt. Mukhriani, S.Si., M.Si.  
Pembimbing II : Haeria, S.Si., M.Si.  
Penguji I : Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.  
Penguji II : Dra. Audah Mannan, M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. Syatirah Sp. A., M.Kes.

NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih atas segala limpah kasih, karunia dan kehendak-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Ttabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingibert Zerumbert* (L). Smith)”, dapat diselesaikan dengan baik. terselesaikannya tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan, do'a dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan penelitian ini, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. H. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M. Ag. selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M. Ag. selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M. Ag. selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M. Kes., Sp. A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S. Si., M. Si. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S. KM., MARS. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Apt. Syamsuri Syakri, S. Farm., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Apt. Mukhriani, S.Si., M. Si. selaku Pembimbing Pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
13. Ibu Haeria, S. Si., M. Si. Selaku Pembimbing Kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberi masukan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
14. Ibu Dra. Audah Mannan, M. Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M. Si. selaku Penguji kompetensi yang telah banyak memberikan tuntunan dan arahan yang baik dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Ibu Apt. Nur Azizah Syahrana, S. Farm., M. Farm.F selaku Pelaksana Ujian Akhir yang telah sangat berkontribusi dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
17. Bapak dan Ibu dosen yang tulus dan ikhlas dalam membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada peneliti.
18. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2016, Digoxin yang tak henti-hentinya memberi semangat serta mendukung sehingga dapat terselesaikannya penelitian dan skripsi ini.

Peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terkhusus pada bidang farmasi. Walaupun telah berusaha semaksimal

mungkin, tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan kritik dan sarannya untuk membangun kesempurnaan penelitian ini.

Romangpolong, November 2022

Penyusun



**Hariratul Jannah**

NIM : 70100116021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup.....	5
F. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	9
A. Uraian Tanaman .....	9
B. Anatomi Fisiologi Kulit .....	11
C. Sinar Ultraviolet .....	21
D. Tabir surya .....	22
E. Metode Ekstraksi.....	25
F. Spektrofotometer UV-Vis .....	27
G. Tinjauan Islam.....	32

BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Waktu Penelitian .....	39
D. Populasi dan Sampel .....	39
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen .....	42
H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN .....	61
RIWAYAT HIDUP.....	103

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keefektifan Sediaan Tabir Surya Berdasarkan Nilai SPF .....	17
Tabel 2. Tipe Kulit Berdasarkan Respon Kulit Terhadap Paparan Sinar.....	21
Tabel 3. Penggolongan Potensi Tabir Surya .....	23
Tabel 4. Spektrum Cahaya Tampak dan Warna-Warna Komplementer .....	29
Tabel 4.1 Skrining Fitokimia Kimia .....	46
Tabel 4.2 Hasil Pengukuran Nilai $IC_{50}$ .....	47
Tabel 4.3 Pengukuran Nilai $IC_{50}$ Aktivitas Vitamin C.....	47
Tabel 4.4 % Nilai Transmisi Eritema (%Te).....	48
Tabel 4.5 % Transmisi Pigmentasi (%Tp) .....	48
Tabel 4.6 Nilai Sun Protection Factor (SPF).....	49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lempuyang Gajah .....	9
Gambar 2. Struktur Kulit.....	11



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel .....	61
Lampiran 2. Uji Aktivitas Antioksidan .....	62
Lampiran 3. Identifikasi Senyawa Kimia .....	63
Lampiran 4. Skema Analisis Data .....	64
Lampiran 5. Pembuatan Larutan .....	65
Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi .....	68
Lampiran 7. Perhitungan IC <sub>50</sub> .....	69
Lampiran 8. Hasil Pengukuran SPF .....	71
Lampiran 9. Persen Transmisi Eritema Dan Pigmentasi .....	90
Lampiran 10. Pembuatan Larutan .....	98
Lampiran 11. Gambar Penelitian .....	100
Lampiran 12. Proses Pengerjaan .....	102

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## ABSTRAK

Nama : HARIRATUL JANNAH  
NIM : 70100116021  
Jurusan : FARMASI  
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Peredaman Radikal Bebas DPPH ( *1,1- Diphenyl-2-Picrylhydrazil* ) Dan Potensi Tabir Surya Ekstrak Etil Asetat Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L). Smith)

---

Tabir surya adalah suatu zat atau bahan yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada penentuan nilai *Sun Protection Factor* (SPF), persentase eritema dan pigmentasinya, yang menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UV. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah. Dengan menggunakan metode spektrofotometer UV-Vis untuk penentuan nilai  $IC_{50}$  dan nilai potensi tabir surya. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai  $IC_{50}$  sebesar 98,109 ppm dan vitamin C sebesar 7,79 ppm. Dan untuk hasil nilai %transmisi eritema dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm yang didasarkan pada nilai %Transmisi eritema berturut-turut sebesar 10,904%, 9,121%, 6,568% yang termasuk kategori *Regular suntan* yang berada pada range (6-12%), Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi pada konsentrasi 150 ppm dan 300 ppm sebesar 58,921%, 50,557% yang termasuk kategori *Ekstra protection* yang berada pada range (42-86%), untuk konsentrasi 450 ppm sebesar 40,720% yang termasuk kategori *Total block* yang berada pada range (3-40) dan untuk Nilai SPF Ekstrak Rimpang lempuyang gajah memiliki nilai rata-rata dari konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm sebesar 2,588, 2,967, dan 3,630 termasuk dalam kategori proteksi minimal.

**Kata Kunci :** *Tabir surya, Antioksidan, DPPH, spektrofotometer UV-Vis, Zingiber zerumbet (L).*

## ABSTRACT

Name : HARIRATUL JANNAH  
NIM : 70100116021  
Department : PHARMACY  
Title : Test Of DPPH Free Radical Reduction Activity (*1,1- Diphenyl-2-Picryhydrazil*) And Potential Syncreen Ethyl Acetate Extract Of Elephant Lempuyang (*Zingiber Zerumbet* (L). Smith)

---

Sunscreen is a substance or material that can protect the skin against ultraviolet radiation. The effectiveness of sunscreen preparations is based on the determination of the value of the Sun Protection Factor (SPF), the percentage of erythema and pigmentation, which indicate the ability of sunscreen products to protect the skin from UV exposure. This study was conducted with the aim of knowing the potential of sunscreen from the ethyl acetate extract of the lempuyang elephant rhizome. Using the UV-Vis spectrophotometer method to determine the IC<sub>50</sub> value and the potential value of sunscreen. Based on the results obtained, it shows that the IC<sub>50</sub> value is 98.109 ppm and vitamin C is 7.79 ppm. And for the results of the % transmission of erythema it can be stated that the concentrations of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm are based on the value of % transmission of erythema, respectively. 10.904%, 9.121%, 6.568% which are included in the *Regular suntan* category which is in the range (6-12%), while for the % Transmission of pigmentation at a concentration of 150 ppm and 300 ppm it is 58.921%, 50.557% which is included in the Extra protection category which is in the category of *Extra protection* in the range (42,86%), for a concentration of 450 ppm at 40.720% which is included in the *Total block* category which is in the range (3-40). and for the SPF value of the elephant lempuyang rhizome extract has an average value of a concentration of 150 ppm, 300 ppm, and 450 ppm of 2,588, 2,967, and 3,630 included in the minimal protection category.

**Keywords:** Sunscreen, *antioxidant*, DPPH, *Spectrophotometer UV-Vis*, *Zingiber zerumbet* (L). *Roscoe ex SM*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Indonesia merupakan salah satu negara tropis yang memperoleh penyinaran matahari yang cukup baik sepanjang tahun dan masyarakatnya identik dengan kulit yang sawo matang. Sinar matahari terbagi 2 yakni ada yang dapat dilihat (*visibel*) dan ada yang tidak dapat dilihat (*in visibel*). Frekuensi gelombang pancaran Sinar matahari yang dapat dilihat oleh mata yaitu lebih dari 400nm, sedangkan frekuensi gelombang pancaran sinar matahari tidak dapat dilihat dengan mata yaitu 10 nm-400 nm atau disebut dengan sinar ultra violet (Isfardiyana & Safitri, 2014).

Sinar ultra violet (UV) mempunyai manfaat yang sangat baik bagi tubuh, salah satunya adalah untuk pembentukan Vitamin D3 atau Kolekalsiferol. Vitamin D3 berfungsi dalam metabolisme pembentukan tulang dan pertahanan sistem imun tubuh. Selain itu, radiasi sinar UV dapat dijadikan terapi dengan waktu yang cukup dan rutin diantaranya penyakit tuberkulosis, vitiligo dan psoriasis. Sisi lainnya, bahwa Radiasi sinar UV yang berlebihan dapat mengakibatkan efek merugikan pada manusia. Menurut (Havas, 2008), Radiasi sinar ultra violet dari matahari dibagi menjadi tiga yakni dengan panjang gelombang 320nm-400 nm disebut sinar ultra violet A (UV A), dengan panjang gelombang 290nm-320 nm disebut sinar ultra violet B (UV B), dan dengan panjang gelombang 200nm-290 nm disebut sinar ultra violet C (UV C) (Pratiwi & Husni, 2017).

Efek buruk dari radiasi sinar UV yang berlebihan diantaranya dapat menyebabkan jaringan epidermis kulit tidak cukup mampu melawan efek negatif seperti merusak sistem imun, katarak, dan kelainan kulit seperti kulit terbakar, eritema, non melanoma, kanker kulit maupun penuaan dini (hiperpigmentasi), sehingga diharuskan untuk perlindungan diri baik secara fisik dengan cara menutupi

tubuh semisal menggunakan topi, payung, atau jaket dan lebih efisien secara kimia dengan menggunakan kosmetika tabir surya baik dari sintetik ataupun bahan alam (Anugerah, Putri et al., 2016).

Tabir surya adalah suatu zat atau bahan yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada penentuan nilai *Sun Protection Factor* (SPF), persentase eritema dan pigmentasinya, yang menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UV (Rusita, Y, Dwi; Indarto, 2017). FDA atau (*Food Drug Administration*) membagi tabir surya dari kemampuannya berpenetrasi diantaranya, Minimal (bila SPF antara 2-4), Sedang (bila SPF antara 4-6), Ekstra (bila SPF antara 6-8), Maksimal (bila SPF antara 8-15), dan Ultra (bila SF lebih dari 15) (Damogalad et al., 2013)

Beberapa golongan senyawa aktif yang digunakan tabir surya yaitu Flavonoid, tanin, antarquinon, sinamat yang telah memiliki kemampuan sebagai perlindungan terhadap sinar UV (Hogade, 2010: 56). Senyawa fenolik khususnya golongan flavonoid dan tanin mempunyai potensi tabir surya karena adanya gugus kromofor (ikatan rangkap terkonjugasi) yang mampu menyerap sinar UV, baik UV A ataupun UV B sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit (Shovyana dkk, 2013).

Saat ini industri farmasi bidang kosmetik terus menerus mengembangkan produknya yang berasal dari bahan alam ini sesuai dengan slogan “back to nature”, dan besarnya respon positif dari masyarakat mengatakan bahwa formulasi dari bahan alam dianggap lebih aman digunakan, kemudian dampak negatifnya yang kurang dibandingkan dengan yang terbuat dari bahan kimia yang dimana pada zat aktif senyawa tabir surya kebanyakan daya absorpsi sinar UV dapat menyebabkan terjadinya iritasi pada kulit maupun alergi (Juanita & Juliadi, 2020).

Salah satu bahan alam yang berpotensi adalah Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L. Smith) yang termasuk dari golongan keluarga Zingiberaceae yang merupakan golongan temu-temuan atau jahe-jahean yang memiliki nilai ekonomi dan potensi pengobatan, tanaman ini tersebar di wilayah Asia Selatan salah satunya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis mengenal tanaman ini dengan nama *Lippujang*. Tanaman ini dapat di budidaya dan hidup secara liar, tumbuh di tempat yang lembab, teduh tanah bahkan diatas sisa batang pohon yang basah. Bagian tanaman yang diambil adalah rimpangnya, Lempuyang gajah dijadikan sebagai bahan bedak tradisional dan sebagai campuran untuk mandi uap. Hasil penelitian Somchit *et al.* (2003) menemukan bahwa lempuyang gajah berkhasiat untuk penyakit demam, nyeri (antipiretik), peradangan (anti inflamasi), asam lambung/ tukak lambung (anti ulcer), pereda nyeri (analgesik), dan antimikroba. Ini dikarenakan rhizoma lempuyang gajah terkandung metabolit sekunder berupa alkaloid, saponin, flavonoid, poliphenol dan esensial oil (Syamsuri & Alang, 2021).

Antioksidan alami dapat berasal dari tumbuh-tumbuhan yang banyak mengandung vitamin C, beta karoten, dan senyawa polifenol seperti flavonoid, fenil propanoid, santon, antrakuinon, lignan (Robby G. M. dkk, 2018). Dimana diketahui semakin kecil nilai  $IC_{50}$  nya maka aktivitas antioksidan senyawa akan semakin tinggi. Antioksidan merupakan suatu zat yang dapat menetralkan radikal bebas sehingga melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit dengan cara mengikat radikal bebas. Kemudian kandungan Antioksidan yang tinggi akan mempengaruhi besar kecilnya nilai SPF yang dimana semakin Besar nilai SPF, semakin besar juga daya *protecion* terhadap radikal bebas. Radikal bebas merupakan molekul sangat reaktif yang dapat merusak sel dan salah satu bentuk dari senyawa oksigen reaktif yang dapat merusak sel dan salah satu bentuk dari senyawa oksigen reaktif yang



memiliki elektron tidak berpasangan (Winarsi,2007). Radikal bebas dengan jumlah yang berlebih akan merusak *collagen skin*, sehingga kulit akan kehilangan elastisitasnya dan akan menyebabkan terjadinya keriput.

Berdasarkan uraian tersebut, rimpang lempuyang gajah berpotensi sebagai tabir surya. Namun belum ada penelitian ilmiah yang menguji potensi tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensinya sebagai tabir surya, kemudian menghitung nilai SPF (*Sun Protecting Factor*) serta % transmisi pigmentasi dan % transmisi eritema.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Smith.*) berdasarkan nilai *Sun Protection Factor* (SPF), % Transmisi Eritema, dan % Transmisi pigmentasi?
2. Apa kategori tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L) Smith*)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui potensi tabir surya dari ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah, mengetahui nilai *Sun Protection Factor* (SPF),% Transmisi Eritema dan % Transmisi Pigmentasi ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah.
2. Mengetahui kategori tabir surya dari ekstrak etanol rimpang lempuyang gajah.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Diketahui hasil ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah yang berpotensi sebagai tabir surya
2. Diperoleh data ilmiah nilai *Sun Protecting Factor* (SPF), nilai persen transmisi eritema dan nilai persen pigmentasi pada ekstrak etil asetat

rimpang lempuyang gajah sebagai potensi tabir surya dan sebagai pengembangan referensi ilmu farmasi.

3. Diperoleh kategori tabir surya ekstrak etil asetat rimpang lempuyang gajah

### **E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup**

#### **1. Definisi Operasional**

- a. Potensi tabir surya merupakan ukuran atau kemampuan suatu sediaan yang dapat menyerap, menghaburkan, ataupun memantulkan sinar UV yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar matahari.
- b. Tabir surya adalah salah satu produk perawatan kulit yang memiliki fungsi sebagai penghalang pengaruh sinar matahari yang dapat merusak kulit.
- c. Eritema adalah penyakit kulit akut yang ditandai dengan adanya reaksi hipersensivitas serta infeksi yang terjadi pada kulit.
- d. SPF atau sering dikenal sebagai *Sun Protection Factor* yang merupakan suatu zat yang terkandung dalam produk perawatan kulit yang dapat melindungi kulit dari sinar matahari langsung.
- e. Presentasi transmisi eritema atau pigmentasi merupakan perbandingan jumlah energi yang terdapat pada sinar UV.
- f. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan hasil ekstraksi dari simplisia nabati ataupun hewani dengan menggunakan pelarut yang sesuai.
- g. Lempuyang gajah adalah sejenis rempah-rempah yang dapat dijadikan sebagai obat serta dapat dijadikan jamu.

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini dengan melakukan uji aktivitas ekstrak rimpang lempuyang gajah sebagai potensi tabir surya, lalu menetapkan nilai SPF, nilai eritema, pigmentasi nya berdasarkan data analisis yang diperoleh.

## **F. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan Musyirna Rahmah Nasution, Afrida Yeti, bella Ardhyati pada Tahun 2021 dengan judul “Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Etanol Daun Tenggek Burung (*Euodia Redlevi*) Secara In Vitro”. Pengujian aktivitas tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai persentase Transmisi eritema (%Te), Transmisi pigmentasi (%Tp), dan Sun Protection Factor (SPF) menggunakan microplate reader. Berdasarkan hasil pengujian ekstrak etanol daun tenggek burung (*Euodia redlevi*) menunjukkan aktivitas tabir surya yang baik pada konsentrasi 250 ppm dengan nilai %Te sebesar 0,4252% (Sunblock), nilai %Tp sebesar 0,3150% (Sunblock) dan nilai Sun Protection Factor (SPF) 21,624 (proteksi ultra).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Emma Susanti dan Susi Lestari Tahun 2019 dengan judul “Uji Aktivitas Tabir Surya Ekstrak Etanol Tumbuhan Sembung Rambat (*Mikania Micrantha Kunth*) Secara In Vitro“. Metoda uji aktivitas tabir surya dilakukan secara in vitro menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Uji aktivitas tabir surya dilakukan dengan menghitung nilai persen transmisi eritema (% Te) dan nilai persen transmisi pigmentasi (% Tp), serta nilai SPF. Hasil perhitungan nilai persen transmisi eritema (%Te) serta kategori tabir suryapada konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm berturut-turut adalah 11,3024 % (suntan standar); 3,5238 % (proteksi ekstra); 1,3865 % (proteksi ekstra) dan 0,3838 % (sunblock). Hasil perhitungan nilai persen transmisi pigmentasi (% Tp) serta kategori tabir surya pada konsentrasi 100, 150, 200 dan 250 ppm berturut-turut adalah 11,0254; 3,7011; 1,7447 dan 0,5462 % semuanya dengan kategori sunblock. Nilai SPF pada konsentrasi 250 ppm adalah 42,8810 dengan kategori

perlindungan tinggi. Konsentrasi yang berpotensi dikembangkan menjadi sediaan tabir surya alami yaitu pada konsentrasi 250 ppm

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haeria, Surya Ningsi dan Israyani dengan judul “Penentuan Potensi Ekstrak Tabir Surya Klika Anak Dara (*Croton oblongus* Burm F.)” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Nilai SPF, persen transmisi eritema (% Te), dan persen transmisi pigmentasi (% Tp) dari ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) dengan metode spektrofotometer UV-Vis. Penentuan nilai SPF tabir surya ditentukan berdasarkan perhitungan %Te dan %Tp. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa SPF nilai ekstrak dengan konsentrasi 300 ppm sebesar 2.991, sedangkan Nilai %Transmisi eritema sebesar 22, 655%, dan nilai %Transmisi pigmentasi sebesar 26,837%. Nilai SPF dapat ditentukan ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) pada konsentrasi 300 ppm memiliki tingkat perlindungan minimal dan tabir surya untuk hasil nilai %Te dan %Tp ekstrak klika anak dara (*Croton oblongus* Burm f.) dikatakan tidak mampu menahan kulit untuk mencegah kemerahan/eritema, tetapi dapat menahan pigmentasi atau penggelapan kulit.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dita F. Alhabsyi<sup>1</sup>, Edi Suryanto<sup>2</sup> dan Defny S. Wewengkang dengan judul “Aktivitas Antioksidan Dan Tabir Surya Pada Ekstrak Kulit Buah Pisang Goroho(*Musa acuminata* L.)” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai aktivitas antioksidan dan nilai tabir surya pada ekstrak kulit buah pisang goroho (*Musa acuminata* L.). Metoda uji aktivitas tabir surya dilakukan secara in vitro menggunakan spektrofotometri UV-VIS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah pisang goroho mengandung senyawa fenolik, flavonoid dan tanin. Ekstrak etanol memiliki nilai aktivitas antioksidan yang paling

tinggi yaitu 75,71%, diikuti ekstrak metanol 74,29% dan ekstrak etil asetat 73,37%. Hasil perhitungan nilai SPF yang paling tinggi juga terdapat pada ekstrak etanol dan diikuti oleh metanol dan etil asetat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB II TINJAUAN TEORETIS

### A. Uraian Tanaman



Gambar 1. Lempuyang Gajah (BPOM, 2010)

#### 1. Klasifikasi Tanaman (Tjitrosoepomo, 2013).

Divisi	:	Spermatophyta
Sub division	:	Angiospermae
Class	:	Monocotyledonae
Ordo	:	Zingiberales
Famili	:	Zingiberaceae
Genus	:	Zingiber
Spesies	:	<i>Zingiber zerumbet</i>

#### 2. Nama Daerah

Lippujang (bulukumba), Lippujang (Luwu), kampuja (Bima), Lippujang (Soppeng), Lempuyang kapur (Jawa), lampojaang peak (Madura), Lempuyang pahit (Sunda), Lempuyang emprit (Jawa Tengah).

#### 3. Morfologi tumbuhan

Rimpangnya memiliki rasa pahit dengan bau aromatik khas. Rimpang berbentuk kepingan pipih, ringan, bentuk tidak beraturan, tebal sampai 5 mm dengan permukaan luar tidak rata, berkerut dan berwarna kuning pucat kecoklatan. Bidang irisannya berwarna lebih muda dari permukaan luar dengan korteks sempit (lebar  $\pm$  2 mm). Bekas patahannya tidak rata dan berserat.

Bagian luarnya berwarna coklat kekuningan sampai kuning pucat dan beraluralur memanjang serta memberikan bekas patahan tidak rata dan berserat (Dep Kes RI, 1978).

#### 4. Kandungan kimia

Tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L) Smith) terutama pada bagian rimpangnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, polifenol dan minyak atsiri (Rejeki & Priyandari, 2017).

Rimpang *Zingiber zerumbet* mengandung senyawa yang beragam. Penentuan kromatogram ekstrak etanol *Zingiber zerumbet* dengan KLT menyebutkan bahwa mengandung senyawa terpen, minyak atsiri yaitu *zerumbone*, flavonoid, saponin dan polifenol dalam rimpang *Zingiber zerumbet* (Octaviani, 2007; Andasari, 2011; Puspitasari, 2011; Rengginasti, 2008).

Rimpang lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* mengandung kurkumin, suatu zat warna kuning, 3",4"-diasetilafzelin yang mempunyai efek sitotoksik (Sudarsono, 2002), *p*-hydroxybenzaldehyde, vanillin, turunan kaemferol (Jang *et al.*, 2004), 6- methoxy-2E, 9E-humuladien-8-one dan stigmast-4-en-3-one (Jang *et al.*, 2005). Minyak atsiri rimpang terdiri dari sineol, dipenten, limonene, kariofilen, akurkumen,  $\gamma$ -kadimen, kariofileknosid, humulen epoksid, I dan II;heksahidrohumulenol II, heksa-hidro humulenon, zerumbonoksid; kamfen (16%), humulen (17%); *zerumbone* (36%) (Sudarsono, 2002) (Suhirman et al., 2006).

#### 5. Khasiat tanaman


*Zingiber zerumbet* sebagai bahan obat berhubungan dengan kandungan metabolit sekundernya. Sebagai bahan obat *rhizoma* dari *Zingiber zerumbet* digunakan sebagai antipiretik, anti inflamasi, anti ulcer, analgesik dan anti mikroba (Somchit et al. 2003). *Rhizoma Zingiber zerumbet*. *Zingiber zerumbet* dimanfaatkan sebagai obat diare, disentri, gangguan lambung, dan mengurangi rasa sakit (Silalahi, 2018).

Rimpang dari tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) memiliki khasiat sebagai stomakik, karminativa dan stimulan. Rimpang lempuyang gajah juga bermanfaat sebagai tonikum, obat luar, anti kejang dan penambah nafsu makan (Rejeki & Priyandari, 2017).

Lempuyang gajah mengandung senyawa kurkuminoid yang mempunyai banyak manfaat seperti anti kanker. Kurkumin sebagai salah satu senyawa pendukung kurkuminoid telah banyak dimanfaatkan (Suhirman et al., 2006).

Zerumbone yang merupakan senyawa sesquiterpenoid monosiklik yang memiliki aktivitas antikanker yang menjanjikan. Senyawa ini dapat ditemukan banyak pada rimpang terutama dari tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dan lempuyang wangi (*Zingiber aromaticum* Val.). Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sesquiterpenoid zerumbone mempunyai aktivitas antiinflamasi, analgetik, antitumor, pengobatan luka memar dari pukulan, sebagai ramuan untuk sakit perut, sebagai obat bius sakit gigi, untuk panu dan kurap, isi cairan bening dari bunga digunakan sebagai bahan dasar sampo, untuk menambah nafsu makan, menyembuhkan penyakit kuning dan empedu (Lallo et al., 2018)

### **B. Anatomi Fisiologi Kulit**



**Gambar 2. Struktur kulit (Mescher Al, 2013)**



## 1. Definisi Kulit

Kulit adalah jaringan atau lapisan yang menyelimuti seluruh bagian tubuh dan melindungi dan membungkus tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai serangan trauma/cedera dan penahan terhadap jamur, virus, dan bakteri. Kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat oleh kulit. Kulit terdiri dari tiga lapisan, yaitu epidermis, dermis dan jaringan subkutan (Wibowo, 2005 ; Effendi, 1999).

## 2. Struktur Kulit

Kulit manusia tersusun atas 3 lapisan utama, dari luar ke dalam yakni epidermis (*non-viable* dan *viable* epidermis), dermis, dan endodermis. Ketiga lapisan tersebut berbeda dari segi anatomi, morfologi, senyawa penyusun, sifat dan fungsinya (Isriany, 2013).

Lapisan terluar merupakan turunan dari ectoderm yang disebut epidermis.

Epidermis terhubung dengan dermis oleh taut dermo-epidermic (*dermo-epidermic junction*). Di bawah dermis terdapat lapisan hypodermis (endodermis). Setiap lapisan dilalui oleh ujung-ujung saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah yang perifer yang melintasi kulit mengalirkan darah sebanyak 0,3 ml/jam/cm<sup>3</sup>. Total luas area pembuluh darah intrakutan yang tersedia untuk pelintasan langsung obat ke sirkulasi sistemik sejumlah 100%-200% dari area kulit. Pada kulit terserbar adneksa kulit berupa folikel rambut dan kelenjar (Isriany, 2013).

### a. Epidermis

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit atau disebut lapisan ari terdiri dari :

- 1) Stratum korneum, disebut lapisan tanduk yaitu sel-selnya mati, selnya

berukuran tipis, datar, tidak memiliki inti sel dan mengandung zat keratin.

- 2) Stratum lusidum, yaitu memiliki bentuk sel pipih, memiliki batas yang tegas, tetapi tidak ada inti, terletak di bawah stratum korneum. Dibawah telapak kaki. Di dalam lapisan nya terlihat seperti pita yang bening, batas-batas sudah tidak begitu terlihat.
- 3) Stratum glanulosum atau lapisan kerateohialin terdiri dari sel berisi inti dan glanulosum.
- 4) Zona germinalis, terletak dibawah lapisan tanduk dan memiliki dua lapisan epitel yang tidak tegas.
- 5) Sel berduri, yaitu sel dengan fibril halus yang menyambung sel satu dengan yang lainnya, sehingga setiap sel seakan-akan tampak berduri.
- 6) Sel basale atau stratum germinativum, sel ini berfungsi memproduksi sel epidermis baru secara terus-menerus. Sel ini disusun dengan teratur, berurutan dan kedap sehingga membentuk lapisan pertama atau lapisan dua sel pertama dari sel basal yang letaknya diatas papilla dermis (Susanto dan

Ari, 2013).

#### b. Dermis

Dermis berada dibawah lapisan epidermis. Dermis adalah jaringan ikat longgar terdiri atas sel-sel fibrinoplas yang mengeluarkan elastin dan protein kolagen. Dermis dapat merenggang dan memiliki daya tahan apabila Serabut-serabut protein kolagen dan elastin tersusun secara acak (Corwin, 2009).

Dermis terdiri atas stratum papilaris dan stratum retikularis, batas antara kedua lapisan tidak tegas, serat antaranya saling mengikat (Kalangi, 2013),

#### 1) Stratum papilaris

Lapisan ini tersusun lebih longgar, ditandai oleh adanya papila dermis yang jumlahnya bervariasi antara 50 – 250/mm<sup>2</sup>. Jumlahnya terbanyak dan lebih dalam pada daerah di mana tekanan paling besar, seperti pada telapak kaki. Sebagian besar papila mengandung pembuluh-pembuluh kapiler yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya. Papila lainnya mengandung badan akhir saraf sensoris yaitu badan Meissner. Tepat di bawah epidermis serat-serat kolagen tersusun rapat.

## 2) Stratum retikularis

Lapisan ini lebih tebal dan dalam. Berkas-berkas kolagen kasar dan sejumlah kecil serat elastin membentuk jalinan yang padat ireguler. Pada bagian lebih dalam, jalinan lebih terbuka, rongga-rongga di antaranya terisi jaringan lemak, kelenjar keringat dan sebacea, serta folikel rambut. Serat otot polos juga ditemukan pada tempat-tempat tertentu, seperti folikel rambut, skrotum, preputium, dan puting payudara. Pada kulit wajah dan leher, serat otot skelet menyusupi jaringan ikat pada dermis. Otot-otot ini berperan untuk ekspresi wajah.

Lapisan retikular menyatu dengan hipodermis/fasia superfisial di bawahnya yaitu jaringan ikat longgar yang banyak mengandung sel lemak.

## 3) Sel-sel dermis

Jumlah sel dalam dermis relatif sedikit. Sel-sel dermis merupakan sel-sel jaringan ikat seperti fibroblas, sel lemak, sedikit makrofag dan sel mast.

## c. Hipodermis

Sebuah lapisan subkutan di bawah retikularis dermis disebut hipodermis.

Ia berupa jaringan ikat lebih longgar dengan serat kolagen halus terorientasi terutama sejajar terhadap permukaan kulit, dengan beberapa di antaranya menyatu dengan yang dari dermis. Pada daerah tertentu, seperti punggung tangan, lapis ini memungkinkan gerakan kulit di atas struktur di bawahnya. Di daerah lain, serat-serat

yang masuk ke dermis lebih banyak dan kulit relatif sukar digerakkan. Sel-sel lemak lebih banyak daripada dalam dermis. Jumlahnya tergantung jenis kelamin dan keadaan gizinya. Lemak subkutan cenderung mengumpul di daerah tertentu. Tidak ada atau sedikit lemak ditemukan dalam jaringan subkutan kelopak mata atau penis, namun di abdomen, paha, dan bokong, dapat mencapai ketebalan 3 cm atau lebih. Lapisan lemak ini disebut pannikulus adiposus.

### 3. Warna Kulit

Warna kulit ditentukan oleh tiga faktor, yaitu: pigmen melanin berwarna coklat dalam stratum basal, derajat oksigenasi darah dan keadaan pembuluh darah dalam dermis yang memberi warna merah serta pigmen empedu dan karoten dalam lemak subkutan yang memberi warna kekuningan. Perbedaan warna kulit tidak berhubungan dengan jumlah melanosit tetapi disebabkan oleh jumlah granula-granula melanin yang ditemukan dalam keratinosit (Kalangi, 2013).

Dari semua bahan-bahan pembangun warna kulit, yang paling menentukan warna kulit adalah pigmen melanin. Banyaknya pigmen melanin di dalam kulit ditentukan oleh faktor-faktor ras, individu, dan lingkungan (Kusantati, 2008).

Melanin dan mekanisme pigmentasi (tanning) adalah pigmen alamiah kulit yang memberikan warna coklat. Proses pembentukan pigmen melanin terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit terjadi pada butir-butir melanosom yang dihasilkan oleh sel-sel melanosit yang terdapat diantara sel-sel keratinosit didalam lapisan basal (Stratum germinativum).

Pembentukan melanosom di dalam melanosit melalui 4 fase (Tranggono, 2007) yaitu :

a. Fase I : permulaan pembentukan melanosom dari matriks protein dan tirosinase,

diliputi membran dan berbentuk vesikula bulat.

- b. Fase II : disebut premelanosom, pembentukan belum sempurna belum terlihat adanya pembentukan melanin.
- c. Fase III : mulai nampak adanya deposit melanin di dalam membran vesikula. Disini mulai terjadi melanisasi melanosom
- d. Fase IV : deposit melanin memenuhi melanosom yang merupakan partikel-partikel padat dan berbentuk sama.

Pembentukan melanin di dalam melanosit sangat kompleks. Ada 2 macam pigmen melanin dengan variasi warna yang terjadi (Tranggono, 2007):

- a. Eumelanin memberikan warna gelap, terutama hitam, coklat dan variasinya, serta mengandung nitrogen.
- b. Feomelanin memberikan warna cerah, kuning sampai merah, mengandung nitrogen dan sulfur.

#### 4. Sun Protecting Factor

Efektifitas dari suatu sediaan tabir surya dapat ditunjukkan salah satunya adalah dengan nilai sun protection factor (SPF), yang didefinisikan sebagai jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai minimal erythema dose (MED) pada kulit yang dilindungi oleh suatu tabir surya, dibagi dengan jumlah energi UV yang dibutuhkan untuk mencapai MED pada kulit yang tidak diberikan perlindungan.

MED didefinisikan sebagai jangka waktu terendah atau dosis radiasi sinar UV yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya erythema (Wood & Murphy, 2000).

Nilai SPF merupakan perbandingan Minimal Erythema Dose (MED) pada kulit manusia yang terlindungi tabir surya dengan MED tanpa perlindungan tabir surya. *Sun Protection Factor* (SPF) merupakan indikator universal yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV

semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV (Dutra *et al.*, 2004).

Pengukuran nilai SPF suatu sediaan tabir surya dapat dilakukan secara *in vitro* dan *in vivo*. Metode pengukuran nilai SPF secara *in vitro* secara umum terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan produk tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran dari tabir surya yang diuji (Pratama, 2015)

Tabel 1. Keefektifan Sediaan Tabir Surya berdasarkan Nilai SPF (Wilkinson dan Moore, 1982 dalam Indriani, 2018)

No.	Nilai SPF	Kategori Proteksi Tabir Surya
1.	2-4	Proteksi minimal
2.	4-6	Proteksi sedang
3.	6-8	Proteksi ekstrak
4.	8-15	Proteksi maksimal
5.	>15	Proteksi ultra

FDA mengharuskan semua tabir surya mengandung *Sun Protection Factor* (SPF). Kisaran SPF dimulai dari 2 sampai lebih dari 50, Tabir surya dianjurkan dengan paling sedikit SPF 15. Peringkat SPF tabir surya dihitung dengan membandingkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kulit terbakar sinar matahari pada kulit dilindungi tabir surya dengan jumlah waktu yang

diperlukan untuk menyebabkan kulit terbakar pada kulit yang tidak terlindungi (Lavi, 2013).

Tabir surya dengan SPF menyatakan lamanya kulit seseorang berada dibawah sinar matahari tanpa mengalami *sunburn*. Sedang angka SPF menyatakan berapa kali daya tahan alami kulit dilipat gandakan sehingga aman dibawah sinar matahari tanpa mengalami *sunburn* (Shovyana dkk, 2013).

Persen transmisi eritema (%Te) menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah mengenai tabir surya, sehingga dapat menyebabkan eritema kulit (Kulit menjadi kemerahan). Demikian juga persen transmisi pigmentasi tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit (Kulit menjadi gelap) (Sugihartini, 2011).

## 5. Eritema dan Pigmentasi

Eritema merupakan salah satu tanda terjadinya proses inflamasi akibat paparan sinar UV dan terjadi apabila volume darah dalam pembuluh darah dermis meningkat hingga 38% di atas volume normal, sedangkan pigmentasi adalah perubahan warna kulit seseorang yang disebabkan adanya penyakit atau perlukan yang bisa menimbulkan perubahan warna yang lebih gelap akibat peningkatan jumlah melanin (Yulistiati, 2002).

### a. Reaksi *sunburn* (eritema)

*Sunburn* merupakan peradangan yang terjadi pada kulit akibat interaksi berlebihan terhadap sinar UV dan merupakan efek yang paling jelas terlihat dengan gejala berupa kemerahan (eritema) pada kulit yang dapat disertai nyeri, rasa hangat maupun gatal. Sinar UV B lebih berperan dalam menimbulkan *sunburn* pada kulit. *Sunburn* terjadi dalam 6-24 jam setelah paparan sinar matahari dan dapat menghilang dalam 3-5 hari. Namun gejala *sunburn* dapat lebih berat disertai dengan

bengkak dan demam apabila paparan sinar matahari kuat, lama dan tipe kulit individu yang terpapar (Bambang, 2014; Etnawati, 2013).

Reaksi eritema ini selain disebabkan karena kerusakan *cell prickle* epidermis yang berakibat terjadi oedema juga terjadi pelepasan *histamine like substance* karena mast sel pada lapisan dermis mengalami lisis, sehingga timbul vasodilatasi.

Derajat Sunburn yang ditimbulkan oleh spektrum sinar UVB berdasarkan frekuensi dan lamanya penyinaran digolongkan menjadi empat, yaitu :

1) Minimal Parcetible Erythema

Pada kulit timbul warna kemerahan (merah muda) akibat kontak sinar matahari selama 20 menit

2) Vivid Erythema

Pada kulit timbul warna merah terang, tanpa disertai rasa sakit akibat kontak sinar matahari selama 50 menit

3) Painful Burn

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang ringan pada kulit akibat kontak sinar matahari selama 100 menit.

4) Blistering Burn

Disamping timbul vivid erythema juga disertai rasa sakit yang hebat sekali bahkan terjadi pengelupasan dan pelepasan kulit, akibat kontak dengan sinar matahari selama 200 menit.

b. Reaksi *Tanning* (pigmentasi)

Reaksi pigmentasi selain ditimbulkan oleh radiasi spektrum sinar UV, juga spektrum sinar tampak. Tetapi derajat pigmentasi yang ditimbulkan sangat bervariasi tergantung frekuensi dan lamanya penyinaran.

1) Immediate Tanning



Dalam waktu beberapa menit setelah kulit terkena sinar matahari, timbul warna kegelapan (pigmentasi) yang segera, dan mencapai puncaknya satu jam kemudian. Selanjutnya warna kegelapan pada kulit mulai hilang antara dua sampai empat jam kemudian.

Reaksi tersebut terjadi karena fotooksidasi granul-granul melanin yang berada di permukaan lapisan epidermis kulit akibat radiasi sinar UV pada rentang panjang gelombang 300-600 nm, dan mencapai puncak pada panjang gelombang 340-360 nm.

## 2) Delayed Tanning

Sehari setelah kontak sinar matahari pada kulit timbul warna kegelapan. Tapi warna gelap tersebut sudah tampak satu jam setelah terkena sinar matahari dan mencapai puncak 10 jam kemudian, selanjutnya hilang antara 100-200 jam.

Reaksi tersebut terjadi karena migrasi granul-granul melanin yang terdapat pada stratum basale epidermis kulit ke permukaan kulit akibat terbentuknya sel-sel melanosom baru.

## 3) True Tanning

Kira-kira dua sampai tiga hari setelah kontak sinar matahari pada kulit timbul warna kegelapan, dan mencapai puncak maksimal antara dua sampai tiga minggu kemudian. Warna kegelapan pada kulit hilang antara 10-12 bulan kemudian.

Reaksi tersebut terjadi karena penumpukan granul-granul melanin akibat proliferasi sel-sel melanosit pada stratum basale epidermis kulit. Reaksi "Delayed Tanning" dan "True Tanning" terutama ditimbulkan oleh radiasi spektrum sinar UV pada panjang gelombang 95-320 nm. Secara normal epidermis dapat menyerap radiasi UVB dan UVC, merefleksikan 5%-10% dari kisaran spektrum 250 nm sampai 3000 nm dan menghamburkan cahaya yang paling terlihat.

Tabel 2. Tipe kulit berdasarkan respon kulit terhadap paparan sinar (Pathak MA, 1982)

Tipe Kulit	Warna kulit	Sensitivitas terhadap sinar UV	Riwayat Eritema/Pigmentasi
I	Putih	Sangat sensitif	Mudah Eritema,tidak pernah pigmentasi
II	Putih	Sangat sensitif	Mudah eritema, pigmentasi minimal
III	Putih	Sensitif	Eritema sedang, pigmentasi sedang
IV	Coklat Muda	Sensitif sedang	Eritema minimal, mudah mengalami pigmentasi dan pigmentasi sedang
V	Coklat	Sensitif minimal	Jarang eritema, coklat tua
VI	Coklat tua/Hitam	Tidak sensitif	Tidak pernah terbakar, coklat tua/hitam

### C. Sinar Ultraviolet

Sinar matahari terdiri dari berbagai spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda, dari inframerah yang terlihat hingga spektrum *ultraviolet*. Panjang gelombang sinar ultraviolet dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400-315 nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna

- coklat pada kulit tanpa menimbulkan kemerahan dalam bentuk leuko yang terdapat pada lapisan atas.
2. Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315-280 nm dengan efektivitas tertinggi 297,5 nm, merupakan daerah eritemogenik, dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin awal.
  3. Ultraviolet C (UV C) yaitu sinar dengan panjang gelombang di bawah 280 nm, dapat merusak jaringan kulit, tetapi sebagian besar telah tersaring oleh lapisan ozon dalam atmosfer.

#### **D. Tabir Surya**

Tabir surya adalah suatu zat atau material yang dapat melindungi kulit terhadap radiasi sinar ultra violet. Efektivitas sediaan tabir surya didasarkan pada penentuan nilai Sun Protection Factor (SPF) yang menunjukkan kemampuan produk tabir surya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UV (Stanfield, 2003).

##### **1. Klasifikasi tabir surya**

Tabir surya terdapat dalam 2 pembagian yaitu: (Hari, 2013; Lewie, 2014).

##### **a. Tabir Surya Kimia**

Tabir surya kimia melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi panas. Tabir surya ini disebut juga sunscreen/ tabir surya organik. Tabir surya ini diserap oleh kulit dan mempunyai potensi menimbulkan iritasi pada kulit dan tidak dapat digunakan oleh bayi usia kecil 6 bulan. Contoh tabir surya ini yaitu Avobenzone, Octinoxate dll.

##### **b. Tabir Surya Fisik**

Tabir surya yang bekerja melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar matahari. Tabir surya ini dikenal dengan nama sunblock/tabir surya anorganik.

Tabir surya ini merupakan broad spectrum (Spektrum luas) yang mampu melindungi dari sinar UV A dan UV B, bersifat stabil, potensi alergi yang ditimbulkan rendah dan tidak diserap oleh kulit sehingga dapat dipakai pada anak-anak. Tabir surya fisik merupakan tabir surya ideal menurut Food Drug Administration (FDA). Untuk mengoptimalkan kemampuan tabir surya sering dilakukan kombinasi antara tabir surya fisik dan kimia oleh sebahagian produsen kosmetik.

Tabel 3. Penggolongan potensi tabir surya (Balsam, 1972)

Klasifikasi Produk	Persen Transmisi Sinar Ultraviolet (%)	
	Erythematous range	Tanning range
Total block	<1,0	3-40
Extra protection	1-6	42-86
Regular suntan	6-12	45-86
Fast tanning	10-18	45-86

## 2. Mekanisme Tabir surya

Mekanisme kerja tabir surya antara lain:

- a. Senyawa yang dapat menyerap atau menghalangi cahaya UV. Fotoprotektor ini biasanya ditemukan pada sediaan topikal.
- b. Senyawa yang secara kompetitif bersaing dengan senyawa yang dapat dirusak oleh senyawa matahari. Cahaya UV dapat memacu pembentukan sejumlah senyawa reaktif atau radikal bebas pada kulit. Senyawa dengan kemampuan antioksidan atau penangkap radikal bebas dapat berkompetisi dengan molekul target dan mengurangi atau mengacaukan efek yang merugikan.

- c. Senyawa yang dapat memperbaiki senyawa yang rusak karena cahaya matahari, contohnya nukleotida dapat mencegah edema karena cahaya UV dan digunakan pada perawatan kulit karena fotosensitif. Namun hal ini masih perlu penelitian lebih lanjut (Pratama, 2015).

### 3. Persyaratan bahan tabir surya

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk bahan penyerap UV pada kosmetik adalah:

- a. Non toksik, dengan keamanan tinggi dan tidak menyebabkan kerusakan kulit,
- b. Absorbansi UV yang tinggi pada rentang panjang gelombang yang lebar,
- c. Tidak ada kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV dan panas,
- d. Kompatibilitas baik dengan material sediaan kosmetik (Shovyana, 2013)

### 4. Potensi Tabir surya

Kemampuan dari suatu tabir surya tidak hanya tergantung dari nilai SPF nya, ada beberapa faktor yang turut menentukan potensi tabir surya yaitu :

#### a. Jenis

Tabir surya yang ideal jenisnya adalah tabir surya yang memberikan perlindungan terhadap UVA dan UVB (spektrum luas), tidak menimbulkan iritasi, mudah didapat. Selain jenis bahan pembawa dalam tabir surya juga mempengaruhi potensi penetrasi bahan aktif ke kulit dan stabilitas seperti water resistant (Hari, 2013; Lili, 2009).

#### b. Cara pakai

Cara pakai menentukan efektifitas tabir surya, yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan tabir surya yaitu (Bambang, 2014; Syarif, 2011):

- 1) Jumlah/ketebalan yang cukup dan merata,
- 2) Pemakaiannya rutin setiap hari

- 3) Waktu pemakaian adalah 15-30 menit sebelum keluar rumah/ terpapar sinar UV dan tabir surya dibiarkan kering terlebih dahulu sebelum memakai make up
  - 4) Pengulangan kembali pemakaian tabir surya kurang lebih setelah 2-4 jam tergantung aktifitas, efektifitas tabir surya berkurang jika terkena keringat/air. Jika melakukan aktifitas berenang di ulang dalam 1 jam dengan memakai tabir surya *water resistant*.
  - 5) Pemakaian awal atau pergantian tabir surya baru dianjurkan untuk mencobanya terlebih dahulu pada sebahagian kecil area untuk menghindari efek alergi ataupun iritasi.
- c. Kadar

Seperti yang telah diuraikan diatas nilai SPF yang baik adalah diatas 15, namun banyak kosmetik yang dijual di pasaran mencantumkan SPF pada kemasan tetapi tidak menyantumkan jenis tabir surya yang dikandung.

### **E. Metode Ekstraksi**

Ekstraksi adalah proses mendapatkan ekstrak kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan (Dirjen POM, 2000).

#### **1. Jenis jenis ekstraksi**

##### a. Cara dingin

##### 1) Maserasi

Maserasi adalah proses mengekstraksi simplisia atau bahan alam dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengadukan atau pengocokan disimpan

di suhu ruangan (kamar). Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa- senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

## 2) Perkolasi

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah percolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam percolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

## b. Cara panas

### 1) Refluks

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut kedalam labu yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Uap terkondensasi dan kembali kedalam labu (Mukhriani, 2014).

## 2) Soxhlet

Metode ini dilakukan menempatkan serbuk sampel dalam sarung selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klongson yang ditempatkan diatas labu dan dibawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur dibawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini dalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang di peroleh terus-menerus berada pada titik didih (Mukhriani, 2014).

### c. Destilasi Uap

Destilasi uap memiliki proses sama dengan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi dengan destilasi (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014).

## **F. Spektrofotometer UV-Vis**

Spektrofotometer UV-Vis merupakan salah satu jenis spektroskopi yang sering digunakan dalam analisis kimia dan biologi. Spektrofotometer ini didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik. Apabila seberkas radiasi (cahaya) dikenakan pada cuplikan (larutan sampel), maka sebagian dari cahaya diserap oleh molekul – molekul sesuai dengan struktur dari molekul. Setiap senyawa dalam sampel memiliki tingkatan tenaga yang spesifik. Bila cahaya mempunyai perbedaan energy antara tingkatan dasar dan tingkatan tereksitasi yang mengenai cuplikan, maka electron-elektron pada tingkatan dasar akan dieksitasi ke



tingkatan tereksitasi, dan sebagian energi cahaya yang sesuai diserap dengan panjang gelombang ini. Elektron yang tereksitasikan melepaskan tenaga melalui proses radiasi panas dan akan kembali pada tingkatan dasar lagi. Perbedaan energi antara tingkat dasar dengan tingkat tereksitasi yang spesifik untuk tiap-tiap bahan/senyawa menyebabkan frekuensi yang diserap juga berbeda-beda (Sastrohamidjojo, 2001).

Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dari spektro dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang (Khopkar, 2007).

Suatu spektrofotometer UV-Vis dapat mengukur dan merekam spektrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spektrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektro tampak yang kontinu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembanding (Khopkar, 2007).

Pendeteksian senyawa dengan cara sederhana menggunakan spektrofotometer ultraviolet dilakukan pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Radiasi senyawa pada panjang gelombang 254 nm menunjukkan radiasi gelombang pendek, sedangkan pada panjang gelombang 366 nm menunjukkan radiasi panjang gelombang. Bila senyawa menyerap sinar UV, maka akan tampak sebagai bercak gelap pada latar belakang yang berfluoresensi (Stahl, 1985).

Sinar radiasi UV-Vis adalah panjang gelombang antara 180 – 380 nm untuk UV dan panjang gelombang 380–780 nm untuk visible. Cahaya yang dapat dilihat oleh manusia disebut cahaya tampak/visible. Biasanya cahaya terlihat merupakan campuran dari cahaya yang mempunyai berbagai panjang gelombang dari 400 nm hingga 750 nm.

Tabel 4. Spektrum cahaya tampak dan warna-warna komplementer (Underwood, 2001; 396).

Panjang Gelombang (nm)	Warna Komplementer
400-435	Violet Kuning-hijau
435-480	Biru Kuning
480-490	Hijau-biru Orange
490-500	Biru-hijau Merah
500-560	Hijau Ungu
560-580	Kuning-hijau Violet
580-595	Kuning Biru
595-610	Orange Hijau-biru
610-750	Merah Biru-hijau

Spektrofotometri UV-Vis dapat mengukur dan merekam spectrum senyawa tumbuhan dalam bentuk larutan. Spektrum tampak terentang panjang dari 400 nm (ungu) sampai 750 nm (merah), sedangkan spectrum ultraviolet terentang dari 100 nm sampai 400 nm (Fessenden, 1994).

Instrumen yang digunakan untuk mempelajari serapan atau emisi radiasi elektromagnetik sebagai fungsi dari panjang gelombang disebut spektrometer atau spektrofotometer. Pada umumnya konfigurasi dasar dari spektrofotometer UV-Vis berupa susunan peralatan adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra

lembayung yang kebanyakan dipakai adalah lampu hidrogen dan lampu deuterium (D2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat) (Mulja, 1995).

Lampu tungsten merupakan campuran dari filament tungsten gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm (Mulja, 1995).

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

## 2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk filter prisma-kisi (grating)-celah keluar.

### a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu monokromator pada spektrofotometer. Celah monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

### b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai. Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

#### c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

### 3. Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari gelas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

### 4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

### 5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995).

Prinsip penentuan spektrofotometer UV-Vis merupakan aplikasi dari Hukum Lambert Bert. Hukum ini menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi kuvet (Rohman, 2007).

### **G. Tinjauan Islam Tentang Pemanfaatan Tumbuhan**

Dalam Al-Quran dijelaskan Maha besar Allah yang telah menciptakan alam semesta dan segala yang ada didalamnya. Allah swt berfirman dalam QS Abasa /80: 27-31.

فَأَبْتَنَّا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ  
وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ

Terjemahnya:

“Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian; anggur, sayur-sayuran; zaitun, pohon kurma; kebun-kebun (yang) rindang; buah-buahan, dan rerumputan,” (Kementerian Agama RI).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyebutkan beberapa macam tumbuh-tumbuhan. Pertama, Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok. Kedua dan ketiga, Allah menumbuhkan pula buah anggur dan bermacam sayuran yang dapat dimakan secara langsung. Keempat dan kelima, buah zaitun dan pohon kurma. Keenam,

kebun-kebun yang besar, tinggi, dan lebat buahnya. Tidak hanya buahnya yang dapat dimanfaatkan, tetapi pohonnya pun dapat dijadikan bahan bangunan dan alat-alat perumahan. Ketujuh, bermacam-macam buah-buahan yang lain, seperti buah pir, apel, mangga, dan sebagainya. Kedelapan, berbagai macam rumput-rumputan (Shihab, 2009).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah swt. Tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang manfaatnya dapat diketahui dari melakukan penelitian-penelitian, termasuk diantaranya adalah tanaman rimpang lempuyang gajah (*zingiber zerumbet L. Smith*) Sesuai dalam firman Allah swt dalam QS. Al-an'am/6: 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتَرَ كَبَابًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.”

Ayat ini merupakan bukti-bukti kemahakuasaan Allah swt. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Dan Dia juga bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu Kami, yakni Allah, mengeluarkan yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuhan-tumbuhan, maka Kami keluarkan

darinya, yakni dari tumbuhan-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau. Untuk lebih menjelaskan kekuasaan-Nya ditegaskan lebih jauh bahwa, kami keluarkan darinya, yakni dari tanaman yang menghijau itu, butir yang saling bertumpuk, yakni banyak, padahal sebelumnya ia hanya berasal dari satu biji atau benih (Shihab, 2009).

Selanjutnya Allah memberi contoh dengan mendahulukan menyebut sesuatu yang berkaitan dengan butir, yaitu bahwa: Dan dari mayang, yakni pucuk kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, yang mudah dipetik dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa bentuk buahnya dan tidak serupa aroma dan kegunaannya. Perhatikanlah buah yang dihasilkannya dengan penuh penghayatan guna menemukan pelajaran melalui beberapa fase di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman (Shihab, 2009).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab al-Muntahab fi at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuhan-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga mencapai pada fase kematangan. Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Adapun dalam ayat ini yang ditutup dengan *liqaumin yu'minun* bagi kaum yang beriman, ia ditutup demikian sebagai isyarat bahwa ayat-ayat ini atau tanda-tanda itu hanya bermanfaat untuk yang beriman.

Memang, bisa saja ada yang mengetahui rahasia di balik fenomena yang diuraikan ayat-ayat diatas, tetapi bila pengetahuannya tidak disertai iman kepada Allah pengetahuan tersebut tidak akan bermanfaat. Atau, dapat juga penutup itu

dipahami sebagai mengisyaratkan bahwa yang tidak mengetahui dengan dalam atau bahkan yang tidak mengetahui walau sebatas tentang bukti-bukti tersebut bukanlah orang yang beriman (Shihab, 2009).

Dalil Al-Qur'an tentang kecantikan sebagaimana yang digambarkan pada sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh bidadari sebagai berikut:

- QS. As-Saffat/37: 49

Terjemahnya:

“Seakan-akan mereka adalah telur (burung unta) yang tersimpan dengan baik.”

- QS. Ar-Rahman/55: 58

Terjemahnya:

“Seakan-akan mereka (Bidadari) itu permata yakut dan marjan.”



Allah memberikan sifat-sifat bidadari itu bagaikan telur burung unta yang tersimpan baik, dan bagaikan permata yakut dan marjan. Semua itu Allah kiaskan karena sifat-sifat bidadari yang sangat indah. Syeikh Nawawi menjelaskan dalam tafsirnya pada surah aṣ-Ṣāffāt bahwa warna kulit bidadari itu bagaikan telur burung unta, kebersihannya yang mempunyai tempat terbatas menyerupai telur burung unta dari debu. Warna keputihannya bercampur dengan kekuningan. Dan sesungguhnya inilah warna yang sebagus-bagusnya warna badan.<sup>1</sup>

Penggambaran bidadari pada ayat ini Imam Nawawi menafsirkan bahwa bidadari yang diumpamakan dalam al-Qur'an bagaikan permata yakut yang murni, dan yang putih. Diibaratkan seperti permata yakut karena kemerahmudahan pipi dan dengan marjan dengan arti kecilnya mutiara dalam putihnya kulit dan kebersihannya. Sesungguhnya kecilnya mutiara dalam putihnya salju dari pada besarnya. Dikatakan bahwa para bidadari memakai tujuh pakaian, kemudian dia melihat intisari betisnya dari belakangnya. Seperti dia melihat minuman warna merah dalam kaca putih.<sup>2</sup>


Ketika berbicara tentang kecantikan, orang selalu menghubungkannya dengan wanita, hal ini karena sejak dulu wanita identik atau bahkan disamakan dengan kecantikan. Bahkan keduanya diibaratkan seperti dua sisi berbeda dari mata uang yang sama. Hal ini wajar, karena selama ini kaum wanitalah yang paling banyak menggunakan atribut kecantikan. Salah satu contoh, sebutan *eye shadow*, *mascara*, begitu juga wewangian dan bedak, ternyata sudah sejak beribu tahun lalu sudah digunakan wanita. Begitu pula wanita Indonesia yang terkenal mewarisi berbagai ramuan dan wewangian yang dapat membuat mereka cantik dan awet muda. Bahkan dalam cerita wayang Indonesia pun dengan penggambaran kecantikan wanita.

Keinginan untuk cantik telah tertancap dengan kuat dalam kepala setiap

<sup>1</sup> Syeikh Muhammad Nawawi al-Jaawi, *Marah Labiid Tafsir an-Nawawi* (Dar al-Kitab al-Islamiyyah), h. 218.

<sup>2</sup> Syeikh Muhammad Nawawi al-Jaawi, *Marah Labiid Tafsir an-Nawawi* (Dar al-Kitab al-Islamiyyah), h. 344.

wanita, sehingga membuat para wanita ingin kelihatan cantik terutama di depan laki-laki. Maka tak heran kalau kemudian para wanita berlomba-lomba mempercantik dirinya dengan berbagai cara. Mulai cara tradisional seperti minum jamu, hingga cara modern seperti *facial*, operasi plastik. Selain itu mereka-pun mengkonsumsi berbagai produk pemoles tubuh, seperti bedak, masker, lotion, pencuci wajah, lipstik, pil anti jerawat, peramping pinggang, alat orang raga yang bisa membuat langsing, minyak wangi dan berbagai model pakaian, sampai tampil dengan pakaian minim supaya terlihat menarik bagi laki-laki(Taimiyah dan Qoyyim, 2002: 48)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) (V. Wiratna Sujarweni, 2014).

Digunakan metode kuantitatif dikarenakan data yang akan diolah merupakan data rasio dan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel yang diteliti.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan Penelitian yang di gunakan adalah pendekatan ekperimental laboratorium. Metode penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan mempengaruhi *outcome* kecuali variabel independen (*treatment*) yang telah ditetapkan (Creawll, 2012).

### ***C. Waktu Penelitian***

Waktu penelitian di rencanakan pada bulan Desember 2021 – Juli 2022.

### ***D. Populasi dan Sampel***

#### **1. Populasi**

Populasi penelitian yang di gunakan adalah tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet*) yang diperoleh dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

#### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini adalah ekstrak etil asetat rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber Zerumbert L. Smith*).

### ***E. Instrumen Penelitian***

#### **1. Alat**

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah wadah maserasi, cawan porselin, Erlenmeyer (Pyrex), gelas ukur (Pyrex), kuvet, labu tentukur (Pyrex), mikro pipet (Socorex), neraca analitik (Kern), pipet tetes, seperangkat alat refluks, spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV/Vis Spektrofotometer), toples.

#### **2. Bahan**

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Aquadest,etil asetat,methanol,DPPH.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Pengambilan sampel**

Rimpang yang di ambil adalah rimpang yang berukuran besar dan tua serta siap panen, diambil pada waktu pagi hari.

### **2. Pengolahan sampel**

Sampel yang diteliti adalah rimpang Lempuyang gajah yang telah diperoleh dari Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan sebanyak 2 kg dibersihkan dari kotoran yang melekat. Kemudian sampel rimpang Lempuyang gajah dicuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang menempel, lalu ditiriskan, kemudian dirajang atau dipotong kecil-kecil. Selanjutnya dikeringkan di lemari pengering sampai konstan. Setelah kering dimasukkan dalam wadah maserasi untuk selanjutnya dilakukan proses ekstraksi.

### **3. Ekstraksi Sampel Dengan Metode Maserasi**

Metode yang digunakan dalam ekstraksi simplisia rimpang lempuyang gajah yaitu dengan cara maserasi. Rimpang lempuyang gajah sebanyak 200 gram dan dimaserasi dengan pelarut etil asetat selama 3 x 24 jam dengan sesekali pengadukan. selanjutnya dilakukan penguapan dengan metode evaporasi pada suhu 60°C dengan bantuan alat *rotary evaporator* (Podungge, dkk., 2017).

### **4. Identifikasi Kandungan Kimia Ekstrak Hasil Partisi**

#### **a. Uji alkaloid**

Sebanyak 500 mg ekstrak dimasukkan kedalam erlenmeyer lalu ditambahkan 1 ml HCL 2N dan dicukupkan dengan aquadest hingga 10 ml. Kemudian dipanaskan diatas penangas air selama 15 menit, didinginkan dan disaring. Diteteskan larutan dalam kaca arlogi dan ditambahkan dengan 2 tetes regen

Bouchardat. Hasil positif ditandai dengan endapan coklat sampai hitam (Utami, 2020)

b. Uji flavonoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak ditambahkan air panas, kemudian dididihkan selama 5 menit, lalu disaring. Filtrat ditambahkan sedikit serbuk Magnesium dan 1 ml HCL pekat, kemudian dikocok. Uji positif ditunjukkan oleh terbentuknya warna merah, kuning atau jingga (Ilmiati, dkk., 2017).

c. Uji steroid dan triterpenoid

Sebanyak 2 ml larutan ekstrak, ditambahkan beberapa tetes pereaksi Lieberman-Burchard. Uji positif steroid menghasilkan warna hijau atau biru dan terpenoid menghasilkan warna merah atau violet (Susanti, dkk., 2015).

d. Uji saponin

Sebanyak 1 gram ekstrak ditambah dengan 10 ml air panas di masukkan kedalam tabung reaksi dan didinginkan. Kemudian dikocok secara vertikal selama 10 detik lalu didiamkan selama 10 detik. Apabila terbentuk busa stabil setinggi 1-10 cm selama tidak kurang dari 10 detik maka disimpulkan bahwa larutan uji mengandung saponin. Busa yang terbentuk tidak hilang pada penambahan HCL 2N (Susanti, dkk., 2015).

e. Uji tanin dan polifenol

Sebanyak 2 ml larutan uji dimasukkan masing-masing dalam dua tabung reaksi. Tabung reaksi A berisi larutan uji sebagai kontrol negatif, sedangkan tabung reaksi B berisi larutan uji dengan penambahan beberapa tetes  $\text{FeCl}_3$  10%. Sampel yang mengandung tanin dan polifenol ditandai dengan timbulnya warna hitam kehijauan atau biru tua (Susanti, dkk., 2015).

## 5. Uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl)

a. Pembuatan larutan DPPH

Dibuat larutan DPPH dengan konsentrasi 0,45 mM dengan cara menimbang 18 mg serbuk DPPH kemudian dilarutkan menggunakan metanol sebanyak 100 ml lalu di vortex (Nurfiana, dkk., 2017).

b. Panjang gelombang serapan maksimum DPPH

Larutan diambil menggunakan pipet mikro sebanyak 1 ml kemudian ditambahkan 4 ml metanol kemudian di vorteks dan didiamkan selama 30 menit ditempat gelap dan diukur serapannya pada panjang gelombang 400-800 nm untuk memperoleh panjang gelombang maksimum (Prasetyo, dkk., 2021).

**G. Validasi dan Reliabilitas Instrumen**

Alat yang digunakan dalam menentukan Transmisi Eritema dan Pigmentasi serta nilai SPF adalah spektrofotometer UV-Vis. Reliabilitas dijaga dengan melakukan replikasi 3 kali pada tiap pengujian.

**H. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

**1. Teknis Pengolahan Data Dan Penentuan Tabir Surya**

Data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapatkan dari absorbansi yang diukur untuk penentuan potensi tabir surya.

Pada penelitian ini potensi tabir surya ekstrak rimpang Lempuyang gajah ditentukan berdasarkan nilai SPF, potensi transmisi eritema dan transmisi pigmentasi.

Ditimbang ekstrak rimpang Lempuyang gajah sebanyak 50 mg dan dilarutkan dengan etil asetat pada labu tentukur 50 ml diperoleh suatu konsentrasi 1000 ppm (Larutan stok), kemudian larutan stok diencerkan hingga diperoleh 3 konsentrasi pengenceran, yaitu 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm. Kemudian

dilakukan pengukuran untuk menentukan nilai persen transmittan pigmentasi (%Tp) dan persen transmittan eritemanya (%Te) pada daerah panjang gelombang 292,5-372,5 nm dengan interval 5 nm lalu diukur nilai absorpsinya pada daerah panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 5 nm dengan menggunakan spektrofotometer UV- Vis untuk mendapatkan nilai SPF (Yasin Adillah:2017)

## 2. Analisis Data

### a. Penentuan SPF

Nilai *Sun Protecting Factor* (SPF) dihitung terlebih dahulu luas daerah dibawah kurva serapan (AUC) dari nilai serapan pada panjang gelombang 290-400 nm dengan interval 2 nm. Nilai AUC dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\{AUC\} = \frac{Aa + Ab}{2} \times dPa - b$$

Aa = absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPa-b = selisih panjang gelombang a dan b

Nilai total AUC dihitung dengan menjumlahkan nilai AUC pada tiap segmen panjang gelombang. Nilai SPF masing-masing konsentrasi ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$\log SPF = AUC/\lambda_n - \lambda_1$$

$\lambda_n$  = panjang gelombang terbesar (dengan  $A > 0,05$  untuk ekstrak dengan

$A > 0,01$  untuk sediaan

$\lambda_1$  = panjang gelombang terkecil (290 nm)



Untuk memperoleh nilai SPF pada rentan panjang gelombang UV A dan UVB, terlebih dahulu ditentukan rata-rata nilai A pada interval aktivitas eritemogeniknya adalah interval panjang gelombang yang dapat diserap oleh bahan tabir surya yang dapat menyebabkan eritema yang dapat ditunjukkan dengan absorbansi sebesar 0,0541 pada sampel tanpa pengenceran. Sediaan yang digunakan pada penentuan nilai SPF sebanyak 2 mg/cm<sup>2</sup> yang setara dengan 2 mg/ml

(Yasin Adillah, 2017)

#### b. Nilai Persen Eritema

Dari data pengamatan nilai transmisi pada berbagai panjang gelombang dapat dihitung persen transmisi eritema dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nilai transmisi eritema adalah T<sub>Fe</sub>. Perhitungan nilai transmisi eritema tiap panjang gelombang (panjang gelombang 292,5 – 372,5 nm).
- 2) Banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh bahan tabir surya (E<sub>e</sub>) dihitung dengan rumus :  $E_e = \sum T \cdot Fe$

- 3) Kemudian % transmisi eritema dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ transmisi eritema} = E_e / \sum Fe = (\sum Te) / (\sum Fe)$$

Dimana:

T = Nilai transmisi

Fe = Fluks eritema

$E_e = \sum T \cdot Fe$  = banyaknya fluks eritema yang diteruskan oleh ekstrak panjang gelombang 292,5 – 317,5 nm

(Yasin Adillah, 2017)

#### c. Persen Transmisi Pigmentasi

Nilai persen transmisi pigmentasi dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nilai transmisi pigmentasi adalah  $T.F_p$ . Perhitungan nilai transmisi pigmentasi tiap panjang gelombang (panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm).
- 2) Banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh bahan tabir surya ( $E_p$ ) dihitung dengan rumus  $E_p = \sum T.F_p$
- 3) Kemudian % transmisi pigmentasi dihitung dengan rumus:

$$\% \text{transmisi eritema} = \frac{E_p}{\sum F_p} = \frac{(\sum T_p)}{(\sum F_p)}$$

Dimana:

$T$  = nilai transmisi

$F_p$  = fluks pigmentasi

$E_p = \sum T.F_p$  = banyaknya fluks pigmentasi yang diteruskan oleh ekstrak pada panjang gelombang 322,5 – 372,5 nm

$\sum F_p$  = Jumlah total energi sinar UV yang menyebabkan pigmentasi

(Yasin Adillah, 2017)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Hasil Ekstraksi Rimpang Lempuyang Gajah**

Penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa rimpang lempuyang gajah, kemudian dicuci dengan air mengalir, selanjutnya dilakukan perajangan, kemudian dikeringkan hingga diperoleh 200 gram yang dimaserasi menggunakan pelarut etil asetat sebanyak 2 liter dan dilakukan remaserasi sehingga diperoleh ekstrak kental sebanyak 3,88gram.

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{Berat ekstrak}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{3,88 \text{ g}}{200 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,94 \% \end{aligned}$$

**2. Hasil Skrining Fitokimia rimpang lempuyang gajah (Zingiber zerumbet (L.))**

Tabel.1. Skrining Fitokimia kimia

Senyawa	Preaksi	Senyawa
		Etil Asetat
Alkaloid	(+) 3 ml HCL 2N (+) Mayer (+) Dragendorff	-
Saponin	(+) HCL 2N	-
Flavonoid	(+) Serbuk Mg (+) HCL Pekat	-
Tanin dan Polifenol	(+) FeCl <sub>3</sub> 10%	+

Steroid dan Triterpenoid	(+) Lieberman-Burchard	-
--------------------------	------------------------	---

Keterangan : + = Positif dan - = Tidak Positif

### 3. Pengujian Aktivitas Antioksidan

Table.2. Hasil Pengukuran Nilai IC<sub>50</sub>

Sampel	Konsentrasi	Absorbansi Sampel	%Inhibisi	Persamaa Garis Linier	Nilai IC <sub>50</sub>
Etil asetat	20 ppm	0.497	17.028	$y = 0.4338x + 7.4402$ $R^2 = 0.965$	98.109
	40 ppm	0.465	22.315		
	60 ppm	0.379	36.784		
	80 ppm	0.364	39.288		
	100 ppm	0.288	51.920		

Tabel.3. Pengukuran Nilai IC<sub>50</sub> Aktivitas Vitamin C

Sampel	Konsentrasi	Absorbansi Sampel	%Inhibisi	Persamaa Garis Linier	Nilai IC <sub>50</sub>
Vitamin C	2 ppm	0.912	0.941	$y = 9,1404x - 21,234$ $R^2 = 0,9629$	7,79
	4 ppm	0.860	6.659		
	6 ppm	0.585	36,446		
	8 ppm	0.399	56.641		
	10 ppm	0.301	67.354		

#### 4. Nilai Potensi Tabir Surya Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah

##### a. Nilai Transmisi Eritema Dan Pigmentasi

Tabel.4. % Nilai Transmisi Eritema (%Te)

Replikasi	Persen transmisi eritema (%)		
	150ppm	300ppm	450ppm
I	10,801	9,107	6,604
II	10,851	9,145	6,506
III	11,062	9,111	6,595
Rata-rata	10,904	9,121	6,568
Kategori tabir surya	Regular suntan	Regular suntan	Regular suntan

Keterangan ; I : Hasil pengukuran %Te replikasi pertama

II : Hasil pengukuran %Te replikasi kedua

III : Hasil pengukuran %Te replikasi ketiga

Tabel.5. %Transmisi Pigmentasi (%Tp)

Replikasi	Persen transmisi pigmentasi (%)		
	150ppm	300ppm	450ppm
I	58,581	50,508	40,998
II	58,921	50,666	40,423
III	59,478	50,497	40,739
Rata-rata	58,993	50,557	40,720
Kategori tabir surya	Extra protection	Extra protection	Total block

Keterangan ; I : Hasil pengukuran %Tp replikasi pertama

II : Hasil pengukuran %Tp replikasi kedua

III : Hasil pengukuran %Tp replikasi ketiga

Table.6. Nilai Sun Protection Factor (SPF)

No	Replikasi	Konsentrasi (ppm)		
		150ppm	300ppm	450ppm
1	I	2,606	2,958	3,605
2	II	2,582	2,992	3,647
3	III	2,576	2,951	3,639
Nilai SPF Rata-rata		2,588	2,967	3,630

Keterangan ; I : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi pertama

II : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi kedua

III : Hasil pengukuran nilai SPF replikasi ketiga

### **B. Pembahasan**

Tabir surya merupakan salah satu bentuk sediaan kosmetika yang dipakai untuk menghindari paparan sinar ultra violet (UV) yang diradiasikan secara langsung oleh matahari. Sediaan ini diformulasikan untuk mengurangi penyerapan sinar UV pada kulit mengingat bahwa paparan sinar UV secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan kulit ( Pratiwi Sheila, 2017).

Sinar UV dibedakan menjadi 3, yaitu sinar ultraviolet A (UV-A), UV-B, dan UV-C, yang ketiganya mempunyai panjang gelombang dan efek radiasi yang berbeda. Sinar UV-A dengan panjang gelombang 320–400 nm mempunyai efek radiasi, berupa pigmentasi yang menyebabkan kulit berwarna coklat dan kemerahan. Sinar UV-B dengan panjang gelombang 290-320 nm memiliki efek radiasi, yang menyebabkan eritema (kemerahan) hingga dapat menyebabkan kanker kulit bila terlalu lama terkena radiasi ini. Sedangkan sinar UV-C dengan panjang gelombang 200-290 nm tertahan pada lapisan atmosfer paling atas dari bumi dan tidak sempat masuk ke bumi karena adanya lapisan ozon (Tranggono

dkk, 2007: 83). Sehingga dalam penelitian ini, potensi tabir surya diukur dari panjang gelombang 290-400 (UV A dan UV B).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm) yang pada umumnya banyak digunakan sebagai rempah, bumbu dan obat karena rasanya yang unik dan bersifat medis. Didalam dunia kesehatan dapat mencakup yaitu mengobati radang, demam tinggi, skait gigi, gangguan pencernaan, sembelit, diare serta dapat meredakan rasa sakit (Yob, dkk, 2011)

Ekstraksi simplisia Rimpang lempuyang gajah dilakukan dengan metode maserasi. Sebelum maserasi simplisia dirajang untuk memperkecil ukuran partikel dan meningkatkan efektifitas penyarian. Semakin kecil ukuran partikel maka semakin besar luas permukaannya dan akan semakin luas pula permukaan yang kontak dengan cairan penyari sehingga penyarian akan lebih efektif. Keluarnya zat aktif dalam sel tersebut karena perbedaan konsentrasi didalam dan diluar sel

Dalam proses maserasi, simplisia diekstraksi dengan menggunakan pelarut etil asetat. Penggunaan metode maserasi merupakan metode yang cukup efektif dalam mengekstraksi suatu simplisia, keuntungan metode ini adalah dapat terhindar dari kerusakan senyawa aktif yang terkandung dalam suatu simplisia yang mungkin diakibatkan oleh faktor suhu. Akan tetapi dalam menggunakan metode ini ternyata masih banyak kekurangan diantaranya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan Proses maserasi dilakukan selama 3x24 jam dengan sesekali diaduk.

Ekstrak cair yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan menggunakan penguapan vakum putar (rotavapor), hal ini bertujuan agar senyawa antioksidan yang ada dalam ekstrak tidak mengalami kerusakan walaupun memakan waktu yang sedikit lebih banyak dalam proses penguapan pelarut etil asetat.

Tahap selanjutnya yaitu skrining fitokimia yang dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder pada suatu bahan alam (Vifta & Advistasari, 2018). Adapun pengujian yang dilakukan yaitu uji alkaloid, saponin, flavonoid, tanin dan polifenil serta steroid dan triterpenoid.

Pada pengujian alkaloid, hasil yang terbentuk pada ekstrak etil asetat setelah penambahan reagen mayer tidak terjadi perubahan warna, sedangkan pada penambahan reagen boucherdat tidak terjadi perubahan warna. Berdasarkan perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa alkaloid (Susanti, dkk., 2015).

Pada pengujian saponin, dengan penambahan HCL 2 N dan dikocok secara vertikal selama 10 detik menunjukkan ekstrak etil asetat menunjukkan tidak adanya kandungan senyawa saponin (Susanti, dkk., 2015).

Pada pengujian flavonoid, dengan penambahan serbuk magnesium dan HCL pekat menunjukkan Pada ekstrak etil asetat tidak menunjukkan kandungan senyawa flavonoid (Susanti, dkk., 2015).


Pada pengujian tanin dan polifenol dengan penambahan  $\text{FeCl}_3$  10% menunjukkan hasil Pada ekstrak etil asetat terjadi perubahan warna yaitu hitam kehijauan yang dimana berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya kandungan senyawa tanin dan polifenol (Susanti, dkk., 2015).

Pada pengujian steroid dan triterpenoid dengan penambahan reagen lieberman burchard, pada ekstrak etil asetat tidak menunjukkan adanya kandungan senyawa steroid dan triterpenoid (Susanti, dkk., 2015).

Selanjutnya, pengujian aktivitas antioksidan dengan menggunakan metode DPPH (*1,1-difenil-2-pikrilhidrazil*). Prinsip kerja pada metode DPPH yaitu adanya atom hidrogen pada senyawa antioksidan yang bergandengan dengan elektron bebas pada senyawa radikal sehingga dapat terjadi perubahan dari radikal bebas



yang menjadi senyawa non-radikal. Yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna dari ungu menjadi kuning (Setiawan, dkk. 2018).



Pengukuran antioksidan dilakukan dengan menggunakan spektrofotometri Uv-Vis dengan panjang gelombang 517 nm yang merupakan panjang gelombang maksimum untuk DPPH. Besarnya aktivitas antioksidan ditandai dengan nilai IC<sub>50</sub>, yang dimana merupakan konsentrasi larutan sampel yang dibutuhkan untuk menghambat 50% radikal bebas DPPH.

Selanjutnya, pengujian potensi tabir surya ekstrak Rimpang lempuyang gajah dilakukan secara in-vitro. Metode pengukuran nilai SPF secara umum terbagi dalam dua tipe. Tipe pertama adalah dengan cara mengukur serapan atau transmisi radiasi UV melalui lapisan tabir surya pada plat kuarsa atau biomembran. Tipe yang kedua adalah dengan menentukan karakteristik serapan tabir surya menggunakan analisis secara spektrofotometri larutan hasil pengenceran tabir surya.

Persen transmisi eritema menggambarkan jumlah sinar matahari yang diteruskan setelah terkena tabir surya sehingga dapat menyebabkan pigmentasi kulit. Berdasarkan hal tersebut maka semakin kecil nilai % transmisi eritema dan

pigmentasi berarti potensi tabir surya dalam melindungi kulit menjadi lebih baik (Sugihartini, 2011).

Sun Protection Factor (SPF) merupakan indikator universal yang menjelaskan tentang keefektifan dari suatu produk atau zat yang bersifat UV protektor, semakin tinggi nilai SPF dari suatu produk atau zat aktif tabir surya maka semakin efektif melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar UV (Dutra et al., 2004).

Menurut Cumpelick (1972), Sediaan tabir surya dapat dikategorikan sebagai *sunblock* (Sediaan yang dapat menyerap hampir semua sinar UV-B dan sinar UV-A) apabila memiliki presentase transmisi eritema  $<1\%$  dan presentase transmisi pigmentasi 3-40%.

Jika presentase transmisi eritema 6-18% dan presentase transmisi pigmentasi 45-86% dikategorikan sebagai *suntan* atau dapat dikatakan suatu bahan yang menyerap sebagian besar sinar UV-B dan menyerap sedikit sinar UV-A (Agustin et.al, 2013).

Berdasarkan table No.4 dan table No.5 diatas menunjukkan bahwa, nilai %Transmisi eritema dapat dinyatakan bahwa konsentrasi 150 ppm (10,904), 300 ppm (9,121), dan 450 ppm (6,568) termasuk dalam kategori *Regular suntan* yang berada pada range (6-12%). Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi konsentrasi (150 ppm,58,993 dan 300 ppm,50,557) termasuk kategori *Ekstra protection*, yang berada pada range (42-86), untuk konsentrasi 450 ppm (40,720) termasuk dalam kategori *Total block* yang berada pada range (3-40)

Berdasarkan table No.6 pengukuran rata-rata nilai SPF menunjukkan bahwa ekstrak memiliki nilai SPF yang rendah, yakni pada konsentrasi 150 ppm 2,588, pada konsentrasi 300 ppm 2,967, dan pada konsentrasi 450 ppm nilai SPF sebesar

3,630 sehingga dalam hal ini termasuk dalam kategori Proteksi Minimal dengan range nilai SPF (1-4).

Aktivitas terbaik ditunjukkan oleh ekstrak dengan konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm yang menunjukkan efek *Regular Suntan* terhadap terjadinya eritema kulit dan juga memberikan efek perlindungan total terhadap pigmentasi (*Ekstra protection* dan *Total Block*). Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa ekstrak memiliki potensi yang baik sebagai tabir surya dalam melindungi kulit dari terjadinya eritema dan pigmentasi akibat sengatan sinar UV.

Pada penentuan nilai SPF, menunjukkan bahwa ekstrak pada konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm masuk dalam kategori proteksi minimal, sehingga jika normalnya kulit manusia dapat mempertahankan dirinya sendiri dari dampak eritema dan pigmentasi selama kurang lebih 25 menit. Maka setelah menggunakan sediaan tabir surya dengan nilai SPF 3,2, itu artinya kulit akan bertahan selama 3,2 kali dari waktu normal kulit untuk mempertahankan dirinya sendiri.


Sehingga berdasarkan pada hasil menunjukkan bahwa seiring bertambahnya konsentrasi ekstrak maka fungsi perlindungan terhadap sinar UV juga semakin besar yang ditunjukkan dengan nilai transmisi eritema dan pigmentasi yang semakin kecil dan nilai SPF yang semakin besar.

Nilai SPF adalah kemampuan suatu sediaan tabir surya melindungi kulit dari eritema. Sehingga SPF adalah rasio kemampuan kulit normal dikali dengan nilai SPF. Dalam sebuah percobaan yang dilakukan oleh FDA, MED (Minimal Erythema Dosage) dilihat dengan semakin tingginya energi UV, maka persentase eritema akan meningkat.

Saat ini dipasaran banyak beredar sediaan tabir surya dengan nilai SPF 2 samapi 60. Sehingga tabir surya dengan SPF 2 mampu mentransmisikan 50% energi UV yang diterima dan sediaan tabir surya dengan SPF 50 masih akan

mentransmisikan 2%. Dengan kata lain SPF berbanding terbalik dengan transmisi eritema.

Produk tabir surya yang beredar dipasaran pada umumnya mencantumkan nilai SPF dan PA. PA (Protection Grade of UV A) adalah kemampuan sediaan tabir surya melindungi dari pigmentasi berdasarkan reaksi PPD (Persisten Pigment Darkening) yang digambarkan dengan tanda plus (+), semakin banyak tanda plus maka semakin baik sediaan tersebut melindungi dari pengaruh UV A yaitu pigmentasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*(L) Smith) pada konsentrasi 150 ppm, 300 ppm, dan 450 ppm untuk Transmisi eritema berturut-turut sebesar 10,904%, 9,121%, dan 6,568% yang termasuk kategori (*Regular suntan*), Sedangkan untuk nilai %Transmisi pigmentasi pada konsentrasi 150 ppm dan 300 ppm sebesar 58,921%, 50,557% yang termasuk kategori (*Ekstra protection*), serta untuk konsentrasi 450 ppm sebesar 40,720% yang termasuk kategori (*Total block*), dan untuk nilai SPF memiliki nilai 3.6 termasuk dalam kategori *proteksi minimal*.
2. Ekstrak Rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*(L) Smith) dikategorikan sebagai *suntan* yaitu suatu bahan yang dapat menyerap sebagian besar UV-B dan menyerap sedikit UV-A.

### B. Saran

1. Mengoptimasi konsentrasi ekstrak yang memberi nilai SPF yang ideal.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjutan untuk membuat formulasi ekstrak Rimpang lempuyang gajah ini dalam bentuk sediaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andasari, S.D. (2011), Aktivitas Sitotoksik Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumber*); Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Agustin, Rini(2013). Formulasi Krim Tabir Surya Dari Kombinasi Etil p-Metoksisinamat Dengan Katekin. Surabaya: Universitas Andalas.
- Anugerah, Putri, D., Budimana, S., & Hadi, Subroto, G. (2016). Analisa Kadar Nilai SPF Sun Protection Factor) pada Kosmetik Krim Pencerah Wajah yang Beredar di Pasar Tradisional/ Swalayan Kota Suka Buma Dengan Menggunakan Spektrofotometri UV-Vis. *Prosiding Seminar Nasional Kimia UNJANI-HKI*, 9–14. Balsam, M.S., Edward Sagarin. (1972). *Cosmetics: Science and Technology*. Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Bambang A,kojong N. (2014). Analisis Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia Coli. Yogyakarta
- Corwin,E,J. (2009). Buku saku patofisiologi, Edisi 3: Jakarta. EGC
- Damogalad, V., Jaya Edy, H., & Sri Supriati, H. (2013). Formulasi Krim Tabir Surya Ekstrak Kulit Nanas (*Ananas Comosus L Merr*) Dan Uji in Vitro Nilai Sun Protecting Factor (Spf). *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi – UNSRAT*, 2 (02), 2302–2493.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. 2000.
- Departemen Kesehatan RI. (1978). Formularium Kosmetika Indonesia (Cetakan I). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen POM. (2000). *Farmakope Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dutra, EA Olivera D.A, (2004). *Determination of Sun Protecting Factor (SPF) of Sunscreen by Ultraviolet Spectrophotometry. Brazilian Journal Of Pharmaceutical Sciences*. M.I. 2004.
- Effendy. (1999). Perawatan Pasien Luka Bakar, Penerbit Buku kedokteran EGC Press, Jakarta
- Etnawati k. (2013). Produk Kosmetik Instant Sebabkan Kanker: Jakarta
- Fessenden, R. J., Fessenden, J. S. (1994) *Kimia Organik Jilid I Edisi Ketiga. Terjemahan dari Organic Chemistry oleh Hadyana Pudjaatmaka*. Jakarta: Erlangga,
- Indriani, Nurfajri. (2018). Uji Potensi Tabir Surya Ekstrak Daun Binahong (*Anrederacordifolia* (Ten.) Steenis) Secara In Vitro. Skripsi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- Isfardiyana, S. H., & Safitri, S. R. (2014). Pentingnya melindungi kulit dari sinar ultraviolet dan cara melindungi kulit dengan sunblock buatan sendiri. *jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, 3(2), 126–133.
- Isriany.(2013). *Formulasi Kosmetik*. Makassar: Alauddin University Press.
- Juanita, R. A., & Juliadi, D. (2020). Penetapan Potensi Tabir Surya Krim Ekstrak Etanol Daun Ceremai (*Phyllanthus Acidus L.*) dengan Spektrofotometri UV-Vis. *Jurnal Farmagazine*, 7(1), 51. <https://doi.org/10.47653/farm.v7i1.154>
- Kalangi,S.J.(2013). Histofisiologi Kulit, jurnal Biomedik: Jakarta. penerbit Buku

kedokteran EGC

- Kementrian Agama RI. (2012). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Khopkar S. M. (2007). Konsep Dasar Kimia Analitik. Terjemahan dari Basic Concepts Of Analytical Chemistry oleh Saptoraharjo. Jakarta: UI-Press
- Kusantati, Herni. (2008). Tata Kecantikan Kulit. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). Analisis Zerumbone Dalam Zingiber zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri Mycobacterium tuberculosis. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal of Pharmacy)*, 4(2), 126. <https://doi.org/10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138>
- Lavi, Novita. (2013). *Tabir Surya Bagi Pelaku Wisata*. Universitas Udayana : Denpasar.
- Lili (2009). Pathophysiology of Heart Disease; Jakarta. EGC.
- Mescher Al. (2013). Kamus kedokteran Dorland. Jakarta. EGC.
- Minerva, P. (2019). Penggunaan Tabir Surya Bagi Kesehatan Kulit. *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 11(1), 87. <https://doi.org/10.24036/jpk/vol11-iss1/619>.
- Mukhriani. (2014). Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif. *Jurnal Kesehatan* 7(2), 361-367.
- Mulja, M; Suharman. *Analisis Instrumental*. Surabaya: Airlangga University Press. 1995.
- Nag, A., Bandyopadhyay, M., & Mukherjee, A. (2013). Antioxidant Activities and Cytotoxicity of Zingiber zerumbet (L.) Smith Rhizome. ~ 102 ~ *Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 2(3), 102–108. Diambil dari <http://www.phytojournal.com/archives/2013/vol2issue3/PartB/30.1.pdf>
- Pathak, M.A. (1982). *Sunscreens : Topical and Systemic Approaching for Protection For Human Skin Against Harmful Effect Of Solar Radiation*. J Am Acad Dermatol.
- Pratama, Wiweka Adi dkk.(2015) Uji SPF in Vitro dan Sifat Fisik Beberapa Produk Tabir Surya yang Beredar di Pasaran. Yogyakarta: *Fakultas Farmasi UGM*.
- Pratiwi, S., & Husni, P. (2017). Artikel Tinjauan: Potensi Penggunaan Fitokonsituen Tanaman Indonesia sebagai Bahan Aktif Tabir Surya. *Farmaka*, 15(4), 18–25. <https://doi.org/https://Doi.org/10.24198/jf.v15i4.14581.g7430>
- Rejeki, S., & Priyandari, A. (2017). Uji Efek Tonikum Ekstrak Etanol Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet SM.) Terhadap Mencit Jantan Galur Swiss. *Indonesian Journal On Medical Science*, 4(2), 232–236.
- Rohman, Abdul. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Rout, O. P., Acharya, R., & Mishra, S. K. (2011). In-Vitro antioxidant potentials in leaves of *Coleus aromaticus* benth and rhizomes of *Zingiber zerumbet* (L.) SM. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 1(8), 194–198.
- Rusita, Y, Dwi; Indarto, A. . (2017). Aktivitas Tabir Surya Dengan Nilai Sun

Protection Factor (SPF) Sediaan Losian Kombinasi Ekstrak Kayu Manis dan Ekstrak Kulit Delma pada Paparan Sinar Matahari dan Ruang Tertutup, 2(1), 38–43.

- Sastrohamidjojo, H. (2001). *Kimia Dasar*. Yogyakarta: UGM University Press.
- Setiawan, F., Yunita, O., & Kurniawan, A. (2018). *Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kayu Secang (Caesalpinia sappan) Menggunakan Metode DPPH, ABTS, dan FRAP*. 2(2), 82–89.
- Shihab, M. Quraish. (2009). *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol.6*. Jakarta: Penerbit lentera hati.
- Shovyana, H.H., A. Karim Zulkarnain. (2013). Physical Stability and Activity of Cream W/O Etanolic Fruit Extract of Mahkota Dewa (*Phaleria macrocarpha* (scheff.) Boerl.) as a Sunscreen. *Traditional Medicine Journal*, 18(2).
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (, 2(2), 147–160.
- Somchit, M.N., Hareet, M., & Shukriyah, N.M.H. 2003. Antiinflammatory Property Of Ethanol And Water Extracts Of Zingiber zerumbet. *Indian Journal of Pharmacology*, 35, 181- 182.
- Stanfield (2003). Efektivitas Sediaan Tabir Surya dan Penentuan Nilai SPF. Jakarta.
- Stahl, Egon. (1985). Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi. Bandung: ITB Press.
- Sudarsono P,H,dkk. (2002). Tumbuhan Obat. *Jurnal Penelitian*.
- Sugihartini, Nining (2011).Optimasi Komposisi Tepung Beras dan Fraksi Etanol Daun Sendok (*Plantago major L*) Dalam Formulasi Tabir Surya Dengan metode Simplex Lattice Design. Yogyakarta : Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Vol 1,
- Suhriman, S., Syukur, C., Penelitian, B., Obat, T., Besar, B., Pasca, P., & Pertanian, P. (2006). UJI TOKSISITAS EKSTRAK LEMPUYANG GAJAH ( Zingiber zerumbet ) TERHADAP LARVA UDANG ( Artemia salina Leach .) BSLT ( Brine Shrimp Lethality sederhana dari biota laut yang sangat Metoda ini juga banyak digunakan dalam berbagai analisis biosistem seperti anal, XVII(1), 30–38.
- Susanto, Clever & GA Made Ari. (2013). Penyakit Kulit dan Kelamin. :Yogyakarta. Penerbit Nuha Medika.
- Susanti, N. M. P., Budiman, I. N. ., & Warditiani, N. K. (2015). *Skrining Fitokimia Ektrak Etanol 90 % Daun Katuk ( Sauropus androgynus ( L .) Merr .)*. *Repository Universitas Udayana*, 83–86.
- Syamsuri, S., & Alang, H. (2021). Inventarisasi Zingiberaceae yang Bernilai Ekonomi (Etnomedisin, Etnokosmetik dan Etnofood) di Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia. *Agro Bali : Agricultural Journal*, 4(2), 219–229. <https://doi.org/10.37637/ab.v4i2.715>
- Tjirosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan*. Yogyakarta: UGM Press. 2013.
- Tranggono, Retno I., Latifah, Fatma. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Underwood, A.L. dan Day, R.A. *Analisis kimia kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Wibowo. (2005). *Anatomi Tubuh Manusi*: Jakarta. EGC
- Wood, C. & Murphy, E. (2000). Sunscreen Efficacy. *Glob.Cosmet. Ind., Duluth*, v.
- Yob, N. J., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., Salleh, M. Z., & Zakaria, Z. A. (2011). *Zingiber zerumbet ( L .) Smith : A Review of Its Ethnomedicinal , Chemical , and Pharmacological Uses*. Hindawi Publishing Corporation, 2011, 12. <https://doi.org/10.1155/2011/543216>
- Yuliasuti, Ike. (2002). *Pemodelan dan Sintesis Senyawa Penyerap Sinar UV 3,4 Dimetoksi heksilsinamat Berdasarkan Pendekatan Kimia Komputasi*. :Yogyakarta. FMIPA UGM.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR


## LAMPIRAN

### A. Skema Kerja

#### Lampiran 1. Skema Penyiapan Sampel




*Lampiran 2. Uji Aktivitas Antioksidan*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

*Lampiran 3. Identifikasi Senyawa Kimia*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

*Lampiran 4. Skema Analisis Data*

### Lampiran 5. Pembuatan Larutan

#### 1. Larutan DPPH 0,45 mM

$$0,45 \text{ mM} = 0,00045 \text{ M}$$

$$\diamond M = \frac{g}{Mr} \times \frac{1000}{V}$$

$$0,00045 = \frac{g}{394,32} \times \frac{1000}{100}$$

$$0,00045 = \frac{10 \cdot g}{394,32}$$

$$10 \cdot g = 0,00045 \times 394,32$$

$$g = \frac{0,177}{10}$$

$$g = 0,0177 \rightarrow 17,8 \text{ mg} \approx 18 \text{ mg}$$

#### 2. Larutan ekstrak dan fraksi

##### a. Larutan induk

$$\diamond 1 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$$

$$200 \text{ ppm} = 200 \text{ mg} / 1000 \text{ ml}$$

$$= 50 \text{ mg} / 250 \text{ ml}$$

$$= 0,05 \text{ g} / 250 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 200 ppm dengan cara ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 50 mg dan di larutkan dengan 250 ml pelarut.

##### b. Larutan standar

$$\diamond M_1 V_1 = M_2 V_2$$

- 20 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$200 \text{ ppm} \cdot V_1 = 20 \text{ ppm} \cdot 100 \text{ ml}$$

$$V_1 = \frac{2000}{200}$$

$$V1 = 10 \text{ ml}$$

- 40 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$200\text{ppm} \cdot V1 = 40\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{4000}{200}$$

$$V1 = 20 \text{ ml}$$

- 60 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$200\text{ppm} \cdot V1 = 60\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{6000}{200}$$

$$V1 = 30 \text{ ml}$$

- 80 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$200\text{ppm} \cdot V1 = 80\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{8000}{200}$$

$$V1 = 40 \text{ ml}$$

- 100 ppm

$$M1 V1 = M2 V2$$

$$200\text{ppm} \cdot V1 = 100\text{ppm} \cdot 100\text{ml}$$

$$V1 = \frac{10.000}{200}$$

$$V1 = 50 \text{ ml}$$

### 3. Larutan Vitamin C

## a. Larutan induk

$$\diamond 1 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$$

$$\begin{aligned} 100 \text{ ppm} &= 100 \text{ mg/ } 1000 \text{ ml} \\ &= 10 \text{ mg/ } 100 \text{ ml} \\ &= 0,01 \text{ g/ } 100 \text{ ml} \end{aligned}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm dengan cara ditimbang vitamin C sebanyak 10 mg dan di larutkan dengan 100 ml pelarut.

## b. Larutan standar

$$\diamond M_1 V_1 = M_2 V_2$$

- 2 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 2\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{100}{100}$$

$$V_1 = 1 \text{ ml}$$

- 4 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 4\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{200}{100}$$

$$V_1 = 2 \text{ ml}$$

- 6 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 6\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{300}{100}$$

$$V_1 = 3 \text{ ml}$$



- 8 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 8\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{400}{100}$$

$$V_1 = 4 \text{ ml}$$

- 10 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$100\text{ppm} \cdot V_1 = 10\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{500}{100}$$

$$V_1 = 5 \text{ ml}$$

#### Lampiran 6. Perhitungan % Inhibisi

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Abs.Blanko} - \text{Abs.Sampel}}{\text{Abs.Blanko}} \times 100\%$$

##### 1. Ekstrak Etil Asetat

- Konsentrasi 20 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,559 - 0,497}{0,559} \times 100\% = 17,028\%$$

- Konsentrasi 40 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,559 - 0,465}{0,559} \times 100\% = 22,315\%$$

- Konsentrasi 60 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,559 - 0,379}{0,559} \times 100\% = 36,727\%$$

- Konsentrasi 80 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,559 - 0,364}{0,559} \times 100\% = 39,288\%$$

- Konsentrasi 100 ppm

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{0,559 - 0,288}{0,559} \times 100\% = 51,920\%$$

### Lampiran 7. Perhitungan $IC_{50}$


a. Perhitungan vitamin C

Melalui persamaan Linear :

- $y = ax + b$

- $ax = y - b$

- $x = \frac{y-b}{a}$



**Kurva Standar Vitamin C**

Diketahui :  $y = 50$

$a = 9,1404$

$b = -21,234$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$

$$x = \frac{50 - (-21,234)}{9,1404}$$

$$= 7,79 \text{ ppm}$$


b. Perhitungan  $IC_{50}$  sampel

Melalui persamaan Linear :

- $y = ax + b$

- $ax = y - b$

- $x = \frac{y-b}{a}$



**Kurva Standar Ekstrak Etil Asetat**

Diketahui :

$$y = 50$$

$$a = 0,4338$$

$$b = 7,4402$$

Penyelesaian :

$$x = \frac{y-b}{a}$$


$$x = \frac{50-7,4402}{0,4338}$$

$$= 98,109 \text{ ppm}$$

*Lampiran 8. Hasil Pengukuran SPF*

a. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi I 150 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi I



2) Data Tabel Absorbansi Replikasi I

Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapezium	(AUC)
290	2.436	L1	10.485
295	1.731	L2	7.355
300	1.211	L3	5.182
305	0.862	L4	3.732
310	0.631	L5	2.785
315	0.483	L6	2.167
320	0.384	L7	1.752
325	0.317	L8	1.472
330	0.272	L9	1.282
335	0.241	L10	1.152
340	0.22	L11	1.057

345	0.203	L12	0.98
350	0.189	L13	0.907
355	0.174	L14	0.853
360	0.16	L15	0.767
365	0.147	L16	0.7
370	0.133	L17	0.64
375	0.123	L18	0.592
380	0.114	L19	0.547
385	0.105	L20	0.51
390	0.099	L21	0.48
395	0.093	L22	0.452
400	0.088		
<b>AUC</b>		45.831	
<b>LOG SPF</b>		0.416	
<b>NILAI SPF</b>		2.60615355	

### 3) Contoh perhitungan nilai SPF

$$(AUC) = (Aa+Ab)/2 \times Dpb-a$$

$$AUC = L1+L2+L3.....Ln$$

$$\text{Log SPF} = AUC/(\lambda n - \lambda 1)$$

Ket. Aa = Absorbansi pada panjang gelombang a nm

Ab = Absorbansi pada panjang gelombang b nm

dPb-a = Selisih panjang gelombang a dan b

$\lambda_n$  = Panjang gelombang terbesar (dengan  $A > 0,05$  untuk ekstrak, dengan  $A > 0,01$  untuk sediaan)

$\lambda_1$  = Panjang gelombang terkecil (290 nm).

$$L1 = \frac{1.731+2.463}{2} \times (295-290) = 10.485$$

$$L2 = \frac{1.211+1.731}{2} \times (300-295) = 7.355$$

$$L3 = \frac{0.862+1.211}{2} \times (305-300) = 5.182$$

$$L4 = \frac{0.631+0.862}{2} \times (310-305) = 3.732$$

$$L5 = \frac{0.483+0.631}{2} \times (315-310) = 2.785$$

$$L6 = \frac{0.384+0.483}{2} \times (320-315) = 2.167$$

$$L7 = \frac{0.317+0.384}{2} \times (325-320) = 1.752$$

$$L8 = \frac{0.272+0.317}{2} \times (330-325) = 1.472$$

$$L9 = \frac{0.241+0.272}{2} \times (335-330) = 1.282$$

$$L10 = \frac{0.220+0.241}{2} \times (340-335) = 1.152$$

$$L11 = \frac{0.203+0.220}{2} \times (345-340) = 1.057$$

$$L12 = \frac{0.189+0.203}{2} \times (350-345) = 0.980$$

$$L13 = \frac{0.174+0.189}{2} \times (355-350) = 0.907$$

$$L14 = \frac{0.160+0.174}{2} \times (360-355) = 0.853$$

$$L15 = \frac{0.147+0.160}{2} \times (365-360) = 0.767$$

$$L16 = \frac{0.133+0.147}{2} \times (370-365) = 0.700$$

$$L17 = \frac{0.123+0.133}{2} \times (375-370) = 0.640$$

$$L18 = \frac{0.114+0.123}{2} \times (380-375) = 0.592$$

$$L19 = \frac{0.105+0.114}{2} \times (385-380) = 0.547$$

$$L20 = \frac{0.099+0.105}{2} \times (390-385) = 0.510$$

$$L21 = \frac{0.093+0.099}{2} \times (395-390) = 0.480$$


$$L22 = \frac{0.088+0.093}{2} \times (400-395) = 0.452$$

$$\text{Log Spf} = 0.416$$

$$\text{SPF} = 2.606$$

b. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi II 150 ppm

1. Grafik Absorbansi Replikasi II
2. Data Tabel Absorbansi Replikasi II




Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapezium	(AUC)
290	2.456	L1	10.455
295	1.726	L2	7.322
300	1.203	L3	5.145
305	0.855	L4	3.69
310	0.624	L5	2.752

315	0.477	L6	2.137
320	0.378	L7	1.725
325	0.312	L8	1.447
330	0.267	L9	1.26
335	0.237	L10	1.132
340	0.216	L11	1.037
345	0.199	L12	0.96
350	0.185	L13	0.887
355	0.17	L14	0.817
360	0.157	L15	0.725
365	0.144	L16	0.69
370	0.132	L17	0.632
375	0.121	L18	0.585
380	0.113	L19	0.545
385	0.105	L20	0.51
390	0.099	L21	0.48
395	0.093	L22	0.455
400	0.089		
<b>AUC</b>		45.415	
<b>LOG SPF</b>			0.412
<b>NILAI SPF</b>			2.582260191

c. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi III 150 ppm

1. Grafik Absorbansi Replikasi III





## 2. Data Tabel bsorbansi Replikasi III


Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.452	L1	10.437
295	1.723	L2	7.31
300	1.201	L3	5.135
305	0.853	L4	3.687
310	0.622	L5	2.742
315	0.475	L6	2.13
320	0.377	L7	1.72
325	0.311	L8	1.442
330	0.266	L9	1.255
335	0.236	L10	1.127
340	0.215	L11	1.035
345	0.199	L12	0.96
350	0.185	L13	0.887

355	0.17	L14	0.815
360	0.156	L15	0.75
365	0.144	L16	0.687
370	0.131	L17	0.63
375	0.121	L18	0.582
380	0.112	L19	0.54
385	0.104	L20	0.505
390	0.098	L21	0.475
395	0.092	L22	0.45
400	0.088		
<b>AUC</b>		45.301	
<b>LOG SPF</b>		0.411	
<b>NILAI SPF</b>		2.576321157	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

a. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi I 300 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi I



2) Data Tabel Absorbansi Replikasi I


Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.516	L1	10.817
295	1.811	L2	7.747
300	1.288	L3	5.55
305	0.932	L4	4.092
310	0.705	L5	3.155
315	0.557	L6	2.535
320	0.457	L7	2.177
325	0.39	L8	1.832
330	0.343	L9	1.637
335	0.312	L10	1.527
340	0.29	L11	1.402
345	0.271	L12	1.307
350	0.252	L13	1.21

355	0.232	L14	1.107
360	0.211	L15	1.002
365	0.19	L16	0.9
370	0.17	L17	0.807
375	0.153	L18	0.73
380	0.139	L19	0.665
385	0.127	L20	0.61
390	0.117	L21	0.565
395	0.109	L22	0.527
400	0.102		
<b>AUC</b>		51.841	
<b>LOG SPF</b>		0.471	
<b>NILAI SPF</b>		2.958012467	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

b. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi II 300 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi II



2) Data Tabel Absorbansi Replikasi II


Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.52	L1	10.837
295	1.815	L2	7.77
300	1.293	L3	5.575
305	0.937	L4	4.12
310	0.711	L5	3.332
315	0.562	L6	2.562
320	0.463	L7	2.145
325	0.395	L8	1.857
330	0.348	L9	1.662
335	0.317	L10	1.53
340	0.295	L11	1.427
345	0.276	L12	1.33
350	0.256	L13	1.227

355	0.235	L14	1.122
360	0.214	L15	1.017
365	0.193	L16	0.912
370	0.172	L17	0.817
375	0.155	L18	0,740
380	0.141	L19	0.675
385	0.129	L20	0.62
390	0.119	L21	0.575
395	0.111	L22	0.537
400	0.104		
<b>AUC</b>		52.389	
<b>LOG SPF</b>		0.476	
<b>NILAI SPF</b>		2.992264637	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

c. Pengukuran absorbansi pengenceran Replikasi III 300 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi III



## 2) Data Tabel Absorbansi Replikasi III

Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.514	L1	10.81
295	1.81	L2	7.742
300	1.287	L3	5.545
305	0.931	L4	4.09
310	0.705	L5	3.152
315	0.556	L6	2.535
320	0.458	L7	2.12
325	0.39	L8	1.832
330	0.343	L9	1.637
335	0.312	L10	1.502
340	0.289	L11	1.4
345	0.271	L12	1.305
350	0.251	L13	1.205


355	0.231	L14	1.102
360	0.21	L15	1
365	0.19	L16	0.897
370	0.169	L17	0.802
375	0.152	L18	0.727
380	0.139	L19	0.665
385	0.127	L20	0.612
390	0.118	L21	0.57
395	0.11	L22	0.532
400	0.103		
<b>AUC</b>		51.782	
<b>LOG SPF</b>		0.47	
<b>NILAI SPF</b>		2.951209227	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 M A K A S S A R

a. Pengukuran Absorbansi Pengenceran Replikasi I 450 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi I





2) Data Tabel Absorbansi Replikasi I


Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.719	L1	11.792
295	1.998	L2	8.59
300	1.438	L3	6.25
305	1.062	L4	4.71
310	0.822	L5	3.727
315	0.669	L6	3.08
320	0.563	L7	2.632
325	0.49	L8	2.325
330	0.44	L9	2.117
335	0.407	L10	1.975
340	0.383	L11	1.857
345	0.36	L12	1.737
350	0.355	L13	1.605

355	0.307	L14	1.51
360	0.297	L15	1.365
365	0.249	L16	1.17
370	0.219	L17	1.032
375	0.194	L18	0.92
380	0.174	L19	0.83
385	0.158	L20	0.755
390	0.144	L21	0.692
395	0.133	L2	0.642
400	0.124		
<b>AUC</b>		61.313	
<b>LOG SPF</b>		0.557	
<b>NILAI SPF</b>		3.60578643	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

b. Pengukuran Absorbansi Pengenceran Replikasi II 450 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi II



2) Data Tabel Absorbansi Replikasi II


Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.73	L1	11.84
295	2.006	L2	8.707
300	1.477	L3	6.367
305	1.07	L4	4.747
310	0.829	L5	3.762
315	0.676	L6	3.112
320	0.569	L7	2.662
325	0.496	L8	2.355
330	0.446	L9	2.147
335	0.413	L10	2.002
340	0.388	L11	1.882
345	0.365	L12	1.762
350	0.34	L13	1.63

355	0.312	L14	1.487
360	0.283	L15	1.34
365	0.253	L16	1.187
370	0.222	L17	1.047
375	0.197	L18	0.932
380	0.176	L19	0.837
385	0.159	L20	0.76
390	0.145	L21	0.695
395	0.133	L22	0.642
400	0.124		
<b>AUC</b>		61.902	
<b>LOG SPF</b>		0.562	
<b>NILAI SPF</b>		3.647539469	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ALAUDDIN  
 MAKASSAR

c. Pengukuran absorbansi pengenceran replikasi III 300 ppm

1) Grafik Absorbansi Replikasi III



2) Data Tabel Absorbansi Replikasi III

Panjang gelombang(nm)	Absorbansi (A)	Luas Trapesium	(AUC)
290	2.726	L1	11.827
295	2.005	L2	8.62
300	1.443	L3	6.272
305	1.066	L4	4.73
310	0.826	L5	3.747
315	0.673	L6	3.097
320	0.556	L7	2.647
325	0.493	L8	2.342
330	0.444	L9	2.137
335	0.411	L10	1.992
340	0.386	L11	1.872
345	0.363	L12	1.877
350	0.388	L13	1.745
355	0.31	L14	1.48
360	0.282	L15	1.332

365	0.251	L16	1.18
370	0.221	L17	1.042
375	0.196	L18	0.93
380	0.176	L19	0.837
385	0.159	L20	0.76
390	0.145	L21	0.697
395	0.134	L22	0.647
400	0.125		
<b>AUC</b>		61.81	
<b>LOG SPF</b>		0.561	
<b>NILAI SPF</b>		3.639150361	

Rata-rata nilai SPF :

$$150 \text{ ppm} = \frac{2.606+2.953+3.605}{3}$$

$$300 \text{ ppm} = \frac{2.588+2.582+2.992+3.642}{3}$$

$$450 \text{ ppm} = \frac{2.967+2.576+2.951+3.639}{3}$$

$$= 3.630$$

**Lampiran 9. Persen Transmisi Eritema Dan Pigmentasi**

a. Data Transmisi Replikasi I 150 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.838	0.092	

297.5	0.6720	3.635	2.442	%Te=10.801
302.5	1.0000	9.774	9.774	
307.5	0.2008	18.648	3.744	
312.5	0.1364	28.330	3.864	
317.5	0.1125	37.358	4.202	
<b>Jumlah</b>	2.2332		24.120	
322.5	0.1079	45.358	4.894	%Tp=58.581
327.5	0.1020	51.437	5.246	
322.5	0.0936	56.195	5.259	
337.5	0.0798	59.401	4.740	
342.5	0.0669	61.145	4.090	
347.5	0.0570	64.102	3.653	
352.5	0.0448	66.302	2.970	
357.5	0.0456	67.894	3.095	
362.5	0.0356	70.105	2.495	
367.5	0.0310	73.140	2.267	
372.5	0.0260	75.105	1.952	
<b>Jumlah</b>	0.6942		40.667	

b. Data Transmisi Replikasi II 150 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons)</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.841	0.092	%Te=10.851
297.5	0.6720	3.651	2.453	
302.5	1.0000	9.818	9.818	
307.5	0.2008	18.778	3.770	
312.5	0.1364	28.439	3.879	
317.5	0.1125	37.501	4.218	

Jumlah	2.2332		24.23	
322.5	0.1079	45.529	4.912	%Tp=58.921
327.5	0.1020	51.595	5.262	
322.5	0.0936	56.369	5.276	
337.5	0.0798	59.621	4.757	
342.5	0.0669	62.145	4.157	
347.5	0.0570	64.338	3.667	
352.5	0.0448	66.575	2.982	
357.5	0.0456	68.844	3.139	
362.5	0.0356	70.990	2.527	
367.5	0.0310	73.140	2.267	
372.5	0.0260	75.115	1.952	
Jumlah	0.6942		40.903	

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

c. Data Transmisi Replikasi III 150 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.867	0.095	%Te=11.062
297.5	0.6720	3.743	2.515	
302.5	1.0000	10.027	10.027	
307.5	0.2008	19.128	3.840	



312.5	0.1364	28.908	3.943	%Tp=59.476
317.5	0.1125	38.075	4.283	
Jumlah	2.2332		24.705	
322.5	0.1079	46.146	4.979	
327.5	0.1020	52.250	5.3295	
322.5	0.0936	56.994	5.334	
337.5	0.0798	60.214	4.805	
342.5	0.0669	62.723	4.196	
347.5	0.0570	64.889	3.698	
352.5	0.0448	67.082	3.005	
357.5	0.0456	69.308	3.1604	
362.5	0.0356	71.370	2.540	
367.5	0.0310	73.502	2.278	
372.5	0.0260	75.407	1.960	
Jumlah	0.6942		41.288	

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

d. Data Transmisi Replikasi I 300 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons)</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.703	0.0776	%Te=9.1075
297.5	0.6720	3.037	2.0408	
302.5	1.0000	8.277	8.277	
307.5	0.2008	15.765	3.1656	

312.5	0.1364	23.772	3.2425	%Tp=50.508
317.5	0.1125	31.425	3.5353	
Jumlah	2.2332		20.338	
322.5	0.1079	38.148	4.1161	
327.5	0.1020	43.306	4.4172	
322.5	0.0936	47.416	4.4381	
337.5	0.0798	50.248	4.0097	
342.5	0.0669	52.635	3.5212	
347.5	0.0570	54.862	3.1271	
352.5	0.0448	57.491	2.5755	
357.5	0.0456	60.305	2.7499	
362.5	0.0356	63.114	2.2468	
367.5	0.0310	66.391	2.0581	
372.5	0.0260	69.346	1.8029	
Jumlah	0.6942		35.063	

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

## e. Data Transmisi Replikasi II 300 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.709	0.078	%Te=9.145
297.5	0.6720	3.056	2.053	
302.5	1.0000	8.316	8.316	

307.5	0.2008	15.806	3.173	%Tp=50.666
312.5	0.1364	23.874	3.256	
317.5	0.1125	31.516	3.545	
Jumlah	2.2332		20.423	
322.5	0.1079	38.317	4.134	
327.5	0.1020	43.505	4.437	
322.5	0.0936	47.592	4.454	
337.5	0.0798	50.434	4.024	
342.5	0.0669	52.786	3.531	
347.5	0.0570	55.026	3.136	
352.5	0.0448	57.629	2.581	
357.5	0.0456	60.45	2.75	
362.5	0.0356	63.202	2.249	
367.5	0.0310	66.477	2.060	
372.5	0.0260	69.408	1.804	
Jumlah	0.6942		35.172	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MARRASAR

f. Data Transmisi Replikasi III 300 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons)</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.706	0.078	%Te=9.111
297.5	0.6720	3.046	2.046	

302.5	1.0000	8.286	8.286	
307.5	0.2008	15.747	3.161	
312.5	0.1364	23.772	3.242	
317.5	0.1125	31.393	3.531	
<b>Jumlah</b>	2.2332		20.347	
322.5	0.1079	38.158	4.117	%Tp=50.497
327.5	0.1020	43.283	4.414	
322.5	0.0936	47.369	4.433	
337.5	0.0798	50.213	4.006	
342.5	0.0669	52.621	3.520	
347.5	0.0570	54.863	3.127	
352.5	0.0448	57.472	2.574	
357.5	0.0456	60.315	2.750	
362.5	0.0356	63.100	2.246	
367.5	0.0310	66.394	2.058	
372.5	0.0260	69.422	1.804	
<b>Jumlah</b>	0.6942		35.055	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

g. Data Transmisi Replikasi I 450 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.443	0.048	%Te=6.604
297.5	0.6720	2.000	1.344	

302.5	1.0000	5.902	5.902	
307.5	0.2008	11.663	2.341	
312.5	0.1364	17.653	2.407	
317.5	0.1125	24.040	2.704	
Jumlah	2.2332		14.749	
322.5	0.1079	29.636	3.197	%Tp=40.998
327.5	0.1020	34.021	3.470	
322.5	0.0936	37.476	3.507	
337.5	0.0798	39.919	3.185	
342.5	0.0669	42.070	2.814	
347.5	0.0570	44.409	2.531	
352.5	0.0448	47.210	2.115	
357.5	0.0456	50.571	2.306	
362.5	0.0356	54.035	1.923	
367.5	0.0310	58.077	1.800	
372.5	0.0260	61.879	1.608	
Jumlah	0.6942		28.460	

h. Data Transmisi Replikasi II 450 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
292.5	0.1105	0.434	0.047	

297.5	0.6720	1.965	1.320	%Te=6.506
302.5	1.0000	5.798	5.798	
307.5	0.2008	11.434	2.295	
312.5	0.1364	17.650	2.407	
317.5	0.1125	23.650	2.660	
<b>Jumlah</b>	2.2332		14.530	
322.5	0.1079	29.149	3.145	%Tp=40.423
327.5	0.1020	33.494	3.416	
322.5	0.0936	36.910	3.454	
337.5	0.0798	39.322	3.137	
342.5	0.0669	41.495	2.776	
347.5	0.0570	43.766	2.494	
352.5	0.0448	46.602	2.087	
357.5	0.0456	49.937	2.277	
362.5	0.0356	53.411	1.901	
367.5	0.0310	57.440	1.78	
372.5	0.0260	61.169	1.590	
<b>Jumlah</b>	0.6942		28.062	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

i. Data Transmisi Replikasi III 450 ppm

Panjang gelombang(nm)	<i>Erythmal Flux/Tannig Fe/Fp(E-vitons</i>	%Te	Ee	%Te/%Tp
-----------------------	--	-----	----	---------

292.5	0.1105	0.441	0.048	%Te=6.595
297.5	0.6720	1.994	1.339	
302.5	1.0000	5.881	5.881	
307.5	0.2008	11.604	2.330	
312.5	0.1364	17.880	2.438	
317.5	0.1125	23.921	2.691	
Jumlah	2.2332		14.729	
322.5	0.1079	29.497	3.182	%Tp=40.739
327.5	0.1020	33.837	3.453	
322.5	0.0936	37.233	3.485	
337.5	0.0798	39.652	3.164	
342.5	0.0669	41.765	2.794	
347.5	0.0570	44.082	2.512	
352.5	0.0448	46.853	2.099	
357.5	0.0456	50.235	2.290	
362.5	0.0356	53.724	1.912	
367.5	0.0310	57.727	1.789	
372.5	0.0260	61.504	1.599	
Jumlah	0.6942		28.281	

### Lampiran 10. Pembuatan Larutan

#### 1. Larutan ekstrak etil-asetat

##### a. Larutan induk

$$\diamond 500 \text{ ppm} = \text{mg/ml}$$

$$500 \text{ ppm} = 125 \text{ mg} / 250 \text{ ml}$$

$$= 0,125 \text{ mg} / 250 \text{ ml}$$

Jadi, dibuat larutan induk dengan konsentrasi 500 ppm dengan cara ditimbang ekstrak dan fraksi sebanyak 125 mg dan di larutkan dengan 250 ml pelarut.

b. Larutan standar

$$\diamond M_1 V_1 = M_2 V_2$$

- 150 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$500\text{ppm} \cdot V_1 = 150\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{750}{50}$$

$$V_1 = 15 \text{ ml}$$

- 300 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$300\text{ppm} \cdot V_1 = 300\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{1500}{50}$$

$$V_1 = 30 \text{ ml}$$

- 450 ppm

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$450\text{ppm} \cdot V_1 = 450\text{ppm} \cdot 50\text{ml}$$

$$V_1 = \frac{2250}{50}$$

$$V_1 = 45 \text{ ml}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR





Sampel lempuyang gajah



proses maserasi



Proses Evaporasi dengan menggunakan alat *rotary evaporator*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Skrining fitokimia



*Lampiran 12. Proses Pengerjaan*



Penimbangan Sampel



Pembuatan Larutan Stok



Pengukuran spektrofotometri

Uv-vis



Pengukuran Blanko

UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hariratul jannah sering dipanggil Rara, lahir di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Juni 1998 merupakan anak tunggal dari pasangan (Alm) Mansur dan Rosmiati lahir di Bulukumba, 12 Juni 1998, Penulis berasal dari Bulukumba, dan sekarang bertempat tinggal di Perumahan Aeropala Residence. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SDN 36 Bontosunggu setelah 6 tahun mengenyam Pendidikan kemudian melanjutkan Pendidikan di Mts 20 Bontosunggu dan melanjutkan di bangku menengah atas yaitu SMAN 7 Bulukumba. Saat ini telah menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. Penulis memiliki hobi menonton dan mendengarkan musik. Motto yang selalu melekat yaitu Jangan pernah berharap kepada manusia melainkan hanya kepada Allah swt karna takdir orang tidak ada yang tertukar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR