

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL FISILOGI PADA
NY''J'' DENGAN GESTASI 39 MINGGU 6 HARI INPARTU KALA III
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU MAKASSAR
TANGGAL 31 JULI 2022**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahli Madya Diploma Kebidanan Jurusan Kebidanan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

INDAH LESTARI SUTRANG

70400119007

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Lestari Sutrang
Nim : 70400119008
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 11 Juni 2000
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 06 Oktober 2022

Penyusun,

Indah Lestari Sutrang
70400119007

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Lestari Sutrang
Nim : 70400119007
Tempat/Tanggal Lahir : Makassar, 11 Juni 2000
Jurusan/Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 06 Oktober 2022

Penyusun,



Indah Lestari Sutrang
70400119007

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Indah Lestari Sutrang
Nim : 70400119007
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny"J"
Dengan Gestasi 39 Minggu 6 Hari Inpartu Kala III Di Puskesmas
Jumandang Baru Makassar Tanggal 31 Juli 2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Agustus 2022

Pembimbing I



Dr.Bdn. Hj. Sitti Salcha, S.Si.T,S.KM, M.Keb
NIP : 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb
NIP : 198903282091032018

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny “J” Dengan Gestasi 39 Minggu 6 Hari Inpartu Kala III Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tanggal 31 Juli 2022”, yang disusun oleh Indah Lestari Sutrang 70400119007, Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Oktober 2022, bertepatan dengan Tanggal 10 Rabiul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Oktober 2022
10 Rabiul Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|--------------|---|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Firdayanti, S.Si', M.Keb | (.....) |
| Pembimbing 1 | : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., S.KM., M.Keb | (.....) |
| Pembimbing 2 | : Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb | (.....) |
| Penguji 1 | : A. Dian Diarfah, S.Psi., M.Psi, Psikolog | (.....) |
| Penguji 2 | : Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil,, alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny”J” Dengan Gestasi 39 Minggu 6 Hari Inpartu Kala III Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tanggal 31 Juli Tahun 2022”**. Karya Tulis Ilmiah ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan dapat terselesaikan. Shalawat dan taslim juga tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini sehingga penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A,Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III dan IV.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan I, II dan III.
3. Ibu Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Hj Sitti Saleha, S.SiT.,S.KM.,M.Keb selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing dengan ikhlas dan sabar,

senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta memberikan saran kepada penyusun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

5. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST.,M.Keb sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya demi membantu, membimbing dengan ikhlas dan sabar, senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat, serta memberikan arahan sehingga dapat membangun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Ibu A. Dian Diarfah, S.Psi.,M.Psi, psikolog selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan kebidanan.
9. Direktur Puskesmas Jumpang Baru dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Ucapan yang tak ternilai harganya untuk Ayahanda Alm.Sutrang Haris, bapak Effendi, dan Ibunda Nursanti Hakim tercinta atas doa, dukungan serta pengorbanannya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
11. Kepada keluarga tercinta Rajawang Hakim, M.Ag dan Muhsin Hakim, S.Pd selaku orang tua sekaligus wali selama penulis menempuh pendidikan, yang telah

senantiasa memberikan bantuan material, moral dan dukungan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.

12. Kepada saudaraku tercinta Megawati Sutrang, S.KM serta adik-adik saya yang telah banyak membantu dan mendoakan penulis dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
13. Kepada teman saya yang tidak bisa saya sebutkan yang telah membantu saya baik dari segi pikiran, dukungan, partisipasi, moral, serta material dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

Niat yang baik dari hati akan mendapatkan hasil yang baik pula, dari Umar radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda *“Innamal a’maalu bin niyyah”*, kalimat itulah yang selalu menjadikan pedoman bagi penulis agar menjadi lebih semangat meskipun dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak menemui beberapa hambatan dan kesalahan, namun penulis berharap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Akhir kata penulis ucapkan Jazakallah semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, 6 Oktober 2022

Penulis

Indah Lestari Sutrang

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I..... | 4 |
| PENDAHULUAN..... | 4 |
| A. Latar Belakang..... | 4 |
| B. Ruang Lingkup..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II..... | 14 |
| PEMBAHASAN..... | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Persalinan Kala III..... | 19 |
| C. Tinjauan Islam Tentang Penciptaan Manusia..... | 35 |
| D. Konsep Dasar Asuhan Manajemen Kebidanan..... | 39 |
| BAB III..... | 49 |
| STUDI KASUS..... | 49 |
| A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar..... | 49 |
| B. Langkah II : Menetapkan Diagnosa/Masalah Aktual..... | 55 |

| | |
|---|------------|
| C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial | 55 |
| D. Langkah IV : Tindakan Segera/Emergency | 57 |
| E. Langkah V : Intervensi | 57 |
| F. Langkah VI : Tindakan Segera/Kalaborasi | 62 |
| G. Langkah VII : Evaluasi..... | 66 |
| BAB IV | 103 |
| PEMBAHASAN | 117 |
| 1. KALA III | 117 |
| A. Langkah I Identifikasi data dasar | 117 |
| B. Langkah II Menetapkan Diagnosa/Masalah Aktual | 122 |
| C. Langkah III Mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Potensial | 124 |
| D. Langkah IV Tindakan Segera/Emergensi..... | 126 |
| E. Langkah V Intervensi | 127 |
| F. Langkah VI Tindakan Segera/Kalaborasi | 131 |
| G. Langkah VII Evaluasi..... | 132 |
| 2. Kunjungan Masa Nifas..... | 136 |
| 1. Kunjungan nifas II tanggal 01 Agustus 2022, pukul 08.00 wita..... | 136 |
| 2. Kunjungan nifas III hari ke-6 tanggal 10 Oktober 2022, pukul 15.05 wita... | 138 |
| 3. Kunjungan nifas IV hari ke-14 tanggal 20 Agustus 2022, pukul 10.00 wita | 139 |
| 4. Kunjungan nifas V hari ke-28 tanggal 30 Agustus 2022, pukul 15.30 wita.. | 141 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| BAB V..... | 144 |
| PENUTUP..... | 144 |
| A. KESIMPULAN..... | 144 |
| B. SARAN..... | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | 148 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 : Partograf Kasus (Halaman Depan)..... | 114 |
| Gambar 2.2 : Partograf Kasus (Halaman Belakang)..... | 115 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1 : Riwayat Kehamilan Dan Persalinan Yang Lalu..... | 51 |
| Tabel 2 : Evaluasi Dan Stimulasi Jumlah Kehilangan Darah..... | 76 |
| Tabel 3 : Tanda-Tanda Vital Pasca Persalinan..... | 77 |
| Tabel 4 : Matriks Kunjungan..... | 103 |



ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2022

Indah Lestari Sutrang, 70400119007

Supervisor I : Hj. Sitti Saleha

Supervisor II : Zulna Yuni Andryani

“Management of Physiology Intranatal Midwifery Care for Mrs. “J” on the Gestational Period of 39 Weeks and 6 Days with the 3rd Stage of Inpartu at Jumpandang Baru Health Center, July 31st, 2022”

The third stage of labor is the 3rd stage, namely the birth of the baby and the release of the placenta and the amniotic membranes. Active management of the third stage is the management on the expulsion of the placenta. In most cases, the maternal morbidity and mortality in Indonesia were caused by uterine atony and retained placenta. However, these issues could actually be prevented by enhancing the active management of the third stage.

The major purpose of this research was to conduct the physiology intranatal midwifery care management of the third stage at the Jumpandang Health Center in Makassar. In this research, the 7-stage of Varney management approach was employed in accordance with proper procedure based on the competence and authority of the midwives.

The findings of this research indicated that there were no particular obstacles found during the process of treatment given to Mrs “J” with the third stage of labor. The patient experienced a normal lower abdominal pain and pains in the perineum on day 1. However, on the next monitoring day, the patient had no complaints, and there were no complications found.

This study concluded that the research was conducted based on the mentioned approach and SOAP procedure, and it revealed that from the third stage to the fourth stage there were no obstacles and complications found in both the mother and fetus. The condition of both the mother and the baby was generally good where their vital signs were within normal limits.

Key Words: Pregnancy, Stage III, Health Center, 7-stage of Varney



ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2022

Indah Lestari Sutrang, 70400119007

Pembimbing I : Hj.Sitti Saleha

Pembimbing II : Zelna Yuni Andryani

“Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny”J” Dengan Gestasi 39 Minggu 6 Hari Inpartu Kala III Di Puskesmas Jumpandang Baru Tanggal 31 Juli 2022”

Kala III persalinan merupakan kala uri yaitu lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Manajemen aktif kala III merupakan penatalaksanaan pengeluaran plasenta, sebagian besar kasus kesakitan dan kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala III.

Untuk menerapkan penatalaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada kala III di puskesmas jumpandang baru makassar dengan menggunakan pendekatan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.

Hasil studi kasus yang dilakukan pada Ny “J” dengan Inpartu kala III tidak ditemukan hambatan pada saat perlangsungan kala III. Selama penelitian ditemukan ibu mengalami nyeri perut bagian bawah, nyeri pada bagian perineum di hari 1, pada pemantauan selanjutnya ibu sudah tidak ada keluhan dan tidak terjadi komplikasi lain.

Kesimpulan dari studi kasus dengan manajemen asuhan 7 langkah varney dan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yakni dari kala III hingga kala IV semuanya berlangsung normal tanpa ada penyulit, tidak ditemukannya komplikasi atau masalah pada janin dan ibu, serta keadaan ibu dan bayi baik yang ditandai dengan tanda-tanda vital dalam batas normal.

Kata kunci : Persalinan, kala III, puskesmas, 7 langkah varney

UIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persalinan dan kelahiran merupakan hal fisiologi yang akan di alami oleh ibu. Namun walaupun hal tersebut hal yang fisiologis akan tetapi bisa saja membuat ibu merasa cemas karena pada saat proses persalinan akan mengalami kesakitan yang luar biasa (Hernawati, 2018).

Menurut WHO (2019) Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan yang di jadikan indikator derajat kesehatan perempuan. Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu target Global Sustainable Development Goals (SDGs) dalam menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Menurut Data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002-2007 menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007-2012. Angka Kematian Ibu (AKI) berubah dan mengalami penurunan pada tahun 2012-2015 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dan jumlah kematian ibu di indonesia pada tahun 2019 sebanyak 4.221 kasus (Kemenkes RI, 2019).

Dalam proses persalinan dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu kala I, kala II, kala III, dan kala IV pada saat proses persalinan ini bisa saja terjadi penyulit atau

komplikasi salah satunya pada proses Kala III. Komplikasi yang bisa saja muncul pada proses kala III seperti perdarahan yang diakibatkan oleh retensio plasenta, atonia uteri, dan juga inversio uteri.

Angka Kematian Ibu (AKI) karena bersalin di Indonesia masih tinggi. Sebagian Besar kasus perdarahan pada persalinan terjadi selama persalinan kala III. Diperkirakan ada 14.000.000 kasus perdarahan dalam kehamilan paling sedikit 128.000 perempuan mengalami perdarahan sampai meninggal.

Sebagian kematian tersebut terjadi dalam waktu empat jam setelah melahirkan dan Merupakan akibat dari masalah yang timbul selama persalinan kala III. Perdarahan pasca persalinan didefinisikan sebagai kehilangan darah sebanyak lebih dari 500 ml setelah kelahiran dan perdarahan pasca persalinan berat didefinisikan kehilangan darah lebih dari 1000 ml (Susiloningtyas, I., & Purwanti, Y).

Kala III persalinan merupakan kala uri yaitu lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Manajemen aktif kala III merupakan penatalaksanaan pengeluaran plasenta, sebagian besar kasus kesakitan dan kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala III (Tanjung, 2019). Maka manajemen aktif kala III merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam upaya menurunkan kesakitan dan kematian ibu yang disebabkan perdarahan pasca persalinan. Hal itu membuat *WHO*

merekomendasikan agar semua tenaga kesehatan yang menolong persalinan baik dokter maupun bidan dapat melaksanakan manajemen aktif kala III.

Penyebab umum terjadinya perdarahan pasca persalinan dini yang berat (yang terjadi 24 jam setelah melahirkan) adalah atonia uteri (kegagalan rahim untuk berkontraksi sebagaimana mestinya setelah melahirkan). Plasenta yang tertinggal, vagina yang robek dan uterus yang turun atau *inversio* juga merupakan sebab dari perdarahan pasca persalinan.

Manajemen aktif kala III telah dilaksanakan secara rutin dalam pengelolaan persalinan kala III. Namun menuai kontroversi karena bertentangan dengan filosofi kebidanan dan tidak semua wanita mempunyai nilai dan filosofi yang sama. Pada beberapa wanita menginginkan persalinan yang alamiah tanpa intervensi apapun, termasuk pemberian obat-obatan.

Tujuan manajemen aktif kala III adalah untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu pada kala III, mencegah perdarahan, dan mengurangi kehilangan darah kala III persalinan. Manajemen aktif kala III terdiri dari tiga langkah utama yaitu pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir, melakukan penegangan tali pusat terkendali, dan masase fundus uteri (Rohani dkk, 2011). Disamping pemberian suntikan oksitosin 10 IU secara *intramuskuler*, oksitosin alamiah dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelahiran plasenta yang cepat dan efektif. Oksitosin alamiah tersebut dapat diperoleh dari rangsangan puting susu dengan *IMD* maupun dengan pemilinan pada puting susu ibu. Rangsangan puting susu

akan menyebabkan sel-sel mioepitel sekitar alveoli di dalam kelenjar mammae memberikan refleksi neurogenik kemudian dihantarkan ke *hipotalamus*, lalu memicu *hipofise posterior* untuk mengeluarkan hormon oksitosin ke dalam darah menimbulkan kontraksi miometrium untuk melepas plasenta (Prawirohardjo, 2011).

Risiko yang dialami ibu selama proses persalinan tidak hanya di fase kala I atau II, bahkan setelah bayi sudah keluar dari rahim ibunya risiko tersebut mengancam kehidupan seorang ibu. Jika pada proses kala III atau tahap pengeluaran plasenta mengalami perlambatan kemungkinan ibu dikatakan mengalami retensi plasenta yang selanjutnya 2 menyebabkan ibu berisiko mengalami perdarahan yang melebihi batas normal (Manurung, 2011). Tahap ketiga atau kala III persalinan merupakan periode lahirnya bayi sampai plasenta, akan tetapi komplikasi dapat terjadi walaupun plasenta sudah dilahirkan. Tingkat kehilangan darah sepanjang tahap ini dipengaruhi oleh seberapa cepat kontraksi otot rahim dan plasenta dalam memisahkan diri dari dinding rahim. Menurut Sukarni & ZH, (2013) perdarahan dianggap patologis apabila jumlahnya melebihi dari 500 mL.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu dapat dilihat dari indikator angka kematian ibu. Menurut World Health Organisation (*WHO*) wanita berusia 15 sampai 49 tahun sekitar 600.000 meninggal dunia setiap tahunnya karena mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan. Kematian ibu di Negara berkembang pada

tahun 2015 adalah 239 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan di Negara maju jauh lebih rendah yaitu 12 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rekam Medik puskesmas Jumpandang Baru Makassar menunjukkan jumlah persalinan pada periode 2019 yaitu 428 ibu bersalin, pada tahun 2020 terdapat 179 ibu bersalin pada tahun 2021 terdapat 86 ibu bersalin. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ibu dengan kasus persalinan kala III cukup banyak.

Berdasarkan latar belakang di atas yang menunjukkan bahwa masih tinggi kemungkinann ibu mengalami komplikasi pada masa persalinan yaitu pada kala III, maka penulis tertarik untuk menggunakan metode pendekatan “Manajemen Asuhan Kebidanan pada kala III di Puskesmas Jumpdang Baru Makassar”.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Jumpang Baru Makassar. Subjek pada penelitian ini adalah ibu bersalin dan objek manajemen asuhan kebidanan intranatal pada kala III.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menerapkan penatalaksanaan manajemen asuhan kebidanan pada kala III di puskesmas jumpandang baru makassar dengan menggunakan pendekatan manajemen 7 langkah Varney sesuai dengan kompetensi dan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Dilaksanakannya pengkajian dan analisa data pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- b. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah aktual pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- c. Dirumuskannya untuk menganalisa dan menginterpretasikan data untuk menegakkan diagnosis atau masalah potensial pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- d. Diidentifikasi perlunya tindakan segera atau kolaborasi pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- e. Ditetapkannya rencana tindakan asuhan kebidanan pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- f. Dilaksanakannya tindakan asuhan kebidanan pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- g. Dilakukannya evaluasi hasil asuhan kebidanan pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.
- h. Didokumentasikannya semua hasil temuan dan tindakan asuhan kebidanan pada kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penyusunan pada kala III tersebut diatas adalah:

1. Manfaat praktis Menjadikan sumber informasi untuk penentuan kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan maupun pihak Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dalam membuat perencanaan pelaksanaan dan evaluasi terhadap kejadian aktif kala III.
2. Manfaat ilmiah pada hasil penelitian dalam bentuk asuhan tersebut dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kebidanan yang berkaitan dengan kala III.
3. Manfaat institusi bahan yang dapat dijadikan acuan bagi institusi pendidikan dalam penerapan proses manajemen asuhan kebidanan pada kala III serta dapat digunakan untuk rekan-rekan mahasiswa kebidanan khususnya dalam penyusunan karya tulis ilmiah berikutnya yang relevan dengan sumber pustaka dan karya tulis ilmiah ini.
4. Manfaat bagi penyusun meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tambahan khususnya dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan pada kala III.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan dasar teori serta perpaduan praktek dengan metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Penyusun mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan profil kesehatan diantaranya buku, artikel, teksbook serta jurnal dan mengakses data melalui internet dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini.

2. Studi kasus

Melaksanakan studi kasus dengan menggunakan metode pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian data, analisis data, rumusan diagnosa atau masalah, perencanaan tindakan, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi untuk menentukan masalah aktual dan potensial, merencanakan tindakan, pelaksanaan asuhan kebidanan pada kala III untuk menghimpun data yang akurat dengan menggunakan teknik :

- a. Anamnesa Penyusun melakukan tanya jawab dengan ibu, suami dan keluarga yang dapat membantu memberikan informasi yang dibutuhkan.
- b. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki (head to toe) yang meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi dan pemeriksaan penunjang (laboratorium).
- c. Pengkajian psikososial pengkajian status emosional, pola interaksi ibu terhadap keluarganya, tetangga, petugas kesehatan lingkungannya dan pengetahuan tentang kesehatan, respon terhadap keadaan yang dialami.

- d. Studi dokumentasi studi ini dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan bidan, dokter, petugas, laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini.
- e. Diskusi melakukan tanya jawab dengan tenaga kesehatan yakni dokter maupun bidan yang menangani langsung klien tersebut serta berdiskusi dengan dosen pembimbing karya tulis ilmiah.

F. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah yang mengungkap mengenai persalinan normal dengan memberikan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan pustaka membahas mengenai teori berdasarkan judul yaitu mengenai persalinan yang terdiri dari, pengertian, bentuk-bentuk persalinan, patofisiologi persalinan, tanda-tanda mulainya persalinan, sebab– sebab mulainya persalinan, tujuan asuhan persalinan,tahap-tahap dalam proses persalinan, mekanisme persalinan, tinjauan umum tentang fisiologi kala III, tujuan manajemen aktif kala III, keuntungan-keuntungan manajemen aktif kala III, mekanisme pelepasan plasenta, pelepasan plasenta, penatalaksanaan aktif kala III, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab III: Studi kasus membahas mengenai langkah I. identifikasi dan analisa data dasar, langkah II. identifikasi diagnosa/masalah aktual, langkah III. identifikasi diagnosa/masalah potensial, langkah IV. tindakan emergency,

konsultasi, kolaborasi dan rujukan, langkah V. intervensi/rencana tindakan asuhan kebidanan, langkah VI. implementasi/pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan, langkah VII. evaluasi tindakan asuhan kebidanan, pendokumentasian asuhan kebidanan.

Bab IV: Membahas mengenai persamaan, perbedaan atau kesenjangan dalam studi kasus yang sedang dilakukan pengkajian.

Bab V: Kesimpulan dan saran antara kasus yang diteliti terhadap teori yang telah dibahas pada bab II, dan pada bagian ini juga menjawab tujuan penelitian dan terakhir bab V membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap pihak yang terkait pada kasus yang diteliti

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

1. Pengertian Persalinan

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi (janin dan plasenta) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). Proses ini di mulai dengan adanya kontraksi persalinan sejati, yang di tandai dengan perubahan serviks secara progresif dan di akhiri dengan kelahiran plasenta (Eka & Kurnia, 2014:2).

Persalinan adalah proses pengeluaran hasil kontrasepsi berupa janin dan plasenta yang sudah cukup bulan yaitu usia kehamilan 37 sampai 42 Minggu dan dapat hidup diluar kandungan baik dengan bantuan atau tanpa bantuan persalinan normal adalah proses pengeluaran janin yang telah cukup bulan lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung 18 jam tanpa komplikasi pada ibu maupun janin.

Persalinan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dimana angka kematian ibu bersalin yang cukup tinggi. Keadaan ini disertai dengan komplikasi yang mungkin saja timbul selama persalinan, sehingga memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam bidang kesehatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan

angka kematian, kesakitan ibu dan perinatal. Persalinan sampai saat ini masih merupakan masalah dalam pelayanan kesehatan. Hal ini diakibatkan pelaksanaan dan pemantauan yang kurang maksimal dapat menyebabkan ibu mengalami berbagai masalah, bahkan dapat berlanjut pada komplikasi (Purwandari Atik, dkk, 2014).

Persalinan merupakan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu). Lahir dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 18 jam, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janin (Indrayani & Djami, 2013).

2. Tanda-tanda mulainya persalinan

a. His / kontraksi

His atau kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan menimbulkan ketidaknyamanan serta kadang-kadang nyeri merupakan tanda persalinan yang sebenarnya kalau his tersebut berlanjut terus dan semakin meningkat frekuensinya.

b. Bloody show

Bloody show diartikan sebagai terlihatnya mukus atau lendir yang mengandung bercak darah dan keluar dari vagina. Lendir tersebut berasal dari serviks dan selama kehamilan berfungsi sebagai sumbatan pelindung. Kemunculannya menunjukkan bahwa serviks sudah mulai berdilatasi.

c. Dilatasi serviks

Dilatasi yang terjadi secara bertahap merupakan indikator yang menunjukkan kemajuan persalinan tersebut disertai dengan kontraksi uterus. Dilatasi serviks diketahui atau dipastikan dengan pemeriksaan pervaginam.

d. Engagement presenting part

Presenting part (yang biasanya kepala janin) akan mengalami “engagement” atau “tertanam” kedalam panggul. Pada primigravida, peristiwa ini terjadi 3–4 minggu sebelum proses persalinan dimulai. Dinding abdomen pada multipara tidak begitu kencang sehingga engagement baru terjadi setelah proses persalinan dimulai (Kuswanti, 2014).

3. Tujuan asuhan persalinan

Salah satu hal penting dalam proses persalinan adalah asuhan intrapartum, yang bertujuan untuk meningkatkan jalan lahir yang aman bagi ibu dan bayi, meminimalkan resiko pada ibu dan bayi, dan meningkatkan hasil kesehatan yang baik dan pengalaman yang positif. Tujuan dari asuhan persalinan normal adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan perilaku koping ibu
- b. Memberikan lingkungan yang aman bagi ibu dan janin
- c. Mendukung ibu dan keluarganya melewati pengalaman persalinan dan melahirkan

- d. Memenuhi keinginan dan pilihan ibu selama persalinan, ketika memungkinkan
- e. Memberikan tindakan rasa nyaman dan meredakan nyeri jika perlu
- f. Memberikan ketenangan dan informasi, yang disertai dengan perhatian terhadap kebutuhan budaya ibu dan keluarga
- g. Untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi bagi ibu dan bayinya (Eka Puspita, 2014).

4. Tahap-tahap dalam proses persalinan

- a. Persalinan kala I adalah kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan nol sampai pembukaan lengkap. Proses ini berlangsung kurang lebih 18–24 jam, yang terbagi menjadi 2 fase yaitu fase laten (8 jam) dan fase aktif (7 jam). Keadaan tersebut dapat dijumpai baik pada primigravida maupun multipara, akan tetapi pada multipara fase laten dan fase aktif terjadi lebih pendek. Berdasarkan kurve fridman, di perhitungkan 15 pembukaan pada primigravida 1 cm/jam dan pembukaan pada multipara 2 cm/jam.
- b. Kala II (pengeluaran) dimulai dari pembukaan 10 cm sampai bayi lahir. Proses ini berlangsung 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multipara
- c. Kala III (pelepasan uri) dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat. Beberapa menit

kemudian uterus berkontraksi lagi untuk melepaskan plasenta dari dindingnya.

- d. Kala IV dimulai dari saat lahirnya placenta sampai 2 jam pertama post partum. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman, dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi (Sumarah, dkk, 2011).

5. Mekanisme persalinan

Mekanisme persalinan normal merupakan gerakan janin dalam menyesuaikan dengan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat kepala melewati panggul. Engagement adalah peristiwa ketika diameter biparietal melewati pintu atas panggul dengan sutura sagitalis melintang/oblig didalam jalan lahir dan sedikit fleksi. Penurunan dimulai sebelum onset persalinan atau inpartu. mendukung antara lain, tekanan cairan amnion, tekanan langsung fundus pada bokong janin kontraksi otot abdomen.

Fleksi gerakan fleksi disebabkan karena janin terus didorong maju, tetapi kepala janin terhambat oleh serviks, dinding panggul atau dasar panggul. Putaran paksi dalam adalah pemutaran bagian terendah janin dari posisi sebelumnya kearah depan sampai di bawah symphysis. Ekstensi merupakan gerakan dimana oksiput berhimpit langsung pada margo inferior symphysis pubis. Penyebabnya dikarenakan sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah ke depan dan atas, sehingga kepala menyesuaikan dengan cara

ekstensi agar dapat melaluinya. Putaran paksi luar di pengaruhi oleh faktor-faktor panggul, sama seperti pada putaran paksi dalam. Putaran paksi luar merupakan gerakan memutar ubun-ubun kecil kearah punggung janin, bagian belakang kepala berhadapan dengan tuber isciadikum kanan atau kiri, sedangkan muka janin menghadap ke salah satu paha ibu.

Ekspulsi setelah terjadinya rotasi luar, bahu depan berfungsi sebagai *hypomochlion* untuk kelahiran bahu belakang. Kemudian setelah kedua bahu lahir disusul lahirlah trochanter depan dan belakang sampai lahir janin seutuhnya. Gerakan kelahiran bahu depan, bahu belakang dan badan seluruhnya (Kuswanti, dkk, 2014).

B. Tinjauan Umum Tentang Asuhan Persalinan Kala III

1. Fisiologi Kala III

Dimulai sejak lahir bayi sampai lahirnya plasenta atau uri yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Rata-rata kala III berkisar 6-15 menit setelah bayi lahir dan keluar spontan atau dengan adanya tekanan pada fundus uteri, baik pada primipara maupun multipara. Tempat implantasi plasenta sering pada dinding depan dan belakang korpus uteri atau lateral. Serta sangat jarang pada fundus uteri. Setelah bayi lahir uterus akan teraba keras dengan fundus akan setinggi pusat beberapa menit kemudian uterus akan berkontraksi untuk melepaskan plasenta dari tempat implantasinya. Pengeluaran akan disertai dengan pengeluaran darah serta akan mengalami pengerutan akibat

kavim uteri dan kontraksi lanjutan sehingga plasenta dilepaskan dari perlekatannya dan pengumpulan darah pada ruang utero-plasenter akan mendorong plasenta keluar.

Kala III Data kala III terdiri atas lama kala III, pemberian oksitosin, peregangan tali pusat terkendali, masase uterus, plasenta lahir lengkap, plasenta tidak lahir >30 menit, laserasi, atonia uteri, jumlah perdarahan, masalah penyerta, penatalaksanaan dan hasilnya (Sulfiana, 2014).

Persalinan kala III merupakan bagian dari proses persalinan yang tidak bisa di pandang sebelah mata karena Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi salah satunya adalah perdarahan sebesar (42%) dimana sebagian besar disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta (Dwi Kurniasih, 2021).

Penyebab *AKI* di Indonesia yaitu perdarahan saat persalinan, kala III terbukti mengurangi perdarahan, kala III yaitu suntik oksitosin 1 menit setelah bayi lahir ketika tidak ada janin ke dua, penegangan tali pusat terkendali, masase fundus uteri setelah plasenta lahir, dengan kala III dapat mengurangi perdarahan namun, penelitian lain menyebutkan masase fundus uteri sebelum plasenta lahir dapat mengurangi kehilangan darah, waktu pengeluaran plasenta berpengaruh terhadap pengeluaran darah (Alviani et al., 2018).

Kala III merupakan masa setelah lahirnya bayi dan berlangsungnya proses pengeluaran plasenta. Manajemen aktif kala tiga adalah penatalaksanaan secara aktif pada kala tiga (pengeluaran aktif plasenta) untuk membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca persalinan. (Eniyati, 2012).

Berdasarkan teori yang didapatkan asuhan persalinan kala III dimulai segera setelah bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah bayi lahir uterus teraba keras dengan fundus uteri agak di atas pusat untuk melepaskan plasenta dari dindingnya. Tanda-tanda terlepasnya plasenta yaitu perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vulva, semburan darah tiba-tiba.

Manajemen aktif kala III merupakan penatalaksanaan pengeluaran plasenta, sebagian besar kasus kesakitan dan kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta yang sebenarnya dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala III (Wiknjastro, 2008).

2. Tujuan Manajemen Aktif Kala III

Tujuan manajemen aktif kala III yaitu untuk menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif, mencegah perdarahan.

Tujuan manajemen aktif kala III (Eniyati, 2012) yaitu :

- a. Mengupayakan kontraksi uterus yang adekuat dari uterus dan mempersingkat waktu kala III.
- b. Mengurangi jumlah kehilangan darah.
- c. Menurunkan angka kejadian retensio plasenta. Menghasilkan kontraksi uterus yang lebih efektif.
- d. Membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

3. Keuntungan-keuntungan manajemen aktif kala III

Keuntungan dari manajemen kala III yaitu persalinan kala III lebih singkat, mengurangi kehilangan darah, dan mengurangi kejadian retensio plasenta.

- a. Memperpendek waktu persalinan kala III
- b. Mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan
- c. Mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta atonia uteri adalah suatu kondisi dimana miometrium tidak dapat berkontraksi segera setelah bayi lahir (Eniyati, 2012).

4. Mekanisme pelepasan plasenta

Mekanisme Pelepasan Plasenta Menurut Asrinah, dkk (2010) penyebab terpisahnya plasenta dari dinding uterus adalah kontraksi uterus (spontan atau dengan stimulasi) setelah kala dua selesai. Berat plasenta mempermudah terlepasnya selaput ketuban, yang terkelupas dan dikeluarkan. Tempat perlekatan plasenta menentukan kecepatan pemisahan dan metode ekspulsi plasenta. Selaput ketuban dikeluarkan dengan penonjolan bagian ibu atau bagian janin.

Pada kala III, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan plasenta menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari

dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah janin lahir, uterus mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan permukaan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta akan lepas dari tempat implantasinya.

Setelah lahir bayi, uterus masih mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Hal ini mengakibatkan plasenta lepas dari tempat implantasinya.

a. Macam-macam pelepasan plasenta:

- 1) Metode *Schulze* Pelepasan dimulai pada bagian tengah (sentral) dari plasenta dan akan terjadi *hematoma* retro plasenta yang selanjutnya mengangkat plasenta dari dasarnya. Plasenta dengan hematoma bagian atas akan jatuh ke bawah dan akan menarik selaput plasenta. Bagian plasenta yang akan muncul pada vulva adalah permukaan *fetal*, sedangkan hematoma terdapat dalam kantong yang terputar balik. Maka saat pelepasan plasenta secara *schultze* tidak akan terjadi perdarahan sebelum plasenta lahir atau sebagian terlepas seluruhnya, setelah plasenta lahir akan ada darah menggumpal mengalir. Pelepasan plasenta dengan metode *schultze* adalah cara yang paling banyak ditemui dalam proses kala uri.
- 2) Metode *duncan* plasenta lepas mulai dari bagian pinggir (marginal) yang ditandai dengan adanya perdarahan dari vagina apabila plasenta sudah

mulai terlepas. Umumnya perdarahan tidak melebihi 400ml (Kuswanti & Melina,2014: 120).

Darah yang mengalir keluar antara selaput janin dan dinding uterus, perdarahan ini telah terjadi sejak sebagian dari plasenta dan akan berlangsung sampai seluruh 14 plasenta lepas. Pelepasan secara Duncan akan terjadi pada plasenta letak rendah (Eniyati dan Sholihah, 2013:132).

5. Kala III (Pelepasan Plasenta) .

1. Tanda-tanda pelepasan plasenta

a. Perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uterus

Setelah bayi lahir dan sebelum myometrium mulai berkontraksi, uterus berbetuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat (Tando, 2015:98). Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus yang semula discoid menjadi glober (bundar) akibat dari kontraksi uterus dan fundus berada di atas pusat (Kuswanti dan Melina, 2013: 120).

b. Semburan darah tiba-tiba

Darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dengan adanya gaya gravitasi. Apabila *retroplasenter pooling* dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas maka *retroplasenter* akan pecah, sehingga terjadi semburan darah dari tepi plasenta yang terlepas.

Tanda ini tampak dalam waktu satu menit setelah bayi lahir sampai lima menit (Tando, 2015: 98).

c. Tali pusat memanjang

Tali pusat akan tampak menjulur keluar melalui vulva (Tando, NM: 2015:99). Hal ini karena plasenta turun ke segmen uterus yang lebih bawah atau rongga vagina (Kuswanti dan Melina, 2013: 121).

d. Perubahan posisi uterus

Setelah plasenta lepas dan menempati segmen bawah Rahim, maka uterus muncul pada rongga abdomen (uterus naik di dalam abdomen) (Kuswanti dan Melina, 2013: 121).

6. Penatalaksanaan Aktif Kala III

Manajemen aktif kala tiga adalah penatalaksanaan secara aktif pada kala III (pengeluaran aktif plasenta) untuk membantu menghindari terjadinya perdarahan pasca persalinan (Eniyati, 2012).

Manajemen aktif kala III merupakan tahap yang berbahaya bagi ibu karena dapat menyebabkan perdarahan postpartum yang menjadi penyebab kematian ibu. Kesalahan dalam penatalaksanaan dapat meningkatkan terjadinya perdarahan.

a. Penatalaksanaan Kala III

Penatalaksanaan kala III harus dilakukan dengan benar sesuai protap, karena hal ini dapat menekan angka kematian ibu secara bermakna. Kesalahan penatalaksanaan kala III adalah penyebab utama perdarahan

yang dapat menyebabkan kematian pada ibu bersalin. Apabila penatalaksanaan kala III tidak dilakukan dengan benar misalnya keterlambatan dalam menyuntikan oksitosin dan masase uteruse yang tidak sesuai protap maka bisa menyebabkan uterus tidak berkontraksi dengan baik sehingga menyebabkan atonia uteri (Sarwono, 2017).

Pendarahan merupakan penyebab utama kematian ibu di Asia Tenggara dengan Prevalensi 29,9% dari total kasus. Kejadian pendarahan postpartum sekitar 23,1%, pendarahan antepartum 4,7% dan pendarahan intrapartum 2,1%. Semua dikarenakan sebagian besar negara di Asia Tenggara adalah negara yang sedang berkembang (Sarwono, 2017).

Penatalaksanaan manajemen kala III dapat mencegah terjadinya kasus perdarahan pasca persalinan yang disebabkan oleh atonia uteri dan retensio plasenta. Syarat manajemen aktif kala III yakni janin tunggal atau memastikan tidak ada lagi janin di uterus. Dengan membuat kontraksi uterus lebih efektif dapat memberi keuntungan di antaranya persalinan kala III lebih singkat, mencegah perdarahan post partum dan menurunkan kejadian retensio plasenta.

Manajemen aktif kala III dalam persalinan terdapat tiga intervensi utama yakni pemberian *uterotonika* setelah kelahiran bayi, penegangan tali pusat terkendali dengan menunggu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta masase fundus uteri :

- 1) Pemberian oksitosin perlu dilakukan pengkajian dengan melakukan palpasi pada abdomen untuk meyakinkan hanya ada bayi tunggal. Pemberian oksitosin secara *intramuscular* pada sepertiga paha bagian luar diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka pemberian oksitosin kedua, evaluasi kandung kemih apakah penuh atau tidak, bila penuh lakukan kateterisasi. Setelah 30 menit belum lahir, maka berikan oksitosin ketiga sebanyak 10 mg dan rujuk pasien (Kuswanti dan Melina Fitria, 2013).
- 2) Oksitosin dan ergometri kedua obat uterotonika tersebut dapat mengurangi perdarahan pada periode postpartum. Berdasarkan penelitian ibu hamil di Nigeria, ditemukan bahwa penggunaan *ergometri* aman untuk klien dengan tekanan darah normal. Pada resiko tinggi seperti riwayat hipertensi tidak dapat diberi ergometri karena ergometri meningkatkan tekanan darah secara bermakna membahayakan jiwa ibu, sebaiknya menggunakan oksitosin untuk lebih aman bagi ibu (Fauziah Yulia, 2012).
- 3) Masase fundus uteri Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase fundus uteri dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memastikan bahwa kotiledon dan selaput plasenta dalam keadaan lengkap dari sisi maternal dan fetal. Masase fundus uteri perlu dilakukan untuk merangsang kontraksi uterus yang adekuat, sehingga perdarahan postpartum yang sering diakibatkan oleh atonia uteri dapat dihindari.

Sedangkan penatalaksanaan manajemen kala III menurut Eniyati (2012) penatalaksanaan manajemen aktif kala III yaitu: pemberian suntikan oksitosin

- a) Letakkan bayi baru lahir diatas kain bersih yang telah disiapkan di perut bawah ibu dan minta ibu atau pendampingnya untuk membantu memegang bayi tersebut.
 - b) Pastikan tidak ada bayi kedua di dalam uterus.
 - c) Beritahu ibu bahwa ia akan di suntik
 - d) Segera dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir suntik oksitosin 10 unit *IM* pada 1/3 bagian atas paha bagian luar.
 - e) Jepit tali pusat dan pemotongan tali pusat.
 - f) Lakukan *IMD* (Inisiasi Menyusui Dini).
 - g) Tutup perut bawah ibu dengan kain bersih.
- b. Placenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan yang manual apabila terjadi sebagai berikut:
- a) Perdarahan lebih dari 400 sampai 500 cc
 - b) Terjadi retensio placenta
 - c) Bersamaan dengan tindakan yang disertai narkosa
 - d) Dari anamnesa terdapat perdarahan habitualis.
- c. Cara pengeluaran selaput janin
- a) Placenta yang telah lahir dipegang selanjutnya selaput ditarik dan dipilinkan seperti tali
 - b) Ditarik dengan klem perlahan – lahan

- c) Dikeluarkan dengan manual
- d. Setelah selaput dan placenta lahir maka akan dilakukan pemeriksaan cermat terhadap:
 - a) Kotiledon yang berjumlah 20 buah
 - b) Permukaan plasenta janin
 - c) Kemungkinan adanya plasenta *suksenturiata* tertinggalnya sebagian jaringan placenta dapat menyebabkan:
 1. Perdarahan perineum yang berkepanjangan
 2. Bahaya infeksi
 3. Terjadi polip plasenta
 4. Degenerasi ganas menjadi kariokarsinom.

7. Pemeriksaan Plasenta

a. Plasenta

Pastikan bahwa seluruh plasenta telah lahir lengkap dengan memeriksa jumlah kotiledon yang rata-rata 15- 20 kotiledon. Periksa dengan seksama pada bagian pinggir plasenta apakah kemungkinan masih ada hubungan dengan plasenta lain (plasenta *suksenturiata*). Amati apakah ada bagian tertentu yang seperti tertinggal atau tidak utuh, jika kemungkinan itu ada maka segera lakukan eksplorasi untuk membersihkan sisa plasenta (Purwoastuti Walyani, 2015).

b. Selaput ketuban

Pada pemeriksaan selaput ketuban setelah plasenta lahir, menilai kelengkapan selaput ketuban untuk memastikan tidak ada bagian yang tertinggal di dalam uterus. Dengan cara meletakkan plasenta diatas tempat yang datar dan pertemukan setiap tepi selaput ketuban sambil mengamati apakah ada tanda-tanda robekan dari tepi selaput ketuban. Jika ditemukan kemungkinan ada bagian yang robek, maka segera lakukan eksplorasi uterus untuk mengeluarkan sisa selaput ketuban karena sisa selaput ketuban atau bagian plasenta yang tertinggal di dalam uterus akan menyebabkan perdarahan dan infeksi (Purwoastuti Walyani, 2015).

c. Tali pusat setelah plasenta lahir

Periksa mengenai data yang berhubungan dengan tali pusat yakni panjang tali pusat, bentuk tali pusat (besar, kecil atau terpilin-pilin), insersio tali pusat, jumlah vena dan arteri pada tali pusat serta adanya lilitan tali pusat (Kuswanti dan Melina Fitria, 2013).

8. Penegangan tali pusat

Yaitu dengan cara satu tangan diletakan pada korpus uterus tepat di atas simfisis pubis, jika menggunakan mangemen aktif kala III tetap tidak ada tanda pelepasan plasenta setelah 15 menit, maka ulangi pemberian oksitosin 10 unit *IM* dosis kedua, dalam jarak waktu 15 menit dari pemberian oksitoksin dosis pertama (Nurasiah et al., 2014).

Menurut Eniyati (2012), Penegangan tali pusat terkendali (*PTT*)

- a. Berdiri disamping ibu.
- b. Pindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva.
- c. Letakkan tangan yang lainnya pada abdomen ibu (beralaskan kain) tepat disimpisis pubis ibu.
- d. Bila ada his dorong ibu untuk meneran lakukan Dorso_kranial sambil melakukan *PTT* (Peregangan tali pusat terkendali) jika tidak berkontraksi lakukan stimulasi puting susu /*IMD*.
- e. Pindahkan klem dekat ke perineum bila tali pusat memanjang. Bila ada his ulangi peregangan tali pusat terkendali dan dorso cranial secara serentak hingga plasenta terlepas dari dinding uterus.
- f. Setelah plasenta terlepas, ajukan ibu untuk meneran agar plasenta terdorong keluar melewati introitus vagina.
- g. Pada saat plasenta terlihat pada introitus vagina, lahirkan plasenta dengan mengangkat tali pusat keatas dan menopang plasenta dan memutar plasenta searah jarum jam sampai plasenta terlepas seluruhnya.
- h. Letakkan plasenta pada tempat yang telah di sediakan.
- i. Massase uterus ibu selama 15 detik dan nilai kontraksi.
- j. Periksa robekan jalan lahir dan nilai perdarahan.
- k. Periksa plasenta apakah telah lahir lengkap dengan memeriksa jumlah kotiledonnya. (rata-rata 20 kotiledon). Robekan pada tepi selaput ketuban, dan pemeriksaan tali pusat. Jika dalam pemeriksaan ada robekan maka

lakukan eksplorasi untuk membersihkan sisa plasenta agar tidak menyebabkan perdarahan dan infeksi.

- l. Periksa robekan jalan lahir dan nilai perdarahan.
- m. Dekontaminasi pasca tindakan.

9. Pemantauan kala III

a. Perdarahan

Jumlah darah diukur, disertai dengan bekuan darah atau tidak. Bila jumlah darah lebih dari 500 cc, segera lakukan penatalaksanaan sesuai faktor penyebab (Tando, 2013:104).

b. Kontraksi uterus

Setelah plasenta terlepas dan lahir, maka uterus akan melakukan kontraksi. Kontraksi harus dipantau sampai kala IV persalinan, jika didapatkan uterus berkontraksi jelek atau bahkan tidak berkontraksi, kemungkinan terjadi atonia uteri sebagai factor terjadinya perdarahan pasca persalinan (Tando, 2013: 104).

c. Robekan jalan lahir dan perineum

Saat melakukan *PTT* saat tidak adanya kontraksi, bidan akan melakukan pengkajian terhadap robekan jalan lahir dan perineum. Pengkajian dilakukan sejak awal sehingga bidan dapat segera menentukan derajat robekan dan teknik jahitan yang tepat yang akan digunakan sesuai kondisi pasien. Bidan memastikan apakah jumlah darah yang keluar

merupakan akibat dari robekan jalan lahir atau karena pelepasan plasenta (Walyani, Purwoastuti, 2015:83).

d. Tanda-tanda Vital

Tekanan darah yakni tekanan *sistolik* dan *diastolik* mulai kembali ke tingkat sebelum persalinan. Nadi yakni secara bertahap meningkat secara perlahan. Pernapasan akan kembali normal dan aktivitas *gastrointestinal*, apabila tidak terpengaruh obat-obatan, motilitas lambung dan absorbs kembali ke aktivitas normal, ibu bersalin yang mengalami mual muntah selama kala III adalah hal yang abnormal (Tando, 2013: 105).

e. *Personal Hygiene*

Menjaga kebersihan tubuh pasien terutama pada daerah genitalia dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi terhadap luka robekan jala lahir dan kemungkinan infeksi intrauterus. Kondisi pasien yang sangat kotor akibat pengeluaran air ketuban, darah, atau feses saat proses kelahiran janin. Saat plasenta telah lahir dan tidak adanya perdarahan, maka segera keringkan bagian bawah pasien dari air ketuban dan darah. Pasang underpad sebagai pengalas bokong yang berfungsi untuk menampung darah. Apabila diperlukan unruk menghitung volume darah, maka dapat dipasangkan bengkok dibagian bokong pasien atau dapat di ketahui dari pemakaian pembalut (Walyani, Purwoastuti, 2015:84).

10. Kebutuhan Ibu Pada Kala III

- a. Dukungan mental dari bidan dan keluarga atau pendamping.
- b. Penghargaan terhadap proses kelahiran janin yang telah dilalui.
- c. Informasi yang jelas tentang keadaan pasien sekarang dan tindakan apa yang akan dilakukan.
- d. Menjelaskan pada pasien yang harus dilakukan untuk membantu mempercepat kelahiran plasenta yakni kapan akan meneran dan posisi apa yang mendukung untuk pelepasan dan kelahiran plasenta.
- e. Merasa nyaman karena terbebas dari bagian bawah yang basah dikarenakan darah dan air ketuban.
- f. Hidariasi (Kuswanti dan Melina, 2013:127).

11. Komplikasi pada kala III persalinan.

- a. Retensio plasenta

Adalah plasenta belum lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir.

Manajemen untuk kasus ini adalah dengan manual plasenta dan segera merujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang memadai.

- b. Atonia uteri

Adalah perdarahan yang terjadi karena miometrium tidak dapat berkontraksi sehingga ujung pembuluh darah di tempat implementasi plasenta tidak dapat dihentikan yang menyebabkan perdarahan tidak terkendali (Indrayani, 2016).

C. Tinjauan Islam Tentang Penciptaan Manusia

Islam sebagai agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan. Persalinan merupakan proses fisiologi yang kemungkinan serangkaian perubahan yang besar pada ibu untuk dapat melahirkan janinnya melalui jalan lahir. Maha Besar Allah yang telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna. Persalinan proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu).

Hal ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Isa a.s, ibu Nabi Isa a.s Maryam mengandung Nabi Isa a.s dalam keadaan ia tidak mempunyai seorang suami dan ia bukan pula seorang pezina. Kebesaran Allah *swt* juga dapat dilihat dalam kisah Nabi Zakariah a.s beliau tidak kunjung mempunyai keturunan setelah 100 tahun usia pernikahannya dengan istrinya yang belum di karunai seorang anak. Atas kebesaran Allah *swt*, beliau mendapatkan keturunan.

Mengenai proses persalinan digambarkan oleh Allah *swt* dalam QS. Maryam/19: 23.

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا أَيُّنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا

Terjemahannya :

Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata “Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan (Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, 2019).

Kata *al-makhadh* berasal dari kata *al-makhdh* yaitu gerakan yang sangat keras. Desakan janin untuk keluar melalui rahim mengakibatkan pergerakan anak dalam perut, dan mengakibatkan kontraksi sehingga menimbulkan rasa sakit. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti sakit yang mendahului kelahiran anak.

Kata *jidz'i an-nakhlah* adalah batang pohon kurma. *Al-Biq'a'i* memahami keberadaan pohon kurma di tempat dan waktu itu sebagai suatu keajaiban. Ini karena ulama tersebut menduga bahwa kelahiran nabi Isa as terjadi di musim dingin, sedangkan kurma hanya berbuah di musim panas, dan sangat sulit bertahan di musim dingin. Selanjutnya ulama tersebut menulis bahwa barangkali beliau sengaja diarahkan ke pohon kurma karena banyak keserasian antara pohon kurma dan proses kelahiran itu. Pohon kurma tidak dapat berbuah kecuali setelah melalui proses perkawinan, sedang disini buahnya berjatuhan tanpa perkawinan dan hanya dengan gerakan yang dilakukan oleh Maryam, persis sama dengan apa yang dialami oleh kelahiran anak Maryam yang tanpa perkawinan itu (M. Quraish Shihab, 2002: 168- 169).

Berdasarkan uraian di atas tentang persalinan dalam pandangan Islam dan teori kesehatan dapat disimpulkan bahwa, ayat ini memberikan gambaran Maha Besar Allah *swt* yang memberikan rasa sakit yang luar biasa yang dirasakan oleh setiap perempuan yang akan melahirkan untuk membantu lahirnya bayi. Rasa sakit tersebut dalam ilmu kesehatan disebut his dalam persalinan. His dalam persalinan terjadi karena adanya kontraksi uterus yang adekuat sehingga

menimbulkan rasa sakit yang hebat pada ibu yang menyebabkan serviks membuka dan mendorong janin ke bawah dan membantu lahirnya bayi. His yang disertai pengeluaran lendir dan darah adalah salah satu tanda dimulainya persalinan. Jadi ayat tersebut memiliki keterikatan dengan pengetahuan khususnya dalam kesehatan yang dipelajari saat ini yaitu setiap ibu hamil pasti akan mengalami rasa sakit yang hebat saat menjelang persalinan dan hal ini telah dijelaskan oleh Allah *swt* jauh sebelum ilmu pengetahuan tentang persalinan ditemukan

Pada proses ini memungkinkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang akan membahayakan nyawa seorang wanita yang bisa menimbulkan kematian. Sebagaimana firman Allah *Sw*t dalam Q.S Al-Fatir/35: 11.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (*Lauh mahfuzh*). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah

adalah mudah (Depertemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2019).

Persalinan merupakan proses yang fisiologis yang terbagi menjadi 4 kala yaitu pertama kala I merupakan kala pembukaan, kala II disebut pula kala pengeluaran, kala III atau kala uri plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan dan kala IV mulai dari lahirnya plasenta dan lamanya 1 jam (Wiknjosastro, 2005: 181).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah swt pasti akan terjadi. Seperti halnya, dalam persalinan kala III tidak kalah pentingnya dari kala I dan II. Kelainan dalam memimpin kala III dapat mengakibatkan kematian karena perdarahan. Kala uri dimulai sejak bayi lahir lengkap sampai plasenta lahir lengkap. Namun hal ini harus ada ikhtiar dan berdo'a kepada Allah swt agar tidak terjadi sesuatu di luar kemampuan kita dengan jalan mengikuti hukumhukum alam yang telah di tetapkan oleh Allah swt.

Kesimpulan dari kedua ayat di atas adalah bahwa Allah swt, telah menciptakan semua ciptaan-Nya dalam keadaan baik, seorang ibu yang mengandung anaknya selama kurang lebih 9 bulan akan merasakan sakit saat melahirkan. Pada saat melahirkan seorang ibu akan merasakan sakit yang luar biasa yaitu nyeri perut tembus belakang yang akan bertambah sakit saat adanya tanda-tanda persalinan sampai lahirnya bayi. Dalam hal ini, bidan sangat berperan penting untuk memberikan asuhan pada ibu seperti pada saat masa

kehamilan menjelaskan pada ibu bahwa pada saat menjelang persalinan akan mengalami rasa sakit perut tembus belakang yang dirasakan oleh semua ibu yang akan melahirkan dan menjelaskan rasa sakit tersebut akan membantu cepatnya bayi lahir. Bukan hanya itu, bidan juga berperan dalam mendeteksi dini apakah ada kelainan atau tidak selama proses kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, bidan harus memberikan asuhan yang komprehensif sesuai dengan kompetensi bidan.

D. Konsep Dasar Asuhan Manajemen Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang di gunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi (Yulifah, 2014: 125).

Manajemen kebidanan merupakan proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan dengan urutan logis dan perilaku yang diharapkan dari pemberi asuhan yang berdasarkan ilmiah, penemuan, dan keterampilan dalam tahapan yang logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien.

2. Langkah-langkah dalam manajemen kebidanan

Langkah-langkah manajemen kebidanan merupakan suatu proses penyelesaian masalah yang menuntut bidan untuk lebih kritis di dalam

mengantisipasi masalah. Ada tujuh langkah dalam manajemen kebidanan menurut Varney yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Langkah I : Identifikasi data dasar

Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan adalah pengakajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap (Manguji, dkk, 2013:5). Data yang dikumpulkan antara lain:

Data secara garis besar diklarifikasikan menjadi data subjektif dan objektif. Data subjektif menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data dasar ibu melalui anamnesa (identitas pasien, riwayat kehamilan sekarang, riwayat menstruasi, riwayat *KB*, riwayat persalinan dan nifas yang lalu, riwayat kesehatan yang lalu dan sekarang, riwayat ekonomi, psikologis dan spiritual serta pola kebiasaan sehari-hari). Sedangkan data objektif menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan yang dilakukan bidan terhadap ibu seperti pemeriksaan penunjang(laboratorium), tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik terfokus (inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi).

Pada kala III pada saat dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien yang meliputi: keadaan umum ibu baik serta kesadaran composmentis. tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik yang terfokus yaitu mata dari hasil pemeriksaan inspeksi kongjungtiva merah muda dan

sklera putih tidak ikhterus. Wajah dari hasil pemeriksaan inspeksi tidak ada cloasma gravidarum dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada oedema.

b. Langkah II: Interpretasi data dasar

Menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan sehingga ditemukan diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada nomenklatur standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan dari hasil pengkajian (Mangkuji, dkk, 2013 : 5).

Pada kala III menginterpretasikan semua data dasar yang telah dikumpulkan, dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu inpartu perlangsungan kala III.

c. Langkah III :Identifikasi diagnosis atau masalah potensial.

Mengidentifikasi masalah atau diagnosis potensial lain berdasarkan rangkaian diagnosis dan masalah yang sudah teridentifikasi. Berdasarkan temuan terjadi. Selain itu, bidan harus bersiap-siap apabila diagnosis atau masalah tersebut benar-benar terjadi (Mangkuji, dkk, 2013 : 5).

Pada kala III langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap siap atau masalah potensial ini benar-benar terjadi. Pada kala

III masalah potensial yang dapat terjadi adalah perdarahan dan retensio plasenta.

d. Langkah IV: Identifikasi kebutuhan yang memerlukan penanganan segera.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Ada kemungkinan, data yang kita peroleh memerlukan tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan, sementara kondisi yang lain masih bisa menunggu beberapa waktu lagi (Mangkuji, dkk, 2013 : 6).

Kala III tindakan segera yang harus dilakukan pada Ny''J'' apabila persalinan kontraksi uterus tidak adekuat atau bahkan uterus gagal pada berkontraksi atau yang disebut dengan atonia uteri maka darah akan terkumpul di uterus terutama di tempat perlekatan plasenta yang selanjutnya berisiko terjadi perdarahan. Jika risiko tersebut tidak segera diatasi maka akan terjadi perdarahan melebihi batas yang disebut dengan perdarahan pascapersalinan. adapun plasenta tidak lahir spontan dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir. pada keadaan ini, perlu dilakukan tindakan manual plasenta. retensio plasenta dapat menyebabkan perdarahan postpartum.

e. Langkah V: Perencanaan asuhan yang menyeluruh.

Direncanakan asuhan yang menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah-langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak

hanya meliputi hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi dilihat juga dari apa yang akan diperkirakan terjadi selanjutnya, apakah dibutuhkan konseling dan apakah perlu merujuk klien. Setiap asuhan yang direncanakan harus disetujui oleh kedua pihak, yakni bidan dan pasien (Mangkuji, dkk, 2013 : 6).

Pada kasus kala III rencana asuhan yang diberikan yaitu mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital, observasi *TFU*, kontraksi uterus dan pengeluaran lochia, observasi tanda-tanda komplikasi kala III untuk menghindari perdarahan yaitu: melaksanakan manajemen aktif kala III, meliputi melakukan palpasi abdomen untuk memastikan kehamilan tunggal: tidak terdapat janin kedua. Memberitahu ibu bahwa akan di suntik untuk mempercepat lahirnya ari-ari sehingga tidak terjadi perdarahan: Melakukan penyuntikan oksitosin 10 IU secara *intramuscular*, di suntik pada 1/3 bagian luar paha kanan ibu. Melakukan Penegangan tali pusat terkendali. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Meletakkan tangan kiri diatas *symphysis* menahan bagian bawah uterus, sementara tangan kanan memegang tali pusat menggunakan klem dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Saat uterus berkontraksi menegangkan tali pusat ke arah bawah dengan tangan kanan, sementara tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atas secara hati-hati untuk mencegah inversio uteri. Melakukan penegangan dan dorongan dorso-cranial hingga plasenta

terlepas, kemudian meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir. Setelah plasenta tampak pada vulva, plasenta di pegang dengan kurve jalan lahir hingga plasenta tampak pada vulva. Pada kedua tangan di putar searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput plasenta. Plasenta lahir lengkap dan diberikan injeksi metergin 1 ampul untuk mencegah terjadinya perdarahan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, melakukan masase uterus dengan telapak tangan secara sirkuler \pm 15 detik searah jarum jam dengan gerakan melingkar dengan lembut sehingga uterus berkontraksi tinggi fundus uteri setinggi pusat dan nilai perdarahan. Menganjurkan keluarga untuk memberikan minum kepada ibu serta menjelaskan pada ibu bahwa mules yang di alaminya adalah normal: kontraksi uterus baik dan perdarahan \pm 100 cc. Memeriksa kelengkapan plasenta: Letakkan plasenta di atas permukaan datar periksa tali pusat dan panjangnya. Pegang tali pusat dengan tangan, angkat plasenta dan periksa robekan selaput plasenta dan kembalikan ke tempatnya. Buka plasenta ke arah luar, periksa adanya pembuluh darah atau lobus tambahan. Pisahkan amnion dan korion, tarik amnion ke arah belakang melewati dasar tali pusat. Balik plasenta sehingga permukaan maternal berada di atas. Periksa kelengkapan kotiledon dan ukurannya. Plasenta lengkap, selaput amnion/korion lengkap, 20 kotiledon.

f. Langkah VI: Pelaksanaan

Melaksanakan rencana asuhan yang sudah dibuat pada langkah ke-5 secara aman dan efisien. Kegiatan ini bisa dilakukan oleh bidan atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri, bidan tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Dalam situasi ini, bidan harus berkolaborasi dengan tim kesehatan lain atau dokter. Dengan demikian, bidan harus bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan yang menyeluruh yang telah dibuat bersama tersebut (Manguji, dkk, 2013 : 6).

Pada kasus kala III disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pada langkah kelima. Dilaksanakan secara efisien dan aman. data objektif keadaan ibu baik, kontraksi uterus baik dan perdarahan tidak melebihi batas normal, dan plasenta lahir lengkap.

g. Langkah VII: Evaluasi

Melakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan, untuk menilai apakah sudah benar-benar terlaksana atau terpenuhi sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam masalah dan diagnosis. Mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui mengapa proses manajemen ini tidak aktif (Manguji, dkk, 2013: 6).

Evaluasi yang dapat dilakukan pada kala III mengevaluasi kembali dari asuhan yang telah diberikan.

3. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

Dokumentasi adalah catatan tentang interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga pasien, dan tim kesehatan tentang hasil pemeriksaan, prosedur tindakan, pengobatan pada pasien, dan respon pasien terhadap semua asuhan yang telah diberikan (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010: 38-39).

Pendokumentasian yang benar adalah mengenai asuhan yang telah dan akan dilakukan pada seorang pasien, didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis dalam menghadapi langkah-langkah manajemen kebidanan. Menurut *Varney*, alur berpikir bidan saat merawat klien meliputi tujuh langkah. Pendokumentasian atau catatan asuhan kebidanan dapat diterapkan dengan menggunakan metode SOAP.

Menurut *Varney*, alur berpikir bidan saat merawat klien meliputi tujuh langkah. dengan tujuan untuk mengetahui apa yang telah dilakukan bidan melalui proses berpikir sistematis, dokumentasi dibuat dalam bentuk SOAP sebagai berikut:

S: Subjektive (data subyektif)

Data subyektif (S) adalah pendokumentasian manajemen kebidanan menurut *Helen Varney* langkah pertama adalah pengkajian data, terutama data yang diperoleh melalui anamnesis, berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhannya yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang

akan berhubungan langsung dengan diagnosis (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010: 39).

O: Data Objektif

Data yang berhubungan dengan pengkajian, terutama yang di peroleh dari hasil observasi yang jujur dari pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lain. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat di masukkan dalam data objektif. Data tersebut dapat sebagai bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis (Saminem, 2010: 45).

A: Assessment

Pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi dari data subjektif dan objektif. Sehingga mencakup hal-hal berikut ini diagnosis atau masalah kebidanan, diagnosis atau masalah potensial serta perlunya mengidentifikasi kebutuhan tindakan segera harus diidentifikasi menurut kewenangan bidan, meliputi tindakan mandiri, tindakan kolaborasi dan tindakan merujuk klien. Assessment merupakan manajemen kebidanan menurut Helen Varney yang merupakan langkah II, III dan IV (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010: 42).

P: Planning

Planning atau perencanaan adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencanan asuhan disusun berdasarkan hasil analisis

dan interpretasi data. Planning dalam metode pendokumentasian SOAP merupakan gambaran dari implementasi dan evaluasi yang merupakan langkah V, VI dan VII menurut *Helen Varney*. Pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Dalam proses implementasi pasien harus dilibatkan karena jika kondisi pasien berubah, maka analisis, rencana asuhan serta implementasinya kemungkinan besar akan berubah atau harus disesuaikan. Dalam planning mencantumkan evaluasi yakni efek tindakan untuk menilai efektifitas asuhan atau hasil tindakan (Sudarti, Afroh Fauzia, 2010: 41- 42).

BAB III
STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL FISILOGI PADA
NY”J” DENGAN GESTASI 39 MINGGU 6 HARI INPARTU KALA III
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 31 JULI 2022**

| | | |
|--------------------|-------------------------|------------------|
| No. Register | : xxxxx | |
| Tanggal Masuk | : 31 Juli 2022 | Pukul 18.40 Wita |
| Tanggal Pengkajian | : 31 Juli 2022 | Pukul 18.40 Wita |
| Tanggal Partus | : 31 Juli 2022 | Pukul 19.05 Wita |
| Nama pengkaji | : Indah Lestari Sutrang | |

A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas Istri/Suami

| | |
|---------------|-----------------------|
| Nama | : Ny ”J” / Tn ”A” |
| Umur | : 24 Tahun / 41 Tahun |
| Nikah/Lamanya | : 1 X / 15 Tahun |
| Suku | : Makassar / Makassar |
| Agama | : Islam / Islam |
| Pendidikan | : SD / SMP |
| Pekerjaan | : IRT / Buruh Harian |
| Alamat | : Jxxxx |

2. Data Biologis/Fisiologis

a Keluhan Utama

Ibu merasakan lelah setelah melahirkan, dan nyeri perut tembus ke belakang serta adanya nyeri luka pada perineum serta perutnya masih terasa mules.

b Riwayat Keluhan Utama

Ibu melahirkan pada tanggal 31 Juli 2022 pukul 19.05 Wita, terdapat robekan pada perineum tingkat I, dan A/S : 8/10.

3. Riwayat Menstruasi

- a. Menarche : 12 tahun
- b. Siklus haid : 28-30 hari
- c. Lamanya : 5-6 hari
- d. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut/hari
- e. Dismenorrhoe : Tidak ada nyeri bagian bawah yang dapat mengganggu aktivitas.

4. Riwayat Kehamilan Sekarang

- a) Kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
- b) Hari Pertama Haid Terakhir tanggal 24 Oktober 2021
- c) Tafsiran Persalihan tanggal 31 Juli 2022
- d) Keluhan selama hamil

Trimester I : tidak ada keluhan yang dialami ibu pada usia kehamilan muda.

Trimester II : mengeluh sering pusing dan mudah lelah

Trimester III : mengeluh sering kencing.

1. Ibu memeriksakan kehamilannya secara tidak teratur, hanya 3 kali selama hamil di RS Masita yaitu trimester I sebanyak 1x , trimester II sebanyak 1x, dan di trimester III di Puskesmas Jumpandang Baru sebanyak 1x

2. Ibu tidak pernah mendapatkan imunisasi TT.

5. Riwayat Kehamilan, dan Persalinan yang Lalu

| Anak ke | Tahun lahir | UK | Jenis persalinan | Penolong | Tempat | BBL | JK | Keadaan anak |
|---------|-------------|-------|------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|
| 1 | 2018 | Aterm | Normal | Bidan | Rs masita | 2.600 gram | Perempuan | Hidup |

6. Riwayat penyakit yang sekarang

Ibu mengatakan tidak ada riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus, ibu tidak memiliki riwayat penyakit menular seperti Tubercuolosis (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS). Ibu mengatakan tidak ada riwayat alergi terhadap makanan maupun obat-obatan dan ibu tidak mempunyai riwayat operasi, dan sebelumnya ibu juga tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas karena penyakit yang serius.

7. Riwayat Sosial, Ekonomi, Psikososial Dan Spiritual

Ibu mengatakan kebutuhan biaya sehari-hari dalam keluarganya mencukupi, ibu menikah 1 kali dengan suami yang sekarang dan sudah 15 tahun lamanya, ibu dan keluarga bahagia dengan kehamilannya dan ibu akan melahirkan di puskesmas jumpandang baru, pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami serta ibu dan suaminya rajin beribadah.

8. Riwayat KB

Sejak kelahiran anak pertama yaitu pada tahun 2018 ibu mulai menjadi akseptor KB implan dan berhenti dengan alasan ingin hamil lagi.

9. Riwayat Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a) Kebutuhan nutrisi

Kebiasaan:

- 1) Pola makan : Nasi, sayur, lauk
- 2) Frekuensi : 3 kali sehari
- 3) Kebutuhan minum : 6-8 gelas per hari

Selama inpartu :

- 1) Ibu makan, tetapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

b) Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan:

- 1) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak.
- 2) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu:

- 1) BAK : Ibu BAK di toilet
- 2) BAB : Ibu belum BAB

c) Personal hygiene

Kebiasaan:

- 1) Mandi, 2 kali sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- 2) Sikat gigi, 2 kali (setelah makan dan sebelum tidur) dengan menggunakan pasta gigi
- 3) Keramas, 3 kali seminggu dengan menggunakan shampo
- 4) Ganti pakaian, 2 kali sehari

d) Kebutuhan istirahat dan tidur

Kebiasaan

- 1) Tidur siang tidak teratur, tidur malam 6-8 jam

10. Pemeriksaan Fisik

- a) Keadaan umum baik
- b) Kesadaran composmentis
- c) Tanda-tanda vital

TD : 110/70 mmHg

S : 36.7°C

N : 80 x/Menit

P : 20 x/menit

d) Pemeriksaan *head to toe*

- 1) Kepala : rambut hitam, panjang, lurus, keadaan kulit kepala bersih, tidak ada ketombe, benjolan dan nyeri tekan
- 2) Wajah : tidak ada cloasma, tidak ada pembengkakan, oedema dan nyeri tekan.
- 3) Mata : konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ikhterus.
- 4) Mulut : bibir lembab, keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi, dan keadaan gigi lengkap.
- 5) Telinga : tidak ada serumen, pembengkakan dan nyeri tekan.
- 6) Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan vena jugularis.
- 7) Payudara : simetris kiri/kanan, puting susu menonjol, tampak hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan,nyeri tekan dan terdapat kolostrum apabila puting susu dipencet.
- 8) Abdomen : kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri (TFU) setinggi pusat, tampak linea nigra, dan stiae albican, tonus otot perut tampak kendor.
- 9) Ekstremitas : keadaan kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema pada tungkai, tidak ada varises, tidak ada nyeri tekan dan terdapat reflex patella kiri dan kanan.
- 10) Genitalia : keadaan genitalia bersih, tidak ada varises, tidak ada oedema, tidak ada pembesaran kelenjar batholin, dan tampak pengeluaran lendir dan darah.

B. LANGKAH II : MENETAPKAN DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : Perlangsungan kala III.

Data subjektif : Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya.

Data objektif : Bayi lahir spontan tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 wita, JK: laki-laki, BB : 3500 gram, PB : 50 cm, A/S : 8/10, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri setinggi pusat, adanya robekan pada perineum, tali pusat semakin memanjang, adanya semburan darah, tampak tali pusat di depan vulva .

Analisa dan interpretasi data

Adanya kontraksi uterus dan peregangan tali pusat serta dorongan uterus dorsocranial, dengan sendirinya plasenta akan terlepas dari tempat tertahan dan akan bergerak kuat kearah intraitus vagina (Ilmu kebidanan, Sarwono 155-158).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya retensio plasenta, dan atonia uteri.

1. Retensio plasenta

Data Subjektif (S) :

- a. Plasenta sudah lahir \pm 10 menit setelah bayi lahir
- b. Ibu mengatakan merasa lelah

Data Objektif (O) :

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran composmentis
- c. Tanda-tanda vital :

| | |
|------------------|----------------|
| TD : 110/70 mmHg | S : 36.7°C |
| N : 80 x/Menit | P : 20 x/menit |

Analisa dan interpretasi data

Retensio plasenta adalah plasenta yang tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir. Plasenta yang sukar dilepas dengan manajemen aktif kala III dapat disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Saifuddin,2014:526). Faktor resiko pada ibu yang mengakibatkan plasenta tertahan atau tidak lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir yakni riwayat retensio plasenta, usia diatas 35 tahun dan grandemultipara (Akinola,dkk:2013:280). Dengan demikian, Plasenta yang belum lepas tidak akan mengakibatkan perdarahan tetapi bila sebagian plasenta telah terlepas maka akan terjadi perdarahan, hal ini mengindikasikan untuk segera mengeluarkannya dengan tindakan manual plasenta.

2. Atonia uteri

Data Subjektif (S) :

- a. Plasenta sudah lahir \pm 10 menit setelah bayi lahir

- b. Ibu mengatakan merasa lelah

Data Objektif (O) :

- a. Keadaan umum ibu baik
- b. Kesadaran composmentis
- c. Tanda-tanda vital :

TD : 110/70 mmHg S : 36.7°C

N : 80 x/Menit P : 20 x/menit

Analisa dan interpretasi data

Atonia uteri adalah perdarahan yang terjadi karena miometrium tidak dapat berkontraksi sehingga ujung pembuluh darah di tempat implantasi plasenta tidak dapat dihentikan yang menyebabkan perdarahan tidak terkendali (Indrayani, 2016).

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/EMERGENCY

Tidak ada indikasi untuk di lakukannya tindakan segera/emergency.

E. LANGKAH V : INTERVENSI

Diagnosa aktual : Perlangsungan kala III.

Diagnosa potensial :

1. Tujuan : kala III berlangsung normal, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), keadaan ibu dan janin baik.

2. Kriteria :

- a. Perdarahan tidak lebih dari 500 cc.
- b. Lamanya kala III \leq 30 menit.
- c. Plasenta dan selaput lahir lengkap.

Intervensi

Tanggal 31 Juli 2022

Pukul : 19.10 Wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin dalam uterus

Rasional : untuk memastikan kehamilan tunggal atau ganda

2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi

Rasional : mempercepat lahirnya plasenta

3. Memberikan dukungan kepada ibu, dan menganjurkan ibu selalu meminta pertolongan kepada Allah *swt* agar proses pengeluaran plasenta berjalan normal serta menganjurkan ibu untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Qur'an yang di bacakan sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Rasional : ibu merasa tenang dan mengikuti anjuran yang diberikan

4. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskuler (IM) di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Rasional : penyuntikan oksitosin membantu kontraksi uterus yang membantu keluarnya plasenta

5. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Mendorong isi tali pusat ke arah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Rasional : untuk memudahkan memotong tali pusat

6. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Rasional : agar bayi dapat dipisahkan dari plasenta

7. Menjepit tali pusat menggunakan penjepit tali pusat.

Rasional : agar darah tidak keluar dari pusat bayi

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayi.

Rasional : agar ibu dan bayi tidak hipotermi dan bisa melakukan kontak kulit

9. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Rasional : agar dapat memudahkan proses peregangan tali pusat terkendali

10. Meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi dan tangan lain meregangkan tali pusat.

Rasional : memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya

11. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.
Rasional : dorso kranial memudahkan plasenta terlepas dari tempat implantasinya
12. Melakukan peregangan dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).
Rasional : memudahkan plasenta keluar sesuai dengan kurva jalan lahir sehingga tampak pada vulva
13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.
Rasional : mencegah robekan dan mencegah tertinggalnya selaput ketuban yang dapat menyebabkan perdarahan
14. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)
Rasional : agar kontraksi baik dan mencegah perdarahan

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukkan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Rasional : adanya sisa plasenta dan selaput ketuban yang tertinggal dapat menyebabkan perdarahan

16. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Rasional : penjahitan laserasi dapat mencegah terjadinya perdarahan

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Rasional : kontraksi uterus yang baik dapat mencegah perdarahan akibat atonia uteri

18. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Rasional : untuk menjalin ikatan batin antara ibu dan bayi

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K1 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral

Rasional : agar bayi mendapat perlindungan dini terhadap komplikasi yang akan terjadi.

20. Setelah satu jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral

Rasional : mengurangi resiko bayi terkena penyakit hepatitis.

F. LANGKAH VI : TINDAKAN SEGERA/KALABORASI

Tanggal 31 Juli 2022

Pukul : 19.10 Wita

1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin dalam uterus.

Hasil: janin tunggal

2. Memberitahu ibu bahwa akan disuntikkan oksitosin sebanyak 10 unit secara intramuskuler agar uterus berkontraksi dengan baik

Hasil: ibu telah di beritahu dan ibu bersedia di suntik

3. Memberikan dukungan kepada ibu, dan menganjurkan ibu selalu meminta pertolongan kepada Allah *swt* agar proses pengeluaran plasenta berjalan normal serta menganjurkan ibu untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Qur'an yang di bacakan sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Rasional : ibu merasa tenang dan mengikuti anjuran yang diberikan

4. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosinn 10 unit (IM) di 1/3 lateral paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin).

Hasil: oksitosin telah di suntikkan

5. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. mendorong isi tali pusat ke arah (ibu) dan jepit kembali tali pusat 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah diklem

6. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil : tali pusat telah digunting

7. Mengikat tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya.

Hasil : tali pusat telah di ikat dengan benang steril.

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi pada kepala bayi.

Hasil : bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasangkan topi

9. Memindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5 -10 cm dari vulva

Hasil : klem telah di pindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : telah dilakukan

11. Setelah uterus berkontraksi, meregangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorso kranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30 – 40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : telah dilakukan dorongan dorso cranial

12. Melakukan peregang dan dorongan dorso kranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorso kranial).

Hasil : telah dilakukan

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta telah lahir 10 menit setelah bayi lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 19.15 wita

14. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras)

Hasil : telah dilakukan masase uterus

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta lahir lengkap kotiledon dan selaput ketubannya.

16. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : telah dilakukan, dan tidak terjadi laserasi pada perineum.

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : telah dilakukan, dan uterus berkontraksi dengan baik teraba bundar dan keras.

18. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam.

Hasil : telah dilakukan, dengan membiarkan bayi melakukan kontak kulit selama 1 jam.

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri salep mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg intramaskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil : bayi telah di beri tetes mata/salep mata antibiotic profilaksis, dan telah di suntikkan vitamin K secara intramuskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil penimbangan/pengukuran

BBL = 3500 gram

PBL = 50 cm

LK = 34 cm

LD = 35 cm

LP = 32 cm

20. Setelah satu jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis di paha kanan anterolateral

Hasil : telah dilakukan penyuntikkan hepatitis B di paha kanan antero lateral secara intramuscular.

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 31 Juli 2022 Pukul : 19.20 Wita

- a. Kala III berlangsung normal.
- b. Perdarahan \pm 100 cc.
- c. Plasenta dan selaput lahir lengkap pada jam 19.15 Wita.
- d. Kala III berlangsung \pm 10 menit.
- e. Ibu mengatakan lelah setelah proses persalinan.
- f. Kontraksi uterus baik , terasa keras dan bundar.
- g. Tinggi fundus uteri 1 jari bawah pusat.
- h. Tanda – tanda vital

Tekanan darah : 110/70 mmHg

Nadi : 80×/menit.

Pernapasan : 20×/menit.

Suhu : 36,7°C

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL
FISIOLOGI PADA NY"J" DENGAN GESTASI 39 MINGGU 6 HARI
INPARTU KALA III DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 31 JULI 2022**

No. Register : xxxxx

Tanggal Masuk : 31 Juli 2022 Pukul 18.40 Wita

Tanggal Pengkajian : 31 Juli 2022 Pukul 18.40 Wita

Tanggal Partus : 31 Juli 2022 Pukul 19.05 Wita

Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

KALA III

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "J" / Tn "A"

Umur : 24 Tahun / 41 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 6 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Ala mat : Jxxxx

B. Data Subyektif (S)

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah

2. Ibu tampak senang dengan kelahiran bayinya.
3. Ibu mengatakan plasenta atau ari-arinya belum lahir.

C. Data Obyektif (O)

1. Bayi lahir spontan segera menangis, tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 wita, dengan jenis kelamin laki-laki, BBL = 3500 gram, PBL = 50 cm, A/S = 8/10
2. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat.
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibu kosong

D. Assesment (A)

Diagnosa : Perlangungan kala III

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya retensio plasenta

E. Planning (P)

Tanggal : 31 Juli 2022 Pukul : 19.10 Wita

1. Periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin dalam uterus.
Hasil : ibu hamil tunggal
2. Memberitahu ibu bahwa ia akan oksitosin 10 unit IM agar uterus berkontraksi baik.
Hasil : ibu telah di beritahu dan ibu bersedia di suntik
3. Memberikan dukungan kepada ibu, dan menganjurkan ibu selalu meminta pertolongan kepada Allah *swt* agar proses pengeluaran plasenta berjalan

normal serta menganjurkan ibu untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Qur'an yang di bacakan sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 153.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahan :

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Rasional : ibu merasa tenang dan mengikuti anjuran yang diberikan

4. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikkan oksitosin 10 unit IM di 1/3 paha atas bagian distal lateral (lakukan aspirasi sebelum menuntikkan oksitosin).

Hasil : oksitosin telah disuntikkan

5. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dengan mendorong tali pusat kearah distal (ibu) dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama.

Hasil : tali pusat telah diklem

6. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit (lindungi perut bayi), dan lakukan pengguntingan tali pusat diantara 2 klem tersebut.

Hasil : tali pusat telah digunting

7. Lakukan pengikatan tali pusat dengan benang steril pada satu sisi kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul

kunci pada sisi lainnya. Atau dilakukan penjepitan tali pusat dengan penjepit tali pusat.

Hasil : tali pusat telah di ikat dengan benang steril.

8. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan bersih lalu pasang topi di kepala bayi.

Hasil : bayi dan ibu telah di selimuti dengan kain hangat dan bayi telah di pasang topi

9. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva.

Hasil : klem telah di pindahkan

10. Meletakkan satu tangan diatas kain pada perut ibu, di tepi atas simfisis, untuk mendeteksi, sementara itu tangan lain meregangkan tali pusat.

Hasil : telah dilakukan

11. Setelah uterus berkontraksi, regangkan tali pusat kearah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus kearah belakang-atas (dorso cranial) secara hati-hati (untuk mencegah inversion uteri). Jika plasenta tidak lahir setelah 30–40 detik, hentikan peregang tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur.

Hasil : telah dilakukan dorongan dorso cranial

12. Melakukan peregang dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas, minta ibu meneran sambil penolong meregangkan tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian kearah atas, mengikuti poros jalan lahir (tetap lakukan tekanan dorsokranial).

Hasil : telah dilakukan

13. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah jarum jam untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban.

Hasil : plasenta telah lahir 10 menit setelah bayi lahir pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul 19.15 wita

14. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik (fundus teraba keras).

Hasil : telah dilakukan massase uterus

15. Periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap, dan masukan kedalam kantong plastik yang tersedia.

Hasil : plasenta lahir lengkap kotiledon dan selaput ketubannya.

16. Mengevaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan.

Hasil : telah dilakukan, dan tidak terjadi laserasi pada perineum.

17. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam.

Hasil : telah dilakukan, dan uterus berkontraksi dengan baik teraba bundar dan keras.

18. Biarkan bayi melakukan kontak kulit dengan ibu paling sedikit 1 jam

Hasil : telah dilakukan, dengan membiarkan bayi melakukan kontak kulit selama 1 jam.

19. Setelah satu jam, lakukan penimbangan/pengukuran bayi, beri tetes mata antibiotik profilaksis, dan vitamin K 1 mg secara intramuskuler (IM) di paha kiri anterolateral.

Hasil : bayi telah di beri tetes mata/salep mata antibiotic profilaksis, dan telah di suntikkan vitamin K secara intramuskuler di paha kiri anterolateral.

Hasil penimbangan/pengukuran

BBL = 3500 gram PBL = 50 cm

LK = 34 cm LD = 35 cm

LP = 32 cm

20. Setelah satu jam pemberian suntikkan vitamin K, lakukan penyuntikan imunisasi hepatitis B pada paha kanan antero lateral secara intramuscular.

Hasil : telah dilakukan penyuntikkan hepatitis B di paha kanan anterolateral secara intramuscular.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL
CARE PADA NY''J'' 2 JAM SETELAH PERSALINAN
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 31 JULI 2022**

No. Register : xxxxx

Tanggal Masuk : 31 Juli 2022 Pukul 18.40 Wita

Tanggal Partus : 31 Juli 2022 Pukul 19.05 Wita

Tanggal Pengkajian : 31 Juli 2022 Pukul 21.30 Wita

Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

KALA IV

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny ''J'' / Tn ''A''

Umur : 24 Tahun / 41 Tahun

Nikah/Lamanya : 1 X / 6 Tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP / SMP

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jxxxx

B. Data Subjektif

1. Ibu merasa lelah setelah selesai persalinannya

2. Ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah
3. Ibu mengeluh nyeri pada jalan lahir

C. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal
 - a. TD = 120/80 mmHg S = 36.5°C
 - b. N = 80 x/menit P = 24 x/menit
4. Pemeriksaan fisik *Head To Toe*
 - a. Wajah
Inspeksi : tidak pucat
 - b. Mata
Inspeksi : kongjungtiva merah muda, sklera tidak ikhterus
 - c. Mulut
Inspeksi : bibir pucat, gigi tidak caries
 - d. Leher
Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar
Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis
 - e. Payudara
Inspeksi : puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu di pencet terdapat pengeluaran ASI tetapi belum lancar

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada varises, tampak pengeluaran lochea rubra, tampak adanya robekan perineum tingkat I.

Palpasi : tidak ada edema

h. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak ada eodema

5. Plasenta lahir lengkap pada tanggal 31 Juli 2022, Pukul: 19.15 wita

6. Ibu tampak lelah setelah menjalani persalinannya

7. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

8. Tinggi fundus uteri setinggi pusat

9. Perdarahan \pm 100cc

10. Terdapat jahitan pada perineum

11. kandung kemih kosong

12. tidak ada tanda-tanda infeksi

13. tampak pengeluaran ASI saat di tekan tetapi belum lancar

D. Assesment (A)

Perlangsungan kala IV dengan keadaan ibu kelelahan.

E. Planning (P)

Tanggal 31 Juli 2022 Pukul: 19.30 Wita

1. Memberikan selamat pada ibu atas kelahiran anaknya

Hasil : ibu senang atas kelahiran anaknya

2. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan pervaginam

Hasil : kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)

3. Mengajarkan ibu/ keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi.

Hasil : ibu telah melakukannya

4. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah, setiap 15 menit selam 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan

Hasil :

| Waktu | Perdarahan |
|-------|------------|
| 19.30 | ±50 cc |
| 19.45 | ±20 cc |
| 20.00 | ±10 cc |
| 20.15 | ±10 cc |

| | |
|-------|---------|
| 20.45 | ±5 cc |
| 21.15 | ±5 cc |
| Total | ±100 cc |

5. Memeriksa tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan 30 menit pada 2 jam pasca persalinan

Hasil :

| Jam | Waktu (Wita) | TD (mmHG) | Nadi (x/i) | Suhu (°C) | TFU | Kontraksi | Kandung Kemih |
|-----|-----------------|------------------|---------------|--------------|----------|-----------|------------------|
| I | 19.30 | 100/80 | 80 | 36,8 | STP | Baik | Kosong |
| | 19.45 | 110/80 | 82 | | STP | Baik | Kosong |
| | 20.00 | 110/80 | 82 | | STP | Baik | Kosong |
| | 20.15 | 110/80 | 84 | | STP | Baik | Kosong |
| II | 20.45 | 110/80 | 81 | 36,8 | STP | Baik | Kosong |
| | 21.15 | 110/80 | 81 | | I jrbpst | Baik | Kosong |

Sumber Data Primer

6. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik.

Hasil : bayi bernapas dengan normal yaitu 50 kali per menit

7. Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi (10 menit). Cuci dan bilas peralatan setelah di dekontaminasi.
Hasil : alat sudah dilarutkan dalam larutan klorin 0,5 %, telah dicuci dan telah bersih
8. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai.
Hasil : Sampah yang terkontaminasi telah dibuang ketempat sampah.
9. Membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Bantu ibu memakai memakai pakaian bersih dan kering.
Hasil : ibu telah dalam keadaan bersih
10. Memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum.
Hasil : ibu telah nyaman dan telah makan dan minum
11. Dekontaminasikan tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%.
Hasil : tempat bersalin telah di dekontaminasikan
12. Membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5.
Hasil : sarung tangan telah dicelupkan di didalam larutan klorin 0,5 % dalam keadaan terbalik
13. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Hasil : kedua tangan telah bersih

14. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu

Hasil : ibu mengerti dan akan menjalani tugas barunya walaupun ASI nya kurang lancar

15. Melengkapi partograf

Hasil : partograf telah diisi



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN POSTNATAL
CARE 6 JAM SETELAH PERSALINAN PADA NY "J"
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU
TANGGAL 01 AGUSTUS 2022**

Tanggal Masuk : 01 Agustus 2022 Pukul 08.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 01 Agustus 2022 Pukul 08.00 Wita
Tanggal Partus : 31 Juli 2022 Pukul 19.05 Wita
Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

A. Identitas Istri/Suami

Nama : Ny "J" / Tn "A"
Umur : 24 Tahun / 41 Tahun
Nikah/Lamanya : 1 X / 6 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Islam / Islam
Pendidikan : SMP / SMP
Pekerjaan : IRT / Buruh Harian
Alamat : Jxxx

B. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ini anak kedua dan tidak pernah keguguran
2. Ibu melahirkan tanggal 31 Juli 2022, Pukul 19.05 wita

3. Ibu merasa lelah setelah melahirkan
4. Ibu merasa sedikit nyeri pada jalan lahir
5. Ibu merasa senang atas kelahiran bayinya
6. Ibu mengatakan ASI nya kurang lancar
7. Ibu sudah BAK namun belum BAB
8. Tidak ada riwayat menderita penyakit Jantung, Diabetes Melitus, Hepatitis, Tumor, Hipertensi.
9. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok.
10. Ibu dan keluarga tidak memiliki riwayat penyakit turunan maupun menular
11. Ibu pernah menjadi akseptor KB implant

C. Data Objektif (O)

1. Kedaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

TD : 110/80 mmHG

Suhu : 36,5°C

Nadi : 80x/menit

Pernafasan : 20x/menit

4. Pemeriksaan fisik *Head To Toe*

- a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

- b. Mata

Inspeksi : kongjungtiva merah muda, sklera tidak ikhterus

c. Mulut

Inspeksi : bibir pucat, gigi tidak caries

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis

e. Payudara

Inspeksi : puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola mammae

Palpasi : tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu di pencet terdapat pengeluaran ASI tetapi belum lancar

f. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae livid

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada varises, tampak pengeluaran lochea rubra, tampak adanya robekan perineum tingkat I

Palpasi : tidak ada edema

h. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak ada eodema.

D. Assesment (A)

PIIA0, Post partum enam jam dengan keadaan asi kurang lancar.

E. Planning (P)

Tanggal : 01 Agustus 2022 Pukul: 08.00 Wita

1. Mencuci tangan/pakai *hand zanitizer* sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil: pemeriksa telah memakai *hand zanitizer*

2. Menanyakan kondisi yang dialami ibu

Hasil : ibu mengatakan kondisinya saat ini baik

3. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu.

Hasil :

TD : 120/70 mmHG Suhu : 36,5°C

Nadi : 82x/menit pernafasan : 22x/menit

4. Memberikan support kepada ibu agar ibu merasa senang atas kelahiran bayinya

Hasil : ibu merasa bahagia karena diberikan support

5. Menganjurkan ibu untuk massase uterus

Hasil : ibu mengerti dan akan melakukan massase uterus

6. Mengobservasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil : TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi uterus baik dan teraba keras serta bundar, pengeluaran lochea rubra, tidak berbau.

7. Mengajarkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi.

Hasil : ibu mengerti dan akan rutin mengganti pembalutnya.

8. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu: mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

9. Mengajarkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini

Hasil : ibu miring ke kanan dan kiri di atas tempat tidur dan sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih.

10. Anjurkan pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada anaknya

Hasil : ibu memberikan ASI eksklusif pada bayinya walaupun asinya belum lancar

11. Mengajarkan pada ibu tentang perawatan payudara

- a. Melicinkan tangan dengan baby oil secukupnya
- b. Tempatkan kedua tangan antara payudara ibu kemudian diurut ke arah atas, terus kesamping, kebawah melintang sehingga menyangga payudara lakukan 20-30 kali
- c. Menyokong payudara kiri dengan tangan kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara berakhir pada

putting susu. Lakukan tahapan yang sama pada payudara kanan lakukan 2 kali gerakan pada setiap payudara

- d. Menyokong payudara kiri dengan tangan kiri, telapak tangan kiri menopang payudara kiri dan jari-jari tangan sisi kelingking mengurut payudara kearah putting susu, gerakan diulang sebanyak 20-30 kali untuk setiap payudara
- e. Telapak tangan kiri menyokong payudara, tangan dikepalkan kemudian jari tangan mengurut payudara mulai dari pangkal kearah putting susu, gerakan ini ulang sebanyak 20-30 kali untuk setiap payudara
- f. Setelah pengurutan, kompres kedua payudara dengan air hangat selama 2 menit kemudian kompres kembali menggunakan air dingin selama 1 menit
- g. Keringkan payudara dengan handuk kering dan pakaikan bra

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukan perawatan payudara

12. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kanan dan kiri

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

13. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya.

14. Mengajarkan ibu tehnik menyusui yang baik dan benar yaitu :

- a) Kepala dan badan bayi berada pada garis lurus
- b) Perut bayi menempel di dada ibu
- c) Daggu bayi menempel di payudara ibu
- d) Tunggu sampai mulut bayi terbuka lebar
- e) Masukkan areola sebagian esar masuk kemulut bayi
- f) Bibir bayi terputar keluar
- g) Selesai menyusui sendawakan bayi dengan menepuk-nepuk bagian belakang bayi

Hasil : ibu mengerti dan sedang mempraktekkannya.

15. Menganjurkan ibu untuk menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat

Hasil : ibu mengerti dan akan menjaga suhu tubuh bayi

16. Memberikan health education (HE) tentang:

- 1) Nutrisi

Yaitu makanan sehat dan seimbang yang mendukung adanya pengeluaran ASI seperti makan sayur kelor dan serat karbohidrat, protein, mineral, kalsium yang cukup seperti nasi/gandum, ikan, sayuran hijau, daging, kacang-kacangan dan banyak minum air putih.

- 2) *Personal hygiene*

Mandi setiap hari minimal 1×/hari, gosok gigi minimal 2×/hari, dan menjaga kebersihan daerah kewanitaan.

3) Istirahat yang cukup

Tidur siang 2 jam tidur malam 6-8 jam, dan tidak melakukan aktifitas berat.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan memakan makanan yang sehat untuk memperlancar pengeluaran ASI

17. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan zat besi yang telah diberikan.

a. Asam mafenamat 3×1

Sebagai obat analgetik, untuk membantu meredakan rasa sedikit nyeri pada jalan lahir yang dirasakan ibu.

b. Ferro sulfat 2×1

Diberikan untuk membentuk sel darah merah (hemoglobin) serta sebagai komponen untuk membentuk mioglobin(protein yang membawa oksigen ke otot), kolagen (protein yang terdapat pada tulang rawan, dan jaringan penyambung), serta enzim.

Hasil : ibu bersedia mengkonsumsi obatnya

18. Mengajarkan ibu tentang perawatan tali pusat yang benar agar tali pusat puput dengan baik dan tidak terinfeksi yaitu:

a) Upayakan tali pusat dalam kondisi tidak basah dan tetap menjaga kebersihan

b) Tali pusat tidak perlu dibersihkan dengan sabun ataupun cairan lainnya dan biarkan dalam keadaan terbuka tanpa ditutup dengan kasa kering

- c) Saat memakaikan popok bayi, usahakan tali pusat tidak basah
- d) Minyak, bedak, ataupun jamu-jamuan tidak perlu diberikan pada tali pusat karena akan membuat basah dan lembab.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

19. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu

Hasil : ibu mengerti dan akan menjalani tugas barunya walaupun ASI nya kurang lancar

20. Menganjurkan ibu untuk tetap mengigat dan berserah diri kepada Allah Swt. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, berdoa seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/14:40

Hasil : ibu mengerti, serta mau mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, dan berdoa.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
POSTNATAL CARE HARI KE-6 PADA NY “J”
TANGGAL 10 AGUSTUS 2022**

Hari/tanggal : Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul : 15.05 WITA
Tempat : Rumah pasien
Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit
3. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan
4. Ibu mengatakan tali pusatnya sudah kering dan terlepas.
5. Ibu mengatakan luka jahitan sudah tidak nyeri.

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/70 mmHG

Suhu : 36,5°C

Nadi : 84x/menit

Pernafasan : 20x/menit

4. Pemeriksaan fisik *Head To Toe*

a. Wajah

Inspeksi : tidak pucat

b. Mata

Inspeksi : kongjungtiva merah muda, sklera tidak ikhterus

c. Mulut

Inspeksi : bibir pucat, gigi tidak caries

d. Leher

Inspeksi : tidak ada pembesaran kelenjar

Palpasi : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis

e. Payudara

Inspeksi : puting susu menonjol, terdapat hiperpigmentasi areola

Mammae.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta terdapat pengeluaran ASI.

f. Abdomen

Inspeksi: tidak ada luka bekas operasi, tampak linea nigra dan striae livid.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU 1 jari di bawah pusat, kandung kemih kosong.

g. Genetalia

Inspeksi : tidak ada varises, tampak pengeluaran lochea *sanguilenta*

Palpasi : tidak ada edema

h. Ekstremitas

Inspeksi : tidak ada varises

Palpasi : tidak ada eodema.

5. Putting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta terdapat pengeluaran ASI
6. Kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, TFU pertengahan pusat-simpisis
7. Tampak pengeluaran *lochea sanguilenta*

C. Assesment (A)

Post partum hari keenam.

D. Planning (P)

Tanggal : 10 Agustus 2022 Pukul : 15.10 WITA

1. Menanyakan kepada ibu kondisi yang dialami saat ini

Hasil : ibu mengatakan kondisinya saat ini baik

1. Mengoservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

Hasil : TFU pertengahan pusat-simpisis, involusio berjalan normal

2. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah *lochea* yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. *Lochea* yang keluar pada hari keenam akan berwarna merah kekuningan

yang merupakan cairan berupa darah bercampur lendir disebut dengan *lochea sanguilenta* seperti yang terjadi pada ibu.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

3. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi yaitu karbohidrat (nasi, roti), protein (ikan, telur, tahu, tempe, daging), vitamin (buah dan sayur).

Hasil : ibu bersedia makan makanan yang bergizi

4. Anjurkan pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada anaknya

Hasil : ibu memberikan ASI eksklusif pada bayi

5. Anjurkan pada ibu tentang perawatan payudara

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

6. Memberikan konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI

1. KB implant

Keuntungan:

- a. Dapat mencegah terjadinya kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun
- b. Dapat digunakan oleh ibu yang sedang menyusui
- c. Tidak perlu dikonsumsi setiap hari atau dipakai sebelum melakukan hubungan seksual.

Kerugian :

- a. Dapat memengaruhi siklus menstruasi
- b. Tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual
- c. Dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

2. Suntik 3 bulan

Keuntungan :

- a. Dapat digunakan oleh ibu yang sedang menyusui
- b. Dapat mencegah terjadinya kehamilan

Kekurangan :

- a. Dapat memengaruhi siklus menstruasi
- b. Dikomsumsi tiap 3 bulan
- c. Dapat menyebabkan kenaikan berat badan.

3. Metode amenorea laktasi

Keuntungan :

- a. Tidak membutuhkan biaya
- b. Mudah dilakukan
- c. Tidak membutuhkan kunjungan
- d. Tidak ada hormon yang mempengaruhi proses menyusui
- e. Tidak mempengaruhi hubungan seksual

Kekurangan :

- a. Hanya berlangsung selama 6 bulan
- b. Tidak lagi efektif bila bayi mulai mendapatkan susu formula
- c. Tidak melindungi dari infeksi yang menularkan melalui hubungan seksual.

4. Kontrasepsi IUD

Keuntungan :

- a. Bisa di lepas kapan saja, tanpa mempengaruhi kesuburan
- b. Aman digunakan untuk ibu menyusui
- c. Mengurangi resiko terkena kanker serviks dan kanker *endometrium*.
- d. Tidak membuat berat badan meningkat seperti pil KB

Kekurangan :

- a. Rasa tidak nyaman pada vagina ketika di pasang
- b. Tidak boleh digunakan pada wanita yang mempunyai penyakit radang panggul
- c. Menstruasi akan lebih singkat bahkan tidak menstruasi sama sekali.

5. Pil mini

Keuntungan :

- a. Mampu mengurangi gejala PMS
- b. Melindungi dari penyakit radang panggul
- c. Periode menstruasi lebih teratur
- d. Bisa langsung program hamil setelah berhenti mengkonsumsi pil KB

Kerugian :

- a. Tidak melindungi dari penyakit kelamin
- b. Harus di minum tiap hari di jam yang sama tidak boleh terlewatkan
- c. Bisa meningkatkan tekanan darah.

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang disampaikan.

10. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menjalani tugas barunya sebagai seorang ibu seperti membuat susu dan memandikan bayinya

Hasil : ibu telah menjalani tugas barunya sebagaimana sesuai dengan peran ibu

11. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah *Sw.*

Hasil : ibu mengerti dan ibu sering berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci serta berdoa.

12. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 20 Agustus 2022

Hasil : ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
POSTNATAL CARE HARI KE-14 PADA NY “J”
TANGGAL 20 AGUSTUS 2022**

Hari/tanggal : Sabtu, 20 Agustus 2022 Pukul : 14.30 Wita
Tempat : Rumah pasien
Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASI nya sudah banyak, lancar, dan rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit
3. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning/kecoklatan
4. Ibu mengatakan dia sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/80 mmHG Suhu : 36,5°C

Nadi : 82x/menit Pernafasan : 22x/menit

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI
5. TFU sudah tidak teraba
6. Tampak pengeluaran *lochea serosa*

C. Assesment (A)

Post partum hari keempat belas

D. Planning (P)

Tanggal 13 Agustus 2022 Pukul : 14.40 wita

1. Menanyakan kepada ibu kondisi yang dialami saat ini

Hasil : ibu mengatakan kondisi ibu baik

2. Mengobservasi uterus ibu untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

Hasil : TFU tidak teraba, inversio berjalan normal

3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah *lochea* yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. *Lochea* yang keluar pada hari keempat belas akan berwarna kekuningan/kecoklatan yang merupakan cairan berupa sedikit darah dan lebih banyak serum yang terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta yang disebut dengan *lochea serosa* seperti yang terjadi pada ibu.

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) yaitu; mandi 2 kali sehari menggunakan sabun, keramas rambut 2 kali seminggu menggunakan sampo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya.

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mengkonsumsi makanan bergizi seimbang

Hasil : ibu mengerti atas penjelasan yang di sampaikan

7. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa tersedot masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi

Hasil : ibu telah mengerti atas penjelasan yang diberikan

8. Menanyakan kepada ibu apakah sudah memiliki alat kontrasepsi yang akan digunakan

Hasil : ibu mengatakan ingin memakai KB implant

9. Menganjurkan ibu untuk membawa anaknya ke Puskesmas untuk imunisasi jika bayi sudah berusia 1 bulan pada tanggal 30 Agustus 2022 untuk dilakukan imunisasi BCG dan polio 1

Hasil : ibu bersedia membawa anaknya untuk imunisasi

10. Memberikan dukungan kepada ibu mengenai asuhan pada bayi dan tetap menjaga kehangatan bayinya dengan cara membedong

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

11. Menganjurkan ibu untuk tetap mengigat dan berserah diri kepada Allah Swt

Hasil : ibu mengerti dan ibu sering berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci serta berdoa.

12. Menyampaikan kepada ibu bahwa dilakukan kunjungan rumah yang terakhir untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu pada tanggal 30 Agustus 2022

Hasil : ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
POSTNATAL CARE HARI KE-28 PADA NY “J”
TANGGAL 30 AGUSTUS 2022**

Hari/tanggal : Selasa, 30 Agustus 2022 Pukul : 15.30 WITA
Tempat : Rumah pasien
Nama pengkaji : Indah Lestari Sutrang

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu mengatakan ASI nya banyak, lancar, dan rajin menyusui bayinya
2. Ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna putih keluar dari kemaluannya
3. Ibu mengatakan dia sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik
4. Ibu mengatakan sudah datang ke Puskesmas dan sudah memakai KB implant pada tanggal 28 Agustus 2022
5. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialaminya selama memakai KB implant
6. Ibu sudah membawa bayinya imunisasi pada tanggal 30 Agustus 2022
7. Ibu mengatakan sudah aktif melakukan aktifitas sehari-hari
8. Pola makan ibu sudah teratur dan nafsu makan bertambah.

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis

3. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah : 120/90 mmHG Suhu : 37°C
 Nadi : 82x/menit Pernafasan : 22x/menit

4. Payudara banyak mengeluarkan ASI

5. TFU sudah tidak teraba

6. Tampak pengeluaran *lochea alba***C. Assesment (A)**

Post partum hari kedua puluh delapan

D. Planning (P)

Tanggal 30 Agustus 2022 Pukul : 16.35 WITA

1. Memeritahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

2. Mengobservasi uterus ibu untuk memastikan involusio uterus berjalan dengan baik

Hasil : TFU tidak teraba, inversio berjalan normal

3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah *lochea* yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi.

Lochea yang keluar pada hari kedua puluh delapan akan berwarna putih seperti cream atau keputihan karena terdiri atas leukosit dan sel-sel desidua disebut dengan *lochea alba* seperti yang terjadi pada ibu (Saleha, 2013).

Hasil : ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

4. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan.

Hasil : ibu mengerti dan bersedia menyusui anaknya.

5. Menganjurkan ibu untuk ke Puskesmas apabila ibu memiliki keluhan

Hasil : ibu bersedia akan datang apabila ada keluhan.

6. Menganjurkan ibu untuk membawa bayinya ke Puskesmas untuk imunisasi selanjutnya sesuai dengan jadwal

Hasil : ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan

7. Menganjurkan ibu untuk tetap mengigat dan berserah diri kepada Allah Swt.

Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, berdoa seperti doa Nabi Ibrahim AS yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/14:40

Hasil : ibu mengerti, serta mau mendengarkan rekaman lantunan ayat suci, dan berdoa.

MATRIKS KUNJUNGAN

| No | Hari/Tanggal | Hasil pemeriksaan | Asuhan | Evaluasi |
|----|--|--|---|--|
| 1 | Minggu, 31 Juli 2022 Pukul 19.05 Wita Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar | <p>Ds : Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, ibu tampak senang dengan kelahiran bayinya, ibu mengatakan ari-ari nya belum lahir</p> <p>Do :</p> <p>a. Bayi lahir spontan, segera menangis, tanggal 31 Juli 2022, Pukul 19.05 wita, dengan jenis kelamin laki-laki, berat Ibu merasa lelah setelah selesai persalinannya, ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah, ibu mengeluh nyeri pada jalan lahir badan lahir 3500 gram, panjang badan lahir 50 cm, A/S = 8/10</p> <p>b. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar</p> <p>c. Tinggi fundus uteri setinggi pusat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi janin kedua 2. Memberitahu ibu bahwa akan di suntikkan oksitosin 3. Memberikan dukungan kepada ibu, dan menganjurkan ibu selalu meminta pertolongan kepada Allah swt, serta menganjurkan ibu untuk mengikuti bacaan ayat suci Al-Qur'an | <ol style="list-style-type: none"> a. Ibu hamil tunggal b. Ibu telah diberitahu dan ibu bersedia di suntik c. Ibu merasa tenang, dan mengikuti anjuran yang diberikan |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>d. Plasenta belum lahir e. Kandung kemih ibu kosong</p> | |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 2 | Minggu, 31 Juni 2022 Pukul 19.30 Wita Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar | <p>Ds : ibu merasa lelah setelah selesai persalinannya, ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah, ibu mengeluh nyeri pada jalan lahir</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik</p> <p>b. Tanda-tanda vital dalam batas normal: TD: 120/80 mmHg N: 80x/menit S:36,5°C P: 24x/menit</p> <p>c. Pada pemeriksaan fisik pada genetalia terdapat robekan pada perineum tingkat I, pada payudara terdapat pengeluaran ASI tetapi belum lancar</p> | <p>a. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan pervaginam</p> <p>b. Mengajarkan kepada ibu/keluarga cara melakukan massase uterus dan menilai kontraksi.</p> <p>c. Mengevaluasi dan stimulasi jumlah kehilangan darah, setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam ke 2 pasca persalinan</p> <p>d. Memberikan dukungan psikologis pada ibu</p> | <p>a. Kontraksi uterus baik</p> <p>b. Ibu mengerti dan ibu telah melakukannya</p> <p>c. Jumlah perdarahan ± 100 cc</p> <p>d. Ibu sangat senang dan bahagia atas dukungan yang di berikan</p> |
|---|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| 3 | <p>Senin, 01 Agustus 2022 Pukul 08.00 Wita Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar</p> | <p>Ds : Ibu mengatakan melahirkan tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 Wita, ibu merasa lelah setelah melahirkan, ibu merasa sedikit nyeri pada jalan lahir, ibu mengatakan ASI nya kurang lancar Do : a. Keadaan umum ibu baik b. Tanda-tanda vital: TD: 110/80 mmHg N: 80x/menit S:36,5°C P: 20x/menit c. Pada pemeriksaan fisik pada genetalia terdapat robekan pada perineum tingkat I, pada payudara terdapat pengeluaran ASI tetapi belum lancar</p> | <p>a. Memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan b. Menganjurkan ibu untuk massase uterus c. Menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan dirinya d. Menganjurkan ibu untuk moilisasi dini e. Menganjurkan pada ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif pada anaknya f. Mengajarkan pada ibu tentang perawatan payudara, dan menyusui bayinya tanpa di jadwalkan, serta mengajarkan ibu tehnik menyusui dengan benar g. Memberikan health education tentang nutrisi yaitu makanan yang sehat dan seimbang yang mendukung adanya pengeluaran ASI seperti makan sayur</p> | <p>a. Ibu mengetahui dan mengerti kondisinya saat ini b. Ibu mengerti dan akan melakukan massase uterus c. Ibu mengerti dan bersedia melakukannya d. Ibu sudah bisa jalan ke kamar mandi untuk berkemih e. Ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya walaupun belum lancar f. Ibu mengerti dan bersedia melakukan anjuran yang diberikan g. Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan dan akan memakan makanan yang sehat untuk memperlancar pengeluaran ASI</p> |
|---|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>kelor, dan banyak minum air putih</p> <ul style="list-style-type: none">h. Mengajarkan kepada ibu tentang perawatan tali pusati. Memberikan dukungan psikologis pada ibu | <ul style="list-style-type: none">h. Ibu mengerti dan atas penjelasan yang diberikani. Ibu sangat senang dan bahagia atas dukungan yang di berikan |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 4 | Rabu, 10 Agustus 2022 Pukul 15.05 Wita Di Rumah Pasien | <p>Ds : Ibu mengatakan ASI nya sudah lancar, ibu mengatakan kondisinya sudah fit, iu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan, ibu mengatakan tali pusatnya sudah kering dan terlepas, ibu mengatakan luka jahitannya sudah tidak nyeri lagi</p> <p>Do :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keadaan umum ibu baik b. Tanda-tanda vital: TD: 120/70 mmHg N: 84×/menit S:36,5°C P: 20×/menit c. Pada pemeriksaan fisik pada genetalia terdapat pengeluaran lochea sanguilenta d. Kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar, TFU pertengahan simpisis | <ul style="list-style-type: none"> a. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik b. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea <i>sanguilenta</i> c. Menganjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi . d. Memberikan kongseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI e. Memberikan dukungan psikologis pada ibu f. Menganjurkan ibu untuk tetap mengigit dan berserah diri kepada Allah <i>Swt</i> g. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2022 | <ul style="list-style-type: none"> a. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan b. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan c. Ibu bersedia makan-makanan yang bergizi d. Ibu mengerti atas penjelasan yang disampaikan e. Ibu telah menjalani tugas barunya sebagaimana peran ibu f. Ibu berserah diri kepada Allah swt g. Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah |
|---|--|--|---|--|


| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | e. Tampak pengeluaran sanguilenta | |
|--|--|-----------------------------------|--|

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 5 | <p>Sabtu, 20 Agustus 2022 Pukul 14.30 Wita Di Rumah Pasien</p> | <p>Ds : Ibu mengatakan ASI nya sudah banyak keluar, lancar, dan rajin menyusui bayinya, ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning/kecoklatan, ibu mengatakan sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik</p> <p>Do :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keadaan umum ibu baik Tanda-tanda vital TD: 120/80 mmHg N: 82×/menit S:36,5°C P: 22×/menit Pada pemeriksaan fisik pada payudara banyak mengeluarkan ASI TFU sudah tidak teraba Tampak pengeluaran lochea <i>serosa</i> | <ol style="list-style-type: none"> Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea <i>serosa</i> Menganjurkan pada ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan Menganjurkan kepada ibu untuk mengkomsumsi makanan yang bergizi seimbang Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu | <ol style="list-style-type: none"> Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan Ibu mengerti dan bersedia melakukannya Ibu bersedia menyusui anaknya Ibu mengerti atas penjelasan yang disampaikan Ibu telah mengerti penjelasan yang disampaikan Ibu mengatakan ingin memakai alat kontrasepsi KB implant Ibu bersedia membawa anaknya untuk imunisasi Ibu mengerti dan mendengarkan lantunanan ayat suci serta berdoa Ibu mengerti |
|---|--|---|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>g. Menanyakan kepada ibu apakah sudah memiliki alat kontrasepsi yang akan digunakan</p> <p>h. Menganjurkan ibu untuk membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi jika bayi sudah berusia 1 bulan pada tanggal 30 Agustus 2022</p> <p>i. Menganjurkan ibu untuk tetap mengikat dan berserah diri kepada Allah <i>swt</i></p> <p>j. Memberikan dukungan kepada ibu mengenai asuhan pada bayi dan tetap menjaga kehangatan bayinya dengan cara membedong</p> <p>k. Kunjungan ulang akan dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2022</p> | <p>dengan penjelasan yang diberikan</p> <p>k. Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah</p> |
|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 6 | <p>Selasa, 30 Agustus 2022 Pukul 15.30 Wita Di Rumah Pasien</p> | <p>Ds : Ibu mengatakan ASI nya banyak, lancar, dan rajin menyusui bayinya, ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna putih keluar dari kemaluannya, ibu mengatakan sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik, ibu mengatakan sudah datang ke puskesmas dan sudah memakai kb implant tanggal 28 Agustus 2022, ibu sudah membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi tanggal 30 Agustus 2022, ibu sudah aktif beraktifitas sehari-hari serta pola makan sudah teratur dan nafsu makan bertambah</p> <p>Do :</p> <p>a. Keadaan umum ibu baik b. Tanda-tanda vital TD: 120/90 mmHg N: 82x/menit S:37°C P: 22x/menit</p> | <p>a. Memberitahu kepada ibu bahwa kondisinya saat ini dalam keadaan baik b. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea <i>alba</i> c. Menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan d. Menganjurkan kepada ibu datang ke puskesmas apabila ada keluhan e. Menganjurkan kepada ibu untuk membawa anaknya imunisasi selanjutnya sesuai dengan jadwal f. Menganjurkan ibu untuk mengigat kepada Allah swt serta memperbanyak</p> | <p>a. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan b. Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan c. Ibu mengerti dan bersedia menyusui bayinya d. Ibu bersedia akan datang apabila ada keluhan e. Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan f. Ibu mengerti atas penjelasan yang diberikan</p> |
|---|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>c. Terdapat pengeluaran lochia <i>alba</i></p> <p>d. Payudara banyak mengeluarkan ASI</p> <p>e. TFU sudah tidak teraba</p> | <p>amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah</p> | |
|--|--|---|--|--|



CATATAN PERSALINAN

- Tanggal: 31 Juli 2022
- Nama bidan: Indah Lestari Sutrang
- Tempat Persalinan:
 - Rumah Ibu
 - Puskesmas
 - Polindes
 - Rumah Sakit
 - Klinik Swasta
 - Lainnya:
- Alamat tempat persalinan:
- Catatan: ruuk, kala I/II/III/IV
- Alasan merujuk:
- Tempat rujukan:
- Pendamping pada saat merujuk:
 - Bidan
 - Teman
 - Suami
 - Dukun
 - Keluarga
 - Tidak ada

KALA I

- Partogram melewati garis waspada: Ya
- Masalah lain, sebutkan:
- Penatalaksanaan masalah tsb:
- Hasilnya:

KALA II

- Episiotomi:
 - Ya, Indikasi
 - Tidak
- Pendamping pada saat persalinan:
 - Suami
 - Teman
 - Tidak ada
 - Keluarga
 - Dukun
- Gawat jalan:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
- Ditula bahu:
 - Ya, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
- Masalah lain, sebutkan:
- Penatalaksanaan masalah tersebut:
- Hasilnya:

KALA III

- Lama kala III: 10 menit
- Pemberian Oksitosin 10 U/lm?
 - Ya, waktu: menit sesudah persalinan
 - Tidak, alasan:
- Pemberian tilang Oksitosin (2x)?
 - Ya, alasan:
 - Tidak
- Peregangan tali pusat terkendali?
 - Ya
 - Tidak, alasan:

PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV

| Jam Ke | Waktu | Tekanan darah | Nadi | Tinggi Fundus Uterus | Kontraksi Uterus | Kandung Kemih | Perdarahan |
|--------|-------|---------------|------|----------------------|------------------|---------------|------------|
| 1 | 19-30 | 100/80 | 80 | 36.5 | STP | Kosong | ± 5 cc |
| | 19-45 | 110/80 | 81 | | STP | Kosong | ± 20 cc |
| | 20-00 | 116/80 | 82 | | STP | Kosong | ± 10 cc |
| | 20-15 | 110/80 | 84 | | STP | Kosong | ± 10 cc |
| 2 | 20-45 | 110/80 | 81 | 36.5 | STP | Kosong | ± 5 cc |
| | 21-15 | 110/80 | 81 | | STP | Kosong | ± 5 cc |

Masalah kala IV:

Penatalaksanaan masalah tersebut:

Hasilnya:

- Masase fundus uteri?
 - Ya
 - Tidak, alasan:
- Plasenta lahir lengkap (intact) Tidak
Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan:
 - a.
 - b.
- Plasenta tidak lahir > 30 menit: Ya Tidak
 - Ya, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
- Laserasi:
 - Ya, dimana: Perineum
 - Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat: 2/3/4
Tindakan:
 - Penjahitan, dengan / tanpa anestesi
 - Tidak jahit, alasan:
- Atoni uteri:
 - Ya, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
 - Tidak
- Jumlah perdarahan: 100 ml
- Masalah lain, sebutkan:
- Penatalaksanaan masalah tersebut:
- Hasilnya:

BAYI BARU LAHIR

- Berat badan: 3500 gram
- Panjang: 50 cm
- Jenis kelamin: OP
- Penilaian bayi baru lahir: baik / ada penyulit
- Bayi lahir:
 - Normal, tindakan:
 - mengeringkan
 - menghangatkan
 - rangsang taktil
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - Aspirasi ingan/pucat/biru/lemas/tindakan
 - mengeringkan
 - bebaskan jalan napas
 - rangsang taktil
 - menghangatkan
 - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
 - lain-lain sebutkan:
 - Cacat bawaan, sebutkan:
 - Hipotermi, tindakan:
 - a.
 - b.
 - c.
- Pemberian ASI:
 - Ya, waktu: 1 jam setelah bayi lahir
 - Tidak, alasan:
- Masalah lain, sebutkan:
- Hasilnya:

HASIL DOKUMENTASI KUNJUNGAN RUMAH



BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang ketidaksesuaian antara teori terhadap tinjauan kasus yang terjadi pada Ny “J” dengan kasus persalinan inpartu kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tanggal 31 Juli 2022. Pembahasan akan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan menurut 7 langkah Varney meliputi pengkajian sampai evaluasi. Pembahasan dilakukan untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah dan kesimpulan dari tinjauan teori dengan kasus sehingga dapat digunakan sebagai tindak lanjut dalam penerapan asuhan kebidanan yang efektif dan efisien khususnya pada pasien ibu bersalin dengan persalinan inpartu kala III.

1. KALA III

A. Langkah I Identifikasi data dasar

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah pengkajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi klien secara lengkap di mana data yang di kumpulkan berupa keluhan klien, riwayat kesehatan klien, pemeriksaan fisik secara lengkap sesuai dengan kebutuhan, meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, meninjau laboratorium. Pada langkah ini, bidan mengumpulkan data dasar awal secara lengkap (Mungkuji, dkk, 2014: 5).

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu, 1)Observasi, 2) Wawancara 3) Pemeriksaan. Observasi adalah pengumpulan data melalui indra penglihatan

(perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah), pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), peredaran (suhu badan, nadi). Wawancara, dimana pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting di perhatikan adalah data yang ditanyakan di arahkan data yang relevan. Pemeriksaan, dimana pengumpulan data yang dilakukan dengan memakai instrument/alat mengukur. Dengan tujuan untuk memastikan batas dimensi angka, irama kuantitas. Misalnya pengukuran tinggi badan dengan meteran, berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter (Dwi Asri, 2012: 27-28).

Data secara garis besar diklasifikasikan sebagai data subjektif dan data objektif. Pada waktu mengumpulkan data subjektif harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien/klien yang diwawancarai, lebih diperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan mencerminkan, berupa pendataan data/fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara, anamneses dengan melakukan tanya jawab untuk memperoleh data meliputi: riwayat kesehatan, riwayat reproduksi: riwayat haid, riwayat obstetri, riwayat kehamilan, persalinan dan nifas, riwayat ginekologi, riwayat KB, riwayat pemenuhan kebutuhan dasar, data sosial ekonomi dan psikologi dan pemeriksaan fisik, yang meliputi keadaan umum klien, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dilakukan secara inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi dan dilakukan pemeriksaan penunjang bila perlu.

Tahap ini merupakan langkah yang menentukan langkah berikutnya. Kelengkapan data yang sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan proses interpretasi yang benar atau tidak dalam tahap selanjutnya, sehingga dalam pendekatan ini harus komprehensif meliputi data subjektif, objektif dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi atau masukan klien yang sebenarnya.

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada inpartu kala III yang telah didapatkan pada Ny “J” usia 24 tahun, GIPIAO, datang ke Puskesmas pada pukul 18.40 wita bahwa ibu masuk tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita dengan keluhan utama ibu merasakan lelah setelah melahirkan, nyeri tembus belakang, adanya nyeri pada perineum, serta perutnya masih terasa mules, dengan riwayat keluhan utama ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 31 Juli 2022, pukul 16.00 wita, dan terdapat pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita. Sifat nyeri yang di rasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan tidak ada pengeluaran air di jalan lahir. Serta usaha klien untuk mengatasi keluhannya adalah dengan mengelus-ngelus perut dan pinggangnya. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 24 Oktober 2021, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 9 bulan, pergerakan janin pertama kali dirasakan sejak usia kehamilan \pm 5 bulan tepatnya bulan Maret 2022 sampai sekarang dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 3 kali di RS

Masita yaitu trimester I sebanyak 1×, trimester II 1×, dan di trimester III di puskesmas jumpandang baru 1×, ibu mengatakan tidak pernah mendapat suntik imunisasi TT, ibu pernah menjadi akseptor KB implant, ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit menular seperti *tubercuolosis*.

Hasil pemeriksaan usia kehamilan dilihat dengan menggunakan rumus neagle, mulai dari HPHT sampai tanggal pengkajian, maka umur kehamilan 39 minggu 6 hari (Prawirohardjo, 2014: 279). Bagian dari uterus yang merupakan tempat janin dapat tumbuh dan berkembang adalah kavum uteri dimana rongga ini merupakan tempat yang luas bagi janin untuk dapat bertahan hidup sampai aterm tanpa ada rasa nyeri perut yang hebat. Tempat tersebut berada dalam korpus uteri yang disebut dengan kehamilan intra uterin (Baety, 2012: 9).

Data objektif yang didapatkan bahwa keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, tanda-tanda vital dalam batas normal. Pada abdomen dilakukan pemeriksaan apakah ada janin kedua yang didapatkan janin tunggal, kontraksi uterus didapatkan baik, tinggi fundus uteri didapatkan setinggi pusat, tampak linea nigra, dan striae albicans, tonus otot perut tampak kendur. Pada pemeriksaan abdomen, tampak adanya linea nigra yang menandakan ibu primigravida. Tinggi fundus uteri merupakan pemeriksaan TFU yang dapat mendukung diagnosis persalinan inpartu kala III.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu adanya perubahan bentuk uterus dan tinggi fundus uterus, setelah

bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh dan tinggi fundus biasanya di bawah pusat (Tando, 2015: 98). Setelah uterus berkontraksi dan plasenta terdorong kebawah, uterus yang semula *discoïd* menjadi *glober* (bundar) akibat dari kontraksi uterus dan fundus berada di atas pusat (Kuswanti dan Melina, 2013: 120).

Semburan darah tiba-tiba darah yang terkumpul dibelakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dengan adanya gaya gravitasi. Apabila retroplasenter pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas maka retroplasenter akan pecah, sehingga terjadi semburan darah dari tepi plasenta yang terlepas. Tanda ini tampak dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir sampai 5 menit.

Tali pusat memanjang akan tampak menjulur keluar melalui vulva. Hal ini karena plasenta turun ke segmen uterus yang lebih bawah atau rongga vagina. Serta perubahan posisi uterus setelah plasenta lepas dan menempati segmen bawah rahim, maka uterus muncul pada rongga abdomen.

membantu mendorong plasenta keluar dengan adanya gaya gravitasi. Apabila retroplasenter pooling dalam ruang di antara dinding uterus dan permukaan dalam plasenta melebihi kapasitas maka retroplasenter akan pecah, sehingga terjadi semburan darah dari tepi plasenta yang terlepas. Tanda ini tampak dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir sampai 5 menit.

Berdasarkan teori yang telah didapatkan bahwa pada kala III persalinan, otot uterus (miometrium) berkontraksi mengikuti berkurangnya ukuran rongga

uterus secara tiba-tiba setelah lahirnya bayi. Penyusutan rongga uterus atau berkurangnya ukuran tempat implantasi plasenta. Tanda-tanda terlepasnya plasenta mencakup perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri, tali pusat memanjang, dan adanya semburan darah tiba-tiba. Pada kala III, otot uterus berkontraksi mengikuti penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Karena tempat perlekatan semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah maka plasenta akan terlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus. Setelah lepas, plasenta akan turun ke bagian bawah uterus atau ke dalam vagina. Setelah janin lahir, uterus mengadakan kontraksi yang mengakibatkan penciutan permukaan kavum uteri, tempat implantasi plasenta. Akibatnya, plasenta akan lepas dari tempat implantasinya (Eka dan Kurnia, 2013: 90-91).

Berdasarkan uraian di atas terdapat persamaan antara teori dengan gejala yang timbul pada inpartu kala III. Hal ini membuktikan bahwa tidak ditemukan adanya kesenjangan antara teori dan kasus.

B. Langkah II Menetapkan Diagnosa/Masalah Aktual

Pada langkah ini kegiatan yang dilakukan adalah menginterpretasikan semua data yang telah dikumpulkan sehingga diagnosis atau masalah. Diagnosis yang dirumuskan adalah diagnosis dalam lingkup praktik kebidanan yang tergolong pada standar diagnosis, sedangkan perihal yang berkaitan dengan pengalaman klien ditemukan hasil pengkajian (Mengkuji, dkk, 2014: 5).

Berdasarkan pengkajian asuhan kebidanan pada inpartu kala III yang telah didapatkan pada Ny "J" usia 24 tahun, GIPIAO, datang ke Puskesmas pada pukul 18.40 wita bahwa ibu masuk tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita dengan keluhan utama ibu merasakan lelah setelah melahirkan, nyeri tembus belakang, adanya nyeri pada perineum, serta perutnya masih terasa mules, dengan riwayat keluhan utama ibu merasakan nyeri perut tembus ke belakang sejak tanggal 31 Juli 2022, pukul 16.00 wita, dan terdapat pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita. Sifat nyeri yang di rasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering dan tidak ada pengeluaran air di jalan lahir. Serta usaha klien untuk mengatasi keluhannya adalah dengan mengelus-ngelus perut dan pinggangnya. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 24 Oktober 2021, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 9 bulan, pergerakan janin pertama kali dirasakan sejak usia kehamilan \pm 5 bulan tepatnya bulan Maret 2022 sampai sekarang dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu.

Data objektif pada kasus Ny "J" yang didapatkan dari hasil pemeriksaan yaitu bayi lahir spontan pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 wita, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi setinggi pusat, perdarahan \pm 100 cc.

Berdasarkan uraian di atas maka diagnosis pada kasus Ny"J" inpartu kala III tersebut adalah GIPIAO, dengan perlangsungan kala III.

Berdasarkan teori yang dijelaskan mengenai persalinan kala III dimulai segera setelah lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit dan kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar.

Pada teori menjelaskan bahwa kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Partus kala III disebut juga kala uri. Kala III merupakan periode waktu dimana penyusutan volume rongga uterus setelah kelahiran bayi. Penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat perlekatan plasenta. Oleh karena tempat perlekatan menjadi kecil, sedangkan ukuran plasenta tidak berubah, maka plasenta menjadi berlipat, menebal dan kemudian lepas dari dinding uterus (Kuswanti dan Melina, 2014: 199).

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny “J” di inpartu kala III tidak di temukan kesenjangan antara teori dan studi kasus.

C. Langkah III Mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar – benar terjadi (Mufdillah, dkk 2012: 117).

Pada kasus Ny “J” tidak terdapat data yang menunjang terjadinya diagnosa potensial tersebut dimana pada kasus Ny “J” di dapatkan data objektif yaitu plasenta lahir ± 10 menit setelah bayi lahir pada tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.15 wita tanpa ada penyulit, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar) tinggi fundus uteri setinggi pusat, perdarahan ± 100 cc.

Dalam mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial dilakukan pengantisipasi penanganan yang kemungkinan muncul pada kala III yaitu retensio plasenta dan atonia uteri.

Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan bahwa bahwa plasenta yang sukar di lepas dengan manajemen aktif kala III dapat disebabkan oleh adhesi yang kuat antara plasenta dan uterus (Saifuddin, 2014: 526). Faktor resiko pada ibu yang mengakibatkan plasenta tertahan atau tidak lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir yakni riwayat retensio plasenta, usia di atas 35 tahun dan grandemultipara (Akinola, dkk, 2013: 280). Dengan demikian plasenta yang belum lepas tidak akan mengakibatkan perdarahan tetapi bila sebagian plasenta telah terlepas maka akan terjadi perdarahan, hal ini mengindikasikan untuk segera mengeluarkannya dengan tindakan manual plasenta.

Sedangkan atonia uteri adalah perdarahan yang terjadi karena miometrium tidak dapat berkontraksi sehingga ujung pembuluh darah di tempat implementasi plasenta tidak dapat dihentikan yang menyebabkan perdarahan tidak terkendali (Indrayani, 2016). Faktor resiko yang menyebabkan atonia uteri adalah preklamsia, kehamilan kembar dan induksi persalinan.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny “J” di inpartu kala III pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada diagnosa potensial yang terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

D. Langkah IV Tindakan Segera/Emergensi

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat. Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan (Mufdillah, dkk, 2012: 117-178).

Langkah keempat ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan yang terjadi dalam kondisi darurat. Kondisi darurat dapat terjadi pada saat pengelolaan ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir. Kondisi darurat merupakan kondisi yang membutuhkan tindakan dengan segera untuk menangani diagnosis maupun masalah darurat yang terjadi apabila tidak segera dilakukan tindakan segera, selain di atas bisa juga berupa observasi/pemeriksaan. Pada penjelasan diatas menunjukkan bahwa bidan dalam melakukan tindakan harus sesuai dengan prioritas masalah/kebutuhan yang dihadapi kliennya. Setelah bidan merumuskan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi diagnosis/masalah potensial pada langkah

sebelumnya, bidan juga harus merumuskan tindakan darurat/segera yang harus dirumuskan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Dalam rumusan ini, termasuk tindakan segera yang mampu dilakukan secara mandiri atau bersifat rujukan (Rita Yulifah, 2013: 134).

Pada studi kasus Ny “J” tidak ada tindakan segera yang perlu dilakukan karena dalam pelaksanaan manajemen aktif kala III berjalan normal dan tidak ada tindakan yang membutuhkan penanganan segera.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny “J” di inpartu kala III yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori karena berjalan normal dan tidak ada tindakan segera/kalaborasi yang terjadi sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

E. Langkah V Intervensi

Pada langkah ini di rencanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap di lengkapi (Mufdillah, dkk 2012).

Rencana asuhan pada kasus Ny “J” disusun berdasarkan teori dengan melihat kondisi dan kebutuhan pasien. Hasil pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik dan pada pasien yaitu Ny “J” didapatkan bahwa ibu masuk tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita dengan keluhan utama ibu merasakan lelah setelah melahirkan, nyeri tembus belakang, adanya nyeri pada perineum,

serta perutnya masih terasa mules. Ibu mengatakan ini merupakan kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya, hari pertama haid terakhir tanggal 24 Oktober 2021, ibu mengatakan usia kehamilannya sekarang 9 bulan, pergerakan janin pertama kali dirasakan sejak usia kehamilan \pm 5 bulan tepatnya bulan Maret 2022 sampai sekarang dan dominan terasa pada sebelah kanan perut ibu. Melakukan pemeriksaan kehamilan sebanyak 3 kali di RS Masita yaitu trimester I sebanyak 1 \times , trimester II 1 \times , dan di trimester III di puskesmas jumpandang baru 1 \times , ibu mengatakan tidak pernah mendapat suntik imunisasi TT, ibu pernah menjadi akseptor KB implant, ibu tidak memiliki riwayat penyakit jantung, hipertensi, asma, diabetes mellitus, dan riwayat penyakit menular seperti *tubercuolosis*.

Setiap rencana asuhan haruslah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien agar dapat dilaksanakan dengan efektif karena klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut. Rencana yang dibuat harus rasional dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang *up to date* serta *evidance* terkini serta sesuai dengan asumsi tentang apa yang akan dilakukan klien. Bila diagnosis asuhan peralihan normal ditegakkan, rencana asuhan yang akan diberikan adalah memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan, melakukan pemantauan kemajuan persalinan dengan menggunakan partograf, memantau tanda-tanda vital ibu, memantau keadaan bayi, (DJJ, dan gerakan bayi, memenuhi kebutuhan hidrasi ibu, memberikan asuhan sayang ibu selama persalinan dimana menghadirkan orang-orang yang

dianggap penting oleh ibu dan memberikan dukungan psikologis pada ibu, menjaga privasi dan kebersihan ibu, serta mempertahankan kandung kemih agar tetap kosong (Nurul Jannah, 2017: 59).

Berdasarkan kasus Ny “J” telah dilakukan implementasi yaitu dengan melakukan pengecekan fundus untuk memastikan tidak ada lagi bayi, pemberian oksitosin secara IM di sepertiga lateral paha ibu, menganjurkan ibu untuk tetap berserah diri dan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali sambil melakukan dorsocranial, setelah plasenta lahir dilakukan masase uterus. Pelepasan dan pengeluaran plasenta berlangsung normal dan tidak ada penyulit yaitu berlangsung selama ± 10 menit lahir lengkap dengan kotiledon yaitu pada pukul 19.15 wita, dengan perdarahan kurang lebih 100 cc.

Teori mengatakan penatalaksanaan pada kasus manajemen aktif kala III yaitu Manajemen aktif kala III dalam persalinan terdapat tiga intervensi utama yakni pemberian *uterotonika* setelah kelahiran bayi, penegangan tali pusat terkendali dengan menunggu pelepasan dan pengeluaran plasenta serta masase fundus uteri: Pemberian oksitosin perlu dilakukan pengkajian dengan melakukan palpasi pada abdomen untuk meyakinkan hanya ada bayi tunggal. Pemberian oksitosin secara *intramuscular* pada sepertiga paha bagian luar diberikan 1 menit setelah bayi lahir. Bila 15 menit plasenta belum lahir, maka pemberian oksitosin kedua, evaluasi kandung kemih apakah penuh atau tidak, bila penuh lakukan kateterisasi. Setelah 30 menit belum lahir, maka berikan

oksitosin ketiga sebanyak 10 mg dan rujuk pasien (Kuswanti dan Melina Fitria, 2013).

Oksitosin dan ergometri kedua obat uterotonika tersebut dapat mengurangi perdarahan pada periode postpartum. Berdasarkan penelitian ibu hamil di Nigeria, ditemukan bahwa penggunaan *ergometri* aman untuk klien dengan tekanan darah normal. Pada resiko tinggi seperti riwayat hipertensi tidak dapat diberi *ergometri* karena *ergometri* meningkatkan tekanan darah secara bermakna membahayakan jiwa ibu, sebaiknya menggunakan oksitosin untuk lebih aman bagi ibu (Fauziah Yulia, 2012).

Masase fundus uteri Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase fundus uteri dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan memastikan bahwa kotiledon dan selaput plasenta dalam keadaan lengkap dari sisi maternal dan fetal. Masase fundus uteri perlu dilakukan untuk merangsang kontraksi uterus yang adekuat, sehingga perdarahan postpartum yang sering diakibatkan oleh atonia uteri dapat dihindari.

Rencana tindakan yang akan diberikan adalah melakukan manajemen aktif kala III (PTT, melahirkan plasenta, masase fundus uteri), mengevaluasi perdarahan dan memeriksa robekan pada vagina dan perineum serta melakukan katektisasi.

Rencana asuhan kebidanan yang telah disusun berdasarkan diagnosa/masalah aktual dan potensial, hal ini menunjukkan tidak ada

kesenjangan antara teori dengan manajemen asuhan kebidanan pada penerapan studi kasus di lahan praktek.

F. Langkah VI Tindakan Segera/Kalaborasi

Pada langkah keenam ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya.

Pada studi kasus Ny “j” dengan inpartu kala III semua tindakan yang direncanakan terlaksana dengan baik. Seperti menyampaikan hasil pemeriksaan dengan baik, memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk bersama, memberikan dukungan moril kepada ibu dan keluarga untuk mengambil keputusan penting dengan membesarkan hati ibu dan keluarga bahwa janin dapat lahir melewati jalan lahir secara normal. Penjelasan telah disampaikan, pasien dan keluarga memutuskan janinnya akan dilahirkan secara normal, memberikan dukungan psikologis pada ibu dan keluarga, serta memenuhi kebutuhan cairan ibu yaitu memberi ibu minum.

Berdasarkan kasus Ny “J” telah dilakukan implementasi yaitu melakukan pengecekan fundus dan tidak ada lagi bayi dalam uterus, kemudian memberitahu ibu dan menyuntikkan oksitosin dan suntikan oksitosin, dan menjepit dan memotong tali pusat. Kala III dimulai setelah bayi lahir pukul 19.05 wita, dan ditandai dengan adanya semburan darah tiba-tiba serta tali pusat

bertambah panjang. Tindakan yang dilakukan pada saat kala III yaitu melakukan manajemen aktif kala III: plasenta dan selaput ketuban lahir spontan pukul 19.15 wita kontraksi uteru baik dan TFU setinggi pusat. Lama kala III adalah ± 10 menit, plasenta dan selaput ketuban lahir lengkap, perdarahan ± 100 cc dan terjadi robekan pada vagina dan perineum.

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan pada Ny "J" di inpartu kala III Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan yang terjadi dan tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus karena seluruh tindakan yang dilakukan sesuai dengan teori dan praktik yaitu melakukan manajemen aktif kala III dan sudah berorientasi pada kebutuhan klien.

G. Langkah VII Evaluasi

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektivan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif sedangkan sebagian belum efektif (Mufdillah, dkk 2012: 118-119).

Adapun evaluasi yang dimaksudkan untuk memperoleh atau memberi nilai terhadap intervensi yang dilakukan berdasarkan tujuan kriteria yang diberikan

kepada Ny "J" di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar pada tanggal 31 Juli 2022 yaitu pada kala III berlangsung tidak lebih dari 30 menit, keadaan ibu dan janin baik, dan tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi.

Berdasarkan pada kasus Ny "J" didapatkan tidak ada penyulit dan berlangsung normal, berlangsung \pm 10 menit, kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 31 Juli 2022, jam 19.15 wita, TFU setinggi pusat, perdarahan \pm 100 cc, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), serta keadaan ibu dan bayi baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus kala III, semuanya berlangsung normal, tidak ada komplikasi yang terjadi pada ibu maupun janin. Hal tersebut terjadi karena manajemen asuhan yang diberikan sesuai dengan teori dan sesuai dengan wewenang bidan sehingga dapat disimpulkan bahwa kala III berlangsung normal, serta tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

a. Pendokumentasian SOAP kala III

1. Data subjektif yang meliputi pendokumentasian dengan pengumpulan data pasien dan informasi-informasi yang didapatkan dari hasil anamnesis, pada kasus Ny "J" telah didapatkan pada Ny "J" usia 24 tahun, GIPIAO, datang ke Puskesmas pada pukul 18.40 wita bahwa ibu masuk tanggal 31 Juli 2022, pukul 18.40 wita dengan keluhan utama ibu merasakan lelah setelah melahirkan, nyeri tembus belakang, adanya nyeri pada perineum, serta perutnya masih terasa mules.

2. Data objektif yaitu data yang didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Pada kasus Ny “J” didapatkan tanda-tanda pelepasan plasenta dengan adanya semburan darah tiba-tiba, tali pusat bertambah panjang, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
3. Assessment yaitu hasil analisis dari data subjektif dan data objektif dalam suatu identifikasi masalah/diagnosa, antisipasi terjadinya masalah potensial, dan perlunya tindakan segera. Pada kasus Ny “J” ditegakkan diagnosa perlangungan kala III.
4. Planning yaitu hasil dari tindakan asuhan yang diberikan dan evaluasi dari hasil yang telah dilakukan. Pada kasus Ny “J” telah dilakukan tindakan asuhan sesuai dengan teori yang ada, dan hasil evaluasi didapatkan plasenta lahir lengkap pukul 19.15 WITA, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tanda-tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri setinggi pusat, dan perdarahan kurang dari 100 cc.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada kala III, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

a. Pendokumentasian SOAP

Pendokumentasian SOAP Kala IV

1. Data subjektif yaitu data yang diperoleh dari pasien dengan cara pengumpulan data dari pasien melalui anamnesis. Berdasarkan kasus Ny “J” didapatkan bahwa ibu merasa lelah setelah persalinannya dan ibu mengeluh nyeri perut bagian bawah.
2. Data objektif di dapatkan hasil kala III berlangsung ± 10 menit, plasenta lahir lengkap tanggal 31 Juli 2022 jam 19.15 wita, tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar), perdarahan ± 100 cc dan kandung kemih kosong.
3. Assessment adalah hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan data objektif untuk menentukan diagnosis/masalah yang terjadi, antisipasi diagnosis/masalah potensial dan perlunya tindakan segera atau kolaborasi. Berdasarkan kasus Ny “J” maka assessment yang ditegakkan adalah perlangsungan kala IV.
4. Planning yang meliputi tindakan asuhan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assessment yang dibuat sebelumnya. Berdasarkan implementasi yang dilakukan sesuai dengan teori maka hasil evaluasi yaitu ibu dalam keadaan baik, yang ditandai dengan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu pada jam pertama 19.30 wita tekanan darah 100/80 mmHg, nadi 80x/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, kontraksi baik, kandung kemih kosong. Pada jam kedua 20.45 wita tekanan darah 110/80 mmHg, nadi

82×/menit, suhu 36,8°C, TFU setinggi pusat, kontraksi baik, kandung kemih kosong.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada kala IV, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Kunjungan Masa Nifas

1. Kunjungan nifas II tanggal 01 Agustus 2022, pukul 08.00 wita.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari:

- a. Data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan bahwa ibu melahirkan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 wita, ibu sudah BAB dan sudah BAK, ASI sudah keluar, iu sudah BAK namun belum BAB, ibu pernah menjadi akseptor KB implant.
- b. Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI, TFU 1 jrbst, kandung kemih kosong, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, tidak terdapat jahitan pada perineum, tampak pengeluaran lochea rubra.

- c. Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan assessment Ny “J” PIIAO postpartum enam jam yang lalu.
- d. Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment yang didapatkan. Pada kasus Ny “J” telah diajarkan cara masase uterus, telah melakukan mobilisasi dini, telah dianjurkan untuk menyusui bayinya secara eksklusif, telah dianjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan, telah diajarkan ibu tehnik menyusui dengan benar, telah dianjurkan ibu untuk mengkomsumsi makanan bergizi, telah dianjurkan ibu untuk meminimum obat analgetik dan zat besi yang telah diberikan, telah diajarkan ibu tentang perawatan tali pusat, telah dianjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab untuk menghindari infeksi, telah dianjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*) telah diberikan konseling pendidikan kesehatan, telah diajarkan cara menjaga suhu tubuh bayi agar tetap hangat, telah dianjurkan ibu untuk tetap mengingat kepada Allah swt seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, dan berdoa.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada postnatal care 6 jam setelah persalinana, karena penanganan yang dilakukan

pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

2. Kunjungan nifas III hari ke-6 tanggal 10 Oktober 2022, pukul 15.05 wita.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari

- a. Data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan bahwa ibu melahirkan di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tanggal 10 Agustus 2022, pukul 15.05 WITA, ASI sudah lancar, dan rajin menyusui bayinya, ibu mengatakan kondisinya sudah fit, ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan, ibu mengatakan tali pusatnya sudah kering dan terlepas, ibu mengatakan luka jahitannya sudah tidak nyeri.
- b. Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi puting susu menonjol, tidak ada nyeri tekan massa dan benjolan serta pada saat puting susu di pencet terdapat pengeluaran ASI, kontraksi uterus baik, uterus teraba bundar dan keras, *TFU* pertengahan simfisis, tampak pengeluaran sanguilenta.
- c. Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan assessment Ny “J” PIIAO postpartum hari ke 6.

d. Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment yang didapatkan. Pada kasus Ny “J” telah dijelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir, telah diberikan penjelasan *health education* seperti nutrisi, *personal hygiene*, istirahat yang cukup, telah dianjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut minimal 3 kali sehari atau saat lembab, telah dianjurkan ibu tetap memberikan ASI eksklusif pada bayinya, telah memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi dan menjaga bayi agar tetap hangat, telah dianjurkan ibu untuk merawat payudara, telah diberikan konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI, telah menganjurkan ibu untuk tetap mengigat kepada Allah dn berserah diri kepada Allah swt.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada postnatal care hari ke-6, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

3. Kunjungan nifas IV hari ke-14 tanggal 20 Agustus 2022, pukul 10.00 wita

Pendokumentasian SOAP terdiri dari

- a. Data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan bahwa ibu melahirkan 3 minggu yang lalu di Puskesmas Jumpandang Baru

Makassar tanggal 31 Juli 2022, pukul 19.05 WITA, ibu mengatakan kondisinya sudah fit, ibu mengatakan ASI sudah lancar, ibu mengatakan bayinya aktif menyusui, ibu mengatakan sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik, ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning kecoklatan.

- b. Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI, TFU tidak teraba, tampak pengeluaran *lochea serosa* kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar.
- c. Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan assessment Ny “J” PIIAO postpartum hari ke 14.
- d. Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesement yang didapatkan. Pada kasus Ny “J” telah dianjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (*personal hygiene*), telah dijelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan, telah dianjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan, telah dijelaskan dan dianjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan, telah ditanyakan kepada ibu apakah sudah memiliki alat kontrasepsi yang akan di gunakan, telah dianjurkan ibu untuk membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi jika bayinya sudah erusia

1 bulan, telah diberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, dan menjaga kehangatan bayinya dengan cara membedong, telah dianjurkan ibu untuk tetap mengigit dan berserah diri kepada Allah swt.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada postnatal care hari ke-14, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

4. Kunjungan nifas V hari ke-28 tanggal 30 Agustus 2022, pukul 15.30 wita.

Pendokumentasian SOAP terdiri dari

- a. Data subjektif yang meliputi data yang didapat dengan menganamnesis pasien. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan bahwa ibu melahirkan 4 minggu yang lalu di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar tanggal 31 Juli 2022, pukul 15.30 wita, ibu mengatakan ASI sudah lancar dan rajin menyusui bayinya, ibu mengatakan masih ada pengeluaran cairan berwarna putih keluar dari vaginanya, ibu mengatakan sudah mengerti cara merawat bayinya dengan baik, ibu mengatakan sudah datang ke Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dan sudah memakai KB implant pada tanggal 28 Agustus 2022, ibu sudah membawa anaknya imunisasi pada tanggal 30 Agustus 2022, ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialaminya selama memakai KB implant, ibu mengatakan sudah aktif

- melakukan aktifitas sehari-hari, ibu mengatakan pola makan ibu sudah teratur dan nafsu makan bertambah.
- b. Data objektif yang didapatkan adalah keadaan umum ibu baik, kesadaran composmentis, TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik dalam batas normal yang meliputi ada pengeluaran ASI, TFU tidak teraba, tampak pengeluaran *lochea alba*, tidak ada tanda-tanda infeksi.
- c. Assessment adalah hasil anamnesis dari data subjektif dan objektif. Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan pada Ny “J” didapatkan assessment Ny “J” PIIAO postpartum hari ke 28.
- d. Planning yaitu pendokumentasian yang menggambarkan semua rencana tindakan, implementasi dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesement yang didapatkan. Pada kasus Ny “J”, telah dijelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan pada jalan lahir, telah dianjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara eksklusif minimal selama 6 bulan, telah dianjurkan ibu untuk ke Puskesmas apabila ibu memiliki keluhan, telah dianjurkan ibu untuk membawa bayinya ke Puskemas untuk imunisasi selanjutnya sesuai dengan jadwal, telah dianjurkan ibu untuk tetap mengingat kepada Allah swt serta memperanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat masa nifas seperti berdzikir, mendengarkan lantunan ayat suci, berdoa seperti doa Nabi ibrahim as yang mendoakan anaknya dalam Q.S Ibrahim/14: 40.

Pada kasus Ny “J”, penulis tidak menemukan tanda-tanda infeksi atau kelainan komplikasi pada ibu maupun janin yang mungkin akan terjadi pada postnatal care hari ke-28, karena penanganan yang dilakukan pada ibu bersalin telah sesuai dengan teori sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung dilahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “J” Gestasi 39 Minggu 6 hari dengan inpartu kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar, maka bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

A. KESIMPULAN

1. Asuhan kebidanan pada Ny “J” dengan inpartu kala III dilakukan dengan teknik pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian dan analisa data dasar, pada langkah ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, mulai dari anamnesis riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan keterangan tambahan yang menyangkut atau yang berhubungan dengan kondisi klien.
2. Diagnosa Ny “J” dengan inpartu kala III ditegakkan berdasarkan adanya keluhan utama yaitu ibu merasakan lelah setelah melahirkan, nyeri perut tembus ke belakang,, adanya nyeri pada perineum serta perutnya masih terasa mules.
3. Pada Ny “J” masalah yang mungkin muncul yaitu, pada kala III persalinan kemungkinan masalah yang bisa terjadi yaitu terjadinya retensio plasenta dan

atonia uteri dan pada kala IV kemungkinan masalah yang dapat terjadi yaitu kontraksi uterus yang kurang baik.

4. Pada Ny “J” diperlukan tindakan segera, kolaborasi atau rujukan apabila terjadi masalah dalam persalinan tersebut.
5. Rencana tindakan yang telah disusun pada Ny “J” bertujuan agar ibu mendapatkan penanganan yang bersih dan aman, sesuai dengan kondisinya dan mencegah terjadinya komplikasi serta mencegah terjadinya trauma berat pada ibu dan bayinya.
6. Tindakan yang dilakukan bertujuan agar rencana yang disusun tercapai dengan adanya kerjasama antara bidan dengan petugas lainnya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan pasien.
7. Tindakan evaluasi pada Ny “J” dengan inpartu kala III telah diberikan semaksimal mungkin dan sesuai standar pelayanan/rencana asuhan kebidanan serta komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi dapat teratasi.
8. Pendokumentasian dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2022 di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar. Pengkajian dilakukan mulai dari pasien datang sampai proses persalinan dari Kala III-IV persalinan.

B. SARAN

1. Bagi klien

- a. Setiap ibu hamil harus melaksanakan persalinannya dengan aman baik dari segi penolong, tempat, atau pun peralatan kesehatan yang diperoleh dengan

melakukan persalinan di rumah sakit, puskesmas, bidan praktek mandiri, atau pun klinik dokter.

- b. Diharapkan kepada ibu untuk segera ber KB
 - c. Perlunya dukungan dan keterlibatan suami atau anggota keluarga dalam masa nifas merupakan interaksi terus-menerus yang bersifat saling mencintai, pemenuhan keutuhan emosional dan saling membutuhkan
 - d. Mengajarkan ibu untuk selalu memperhatikan keadaan bayinya.
 - e. Mengajarkan kepada ibu untuk untuk mengomsumsi makanan dengan gizi seimbang.
 - f. Mengajarkan kepada ibu untuk mengomsumsi obat secara teratur sesuai instruksi yang diberikan.
 - g. Mengajarkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan organ genetaliaanya.
2. Saran untuk bidan
- a. Bidan sebagai tenaga kesehatan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang professional sehingga dapat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian perinatal (AKP). Oleh karena itu bidan harus meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, melalui program pendidikan, pelatihan-pelatihan, seminar agar menjadi bidan yang berkualitas sesuai dengan perkembangan IPTEK.
 - b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai wewenang untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat yang mendasari bagi bidan untuk memecahkan masalah klien dan berbagai kasus.

- c. Seorang bidan hendaknya menganggap bahwa semua ibu hamil mempunyai resiko untuk komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan janin, oleh karena itu bidan diharapkan mampu mendeteksi secara dini adanya tandatanda bahaya kehamilan dan menganjurkan ibu dan keluarga segerah ke pelayanan kesehatan bila mengalami hal tersebut.
3. Saran untuk institusi kebidanan
 - a. Untuk mendapatkan hasil manajemen asuhan kebidanan yang baik perlu menyediakan tenaga bidan yang profesional untuk menunjang pelaksanaan tugas.
 - b. Untuk pelayanan yang lebih berkualitas sesuai dengan kemajuan teknologi, sebaiknya bidan yang sudah bertugas diberi kesempatan untuk melanjutkan atau semacam pelatihan-pelatihan.
 - c. Demi mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan perlu kiranya penyediaan fasilitas/alat-alat yang memadai untuk penunjang pelaksanaan tugas-tugas kebidanan dan untuk meningkatkan keterampilan bidan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, E. S., Wijaya, M., & Kurnia, I. (2018). Gambaran Lama Waktu Pelepasan Plasenta Dengan Manajemen Aktif Kala III Dan Masase Fundus Setelah Bayi Lahir. *Jsk*, 3(4), 182–188.
- Ambarwati, Eny Retna dan Tri Sunarsih. 2011. *KDPK Kebidanan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Aslamiyah, D., Fajrini, F., & Herdiansyah, D. (2018). Analisis Faktor Rekam Medis Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Di Rumah Sakit Kartini Jakarta. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(2), 203–209.
- Asrinah, dkk, 2010, *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Baety, A.N. (2012). *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Damayanti, Ika Putri, dkk. *Buku Ajar: Asuhan Kebidanan Komprehensif Pada Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Deepublish. 2014.
- Depertemen Agama, RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Dinda, N., Saleha, S., & Haruna, N. (2021). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Patologi dengan Persalinan Letak Sungsang (Literatur Review). *Jurnal Midwifery*, 3(2).
- Dwi Kurniasih, N. I. (2021). *Hubungan Lama Kala Iii Persalinan Dengan Kejadian Perdarahan Pada Ibu Post Partum Di Rsud 45 Kuningan*. 1–7.
- Eniyati, 2012, *Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eniyati dan Sholihah 2013. *Asuhan Kebidanan pada Persalinan Patologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah, Yulia. *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan*. 2012. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hernawati, E. B. M. A. (2018). Implementasi Risiko Pengurangan Kecemasan Ibu Bersalin Kala I Melalui Metode Hipnobrithing Di Klinik Bersalin Gegerkalong Kota Bandung Tahun 2016. *Jurnal Bidan*, 4(02), 73–78. <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/267038-Implementasi-Pengurangan-Resiko-Kecemasa-92d49431.Pdf>.

- Indrayani dan Djami. *Asuhan Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: TIM, 2013.
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina. *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Kuswanti, I., & Fitria, M. (2014). *Askeb II Persalinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kusmiyati Yuni. 2012. *Penuntun Belajar Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Mangkuji, Betty. dkk. 2013. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney SOAP*. Jakarta. EGS.
- Masni. (2020). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care. *International Journal Of Advanced Science And Technology*, 29(7), 3263–3271.
- Nurasiah, A., Rukmawati, A., & Badriah, D. L. (2014). *Asuhan kebidanan Persalinan Normal bagi Bidan*. Bandung : Refika Aditama.
- Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.
- Nurmawati, N., Saleha, S., & Nadyah, N. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal pada Ny” R” Gestasi 38-40 Minggu dengan Anemia Persalinan di RSUD Syekh Yusuf Tanggal 05 Juli 2018. *Jurnal Midwifery*, 1(1).
- Prawiroharjo, Sarwono. (2014) *Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka.
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo*. Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2014.
- Purwandari Atik, Dkk. “ Studi Kasus Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny. D.N Dengan Persalinan Normal Di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Tahun 2014 “. *Jurnal Ilmiah Bidan*. Vol 2 No. 1 (Januari – Juni 2014). [Http://Ejurnal.Poltekkesmanado.Ac.Id/Index.Php/Jib/Article/View/219.Pdf](http://ejurnal.poltekkesmanado.ac.id/index.php/jib/article/view/219.pdf) (Diakses Tanggal 17 Juni 2017).
- Saleha, Sitti, 2013. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas* . Jakarta: Salemba Medika.
- Saminem. 2010. *Dokumentasi Asuhan Kebidanan Konsep dan Praktik*. Jakarta: EGC.
- Sari, Eka Puspita Dan Kurnia Dwi Rimandini. *Asuhan Kebidanan Persalinan*. Jakarta: Trans Info Media, 2014.

- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*, Makassar : Alauddin University Press, 2013.
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Sudarti, Afroh Fauziah. 2011. *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sulfiana. (2014). *Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ny “F” Gestasi 38– 40 Minggu Dengan Asuhan Persalinan Normal Di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar Tanggal 16 S/D 17 Mei 2017*. *Skripsi : Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta., September.*
- Susiloningtyas, I., & Purwanti, Y. (2022). *Kajian Pengaruh Manajemen Aktif Kala III Terhadap Pencegahan Perdarahan Postpartum (Sistematik Review)*. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(128), 63-72.
- Sumarah, dkk. *Perawatan Ibu Bersalin (Asuhan Kebidanan Pada Ibu Bersalin)*. Yogyakarta: Fitramaya, 2011.
- Tando Naomy Marie. 2013. *Asuhan Kebidanan persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: In Media.
- Tanjung, M. F. A. (2019). *Tingkat Pengetahuan Bidan Tentang Manajemen Aktif Kala Iii*. *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 4(2), 5. <https://Makarioz.Sciencemakarioz.Org/Index.Php/JIM/Article/View/83/80>.
- Varney, Helen. Dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Jakarta: EGC. 2007.
- Widyastutik, Palupi. (2018). *Modul Haemoragik Post Partum*. Jakarta : EGC
- Wiknjosastro, 2008, *Pelatihan Klinik Asuhan Persalinan Normal*, IDAI, Jakarta.
- Walyani Dan Purwoastuti. 2015. *Asuhan Kebidanan Persalinan & Bayi Baru Lahir*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Yanti, 2010, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Persalinan*, Pustaka Rihama, Yogyakarta.
- Yeyeh, Ai, dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan Edisi Revisi*, DKI Jakarta : CV. Trans Info Media, 2014.
- Yulifah, Rita. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika. 2014. h. 127-137.



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS/RSP I JUMPANGANG BARU



Jalan Ir. H. Juanda No. 01 KodePos 90211
Tlp (0411) 448359 Fax (0411) 421154 Email pkjumpangbaru@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 19/PKM-JB/II/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : **INDAH LESTARI SUTRANG**
NIM / Jurusan : 70400119007 / D3 Kebidanan
Instansi / Fakultas : UIN Alauddin Makassar

Benar telah melakukan Pengambilan "DATA AWAL" di Puskesmas Jumpandang Baru, dengan judul:

"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA KALA III"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 07 Februari 2022

Kepala Puskesmas Jumpandang Baru



Dr. Fauziah Bakhtiar

NIP. 19731231 200501 2 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa
Website: fak.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3760 / Un 06/FKIK/PP.00.9/07/ 2022 Gowa, 27 Juli 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Penihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel cq. Bidang Kepala Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Di
Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Indah Lestari Sutrang
N I M : 70400119007
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan
Semester : VI (Enam)
Alamat : BTN Bumi Zarindah Blok 12

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny "X" Dengan Gestari 38 - 40 Minggu Inpartu Kala III di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2022"

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T.,SKM.,M.Keb
2. Zelna Yuni Andryani, S.St.,M.Keb

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru mulai tanggal 25 Juli - 9 September 2022 .

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Wassalam



Tembusan :
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

| | | |
|----------|---------------------------------|--------------------|
| Nomor | : 6118/S.01/PTSP/2022 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Walikota Makassar |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3260/UN.06/FKIK/PP.00.9/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|---|
| N a m a | : INDAH LESTARI SUTRANG |
| Nomor Pokok | : 70400119007 |
| Program Studi | : Kebidanan |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (D3) |
| Alamat | : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL FISILOGI PADA NY"X" DENGAN GESTASI 38-40 MINGGU INPARTU KALA III DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN 2022 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Juli s/d 09 September 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 26 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.081/KEPK/FKIK/IX/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : INDAH LESTARI SUTRANG
Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Name of the Institution

Dengan judul:
Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL FISILOGI PADA NY "X" DENGAN
 GESTASI 38-40 MINGGU INPARTU KALA III DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN
 2022"**


**"MANAGEMENT OF PHYSIOLOGIC INTRANATAL MIDWIFERY CARE FOR NY WITH 38-40 WEEKS
 OF GESTATION IN THE THIRD STAGE OF LABOR AT THE NEW JUMPANDANG HEALTH CENTER
 IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2023
This declaration of ethics applies during the period September 5, 2022 until September 5,2023

September 5, 2022
 Professor and Chairperson,


 DR. Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS/RSP I JUMPANDANG BARU



Jalan Ir. H. Juanda No. 01 KodePos 90211
Tlp.(0411) 448359 Fax (0411) 421154 Email : pkmjumban@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 295/PKM-JB/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : **INDAH LESTARI SUTRANG**
NIM / Jurusan : 70400119007 / D3 Kebidanan
Instansi / Fakultas : UIN Alauddin Makassar

Benar telah melakukan "PENELITIAN" Pada Tanggal 26 Juli 2022 s/d 09 September 2022 di Puskesmas Jumpandang Baru, dengan judul :

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL FISILOGI PADA NY "X"
DENGAN GESTASI 38-40 MINGGU INPARTU KALA III DI PUSKESMAS JUMPANDANG
BARU"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 November 2022

Kepala Puskesmas Jumpandang Baru



Dr. Fauziah Bakhtiar

NIP. 19731231 200501 2 023

RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Indah Lestari Sutrang
- Nim : 70400119007
- Tempat, tanggal lahir : Makassar, 11 Juni 2000
- Suku : Makassar
- Asal Daerah : Bulukumba
- Agama : Islam
- Alamat : BTN. Bumi Zarindah Blok D/12
2. Nama Orang Tua
- Ayah : Alm. Sutrang Haris
- Bapak : Efendi
- Ibu : Nursanti Hakim

B. Riwayat Pendidikan

- Tamat SD : SD Negeri 195 Ekatiro
- Tamat SMP : Mts.N 1 Bontotiro
- Tamat SMA : Pondok Pesantren Mdia Bontoala Makassar
- Tamat 2018 melanjutkan pendidikan pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan