

**PROFIL FLAVONOID, FENOLIK DAN ANTIOKSIDAN  
PADA TANAMAN BOTTO-BOTTO (*Chromolaena odorata L.*)  
DARI BEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN GOWA**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**ISMUNANDAR HS BANDASO**

NIM: 70100118016

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismunandar HS Bandaso  
Nim : 70100118016  
Tempat/Tgl.Lahir : Rewang, 14 November 2000  
Program Studi : Farmasi  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Judul : Profil Flavonoid, Fenolik Dan Antioksidan Pada  
Tanaman Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) Dari  
Beberapa Kecamatan Dikabupaten Gowa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 29 oktober 2022

Penyusun,

**Ismunandar HS Bandaso**  
**NIM: 70100118016**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Profil Flavonoid, Fenolik, Antioksidan Pada Tanaman Botto-Botto (Chromolaena Odorata L.) Dar Beberapa Kecamatan Di Kabupaten Gowa*” yang disusun oleh ISMUNANDAR HS BANDASO, NIM: 70300118016, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 Januari 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 18 Januari 2023

\*Kalender Hijriah

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm.,M.Si	(.....)
Munaqisy I	: apt. Isriany Ismail, S.Si.,M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Asriyah, M.Pd.I	(.....)
Pembimbing I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si.,M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm.,M.Sc	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil' alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam atas segala nikmat iman dan nikmat kesehatan serta rahmat-Nyalah sehingga skripsi yang berjudul **“Profil Flavonoid, Fenolik Dan Antioksidan Pada Tanaman Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) Dari Beberapa Kecamatan Dikabupaten Gowa”** dapat diselesaikan. Salam dan Shalawat dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, beserta para keluarga yang suci, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi (S.Farm.) pada Jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Untuk itu penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama doa dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta yang telah merawat dan mendidik penulis dari kecil hingga besar, memberikan limpahan kasih sayang, pengorbanan, dorongan semangat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan serta motivasi yang telah penulis peroleh selama proses pembuatan skripsi ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum, selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu apt., Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars, selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S. Si., M. Si, selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M. Si, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

12. Ibu Dwi Wahyuni Leboe ,S.Si, M.Si. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu apt. Munifah Wahyuddin, S.Farm, M.Sc. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Ibu apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si, selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
15. Ibu Dr. Asriyah, M.Pd.I. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
16. Bapak dan ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
17. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
18. teman-teman seperjuangan di Jurusan Farmasi angkatan 2018 (SUSPENSI) yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan kebersamaan selama ini.
19. Kepada teman-teman Angker 7 yang selalu senantiasa membantu penulis dalam menyusun skripsi, serta selalu memberikan semangat kepada penulis.

20. Kepada semua elemen yang telah memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini  
Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan pengetahuan dan pemikiran kita. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat-Nya dan hidayah-Nya kepada kita semua. ***Amin ya Rabbal Alamin,***

Makassar, 29 Oktober 2022

Penulis

Ismunandar Hs Bandaso



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional.....	4
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
A. Uraian Tanaman.....	13
B. Wilayah dan Ekosistem.....	17
C. Metabolisme Skunder.....	21
D. Ekstraksi.....	31
E. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian dan Waktu .....	40
C. Pendekatan Penelitian .....	40
D. Prosedur Kerja.....	41



E. Pengujian.....	42
F. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Hasil .....	55
B. Pembahasan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>72</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b> Jumlah metabolit sekunder yang sudah diisolasi dan dikarakterisasi pada tumbuhan tingkat tinggi (Yustinus, 2018).....	23
<b>Tabel II. 2</b> Makanan Sumber Flavonid (Sunarti, 2021).....	27
<b>Tabel IV. 1</b> Hasil ekstrak daun Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ).....	55
<b>Tabel IV. 2</b> Hasil skrining fitokimia daun Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ) .....	56
<b>Tabel IV. 3</b> Hasil pH Tanah, kegemburan tanaman Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ).....	56
<b>Tabel IV. 4</b> Hasil Pengukuran Kurvabaku Asam Galat .....	56
<b>Tabel IV. 5</b> Tabel 5. Kadar total fenolik ekstrak daun Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ).....	57
<b>Tabel IV. 6</b> Hasil Pengukuran Kurvabaku Kuersetin.....	57
<b>Tabel IV. 7</b> Kadar total flavonoid ekstrak daun Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ).....	57
<b>Tabel IV. 8</b> Hasil Pengukuran Kapasitas Antioksidan ekstrak daun Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ) .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II. 1</b> Botto-botto ( <i>Choromolaena odorata L.</i> ) .....	13
<b>Gambar II. 2</b> Struktur Dasar Flavonoid (Sirait, 2007) .....	24
<b>Gambar II. 3</b> Struktur Kimia Dan Klasifikasi Flavonoid (Tian Yang Wang et al, 2018) .....	26
<b>Gambar II. 4</b> Struktur Fenol (Kusnadi, 2018).....	28
<b>Gambar II. 5</b> Struktur Asam Galat (Junaidi & Anwar, 2018).....	31
<b>Gambar IV. 1</b> Struktur Asam Galat (Eka Junaidia, 2018).....	61



## ABSTRAK

Nama : Ismunandar Hs Bandaso

NIM : 70100118016

Judul : Profil Flavonoid, Fenolik Dan Antioksidan Pada Tanaman Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) Dari Beberapa Kecamatan Dikabupaten Gowa

Indonesia dikenal sebagai gudang tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Penggunaan berbagai jenis tumbuhan di Indonesia sebagai tanaman obat tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat jauh sebelum perkembangan obat-obatan sintetik, dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian terkait dengan pengaruh tempat tumbuh Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) terhadap kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasitas anti oksidan yang diambil dari beberapa lokasi di kabupaten gowa. Penelitian ini bertujuan Membandingkan pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) terhadap kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas Antioksidan yang tertinggi di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa. Metode dalam penelitian menggunakan ekstraksi sampel dengan meserasi dan pengujian yang dilakukan yakni uji kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan uji kapasitas anti oksidan melalui uji DPPH, CUPRAC, FRAP, dan TOAC. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasitas anti oksidan pada tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) dari beberapa kecamatan di kabupten Gowa memiliki nilai yang berbeda-beda serta terdapat pengaruh jumlah kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasitas anti oksidan pada tanaman Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) terhadap daerah tumbuh.

Kata kunci : Tanah, Flavonoid, Fenolik dan Kapasitas Anti Oksidan

## ABSTRACT

Name : Ismunandar Hs Bandaso  
Student ID Number : 70100118016  
Title : Profile of Flavonoids, Phenolics and Antioxidants in Botto-Botto Plants (*Chromolaena Odorata L.*) From Several Districts of Gowa Regency

Indonesia is known as a storehouse of medicinal plants. With this in mind, research on the effect of where Botto-Botto (*Chromolaena Odorata L.*) grows on total flavonoid levels, phenolic content, and total anti-oxidant capacity, taken from several locations in Gowa district, was carried out. This study aims to compare the effect of the botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) growing area on the highest levels of total flavonoids, phenolics, and antioxidant capacity in several districts in Gowa Regency. The method in this study used sample extraction by maceration, and the tests carried out were tests for total flavonoid content, total phenolic content, and anti-oxidant capacity tests through the DPPH, CUPRAC, FRAP, and TOAC tests. Based on the results of research and analysis of existing data, it can be concluded that total flavonoid content, total phenolic content, and anti-oxidant capacity in Botto-Botto plants (*Chromolaena odorata L.*) from several sub-districts in Gowa Regency have different values and that there is an influence on total flavonoid content, total phenolic content, and anti-oxidant capacity of Botto-Botto plants (*Chromolaena odorata L.*) from growing areas in Gowa

Key words : *Soil, Flavonoid, Phenolic, and Anti-Oxidant Capacity.*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Nabi SAW. bersabda, “Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Muslim). Manusia tidak bisa terlepas dari tanaman dan pepohonan, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya manusia memerlukan tanaman untuk dipakai sebagai kebutuhan hidup.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dengan kekayaan tersebut maka banyak juga peneliti-peneliti memanfaatkan hal tersebut untuk menjadikan sebagai bahan penelitian, bahan alam di negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, hal tersebut tentu memiliki potensi dalam pengembangan obat herbal yang berbasis pada tumbuhan obat dalam usaha kemandirian di bidang kesehatan. Tanaman obat sendiri memiliki ribuan jenis spesies. Dari total sekitar 40.000 jenis tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di Indonesia. Jumlah tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman obat. Namun hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-obatan herbal atau jamu. (Zamroni Salim, 2017).

Indonesia dikenal sebagai gudang tumbuhan yang berkhasiat sebagai obat. Penggunaan berbagai jenis tumbuhan di Indonesia sebagai tanaman obat tradisional

telah lama dikenal oleh masyarakat jauh sebelum perkembangan obat-obatan sintetik. Upaya pengobatan tradisional dengan obat-obat tradisional merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dan sekaligus merupakan teknologi tepat guna yang potensial untuk menunjang pembangunan kesehatan. Hal ini disebabkan antara lain karena pengobatan tradisional telah sejak dahulu kala dimanfaatkan oleh masyarakat serta bahan-bahannya banyak terdapat di seluruh pelosok tanah air. Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat, obat tradisional perlu dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang semakin luas dan kompleks dengan keputusan Menteri Kesehatan RI No. 99a/Menkes/SK/III/1982 tanggal 2 Maret 1982 telah ditetapkan Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan penjabaran pola Pembangunan Nasional dan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan dibidang kesehatan (Aseptianova, 2019).

Umumnya pengetahuan pengobatan tradisional hanya dikuasai oleh kaum tua. Generasi muda saat ini kurang termotivasi untuk menggali pengetahuan dari kaum tua, dan lambat laun mulai ditinggalkan karena berbagai faktor penyebab. Kondisi seperti ini, menjadikan warisan tradisional lambat laun akan mengalami kepunahan di tempat aslinya. Kecamatan Tompobulu memiliki potensi sumber daya hutan yang melimpah. Sumber daya hutan ini banyak dimanfaatkan. Oleh masyarakat terutama sebagai sumber obat traditional. Pada hutan lindung telah dimulai turun-temurun. Tumbuhan berkasiat obat ini sangat berpotensi untuk dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan tumbuhan berkasiat obat di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa merupakan Kabupaten yang mempunyai luas wilayah 1.883,32 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari 18 Kecamatan yang mempunyai luas dan ketinggian yang berbeda beda, dari luasnya Kabupaten Gowa banyak potensi tanaman yang bisa dijadikan obat tradisional. Pengambilan sampel yang dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa ini diambil di beberapa daerah sesuai dengan ketinggian, kondisi tanah, kegemburan dan pH tanah yang berbeda. (Gowa, 2017)

Ketinggian, kondisi tanah, kegemburan dan pH tanah berpengaruh terhadap tumbuh dan jumlah kandungan kimia yang ada pada tanaman. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhaidaa & Kurniawan (2018) yang menyatakan bahwa kesuburan tanah adalah kondisi atau keadaan dan kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan berbagai komponen yang ada di dalamnya seperti biologi, kimiawi dan fisika. Kesehatan tanah lebih diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan tanah yang mendukung dan menjamin tanaman dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa adanya gangguan dari berbagai aspek, salah satu ciri tanah yang subur ditandai dengan memiliki pH yang netral.

Salah satu tanaman yang dapat kita manfaatkan adalah tanaman botto-botto yang bernama latin *Chromolaena Odorata L*. Tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L*) merupakan salah satu tanaman banyak tersebar dataran di Indonesia yang dianggap sebagai tanaman liar, sebagian orang Indonesia sebagai gulma siam. Penggunaan tradisional *Chromolaena odorata L* sebagai sumber obat telah banyak digunakan di negara Afrika barat dan negara-negara Asia.



Beberapa aktivitas yang ditunjukkan oleh ekstrak daun botto-botto ialah potensi aktivitas penyembuhan luka, antibakteri, antimalaria, antiinflamasi, antioksidan, analgesik dan antiimunopresif, sitotoksik, antifungi, efektif untuk kanker payudara, dan aktivitas lainnya. Golongan Senyawa yang mungkin memberikan aktivitas farmakologi ialah, flavonoid, terpenoid, steroid, yang diisolasi dari tanaman tersebut (Finnie, 2015:8).

Maksud dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh daerah tumbuh serta jumlah kadar total Flavonoid, Fenolik, Karotenoid dan kapasitas Antioksidan yang tertinggi pada tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) di beberapa daerah. Pengambilan sampel diambil dari daerah yang mempunyai ketinggian, kelembaban dan pH tanah yang berbeda.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas maka dapat diketahui rumusan masalahnya adalah :

Bagaimana pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) terhadap kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas antioksidan yang tertinggi di beberapa daerah?

### **C. Definisi Operasional**

#### 1. Flavonoid

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar ditemukan di alam. Senyawa-senyawa flavonoid terdiri dari beberapa jenis tergantung pada tingkat oksidasi. Flavon, flavonol dan antosianidin adalah jenis yang banyak ditemukan di alam sehingga sering disebut sebagai flavonoida utama. Flavonoid

juga mempunyai efek antiinflamasi, antioksidan kandungan flavonoid juga diyakini mempunyai manfaat dalam proses penyembuhan luka.

## 2. Fenolik

Fenolik merupakan salah satu metabolik sekunder yang memiliki satu dari tanaman yang memiliki satu cincin aromatik dengan satu atau lebih substitusi gugus hidroksil (-OH) yang termasuk turunan fungsional. Fenolik juga memiliki gugus hidroksil dan paling banyak terdapat dalam tanaman.

## 3. Kapasitas Antioksidan

Kapasitas Antioksidan merupakan ukuran jumlah radikal bebas yang ditangkap oleh asam askorbat dan Trolox yang digunakan untuk mengevaluasi kapasitas antioksidan ekstrak pegagan (*Centella asiatica* L.Urban) yang dinyatakan dalam satuan mg perbandingan/g ekstrak ekuivalent.

Kapasitas antioksidan secara luas diklasifikasikan sebagai uji berbasis transfer atom hidrogen (HAT) dan transfer elektron (ET). Sebagian besar pengujian kapasitas antioksidan berbasis transfer atom hidrogen dapat mengukur kemampuan antioksidan untuk memadamkan radikal bebas umumnya radikal peroksil dengan donasi atom H. Kapasitas antioksidan mencakup metode ABTS/TEAC, CUPRAC, DPPH, Folin-Ciocaltau dan FRAP.

Metode ABTS adalah metode yang menggunakan suatu senyawa 2,2'-azinobis (3-etilbenzotiazolin)-6-asam sulfonate yang merupakan suatu senyawa yang memiliki kandungan atom nitrogen. Prinsip dari pengujian ini dengan menstabilkan radikal bebas dengan mendonorkan proton. Pengukuran aktivitas antioksidan dilakukan berdasarkan penghilangan warna ABTS yang mulanya

berwarna biru akan berubah menjadi tidak berwarna jika telah tereduksi oleh radikal bebas. FRAP (*Ferric Reducing Antioxidant Power*) merupakan salah satu pengujian antioksidan pada tumbuhan. Pada metode FRAP ini dapat menentukan kandungan antioksidan total suatu bahan yang didasarkan pada kemampuan suatu senyawa antioksidan untuk mereduksi ion  $Fe^{3+}$  menjadi ion  $Fe^{2+}$  sehingga kekuatan antioksidan suatu senyawa dianalogikan dengan kemampuan mereduksi dari senyawa tersebut.

Aktivitas antioksidan dengan metode CUPRAC menunjukkan kemampuan dalam mereduksi ion logam. Pengurangan ion tembaga yang berperan dalam pembentukan radikal bebas menunjukkan adanya potensi antioksidan dari sampel yang diteliti. Pada DPPH (2,2 difenil-1- pikrihidrazil) merupakan suatu senyawa radikal yang bersifat stabil. DPPH digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan melalui kemampuannya dalam menangkap radikal bebas. Aktivitas antioksidan diukur berdasarkan transfer elektron yang dilakukan oleh antioksidan. Semula DPPH yang berwarna ungu pekat memberikan serapan pada panjang gelombang 517 nm namun setelah mengalami reduksi maka DPPH akan berubah menjadi senyawa difenil pikril hidrazin yang warnanya akan berangsur-angsur memudar menjadi warna kuning dan nilai serapannya akan sebanding dengan jumlah elektron yang diterima. Keunggulan dari metode ini yaitu metode analisis yang sederhana, mudah, cepat, serta sensitif terhadap sampel dengan konsentrasi kecil.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil peneliti sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abubakar, H Yusuf, M Syukri, R Nasution, T Karma, AA Munawar, dan R Idroes “*Chemometric classification of geothermal and nongeothermal ethanol leaf extract of seurapoh (Chromolaena odorata Linn) using infrared spectroscopy*” penelitian ini melaporkan klasifikasi kemometrik ekstrak etanol daun seurapoh (*Chromolaena odorata Linn*) yang diperoleh dari daerah panas dan dingin. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi korelasi antara ekstrak etanol daun seurapoh (ELES) yang dikumpulkan dari tiga lokasi, satu daerah panas (*Ie Seuum*) dan dua daerah dingin (Pantai Lhoknga, Samahani), Provinsi Aceh Besar, Indonesia. Ekstraksi dilakukan dengan etanol 96% menggunakan maserasi. Setelah ekstraksi, spektrum inframerah masing-masing sampel diperoleh menggunakan spektroskopi inframerah-dekat (NIR) pada kisaran bilangan gelombang 10.000 cm – 4.000 cm. Data spektral diproses sebelumnya dengan metode MSC untuk menghilangkan efek hamburan cahaya selama akuisisi spektral. Klasifikasi ELES dilakukan dengan menggunakan *Principle Component Analysis* (PCA), menghasilkan skor plot sebagai berikut, PC1 dan PC2 mampu menjelaskan 97% dari total data (PC1 = 87%, PC2 = 10%). Hasilnya juga mengungkapkan diskriminasi sampel yang sangat baik berdasarkan lokasi pengambilan sampel masing-

masing. Lebih lanjut menyiratkan bahwa ELES memiliki profil spektral NIR berbeda yang signifikan, yang mengikuti lokasi pengambilan sampel mereka. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat kemungkinan adanya senyawa yang berbeda yang terkandung dalam ELES, yang dikumpulkan dari area panas bumi dan dua area dingin bumi lainnya.

Persamaan dari penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengambilan sampel yang diambil dari daerah yang berbeda, namun terdapat perbedaan diantaranya penelitian yang akan dilakukan menguji terkait dengan pH dari tanah, kegemburan serta suhu terhadap kadar total flavonoid, fenolik, karotenoid dan kapasitas antioksidan menggunakan spektrofotometri UV-VIS.

2. Penelitian oleh K. Vijayaraghavan, J. Rajkumar, M.A. Seyed “*Efficacy of Chromolaena odorata leaf extracts for the healing of rat excision wounds*”, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi penyembuhan luka dari ekstrak air dan etanol dari *C.odorata* yang diambil dari daerah perbukitan Ootacamund (Ooty), India dalam model luka eksisi tikus. Penyelidikan ini melibatkan penyaringan fitokimia dan in vitro analisis berbagai parameter seperti aktivitas antioksidan, aktivitas penghambatan lipid peroksida dan efek ekstrak pada kontraksi dan epitelisasi luka eksisi tikus. Skrining fitokimia ekstrak etanol dan air menunjukkan bahwa mereka kaya akan metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, terpenoid, antrakuinon, glikosida jantung dan karbohidrat. Ekstrak air menunjukkan aktivitas penghambatan antioksidan dan lipid peroksida yang

tinggi sedangkan ekstrak etanol menunjukkan kadar fenol total dan aktivitas penghambatan hidrogen peroksida yang tinggi pada konsentrasi 50, 100 dan 250 g/ml. Hasil ini juga menunjukkan bahwa konsentrasi yang paling efektif dari *C.odorata* ekstrak untuk penyembuhan luka eksisi adalah 5,0% (b/b). *C.odorata* Kelompok yang diberi perlakuan menunjukkan pengurangan area luka yang lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kontrol dan kelompok yang diobati dengan betadine. Selain itu, aplikasi topikal dari *C.odorata* ekstrak meningkatkan sintesis kolagen dan stabilisasi di lokasi luka, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan kadar hidroksiprolin dan heksosamin dan ekspresi kolagen. Penyelidikan ini menunjukkan bahwa ekstrak air dan etanol dari *C.odorata* konsentrasi yang bervariasi mendorong proses penyembuhan luka yang dipercepat dan mungkin mewakili agen penyembuhan baru. Temuan ini memiliki relevansi klinis potensial dan mungkin sangat bermanfaat untuk penemuan dan pengembangan obat di bidang kedokteran manusia dan hewan.

Berdasarkan penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang dilakukan, persamaan terletak pada uji fitokimia menggunakan sampel yang sama yang diambil dari daerah perbukitan. Namun pada penelitian yang akan dilakukan pengambilan sampel dari beberapa daerah dan tidak melakukan pengujian kepada hewan uji, serta melakukan pengukuran kadar total flavonoid, fenolik, karotenoid dan kapasitas antioksidan dari 9 lokasi yang berbeda.

3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Solihah, Herlina, Inayatul Munawwaroh, dan Riana Sari Puspita Rasyid (2020) yang berjudul “*In vivo study of the antioxidant test of ethanolic extract of Chromolaena odorata Linn. Leaves*” Penelitian ini mengevaluasi aktivitas antioksidan dengan berbagai dosis ekstrak etanol daun *Chromolaena odorata* L. terhadap tikus wistar jantan yang diinduksi parasetamol. Kandungan flavonoid diukur secara spektrofotometri berdasarkan pembentukan kompleks flavonoid-aluminium. Quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Uji *in vivo* menggunakan metode TBARS yang dilakukan dengan cara pengukuran kadar malondialdehid (MDA) tikus wistar jantan yang diinduksi parasetamol 2g/Kg BB. Pengujian dilakukan pada ekstrak dengan dosis 125, 250, dan 500 mg/Kg. BB. Vitamin C dengan dosis 6,5mg/Kg BB digunakan sebagai kontrol positif, dan 1% Na CMC digunakan sebagai kontrol negatif. Penilaian histopatologi hati yang digunakan Pewarnaan Hema-toxylin Eosin. Sampel daun kering *Chromolaena Odorata Linn.* diperoleh dari Belitung, Sumatera Selatan, Indonesia. 2 Kg daun kering digiling menjadi bubuk kemudian direndam dengan etanol 96% (1:10). Proses maserasi tetap terjaga dalam botol kuning pada suhu kamar selama 72 jam dan terguncang sesekali. Maserat disaring kemudian diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 60°C sampai mendapatkan ekstrak yang kental.

Dari penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan metode ekstraksi yang sama menggunakan etanol

96 %. Namun pengambilan sampel yang dilakukan hanya dari satu lokasi saja.

4. Dari penelitian yang dilakukan oleh Noor Zafirah Ismail *et al.* (2017) yang berjudul “*Determination of Phenolic and Flavonoid Contents, Antioxidant Activities and GC-MS Analysis of Clinacanthus nutans (Acanthaceae) in Different Location*” *Clinacanthus nutans* adalah tanaman obat esensial yang telah digunakan dalam berbagai pengobatan lokal untuk mengobati banyak penyakit. Sebuah studi telah dilakukan untuk menentukan fenolik, flavonoid, antioksidan aktivitas dan senyawa fitokimia dari *C. kacang* di lokasi yang berbeda. *C. kacang* adalah dipanen dari delapan lokasi dan daunnya diekstraksi dengan metanol 80% dengan maserasi proses. Kemudian dilakukan penyaringan fitokimia menggunakan Kromatografi Gas-Spektrometri Massa (GC-MS), 2,2 difenil-2-pikrilhidrazil hidrat (DPPH) assay metode, kandungan total fenolik oleh Folin-Ciocalteu's metode pengujian dan kandungan flavonoid total dengan aluminium klorida ( $AlCl_3$ ) dilakukan. C.ekstrak kacang menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan kandungan fenolik dan flavonoidnya. yang netral pH tanah lempung berpasir dari lokasi KKK (Kuala Ketil, Kedah, Malaysia) memiliki aktivitas antioksidan yang lebih tinggi (58,0%), fenolik (44,1 mg GA.100 g<sup>-1</sup>) dan kandungan flavonoid (30,8 mg QE.100 g<sup>-1</sup>) dibandingkan ke lokasi lain. Analisis GC-MS menunjukkan adanya konstituen fitokimia dari 20 senyawa. Hasilnya mengungkapkan bahwa faktor lingkungan (intensitas cahaya, suhu dan karakteristik tanah) dari



delapan lokasi adalah bertanggung jawab untuk variasi fenolik, flavonoid, antioksidan dan analisis GC-MS pada *C. nutans*.

Penelitian diatas mempunyai kesamaan terhadap penelitian yang akan dilakukan, letak dari persamaannya yakni peneliti melalukan penelitian terhadap tanaman dengan membandingkan kadar total flavonoid dan antioksidan dari beberapa daerah, namun sampel yang digunakan berbeda dengan peneltian yang akan dilakukan. Dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L.*), sedangkan penelitian diatas menggunakan sampel *Clinacanthus nutans*.

#### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Membandingan pengaruh daerah tumbuh tanaman botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) terhadap kadar total Flavonoid, Fenolik dan kapasitas Antioksidan yang tertinggi di beberapa kecamatan di Kabupaten Gowa.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti serta menambah pengetahuan masyarakat tentang potensi tanaman botto-botto sebagai obat tradisional. Serta dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah yang dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Uraian Tanaman



**Gambar II. 1** Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) (Umar, 2014)

#### 1. Klasifikasi Tanaman

Kingdom	: <i>Plantae</i>
Division	: <i>Magnoliophyta</i>
Class	: <i>Magnoliopsida</i>
Ordo	: <i>Asterales</i>
Family	: <i>Asteraceae</i>
Genus	: <i>Chromolaena</i>
Spesies	: <i>Chromolaena odorata L.</i> (Zahara, 2019).

## 2. Nama Daerah

Tanaman yang bernama latin *Chromolaena odorata* (L.) mempunyai nama lain baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. khususnya di Makassar, spesies ini dikenal dengan beberapa nama, seperti botto-botto, laruna dan gondrong-gondrong. Dibeberapa daerah lain memiliki nama tersendiri seperti, Kopasanda di Maros, Ki Rinyuh di Sunda, Tekelan di Jawa, Siam Weed atau Jack in the Bush di Inggris. (Ashar, 2016).

## 3. Morfologi

Botto-botto memiliki siklus hidup yang pendek kira-kira maksimal 10 tahun. Ini adalah herba abadi yang membentuk semak kusut lebat setinggi hingga 2 m. Kadang-kadang mencapai ketinggian maksimum 6 m (sebagai pemanjat pada tumbuhan lain). Cabang-cabang yang berpasangan tumbuh bebas melalui batang utama. Batang tua dipangkal berwarna coklat dan berkayu, sedangkan ujungnya lunak dan hijau. Formasi akar berserat dan tidak menembus lebih dari 20-30 cm di sebagian besar tanah. Bunganya berwarna putih atau pucat kebiruan-ungu, dan bentuk menutupi seluruh permukaan. Daunnya berbentuk mata panah, panjangnya 50-120 mm dan lebarnya 30-70 mm. Mereka tumbuh berpasangan di sepanjang batang dan cabang. Daun mengeluarkan bau yang menyengat ketika diremas, tanaman ini biasa juga disebut sebagai gulma siam.

Daun botto-botto berbentuk lonjong dengan panjang 6-10 cm dan lebar 3-6 cm, bagian bawahnya lebih lebar dan ujungnya lebih runcing. Tepi daun bergerigi dan menghadap pangkal serta posisi daun berhadap-hadapan. Karangan bunga terletak di ujung cabang (terminal), terdiri dari 20-30 bunga dengan warna kebiruan

untuk bunga muda dan coklat untuk bunga dewasa. Bunganya mekar di musim kemarau, hal ini berkembang bersamaan terjadi dalam waktu 3-4 minggu. Saat biji sudah matang maka tanaman akan mengering, biji akan pecah dan terbawa angin. Pada awal musim hujan, potongan batang, cabang dan pangkal batang bertunas kembali, benih yang jatuh mulai berkecambah dan dua bulan berikutnya kecambah dan pucuk mendominasi area yang ditempati.

Tanaman botto-botto tumbuh serta berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga tumbuhnya itu saling rapat dan menghalang tumbuhan lain untuk tumbuh. Botto-botto dapat tumbuh sampai ketinggian 1000-2800 mdpl, di Indonesia sendiri ditemukan didaerah dataran rendah (0-500 mdpl) seperti tanaman kepala dan karet (Zahara, 2019).

#### **4. Kandungan Kimia**

Menurut Sirinthipaporn & Jiraungkoorsku (2017) daun botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) mempunyai kandungan flavonoid aglikon (flavanon, flavonol, flavon) termasuk acacetin, chalcones, eupatilin, luteolin, naringenin, kaempferol, quercetin, quercetagenin, dan sinensetin, terpen dan terpenoid, minyak esensial, alkaloid termasuk pirolizidin, saponin dan tanin, asam fenolik termasuk asam ferulic, asam protocatechuic, senyawa fitoprostan termasuk asam kromorat. Dalam daun kering dari botto-botto mengandung abu (11%), lemak kasar (11%), serat (15%), kadar air (15%), protein kasar (18%), dan karbohidrat (31%).

Senyawa flavonoid daun botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) memiliki kemampuan untuk menstabilkan radikal bebas yang dihasilkan gugus hidroksil, metoksil atau dengan mendukung sistem konjugasi elektron, Flavonoid dapat

mengeleminasi radikal bebas, yang merupakan zat antara reaktif yang berpotensi terlibat dalam menunda penyembuhan luka (Fatmawati, 2019). Flavonoid sebagai antioksidan kuat dapat mengurangi lipid peroksidasi sehingga membantu proses reepitelisasi dan antimikroba. Saponin dan terpenoid dalam ekstrak tumbuhan juga telah dikaitkan dengan kontribusi terhadap peningkatan aksi biologis dari banyak tumbuhan obat. Saponin meningkatkan kemampuan reseptor TGF- $\beta$  fibroblas berikatan dengan TGF- $\beta$ . TGF- $\beta$  merupakan faktor pertumbuhan yang diperlukan fibroblas dalam mensintesis kolagen, sedangkan tannins diduga berperan dalam pengaturan transkripsi dan translasi *vascular endothelial growth factor* (VEGF). VEGF bertindak secara parakrin tidak hanya dalam endotel vaskular kulit, tetapi juga keratinosit dan sel imun yang memperlihatkan efek reepitelisasi dan pada saat yang sama memulihkan angiogenesis serta perfusi oksigen (Irena Pastar, 2013).

Selain itu, flavonoid, tannin dan saponin mampu bertindak sebagai agen hemostatic yang mampu mempercepat dalam proses penyembuhan luka. Flavonoid dalam daun Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) mampu mengagregasi dan mempengaruhi kenaikan jumlah trombosit, juga mampu bertindak sebagai koagulan darah, mempercepat pembekuan darah melalui jalur intrinsik yang terdeteksi oleh tes APTT (*Activated Partial Thromboplastin Time*). Dalam mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk (B O Putry, 2021).

## 5. Efek Farmakologi

Dilaporkan dari rivew jurnal yang dilaksanakan oleh Zahara (2019) serta jurnal yang di tuliskan oleh Sirinthipaporn & Jiraungkoorskul (2017) dengan judul “*Wound Healing Property Review of Siam Weed, Chromolaena odorata*” bahwa daun Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) bahan alam yang berkhasiat anti bakteri, antikanker, antikonvulsan, antidiabetes, anti diare, antijamur, antiinflamasi, antioksidan, antiparasit, hemostatik, penyembuhan luka dan aktivitas hepatoprotekti juga obat batuk.

### B. Wilayah dan Ekosistem

Wilayah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah daerah (kekuasaan, pemerintahan, dan sebagainya); lingkungan dari suatu daerah. Sedangkan dalam Wikipedia Bahasa Indonesia adalah suatu daerah yang mencakupi suatu kedaulatan. Sedangkan ekosistem merupakan suatu satuan ekologi yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Dalam KBBI, ekosistem dimaksud sebagai suatu komunitas yang terdiri atas tumbuhan dan hewan, bersama dengan habitatnya.

A.G. Tansley berpendapat bahwa struktur dan fungsi yang terdapat dalam suatu ekologi tertentu disebut sebagai ekosistem. Struktur yang terdapat dalam ekosistem tersebut tidak lain merupakan keanekaragaman spesies. Tingginya keanekaragaman spesies disebabkan oleh stuktur kompleks yang dimiliki oleh ekosistem. Sedangkan fungsi yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan siklus materi serta arus energi melalui komponen ekosistem.

Menurut Soemarwoto (1983), ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tingkatan organisasi ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi yang berbeda-beda. Ekosistem memiliki dua komponen yaitu komponen hidup atau biasa disebut dengan komponen biotik dan komponen tak hidup yang disebut dengan komponen abiotik. Komponen biotik ialah makhluk hidup itu sendiri sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang berasal dari benda-benda bukan makhluk hidup yang ada disekitarnya misalnya seperti tanah.

Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan untuk kemaslahatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tubuh tanah terdiri atas udara (20-30%), air (20-30%), bahan mineral (45%), dan bahan organik (5%). Tanah sifatnya sangat dinamis yaitu terus menerus mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh iklim (curah hujan dan suhu), bentuk wilayah (relief atau bentuk permukaan tanah), bahan induk, waktu, dan organisme.

Berdasarkan ukuran partikelnya, tanah dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tanah dengan ukuran partikel kasar (mengandung pasir dan kerikil), partikel halus (tanah lempung dan liat), dan tanah dengan organik tinggi (misalnya tanah gambut).

### **1. Struktur Tanah, Unsur Hara, dan Tanaman Endemi**

Pada dataran tinggi, terletak di lokasi yang dekat dengan pegunungan dengan ketinggian mencapai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki permukaan alam yang bergelombang dan juga berbukit. Dataran tinggi juga disebut sebagai plato karena mencapai ketinggian 700 meter di atas permukaan

laut. Tanah pada dataran tinggi memiliki banyak kandungan air dan unsur hara yang tinggi sehingga subur dan cocok untuk lahan pertanian. Tanaman endemik yang dapat tumbuh pada dataran tinggi salah satunya ialah Edelweiss Jawa, pojon pirdot.

Pada dataran rendah, memiliki permukaan yang lapang, datar, landai, dan juga rata. Dataran rendah sering kali ditemui di dekat pantai. Maka karena itu pula, udara yang terletak di dataran rendah relatif tidak terlalu dingin. Dataran rendah memiliki suhu yang normal, artinya tidak terlalu panas namun juga tidak terlalu dingin. Lokasi dari dataran rendah berada pada ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut.

Dataran rendah ada beberapa jenis tanah yang memiliki tingkat kesuburan tanah yang tinggi, contohnya tanah margel yang memiliki kandungan air tinggi sehingga cocok dijadikan lahan pertanian yang ada di daerah dataran rendah yang kurang terkandung air. Tanaman endemik yang dapat tumbuh pada dataran ialah anggrek hitam. Pada daerah pesisir (pantai) berbatasan langsung dengan lautan. Jenis tanah pada daerah pantai memiliki ciri-ciri lingkungan yang berpasir. Jenis tanaman endemik yang tumbuh pada daerah pesisir ialah tanaman bakau, dan pandan pantai.

## **2. Tempat Tumbuh dan Kandungan Kimia Tanaman**

Terdapat banyak kandungan kimia yang ada pada tanaman diantaranya ialah alkaloid, tanin, flavonoid, glukosida, terpenoid, dan lain-lain.

- a. Alkaloid ialah sebuah golongan senyawa basa bernitrogen yang kebanyakan heterosiklik dan terdapat di tumbuhan (tetapi ini mengecualikan senyawa yang berasal dari hewan). Asam amino, peptida, protein, nukleotid, asam nukleik,



gula amino dan antibiotik biasanya tidak digolongkan sebagai alkaloid. Dengan prinsip yang sama, senyawa netral yang secara biogenetik berhubungan dengan alkaloid termasuk digolongan ini.

- b. Tanin (atau tanin nabati, sebagai lawan tanin sintetik) adalah suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, berasa pahit dan kelat, yang bereaksi dengan dan menggumpalkan protein, atau berbagai senyawa organik lainnya termasuk asam amino dan alkaloid. Tanin (dari bahasa Inggris *tannin*; dari bahasa Jerman Hulu Kuno *tanna*, yang berarti “pohon ek” atau “pohon berangan”) pada mulanya merujuk pada penggunaan bahan tanin nabati dari pohon ek untuk menyamak belulang (kulit mentah) hewan agar menjadi kulit masak yang awet dan lentur. Namun kini pengertian tanin meluas, mencakup aneka senyawa polifenol berukuran besar yang mengandung cukup banyak gugus hidroksil dan gugus lain yang sesuai (misalnya karboksil) untuk membentuk perikatan kompleks yang kuat dengan protein dan makro molekul yang lain.
- c. Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari tumbuhan telah diidentifikasi, tetapi ada tiga kelompok yang umum dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon. Antosianin (dari bahasa Yunani *anthos*, bunga dan *kyanos*, biru-tua) adalah pigmen berwarna yang umumnya terdapat di bunga berwarna merah, ungu, dan biru. Pigmen ini juga terdapat di berbagai bagian tumbuhan lain misalnya, buah tertentu, batang, daun dan bahkan akar.

Flavonoid sering terdapat di sel epidermis. Sebagian besar flavonoid terhimpun di vakuola sel tumbuhan walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakuola.

- d. Glukosida ialah senyawa glukosa (misal glukosa-alfa-glukosida atau maltosa). Atau disebut sebagai penyusunan tumbuhan netral tidak bernitrogen, yang diuraikan oleh kalor, asam encer, alkali, enzim, bakterium, atau jamur membentuk zat (glukosa) dan senyawa lain.
- e. Terpena merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakuola selnya. Pada tumbuhan, senyawa-senyawa golongan terpena dan modifikasinya, terpenoid, merupakan metabolit sekunder. Terpena dan terpenoid menyusun banyak minyak atsiri yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kandungan minyak atsiri memengaruhi penggunaan produk rempah-rempah, baik sebagai bumbu, sebagai wewangian, serta sebagai bahan pengobatan, kesehatan, dan penyerta upacara-upacara ritual. Nama-nama umum senyawa golongan ini sering kali diambil dari nama minyak atsiri yang mengandungnya.

### C. *Metabolisme Sekunder*

Metabolit sekunder adalah golongan senyawa yang terkandung dalam tubuh mikroorganisme, flora dan fauna yang terbentuk melalui proses metabolisme sekunder yang disintesis dari banyak senyawa metabolisme primer, seperti asam amino, asetil koenzim A, asam mevalonat dan senyawa antara dari jalur shikimate. Metabolit sekunder juga di definisikan sebagai senyawa organik yang tidak terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, atau reproduksi normal suatu organisme. (Durairaj Thirumurugan, 2018)

## 1. Metabolisme

Metabolisme dapat didefinisikan sebagai jumlah dari semua reaksi biokimia yang dilakukan oleh sebuah organisme. Metabolit adalah zat antara dan produk metabolisme dan biasanya terbatas pada molekul kecil. Istilah "sekunder" yang diperkenalkan oleh A. Kossel pada tahun 1891 menyiratkan: bahwa sementara metabolit primer ada di setiap sel hidup yang mampu membelah, metabolit sekunder hanya ada secara kebetulan dan tidak terlalu penting untuk kehidupan organisme. Meskipun metabolit sekunder berasal dari metabolisme primer, mereka tidak membentuk kerangka molekul dasar organisme. Ketidakhadirannya tidak serta merta membatasi kehidupan suatu organisme, fitur yang bertentangan dengan metabolit primer, tetapi kelangsungan hidup organisme, organisme terganggu untuk tingkat yang lebih besar. Kehadiran dan sintesisnya diamati pada spesies yang secara ekologis kurang beruntung dalam kelompok filogenetik (Durairaj Thirumurugan, 2018).

## 2. Jenis Metabolisme Sekunder

Metabolit sekunder banyak dimanfaatkan manusia pada berbagai bidang kehidupan, misalnya bidang dari kesehatan, pertanian, pangan, dan lain sebagainya, dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga kini sudah puluhan ribu MS diisolasi dan dikarakterisasi (Tabel II.1), bahkan banyak yang sudah diperdagangkan.

**Tabel II. 1** Jumlah metabolit sekunder yang sudah diisolasi dan dikarakterisasi pada tumbuhan tingkat tinggi (Yustinus, 2018)

<b>Tipe metabolit sekunder</b>	<b>Jumlah*</b>
<i>Mengandung Nitrogen</i>	
<i>Alkaloid</i>	21.000
<i>Non-protein amino acid (NPAA)</i>	700
<i>Amina</i>	100
<i>Glikosida sianogenik</i>	60
<i>Glukosinolat</i>	100
<i>Alkamida</i>	150
<i>Lektin, peptida, polipeptida</i>	2000
<i>Tanpa Nitrogen</i>	
<i>Monoterpen (C10)</i>	2500
<i>Suskuiterpen (C15)</i>	5000
<i>Diterpen</i>	2500
<i>Triterpen, steroid, saponin (C30, C27)</i>	5000
<i>Tetraterpen (C40)</i>	500
<i>Flavanoid, tanin</i>	5000
<i>Fenilpropanid, lignin, kumarin, lignin</i>	2000
<i>Polisasetilen, asam-asam lemak, lilin</i>	1500
<i>Poliketida</i>	750
<i>Karbohidrat, asam-asam organik</i>	200

Klasifikasi metabolit sekunder secara sederhana terdiri atas tiga kelompok

utama:


- a. terpen (misalnya volatil, glikosida kardiak, karotenoid, dan sterol.
  - b. fenolik (misalnya asam fenolat, kumarin, lignan, stilbena, flavonoid, tanin, dan lignin)
  - c. senyawa yang mengandung nitrogen (misalnya alkaloid dan glukosinolat)
- (Yustinus Ulung Anggraito, 2018)

#### 1. Uraian Flavonoid

Flavonoid termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki banyak gugus –OH dengan adanya perbedaan keelektronegatifan yang tinggi, hingga sifatnya polar. Senyawa golongan ini mudah terekstrak dalam pelarut etanol yang memiliki sifat polar karena adanya gugus hidroksil, sehingga mampu terbentuk

ikatan hidrogen (Sriwahyuni et al, 2010). Flavonoid merupakan senyawa yang terdapat pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa minuman yang memiliki berbagai macam manfaat biokimia serta efek antioksidan. Golongan senyawa flavonoid mempunyai efek antihipertensi. Flavonoid adalah pigmen dari tumbuhan untuk memproduksi warna bunga merah atau biru pigmentasi kuning pada kelopak yang digunakan untuk menarik hewan penyerbuk (Robertino Ikalinus, 2015).


Flavonoid merupakan golongan senyawa polifenol yang diketahui mempunyai sifat sebagai penangkap radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif, serta bekerja sebagai antiinflamasi, flavonoid berfungsi mengatur pertumbuhan, fotosintesis, anti-mikroba, serta antivirus. Flavonoid memiliki manfaat untuk melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, anti-inflamasi, mencegah keroposnya tulang, serta sebagai antibiotik (Robertino Ikalinus, 2015).



**Gambar II. 2** Struktur Dasar Flavonoid (*Sirait, 2007*)

Flavonoid merupakan kelompok yang memiliki berat molekul rendah berbasis inti 2-fenil-kromon yang merupakan turunan biosintetik asam asetat/ fenilalanin menggunakan jalur asam shikimat. Secara tradisional, flavonoid

diklasifikasikan menurut tingkat oksidasi, cincin C annularitas, dan posisi persimpangan cincin B (Gambar 2). Flavon dan flavonol mengandung jumlah terbesar senyawa, mewakili sejumlah kecil flavonoid, yaitu kategori 2-benzoyl-pyrone. Misalnya, flavonol kuarsetin paling sering dipelajari. Flavanon dan flavanonol memiliki ikatan C jenuh, dan sering ditemukan dengan flavon dan flavonol pada tanaman. Isoflavon, seperti daidzein, adalah senyawa 3-fenil-kromon. Sebagai pendahulu sumber utama biosintesis flavonoid, chalcone adalah isomer pembuka cincin C dari dihidroflavon, bertanggung jawab untuk tampilan warna menanam. Struktur flavonoid, auron adalah cincin C beranggota 5 turunan benzofuran. Anthocyanidins adalah kelompok penting pigmen krom untuk karakteristik warna tumbuhan, ada dalam bentuk ion. Flavanol adalah produk reduksi dihidroflavonol, terutama dengan flavan-3-ol terdistribusi pada kerajaan tumbuhan, juga dikenal sebagai katekin. Namun, masih ada flavonoid lain tanpa kerangka C6-C3-C6, misalnya, biflavon, chromones, furan dan xanthone.



**Gambar II. 3** Struktur Kimia Dan Klasifikasi Flavonoid (Tian Yang Wang et al, 2018)

Glikosida, menurut kategori penghubung yang berbeda, yang mendominasi bentuk flavonoid yang ada. (Tian-yang Wang, 2018)

Jenis-jenis makanan yang mengandung flavonid dan subkelompok flavonoid dapat dilihat pada tabel 1. Katekin, katekin-gallatem, kuersetin, dan kaemferol merupakan beberapa contoh subkelompok flvonoid yang penting dan banyak dimanfaatkan (Sunarti, 2021).

**Tabel II. 2** Makanan Sumber Flavonid (Sunarti, 2021)

Subkelompok Flavonoid	Sumber	Flavonoid Spesifik
Flavonol	Bawang putih, buah ceri, apel, brokoli, tomat, beri, teh hitam, daun bawang, buah jeruk	Isorhemnetin, kaemferol, kuersetin, miricetin, rutin, pinosembrin
Flavanol	Apel, teh hijau, kiwi, dan olahan kakao	Katekin, gallaktokatekin, epikatekin, epigallokatekin gallate
	Jus buah	Pronsiandin
	Teh hitam	Theaflavin
Antosianin	Buah-buahan, bluberi, pisang, stroberi, kranberi, dan <i>blackcurrant</i>	Antosianidin, sianidin, delfinidin, malvidin, pelargonidin, petunidin, peonidin
Isoflavonoid	Kacang-kacangan (kacang kedelai), olahan kacang kedelai, tahu, dan tempe	Daizein, ganistein, glisitein, formononetin, biochanin A
Flavanon	Buah jeruk, kurkumin, jeruk bali, lemon, tomat	Hasperidin, naringenin, neohesperidin, eriokditiol
Flavon	Rempah-rempah, sereal, buah-buahan, peterseli, dan timi	Apigenin, krisin, liteolin

Instilah flavonoid diberikan untuk senyawa-senyawa *fenol* yang berasal dari kata *flavon*, yaitu nama dari salah satu flavonoid yang terbesar jumlahnya dalam tumbuhan. Senyawa-senyawa *flavon* ini mempunyai kerangka *2-fenilkroman*, dimana posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B dari *1,3-diarilpropana* dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga membentuk cincin *heterosiklik* yang baru (Cincin C). Senyawa-senyawa *isoflavonoid* dan *neoflavonoid* hanya ditemukan dalam beberapa jenis tumbuhan, terutama suku *Laguminosae* (Yuslianti, 2018).

Pada tanaman, flavonoid berfungsi pada proses fotosintesis, anti mikroba, dan anti virus. Aktivitas anti-oksidasi juga dimiliki oleh komponen aktif flavonoid




tertentu, digunakan dalam menghambat perdarahan dan anti-skorbut. Pada manusia flavonoid berfungsi sebagai antimikroba, misalnya pada penyakit gangguan ginjal dan kanker. Beberapa jenis dari flavonoid seperti *slimirin* dan *silyburn* terbukti dapat mengobati gangguan fungsi hati, menghambat sintesis prostaglandin sehingga bekerja sebagai hepatoprotektor. Flavonoid juga bekerja dalam mengurangi pembekuan darah (Dharmayudha, 2016).

## 2. Uraian Fenolik

Senyawa polifenol meruakan salah satu metabolit sekunder paling besar pada tanaman. Senyawa fenol terdiri atas sebuah cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil. Senyawa fenol mempunyai bentuk struktur yang sederhana dan juga struktur kompleks yang rumit seperti tanin dan juga lignin (Nugrahani et al, 2016).

Senyawa fenolik ( $C_6H_5OH$ ) merupakan komponen yang memiliki aksi antioksidan dan juga merupakan kelompok fitokimia terbesar pada tumbuhan dengan kemampuan meregenerasi oksigen aktif, karena pada cincin aromatik mengandung gugus hidroksil yang berperan sebagai donor elektron (Indra et al., 2019).



**Gambar II. 4** Struktur Fenol (Kusnadi, 2018)

Senyawa fenol adalah penyusun alelokimia tanaman yang sangat penting dan umum didapatkan di lingkungan. Fenol berpotensi untuk dikembangkan sebagai bioherbisida karena memiliki mekanisme penghambatan yang beragam baik itu secara morfologis ataupun fisiologis (Ayu Vandira Candra Kusuma, 2016)

Senyawa fenolik merupakan salah satu metabolit sekunder tanaman. Senyawa tersebut memiliki cincin aromatik yang membawa satu atau lebih gugus hidroksil. Struktur senyawanya bervariasi mulai dari molekul fenolik sederhana hingga polimer kompleks dengan massa molekul relatif yang tinggi. Fenolik memiliki fungsi fisiologis dan morfologis yang penting bagi tanaman. Fenolik memiliki beragam peran biologis, diantaranya sebagai fitoalexin, *feeding deterrent*, penarik serangga penyerbuk, mempengaruhi pigmentasi tanaman, serta sebagai antioksidan dan agen pelindung terhadap sinar ultraviolet (Sari et al., 2021).

Setiap tumbuh-tumbuhan memiliki struktur komponen fenolik yang berbeda. Ada komponen fenolik yang memiliki gugus OH banyak, dan ada juga komponen fenolik yang memiliki gugus OH sedikit. Gugus OH berperan dalam proses transfer elektron, untuk menstabilkan dan meredam radikal bebas. Beberapa penelitian mengatakan bahwa senyawa fenolik telah diketahui memiliki berbagai efek biologis, seperti aktivitas antioksidan melalui mekanisme mereduksi, menangkap radikal bebas, mengkelat logam, meredam terbentuknya senglet oksigen, serta mendonor elektron (Ni Luh & Razimin, 2013).

Senyawa ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) golongan fenol sederhana (vanilin, gingerol, shogaol, guaiakol, dan eugenol) dan asam fenol (*p*-kresol, 3-etilfenol, hidrokuinon, dan asam galat); (2) turunan asam hidroksinamat


(*p*-kumarin, kafein, dan firulin); serta (3) flavonoid (antosianin, flavonon, flavonol, dan tanin) (Yasni, 2013).

Senyawa fenol juga sering digunakan sebagai antibakteri, mekanisme fenol sebagai anti bakteri adalah karena fenol mengubah permeabilitas membran sitoplasma yang mengakibatkan kebocoran nutrisi dari dalam sel sehingga sel bakteri akan mati atau terhambat perkembangannya dan mengendapkan protein. Fenol memiliki sifat asam, karena sifat gugus –OH yang gampang melepaskan diri. Karakteristik lainnya ialah kemampuan dalam membentuk senyawa kelat dengan logam, mudah teroksidasi dan membentuk polimer sehingga menimbulkan warna gelap. Warna gelap yang timbul pada bagian tanaman yang terpotong atau mati disebabkan oleh reaksi ini. Hal ini sekaligus menghambat perkembangan tumbuhan (Dharmayudha, 2016)

Senyawa fenolik pada konsentrasi rendah bisa merusak sitoplasma dan bisa mengakibatkan kebocoran inti sel sedangkan pada konsentrasi tinggi senyawa fenol berkoagulasi dengan protein seluler. Senyawa fenol merupakan antibakteri yang memiliki sifat bakterisidal. Senyawa fenol mempunyai aktivitas antimikroba berspektrum luas terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Sehingga senyawa fenol secara intensif mampu digunakan sebagai desinfektan (Sudarmi, Darmayasa, & Muksin, 2017)

Asam galat merupakan salah satu senyawa aktif yang banyak dimanfaatkan di bidang medis. Senyawa ini terdapat sebagai metabolit sekunder pada tanaman. Keberadaan asam galat dalam tanaman terdapat pada konsentrasi yang kecil. Asam

galat memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antivirus, analgesik dan antioksidan (Junaidi & Anwar, 2018).



**Gambar II. 5** Struktur Asam Galat (Junaidi & Anwar, 2018)

Struktur asam galat mempunyai gugus fungsional  $-OH$  yang mampu bereaksi dengan radikal bebas sehingga menghindari proses oksidasi lebih lanjut. Asam galat mampu bereaksi dengan radikal bebas peroksi dan hidrosiperoksi yang terbentuk dari reaksi oksidasi. Radikal asam galat yang terbentuk distabilkan melalui interaksi dua ikatan hidrogen pada posisi ortho (Bharti Badhani, 2015)

#### **D. Ekstraksi**

Dalam metode ekstraksi konvensional, ada beberapa yang digunakan, diantaranya maserasi, perkolasi dan ekstraksi refluks, biasanya menggunakan pelarut organik dan membutuhkan volume pelarut yang besar dan waktu ekstraksi yang lama. Dalam ekstraksi modern atau lebih hijau metode ekstraksi seperti ekstraksi cairan super kritis (SFC), ekstraksi cairan bertekanan (PLE) dan microwave ekstraksi berbantuan (MAE), juga telah diterapkan di ekstraksi produk alami, dan mereka menawarkan beberapa keuntungan seperti konsumsi pelarut

organik yang lebih rendah, lebih pendek waktu ekstraksi dan selektivitas yang lebih tinggi (Qing-Wen Zhang, 2018).

### **1. Jenis metode**

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap metode ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna (Wewengkang, 2021)

#### **a. Maserasi**

Maserasi adalah kegiatan pengestrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapakali pengocokan atau pengadukan pada suhu ruang (kamar). Secara teknologi termasuk ekstraksi yang memiliki prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi kinetik yaitu dilakukan pengadukan yang kontinu (teru-menerus). Remaserasi yaitu dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah di lakukan penyaringan meserat pertama, dan seterusnya (Depkes RI, 2000).

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan penyaringan. (Mukhriani, 2014)

## b. Refluks dan Destilasi

Refluks merupakan proses ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik dididhnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Secara umum, proses ini diulang hingga 3-5 kali pada residu pertama sehingga dapat mencakup ekstraksi sempurna (Depkes RI, 2000).

Pada metode refluks, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu yang telah dihubungkan dengan kondensor. Dalam hal ini pelarut dipanaskan hingga mencapai titik didih. Kemudian uap tersebut terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Selama pemanasan, uap terkondensasi serta destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Destilasi uap memiliki prinsip kerja yang sama dengan mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap) (Mukhriani, 2014).

## c. Soxhletasi

Soxhlet merupakan proses ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, yang secara umum dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik (Depkes RI, 2000).

Prosedur ini dilakukan dengan menempatkan sampel bubuk dalam bungkus selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas labu dan di bawah kondensor. Tambahkan pelarut yang sesuai ke dalam labu dengan suhu penangas diatur di bawah suhu refluks. Keuntungan dari metode ini

adalah proses ekstraksi berlangsung secara terus menerus dan sampel diekstraksi dengan pelarut murni hasil kondensasi yang menggunakan lebih sedikit pelarut dan membutuhkan waktu lebih sedikit (Mukhriani, 2014)

#### d. Perkolasi

Perkolasi Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).

Perkolasi adalah cara penarikan senyawa aktif dengan mengalirkan penyari melalui serbuk simplisia yang telah terbasahi. Prinsip ekstraksi secara perkolasi adalah serbuk simplisia diletakkan dalam suatu wadah bejana berbentuk silinder, yang bagian bawah silinder diberi sekat berpori, dimana cairan penyari dialirkan dari bagian atas ke bagian bawah melalui serbuk simplisia, dimana cairan penyari akan melarutkan zat aktif dalam sel simplisia yang dilalui sampel dalam kondisi jenuh. Bentuk perkolator ada 3 macam yaitu perkolator berbentuk tabung, perkolator berbentuk paruh, dan perkolator berbentuk corong. Pemilihan perkolator tergantung pada jenis serbuk simplisia yang akan di saring. (Saputra, 2020)

## 2. Pemilihan pelarut

Suatu senyawa yang ingin diambil ekstraknya biasanya tergantung apa pelarut yang digunakan, Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut, sesuai dengan prinsip *like dissolve like* yaitu suatu senyawa akan terlarut pada pelarut dengan sifat yang sama. (Verdiana, 2018). Menurut Anindita Kurniawati (2019) mengatakan bahwa 2 persyaratan agar dapat pelarut digunakan untuk ekstraksi, yaitu pelarut tersebut harus merupakan pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi dan pelarut tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dalam pemilihan pelarut yang harus diperhatikan adalah toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan biaya operasi serta reaktivitas. Pelarut yang sesuai untuk ekstraksi adalah heksan, karena jumlah dan kualitas concrete yang dihasilkan paling baik. (Kurniawati, 2019)

Proses ekstraksi dengan pelarut berdasarkan pada sifat kepolaran zat dalam pelarut saat ekstraksi. Senyawa polar hanya akan larut pada pelarut polar seperti etanol, metanol, butanol dan air, sedangkan senyawa non-polar hanya dapat larut pada pelarut non-polar, seperti eter, kloroform dan n-heksana (Wahyu Bagio Leksono, 2018).

### ***E. Tinjauan Islam Mengenai Pemanfaatan Tanaman***

Tanaman merupakan suatu kenikmatan yang besar yang diturunkan Allah SWT. kepada manusia yang sangat besar manfaatnya jika manusia menggunakannya dengan tepat. Allah SWT. menciptakan isi dalam bumi dengan



sejuta manfaat, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam QS Thaha/20 : 53 yang berbunyi :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّاكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى

Terjemahnya :

53. (Dialah Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan meratakan jalan-jalan di atasnya bagimu serta menurunkan air (hujan) dari langit.” Kemudian, Kami menumbuhkan dengannya (air hujan itu) beraneka macam tumbuh-tumbuhan.

Dari tafsir Al-jalalain mengatakan bahwa “Dia (yang telah menjadikan bagi kalian) di antara sekian banyak makhluk-Nya (bumi sebagai hamparan) tempat berpijak (dan Dia memudahkan) mempermudah (bagi kalian di bumi itu jalan-jalan) tempat-tempat untuk berjalan (dan Dia menurunkan dari langit air hujan) yakni merupakan hujan. Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkan-Nya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa dan dianggap sebagai khithab untuk penduduk Mekah. (Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacam-macam (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam). Dari penjelasan yang ada bahwa sanya Allah SWT. menurunkan hujan serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan.

Tumbuhan akan tumbuh subur dan mempunyai kandungan yang banyak juga berpengaruh terhadap tanah tempat dimana suatu tanaman itu tumbuh, tanah yang mempunyai unsur hara dan kegemburan yang bagus akan menghasilkan suatu tumbuhan yang baik pula, sebaliknya juga terjadi jikalau tanah yang kurang baik

maka tumbuhan yang tumbuh juga mempunyai kualitas tumbuh yang kurang baik pula. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al A'raf Ayat 58 yang berbunyi :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ء

*Terjemahnya :*

*58. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur seizin Tuhannya. Adapun tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami jelaskan berulang kali tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.*


Dari surah diatas di terangkan dalam tafsir jalalin bahwa “(Dan tanah yang baik) yang subur tanahnya (tanaman-tanamannya tumbuh subur) tumbuh dengan baik (dengan seizin Tuhannya) hal ini merupakan perumpamaan bagi orang mukmin yang mau mendengar petuah/nasihat kemudian ia mengambil manfaat dari nasihat itu (dan tanah yang tidak subur) jelek tanahnya (tidaklah mengeluarkan) tanamannya (kecuali tumbuh merana) sulit dan susah tumbuhnya. Hal ini merupakan perumpamaan bagi orang yang kafir. (Demikianlah) seperti apa yang telah Kami jelaskan (Kami menjelaskan) menerangkan (ayat-ayat Kami kepada orang-orang yang bersyukur) terhadap Allah, kemudian mereka mau beriman kepada-Nya.”

Maksud “tanah yang baik” di ayat tersebut adalah tanah yang subur. Dimana tanah tersebut secara sains terdapat berbagai komponen yang terkandung dalam tanah tersebut. Tanah yang baik akan berfungsi sebagai media tanaman untuk tumbuh. Sebagai contoh sebelumnya adalah tanaman bayam yang tumbuh dengan baik (segar) karena media (tanah) yang ditempatinya juga baik (subur). Hal tersebut

tentu dengan izin Allah Swt. yang mengatur seluruh alam ini. Karena ada juga tanaman yang justru tidak dapat tumbuh di tanah yang memiliki banyak unsur hara karena beberapa faktor.

Allah SWT. memberikan nikmat ini agar manusia dapat memanfaatkannya dengan baik. Tanah yang ditumbuhi banyak tumbuhan dan tanaman baiknya dimanfaatkan dengan baik, dimanfaatkan sebagai makanan obat-obatan dan lain-lain. Tanaman banyak yang digunakan sebagai obat-obatan dengan berbagai penyakit karena Allah STW. Menurunkan suatu penyakit pasti menurunkan pula obatnya, seperti yang hadits yang riwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi Nabi Muhammad ﷺ.

Pernah bersabda :



عن اسامة: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya :

*“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya: “Penyakit apa itu?” Beliau menjawab: “Penyakit tua.” (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi).*

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya terkecuali penyakit tua. Rasulullah Saw. menganggap tua sebagai penyakit. Sebab penyakit

tersebut merusak kondisi sakit, sebagaimana penyakit- penyakit lain yang biasanya mengakibatkan seseorang meninggal atau berat dalam menjalani hidup. Dari hadits ini juga mengarakan bahwa manusia tidak boleh berputus asah dalam mencari obat jikalau terserang suatu penyakit, karen Allah SWT. sudah menyiapkan obatnya disekitar manusia itu sendiri, dan kembali lagi ke manusianya unntuk bagaimana caranya selalu berdoa, berikhtiar kepada Allah SWT. dan selalu berusaha.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan eksperimental laboratorium dengan analisis pendekatan kuantitatif dimana pada sampel diukur kapasitas flavonoid, fenolik, karotenoid dan antioksidan.

#### ***B. Lokasi Penelitian dan Waktu***

##### ***1. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Fitokimia dan Laboratorium Kimia Instrumen, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan pengambilan sampel dilakkan di beberapa daerah dimulai dari Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bajang, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Patallasang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Parigi, Kecamatan Manuju, Kecamatan Bungaya, dan Kecamatan Tinggi moncong yang berada di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

##### ***2. Waktu Penelitian***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2022

#### ***C. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian ini berupa eksperimentatif laboratorium.

#### **D. Prosedur Kerja**

##### **1. Alat dan dan Bahan**

###### **a. Alat**

Adapun alat-alat yang digunakan diantaranya pipet mikro (TopPetter Pipettor), rotary evaporator (IKA RV 10 basic), seperangkat alat meserasi, spektrofotometer uv-vis, oven, timbangan analitik, dan waterbath.

###### **b. Bahan**

Adapun bahan yang digunakan diantaranya sampel daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) air suling, aluminium foil, etanol 96%.

##### **2. Penyiapan sampel**

###### **a. Pengambilan Sampel**

Sampel daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) diperoleh dari beberapa daerah baik dataran rendah maupun dataran tinggi di kecamatan yang ada di kabupaten Gowa diantaranya, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Sombaopu, Kecamatan Patallasang, Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Parangloe, Kecamatan manuju, Kecamatan Tinggimoncong dan Kecamatan Parigi . Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari (08.00-10.00 WITA), daun yang digunakan adalah seluruh daun yang tidak rusak dan tidak berjamur.

###### **b. Pengolahan Sampel**

Sampel daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir, dikeringkan tanpa terkena sinar matahari langsung kurang lebih tiga hari, dikeringkan dalam lemari pengering.

### 3. Ekstraksi Sampel

Daun Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) yang sudah dikeringkan dan dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah maserasi sebanyak 10 g, direndam dengan etanol 96% hingga simplisia terendam secara merata. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 1 x 24 jam di tempat terlindung dari sinar matahari dan sesekali diaduk. Selanjutnya disaring dan dipisahkan antara filtrate dan residunya.

Ampas dari daun Botto-botto (*Chromolaena odorata L.*) diekstraksi kembali menggunakan penyaring yang baru dengan jumlah yang sama. Hal ini terus dilakukan hingga cairan penyari tampak bening (3 kali). Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipekatkan dengan cairan penyari dalam rotavapor 60°C. Ekstrak sampel selanjutnya dibebaskan etanolkan.

### ***E. Pengujian***

#### **1. Pengukuran pH Tanah (Yanti, 2021)**

Pada analisis keasaman (pH) tanah dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran pH aktual (pH H<sub>2</sub>O) dan pH potensial (pH KCl). Pertama untuk menentukan pH actual (pH H<sub>2</sub>O) yaitu dengan cara menimbang sampel tanah 5 gr dan dimasukkan ke dalam botol kocok. Ditambahkan 25 mL aquades ke dalam botol kocok untuk mengencerkan sampel tanah lalu dihomogenkan hingga tanah larut. pH meter sebelum digunakan dilakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan larutan buffer pH 10,7 dan 4 setelah itu diukur pH sampel tanah menggunakan pH meter.

## 2. Skrining Fitokimia

### a. Uji Alkaloid

Diambil sampel sebanyak 0,5 g, kemudian setiap ekstrak yang digunakan diaduk secara terpisah dengan HCl 1% diatas penangas air selama 5 menit kemudian disaring. Filtratnya dibagi menjadi 3 bagian sama besar

#### 1) Tes Dragendorff

Bagian pertama filtrat, ditambahkan pereaksi dragendorff sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan merah jingga berarti menunjukkan adanya alkaloid.

#### 2) Tes Mayer

Bagian kedua filtrat, ditambahkan pereaksi mayer sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan warna krem berarti menunjukkan adanya alkaloid.

#### 3) Tes Wagner

Bagian ketiga filtrat, ditambahkan pereaksi wagner sebanyak 1-2 ml, jika terdapat endapan berwarna coklat berarti menunjukkan adanya alkaloid (Joshi *et al.*, 2013; Abdullahi *et al.*, 2013 dalam Iqbal *et al.*, 2015 : 226).

### b. Uji Steroid dan Terpenoid

#### 1) Tes Salkowski

Diambil sampel ekstrak sebanyak 0,5 g, ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml lalu dikocok secara terpisah, ditambahkan H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat sebanyak 2 ml disepanjang sisi tabung uji, adanya warna coklat kemerahan pada antarmuka menunjukkan adanya terpenoid.



## 2) Tes Liebermann-Burchard

Diambil beberapa mg sampel ekstrak, lalu dikocok dengan kloroform sebanyak 2 ml, ditambahkan beberapa tetes asam asetat anhidrad dan dididihkan didalam penangas air dan segera didinginkan di dalam air es. Kemudian ditambahkan  $H_2SO_4$  pekat sebanyak 2 ml. Terbentuknya cincin coklat pada pertemuan dua lapisan dan lapisan atas berubah menjadi hijau menunjukkan adanya steroid sedangkan terbentuknya warna merah tua menunjukkan adanya triterpenoid.

### c. Uji Tanin

Diambil sampel ekstrak sebanyak 0,5 g dan diaduk dengan aquadest sebanyak 5 ml dan disaring. Ditambahkan beberapa tetes  $FeCl_3$  5% kedalam filtrat. Adanya warna hitam atau biru-hijau atau endapan menunjukkan adanya tanin.

### d. Uji Saponin

Dimasukkan kedalam tabung reaksi sampel ekstrak sebanyak 0,5 g, lalu dikocok hingga terbentuk buih dengan aquadest sebanyak 5-10 ml. Apabila buih tersebut bertahan selama 5 menit di penangas air, maka menunjukkan adanya saponin.

### e. Uji Glikosida

#### 1) Tes Borntrager (*Anthraquinone Glycoside*)

Dimasukkan sampel ekstrak sebanyak 0,5 g kedalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 5 ml  $H_2SO_4$  5%, campuran tersebut disimpan di penangas air selama 1-2 menit kemudian disaring. Filtratnya dikocok dengan kloroform dengan volume

yang sama dan didiamkan selama 5 menit. Diambil lapisan kloroform bagian bawah lalu dikocok dengan amonia encer sebanyak setengah volume dari kloroform tersebut. Adanya warna merah muda sampai merah pada lapisan amonia memberikan indikasi glikosida antarkuinon.

## 2) Tes Keller-Killaini (*Cardiac Glycoside*)

Dimasukkan sampel ekstrak sebanyak 0,5 g kedalam tabung reaksi, lalu dikocok dengan aquadest sebanyak 5 ml. Ditambahkan 2 ml asam asetat glasial, beberapa tetes  $\text{FeCl}_3$  5% dan diikuti  $\text{H}_2\text{SO}_4$  pekat sebanyak 1-2 ml disepanjang sisi tabung uji. Terbentuknya cincin coklat pada antarmuka dan cincin ungu yang mungkin muncul di bawah cincin coklat menunjukkan adanya glikosida jantung.

## 3. Penetapan Kadar Fenolik Total (Celep 2012)

### a. Pembuatan larutan uji

Diambil 25 mg ekstrak, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir. Ditambahkan 2500  $\mu\text{l}$  metanol dalam tabung reaksi tutup ulir, panaskan dan aduk sampai larut dan didinginkan hingga diperoleh konsentrasi 10000 ppm.

### b. Pembuatan reagen

#### 1) Reagen Follin-Ciocalteu 7,5%

Folin 15 ml dicukupkan 200 ml air suling

#### 2) Pereaksi natrium hidrosida (NaOH) 1%

NaOH 2,0 gram dicukupkan 200 ml air suling

### c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Ditimbang 25 mg asam galat lalu dicukupkan dengan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 25,0 ml. Kemudian dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10  $\mu$ l, 20  $\mu$ l, 30  $\mu$ l, 50  $\mu$ l, 75  $\mu$ l, 100  $\mu$ l, dan 125  $\mu$ l dengan air suling 240  $\mu$ l, 230  $\mu$ l, 220  $\mu$ l, 200  $\mu$ l, 175  $\mu$ l, 150  $\mu$ l, dan 125  $\mu$ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan reagen *Follin-Ciocalteu* sebanyak 1.250  $\mu$ L yang didiamkan selama 8 menit, lalu ditambahkan 1.000  $\mu$ L pereaksi natrium hidroksidan (NaOH). Terakhir didiamkan kembali selama 1 jam dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 425 nm.

d. Prosedur penetapan kadar fenolik total dalam sampel

Larutan sampel uji 50  $\mu$ L dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 200  $\mu$ L. Selanjutnya melakukan penambahan reagen *Follin-Ciocalteu* dan pereaksi natrium hidroksida (NaOH) dengan perlakuan yang sama seperti prosedur pengukuran larutan pembanding. Terakhir didiamkan kembali selama 1 jam dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 425 nm dan dilakukan sebanyak 3 kali cuplik.

**4. Penetapan kadar total flavonoid (Iqbal, Salim, & Lim, 224-232)**

a. Pembuatan larutan uji

Ditimbang ekstrak 10 mg dan dilarutkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dengan menggunakan metanol sebanyak 10,0 ml. Selanjutnya ekstrak divorteks dan dioven hingga larut dan menghasilkan konsentrasi 10000 ppm.

b. Pembuatan reagen

- 1) Reagen aluminum klorida ( $\text{AlCl}_3$ ) 10%

$\text{AlCl}_3$  2,0 g dicukupkan 20 ml air suling

2) Reagen natrium asetat ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ) 0,1 %

$\text{CH}_3\text{COONa}$  1.640 mg dicukupkan 20 ml air suling

c. Prosedur pengukuran larutan pembanding

Ditimbang Kuersetin 25,0 mg dimasukkan kedalam labu tentukur dicukupkan 50 ml methanol dalam labu tentu ukur 50,0 ml . Dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10  $\mu\text{l}$ , 15  $\mu\text{l}$ , 25  $\mu\text{l}$ , 35  $\mu\text{l}$ , 50  $\mu\text{l}$ , 75  $\mu\text{l}$  dengan air suling sebanyak 3.290  $\mu\text{l}$ , 3.285  $\mu\text{l}$ , 3.275  $\mu\text{l}$ , 3.265  $\mu\text{l}$ , 3.250  $\mu\text{l}$ , 3.225  $\mu\text{l}$ . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 100  $\mu\text{l}$   $\text{AlCl}_3$ , ditambahkan 100  $\mu\text{l}$  natrium asetat. Diamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm.

d. Prosedur penetapan kadar flavonoid total dalam sampel

Diambil larutan sampel uji 20  $\mu\text{L}$  dimasukkan ke dalam labu tentukur, kemudian ditambahkan air suling sebanyak 3.280  $\mu\text{L}$ . Ditambahkan pereaksi  $\text{AlCl}_3$  dan pereaksi natrium asetat sebanyak 100  $\mu\text{l}$  kemudian di vorteks. Terakhir, didiamkan selama 30 menit dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 415 nm dan dilakukan pengukuran sebanyak 3 kali cuplik.

## 5. Uji Kapasitas Antioksidan

a. FRAP (Özyürek, Bektaglu, Güclü, Güngör, & Apak, 2008)

1) Pembuatan larutan  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$   $2.0 \times 10^{-2}$  M

Ditimbang 750 mg Fe (III) lalu ditambahkan 200  $\mu\text{l}$  HCl 5M dan dicukupkan 50 ml aqaudest.

2) Pembuatan larutan TPTZ  $1.0 \times 10^{-2}$  M

Ditimbang 167,5 mg TPTZ lalu ditambahkan etanol absolut 50 ml.

3) Pembuatan larutan bupper natrium asetat pH 3,6

Ditimbang natrium asetat 1,86 gr lalu ditambahkan 8 ml asam asetat pekat dan dicukupkan hingga 500 ml.

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut..

5) Pembuatan larutan FRAP

Buffer : TPTZ :  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  (60 : 6 : 6).

6) Pengujian antioksidan sampel dengan FRAP

Diambil sampel sebanyak 50  $\mu\text{l}$ , ditambahkan aquadest 950  $\mu\text{l}$  dan ditambahkan 3000  $\mu\text{l}$  larutan FRAP. Didiamkan selama 30 menit kemudian diamati absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 595 nm.

7) Pengujian antioksidan vitamin C

Ditimbang vitamin C 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 30  $\mu\text{l}$ , 40  $\mu\text{l}$ , 50  $\mu\text{l}$ , 60  $\mu\text{l}$ , dan 70  $\mu\text{l}$  dengan metanol sebanyak 970  $\mu\text{l}$ , 960  $\mu\text{l}$ , 950  $\mu\text{l}$ , 940  $\mu\text{l}$ , dan 930  $\mu\text{l}$ . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000  $\mu\text{l}$  larutan Frap. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm.

8) Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 20  $\mu$ l, 30  $\mu$ l, 40  $\mu$ l, 50  $\mu$ l, 60  $\mu$ l, 70  $\mu$ l dan 80  $\mu$ l dengan metanol sebanyak 980  $\mu$ l, 970  $\mu$ l, 960  $\mu$ l, 950  $\mu$ l, 940  $\mu$ l, 930  $\mu$ l dan 920  $\mu$ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000  $\mu$ l larutan Frap Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 595 nm.

9) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap vitamin c dan trolok.

b. CUPRAC (Özyürek, Bektaglu, Güçlü, Güngör, & Apak, 2008)

1) Pembuatan larutan  $\text{CuCl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$   $10 \times 10^{-2}$  M

Ditimbang 425 mg  $\text{CuCl}_2$  lalu dilarutkan dengan aquadest 250 ml.

2) Pembuatan larutan neocuproine  $7.5 \times 10^{-2}$  M

Ditimbang 390 mg neocuproine lalu dilarutkan dengan etanol absolut 250 ml.

3) Pembuatan larutan buffer amonium asetat pH 7.0

Ditimbang 19,27 gram amonium asetat lalu dilarutkan dengan 250 ml aquadest.

4) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut.

5) Pengujian antioksidan sampel dengan CUPRAC

Diambil sampel sebanyak 50  $\mu\text{l}$  lalu ditambahkan aquadest 950  $\mu\text{l}$  dan reagen CUPRAC sebanyak 3000  $\mu\text{l}$ . Diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.

6) Pengujian antioksidan vitamin C

Ditimbang vitamin C 10 mg lalu dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut, dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 250  $\mu\text{l}$ , 200  $\mu\text{l}$ , 150  $\mu\text{l}$ , 100  $\mu\text{l}$ , 50  $\mu\text{l}$ , dan 25  $\mu\text{l}$  dan ditambahkan metanol sebanyak 750  $\mu\text{l}$ , 800  $\mu\text{l}$ , 850  $\mu\text{l}$ , 900  $\mu\text{l}$ , 950  $\mu\text{l}$ , dan 975  $\mu\text{l}$ . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan CUPRAC sebanyak 3000  $\mu\text{l}$ . Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 450 nm.

7) Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 100  $\mu\text{l}$ , 150  $\mu\text{l}$ , 200  $\mu\text{l}$ , 250  $\mu\text{l}$ , dan 300  $\mu\text{l}$ , dengan metanol sebanyak 900  $\mu\text{l}$ , 850  $\mu\text{l}$ , 800  $\mu\text{l}$ , 750  $\mu\text{l}$ , dan 700  $\mu\text{l}$ . Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 3000  $\mu\text{l}$  larutan cuprac. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 450 nm.

8) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung dengan kesetaraannya terhadap vitamin C dan Trolok.

c. DPPH (Celep, Charehsaz, Akyüz, Acar, & Yesilada, 2015)

1) Pembuatan larutan DPPH (BM 394) konsentrasi 0,1 mM

Ditimbang 2 mg DPPH dilarutkan kedalam 50 ml metanol.

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 10 mg dilarutkan dengan 10 mL metanol, kemudian dipanaskan di oven hingga larut, dan dinginkan.

3) Pengujian aktivitas antioksidan vitamin C

Ditimbang 10 mg vitamin C kemudian dilarutkan kedalam metanol sebanyak 50 ml. Dari larutan tersebut dibuat beberapa seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 10  $\mu$ l, 20  $\mu$ l, 30  $\mu$ l, 50  $\mu$ l, 75  $\mu$ l, dan 100  $\mu$ l dan ditambahkan metanol sebanyak 1.490  $\mu$ l, 1.480  $\mu$ l, 1.470  $\mu$ l, 1.450  $\mu$ l, 1.425  $\mu$ l, dan 1.400  $\mu$ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan DPPH sebanyak 2000  $\mu$ l divortex hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit diruangan tertutup dan gelap. Diukur absorbansinya menggunakan alat spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 517 nm.

4) Troloks

Ditimbang troloks 10 mg dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dibuat dalam beberapa seri konsentrasi yaitu 10  $\mu$ l, 25  $\mu$ l, 50  $\mu$ l, 100  $\mu$ l, dan 150  $\mu$ l dengan metanol sebanyak 1.490  $\mu$ l, 1.475  $\mu$ l, 1.450  $\mu$ l, 1.400  $\mu$ l, dan 1.350  $\mu$ l. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan 2000  $\mu$ l larutan dpph. Didiamkan selama 30 menit dan diamati absorbansinya



dengan menggunakan spektrofotometri uv-vis pada panjang gelombang 517 nm.

5) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Dihitung persen penghambatan dengan persamaan :

$$\% \text{ Inhibisi} = \frac{\text{Ablanko0} - \text{Asampel}}{\text{Ablanko}} \times 100\%$$

Nilai Kesetaraan vit c/troloks dihitung terhadap kurva konsentrasi vs %inhibisi.

$y = ax + b$ , dimana nilai y sebesar 50.

$$\text{Jadi, } x = \frac{50 - b}{a}$$

Hasil x itu merupakan nilai kesetaraan vit c/troloks

d. TOAC (Celep, Charehsaz, Akyüz, Acar, & Yesilada, 2015)

1) Pembuatan larutan TOAC

Ditimbang 1.977 mg ammonium molybdate ( $(\text{NH}_4)_2\text{MoO}_4$ ), 380,2 mg potassium phosphate monobasic ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ), dan 48 ml asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) ditambahkan dan dicukupkan aquadest hingga 60 ml.

2) Pembuatan ekstrak 1000 ppm

Ditimbang ekstrak 100,0 mg, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi tutup ulir dilarutkan dengan 10 ml metanol dipanaskan dan divorteks hingga larut.

3) Pengujian aktivitas antioksidan

Diambil sampel 200  $\mu\text{l}$  dan dimasukkan kedalam tabung reaksi tutup ulir, selanjutnya ditambahkan aquadest sebanyak 300  $\mu\text{l}$ . Ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3 ml. Selanjutnya divortex hingga larut, diinkubasi selama

90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya pada spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695nm.

4) Pengujian antioksidan vitamin C

Ditimbang 10 mg vitamin C dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 450 µl, 400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.

5) Troloks

Ditimbang 10 mg troloks dan dilarutkan dalam 50 ml metanol. Dari larutan tersebut dibuat seri konsentrasi dengan mencampur berturut-turut yaitu 50 µl, 100 µl, 150 µl, 200 µl, dan 250 µl dengan ditambahkan metanol 450 µl, 400 µl, 350 µl, 300 µl, dan 250 µl. Masing-masing dari seri konsentrasi ditambahkan larutan TOAC sebanyak 3000 µl dan diinkubasi selama 90 menit pada suhu 95°C. Diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri uv-vis dengan panjang gelombang 695 nm.

6) Kapasitas antioksidan sampel dihitung dengan rumus:

Kapasitas antioksidan ekstrak dihitung kesetarannya terhadap vitamin C dan troloks

### ***F. Analisis Data***

Pengaruh daerah tumbuh di analisis menggunakan uji anova satu arah.



**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**1. Hasil Ekstarksi Daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)**

Hasil ekstraksi dari simplisia daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel IV. 1** Hasil ekstrak daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

No	Sampel	Berat Simplisia (g)	Berat Ekstrak (g)	Rendamen %
1	Bontonompo	10	1,2696	12,6960
2	Bajeng	10	1,0298	10,2980
3	Somba Opu	10	1,6808	16,8080
4	Parangloe	10	1,7902	17,9020
5	Patallasang	10	1,7637	17,6370
6	Manuju	10	1,1092	11,0920
7	Bungaya	10	1,7790	17,7090
8	Parigi	10	1,6808	16,8080
9	Tinggi Moncong	10	1,2496	12,4960

## 2. Hasil Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

Tabel IV. 2 Hasil skrining fitokimia daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

No	Pelarut	Uji pereaksi						
		Alkaloid		Tannin	Steroid/terpenoid		Saponin	Glikosida
		Dragendorf	Mayer		Lieberman Burchard	Salkowski		
1	Bontonompo	-	-	-	+	+	+	-
2	Bajeng	-	-	-	+	+	-	-
3	Somba Opu	-	-	+	+	+	+	-
4	Parangloe	-	-	+	+	+	-	-
5	Patallassang	-	-	+	+	+	+	-
6	Manuju	-	-	+	+	+	+	-
7	Bungaya	-	-	+	+	+	+	-
8	Parigi	-	-	+	+	+	+	-
9	Tinggi Moncong	-	-	+	+	+	+	-

### Keterangan

- = Hasil negatif (tidak terdapat senyawa)
- + = Hasil positif (terdapat senyawa)

## 3. Hasil pH Tanah

Tabel IV. 3 Hasil pH Tanah, kegemburan tanaman Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

No	Sampel	pH Tanah	Kegemburan	Suhu lokasi	Ketinggian
1	Bontonompo	7	1	28°C	24 mdpl
2	Bajeng	7	1	29°C	19 mdpl
3	Somba Opu	7	1	27°C	20 mdpl
4	Patallassang	7	2	27°C	80 mdpl
5	Manuju	7	2	24°C	73 mdpl
6	Bungaya	7	2	25°C	132 mdpl
7	Parangloe	7	3	22°C	641 mdpl
8	Parigi	7	3	22°C	575 mdpl
9	Tinggi Moncong	7	3	21°C	990 mdpl

### Keterangan.

- 1 : tanah kering dan keras
- 2 : tanah agak kering dan agak basah sedikit gembur

3 : tanah gembur

#### 4. Kadar Total Fenolik dan Kadar Flavonoid total

**Tabel IV. 4** Kadar total fenolik dan Flavonoid total ekstrak daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

No.	Sampel	Kadar Total Fenolik (mg GAE/gr ekstrak)	Total Flavonoid (mg QE/gr ekstrak)
1	Bontonompo	176.29 ± 0.94 <sup>f</sup>	110.34 ± 0.76 <sup>h</sup>
2	Bajeng	161.70 ± 0.60 <sup>e</sup>	95.94 ± 0.79 <sup>g</sup>
3	Somba Opu	146.87 ± 0.77 <sup>d</sup>	44.70 ± 0.50 <sup>b</sup>
4	Patallasang	219.91 ± 0.37 <sup>h</sup>	35.37 ± 0.08 <sup>a</sup>
5	Manuju	54.72 ± 0.58 <sup>a</sup>	45.98 ± 0.25 <sup>c</sup>
6	Bungaya	197.31 ± 0.60 <sup>g</sup>	91.27 ± 0.43 <sup>e</sup>
7	Parangloe	81.38 ± 0.59 <sup>b</sup>	93.57 ± 0.77 <sup>f</sup>
8	Parigi	138.53 ± 0.82 <sup>c</sup>	86.43 ± 0.53 <sup>d</sup>
9	Tinggi Moncong	233.79 ± 0.91 <sup>i</sup>	111.53 ± 0.86 <sup>i</sup>

Keterangan:

*gallic acid equivalent*/GAE (mg/gram extract)

*a,b,c,d,e,f,g,h,i* = kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada <0,05 yang ada pada data statistic di tabel lampiran

### 5. Kapasitas antioksidan ekstrak Daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

**Tabel IV. 5** Hasil Pengukuran Kapasitas Antioksidan ekstrak daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

No.	Sampel	Metode							
		DPPH		FRAP		CUPRAC		TOAC	
		A(mg/g)	B(mg/g)	A(mg/g)	B(mg/g)	A(mg/g)	B(mg/g)	A(mg/g)	B(mg/g)
1	Bontonompo	432.98 ± 0.19 <sup>g</sup>	319.29 ± 0.07 <sup>g</sup>	353.50±0.82 <sup>d</sup>	417.40 ± 1.10 <sup>d</sup>	208.21±0.60 <sup>g</sup>	332.99 ± 0.77 <sup>g</sup>	54.73 ± 0.18 <sup>g</sup>	114.27 ± 0.36 <sup>g</sup>
2	Bajeng	446,88 ± 0.03 <sup>h</sup>	329.61 ± 0.42 <sup>h</sup>	482.48 ± 0.99 <sup>i</sup>	588.83 ± 1.32 <sup>i</sup>	227.57 ± 0.61 <sup>h</sup>	359.22 ± 0.79 <sup>h</sup>	40.45 ± 0.13 <sup>c</sup>	85.17 ± 0.26 <sup>c</sup>
3	Somba Opu	368.43 ± 0.15 <sup>d</sup>	269.20 ± 0.21 <sup>d</sup>	402.77 ± 0.85 <sup>g</sup>	482.94 ± 1.13 <sup>g</sup>	116.99 ± 0.44 <sup>b</sup>	215.51 ± 0.57 <sup>b</sup>	59.81 ± 0.06 <sup>h</sup>	124.71 ± 0.13 <sup>h</sup>
4	Parangloe	448.40± 0.04 <sup>i</sup>	330.64 ± 0.03 <sup>i</sup>	438.70 ± 0.49 <sup>h</sup>	530.92 ± 0.65 <sup>h</sup>	231.60 ± 0.44 <sup>i</sup>	362.48 ± 0.56 <sup>i</sup>	53.48 ± 0.06 <sup>f</sup>	111.76 ± 0.07 <sup>f</sup>
5.	Patallasang	345.35 ± 0.03 <sup>c</sup>	253.23 ± 0.64 <sup>c</sup>	222.22± 0.82 <sup>a</sup>	243.44± 1.10 <sup>a</sup>	111.86± 0.59 <sup>a</sup>	208.27 ± 0.77 <sup>a</sup>	44.34 ± 0.19 <sup>d</sup>	93.07 ± 0.38 <sup>d</sup>
6	Manuju	343.53 ± 0.00 <sup>b</sup>	250.92 ± 0.64 <sup>b</sup>	379.52± 0.84 <sup>e</sup>	452.44± 1.12 <sup>e</sup>	167.27± 0.17 <sup>e</sup>	281.57± 0.22 <sup>e</sup>	18.04 ± 0.19 <sup>a</sup>	39.43 ± 0.40 <sup>a</sup>
7	Bungaya	375.07 ± 0.06 <sup>e</sup>	275.10 ± 0.64 <sup>e</sup>	401.30 ± 0.87 <sup>f</sup>	479.88± 1.16 <sup>f</sup>	203.86± 0.44 <sup>f</sup>	328.03± 0.57 <sup>f</sup>	34.61 ± 0.19 <sup>b</sup>	73.22 ± 0.38 <sup>b</sup>
8	Parigi	400.34 ± 0.09 <sup>f</sup>	294.27 ± 0.07 <sup>f</sup>	326.85± 0.87 <sup>c</sup>	308.46± 1.16 <sup>c</sup>	142.25± 0.49 <sup>d</sup>	246.48± 0.63 <sup>d</sup>	51.16 ± 0.19 <sup>e</sup>	106.97 ± 0.38 <sup>e</sup>
9	Tinggi Moncong	342.45 ± 0.19 <sup>a</sup>	249.27 ± 0.07 <sup>a</sup>	247.47± 0.50 <sup>b</sup>	274.49± 0.67 <sup>b</sup>	119.76± 0.57 <sup>c</sup>	218.45± 0.74 <sup>c</sup>	70.83 ± 0.19 <sup>i</sup>	149.79 ± 0.38 <sup>i</sup>

Keterangan:

A= ascorbic acid equivalent (mg/g extract)

B= trolox equivalent (mg/g extract)

a,b,c,d,e,f,g,h,i.= kode yang berbeda menunjukkan perbedaan signifikan pada <0,05, yang ada pada data statistic di tabel lampiran

M A K A S S A R

## 6. Uji Statistic Anova

### a. Uji Statistic Anova Fenolik

**Tabel IV.6** Hasil uji Anova Fenolik ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

Fenolik

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	85490.405	8	10686.301	21231.160	.000
Within Groups	9.060	18	.503		
Total	85499.465	26			

### b. Uji Statistic Anova Flavonoid

**Tabel IV.7** Hasil uji Anova Flavonoid ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

Flavonoid

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	20743.309	8	2592.914	7118.192	.000
Within Groups	6.557	18	.364		
Total	20749.866	26			

### c. Uji Statistik Anova Kapasitas Anti Oksidan

**Tabel IV. 8** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode DPPH VIT.C ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

ANOVA

DPPHVIT.C

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	46574.915	8	5821.864	484746.729	.000
Within Groups	.216	18	.012		
Total	46575.131	26			

**Tabel IV. 9** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode DPPH Trolox ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

Trolox

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	27200.902	8	3400.113	11829.518	.000
Within Groups	5.174	18	.287		
Total	27206.075	26			

**Tabel IV. 10** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode CUPRAC VIT.C ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

CUPRAV\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	57621.868	8	7202.734	28609.972	.000
Within Groups	4.532	18	.252		
Total	57626.400	26			



**Tabel IV. 11** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode CUPRAC Trolox ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

## ANOVA

## CUPRAC\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	96872.340	8	12109.043	29030.650	.000
Within Groups	7.508	18	.417		
Total	96879.848	26			

**Tabel IV. 12** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode FRAP VIT.C ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

## ANOVA

## FRAP\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	173668.280	8	21708.535	33942.672	.000
Within Groups	11.512	18	.640		
Total	173679.792	26			

**Tabel IV. 13** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode FRAP Trolox ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

## ANOVA

## FRAP\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	308309.517	8	38538.690	33797.686	.000
Within Groups	20.525	18	1.140		
Total	308330.042	26			

**Tabel IV. 14** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode TOAC VIT.C ekstrak daun Botto-botto (Choromolaena odorata L.)

## ANOVA

## TOAC\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5678.872	8	709.859	10538.599	.000
Within Groups	1.212	18	.067		
Total	5680.085	26			

**Tabel IV. 15** Hasil uji Anova Anti Oksidan dengan metode TOAC Trolox ekstrak daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*)

ANOVA

TOAC\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	24401.379	8	3050.172	28759.417	.000
Within Groups	1.909	18	.106		
Total	24403.288	26			

### ***B. Pembahasan***

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang diambil dari sembilan lokasi yang berbeda. Untuk mengetahui jumlah kadar total flavonoid, kadar total fenolik dan kapasitas antioksidan tertinggi pada setiap sampel, dilakukan penelitian dengan menggunakan Spektrofotometri UV-Vis metode FRAP, CUPRAC, DPPH, dan TOAC.

Pada Tabel IV.1 hasil pengamatan dari jumlah rendamen dari 9 lokasi berbeda, memiliki berat ekstrak yang berbeda-beda. Pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah rendamen terbanyak didapatkan pada ekstrak sampel yang berasal dari parangloe dengan berat ekstrak 1,79 gram dengan % rendamen 17,9 %, yang menunjukkan bahwa dari setiap lokasi terdapat perbedaan yang signifikan terhadap jumlah rendamen.

Berdasarkan hasil yang diperoleh yang ada pada tabel IV.2 pada uji fitokimia ekstrak daun Botto-botto dari semua sampel dengan uji alkaloid menunjukkan hasil yang negatif karena tidak ada endapan. Pada uji tanin, ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Bontonompo dan Bajeng memiliki hasil yang negatif, Sedangkan ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Somba Opu, Patallasang, Parangloe, Manuju, Bungaya, Parigi dan Tinggimoncong menunjukkan hasil yang positif karena terjadinya perubahan warna, hasil positif pada tanin menunjukkan bahwa ekstrak sampel tersebut mengandung fenolik. Pada uji steroid/terpenoid didapatkan hasil yang positif karena adanya perubahan warna.

Pada uji saponin, ekstrak ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Bontonompo, Somba Opu, Patallasang, Manuju, Bungaya, Parigi dan Tinggimoncong mendapatkan hasil positif yang berarti sampel tersebut mengandung glikosida ekstrak daun Botto-botto yang berasal dari daerah Bajeng dan Parangloe mendapatkan hasil yang negatif karena tidak busa tidak bertahan selama 5 menit diatas penangas air. Dan pada uji glikosida mendapatkan hasil yang negatif. Hasil skrining fitokimia menunjukkan bahwa kandungan metabolit sekunder yang ada pada sampel bervariasi.

Hasil tabel VI.3 memperlihatkan perbedaan pH tanah, kegemburan, suhu lokasi dan ketinggian lokasi pengambilan sampel daun Botto-botto (*Chromolaena odorata* L.), terlihat bahwa pH tanah dari 9 lokasi mempunyai hasil yang tidak ada perbedaan dengan jumlah pH yakni 7. Sedangkan kegemburan diberi angka 1, 2 dan 3 dengan maksud untuk membedakan kegemburan dari tanah tempat pengambilan sampel dimana angka 1 menunjukkan tanah yang kering dan keras, angka 2 menunjukkan tanah agak kering dan agak basah sedikit gembur dan angka 3 menunjukkan tanah yang gembur. Terlihat pula suhu dan ketinggian lokasi menunjukkan hasil yang berbeda, semakin tinggi lokasi tempat pengambilan sampel maka suhu lokasi juga semakin rendah. Ketinggian lokasi dibagi menjadi 3 bagian dimana ketinggian 19 mdpl, 20 mdpl dan 24 mdpl merupakan golongan lokasi yang termasuk dalam dataran rendah. Ketinggian 73 mdpl, 80 mdpl dan 132 mdpl tergolong dalam lokasi dataran sedang dan ketinggian 575 mdpl, 641 mdpl dan 990 mdpl merupakan golongan lokasi dataran tinggi.

Pada tabel IV.4 menunjukkan hasil kadar fenolik total ekstrak botto-botto (*Chromolaena odorata* L.) nilai fenolik tertinggi ditunjukkan pada sampel yang berasal dari kecamatan Tinggi moncong nilai  $187,03 \pm 0,73$  mg GAE/g, (187,03mg asam galat setara dengan 1g ekstrak botto-botto) yang berbeda

bermakna ( $\alpha < 0.05$ ) yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak yang berasal dari Tinggimoncong banyak mengandung senyawa fenolik, sehingga efektif digunakan untuk digunakan. Data hasil Penetapan Kadar Fenolik Total yang dianalisis secara statistik menggunakan uji One-Way ANOVA pada tabel VI.6 yang dilanjutkan dengan uji Duncan terdapat pada lampiran uji statistic untuk mengetahui perbandingan rata-rata dari seluruh nilai rata-rata yang ada, dan didapatkan hasil yang nilai yang berbeda nyata antar sampel.

Pada tabel IV.4 menunjukkan hasil kadar flavonoid total ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) nilai tertinggi di dapat pada ekstark yang berasal dari kecamatan Tinggi moncong dengan nilai  $111.53 \pm 0.86$  mg QE/g ekstrak (111.53 mg kuersetin setara dengan 1g ekstrak botto-botto) yang berbeda bermakna ( $\alpha < 0.05$ ) yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ekstrak yang berasal dari Tinggimoncong banyak mengandung senyawa flavonoid, sehingga efektif digunakan untuk digunakan. Data hasil Penetapan Kadar Fenolik Total yang dianalisis secara statistik menggunakan uji One-Way ANOVA pada tabel VI.7 yang dilanjutkan dengan uji Duncan terdapat pada lampiran uji statistic untuk mengetahui perbandingan rata-rata dari seluruh nilai rata-rata yang ada, dan didapatkan hasil yang nilai yang berbeda nyata antar sampel.

Pengujian kapasitas antioksidan merupakan suatu pengujian untuk mengetahui kemampuan senyawa pada sampel yang digunakan dalam mereduksi radikal bebas yang diuji menggunakan larutan pembanding. Kapasitas antioksidan dari masing-masing ekstrak diuji menggunakan metode FRAP, CUPRAC, DPPH, dan TOAC, yang masing-masing diukur menggunakan spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang maksimal setiap metode tersebut. Trolox dan Vitamin C

adalah pembanding yang digunakan. Troloks biasanya digunakan sebagai standar dalam proses pengukuran antioksidan. Trolox merupakan antioksidan yang dapat larut dalam air, yang merupakan hasil sintesis sebagai derivat Vitamin E pada 1974. Trolox juga banyak digunakan sebagai standard pembanding dalam berbagai pengujian antioksidan (Setiawan, Yunita, & Kurniawan, 2018). Asam askorbat merupakan senyawa pembanding yang paling sering digunakan dibanding Vitamin A dan Vitamin E karena aktivitas antioksidannya yang sangat tinggi (Lung & Destiani, 2017).

Hasil penelitian dengan metode *DPPH* diperoleh hasil kapasitas antioksidan ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari Kecamatan Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna ( $\alpha < 0.05$ ), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncan, dibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonombo, Bajeng, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, dan Tinggi Moncong.

Hasil penelitian dengan metode *FRAP* diperoleh hasil kapasitas antioksidan ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari Kecamatan Bajeng dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna ( $\alpha < 0.05$ ), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncan, dibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonombo, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, Parangloe dan Tinggi Moncong.

Hasil penelitian dengan metode *CUPRAC* diperoleh hasil kapasitas antioksidan ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari

Kecamatan Parangloe dengan pembandingan Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna ( $\alpha < 0.05$ ), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncandibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Bajeng, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, dan Tinggi Moncong.

Hasil penelitian dengan metode *TOAC* diperoleh hasil kapasitas antioksidan ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari Kecamatan Tinggi Moncong dengan pembandingan Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi secara bermakna ( $\alpha < 0.05$ ), yang berarti tingkat kesalahan atau perbedaan setiap sampel kurang dari 5 % dan mempunyai makna berbeda nyata antar sampel, yang dilanjutkan dengan uji Duncandibanding dengan ekstrak sampel dari Bontonompo, Bajeng, Somba Opu, Pattallassang, Manuju, Bungaya, Parigi, dan Parangloe

Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa banyak perbedaan antara sampel baik yang diambil dari dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi serta dengan ketinggian yang berbeda mempunyai nilai yang tidak sama, Dari setiap tabel pada setiap pengujian tidak ada nilai menunjukkan setara serta mempunyai jumlah kadar berbeda signifikan pada setiap daerah tempat tumbuh. Dari tabel yang ada, nilai-nilai tersebut menunjukkan pengaruh jumlah kadar flavonoid total, kadar fenolik total dan kapasitas anti oksidan terhadap daerah tumbuh tanaman botto-botto, karena hasil yang telah di analisis menggunakan One-Way ANOVA yang dilanjutkan dengan uji Duncan yang merujuk dari lampiran uji statistik, untuk melihat pengaruh dari setiap sampel yang ada dan menunjukkan hasil yang berbeda secara signifikan dari setiap ekstrak sampel yang ada. Dari 9

sampel yang telah diuji menunjukkan hasil yang tidak berurutan sesuai dengan ketinggian, suhu dari lokasi tempat pengambilan sampel tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ariskah, 2022) mengatakan bahwa keberadaan senyawa antioksidan dalam organ tumbuhan merupakan salah satu produk metabolisme tumbuhan. Ketinggian tempat memberikan pengaruh paling besar pada metabolisme tumbuhan berkaitan dengan ketersediaan cahaya matahari, suhu lingkungan dan nutrisi. Lain hal dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Zafirah Ismail *et al.* (2017) yang melakukan penelitian yang sama namun menggunakan sampel yang berbeda, mendapatkan hasil mengungkapkan bahwa faktor lingkungan (intensitas cahaya, suhu dan karakteristik tanah) dari delapan lokasi adalah bertanggung jawab untuk variasi fenolik, flavonoid, antioksidan dan analisis GC-MS pada *C. nutans*. Perbedaan jumlah kadar yang terdapat pada penelitian kemungkinan disebabkan hal yang tidak dilakukan pada penelitian seperti uji kadar unsur hara pada tanah dan intensitas cahaya.

Dari penelitian ini, kita dapat mengetahui betapa besar kekuasaan Allah SWT dalam menciptakan segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup terutama manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Asy-Syu'ara/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahan:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementrian Agama RI, 2014).

Firman Allah tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT. mengajak kita agar belajar dari seluruh alam bahwa hanya Allah SWT. semata yang berhak untuk di sembah. Jika mereka ingin merenungi adanya kuasa-Nya di bumi ini, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Allah SWT. telah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang baik sehingga mendatangkan manfaat, membuktikan bahwa Allah SWT. merupakan dzat yang Maha Kuasa dalam menghidupkan atau membangkitkan yang telah mati (Shihab, 2012).

Dengan segala kebesaran dan kekuasaan-Nya, Allah SWT. telah menumbuhkan suatu tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat dimanfaatkan oleh makhluknya. Salah satu dimanfaatkan nya tumbuhan yaitu dalam dunia kesehatan. Tumbuhan dapat digunakan sebagai pengobatan atau biasa disebut tanaman obat (herbal). Salah satu tanda-tanda kebesaran-Nya adalah ditumbuhkannya tumbuhan bajakah tampala yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai obat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliatian dan analisis data yang ada maka dapat disimpulkan bahwa :

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil kadar total fenolik dan kadar total flavonoid, ekstrak daun Botto-botto (*Cromolaena Odorata L*) tertinggi diperoleh dari kecamatan Tingggimoncong, dimana kadar total fenolik dengan nilai  $187,03 \pm 0,73$  mg GAE/g, dan kadar total flavonoid dengan nilai  $111.53 \pm 0.86$  mg QE/g ekstrak, dan kapasitas anti oksidan pada metode TOAC terdistribusi memiliki kadar antioksidan yang tertinggi dari Kecamatan Tinggi Moncong dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5, metode DPPH diperoleh hasil ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari Kecamatan Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi, dan metode CUPRAC diperoleh hasil kapasitas antioksidan ekstrak botto-botto (*Choromolaena odorata L.*) yang berasal dari Kecamatan Parangloe dengan pembanding Vit C dan trolox pada tabel IV.5 menunjukkan kapasitas antioksidan yang paling tertinggi.

#### **B. Saran**

Disarankan untuk melakukan pengujian unsur hara dan intensitas cahaya pada tempat pengambilan sampel.

## DAFTAR PUSTAKA


- Ahmad et al., A. R. (2015). *Penetapan Kadar Fenolik dan Flavonoid Total Ekstrak Metanol Buah dan Daun Patikala (Etilingera elatior (Jack)R.M.SM). original artikel*, 6.
- Amina et al, N. (2020). *Penetapan Kadar Flavonoid Total Ekstrak Etanol Kulit Buah Alpukat (Persea Americana Mill.) Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis. Jurnal Fitofarmaka Indonesia, Vol. 4 No.2*, 226.
- Ariskah, A. (2022). *Pengaruh Ketinggian Tempat Tumbuh Terhadap Kadar Flavonoid Total Dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Kipahit (Tithonia diversifolia)*. 43.
- Aseptianova. (2019). *Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga Untuk Pengobatan Keluarga Di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami-Kota Palembang. urnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 25.
- Ashar, M. (2016). *Formulasi Dan Uji Stabilitas Fisik Sediaan Gel Ekstrak Daun . makassar: UIN Alauddin Makassar*.
- Ayu Vandira Candra Kusuma, M. A. (2016). *Phenolic Compound of Shoots and Tubers of Purple Nutsedge (Cyperus rotundus L.) at Various Growth Ages and Its Effect on Broadleaf Weed Germination*. 8.
- B O Putry, E. H. (2021). *Efektivitas Ekstrak Daun Kirinyuh (Chromolaena Odorata) Terhadap Penyembuhan Luka Studi In Vivo Dan In Vitro*. 13.
- Bharti Badhani, N. S. (2015). *Gallic acid: A versatile antioxidant with promising therapeutic and industrial applications . RSC Advances*, 54.
- Celep, E., Aydin, A., & Yesilada, E. (2012). *A comparative study on the in vitro antioxidant potentials of three edible fruits: Cornelian cherry, Japanese persimmon and cherry laurel. Elsevier, Food and Chemical Toxicology*, 3329-3335.
- Celep, E., Charehsaz, M., Akyüz, S., Acar, E. T., & Yesilada, E. (2015). *Effect of in vitro gastrointestinal digestion on the bioavailability of phenolic components and the antioxidant potentials of some Turkish fruit wines. Elsevier, Food Research International*, 209-215.
- Dharmayudha, I. W. (2016). *Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L) di Bali. Indonesia Medicus Veterinus*, 10.
- Durairaj Thirumurugan, A. C. (2018). *An Introductory Chapter: Secondary Metabolites*. 1.

- Eka Junaidia, Y. A. (2018). *Aktivitas Antibakteri dan Antioksidan Asam Galat dari Kulit Buah Lokal yang Diproduksi dengan Tanase. ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia*, 137.
- Fatmawati, D. A. (2019). A New Flavanone as a Potent Antioxidant Isolated from *Chromolaena odorata* L. Leaves. *Hindawi*, 13.
- Gowa, P. (2017). *Kabupaten Gowa Dalam Angka*. Kabupaten Gowa.
- Iqbal, E., Salim, K. A., & Lim, L. B. (224-232). *Phytochemical screening, total phenolics and antioxidant activities of bark and leaf extracts of Goniothalamus velutinus (Airy Shaw) from Brunei Darussalam. Journal of King Saud University – Science*, 2015.
- Irena Pastar, O. S. (2013). *Epithelialization in Wound Healing: A Comprehensive Review. whs*, 20.
- Kurniawati, A. (2019). *Pengaruh Jenis Pelarut Pada Proses Ekstraksi Bunga Mawar Dengan Metode Maserasi Sebagai Aroma Parfum. Journal of Creativity Student*, 10.
- Mukhriani. (2014). *Esktraksi Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif. Jurnal Kesehatan*.
- Özyürek, M., Bektaglu, B., Güclü, K., Güngör, N., & Apak, R. (2008). *Simultaneous total antioxidant capacity assay of lipophilic and hydrophilic antioxidants in the same acetone–water solution containing 2% methylcyclodextrin using the cupric reducing antioxidant capacity (CUPRAC) method. Elsevier, analytica chimica acta*, 28-39.
- Qing-Wen Zhang, L.-G. L.-C. (2018). *Techniques for extraction and isolation. Chinese Medicine*, 26.
- Robertino Ikalinus, S. K. (2015). *Phytochemical Screening Ethanol Extract Skin Stem Moringa. Indonesia Medicus Veterinus*, 9.
- Saputra. (2020). *Mikroemulsi Ekstrak Bawang Tiwai Sebagai Pembawa Zat Warna, Antioksidan Dan Antimikroba Pangan (Cet-1; B. Saragih, Ed.). D.I. Yogyakarta: Deepublish*.
- Sudarmi, K., Darmayasa, I. B., & Muksin, I. (2017). *Phytochemical And Inhibition Of Juwet Leaf Extract (Syzygium Cumini) On Growth Escherichia coli AND Staphylococcus aureus ATCC. JURNAL SIMBIOSIS*, 5.
- Susi et al., R. H. (2018). *Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Umbi Hati Tanah (Angiotepriis Sp.) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus. surya medika*, 23.


- Tian-yang Wang, Q. L.-s. (2018). *Bioactive flavonoids in medicinal plants: structure, activity and biological fate* . Asian Journal of Pharmaceutical Sciences , 22.
- Umar, I. (2014). *Formulasi Dan Uji Efektivitas Antioksidan Krim Ekstrak Etanol Daun Botto '-Botto ' (Chromolaena Odorata L.) dengan METODE DPPH* .
- Verdiana, M. (2018). *Pengaruh Jenis Pelarut Pada Ekstraksi Menggunakan Gelombang Ultrasonik Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Kulit Buah Lemon (Citrus Limon (Linn.) Burm F.)*. Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan, 9.
- Wahyu Bagio Leksono, R. P. (2018). *Jenis Pelarut Metanol Dan N-Heksana Terhadap Aktivitas Antioksidan Ekstrak Rumpun Laut Gelidium sp. Dari Pantai Drini Gunungkidul – Yogyakarta*. Jurnal Kelautan Tropi, 9.
- Wewengkang, D. S. (2021). *Galenika (Cet-1; Andriyanto, Ed.)* . Kawa Tengah: Lakeisha.
- Yanti, Y. R. (2021). *Effect of Water Content in Soil On C-Organic Levels and Soil Acidity (pH)*. IJCR-Indonesian Journal of Chemical Research, 6.
- Yustinus Ulung Anggraito, R. S. (2018). *Metabolit Sekunder Dari Tanaman : Aplikasi Dan Produksi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.
- Yustinus, e. a. (2018). *Metabolisme Sekunder Dari Tanaman*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Zahara, M. (2019). *Description of Chromolaena odorata L. R.M King and H.* . banda aceh: Department of Biology, Islamic Faculty, University Muhammadiyah Aceh.
- Zamroni Salim, P. d. (2017). *info komoditi tanaman obat. indonesia: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan* .
- Zuhaidaa, A. (2018). *Deskripsi Saintifik Pengaruh Tanah Pada Pertumbuhan Tanaman: Studi Terhadap QS. Al A'raf Ayat 58. Thabiea : Journal of Natural Science Teaching*, 9.

## LAMPIRAN

### Preparasi Sampel




### Ekstraksi Sampel




## Skrining Fitokimia


### Uji Alkaloid




### Uji Steroid dan Terpenoid



### Uji Tanin




### Uji Saponin




### Uji Glikosida

#### Tes Borntrager (*Anthraquinone Glycoside*)




#### Tes Keller-Killaini (*Cardiac Glycoside*)







## Kadar Fenolik Total




## Kadar Flavonoid Total




**KAPASITAS ANTIOKSIDAN FRAP**

### Uji Troloks Frap





M A K A S S A K

**CUPRAC**


M A K A S S A R

### Uji Troloks Cuprac




**DPPH**


### Uji Troloks DPPH





**TOAC**

### Uji Troloks TOAC





Gambar 4 Daun Botto-botto  
(*Chromolaena Odorata L.*)



Gambar 5 Simplisia sampel



Gambar 6 : Proses ekstraksi sampel



Gambar 7: Proses Rotary Evaporator



Gambar 8 : Uji Flavonoid



Gambar 9 : Uji Fenolik



Gambar 10 : Hasil Uji FRAP



Gambar 11: Hasil Uji Cuprac



Gambar 12 : Hasil Uji DPPH



Gambar 13 : Hasil Uji TOAC

**Lampiran Perhitungan rendamen ekstrak**

**A. Parigi**

Bobot cawan kosong	=	8,9879	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,9246	gram
Bobot ekstrak	=	1,9367	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	19,3670	%

**B. Somba Opu**

Bobot cawan kosong	=	8,9341	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,6149	gram
Bobot ekstrak	=	1,6808	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	16,8080	%

**C. Tinggi Moncong**

Bobot cawan kosong	=	8,7761	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,0257	gram
Bobot ekstrak	=	1,2496	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	12,4960	%

**D. Pattallassang**

Bobot cawan kosong	=	8,9641	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,7278	gram
Bobot ekstrak	=	1,7637	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	17,6370	%

E. **Manuju**

Bobot cawan kosong	=	8,9512	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,0604	gram
Bobot ekstrak	=	1,1092	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	11,0920	%

F. **Bajeng**

Bobot cawan kosong	=	8,6567	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	9,6865	gram
Bobot ekstrak	=	1,0298	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	10,2980	%

G. **Bungaya**

Bobot cawan kosong	=	8,9698	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,7407	gram
Bobot ekstrak	=	1,7709	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	17,7090	%

H. **Parangloe**

Bobot cawan kosong	=	8,4768	gram
Bobot cawan kosong + ekstrak	=	10,2670	gram
Bobot ekstrak	=	1,7902	gram
Bobot simplisia	=	10,0	gram
% Rendemen	=	$\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simplisia}} \times 100\%$	
	=	17,9020	%

**I. Bontonompo**

Bobot cawan kosong = 8,5614 gram

Bobot cawan kosong + ekstrak = 9,8310 gram

Bobot ekstrak = 1,2696 gram

Bobot simplisia = 10,0 gram

% Rendemen =  $\frac{\text{Bobot Ekstrak}}{\text{Bobot Simmlisia}} \times 100\%$

= 12,6960 %



## Lampiran Hasil uji statistic

### a. Fenolik

#### Uji Nomablitas

		Fenolik
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	156.7211
	Std. Deviation	57.34493
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.126
	Negative	-.147
Kolmogorov-Smirnov Z		.765
Asymp. Sig. (2-tailed)		.602

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Test of Homogeneity of Variances

##### Fenolik

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.570	8	18	.789

#### Anova Fenolik

##### Fenolik

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	85490.405	8	10686.301	21231.160	.000
Within Groups	9.060	18	.503		
Total	85499.465	26			

#### Duncan

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Manuju	3	54.7231								
Parangloe	3		81.3777							
Parigi	3			138.5170						
Somba Opu	3				146.8658					
Bajeng	3					161.7031				
Bontonopu	3						176.2905			
Bungaya	3							197.3097		
Patallasang	3								219.9100	
Tinggi moncong	3									233.7926
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.



## b. Flavonoid

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Predicted Value
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	80.4805890
	Std. Deviation	12.10071050
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		.901

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**Anova flavonoid**

## Flavonoid

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	20743.309	8	2592.914	7118.192	.000
Within Groups	6.557	18	.364		
Total	20749.866	26			

**Tabel. VI.7 Duncan flavonoid**

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duncan <sup>a</sup>	Patallasang	3	35.3669								
	Somba Opu	3		44.6958							
	Manuju	3			45.9795						
	Parigi	3				86.4314					
	Bungaya	3					91.2668				
	Parangloe	3						93.5743			
	Bajeng	3							95.9427		
	Bontonompo	3								110.3367	
	Tinggi Moncong	3									111.5298
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

c. Anti Oksidan

1. DPPH  
DPPH VIT C

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		DPPHVIT.C
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	389.4904
	Std. Deviation	42.32436
	Absolute	.189
Most Extreme Differences	Positive	.189
	Negative	-.180
Kolmogorov-Smirnov Z		.980
Asymp. Sig. (2-tailed)		.292

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

**ANOVA**

DPPHVIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	46574.915	8	5821.864	484746.729	.000
Within Groups	.216	18	.012		
Total	46575.131	26			

**DPPHVIT.C**

Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tinggi Moncong	3	342.45 11								
Manuju	3		343.52 68							
Patallasang	3			347.34 54						
Somba Opu	3				368.43 38					
Bungaya	3					375.06 57				
Parigi	3						400.34 03			
Bontonompo	3							432.97 81		
Bajeng	3								446.87 56	
Parangloe	3									448.3972
Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

- Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.

DPPH TROLOX

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Trolox
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	285.7860
	Std. Deviation	32.34791
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.176
	Negative	-.181
Kolmogorov-Smirnov Z		.942
Asymp. Sig. (2-tailed)		.337

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.



**ANOVA**

Trolox

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	27200.902	8	3400.113	11829.518	.000
Within Groups	5.174	18	.287		
Total	27206.075	26			



**Trolox**

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05							
			1	2	3	4	5	6	7	8
Duncan <sup>a</sup>	Tinggi Moncong	3	249.6807							
	Manuju	3		250.9100						
	Patallassing	3			253.4587					
	Somba Opu	3				269.3320				
	Bungaya	3					275.1047			
	Parigi	3						294.0223		
	Bontonombo	3							319.6487	
	Bajeng	3								329.6063
	Parangloe	3								330.3103
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

- Means for groups in homogeneous subsets are displayed.
- a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## 2. CUPRAC VIT. C

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		CUPRAV_VIT.C
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	169.9302
	Std. Deviation	47.07866
	Absolute	.206
Most Extreme Differences	Positive	.187
	Negative	-.206
Kolmogorov-Smirnov Z		1.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.203

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## ANOVA

## CUPRAV\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	57621.868	8	7202.734	28609.972	.000
Within Groups	4.532	18	.252		
Total	57626.400	26			

## CUPRAV\_VIT.C

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duncan <sup>a</sup>	Patallassa ng	3	111.85 99								
	Somba Opu	3		116.99 34							
	Tinggi Moncong	3			119.76 01						
	Parigi	3				142.24 29					
	Manuju	3					167.27 45				
	Bungaya	3						203.86 33			
	Bontonom po	3							208.20 84		
	Bajeng	3								227.56 86	
	Parangloe	3									231.60 10
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## CUPRAC TROLOX

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		CUPRAC_TROLOX
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	283.6669
	Std. Deviation	61.04218
Most Extreme Differences	Absolute	.208
	Positive	.188
	Negative	-.208
Kolmogorov-Smirnov Z		1.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.195

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## ANOVA

## CUPRAC\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	96872.340	8	12109.043	29030.650	.000
Within Groups	7.508	18	.417		
Total	96879.848	26			

## CUPRAC\_TROLOX

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Duncan <sup>a</sup>	Patallassing	3	208.27 20									
	Somba Opu	3		215.51 30								
	Tinggi Moncong	3			218.44 66							
	Parigi	3				246.48 40						
	Manuju	3					281.56 57					
	Bungaya	3						328.03 28				
	Bontonompo	3							332.98 67			
	Bajeng	3								359.21 72		
	Parangloe	3									362.48 40	
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## 3. Frap vit. C

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		FRAP_VIT.C
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	361.5342
	Std. Deviation	81.73122
Most Extreme Differences	Absolute	.140
	Positive	.140
	Negative	-.139
Kolmogorov-Smirnov Z		.726
Asymp. Sig. (2-tailed)		.668

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

**ANOVA**

FRAP\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	173668.280	8	21708.535	33942.672	.000
Within Groups	11.512	18	.640		
Total	173679.792	26			

**FRAP\_VIT.C**

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duncan <sup>a</sup>	Patallassa ng	3	222.22 21								
	Tinggi Moncong	3		247.47 47							
	Pari gi	3			326.83 98						
	Bontonom po	3				352.50 46					
	Manuju	3					379.52 34				
	Bungaya	3						401.29 87			
	Somba Opu	3							402.76 72		
	Parangloe	3								438.70 07	
	Bajeng	3									482.47 68
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## Frap Trolox

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		FRAP_TROLOX
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	427.8671
	Std. Deviation	108.89834
	Absolute	.142
Most Extreme Differences	Positive	.142
	Negative	-.141
Kolmogorov-Smirnov Z		.736
Asymp. Sig. (2-tailed)		.651

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## ANOVA

## FRAP\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	308309.517	8	38538.690	33797.686	.000
Within Groups	20.525	18	1.140		
Total	308330.042	26			

## FRAP\_TROLOX

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duncan <sup>a</sup>	Patallassing	3	243.4352								
	Tinggi Moncong	3		274.4894							
	Parigi	3			380.4624						
	Bontonompo	3				417.3961					
	Manuju	3					452.4384				
	Bungaya	3						479.8844			
	Somba Opu	3							482.9423		
	Parangloe	3								530.9230	
	Bajeng	3									588.8323
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## 4. TOAC\_VIT.C

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TOAC_VIT.C
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	47.4582
	Std. Deviation	14.78055
Most Extreme Differences	Absolute	.150
	Positive	.089
	Negative	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		.780
Asymp. Sig. (2-tailed)		.576

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## ANOVA

TOAC\_VIT.C

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	5678.872	8	709.859	10538.599	.000
Within Groups	1.212	18	.067		
Total	5680.085	26			

## TOAC\_VIT.C

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Duncan <sup>a</sup>	Manuju	3	18.0430								
	Bungaya	3		34.6073							
	Bajeng	3			40.4531						
	Patallassing	3				44.0110					
	Parigi	3					51.1603				
	Parangloe	3						53.4810			
	Bontonpomp	3							54.7294		
	Somba Opu	3								59.8101	
	Tinggi Moncong	3									70.8287
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3,000.



## TOAC\_TROLOX

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		TOAC_TROLOX
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	99.8206
	Std. Deviation	30.63638
Most Extreme Differences	Absolute	.144
	Positive	.096
	Negative	-.144
Kolmogorov-Smirnov Z		.746
Asymp. Sig. (2-tailed)		.634

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## ANOVA

## TOAC\_TROLOX

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	24401.379	8	3050.172	28759.417	.000
Within Groups	1.909	18	.106		
Total	24403.288	26			

## TOAC\_TROLOX

	Perlakuan	N	Subset for alpha = 0.05								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dunca n <sup>a</sup>	Manuju	3	39.42 65								
	Bungaya	3		73.22 17							
	Bajeng	3			85.16 55						
	Patallassan g	3				93.07 28					
	Parigi	3					106.96 86				
	Parangloe	3						111.76 35			
	Bontonom po	3							114.27 08		
	Somba Opu	3								124.70 97	
	Tinggi Moncong	3									149.78 60
	Sig.			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 3.000.

## Lampiran Perhitungan

### 1. Reagen Fenolik

- a. Pereaksi *Follin-Ciocalteu* 7,5%

Ketentuan larutan *Follin-Ciocalteu* 7,5% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 200 mL. jadi,  $7,5 \times 2 = 15$  mL *Follin-Ciocalteu* ad 200 mL (185 mL) air suling.

- b. Pereaksi Natrium hidroksida (NaOH) 1%

NaOH 1% dalam 100 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 200 mL. Jadi, 2 g NaOH ad 200 mL (198 mL) air suling.

### 2. Reagen Flavonoid

- a. Pereaksi Aluminium klorida ( $\text{AlCl}_3$ ) 10%

$\text{AlCl}_3$  10% dalam 10 mL. Sedangkan yang mau dibuat dalam 20 mL. Jadi, 2 gram  $\text{AlCl}_3$  10% ad 20 mL (18 mL) air suling.

- b. Pereaksi Natrium asetat ( $\text{CH}_3\text{COONa}$ ) 0,1%

$\text{CH}_3\text{COONa}$  ditimbang 1,640 mg ad 20 mL (18,5 mL) air suling.

### 3. Reagen FRAP

- a.  $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$   $2.0 \times 10^{-2}$  M

$$0,02 \times 270 \times 50 \text{ mL} = 750 \text{ mg}$$

Jadi,  $\text{FeCl}_3$  yang ditimbang 750 mg + 200  $\mu\text{L}$  HCl 5 M ad 50 mL air suling.

- b. TPTZ  $1.0 \times 10^{-2}$  M

$$0,01 \times 335 \times 50 \text{ mL} = 167,5 \text{ mg}$$

Jadi, TPTZ yang ditimbang 167,5 mg ad 50 mL etanol absolut.

- c. Natrium asetat pH 3,6

$1,55 \times 8 \text{ mL}$  asam asetat pekat ad 500 mL air suling.

#### 4. Reagen CUPRAC

a.  $\text{CuCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$   $10 \times 10^{-2} \text{ M}$

425 mg + 250 mL air suling.

b. neocuproine  $7.5 \times 10^{-2} \text{ M}$

390 mg + etanol absolut 250 mL.

c. amonium asetat pH 7.0

19,27 gram + 250 mL air suling.

#### 5. Reagen DPPH

Larutan DPPH yang dibutuhkan sebanyak 100ml

Reagen DPPH = 394

0,1 mM = 0,0001 M

Mg DPPH =  $M \times \text{BM} \times \text{Vol (mL)}$

$$= 0,0001 \text{ M} \times 394 \times 100 \text{ mL}$$

$$= 3,94 \text{ mg/100 mL etanol absolute}$$

#### 6. Reagen TOAC

Larutan yang mau dibuat 400 mL

a. Amonium molibdat  $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  4 mM

$$= 0,004 \times 1236 \times 3$$

$$= 14,832$$

$$\frac{400}{3} \times 14,832 = 1,977 \text{ mg}$$

Jadi, amonium molibdat yang ditimbang sebanyak 14,832 mg

b. Kalium dihidrogen fosfat ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ) 28 mM

$$= 0,028 \times 136 \times 3$$

$$= 11,424$$

$$\frac{400}{3} \times 11,424 = 152,32 \text{ mg}$$

Jadi, kalium dihidrogen fosfar ditimbang sebanyak 152,32 mg

c. Asam sulfat ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) 0,6 M

$$N_1 \cdot V_1 = N_2 \cdot V_2$$

$$5 \cdot X = 0,6 \cdot 3$$

$$X = \frac{1,8}{3}$$

$$X = 0,36 \text{ mL}$$

$$= 360 \mu\text{L}$$

$$\frac{400}{3} \times 360 \mu\text{L} = 48.000 \mu\text{L}$$

$$= 48 \text{ mL}$$



## RIWAYAT HIDUP



Lahir di Rewang, 14 November 2000. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, anak dari pasangan Bapak Hasan dan Ibu Annisa. Penulis memiliki hobi bermain futsal dan volly. Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak pada tahun 2006 di TK Terpadu. Pada tahun 2007 penulis melanjutkan Pendidikan di SDN Funju dan tamat pada 2012, dan pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMPN 4 Dapurang dan tahun 2015 melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Pasangkayu. Pada tahun 2018 penulis memasuki jenjang perguruan tinggi di *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Penulis merasa bersyukur atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT dan motivasi serta limpahan doa yang ikhlas dan usaha kerja keras orang tua dan keluarga membuat penulis selalu bersemangat untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk orang-orang sekitar terutama orang tua.

ALA UDDIN  
M A K A S S A R