

**GAMBARAN KEJADIAN ANEMIA PADA SISWI SMA PERKOTAAN DENGAN SISWISMA PEDESAAN
KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Mutmainnah
70200118034

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Perkotaan Dengan Siswi SMA Pedesaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022” yang disusun oleh Mutmainnah, NIM: 70200118034 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, 11 November 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Gowa, 16 November 2022
21 Rabiul Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Abd. Majid HR. Lagu, SKM, M.Kes | (.....) |
| Munaqisy I | : Yusma Indah Jayadi, S. Gz., M.Kes | (.....) |
| Munaqisy II | : Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd | (.....) |
| Pembimbing I | : Syamsul Alam SKM, M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : Irviani Anwar Ibrahim SKM, M.Kes | (.....) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh:

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Syatirah., Sp.A., M.Kes
NIP: 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, segala puji hanya milik Allah SWT dan kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkatlimpahan dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Perkotaan Dengan Siswi SMA Pedesaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022” dapat terselesaikan.

Penulis skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum, Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM.,MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi,M.Pd.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat
4. Bapak Syamsul Alam, SKM., M.Kes sebagai pembimbing I dan Ibu Irviani A Ibrahim,SKM.,M.Kes sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu,tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan dan perbaikan dalam penulisan proposal ini.

5. Ibu Yusma Indah Jayadi, S. Gz., M.Kes dan Bapak Prof. Dr. Mustari Mustafa, M.Pd sebagai penguji I dan II yang telah memberikan saran dan arahan dalam penyelesaian proposal ini.
6. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis.
7. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
8. Para staff akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
9. Teman-teman tercinta Angkatan 2018 Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar khususnya Peminatan Gizi 2018 sebagai teman seperjuangan dan selalu ada bahu membahu, menyemangati, saling membantu serta mendo'akan dalam penyelesaian proposal ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Alhamdulillah akhirnya proposal ini bisa dirampungkan, semoga kebaikan dan kemurahan hati semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, Aamiin


Makassar, 23 Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | v |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Hipotesis | 4 |
| D. Definisi operasional dan kriteria objektif..... | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Tujuan Penelitian | 25 |
| G. Manfaat penelitian | 25 |
| BAB II..... | 27 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 27 |
| A. Tinjauan tentang remaja putri | 27 |
| B. Tinjauan Tentang Anemia..... | 31 |
| C. Tinjauan tentang status gizi | 35 |
| D. Tinjauan Tentang Inhibitor Zat Besi..... | 38 |
| E. Tinjauan tentang pola menstruasi | 41 |
| F. Tinjauan Tentang Asupan Makanan | 44 |
| G. Kerangka teori..... | 54 |
| H. Kerangka Konsep..... | 55 |
| BAB III | 56 |
| METODOLOGI PENELITIAN..... | 56 |
| A. Jenis dan Lokasi penelitian | 56 |
| B. Populasi dan Sampel..... | 56 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 57 |

| | |
|--|-----|
| D. Instrument Penelitian | 57 |
| E. Teknik pengolahan dan analisis data | 58 |
| F. Uj Man Whitney | 60 |
| BAB IV | 61 |
| HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 61 |
| BAB V | 109 |
| PENUTUP..... | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | 111 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1. Angka Kecukupan Gizi Pada Remaja | 29 |
| Tabel 2.2. Kadar Normal HB..... | 31 |
| Tabel 2.3. Klasifikasi Anemia Menurut Kelompok Umur | 32 |
| Tabel 2.4. Klasifikasi IMT Menurut Kriteria Asia Pasifik..... | 38 |
| Tabel 2.5. Kafein..... | 41 |
| Tabel 2.6. Jenis Zat Besi | 53 |
| Tabel 4.1. Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 65 |
| Tabel 4.2. Distribusi Siswi Berdasarkan IMT Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 66 |
| Tabel 4.3. Distribusi Siswi Berdasarkan KEK Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 66 |
| Tabel 4.4. Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022. | 67 |
| Tabel 4.5. Distribusi Siswi Berdasarkan Siklus Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.... | 68 |
| Tabel 4.6. Distribusi Siswi Berdasarkan Lama Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.... | 68 |

| | |
|---|----|
| Tabel 4.7. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor Zat Besi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 69 |
| Tabel 4.8. Distribusi Tingkat Konsumsi Karbohidrat Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 70 |
| Tabel 4.9. Distribusi Tingkat Konsumsi Protein Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 71 |
| Tabel 4.10. Distribusi Tingkat Konsumsi Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 71 |
| Tabel 4.11. Distribusi Tingkat Konsumsi Vitamin C Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 72 |
| Tabel 4.12. Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 73 |
| Tabel 4.13. Hubungan Antara Kelas Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 74 |
| Tabel 4.14. Hubungan Antara IMT Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 75 |
| Tabel 4.15. Hubungan Antara KEK Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan | |

(SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....76

Tabel 4.16. Hubungan Antara Siklus Mestruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....77

Tabel 4.17. Hubungan Antara Lama Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....78

Tabel 4.18. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....79

Tabel 4.19. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....80

Tabel 4.20. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....81

Tabel 4.21. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.....82

Tabel 4.22. Hubungan Antara Asupan Karbohidrat Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma

| | |
|--|----|
| Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 83 |
| Tabel 4.23. Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 84 |
| Tabel 4.24. Hubungan Antara Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 85 |
| Tabel 4.25. Hubungan Antara Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 86 |
| Tabel 4.26 Uji man whitney Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 86 |
| Tabel 4.27 Uji man whitney Status Gizi Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 87 |
| Tabel 4.28 Uji man whitney Kejadian pola menstruasi anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 87 |
| Tabel 4.29 Uji man whitney pola konsumsi asupan inhibitor zat besi Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) | |

| | | |
|------------|--|----|
| | Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 88 |
| Tabel 4.30 | Uji man whitney asupan karbohidrat Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 88 |
| Tabel 4.31 | Uji man whitney asupan protein Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 89 |
| Tabel 4.30 | Uji man whitney asupan zat besi Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 89 |
| Tabel 4.30 | Uji man whitney asupan vitamin c Kejadian anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022..... | 89 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Teori..... | 53 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konsep..... | 54 |



ABSTRAK

Nama : Mutmainnah

NIM : 70200118034

**Judul : Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Pedesaan Dengan Siswi SMA
Perkotaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022**

Anemia merupakan Kadar hemoglobin (Hb) dalam darah yang berada di bawah normal. Didunia terdapat remaja (10-19 tahun) sebanyak 40-88% mengalami anemia dengan frekuensi 26,2% di Indonesia, terdiri dari 59% pria dan 49,1% wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswi SMA Pedesaan Dengan Siswi SMA Perkotaan Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif observasional dengan pendekatan analitik observasional dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi di perkotaan maupun di pedesaan yaitu SMA 1 Bone dan SMA 21 Bone dengan jumlah sampel sebanyak 83 orang yang dimana disetarakan dengan jumlah sampel dipedesaan. Teknik sampling yang digunakan yaitu *non-random sampling* dan *total sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kejadian anemia pada siswi SMA Pedesaan dengan siswi SMA Perkotaan dikabupaten bone dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,026 < 0,05$. Remaja berpotensi mengalami anemia karena gaya hidup dan pola konsumsi remaja bervariasi karena pertumbuhan dan perkembangan.

Kata Kunci : Anemia, Kejadian Anemia dipedesaan dan diperkotaan, Total sampling



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja didefinisikan oleh WHO sebagai usia antara 10 dan 19 tahun. BKKBN (2018) menyatakan bahwa usia remaja berkisar antara 10 hingga 24 tahun. Masa remaja sangat penting untuk membentuk perkembangan mereka selama sepuluh tahun pertama kehidupan. Perkembangan dan perubahan yang cepat dari masa kanak-kanak hingga dewasa muda dapat diperhatikan selama masa ini. Perubahan biologis yang terjadi pada masa pubertas remaja meliputi perubahan komposisi tubuh, penambahan tinggi beserta berat badan, penumpukan massa tulang, dan perkembangan seksual. Sikap seseorang akan berubah karena memiliki informasi yang baik, menjadikannya kebiasaan sehari-hari. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang makan sehat menyukai makanan bergizi dan jarang makan makanan cepat saji.

1000 hari pertama kehidupan seorang anak adalah saat dimulainya investasi nutrisi untuk wanita muda yang sedang hamil. Ibu hamil yang kekurangan gizi akan melahirkan anak yang kekurangan gizi dan berisiko signifikan menurunkan kemampuan kecerdasan anaknya pada usia sekolah dan produktivitas orang dewasa. Tahap awal menstruasi sangat penting dengan kebutuhan zat besi dalam tubuh. Namun, remaja putri saat ini masih sangat kurang dalam pengetahuan tentang kesehatan dan pola makan yang menyebabkan mereka rentan terhadap anemia karena kurangnya asupan makanan bergizi dan pola makan yang buruk. Diharapkan dengan memiliki informasi yang memadai akan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan pola makan dan kesehatan yang sehat (Kemenkes Republik Indonesia, 2019).

Remaja merupakan salah satu anggota keluarga yang dibidik KADARZI (keluarga yang peduli gizi). Tidak banyak informasi yang tersedia saat ini tentang pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) remaja dalam hal tingkat gizi, terutama dalam hal melacak berat badan, mengonsumsi makanan yang berbeda, dan indikator lain yang penting bagi remaja yang berencana untuk menjadi orang tua di masa depan. Generasi Penerus Remaja merupakan generasi penerus yang sangat strategis dan mudah menyerap peremajaan karena kualitas remaja akan menentukan kualitas orang dewasa di masa depan, namun saat ini mereka kurang mendapat perhatian yang cukup dari program gizi.

Gadis remaja sering ingin tetap kecil, oleh karena itu diyakini bahwa dengan terus-menerus melacak berat badan mereka dan makan dengan tujuan remaja yang berbeda, ini dapat dicapai (Kemenkes Republik Indonesia, 2019).

Anemia merupakan salah satu kategori gizi buruk dan masalah kesehatan yang buruk. Kadar hemoglobin (Hb) dalam darah berada di bawah normal, yang merupakan tanda anemia (Kemenkes, 2018).

Menurut WHO, kekurangan gizi adalah penyebab paling umum dari anemia. (WHO, 2018). Generasi Penerus Remaja merupakan generasi penerus yang sangat strategis dan mudah menyerap peremajaan karena kualitas remaja akan menentukan kualitas orang dewasa di masa depan, namun saat ini mereka kurang mendapat perhatian yang cukup dari program gizi. Gadis remaja sering ingin tetap kecil, oleh karena itu diyakini bahwa dengan terus-menerus melacak berat badan mereka dan makan dengan tujuan remaja yang berbeda, ini dapat dicapai. (Gallagher ML. , 2008)

Wanita remaja yang menderita anemia lebih sensitif terhadap penyakit, memiliki tingkat aktivitas yang lebih rendah, dan memiliki keberhasilan akademis yang lebih buruk, di antara efek lainnya. Remaja dengan anemia juga mengalami penurunan kebugaran, yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka dalam olahraga. Akibatnya, wanita muda 10 kali lebih mungkin terkena anemia dibandingkan pria muda. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Remaja putri membutuhkan asupan zat besi yang lebih besar karena mereka mengalami menstruasi setiap bulan dan berada dalam tahap perkembangan (Nurbaiti, 2019).

Anak perempuan di masa remajanya masih memiliki angka anemia yang signifikan. Seperti yang dinyatakan oleh (World Health Organization, 2011) , Anemia mempengaruhi 40-88% remaja (10-19 tahun) di seluruh dunia, dengan frekuensi 26,2% di Indonesia, terdiri dari 59% pria dan 49,1% wanita. Menurut data (Riset Kesehatan Dasar, 2018) , Di Indonesia, 48,9% penduduk penderita anemia, yang lebih banyak terjadi pada kelompok usia 15-24 tahun dan 25-34 tahun.

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan memberikan kontribusi pemenuhan kebutuhan energi oleh protein sebesar 27,4% dalam bentuk jajanan. Temuan menunjukkan bahwa 78% anak sekolah makan jajanan saat di sekolah, baik di kantin

maupun di luar kantin, membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit, salah satunya adalah peningkatan 33,7% (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan, 2015)

Menurut statistik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, prevalensi anemia pada remaja adalah 29,76% pada tahun 2018 dan 22,70% pada tahun 2019 (Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2019) . Kasus anemia pada remaja saat ini cukup banyak, yaitu sebesar 21,7%. Angka kejadian kasus yang melibatkan remaja adalah 18,4%. Kasus anemia sebanyak 20,6% di kota dan 22,8% di dusun (Risikesdas, 2013)

Remaja putri dengan anemia memiliki kemungkinan 1,87 kali lebih besar dibandingkan remaja putri tanpa anemia untuk memiliki keberhasilan berdasarkan pendidikan yang kurang. Hal tersebut disebabkan karena anemia pada remaja putri dapat mempengaruhi kemampuan berkonsentrasi saat belajar, selain berdampak buruk pada pertumbuhan, kerentanan terhadap penyakit, dan tingkat kesegaran dan kebugaran (Alexander, 2020)

Anemia akan mempengaruhi kemampuan konsentrasi siswa di kelas, tingkat kebugaran jasmaninya, dan kemampuan tumbuh kembangnya secara normal dari segi tinggi dan berat badan. Anemia juga merupakan masalah asupan mikronutrien yang sangat serius karena terjadinya berbagai masalah pada ibu dan bayi baru lahir (Herwandari & Soviyati, 2020).

Menurut teori (Chaparro & Suchdev, 2019), anemia dipengaruhi oleh sosio demografi dan perilaku, serta wanita yang rentan secara fisiologis (usia kehamilan, paritas, menstruasi, jarak kelahiran), sumber makanan yang diperkaya, akses ke pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pendidikan. tentang gizi, air bersih. dan sanitasi, asupan dan penyerapan zat gizi yang tidak memadai serta kekurangan zat gizi mikro, penyakit infeksi dan kelainan hemoglobin genetic. Semua ini adalah beberapa faktor penyebab anemia.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tinjauan literatur jurnal, telah banyak penelitian yang mengangkat asupan makronutrien, penyakit menular, pola asuh, dan sosiodemografi. Penelitian sebelumnya menyarankan untuk fokus pada pengaruh asupan mikronutrien pada kejadian anemia. Selain itu, masih kurangnya penelitian yang membahas tentang pengaruh inhibitor besi dan prevalensi anemia di kalangan remaja. Asupan zat gizi makro (karbohidrat dan protein) dan mikro (nutrisi lain) akan

dikategorikan dalam penelitian ini (Vitamin C dan Fe) sebagai gambaran kejadian anemia pada remaja . Hal inilah yang membedakannya dengan peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Kejadian Anemia Pada Siswa SMA Perkotaan dengan Siswa SMA Perdesaan di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Tahun 2022.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022?

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

- a) Tidak ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022.
- b) Tidak ada hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022.
- c) Tidak ada hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022.
- d) Tidak ada hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022.

2. Hipotesis Alternatif(Ha)

- a) Ada hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022.
- b) Ada hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022

- c) Ada hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022
- d) Ada hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022



D. Definisi operasional dan kriteria objektif

| Variable | Definisi | Cara Ukur | Alat Ukur | Kriteria Objektif | Skala |
|---------------------------------------|---|---|------------------------------|---|---------|
| Independen : Asupan Makanan | Asupan karbohidrat, protein, zat besi dan vitamin c yang diperoleh dari <i>food recal</i> 2x24 jam, yang dianalisis dengan DKBM hasilnya dirata-rata, dan dibandingkan dengan AKG dalam satuan gram (g). | Wawancara dan <i>food recall</i> 2x24 jam | kuesioner <i>food recall</i> | Dikatakan asupannya cukup apabila berkisar $\geq 80\%$ dan dikatakan asupannya kurang apabila $< 80\%$ (Firdhayani, 2010) | Nominal |
| Pola menstruasi | Pola menstruasi ada 2 yaitu siklus menstruasi dan lama menstruasi. <ul style="list-style-type: none"> Siklus menstruasi adalah jarak mulainya menstruasi bulan lalu dengan mulainya kembali menstruasi. Yang mana siklus | Interval hari | Kuesioner | Siklus Menstruasi <ul style="list-style-type: none"> Normal, jika siklus menstruasi 21-35 hari Tidak Normal, jika siklus menstruasi < 21 hari atau > 35 hari Lama Menstruasi <ul style="list-style-type: none"> Normal, jika lama menstruasi 3-7 hari Tidak Normal, jika lama menstruasi < 3 hari atau > 7 hari | Ordinal |

| | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|---|---|----------------|
| | <p>menstruasi normal wanita yaitu 21-35 hari dengan rata-rata 28 hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lama menstruasi adalah lama proses menstruasi yang dialami responden. Yang mana lama menstruasi normal wanita berkisar 3-7 hari. | | | (Wahyu, 2016) | |
| Status Gizi | <p>Gambaran kesehatan remaja sebagai akibat dari pemberian/konsumsi makanan dan penggunaan dalam tubuh, dilakukan dengan menggunakan pengukuran antropometri</p> | <p>IMT</p> <p>LILA</p> | <p>Berat Badan (Timbangan) dan Tinggi Badan (Microtoise)</p> <p>Pita Lila</p> | <ul style="list-style-type: none"> Kurang (< 18,5) Normal (18,5-22,9) Overweight (23-24,9) <p>(Notoadmojo, 2007)</p> <p>1 = KEK, jika LILA <23,5 cm</p> <p>2 = Normal, Jika LILA 23,5 cm</p> | Ratio |
| Inhibitor Zat Besi | Kebiasaan | Wawancara | Kesioner | Frekuensi konsumsi: | Ordinal |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------------------------|--|-------|
| | mengonsumsi minuman yang mengandung zat-zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi yaitu kopi dan teh dalam 1 bulan terakhir | Langsung | | <p>a. 1x/hari b. > 1x/hari c. 3-6x/ minggu d. 1-2x/ minggu e. 1-2x/bulan f. Tidak pernah</p> <p>Kriteria: 1). Sering = jika memilih poin a-c lebih 2). Jarang = jika memilih poin d-e 3). Tidak pernah = jika memilih poin f</p> <p>Waktu Konsumsi : a. < 2 jam sebelum makan b. 1-2 jam sebelum makan c. 1-2 jam setelah makan d. > 2 jam setelah makan (Gibson, 2005)</p> | |
| Dependen : Kejadian Anemia | Suatu keadaan dimana kadar Hb dalam darah < 12 g/dl berdasarkan pemeriksaan darah | Pemeriksaan langsung dengan metode <i>Finger Prick</i> | <i>HemoCue System (Easy Touch)</i> | 1 = Anemia jika kadar Hb < 12 g/dl 2 = Tidak Anemia jika kadar Hb > 12 g/dl (Kemenkes RI, 2018) | Ratio |



E. Kajian Pustaka

| | Judul>Nama Peneliti/Tahun | Metodologi | | | | Hasil Penelitian |
|---|---|--|---|--|---|---|
| | | Subjek | Jenis/Pendekatan Penelitian | Variabel | Instrument | |
| 1 | Hubungan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Puteri Di Kelas Xi Sma Negeri 3 Tangerang Selatan/ Gita Ayuningtyas, Dewi Firiani, Parmah/ 2020 | Populasi: kelas XI SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Sampel : dalam penelitian Ini | Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan <i>cross sectional study</i> . | Independen : Status gizi, pengetahuan dan umur Dependen : kejadian anemia | Instrumen dalam penelitian ini adalah uji laboratorium kadar Hb, pengukuran antropometri (IMT), kuesioner yang dibuat dengan mengacu kepada konsep dan definisi operasional, yang berisi pertanyaan | Hasil penelitian analisa uji statistik dengan uji chi-square antara variabel kejadian anemia dengan status gizi diperoleh $p=0,003$ ($p<0,05$) yang artinya dapat disimpulkan ada hubungan secara signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja puteri kelas XI di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|
| | http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/9069/5761 | <p>menggunakan sampel minimal sejumlah 120 siswi dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Pengambilan sampel menggunakan</p> | | | <p>tentang variabel penelitian</p> | |
|--|---|---|--|--|------------------------------------|--|



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kan tekhnik <i>total sampling</i> | | | | |
| 2 | Analisis Hubungan Karakteristik Keluarga Dan Status Gizi Terhadap Kejadian Anemia Pada Remaja/ Indah Dwi Sari/ 2019 | Populasi : Remaja putrid di SMU PAB 5 Klumpang Tahun 2019 Sampel : sebanyak 92 orang | Penelitian menggunakan survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> . | Independen : Karakteristik keluarga dan status gizi Dependen : kejadian anemia | Teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dengan uji analisis univariat, bivariat dan multivariat. | Hasil penelitian menggunakan uji statistik pearson chi-Square untuk Pendidikan ibu dengan anemia remaja putri dengan p – value 0,563, Penghasilan keluarga dengan anemia remaja putri dengan p-value 0,532, IMT dengan anemia remaja putri dengan p-value 0,010, Lila dengan anemia remaja putri dengan p-value 0,001. Analisis ini dilakukan sampai uji multivariate menggunakan uji regresi logistic, Li ngkar lengan atas dengan p-value 0,001 |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | https://akbid-dharmahusada-kediri.e-journal.id/JKDH/article/view/113/92 | menggunakan metode <i>stratified random sampling</i> | | | | |
| 3 | Judul: Hubungan Pola Menstruasi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di Sma Negeri 2 | Populasi : semua siswi kelas xi dan xii yang berjumlah 146 orang. | Jenis penelitian ini kuantitatif analitik dengan <i>desain cross secsional</i> . | Independen : Pola menstruasi, status gizi | Data dikumpulkan melalui kuesioner dan pemeriksaan kadar Hb kemudian diolah dengan menggunakan analisa univa | Hasil penelitian didapatkan responden berumur 17 tahun sebanyak 48,5%, pola menstruasi normal sebanyak 63,6%, status gizi yang tidak normal sebanyak 50,5%, tidak anemia sebanyak 57,6% serta ada hubungan pola menstruasi dan status |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | <p>Tembilahan/ Mia Rita Sari/ 2020</p> <p>http://jurnal.mercu-baktijaya.ac.id/index.php/mercusuar/article/view/81/36</p> | <p>Sampel : berjumlah 99 orang dengan menggunakan metode <i>simple random sampling</i>.</p> | <p>Dependen : kejadian anemia</p> | <p>riat dan bivariat dengan uji chi square</p> | <p>gizi dengan kejadian anemia dengan nilai p value 0,000. Diharapkan sekolah tetap menjalin bekerja sama dengan tenaga kesehatan UPT Puskesmas Gajah Mada dalam memberikan KIE kepada seluruh siswi.</p> | |
| 4 | <p>Pola makan pada remaja berhubungan dengan kejadian anemia pada siswi</p> | <p>Populasi: Seluruh siswi kelas VII MTs</p> | <p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif Dengan</p> | <p>Independen : Karakteristik responden, dan pola makan</p> | <p>Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kuesioner food recall dan</p> | <p>Hasil penelitian didapatkan 8 responden pola makan baik, 58 responden memiliki pola makan kurang baik dan 41 responden tidak mengalami anemia, 25 responden mengalami anemia. Hasil uji korelasi Chi</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|
| <p>kelas VII/ Sumi dwi antono, arika indah setyarini, mashlachatul mar'ah/ 2020</p> <p>http://journal.stike skendal.ac.id/index php/PSKM/articl e/view/721/438</p> | <p>Sunan kalijaga Kranding Mojo Kediri Sejumlah 220 siswi.</p> <p>Sampel : Sebanyak 66 responden dengan mengguna kan</p> | <p>analisis korelasi,jenis penelitian yang dipakai adalah <i>cross sectional</i>.</p> | <p>Dependen : Kejadian anemia</p>  | <p>pemeriksaan hemoglobin</p> | <p>Squaredi dapatkan p value 0,02 (< 0,05). Berdasarkan penelitian disimpulkan terdapat hubungan pola makan pada remaja dengan kejadian anemia pada remaja putri</p> |
|---|--|---|---|-----------------------------------|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | | <i>stratified random sampling</i> | | | | |
| 5 | Asupan vitamin C tidak berhubungan dengan kadar hemoglobin pada remaja putri di SMA Negeri 5 kota malang/ Intan yusuf habibie, Fransiska Oktavia, Agustiana Dwi Indiah Ventiyarningsih/ | Populasi : Remaja putri di SMA Negeri 5 kota malang Sampel : Sebanyak 58 | Jenis penelitian ini adalah penelitian observasi analitik,dengan menggunakan desain <i>cross-sectional</i> | Independen : Karakteristik umum responden dan asupan vitamin C Dependen: Kadar | Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu form data umum responden, dan form SQ-FFQ vitamin C. | Berdasarkan uji statistik, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin C terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri di SMA Negeri 5 di Kota Malang dengan p-value sebesar 0,383 ($p > 0,05$), dengan rata-rata asupan vitamin C $140 \pm 85,19$ mg, dan rata-rata kadar Hb remaja putri $12,7 \pm 1,33$ g/dL. Kesimpulan dari penelitian ini tidak terdapat hubungan antara vitamin C dengan kadar Hb pada remaja putri di |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| <p>Dengan Anemia Remaja Putri Di Sma Muhammadiyah 7 Sawangan, Depok Tahun 2018</p> <p>http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/201</p> | <p>adiyah 7 sawangan depok tahun 2018.</p> <p>Sampel : Terdapat 42 responden dengan menggunakan teknik sampel <i>probability</i></p> | | <p>besi(Fe) , inhibitor zat besi (Fe)</p> <p>Variabel dependen: Kejadian anemia</p> | <p>Quantitative- Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ), pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan dan pemeriksaan Hb dengan menggunakan alat Easytouch GcHb.</p> | <p>menderita mengalami anemia, 32 responden (76.2%) IMT/U tidak normal, 39 responden (92.9%) kurang mengkonsumsi asupan zat besi, dan 30 responden (71.4%) sering mengkonsumsi inhibitor zat besi yang dikarenakan sering mengkonsumsi teh lebih dari 1 kali dalam seminggu</p> |
|---|--|--|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|
| | | <i>sampling</i> | | | | |
| 7 | Hubungan kurang energi kronik (KEK) dan wasting dengan kejadian anemia pada remaja putri dikabupaten majene / Mutmainnah, Sitti Patimah dan septiyanti / 2021 http://jurnal.fkm.u | Populasi : Remaja putri dikabupaten majene Sampel : sebanyak 126 responden dengan metode <i>total</i> | Metode yang digunakan yaitu penelitian rancangan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan desain pendekatan <i>cross sectional study</i> . | Independen: Umur, Status gizi Dependen : Kejadian Anemia | Dengan menggunakan uji <i>correlation spearman</i> . | Dari hasil uji statistik ditemukan nilai ($p = 0.025 < \alpha = 0.05$) pada uji hubungan kurang energi kronik (KEK) dengan kejadian anemia dan ditemukan nilai ($p = 0.020 < \alpha = 0.05$) pada uji hubungan antara wasting dengan kejadian anemia |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | mi.ac.id/index.php/woph/article/view/184/131 | <i>sampling</i> | | | | |
| 8 | The Influence Of Dietary Intake On The Incidence Of Anemia Female Teenagers In Smp Rural Area Pancur Batu Deli Serdang District/ Yohana Tetty Gultom, Jumirah, Evawany Aritonang/ 2020 | Populasi : seluruh siswi SMP Negeri Pancur Batu Kecamatan Deli Serdang | Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian <i>cross sectional</i> | Independen : asupan protein, asupan zat besi, asupan vitamin c, asupan folat, pola diet Dependen : kejadian anemia | Data diperoleh dari pemeriksaan kadar hemoglobin, menggunakan digital acute check, kuesioner, formulir food recall 24 jam, dan formulir frekuensi makan. Analisis data menggunakan Chi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi anemia pada remaja putri di SMP Perdesaan Pancur Batu Deli Serdang adalah 58%, persentase remaja dengan asupan protein yang cukup (56%), asupan zat besi (22%), folat (5%) asam, vitamin C (15%). |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|---|
| | | <p>Sampel : sebanyak 100 orang yang dipilih secara <i>simple random sampling</i></p> <p>http://publichealthmy.org/ejournal/ojs2/index.php/ijphcs/article/view/1205/724</p> | | | Square. | |
| 9 | <p>Correlation Between The Knowledge Level About Eating Patterns And The</p> | <p>Populasi : seluruh remaja di SMA N 3 Sragen</p> | <p>Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional</p> | <p>Independen : pola makan dan tingkat pengetahuan Remaja</p> | <p>Pengumpulan data menggunakan pemeriksaan kadar hemoglobin dan kuesioner tertutup.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja tentang pola makan sebagian besar responden dengan kategori kurang yaitu sebanyak 33 responden (55%). Hasil penelitian</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| <p>Incidence Of Anemia In Adolescents During Covid-19 Pandemic / Anik Sulistiyanti, Fany Dwi Yulianti, Yulia Nur Khayati/ 2021</p> <p>http://ojs.udb.ac.id/index.php/icohete/article/view/1072/915</p> | <p>Sampel : Sebanyak 60 remaja dengan teknik <i>propotional random sampling</i>.</p> | <p>analitik dengan desain penelitian <i>cross sectional</i></p> | <p>Dependen : kejadian anemia</p> | <p>Analisis data dengan analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji statistik chi square</p> | <p>menunjukkan bahwa kejadian anemia sebagian besar responden dengan kategori anemia sebanyak 36 responden (60%). Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh nilai = 17,911 > 5,59 dan p value = 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya secara statistik dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja tentang pola makan dengan anemia pada siswa SMAN 3 Sragen. diperoleh hasil sebesar 0,479 sehingga hubungan yang erat antara tingkat pengetahuan remaja tentang pola makan dengan kejadian anemia adalah sedang. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang pola makan dengan kejadian</p> |
|---|--|---|---------------------------------------|---|--|

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | | anemia pada remaja pada masa pandemi Covid-19 |
| 10 | Analysis of Heme and Non-Heme Iron Intake and Iron Dietary Sources in Adolescent Menstruating Females in a National Polish Sample/ Dominika Skolmowska and Dominika Głabska/ 2019 | Populasi : Remaja (berusia 15-20) yang direkrut dari seluruh wilayah Polandia | Penelitian dilakukan pada representatif | Independen : Asupan zat besi, zat besi heme, zat besi non-heme, dan zat besi dari kelompok produk makanan dan pola menstruasi serta pola diet | Asupan zat besi dinilai menggunakan IRONIC-FFQ (IRON Intaketelah divalidasi sebelumnya Calculation-Food Frequency Questionnaire) | Dalam sampel nasional perwakilan remaja Polandia, perempuan dicirikan oleh asupan semua bentuk zat besi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Responden wanita non-vegetarian memiliki asupan zat besi heme yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden wanita vegetarian. Asupan zat besi non-heme lebih tinggi pada responden wanita minor, responden wanita kelebihan berat badan, responden wanita vegetarian, dan siswa dari sekolah menengah komprehensif. Remaja perempuan dengan riwayat anemia ditandai dengan asupan zat besi yang sama seperti |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| | <p>https://www.mdpi.com/2072-6643/11/5/1049</p> | <p>Sampel sekolah (sampel kuota acak), dengan 1385 remaja perempuan dimasukkan dalam sampel</p> | | <p>Dependen : kejadian anemia</p> | | <p>yang lain. Selain itu, ada kebutuhan untuk pendidikan gizi dan kampanye pendidikan di kalangan remaja anemia dan non-anemia, karena tidak ada kampanye pendidikan yang berkaitan dengan kekurangan zat besi dan sumber zat besi tertentu telah dilakukan di Polandia. Kampanye ini harus ditujukan untuk memperluas pengetahuan dengan mengidentifikasi dan mempromosikan berbagai sumber zat besi yang diserap dengan baik. Strategi seperti itu akan bermanfaat bagi kesehatan individu selama masa remaja dan untuk masa dewasa mereka di masa depan.</p> |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---|



F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dengan siswi SMA pedesaan kabupaten bone Sulawesi selatan tahun 2022

2. Tujuan khusus

- a) Mengetahui hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan.
- b) Mengetahui hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan.
- c) Mengetahui hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan.
- d) Mengetahui hubungan antara asupan makanan dengan kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan.
- e) Mengetahui perbedaan antara kejadian anemia pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan
- f) Mengetahui perbedaan antara status gizi pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan
- g) Mengetahui perbedaan antara pola menstruasi pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan
- h) Mengetahui perbedaan antara pola konsumsi inhibitor zat besi pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan
- i) Mengetahui perbedaan antara asupan makanan pada siswi SMA perkotaan dan pedesaan

G. Manfaat penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat pada beberapa aspek diantaranya:

a. Responden

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada para penderita anemia untuk memperhatikan asupan makanan, pola menstruasi serta pola konsumsi inhibitor zat besi.

b. Institusi pendidikan


Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan dalam penanganan anemia agar dapat memperhatikan kembali asupan makanan serta pola asupan inhibitor zat besi dan menjadi sumber informasi bagi semua mahasiswa kesehatan utamanya peminatan gizi kesehatan masyarakat.

c. Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti dan sebagai sarana untuk menambah keilmuan peneliti.

d. Penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai data dasar bagi penelitian selanjutnya dalam ruang lingkup yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang remaja putri

1. Definisi remaja

Periode kehidupan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan yang dikenal sebagai masa remaja berlangsung dari usia 10 hingga 19 tahun. Periode khusus perkembangan manusia ini sangat penting untuk meletakkan dasar bagi kesehatan jangka panjang. Remaja tumbuh dengan cepat dalam hal perkembangan fisik, kognitif, dan emosional nya. Ini berdampak pada emosi, pikiran, keputusan, dan interaksi mereka dengan orang lain.. (WHO, 2022)

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى .

Terjemahan : *Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambah pula untuk mereka petunjuk.*(Q.S Al-Kahf:13)

Pubertas, yang biasanya terjadi antara usia 12 dan 14 tahun, menandai awal dari fase perkembangan remaja. Sekitar usia 18 hingga 20 tahun, atau remaja akhir, orang mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab, membuat keputusan, dan memiliki kesempatan untuk menjadi dewasa (Djiwandono, 2006).

Meskipun dianggap sebagai tahap kehidupan yang sehat, ada kematian, penyakit, dan cedera yang signifikan pada masa remaja. Banyak dari ini dapat dicegah atau diobati. Selama fase ini, remaja membentuk pola perilaku – misalnya, terkait dengan diet, aktivitas fisik, penggunaan narkoba, dan aktivitas seksual – yang dapat melindungi kesehatan mereka dan kesehatan orang lain di sekitar mereka, atau membahayakan kesehatan mereka sekarang dan di masa depan (WHO, 2022)

Remaja memerlukan pengetahuan, termasuk pendidikan seksualitas komprehensif sesuai usia, kesempatan untuk membangun keterampilan hidup, perawatan. Selain itu, mereka membutuhkan kesempatan untuk secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan yang akan meningkatkan dan menjaga kesehatan mereka. Memperluas kemungkinan tersebut sangat penting untuk mengatasi kebutuhan unik dan hak-hak hukum kaum muda (WHO, 2022)

Remaja sekarang membentuk 1,2 miliar lebih banyak orang di seluruh dunia, atau seperenam dari seluruh populasi. Karena lebih dari 90% anak-anak antara usia 10 dan 19 tinggal di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, angka ini diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2050. Setelah itu, dibagi menjadi 3 fase, yang terdiri dari (WHO, 2022)

Masa remaja merupakan masa transisi dimana suatu proses untuk mencapai kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas yang mengalami pertumbuhan fisik, mental, emosional dan psikologis yang pesat. Perubahan pertumbuhan fisik pada remaja berkembang sangat cepat karena sangat mempengaruhi organ reproduksi remaja tersebut. Kesehatan reproduksi pada remaja sangat membutuhkan perawatan khusus, pengetahuan dan perawatan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup remaja tersebut. Sistem, fungsi, dan organ reproduksi remaja merupakan bagian dari kondisi kesehatan reproduksi remaja (Diananda, 2018).

2. Karakteristik Remaja

Masa remaja (12 hingga 21 tahun) merupakan tahap antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Gambaran umum masa remaja adalah “pencarian identitas” (ego identity). Ada berbagai ciri penting masa remaja, antara lain: (Desmita, 2010) :

- a. Mencapai koneksi yang matang dengan teman sebaya
- b. Mampu memahami dan menerima peran sosial yang diharapkan dari pria atau wanita dewasa
- c. Menerima kondisi fisik seseorang dan mampu memanfaatkannya dengan sukses
- d. Menjadi mandiri secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya
- e. Tentukan dan persiapkan untuk pekerjaan masa depan berdasarkan minat dan keterampilan Anda.
- f. Mendapatkan kemampuan intelektual dan konsep yang diperlukan untuk menjadi warga negara;
- g. memperoleh pandangan positif tentang pernikahan, keluarga, dan memiliki anak;
- h. mencapai tanggung jawab sosial;
- i. memperoleh seperangkat nilai dan sistematika;
- j. memperoleh wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas memperoleh rasa religiusitas..

3. Tahapan Remaja

Menurut (Sarwono, 2011) ada tiga tahap perkembangan remaja, yaitu:

a. Masa Remaja Awal (Early Adolescence) 11-13 tahun

Pada titik ini dalam perkembangannya, seorang remaja masih heran dengan perubahan tubuhnya. Remaja sering berubah pikiran, tertarik pada lawan jenis dengan cepat, dan mudah dirangsang secara erotis. Masa remaja awal pada titik ini merupakan tantangan bagi orang dewasa untuk memahaminya. Remaja menginginkan kebebasan dan mulai mengembangkan pemikiran abstrak.

b. Remaja Pertengahan 14-16 Tahun

Remaja di usia ini pasti membutuhkan teman. Remaja senang memiliki banyak teman yang menyukai mereka. Dengan menyukai individu yang memiliki karakteristiknya, ia menunjukkan kecenderungan "narsistik" untuk memuja dirinya sendiri. Remaja terkadang merasa bingung karena tidak yakin pilihan mana yang harus dipilih. Remaja mulai bermimpi berhubungan seks dengan lawan jenis pada tahap remaja pertengahan ini, yang mendorong mereka untuk melakukan hubungan seksual yang diinginkan.

a. Masa Remaja Akhir (Late Adolescence) 17-20 Tahun.

Tahap ini merupakan masa konsolidasi menuju masa dewasa yang ditandai dengan tercapainya 5 hal, yaitu:

- 1) Minat yang tumbuh pada fungsi intelek
- 2) Egonya mencari peluang untuk bersatu dengan orang-orang dan dalam pengalaman baru.
- 3) Terbentuklah identitas seksual yang tidak akan berubah lagi.
- 4) Egosentrisme (terlalu fokus pada diri sendiri).
- 5) Tumbuh "tembok" yang memisahkan antara diri pribadi (private self) dan publik.

4. Gizi Remaja

Pola makan seorang remaja harus diperhatikan karena jika tidak dilakukan dengan benar akan berdampak pada usia selanjutnya. Selain itu, penting untuk

mempertimbangkan kebutuhan makanan remaja karena alasan berikut (Supariasa, I., Dewa Nyoman, 2017) :

- a. Nutrisi menjadi lebih penting untuk mendorong pertumbuhan fisik dan psikologis.
- b. Perubahan perilaku makan dan hidup berdampak pada kebutuhan dan asupan gizi remaja.
- c. Khusus untuk kelompok remaja yang melakukan aktivitas fisik tingkat tinggi, sedang hamil, mengalami gangguan makan, menjalani diet ketat, dan menggunakan obat-obatan dan alkohol, kebutuhan nutrisi yang unik harus diperhatikan.. Angka Kecukupan Gizi (AKG) remaja usia 10 sampai 18 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Angka Kecukupan Gizi Pada Remaja

| Kelompok Umur (Tahun) | Wanita | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| | 10-12 | 13-15 | 16-18 |
| Energy (kcal) | 1900 | 2050 | 2100 |
| Protein (gr) | 55 | 65 | 65 |
| Lemak (gr) | 65 | 70 | 70 |
| Karbohidrat (gr) | 280 | 300 | 300 |
| Air (mL) | 1800 | 2000 | 2100 |
| Serat (gr) | 27 | 29 | 29 |
| Vitamin A (mcg) | 600 | 600 | 600 |
| Vitamin C (mcg) | 50 | 65 | 75 |
| Vitamin D (mcg) | 15 | 15 | 15 |
| Asam Folat (mcg) | 400 | 400 | 400 |
| Kalsium (mg) | 1200 | 1200 | 1200 |

| | | | |
|---------------|------|------|------|
| Zat Besi (mg) | 8 | 15 | 15 |
| Zink (mg) | 8 | 9 | 9 |
| Fosfor (mg) | 1250 | 1250 | 1250 |

Sumber : AKG (Angka Kecukupan Gizi) 2019

Konsumsi pangan individu dapat dipertimbangkan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Proporsi kebutuhan zat gizi makro harian—karbohidrat, protein, lemak, dan energi—dan zat gizi mikro seperti vitamin C, Fe, dan Zink adalah 80% yang dapat dikategorikan asupan tidak cukup jika <80% dan asupan cukup >80% dari angka kecukupan gizi AKG tahun 2019.

B. Tinjauan Tentang Anemia

1. Definisi Hemoglobin

Karena hemoglobin terbuat dari zat besi, yang kekurangan pada individu yang anemia, jumlah darah pembawa oksigen yang dapat dibawa untuk diedarkan ke seluruh tubuh akan berkurang (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Zat besi diperlukan agar produksi hemoglobin tubuh berfungsi dengan benar. Tubuh membutuhkan zat besi, mineral mikroskopis, untuk membuat hemoglobin. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Direkomendasikan (AKG), remaja putri antara usia 10 dan 12 serta 13 dan 18 tahun masing-masing membutuhkan 8 mg dan 18 mg zat besi setiap hari. . Setiap hari, 15 mg zat besi dibutuhkan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019)

Tabel 2.2

Kadar normal Hb

| Berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin | Hemoglobin (g/l) |
|---|------------------|
| Remaja Putri | |
| 12-14 tahun | 12 |
| >14 tahun | 12 |

Sumber : Almatier,2009

2. Definisi Anemia

Menurut definisi lain, anemia adalah suatu keadaan ketika konsentrasi eritrosit (sel darah merah) atau hemoglobin (Hb) dalam darah di bawah normal. Secara alami, ketika Hb, atau darah merah, turun, begitu juga kapasitas sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena itu, kadar oksigen tubuh rendah, yang membuatnya lemah dan kelelahan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Tubuh harus memiliki cukup protein dan zat besi yang tersedia untuk pembentukan hemoglobin. Besi diangkut oleh protein ke sumsum tulang di mana ia digunakan untuk membuat molekul hemoglobin baru (Gallagher, 2008)

Remaja putri juga sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, salah satunya anemia pada remaja putri. Seseorang dengan anemia memiliki jumlah hemoglobin dan eritrosit yang rendah, yang menempatkan mereka pada bahaya melemahnya sistem kekebalan mereka dan penurunan kapasitas mereka untuk bekerja sebagai akibat dari gangguan pertumbuhan fisik dan kecerdasan khususnya pada remaja putri (Anggoro, 2020).

3. Klasifikasi Anemia

Menurut (Wiknjosastro, 2009), jenis-jenis anemia adalah sebagai berikut:

- a. Kekurangan mineral besi mengakibatkan anemia defisiensi besi, yaitu anemia. Defisit ini dapat disebabkan oleh diet rendah nutrisi yang mengandung zat besi, oleh penyerapan yang buruk, atau oleh tubuh yang mengeluarkan terlalu banyak zat besi, seperti pada perdarahan.
- b. Anemia megaloblastik adalah anemia Wanita yang mengonsumsi sayuran hijau segar dalam jumlah yang cukup atau diet tinggi protein hewani sering kali mengalami defisiensi asam folat dan vitamin B12.
- c. Jenis anemia tertentu yang dikenal sebagai anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah hilang lebih cepat daripada yang dihasilkan.
- d. Kegagalan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah mengakibatkan anemia jenis hipoplastik dan anemia aplastic untuk memproduksi sel darah baru. Obat-obatan dan zat lain, infeksi, radiasi, leukemia, dan penyakit imunologis menyebabkan sepertiga kasus anemia.

4. Diagnosis anemia

Remaja putri mengalami anemia bila kadar hemoglobin darahnya kurang dari 12 g/dl. (who, 2011)

Tabel 2.3
Klasifikasi Anemia menurut kelompok umur

| Populasi | Non Anemia (g/dl) | Anemia (g/dl) | | |
|--|-------------------|---------------|------------|-------|
| | | Ringan | Sedang | Berat |
| Anak 6-59 Bulan | 11 | 10.0 - 10.9 | 7.0 - 9.9 | < 7.0 |
| Anak 5-11 Tahun | 11.5 | 11.0 - 11.4 | 8.0 - 10.9 | < 8.0 |
| Anak 12-14 Tahun | 12 | 11.0 - 11.9 | 8.0 - 10.9 | < 8.0 |
| Perempuan tidak hamil (≥ 15 tahun) | 12 | 11.0 - 11.9 | 8.0 - 10.9 | < 8.0 |
| Ibu hamil | 11 | 10.0 - 10.9 | 7.0 - 9.9 | < 7.0 |
| Laki laki > 15 Tahun | 13 | 11.0 - 12.9 | 8.0 - 10.9 | < 8.0 |

Sumber : WHO, 2011

5. Penyebab Anemia

Masyarakat Indonesia masih banyak mengonsumsi sayuran yang merupakan sumber utama zat besi, yang menjadi salah satu penyebab rendahnya konsumsi zat besi (zat besi non-heme). Sebagai akibat dari jarang mereka mengonsumsi daging dan protein hewani lainnya (seperti ayam dan ikan), yang dikenal sebagai sumber zat besi yang signifikan (besi heme), masyarakat di daerah pedesaan cenderung memiliki penyerapan dan pemanfaatan zat besi yang lebih buruk (Sediaoetama, 2003).

Ada 3 penyebab anemia, yaitu: (Kemenkes RI, 2018).

1. Defisiensi zat gizi
2. Perdarahan (Loss of blood volume)
3. Hemolitik

6. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Anemia

Anemia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: (Martini, 2017):

- a. Tingkat pendidikan orang tua
- b. pendapatan keluarga
- c. sikap remaja putri tentang anemia
- d. tingkat asupan gizi
- e. pola menstruasi
- f. penyakit menular
- g. dan pengetahuan tentang anemia merupakan faktor-faktor tersebut.

7. Gejala Anemia

5 L (lesu, lelah, lemah, mengantuk, lalai), sakit kepala dan pusing (“kepala berputar”), mata pusing, mudah tertidur, dan sulit berkonsentrasi merupakan tanda-tanda anemia yang sering muncul. Secara klinis, pasien anemia menunjukkan "pucat" pada kulit, bibir, kelopak mata, kulit, kuku, dan telapak tangan mereka (Kemenkes RI, 2018).

8. Dampak anemia pada remaja putri

Anak perempuan remaja lebih mungkin terkena anemia dibandingkan anak laki-laki. Sadarilah bahwa remaja dengan anemia biasanya memiliki gangguan kekebalan, fokus, prestasi belajar, kebugaran, dan produktivitas (Kemenkes RI, 2018).

Menurut (Kemenkes RI, 2018) Wanita muda yang menderita anemia akan sangat terpengaruh karena mereka cenderung hamil dan melahirkan anak, meningkatkan risiko kematian ibu, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah. Anemia dan

penurunan berat badan (BBLR) dapat memiliki sejumlah dampak negatif pada rematik dan WUS, termasuk: (Kemenkes RI, 2018).

- Menurunkan daya tahan tubuh agar lebih mudah bagi penderita anemia menginfeksi diri sendiri
- Penurunan kelincahan mental dan kebugaran karena sel-sel otak dan otot tidak mendapatkan cukup oksigen.
- Penurunan kinerja di tempat kerja dan penurunan hasil belajar.

9. Pencegahan dan pengendalian anemia

a. *Tingkatkan asupan makanan kaya zat besi*

Diet yang bervariasi dan bergizi seimbang yang menekankan makanan yang berasal dari hewan yang tinggi zat besi (besi heme) dalam proporsi yang direkomendasikan RDA, dapat membantu Anda meningkatkan konsumsi makanan kaya zat besi. Meskipun penyerapannya kurang dari hewan, itu juga diperlukan untuk meningkatkan sumber makanan nabati yang tinggi zat besi (zat besi non-heme). Hati, ikan, babi, dan ayam adalah sumber zat besi dari hewan, sedangkan sayuran hijau tua dan almond adalah sumber dari tumbuh-tumbuhan. Untuk meningkatkan penyerapan zat besi dari sumber nabati, maka perlu mengonsumsi buah-buahan yang tinggi vitamin C, seperti jeruk dan jambu biji. Zat lain yang dapat menghambat penyerapan zat besi antara lain tanin, fosfor, serat, kalsium, dan fitat.

b. *Fortifikasi bahan makanan dengan zat besi*

Nilai gizi makanan meningkat dengan penambahan satu atau lebih zat gizi. Sangat penting untuk membaca label kemasan untuk mengetahui apakah suatu komponen telah diperkaya dengan besi. Perusahaan makanan sering memasukkan nutrisi. Tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, bahkan makanan ringan semuanya difortifikasi di Indonesia.

Makanan rumah tangga juga dapat dilengkapi dengan zat besi dan vitamin serta mineral lainnya menggunakan bubuk nutrisi, kadang-kadang disebut sebagai bubuk mikronutrien ganda.

c. *Suplementasi zat besi*

Diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen zat besi dalam kasus dimana zat besi makanan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kadar hemoglobin dimaksudkan untuk meningkat dengan cepat setelah mengkonsumsi suplemen zat besi secara teratur untuk jangka waktu tertentu, dan proses ini harus dipertahankan untuk membangun cadangan zat besi tubuh.

C. Tinjauan tentang status gizi

1. Definisi status gizi

Keseimbangan antara asupan gizi dari makanan dan kebutuhan gizi tubuh mengakibatkan keadaan yang dikenal dengan status gizi (nutritional status) (Kemenkes, 2017).

Indikator status gizi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat gizi seseorang. Jika seseorang lulus evaluasi gizi dan memenuhi persyaratan tertentu, mereka dianggap memiliki diet seimbang. Di sisi lain, profesional medis akan merekomendasikan gaya hidup sehat untuk meningkatkan nutrisi Anda ketika pemeriksaan status gizi seseorang menunjukkan bahwa mereka kekurangan gizi atau kelebihan gizi. Diet seimbang juga akan menurunkan kemungkinan mengembangkan beberapa penyakit (Kemenkes, 2017).

2. Tujuan penentuan status gizi

Pengkajian status gizi bertujuan untuk:

- Jelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan saat ini dan
- berikan ringkasan metode penilaian status gizi.
- Jelaskan pengumpulan, pengolahan, dan penerapan data untuk penilaian status gizi secara singkat (Kemenkes, 2017)

3. Cara menentukan status gizi

Dua ukuran yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung dapat digunakan untuk menentukan status gizi. (Kemenkes, 2017)

- Alat yang mudah didapat
- pengukuran yang mudah dilakukan
- pengukuran yang murah, dan
- kesimpulan tentang hasil pengukuran yang mudah ditarik
- Dapat didukung oleh ilmu pengetahuan
- Dapat menentukan kebiasaan diet sebelumnya

4. Definisi Antropometri

Antropometri berasal dari kata *anthropos* (tubuh) dan *metros* (pengukuran). jadi antropometri adalah ukuran tubuh. (Who, 2022)

1) Penilaian status gizi menggunakan antropometri

Menurut WHO, penggunaan antropometri untuk menilai status gizi merupakan pengukuran yang paling sering digunakan karena antropometri merupakan indikator status gizi dengan mengukur beberapa pengukuran seperti usia, berat badan, tinggi badan, lingkaran lengan atas, lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran pinggul, dan ketebalan lemak subkutan. (Who, 2022)

Dalam penelitian ini ada 3 ukuran yang digunakan yaitu :

- Indeks Massa Tubuh (BMI)

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan indeks yang direkomendasikan secara internasional oleh WHO sebagai indikator penentuan *kelebihan berat badan* dan *kekurangan berat badan* pada anak dan remaja. **Status gizi remaja dapat diketahui dengan Z score IMT/U di SD** karena usia < 18 tahun termasuk dalam kategori anak-anak. Perhitungan ini dianggap tepat karena disesuaikan dengan berat badan, tinggi badan, usia dan jenis kelamin sehingga lebih tepat menggambarkan kondisi remaja. (Organisasi Kesehatan Dunia, 2013) . Dalam (Satriani, 2018)

Menurut Sugondo (2009) hasil penghitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi menurut klasifikasi Kriteria Asia Pasifik menjadi kurus, normal dan kelebihan berat badan, dengan kisaran angka sebagai berikut

Tabel 2.4

Klasifikasi IMT menurut kriteria asia pasifik

| Klasifikasi | Index Massa Tubuh |
|--------------------|-------------------|
| <i>Underweight</i> | < 18,5 |
| Normal | 18.5-22,9 |
| <i>Overweight</i> | <u>></u> 23 |
| Beresiko | 23-24,9 |
| Obes I | 25-29,9 |
| Obes II | <u>></u> 30 |

- **Lingkar Lengan Atas (LILA)**

Definisi Kurang Energi Kronik (KEK) dengan LiLA adalah keadaan dimana remaja putri mengalami kekurangan gizi (Kalori) yang berlangsung lama dan menahun disebabkan karena ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan perubahan tubuh baik fisik ataupun mental tidak sempurna seperti yang seharusnya (Kemenkes, 2019)

✓ KEK : <23,5 cm

✓ Tidak ada KEK : 23,5 cm

D. Tinjauan Tentang Inhibitor Zat Besi

Bahan makanan yang disebut fe inhibitor dapat menghambat penyerapan zat besi. Konsentrasi tinggi beberapa zat pengkelat besi, seperti tanin, asam oksalat, dan asam lemak, dapat membatasi penyerapan zat besi (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002)

Banyak cairan yang dikonsumsi secara teratur, termasuk kopi, teh, teh hitam, teh hijau, dan biji cola, mengandung kafein. Kafein (1-2,5%), karbohidrat (7%), asam (asam klorogenat, asam caffeic), tanin, bahan pahit, lemak (ca. 10%), dan minyak terbang adalah senyawa yang paling signifikan dalam kopi. Ada sekitar 24 bahan kimia yang berbeda dalam kopi. (aroma). Terlalu banyak minum kopi meningkatkan kadar

homosistein darah, yang meningkatkan risiko penyakit jantung (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002)

Secangkir kopi instan tertentu memiliki sekitar 50 mg kafein di dalamnya. Kopi mengandung alkaloid xanthine (atau purin), termasuk kafein (1-2%). Kopi Turki atau Arab memiliki konsentrasi kafein yang lebih besar, hingga 300 mg per cangkir. Untuk mengatasi rasa lelah dan kantuk, siswa sering menggunakan Proplus, obat yang mengandung kafein, stimulan SSP. Selain itu digunakan sebagai diuretik dan analgesik, zat ini (Heinrich, 2010). Thea Sinensis, tanaman teh yang berasal dari Cina selatan yang saat ini tumbuh di Jawa, Sri Lanka, Rusia Selatan, Brasilia, dan Pulau Christmas, juga mengandung kafein pada daunnya. (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002)

Teh hitam dibuat dengan memfermentasi daun giling, di mana enzim dilepaskan dan secara oksidatif mengubah flavonoid (polifenol) kafein yang diubah menjadi tanin (thearubigin) dan membuat rona hitam. Teh hitam memiliki kandungan kafein rata-rata 3%, serta teofilin dan theobromine, turunan xanthine lainnya, antara 7 dan 15% tanin, polifenol, flavonoid (seperti ketikan), dan 0,5 hingga 1% senyawa lainnya. aroma, yang mencakup geraniol dari minyak penerbangan. Tergantung pada seberapa banyak kopi yang dikonsumsi, satu cangkir kopi (sekitar 100 ml) mengandung 80-100 mg kafein. Kandungan kafein dalam 100 ml masing-masing teh (60 mg) dan cola (20 mg) (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002)

Daun *camellia sinensis* yang tidak difermentasi digunakan untuk membuat teh hijau, yang dimasak dengan uap sebelum dihaluskan. Sintesis thearubigin dapat dicegah karena enzim yang mengubah flavonoid menjadi tidak aktif. Teh hijau memiliki banyak katekin, yang antara lain memiliki efek antikanker dan antiaterosklerotik, dan sangat sedikit kafein. Baik Asia Tenggara dan Jepang ("sencha hijau Jepang") adalah konsumen utama teh hijau. Sebagai ekstrak, teh hijau digunakan dalam pengobatan komplementer dan alternatif untuk pengobatan dan pencegahan aterosklerosis dan segala bentuk kanker (Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. , 2002)

Banyak obat analgesik kombinasi juga mengandung kafein. Harus diingat bahwa ketika efek stimulasi sentral analgesik meningkat, demikian juga risiko ketergantungan. Selain itu, tidak ada bahaya biologis jangka panjang dari konsumsi kafein sehari-hari (Mutschler, 2010) .

Tanin dan senyawa fenolik termasuk katekin, epikatekin, colatins, cholatein, cholanes, serta senyawa amina, seperti dimethylamine, methylamine, ethylamine dan isopentylamine, bersama dengan tiamin dan vitamin B lainnya. Karena adanya komponen tanin, ekstrak cola juga memiliki kualitas astringen dan antidiare selain menjadi stimulan moderat dan diuretik. Ekstrak cola meningkatkan nafsu makan dan merupakan komponen dari beberapa tonik untuk kelelahan dan depresi. Meskipun ada konsekuensi negatif dari kafein dalam jumlah besar, ekstrak cola tidak berbahaya (Heinrich, Michael., Barnes, J., Gibson, S., Williamson, M.E, 2010).

Firna (2008) menyatakan bahwa berdasarkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK. Maksimum harian untuk konsumsi kafein adalah 150 mg, yang harus dikonsumsi dalam tiga kali makan terpisah. Ini berarti jumlah maksimum yang dapat dikonsumsi dalam satu kali makan adalah 50 mg. Tubuh bisa kehilangan hingga 21% vitamin B6-nya ketika mengonsumsi terlalu banyak kafein, yang didefinisikan sebagai lebih dari 400 mg kafein per hari, atau setara dengan 6-7 cangkir kopi. Sekitar 137 mg kafein termasuk dalam satu cangkir kopi. Satu ons cokelat mengandung 20 mg kafein, secangkir teh dan satu kaleng minuman ringan cola masing-masing memiliki sekitar 46 mg kafein. Kafein juga ditemukan di banyak minuman, makanan, obat resep, dan obat bebas.

Tabel 2.5

Kafein

| Sumber | Kafein per unit |
|---------------------------------------|-----------------|
| Kopi murni, kopi buatan | 90-140 mg |
| Kopi instan | 66-100 mg |
| Teh (Daun atau Kantung) | 30-100 mg |
| Kokoa | 5-50 mg |
| Kopi tanpa kafein | 2-4 mg |
| Coklat batangan atau ons coklat masak | 25-35 mg |
| Minuman ringan (8-12 oz) | 25-50 mg |

Sumber : Michael et all, 2005

Banyak orang secara rutin menggunakan kafein, yang termasuk dalam minuman berenergi termasuk teh, kopi, dan "coca cola." Kafein mulai bekerja cukup cepat setelah minum kopi; itu mencapai puncaknya setelah sekitar 30 menit dan secara bertahap hilang setelah 2-3 jam (Mutschler, 2010) . Dampaknya tidak langsung terjadi setelah minum teh, tetapi reaksinya berlangsung lebih lama. Efek utama kafein pada tingkat yang direkomendasikan 50-200 mg adalah pada korteks serebral. Ketika seseorang menjadi lelah, gejala kelelahan mereka hilang dan kekuatan psikis mereka meningkat. Konsumsi kafein tidak akan berdampak pada mereka yang beristirahat daripada kelelahan (Mutschler, 2010) .

Kafein akan mengaktifkan pusat vasomotor dan pusat pernapasan pada dosis yang lebih besar. Namun, karena efeknya pada sistem saraf perifer, tekanan darah tidak meningkat meskipun terjadi pelebaran simultan pada kulit, ginjal, dan vena koroner (Mutschler, 2010) . Kafein membantu mencegah sakit kepala vasomotor dengan menyempitkan arteri darah otak dan menurunkan tekanan intrakranial (tekanan cairan serebrospinal). Selain itu, kafein mempengaruhi metabolisme dengan mempromosikan pemecahan lemak dan glikogen (Mutschler, 2010) . Kafein cepat dan total diserap setelah pemberian oral, serta sebagian demetilasi dan teroksidasi dalam tubuh. Mono Metilxantin, metilxantin, monometilurat, dimetil urat, dan trimetilurat adalah produk ekskresi utama yang ditemukan dalam urin (Mutschler, 2010) . Jumlah kafein yang rendah akan menyebabkan kantuk, agitasi pikiran, takikardia, dan bahkan diare pada pasien yang labil secara vegetatif. Sebaliknya, kafein justru mendorong tidur pada penderita hipertensi dan orang tua karena meningkatkan aliran darah ke otak sebagai akibat dari peningkatan aktivitas jantung. Namun, tidak jelas persis bagaimana ini bekerja. Jumlah kafein yang tinggi membuat subjek sulit untuk tetap diam, menyebabkan kebingungan dan gemetar di kepala, dan kadang-kadang mengubah ritme jantung. Keracunan kafein yang sebenarnya jarang terjadi (Mutschler, 2010) .

Kafein efektif dalam merangsang sistem saraf pusat (SSP) yang berdampak mengurangi rasa lelah, lapar, dan kantuk. Ini juga meningkatkan fokus dan waktu respons sambil meningkatkan suasana hati dan fungsi otak. Dibandingkan dengan amfetamin, ia memiliki efek yang lebih lembut dan lebih cepat pada permukaan otak. Selain itu, kafein

meningkatkan kekuatan kontraksi jantung sekaligus menyebabkan vasodilatasi perifer dan diuresis. Kafein menghambat enzim fosfodiesterase (Tjay, 2002) Bila digunakan secara berlebihan (lebih dari 20 cangkir per hari), zat pengencangnya bisa menjadi kecanduan. Risiko PJK meningkat dengan konsumsi kopi setiap hari lebih dari 4 cangkir, yang juga meningkatkan kadar homosistein dalam darah. Sakit kepala adalah gejala penarikan umum ketika tiba-tiba berhenti. Bahan kimia ini sering digabungkan dengan ergotamine untuk mempercepat penyerapan, serta dengan parasetamol dan asetosal untuk mengintensifkan analgesic (Tjay, 2002) .

Pada mereka dengan penyakit hati yang parah, kafein dapat menumpuk, memperpanjang waktu paruh hingga 96 jam. Waktu paruh pada bayi dan anak usia dini mungkin lebih lama daripada orang dewasa; pada bayi baru lahir, mungkin selama 30 jam. Waktu paruh kafein dapat dipersingkat oleh variabel lain termasuk merokok. Ini memiliki tingkat penyerapan usus yang sangat baik, PP sekitar 17%, dan waktu paruh plasma 3-5 jam. Bahan kimia ini mengalami kerusakan hampir penuh di hati sebelum dieliminasi dalam urin. Jantung berdebar, masalah perut, tangan gemetar, gelisah, kehilangan ingatan, dan sulit tidur adalah beberapa efek samping yang mungkin terjadi setelah mengkonsumsi lebih dari 10 cangkir kopi. harus membatasi konsumsi kopi harian mereka hingga 3-4 cangkir. 100-200 mg setiap 1-3 hari untuk kelelahan, 50 mg sekali untuk analgesik, dan 100 mg ergotamine untuk migrain (Tjay, 2002) . Jika kafein digunakan untuk jangka waktu yang sedikit, itu akan meningkatkan kewaspadaan sekaligus menekan rasa lelah, tetapi, jika digunakan untuk jangka waktu yang lama (secara intensif), dapat mengakibatkan sulit tidur dan kecemasan. Penggunaan kafein dalam dosis tinggi membahayakan jantung dan pembuluh darah (Tjay, 2002) .

E. Tinjauan tentang pola menstruasi

1. Pengertian menstruasi

Pendarahan periodik dan siklus dari rahim yang dikenal sebagai menstruasi disertai dengan pelepasan endokrin (desquamation). Interval antara awal periode menstruasi sebelumnya dan awal periode berikutnya dikenal sebagai panjang siklus menstruasi. Karena awal menstruasi tidak ditentukan dan waktu menstruasi yang tepat dari ostium uteri eksterna tidak diketahui, durasi siklus mengandung

ketidakakuratan 1 hari, hari pendarahan disebut sebagai hari pertama siklus (Wiknjosastro, 2007) . Al-Qur'an menyebutkan menstruasi empat kali dalam dua ayat, satu kali sebagai fi'il mudhari (yahid) dan tiga kali lainnya sebagai isim masdar (al-mahidh). Imam Muslim mengatakan bahwa sejumlah sahabat Nabi menanyakan tentang perilaku orang-orang yang menolak untuk makan bersama dan bergaul dengan istri mereka di rumah saat mereka sedang menstruasi.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahan : *Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.*”(Q.S. Al-Baqarah: 222). (HR Sunan Ibnu Majah)

2. Siklus menstruasi

Siklus menstruasi yang khas berlangsung selama 28 hari, meskipun tidak hanya di antara wanita yang berbeda tetapi bahkan di dalam wanita yang sama, ada perbedaan yang signifikan. Siklus menstruasi seorang gadis berusia 12 tahun berlangsung rata-rata 25,1 hari, tetapi periode seorang wanita berlangsung rata-rata 27,1 hari pada usia 43 dan siklus seorang gadis berlangsung rata-rata 51,9 hari pada usia 55. Periode menstruasi manusia biasanya berlangsung antara 25 dan 32 hari, dan 97% wanita yang berovulasi memiliki siklus yang berlangsung antara 18 dan 42 hari. Seringkali tidak berovulasi jika siklusnya tidak teratur dan kurang dari 42 hari atau lebih dari 42 hari (anovulatory) (Wiknjosastro, 2007) .

Siklus menstruasi rata-rata berlangsung antara tiga dan lima hari, meskipun bisa juga berlangsung hingga delapan hari dalam kasus luar biasa. Lamanya biasanya 4-6 hari, sedangkan 2-8 hari umumnya terlihat normal. Siklus menstruasi setiap wanita biasanya berlangsung dalam jumlah waktu yang sama. Jumlah darah yang

dikeluarkan rata-rata 33,2 16 cc. Darah umumnya lebih mudah berdarah pada wanita lanjut usia. Selain itu, lebih banyak darah menstruasi terlihat pada wanita anemia defisiensi besi (Wiknjastro, 2007).

3. Gangguan menstruasi

Ketegangan pramenstruasi, atau gangguan dysphoric pre menstruasi, ditandai dengan gejala yang dimulai kira-kira seminggu sebelum dan sesudah menstruasi dan disebabkan oleh ketidakseimbangan estrogen dan progesteron menstruasi (Candranita, 2009) .

Wanita antara usia 30 dan 40 memiliki ketegangan pramenstruasi; bagaimana menanganinya tergantung pada keadaan dan memerlukan nasihat profesional. Mastodynia (mastalgia), yang merupakan pembengkakan dan pembesaran payudara sebelum menstruasi, adalah jenis lain dari kondisi pramenstruasi. Peningkatan estrogen berkontribusi terhadap hal ini dengan menyebabkan retensi garam dan air. Penting untuk diingat bahwa ada kemungkinan iritasi payudara atau tumor, oleh karena itu disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Nyeri selama ovulasi (mittelschmerz), yang disebabkan oleh pecahnya folikel Graaf dan dapat diikuti dengan perdarahan, adalah masalah lain yang berhubungan dengan menstruasi sebelum menstruasi. Durasinya antara beberapa jam hingga dua hingga tiga hari (Candranita, 2009) .

Gangguan menstruasi dapat disebabkan oleh sejumlah kondisi, termasuk yang mempengaruhi sumbu hipotalamus-hipofisis-ovarium, kelainan bawaan, gangguan sistem hormonal, penyakit lain, ketidakstabilan emosi, dan kekurangan nutrisi. Kondisi ini dapat terjadi sebelum pubertas, saat menopause, selama kehamilan, saat menyusui, atau bahkan selama kehamilan. hubungan antara kelas sosial ekonomi dan pekerjaan dengan nilai gizi dan memiliki nilai gizi yang lebih besar (Rabe, 2002).

F. Tinjauan Tentang Asupan Makanan

Asupan makanan adalah praktik mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi jangka panjang (Irianto dalam Shafriani, 2004). Dalam Surah Al-A'raf ayat 31 Al-Qur'an, Allah SWT memberikan penjelasan

tentang bagaimana menghindari berlebihan dalam segala bidang kehidupan, termasuk makan dan minum.

﴿يَا أَيُّهَا آدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ □

Terjemahannya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*

Artinya: masing-masing akan melaksanakan shalat atau tawaf mengelilingi Ka'bah atau ibadah lainnya. tidak melebihi batas yang disyaratkan oleh tubuh dan tidak melebihi batas makanan halal.

Mengikuti penjelasan pada ayat sebelumnya bahwa Allah memerintahkan al-qisth dan pelurusan wajah di setiap masjid, ayat ini memerintahkan: Wahai anak Adam, tutuplah auratmu setidaknya dengan pakaianmu yang indah karena memperlihatkannya akan merugikan. Lakukan ini setiap kali Anda masuk dan tinggal di masjid, baik itu mengacu pada struktur tertentu atau pemerintah lokal di planet ini secara umum. Anda juga harus mengonsumsi makanan yang halal, enak, menyehatkan, bergizi, dan memiliki pengaruh positif, dan Anda harus minum apa pun yang Anda sukai. selama tidak memabukkan atau tidak, saya menikmatinya juga membahayakan kesehatan Anda dan menahan diri untuk tidak berlebihan dalam hal apa pun, apakah itu ibadah Anda dengan cara atau derajat, makan dan minum Anda, atau apa pun. Ini karena Allah tidak menyukai manusia, yang berarti Dia tidak akan menunjukkan rahmat atau pahala kepada mereka. berlebihan-luar biasa dalam hal apapun (Tafsir Al-Misbah).

Konsumsi makanan sering diselidiki dalam kaitannya dengan status gizi suatu populasi atau individu. Dengan menggunakan kondisi kesehatan, gizi, dan produktivitas saat ini sebagai titik awal, informasi ini dapat digunakan untuk merancang pendidikan gizi, khususnya untuk perencanaan menu atau intervensi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Salah satu teknik untuk meramalkan kondisi gizi kelompok masyarakat atau orang yang bersangkutan adalah dengan mengetahui asupan makanannya (Pramitha, 2009).

Itu semua tergantung pada upaya kita untuk memperhatikan makanan yang kita makan; hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah 'Abasa ayat 24-28. Nutrisi yang kita konsumsi berperan penting dalam memberikan energi, pembentukan sel dan jaringan, serta mengatur tubuh. Menurut ayat di bawah ini, Allah menyarankan orang untuk memperhatikan pola makan mereka, terutama buah-buahan dan sayuran, untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan cukup vitamin dan asam folat:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا

Terjemahan: *Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, Anggur dan sayur-sayuran.*

Arti dari ayat tersebut : Hendaknya orang-orang yang kafir dan kafir memperhatikan Keesaan Allah dalam hal pemenuhan makanan sebagaimana yang telah diatur oleh Allah. Dan Allah berfirman: Sesungguhnya Kami telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian: Sesungguhnya Aku telah menurunkan pertolongan dari langit. Allah Ta'Ala : Kemudian Kami belah bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah berfirman: Kemudian Kami menumbuhkan biji-bijian di bumi, yaitu biji-bijian tanaman dan mereka tidak dikeluarkan dari bumi dari biji-bijian seperti gandum dan yang semacam itu. Dan Allah berfirman: (Anggur), maka: anggur (dan sayuran) yang dimuliakan yaitu dengan sayuran: kurma dan orang-orang Mekah menanam pohon. Karena Allah telah menyediakan makanan yang cukup agar manusia terhindar dari rasa lapar dan memberikan rasa aman dan damai, maka manusia harus beribadah kepada Allah SWT. Itulah kewajiban manusia sebagai hamba Tuhan. Kegiatan ibadah secara garis besar meliputi kegiatan jasmani, nafsani, dan rohani serta kegiatan jasmani, rohani, dan rohani, yang kesemuanya memerlukan energi yang diperoleh dari makanan dan minuman. (Tafsir Al Misbah)

Dari perspektif ilmiah, buah-buahan adalah makanan sumber mineral dan vitamin. Sama seperti sayur-sayuran, buah-buahan juga mengandung zat gizi makro yang lengkap yaitu: protein, lemak, dan karbohidrat, meskipun zat gizi tersebut relatif tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah mineral dan vitamin yang dikandungnya. nilai gizi total. Selain itu, buah memiliki serat makanan. Serat pangan memiliki keunggulan dalam memberikan isi perut atau volume yang menghasilkan rasa kenyang. Selain itu, serat makanan membuat buang air besar lebih mudah, mengurangi sembelit (Ali Khomsan, 2003).

1. Asupan Karbohidrat

Untuk sel-sel tertentu, seperti yang ada di sistem otak dan sel darah merah, karbohidrat adalah sumber energi utama. Agar otot dapat melakukan aktivitas fisik secara rutin, mereka juga membutuhkan pasokan karbohidrat. Semua sel memiliki akses ke karbohidrat sebagai cadangan dalam bentuk glukosa darah, yang juga disimpan di hati dan otot sebagai glikogen (Barasi, 2017) dalam (Tika Handayani Putri, 2019)

Selamat pagi Menu sarapan harus memiliki semua komponen nutrisi yang dibutuhkan tubuh karena tubuh membutuhkan energi sepanjang hari. Jika jenis makanan yang dikonsumsi memiliki nutrisi. Jika sarapan Anda menyediakan vitamin, protein, zat besi, lemak, dan asam lemak omega-3, itu dianggap cukup untuk pertumbuhan remaja (Fadillah, 2017).

2. Asupan Protein

Semua sel hidup termasuk protein, yang merupakan komponen terbesar kedua dari tubuh manusia setelah air. Sejumlah hormon, protein membentuk matriks intraseluler dan membawa nutrisi dan darah. Protein bertindak sebagai dasar sel manusia dan memiliki tujuan khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh bahan lain. Fungsi ini adalah pembangunan dan pemeliharaan sel dan jaringan tubuh. Protein adalah zat yang mengembangkan sistem kekebalan tubuh, menciptakan jaringan, membentuk struktur tubuh, dan mendorong perkembangan. sumber protein yang sangat baik yang terbuat dari sumber hewani dan nabati (Almatsier, 2003).

Protein berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan janin, plasenta, rahim, payudara, serta peningkatan volume darah ibu pada remaja dan ibu hamil. Karena produk hewani termasuk daging susu, telur, keju, unggas, dan produk ikan memberikan rasio asam amino yang ideal, disarankan agar sebagian besar protein yang berasal dari hewani. Selama bertahun-tahun, susu dan produk susu telah diakui sebagai hal yang berasal dari nutrisi terbaik bagi ibu hamil, terutama dalam hal kalsium dan protein (Cunningham, 2005).

Fungsi protein bagi tubuh antara lain : (Winarno, 2004)

- a. Enzim sebagai berkontribusi pada perubahan kimia dalam sistem biologis.
- b. Peralatan Penyimpanan dan Transportasi
Berbagai molekul kecil dengan berat molekul rendah dan berbagai ion dapat dibawa oleh protein tertentu.
- c. Kontrol gerak tubuh
Daging sebagian besar terdiri dari protein, dan gerakan otot disebabkan oleh interaksi dua molekul protein.
- d. Bantuan Mekanik
Kolagen, protein elips yang siap membentuk serat dan berkontribusi pada kekuatan dan ketahanan sobek kulit dan tulang, terdapat di kedua jaringan ini.
- e. Pertahanan Tubuh
Antibodi, yang merupakan protein unik yang dapat mengidentifikasi dan mengikat benda asing seperti virus, bakteri, dan sel asing lainnya yang masuk ke dalam tubuh, seringkali merupakan garis pertahanan utama tubuh.
- f. Media Perambatan Impuls Saraf
Rhodopsin, protein yang berfungsi sebagai reseptor/penerima warna atau cahaya pada sel mata, merupakan contoh protein yang memiliki fungsi tersebut. Sebagian besar protein dengan fungsi ini adalah reseptor.
- g. Kontrol Pertumbuhan

Pada bakteri, protein ini berfungsi sebagai reseptor yang dapat mengubah cara bagian DNA yang mengontrol fungsi karakteristik dan kualitas bahan

3. Asupan Fe

Tubuh orang dewasa memiliki hingga 3-5 gram zat besi, yang merupakan mikromineral paling umum di tubuh manusia dan hewan. Banyak proses tubuh yang penting termasuk zat besi. elektron dalam sel, sebagai mekanisme untuk mendapatkan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, dan sebagai elemen integral dari berbagai aktivitas enzim dalam jaringan manusia (Anonim, Kekurangan Zat Besi, 2008) diakses 12 Desember 2010

1. Sumber FE (besi)

Ikan dan produk hewani lainnya seperti ayam adalah sumber zat besi yang baik. Telur, almond, sayuran hijau, dan jenis buah lainnya merupakan sumber zat besi tambahan yang sangat baik.

2. Karena Kekurangan Zat Besi

Selain itu, zat besi sangat penting untuk kinerja imunologi yang sehat. Kekurangan zat besi telah membuat tubuh seseorang lebih rentan terhadap penyakit.

- Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan pendarahan dari cacingan, luka, dan penyakit yang mencegah tubuh menyerap zat besi.
- Secara umum, kekurangan zat besi menyebabkan pucat, lemah, kelelahan, kepala terasa ringan, kurang nafsu makan, penurunan kekebalan, memperlambat penyembuhan luka, dan penurunan kapasitas untuk mengontrol suhu tubuh.
- Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia pada remaja dan wanita pasca persalinan.
- Ini dapat menyebabkan anemia, kelelahan, kelemahan, palpitasi, ketidaknyamanan dada, dan palpitasi jantung.

3. Konsekuensi Kelebihan Zat Besi

Karena suplemen zat besi dapat menghasilkan kelebihan zat besi dalam makanan, itu jarang terjadi. Gejala kelebihan zat besi termasuk mual, muntah, diare, dan peningkatan denyut jantung, sakit kepala, disorientasi, dan pingsan.

4. Fungsi Besi

Nutrisi penting bagi tubuh manusia adalah zat besi. Seorang wanita dewasa memiliki 35 sampai 50 mg zat besi per kilogram berat badan, dibandingkan dengan pria dewasa yang sehat 40 sampai 50 mg. Zat besi sangat penting dalam pergerakan oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di paru-paru, zat besi dan oksigen bercampur untuk mengantarkan oksigen ke jaringan yang membutuhkannya. Hemoglobin dibuat dengan bantuan zat besi. (Anonim, anemia gizi, 2008) diakses 13 Desember 2010

Baik zat besi yang diturunkan dari heme maupun yang tidak berasal dari zat besi dapat ditemukan dalam makanan. Hewan menyediakan zat besi heme, yang lebih mudah diserap daripada zat besi non-heme dan tidak bergantung pada keberadaan makanan lain. Zat besi eksogen yang berasal dari tanah, debu, dan air selain didapat dari makanan juga dapat ditemukan dalam makanan (Citra, 2012). Sumber zat besi dalam makanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Jenis Zat Besi

| Jenis zat besi | Sumber |
|----------------|--------|
|----------------|--------|

| | |
|--|---|
| <p>Zat Besi Dari Makanan</p> <p>a. Zat Besi Heme</p> <p>b. Zat Besi Non-Heme</p> | <p>Daging, ikan, unggas, dan hasil olahan darah</p> <p>Sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan kacang-kacangan</p> |
| <p>Zat besi eksogen/cemaran</p> <p>a. Zat besi fortifikasi</p> <p>b. Zat besi cemaran</p> | <p>Berbagai campuran zat besi yang digunakan, bervariasi dalam potensi penyediaannya. Persediaan dari fraksi yang dapat larut ditentukan oleh komposisi makanan. Tanah, debu, air, panci besi dll</p> <p>Persediaan biasanya rendah</p> |

Sumber: Linder, 2010

4. Asupan Vitamin C

1) Fungsi Vitamin C.

- Ini adalah antioksidan yang diperlukan untuk setidaknya 300 proses metabolisme dalam tubuh, seperti pembelahan dan pergantian sel, pemrosesan ulang kelenjar adrenal, dan pemeliharaan kesehatan gusi. Hal ini diperlukan untuk metabolisme asam folat, tyrosine, dan fenilalanin dan membantu untuk menghasilkan interferon, protein sistem kekebalan yang penting, dan hormon anti-stres. Menurut penelitian, menelan vitamin C membantu mengurangi gejala asma. dapat meningkatkan kekebalan, membantu mencegah kanker, bertahan melawan wabah penyakit, dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh bahaya polusi.
- Asupan zat besi ditingkatkan oleh vitamin C. Bahan kimia beracun, seperti logam berat tertentu, dapat dikaitkan dengan vitamin C dan tidak berbahaya, memungkinkan tubuh untuk mengeluarkannya. Sementara pemberian vitamin C dalam jumlah besar dapat

memberikan racun laba-laba hitam. Selain itu, vitamin ini dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi dengan menurunkan kadar "low-density lipoproteins" (LDL), atau kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kadar "high-density lipoproteins" (HDL), atau kolesterol baik. hipertensi; aterosklerosis. Vitamin C juga diperlukan untuk produksi kolagen, mencegah memar dan pembekuan darah yang tidak tepat, menurunkan kejadian katarak, dan mempercepat pemulihan dari luka bakar (Ali Khomsan, 2003).

2) Sumber Vitamin C

Vitamin C harus diterima melalui makanan atau dalam bentuk tambahan seperti suplemen karena sistem kita tidak dapat memproduksinya. Sebagian besar vitamin C yang kita konsumsi diekskresikan dalam urin kita. Buah beri, buah jeruk, dan sayuran hijau semuanya mengandung vitamin C. Asparagus, alpukat, kismis hitam, kembang kol, anggur, kubis, sawi, bawang, jeruk, bebek, kacang hijau, nanas, bayam, stroberi, tomat, dan selada air adalah beberapa di antaranya. sumber yang sangat baik..

3) Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan antara lain: (Jurnal Medika Unhas) Diakses 15 Februari 2011.


- Tubuh yang lemah
- Ketidaknyamanan dan nyeri otot.
- Pembesaran gusi.
- Anemia
- Pendarahan hidung
- Flu babi (pendarahan pada tubuh, gusi memar dan berdarah, gigi mudah dicabut, pendarahan pada otot dan persendian, menyebabkan nyeri) (Anonim, anemia gizi, 2008) diakses 13 Desember 2010.

Menurut penelitian Masthālinā et . All (2015) bahwa mengkonsumsi berbagai makanan adalah salah satu elemen kunci yang membantu tubuh menyerap zat besi lebih efektif. Vitamin C berperan dalam penyerapan zat besi dengan mengubah zat besi menjadi zat besi dan meningkatkan penyerapan di usus, yang merupakan salah satu fungsi

penyerapan zat besi. Oksalat dapat membuat kelompok besi dengan vitamin C, dan kelompok besi ini akan tetap larut pada tingkat pH tinggi, sehingga lebih mudah bagi duodenum untuk menyerapnya. Buah jeruk, pepaya, dan jambu biji adalah sumber makanan umum vitamin C.




G. Kerangka teori



Gambar 2.1 Kerangka teori modifikasi Gibson (2005), Chaparroand Suchdev (2019),Husaini (1989)

H. Kerangka Konsep

Berdasarkan landasan teori diatas kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konsep

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analitik observasional dengan desain *cross sectional*. Penelitian yang dilakukan dengan mengamati hubungan variabel independen dan variabel dependen dalam satu waktu secara bersamaan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah SMA 1 Bone dan SMA 21 Bone kabupaten bone Sulawesi selatan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah setiap subjek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi penelitian ini adalah kelas X dan XI yang berada di sekolah menengah atas di perkotaan dan sekolah menengah atas di pedesaan di kabupaten bone Sulawesi selatan.

Bedasarkan survey awal yang telah dilaksanakan SMA 1 BONE dan SMA 21 BONE merupakan tempat penelitian yang akan saya laksanakan.

- SMAN 1 BONE (Perkotaan) sebanyak 283 siswi yang terdiri dari kelas X sebanyak 148 siswi dan kelas XI sebanyak 135 siswi
- SMAN 21 BONE (Pedesaan) sebanyak 83 siswi yang terdiri dari kelas X sebanyak 45 siswi dan kelas XI sebanyak 38 siswi

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi.

- Agar dapat setara dengan sampel didesa maka sampel dikota pun sebanyak 83 siswi. Teknik pengambilan sampel pada SMA 1 Bone dalam penelitian ini adalah sistem *Non Random Sampling*.

- Pada SMA 21 Bone sebanyak 83 responden. Teknik pengambilan sampel pada SMA 21 Bone dalam penelitian ini adalah *Total Sampling*.

C. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi. Data ini diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Data primer ini diperoleh melalui pemeriksaan hemoglobin, wawancara langsung dan pengisian kuesioner (*food recall 24 jam dan pola menstruasi*).

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber studi literatur review terutama dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor penyebab terjadinya anemia pada remaja putri. Serta data ini diperoleh dari dinas kesehatan bone terkait prevalensi kejadian anemia pada remaja putri serta data terkait jumlah siswi kelas X dan XI di SMA perkotaan dan pedesaan

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data. Instrument penelitian ini dapat berupa kuesioner (daftar pertanyaan) dan formulir-formulir lain yang berkaitan dengan pencatatan data dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2010). Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. *Hematology analyser (EasyTouch)*

Alat yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin responden

b. Kuesioner

Kuesioner dalam penelitian ini memuat daftar pertanyaan mengenai variabel-variabel penelitian meliputi identitas responden, food recall 24 jam, pola menstruasi dan inhibitor zat besi.

c. Timbangan, microtoise dan lila

Pengukuran berat badan responden dengan menggunakan timbangan digital, pengukuran tinggi badan responden menggunakan "microtoise" dan pengukuran lengan responden menggunakan pita lila.

d. Handphone dan alat tulis

Handphone digunakan sebagai alat dokumentasi kegiatan sedangkan alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik pengolahan dan analisis data

1. Pengolahan Data

a. Mengkonversi

Pada proses ini mengkonversi porsi makanan Ukuran rumah tangga (URT) kedalam gram.

b. Penginputan hasil konversi ke aplikasi nutrisurvey

Menginput hasil konversi URT ke gram untuk mengetahui jumlah asupan gizi mikro dan makro.

c. Penentuan status gizi

Menentukan status gizi dengan menggunakan WHO Anthro berdasarkan BB/TB untuk mengetahui apakah responden masuk kedalam kategori kurus, normal atau obese. Serta menentukan LILA responden apakah masuk kedalam kategori KEK atau normal (tidak KEK).

d. Skoring dan kategorisasi

Menghitung skor di excel berdasarkan hasil pengisian kuesioner dari responden dan melakukan pengkategorian berdasarkan hasil skor yang diperoleh.

e. *Editing*

Editing atau pemeriksaan adalah pengecekan atau penelitian kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan revalidasi data yang dikumpulkan untuk bias diproses lebih lanjut. Hal yang perlu di perhatikan dalam editing ini adalah kelengkapan pengisian kuesioner, keterbacaan tulisan, kesesuaian jawaban, dan relevansi jawaban.

f. *Coding*

Memberikan kode pada jawaban responden. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam melakukan tabulasi dan Analisa data yang diberi nilai sesuai dengan ketentuan penilaian pada definisi operasional.

- g. *Entry Data*
Entry data dilakukan dengan memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS Statistic 26 pada computer untuk dilakukan analisis.
- h. *Cleaning*
Cleaning dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali jika ada kemungkinan kesalahan kode sehingga dilakukan koreksi terhadap data yang missing. Setelah cleaning selesai maka dilanjutkan dengan proses analisis .
- i. *Tabulasi*
Tabulasi merupakan langkah lanjut setelah pemeriksaan dan pemberian kode. Dalam tahap ini data disusun dalam bentuk table agar lebih mudah mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian. Tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah table frekuensi yang dinyatakan dalam persen.
- j. *Interpretasi*
Menyajikan data dalam bentuk narasi sehingga mudah untuk dipahami.
2. *Analisis Data*
- a. *Analisis Univariat*
Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik masing-masing variable yang diteliti baik dari variabel dependent ataupun variabel independent yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dari tiap-tiap variabel yang di interpretasikan dalam bentuk tabel dan narasi berdasarkan hasil yang diperoleh.
- b. *Analisis Bivariat*
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan metode cross seccional dengan skala nominal dan ordinal. Uji hipotesis yang tepat digunakan untuk mengetahui hubungan antarvariabel pada penelitian ini adalah uji chi-square dengan rumus sebagai berikut:
- $$X^2 = \sum \frac{(fo - fe)^2}{fe}$$
- Keterangan :
- X^2 : nilai khai-kuadrat
Fo : frekuensi observasi/pengamatan

Fe : frekuensi ekspektasi/harapan

Uji ini akan digunakan untuk mengetahui hubungan variabel independent terhadap kejadian anemia pada remaja putri. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan nilai Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan jika $p > 0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan jika $p < 0,05$ maka H_0 ditolak.

F. Uji Man Whitney

- Uji Man Whitney merupakan alternative dari uji t tidak berpasangan yang dimana jika data tidak terdistribusi normal maka dapat dilakukan uji man whitney tersebut. Uji Mn whitney sendiri adalah uji non-parametrik yang dimana digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata 2 kelompok sampel yang saling independent. Uji Mann Whitney biasa digunakan pada penelitian desain comparison (perbandingan).
- Pengambilan keputusan untuk uji man whitney sendiri ialah:
 - Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima
 - Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak sekitar 174 km dari kota Makassar. Luas wilayahnya sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km. Wilayah yang besar ini terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan. Ibukota Kabupaten Bone adalah Watampone.

Secara geografis Kabupaten Bone berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut:

Utara : Kabupaten Wajo dan Soppeng

Timur : Teluk Bone

Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa

Barat : Kabupaten Maros, Pangkep, Barru.

Secara astronomis Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13' – 5°6' Lintang Selatan dan antara 119°42' - 120°30' Bujur Timur. Letaknya yang dekat dengan garis khatulistiwa menjadikan Kabupaten Bone beriklim tropis. Sepanjang tahun 2014, kelembaban udara berkisar antara 77–86 persen dengan suhu udara 24,4°C-27,6°C.

Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe hujan Monsoon dan tipe hujan lokal. Tipe hujan Monsoon memiliki curah hujan tertinggi saat bertiup angin monsun Asia yaitu bulan Januari dan Februari. Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian barat. Tipe kedua memiliki kriteria pola hujan terbalik dengan pola monsoon, yaitu curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Bone.

a. SMAN 1 BONE

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Bone. SMAN 1 Bone didirikan pada tanggal 24 juli 1956 ditandai dengan surat keputusan nomor: 4808/B/III. Saat itu bernama SMA negeri 156 watampone. SMAN 1 Bone berada di titik koordinat garis lintang : -4.5428 dan garis bujur : 120.3127 luas tanahnya 4389 m². SMAN 1 Bone memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat 150/SK/BAP-SM/X/2016. Sekolah ini beralamat di Jl. Ternate No.1 watampone, Jeppee, kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan dengan kode pos 92732

SMAN 1 Bone memiliki jumlah siswa sebanyak 726 siswa/i dikepalai oleh bapak Muhammad Idris, S.Pd., M.Si dan tenaga pendidik sebanyak 47 orang. Pembelajaran di sekolah tersebut dilakukan selama 6 hari dalam seminggu pada Pagi hari, sekolah tersebut menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik tersebut berasal dari PLN dengan daya listrik 16,500 watt. SMAN 1 Bone juga menyediakan akses internet (Provider Satelit) sehingga menjadi sarana pendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan memiliki 19 ruang kelas, 4 laboratorium, dan 1 perpustakaan.

b. SMAN 21 BONE

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 21 Bone. SMAN 21 Bone didirikan pada tanggal 25 oktober 2005. SMAN 1 Bone berada di titik koordinat garis lintang : -4,000 dan garis bujur : 120,000 luas tanahnya 3 m². SMAN 21 Bone memiliki akreditasi B. Sekolah ini beralamat di Kelurahan pancaitana, Kec. Salomekko, Kab. Bone dengan kode pos 92775

SMAN 21 Bone memiliki jumlah siswa sebanyak 235 siswa/i dikepalai oleh bapak Umar dan tenaga pendidik sebanyak 19 orang. Pembelajaran di sekolah tersebut dilakukan selama 6 hari dalam seminggu pada Pagi hari, sekolah tersebut menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik tersebut berasal dari PLN dengan daya listrik 11,000 watt. SMAN 21 Bone juga menyediakan akses internet (Telkom Flash)

sehingga menjadi sarana pendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif dan memiliki 21 ruang kelas, 6 laboratorium, dan 2 perpustakaan.

B. Hasil

1. Analisis univariat

- a. Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022.

Tabel 4.1 Distribusi Siswi Berdasarkan Usia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Usia | Pedesaan | | Perkotaan | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| 15 Tahun | 17 | 20,5 | 15 | 18,1 |
| 16 Tahun | 30 | 36,1 | 28 | 33,7 |
| 17 Tahun | 30 | 36,1 | 37 | 44,6 |
| 18 Tahun | 6 | 7,2 | 3 | 3,6 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.1, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan terdapat 17 siswi (20,5%) yang berusia 15 Tahun, terdapat 30 siswi (36,1%) yang berusia 16 tahun, terdapat 30 siswi (36,1%) yang berusia 17 tahun, dan untuk siswi yang berusia 18 Tahun berjumlah 6 responden (7,2%). Sedangkan diperkotaan, terdapat 15 siswi (18,1%) yang berusia 15 Tahun, terdapat 28 siswi (33,7%) yang berusia 16 tahun, terdapat 37 siswi (44,6%) yang berusia 17 tahun, sedangkan untuk siswi yang berusia 18 Tahun berjumlah 3 responden (3,6%).

- b. Distribusi Siswi Berdasarkan Status Gizi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.3 Distribusi Siswi Berdasarkan IMT Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| IMT | Pedesaan | | Perkotaan | |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Underweight | 31 | 37,3 | 22 | 26,5 |
| Normal | 28 | 33,7 | 35 | 42,2 |
| Overweight | 24 | 28,9 | 26 | 31,3 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan terdapat 31 siswi (37,3%) yang termasuk dalam kategori kurus(underweight), terdapat 28 siswi (33,7) yang termasuk dalam kategori normal. Dan hanya 24 siswi (28,9%) yang termasuk dalam kategori gemuk(overweight). Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 22 siswi (26,5%) yang termasuk dalam kategori kurus(underweight), terdapat 35 siswi (42,2%) yang termasuk dalam kategori normal. Dan 26 siswi (31,3%) yang termasuk dalam kategori gemuk(overweight).

Tabel 4.4 Distribusi Siswi Berdasarkan KEK Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Kategori KEK | Pedesaan | | Perkotaan | |
|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| KEK | 49 | 59,0 | KEK | 48 |
| Normal | 34 | 41,0 | Normal | 35 |
| Total | 83 | 100 | Total | 83 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.4., diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan terdapat 49 siswi (59,0%) yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik), Dan hanya 34 siswi (41,0%) yang Normal. Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 48 siswi (57,8%) yang mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronik), Dan hanya 35 siswi (42,2%) yang Normal.

- c. Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.5 Distribusi Siswi Berdasarkan Kejadian Anemia Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Kejadian Anemia | Pedesaan | | Perkotaan | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Anemia | 47 | 56,6 | 29 | 34,9 |
| Tidak Anemia | 36 | 43,4 | 54 | 65,1 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan terdapat 47 siswi (56,6%) mengalami anemia, sedangkan yang tidak mengalami anemia berjumlah 36 siswi (43,4%). Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 29 siswi (34,9%) mengalami anemia, sedangkan yang tidak mengalami anemia berjumlah 54 siswi (65,1%).

- d. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.6 Distribusi Siswi Berdasarkan Siklus Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Siklus Menstruasi | Pedesaan | | Perkotaan | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Normal | 42 | 50,6 | 43 | 51,8 |
| Tidak Normal | 41 | 49,4 | 40 | 48,2 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.6 , diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan terdapat 42 siswi (50,6%) yang mengalami siklus menstruasi normal, sedangkan 41 siswi (49,4%) mengalami siklus menstruasi yang tidak normal. Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 43 siswi (51,8%) yang mengalami siklus menstruasi normal, sedangkan 40 siswi (48,2%) mengalami siklus menstruasi yang tidak normal.

Tabel 4.7 Distribusi Siswi Berdasarkan Lama Menstruasi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Lama Menstruasi | Pedesaan | | Perkotaan | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Normal | 63 | 75,9 | 55 | 66,3 |
| Tidak Normal | 20 | 24,1 | 28 | 33,7 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.7, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan terdapat 63 siswi (75,9%) yang mengalami lama menstruasi normal,

sedangkan 20 siswi (24,1%) mengalami lama menstruasi yang tidak normal. Sedangkan diperkotaan, diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 55 siswi (66,3%) yang mengalami lama menstruasi normal, sedangkan 28 siswi (33,7%) mengalami lama menstruasi yang tidak normal..

- e. Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor Zat Besi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.8 Distribusi Siswi Berdasarkan Pola Asupan Makanan Inhibitor Zat Besi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Frekuensi Konsumsi | Pedesaan | | Perkotaan | |
|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Susu | | | | |
| Sering | 29 | 34,9 | 32 | 38,6 |
| Jarang | 41 | 49,4 | 40 | 48,2 |
| Tidak Pernah | 13 | 15,7 | 11 | 13,3 |
| Teh | | | | |
| Sering | 52 | 62,7 | 44 | 53,0 |
| Jarang | 28 | 33,7 | 35 | 48,2 |
| Tidak Pernah | 3 | 3,6 | 4 | 4,8 |
| Kopi | | | | |
| Sering | 13 | 15,7 | 16 | 19,3 |
| Jarang | 45 | 54,2 | 33 | 39,8 |
| Tidak Pernah | 25 | 30,1 | 34 | 41,0 |
| Coklat | | | | |
| Sering | 68 | 81,9 | 59 | 71,1 |
| Jarang | 15 | 18,1 | 24 | 28,9 |
| Tidak Pernah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh bahwa 83 responden, dipedesaan terdapat 29 siswi (34,9%), 52 siswi (62,7%), 13 siswi(15,7%) dan 68 siswi(81,9%) yang sering mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat, Adapun yang jarang mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat berjumlah 41 siswi(49,4%),28 siswi(33,7%),45 siswi(54,2%) dan 15 siswi (18,1%), Sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi susu.teh,kopi dan coklat terdapat 13 siswi(15,7%),3 siswi(3,6%),25 siswi (30,1%) dan tidak ada siswi (0%) sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa 83 responden, terdapat 32 siswi (38,6%), 44 siswi (53,0%), 16 siswi(19,3%) dan 59 siswi (71,1%) yang sering mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat, Adapun yang jarang mengkonsumsi susu,teh,kopi dan coklat berjumlah 40 siswi(38,6%),35 siswi(48,2%),33 siswi(39,8%) dan 24 siswi (28,9%), Sedangkan yang tidak pernah mengkonsumsi susu.teh,kopi dan coklat terdapat 11 siswi(113,3%),4 siswi(4,8%),34 siswi (41,0%) dan tidak ada siswi (0%)

- f. Distribusi Total Asupan Makanan Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.9 Distribusi Tingkat Konsumsi Karbohidrat Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Tingkat Konsumsi Karbohidrat | Pedesaan | | Perkotaan | |
|------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Kurang | 63 | 75,9 | 57 | 68,7 |
| Cukup | 20 | 24,1 | 26 | 31,3 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan table 4.9, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 63 siswi yang kurang mengkonsumsi karbohidrat dan 20 siswi yang cukup mengkonsumsi karbohidrat, sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, terdapat 53 siswi yang kurang mengkonsumsi karbohidrat dan 26 siswi yang cukup mengkonsumsi karbohidrat

Tabel 4.10 Distribusi Tingkat Konsumsi Protein Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Tingkat Konsumsi Protein | Pedesaan | | Perkotaan | |
|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Kurang | 58 | 69,9 | 53 | 63,9 |
| Cukup | 25 | 30,1 | 30 | 36,1 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan table 4.10, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 58 siswi yang kurang mengkonsumsi protein dan 25 siswi yang cukup mengkonsumsi protein. Sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, terdapat 53 siswi yang kurang mengkonsumsi protein dan 30 siswi yang cukup mengkonsumsi Protein.

Tabel 4.11 Distribusi Tingkat Konsumsi Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Tingkat Konsumsi Zat Besi | Pedesaan | | Perkotaan | |
|---------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Kurang | 62 | 74,7 | 64 | 77,1 |
| Cukup | 21 | 25,3 | 19 | 22,9 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan table 4.11, diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 62 siswi yang kurang mengkonsumsi zat besi dan 21 siswi yang cukup mengkonsumsi zat besi. Sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden,

terdapat 64 siswi yang kurang mengkonsumsi zat besi dan 19 siswi yang cukup mengkonsumsi zat besi.

Tabel 4.12 Distribusi Tingkat Konsumsi Vitamin C Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Tingkat Konsumsi Vitamin C | Pedesaan | | Perkotaan | |
|----------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Jumlah (n) | Persentase% | Jumlah (n) | Persentase% |
| Kurang | 71 | 85,5 | 48 | 57,8 |
| Cukup | 12 | 14,5 | 35 | 42,2 |
| Total | 83 | 100 | 83 | 100 |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan table 4.12 , diperoleh 83 responden, dipedesaan terdapat 71 siswi yang kurang mengkonsumsi vitamin c dan 12 siswi yang cukup mengkonsumsi vitamin c. sedangkan diperkotaan, diperoleh 83 responden, terdapat 48 siswi yang kurang mengkonsumsi vitamin c dan 35 siswi yang cukup mengkonsumsi vitamin c.

2. Analisis Bivariat

- a. Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.13 Hubungan Antara Usia Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Usia | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % | | | | |
| 15 Tahun | 13 | 76,5 | 4 | 23,5 | 17 | 100 | 0,257 | 8 | 53,3 | 7 | 46,7 | 15 | 100 | 0,417 |
| 16 Tahun | 14 | 46,7 | 16 | 53,3 | 30 | 100 | | 8 | 28,6 | 20 | 71,4 | 28 | 100 | |
| 17 Tahun | 17 | 56,7 | 13 | 43,3 | 30 | 100 | | 12 | 32,4 | 25 | 67,6 | 37 | 100 | |
| 18 Tahun | 3 | 50,0 | 3 | 50,0 | 6 | 100 | | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.13, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan tergolong kategori anemia terdiri dari anak usia 15 tahun yang berjumlah 13 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 14 siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 17 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 3 siswi. Sedangkan, yang tergolong kategori tidak anemia pada anak-anak usia 15 tahun yang berjumlah 4 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 16 siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 13 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 3 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,257 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan ,

diperoleh bahwa dari 83 responden, tergolong kategori anemia terdiri dari anak usia 15 tahun yang berjumlah 8 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 8 siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 12 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 1 siswi. Sedangkan, yang tergolong kategori tidak anemia pada anak-anak usia 15 tahun yang berjumlah 7 siswi, anak usia 16 tahun yang berjumlah 20 siswi, anak usia 17 tahun yang berjumlah 25 siswi, anak usia 18 tahun yang berjumlah 2 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,417 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia.

- b. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.15 Hubungan Antara IMT Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Status Gizi | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | n | % | | N | % | | | | | |
| Underweight | 23 | 74,2 | 8 | 25,8 | 31 | 100 | 0,003 | 12 | 54,5 | 10 | 45,5 | 22 | 100 | 0,017 |
| Normal | 17 | 60,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100 | | 13 | 37,1 | 22 | 62,9 | 35 | 100 | |
| Overweight | 7 | 29,2 | 17 | 70,8 | 24 | 100 | | 4 | 15,4 | 22 | 84,6 | 26 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan terdapat 23 siswi Underweight yang tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada

siswi yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,003 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia. , sedangkan diperkotaan diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 13 siswi normal yang tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terbanyak terdapat pada siswi yang status gizinya normal dan Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,017 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara IMT dengan kejadian anemia

Tabel 4.16 Hubungan Antara Kategori KEK Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| KEK | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | Tidak Anemia | | | | | |
| | N | % | N | % | | | | n | % | N | | | % |
| KEK | 36 | 73,5 | 13 | 26,5 | 49 | 100 | 23 | 47,9 | 25 | 52,1 | 48 | 100 | 0,008 |
| Normal | 11 | 32,4 | 23 | 67,6 | 34 | 100 | 6 | 17,1 | 29 | 82,9 | 35 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.16 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaanyang mengalami kekurangan energy kronik dan mengalami anemia berjumlah 36 siswi. Sedangkan yang tidak mengalami anemia terdapat pada siswi yang tidak mengalami kekurangan energy kronik sebanyak 23 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,000 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kategori KEK dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, yang mengalami kekurangan energy kronik dan mengalami anemia berjumlah 23

siswi. Sedangkan yang tidak mengalami anemia terdapat pada siswi yang tidak mengalami kekurangan energy kronik sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,008 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kategori KEK dengan kejadian anemia.

- c. Hubungan Antara Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.17 Hubungan Antara Siklus Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Siklus Menstruasi | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|-------------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | n | % | N | % | | | |
| | N | % | N | % | | | | | | | | | |
| Normal | 28 | 66,7 | 14 | 33,3 | 42 | 100 | 14 | 32,6 | 29 | 67,4 | 43 | 100 | 0,809 |
| Tidak Normal | 19 | 46,3 | 22 | 53,7 | 41 | 100 | 15 | 37,5 | 25 | 62,5 | 40 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.17, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya normal (28 siswi) sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya tidak normal tergolong kedalam kategori tidak anemia (22 siswi). Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,100 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia., sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang

siklus menstruasinya tidak normal sebanyak 15 siswi. sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya normal tergolong kedalam kategori tidak anemia sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,809 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia.

Tabel 4.18 Hubungan Antara Lama Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Lama Menstruasi | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|-----------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | Tidak Anemia | | | | | |
| | N | % | N | % | | | | | n | % | | | N |
| Normal | 38 | 60,3 | 25 | 39,7 | 63 | 100 | 18 | 32,7 | 37 | 87,3 | 55 | 100 | 0,727 |
| Tidak Normal | 9 | 45,0 | 11 | 55,0 | 20 | 100 | 11 | 39,3 | 17 | 60,7 | 28 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.18 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia dan tidak anemia terdapat pada siswi yang lama menstruasinya normal sebanyak 38 siswi dan 25 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,345 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama menstruasi dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan , diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia dan tidak anemia terdapat pada siswi yang lama menstruasinya normal sebanyak 18 siswi dan 37 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,727 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara lama menstruasi dengan kejadian anemia.

- d. Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.19 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Susu | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | Tidak Anemia | | | | | |
| | N | % | N | % | | | | | n | % | | | N |
| Sering | 14 | 29,8 | 15 | 41,7 | 29 | 100 | 11 | 34,4 | 21 | 65,6 | 32 | 100 | 0,993 |
| Jarang | 25 | 53,2 | 16 | 44,4 | 41 | 100 | 21 | 35,0 | 26 | 65,0 | 40 | 100 | |
| Tidak Pernah | 8 | 61,5 | 5 | 38,5 | 13 | 100 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 11 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.19 , diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang jarang , dan tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori anemia sedangkan yang sering mengkonsumsi susu paling tinggi di kategori tidak anemia . Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,531 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum susu dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan yang sering, jarang dan tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,993 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum susu dengan kejadian anemia.

Tabel 4.20 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| The | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | n | % | | N | % | | | | | |
| Sering | 32 | 61,5 | 20 | 38,5 | 52 | 100 | 0,433 | 12 | 27,3 | 32 | 72,7 | 44 | 100 | 0,212 |
| Jarang | 14 | 50,0 | 14 | 50,0 | 28 | 100 | | 16 | 45,7 | 19 | 54,3 | 35 | 100 | |
| Tidak Pernah | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100 | | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 | 4 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.20, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering, jarang mengonsumsi teh paling tertinggi terdapat di kategori anemia sedangkan yang tidak pernah mengonsumsi teh paling tertinggi terdapat pada kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,433 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum teh dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan yang sering, jarang dan tidak pernah mengonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,212 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum teh dengan kejadian anemia.

Tabel 4.21 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Kopi | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | n | % | | N | % | | | | | |
| Sering | 7 | 53,8 | 6 | 46,2 | 13 | 100 | 0,504 | 7 | 43,8 | 9 | 56,3 | 16 | 100 | 0,458 |
| Jarang | 28 | 62,2 | 17 | 37,8 | 45 | 100 | | 9 | 27,3 | 24 | 72,7 | 33 | 100 | |
| Tidak Pernah | 12 | 48,0 | 13 | 52,0 | 25 | 100 | | 13 | 38,2 | 21 | 61,8 | 34 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.21, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering, jarang dan tidak pernah mengkonsumsi kopi paling tertinggi terdapat di kategori anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,504 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum kopi dengan kejadian anemia. Sedangkan di perkotaan yang sering, jarang dan tidak pernah mengkonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,458 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum kopi dengan kejadian anemia.

Tabel 4.22 Hubungan Antara Frekuensi Pola Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Coklat | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | n | % | | N | % | | | | | |
| Sering | 37 | 54,4 | 31 | 45,6 | 68 | 100 | 0,386 | 19 | 32,2 | 40 | 67,8 | 59 | 100 | 0,412 |
| Jarang | 10 | 66,7 | 5 | 33,3 | 15 | 100 | | 10 | 41,7 | 14 | 58,3 | 24 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 34,9 | 54 | 65,1 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.22, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang sering dan jarang mengonsumsi coklat paling tertinggi terdapat di kategori anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,386 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum coklat dengan kejadian anemia. Sedangkan diperkotaan yang sering, jarang dan tidak pernah mengonsumsi susu paling tertinggi terdapat di kategori tidak anemia. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,412 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara minum coklat dengan kejadian anemia.

- e. Hubungan Antara Asupan Makan Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

Tabel 4.23 Hubungan Antara Asupan Karbohidrat Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a.Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Karbohidrat | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | Tidak Anemia | | | | | |
| | N | % | N | % | | | | | N | % | | | |
| Kurang | 37 | 78,7 | 20 | 55,6 | 57 | 100 | 21 | 36,8 | 36 | 63,2 | 57 | 100 | 0,772 |
| Cukup | 10 | 20,3 | 16 | 44,4 | 26 | 100 | 8 | 30,8 | 18 | 69,2 | 26 | 100 | |
| Total | 47 | 100 | 36 | 100 | 83 | 100 | 29 | 100 | 54 | 100 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.23, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 37 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 10 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 20 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 16 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,024 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 21 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 8 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 36 siswi dan yang cukup

mengonsumsi karbohidrat sebanyak 18 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,772 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian anemia.

Tabel 4.24 Hubungan Antara Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Protein | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | | | n | % | N | % | | | |
| Kurang | 36 | 68,1 | 22 | 72,2 | 58 | 100 | 15 | 28,3 | 38 | 71,7 | 53 | 100 | 0,148 |
| Cukup | 15 | 31,9 | 10 | 27,8 | 25 | 100 | 14 | 46,7 | 16 | 53,3 | 30 | 100 | |
| Total | 47 | 100 | 36 | 100 | 83 | 100 | 29 | 100 | 54 | 100 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.24, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 36 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 15 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 22 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 10 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,684 < 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia, sedangkan diperkotaan diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 15 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 14 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 38 siswi dan yang cukup

mengonsumsi karbohidrat sebanyak 16 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,148 < 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia.

Tabel 4.25 Hubungan Antara Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi a. Di Sma Pedesaan (SMAN 21 Bone) Dan Di Sma Perkotaan (SMAN 1 BONE) Kabupaten Bone Tahun 2022

| Zat Besi | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | P Value | |
|--------------|--------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | Anemia | Tidak Anemia | | | | | |
| | N | % | N | % | | | | | n | % | | | N |
| Kurang | 37 | 78,7 | 27 | 75,0 | 64 | 100 | 21 | 32,8 | 43 | 67,2 | 64 | 100 | 0,637 |
| Cukup | 10 | 21,3 | 9 | 25,0 | 19 | 100 | 8 | 42,1 | 11 | 57,9 | 19 | 100 | |
| Total | 47 | 100 | 36 | 100 | 83 | 100 | 29 | 100 | 54 | 100 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.25, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 37 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 10 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 27 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 9 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,689 < 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia, sedangkan dipertanian diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 21 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 8 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 43 siswi dan yang cukup

mengonsumsi karbohidrat sebanyak 11 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,637 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia.

Tabel 4.26 Hubungan Antara Asupan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Pada Siswi SMAN 21 Bone Kecamatan Tonra Kabupaten Bone Tahun 2022

| Vitamin C | Kejadian Anemia Pedesaan | | | | Total | | P Value | Kejadian Anemia Perkotaan | | | | Total | | P Value |
|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------|------------|---------|---------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|
| | Anemia | | Tidak Anemia | | | | | Anemia | | Tidak Anemia | | | | |
| | N | % | N | % | n | % | N | % | | | | | | |
| Kurang | 28 | 59,6 | 19 | 52,8 | 47 | 100 | 0,536 | 17 | 35,4 | 31 | 64,6 | 48 | 100 | 1,000 |
| Cukup | 19 | 40,4 | 17 | 47,2 | 36 | 100 | | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 35 | 100 | |
| Total | 47 | 56,6 | 36 | 43,4 | 83 | 100 | | 29 | 100 | 54 | 100 | 83 | 100 | |

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 4.51, diperoleh bahwa dari 83 responden, dipedesaan yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 28 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 19 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 19 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 17 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,536 < 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia, sedangkan dipertanian diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 17 siswi dan yang cukup mengonsumsi karbohidrat sebanyak 12 siswi sedangkan yang tergolong kedalam kategori tidak anemia yang kurang mengonsumsi karbohidrat sebanyak 31 siswi dan yang cukup

mengonsumsi karbohidrat sebanyak 23 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 1,000 < 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia.

3. Uji Pembeda (Uji Mann Whitney)

a. Kejadian Anemia

Tabel 4.27

| Tes Statistic | Kejadian Anemia |
|------------------------|-----------------|
| Mann-Whitney U | 2756.000 |
| Wilcoxon W | 6242.000 |
| Z | -2.227 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.026 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,026 < 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan Antara Kejadian Anemia Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Kejadian Anemia Siswi Di Sma Perkotaan.

b. Status Gizi (IMT dan KEK)

Tabel 4.28

| Tes Statistic | IMT | KEK |
|------------------------|----------|----------|
| Mann-Whitney U | 0.000 | 2756.000 |
| Wilcoxon W | 3486.000 | 6242.000 |
| Z | -11.127 | -2.227 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.000 | 0.026 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,000 < 0,05$ Dan $0,026 < 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan Antara Status Gizi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Status Gizi Siswi Di Sma Perkotaan.

c. Pola Menstruasi

Tabel 4.29

| Tes Statistic | Pola Menstruasi |
|------------------------|-----------------|
| Mann-Whitney U | 3258.500 |
| Wilcoxon W | 6744.500 |
| Z | -0.613 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.540 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,540 > 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Menstruasi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Menstruasi Siswi Di Sma Perkotaan.

d. Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi

Tabel 4.30

| Tes Statistic | Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi |
|------------------------|----------------------------------|
| Mann-Whitney U | 3024.000 |
| Wilcoxon W | 6510.000 |
| Z | -1.409 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.159 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,159 > 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi Siswi Di Sma Perkotaan.

e. Asupan Makanan

- Asupan Karbohidrat

Tabel 4.31

| Tes Statistic | Asupan Karbohidrat |
|------------------------|--------------------|
| Mann-Whitney U | 3141.000 |
| Wilcoxon W | 6627.000 |
| Z | -0.980 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.327 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,327 > 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan Karbohidrat Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Karbohidrat Siswi Di Sma Perkotaan.

- Asupan Protein

Tabel 4.32

| Tes Statistic | Asupan Protein |
|------------------------|----------------|
| Mann-Whitney U | 3395.500 |
| Wilcoxon W | 6881.500 |
| Z | -0.158 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.874 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,874 > 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan Protein Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Protein Siswi Di Sma Perkotaan.

- Asupan Zat Besi

Tabel 4.33

| Tes Statistic | Asupan Zat Besi |
|------------------------|-----------------|
| Mann-Whitney U | 3442.000 |
| Wilcoxon W | 6928.000 |
| Z | -0.008 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.994 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,994 > 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Ditolak”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan Zat Besi Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Zat Besi Siswi Di Sma Perkotaan.

- Asupan Vitamin C

Tabel 4.34

| Tes Statistic | Asupan Vitamin C |
|------------------------|------------------|
| Mann-Whitney U | 2413.000 |
| Wilcoxon W | 5899.000 |
| Z | -3.332 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | 0.001 |

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,001 < 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Tidak Ada Perbedaan Antara Pola Asupan Vitamin C Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Pola Asupan Vitamin C Siswi Di Sma Perkotaan.

C. Pembahasan (Analisis Bivariat)

a. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia

Masa remaja adalah perjalanan bertahun-tahun dari masa kanak-kanak menuju dewasa dan ditandai dengan berbagai perubahan biologis, kognitif, dan emosional. Akibatnya, itu adalah waktu ketika lebih banyak energi dibutuhkan dan dua kali lebih banyak makanan dibutuhkan untuk pertumbuhan. (Proverawati, 2011)

Era antara remaja awal dan remaja akhir, yang merupakan masa eksplorasi identitas dan pengaruh lingkungan yang cepat pada remaja, mencakup rentang usia 12 hingga 14 tahun. Remaja dengan sengaja melewati makan atau memutuskan untuk makan di luar karena kecemasan mereka terhadap tipe tubuh mereka. (Corwin, 2009)

Dari hasil analisis chi-square dipedesaan didapatkan nilai $p = 0,257 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia. Sedangkan dari hasil analisis chi-square diperkotaan didapatkan nilai $p = 0,417 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia dengan kejadian anemia.

(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ □ ٧٠) (النحل/16:70)

Terjemahan : Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahakuasa. (An-Nahl/16:70)

Tafsir Q.S An- Nahl 16:70 : Dan Allah menciptakan kalian kemudian mematikan kalian pada akhir umur kalian. Dan diantara kalian ada orang yang dikembalikan kepada masa usia terburuk, yaitu masa pikun, sebagaimana keadaannya pada masa kanak-kanak, ia menjadi tidak mengetahui apa-apa dari apa yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa, dan ilmu serta kekuasaannya meliputi segala sesuatu, maka Allah lah yang mengembalikan manusia kepada keadaan ini, Dia mahakuasa untuk mematikan dan kemudian membangkitkannya kembali.

Distribusi usia remaja putri di SMA Negeri 97 Jakarta tahun 2018 mengungkapkan bahwa 98 responden (52,1%) adalah remaja putri awal usia 12 hingga 16 tahun dan 90 responden (47,9%) merupakan remaja putri awal usia 17 hingga 21 tahun. (remaja akhir) (Proverawati, 2011)

Penelitian ini tidak mendukung penelitian Dian Pertiwi et al., yang menemukan bahwa remaja putri di Desa Sirnagalih, Jombang yang berada pada kategori usia remaja akhir lebih banyak mengalami anemia, dengan laju 25%, dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kategori usia remaja awal, dengan laju hanya 5,2%. Hasil Fisher Exact Test sebesar 0,023 menunjukkan adanya hubungan antara umur dengan kejadian anemia. Anemia lebih mungkin terjadi pada masa remaja akhir, 6.111 kali lebih mungkin dibandingkan pada masa remaja awal.

Remaja membatasi asupan makanan mereka karena mereka memiliki rasa citra tubuh mereka sendiri dari 15 sampai 16 tahun. Hal ini menyebabkan para ahli percaya bahwa remaja berpotensi mengalami anemia karena gaya hidup dan pola konsumsi remaja bervariasi karena pertumbuhan dan perkembangan. Aktivitas remaja dan kebutuhan energi keduanya meningkat.

Usia tidak berhubungan dengan anemia dikarenakan yang menyebabkan anemia ada beberapa faktor diantaranya status gizi, pola menstruasi, pola konsumsi inhibitor zat besi dan asupan makanan.

b. Hubungan Antara Status Gizi Dengan Kejadian Anemia

Status gizi adalah keadaan tubuh yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat gizi, serta keadaan fisiologis yang disebabkan oleh adanya zat gizi dalam tubuh (Supriasa, 2002).

Berdasarkan penelitian di sma perkotaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 23 siswi Underweight yang tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada siswi yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p =$

0,003 < 0,05, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia.

Berdasarkan penelitian di sma pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, terdapat 23 siswi Underweight yang tergolong kedalam kategori anemia yang terbanyak . sedangkan yang mengalami kategori tidak anemia terdapat pada siswi yang status gizinya Overweight. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,003 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia.

(وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۝ ٨٨) (المائدة/5: 88)

Terjemahan : *Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman (Al-Ma'idah/5:88).*

Tafsir Q.S Al-Ma'idah/5:88 : ada ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada mereka.

"Halal"Di sini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya.

"baik"adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin protein dan sebagainya.

Makanan tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.

"halal dan baik" ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani.

Hubungan antara Q.S Al-Ma'idah/5:88 dengan penelitian ialah : Dari ayat tersebut Allah menyuruh hamba - Nya untuk memilih makanan yang halal dan baik seperti susu,teh dan kopi yang dapat menyebabkan anemia. Salah satu kriteria makanan yang baik adalah sehat dan bergizi tinggi. Namun makan dan minum harus sesuai dengan kebutuhan dan prinsip kesehatan.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yureka, 2020) yang mencatat bahwa meskipun ada tiga (50%) orang yang gemuk dan menderita anemia, hanya ada satu peserta yang kurus dan menderita anemia. Jelas dari penelitian yang menggunakan uji Chi Square bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan prevalensi anemia pada remaja putri (p value > 0,05).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (SIREGAR, 2019) yang menyatakan bahwa pada remaja putri kelas VIII di SMPN 3 Lubuk Pakam terdapat hubungan antara status gizi dengan prevalensi hemoglobin. penelitian lain yang dilakukan oleh (Mutmainnah, Siti Fatimah, 2021) yang menyatakan bahwa pada remaja putri kelas VIII di SMPN 3 Lubuk Pakam terdapat hubungan antara status gizi dengan prevalensi hemoglobin. penelitian lain yang dilakukan oleh.

Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mutmainnah et al., 2021) yang menyatakan bahwa status gizi tidak berperan dalam terjadinya anemia. Penelitian Wahyu Mahar Permatasari tahun 2016 juga tidak menemukan hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi dengan prevalensi anemia pada remaja putri.

Karena asupan makanan sehari-hari berhubungan dengan status gizi, peneliti berpendapat bahwa status gizi berhubungan dengan terjadinya anemia. Makanan yang dikonsumsi mengandung zat gizi sehat dalam jumlah yang sesuai, yang berarti status gizinya juga baik. Anemia dapat disebabkan oleh makanan yang dimakan dalam jumlah kecil dan mengandung nutrisi seperti kekurangan zat besi, yang mencegah tubuh memproduksi sel darah merah yang cukup.

c. Hubungan Antara Kategori KEK Dengan Kejadian Anemia

Salah satu teknik deteksi dini yang sederhana dan mudah diakses untuk menentukan populasi yang berisiko kekurangan energi kronis adalah mengukur LILA pada wanita usia subur (WUS) (KEK). Penilaian LILA, bagaimanapun, tidak dapat digunakan untuk melacak perubahan jangka pendek dalam status gizi. Selain itu, ada

beberapa masalah yang perlu ditangani, terutama jika ini menjadi satu-satunya pilihan untuk indeks status gizi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki akses ke teknik pengukuran antropometri tambahan yang dapat digunakan untuk melacak perubahan status gizi seseorang dari waktu ke waktu untuk menilai status gizi remaja selain menggunakan LILA (Supriasa, 2002).

Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah gangguan gizi buruk di mana terjadi kekurangan konsumsi makanan yang berkepanjangan selama bertahun-tahun, yang menyebabkan masalah kesehatan. Jika lingkaran lengan atas (LiLA) lebih kecil dari 23,5 cm, ini menunjukkan bahwa ibu berisiko mengalami KEK dan kemungkinan besar bayi lahir dengan berat badan rendah akan dilahirkan (Supriasa, 2002).

Berdasarkan penelitian di sma pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang mengalami kekurangan energy kronik dan Sebanyak 36 siswa mengalami anemia. Terdapat 23 siswa yang tidak mengalami anemia dan tidak mengalami defisit energi persisten. Menurut temuan analisis chi-kuadrat, kejadian anemia dan kategori KEK berhubungan (nilai $p = 0,000$ $0,05$).

Berdasarkan penelitian di sma perkotaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang mengalami kekurangan energy kronik dan mengalami anemia berjumlah 23 siswi. Sedangkan 29 siswa tidak mengalami anemia dan tidak mengalami kekurangan energi yang persisten. Hasil analisis chi-square menunjukkan adanya hubungan kategori KEK dengan kejadian anemia dengan p value $0,008$ $0,05$.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ina et al., 2018), yang menemukan korelasi yang cukup signifikan antara ukuran lengan atas dengan prevalensi anemia. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Satriani (2018) yang menemukan bahwa kejadian anemia pada siswa kelas XI SMAN 2 dan siswa MA DDI Babussalam Kassi di Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto tidak dipengaruhi oleh LILA.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada siswa di SMK Kesehatan Bantul Yogyakarta oleh (MULIANI, 2022). KEK dan kejadian

anemia terbukti berkorelasi signifikan dalam penelitian (Mutmainnah et al., 2021) pada siswa SMP di Majene, dengan nilai $p = 0,025$.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prevalensi anemia di antara responden baik, masih banyak remaja putri yang tidak mengonsumsi makanan bergizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, yang dapat menyebabkan mudahnya masalah anemia dan kekurangan energi kronis (KEK). . Disarankan bahwa untuk mengendalikan anemia, remaja putri ini harus mengonsumsi suplemen zat besi dan makan makanan bergizi dalam jumlah yang cukup. Selain itu, melalui sosialisasi kesehatan bagi remaja putri, mereka juga memahami perlunya memenuhi kebutuhan diet sesuai usia mereka.

d. Hubungan Antara Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia

Haid wanita merupakan salah satu gejala pubertas. Menstruasi, yang biasanya berlangsung selama 5-7 hari setiap bulan, adalah proses pelepasan lapisan dalam dinding rahim (endometrium) wanita. Siklus menstruasi seringkali berlangsung hingga usia 50 tahun. Menopause adalah fase setelah berhentinya menstruasi (Kemenkes, 2018)

Berdasarkan penelitian di pedesaan, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya normal (28 siswi) sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya tidak normal tergolong kedalam kategori tidak anemia (22 siswi). Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,100 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia.

Berdasarkan penelitian dipertanian, diperoleh bahwa dari 83 responden, yang tergolong kedalam kategori anemia terdapat pada siswi yang siklus menstruasinya tidak normal sebanyak 15 siswi. sebaliknya siswi yang siklus menstruasinya normal tergolong kedalam kategori tidak anemia sebanyak 29 siswi. Dari hasil analisis chi-square didapatkan nilai $p = 0,809 > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة/2: 222)

Terjemahan: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.”⁶⁵⁾ Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. “⁶⁶⁾ Haid adalah darah yang keluar bersama jaringan yang dipersiapkan untuk pembuahan di rahim perempuan. Keluarnya secara periodik, sesuai dengan periode pelepasan sel telur ke rahim. Kondisi seperti itu yang dianggap kotor dan menjadikan perempuan tidak suci secara syar’i, termasuk tidak suci untuk digauli suaminya. (Al-Baqarah/2:222)

Terjemahan : Pada ayat ini Allah memberi tuntunan perihal aturan-aturan dalam menjalin hubungan suami-istri. Dan mereka, para sahabat, menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang haid. Pertanyaan ini diajukan para sahabat ketika melihat pria-pria Yahudi menghindari istri mereka dan tidak mau makan bersama mereka ketika sedang haid, bahkan mereka pun menempatkan para istri di rumah yang berbeda. Ayat ini kemudian turun untuk menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid. Katakanlah, wahai Rasulullah, bahwa haid itu adalah sesuatu, yakni darah yang keluar dari rahim wanita, yang kotor karena aromanya tidak sedap, tidak menyenangkan untuk dilihat, dan menimbulkan rasa sakit pada diri wanita. Karena itu jauhilah dan jangan bercampur dengan istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka untuk bercampur bersamanya sebelum mereka suci dari darah haidnya, kecuali bersenang-senang selain di tempat keluarnya darah. Apabila mereka telah suci dari haid dan mandi maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu jika kamu ingin bercampur dengan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dari segala

kesalahan yang diperbuatnya dan menyukai orang yang menyucikan diri dari kotoran lahiriah dengan mandi atau wudu.I

Hubungan antara Q.S Al-Baqarah/2:222 dengan penelitian ialah : Pertama, adalah darah kotor yang keluar dari rahim atau kemaluan perempuan dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan siklus biologis. Kedua, menimbulkan konsekuensi bagi terlarangnya hubungan seksual, namun tidak menghalangi kaum perempuan dan kaum laki-laki melakukan aktifitas lainnya seperti ciuman, bernesraan, berpegangan dan lain sebagainya dengan mengecualikan hubungan alat kelamin, indikasi dari makna al-mahidh yang menunjukkan tempat keluarnya darah haid tersebut yang dinamakan dengan alat kelamin.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Suhariyati et al (Suhariyati et al., 2020), yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia. Berdasarkan temuan uji koreksi kontinuitas, nilai p untuk hubungan ini adalah 0,000 (0,05).

Penelitian ini mendukung temuan penelitian Kirana (2011) yang tidak menemukan hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia ($p = 0,789$). Menurut penelitian Kirana, variabel yang mempengaruhi anemia antara lain konsumsi makanan, vitamin A, vitamin C, dan asupan zat besi (Kirana, 2011).

Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Siahaan, Nasty Ratauli; Siti Arifah Pujonarti, 2012) penelitian dengan nilai p 0,756 menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di Wilayah Kota Depok tahun 2011. Berdasarkan penelitian ini, pengetahuan remaja, konsumsi protein, asupan zat besi, pekerjaan ayah, dan pekerjaan ibu merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi anemia.

Siklus menstruasi yang lebih pendek pada remaja putri merupakan hal yang tidak normal karena mereka memiliki periode menstruasi yang lebih sering, yang dapat mengakibatkan perdarahan menstruasi yang parah. Cadangan zat besi wanita yang tidak mencukupi dan ketidakmampuan tubuh untuk menyerap zat besi yang

cukup untuk menggantikan zat besi yang hilang selama menstruasi adalah penyebab utama jumlah darah yang rentan terhadap anemia. Remaja putri dengan siklus menstruasi atipikal memiliki risiko 36,08 kali lebih tinggi terkena anemia dibandingkan dengan periode menstruasi yang teratur.

Responden dengan siklus menstruasi atipikal melaporkan memiliki kebiasaan makan yang tidak konsisten, sering kelelahan, dan mengalami tingkat stres yang tinggi akibat jadwal yang padat. Siklus menstruasi dianggap menyimpang sebagai akibat dari beberapa keadaan. sehingga baik individu anemia maupun non-anemia mengalami menstruasi yang tidak teratur.

e. Hubungan Antara Pola konsumsi Inhibitor Zat Besi Dengan Kejadian Anemia

Zat yang dikenal sebagai "inhibitor Fe" dapat mencegah penyerapan zat besi. Tanin merupakan zat yang menghambat zat besi (Rahmi, R. and Puspita, 2020)

Karena tanin dalam teh membentuk koneksi rumit yang tidak dapat diserap, mereka dapat menurunkan penyerapan zat besi non-heme (Temme, 2002) dalam (Masthalina, 2015)

Penelitian Thankachan (2008) dalam (Masthalina, 2015), Kesimpulannya, konsumsi 1-2 cangkir per hari pada wanita — apakah mereka menderita anemia atau tidak — menurunkan penyerapan zat besi. Pasien dengan anemia defisiensi besi yang minum 1 cangkir teh per hari dapat mengalami penurunan penyerapan zat besi sebesar 49%, sedangkan mereka yang minum 2 cangkir teh per hari dapat mengalami penurunan penyerapan zat besi sebesar 67%.

berdasarkan analisis data dari lokasi perkotaan dan pedesaan. Hasil analisis chi-square menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pola inhibitor zat besi dengan prevalensi anemia, dengan nilai p masing-masing $> 0,05$.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ayuningtyas et al., 2022) tidak terdapat perbedaan asupan fitat ($p=0,133$) antara santriwati anemia dan non anemia

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian (Utomo, Gullit Danan Prasetyo and , Endang Nur Widyaningsih, S.ST., M.Si, Med. and , Mutalazim, SKM., 2013), Di SMAN 1, Mojolaban menemukan bahwa 61,9% siswa anemia secara teratur minum teh, sedangkan 58,3% siswa non-anemia melakukan hal yang sama.

Penelitian tidak ini sejalan dengan penelitian (Masthalina et al, 2015) Karena kejadian anemia pada remaja putri berkorelasi dengan pola konsumsi zat penghambat penyerapan zat besi ($p = 0,004$), maka dapat disimpulkan bahwa kejadian anemia lebih tinggi pada remaja putri yang sering mengkonsumsi makanan tersebut dibandingkan pada remaja putri yang kurang sering mengkonsumsinya. . karenanya, anemia tidak umum.

Penelitian lainnya menunjukkan remaja putri dengan pola minum teh selama makan berisiko 52 kali lebih tinggi mengalami anemia (Putra et al., 2020). Kecukupan zat besi remaja putri ditentukan oleh penyerapan zat besi. Teh mengandung polifenol yang merupakan zat inhibitor dalam penyerapan zat besi. Penelitian menunjukkan konsumsi teh berperan penting dalam defisiensi zat besi, kandungan tanin memiliki korelasi positif dengan tingkat serum ferritin (Machmud et al., 2019).

Asupan dan penyerapan zat besi yang tidak memadai, yaitu praktik makan makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi dan minum teh dan kopi secara bersamaan saat makan.

Karena remaja putri sering mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti fitat (ditemukan pada jagung, kedelai, dan jenis kacang-kacangan lainnya), tanin (ditemukan dalam teh, kopi, bayam), dan jeruk nipis/kalsium (ditemukan dalam susu dan keju) dapat mencegah senyawa ini dari yang diserap besi.

f. Hubungan Antara Pola Asupan Makanan Dengan Kejadian Anemia

Sumber energi utama untuk kebutuhan sel dan jaringan tubuh adalah pembentukan karbohidrat. Sistem saraf dan eritrosit adalah dua contoh jaringan yang secara eksklusif dapat menggunakan karbohidrat sebagai sumber energy (Restuti & Susindra, 2017)

(فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ ٢٧) (عبس/80:27)

Terjemahan : *Lalu, Kami tumbuhkan padanya biji-bijian ('Abasa/80:27)*

Tafsir : Allah menumbuhkan di bumi biji-bijian seperti gandum, padi, dan lain-lainnya yang menjadi makanan pokok.

Hubungan antara Q.S 'Abasa/80:27 dengan penelitian ialah : Nasi terbuat dari beras yang merupakan biji-bijian hasil bumi, selain beras ada gandum, jagung, dan lainnya. Di Indonesia beras adalah makanan pokok.

(Almatsier, 2009) menegaskan bahwa protein sangat penting untuk pergerakan zat besi ke seluruh tubuh. Oleh karena itu, kekurangan protein akan menghambat pengangkutan zat besi, sehingga terjadi defisiensi zat besi dan anemia. Selain itu, makanan dengan banyak protein, terutama yang berasal dari hewan, mengandung banyak zat besi.

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبًا ۖ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۚ ١٤) (النحل/16:14)

Terjemahan : *Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Yang dimaksud lautan di sini adalah perairan yang luas, baik tawar maupun asin, mencakup laut, danau, dan sungai yang luas. (An-Nahl/16:14)*

Tafsir Q.S An-Nahl/16:14 : Dijelaskan bahwa Dia yang telah mengendalikan lautan untuk manusia. Maksudnya ialah mengendalikan segala macam nikmat-Nya yang terdapat di lautan agar manusia dapat memperoleh makanan dari lautan itu berupa daging yang segar, yaitu segala macam jenis ikan yang diperoleh manusia dengan jalan menangkapnya. Penyerupaan ikan dengan daging yang segar agar dipahami bahwa yang boleh dimakan dari segala jenis ikan yang terdapat di dalam lautan itu ialah yang ditangkap dalam keadaan segar, meskipun binatang itu mati tanpa disembelih. Akan tetapi, apabila segala jenis ikan yang diperoleh itu dalam keadaan tidak segar, mati, apalagi telah membusuk, maka tidak boleh dimakan karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Yang dimaksud dengan binatang yang mati

di lautan ialah binatang yang mati dengan sendirinya atau karena sebab-sebab yang lain sehingga mengambang di permukaan air, bukan yang mati karena ditangkap oleh manusia.

Rasulullah bersabda:

Semua binatang laut yang mati karena kehabisan air makanlah dan semua binatang laut yang terdampar ke daratan dari lautan makanlah, tetapi binatang yang terapung di lautan janganlah dimakan. (Hadis dhaif riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Jabir)

Hubungan antara Q.S An Nahl:14 dengan penelitian ialah : ikan merupakan bahan makanan yang paling baik bagi manusia. Kelebihannya mengandung kadar protein tinggi, minyak ikan kaya akan vitamin A&B, Ikan merupakan sumber paling baik bagi kalsium.

Pemindahan zat besi ke dalam sel adalah salah satu dari banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh protein, sumber energi. Protein hewani merupakan jenis protein yang dapat meningkatkan transport dan penyerapan zat besi. Akibatnya, diet rendah protein hewani akan berdampak pada kadar hemoglobin darah (Sa, S., Of, A., & Ao, 2017)

Asupan protein rendah akibat tidak cukup makan lauk pauk, terutama yang mengandung produk hewani seperti ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. Dampak protein jaringan hewani pada penyerapan zat besi nonheme semakin meningkat. Namun, telah ditunjukkan bahwa putih telur dan kasein dan protein whey dalam susu sapi menghambat penyerapan zat besi. Penyerapan zat besi juga menurun oleh protein kedelai (Sa, S., Of, A., & Ao, 2017)

Unsur utama, zat besi, sangat penting untuk produksi hemoglobin selama proses pembuatan darah (hemopoiesis). Besi ekstra disimpan di hati, sumsum tulang belakang, limpa, dan otot sebagai protein feritin dan hemosiderin. Kebutuhan untuk produksi sel darah merah di sumsum tulang akan terpenuhi jika kadar zat besi cukup. Kondisi tersebut dikenal sebagai anemia gizi besi dan terjadi ketika cadangan zat besi tubuh menurun. Akibatnya, kadar hemoglobin turun di bawah kisaran normal.

Kebutuhan zat besi remaja putri meningkat selama menstruasi hingga 1,4 mg (Gibney, 2008)

Vitamin C merupakan enhancer utama bagi absorpsi zat besi pada vegetarian (Sa, S., Of, A., & Ao, 2017)

(وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩) (الانعام/6:99)

Terjemahan : *Dialah yang menurunkan air dari langit lalu dengannya Kami menumbuhkan segala macam tumbuhan. Maka, darinya Kami mengeluarkan tanaman yang menghijau. Darinya Kami mengeluarkan butir yang bertumpuk (banyak). Dari mayang kurma (mengurai) tangkai-tangkai yang menjuntai. (Kami menumbuhkan) kebun-kebun anggur. (Kami menumbuhkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman. (Al-An'am/6:99)*

Tafsir Q.S Al-An'am/6:99 : Allah adalah Dzat yang menurunkan hujan dari awan, lalu Dia mengeluarkan macam-macam tumbuhan yang berbeda di bumi. Dia mengeluarkan tumbuhan yang hijau dan segar, yang mana dari sebagian tumbuhan itu keluarlah biji yang tersusun satu sama lain seperti tangkai, dan dari mayang kurma (hal pertama yang tumbuh dari kurma) tangkai-tangkai yang hampir bisa diambil orang yang berdiri dan yang didik. Dia menumbuhkan kebun-kebun anggur, zaitun, dan delima yang ukuran dan warnanya hampir serupa, namun rasanya tidak serupa. Perhatikanlah buahnya saat tumbuhan itu berbuah, begitu juga perkembangannya, yang mana sesuai dengan dengan bentuknya

Hubungan antara Q.S Al An'am : 99 dengan penelitian ialah: buah zaitun adalah bahan makanan yang mengandung lemak yang tinggi, protein yang cukup, garam kapur, zat besi, fosfat, vitamin A,B,B Kompleks. Buah ini diambil minyaknya yaitu jenis minyak nabati paling baik kualitasnya, nilai gizinya yang tinggi, kalori yang besar, lemak tidak jenuh.

Dari hasil analisis chi-square dipedesaan didapatkan nilai $p = 0,024 < 0,05$, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian anemia. Sedangkan asupan protein, zat besi dan vitamin c menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan dengan kejadian anemia. Sedangkan Dari hasil analisis chi-square diperkotaan didapatkan nilai $p = > 0,05$, menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat, protein, zat besi dan vitamin c dengan kejadian anemia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Akib & Sumarmi, 2017). Berdasarkan Hasil penelitian terkait hasil analisis korelasi pearson antara asupan karbohidrat dari 21 orang responden diperoleh nilai $r=-0,022$ dengan arah negatif. Hasil uji statistik diperoleh nilai $P=0,925$ ($p>0,05$) sehingga tolak H_a atau terima H_o . Kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan kadar hemoglobin dan semakin tinggi kadar karbohidrat, maka kadar hemoglobin semakin rendah, begitupun sebaliknya

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Papatungan SR, dkk (2016)) dalam (Adhisti, Anindya Putri and Puruhita, 2011), menemukan bahwa konsumsi protein dan prevalensi anemia pada remaja putri berhubungan ($p=0,003$). Ketersediaan konstituen utama hemoglobin, protein besi dan vitamin C, sangat penting untuk produksinya.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Akib & Sumarmi, 2017) ada hubungan antara asupan protein dengan status anemia dan penelitian (Palupi & Dodik Arso Wibowo, 2017) bahwa ada hubungan antara asupan protein dengan status anemia.

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Zamzam Al Mousa dkk. di Kuwait dan penelitian (Adhisti, Anindya Putri and Puruhita, 2011). Temuan serupa dari penelitian ini ditemukan tidak ada hubungan antara kadar Hb dan konsumsi zat besi, asam folat, protein, vitamin A, dan vitamin C ($p > 0,05$). Produksi hemoglobin sangat dipengaruhi oleh konsumsi makanan, khususnya asupan zat besi. Karena tubuh masih mempertahankan simpanan zat besi di hati, konsumsi zat besi di bawah RDA tidak akan berdampak langsung pada kadar Hb. Kadar Hb akan turun segera setelah cadangan besi ini habis.

D. PEMBAHASAN (UJI PEMBEDA)

a. Kejadian Anemia

Berdasarkan Output “Test Statistic” Diketahui Bahwa Nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) Sebesar $0,026 < 0,05$. Maka Dapat Disimpulkan Bahwa “Hipotesis Diterima”. Dengan Demikian Dapat Dikatakan Bahwa Ada Perbedaan Antara Kejadian Anemia Siswi Di Sma Pedesaan Dengan Kejadian Anemia Siswi Di Sma Perkotaan.

Laporan "Statistik Uji" memperjelas apa itu nilai Asymp. (2-Tailed) Sig. 0,026 0,05 Maka, "Hipotesis Diterima", mungkin dikatakan. Akibatnya, ada kemungkinan untuk mengklaim bahwa ada perbedaan dalam prevalensi anemia pada siswa sekolah menengah perkotaan dan pedesaan.

Hemoglobin memainkan pekerjaan penting baik dalam mengangkut karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk pernafasan keluar dari tubuh dan membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh untuk konsumsi. Mekanisme ini dapat terganggu jika kadar hemoglobin terlalu rendah, meninggalkan tubuh dengan kadar oksigen rendah (hipoksia). Anemia sering memiliki prognosis yang sangat baik dan sering dapat diobati. Tingkat keparahan anemia, etiologi yang mendasarinya, dan kondisi umum pasien semuanya mempengaruhi prognosis. Serangan jantung dapat terjadi akibat anemia berat karena dapat menyebabkan kadar oksigen yang tidak mencukupi di jantung dan organ penting lainnya (Proverawati, 2011).

Menurut Adriani dan Wirjatmadi (2012), Zat besi merupakan komponen penting dalam pembentukan hemoglobin (Hb). Di dalam tubuh, zat besi, yang dapat ditemukan dalam bentuk hemoglobin, myoglobin, atau sitokrom, melakukan tugas-tugas yang terkait dengan transportasi, penyimpanan, dan penggunaan oksigen. Sebagian besar zat besi

yang dilepaskan selama pemecahan sel darah merah akan digunakan kembali untuk memenuhi permintaan produksi hemoglobin sebelum kekurangan tersebut perlu diatasi dan diisi ulang melalui makan. Jumlah zat besi yang dikonsumsi melalui makanan, jumlah yang diserap melalui sistem pencernaan, jumlah zat besi yang disimpan dalam jaringan ekskresi, dan kebutuhan tubuh, semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat gizi zat besi seseorang. (Adriani, M , Wijatmadi, B, 2012)

Tubuh mendapatkan zat besi dari tiga sumber berbeda: sistem pencernaan, zat besi diambil dari penyimpanan dalam tubuh, dan zat besi diperoleh melalui pemecahan sel darah merah (hemolisis). Pada individu yang khas, hemolisis menyumbang sekitar 20-25 mg zat besi yang mereka butuhkan setiap hari, sementara sekitar 1 mg berasal dari sumber lain dalam jumlah kecil. Orang dewasa diperkirakan hanya menyerap dan mengeluarkan sedikit zat besi setiap hari, antara 0,5 hingga 2,2 mg. Ada beberapa penyerapan di duodenum, tetapi hanya sedikit di ileum dan jejunum (Adriani, M , Wijatmadi, B, 2012)

b. Status Gizi

0,000 0,05 dan 0,026 0,05 adalah nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) dari output "Statistik Uji", diketahui. Kemudian, "Hipotesis Diterima," mungkin dikatakan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan status gizi siswa di sekolah menengah perkotaan dan siswa di sekolah menengah pedesaan.

Sistem pencernaan, zat besi yang diambil dari cadangan tubuh, dan zat besi yang diperoleh dari penghancuran sel darah merah adalah tiga sumber utama zat besi (hemolisis). Sekitar 20–25 mg kebutuhan zat besi harian untuk rata-rata orang datang

melalui hemolisis, sedangkan hanya sekitar 1 mg yang berasal dari sumber lain dalam kadar yang sedikit. Orang dewasa hanya menelan dan mengeluarkan antara 0,5 dan 2,2 miligram zat besi setiap hari, menurut perkiraan. Di ileum dan jejunum, penyerapannya sangat sedikit dibandingkan dengan duodenum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ratna, R.D., Dyah, U.P., dan Kusnandar, 2015) menunjukkan bahwa anak kelas V di SDN 1 Purwojati dan SD Santo Yosep memiliki status gizi yang berbeda dengan anak di perkotaan dan di pedesaan. Kebiasaan konsumsi makanan berbeda antara lokasi pedesaan dan perkotaan. Hal ini terlihat dari keadaan sosial ekonomi penduduk yang lebih terdidik dan mampu, aksesibilitas kesehatan dan sumber daya pendidikan yang memadai, ketersediaan tenaga kesehatan profesional, dan sektor bisnis di mana sebagian besar penduduk kota bekerja sebagai karyawan dan pemilik bisnis. Kondisi sosial ekonomi yang rendah, kurangnya kesempatan pendidikan, dan ketergantungan penduduk pada pertanian dan tenaga kerja manual, di sisi lain, menunjukkan bahwa pola makan penduduk pedesaan kurang dari kebutuhan gizi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Handayani, M.S., Cesilia, M.D., dan Hadi, R, 2013) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok pada BMI/U sampel di SMP perkotaan dan pedesaan dalam hal kualitas gizinya. Di SMP perkotaan, 76% sampel termasuk dalam kelompok normal, sedangkan 24% sisanya termasuk dalam kategori kelebihan berat badan. 92% SMP di daerah pedesaan termasuk dalam kelompok normal, dibandingkan dengan 6% untuk siswa kurus dan 2% untuk siswa yang kelebihan berat badan. Sebagian besar sampel memiliki status gizi yang dapat diterima, yang akan menyebabkan remaja tumbuh sebagaimana mestinya karena perkembangan tubuh yang sehat memerlukan nutrisi yang tepat.

i. c. Pola Menstruasi

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) $0,540 > 0,05$ berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola menstruasi siswa perempuan di SMA pedesaan dan siswa perempuan di SMA perkotaan adalah identik.

Siklus menstruasi rata-rata berlangsung antara 21 dan 35 hari, periode berlangsung antara 2 dan 8 hari, dan antara 20 dan 80 ml darah ditumpahkan setiap hari. Ketika siklus bulanan, panjang, dan volume darah tidak normal, kondisi ini disebut sebagai gangguan menstruasi. Siklus menstruasi biasanya berlangsung selama 28 hari. Siklus khas berlangsung 21 hingga 35 hari. Siklus menstruasi setiap wanita berbeda; lebih dari 90% wanita mengalami menstruasi yang berlangsung 25 hingga 35 hari, sementara sekitar 10% hingga 15% memiliki siklus yang berlangsung lebih dari 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur. Hari awal digunakan untuk menentukan lamanya siklus menstruasi, yang kemudian dihitung sampai hari akhir, yaitu satu hari sebelum menstruasi bulan berikutnya dimulai (Saryono, 2009)

ii. Pola Konsumsi Inhibitor Zat Besi

Laporan "Statistik Uji" memperjelas apa itu nilai Asymp. (2-Ekor) Sig. $0,159 > 0,05$ "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan frekuensi siswa di sekolah menengah perkotaan dan sekolah menengah pedesaan yang mengonsumsi inhibitor zat besi.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (AOLIA FEBRIANI ATMA W, 2019) Hal ini menghasilkan nilai $p 0,003$ yang menunjukkan bahwa ada perbedaan yang

signifikan antara remaja putri anemia dan non anemia di SDN Totosari dan SDN Tunggulsari I, II Surakarta dalam penggunaan inhibitor zat besi.

iii. d. Asupan Makanan

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) sebesar $0,327 > 0,05$ berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pola konsumsi karbohidrat siswa SMA di pedesaan dengan siswa SMA di perkotaan.

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) $0,874 > 0,05$ berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kebiasaan konsumsi protein siswa SMA dari pedesaan dan perkotaan.

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) sebesar $0,327 > 0,05$ berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pola konsumsi karbohidrat siswa SMA di pedesaan dengan siswa SMA di perkotaan.

Diketahui nilai Asymp. Tanda tangan. (2-Tailed) $0,874 > 0,05$ berdasarkan laporan "Statistik Uji". "Hipotesis ditolak" pada saat itu, bisa dikatakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kebiasaan konsumsi protein siswa SMA dari pedesaan dan perkotaan.

Pengangkut glukosa afinitas tinggi hadir di membran HR, itulah sebabnya ia sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi. Rute ATP melibatkan glikolisis,

yang menghasilkan laktat. Karena HR tidak memiliki mitokondria, tidak ada fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP. Keseimbangan ion dan air dipertahankan melalui sejumlah transporter di HR. Untuk mengontrol kapasitas pembawa oksigen HB, proses yang terhubung langsung ke glikolisis menghasilkan sintesis 2,3-bis fosfoglisarat (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)

Anemia hemolitik sering disebabkan oleh kurangnya aktivitas glukosa 6-fosfat dehidrogenase. Anemia hemolitik disebabkan oleh metabolisme sekitar 5-10% dari total aliran glukosa oleh jalur pentosa fosfat, yang bekerja dalam sel darah merah. Salah satu peran glutathione tereduksi (GSH), yang sangat penting untuk metabolisme HR, adalah untuk melawan efek peroksida yang berpotensi berbahaya. Untuk mengubah glutathion teroksidasi (G-S-S-G) kembali ke keadaan tereduksi, HR dapat menghasilkan GSH dan membutuhkan NADPH (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)

Besi dalam hemoglobin harus disimpan dalam bentuk besi, dan sitokrom b3 reduktase dan sitokrom b5 bekerja sama sebagai bagian dari sistem methemoglobin reduktase yang bergantung pada NADPH untuk mengubah besi besi menjadi besi besi. Glikogen, asam lemak, protein, dan asam nukleat tidak disintesis dalam sel darah merah (RBC), namun lipid membran tertentu, seperti kolesterol, dapat ditukar dengan lipid plasma yang sama (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)

Beberapa bentuk anemia hemolitik disebabkan oleh defisiensi enzim metabolisme nukleotida tertentu yang ditemukan dalam sel darah merah, seperti adenosine deaminase, pyrimidine nucleotidase, dan adenylyl kinase. Ketika sel darah merah mencapai akhir masa pakainya, globin dipecah menjadi asam amino, yang kemudian dapat digunakan

kembali oleh tubuh. Besi juga dibebaskan dari heme dan digunakan kembali, sedangkan komponen heme tetrapireol diubah menjadi bilirubin, yang terutama dieliminasi oleh empedu di usus besar (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)

Dalam hidroksilase yang mengandung besi yang terhubung ke -ketoglutarat, asam askorbat memainkan fungsi tertentu. In vitro, itu juga membuat sejumlah enzim lain lebih aktif, namun ini adalah aktivitas penurun non-spesifik. Selain itu, asam ini memiliki sejumlah tindakan non-enzimatik sebagai akibat dari perannya sebagai agen pereduksi dan "pemadam" radikal oksigen (Robert K. Murray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell)

Amida terminal karboksi yang dihasilkan dari residu glisin terminal terdapat dalam berbagai hormon peptida. Enzim yang mengandung tembaga peptidyl glycine hydroxylase meng hidroksilasi glisin ini pada -karbon dan sekali lagi membutuhkan askorbat untuk menurunkan Cu^{2+} . Namun, menurut beberapa orang menambahkan, keberadaan vitamin C di usus inilah yang menyebabkannya meningkatkan penyerapan zat besi (Robert K. Muray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara pola konsumsi inhibitor zat besi dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara asupan karbohidrat dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara asupan protein dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Tidak terdapat hubungan antara asupan vitamin c dengan kejadian anemia pada siswi sma perkotaan dan siswi sma pedesaan kabupaten bone tahun 2022
- Status gizi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan terdapat perbedaan keduanya
- Pola menstruasi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya
- Pola konsumsi inhibitor zat besi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya

- Asupan karbohidrat pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya
- Asupan protein pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya
- Asupan zat besi pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya
- Asupan vitamin c pada siswi di perkotaan dan siswi di pedesaan tidak terdapat perbedaan keduanya
- Kualitas makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Al-Qur'an adalah halal dan tayyib. Dengan kuantitas yang baik, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, serta memiliki pengaruh yang baik dan aman untuk dikonsumsi.

B. Saran

- Dilakukan kerjasama dengan petugas kesehatan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan Lila, berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan kadar hemoglobin secara berkala agar dapat melihat dengan pasti status gizi siswi putri
- Harus lebih memperhatikan lagi makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari.
- Perlunya penyuluhan yang menyeluruh tentang anemia kepada petugas kesehatan
- Bagi peneliti selanjutnya harus lebih mempelajari lagi tentang perbedaan kejadian anemia di pedesaan dan diperkotaan baik pengetahuan tentang anemia, pola makan dan bisa juga memperhatikan tentang konsumsi tablet tambah darahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisti, Anindya Putri and Puruhita, N. (2011). Hubungan Status Antropometri Dan Asupan Gizi Dengan Kadar Hb Dan Ferritin Remaja Putri (*Penelitian pada remaja putri pondok pesantren At-Taqwa Semarang*). faculty of medicine.
- Adriani, M , Wijatmadi, B. (2012). *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana
- Akib, A., & Sumarmi, S. (2017). Kebiasaan Makan Remaja Putri yang Berhubungan dengan Anemia : Kajian Positive Deviance Food Consumption Habits of Female Adolescents Related to Anemia: A Positive Deviance Approach. *Amerta Nutrition*, 1(2), 105–116. <https://doi.org/10.20473/amnt.v1.i2.2017.105-116>
- Alexander, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri Di Sekolah Smpn 09 Pontianak Tahun 2019. *Jurnal_Kebidanan*, 9(2), 394–403. https://doi.org/10.33486/jurnal_kebidanan.v9i2.84
- Almatsier, S. (2009). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT Gramedia.
- Almatsier, S. (2009). *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Angelina, C., Siregar, D. N., Siregar, P. S., & Anggeria, E. (2020). Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Keperawatan Priority*, 3(1), 99–106.
- Anggoro, S. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Anemia pada Siswi SMA. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 10(3), 341–350.
- Aolia Febriani Atma W. (2019). *Perbedaan Kebiasaan Konsumsi Susu Dan Asupan Kalsium (Ca) Antara Remaja Anemia Dan Non Anemia Di Sdn Totosari Dan Sdn Tunggulsari I, Ii Di Surakarta*. SURAKARTA: FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- Astiandani, Ari and Rokhanawati, Dewi . (2015). *Hubungan Kejadian Anemia dengan Prestasi Belajar Matematika pada Remaja Putri Kelas 11 di SMAN 1 Sedayu*. yogyakarta: STIKES 'Aisyiyah.
- Fikawati, S., Syafiq, A., & Veratamala, A. (2017). *Buku gizi anak dan remaja*.
- Gallagher ML. . (2008). *The Nutrients and Their Metabolism*. In: *Mahan LK, Escott Stump.S. Krause's Food, Nutrition, and Diet Therapy. 12th edition*. Philadelphia: Saunders.
- Handayani, M.S., Cesilia, M.D., dan Hadi, R. (2013). Hubungan Komposisi Tubuh dan Status Gizi dengan Perkembangan Seksual Pada Remaja Putri di Perkotaan dan Pedesaan. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 8(6)..
- Arisman, M. (2010). *Gizi dalam Daur Kehidupan*. EGC.

- Astiandani, Ari and Rokhanawati, Dewi . (2015). *Hubungan Kejadian Anemia dengan Prestasi Belajar Matematika pada Remaja Putri Kelas 11 di SMAN 1 Sedayu*. Yogyakarta: STIKES 'Aisyiyah
- Ayuningtyas, I. N., Tsani, A. F. A., Candra, A., & Dieny, F. F. (2022). Analisis Asupan Zat Besi Heme Dan Non Heme, Vitamin B12 Dan Folat Serta Asupan Enhancer Dan Inhibitor Zat Besi Berdasarkan Status Anemia Pada Santriwati. *Journal of Nutrition College*, 11(2), 171–181. <https://doi.org/10.14710/jnc.v11i2.32197>
- Badriah Dewi L. (2014). *Gizi dalam kesehatan reproduksi*. Refika Aditama.
- Candranita, M. dan I. A. (2009). *Gadar Obstetri & Ginekologi & Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. EGG.
- Chaparro, C. M., & Suchdev, P. S. (2019). Anemia epidemiology, pathophysiology, and etiology in low- and middle-income countries. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1450(1), 15–31. <https://doi.org/10.1111/nyas.14092>
- Corwin, E. J. (2009). *Handbook of Pathophysiology, 3rd Ed.* EGC.
- Dengan, B., Anemia, K., & Remaja, P. (2019). 1, 2. 10(1), 1–11.
- Departemen Kesehatan. (2007). *Penilaian Status Gizi*.
- Desmita. (2010). *Psikologi perkembangan peserta didik*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Dewi, R. M. M. Y. S. dan M. (2020). *Karakteristik dan Prevalensi Anemia pada Mahasiswi D IV Kebidanan Reguler B Tingkat III Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Tahun 2019* [Poltekkes Kemenkes Yogyakarta]. <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/id/eprint/2349>
- Diananda, A. (2018). Psikologi remaja dan permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1, 1.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. (2019). *Anemia pada Remaja Putri*.
- Djiwandono, S. E. (2006). *Psikologi Pendidikan*. Grasindo.
- Energi, P. A., Dan, K., Gizi, S., Negeri, S. M. P., & Negeri, S. M. P. (2013). *Journal of Nutrition College*, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, Halaman Online di: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jnc.2>, 232–241.
- Fikawati, S., Syafiq, A., & Veratamala, A. (2017). *Buku gizi anak dan remaja*
- Firdhayani. (2010). *Gambaran Asupan Makanan Dengan Kadar HB Dengan Prestasi Belajar Siswi SMP Negeri 20 Makassar*. universitas islam negeri alauddin makassar.
- Gallagher ML. . (2008). *The Nutrients and Their Metabolism*. In: Mahan LK, Escott Stump.S. *Krause's Food, Nutrition, and Diet Therapy. 12th edition*. Philadelphia: Saunders.

- Gibney. (2008). *Gizi Kesehatan Masyarakat*. ECG.
- Gibson, R. S. (2005). *Principles of nutritional assessment*. Oxford University Press Inc.
- Handayani, M.S., Cesilia, M.D., dan Hadi, R. (2013). Hubungan Komposisi Tubuh dan Status Gizi dengan Perkembangan Seksual Pada Remaja Putri di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 8(6).
- Hasyim, dzul istiqomah. (2018). Pengetahuan, sosial ekonomi, pola makan, pola haid, status gizi dan aktivitas fisik dengan kejadian anemia pada remaja putri. *Jurnal Keperawatan Dan Kebidanan Aisyiyah*, 14(1), 06–14.
- Herwandar, F. R., & Soviyati, E. (2020). Perbandingan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Premenarche Dan Postmenarche Di Desa Ragawacana Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 11(1), 71–82. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v11i1.154>
- Ina, A. S., Yulifah, R., & Susmini. (2018). Hubungan Ukuran Lingkar Lengan Atas Dengan Kejadian Anemia Pada Mahasiswa Di Asrama Putri Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang. *Nursing News*, 3(3), 748–757.
- Indonesia, K. K. R. (2018). *Anemia pada remaja putri*.
- Jamingatu, A. (2011). *Menstruasi dan Permasalahannya*. Pustaka Panasea.
- Kedokteran, F., & Lampung, U. (2020). *Wellness and healthy magazine*. 2(February), 187–192.
- Kemenkes Republik Indonesia. (2019). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2019*.
- Kementerian Kesehatan. (2017). *Status Gizi*.
- Kementrian Kesehatan. (2018). *Penanggulangan Anemia*.
- Khobibah, Nurhidayati, T., Mimi, R., & Budi, A. (2020). Anemia Remaja Dan Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 3(2), 11–17.
- Kirana, D. P. (2011). Hubungan asupan zat gizi dan pola menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMAN 2 semarang. *Artikel Penelitian Fakultas Kedokteran Program Studi Ilmu Gizi*.
- Luth Ririaprianty. (2020). *Gambaran pola konsumsi (inhibitor,enhancer,zat besi), aktivitas fisik dan asupan zat besi (FE) pada remaja putri dipulau barrang lombo kota makassar*. universitas hasanuddin.
- Marmi, R. dan. (2012). *Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak*. Pustaka Belajar.
- Masthalina, H. (2015). Pola Konsumsi (Faktor Inhibitor Dan Enhancer Fe) Terhadap Status

- Anemia Remaja Putri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 80.
<https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3516>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Angka Kecukupan Gizi*.
- Muliani, U. (2022). Perbedaan Asupan Protein, Fe, Vit B6, Vit C, Dan Status Kek Pada Remaja Putri Anemia Dan Non Anemia. *HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(2), 81–91. <https://doi.org/10.51878/healthy.v1i2.1115>
- Mutmainnah, Sitti Patimah, S. (2021). Hubungan kurang energi kronik (kek) dan wasting dengan kejadian anemia pada remaja putri di kabupaten majene 1,2,3. *Jurnal Kesehatan*, 1(5), 561–569.
- Mutmainnah, Sitti Patimah, & Septiyanti. (2021). Hubungan KEK dan Wasting dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di Kabupaten Majene. *Window of Public Health Journal*, February, 561–569. <https://doi.org/10.33096/woph.v1i5.184>
- Mutschler, E. (2010). *Dinamika Obat Farmakologi dan Toksikologi*. Penerbit ITB.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Rineka Cipta.
- Nurbaiti, N. (2019). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pencegahan Anemia pada Remaja Putri di SMA Negeri 4 Kota Jambi Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 84. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.552>
- Nursalam. (2013). *metodologi penelitian ilmu keperawatan*. salemba medika.
- Palupi, M., & Dodik Arso Wibowo. (2017). Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Energi Dan Zat Gizi (Protein Dan Fe) Terhadap Status Anemia Mahasiswi Akademi Gizi Karya Husada Kediri. *Hubungan Antara Tingkat Konsumsi Energi Dan Zat Gizi (Protein Dan Fe) Terhadap Status Anemia Mahasiswi Akademi Gizi Karya Husada Kediri*, 1240–1248.
- Profil Kesehatan Sulawesi Selatan. (2015). *No Title*.
- Proverawati, A. (2011). *Anemia Dan Anemia Kehamilan*. Nuha Medika.
- Puspikawati, S. I., Sebayang, S. K., Made, D., & Kurnia, S. (2021). Pendidikan Gizi tentang Anemia pada Remaja di Kecamatan Banyuwangi Jawa Timur Nutrition Education about Anemia in Adolescents in Banyuwangi District , East Java. *Media Gizi Kesmas*, 10(2), 278–283.
- Rahayu, A. Yulidasari F, Putri, A. . & A. (2019). *metode orkes-ku (raport sehatanku) dalam mengidentifikasi potensi kejadian anemia gizi pada remaja putri*.
- Rahmi, R. and Puspita, R. (2020). *Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi*. CV. Penerbit Qiara Media.

- Ratna, R.D., Dyah, U.P., dan Kusnandar. (2015). Perbedaan Status Gizi Dan Tingkat Kesegaran Jasmani Pada Anak Sekolah Dasar Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Kesmasindo*, 7(3): 237-243 .
- Restuti, A. N., & Susindra, Y. (2017). Hubungan Antara Asupan Zat Gizi Dan Status Gizi Dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 16(3), 74–80. <https://doi.org/10.25047/jii.v16i3.305>
- Riskesdas. (2013). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun (SDKI) 2012*. Jakarta Riset Kesehatan Dasar. (2018). *Prevalensi Anemia pada Remaja Putri di Indonesia*.
- Robert K. Muray , Daryl K. Granner , Victor W. Rodwell. (n.d.). *Biokimia Harper*. penerbit buku kedokteran EGC.
- Rudi, A., Masan, L., & Nara Kwureh, H. (2018). Determinan yang Mempengaruhi Kejadian Anemia pada Mahasiswi Kebidanan. *Jurnal Vokasi Kesehatan*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.30602/jvk.v4i1.81>
- Sa, S., Of, A., & Ao, O. (2017). Importance of Dietary Sources of Iron in Infants and Toddlers: Lessons from the FITS Study. *Nutrients*, 9(7), 733. 10.3390/nu9070733.
- Sarwono, S. (2011). *Psikologi Remaja*. PT. Raja Grafindo.
- Saryono. (2009). *Sindrom Premenstruasi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Satriani. (2018). *Analisis Determinan Anemia Pada Remaja Putri (15-18 tahun) Di Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto*. universitas hasanuddin
- Siahaan, Nahsty Raptauli; Siti Arifah Pujonarti, S. (2012). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Status anemia pada Remaja Putri di wilayah Kota Depok tahun 2011 (Analisis Data Sekunder Survey Anemia Remaja Putri Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2011)*. universitas indonesia.
- Siregar, aulia rahma. (2021). *analisis tingkat pengetahuan remaja putri terhadap anemia dikecamatan percut sei tuan*. universitas sumatera utara.
- Siregar, F. A. P. (2019). *Hubungan Status Gizi Dengan Kadar Hemoglobin Pada Remaja Putri Kelas Viii Di Smpn 3 Lubuk Pakam*. Poltekkes Medan.
- Suhariyati, S., Rahmawati, A., & Realita, F. (2020). Hubungan antara Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia pada Mahasiswi Prodi Sarjana Kebidanan Unissula Semarang. *Jurnal Akademi Baiturrahim Jambi*, 9(2), 195. <https://doi.org/10.36565/jab.v9i2.214>
- Supriasa, I., Dewa Nyoman, B. B. dan I. F. (2017). *Penilaian Status Gizi*. Penerbit Buku

Kedokteran.

Supariasa. (2002). *Penentuan Status Gizi*. EGC.

Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja. . (2002). *Obat-obat Penting : Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya*. Jakarta : PT.Gramedia.

Tika Handayani Putri. (2019). *Hubungan Citra Tubuh, Asupan Makanan, Aktivitas Fisik, dan Pengetahuan Gizi Seimbang dengan status gizi kurang pada remaja putri di SMAN 1 Painan kabupaten pesisir pantai selatan*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang.

Tjay, T. H. (2002). *Obat-Obat Penting*. Elek Media.

Usdeka Muliani. (2022). PERBEDAAN ASUPAN PROTEIN, FE, VIT B6, VIT C, DAN STATUS KEK PADA REMAJA PUTRI ANEMIA DAN NON ANEMIA. *HEALTHY : Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*.

Utomo, Gulit Danan Prasetyo and , Endang Nur Widyaningsih, S.ST., M.Si, Med. and , Mutalazimah, SKM., M. K. (2013). *Hubungan Antara Asupan Protein, Vitamin C, dan Kebiasaan Minum Teh Dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri di SMA Negeri 1 Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah*. Universitas muhammadiyah surakarta.

Utri, P. (2020). P Ola M Enstruasi D Engan T Erjadinya a Nemia P Ada R Emaja. *Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 314–327.

Who. (2022). *Adolescent health*.

Wiknjosastro. (2009). *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka.

Wiknjosastro, G. H. (2007). *Ilmu Kebidanan*. YBP-SP.

World Health Organization. (2011). *Prevalensi Anemia di Dunia*.

World Health Organization. (2013). *Worldwide Prefalance of Anemia : WHO Global Database on Anemia*. WHO Press.

Yosephin B, Darwis, Eliana, et al. (2019). *Buku Pegangan Petugas KUA Sebagai Konselor 1000 HPK Dalam Mengedukasi Calon Pengantin Menuju Bengkulu Bebas Stunting*. Cetakan Pe. CV BUDI UTAMA.


Yulaeka, Y. (2020). Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Mutiara Mahakam*, 8(2), 112–118. <https://doi.org/10.36998/jkmm.v8i2.108>

L

A

M

P



R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

N

Hasil Univariat Dan Bivariat

- Pedesaan

Usia

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 15 | 17 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
| | 16 | 30 | 36.1 | 36.1 | 56.6 |
| | 17 | 30 | 36.1 | 36.1 | 92.8 |
| | 18 | 6 | 7.2 | 7.2 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

Kelas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | X MIPA 1 | 19 | 22.9 | 22.9 | 22.9 |
| | X MIPA 2 | 15 | 18.1 | 18.1 | 41.0 |
| | X IPS | 17 | 20.5 | 20.5 | 61.4 |
| | XI MIPA 1 | 16 | 19.3 | 19.3 | 80.7 |
| | XI MIPA 2 | 9 | 10.8 | 10.8 | 91.6 |
| | XI IPS | 7 | 8.4 | 8.4 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_statusgizi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Underweight <18,5 | 31 | 37.3 | 37.3 | 37.3 |
| | Normal 18,5-22,9 | 28 | 33.7 | 33.7 | 71.1 |
| | Overweight 23-seterusnya | 24 | 28.9 | 28.9 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_KEK

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | KEK <23,5 | 49 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| | NORMAL >23,5 | 34 | 41.0 | 41.0 | 100.0 |
| Total | | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_HB

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Anemia < 12 g/dl | 47 | 56.6 | 56.6 | 56.6 |
| | Tidak Anemia > 12 g/dl | 36 | 43.4 | 43.4 | 100.0 |
| Total | | 83 | 100.0 | 100.0 | |

berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya)

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Normal | 42 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| | Tidak Normal | 41 | 49.4 | 49.4 | 100.0 |
| Total | | 83 | 100.0 | 100.0 | |

berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus menstruasi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Normal | 63 | 75.9 | 75.9 | 75.9 |
| | Tidak Normal | 20 | 24.1 | 24.1 | 100.0 |
| Total | | 83 | 100.0 | 100.0 | |

Susu

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|--|--|-----------|---------|---------------|--------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|
| Valid | Sering | 32 | 38.6 | 38.6 | 38.6 |
| | Jarang | 38 | 45.8 | 45.8 | 84.3 |
| | Tidak Pernah | 13 | 15.7 | 15.7 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

The

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sering | 67 | 80.7 | 80.7 | 80.7 |
| | Jarang | 13 | 15.7 | 15.7 | 96.4 |
| | Tidak Pernah | 3 | 3.6 | 3.6 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sering | 14 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
| | Jarang | 44 | 53.0 | 53.0 | 69.9 |
| | Tidak Pernah | 25 | 30.1 | 30.1 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Coklat

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sering | 73 | 88.0 | 88.0 | 88.0 |
| | Jarang | 10 | 12.0 | 12.0 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

- **Perkotaan**

Usia

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | 15 | 15 | 18.1 | 18.1 | 18.1 |
| | 16 | 28 | 33.7 | 33.7 | 51.8 |
| | 17 | 37 | 44.6 | 44.6 | 96.4 |
| | 18 | 3 | 3.6 | 3.6 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

Kelas

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | X MIPA 1 | 5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| | X MIPA 2 | 6 | 7.2 | 7.2 | 13.3 |
| | X IPS | 10 | 12.0 | 12.0 | 25.3 |
| | XI MIPA 1 | 20 | 24.1 | 24.1 | 49.4 |
| | XI MIPA 2 | 23 | 27.7 | 27.7 | 77.1 |
| | XI IPS | 19 | 22.9 | 22.9 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_statusgizi

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Underweight <18,5 | 22 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| | Normal 18,5-22,9 | 35 | 42.2 | 42.2 | 68.7 |
| | Overweight 23-seterusnya | 26 | 31.3 | 31.3 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_KEK

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | KEK <23,5 | 48 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| | NORMAL >23,5 | 35 | 42.2 | 42.2 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

kategori_HB

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|------------------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Anemia < 12 g/dl | 29 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| | Tidak Anemia > 12 g/dl | 54 | 65.1 | 65.1 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

**berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda
mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya)**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Normal | 43 | 51.8 | 51.8 | 51.8 |
| | Tidak Normal | 40 | 48.2 | 48.2 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

**berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus
menstruasi**

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Normal | 55 | 66.3 | 66.3 | 66.3 |
| | Tidak Normal | 28 | 33.7 | 33.7 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

Susu

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|
| Valid | Sering | 40 | 48.2 | 48.2 | 48.2 |
| | Jarang | 32 | 38.6 | 38.6 | 86.7 |
| | Tidak Pernah | 11 | 13.3 | 13.3 | 100.0 |
| | Total | 83 | 100.0 | 100.0 | |

The

| | | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid | Sering | 51 | 61.4 | 61.4 | 61.4 |
| | Jarang | 28 | 33.7 | 33.7 | 95.2 |
| | Tidak Pernah | 4 | 4.8 | 4.8 | 100.0 |
| Total | | 83 | 100.0 | 100.0 | |

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|-------|-------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| Usia | 15 | Count | 13 | 4 | 17 |
| | | % within kategori_HB | 27.7% | 11.1% | 20.5% |
| 16 | Count | 14 | 16 | 30 | |
| | | % within kategori_HB | 29.8% | 44.4% | 36.1% |
| 17 | Count | 17 | 13 | 30 | |
| | | % within kategori_HB | 36.2% | 36.1% | 36.1% |
| 18 | Count | 3 | 3 | 6 | |
| | | % within kategori_HB | 6.4% | 8.3% | 7.2% |
| Total | Count | 47 | 36 | 83 | |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Chi-Square Tests

ALAUDDIN
MAKASSAR

Asymptotic
Significance (2-
sided)

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 4.045 ^a | 3 | .257 |
| Likelihood Ratio | 4.223 | 3 | .238 |
| Linear-by-Linear Association | 1.095 | 1 | .295 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.60.

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Kelas | X MIPA 1 | Count | 11 | 8 | 19 |
| | | % within kategori_HB | 23.4% | 22.2% | 22.9% |
| | X MIPA 2 | Count | 9 | 6 | 15 |
| | | % within kategori_HB | 19.1% | 16.7% | 18.1% |
| | X IPS | Count | 10 | 7 | 17 |
| | | % within kategori_HB | 21.3% | 19.4% | 20.5% |
| | XI MIPA 1 | Count | 7 | 9 | 16 |
| | | % within kategori_HB | 14.9% | 25.0% | 19.3% |
| | XI MIPA 2 | Count | 8 | 1 | 9 |
| | | % within kategori_HB | 17.0% | 2.8% | 10.8% |
| | XI IPS | Count | 2 | 5 | 7 |
| | | % within kategori_HB | 4.3% | 13.9% | 8.4% |
| Total | | Count | 47 | 36 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|--------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | 7.253 ^a | 5 | .203 |
| Likelihood Ratio | 7.926 | 5 | .160 |
| Linear-by-Linear Association | .192 | 1 | .662 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.04.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| kategori_statusgizi | Underweight <18,5 | Count | 23 | 8 | 31 |
| | | % within kategori_HB | 48.9% | 22.2% | 37.3% |
| | Normal 18,5-22,9 | Count | 17 | 11 | 28 |
| | | % within kategori_HB | 36.2% | 30.6% | 33.7% |
| | Overweight 23-seterusnya | Count | 7 | 17 | 24 |
| | | % within kategori_HB | 14.9% | 47.2% | 28.9% |
| Total | Count | 47 | 36 | 83 | |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|---------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 11.454 ^a | 2 | .003 |
| Likelihood Ratio | 11.702 | 2 | .003 |
| Linear-by-Linear Association | 10.710 | 1 | .001 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.41.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| kategori_KEK | KEK <23,5 | Count | 36 | 13 | 49 |
| | | % within kategori_HB | 76.6% | 36.1% | 59.0% |
| | NORMAL >23,5 | Count | 11 | 23 | 34 |
| | | % within kategori_HB | 23.4% | 63.9% | 41.0% |
| Total | Count | 47 | 36 | 83 | |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|---------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 13.816 ^a | 1 | .000 | | |
| Continuity Correction ^b | 12.193 | 1 | .000 | | |
| Likelihood Ratio | 14.098 | 1 | .000 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .000 | .000 |
| Linear-by-Linear Association | 13.650 | 1 | .000 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.75.

b. Computed only for a 2x2 table

| | | | kategori_HB | | Total |
|--|--------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya) | Normal | Count | 28 | 14 | 42 |
| | | % within kategori_HB | 59.6% | 38.9% | 50.6% |
| | Tidak Normal | Count | 19 | 22 | 41 |
| | | % within kategori_HB | 40.4% | 61.1% | 49.4% |
| Total | | Count | 47 | 36 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 3.490 ^a | 1 | .062 | | |
| Continuity Correction ^b | 2.711 | 1 | .100 | | |
| Likelihood Ratio | 3.515 | 1 | .061 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .078 | .050 |
| Linear-by-Linear Association | 3.448 | 1 | .063 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.78.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|---|--------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus menstruasi | Normal | Count | 38 | 25 | 63 |
| | | % within kategori_HB | 80.9% | 69.4% | 75.9% |
| | Tidak Normal | Count | 9 | 11 | 20 |
| | | % within kategori_HB | 19.1% | 30.6% | 24.1% |
| Total | | Count | 47 | 36 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | 1.450 ^a | 1 | .228 | | |
| Continuity Correction ^b | .894 | 1 | .345 | | |
| Likelihood Ratio | 1.440 | 1 | .230 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .302 | .172 |
| Linear-by-Linear Association | 1.433 | 1 | .231 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.67.

b. Computed only for a 2x2 table

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
 Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|-------|--------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Susu | Sering | Count | 18 | 14 | 32 |
| | | % within kategori_HB | 38.3% | 38.9% | 38.6% |
| | Jarang | Count | 21 | 17 | 38 |
| | | % within kategori_HB | 44.7% | 47.2% | 45.8% |
| | Tidak Pernah | Count | 8 | 5 | 13 |
| | | % within kategori_HB | 17.0% | 13.9% | 15.7% |
| Total | | Count | 47 | 36 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|-------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | .158 ^a | 2 | .924 |
| Likelihood Ratio | .160 | 2 | .923 |
| Linear-by-Linear Association | .057 | 1 | .811 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.64.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|-------|--------------|----------------------|------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| Teh | Sering | Count | 39 | 28 | 67 |
| | | % within kategori_HB | 83.0% | 77.8% | 80.7% |
| | Jarang | Count | 7 | 6 | 13 |
| | | % within kategori_HB | 14.9% | 16.7% | 15.7% |
| | Tidak Pernah | Count | 1 | 2 | 3 |
| | | % within kategori_HB | 2.1% | 5.6% | 3.6% |
| Total | | Count | 47 | 36 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|-------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | .772 ^a | 2 | .680 |
| Likelihood Ratio | .769 | 2 | .681 |
| Linear-by-Linear Association | .603 | 1 | .438 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.30.

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Kopi | Sering | Count | 6 | 8 | 14 |
| | | % within kategori_HB | 12.8% | 22.2% | 16.9% |
| | Jarang | Count | 29 | 15 | 44 |
| | | % within kategori_HB | 61.7% | 41.7% | 53.0% |
| | Tidak Pernah | Count | 12 | 13 | 25 |
| | | % within kategori_HB | 25.5% | 36.1% | 30.1% |
| Total | Count | 47 | 36 | 83 | |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|--------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | 3.382 ^a | 2 | .184 |
| Likelihood Ratio | 3.398 | 2 | .183 |
| Linear-by-Linear Association | .006 | 1 | .940 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.07.

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|--------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Coklat | Sering | Count | 40 | 33 | 73 |
| | | % within kategori_HB | 85.1% | 91.7% | 88.0% |
| | Jarang | Count | 7 | 3 | 10 |
| | | % within kategori_HB | 14.9% | 8.3% | 12.0% |
| Total | Count | 47 | 36 | 83 | |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .828 ^a | 1 | .363 | | |
| Continuity Correction ^b | .325 | 1 | .569 | | |
| Likelihood Ratio | .856 | 1 | .355 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .502 | .288 |
| Linear-by-Linear Association | .818 | 1 | .366 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.34.

b. Computed only for a 2x2 table

- Perkotaan

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|-------|----|----------------------|------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| Usia | 15 | Count | 8 | 7 | 15 |
| | | % within kategori_HB | 27.6% | 13.0% | 18.1% |
| 16 | | Count | 8 | 20 | 28 |
| | | % within kategori_HB | 27.6% | 37.0% | 33.7% |
| 17 | | Count | 12 | 25 | 37 |
| | | % within kategori_HB | 41.4% | 46.3% | 44.6% |
| 18 | | Count | 1 | 2 | 3 |
| | | % within kategori_HB | 3.4% | 3.7% | 3.6% |
| Total | | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 2.838 ^a | 3 | .417 |
| Likelihood Ratio | 2.738 | 3 | .434 |
| Linear-by-Linear Association | 1.140 | 1 | .286 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.05.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|-------|-----------|----------------------|---------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| Kelas | X MIPA 1 | Count | 1 | 4 | 5 |
| | | % within kategori_HB | 3.4% | 7.4% | 6.0% |
| | X MIPA 2 | Count | 1 | 5 | 6 |
| | | % within kategori_HB | 3.4% | 9.3% | 7.2% |
| | X IPS | Count | 5 | 5 | 10 |
| | | % within kategori_HB | 17.2% | 9.3% | 12.0% |
| | XI MIPA 1 | Count | 5 | 15 | 20 |
| | | % within kategori_HB | 17.2% | 27.8% | 24.1% |
| | XI MIPA 2 | Count | 9 | 14 | 23 |
| | | % within kategori_HB | 31.0% | 25.9% | 27.7% |
| | XI IPS | Count | 8 | 11 | 19 |
| | | % within kategori_HB | 27.6% | 20.4% | 22.9% |
| Total | | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | Df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|--------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | 3.846 ^a | 5 | .572 |
| Likelihood Ratio | 3.994 | 5 | .550 |
| Linear-by-Linear Association | 1.112 | 1 | .292 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.75.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| kategori_statusgizi | Underweight <18,5 | Count | 12 | 10 | 22 |
| | | % within kategori_HB | 41.4% | 18.5% | 26.5% |
| | Normal 18,5-22,9 | Count | 13 | 22 | 35 |
| | | % within kategori_HB | 44.8% | 40.7% | 42.2% |
| | Overweight 23-seterusnya | Count | 4 | 22 | 26 |
| | | % within kategori_HB | 13.8% | 40.7% | 31.3% |
| Total | | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|--------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | 8.169 ^a | 2 | .017 |
| Likelihood Ratio | 8.593 | 2 | .014 |
| Linear-by-Linear Association | 8.029 | 1 | .005 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.69.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total | |
|--------------|--------------|----------------------|------------------------|--------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | | |
| kategori_KEK | KEK <23,5 | Count | 23 | 25 | 48 |
| | | % within kategori_HB | 79.3% | 46.3% | 57.8% |
| | NORMAL >23,5 | Count | 6 | 29 | 35 |
| | | % within kategori_HB | 20.7% | 53.7% | 42.2% |
| Total | | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|--------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | 8.433 ^a | 1 | .004 | | |
| Continuity Correction ^b | 7.133 | 1 | .008 | | |
| Likelihood Ratio | 8.885 | 1 | .003 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .005 | .003 |
| Linear-by-Linear Association | 8.331 | 1 | .004 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.23.

b. Computed only for a 2x2 table

| | | kategori_HB | | |
|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | Total |
| berapakah siklus menstruasi anda(dihitung dari awal anda mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya) | Normal | Count 14 | Count 29 | Count 43 |
| | | % within kategori_HB 48.3% | % within kategori_HB 53.7% | % within kategori_HB 51.8% |
| mendapat menstruasi sampai menstruasi berikutnya) | Tidak Normal | Count 15 | Count 25 | Count 40 |
| | | % within kategori_HB 51.7% | % within kategori_HB 46.3% | % within kategori_HB 48.2% |
| Total | | Count 29 | Count 54 | Count 83 |
| | | % within kategori_HB 100.0% | % within kategori_HB 100.0% | % within kategori_HB 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) | Exact Sig. (2- sided) | Exact Sig. (1- sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|--|--------------------------|--------------------------|
| Pearson Chi-Square | .223 ^a | 1 | .637 | | |
| Continuity Correction ^b | .058 | 1 | .809 | | |
| Likelihood Ratio | .223 | 1 | .637 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .653 | .404 |
| Linear-by-Linear Association | .220 | 1 | .639 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.98.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|---|--------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| berapa lama anda mendapat menstruasi dalam 1x siklus menstruasi | Normal | Count | 18 | 37 | 55 |
| | | % within kategori_HB | 62.1% | 68.5% | 66.3% |
| | Tidak Normal | Count | 11 | 17 | 28 |
| | | % within kategori_HB | 37.9% | 31.5% | 33.7% |
| Total | | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .351 ^a | 1 | .554 | | |
| Continuity Correction ^b | .122 | 1 | .727 | | |
| Likelihood Ratio | .348 | 1 | .555 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .629 | .361 |
| Linear-by-Linear Association | .347 | 1 | .556 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.78.

b. Computed only for a 2x2 table

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|------|--------------|----------------------|------------------|------------------------|-------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Susu | Sering | Count | 14 | 26 | 40 |
| | | % within kategori_HB | 48.3% | 48.1% | 48.2% |
| | Jarang | Count | 11 | 21 | 32 |
| | | % within kategori_HB | 37.9% | 38.9% | 38.6% |
| | Tidak Pernah | Count | 4 | 7 | 11 |
| | | % within kategori_HB | 13.8% | 13.0% | 13.3% |

| | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------|--------|
| Total | Count | 29 | 54 | 83 |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | .014 ^a | 2 | .993 |
| Likelihood Ratio | .014 | 2 | .993 |
| Linear-by-Linear Association | .002 | 1 | .966 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.84.

Crosstab

| | | kategori_HB | | Total |
|--------------|----------------------|------------------|------------------------|--------|
| | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Teh Sering | Count | 17 | 34 | 51 |
| | % within kategori_HB | 58.6% | 63.0% | 61.4% |
| Jarang | Count | 11 | 17 | 28 |
| | % within kategori_HB | 37.9% | 31.5% | 33.7% |
| Tidak Pernah | Count | 1 | 3 | 4 |
| | % within kategori_HB | 3.4% | 5.6% | 4.8% |
| Total | Count | 29 | 54 | 83 |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) |
|------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|
| Pearson Chi-Square | .464 ^a | 2 | .793 |
| Likelihood Ratio | .470 | 2 | .790 |
| Linear-by-Linear Association | .027 | 1 | .869 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.40.

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Kopi | Sering | Count | 6 | 11 | 17 |
| | | % within kategori_HB | 20.7% | 20.4% | 20.5% |
| | Jarang | Count | 10 | 22 | 32 |
| | | % within kategori_HB | 34.5% | 40.7% | 38.6% |
| | Tidak Pernah | Count | 13 | 21 | 34 |
| | | % within kategori_HB | 44.8% | 38.9% | 41.0% |
| Total | Count | 29 | 54 | 83 | |
| | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |

Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2- sided) |
|------------------------------|-------------------|----|--|
| Pearson Chi-Square | .355 ^a | 2 | .837 |
| Likelihood Ratio | .356 | 2 | .837 |
| Linear-by-Linear Association | .103 | 1 | .748 |
| N of Valid Cases | 83 | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Crosstab

| | | | kategori_HB | | Total |
|--------|--------|----------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| | | | Anemia < 12 g/dl | Tidak Anemia > 12 g/dl | |
| Coklat | Sering | Count | 19 | 39 | 58 |
| | | % within kategori_HB | 65.5% | 72.2% | 69.9% |
| | Jarang | Count | 10 | 15 | 25 |
| | | % within kategori_HB | 34.5% | 27.8% | 30.1% |
| | Total | Count | 29 | 54 | 83 |
| | | % within kategori_HB | 100.0% | 100.0% | 100.0% |


Chi-Square Tests

| | Value | df | Asymptotic Significance (2-sided) | Exact Sig. (2-sided) | Exact Sig. (1-sided) |
|------------------------------------|-------------------|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Pearson Chi-Square | .403 ^a | 1 | .526 | | |
| Continuity Correction ^b | .147 | 1 | .701 | | |
| Likelihood Ratio | .399 | 1 | .528 | | |
| Fisher's Exact Test | | | | .618 | .348 |
| Linear-by-Linear Association | .398 | 1 | .528 | | |
| N of Valid Cases | 83 | | | | |

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.73.

b. Computed only for a 2x2 table

A. Hasil Uji Wilcoxon




| | | Ranks | | |
|----------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| IMT - HB | Negative Ranks | 0 ^a | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 166 ^b | 83.50 | 13861.00 |
| | Ties | 0 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

a. IMT < HB

b. IMT > HB

c. IMT = HB



| | | Ranks | | |
|-----------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
| LILA - HB | Negative Ranks | 0 ^a | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 166 ^b | 83.50 | 13861.00 |
| | Ties | 0 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

a. LILA < HB

b. LILA > HB

c. LILA = HB

Test Statistics^a

| IMT - HB | |
|------------------------|----------------------|
| Z | -11.175 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Test Statistics^a

| LILA - HB | |
|------------------------|----------------------|
| Z | -11.176 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. Based on negative ranks.

Ranks


| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|--------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| K - HB | Negative Ranks | 0 ^a | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 166 ^b | 83.50 | 13861.00 |
| | Ties | 0 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

- a. K < HB
- b. K > HB
- c. K = HB

Ranks

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|--------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| P - HB | Negative Ranks | 0 ^a | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 166 ^b | 83.50 | 13861.00 |
| | Ties | 0 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

- a. P < HB
- b. P > HB
- c. P = HB



Test Statistics^a

| P - HB | |
|------------------------|----------------------|
| Z | -11.175 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Test Statistics^a

| K - HB | |
|------------------------|----------------------|
| Z | -11.175 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Ranks

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| ZB - HB | Negative Ranks | 0 ^a | .00 | .00 |
| | Positive Ranks | 166 ^b | 83.50 | 13861.00 |
| | Ties | 0 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

- a. ZB < HB
b. ZB > HB
c. ZB = HB

Ranks

| | | N | Mean Rank | Sum of Ranks |
|---------|----------------|------------------|-----------|--------------|
| VC - HB | Negative Ranks | 121 ^a | 89.07 | 10777.50 |
| | Positive Ranks | 44 ^b | 66.31 | 2917.50 |
| | Ties | 1 ^c | | |
| | Total | 166 | | |

- a. VC < HB
b. VC > HB
c. VC = HB

Test Statistics^a

| VC - HB | |
|------------------------|---------------------|
| Z | -6.395 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on positive ranks.

Test Statistics^a

| ZB - HB | |
|------------------------|----------------------|
| Z | -11.175 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | .000 |

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

