

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL CARE PADA NY ‘S’  
GESTASI 40 - 42 MINGGU DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TAHUN 2022**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya  
Diploma Kebidanan Di Universitas Islam Negeri  
(UIN) Alauddin Makassar**

**Oleh**

**NUR AENUN ALWI  
NIM: 70400119028**

**JURUSAN DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Aenun Alwi

Nim :70400114053

Tempat,Tanggal Lahir: Maros, 17 Agustus 1998

Jurusan/Prodi : Kebidanan

Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Diploma

Alamat : Antang Perum. Gubernuran C4 No.1

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya tulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa Karya Tulis Ilmiah ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.



Samata-Gowa, 30 Oktober 2022

Penyusun,

**Nur Aenun Alwi**  
**70400119028**


## PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nur Aenun Alwi  
Nim : 70400119028  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny "S"  
Dengan Gestasi 40 Minggu 5 Hari Dengan Persalinan Normal Di  
Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 7 Juli 2022


Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, 25 Oktober 2022

Pembimbing I

  
Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb  
NIP : 1989032820190320118

Pembimbing II

  
Anieq Mumthi'ah Al kautsar, S.ST., M.Keb  
NIP : 198901162019032009

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Fisiologi Pada Ny “S” Dengan Gestasi 40 Minggu 5 Hari Dengan Persalinan Normal Di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 7 Juli 2022”, yang disusun oleh Nur Aenun Alwi 70400119028. Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 4 Oktober 2022, bertepatan dengan Tanggal 8 Rabiul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 4 Oktober 2022  
8 Rabiul Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Firdayanti, S.SiT,M.Keb	(.....)
Pembimbing 1	: Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb	(.....)
Pembimbing 2	: Anieq Mumthi'ah Al kautsar, S.ST., M.Keb	(.....)
Penguji 1	: A. Dian Diarfah, S.Psi., M.Psi, Psikolog	(.....)
Penguji 2	: Rahmi Damis, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas keadirat Allah SWT. Atas segala ramat dan karunia-Nya, seingga penulis dapat menyelesaikan proposal KTI ini yang ber judul ‘‘Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Dengan Asuan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar’’ dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

KTI ini diajukan kepada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebaga persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan DIII Kebidanan danmendapat gelar Ahli Madya Kebidanan.

Dalam penyelesaian KTI ini, penulis mendapat bimbingan dari berbagai pihak Untuk itu terucap rasa syukur tak terhingga oleh penulis dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.Dselaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
2. Ibu Dr. dr.Syatirah, S.Ked.,M.Kes., SpA selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Firdayanti, S.Si.T.,M.Keb selaku ketua Prodi Kebidanan Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar.
4. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST.,M.Keb selaku pembimbing I yang senantiasa membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan membimbing dengan sabar dan

ikhlas.

5. Ibu Anieq Mumthi'ah Al kautsar S.ST.,M.Keb selaku pembimbing II yang telah banyak menyempatkan waktu untuk membimbingku dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu Andi Dian Diarfah, M.Psi., Psikolog selaku penguji I yang telah banyak membagikan ilmu kepada saya, memberi kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Ibu Rahmi Damis, M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar program studi kebidanan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan kebidanan.
9. Direktur Puskesmas Bara-Baraya Makassar dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian hingga selesai.
10. Ucapan yang tak ternilai harganya untuk Ayahanda Andi Muh. Alwi Spd.i dan Ibunda Kurniati, kakak dan adik tercinta atas doa, support, motivasi dan pengorbannya yang telah memberikan bantuan dukungan dalam bentuk material dan moral.
11. Kepada seluruh teman-temanku di kebidanan yang selalu memberikan semangat, saran serta masukan khususnya angkatan 2019.

Niat baik datang dari hati dan hasil baik pasti akan didapatkan, dari Umar radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "*Innamal a'malu bin niyyah*" (sesungguhnya amal itu tergantung niat), kalimat ini selalu membimbing penulis untuk lebih Semangat, walaupun proses penulisan KTI ini masih sangat kurang sempurna, masih banyak kendala dan kesalahan, namun saya berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan memudahkan penulis untuk menyelesaikannya. Akhir kata penulis mengucapkan Jazakallah, semoga penulisan ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, Allahumma Amin.

Samata-Gowa, Oktober 2022

Penulis,

**NUR AENUN ALWI**  
**70400119028**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN KTI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Dasar Persalinan.....	9
1. Definisi Persalinan.....	9
2. Patofisiologi Persalinan.....	11
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan.....	12
4. Tahapan Persalinan.....	16



a. Kala I (Pembukaan).....	16
1. Pengertian Kala I.....	16
2. Perubahan Fisiologi Pada Kala I .....	17
3. Perubahan Psikologis Kala I.....	19
4. Masalah Dan Penyulit Pada Kala I .....	19
5. Partograf .....	20
b. Kala II .....	26
1. Pengertian Kala II.....	26
2. Perubahan Fisiologi Kala II Persalinan.....	26
3. Tanda dan Gejala Kala II.....	27
4. Perubahan Psikologis Kala II.....	28
5. Mekanisme Persalinan Normal.....	29
6. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan.....	32
7. Komplikasi dan Penyulit Persalinan Kala II .....	38
c. Kala III .....	39
1. Pengertian Kala III .....	39
2. Tanda-Tanda Lepasnya Plasenta .....	39
3. Metode Pelepasan Plasenta.....	40
4. Pengeluaran Plasenta .....	41
5. Pemeriksaan Plasenta .....	41
6. Deteksi Dan Komplikasi Kala III .....	42
d. Kala IV .....	44
1. Pemeriksaan Serviks, Vagina Dan Perineum.....	44
2. Tanda Bahaya Kala IV .....	44

B. Teori Manajemen Kebidanan.....	45
<b>BAB III STUDI KASUS.....</b>	<b>50</b>
<b>KALA I.....</b>	<b>50</b>
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	50
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	55
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	61
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi .....	61
E. Langkah V. Rencana tindakan.....	61
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	63
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	64
<b>KALA II .....</b>	<b>65</b>
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	65
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	65
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	66
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi .....	66
E. Langkah V. Rencana tindakan.....	66
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	70
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	73
<b>KALA III .....</b>	<b>73</b>
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	73
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	73
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	74
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi .....	74


E. Langkah V. Rencana tindakan.....	74
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	76
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	77
KALA IV .....	78
A. Langkah I. Identifikasi data dasar.....	78
B. Langkah II. Identifikasi diagnosa/ masalah aktual.....	78
C. Langkah III. Identifikasi diagnosa/ masalah potensial.....	79
D. Langkah IV. Tindakan segera/ kolaborasi .....	79
E. Langkah V. Rencana tindakan.....	79
F. Langkah VI. Tindakan asuhan kebidanan.....	81
G. Langkah VII. Evaluasi asuhan kebidanan.....	82
KALA I.....	83
A. Data Subjektif .....	83
B. Data Objektif.....	84
C. Assesment .....	85
D. Planning .....	85
KALA II .....	87
A. Data Subjektif .....	87
B. Data Objektif.....	87
C. Assesment .....	88
D. Planning .....	88
KALA III .....	91
A. Data Subjektif .....	91
B. Data Objektif.....	92

C. Assesment .....	92
D. Planning .....	92
KALA IV .....	95
A. Data Subjektif .....	95
B. Data Objektif.....	95
C. Assesment .....	95
D. Planning .....	95
BAB IV PEMBAHASAN.....	110
BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA .....	138
RIWAYAT HIDUP.....	147




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Partograf kasus.....124



## DAFTAR TABEL

Tabel 2 Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his.....	93
Tabel 3 Observasi tanda-tanda vital, denyut jantung janin dan his.....	104
Tabel 4 Tanda-tanda vital pasca persalinan .....	121



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat permohonan izin penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Kepada Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan)
- Lampiran II : Surat permohonan izin penelitian dari Kepala Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) kepada Wali Kota Makassar Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga.
- Lampiran III : Surat izin rekomendasi penelitian dari Wali kota Makassar/Kepala Badan Kesbang Dan Politik Hubungan Antar Lembaga kepada Pemerintahan Kota Makassar Dinas Kesehatan.
- Lampiran IV : Surat izin penelitian dari Pemerintahan Kota Makassar Dinas Kesehatan.
- Lampiran V : Surat keterangan selesai penelitian dari Puskesmas Jumpang Baru Makassar.
- Lampiran VI : Daftar riwayat hidup



## ABSTRACT

MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER

NUR AENUN ALWI, 70400119028

Supervisor I : Zelna Yuni Andriyani

Supervisor II : Anieq Mumti'a Alkautsar

**“Intranatal Care Management for Mrs. “S” with the Gestational Period of 40-42 Weeks with Normal Delivery at Bara-Baraya Health Center of Makassar on July 7<sup>th</sup> 2022”**

---

---

Labor is the process of expelling the fetus at the proper time around 37-42 weeks. The process is expected to be spontaneous where no complications should be found during the delivery. During the labor, the uterus will continuously contract which may help the cervix open (dilate) and efface which will allow the fetus to move through the birth canal (Nurasih, Nurkholifah, 2017).

The major purpose of this scientific paper was to conduct Normal Delivery Midwifery Care to Mrs. “S” at Bara-Baraya Health Center of Makassar on July 7<sup>th</sup>, 2022. The method used was a case study where the treatment was given according to the patient’s needs under the authority of a midwife. The 7-stage of Hellen Varney midwifery care management and SOAP documentation procedure were employed in this study.

The findings of this study revealed that there were no particular problems found during the normal delivery of Mrs. “S”, an 18-year-old patient. In the process, a number of procedures were taken such as providing clean, safe and comfortable environment for the patient and preventing the patient from any complications, especially postpartum bleeding and newborn asphyxia. Besides, monitoring, caring, and evaluation were conducted from stage I to stage IV.

This study concluded that the treatments given to the patient were considered to be successful without any problems and complications. All the vital signs of both the mother and the baby were within normal limits.



## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH

**NUR AENUN ALWI, 70400119028**

**Pembimbing I : Zelna Yuni Andriyani**

**Pembimbing II : Anieq Mumti'a Alkautsar**

**‘Manajemen Asuhan Intranatal Care pada Ny. ‘S’ Gestasi 40-42 Minggu Dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tanggal 7 Juli 2022’**

---

---

Persalinan adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan, sekitar 37-42 minggu dan lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung tanpa adanya komplikasi. Selama persalinan, rahim akan berkontraksi dan mendorong bayi sehingga dorongan ini yang menyebabkan pembukaan lengkap, menyebabkan ibu melahirkan bayi (Nurasih, Nurkholifah, 2017).

Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk memberikan Asuhan Kebidanan Persalinan Normal pada Ny. ‘S’ di Puskesmas Bara-Baraya Makassar tanggal 7 Juli 2022. Metode yang digunakan adalah studi kasus sesuai dengan kebutuhan klien dan juga wewenang seorang bidan dengan menggunakan manajemen asuhan kebidanan 7 langkah berdasarkan Hellen Varney serta pendokumentasian SOAP.

Hasil dari studi kasus yang telah dilakukan pada Ny. ‘S’ usia 18 tahun dengan asuhan persalinan normal yakni tidak ditemukan masalah. Dalam penatalaksanaan asuhan persalinan normal dilakukan bersih aman dan nyaman serta melakukan upaya pencegahan komplikasi terutama perdarahan pasca persalinan pada ibu, asfiksia bayi baru lahir, serta dilakukan pemantauan dan asuhan dari kala I – kala IV.

Kesimpulan dari penelitian studi kasus yang diberikan pada Ny. ‘S’ dengan persalinan normal menggunakan manajemen asuhan 7 langkah varney serta pendokumentasian SOAP dari kala I – kala IV dilakukan dengan baik dan berlangsung normal tanpa adanya komplikasi atau masalah, ditandai dengan keadaan ibu dan bayi dan tanda-tanda vital dalam batas normal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Persalinan adalah serangkaian aktivitas pengeluaran janin dalam kondisi hamil cukup bulan yaitu sekitar 37-42 minggu dan lahir secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18-24 jam tanpa adanya komplikasi. Selama persalinan, rahim akan berkontraksi dan mendorong bayi sampai ke leher rahim. Sehingga dorongan ini yang menyebabkan pembukaan lengkap, dan dorongan ini menyebabkan ibu untuk melahirkan bayi (Nurasih, Nurkholifah, 2017).

Bersalin normal dijelaskan bahwa ada sebuah kejadian alam dimana terciptanya kehidupan baru, hal ini merupakan hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan seorang wanita, juga karena hal luar biasa ini yang membuat wanita mampu mengatasi perasaan ketakutan, kekhawatiran juga kegelisahan saat berhadapan dengan persalinan (Eun-Young Choi, dkk, 2015: 233).

Kesehatan selama kehamilan juga persalinan merupakan penyebab banyaknya wanita yang mengalami masalah serius. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) tahun 2018. Angka Kematian Ibu (AKI) di seluruh dunia pada tahun 2015 yaitu 216/100.000 kelahiran hidup. Hampir semua kematian ini (99%) terjadi di Negara yang berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) (WHO, 2018).

Di Asia Tenggara AKI tertinggi pada tahun 2015 terdapat di Negara Laos yaitu 357/100.000 kelahiran hidup, dan Indonesia merupakan negara kedua yang

sangat tinggi di Asia dengan 305/100.000. Jadi secara keseluruhan AKI di Negara ASEAN yaitu 197/100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018).

AKI di Indonesia sampai saat ini masih cukup tinggi dan merupakan salah satu masalah kesehatan yang belum tuntas. Berdasarkan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2017. Angka Kematian Ibu (AKI) Indonesia turun dari 4.999 kasus menjadi 879 kasus pada tahun 2016, dan naik lagi dengan 1712 kasus pada tahun 2017. Hasil survey Angka Kematian Ibu di Indonesia masih tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Tingginya AKI menunjukkan bahwa derajat kesehatan Indonesia masih belum baik (Kemenkes RI, 2015)

Tahun 2018 tercatat jumlah AKI di Provinsi Sulawesi Selatan ada 138 kasus. Keadaan tersebut masih sangat jauh dari target yang telah dicanangkan yakni 101 kasus dan terjadi peningkatan dari tahun 2017 sebanyak 37 kasus sehingga totalnya 108 kasus.

Distribusi penyebab kematian ibu karena perdarahan, hipertensi dan penyebab lain seperti penyakit jantung, ginjal, retensio urine, stroma, masalah pernapasan juga penyakit kongenital ada sebanyak 34 kasus. (Depkes Sul-Sel, 2018).

Informasi data rekam medik yang didapatkan di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, ditunjukkan bahwa sejumlah persalinan normal di tahun 2021 dimulai pada bulan Januari - Desember sebanyak 123 orang dengan persalinan normal.

Asuhan persalinan normal dirancang untuk memberikan kelangsungan hidup dan derajat kesehatan yang baik untuk ibu dan bayi dengan cara yang terpadu dan lengkap, namun melalui intervensi sehingga setiap intervensi yang akan diterapkan pada asuhan persalinan normal memiliki dasar pemikiran dan kemajuan ilmiah yang kuat dan sebagai bukti berhasilnya proses persalinan. (Aat Agustini, 2017).

Dalam rangka penerapan standar Asuhan Persalinan Normal (APN), dibutuhkan adanya ilmu dan kemampuan dengan demikian bisa menerapkan layanan yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan, satu dari keempatnya adalah diperlukannya bidan untuk ikut dalam pelatihan APN khususnya untuk yang tidak pernah ikut pelatihan tersebut.

Hal yang di percaya dan di ambil oleh semua organisasi kebidanan di seluruh dunia dan telah mendapat pengakuan *World Health Organization* dan *Federation of International Gynecologists Obstetricians* (FIGO) menurut *International Confederation of Midwives* (ICM): Bidan merupakan sebuah profesi yang diikuti dengan studi pendidikan kebidanan yang telah mendapatkan izin oleh negara dan diakui secara resmi dan telah menyelesaikan pendidikannya dan dinyatakan memenuhi standar dan berhak mendapatkan lisensi dalam melaksanakan praktik kebidanan. Merujuk pada penjelasan di atas, maka penulis memiliki ketertarikan dengan sebuah kasus yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Care Pada Ny “S” Gestasi 40-42 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar”.

## ***B. Rumusan Masalah***

Cakupan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh peneliti terkait Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny ‘S’ Gestasi 40-42 Minggu dengan Asuhan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar.

## ***C. Tujuan Penulisan***

### **1. Tujuan Umum**

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘S’ dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Dilaksanakan pengumpulan data dasar, pengkajian pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘S’ dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar.
- b. Dirumuskan identifikasi diagnosa atau masalah aktual pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘S’ dengan Persalinan Normal di Pusekesmas Bara-Baraya Makassar.
- c. Diidentifikasi diagnosa atau masalah potensial yang kemungkinan terjadi pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘S’ dengan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar.
- d. Diidentifikasi tindakan segera pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘S’ dengan persalinan normal di puseksmas bara-baraya Makassar.
- e. Ditetapkan standar penyusunan dan memberikan rumusan rencana tindakan asuhan yang menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan

Intranatal Pada Ny ‘‘S’’ dengan persalinan normal di puskesmas bara-baraya makassar.

- f. Dilakukan tindakan asuhan menyeluruh pada Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘‘S’’ dengan persalinan normal di puskesmas bara-baraya Makassar.
- g. Evaluasi efektivitas tindakan yang telah dilakukan Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘‘S’’ dengan persalinan normal di puskesmas bara-baraya Makassar.
- h. Dilakukan pendokumentasian hasil Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny ‘‘S’’ dengan persalinan normal di puskesmas bara-baraya Makassar.

#### ***D. Manfaat Penulisan***

1. Manfaat bagi penulis
  - a. Penulisan bisa menambah ilmu juga memperluas wawasan ketika memberikan asuhan kebidanan pada klien ketika bersalin.
  - b. Penulisan ini merupakan syarat saat ingin menyelesaikan pendidikan tingkat akhir dalam Program Studi D3 kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

#### **2. Manfaat Bagi Pembaca**

Dapat menambah pengetahuan juga ilmunya untuk pembacanya perihal asuhan kebidanan ketika bersalin.

#### **3. Manfaat Bagi Institusi**

Menjadi pedoman bagi mahasiswa kebidanan dalam rangka peningkatan

pengetahuan dan wawasan untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah.

#### 4. Manfaat Bagi Praktisi

Menjadi referensi terbaru untuk mendapatkan pembaharuan informasi sehingga angka mortalitas dapat ditekan peningkatannya juga dapat memberikan saran dalam peningkatan layanan kesehatan untuk klien dengan menerapkan manajemen asuhan kebidanan dalam bersalin normal.

### ***E. Metode Penulisan***

Penulisan ini menggunakan beberapa metode, seperti:

#### 1. Studi Kepustakaan

Dalam studi yang dilakukan pada banyak macam referensi buku, jurnal penelitian yang memiliki kaitan dengan proses bersalin normal yang merupakan acuan teori yang kiranya bisa dimanfaatkan untuk dibahas dalam proposal ini.

#### 2. Studi Kasus

Penulis melaksanakan penelitian dengan memakai pendekatan mekanisme manajemen asuhan kebidanan Helen Varney, langkah-langkahnya meliputi: mengidentifikasi data yang mendasari, mengidentifikasi diagnosis/permasalahan nyata, mengidentifikasi diagnosis/permasalahan potensial, melaksanakan kolaborasi dalam intervensinya, perencanaan asuhan/intervensi, mengimplementasi serta mengevaluasi hasil asuhan kebidanan yang diterapkan.

#### 3. Studi Dokumentasi

Ilmu yang diajarkan untuk mengetahui status klien, entah yang sumbernya

berasal dari arsip status pasien misalnya catatan bidan.

#### 4. Diskusi

Menghadirkan proses diskusi bersama ibu dan keluarga, melakukan tukar informasi bersama dosen pembimbing di tempat klinik serta pembimbing di kampus/institusi sehingga bisa memberikan bantuan dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah.

#### ***F. Sistematika Penulisan***

Mekanisme penulisan yang dipakai dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut yakni di bab 1 pendahuluan, yang membahas perihal bagaimana permasalahan itu muncul, rumusan masala, tujuan penulisan, manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai tinjauan teoritis, yang menjelaskan perihal bersalin normal, peninjuan dalam konsep islam yang berhubungan dengan manajemen asuhan persalinan normal, serta pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan normal.


Bab III membahas mengenai *case study*, yang pastinya akan diuraikan perihal beberapa proses varney yakni mengidentifikasi masalah utamanya, mengidentifikasi diagnosa/permasalahan nyata, mengidentifikasi diagnosa/permasalahan potensial, tindakan langsung juga kerja sama intervensi dan atau tindakannya, pengimplementasi juga proses evaluasi lalu melaksanakan dokumentasi (SOAP).

Bab IV yakni mengenai bahasan yang pastinya terkait dengan munculnya kesenjangan antara asuhan teoritis dan kebidanan, dan praktik dalam persalinan



intrapartum dan asuhan persalinan normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar dibandingkan.

Kesimpulan, saran dan rekomendasi, serta banyak penemuan dan pengetahuan baru yang diperoleh pada proses keperawatan yang di istilahkan dengan penutup yang disajikan dalam Bab 5. Kemudian muncul daftar pustaka berikutnya, bagian ini berisi pedoman ilmiah untuk digunakan sebagai referensi tertulis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Konsep Dasar Persalinan***

##### **1. Definisi persalinan**

Partus adalah serangkaian peristiwa yang terjadi setelah kelahiran bayi cukup bulan (37-42 minggu) atau mendekati aterm yang diikuti dengan pengeluaran plasenta dan selaput ketuban dari ibu atau kelahiran merupakan proses pelepasan variabel hasil konsepsi dengan cara jalan lahir normal (Dewi Setiawati), 2013:53).

Persalinan yaitu suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan diawali proses kontraksi uterus sehingga akan membuat terjadinya dilatasi progresif dari serviks, bayi lahir, keluarnya plasenta serta rangkaian demikian adalah kejadian alami (Rohani dalam Oktarina, 2016).

Persalinan yaitu serangkaian aktivitas terbukanya dan menipisnya serviks sehingga janin turun ke dalam jalan lahir lalu berakhir dengan pengeluaran bayi dengan cukup bulan atau hampir cukup bulan, dan disusul dengan pengeluaran plasenta serta selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri) (Mutmainnah, 2017).

Persalinan merupakan serangkaian peristiwa keluarnya bayi yang sudah cukup berada dalam rahim ibunya, dengan disusul oleh keluarnya plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu (Yuni & Widy, 2018).

Dari beberapa definisi yang diuraikan disimpulkan bahwasanya bersalin normal merupakan proses keluarnya janin yang sudah mencukupi bulannya

sehingga lahirlah bayi dengan spontan dengan presentasi belakang kepala, selanjutnya diikuti proses keluarnya plasenta serta selaput ketuban dalam tubuh ibunya tanpa adanya masalah pada ibu ataupun janinnya.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang kelahiran manusia adalah kehendak Allah swt, seperti dalam surat Q.S An- Nahl:16/78 tentang proses persalinan, berbunyi;

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, dan kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu dapat bersyukur”.

Ayat ini mengatakan bahwa sebagaimana kuasa Allah swt yang mengeluarkan.. kamu berdasarkan kuasa dan ilmunya dari perut ibu-ibu kamu sedang tadinya kamu tidak berwujud, demikian juga dia dapat mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Ketika dia mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibu kamu semua dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu dan satupun yang ada disekeliling kamu dan dia memberikan bagi kamu pendengaran, penglihatan-penglihatan dan hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kamu bersyukur dengan itu, dan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah swt, menganugerahkannya kepada kamu (Shihab M. Quraish, 2009).

Berdasarkan bunyi penjelasan diatas bahwa Allah swt maha kuasa untuk mengeluarkan seorang anak dari kandungan ibunya termasuk melindungi ibunya saat setelah melahirkan. Akan tetapi sebagai manusia tetap memerlukan perawatan secara mediss.

## 2. Patofisiologi Persalinan

### a. Tanda persalinan sudah dekat

Sebelum melahirkan, minggu-minggu sebelum seorang wanita memasuki "bulan" atau "minggunya", disebut tahap pertama. Ini memberikan tanda-tanda berikut:

#### 1) *Lightening*

Di minggu ke-36 yang disebut primipara, fundus uteri mengecil dikarenakan kepala bayi telah memasuki pintu di atas panggul dikarenakan: kontraksi Braxton Hicks, ketegangan otot, ketegangan pada ligamen sirkular, dan berat kepala bayi ke bawah.

#### 2) Munculnya hispermulaan

Semakin menua usia kehamilan, perkembangan bahan kimia progesteron dan estrogen makin sedikit dengan demikian hormon oksitosin menyebabkan banyak kontraksi yang diistilahkan dengan his palsu yaitu perasaan nyeri pada bagian bawah yang waktunya tidak beraturan, bagian *serviks* belum mengalami perubahan, waktunya sebentar, saat banyak berkegiatan belum bertambah (Ai Nursiah, dkk, 2014: 6).

### b. Tanda-tandapersalinan

- 1) Awal munculnya his bersalin adalah pembukaannya melalui sifat-sifat yang menyertainya: Nyeri mengelilingi pada bagian belakang menjalar ke depan bagian tengah, normal, semakin ditarik peregangan semakin terbatas dan semakin besar durasinya, saat berjalan malah akan semakin kuat dan berdampak pada perataan ataupun terbukanya *serviks* (Dewi Setiawati, 2013:54).

2) *Bloody show* (pengeluaran lendir dan darah melalui vagina)

Dengan mendasarinya, terjadi perubahan pada leher rahim yang menyebabkan pembukaan, cairan tubuh yang terkandung di dalam perut leher rahim akan dikeluarkan, pembuluh darah vena akan pecah, dan mengeluarkan sedikit darah (Ai Nursiah, dkk, 2014). : 7).

3) Dengan pembukaan

Cairan tubuh dari saluran serviks keluar bergabung dengan darah. Pengeluaran ini disebabkan oleh masuknya selaput janin pada bagian bawah rahim sehingga beberapa pembuluh darah terputus (Dewi Setiawati, 2013: 54).

4) Pengeluaran cairan

Hal ini muncul dikarenakan terpecahnya lapisan atau robekan selaput ketuban. Semua lapisan yang akan terpecah sebelum pembukaan penuh, namun kadang-kadang ketuban pecah dalam kondisi pembukaan yang awal, ini disebutnya pecah ketuban sebelum waktunya (KPD) (Dewi Setiawati, 2013: 54).

**3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan**

Keberhasilan proses bersalin sangat bisa dipengaruhi karena hal-hal berikut ini yakni ibu (tenaga, *passage*, mental), unsur janin, plasenta dan cairan ketuban (*passenger*), juga yang mendorong kejadian itu. Kejadian ini begitu penting, karena diketahui terdapat banyak masalah kematian ibu dan bayi baru lahir dikarenakan tidak adanya yang mengidentifikasi adanya salah satu dari unsur-unsur ini sejak dini.

a. *Power*(Tenaga/Kekuatan)

1) His (Kontraksi Uterus)

Merupakan kekuatan kontraksi uterus yang terjadi karena otot-otot polos rahim bekerja dengan baik dan sempurna..

2) Kekuatan mengedan

Pasca dilatasi lengkap serta ketuban akhirnya pecah, sifat kontraksi akan berubah, yaitu khususnya bergerak keluar karena bantuan ibunya yang dilakukan dengan mengedan yaitu pengerahan tenaga yang disengaja. Keadaan mengedan tersebut terjadi dikarenakan adanya penyempitan otot dinding perut yang mengakibatkan peningkatan tekanan *intraabdominal* yang mendorong ketegangan pada rahim di semua sisi dan membangun kekuatan untuk mendorong keluar, kekuatan ini seperti keadaan saat sedang buang air besar (BAB) namun keadaan melahirkan jauh lebih sulit. Pada saat kepala tiba di dasar panggul, ada refleks yang membuat penekanan pada otot abdomen serta penekanan pada otot diafragma bagian bawah, dan kekuatan mengedan tersebut bisa sukses ketika pembukaan selesai dan paling baik ketika ada hisnya. (Ai Nursiah, dkk, 2014: 31-32).

Berdasarkan uraian teori di atas Islam juga memiliki pandangan yang sesuai dengan teori tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT tentang his yang membantu dalam proses persalinan dalam QS. Maryam 19:23

فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّسِيًّا

Terjemahannya:

“Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.”

Dapat disimpulkan bahwa, kata al-makhadh berasal dari kata al-makhdh yaitu gerakan yang sangat keras. Sehingga bisa dimengerti sebagai rasa sakit yang terjadi sebelum melahirkan anaknya. Ayat ini memberikan gambaran besar kebesaran Allah SWT dengan memberikan rasa sakit yang luar biasa untuk membantu kelahiran bayi. Rasa sakit tersebut dalam ilmu kesehatan disebut sebagai His dalam persalinan yang dirasakan oleh setiap perempuan yang akan melahirkan. His terjadi karena adanya kontraksi yang kuat sehingga mendorong janin kebawah menyebabkan terbukanya serviks. His yang disertai pengeluaran lendir dan darah menjadi tanda dimulainya persalinan.

b. *Passage* (Jalan Lahir)

Yaitu saluran kelahiran yang semestinya dilalui oleh janin yang diantaranya adalah rongga panggul, dasar panggul, leher rahim, dan vagina. Ketentuan kiranya embrio juga plasenta bisa melewati jalan lahir meskipun tidak ada hambatan yaitu saluran kelahiran baiknya normal (Widia, 2015).

c. *Passenger* (Janin, Plasenta, dan Air Ketuban)

1) Janin

*Passenger* atau janin berjalan di jalur proses kelahiran yang itu adalah konsekuensi dari asosiasi beberapa elemen, khususnya kepala janin, presentasi, area, mentalitas, juga letak bayi (Ai Nursiah, dkk, 2014:39).

2) Plasenta

Plasenta wajib melalui jalur kelahiran, jadi pikirkan tentang bagian perjalanan dengan *passenger*. Akan tetapi, plasenta sedikit menghalangi jalannya bersalin normal (Widia, 2015: 29).

3) Air ketuban

*Amnion* dalam kehamilan cukup bulan adalah area kekuatan yang memiliki kekuatan juga keuletan namun memiliki sifat lentur. *Amnion* merupakan bagian yang jadi penentu pada seluruh kekuatan lapisan janin, akibatnya perkembangan bagian amnion dapat mencegah pecah atau robek (Widia, 2015: 29).

d. Factor Psikis (Psikologi)

Sentimen baik seperti pertolongan, seolah-olah disitulah kebenaran benar-benar terjadi, "wanita sejati" adalah hadirnya perasaan puas dalam diri karena dapat mengandung dan melahirkan anak.

1) Mental terdiri dari: keadaan mental ibunya, perencanaan mendalam dan ilmiah, pengalaman masa lalu melahirkan anak, serta bantuan dari orang-orang yang dekat dengannya dalam hidupnya.

2) Sifat negatif bersalin dipengaruhi karena: Bersalin seperti ini sama halnya dengan sebuah bahaya bagi perasaan aman, persalinan demikian ini sebagai bahaya bagi potret diri mental, juga nyeri saat bersalin juga kelahiran (Widia, 2015: 29-30).

e. Pysician(Penolong)

Peranan penting dalam menolong proses bersalin yaitu spesialis bersalin



(bidan), yang mengharapkan dan menangani ketidaknyamanan yang bisa saja muncul pada ibu dan janinnya (Widia, 2015: 30).

Bukan hanya bagian dari kegiatan yang diberikan, namun juga bagian dari pengarahan dan pemberian data yang jelas dan diperlukan dalam pengurangan derajat cemas ibu juga keluarganya (Ai Nursiah, 2014).

#### 4. Tahapan Persalinan

##### A. Kala I (Pembukaan)

###### 1. Pengertian Kala I

Persalinan kala I meliputi fase pembukaan 1-10 cm, yang di tandai dengan penipisan dan pembukaan *serviks*, kontraksi uterus yang akan mengakibatkan perubahan *serviks* (frekuensi minimal 2 kali dalam 10 menit), cairan lendir bercampur darah (*show*) melalui vagina. Darah berasal dari pecahnya pembuluh darah kapiler serta *kanalis servikalis* karena pergeseran *serviks* yang membuka (Ai Nursiah, 2014).

Kala I dibagi atas 2 fase yaitu :

- a) Fase laten, dimana pembukaan *serviks* berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai 3 cm, berlangsung dalam 7-8jam.
- b) Fase aktif (pembukaan *serviks* 4-10 cm), berlangsung selama 6 jam.

Dalam tahap aktif, timbulnya dan panjangnya penyempitan rahim akan meluas secara bertahap dan akan terjadi pengurangan pada bagian bawah bayi. Dari 4 dilatasi sampai dilatasi akhir atau 10 cm, akan terjadi pada kecepatan per jam (primipara) atau lebih 1 cm

sampai 2 cm (multipara) (Ai Nursiah, dkk 2014:66).

Fase aktif, dibagi dalam 3 fase, yaitu:

- a) Fase akselerasi, dalam waktu dua jam, terjadi pembukaan 1 cm, misalnya dari pembukaan 3 tadi menjadi 4 cm.
- b) Fase dilatasi, yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan berlangsung sangat atau lebih cepat, dari 4 cm menjadi 9 cm.
- c) Fase deselerasi, pembukaan menjadi lambat sekali. Dalam waktu 2 jam.

## 2. Perubahan Fisiologi Kala I

Ketika dalam kurung waktu dari kehadirannya hingga akhir dilatasi 10 cm, muncul sebuah perubahan fisiologis, yaitu:

### a) Perubahan padaserviks

#### (1) Pendataran padaserviks/*effacement*

Meratakan serviks adalah metode saluran air serviks yang awalnya berupa parit sepanjang 1-2 cm, berubah menjadi hanya bukaan dengan sedikit tepi.

#### (2) Pembukaan *serviks*

Terbukanya serviks dikarenakan oleh membesarnya *ostium uteri* luar (OUE) disebabkan otot bundar di sekitar ostium memanjang agar kepala dapat lewat.

### b) Kontraksi uterus

Penyempitan rahim terjadi karena perasaan otot polos rahim dan penurunan kimia progesteron yang menyebabkan datangnya

oksitosin kimia.

c) Perubahan suhu badan

Tingkat suhu tubuh pastinya meningkat sedikit selama bersalin, suhu sampai pada tingkatan yang paling signifikan selama bersalin juga setelah kelahiran. Meningkatnya suhu diasumsikan hal normal selama tidak  $> 0,5 - 10$  C. Hal ini biasa namun jika kondisi ini berlangsung cukup lama, peningkatan suhu menunjukkan kekurangan air.

d) Perubahan pada *vagina* dasar panggul

Posisi atas vagina yang semenjak hamil banyak berubah ini dikarenakan agar anak dapat melewatinya, pasca selaput ketuban pecah, semua perubahan terutama pada dasar panggul yang terjadi karena bagian depan anak, bagian depan yang kemajuan ke dasar panggul diperpanjang ke saluran dengan dinding ramping, ketika kepala tiba di vulva, lubang vulva melihat ke depan dan dari perspektif eksternal, pandangan ke depan pada perineum yang menonjol akan menjadi tipis, sedangkan bagian belakang semakin terbuka, area kekuatan untuk ini disebabkan oleh perluasan vena di vagina dan dasar panggul. Apalagi ini akan menyebabkan perdarahan yang begitu banyak (Ai Nursiah, dkk 2014: 67-71)

3. Perubahan *Psikologis* kala I

- a) Menampakkan rasa takut juga cemas, yang mengakibatkan perempuan memahami pengucapan demikian memberikan perawatan

dan peristiwa bersalin dengan pesimis.

- b) Memiliki banyak pertanyaan dan tahu tentang elemen lingkungannya.
  - c) Menunjukkan perilaku bila diperlukan.
  - d) Menunjukkan area kekuatan yang serius untuk kontraksi ringan atau penilaian.
  - e) Tampaknya, ketika ibu tidak terkontrol ketika bersalin (ketika penderitaan yang serius, menggeliat sedih, menakutkan, berteriak, tidak memberikan respon atau pertanyaan yang mendukung).
  - f) Reaksi “melawan dan menjauh”, yang disebabkan risiko aktual, ketakutan, kegelisahan, dan berbagai jenis tekanan (Widia, 2015: 57).
4. Permasalahan juga Penyulit Pada Kala I
- a. Pengeluaran vagina selain cairan tubuh yang terkena darah ("*show*")
  - b. Ketuban yang pecah bersatu walaupun sedikit dengan *mekonium* bergabung dengan indikasi masalah janin
  - c. Ketuban yang pecah (>24 jam) ataupun pecah dalam kehamilan prematur (di bawah 37 minggu pertumbuhan).
  - d. Gejala atau efek samping penyakit, misalnya suhu tubuh >38°C, menggigil
  - e. TD >160/100 atau protein urin
  - f. DJJ <100 atau >180 kali/menit pada dua kali dinilai rentang 5 menit.
  - g. Tanda dan efek samping syok: Detak jantung cepat, tidak bertenaga

(>110 denyut/menit), tekanan peredaran darah rendah (sistolik <90 mmHg), kulit memucat, kulit berkeringat atau lengket, dingin, napas cepat (>30 denyut/menit), gugup, berantakan atau tidak sadar, dan hasil kencing yang rendah (<30 ml/jam)

- h. Tanda dan efek samping kerja dimana dilatasi serviks <4 cm setelah 8 jam, dan penyempitan normal (<2 cepat)
  - i. Gejala juga efek samping belum *impartu*, yaitu di bawah 2 kali kontraksi dengan cepat, bertahan di bawah 20 detik, belum terjadi perubahan serviks kurang waktu hingga 2 jam.
  - j. Gejala juga efek samping dalam partus lama, khususnya dilatasi serviks yang berkepanjangan dengan asumsi pembukaan serviks di bawah 1 cm setiap jam, dan di bawah dua kompresi dengan cepat, masing-masing bertahan di bawah 40 detik.
5. Partograf

Partograf adalah peralatan ketika merekam data yang didasarkan persepsi, data atau anamnesis, serta penilaian aktual ibu selama bersalin, terutama dalam menjalani pilihan klinis selama fase dalam kala I persalinan.

Alasan penggunaan partograf yaitu untuk melihat juga melakukan pencatatan konsekuensi persepsi dan memajukan dan memutuskan apakah persalinan normal dan lebih awal mengidentifikasi persalinan lama sehingga spesialis persalinan dapat membedakan lebih awal dengan asumsi ada indikasi persalinan tertunda yang mungkin terjadi. Partograf

digunakan selama periode dinamis dari fase aktif kala I bersalin.

a. Bagian Partograf

1) Kemajuan Persalinan

Persalinan yang semakin dekat ditulis dalam sebuah partograf mencakup dilatasi serviks, penurunan kepala janin, dan penarikan uterus.

2) Pencatatan Selama Fase Laten Dan Fase Aktif Persalinan

a) Pencatatan Selama Fase Laten

Tahap laten digambarkan dengan pembukaan serviks 1-3 cm. Dalam rentang waktu fase laten bersalin, seluruh asuhan, persepsi dan penilaian mestinya dilakukan pencatatan yang dipisahkan dari partograf, khususnya pada Kartu Menuju Sehat (KMS) ibu hamil. Waktu dan tanggalnya wajib tercatat tiap kali dibuat sebuah catatan selama periode fase laten bersalin dan semua pertimbangan dan mediasi harus dicatat. Waktu penilaian, keadaan ibu.

Keadaan janin pada tahap laten terdiri: Denyut janin, frekuensi dan rentang konstiksi uterus, denyut setiap 60 menit, dilatasi serviks, penurunan kepala, ketegangan sirkulasi, dan suhu setiap 2-4 jam dan dengan asumsi bahwa kompleksitas dialami, penilaian keadaan ibu dan anak harus diselesaikan dan dilakukan secara lebih teratur.

### 3) Pencatatan Dan Temuan Pada Partograf Selama Fase Aktif

#### a) Kesehatan dan Kenyamanan Janin

Evaluasi dan catat dalam 30 menit (lebih teratur, jika ada indikasi gangguan janin). Tiap kotak di segmen ini menunjukkan 30 menit, rentang FHR biasa terpanjang pada partograf antara garis kuat 180 dan 100. Bagaimanapun, tenaga medis harus siap jika FHR kurang dari 120 ataupun >160.

#### b) Warna dan Adanya Ketuban

Warna kantung ketuban dievaluasi pada setiap pemeriksaan bagian dalam, selain warna cairan ketuban, jika pecah. Rekam penemuan di kontak yang sesuai di bawah bagian FHR dan gunakan gambar yang menyertainya.

**U** = lapisan tanpa cacat (tidak retak)

**J** = cairan ketuban pecah dan cairan ketuban bening

**M** = ketuban pecah dan cairan ketuban bersatu dengan mekonium

**D** = cairan ketuban pecah dan cairan ketuban bersatu dengan darah

**K** = cairan ketuban pecah dan tidak ada cairan ketuban (kering)

Mekonium dalam cairan ketuban tidak selalu menunjukkan rasa sakit pada janin. Dengan asumsi bahwa mekonium tersedia, saring DJJ secara seksama untuk indikasi gangguan janin (JJ <100 atau >180 denyut setiap saat) selama bersalin.

c) *Molase* (Penyusupan Kepala Janin)

Invasi adalah tanda signifikan seberapa jauh anak dapat berubah sesuai dengan langkah penting panggul ibu. Ruang tengkorak menunjukkan kemungkinan adanya ketidakseimbangan pinggul (*Cephalopelvic unbalanced*) CPD. Setiap kali penilaian interior dilakukan, evaluasi penetrasi kepala janin dan catat penemuan di bawah bagian cairan ketuban dengan menggunakan gambar yang menyertainya.

d) Kemajuan Persalinan

Segmen dan garis pada partograf merupakan catatan kemajuan bersalin. Bilangan 0-10 di tepi kiri terjauh segmen merupakan kebesaran dilatasi serviks. Ukuran 1-5 pastinya menggambarkan janin turun sejauh apa.

e) Pembukaan *Serviks*

Evaluasi dan pencatatan dilatasi serviks diselesaikan tiap waktu 4 jam. Simbol "X" harus dicatat pada waktunya yang disesuaikan pada tingkat di mana dilatasi serviks terjadi

f) Penuruna Bagian Terbawah Atau Presentasi Janin

Tiap kali melaksanakan penilaian di suatu tempat sekitar 4 jam atau lebih, ada indikasi kesulitan, perhatikan, lakukan pencatatan juga penilaian penurunan pada bagian bawah ataupun presentasi bayi.

g) Garis Waspada dan Garis Bertindak

Bagian alarm dimulai ketika pembukaan dan penutupan serviks 4



cm di mana ekspansi lengkap adalah normal dengan asumsi tingkat pembukaan adalah 1 cm setiap jam.

h) Jam dan Waktu

Pada saat masa aktif persalinan, bagian bawah partograf (serviks terbuka juga kepala janin mulai mengalami penurunan) dicatat dalam kotak bernomor 1-16. Tiap kotak menyiapkan waktu 1 jam dari awal periode aktif pada persalinan.

i) Kontraksi Uterus

Ada lima bagian yang bertuliskan "penyempitan secara berkala" di luar bagian kiri terjauh di bawah segmen waktu partograf. Tiap kotak mengatasi satu penyempitan

j) Obat dan Cairan yang Diberikan

(1) Oksitosin

Ketika oksitosin mulai menetes, catat secara berkala berapa banyak oksitosin yang diarahkan per volume cairan intravena dan unit tetes setiap saat.

(2) Obat lain dan cairan *intravena*

Mencatat seluruh pengobatan yang diberikan dalam kotak yang sesuai dengan kolom waktunya.

4) Kesehatan dan Kenyamanan Ibu

Nadi, tekanan darah, dan *temperature* tubuh. Catat dan nilai nadi ibu setiap 30 menit selama fase aktif persalinan. Letakkan titik di bagian pada waktu yang tepat. Periksa tekanan darah ibu dan catat

dalam waktu 4 jam ketika fase aktif bersalin (seringkali ketika dianggap ada kesulitan).

5) Asuhan, Pengamatan, Keputusan Klinik Lainnya.

Catat seluruh asuhan, hasil persepsi, juga pilihan klinis di luar bagian partograf, atau dapatkan arsip yang beda perihal kemajuan persalinan. Sertakan tanggalnya juga waktunya.

6) Pencatatan Pada Lembar Belakang Partograf

a) Data Dasar

Informasi umum meliputi tanggal, nama spesialis bersalin, lokasi bersalin, alamatnya, catatan tentang tujuan dirujuk, asal rujukan, juga yang mendampingi ketika dirujuk.

(1) Kala I

Terdiri dari pertanyaan perihal partograf ketika lewat dari garis alarm, permasalahan yang dialami, menatalaksanakannya juga hasilnya dari proses penatalaksanaan itu.

(2) Kala II

Informasi tahap kedua terdiri dari episiotomi, urutan kelahiran, nyeri janin, distosia bahu, penyakit yang menyertai, penatalaksanaan, dan outputnya.

## **B. Kala II (kala pengeluaran)**

### **1. Pengertian kala II**

Kala II persalinan adalah masa pengeluaran yang itu adalah sebuah kejadian utama pada siklus bersalin dengan alasan bahwa yang dilahirkan

yaitu seorang anak (Widia, 2015:128).

## **2. Perubahan fisiologis yang terjadi pada kala II persalinan**

- a) His jadi semakin kuat dan muncul lebih banyak
  - (1) Cairan ketuban yang keluar membuat dinding rahim lebih dekat dengan bayi, sehingga kekuatan untuk kontraksi lebih kuat sehingga bisa dilakukan dorongan janin keluar.
  - (2) Vagina yang memanjang disebabkan kepala bayi yang turun bisa menyebabkan kontraksi menjadi lebih bagus
- b) Munculnya kekuatan untuk mencedakan
  - (1) His yang terus menerus dan kuat dikarenakan adanya kontraksi otot rahim yang menyebabkan tekanan intra-abdominal tinggi yang membuat kepala anak mendorong otot-otot dasar panggul dan mengendur, menyebabkan perasaan ingin mencedakan.
- c) Perubahan dalam dasar panggul
  - (1) Berubahnya area kandung kemih yang akan naik ke lubang perut agar tidak membebani kepala anak, ini artinya menguras kandung kemih agar saluran kelahiran lebih banyak, dan tidak ada ketegangan pada anak.
  - (2) Berubahnya bagian rektum, ketika kepala anak berada di dasar panggul, bagian belakang dasar panggul akan terdorong ke bawah dengan demikian rektum terhalang oleh kepala anak.
  - (3) Ketegangan pada kepala membuat perineum menjadi ramping, memanjang dan menggelembung.

d) Lahirnya janin

(1) Mulainya proses kelahiran ditunjukkan dengan munculnya kepala anak di vulva, dengan penyempitan rahim juga ada tekanan, sedikit demi sedikit kepala anak bisa muncul.

(2) Diikuti dengan pengangkatan bahu di samping sama dengan cairan ketuban yang membantu kelancaran saluran kelahiran dan diikuti dengan pengeluaran seluruh tubuh (Widia, 2015: 128-129)

### 3. Tanda Dan Gejala Kala II

Kala II harus dilaksanakan ketika pembukaan sempurna hingga dengan hadirnya anak, gejala dan tandanya yaitu:

a) Pembukaan yang sudah selesai. Hal ini muncul akibat terdorongnya bagian paling bawah dari embrio ke dasar panggul karena penyempitan rahim yang kuat sehingga bagian tersebut akan terbuka.

b) His lebih kencang dan lebih kuat ( $\pm$  2-3 menit 1 kali) dan ada sensasi mau mencedan.

c) Munculnya darah yang bersatu dengan cairan tubuh, dikarenakan munculnya sebuah robekan serviks yang akhirnya ada yang merenggang.

d) Terpecahnya kantung ketuban, disebabkan penyempitan yang membuat adanya ketegangan di dalam uterus dan diluar uterus sehingga kantung ketuban tidak dapat menahan dan akhirnya ketuban menjadi pecah.

- e) Anus terbuka, disebabkan bagian bawah janin yang memasuki dasar panggul dengan demikian ada penekanan pada rektum dan sensasinya sama halnya BAB, demikian ini membuat bagian anus terbuka.
- f) Membuka Vulva, perineum menonjol, sebab bagian paling kecil dari janin yang telah memasuki PBP dan dikombinasikan dengan adanya kekuatannya dan tekanan membuat vulva terbuka dan perineum membengkak, pada alasan bahwa perineum elastis.
- g) Bagian depan anak terlihat di vulva, karena labia terbuka, perineum melebar sehingga bagian bawah janin terlihat di vulva, karena adanya his.
- h) Lalu kekakuan mengedan membuat sedikitnya bagian bayi yang dikandung lahir (Widia, 2015: 129-130).

#### **4. Perubahan Psikologis Kala II**

Berubahnya kondisi mental secara umum dialami oleh ibu menjelang persalinan, dan berfluktuasi sangat bergantung pada kesiapan dan arahan yang diharapkan yang dia dapatkan selama bersiap untuk melakukan persalinan.

Bantuan yang didapat atau tidak didapatkan oleh seorang ibu dalam suasana di mana ia mengandung seorang anak, termasuk dari orang-orang yang menemaninya, sangat mempengaruhi pandangan mentalnya ketika kondisinya sama sekali tidak berdaya tiap kali mengalami kontraksi terjadi dan ketika nyeri muncul. (Ai Yeyeh, dkk 2014: 37-38).

## 5. Mekanisme Persalinan Normal

Menjelang akhir kala satu, uterus, serviks, dasar panggul, dan vulva meninggalkan bagian-bagian yang membentuk jalur kelahiran. Gaya yang diharapkan dalam mengeluarkan bayi asalnya dari kegiatan otot rahim dan dari otot perut sekunder juga diafragma, yang membuat penyempitan saat kepala janin melewati panggul, kepala anak akan terjadi gerakan utama termasuk;

### 1) Masuknya kepala kedalam PAP

Primigravida yang muncul diakhir bulannya ketika hamil sedangkan pada multigravida umumnya muncul di awal bersalin. Kepala ditempatkan ke dalam PAP sebagai aturan dengan jahitan sagital silang dan dengan fleksi lembut. Sutura sagital terletak di jalur air kelahiran/kanan antara simfisis dan promotorium sehingga, dari depan dan belakang parietal adalah tingkat yang sama.

Kepala yang masuk dengan asinklitismus adalah jalannya kepala janin yang digeser dengan bidang PAP atau jahitan sagital agak ke depan bergerak ke arah simfisis/agak terbalik dengan mendekati *promotorium*. *Back asynclitism* ketika jahitan sagital bergerak ke arah *simfisis parietal* normal lebih rendah dari parietal depan, atau ketika pivot kepala membuat titik balik yang tajam dengan PAP.

### 2) Majunya kepala

Primigravida dalam perkembangan kepala muncul pasca kepala memasuki rongga panggul juga umumnya baru dimulai ketika tahap

berikutnya. Pada multipara, perkembangan kepala dan bagian kepala ke dalam rongga panggul terjadi terus menerus. Kemajuan kepala sesuai dengan perkembangan fleksi, revolusi kelompok ke dalam, dan ekspansi.

### 3) Flexi

Saat kepala berkembang, fleksi sebagian besar meningkat sampai ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Manfaat dari fleksi yang diperluas adalah ukuran kepala lebih sederhana melalui jalan kelahiran. Maksudnya adalah putaran paksi yang dalam putaran bagian depan sehingga bagian depan yang paling minimal berbelok ke depan di bawah simfisis. Dalam presentasi di belakang kepala, bagian terkecil adalah ubun-ubun kecil dan bagian ini berputar ke depan di bawah simfisis.

Putaran paksi interior sangat penting dalam pengenalan kepala dengan alasan bahwa putaran paksi adalah upaya untuk mengubah letak kepala dan keadaan jalan kelahiran, terutama keadaan bidang tengah dan teluk panggul. Perputaran paksi bagian dalam tidak terjadi sendiri, tetapi selalu sesuai dengan perkembangan kepala dan tidak terjadi sebelum kepala bergerak ke hodge III, umumnya hanya pasca kepala muncul di dasar panggul.

### 4) Ekstensi

Setelah putaran paksi selesai dan kepala sampai didasar panggul, terjadilah ekstensi atau defleksi dari kepala. Hal ini

disebabkan karena sumbu jalan lahir pada pintu bawah panggul mengarah kedepan dan atas, sehingga kepala harus mengadakan ekstensi untuk melaluinya.

#### 5) Putaran Paksi Luar

Setelah kepala lahir, maka kepala anak memutar kembali kearah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Gerakan ini disebut putaran retribusi (putaran balasan).

Ibu dalam proses persalinan harus tetap kuat, sabar dan berpikiran positif bahwa segala sesuatu adalah kehendak dari Allah swt, dan mengingatkan ibu untuk senantiasa berdoa, dan membayak membaca do'a Nabi Yunus yang terdapat dalam QS. Al-Anbiya/ayat 87-88 yang berbunyi:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

Terjemahnya:

“Tidak ada Tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim.”

## 6. Langkah-langkah Pertolongan Persalinan

### a. Mengenali Gejala dan Tanda Kala II

- 1) Ibu merasakan terdapat kekuatan untuk mendorong juga menerang (doran)
- 2) Ibu merasakan ketegangan yang meluas pada rektum dan vagina (teknus)
- 3) Perineum terlihat menonjol (perjol)



4) Vulva dan singter penyanyi terbuka (vulva).

**b. Menyiapkan pertolongan persalinan**

- 1) Menjamin aksesibilitas peralatan, bahan dan obat-obatan dasar untuk membantu persalinan juga melakukan penatalaksanaan masalah ibu dan bayi.
- 2) Kenakan penutup plastik
- 3) Bersihkan (sekitar 15 detik) dan keringkan dengan tisu/handuk.
- 4) Kenakan sarung tangan DDT pada tangan yang digunakan untuk PD.
- 5) Tambahkan oksitosin ke dalam jarum (menggunakan tangan yang dipakaikan DTT/sarung tangan steril, memastikan tidak ada polusi pada jarum)

**c. Memastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik**

- 1) Bersihkan vulva dan perineum, usap dengan perlahan dimulai bagian depan hingga kebelakang memakai kapas DTT.
- 2) Melakukan penilaian ke dalam (PD) dalam menjamin dilatasi total (jika lapisan belum retak dan pembukaan selesai, lakukan amniotomi).
- 3) Bersihkan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang belum memakai sarung tangan dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.
- 4) Benar-benar melihat DJJ setelah penyempitan/saat pelepasan rahim bahwa DJJ berada di dalam batas normal (120-

160x/menit).

**d. Menyiapkan Ibu dan Keluarga Untuk Membantu Proses Bimbingan Meneran**

- 1) Menerangkan bahwa pembukaan telah selesai dan keadaan janin sudah bagus dan membantu ibu dalam mencari posisi yang menyenangkan dan sesuai keinginannya.
- 2) Minta keluarga membantu mengatur posisi mengejan (Dengan asumsi bahwa ada sensasi kebutuhan untuk kontraksi yang besar, bantu ibu ke posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ibu merasa baik).
- 3) Pembinaan lengkap untuk mengejan bila ibu merasa ada dorongan yang memaksa untuk mengejan.
- 4) Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman, jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam 60 menit.

**e. Penanganan Bayi Baru Lahir**

- 1) Terapkan penilaian selintas
  - a) Apakah anak menangis riuh dan mudah bernafas?
  - b) Apakah anak bergerak secara efektif?

Ketika anak tidak menangis, tidak tampak pergerakan pernafasan ataupun terengah-engah, lakukan langkah-langkah pemulihan (buka usaha pemulihan untuk asfiksia BBL).

- 1) Keringkan tubuh anak mulai dari wajah, kepala, bagian

tubuhnya yang lain terkecuali tangan tanpa dengan tidak membersihkan *vernix caseosa*. Lakukan pergantian pada handuknya yang awalnya basah menjadi kering. Tinggalkan anak di perut ibu.

- 2) Tinjau rahim untuk memastikan tidak ada lagi anak di dalam rahim (kehamilan tunggal)
- 3) Informasikan pada ibu ketika ia akan diinfus dengan oksitosin agar rahim melakukan kontraksi dengan baik.
- 4) Pasca 2 menit setelah bersalin, kencangkan tali pusar dengan klip sekitar 3 cm dari tengah anak. Dorong tali pusar ke arah distal (ibu) dan kencangkan tali ke belakang 2 cm distal ke klip utama. Memotong dan mengikat tali pusar.

**f. Penatalaksanaan Aktif Kala III**

- 1) Lakukan perpindahan gesper di tali pusar sejauh 5-10 cm dari vulva.
- 2) Posisikan satu tangan pada kain diatas perut ibunya, di tepi atas simfisis, agar bisa membedakannya. Tangan yang lainnya memperbaiki tali pusar.
- 3) Pasca rahim berkontraksi, tarik tali pusar ke bawah sementara tangan yang lain dengan hati-hati mendorong rahim ke atas (dorso kranial) (tindakan ini untuk melakukan pencegahan pembalikan rahim).
  - a) Ketika plasenta tidak keluar pasca 30-40 detik, lakukan

penghentian ketegangan tali pusar dan percaya bahwa penyempitan berikutnya akan terjadi dan ulangi strategi di atas.

- b) Ketika rahim belum melakukan kontraksi, arahkan ibu, pasangan atau kerabat agar melaksanakan stimulus puting susu.

**g. Mengeluarkan Plasenta**

- 1) Laksanakan peregangan tali pusar dan dorong dorsokranial sampai plasenta akhirnya lepas, arahkan ibu untuk meremas dengan tetap melakukan tekanan dorsokranial.
- 2) Ketika plasenta ada di initus vagina, bawa plasenta dengan dua tangan. Pegang lalu putar plasenta sampai ketuban keluar, lalu bawa dan masukkan plasenta ke dalam kompartemen yang diberikan. Dengan asumsi lapisannya sobek, kenakan sarung tangan steril/DTT untuk memeriksa sisa selaput yang tersisa selanjutnya manfaatkan jari Anda untuk melakukan jepitan steril atau DTT untuk menghilangkan lapisan berlebih.

**h. Rangsangan Taktil (Masase) Uterus**

- 1) Pasca plasenta dan selaput keluar, masase rahim, posisikan telapak tangan di atas undus dan gosok dengan gerakan memutar halus sampai rahim berkontraksi (fundus terasa kencang).

**i. Menilai perdarahan**

- 1) Periksa kedua sisi plasenta ibu dan anak dan pastikan selaput

ketubannya telah selesai dan tidak bercacat. Plasenta dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tempat yang luar biasa.

- 2) Kaji kemungkinan sayatan vagina dan perineum. Laksanakan jahitan dengan asumsi pemotongan menyebabkan darah mengalir aktif sehingga harus langsung dijahit.

**j. Melakukan prosedur pasca persalinan**

- 1) Bidan harus memastikan bahwa rahim melakukan kontraksi dan tidak ada darah pada vagina.
- 2) Persilakan ibu memeluk bayinya untuk menjalin kontak dengan anaknya di letakkan di dada ibu tidak kurang dari 60 menit.
- 3) Pasca 60 menit, ukur berat badan dan panjang anak, berikan tetes mata antitoksin profilaksis dan vitamin K 1 mg IM di paha kiri anterolateral.
- 4) Setelah pemberian vitamin K selama 1 jam, berikan infus hepatitis B pada paha anterolateral kanan.

**k. Evaluasi**

- 1) Terus amati kontraksi juga cegah perdarahan pada vagina
- 2) Tunjukkan pada ibu/keluarga cara melaksanakan massase uterus juga mengevaluasi kontraksi.
- 3) Penilaian dan estimulasi berapa banyak darah yang hilang
- 4) Periksa detak jantung dan kandung kemih ibu secara berkala untuk 1 jam pertama setelah bersalin juga tiap 30 menit dalam rentang waktu selama jam kedua setelah bersalin.

- 5) Evaluasi anak terus menerus sehingga bisa dipastikan bahwasanya pernapasannya baik (40-60 napas/menit) dan tingkat suhu tubuh yang baik (36,5-37,50C).

#### **I. Kebersihan dan Keamanan**

- 1) Temukan semua peralatan bekas dan masukkan kedalam larutan klorin 0,5% dengan tujuan untuk disterilkan
- 2) Pisahkan peralatan yang sudah terkontaminasi dan buang ke tempat pembuangan yang seharusnya.
- 3) Cairan tubuh dan darah. Berikan bantuan pada ibu dalam memasang bajunya yang sempurna dan baik.
- 4) Buatlah ibu memiliki rasa yakin yang kuat dan keamanan yang baik. Berikan bantuan pada ibu ketika ingin memberikan ASI. Arahkan keluarganya agar ibu di perhatikan juga diberikan makan dan minum yang ideal
- 5) Dekontaminasi tempat melakukan persalinan menggunakan larutan klorin 0,5%
- 6) Masukkan sarung tangan yang dipakai ke dalam larutan klorin 0,5% untuk dibersihkan, putar kembali ke depan dan rendam didalam larutan tersebut sebanyak 0,5% klorin dalam rentang waktu 10 menit
- 7) Terakhir lakukan pencucian pada kedua tangan menggunakan sabun pemncuci tangan juga air mengalir.

### **m. Dokumentasi**

Partograf harus dibuat dengan sebaik dan selengkap mungkin (halaman depan dan belakang), lakukan pemeriksaan pada gejala vital dan asuhan tahap keempat (Widia, 2015: 152-161).

## **7. Komplikasi dan Penyulit Persalinan Kala II**

### **a. Distosia Bahu**

Distosia bahu (*shoulder stuck*) adalah masuknya kepala janin dengan bahu depan menempel di atas simfisis pubis dan tidak mampu masuk melalui rongga panggul, bahu menjadi kaku. Bahu belakang juga dapat terjepit di atas tonjolan sakral, meskipun itu jarang terjadi. Distosia bahu sebagian besar muncul pada bayi baru lahir makrosomia, yaitu sebuah kondisi yang ditandai dengan ukuran tubuh anak yang umumnya lebih besar dari ukuran kepala dan bukan hanya berat badan anak > 4000 gram.

Merawat distosia bahu, khususnya dengan melakukan gerakan McRobert (letak lutut-dada) yang mengambil gerakan jongkok lebar ataupun letak litotomi yang tidak wajar melalui bagian paha yang bersentuhan dengan dada juga ibu didalam letak setengah duduk.

Gaya itu membuat pintu keluar panggul lebih luas. Fleksi kaki yang tidak masuk akal akan memperbaiki sakrum dibandingkan dengan tulang belakang lumbar. Fleksi yang tidak wajar dari pinggul dan lutut akan memperbaiki dan memungkinkan titik panggul untuk mewajibkan lebar bahu yang lebih besar.

## C. Kala III (kalahuri)

### 1. Pengertian Kala III

Tahap ketiga terjadi ketika anak dilahirkan ke dunia hingga plasenta juga telah berhasil dikeluarkan. Kala ketiga juga disebut tahap rahim. Tahap ketiga adalah jangka waktu ketika volume uterus berkurang setelah anak lahir ke dunia. Penurunan ukuran tersebut membuat ukurannya juga menjadi kurang pada lokasi plasenta menempel. Dengan demikian lokasi melekatnya berubah ukuran atau mengecil, lalu ukuran plasenta belum mengalami perubahan, kemudian plasenta jadi banyak, terjadi penebalan lalu mengisolasi dari dinding rahim (Ina Kuswanti, et al 2014: 199).

### 2. Tanda – Tanda Lepasnya Plasenta

#### a. Berubahan Bentuk dan Tinggi Fundus

Pasca anak yang dikandung lahir dan sebelum miometrium dimulai untuk berkontraksi, rahim sepenuhnya disesuaikan dan tingkat fundus sebagian besar berada di bawah tengah. Pasca rahim berkontraksi lalu plasenta didorong ke bawah, rahim membentuk tiga sisi, atau berbentuk menyerupai pir juga alpukat dan fundusnya ada di bagian atas tengah (umumnya menonjol pada bagian kanan).

#### b. Tali pusat memanjang

Tali pusat tampak menonjol melalui vulva (*ahfeld*)

#### c. Semburan darah yang mendadak dan singkat.

Darah yang terakumulasi pada bagian belakang plasenta nantinya



akan memberikan bantuan dalam memberikan dorongan pada plasenta memakai bantuan kekuatan gravitasi. (Ai Nursiah, dkk 2014: 154-155).

### 3. Metode Pelepasan Plasenta

#### a. Metode *Scultze*

Teknik yang lebih normal adalah bahwa plasenta terputus dari satu titik dan meluncur ke dalam vagina melalui lubang di kantung ketuban, permukaan janin plasenta muncul di vulva dengan lapisan mengikuti di belakang seperti payung yang disusun ulang saat melepaskan dinding rahim.

#### b. Metode *MatthewsDuncan*

Plasenta didorong agar mengalami penurunan dengan melewati sisi samping lalu masuk ke vulva dengan penghalang paralel lebih awal misalnya kancing yang masuk ke bukaan baju, sehingga bagian plasenta tidak masuk ke dalam kantong. Namun, sebagian dari selaput ketuban memiliki potensi untuk tertinggal (Nurul Jannah, 2017:144-145).

### 4. Pengeluaran Plasenta

Plasenta yang sudah lepas dan menempati segmen bawah rahim, kemudian melewati serviks, vagina juga dikeluarkan ke *introitus vagina*. Dari tempat ini plasenta didorong keluar oleh tenaga mengejan, 20% secara spontan dan selebihnya memerlukan pertolongan. Plasenta dikeluarkan dengan melakukan tindakan manual. Pengangkutan plasenta

baiknya memakai pertolongan tenaga medis yang disertai sedikit ketegangan pada fundus uteri pasca terlepasnya plasenta. Bagaimanapun, pengeluaran plasenta tidak boleh terhambat sebelum persalinan terjadi karena diperkirakan akan menyebabkan pembalikan uteri.

Perawatan harus dilakukan untuk menjaga lapisan agar tidak pecah dan ditinggalkan dengan asumsi bahwa selaput ketuban robek, tangani sobekan dengan klip dan tarik dengan lembut.

#### **5. Pemeriksaan Plasenta**

Plasenta bisa diperiksa dengan melakukan beberapa hal di bawah ini yaitu:

- a. Lapisan ketuban sempurna atau tidak
- b. Plasenta (besar/kecilnya plasenta) yang meliputi: sisi ibu, total kotiledon, tegaknya tepi kotiledon, sisi janin, sempurna atau tidak.
- c. Tali pusar, termasuk: Total arteri dan vena, apakah ada arteri atau vena yang putus sehingga bisa mengenali *succenturia plasenta*, dan apakah inklusi tali pusat fokal, dapat diabaikan atau panjang tali pusat (Nurul Jannah, 2017: 149)

#### **6. Deteksi dan Komplikasi Kala III**

- a. Perdarahan kala III

Perdarahan setelah bersalin merupakan proses hilang atau keluarnya cairan atau adanya kondisi dimana ibu kekurangan darah sebanyak 500 cc atau lebih yang umumnya kondisi ini muncul setelah persalinan terjadi. Perdarahan bisa muncul sebelum,

selama, ataupun pasca plasenta dikeluarkan. Perdarahan berdasarkan waktu dibagi menjadi:

- 1) Perdarahan esensial pasca kehamilan (*early post pregnancy drain*) yang muncul setelah 24 jam pasca bersalin.
- 2) Perdarahan pasca kehamilan opsional (*late postpartum hommorhage*) yang muncul diantara waktu 24 jam juga satu setengah bulan pasca anak dilahirkan (Widia, 2015: 204-205).

b. Penyebab perdarahan kala III yaitu:

1. *Atonia Uteri*

*Atonia uteri* dicirikan dengan sebuah keadaan ketidakmampuan untuk berkontraksi secara tepat pasca bersalin. Dalam keadaan tersebut, otot rahim belum dapat berkontraksi ataupun sebaliknya, jika ada, kontraksi tidak cukup. Dampaknya adanya perdarahan dapat membahayakan kondisi ibu.

a. Tanda dan Gejala

Memahami tandanya juga efek samping begitu penting saat memutuskan masalahnya dan pengobatannya. Tanda-tanda dan efek samping ini termasuk perdarahan vagina, konsistensi uterus yang halus, fundus uterus yang terangkat, dan syok.

- Laserasi Jalan Lahir atau Robekan *Perineum*

Robekan perineum muncul di semua persalinan yang awal juga sangat sedikit terjadi dipersalinan yang selanjutnya. Meskipun demikian, hal ini bisa di cegah ataupun dihindari

melalui pencegahan kepala janin melalui dasar panggul sangat cepat.

- *Retensio Plasenta*

*Retensio plasenta* adalah suatu kondisi di mana plasenta masih belum keluar atau belum lahir selama lebih dari 30 menit setelah anak dilahirkan. Plasenta umumnya terkurung dari tempat implantasi dalam kondisi biasa 15 menit setelah anak dilahirkan. Hal ini disebabkan karena plasenta belum lepas pada dinding rahim ibu yang disebabkan karena tubuh begitu menempel pada plasenta.

- **Kelainan Pembekuan Darah**

Perdarahan yang sudah digambarkan awalnya sebagian besar muncul dikarenakan membekunya darah intravaskular yang miring dan penyimpangan bawaan dalam komponen pengentalan darah. Masalah pembekuan darah, misalnya, ini sangat berbahaya bagi kehidupan ibu, jika tidak segera ditangani (Nurul Jannah, 2017: 151-156).

#### **D. Kala IV (Kala pemantauan)**

Kala keempat ditandai dengan dua jam pasca plasenta selesai, direncanakan agar dokter spesialis, spesialis bersalin atau penolong persalinan masih memberikan pendampingan pasca bersalin dalam kurung waktu 2 jam (2 jam pasca bersalin). (Dwi Asri, dkk 2014: 95).

Ketika ari-ari telah berhasil dikeluarkan, perhatikan benar-benar tiap

bagian ari-ari dan lapisan-lapisannya. Ketika terdapat sisa plasenta juga selaput ketuban yang masih ada dalam rahim, hal itu akan memperlambat penyempitan rahim membuat kondisi buruk seperti kematian. Ketika telah mencapai 15 menit rahim tidak berkontraksi seperti yang diharapkan, maka akan terjadi atonia uteri. (Widia, 2017: 226).

#### 1. Pemeriksaan Serviks, Vagina Dan Perineum

Dalam memutuskan apakah ada robekan di saluran kelahiran, benar-benar melihat darah perineum, vagina dan vulva. Pasca anak dilahirkan, vagina mengalami perenggangan, dengan potensi adanya pembengkakan juga kerutan. Introitus vagina akan muncul sebagai rasa sakit dan terbuka. Lalu vulva dapat berwarna merah, membesar dan memiliki guratan (Ai Nursiah, dkk 2015:181).

#### 2. Tanda Bahaya Kala IV

Ketika kala IV berlangsung, bidan menginformasikan pada ibu dan keluarganya perihal apa saja hal-hal berbahaya yang bisa muncul:

- a. Demam
- b. Perdarahan aktif
- c. Darah membeku
- d. Bau busuk berasal dari vagina
- e. Pusing
- f. Lemas luar biasa.
- g. Sulit dalam menyusui

## **B. Teori Manajemen Kebidanan**

### **1. Pengertian Manajemen Kebidanan**

Manajemen kebidanan (*Midwifery management*) merupakan metodologi yang dipakai seorang spesialis dalam ilmu kebidanan ketika melakukan penerapan teknik berpikir kritis yang sistematis, diawali dengan pengkajian, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, penatalaksanaan serta evaluasi (Mudillah et al, 2015: 110).

### **2. Tahapan dalam Manajemen kebidanan**

Prosedur dalam melakukan asuhan kebidanan didasarkan pada teori varney (1997), yaitu:

#### **a. Langkah I : Pengumpulan Data Dasar**

Pada langka awal ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, meninjau catatan terbaru yang sebetulnya, serta meninjau data laboratorium, mengumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, melalui indra penglihatan (peilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah)

#### **b. Langkah II : Interpretasi Diagnosa atau Masalah Aktual**

Langkah kedua dilakukan untuk mengetahui apa yang baik terdapat diagnosa ataupun masala kebutuhan klien yang berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang dikumpulkan dan diinterpretasikan sehingga ditemukan masala atau diagnose yang spesifik.

c. Langkah III : Mengidentifikasi Diagnose Atau MasalahPotensial

Mengidentifikasi masalahatau diagnose lain berdasarkan rangkaian masalah atau diagnose yang sudah diidentifikasi. Dilangkah yang ketiga ini penting dalam melaksanakan asuhan yang baik.Melakukan identifikasi masalah yang mungkin muncul dan dibuat langkah untuk mengantisipasi munculnya masalah pada kala 1 yaitu;

1. Kala 1 lama
2. Meningkatnya/turunnya TTV
3. DJJ <100 atau >180 x/menit
4. Perdarahan pervaginam
5. Ketuban pecah bercampur mekonium
6. Kontraksi uterus <2 kontraksi dalam 10 menit
7. Tidak ditemukan pembukaan serviks dalam 10 menit

d. Langkah IV : Mengidentifikasi dan Menetapkan Kebutuhan Yang Memerlukan PenangananSegera.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera ole bidan dan dokter untuk mengkonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim keseatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

Ketika bersalin, masalah yang perlu tindakan cepat, seperti; di kala 1, kontraksi uterus dalam 10 menit, juga belum didapati perubahan serviks pada waktu 1-2 jam. Dan pada kala IV persalinan masalah yang dapat terjadi yaitu; perdarahan pervaginam.

e. Langkah V: intervensi (rencana tindakan)

Mengatur sepenuhnya dan bijaksana untuk masalah yang sama menggunakan cara yang sudah ditetapkan di awal. Intervensi asuhan yang diberikan sudah seharusnya disetujui oleh spesialis maternitas dan pasien serta keluarga untuk memutuskan apakah kegiatan yang diatur akan diselesaikan atau tidak. Administrasi yang diberikan dalam persalinan normal yaitu;

1. Melakukan pemantauan pada berubahnya badan ibu agar bisa memutuskan apakah bersalin normal bisa dilakukan
  2. Benar-benar melihat perasaan ibu dan reaksi aktual terhadap persalinan
  3. Memberikan bantuan pada Ibu dalam mengerti apa yang terjadi sehingga ia berperan dalam memutuskan asuhan yang diterapkan nantinya.
  4. Keluarga dibantu agar tetap fokus pada ibu ketika bersalin, membantu lahirnya juga diberikan perawatan dini setelah melahirkan, juga memahami permasalahan dengan cepat dan menetapkan pilihan yang baik juga benar (kuat dan produktif).
- f. Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan dan Penatalaksanaan

Dilangkah ini, perencanaan asuhan yang diberikan secara holistik demikian halnya yang sudah digambarkan dalam keadaan ke 5 dilakukan dengan sukses dan benar. Rencana ini dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh tim bersalin atau umumnya oleh profesional terlatih bersalin dan sebagian besar oleh klien atau orang lain dari kelompok bantuan pemerintah.

- g. Langkah VII :Evaluasi

Pada langkah terakhir, penilaian ketercapaian efektivitas yang telah diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan bantuan apakah benar-benar telah



diselesaikan tergantung pada situasi yang dipersepsikan dalam masalah dan diagnosa.

### **Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan(SOAP)**

Dokumentasi konsekuensi penyelidikan dan pemahaman (penyelesaian) informasi abstrak dan objektif yang mencakup temuan, harapan analisis atau kemungkinan masalah serta arahan untuk tindak lanjut.

a. **Data Subjektif**

Adalah informasi yang terdiri dari data berasal pada klien. Data disalin secara langsung ataupun hanya garis besarnya saja yang terhubung dengan hasil diagnosis.

b. **Data Objektif**

Informasi didapatkan dari apa yang dilihat oleh mata juga dirasa bidan ketika selama pemeriksaan laboratorium, USG, dan sebagainya. Hal-hal yang di amati seorang bidan bisa jadi bagian besar dari kesimpulan yang akan dibuat.

c. **Assessment**

Ini adalah tujuan yang dibuat didasarkan pada informasi subjektif dan informasi objektif yang ditemukan.

d. **Planning/Perencanaan**

Ini adalah rencana eksekusi dan penilaian sesuai tujuan yang dibuat sebagai sebuah kesimpulan.

### BAB III

#### STUDI KASUS

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL  
PADA NY”S” DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TANGGAL 7 JULI 2022**

Nomor register : 8522xx  
Tanggal masuk puskesmas : 7 juli 2022 jam :11.00 wita  
Tanggal pengkajian : 7 juli 2022 jam :11.00 wita  
Tanggal partus : 7 juli 2022 jam :15.20 wita  
Nama pengkaji : Nur Aenun Alwi

#### KALA I

##### A. LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

###### 1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “S” / Tn “H”  
Umur : 18tahun / 24 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMP / S1  
Pekerjaan : IRT / Buruh harian  
Alamat : Jl. Vetran Utara Ir.297

###### 2. Anamnesa (data subjektif)

###### a. Alasan utama ibu masuk

Ibu mengeluh nyeri perut tembus kebelakang yang disertai pelepasan lendir dan darah.

- b. Riwayat keluhan utama
- 1) Ibu merasakan nyeri perut tembus kebelakang disertai pelepasan lendir dan darah sejak tanggal 7 juli 2022 pukul 08.00 WITA
  - 2) Sifat nyeri hilang timbul serta tidak ada pengeluaran air ketuban dari jalan lahir
  - 3) Klien mengatakan mengatasi keluhannya dengan cara dan miring ke kiri dan kanan dan menghembuskan nafas sambil dibantu oleh suami dengan mengelus pinggangnya
3. Riwayat menstruasi
- a. Menarche : 14 tahun
  - b. Siklus : 28-30 hari
  - c. Lamanya : 5-6 hari
  - d. Banyaknya : 2-3 kali ganti pembalut setiap hari
  - e. Teratur/tidak teratur : teratur
  - f. Sifat darah : encer
  - g. Disminorhea : tidak ada
4. Riwayat perkawinan
- Ibu menikah satu kali dengan tuan Tn "H" pada tahun 2022, saat Ny "S" berusia 18 tahun dan Tn "H" berusia 24 tahun
5. Riwayat Kehamilan Yang Lalu
- a. Ibu mengatakan ini kehamilan pertamanya
  - b. Ibu mengatakan tidak pernah keguguran sebelumnya
6. Riwayat kehamilan yang sekarang
- a. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran
  - b. Hari pertama haid terakhir tanggal 25 September 2021
  - c. Hari tafsiran persalinan tanggal 2 Juli 2022
  - d. Menurut ibu kehamilannya  $\pm 9$  bulan
  - e. Ibu tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama hamil.
  - f. Ibu merasakan pergerakan janinnya lebih kuat dirasakan pada bagian perut sebelah kanan dan sampai sekarang

- g. Ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak 5x di Puskesmas muhammadiyah makassar
- 1) Trisemester I : 1 kali
  - 2) Trisemester II : 2 kali
  - 3) Trisemester III : 2 kali
- h. Ibu mendapatkan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT) sebanyak 2 kali yaitu :
- 1) TT I pada tanggal 11 November 2021
  - 2) TT 2 pada tanggal 11 Maret 2022
- i. Keluhan-keluhan
- 1) Trisemester I : ibu mengalami mual dan muntah di pagi hari dan sangat mudah lelah
  - 2) Trisemester II : tidak ada keluhan
  - 3) Trisemester III : sering kencing dan nyeri perut dibagian bawah
- j. Selama hamil mengonsumsi tablet Fe 1x1 yang diberikan bidan
7. Riwayat Kesehatan Yang Lalu
- a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, asma, diabetes militus, dan hipertensi
  - b. Tidak ada riwayat penyakit menular tuberculosis, malaria, dan penyakit menular seksual
  - c. Tidak ada riwayat alergi makanan, minuman, dan juga obat-obatan
  - d. Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit / di puskesmas.
8. Riwayat kesehatan Yang sekarang
- a. Tidak ada riwayat penyakit jantung, diabetes militus, asma, dan hipertensi
  - b. Tidak ada riwayat penyakit menular tuberculosis, malaria, dan penyakit menular seksual
  - c. Tidak ada riwayat alergi makanan, minuman, maupun obat-obatan
  - d. Tidak ada riwayat operasi dan sebelumnya tidak pernah di opname di rumah sakit maupun di puskesmas.

9. Riwayat penyakit keluarga

Tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, diabetes militus, asma, dan penyakit keturunan lainnya.

10. Riwayat sosial ekonomi, psikososial dan spiritual

- a. Yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga adalah suami
- b. Hubungan ibu, suami, keluarga dan tatangga baik.
- c. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami.
- d. Ibu rajin beribadah dan berdo'a untuk kelancaran persalinannya

11. Riwayat kb

Ibu belum pernah menjadi akseptor KB apapun

12. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

a. Riwayat nutrisi

Kebiasaan :

- 1) Pola makan : nasi, sayur, lauk
- 2) Frekuensi : 3 kali sehari
- 3) Kebutuhan minuman : 6-8 gelas per hari

Selama Inpartu :

Ibu tetap makan tapi hanya sedikit dan lebih banyak minum

b. Kebutuhan eliminasi

Kebiasaan :

- 1) BAK : 5-6 kali sehari, warna kuning muda, bau amoniak
- 2) BAB : 1 kali sehari, konsistensi padat, warna kuning.

Selama inpartu :

- 1) BAK : Ibu BAK di popok, karena lela berjalan ke toilet
- 2) Ibu belum BAB (ibu terakhir BAB jam 08.00 WITA)

c. Personal Hygine

Kebiasaan :

- 1) Mandi 2x sehari (pagi dan sore) dengan menggunakan sabun mandi
- 2) Sikat gigi 2x sehari (setelah makan dan sebelum tidur) memakai pasta gigi

3) Ganti pakaian 2x sehari setiap setelah mandi

d. Kebutuhan istirahat dan tidur

Tidur siang teratur, tidur malam 6-8 jam

Selama inpartu :

Ibu susah tidur dan sesekali terbangun

### 13. Pemeriksaan fisik (DO)

a. Keadaan umum baik

b. Kesadaran *composmentis*

c. Hari tafsiran persalinan tanggal 2 Juli 2022

d. Usia gestasi 40 minggu 5hari

e. Tanda-tanda vital

TD: 120/70 mmhg

N : 80x/i

S : 36,5°C

P : 24 x/i

f. Tinggi badan :151 cm

g. Berat badan sebelum hamil : 45 kg

h. Berat badan sekarang : 55 kg

i. Lingkar lengan atas (lila) : 25 cm

j. Pemeriksaan fisik

Kepala : rambut hitam, lurus, tidak ada benjolan dan nyeri tekan

Wajah : tidak ada cloasma, pembengkakan, odema dan nyeri tekan

Mata : simetris kiri dan kanan, konjungtiva merah muda, sklera putih

Telinga : tidak ada serumen, pembengkakan, dan nyeri tekan

Hidung : bersih, tidak ada polip dan secret

Mulut : bersih, bibir embab, tidak ada caries dan gigi yang lubang

Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe, vena jugularis

Payudara : simetris kiri kanan, puting susu menonjol, hiperpigmentasi areola mamame, tidak ada nyeri tekan

Abdomen : pembesaran perut sesuai dengan UK, dan tidak ada bekas luka operasi.

Leopold I : 2 jrbpx 34 cm, kepala

Leopold II : Puka

Leopold III : Kepala

Leopold IV : BDP 4/5

Lingkar perut : 89 cm

Tafsiran berat janin :  $89 \times 34 = 3,027$  gram

Djj terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 143 x/menit.

Genitalia : tidak ada varices, benjolan, odema dan nyeri tekan.

(VT) I tanggal 7 Juli 2022 Jam 11.15 Wita

Vulva Dan Vagina : Normal

Portio : lunak dan tipis

Pembukaan : 7 cm

Air ketuban : Utuh

Presentase : UUK Kanan depan

Penurunan : Hodge 3

Penumbungan : Tidak Ada

Molase : Tidak Ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir dan Darah

Anus : tidak ada hemoroid, benjolan dan nyeri tekan

Ekstrimitas atas dan bawah

pergerakan aktif, tidak ada varises, dan odema

## **B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA MASALAH AKTUAL**

GIP0A0, Gestasi 40 minggu 5 hari, Puka, kepala, situs memanjang, ada pergerakan dipanggul (BDP), Intrauterine, Tunggal, Hidup, Kondisi ibu dan janin sehat, Inpartu Tahap 1 fase aktif.

## 1. G I P0A0

Data Dasar:

DS : Ibu mengatakan ini kehamilannya yang pertamt, dan tidak pernah keguguran. ibu merasakan adanya pergerakan janin pada usia kehamilan 3bulan.

DO: tampak linea nigra, dan pembesaran perut sesuai dengan usia kehamilan, terdengar djj. Pada pemeriksaan Leopold di dapatkan hasil:

LeopoldI : TFU 2 jrbpx, 34 cm, teraba kepala

LeopoldII : punggungkanan

Leopold III : kepala

LeopoldIV : BDP,4/5

DJJ terdengar jelas,kuat dan teratur pada kuadran kanan perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 143x/menit

Analisis dan interpretasi data :

Saat perut diperiksa terdapat linea nigra, adanya denyut janin dan palpasi bagian janin bila disentuh. Ini adalah salah satu indikasi pasti kehamilan. (prawirohardjo, 2014 : 17).

## 2. Gestasi 40 minggu 5hari

Data Dasar :

DS : HPHT Tanggal 25 September2021.

DO : pemeriksaan leopold I, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah *processus xiphoides*, dan hari tafsiran persalinan tanggal 2 Juli 2022 sesuai dengan rumusNeagle.

Analisis dan interpretasi data

Dari hasil pemeriksaan dilihat dengan menggunakan rumus negle mulai dari HPHT tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal pengkajian, maka umur kehamilan memasuki 40



minggu 5 hari (Prawirohardjo, 2014 : 279).

3. Puka, persentasi kepala

DS: ibu merasakan janinnya bergerak kuat dan ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selama kehamilannya.

DO: ibu tidak merasa ada nyeri pada saat dipapasi, TFU sesuai UK. pada palpasi dan Leopold teraba bagian- bagian janin yaitu:

LeopoldI : TFU 2 jrbpx, 34 cm

LeopoldII : punggungkanan

LeopoldIII : kepala

LeopoldIV : BDP,4/5

Analisis dan interpretasi data

Bagian rahim tempat embrio dapat berkembang dan terbentuk adalah rongga rahim di mana lubang ini merupakan tempat besar bagi bayi untuk bertahan hidup tanpa rasa sakit perut yang parah. Bintik ini berada di dalam tubuh rahim diistilahkan dengan kehamilan intrauterin (Baety, 2012:9).

4. Situs Memanjang

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan janinnya bergerak kuat pada bagian sebelah kiri perutibu.

DO : pada palpasi Leopold didapatkan hasil

LeopoldI : TFU 2 jrbpx, 34 cm

LeopoldII : punggungkanan

LeopoldIII: kepala

LeopoldIV: BDP 4/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kiri perut ibu bagian bawah dengan frekuensi 143x/menit.

#### Analisis dan interpretasi data

Sebagian besar janin bisa disentuh, khususnya bokong di fundus dan kepala di bagian paling minimal, DJJ sangat jelas kedengaran di kuadran kanan bagian bawah juga perkembangan janin yang dirasakan ibu di satu sisi regio tengah menunjukkan bahwasanya poros panjang bayi sejajar dengan poros panjang ibu (Prawirohardjo, 2014: 205-206).

#### 5. Tunggal

##### Data Dasar

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya kuat pada sisi perut bagian kanan.

DO: palpasi Leopold pada abdomen didapatkan hasil :

Leopold I : teraba kepala di fundus dan bulat melenting

Leopold II : teraba punggung kanan

Leopold III : teraba bagian bulat dan melenting (kepala)

Leopold IV: BDP 4/5

DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut ibu dengan frekuensi 143 x/menit. TFU sesuai dengan umur kehamilan.

#### Analisis dan interpretasi data

Pada kehamilan, embrio dianggap sendiri dengan asumsi perkembangan perut dibandingkan dengan usia kehamilan, pada palpasi satu kepala dan satu punggung jelas, dan pada auskultasi DJJ jelas dan normal di kuadran kanan bawah regio tengah ibu. (Baety, 2012 : 10-11).

#### 6. Hidup

##### Data Dasar

DS : ibu merasakan pergerakan janinnya aktif dan kuat pada usia kehamilan 5 bulan sampai sekarang dan merasakan pergerakan janinnya 12 x/hari.

DO : Pada auskultasi DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran bahwa kanan perut ibu dengan frekuensi 143 x/menit.

Analisis dan interpretasi data

Munculnya pergerakan juga DJJ adalah simbol bahwasanya janin didalam perut ibu sehat. Frekuensi bunyi jantung di kondisi yang baik yaitu antara 120-100 x/menit, dan pastinya bisa dirasakan melalui gerakan janin yang cepat oleh ibu 1x/jam atau lebih dari, selain itu juga terlihat pembesaran uterus. (Prawirohardjo, 2014 :285).

#### 7. Keadaan ibu dan janin baik

Data Dasar

DS : Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit

DO : TTV dalam batas normal yaitu konjungtiva berwarna merah muda, sclera putih tidak ikterus, serta tidak ada odema pada wajah dan tungkai.

Analisi Dan Interpretasi Data

Melihat pengkajian fisik terdapat output yang mana belum munculnya gejala preklampsi ataupun tahapan diatasnya yaitu eklamsi, anemia, hiperemesis gravidarum, pada pemeriksaan TTV normal, dan pada pemeriksaan fisik juga normal. (Pantiawati dan Saryono, 2010 : 122).

#### 8. Keadaan janin baik

Data Dasar

DS : Ibu merasa pergerakan janinnya kuat, dan bergerak dalam 12x/hari

DO : DJJ terdengar jelas, kuat dan teratur pada kuadran kanan bawah perut dengan frekuensi 143x/menit

#### Analisis dan interpretasi data

Janin yang bergerak aktif juga DJJ yang kedengarannya jelas, kuat juga memiliki keteraturan pada frekuensi 143x/menit, hal demikian menjelaskan bahwasanya janin dalam keadaan yang normal. (Prawirohardjo, 2014)

#### 9. Inpartu kala 1 fase aktif

##### Data Dasar

DS : Ibu mengatakan nyeri perut tembus belakang dirasakan sejak tanggal 7 Juli 2022 pukul 05.00 WITA, dan adanya pengeluaran lendir dan darah sejak pukul 08.00 WITA.

DO : Tampak pengeluaran lendir dan darah sejak tanggal 7 Juli 2022 pukul 08.00 WITA, Kontraksi uterus 4 x 10 menit, dengan durasi 35 – 40detik.

#### **Hasil pemeriksaan dalam tanggal 7 Juli 2022 pukul 11.15 WITA, oleh mahasiswa “N”**

1. Keadaan vulva dan vagina : Normal
2. Portio : Lunak Dan Tipis
3. Pembukaan : 7 cm
4. Ketuban : Utuh
5. Presentase : UUK kanan depan
6. Penurunan : Hodge III
7. Molase : 0
8. Penumbungan : Tidakada
9. Kesanpanggul : Tidak ada
10. Pelepasan : Lendir dan darah

#### Analisis dan interpretasidata

Nyeri perut tembus belakang yang terjadi karena kontraksi rahim. Kontraksi ini muncul dengan durasi yang konsisten dan 'bagian jelas dari dilatasi. Pelebaran 10 cm adalah kala I pekerjaan

di fase aktif mulai dengan dilatasi 4-10 cm(Widia,2015: 4)

### **C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

Potensial terjadinya infeksi jalan lahir

DS : Ibu mengatakan adanya pengeluaran lendir dandarah

DO : Ada pelepasan lendir darah dan air ketuban

Analisa dan interpretasi data

Munculnya kondisi kontraksi uterus, terbukanya jalan lahir, pelepasan lendir darah dan air ketuban, dapat memberikan peluang munculnya mikroorganismen patologis dan menjadi alasan terjadinya infeksi di jalan lahir.

### **D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

- a. Mandiri : Tidak ada
- b. Kolaborasi : Tidak ada
- c. Merujuk : Tidak ada

### **E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN**

Tanggal 7 Juli 2022 11.30 WITA

1. Memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan bahwa keadaan ibu dan janinnya baik.  
Rasional : Agar ibu dan keluarga merasa tenang menghadapi persalinan, setelah mengetahui keadaan ibu dan janinnya baik.
2. Observasi tanda-tanda vital, dan VT setiap 2-4 jam (kecuali nadi tiap 30 menit)  
Rasional :memantau keadaan ibu dengan mengamati tanda-tanda esensial dan VT dalam melakukan pemantauan untuk bersalin dan membuatnya lebih mudah untuk bergerak.
3. Observasi DJJ setiap 30menit.  
Rasional :Saat ada perubahan DJJ dalam batas normal, dapat

diketahui dan diberi tindakan dengan cepat dan tepat.

4. Observasi His setiap 30menit.

Rasional : Mengingat kekuatan kontraksi rahim bisa mengalami perubahan dengan demikian bisa memberikan pengaruh pada penurunan kepala dan dilatasi serviks.

5. Tunjukkan pada ibu cara melepas lelah dan mengarahkan pernapasan saat muncul penyempitan, misalnya menarik napas dari hidung dan menghembuskan napas melalui mulut saat kontraksi.

Rasional : Prosedur relaksasi dapat diberikan perasaan nyaman, kurangi sakit, pasokan oksigen yang cukup ke embrio

6. Ajarkan ibu bagaimana cara kandung kemih dibersihkan dengan rutin selama persalinan.

Rasional : kandung kemih penuh bisa memberikan pengaruhnya pada kontraksi, menghalangi penurunan kepala bayi, memberikan ibu rasa tidak nyaman.

7. Memberikan intake makanan berupa kurma

Rasional : kurma mempunyai kalori juga protein yang bisa diproses secara efektif dan memberi ibu energi saat mengejan

8. Perencanaan perlengkapan, bahan, dan obat-obatan yang diharapkan dapat membantu bersalin dan lokasi penerangan pada keadaan anak saat ini.

Rasional : untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam menggunakan peralatan dan bahan saat melakukan gerakan.

9. Melaporkan efek samping dari fase pertama pengamatan pada partograf

Rasional : adalah suatu normalisasi pada pelaksanaan asuhan kebidanan.

10. Perhatikan efek samping kala II

Rasional : agar diketahuinya kapan ibu masuk kedalam tahap kala II untuk bersalin

**F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN  
KEBIDANAN**

Tanggal 7 Juli 2022 pukul 11.30 WITA

1. Menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu dankeluarga.
2. Mengobservasi tanda-tanda vital
3. Mengobservasi DJJ, Nadi dan his setiap 30 menit

No.	Jam (WITA)	DJJ (X/Menit)	Nadi (X/Menit)	His	
				F (X/Menit)	Durasi (Detik)
1.	11.30	143 x/menit	78 X/Menit	4 X 10	40 – 45
2.	12.00	143 x/menit	80 X/Menit	4 X 10	40 – 45
3.	12.30	143 x/menit	80 X/Menit	5 X 10	40 – 45
4.	13.00	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	40 – 45
5.	13.30	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	40 – 45
6.	14.00	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	45 – 50
7.	14.30	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	45 – 50

**Melakukan pemeriksaan dalam tanggal 7 Juli 2022 pukul 14.45 WITA  
oleh mahasiswa “N”**

Keadaan vulvadanvagina : Tidak adakelainan  
 Portio :Melesap  
 Pembukaan : 10cm  
 Ketuban :Jernih  
 Presentase : Ubun-ubun kecildibawahsimpisis  
 Penurunan : HodgeIV  
 Molase 0

Penumbungan	: Tidakada
Kesanpanggul	:Normal
Pelepasan	: Lendir, darah dan air ketuban

4. Tunjukkan pada ibu prosedur relaksasi juga pengendalian nafas selama kontraksi dapat mengendahkan nyeri. ibu melakukan tarikan pernafasan lewat hidung lalu menghembuskan nafas lewat mulut ketika kompresi.
5. Anjurkan ibu agar mengeluarkan kandung kemihnya selama bersalin.
6. Berikan intake minum dan makan kepada ibu dengan kurma
7. Ajarkan ibu berdzikir untuk menenangkan hati dan pikiran
8. Ajarkan ibu untuk membaca doa Nabi Yunus, agar diberi kemudahan dalam bersalin.
9. Perencanaan alat dan bahan diharapkan dapat membantu tenaga kerja serta lokasi penerangan juga dan lingkungan BBL.

#### **G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 7 juli 2022 jam 14.50 WITA

1. Keadaan ibu dan janin baik
2. Tanda-tanda vital dalam batas normal
  - Tekanan darah : 120/70 mmHg
  - Suhu : 35.6°C
  - Nadi : 80 x/menit
  - Pernapasan : 24 x/menit
3. DJJ 130 kali per menit terdengar jelas kuat dan teratur
4. Kala I fase aktif di tandai dengan :
  - His adekuat 5x10 dalam 10 menit, durasi 45-50 detik, adanya tekanan pada anus, rektum, dan vagina, perineum menonjol, portio tidak teraba, pembukaan lengkap 10 cm, dan penurunan kepala hodge IV UUK depan, air ketuban jernih dan tidak ada molase.
5. Tidak ada tanda-tanda infeksi
6. Mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan



## **KALA II**

### **A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Data subjektif:

1. Ibu mengatakan sakit dan nyeri semakin kuat dirasakan
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan merasa adanya tekanan pada anus
3. Ibu mengatakan ada dorongan untuk meneran

Data objektif:

1. Keadaan umum ibubaik
2. Kesadaran compos mentis
3. Kontraksi uterus 5 x 10 menit, dengan durasi 45-50 detik.
4. Frekuensi DJJ 143x/menit.
5. Tanda-tanda vital  
TD: 120/70 mmHg  
N : 78 x/menit  
S : 36.5° C  
P : 24 x/menit
6. Tampak tanda dan gejala kala II :
  - a. Tampak Perineum menonjol.
  - b. Pembukaan sudah lengkap
  - c. Vulva, vagina membuka.
  - d. Meningkatnya pengeluaran lendir bercampur dengan darah.
  - e. Tampak rambut bayi pada vulva

### **B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL**

Diagnosa : perlangungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

DS

1. ada tekanan pada anus
2. ada dorongan kuat untuk meneran.

DO

1. perineum menonjol

2. vulva dan vagina membuka
3. kontraksi uterus 5x10 menit durasi 45- 50 detik
4. penurunan kepala 0/5
5. pembukaan 10 cm (lengkap)
6. penurunan hodge IV dan pelepasan lendir
7. darah dan air ketuban.

Analisa dan interpretasi data:

Munculnya his yang begitu kuat dan tersistematis, itu akan membuat persalinan menjadi lebih cepat, ketegangan luar biasa di dasar panggul dan bagian yang paling rendah, bisa memudahkan kepala turun, kontraksi yang muncul juga ketika ibu mengejan yang terjadi dengan refleksi (Kuswanti dan Melina, 2014 : 13).

### **C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

Tidak Ada Data Yang Menunjang Terjadinya Diagnosa Potensial

### **D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA/ KOLABORASI DAN RUJUKAN**

Tidak ada data penunjang.

### **E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN**

Diagnosa : perlangsungan kala II

Masalah aktual : tidak ada indikasi

Masalah potensial : tidak ada data penunjang

Tujuan:

1. Kala II berlangsung normal
2. Bayi lahir normal tanpa penyulit

Kriteria:

1. Kala II berlangsung selama  $\pm$  15 menit tanpa adapenyulit
2. Bayi lahir spontan, segera menangis, bernapas dan bergerak

denganaktif.

#### Rencana tindakan

Tanggal 7 juli 2022 jam 15.00 WITA

1. Melihat tanda dan efek samping persalinan tahap kedua (rasa diremukkan, tegang pada anus, distensi perineum, vulva terbuka).  
Rasional : sehingga dapat diketahui apakah sudah bisa dilaksanakan mengejan
2. Menjamin terpenuhinya bantuan alat persalinan, termasuk memecahkan 1 ampul oksitosin dan bisa memasukkan jarum dispensable ke dalam pemegang partusset.  
Rasional : perencanaan sejak dini dapat menghindarkan diri dari penyakit nosokomial
3. Kenakan penutup plastik  
Rasional: pencegahan munculnya infeksi bersilang
4. Pastikan lengan tidak memakai permata, cuci tangan dengan pembersih dan air mengalir  
Rasional : pencegahan terkontaminasi
5. Kenakan sarung tangan sterilisasi tingkat signifikan di tangan kanan yang akan digunakan untuk penilaian interior  
Rasional : pencegahan penyakit
6. Ambil jarum dengan tangan bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan masukkan kembali ke kompartemen partusset  
Rasional: merencanakan perlengkapan dengan kondisi siap digunakan
7. Bersihkan vulva juga perineum menggunakan kapas DTT menggunakan teknik memindahkan vulva ke perineum  
Rasional : pencegahan terjadinya kontaminasi
8. Lakukan penilaian interior untuk memastikan pembukaan telah selesai dan ketuban telah pecah  
Rasional : sehingga bisa diketahui pembukaan serta persalinan

yang sudah mengalami kemajuan

9. Celupkan sarung tangan kanan ke dalam pengaturan klorin 0,5%, lepaskan sarung tangan dengan kondisi yang terbalik lalu basahi dengan pengaturan klorin 0,5%

Rasional: pencegahan munculnya penyakit

10. Periksa denyut nadi janin (DJJ) pasca kontraksi rahim selesai dan pastikan denyut nadi janin (JJJ) ada dalam kondisi baik (120 - 160 setiap saat)

Rasional : agar diketahui kondisi embrio

11. Beritahu ibu bahwa pembukaan sudah selesai dan kondisi bayi baik, minta ibu mengejan bila ada anggapan ibu mau mengejan

Rasional: agar ibu tidak stres atas keadaan anaknya dan mengatur dirinya untuk siklus kelahiran

12. Minta pertolongan keluarga agar mengatur situasi ibu mengejan (bila ada his, berikan pertolongan pada ibu pada keadaan setengah duduk dan pastikan ibu merasakan nyaman

Rasional: bisa memberikan bantuan dalam tatalaksana bersalin

13. Lakukan dorongan utama saat ibu memiliki dorongan yang memaksa untuk mengejan

Rasional: bekerja dengan jalannya persalinan

14. Anjurkan ibu agar jalan-jalan, jongkok ataupun ambil posisi yang nyaman, saat ibu tidak ingin mengejan dalam satu jam

Rasional: agar kepala cepat jatuh ke bawah

15. Letakkan handuk yang bersih (digunakan untuk menglap anak) pada perut ibu, ketika kepala anak sudah terbuka vulva dengan ukuran 5-6cm

Rasional: agar badan anak bisa dikeringkan

16. Letakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian di bawah bagian belakang ibu atau menggunakan underped

Rasional : sebagai dasar untuk membantu perineum

17. Lepaskan set partus dan fokus pada kulminasi peralatan dan bahan  
Rasional : mengatur alat sehingga bisa langsung digunakan
18. Kenakan sarung tangan sterilisasi derajat signifikan untuk kedua tangan  
Rasional : pencegahan munculnya infeksi bersilang
19. Ketika kepala janin sudah kelihatan di vulva dengan lebar 5 - 6 cm, letakkan handuk bersih di atas bagian tengah ibu agar bayi bisa dikeringkan setelah lahir, pakaian kering juga bersih dilipat 1/3 di bagian bawah bokong ibu.  
Rasional: dengan sangat membantu, itu akan berpartisipasi dalam berkurangnya cedera juga sebagai pencegahan ruptur perineum
20. Setelah kepala muncul, bersihkan mulut dan hidung anak dengan bahan steril dan setelah itu periksa tali pusar di sekitar leher tukik  
Rasional: membebaskan jalur terbang dari cairan ketuban dan tali pusar yang terjepit dapat menyebabkan asfiksia dan kematian janin
21. Tahan sampai kepala janin menyelesaikan poros luar yang tidak dibatasi  
Rasional: hilangkan torsi di leher yang muncul karena putaran paksi luar
22. Pasca kepala memutar poros luar, pegang secara biparietal dan arahkan ibu untuk mengejan ketika terjadi kontraksi, pengembangan kepala turun dan distal sampai bahu depan muncul di bawah kurva pubis dan kemudian pengembangan ke atas dan distal untuk membawa bahu belakang  
Rasional: bantuan untuk membuat bayi keluar sehingga robekan perineum tidak terjadi
23. Pasca bahu muncul, geser tangan bagian bawah ke arah perineum ibu agar membantu kepala, lengan dan siku bagian bawah. Manfaatkan tangan bagian atas dalam mencari dan pegang tangan

juga siku bagian atas

Rasional: memakai metode bantuan, itu akan memberikan bantuan untuk mengeluarkan tubuh anak secara total dan menjaga anak agar tidak terjatuh

24. Pasca tubuh dan lengan keluar, tangan kiri berjalan ke belakang ke arah posterior dan kaki bagian bawah tukik untuk menahan kaki bagian bawah

Rasional : bantuan untuk dikeluarkannya bayi dengan menyeluruh juga melakukan pencegahan sehingga anak tidak jatuh

25. Melaksanakan *assesment* sepiantas:
- Apakah anak menangis dengan kencang atau berpotensi bernapas tanpa kesulitan?
  - Apakah anak melakukan pergerakan yang efektif?

Rasional: agar melihat apakah anak mengalami penyakit atau tidak

26. Tubuh anak mulai dari wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya selain tangan dibersihkan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk basah dengan handuk/bahan kering. Meninggalkan anak di perut ibu

Rasional: menjaga anak dari menghadapi hipotermia

## **F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 7 juli 2022, jam 15.00 WITA

- Dengarkan dan amati munculnya indikasi persalinan tahap kedua (mendorong agar mengejan, ketegangan pada anus, perineum distensi, vulva dan pembukaan vagina).
- Pastikan alat bantu bersalin telah lengkap termasuk memecahkan ampul oksitosin dan menyematkan jarum suntik 3 ml ke dalam pemegang partusset

3. Memastikan lengan tidak memakai perhiasan, mencuci tangan dengan sabun dan airmengalir.
4. Menggunakan sarung tangan steril pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaandalam.
5. Mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan, isi dengan oksitosin dan letakkan kembali kedalam wadah partusset.
6. Membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah yang telah dibasahi oleh air matang desinfeksi tingkat tinggi dengan gerakan vulva keperineum.
7. Melakukan pemeriksaan dalam dan pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudahpecah.
8. Mencilupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin0,5%.
9. Periksa denyut nadi janin pasca kontraksi rahim lengkap dan periksa kembali denyut nadi janin berada di dalam titik batas normal (120 - 160x/menit).
10. Beritahu ibu bahwasanya pembukaan sudah selesai, kondisi bayi sudah bagus, dan minta ibu mengejan bila ada anggapan ibu mau mengejan.
11. Minta pertolongan keluarga agar mengatur situasi ibu mengejan (Bila ada, berikan bantuan pada ibu dengan duduk setengah lalu pastikan ibu merasakan nyaman).
12. Lakukan dorongan utama saat ibu memiliki dorongan yang memaksa untuk mengejan.
13. Anjurkan ibu agar jalan-jalan, berjongkok ataupun ambil posisi yang baik, ketika ibu belum mau mengejan dalam satu jam.
14. Letakkan handuk yang bersih (digunakan mengeringkan anak) pada perut ibu, jika kepala anak telah membuka vulva dengan ukuran 5-6cm.
15. Letakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian bawah bokong ibu

16. Buka tutup partus set lalu perhatikan lagi lengkap atau tidak alat dan bahannya
17. Gunakan sarung tangan steril untuk kedua tangan.
18. Pada saat kepala janin muncul di vulva memiliki ukuran 5 - 6 cm, letakkan handuk yang tepat di bagian tengah tubuh ibu dengan tujuan agar bayi bisa dikeringkan sesaat setelah dilahirkan dan kain yang kering dan bersih dilipat 1/3 atau gunakan *underped* yang ada dibagian bawah bokong ibu. Pasca itu kita akan melakukan gerakan stenon (gerakan untuk menjaga perineum dengan satu tangan, di bawah bahan yang sempurna dan kering, ibu jari di satu sisi perineum dan 4 jari di sisi yang berlawanan dan tangan lainnya di belakang punggung kepala bayi).
19. Ketika kepala sudah keluar, bersihkan mulut dan hidung bayi dengan kasa steril, lalu periksa kemungkinan tali pusat di sekitar leher janin.
20. Tahan sampai kepala janin selesai tanpa dibatasi poros luar.
21. Setelah kepala memutar paksi luar, pegang secara hiparental, usulkan ibu untuk mengejan selama kontraksi.
22. Ketika bahu keluar, geser lengan bawah ke arah perineum ibu untuk membantu kepala, lengan dan kaki
23. Siku bawah. Manfaatkan tangan atas untuk mencari dan memegang tangan dan siku bagian atas.
24. Ketika tubuh dan lengan keluar, tangan kiri berjalan ke belakang ke arah bokong dan kaki bagian bawah janin sehingga menahan kaki bagian bawah (letakkan jari telunjuk tangan kiri di antara lutut embrio)
25. Arahkan evaluasi sepiantas:
  - a. Apakah anak menangis tersengal-sengal serta mudah bernapas?
  - b. Apakah anak melakukan pergerakan dengan efektif?
26. Keringkan tubuh anak dimulai dari wajah, kepala dan bagian tubuh lainnya selain tangan tanpa membersihkan vernix. Lakukan penggantian handuk basah dengan handuk/kain kering dan biarkan



anak berada di atas perut ibunya.

#### **H. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 7 juli 2022 jam 15.20 WITA

1. Kala II berlangsung normal tanpa adapenyulit
2. Bayi lahir spontan tanggal 7 juli 2022 jam 15.20 WITA, menangis kuat dan bernapas tanpa bantuan, serta bayi bergerakaktif
3. Perdarahan  $\pm$  150cc

#### **KALA III**

##### **A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Datasubjektif :

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagianbawah
2. Ibu tampak senang dengan kelahiranbayinya.

Dataobjektif :

1. Bayi lahir spontan segera menangis
2. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dankeras
3. Tinggi fundus uteri setinggipusat.
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibukosong

##### **B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAHAKTUAL**

Perlangsungan kala III

Datasubjektif:

1. ibu nyeri perut bagian bawah, ibu senang dengan kelahiran bayinya

Data objektif :

1. bayi lahir spontan tanggal7 juli 2022 jam 15.20 WITA
2. kontraksi uterus baik (teraba keras danbundar)
3. tinggi fundus uteri setinggipusat
4. tali pusat masih nampak divulva

Analisa dan interpretasi data:

Ketika masuk kala III, ukuran rahim sudah mengecil, setinggi fundus uteri bisa dirasakan di tengah, saat menyempit akan mengecilkan lapisan luar rahim sehingga akan terasa menyiksa dan terasa keras dan bulat. (Kuswanti dan Melina, 2018)

### **C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL**

Tidak ada data yang menunjang terjadinya diagnose potensia

### **D. LANGKAH IV INDETIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI / RUJUKAN**

Tidak ada data penunjang

### **E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN**

1. Tujuan:

- a. Kala III berlangsung normal
- b. Plasenta dan selaput ketuban lair lengkap
- c. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- d. Keadaan ibu dan bayi baik

2. kriteria:

- a. Lama kala III tidak lebi dari 30 menit
- b. plasenta, selaput dan kotiledon air lengkap
- c. kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
- d. keadaan ibu dan bayi baik

3. Rencanatindakan

Tanggal 7 juli 2022, jam 15.00 WITA

- a. Periksa lagi rahim agar bisa di pastikan sudah tidak ditemukan anak di Rahim
- b. Dalam waktu 1 menit setela bayi lair, suntikkan oksitosin secara intramuskuler IM di 1/3 paa atas bagian distal lateral (aspirasi

- sebelum menyuntikkan oksitosin)
- c. Setelah 2 menit persalinan, jepit tali pusat dengan klem sekitar 3cm dari umbilicus bayi
  - d. Menggunakan satu tangan, pegang tali pusat dan potong tali pusat di antara dua simpul
  - e. Menyelimuti bayi dengan kain hangat dan memsangkan topi
  - f. Pindahkan gesper pada tali pusat sejauh 5-10 cm dari vulva
  - g. Letakkan satu tangan di atas kain di perut ibunya, di tepi atas simfisis, agar tangan yang lain meregangkan tali pusat.
  - h. Ketika uterus berkontraksi, regangkan tali pusat menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri melakukan penekanan pada uterus di bantalan dorso-kranial
  - i. Lakukan ekstensi dan dorong dorso kranial sampai plasenta lepas, arahkan ibu meregangkan sambil memanjangkan tali pusat sejajar dengan lantai dan kemudian dijajarkan dengan lantai.
  - j. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masase fundus uteri.
  - k. Periksa kelengkapan plasenta memastikan bawa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap.
  - l. Kaji apakah mungkin luka bagian vagina dan perineum, dan lakukan jahitan dengan asumsi ada luka
  - m. Pastikan rahim berkontraksi dan belum ada perdarahan vagina
  - n. Biarkan anak berkontak langsung dengan ibunya selama 60 menit.
  - o. Pasca 60 menit, timbang dan ukur bayi, berikan obat tetes mata, juga vitamin K
  - p. Setelah 1 jam pemberian vit. K berikan suntukan hB 0

## **F. LANGKAH VI PELAKSANAAN TINDAKAN ASUHAN KEBIDANAN**

Tanggal 7 juli 2022, jam 15.30 WITA

1. Lakukan pemeriksaan lagi pada rahim agar bisa dipastikan sudah tidak ada bayi.

2. Beri tahu ibu bahwasanya oksitosin akan diinfuskan sehingga rahim berkontraksi dengan bagus.
3. Rentang waktu 1 menit saat ketika bayi berhasil dilahirkan, infus oksitosin 10 unit (IM) di 1/3 bagian atas paha samping distal (melakukan aspirasi sebelum infus oksitosin).
4. Ketika sudah 2 menit setelah bersalin, jepit tali pusar dengan klip sekitar 3 cm dari tengah anak. Dorong isi tali pusatnya ke bagian ibu lalu jepit tali ke belakang 2 cm distal ke tali utama.
5. Menggunakan satu tangan, pegang tali pusar yang sudah dijepit (melindungi perut anak), dan potong tali pusar di antara 2 penyangga.
6. Pasang tali pusar menggunakan tali steril di satu sisi lalu lingkari talinya dan ikat dengan kunci pas di sisi yang berlawanan.
7. Tutupi ibu dan anak menggunakan kain yang nyaman dan kenakan topi di kepala anak.
8. Pindahkan gesper pada tali pusar sejauh 5 - 10 cm pada vulva
9. Letakkan satu tangan di atas kain di bagian tengah ibu, di tepi atas simfisis, agar bisa diidentifikasi, lalu tangan lainnya merentangkan tali pusar.
10. Pasca rahim berkontraksi, regangkan tali pusar menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kiri dengan lembut menekan rahim ke arah dorso crinal. Ketika plasenta belum keluar setelah 30-40 detik, berhentilah memperpanjang tali pusar dan percayalah bahwa komtraksi selanjutnya lalu ulangi tatacaranya.
11. Lakukan ekstensi dorsokranial dan dorong sampai plasenta lepas, arahkan ibu mengejan sementara tenaga kesehatan renggangkan tali pusar sejajar dengan lantai dan kemudian ke atas, ikuti poros jalan lahir (terus dilakukan penekanan dorsokranial).
12. Pasca plasenta terlihat di vulva, lanjutkan membawa plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan dua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu mengeluarkan plasenta dan

mencegah robeknya selaput.

13. Setelah plasenta keluar, uleni fundus uteri menggunakan teknik menggosok fundus uteri dengan sirkuler memakai bagian palmar 4 jari tangan kiri sampai kompresi uterus besar (fundus besar yang keras)
14. Benar-benar melihat potongan plasenta ibu dan janin dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa semua kotiledon dan lapisan selesai, dan memasukkannya ke dalam karung plastik yang diberikan.
15. Kaji kemungkinan sayatan vagina dan perineum. Lakukan jahitan dengan asumsi luka bisa menjadi penyebab kematian.
16. Menjamin rahim berkontraksi secara keseluruhan dan tidak ada perdarahan vagina.
17. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu tidak kurang dari 60 menit.
18. Pasca 60 menit, timbang dan ukur anak, lakukan tetes mata profilaksis antimikroba, dan 1 mg nutrisi intramaskular K1 di paha kiri anterolateral.
19. Pasca satu jam diberikannya vitamin K, suntikkan pulan infus vaksinasi hepatitis B di paha kanan anterolateral.

#### **G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN**

Evaluasi Tanggal 7 Juli 2022, jam 15.30 WITA

1. Kala III berlangsung  $\pm$  5 menit
2. Kotiledon dan selaput ketuban lahir lengkap tanggal 28 Agustus 2017, jam 16.50 WITA
3. Tinggi fundus uteri setinggi pusat
4. Perdarahan kala III  $\pm$  150cc
5. Kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar
6. Keadaan ibu dan bayi baik.

## **KALA IV**

### **A. LANGKAH I IDENTIFIKASI DATA DASAR**

Data subjektif :

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, setelah melahirkan.
2. Ibu senang dengan kelahiran bayinya
3. Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan

### **B. LANGKAH II IDENTIFIKASI DIAGNOSA / MASALAH AKTUAL**

Perlangsungan kala IV dengan kelelahan

Data subjektif:

1. ibu merasa lelah setelah bersalin

Data objektif:

1. Keadaan ibu baik
2. Kesadaran kompos mentis
3. Tanda-tanda vital dalam batas normal  
TD: 120/70 mmHg  
N: 80 x/menit  
S: 36.5° C  
P: 24 x/menit
4. Plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap
5. Ibu tampak kelelahan setelah proses persalinan
6. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
  - 1) kala III berlangsung  $\pm$  5 menit plasenta lahir lengkap
  - 2) tinggi fundus uteri setinggi pusat, kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
  - 3) perdarahan  $\pm$  150 cc dan kandung kemih kosong

Analisa dan interpretasi data:

Ketika plasenta keluar sempurna, dengan demikian ditunjukkan bahwasanya ia sudah memasuki tahap persepsi pasca bersalin. Rasa lelah muncul karena menggunakan begitu besar dan banyak kekuatan juga banyak cairan ketika bersalin.

**C. LANGKAH III IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH POTENSIAL**

Tidak Ada Data Yang Menunjang Terjadinya Diagnosa Potensial

**D. LANGKAH IV IDENTIFIKASI PERLUNYA TINDAKAN SEGERA / KOLABORASI DAN RUJUKAN**

Tidak ada data yang menunjang

**E. LANGKAH V RENCANA TINDAKAN**

1. Tujuan : kala IV berlangsung normal dan kelelahan dapat teratasi
2. Kriteria : tidak ada perdarahan, penyempitan rahim yang hebat (sangat keras dan bulat), kosongnya kandung kemih juga fungsi tubuh penting di dalam batas normal

Rencana tindakan:

1. Tetap amati kontraksi lalu cegah perdarahan vagina.  
Rasional : pencegahan munculnya kondisi perdarahan vagina
2. Tunjukkan pada ibu/keluarga bagaimana teknik massase uterus lalu penilaian kompresi  
Rasional : untuk kontraksi rahim yang baik (berwujud keras dan bulat)
3. Kaji dan ukur seberapa banyak darah yang keluar tiap 15 menit di jam awal setelah bersalin lalu tiap 30 menit di waktu yang kedua setelah bersalin  
Rasional: sehingga diketahuinya volume darah yang hilang
4. Lakukan pemeriksaan fungsi tubuh ibu, tingkat fundus uteri, penyempitan dan kondisi kandung kemih secara berkala untuk 1 jam pertama pasca bersalin lalu tiap 30 menit selama jam kedua setelah bersalin  
Rasional : tandanya adalah normal lalu kandung kemih yang kosong menunjukkan fase IV yang biasa
5. Periksa lagi bayinya agar bisa dipastikan bahwasanya anak memiliki pernafasan yang normal  
Rasional : dengan tujuan sehingga anak terlindungi dan aman

6. Tempatkan seluruh alat bekas pakai dan simpan dalam sebuah wadah yang berisi larutan klorin 0,5% untuk sterilisasi (10 menit). Bersihkan kemudian siram alat pasca disterilkan.  
Rasional: Pengaturan klorin 0,5% bisa mematikan organisme mikroskopis yang bisa berdampak buruk
7. Lakukan pembuangan bahan yang tercemar di tempat penampungan yang tepat  
Rasional : sebagai pencegahan munculnya infeksi
8. Bersihkan ibu memakai air desinfeksi tingkat tinggi (DDT), bersihkan sisa cairan ketuban, lendir dan darah. Berikan pertolongan pada ibu untuk memasang pakaiannya  
Rasional : mencegah kontaminasi
9. Pastikan ibu perasaan baik lalu informasikan pada keluarganya agar member bantuan jika memiliki keinginan untuk makan /minum  
Rasional : makan dan minum bisa membantu mengembalikan energi ibu yang sudah habis karena bersalin
10. Bersihkan lokasi bersalin dengan larutan klorin 0,5%.  
Rasional : tujuannya agar mikroba mati
11. Bersihkan sarung tangan dengan larutan klorin 0,5% menghilangkan sarung tangan yang kusut dan merendamnya dalam pengaturan klorin 0,5%.  
Rasional: pencegahan kontaminasi silang juga merupakan tindakan sterilisasi penyakit
12. Cuci tangan menggunakan pembersih dan air mengalir  
Rasional: pemurnian sehingga tidak dikotori dengan organisme mikroskopis
13. Melengkapi partograf  
Rasional: dokumentasi pemeriksaan persalinan.



## **F. LANGKAH VI PELAKSANAAN ASUHAN KEBIDANAN**

1. Terus periksa penarikan dan cegah kematian vagina.
2. Tunjukkan pada ibu/keluarga teknik masase rahim juga mengevaluasi kompresi
3. Kaji dan ukur berapa banyak darah yang hilang tiap 15 menit dalam 1 jam setelah bersalin juga secara berkala 30 menit pada 2 jam pasca kehamilan
4. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh fungsi tubuh ibu yang penting (selain bernafas), tingkat fundus uteri, penyempitan rahim, kandung kemih dan drainase tiap 15 menit dalam 1 jam setelah ppersalinan bersalin juga 30 menit dalam 2 jam setelah bersalin.
5. Evaluasi lagi anak agar bisa dipastikan bahwasanya anak memiliki pernafasan yang normal
6. Tempatkan semua alat yang telah digunakan masuk ke larutan klorin 0,5% dengan tujuan dibersihkan (10 menit).
7. Alat dan bahan yang sudah kotor harus dibuang ke pembuangan yang pas.
8. Bersihkan ibumemakai air bersih tingkat tinggi.
9. Bersihkan cairan ketuban yang masih tersisa, cairan tubuh dan darah.
- 10.Pastikan ibu merasakan baik dan anjurkan keluarga agar memberikan pertolongan jika ibu memiliki keinginan untuk minum.
- 11.Sarung tangan pembersih dalam pengaturan klorin 0,5%
- 12.Cuci tangan menggunakan pembersih juga air mengalir.
- 13.Menyelesaikan partograf (Saifuddin, 2014 :341-347).

## **G. LANGKAH VII EVALUASI HASIL ASUHAN KEBIDANAN**

1. Kontraksi uterus baik (teraba keras dan bundar)
2. Jumlah perdarahan  $\pm$  250cc
3. Kandung kemihkosong
4. Tanda-tanda vital dalam batasnornal  
TD : 120/70 mmHg  
N : 78x/ menit  
S : 36,5 °C  
P : 20x/ menit

**PENDOKUMENTASIAN HASILASUHAN KEBIDANAN INTRANATAL  
PADA NY ‘S’ GESTASI 40 MINGGU 5 HARI DENGAN PERSALINAN  
NORMAL DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TAHUN 2022**

Nomor register : 8522xx  
Tanggal masuk puskesmas : 7 juli 2022 jam :11.00 wita  
Tanggal pengkajian : 7 juli 2022 jam :11.00 wita  
Tanggal partus : 7 juli 2022 jam :15.20 wita  
Nama pengkaji : Nur Aenun Alwi

**LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

**Identitas Ibu/Suami**

Nama : Ny ‘S’ / Tn ‘H’  
Umur : 18tahun / 24 tahun  
Nikah/lamanya : 1 kali / 1 tahun  
Suku : Makassar / Makassar  
Agama : Islam / Islam  
Pendidikan : SMP / S1  
Pekerjaan : IRT / Buruh harian  
Alamat :Jl. Vetran Utara Ir.297

**KALA I**

**DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan ini kehamilan yang keempat dan tidak pernah keguguran sebelumnya.
2. Ibu mengatakan hari pertama haid terakhir tanggal 25 september 2021
3. Ibu mengatakan tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat selamahamil
4. Ibu mengatakan telah memeriksakan kehamilannya sebanyak 6 kali di Puskesmas muhammadiyah makassar
5. Ibu mengatakan umur kehamilannya  $\pm$  9bulan
6. Ibu mengatakan selama hamil ibu mengkomsumsi tabletFe

7. Ibu mengatakan nafsu makan baik dan tidak ada pantangan
8. Ibu mengatakan tidak pernah menderita penyakit serius
9. Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi, asma, diabetes melitus, dan penyakit menular lainnya seperti Tuberculosis (TBC), malaria, hepatitis, dan penyakit menular seksual (PMS)
10. Ibu mengatakan tidak pernah di rawat di puskesmas dan di rumah sakit karena penyakit yang serius.
11. Ibu mengatakan sakit perut tembus kebelakang sejak tanggal 7 juli 2022 pukul 05.00 WITA
12. Ibu mengatakan sakit yang di rasakan hilang timbul dan semakin lama semakin sering.
13. Ibu mengatakan adanya pelepasan lender dan darah sejak tanggal 7 juli 2022 pukul 08.00 WITA
14. Ibu mengatakan tidak ada pengeluaran air dari jalan lahir.

**DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum baik
2. Kesadaran composmentis
3. Tanda-tanda vital

TD: 120/70

N: 78x/ menit

S: 35,

P: 20x/ menit

4. pemeriksaan fisik

Kepala : rambut hitam, lurus, kulit kepala bersih, tidak ada benjolan

Wajah : tidak ada cloasma, pembengkakan, oedema dan nyeri tekan.

Mata : konjungtiva merah muda, sclera putih dan tidak ikhterus.

Mulut : keadaan mulut bersih, tidak ada caries pada gigi

Telinga : tidak ada serumen, pembengkakan dan nyeri tekan.

Leher : tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, dan venajugularis.  
Payudara : simetris kiri/kanan, putting susu menonjol, hiperpigmentasi pada areola mammae, tidak ada benjolan, nyeri tekan  
Abdomen :pembesaran perut sesuai usia kehamilan, tampak linea nigra, dan striae alba, tonus otot perut kendur.  
Ekstremitas: keadaan kaki dan tangan lengkap, simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema pada tungkai, varises, nyeri tekan dan terdapat reflex patella kiri dankanan.  
Genitalia : keadaan genitalia bersih, tidak ada varises, oedema, pembesaran kelenjar batholin, dantampak pengeluaran lendir dandarah.

**Pemeriksaan dalam tanggal 7 juli 2022 pukul 11.15 WITA, oleh mahasiswa “N”**

Keadaan vulvadanvagina : Tidak adakelainan  
Portio : Tipis danLunak  
Pembukaan : 7 cm  
Ketuban :Utuh  
Presentase : UUKkanan depan  
Penurunan : HodgeIII  
Molase : 0  
Penummbungan : Tidakada  
Kesanpanggul :Normal  
Pelepasan : Lendir dan darah

#### **ASSESMENT (A)**

GIP0A0, 40 minggu Pertumbuhan 5 hari, presentase kepala, peregangan situs, Intrauterin, Tunggal, Hidup, Kondisi ibu juga janin sehat, Inpartu Tahap 1 aktif.

#### **PLANNING (P)**

1. Jelaskan kepada ibu apa yang melatarbelakangi nyeri yang dirasa, khususnya ketegangan pada bagian sensitif dan tekanan rahim ketika ada kontraksi

Hasil: sudah dimaklumi dan ibu memahami

2. Tunjukkan pada ibu strategi relaksasi dan pengendalian nafas selama berkontraksi yaitu mengambil nafas penuh lewat hidung dan menghembuskan nafas denganya mulutnya.

Hasil: ibu akan mewujudkannya

3. Anjurkan ibu untuk menggeser ke satu sisi dengan tujuan supaya udara ke bayi bisa baik

Hasil: ibu melaksanakan itu melalui cara bergeser posisi ke kiri.

4. Anjurkan ibu agar mengkonsumsi kurma juga minum ketika kompres sehingga ibu bisa mempunyai kekuatan dalam mengejan.

Hasil: ibu akan melakukan nasihat yang disampaikan dan ibu akan makan dan minum ketika berkontraksi

5. Perhatikan His, beat, FHR seperti jarum jam, dan perhatikan VT setiap 2-4 jam.

No.	Jam (WITA)	DJJ (X/Menit)	Nadi (X/Menit)	His	
				F (X/Menit)	Durasi (Detik)
1.	11.00	143 x/menit	78 X/Menit	4 X 10	40 – 45
2.	11.30	143 x/menit	80 X/Menit	4 X 10	40 – 45
3.	12.00	143 x/menit	80 X/Menit	5 X 10	40 – 45
4.	12.30	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	40 – 45
5.	13.00	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	40 – 45
6.	13.30	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	45 – 50
7.	14.00	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	45 – 50
8.	14.30	143 x/menit	78 X/Menit	5 X 10	45 – 50

**Melakukan pemeriksaan dalam tangga 7 juli 2022 pukul 14.45 WITA oleh mahasiswa “N”**

Keadaan vulvadanvagina : Tidak adakelainan  
Portio : Melesap dan tidakteraba  
Pembukaan : 10cm  
Ketuban :Pecah  
Presentase : Ubun-ubun kecil dibawahsimpisis  
Penurunan : HodgeIV  
Molase : 0  
Penumbungan : Tidakada  
Kesanpanggul :Normal  
Pelepasan : Lendir, darah dan ketuban

## **KALA II**

### **DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan sakit yang dirasakan semakinkuat
2. Ibu mengatakan ingin BAB dan ibu merasakan adanya tekanan padaanus
3. Ibu mengatakan adanya dorongan untuk meneran
4. Ibu mengatakan sakitnya bertambah kuat dan tembuskebelakang

### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Keadaan umum ibubaik
2. Kesadaran composmentis
3. Kontraksi uterus 4 x 10 menit, dengan durasi 40-45detik.
4. Frekuensi DJJ 143x/menit.
5. Tanda-tanda vital  
TD : 120/70 mmHg  
N : 78x/ menit  
S : 36.5° C  
P : 24x/menit
6. Tampak tanda dan gejala kala II dimana tampak:
  - a. Tampak Perineummenonjol.

- b. Pembukaan sudah lengkap
- c. Vulva, vagina membuka.
- d. Meningkatnya pengeluaran lender bercampur dengan darah.
- e. Tampak rambut bayi pada vulva.

## **ASSESSMENT (A)**

Berlangsung kala II

## **PLANNING (P)**

Tanggal 7 juli 2022 pukul 15.00 WITA

1. Lihat gejala dan efek samping kala II
  - Terdapat dorongan yang memaksa untuk mendorong
  - Ibu merasakan ketegangan yang meluas di rektum dan vagina
  - Perineum menonjol
  - Vulva, lubang vagina terbuka
2. Menjamin lengkapnya peralatan untuk menolong ibu melahirkan juga membantu memecahkan 1 botol oksitosin lalu memasukkannya ke jarum yang dapat dibuang ke dalam kompartemen set alat.  
Hasil: peralatan yang sudah siap pakai
3. Mengenakan penutup plastik  
Hasil: penutup telah dipakai
4. Lepaskan cincin, jam tangan yang dikenakan di tangan Anda, kemudian bersihkan di bawah air mengalir menggunakan metode 7 langkah  
Hasil: tangan telah bersih
5. Kenakan sarung tangan sterilisasi tingkat tinggi di tangan kanan yang dipakai dalam penilaian interior.  
Hasil: sarung tangan sudah dikenakan
6. Ambil jarum menggunakan tangan bersarung tangan, masukkan oksitosin lalu masukkan kembali ke kompartemen partusset.  
Hasil: jarum sudah dimasukkan dengan oksitosin dan dipasang di kompartemen alat
7. Bersihkan vulva dan perineum, usap secara perlahan dari depan ke

belakang memakai kapas DTT.

Hasil: vulva dan perineum sudah bersih

8. Melakukan pemeriksaan dalam (PD) agar bisa dipastikan dilatasi total (jika ketuban tidak pecah lalu pembukaan selesai, terapkan amniotomi).

Hasil : pemeriksaan dalam tanggal 7 juli 2022 pukul 14.45 WITA oleh mahasiswa "N"

Keadaan vulvavagina : Tidak ada kelainan

Portio : Melesap dan tidak teraba

Pembukaan : 10cm

Ketuban : Pecah

Presentase : Ubun-ubun kecil dibawah simpisis

Penurunan : Hodge IV

Molase : 0

Penumbungan : Tidak ada

Kesan panggul : Normal

Pelepasan : Lendir, darah dan air ketuban

9. Bersihkan sarung tangan yang sudah terkontaminasi memakai larutan klorin 0,5% lalu buka hingga membalik, kemudian bilas dalam 10 menit

Hasil : sarung tangan dihilangkan dan didesinfeksi dalam larutan klorin 0,5% dalam 10 menit.

10. Benar-benar melihat FHR setelah kompresi, untuk menjamin FHR berada di dalam titik batas normal, yaitu 120-160x/menit

Hasil: Suara DJJ, area kekuatan mayor untuk jelas, biasa pada kuadran kiri bawah bagian tengah ibu dengan frekuensi 135x/menit.

11. Jelaskan pada ibu dan keluarga bahwasanya pembukaan telah selesai dan bayi dan ibu dengan kondisi yang sehat.

Hasil: ibu dan keluarga sudah dijelaskan

12. Mintalah keluarga untuk memberikan pertolongan dalam mengatur posisi mengejan (Dengan asumsi ada sensasi kebutuhan untuk berkontraksi, area kekuatan yang serius untuk dan terjadi, tolong ibu untuk posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan



pastikan ibu merasakan kenyamanan

Hasil: keluarga siap menolong

13. Lakukan inisiatif mengejan bila ibu mempunyai dorongan yang memaksa untuk mengejan, membimbing ibu mengejan bila ibu benar-benar ingin mengejan, menawarkan bantuan dan dukungan terhadap usaha ibu mengejan, anjurkan ibu untuk istirahat diantara penyempitan dan dorong ibu untuk minum di antara kompresi.

Hasil: puncak meneran telah dilakukan, ibu beristirahat lalu minum selama kontraksi, dan ibu diberikan dukungan penuh.

14. Ketika ibu belum benar-benar ingin mendorong, dorong ibu untuk jalan-jalan, berjongkok, ataupun ambil tempat yang membuat ibu dalam keadaan aman.

Hasil: ibu sudah dalam keadaan baik tepatnya posisi bergeser ke kiri

15. Ketika kepala anak sudah terbuka vulva ukuran 5-6 cm, simpan handuk bersih di perut ibu.

Hasil: handuk bersih sudah di simpan di perut ibu

16. Letakkan kain bersih dilipat 1/3 dari alas di bawah bagian belakang ibu

Hasil: benar-benar selesai

17. Buka set nifas agar menjamin terpenuhinya peralatan dan bahan.

Hasil: alat dan bahan sudah selesai

18. Kenakan sarung tangan steril di kedua tangan

Hasil: sarung tangan steril sudah dikenakan

19. Pasca kepala anak terbuka vulva dengan lebar 5-6 cm, laksanakan penopang agar perineum terlindungi melalui satu tangan ditutup dengan bahan yang sempurna dan kering, selanjutnya tangan lainnya di atas kepala anak dan berikan regangan halus untuk terjadinya difleksi maksimal.

Hasil: dukungan sudah dilaksanakan lalu kepala anak telah dilahirkan.

20. Periksa apakah tali pusar tersangkut dan lakukan gerakan yang sesuai jika hal itu terjadi, dan lanjutkan dengan cepat dengan lahirnya bayi anak.

Hasil: tidak ada putaran tali pusar

21. Percayalah bahwasanya kepala akan membuat putaran poros luar yang tidak dibatasi.

Hasil: kepala telah dengan cepat memutar paksi luar

22. Putaran paksi luar yang langsung dilaksanakan, buat pula genggam biparietal, letakkan dua tangan di wajah anak itu. Latih ibu dalam melakukan peregangan untuk penyempitan berikutnya, tarik anak dengan lembut ke bawah untuk menarik bahu depan, lalu tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang.

Hasil: dukungan biparietal dilaksanakan, dan kedua bahu dibawa.

23. Pasca bahu anak lahir, pindahkan tangan bagian bawah ke arah perineum ibu untuk membantu kepala, lengan bawah dan siku. Manfaatkan tangan atas dalam mencari dan menahan lengan atas dan siku.

Hasil: bahu dan lengan anak telah tersampaikan.

24. Pasca tubuh juga lengan terbentuk, ikuti terus tangan ke punggung, posterior, tungkai dan kaki dan pegang setiap kaki dengan ibu jari dan jari yang berbeda.

Hasil: sudah selesai, lalu anak itu dilahirkan secara tiba-tiba

25. Laksanakan evaluasi cepat, gunakan pengamatan apakah anak menangis dengan berisik, bernapas dengan mudah, anak melakukan pergerakan aktif lalu warna kulitnya.

Hasil: anak yang baru lahir langsung menangis, bernapas lega, bergerak efektif dan kulit tubuh merah.

26. Bersihkan lalu keringkan anak dari wajah, kepala, bagian tubuh lainnya, selain tangan tanpa membersihkan vernix caseosa.

Hasil: anak sudah bersih dan kering

### **KALA III**

#### **DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah
2. Ibu tampak senang dengan kelahiranbayinya.
3. Ibu mengatakan plasenta atau ari-arinya belum lahir

### **DATA OBJEKTIF (O)**

1. Bayi lahir spontan segera menangis, tanggal 7 juli 2022 pukul 15.20 WITA, dengan jenis kelamin laki-laki, BBL = 3000 gram, PBL = 49 cm, A/S =8/10
2. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras
3. Tinggi fundus uteri setinggipusat.
4. Plasenta belum lahir
5. Kandung kemih ibu kosong

### **ASSESSMENT (A)**

Berlangsung kalaIII

### **PLANNING (P)**

Tanggal 7 juli 2022 pukul 15.20 WITA

1. Pastikan tidak ada janin lagi didalam rahim  
Hasil: ibu hamil hanya dengan satu anak
2. Beri tahu ibu bahwasanya dia mengeluarkan oksitosin supaya rahim berkontraksi bagus.  
Hasil: sudah disampaikanlalu ibu akan diinfus.
3. Rentang waktu 1 menit saat anak lahir, infus oksitosin 10 unit IM di 1/3 atas paha horizontal distal (aspirasi sebelum infus oksitosin).  
Hasil: oksitosin sudah diinfuskan
4. Pasca 2 menit bersalin, pegang tali pusar dengan kencangkan sekitar 3 cm dari tengah anak. Dengan mendorong tali pusar ke arah distal (ibu) dan mengikat tali pusar ke belakang 2 cm distal ke penyangga utama.  
Hasil: tali pusar sudah terpotong
5. Memakai satu tangan, pegang tali pusar yang telah dijepit (melindungi perut anak), dan potong tali pusar di antara 2 simpul.  
Hasil: tali pusar sudah terputus
6. Pasang tali pusat dengan tali steril di satu sisi lalu pada saat itu, lingkari tali dan ikat dengan tandan vital di sisi yang berlawanan.  
Hasil: tali pusar telah terpasang dengan tali steril.

7. Posisikan telungkup pada dada ibu dengan tujuan agar ada kontak kulit antara ibu dan anak. Perbaiki bahu anak dengan tujuan agar anak menempel di dada/perut ibu.  
Hasil: benar-benar selesai
8. Selimuti ibu dan anak menggunakan bahan yang hangat dan bersih, kemudian tutup kepala anak.  
Hasil: anak dan ibu telah ditutup dengan kain yang nyaman dan anak telah dipakaikan topi
9. Pindahkan klem pada tali pusar sejauh 5-10 cm dari vulva.  
Hasil: gesper sudah dipindahkan
10. Letakkan satu tangan di atas bahan di bagian tengah ibu, di tepi atas simfisis, untuk mengenali, sementara tangan yang lain memperpanjang garis pusar.  
Hasil: selesai
11. Pasca rahim berkontraksi, regangkan tali pusar ke bawah sementara tangan yang lain dengan lembut mendorong rahim ke atas (dorso kranial) (untuk mencegah pembalikan rahim). Ketika plasenta belum keluar pasca 30 - 40 detik, berhentilah memperpanjang tali pusar dan percaya bahwa penyempitan berikutnya akan terjadi dan ulangi prosedurnya.  
Hasil: Dorso kranial push telah selesai
12. Regangkan dan dorong dorso kranial sampai plasenta lepas, anjurkan ibu melakukan penekanan sementara bidan menjulurkan tali pusar sejajar dengan lantai lalu ke atas, ikuti poros jalan bersalin.  
Hasil: benar-benar selesai
13. Ketika plasenta terlihat di vulva, lanjutkan membawa plasenta dengan hati-hati, pegang plasenta dengan dua tangan dan putar searah jarum jam untuk membantu mengeluarkan plasenta dan mencegah robeknya selaput.  
Hasil: plasenta lahir 5 menit setelah pasca anak dilahirkan
14. Plasenta keluar, usap fundus uteri dengan cara menggosok fundus uteri dengan sirkuler memakai potongan palmar dari 4 jari tangan kiri sampai penarikan uterus besar.

Hasil: gosok punggung rahim telah selesai

15. Lihatlah potongan plasenta ibu dan janin menggunakan tangan kanan agar bisa dipastikan bahwasanya semua kotiledon dan lapisan selesai, dan masukkan ke dalam karung plastik yang diberikan.

Hasil: plasenta keluar dengan kotiledon dan lapisan yang lengkap.

16. Kaji potensi adanya sayatan vagina dan perineum. Lakukan jahitan dengan asumsi luka menyebabkan kematian.

Hasil : sudah selesai, dan tidak ada luka sayatan pada perineum.

17. Pastikan rahim sangat berkontraksi dan tidak ada perdarahan vagina

Hasil: sudah selesai, dan seluruh rahim berkontraksi, terasa bulat dan keras.

18. Anak harus berkontak langsung dengan ibunya selama sekitar 60 menit

Hasil : sudah selesai, biarkan anak terhubung selama 60 menit.

19. Pasca 60 menit, timbang/ukur anak, berikan tetes mata profilaksis antimikroba, dan nutrisi K1 1 mg secara intramuskular (IM) di anterolateral paha kiri.

Hasil : anak sudah diberikan pengobatan mata antitoksin profilaksis, dan sudah diberikan infus vitamin K secara intramuskular pada paha anterolateral kiri.

BBL=3000gram

PBL = 49 cm

LK =33 cm

LD = 33 cm

LP= 31cm

20. Pasca 1 jam diberikan infus vitamin K, berikan vaksinasi infus hepatitis B di paha anterolateral kanan secara intramuskular

Hasil : Infus hepatitis B telah selesai di anterolateral paha kanan secara intramuscular

## **KALA IV**

### **DATA SUBJEKTIF (S)**

1. Ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah, setelah melahirkan.
2. Ibu senang dengan kelahiran bayinya
3. Ibu mengatakan belum BAB setelah melahirkan dan sudah BAB
4. Keadaan ibu baik
5. Kesadaran compos mentis
6. Tanda-tanda vital dalam batas normal  
TD : 120/70  
N : 78x/ menit  
S : 36.5°C  
P : 20x/ menit
7. Plasenta dan selaput ketuban telah lahir lengkap
8. Ibu tampak kelelahan setelah proses persalinan
9. Kontraksi uterus baik, teraba bundar dan keras

### **ASSESSMENT (A)**

Berlangsung kala IV

### **PLANNING (P)**

Tanggal 7 juli 2022 pukul 15.35 WITA

1. Terus periksa kontraksi lalu mencegah perdarahan vagina, 15 menit dalam 1 jam awal bersalin, lalu 30 menit di 2 jam setelah bersalin  
Hasil: observasi sudah selesai, tidak ada perdarahan vagina, dan penyempitan rahim terlihat jelas dan keras.
2. Tunjukkan pada ibu/keluarga teknik menggosok uterus dan mengevaluasi kontraksi  
Hasil: sudah selesai dan ibu paham apa yang diinstruksikan.
3. Menilai dan memberikan stimulus berapa banyak darah yang hilang misalnya 15 menit dalam 1 jam setelah bersalin, juga tiap 30 menit di 2 jam setelah bersalin  
Hasil : total darah  $\pm 150$  cc

4. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital ibu (kecuali pernapasan), tinggi fundus uteri, kontraksi uterus dan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam dan setiap 30 menit pada jam ke 2 pascapersalinan

Hasil :

Jam	Waktu (WITA)	TD	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi uterus	Kandung kemih	perdarahan
I	15.45 WITA	110/80	80 x/i	36.5° C	Stpst	Baik	Kosong	50 cc
	16.00 WITA	110/80	80 x/i		Stpst	Baik	Kosong	30 cc
	16.15 WITA	110/80	78 x/i		Stpst	Baik	Kosong	30 cc
	16.30 WITA	110/80	78 x/i		Stpst	Baik	Kosong	20 cc
II	17.00 WITA	110/80	80 x/i	36.5° C	Stpst	Baik	Kosong	10 cc
	17.30 WITA	110/80	80 x/i		Stpst	Baik	Kosong	10 cc

5. Verifikasi ulang anak untuk menjamin bahwa anak bernapas dengan baik (40-60 x/menit) dan tingkat panas internal baik khususnya

Hasil: telah diperiksa

6. Posisikan seluruh alat yang sudah dipakai masuk ke larutan klorin 0,5% untuk pemurnian (selama 10 menit). Cuci dan siram setelah pemurnian.

Hasil : sudah selesai, dan alat sudah terendam klorin agar dibersihkan.

7. Alat serta bahan yang tercemar buang ke dalam tabung limbah yang tepat.

Hasil: benar-benar selesai

8. Bantu ibu membersihkan diri memakai air DTT. Membersihkan cairan ketuban yang masih ada, cairan tubuh dan darah. Selain itu, bantu ibu

mengenakan pakaian bersih dan kering.

Hasil : ibu sudah bersih, ibu juga sudah mengenakan pakaian yang bersih dan kering.

9. Ibu harus dijamin bahwa ia memiliki rasa aman yang kuat dan baik. Berikan bantuan pada ibu dalam pemberian ASI untuk anaknya, dan beritahu keluarga agar mengingatkan ibu minum dan makan

Hasil: ibu sudah merasakan kenyamanan, ibu sudah memberikan asi anaknya, lalu ibu sudah makan dan minum dengan bantuan keluarga.

10. Sterilkan lokasi persalinan dengan pengaturan klorin 0,5%.

Hasil: selesai

11. Masukkan sarung tangan kotor masuk ke larutan klorin 0,5%, lalu buka dengan posisi terbalik dari belakang ke depan, kemudian, pada saat itu, serap larutan klorin 0,5% selama 10 menit.

Hasil: benar-benar selesai

12. Kedua tangan dicuci dengan pembersih di bawah air mengalir memakai metode cuci tangan 7 tahap.

Hasil: sudah jadi dan bagian tengahnya sudah dicuci.

13. Selesaikan partograf (halaman depan dan akhir)

Hasil : partograf sudah selesai.





**CATATAN PERSALINAN**

- Tanggal : 7 - 7 - 2011
- Nama bidan : .....
- Tempat Persalinan :
  - Rumah ibu  Puskesmas
  - Polindes  Rumah Sakit
  - Klinik Swasta  Lainnya : .....
- Alamat tempat persalinan : .....
- Catatan :  rujuk, kala : I / II / III / IV
- Alasan merujuk : .....
- Tempat rujukan : .....
- Pendamping pada saat merujuk :
  - Bidan  Teman
  - Suami  Dukun
  - Keluarga  Tidak ada

- KALA I**
- Partogram melewati garis waspada : Y / D
  - Masalah lain, sebutkan : .....
  - Penatalaksanaan masalah Tsb : .....
  - Hasilnya : .....

- KALA II**
- Episiotomi :
    - Ya, indikasi
    - Tidak
  - Pendamping pada saat persalinan
    - Suami  Teman  Tidak ada
    - Keluarga  Dukun
  - Gawat Janin :
    - Ya, tindakan yang dilakukan
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
  - Tidak
  - Distosta bahu :
    - Ya, tindakan yang dilakukan
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
  - Tidak
  - Masalah lain, sebutkan : .....
  - Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
  - Hasilnya : .....

- KALA III**
- Lama kala III : 15 menit
  - Pemberian Oksitosin 10 U lm ?
    - Ya, waktu : .....
    - Tidak, alasan .....
  - Pemberian ulang Oksitosin (2x) ?
    - Ya, alasan .....
    - Tidak
  - Pengendalian tali pusat terkendali ?
    - Ya
    - Tidak, alasan .....

**PEMANTAUAN PERSALINAN KALA IV**

Jam Ke	Waktu	Tekanan darah	Nadi	Suhu	Tinggi Fundus Uteri	Kontraksi Uterus	Kandung Kemih	Perdarahan
1	15.45	110/80 mmHg	80 x / 1'	36,5°C	STP	Baik	Kosong	± 50 cc
	16.00	110/80 mmHg	80 x / 1'		STP	Baik	Kosong	± 50 cc
	16.15	110/80 mmHg	80 x / 1'		STP	Baik	Kosong	± 50 cc
	16.30	110/80 mmHg	80 x / 1'		STP	Baik	Kosong	± 50 cc
2	17.00	110/80 mmHg	80 x / 1'	36,5°C	STP	Baik	Kosong	± 50 cc
	17.20	110/80 mmHg	80 x / 1'		STP	Baik	Kosong	± 50 cc

- Masalah kala IV : Tidak ada masalah
- Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
- Hasilnya : .....

- Mengasah fundus uteri ?
  - Ya
  - Tidak, alasan .....
- Plasenta lahir lengkap (intact) Ya / Tidak
  - Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan :
    - a. ....
    - b. ....
- Plasenta tidak lahir > 30 menit : Ya / Tidak
  - Ya, tindakan :
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
  - Tidak
- Laserasi :
  - Ya, dimana .....
  - Tidak
- Jika laserasi perineum, derajat : 1 / 2 / 3 / 4
  - Tindakan :
    - Panjahan, dengan / tanpa anestesi
    - Tidak dijahit, alasan .....
- Atoni uteri :
  - Ya, tindakan
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
  - Tidak
- Jumlah perdarahan : ± 150 ml
- Masalah lain, sebutkan : .....
- Penatalaksanaan masalah tersebut : .....
- Hasilnya : .....

**BAYI BARU LAHIR :**

- Berat badan : 3300 gram
- Panjang : 51 cm
- Jenis kelamin : D / P
- Penilaian bayi baru lahir : Baik / ada penyulit
- Bayi lahir :
  - Normal, tindakan :
    - mengeringkan
    - perhangatkan
    - rangsang taktil
    - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
  - Asfiksia ringan/pucat/biru/tomas/tindakan :
    - mengeringkan  bebaskan jalan napas
    - rangsang taktil  menghangatkan
    - bungkus bayi dan tempatkan di sisi ibu
    - lain - lain sebutkan .....
  - Cacat bawaan, sebutkan : .....
  - Hipotermi, tindakan :
    - a. ....
    - b. ....
    - c. ....
- Pemberian ASI
  - Ya, waktu : 1 jam setelah bayi lahir
  - Tidak, alasan .....
- Masalah lain, sebutkan : .....
- Hasilnya : .....

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA  
NIFAS PADA NY”S” DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TANGGAL 8 JULI ( NIFAS HARI KE – 2 )**

Tanggal pengkajian : 8 juli 2022, Jam 08.00 WITA

**Identitas Istri / Suami**

Nama : Ny. “S” / Tn“H”

Umur : 18 Th / 23 Th

Suku :Makassar/Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMP/S1

Pekerjaan : IRT/Buruhharian

Menikah : 1 kali

Alamat : Jl. Veteran Utara

**Data Subjektif ( S )**

1. Ibu melahirkan tanggal 7 juli 2022, jam 15.20 WITA.
2. Ada pengeluaranarah
3. Nyeri perineum
4. Ibu belum mengerti cara perawatan bayi.

**Data Objektif (O)**

1. Ekspresi wajah ibu meringis saatbergerak.
2. Ada pengeluaran ASI saat puting susudipencet.
3. TFU 2 jari dibawah pusat, teraba keras danbundar.

4. Luka perineum masih basah.
5. Pengeluaran lochiarubra.
6. Tanda - tanda vitalibu
  - a. Tekanandarah : 110 / 80 mmHg
  - b. Nadi : 80x/ menit
  - c. Suhu : 35,7 °C
  - d. Pernapasan : 20x / menit
7. Obat - obatan yangdiberikan
  - a. Asam efenamat 3x1tablet
  - b. Amoxicillin 3x1tablet
  - c. Novabion 1x1tablet
8. Tanda - tanda vitalbayi:
  - a. Suhu : 36,5 °C
  - b. Pernapasan : 40 x/menit
9. Tali pusat masih basah danterbungkus dengan bethadine dan gassteril.

**Assessment (A)**

Post partum hari ke-2 dengan nyeriperineum

**Planning (P)**

Tanggal 8 juli 2022 pukul 08.00 WITA

- a. Mengobservasi tanda - tanda vitalibu

TD : 110 / 70mmHg

Nadi : 80x /menit

Suhu : 36,5 °C

P : 20x / menit

- b. Memperhatikan TFU, konstiksi rahim, juga pelepasan lokia secara

- konsisten: TFU 2 jari di bawah pusat, penarikan uterus yang besar (terlihat keras dan bulat), pelepasan lochia rubra.
- c. Dorong ibu agar melaksanakan aktivasi dini: ibu digeser dua arah di tempat tidurnya dan dapat berjalan-jalan ke kamar kecil untuk buang air kecil.
  - d. Bantu dan anjurkan ibu agar melaksanakan rawat luka perineum juga penjagaan bersihnya vulva. Ibu mendapatkan informasinya dan akan melaksanakannya tanpa bantuan siapa pun.
  - e. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergiziseimbang
  - f. Berikan informasi perihal bagaimana merawat anak dalam kehidupan seharinya: para ibu paham lalu mengusahakan melakukan perawatan bayi mereka sendiri.
  - g. Memberikan semangat, support, dan motivasi agar dia dapat mandiri menangani anaknya sendirian: ibu memiliki perasaan bahwasanya dia benar-benar perlu mengumpulkan beberapa pengalaman penting tentang pengasuhan anak.
  - h. Anjurkan para ibu agar memberikan asi anaknya walaupun tidak diminta (berdasarkan permintaan): para ibu memberikan asi anaknya dalam waktu yang sering dan sesegera mungkin ketika anak membutuhkan.
  - i. Berikan semangat dan support penuh kepada ibu agar merasa diperhatikan, sehingga merasa senang merawat diri dan bayinya.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA  
NIFAS PADA NY”S” DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TANGGAL 13 JULI ( NIFAS HARI KE – 7 )**

**Kunjungan Rumah ke-1**

**Data subjektif ( S )**

1. Tidak ada nyeri perineum atau keluhan yang dirasa
2. ASI belumlancar
3. Ada pengeluaran darah pada jalanlahir
4. Ibu sudah pandai merawat sendiribayi.

**Data Objektif ( O )**

1. Ekspresi wajah ibu tampaksenang,
2. Keluar ASI saat putting susudipencet
3. Luka perineum masih sedikit lembab
4. Pengeluaran lochiasanguilenta
5. Tanda - tanda vitalibu

Tekanandarah : 110 / 70 mmHg

Nadi : 82 kali /menit

Suhu : 36,4 °C

Pernapasan : 20 kali / menit

**Assesment (A)**

Waktu nifas hari ke-7 dengan luka perineum masi tampak lembab, ada pengeluaran lokia sanguilenta.

## Planning ( P )

Tanggal 13 Juli 2022, Jam 08.00 - 13.30 WITA

a. Mengobservasi tanda - tanda vitalibu

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82x / menit

Suhu : 36,4 °C

Pernapasan : 20x / menit.

b. Bantu dan anjurkan ibu agar melaksanakan rawat luka perineum lalu melakukan penjagaan pada kebersihan vulva

c. Mengajarkan ibu cara merawat payudara untuk kebersihan dan kelancaran ASI

d. Mengajarkan dan menganjurkan ibu untuk melakukan perawatan luka perineum dan menjaga kebersihan vulva

e. Menganjurkan ibu mengkonsumsi makan makanan yang bergizi dan seimbang

f. Berikan semangat dan support penuh kepada ibu agar merasa diperhatikan, sehingga merasa senang merawat diri dan bayinya.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA  
NIFAS PADA NY "S" DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TANGGAL 3 AGUSTUS ( NIFAS HARI KE-28 )**

**Kunjungan Rumah ke-2**

**Data subjektif ( S )**

1. Luka perineum sudah mulai kering
2. Pengeluaran ASI mulai lancar

**Data objektif ( O )**

1. Ekspresi wajah ibu tampak ceria dan sering senyum
2. Luka perineum tampak lebih kering
3. Pengeluaran lochia alba
4. Mengukur tanda - tanda vital ibu
  - TD : 110/80 mmHg
  - Nadi : 82 x /menit
  - Suhu : 36,4 °C
  - P : 22x/menit

**Assesment (A)**

Masa nifas normal hari ke-28, luka perineum tampak lebih kering

**Planning ( P )**

Tanggal 3 Agustus 2022, jam 08.00 WITA

- a. Mengobservasi tanda - tanda vital ibu

TD : mmHg  
Nadi : 80 x/ menit  
Suhu : 36,4 °C



P : 22 x/ menit

- b. Ingatkan ibu agar senantiasa fokus pada kebersihan pribadi, ganti handuk dengan asumsi Anda merasa basah dan konsisten makan makanan bergizi yang disesuaikan dalam tahap ibu memberi asi.
- c. Menganjurkan agar ibu memberikan asi pada bayinya walaupun tidak direncanakan (berdasarkan permintaan): para ibu memberikan asi pada anaknya dalam waktu yang berdekatan dan langsung diberikan ketika anak menginginkannya
- d. Berikan semangat dan support penuh kepada ibu agar merasa diperhatikan, sehingga merasa senang merawat diri dan bayinya.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN MASA  
NIFAS PADA NY "S" DENGAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR  
TANGGAL 17 AGUSTUS ( NIFAS HARI KE - 42 )**

**Kunjungan Rumah ke-3**

**Data subjektif ( S )**

1. Luka perineum sudah kering
2. ASI banyak
3. Bayi sering menetek

**Data objektif ( O )**

1. Ekspresi wajah ibu sering tersenyum ketika berbicara
2. Luka perineum kering,
3. Mengukur tanda - tanda vital ibu

Tekanan darah : 110/80 mmHg

Nadi : 82 kali /menit

Suhu : 37 °C

P : 22x/menit

**Assesment ( A )**

Masa nifas normal hari ke-42

**Planning ( P )**

Tanggal 17 Agustus 2022, jam 08.00 WITA

2. Masa nifas normal hari ke-42

- a. Tangan yang digunakan untuk melakukan tindakan baik ketika ingin

melakukan atau setelahnya harus di cuci hingga bersih

b. Mengobservasi tanda - tanda vital ibu

TD : 120/80 mmHg

Nadi : 80 x / menit

Suhu : 37 °C

P : 22 x/ menit

- c. Ingatkan ibu agar senantiasa fokus pada kebersihan pribadi, ganti duk dengan asumsi bahwa Anda merasa lembek dan konsisten makan makanan bergizi yang disesuaikan untuk ibu menyusui.
- d. Menganjurkan ibu agar memberikan asi pada anaknya walaupun tidak diminta (berdasarkan permintaan): ibu memberikan asi dalam waktu yang sering juga ketika anak membutuhkan.
- e. Berikan semangat dan support penuh kepada ibu agar merasa diperhatikan, sehingga merasa senang merawat diri dan bayinya.
- f. Ingatkan ibu untuk selalu berdoa kepada Allah SWT, supaya diberi keseatan untuk dirinya dan keluarga.

## MATRIKS KUNJUNGAN

No.	Hari/Tanggal	Hasil Anamnesa	Pemeriksaan	Follow Up
1.	Jum'at, 8 juli 2022 Jam 08.00 WITA Nifas hari ke-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ada pengeluaran lokia rubra</li> <li>- nyeri perineum saat bergerak</li> <li>- ada pengeluaran ASI saat putting susu dipencet</li> <li>- TFU 2jrbpst, teraba keras dan bundar</li> <li>- luka perineum masih basah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadaan umum baik</li> <li>• kesadaran komposmentis</li> </ul> <p>TTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD : 110/80</li> <li>• N : 80x/menit</li> <li>• S : 35,7</li> <li>• P : 20x/menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengajarkan ibu teknik relaksasi guna untuk mengurangi rasa nyeri</li> <li>- anjurkan ibu untuk mobilisasi dini</li> <li>- anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan diri dan merawat luka perineum</li> <li>- anjurkan ibu untuk rutn memberi ASI</li> </ul>
2.	Rabu, 13 juli 2022 Jam 10.00 WITA Nifas hari ke- 7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ada pengeluaran lokia sanguilenta</li> <li>- tidak merasakan ada nyeri</li> <li>- ASI ibu belum terlalu lancar</li> <li>- luka perineum masi lembab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadaan umum baik</li> <li>• kesadaran komposmentis</li> </ul> <p>TTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD : 110/70</li> <li>• N : 82x/menit</li> <li>• S : 36,4</li> <li>• P : 20x/menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anjurkan ibu untuk tetap merawat luka perineum dan menjaga kebersihan diri dan sekitar</li> <li>- anjurkan ibu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, terutama untuk memperlancar produksi ASI, seperti sayur kelor</li> <li>- beri semangat dan support kepada ibu, agar merasa senang</li> </ul>
3.	Rabu, 3 august 2022 Jam 10.00 WITA Nifas hari ke - 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengeluaran lokia alba</li> <li>- luka perineum mulai kering</li> <li>- ibu senang dan ceria ketika berbicara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadaan umum baik</li> <li>• kesadaran komposmentis</li> </ul> <p>TTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD : 110/80</li> <li>• N : 82x/menit</li> <li>• S : 36,4</li> <li>• P : 22x/menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingatkan ibu agar selalu menjaga kebersihan diri</li> <li>- anjurkan ibu untuk selalu makan makanan yang bergizi seimbang</li> <li>- beri support, apresiasi terhadap ibu</li> <li>- ingatkan ibu untuk selalu berdoa untuk kesehatan diri dan keluarga</li> </ul>
4.	Rabu, 17 august 2022 Jam 12.00 WITA Nifas hari ke-42	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengeluaran ASI lancar</li> <li>- luka perineum kering</li> <li>- tidak ada nyeri</li> <li>- ibu bersyukur dan bahagia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• keadaan umum baik</li> <li>• kesadaran komposmentis</li> </ul> <p>TTV</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TD : 110/80</li> <li>• N : 82x/menit</li> <li>• S : 37</li> <li>• P : 22x/menit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ingatkan ibu agar selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, terutama memberi menyusui</li> <li>- ingatkan ibu untuk selalu makan makanan yang bergizi seimbang</li> <li>- beri support, apresiasi terhadap semua yang telah ibu lakukan</li> <li>- ingatkan ibu untuk berdoa kepada Allah swt, agar diberi kesehatan diri dan keluarga.</li> </ul>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan terkait asuhan kebidanan pada Ny "S" yang dengan persalinan normal di PKM Bara-Baraya Makassar pada tanggal 7 Juli – 23 Agustus 2022. Asuhan dilaksanakan secara menyeluru meliputi kala I - IV dan dilanjut dengan asuhan post partum menggunakan pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney.

Mengingat cara penanganan pertolongan persalinan dilakukan dengan 7 langkah Varney, mulai dari pengkajian informasi dan analisis informasi mendasar, bukti yang dapat dikenali/diagnosis masalah yang sebenarnya, temukan diagnosa yang mungkin, intervensi cepat, upaya bersama dan merujuk, merencanakan pertolongan persalinan, terakhir pendokumentasian hasil akhir dari asuhan kebidanan yang diberikan.

#### **A. Langkah I Identifikasi Data Dasar**

Langkah awal adalah langkah yang pastinya menjadi penentu tahap selanjutnya. Informasi yang dikumpulkan adalah mengumpulkan data perihal klien/individu yang ingin diberikan perawatan. Aktivitas pemilahan informasi dilakukan ketika klien mulai memasuki lalu di teruskan secara konsisten dalam proses asuhan kebidanan dilakukan, informasi bisa disatukan yang asalnya dari banyak referensi.

Pemenuhan informasi sesuai kasus saat ini akan menentukan siklus pemahaman yang tepat atau tidak pada tahap berikut, sehingga pendekatan

ini harus lengkap termasuk informasi subjektif, obyektif dan hasil penilaian sehingga dapat menggambarkan kondisi asli atau input klien.

Mengingat hasil pengkajian asuhan kebidanan di kala I yang diperoleh Ny. "S" umur 18 tahun, GIPOA0, mendatangi PKM di jam 11.00 dengan mengeluh menderita nyeri di bagian bawah yang berasal dari perut, bagian tengah, yang muncul pula cairan tubuh bersatu dengan darah sejak 7 Juli 2022 pukul 05.00 Wita, dan rasa nyeri yang ibu rasa seperti bolak-balik lalu makin teratur dan makin sakit, pasien menyatakan bahwa pada kehamilan ini perkembangan janin baik dan dia telah melakukan kunjungan 5x *antenatal care*(ANC) di Puskesmas Muhammadiyah Makassar, pasien mengatakan hari pertama haid terakhirnya adalah 25 September 2021, usia kehamilannya kini telah mencapai  $\pm$  9 bulan, pasien menyatakan bahwa ketika hamil belum pernah merasa nyeri yang berat.

Pasien tidak pernah merasakan cedera ketika hamil saat ini ataupun kehamilan di masa lalu, pasien belum pernah merasakan penyulit dan cedera ketika bersalin dan persalinan yang lalu, pasien mengatakantidak mempunyai pengalaman penyakit, misalnya, tekanan darah tinggi, asma, jantung, diabetes, dan penyakit menular yang lain, pasien tidak mempunyai pengalaman meminum obat dalam kehamilan meskipun tidak ada obat dari bidan/dokter.

Ketika mengkaji fisik pasien, perhatian tingkat kesadarannya, kondisi umum bagus, denyut nadi 120/70 mmHg, kocok 80x/menit, bernafas 20x/menit, dan suhu 36,5 ° C terlihat gelisah, tidak nyaman dan

meringin kesakitan, tanpa edema dan terdapat pembengkakan di wajah, kedua konjungtiva mata tidak anemis dan bukan penyakit kuning, tidak ada pembesaran organ tiroid, getah bening dan vena jugularis, payudara tampak simetris, hiperpigmentasi di mammae areola. Penilaian *abdomen* mendapat penilaian yaitu tingkat fundus uterus (TFU) 2 jari di bawah *Processus xiploideus*, 32

Pemeriksaan awal pada 7 Juli 2022 pada pukul 11.00 wita, tidak ada masalah di vulva dan vagina, portio yang halus dan ramping, ada pembukaan 7 cm, cairan ketuban lengkap, tingkat kepala adalah mahkota kecil adalah mahkota kecil Sebelum simfisis, berkurang Hodge III, molase 0, dan tidak ada perkembangan, dan kesan panggul biasa. Penilaian pada tanggal 7 Juli 2022 pada pukul 12:30 hasilnya dilacak tidak ada penyimpangan dalam vulva dan vagina, kondisi portio yang halus dan tipis, ada pembukaan 10 cm, cairan ketuban pecah dengan warna amniotik yang wajar, tingkat kepala adalah mahkota kecil berada di bawah simfisis, berkurang Hodge IV, molase 0 dan tidak ada perkembangan, lalu panggul normal yang diharapkan dan ada lendir yang keluar juga, air dan darah.

Pada penilaian kulit perut, keberadaan linea nigra dan striae alba yang menunjukkan lebih dari satu kehamilan dan kekuatan otot kendur, ada denyut nadi janin dan terasa bagian janin selama palpasi adalah salah satu indikasi spesifik kehamilan (Prawirohardjo, 2017).

Melihat output pemeriksaan, diamati dengan memakai rumus Neagle, dimulai dari hari pertama haid akhir hingga tanggal dikaji, sehingga

usia kehamilan adalah 40 minggu 5 hari (Prawirohardjo, 2017). Bagian rahim lokasi janin bisa mengalami perkembangan dan pertumbuhan yaitu rongga rahim di mana lubang ini merupakan tempat besar bagi embrio agar bisa tinggal hingga ketika atern tanpa nyeri hebat di perut (Baety, 2015).

Dalam melakukan penilaian pada turunnya kepala janin, itu selesai dengan menghitung sejauh mana bagian bawah embrio yang masih melampaui simfisis dan dapat diperkirakan dengan lima jari (kelima), bagian dari simfisis adalah sejauh mana yang belum memasuki pintu delta panggul (bap) lalu sisanya sudah masuk ke ointu atas panggul (Pap) (Widia, 2015).

Munculnya pergerakan janin juga denyut jantung janin (FHR) adalah indikasi bahwa janin baik-baik saja. Janinnya sehat, suara jantungnya normal dan frekuensinya antara 120-160 kali setiap momen, selain indikasi bayi hidup juga dapat dilihat dari area kekuatan untuk perkembangan yang dirasakan oleh ibu satu kali atau setiap jam atau lebih dari 10 kali setiap hari dan membesarnya rahim menunjukkan embrio masih hidup dan berkembang (Prawirohardjo, 2017).

Fungsi tubuh yang penting dari ibu berada di dalam titik normal dan denyut jantung janin (DJJ) yang memiliki keteraturan juga merupakan titik batas normal menunjukkan bahwa ibu dan janin tampak hebat, konjungtiva merah muda, hemoglobin 10,5 g/dL (Pantiawati dan Saryono, 2018).

Dalam fase kala I, yang dipisahkan oleh his adalah mereka yang memiliki karakteristik misalnya, perut yang sangat sakit hingga ke depan,



kontraksi teratur, jarak makin terbatas dan kekuatan yang lebih menonjol, memengaruhi perubahan serviks. Persalinan pastinya diketahui dengan pelepasan cairan tubuh dari jalur serviks disebabkan adanya pembukaan dan pelepasan darah karena pecahnya pembuluh vena (Nurul Jannah, 2017).

Tanda-tanda dan efek samping dari tahap berikutnya yaitu kala II pembukaan total (seperti sekarang tidak ada bibir porsio), hal demikian ada sebab munculnya dorongan bagian bawah janin ke dasar panggul karena rahim berkontraksi dengan kuat sampai porsio terbuka secara bertahap, kontraksi yang makin teratur dan lebih sakit ( $\pm$  2-3 menit 1 kali) dan sensasi ingin mengejan muncul, mengingat umumnya bagian bawah janin yang masuk ke dasar panggul hingga menyebabkan ketegangan pada otot-otot dasar panggul, yang secara refleks menyebabkan sensasi mengejan.

Bercampurnya darah dengan cairan tubuh, yang dikarenakan serviks yang robek dan meluas, kantung ketuban pecah, kontraksi membuat munculnya perbedaan penekanan yang kuat diantara tegangan di dalam rahim dan di luar rahim dengan demikian kantong ketuban tidak mampu menahan ketegangan bagian rahim akhirnya pecah kantong ketuban. Bagian belakang terbuka, karena bagian terkecil dari tukik masuk ke panggul sehingga menekan dubur dan buang air besar, ini membuat bokong terbuka, terbuka vulva, perineum menonjol Vulva terbuka dan perineum menonjol, karena perineum lentur, bagian depan anak terlihat di vulva, karena labia terbuka, perineum berdiri terpisah membuat bagian yang paling kecil Bayi terlihat di vulva, karena ada kontraksi lalu kekuatan mengejan membuat

sedikitnya janin bisa untuk dikeluarkan (Widia, 2015).

Merujuk pada pengkajian informasi dari asuhan kebidanan yang berlangsung kala III pada kasus Ny "S" memperoleh informasi subjektif, ibu mengalami kelelahan pasca bersalin lalu merasa sakit di bagian tengah bawah, dan informasi objektif diperoleh dari hasil asesmen, khususnya anak yang dilahirkan spontan (terasa bulantan dan sangat keras) tinggi fundus rahim tinggi, tempat perdarahan  $\pm 150$  CC, saat kala II terjadi dalam  $\pm 15$  menit dengan praktis tidak ada kesakitan dan tali pusar terlihat di vulva.

Pada teorinya ditunjukkan bahwasanya kala III sudah dilakukan ketika anak dilahirkan hingga plasenta atau uri keluar. Tahap kala III juga diistilahkan tahap rahim. Tahap III adalah jangka waktu di mana volume rongga rahim menurun pasca bayi dilahirkan. Volume yang menurun ini membuat berkurangnya ukuran plasenta yang melengket..

Selain itu, berdasarkan informasi tentang pengkajian asuhana kebidanan pada Ny. "S" dengan kala IV, informasi subjektif diperoleh bahwasanya ibu merasakan kelelahan yang besar pasca bersalin, ibu memiliki keluhan nyeri perut bagian bawah dan informasi objektif menemukan bahwa kala III berlangsung  $\pm 5$  menit, plasenta selesai, fundus uteri tinggi pada tingkat fokus, kompresi uterus yang hebat (jelas keras dan bulat), perdarahan  $\pm 150$  cc dan kandung kemih tidak ada isinya.

Pada teorinya kala IV diputuskan ketika memasuki dua jam pasca plasenta selesai, ini direncanakan sehingga dokter, bidan atau tenaga kesehatan yang masih memberikan pendampingan pada ibu yang sudah

bersalin dalam 2 jam setelah persalinan. Melalui cara ini peristiwa yang tidak diharapkan sebab perdarahan persalinan bisa berkurang atau dihindari. Merujuk pada pengkajian yang diterapkan pada Ny "S" pada kala IV belum didapatkan adanya penyimpangan pada teori dan kasus asli.

Berdasarkan penjelasan tersebut yang dilaksanakan pada kala I bersalin hingga kala IV, ditemukan kesamaan pada teori dan tanda yang muncul di persalinan ini. Ini menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan diantara teoridan kasusnnya.

Pada kunjungan pertama post partumhari ke-2 tanggal 8 juli di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan ibu mengatakan ada pengeluaran darah dan ibu mngatakan nyeri pada perineum ketika terlalu banyak bergerak ataupun melakukan aktivitas. Tampak ibu meringis saat bergerak, tampak pengeluaran ASI saat putting susu dipencet, tampak luka perineum mashi basah, Keadaan umum ibu baik, kesadaran komposmentis, TTV ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/80, Nadi 80x/menit, Suhu 35,7°C, Pernapasan 20x/menit, TFU 2 jrbpst kontraksi uterus teraba keras dan bundar, ada pengeluaran lokia rubra.

Pada kunjungan kedua post partum hari ke-7 pada tanggal 13 juli di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan masih ada pengeluaran darah dan ibu mngatakan ASI nya belum lancer,ibu mengatakan sudah mulai dapat beraktifitas banyak terutama dalam merawat bayinya. Ekspresi waja ibu senang, tampak pengeluaran ASI saat putting susu dipencet, tampak luka perineum masih sedikit lembab, tampak

pengeluaran lokia sanguilenta, TTV ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/70, Nadi 82x/menit, Suhu 36,4°C, Pernapasan 20x/menit.

Pada kunjungan ketiga post partum hari ke-28 pada tanggal 3 agustus di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan ibu mengatakan pengeluaran ASI mulai lancar, bayi nya sering menetek, ibu juga mengatakan luka perineum mulai kering, ekspresi ibu tampak ceria dan sering senyum, luka perineum tampak lebih kering,. TTV ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/80, Nadi 82x/menit, Suhu 36,5°C, Pernapasan 22x/menit, masih ada pengeluaran lokia alba.

Pada kunjungan keempat post partum hari ke-42 pada tanggal 17 agustus di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan ibu mengatakan banyak pengeluaran ASI, bayi nya sering menetek, ibu juga mengatakan sudah tidak ada nyeri yang dirasakan. Luka perineum tampak lebih kering, pengeluaran ASI banyak dan lancar ketika menyusui, dan tampak ekspresi wajahibu sering tersenyum saat berbicara. TTV ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/70, Nadi 78x/menit, Suhu 36,5°C, Pernapasan 20x/menit, masih ada pengeluaran lokia alba.

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa ada persamaan antara teori dan gejala/keluhan yang terjadi pada kasus tersebut, peneliti tidak menemukan hambatan karena pada saat pengkajian data klien, bidan di Puskesmas Bara-Braya Makassar memberikan data atau informasi yang berhubungan dengan asuhan yang telah diberikan kepada klien. Hal ini sangat memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan menyusun data.

Dalam konsep Manajemen Asuhan Kebidanan yang telah dilakukan, tidak ditemukan kesenjangan antara studi kasus dan teori.

## **B. Langkah II Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual**

Untuk tahap ini, analisis masalah dan kebutuhan klien diselesaikan dengan mempertimbangkan persepsi yang tepat dari informasi yang dikumpulkan. Informasi mendasar yang telah dikumpulkan diuraikan sehingga masalah atau kesimpulan ditemukan. Dengan penanganan/penyelidikan informasi yang didapatkan dan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat digambarkan realitasnya (Mufdillah, dkk 2015).

Berdasarkan hasil evaluasi dari informasi subjektif dan objektif yang didapatkan menunjukkan dimana pasien datang pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 11.00 WITA, dengan mengeluh rasa nyeri di bagian bawah, disusul dengan adanya cairan yang keuar bercampur darah sejak tanggal 7 Juli 2022 pukul 08.00 WITA.

Diagnose Aktual yang diidentifikasi pada Ny. "N" ialah ibu dengan nyeri luka perineum dari jalan lahir. Penegakan diagnose diperoleh dari data subjektif dimana ibu mengeluh nyeri pada perineum saat bergerak atau ingin melakukan aktifitas. Dari data objektif sendiri yaitu terlihat ekspresi wajah ibu meringis ketika bergerak, dan tampak luka perineum masih basah.

Pada umumnya pasien in-partum akan mengeluhkan nyeri perut bagian bawah yang menjalar ke bagian tengah tubuh, hal ini terjadi dimana terjadi penarikan uteri yang menyebabkan penipisan atau dilatasi serviks. Selain kompresi, bersalin juga dipisahkan oleh keluarnya cairan tubuh dari

saluran serviks karena pembukaan dan perdarahan karena pembuluh vena yang pecah (Prawirohardjo, 2017).

Pada pemeriksaan perut didapatkan linea nigra dan striae alba yang menunjukkan kehamilan lebih dari satu kali dan abs bebas. Dalam pengkajian Leopold untuk menentukan tinggi fundus uteri, dilakukan pada saat uterus tidak berkontraksi, dengan ibu dalam posisi setengah duduk, kemudian pada saat itu, memperkirakan ketinggian fundus uteri apakah tingkat fundus uteri sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, dan untuk memutuskan presentasi bayi dilaksanakan mengacu pada bagaimana bentuknya, ukuran rahim, dan ketebalan bagian itu, jika palpasi fundus uteri bulat, keras dan lenting, cenderung dianggap sungsang dengan alasan kepala janin berada di fundus atau di sisi lain, tangan dengan asumsi fundus uteri terasa halus, kurang lenting, bisa asumsikan presentasi sungsang.

Dalam penilaian turunnya kepala janin dilaksanakan melalui penghitungan bagian bawah bayi yang masih berada di atas simfisis dan dapat diperkirakan dengan lima jari (perlima), bagian atas simfisis yang belum diletakkan delta panggul (BAP) dan tersisa sudah masuk ke saluran panggul (PAP). (Widia, 2015: 64).

Bersalin bisa dikarenakan keluarnya cairan ketuban, yang sebagian besar baru saja pecah sebelum dilatasi lengkap dan indikasi persalinan, termasuk munculnya darah, rasa sakit yang meluas, perubahan yang terlihat pada serviks, kerusakan serviks, pembukaan serviks. (ekspansi), pelepasan cairan ketuban dan selaputnya yang rusak (Nurul Jannah, 2017: 3).

Merujuk pada gambaran diatas, penentuan kasus kala I yaitu G1P0A0, perkembangan 40 minggu 5 hari, head rate, longitudinal site, moving in the pelvis (BDP), intrauterin, tunggal, hidup, dengan stadium I tahap aktif.

Tanda-tanda dan gejala untuk kala II yaitu pembukaan total (saat ini tidak terlihat bibir porsio), hal ini ada sebab munculnya kontraksi. Dengan demikian porsio terbuka dengan bertahap, hisnya lebih teratur dan kuat ( $\pm$  2-3 menit 1 kali) dan sensasi nyeri muncul, semakin rendah janin memasuki panggul menyebabkan ketegangan pada otot-otot dasar panggul, yang secara refleks menimbulkan sensasi ingin mengejan.

Keluarnya darah yang bersatu dengan cairan tubuh, yang dikarenakan oleh robekan serviks yang memanjang, kantung ketuban yang pecah, sebab adanya tekanan yang menyebabkan kontras tegangan yang sangat besar antara kontraksi di dalam rahim dan di luar rahim dengan demikian kantung ketuban tidak bisa menahan ketegangan di dalam rahim, kondisi itu menyebabkan kantung ketuban pecah, anus terbuka, disebabkan bagian bawah bayi memasuki dasar panggul sehingga menekan rektum lalu perasaan buang air besar, ini membuat bokong terbuka, vulva terbuka, perineum menonjol, bagian paling kecil dari embrio yang telah memasuki BDP dan juga munculnya his juga tenaga mengejan membuat Vulva terbuka dan perineum jelas, karena perineum fleksibel. Bagian utama anak terlihat di vulva, karena labia terbuka, perineum menonjol menyebabkan bagian bawah tukik terlihat di vulva, karena ada kekuatan dan tekanan yang membuat

bagian terkecil dari bayi terlihat sehingga bisa dikeluarkan (Widia, 2015).

Didasarkan pada pengkajian informasi asuhan kebidanan yang berlangsung pada kala III di kasus Ny "S" diperoleh bahwasanya informasi subjektif ibu kelelahan pasca bersalin yang diketahui dari hasil penilaian, khususnya anak dilahirkan spontan, kontraksi rahim yang aman (terasa keras dan bulat) fundus uteri setinggi pusat perdarahan  $\pm$  150 cc, tahap selanjutnya berlangsung selama  $\pm$  15 menit tanpa kesulitan dan tali pusar masih terlihat di vulva.

Selain itu, berdasarkan informasi penilaian asuhan kebidanan pada Ny. "S" kala IV, didapatkan informasi subjektif bahwasanya ibu merasakan kelelahan pasca melahirkan dan ibu mengeluh sakit perut bagian bawah dan keterangan objektif menunjukkan kala III berlangsung  $\pm$  5 menit, plasenta lepas, fundus uteri tinggi pada tingkat fokus, konstiksi uterus hebat (terlihat keras dan bulat), drainase  $\pm$  150 cc dan kandung kemih kosong.

Implementasi pada pembahasan ini, kasus Ny. "S" secara umum menunjukkan bahwasanya terdapat persamaan antara teori juga diagnosis utama yang sudah ditegakkan dengan demikian memudahkan untuk memberikan intervensi lebih lanjut.

### **C. Langkah III Antisipasi Diagnosa/ MasalahPotensial**

Dalam langkah ini kami membedakan masalah atau penentuan potensial lainnya berdasarkan susunan masalah dan temuan yang telah dikenali. Langkah ini membutuhkan pengantisipasi, dengan asumsi melaksanakan tindak pencegahan, sambil memperhatikan klien, spesialis



bersalin seharusnya siap jika analisis/potensi masalah ini terjadi (Mufdillah, et al 2015).

Ketika membedakan diagnosa atau kemungkinan masalah, pengobatan yang diharapkan yang mungkin muncul pada tahap utama adalah peristiwa tahap pertama yang panjang, peningkatan atau penurunan tanda-tanda imperatif, DJJ di bawah setidaknya 100 dari beberapa kali/menit, kejadian persalinan pervaginam. Pengeluaran selain cairan tubuh dan darah, ketuban pecah bersatu mekonium kental disertai indikasi gangguan janin, kompresi uterus di bawah 2 penyempitan dengan cepat dan bertahan di bawah 20 detik dan tidak ada perubahan serviks yang dilacak dalam 1-2 jam, dilatasi serviks ke satu sisi tanda bahaya pada partograf, dan dapat memicu penyakit saluran kelahiran karena saluran air persalinan terbuka, maka, pada saat itu, kontaminasi dapat terjadi pada ibu dengan asumsi pemeriksaan dalam dilakukan dari waktu ke waktu.

Selain itu, dilihat dari evaluasi efek samping asuhan kebidanan pada Ny "S" tidak ada informasi pendukung untuk terjadinya kemungkinan diagnosa dimana karena Ny "S" diperoleh informasi objektif berdasarkan penilaian yang dilakukan diperoleh adalah usia kehamilan 40 minggu 5 hari, fungsi penting tubuh, tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,5 C, denyut 78 x/menit, nafas 20 x/menit.

Penilaian yang sebenarnya dipusatkan pada hasil yang didapat pada pemeriksaan perut Leopold I (2 jrbpx ,33 cm, jelas pantat), Leopold II (Puka), Leopold III (kepala jelas), Leopold IV (bdp dengan pengurangan

sedikitnya bagian embrio 3/5), DJJ 143 x/menit, dan pada pemeriksaan VT 1, akibat vulva dan vagina biasa saja, bagian ramping, bukaan 7 cm, lapisan belum sempurna, tingkat dari ubun-ubun kecil sebelum simfisis berkurang, kesan hogde ketiga khas, dan ada kedatangan cairan tubuh dan darah, dan setelah itu penilaian dilakukan di VT II dan konsekuensi dari vulva dan vagina adalah khas, potongan itu menipis, bukaan 10 cm, selaput pecah dengan tonus cairan ketuban jernih, ketinggian kepala di bawah simfisis, penurunan kesan panggul hogde IV biasa, dan ada keluarnya cairan tubuh, air dan darah.

Pada kala II . Atas nama Ny "S" anak lahir secara tiba-tiba, langsung menangis 15 menit setelah dilatasi lengkap pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 15.20 WITA, penarikan uteri besar (terasa keras dan bulat), tinggi fundus uteri di tingkat tengah, dan garis pusar masih terlihat jelas di vulva.

Pada kala III, dari ibu "S" diperoleh informasi yang objektif, khususnya plasenta keluar  $\pm$  5 menit setelah anak dilahirkan pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 15.20 WITA dengan tidak ada kesulitan, kompresi uterus hebat (terasa keras dan bulat), fundus setinggi 1 jari di bawah tengah, drainase  $\pm$  150 cc.

Selain itu, pada kala IV, dari Ny. "S" tidak ada informasi yang mendukung terjadinya suatu kemungkinan diagnosa yang bisa muncul, diperoleh informasi yang objektif, khususnya kala IV terjadi setelah 15 menit pemisahan plasenta, dengan Pengamatan dilakukan selama 2 jam setelah bersalin, dimana pengecekan dilakukan seperti 1 jam 15 menit, dan

pemeriksaan dilanjutkan dengan interval teratur pada jam kedua pasca bersalin.

Kasus Ny. "S", belum ditemukan indikasi adanya kontaminasi atau masalah pada ibunya ataupun anaknya yang bisa saja terjadi pada kala I - IV, dengan alasan bahwa pengobatan yang dilakukan pada ibunya sesuai dengan teori jadi tidak ada diagnosa potensial yang terjadi dan tidak ada yang menyimpang antara teorinya juga kasusnya.

#### **D. Langkah IV Identifikasi Perlunya Tindakan Segera/Kolaborasi**

Beberapa informasi menunjukkan keadaan krisis di mana spesialis bersalin perlu bertindak segera untuk kesejahteraan ibu dan anak, beberapa informasi menunjukkan apa yang sedang terjadi yang membutuhkan tindakan cepat sambil menunggu petunjuk dokter. Mungkin juga memerlukan diskusi dengan kelompok kesejahteraan lainnya. Spesialis bersalin menilai apa yang terjadi untuk memutuskan pertimbangan pasien yang paling sesuai. Langkah ini mencerminkan kemajuan siklus bantuan persalinan (Mufdillah et al 2015).

Langkah keempat ini mencerminkan perkembangan siklus asuhan maternitas yang terjadi dalam krisis. Kondisi krisis dapat terjadi pada masa pemberian ibu hamil, ibu bersalin, pasca hamil dan bayi. Kondisi krisis akan menjadi kondisi yang membutuhkan aktivitas cepat untuk mengelola isu krisis yang terjadi sebagai persepsi/penilaian.

Klarifikasi di atas menunjukkan bahwa dokter spesialis bersalin dalam melakukan suatu tindakan harus sesuai dengan isu

kebutuhan/kebutuhan yang dilihat oleh kliennya.

Setelah spesialis bersalin membentuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengharapkan kesimpulan/kemungkinan masalah pada langkah sebelumnya, spesialis bersalin juga harus memikirkan kegiatan krisis/cepat yang harus dibentuk untuk menyelamatkan ibu dan anak.

Untuk pemeriksaan keadaan Ny "S" tidak ada tindakan cepat (segera/kolaborasi) yang harus dilakukan mengingat pada pemeriksaan persalinan tidak ada kegiatan yang memerlukan penanganan cepat.

#### **E. Langkah V Rencana Tindakan**

Dalam langkah ini, pertimbangan menyeluruh tidak diatur oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan dari dewan penilaian atau isu yang telah diakui atau diharapkan, pada langkah ini data/informasi fundamental yang terfragmentasi selesai (Mufdillah, dkk 2015).

Penataan asuhan pada Ny. "S" bergantung pada hipotesis dengan melihat kondisi dan kebutuhan pasien. Efek samping dari serangkaian pengalaman, penilaian aktual dan pasien, Ny. "S" disertai keluhan nyeri di daerah tengah bawah yang menjalar ke perut, yang disertai dengan cairan air ketuban dan darah. dan kejengkelan yang dirasakan ibu terputus-putus dan terus menerus memburuk. teratur dan semakin membumi, pasien menyatakan bahwa selama kehamilan perkembangan janin padat dan berlanjut di bagian kiri setengah bagian tengah ibu, dan usia kehamilannya kini telah mencapai  $\pm$  9 bulan.

Strategi dalam kala I adalah menyaring kemajuan pekerjaan dengan memperhatikan dilatasi dan dilatasi serviks. Penataan yang akan diberikan adalah cuci tangan saat melakukan gerakan, mendidik ibu tentang konsekuensi penilaian bahwa pembukaan selesai dan film retak, memahami alasan siksaan, menemani ibu saat bekerja, meresepkan obat. ibu bergeser ke samping untuk metode relaksasi, menunjukkan kepada ibu prosedur relaksasi dengan menarik napas melalui hidung dan menghembuskan napas melalui mulut, memberdayakan keluarga untuk memberikan izin, dukungan dan inspirasi kepada ibu ketika demamnya berkurang, memperhatikannya, mengarahkan penilaian batin, menyemangati ibu dan keluarga untuk terus memohon kepada Allah swt dan diberikan keteguhan dan keterusterangan dalam siklus persalinan, melatih ibu untuk naksir selama masa haidnya, merencanakan alat bantu alat angkut.

Anjurkan ibu untuk makan di sela-sela nafasnya dalam Surah Maryam pengertian tentang kurma umumnya merupakan makanan yang sangat baik untuk wanita yang sedang dalam masa nifas dan dalam proses persalinan karena masih muda untuk diolah, beraroma dan mengandung kalori tinggi dan dalam kandungan. Kurir Allah pada umumnya memakan tujuh buah kurma "ajwa" (siap). Kurir Allah berkata, "Barangsiapa makan tujuh buah kurma, maka dia akan terlindung dari racun." Dan ditunjukkan bahwa ketika seorang wanita Yahudi memasukkan racun ke dalam makanan Nabi dalam upaya kematian di perang Khaibar, zat beracun yang ditelan olehnya kemudian dapat dibunuh oleh zat yang terkandung dalam kurma.

Bisyir ibn al Barra', salah seorang sahabat yang ikut memakan zat beracun itu akhirnya meninggal dunia (Maria Hidayah, 2018: 35).

Rencana tindakanberikut pada tahap berikutnya adalah untuk menjamin bahwa ibu melahirkan seorang anak tanpa kerumitan dan mencegah terjadinya robekan pada vagina dan perineum. Rencana kegiatan yang akan diberikan adalah memimpin pengantaran dengan mengarahkan ibu untuk mengejan, benar-benar melihat ke fundus untuk memastikan tidak ada anak lagi, beri tahu ibu bahwa pahlawan akan menyuntikkan oksitosin 10 IU di 1/3 atas IM paha paralel distal, menggenggam dan memotong tali pusar.

Pengaturan berikut pada kala III adalah untuk menjamin bahwa plasenta disampaikan tanpa cacat tanpa kerumitan kepada ibu. Strategi yang akan diberikan adalah menyelesaikan administrasi dinamis kala III, mengeluarkan plasenta, menguleni fundus uteri, menilai drainase dan memeriksa robekan pada vagina dan perineum serta melakukan kateterisasi.

Rencana kegiatan berikut pada kala IV diharapkan dapat menjamin tidak terjadi pengurusan dengan memeriksa tahap keempat. Rencana kegiatan yang akan diberikan adalah memberikan pemahaman kepada ibu tentang kondisinya yang sedang berlangsung dan keberatan yang dialami adalah biasa setelah persalinan, pemeriksaan 2 jam pasca kehamilan.

Penataan selanjutnya adalah meminta keluarga untuk terus menemani ibu dan mengatasi masalah ibu, membantu ibu dan keluarga untuk skrining kompresi uterus, berapa banyak darah yang keluar dan

indikasi risiko, memberikan KIE tentang kesiapan asumsi dan masa matang, menawarkan bantuan kepada ibu dan keluarga untuk selalu memohon kepada Allah swt agar dimuliakan dengan anak cucu yang agung dan saleh, pindahkan ibu ke ruang pasca hamil (ruang masa nifas).

Pada kunjungan pertama masa nifas 2 hari yang diberikan Ny. S di ruangan nifas Puskesmas Bara-Baraya Makassar tanggal 8 juli 2022, adalah mengucapkan selamat dan syukur kepada ibu atas kelahiran bayinya, menciptakan suasana baagia dengan ibu, juga memperlihatkan apresiasi untuk ibu. Observasi tanda-tanda vital, ketika ibu terlihat meringis karena nyeri perineum, beritahu ibu cara mengurangi/meringankan nyeri dengan relaksasi, anjurkan ibu untuk melakukan perawatan luka dan selalu menjaga kebersihan terutama vulva, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, memberi penjelasan tentang cara meraway bayi, memberikan, support, semangat dan motivasi agar ibu mampu dan mandiri dalam merawat bayinya, menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya sesering mungkin. juga observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lokia pada ibu, anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa agar diberi kesehatan bagi diri dan bayinya.

Pada kunjungan ke-2 masa nifas 7 hari yang diberikan Ny. S di rumah klien tanggal 13 juli 2022, yaitu observasi tanda-tanda vital, dan pengeluaran lokia sanguilenta. Anjurkan ibu untuk tetap selalu menjaga kebersihan vulva, dan perawatan perineum, anjurkan untuk istirahat yang cukup dan konsumsi makanan bergizi seimbang dan terutama makanan yang

dapat memberbayak produksi ASI, anjurkan ibu untuk menyusui bayinya dengan rutin setiap 2 jam, anjurkan ibu untuk senantiasa berdoa agar diberi kesehatan bagi dirinya dan bayinya.

Pada kunjungan ke-3 masa nifas 28 hari yang dierikan Ny. S di rumah klien tanggal 3 agustus 2022, yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan apapun, anjurkan ibu untuk selalu menyusui bayinya secara on demand, anjurkan ibu untuk konsumsi makanan yang bergizi seimbang untuk ibu menyusui, anjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan diri, mengingatkan ibu untuk senantiasa berdoa agar diberi kesehatan bagi dirinya dan bayinya, juga observasi pengeluaran lokia alba.

Pada kunjungan ke-3 masa nifas 42 hari yang diberikan pada Ny. S dirumah klien tanggal 17 agustus 2022, yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu untuk menjaga dan memperatikan kebersihan diri dan sekitar, anjurkan ibu untuk selalu, anjurkan ibu konsumsi makanan yang bergizi seimbang, anjurkan ibu untuk selalu berbahagia, mengingatkan ibu unuk senantiasa berdoa agar diberi kesehatan selalu.

Rancangan asuhan pertolongan persalinan yang telah disusun dengan mempertimbangkan analisis/masalah yang nyata dan mungkin, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara hipotesis dan dewan asuhan pertolongan persalinan dalam pemanfaatan investigasi kontekstual secara praktis.



## **F. Langkah VI Implementasi**

Pada langkah ini, rencana pertimbangan menyeluruh seperti yang digambarkan dalam sinkronisasi V dilakukan dengan baik dan aman. Pengaturan ini harus dimungkinkan sepenuhnya oleh spesialis bersalin atau tidak lengkap oleh asisten bersalin dan sebagian oleh klien atau individu yang berbeda dari kelompok perawatan medis.

Untuk pemeriksaan keadaan Ny. "S" telah diatur dilakukan dengan baik. Seperti menyampaikan hasil penilaian secara tepat, membuka pintu bagi pasien dan keluarga untuk bersama, menawarkan bantuan moral kepada ibu dan keluarga untuk menempuh pilihan yang signifikan dengan memberdayakan ibu dan keluarga agar bayi dapat dilahirkan ke dunia melalui jalur kelahiran. Khas. Klarifikasi telah diberikan, pasien dan keluarga menyimpulkan bahwa bayi akan dikandung secara normal, menawarkan bantuan mental kepada ibu dan keluarga, dan memenuhi kebutuhan cairan ibu, khususnya memberi ibu minum.

Selanjutnya dilakukan pemantauan kala I ibu merasakan nyeri perut yang jelas yang semakin terasa dan ada keluarnya cairan tubuh dan darah, keadaan umum ibu baik-baik saja, dia pasti meringis kesakitan, yang penting fungsi tubuh dalam batas normal, nya: 4x10 menit (lama 35-45 menit). 40 detik ), asesmen interior (VT pukul 16.30 WITA) dengan sinking portio, dilatasi 10 cm, lapisan pecah-pecah, head show, IV hodge berkurang, dan keluarnya cairan tubuh, darah, dan cairan ketuban.

Pemantauan lebih lanjut, pada kala II, yaitu ditegaskan dengan adanya tanda dan efek samping dari tahap selanjutnya, khususnya ibu merasakan nyeri perut yang semakin membesar, ada keinginan mengejan, dan merasa ingin buang air besar, perineum menonjol, vulva dan bagian belakang terbuka.

Setelah itu pemantauan kala III, ketika bayi suda lahir, periksa apakah masi ada janin kedua di dalam rahim ibu, kemudian beritahu ibu bawa dia akan disuntikkan oksitosin dan mulai melahirkan plasenta, dengan cara meregangkan tali pusat dan dorso cranial sampai pada titik plasenta terlihat didepan vulva dan jempit/putar searah jarum jam, pastikan kelengkapan plasenta mulai dari selaput, dan kotiledon.

Pemantauan kala IV. Tahap kerja keempat dimulai setelah plasenta lahir. Ibu merasa lebih baik setelah mengandung anak dan masih sedikit lemah, keadaan umum ibu baik, ibu tampak lelah, fungsi tubuh yang penting adalah tekanan peredaran darah: 120/70 mmHg, denyut: 78x/I, suhu: 36,5 °C , Relaksasi: 20x/I , kompresi uterus hebat, TFU di tengah. Kegiatan yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada ibu tentang kondisinya yang sedang berlangsung dan protes-protes yang dialami biasanya setelah persalinan. Kegiatan selanjutnya adalah mengamati 2 jam pasca kehamilan.

Setelah mengamati, anjurkan keluarga untuk terus mendampingi dan mengatasi masalah ibu, memberdayakan ibu dan keluarga untuk senantiasa memohon kepada Allah swt agar dimuliakan dengan agung dan taqwa. anak cucu.

Berdasarkan anamnesa yang dilakukan pada Ny.S pada pemeriksaan nifas ari ke-2 di Puskesmas Bara-Baraya Makassar tanggal 8 juli 2022, peneliti memperoleh hasil pemeriksaan keadaan umum baik dengan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu, TD 110/80, Nadi 80x/menit, Suhu 35,7°C , Pernapasan 20x/menit, TFU 2 jrbpst kontraksi uterus teraba keras dan bundar, ada pengeluaran lokia rubra, melakukan relaksasi dan mobilisasi dini.

Pada kunjungan kedua post partum hari ke-7 pada tanggal 13 juli di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum ibu baik dengan tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu: TD 110/70, Nadi 82x/menit, Suhu 36,4°C, Pernapasan 20x/menit. tampak pengeluaran lokia sanguilenta, TTV ibu dalam batas normal. Ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang salah satunya untuk melancarkan produksi ASI yaitu sayur daun kelor, menyusui bayinya sevara on demand, memperhatikan kebersihan diri terutama vulva, ibu bersemangat merawat bayinya dan mendapat support baik dari keluarga.

Pada kunjungan ketiga post partum hari ke-28 pada tanggal 3 agustus di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan ibu mengatakan pengeluaran ASI mulai lancer, bayi nya sering menetek, ibu juga mengatakan luka perineum mulai kering, ekspresi ibu tampak ceria dan sering senyum, luka perineum tampak lebih kering,. TTV ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/80, Nadi 82x/menit, Suhu 36,5°C, Pernapasan 22x/menit, ibu juga beristirahat dengan baik.

Pada kunjungan keempat post partum hari ke-42 pada tanggal 17 Agustus di Rumah klien. Didapatkan hasil pemeriksaan tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu: TD 110/70, Nadi 78x/menit, Suhu 36,5°C, Pernapasan 20x/menit, banyak pengeluaran ASI karena ibu sering makan sayur kelor, bayi nya sering menetek, ibu sudah tidak ada nyeri apapun, mendapatkan istirahat yang baik, ekspresi wajah ibu sering tersenyum saat berbicara.

Dalam pelaksanaan asuhan pertolongan persalinan dan pada saat implementasi, peneliti tidak menemukan hambatan kritis karena setiap kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Artinya tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

#### **G. Langkah VII Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan**

Dalam langkah ini, penilaian kelayakan pertimbangan yang telah diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan bantuan apakah benar-benar telah ditangani sesuai kebutuhan sebagaimana diakui dalam masalah dan penetapan. Susunan tersebut dapat dikatakan layak jika benar-benar kuat dalam pelaksanaannya (Mufdillah, dkk 2015).

Penilaian tersebut diharapkan dapat memberikan atau memberikan nilai bagi penyelesaian mediasi mengingat tujuan dari tindakan yang diberikan kepada Ny. "S" di Makassar pada tanggal 7 Juli 2022, dilanjut dengan 42 hari asuhan post partum.

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keberhasilan dalam asuhan dan edukasi yang diberikan kepada ibu, sesuai dengan pemenuhan dan

kebutuannya.

Perencanaan dinilai berhasil jika dalam pemberian asuhan dilakukan dengan benar dan sesuai. Langkah dalam penatalaksanaan menjadi hasil dari pengkajian yang memberikan penjelasan mengenai proses pemikiran yang dapat mempengaruhi tindakan terhadap proses medis (Tajmiati, Dkk, 2016).

Setelah memberikan asuhan, hasil evaluasi yang diberikan penatalaksanaan asuhan pada tanggal 7 Juli – 17 Agustus 2022 pada Ny.S ialah persalinan yang berlangsung secara normal, dimana keadaan ibu baik, kesadaran composmentis, tanda-tanda vital berada dalam batas normal, begitupun juga pada masa nifas sampai ke 42 hari, didapatkan keadaan umum ibu baik, tanda-tanda vital, TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran lokia, semua dalam batas normal. Adapun rasa nyeri yang dirasakan ibu dibagian perut dan vulva, dapat teratasi setelah diberikan asuhan teknik relaksasi, pernapasan dan anjuran mobilisasi dini. Anjuran tetap menyusui bayi dan tidak memberikan susu formula juga makanan tambahan hingga 6 bulan, anjuran untuk istirahat yang cukup, makan makanan dengan gizi seimbang, menghindari aktivitas berat, kebersihan ibu dan bayi terjaga dengan baik, anjuran untuk selalu mengingat dan bersyukur juga senantiasa berdo'a, berdzikir kepada Allah SWT. Dengan demikian hasil asuhan kebidanan yang diberikan pada Ny "S" berhasil dengan melihat keadaan ibu yang semakin dan sangat membaik mulai dari waktu persalinan sampai dengan post partum 42 hari. Keluhan dan kebutuhan ibu teratasi, maka disimpulkan persalinan dan masa nifas berlangsung normal dan teratasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah pencipta berkonsentrasi pada hipotesis dan keterlibatan langsung dengan pelatihan melalui investigasi kontekstual tentang pemberian asuhan pertolongan persalinan Ny. "S" inkubasi 40-42 minggu dengan perawatan alat angkut biasa di Bara-Baraya Makassar, pada bagian ini peneliti mencapai kesimpulan dan ide.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Asuhan Pertolongan Persalinan Ny "S" dengan Tipikal Asuhan Persalinan dilakukan mulai dari pengkajian dan penelusuran informasi mendasar, pada tahap ini dilakukan pengkajian dengan mengumpulkan setiap informasi yang diharapkan dapat menilai kondisi klien secara menyeluruh, mulai dari riwayat klinis, penilaian aktual, penilaian pendukung dan data tambahan yang menghubungkan dengan kondisi klien.
2. Ditemukannya Ny. "S" dengan Perawatan Persalinan Khas dilakukan karena keluhan-keluhan, khususnya rasa sakit di bagian tengah bawah yang menjalar ke perut, disertai keluarnya cairan tubuh bercampur darah.
3. Pada Ny "S" masalah yang mungkin muncul adalah pada tahap utama kemungkinan penyakit jalan lahir yang disebabkan oleh dilatasi serviks dan pemeriksaan bagian dalam yang terlalu teratur, pada tahap selanjutnya, khususnya jika terjadi a. tahap kedua yang panjang dimana garis awal bergerak menuju garis alarm, dan kemungkinan terjadi distosia bahu, pada

tahap ketiga pekerjaan kemungkinan masalah yang bisa terjadi adalah kejadian plasenta yang tertahan, dan pada tahap keempat kemungkinan masalah yang bisa terjadi adalah penarikan rahim yang buruk.

4. Dalam kegiatan menekan Ibu "S", diperlukan upaya bersama atau rujukan jika terjadi masalah dalam pengangkutan.
5. Rencana kegiatan yang telah disusun untuk Ibu "S" diharapkan dapat menjamin bahwa ibu mencari pengobatan yang sempurna dan aman, yang ditunjukkan dengan kondisinya dan mencegah keterikatan dan mencegah cedera parah pada ibu dan anak.
6. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai rencana yang disusun oleh kerjasama antara spesialis bersalin dan pejabat yang berbeda untuk lebih bekerja pada sifat administrasi kebidanan pasien.
7. Penilaian Asuhan Persalinan Biasa telah diberikan sejauh yang dapat diharapkan dan sesuai dengan norma administrasi/rencana asuhan pertolongan persalinan dan kesulitan yang mungkin terjadi dapat diselesaikan.
8. Dokumentasi akan digantung pada tanggal 7 Juli 2022 di Bara-Baraya Wellbeing Center Makassar. Evaluasi selesai dimulai dari pasien datang ke siklus pengangkutan dari fase kerja I-IV.

## **B. SARAN**

1. Untuk klien
  - Ibu hamil mestinya melakukan persalinannya yang memiliki tingkat keamanan yang bagus, baik yang berkaitan dengan bidan, lokasi, juga

alat klinis lengkap yang didapat di RS, PKM, BPS.

- Tuntutan bantuan/partisipasi pasangan dan keluarga pada waktu setelah persalinan adalah hubungan yang saling menjaga, memenuhi kebutuhan dan keutuhan.
- Dorong ibu agar senantiasa fokus pada kondisi anaknya.
- Anjurkan ibu agar makan dengan pola makan yang baik, pada saat sebelum hamil/mengatur kehamilan, serta selama kehamilan
- Anjurkan ibu agar minum resep/vit dengan konsisten seperti petunjuk yang disampaikan.
- Anjurkan ibu agar melakukan penjagaan pada organ vitalnya

## 2. Bagi bidan

- Sebagai bidan seharusnya memiliki pilihan untuk menawarkan jenis bantuan yang cakap dengan memperluas kapasitas, informasi, kemampuan mereka, melalui sekolah, pelatihan, kelas untuk menjadi spesialis persalinan yang berkualitas sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi.
- Spesialis bidan mestinya melayani pasien sesuai kewenangannya, jadi manajemen kebidanan wajib mengalami perkembangan sebab ini adalah peralatan utama untuk bidan dalam menangani permasalahan klien juga masalah lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aat Agustini & Naura Rahma “*Hubungan Kompetensi Bidan Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Asuhan Persalinan Normal Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Lingsung Kabupaten Majalengka*“. (Februari,2018). (Diakses tanggal 21 februari 2022)
- Aditama: 2015.
- Baety, Aprilia Nurul. *Kehamilan dan persalinan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Eun-Young Choi, dkk. “*Primipara and Multipara Simulated a Normal Birth 9Experience for Content Analysisyear 2015*”. *International Journal of Bio-Science and Bio-Technology*. (Diakses tanggal 3 februari 2022)
- Ilmiah, Widia Shofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.
- Ilmiah, WidiaShofa. *Buku Ajar Asuhan Persalinan Normal*, 2015.
- Jannah, Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kometensi*, Jakarta : ECG, 2017.
- Jannah, Nurul. *ASKEB II Persalinan Berbasis Kompetensi*, Jakarta : ECG, 2017..
- Katsir Ibnu, Syaikh dkk. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Imam Asy- Syafit I, 2013.
- Kementerian agama RI: *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung : C.V Penerbit Diponegoro 2015.
- Kementerian agama RI: *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung :Diponegoro 2013.
- Kuswanti, Ina dan Fitria Melina.*ASKEB II Persalinan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2014.
- Mangkuji, Betty, dkk. *Asuhan Kebidanan 7 Langkah SOAP*, Jakarta : ECG : 2014
- Maria hidayah,2018.
- Maru, Abdurrahman Suleiman, *Journal of Research in Nursing and Midwifery*. 2016
- Mufdillah, dkk.*Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta : Nuha Medika : 2015
- Mufdillah, dkk.*Konsep Kebidanan Edisi Revisi*, Yogyakarta :Nuha Medika : 2015
- Nursiah, Ai, dkk. *Asuhan Persalinan Normal Bagi Bidan*,Bandung : PT. Refika
- Pantiawati dan Saryono, 2018

- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : Prawirohardjo, 2017
- PurwandariAtik, dkk. “ StudiKasus Manajemen Asuhan Kebidanan 2018.
- Rini Fitriani. *Pengaruh tekhnik relaksasi nafas dalam persalinan*, kebidanan.  
Makassar : Alauddin University 2013.
- Sarwono.*IlmuKebidanan*,Jakarta:PT.BinaPustakaSarwono Prawirohardjo, 2017.
- Setiawati, Dewi. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*, Makassar : Alauddin University Press, 2017.
- Shihab, M Quraish. Tafsir Al Mishbah, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M Quraish. Tafsir Al Mishbah, Vol:8, Jakarta :Lentera Hati, 2002.
- Siti Saleha. *Manajemen Asuhan Kebidanan Persalinan Normal*. Makassar : Alauddin University 2015
- Trisnawati, Frisca. *Asuhan Kebidanan Panduan Lengkap Menjadi Bidan Profesional*,Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya, 2017.
- WHO (*World Health Organization*) 2017.Angka kematian ibu,
- Yeyeh, Ai, dkk. *Asuhan Kebidanan II Persalinan Edisi Revisi*,DKI Jakarta : CV. Trans Info Media, 2015.



## DOKUMENTASI

Kunjungan rumah ke-1 (Nifas hari ke-7)



Kunjungan rumah ke-2 (Nifas hari ke-28)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Website: flik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-2511 / Un.06-FKIK/PP.00.9/06/ 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Gowa, 26 Juni 2022

Yth :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nur Aenun Alwi  
N I M : 70400119028  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
Semester : VI (Enam)  
Alamat : Perumahan Pemda Antang

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Persalinan Normal di Puskesmas Bara-Baraya Makassar Tahun 2022."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.  
2. Anieq Mumthi'ah Al Kautsar, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Makassar terhitung mulai tanggal 20 Juni – 20 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :  
-Rektor UIN Alauddin Makassar



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.su.se/prov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **3872/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2511/UN.06/FKIK/PP.00.9/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NUR AENUN ALWI**  
Nomor Pokok : **70400119028**  
Program Studi : **Kebidanan**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (D3)**  
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS BARA-BARAYA  
MAKASSAR TAHUN 2022 "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 juni s/d 23 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 23 Juni 2022

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Dra. Hj SUKARNIATY KONDOLELE, M.M.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**  
Nip : **19650606 199003 2 011**

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 24 Juni 2022

**K e p a d a**

**Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR**

**Di -  
MAKASSAR**

**SURAT IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 070/1414 -II/BKBP/VI/2022**

- Dasar** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).
- Memperhatikan** : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan nomor **3872/S.01/PTSP/2022** Tanggal 23 Juni 2022 perihal Izin Penelitian.

Setelah membaca maksud dan tujuan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian, maka pada prinsipnya Kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : **NURAENUN ALWI**  
NIM / Jurusan : 70400119028 / Kebidanan  
Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UIN Alauddin  
Tanggal pelaksanaan: **24 Juni s/d 23 Agustus 2022**  
Jenis Penelitian : Karya Tulis Ilmiah  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa  
Judul : **"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN NORMAL DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022"**

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Melalui *Email* [Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com](mailto:Bidanghublabakesbangpolmks@gmail.com).

a.n. WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANGPOL.  
u.b.



**DR. HARI, S.IP., S.H., M.H., M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I/IV.b  
NIP. : 19730607 199311 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Makassar di Makassar (*sebagai laporan*);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar (*sebagai laporan*);
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
5. Dekan Fak. Kebidanan dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
6. Mahasiswa yang bersangkutan;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710  
**MAKASSAR**

Nomor : 440/126/PSDK/III/2022  
Lamp :  
Perihal : Izin data

Kepada Yth,  
Kepala Puskesmas Bara Baraya

Di -  
Tempat


Sehubungan Surat dari program studi Kedokteran dan ilmu kesehatan UIN  
Alauddin Makassar .No Surat : B-309/Un.06FKIK/PP.00.9/01/2022 . Maka disampaikan  
kepada saudara bahwa :

Nama : Nur AenunAlwi  
NIM : 70400119028  
Judul : Manajemen asuhan kebidanan Intranatal care  
dengan persalinan normal

Data : Data yang dibutuhkan :  
Angka kejadian Intranatal care dengan persalinan  
normal

Akan melaksanakan kegiatan pengambilan data di puskesmas yang saudara pimpin .

Makassar, 21 Maret 2022  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar

  
**Dr. Nursyah Sirajuddin**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19730112 2006042012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS BARA-BARAYA  
Jl. Abubakar Lambogo, 143, Telp. (0411) 452035 Kode Pos : 90143  
E-mail: pkm.barabaraya@yahoo.com.



LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : Dinas Kesehatan	Diretira Tgl. : 07-07-2022
No. Surat : 440/PRO/PSD/1/2022	No. Agenda : 64
Tgl. Surat : 29 Juni 2022	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat segera <input checked="" type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia
Perihal : - Penelitian a/n Nurani Alwi	
Diteruskan kepada Srd. : <input checked="" type="checkbox"/> PA (BTA)	Dengan hormat harap : <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/ konfirmasi
Catatan :	Plt. Kepala Puskesmas Bara-Baraya  dr. JUNIARSIH NIP. 19870611 200901 2 003





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS BARA-BARAYA**  
Jl. Abubakar Lambogo, 143, Telp. (0411) 452035 Kode Pos : 90143  
Email pkm.barabaraya@yahoo.com



## **SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 440 / PKM-BRY / 328 / XII / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Bara-Baraya menerangkan bahwa :

N a m a : Nuraenun Alwi  
NIM : 70400119028  
Jurusan : D3 Kebidanan  
Instansi : Universitas Alauddin Makassar  
Judul : ***"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PERSALINAN NORMAL  
DI PUSKESMAS BARA-BARAYA MAKASSAR TAHUN 2022"*** .

Telah melaksanakan penelitian di Puskesmas Bara-Baraya terhitung mulai pada tanggal  
24 Juni 2022 s/d 23 Agustus 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Makassar, 09 November 2022

A.n Kepala Puskesmas Bara-Baraya  
Kasubag Tata Usaha



**Muhtar Rajab, S. Kep.Ns.**  
Np. 19740101 199803 1 015

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Penulis

1. Nama : Nur Aenun Alwi  
Nim : 7040011028  
Tempat, tanggal lahir : Maros, 17 Agustus 1998  
Suku : Bugis  
Asal daerah : Maros  
Agama : Islam  
Alamat : Antang Perum.Gubernuran Graha Praja
2. Nama Orang Tua  
Ayah : Andi Muh. Alwi Spd.i  
Ibu : Kurniati

### B. Riwayat pendidikan

- Tamat SD : SD Negeri 10 Sanggalea 2010 Tamat  
SMP : SMP Negeri 1 Maros tahun 2013 Tamat  
SMA : SMA Negeri 3 Maros tahun 2016  
Tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri  
Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan.