

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DERAJAT II  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TAHUN 2022**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya  
Kebidanan Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**OLEH:**

**NURDIATI  
70400119008**

**PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurdiati  
Nim : 70400119008  
Tempat/Tanggal Lahir : Bocci, 28 Juni 2000  
Jurusan/Prodi : Kebidanan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Oktober 2022

Penyusun,



**Nurdiati**  
**70400119008**

M A K A S S A R

## PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Nurdiati  
Nim : 70400119008  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Dengan Nyeri  
Luka Perineum Derajat II Di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun  
2022

Karya Tulis Ilmiah (KTI) Ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Samata-Gowa, Oktober 2022

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T. SKM., M.Keb  
NIP : 19760126 200604 2 001

Pembimbing II



Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb  
NIP : 198903282091032018

## PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Dengan Nyeri Luka Perineum Derajat II Di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2022”, yang disusun oleh Nurdianti Nim 70400119008 Mahasiswa Jurusan Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 06 Oktober 2022, bertepatan dengan Tanggal 10 Rabiul Awal 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 06 Oktober 2022  
10 Rabiul Awal 1444 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
Sekertaris : Firdayanti, S.ST, M.Keb  
Pembimbing 1 : Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., M.Keb  
Pembimbing 2 : Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb  
Penguji 1 : dr. Rini Fitriani, M.kes  
Penguji 2 : Dr. Hj. Sohrab, M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

  
Dr. dr. Syatirah., Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 00

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Sebagai sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran dan kebaikan yang telah memberikan berkah dan rahmat serta hidayah kepada hamba-hamba-nya, tidak lupa pula shalawat dan salam kepada Sang Reformator Dunia, Nabi Muhammad saw. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan Judul Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan Nyeri Luka Perineum Derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru.

Niat baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Dalam QS. Al-Insyirah ayat 5-6 disebutkan “*Inna ma’al usri yusra*” (sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan). Kalimat itulah yang menjadi pedoman semangat penulis meskipun terdapat berbagai kesulitan yang dihadapi pada saat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah yang tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan ini. Hasil dari Karya Tulis Ilmiah ini tidak lepas dari doa, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, yang dengan rela membagi waktunya untuk membantu penulis. Dengan rasa cinta karena Allah swt. Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A,Ph.D, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Ibu Firdayanti, S.Si.T., M.Keb selaku ketua prodi kebidanan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Bdn. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb selaku pembimbing I yang telah bermurah hati, dan penuh kesabaran meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing mengarahkan dan memberikan petunjuk serta motivasi kepada penulis.
5. Ibu Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb selaku Pembimbing II yang telah meluangkan pula waktunya membantu, membimbing serta memberikan saran yang membangun kepada penulis.
6. Ibu dr. Rini Fitriani, M.Kes selaku penguji I yang selalu menyempatkan waktunya, memberi kritik, dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.
7. Bapak Dr. Hj. Sohrah, M.Ag selaku penguji agama yang telah senantiasa memberikan masukan dan dukungan yang bersifat Islamiah dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para Dosen dan seluruh staf UIN Alauddin Makassar terkhusus pada prodi Kebidanan yang telah berjasa mengajar dan mendidik.
9. Kepala puskesmas Jumpandang baru dan jajarannya yang telah memberikan izin dalam menyelesaikan penelitian.

10. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Basir, dan Ibunda Maryam yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina penulis dengan ikhlas, atas segala perhatian, kasih sayang, doa restu, pengorbanannya yang tak terhingga, penuh pengorbanan baik lahiriyah maupun batiniyah serta kekhusu'an doa yang selalu terucap dalam salat beliau untuk penulis. Juga keluargaku, kakak dan adikku tercinta yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi selama menempuh pendidikan jurusan Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada mereka semua. Aamiin Allahumma Aamiin.
11. Rekan-rekan mahasiswi jurusan Kebidanan angkatan 2019 yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudra ilmu, saling berbagi suka maupun duka.
12. Rekan-rekan Komunitas Peduli Anak Jalanan dan Komunitas Kesehatan Makassar yang telah memberikan wadah kepada penulis dalam menambah wawasan dan pengalaman.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah swt. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Aamiin.

Makassar, 06 Oktober 2022

Penulis

Nurdiati  
70400119008

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah .....	ii
Halaman Persetujuan Karya Tulis Ilmiah .....	iii
Halaman Pengesahan Karya Tulis Ilmiah .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Gambar .....	x
Daftar Tabel .....	xi
Daftar Lampiran .....	xii
Abstrak .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Pembahasan .....	4
C. Tujuan Penulisan .....	4
D. Manfaat Penulisan .....	5
E. Metode penulisan .....	6
F. Sistematika penulisan .....	7
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas .....	9
1. Pengertian Masa Nifas .....	9
2. Tujuan Asuhan Masa Nifas .....	10
3. Tahapan Masa Nifas .....	10
4. Peran Bidan Dalam Masa Nifas .....	11
5. Program dan Kebijakan Masa Nifas .....	11
6. Perubahan Fisiologi Masa Nifas .....	13
7. Perubahan Psikologi Masa Nifas .....	17
8. Tanda Bahaya Masa Nifas .....	19
9. Perawatan Masa Nifas .....	20
10. Infeksi Nifas .....	23
B. Tinjauan Tentang Nyeri luka Perineum .....	24




1. Nyeri .....	24
2. Luka / Ruptur Perineum .....	26
C. Tinjauan Nifas dengan nyeri luka perineum Menurut Islam.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Asuhan Kebidanan .....	40
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan.....	45
<b>BAB III .....</b>	<b>48</b>
<b>STUDI KASUS .....</b>	<b>48</b>
A. Manajemen Asuhan Kebidanan 7 Langkah Varney .....	48
B. Pendokumentasian Tanggal 07 Agustus 2022 .....	63
C. Kunjungan Tanggal 08 Agustus 2022_ .....	68
D. Kunjungan Tanggal 09 Agustus 2022 .....	72
E. Kunjungan Tanggal 15 Agustus 2022 .....	76
F. Kunjungan Tanggal 28 Agustus 2022 .....	82
G. Kunjungan Tanggal 18 September 2022 .....	86
H. Matriks Kunjungan .....	89
<b>BAB IV .....</b>	<b>95</b>
<b>PEMBAHSAN .....</b>	<b>95</b>
Langkah I : Pengumpulan Data Dasar .....	95
Langkah II: Identifikasi Diagnosa Aktual .....	97
Langkah III: Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial .....	98
Langkah IV : Tindakan Emergency/ Kolaborasi .....	99
Langkah V : Intervensi.....	99
Langkah VI: Implementasi .....	102
Langkah VII: Evaluasi .....	104
<b>BAB V .....</b>	<b>105</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
A. Saran .....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 *Visual Analogue Scale (VAS)* Sebagai Alat Ukur Nyeri.....26

Gambar 2.2 Ruptur Perineum.....27




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kunjungan Masa Nifas.....	12
Tabel 2.2 TFU dan Berat Menurut Masa Invulusi.....	13
Tabel 3.1 Riwayat Kehamilan, Persalinan dan Nifas.....	49
Tabel 3.2 Pemantauan 2 jam Postpartum.....	49
Tabel 3.3 Matriks Kunjungan.....	89



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi kegiatan di Kunjungan Rumah
- Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 4 : Keterangan Layak Etik
- Lampiran 5 : Keterangan Selesai Penelitian





## ABSTRACT

**MIDWIFERY DEPARTMENT  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
SCIENTIFIC PAPER, AUGUST 2022**

**Name : Nurdiati**  
**Reg. Number : 70400119008**  
**Supervisor 1 : Hj. Sitti saleha**  
**Supervisor 2 : Zelna Yuni Andryani**  
**Title : Post Natal Midwifery Care Midwifery Management  
with with the Case of Perineal Wound Level II at  
Jumpandang Baru Health Center in 2022**

---

---

The puerperium normally begins after the delivery characterized by the return of the uterine organs similar to the condition before the pregnancy. This condition runs for approximately 6 weeks or 42 days. During the puerperium, the reproductive organs will undergo slow changes back to the pre-pregnancy state.

The major purpose of this study was to investigate midwifery care management on a mother during the puerperium with the case of perineal wound pain level II at Jumpandang Baru Health Center in 2022. The methodological approach used in this study was a case study approach by using the 7-stage of Varney midwifery care management approach and SOAP documentation procedure.

The findings of this research indicated that Mrs "J" as the patient with perineal wound pain level II was treated for about 42 days. During the treatment, 6 times postpartum visits were conducted both at the health centre and at home. From the visits, it was found that the mother had experienced the perineal wound pain since August 7, 2022 which was the day of the delivery. It also revealed from the monitoring process that no potential problems and signs of infection were found from the patient. Subsequently, on the sixth day of the postpartum period, Mrs "J" no longer felt any pain, and the perineal wound seemed to gradually heal.

Based on the study conducted at Jungpandang health center in 2022, this study concluded that the postpartum period experienced by the patient was considered to be normal where the patient's vital signs were within normal limits. Eventually, all findings and actions had been documented, and the results obtained were in line with previous theories.

**Key Words: Puerperium, Perineal Wound Level II, 7-Stage of Varney**

## ABSTRAK

JURUSAN KEBIDANAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2022

Nama : Nurdiati  
NIM : 70400119008  
Pembimbing 1 : Hj. Sitti saleha  
Pembimbing 2 : Zelna Yuni Andryani  
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care Dengan Nyeri Luka Perineum Derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2022

---

---

Masa nifas adalah dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil dan berlangsung kira-kira 6 minggu atau 42 hari, selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil.

Tujuan penelitian ini untuk melaksanakan manajemen asuhan kebidanan masa nifas pada ibu dengan nyeri luka perineum derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru Tahun 2022 menggunakan pendekatan studi kasus, dengan metode manajemen asuhan kebidanan tujuh langkah varney dengan pendokumentasian dalam bentuk SOAP.

Hasil asuhan pada Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II asuhan dilakukan selama 42 hari dengan melakukan kunjungan nifas sebanyak 6 kali, baik di Puskesmas maupun di rumah ditemukan ibu mengalami nyeri luka perineum sejak setelah ibu melahirkan pada tanggal 07 Agustus 2022, selama pemantauan tidak ditemukan adanya masalah potensial seperti tanda-tanda infeksi serta pada hari keenam masa nifas Ny "J" sudah tidak merasakan nyeri dan luka perineum tampak mulai menyatu dengan kulit dan berangsur sembuh.

Kesimpulan dari studi kasus setelah pemantauan dan analisa data pada ibu dengan nyeri luka perineum derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru tahun 2022 pemantauan masa nifas berjalan normal, tanda-tanda vital dalam batas normal dan telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny "J" dengan hasil tidak ditemukannya kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan.

**Kata Kunci:** Masa Nifas, Nyeri Luka perineum Derajat II, Langkah Varney

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Masa nifas adalah masa setelah lahirnya plasenta, yang berakhir pada saat rahim kembali ke keadaan sebelum hamil dan berlangsung selama enam minggu (Saleha, 2013). Masa nifas merupakan masa yang penting bagi ibu dan bayinya. Diperkirakan 60% kematian ibu terjadi setelah melahirkan dan 40% kematian ibu nifas terjadi dalam 24 jam pertama, salah satu penyebabnya adalah karena adanya komplikasi, sehingga perlu penanganan tepat (Yuliana, Bawon, 2020).

Pada tahun 2050, diprediksikan akan ada 6,3 juta kasus ruptur perineum di seluruh dunia, naik dari 2,7 juta saat ini. Saat melahirkan, 50% wanita Asia mengalami robekan pada perineum (Sari, 2022). *World Health Organization* (WHO) melaporkan bahwa pada tahun 2017, penyebab utama kematian ibu nifas karena pendarahan 48%, serta 49% karena ruptur perineum dan retensio plasenta (Dewanti, 2019).

Robekan perineum terjadi hampir 75% pada wanita Indonesia yang melahirkan melalui persalinan pervaginam. Menurut Depkes RI (2017), dari 1951 kelahiran pervaginam, 57% ibu mendapatkan jahitan 28% karena episiotomi serta 29% karena ruptur spontan. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa infeksi masa nifas terus menjadi penyebab kematian ibu yang signifikan, terutama di negara berkembang

seperti Indonesia. Sistem kekebalan Tubuh yang kurang, perawatan nifas yang tidak memadai, malnutrisi, anemia, personal hygiene yang kurang baik, dan kelelahan merupakan faktor risiko infeksi masa nifas (Tulas,dkk. 2017:2).

Faktor yang menyebabkan ruptur pada perineum yaitu berat badan lahir bayi, umur ibu dan paritas. Pada *Primipara* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami robekan perineum, dikarenakan perineum yang masih utuh sehingga akan mudah terjadi robekan perineum. Kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin lebih didominasi oleh adanya kejadian ruptur perineum derajat I dan II yakni sebanyak 65,6%. Ruptur perineum akan mengakibatkan pendarahan yang apabila tidak ditangani dengan tepat akan berakibat kepada kematian. Ruptur perineum merupakan penyebab utama kedua pendarahan *pascapartum*. Cara untuk menanganinya adalah dengan penjahitan (Dewanti, 2019).

Luka perineum pada kenyataannya sering membuat ibu nifas sangat tidak nyaman karena menimbulkan rasa nyeri yang membuat ibu mengalami ketakutan mobilisasi dini. Nyeri adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan atau suatu pengalaman emosional yang disebabkan oleh terjadinya atau kemungkinan adanya kerusakan jaringan tubuh pada suatu tempat di tubuh kita. Nyeri yang terjadi pada ibu postpartum yang mengalami ruptur spontan atau dilakukan tindakan episiotomi dapat mempengaruhi kondisi ibu, seperti kurang beristirahat, cemas akan kemampuan merawat bayi, stress dan sukar tidur, bahkan bisa memicu terjadinya post partum blues, serta ASI



pada bayi akan berkurang dan keluarganya akan repot untuk mengurus ibu dan bayinya (Utami, 2015:11).

Selain itu, nyeri luka perineum akan mengganggu ibu berinteraksi dengan bayinya, membuat ibu lebih rentan terkena infeksi dan kemungkinan akan menyebabkan terjadinya pendarahan jika luka perineum tidak di pantau dengan baik. Nyeri luka perineum jelas akan menimbulkan dan mempengaruhi kesejahteraan perempuan secara fisik dan psikologis untuk itu teknik relaksasi mobilisasi dini sangat dianjurkan untuk ibu postpartum dengan nyeri luka perineum, mengurangi rasa nyeri, melancarkan pengeluaran *Lochea*, mengurangi infeksi pada luka, mempercepat involusio alat kandungan, melancarkan peredaran darah, dan akan mempercepat penyembuhan luka (Sulfianti, 2021).

Untuk mencegah timbulnya infeksi atau komplikasi lainnya pada masa nifas utamanya dengan ruptur perineum dapat dilakukan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan antara lain perawatan perineum secara intensif. Asuhan masa nifas ini sangat diperlukan terutama pada 24-48 jam pertama (Ambarwati, 2018).

Berdasarkan data rekam medik di Puskesmas Jumpandang Baru kota Makassar, data yang diperoleh pada tahun 2019 terdapat 428 ibu bersalin, 207 ibu bersalin dengan jahitan perineum derajat II, pada tahun 2020 terdapat 179 ibu bersalin, 78 ibu bersalin dengan jahitan perineum derajat II, pada tahun 2021 terdapat 86 ibu bersalin, 42 ibu bersalin dengan luka jahitan perineum derajat II, serta mengalami nyeri pada luka jahitan perineum. Dari uraian diatas maka

penulis tertarik membahas secara spesifik mengenai masalah ini dengan menggunakan metode pendekatan Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan nyeri luka Perineum Derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar.

## **B. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan ini adalah Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan Nyeri Luka Perineum Derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar.

## **C. Tujuan Penulisan**

### **1. Tujuan Umum**

Dapat melaksanakan Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan Nyeri Luka Perineum Derajat II di Puskesmas Jumpandang Baru Makassar dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan sesuai dengan wewenang bidan.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisa data dasar Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- b. Merumuskan diagnosa/masalah aktual Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- c. Merumuskan diagnosa/masalah potensial Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- d. Mengidentifikasi tindakan segera dan kolaborasi Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.

- e. Merencanakan Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- f. Melaksanakan asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- g. Mengevaluasi Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.
- h. Mendokumentasikan Asuhan Kebidanan Post Natal Care dengan nyeri luka perineum derajat II.

#### ***D. Manfaat Penulisan***

Penulisan ini memiliki 4 manfaat yaitu:

##### **1. Manfaat praktis**

Adapun hasil penelitian ini sebagai salah satu masukan dan informasi bagi penentu kebijakan dan pelayanan program di Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

##### **2. Manfaat institusi**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wacana dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan pembaca di perpustakaan mengenai asuhan kebidanan ibu nifas dengan nyeri luka perineum derajat II.

##### **3. Manfaat Ilmiah**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi menambah pengetahuan serta menjadi bahan acuan bagi penulis selanjutnya.

#### 4. Manfaat bagi penulis

Penulisan ini merupakan pengalaman ilmiah yang sangat berharga bagi penulis karena dengan adanya penulisan ini mampu meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang masa nifas dengan nyeri luka perineum derajat II.

#### *E. Metode penulisan*

Penulisan ini menggunakan beberapa metode yaitu :

##### 1. Studi kepustakaan

Penulis mempelajari buku-buku, literatur dan media internet yang berhubungan dengan masa nifas dengan nyeri luka perineum derajat II.

##### 2. Studi kasus

Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan oleh Helen Varney, yaitu dengan 7 langkah meliputi : Identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi doagnosa/masalah potensial, tindakan segera/kolaborasi, rencana asuhan/intervensi, implementasi dan evaluasi hasil asuhan kebidanan yang telah dilakukan.

Pengumpulan data untuk pengkajian ini menggunakan beberapa tehnik.

Antara lain:

##### a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab atau diskusi yang dilakukan kepada pasien, keluarga dan bidan yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan.

b. Pemeriksaan fisik

Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk menilai kesehatan dan kenyamanan fisik ibu dan bayinya. Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis yaitu secara berturut yang dimulai dari kepala sampai kaki dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi.

c. Pengkajian psikososial

Pengkajian ini meliputi pengkajian status emosional ibu, respon terhadap kondisi, kondisi yang dialami oleh ibu serta pola interaksi terhadap keluarga, lingkungannya serta petugas kesehatan.

3. Studi Dokumenter

Studi dokumenter dilakukan dengan mempelajari status kesehatan klien yang bersumber dari catatan dokter, bidan, pegawai, petugas laboratorium, dan hasil pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat memberi kontribusi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian ini.

4. Diskusi

Penulis melakukan tanya jawab dengan bidan yang menangani klien tersebut serta mengadakan diskusi dengan dosen pembimbing proposal penelitian ini.

***F. Sistematika penulisan***

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah Bab I sampai Bab V, yaitu pada Pada bab I ini terdiri dari latar

belakang, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II terdiri dari tinjauan umum tentang masa nifas, tinjauan tentang ruptur perineum, tinjauan tentang nyeri, tinjauan khusus tentang nifas menurut pandangan islam, proses manajemen asuhan kebidanan sampai dengan melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan.

Kemudian pada Bab III yaitu studi kasus, akan menguraikan tentang 7 langkah varney yaitu identifikasi data dasar, identifikasi diagnosa/masalah aktual, identifikasi diagnosa/masalah potensial, tindakan segera dan kolaborasi, rencana tindakan/intervensi, implementasi dan evaluasi serta melakukan pendokumentasian (SOAP).

Bab IV pembahasan, dalam bab ini akan diuraikan tentang asuhan kebidanan masa nifas pada ibu dengan nyeri luka perineum derajat II. Secara nyata manajemen kebidanan menurut 7 langkah varney mulai dari pengkajian sampai evaluasi dan data perkembangan. Sedangkan pembahasan menjelaskan tentang masalah atau kesenjangan antara teori dan kasus yang penulis temukan dilapangan.

Bab V penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari asuhan yang telah dilakukan, semua temuan serta pengetahuan yang di dapat dari hasil asuhan. Kemudian selanjutnya daftar pustaka, bagian ini memuat daftar literatur ilmiah yang telah ditelaah dan dijadikan rujukan dalam penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas*

##### **1. Pengertian Masa Nifas**

- a. Menurut WHO (*World Health Organization*), 2020, Masa nifas adalah periode yang dimulai setelah kelahiran bayi sampai 6 minggu (42 hari) setelah lahir.
- b. Menurut Prawirohadjo, 2018, masa nifas atau Puerperium adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan.
- c. Menurut Fitriani dan Sry, 2021, Masa nifas, dalam bahasa latin, *Puerperium* yaitu waktu mulai tertentu setelah melahirkan anak ini di sebut kata *Puer* yang artinya bayi dan *parous* melahirkan. Sehingga diartikan sebagai “masa setelah melahirkan bayi”.
- d. Menurut Indrianita, Dkk, 2021, Masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali sebelum pra hamil.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa masa nifas atau *puerperineum* adaah dimulai setelah lahirnya plasenta sampai dengan 40 hari atau 6 minggu hingga alat-alat reproduksi kembali seperti keadaan sebelum hamil.

## 2. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Adapun tujuan dari pemberian asuhan kebidanan pada masa nifas yakni:

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis.
- b. Mendeteksi masalah, mengobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.
- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, cara dan manfaat menyusui, imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari.
- d. Memberikan pelayanan KB (Sulfianti Dkk. 2022).

## 3. Tahapan Masa Nifas

Tahapan masa nifas dibagi menjadi tahap/periode, yaitu:

- a. *Puerperium dini (Periode Immediate Postpartum)* Merupakan masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam sampai kepulihan dimana ibu sudah diperbolehkan mobilisasi jalan. Dalam agama islam dianggap bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari.
- b. *Puerperium intermedial (Periode Early Postpartum, 24 jam-1 minggu)* merupakan suatu masa kepulihan menyeluruh alat-alat *genitalia* yang lamanya 6-8 minggu.
- c. *Remote puerperium (Periode Late Postpartum, 1 minggu- 5 minggu)* merupakan masa waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat



sempurna membutuhkan waktu berminggu-minggu, bulanan atau tahunan (Ambarwati, 2018).

#### **4. Peran Bidan Dalam Masa Nifas**

Setelah proses persalinan selesai, bukan berarti tugas dan tanggung jawab seorang bidan berhenti, karena asuhan kepada ibu harus dilakukan secara komprehensif dan terus menerus, artinya selama masa kurun reproduksi seorang wanita harus mendapatkan asuhan yang berkualitas dan standar. Adapun peran bidan pada ibu nifas yakni:

- a. Memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologi selama masa nifas.
- b. Sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga.
- c. Mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman.
- d. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan.
- e. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarga mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi baik (Sulfianti, Dkk. 2021).

#### **5. Program dan Kebijakan Masa Nifas**

Kunjungan masa nifas dilakukan paling sedikit empat kali.

Kunjungan ini bertujuan untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir juga untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani masalah-masalah yang terjadi.

**Tabel 2.1**  
**Kunjungan Masa Nifas**

Kunjungan	Waktu	Tujuan
Pertama	6-8 jam setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mencegah terjadinya pendarahan masa nifas karena atonia uteri</li> <li>b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain pendarahan dan memberi rujukan bila pendarahan berlanjut.</li> <li>c. Memberikan konseling kepada ibu atau salah satu anggota keluarga mengenai bagaimana mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri.</li> <li>d. Pemberian ASI pada masa awal menjadi ibu</li> <li>e. Mempererat hubungan antara ibu dan bayi baru lahir.</li> <li>f. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermia.</li> </ul>
Kedua	Enam hari setelah persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontaksi, fundus di bawah <i>umbilicus</i> tidak ada pendarahan abnormal, dan tidak ada bau.</li> <li>b. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, atau kelainan pasca melahirkan.</li> <li>c. Memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan, dan istirahat.</li> <li>d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak ada tanda-tanda penyulit.</li> <li>e. Memberikan konseling kepada ibu mengenai asuhan pada bayi, cara,</li> <li>f. merawat tali pusat, dan bagaimana menjaga bayi agar tetap hangat</li> </ul>
Ketiga	Dua Minggu Setelah Persalinan	Sama seperti di atas (enam hari setelah persalinan).
Keempat	Enam Minggu Setelah Persalinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami bayinya.</li> <li>2. Memberikan konseling KB secara dini.</li> </ul>

(Maritalia, 2019)

## 6. Perubahan Fisiologi Masa Nifas

### a. Uterus

Pengerutan rahim (*involsi*) merupakan proses kembalinya uterus pada kondisi sebelum hamil. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus (Tihardimanto, A, 2012).

**Tabel 2.2**  
**fundus uteri dan berat uterus menurut masa involusi**

<b>Involusi</b>	<b>Tinggi Fundus Uteri</b>	<b>Berat Uterus</b>
Bayi Lahir	Setinggi pusat, 2 Jrbpst (Jari di bawah pusat)	1.000 gram
1 minggu	Pertengahan Pusat Simfisis	750 gram
2 minggu	Tidak Teraba diatas simfisis	500 gram
6 minggu	Normal	50 gram
8 minggu	Normal tapi sebelum hamil	30 Gram

(Saleha, 2013).

### b. Lochea

*Lochea* adalah ekskresi cairan sekret yang keluar dari uterus melalui vagina selama masa nifas. Lochea mengandung darah dan sisa jaringan desidua yang nekrotik dari dalam uterus.

*Lochea* terbagi menjadi 4 yaitu:

- 1) *Lochea rubra*, yang keluar pada hari ke-1 sampai hari ke 4 masa postpartum, cairan yang keluar berwarna merah karena berisi yang darah segar dan terdapat sisa-sisa selaput ketuban, sel-sel desidua, *vetriks caseosa*, *lanugo* (rambut bayi) dan *mechonium* selama tiga hari postpartum.
- 2) *Lochea Sanguinolenta*, berwarna merah kecoklatan dan juga berlendir. Yang berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke 7 postpartum.
- 3) *Lochea Serosa*, berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Berlangsung pada hari ke 7 sampai hari ke 14.
- 4) *Lochea alba*, berwarna putih, berlangsung selama 2-6 minggu postpartum (Astria, 2016).

c. Endometrium

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya trombosis, degenerasi, dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Pada hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan desidua, dan selaput janin. Setelah tiga hari mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan perut pada bekas implantasi plasenta (Saleha, 2013).

d. Serviks

Perubahan yang terjadi pada serviks ialah bentuk serviks agak menganga seperti corong, segera setelah bayi lahir, bentuk ini disebabkan oleh *corpus uteri*

yang dapat mengadakan kontraksi (Tihardimanto, A, 2012). Serviks menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina pada saat persalinan. Segera setelah persalinan serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa, setelah 2 jam persalinan serviks hanya dapat dilewati 2-3 jari dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari, setelah 6 minggu persalinan serviks menutup (Maritallia, 2019).

#### e. Vagina dan Perineum

Selama proses persalinan vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan, setelah beberapa hari persalinan kedua organ ini kembali dalam keadaan kendur. *Rugae* timbul kembali pada minggu ke tiga. Pada awalnya introitus mengalami eritematosa dan udematosa terutama pada daerah episiotomi atau jahitan laserasi. Tanda-tanda infeksi yaitu nyeri, merah, panas, bengkak atau rabas (Tihardimanto, A, 2012).

Robekan perineum umumnya terjadi digaris tengah dan bisa menjadi luas apabila kepala janin melewati pintu bawah panggul dengan ukuran yang lebih besar. Dalam penyembuhan luka memiliki fase-fase pada keluhan yang dirasakan ibu pada hari pertama sampai hari ke tiga ini merupakan fase inflamasi, dimana pada fase ini ibu akan merasakan nyeri pada luka jahitan perineum, hal ini akan terjadi sampai 4 hari postpartum (Wulandari dkk, 2016).

#### f. Payudara

Setelah kelahiran plasenta, proses laktasi terjadi secara alami, selama sembilan bulan jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk

menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Pada proses laktasi terdapat dua refleks yang berperan yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran (refleks *let down*) yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan isapan bayi (Indrianita, 2021).

Setelah melahirkan ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak ada lagi untuk menghambatnya hormon pituitari akan mengeluarkan prolaktin (*hormon laktogenik*). Sampai hari ketiga setelah melahirkan, efek prolaktin pada payudara mulai bisa dirasakan. Pembuluh darah payudara menjadi bengkak terisi darah, sehingga timbul rasa hangat, bengkak dan rasa sakit. Sel *acini* yang menghasilkan ASI juga mulai berfungsi.

Ketika bayi menghisap puting, refleks saraf merangsang lobus posterior pituitari untuk menyekresi hormon oksitosin. Oksitosin merangsang releks *let down* (mengalirkan), sehingga menyebabkan ejaksi ASI melalui sinus aktiferus payudara ke duktus yang terdapat pada puting. Ketika ASI dialirkan karena isapan bayi atau dengan dipompa sel-sel *acini* terangsang untuk menghasilkan ASI lebih banyak (Maritalia, 2019).

#### g. Tanda-tanda Vital

##### 1) Suhu Tubuh

Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat sekitar 0.5 derajat Celcius dari keadaan normal ( $36^{\circ}\text{C} - 37,5^{\circ}\text{C}$ ), namun tidak lebih dari 38 derajat celcius. Hal ini disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh pada saat proses persalinan. Setelah 12 jam postpartum, suhu tubuh yang meningkat tadi akan kembali seperti keadaan semula. Bila suhu tubuh tidak

kembali seperti keadaan normal atau semakin meningkat, maka perlu dicurigai kemungkinan terjadi infeksi.

## 2) Nadi

Denyut nadi normal berkisar antara 60-80 kali per menit. Pada saat proses persalinan denyut nadi akan mengalami peningkatan. Setelah proses persalinan selesai frekuensi denyut nadi dapat sedikit lebih lambat. Pada masa nifas biasanya denyut nadi akan kembali normal.

## 3) Tekanan Darah

Tekanan darah normal untuk *Systole* berkisar antara 100-120-mmHg untuk *Diastole* antara 60-90 mmHg. Setelah persalinan, tekanan darah dapat sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya pendarahan pada proses persalinan. Bila tekanan darah mengalami peningkatan lebih dari 30 mmHg pada *Systole* perlu dicurigai timbulnya hipertensi atau preeklampsia postpartum.

## 4) Pernapasan

Frekuensi pernapasan normal berkisar antara 18-24 kali per menit. Keadaan pernapasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan nadi. Kecuali apabila ada gangguan khusus pada saluran nafas (Maritalia, 2019).

## 7. Perubahan Psikologi Masa Nifas

Perubahan yang mendadak dan dramatis pada status hormonal menyebabkan ibu yang berada dalam masa nifas menjadi sensitif terhadap faktor-

faktor yang dalam keadaan normal mampu diatasinya. Disamping perubahan hormonal, cadangan fisiknya seiring sudah terkuras oleh tuntutan kehamilan serta persalinan, keadaan kurang tidur, lingkungan yang asing baginya dan oleh kecemasannya akan bayi, suami atau anak-anaknya yang lain. Adaptasi ini diekspresikan oleh Reva Rubin yang terjadi pada tiga tahap yaitu:

*a. Talking In*

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain. Fokus perhatian terhadap tubuhnya, ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialaminya, ketidaknyamanan yang dirasakan ibu karena proses persalinan adanya rasa mules, nyeri pada jalan lahir, kurang tidur atau kelelahan, merupakan hal yang dikeluhkan ibu. Pada fase kebutuhan istirahat, asupan nutrisi dan komunikasi yang baik harus dapat terpenuhi. Bila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ibu dapat mengalami gangguan psikologis berupa kekecewaan pada bayinya, ketidaknyamanan sebagai akibat perubahan fisik yang dialami, rasa bersalah karena belum bisa menyusui bayinya, dan kritikan keluarga dan suami tentang perawatan bayinya.

*b. Taking Hold*

Berlangsung 3-10 hari postpartum. Ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawab dalam perawatan bayinya. Perasaan ibu lebih sensitif sehingga mudah tersinggung. Hal yang perlu diperhatikan adalah komunikasi yang baik, dukungan dan pemberian konseling atau pendidikan kesehatan tentang perasaan diri dan bayinya. Penuhi kebutuhan ibu



tentang cara perawatan bayi, cara menyusui yang baik dan benar, cara perawatan luka jalan lahir, mobilisasi postpartum, nutrisi, istirahat, personal hygienen dan lain-lain.

*c. Letting Go*

Fase ini merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya sebagai seorang ibu. Fase ini berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah mulai dapat menyesuaikan diri dengan ketergantungan bayinya, perawatan ibu terhadap diri dan bayinya meningkat, rasa percaya diri ibu akan peran barunya mulai tumbuh, lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan dirinya dan bayinya. Dukungan suami dan keluarga dapat membantu ibu lebih meningkatkan rasa percaya diri dalam merawat bayinya. Kebutuhan akan istirahat dan nutrisi yang cukup masih sangat diperlukan ibu untuk menjaga kondisi fisiknya (Zan dan Namora, 2019).

## **8. Tanda Bahaya Masa Nifas**

Sebagian besar kematian ibu terjadi selama masa pascasalin. Oleh karena itu sangat penting ibu dan keluarga mengetahui tanda bahaya masa nifas yaitu:

- a. Pendarahan pervaginam yang luar biasa banyak atau tiba-tiba bertambah banyak (lebih banyak dari pendarahan haid biasa atau bila memerlukan penggantian pembalut dua kali setengah jam).
- b. Pengeluaran pervaginam yang baunya busuk.
- c. Rasa sakit pada bagian bawah abdomen atau punggung.
- d. Sakit kepala yang terus menerus, nyeri ulu hati, atau masalah penglihatan.

- e. Pembengkakan wajah atau tangan.
- f. Demam, muntah, rasa sakit waktu buang air kecil, atau merasa tidak enak badan.
- g. Payudara yang berubah merah, panas dan terasa sakit.
- h. Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang sama.
- i. Merasa sangat sedih atau tidak mampu mengasuh sendiri banyinya. (Bahiyatun 2013: 144).

### 9. Perawatan Masa Nifas

Perawatan masa dimaksudkan agar pada saat keluar rumah sakit, ibu berada dalam keadaan sehat dan mengetahui cara merawat anaknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama perawatan masa nifas:

#### a. Mobilisasi dini

Perawatan mobilisasi dini mempunyai beberapa manfaat yaitu:

- 1) Melancarkan pengeluaran *lochea*, mengurangi infeksi perineum
- 2) Mempercepat involusio kandungan
- 3) Memperlancar fungsi alat gastrointestinal dan perkemihan
- 4) Meningkatkan kelancaran peredaran darah, sehingga mempercepat fungsi ASI dan pengeluaran sisa metabolisme (Ambarwati, 2018).

#### b. Rawat Gabung (*Rooming In*)

Perawatan ibu dan bayi dalam suatu ruangan bersama-sama dapat memudahkan ibu untuk lebih dekat dengan bayinya akan terjalin proses lekat akibat sentuhan antara ibu dan anak, dapat segera memberikan ASI karena dalam tubuh

ibu menyusui ada hormon oksitosin. Hormon ini sangat berpengaruh pada keadaan emosi ibu. Jika ibu tenang dan bahagia karena mendekap bayinya, maka hormon ini akan meningkat dan produksi ASI pun akan banyak sehingga bayi lebih puas mendapatkan ASI (Ethyca Sari, 2020).

c. Gizi

Ibu menyusui harus mengonsumsi tambahan 500 kalori tiap hari. Makan dengan diet berkembang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Menganjurkan ibu sedikitnya 3 liter air setiap hari serta minum setiap kali selesai menyusui. Serta minum kapsul Vitamin A agar bisa memberikan vitamin A kepada bayinya melalui ASI (Rini, Susilo, 2017).

d. Kebersihan diri

Mengajarkan ibu bagaimana membersihkan daerah kelamin dengan sabun dan air. Memastikan bahwa ibu paham untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Nasehatkan ibu untuk membersihkan diri setiap kali selesai buang air besar dan kecil. Sarankan ibu untuk mengganti pembalut setidaknya 3 kali sehari. Jika ibu mempunyai luka episotomi atau laserasi, sarankan kepada ibu untuk menghindari daerah luka (Rini, Susilo, 2017).

e. Istirahat

Kebutuhan istirahat sangat dibutuhkan oleh ibu beberapa jam setelah melahirkan untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Rata-rata kebutuhan tidur orang dewasa yaitu 7-8 per 24 jam. Kurangnya istirahat dapat mempengaruhi ibu

dalam beberapa hal yaitu, dapat mengurangi jumlah produksi ASI, memperlambat proses involusio uterus dan memperbanyak pendarahan serta menyebabkan depresi dan ketidakmampuan ibu mengurus bayi dan dirinya sendiri (Saleha, 2013).

f. Sexual

Dinding vagina kembali ke keadaan sebelum hamil dalam 6-8 minggu, pada waktu itu diharapkan organ-organ tubuh telah pulih kembali. Secara fisik aman untuk memulai hubungan suami istri begitu darah berhenti, dan ibu dapat memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina tanpa rasa nyeri. Begitu darah merah berhenti dan ketika luka jahitan dan nyeri telah sembuh serta tidak merasakan ketidaknyamanan, aman untuk memulai melakukan hubungan seksual (Rini, Susilo, 2017).

g. Keluarga berencana

Menurut bahiyatun 2013, idealnya pasangan harus menunggu sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum hamil kembali setiap pasangan harus menentukan kapan dan bagaimana mereka ingin merencanakan tentang keluarganya.

h. Latihan senam nifas

Tujuan senam nifas yaitu:

- 1) Membantu mempercepat proses pemulihan ibu
- 2) Mempercepat proses involusio uterus
- 3) Membantu memulihkan dan mengencangkan otot panggul, perut dan perineum

- 4) Memperlancar penguasaan lochea
- 5) Membantu mengurangi rasa nyeri
- 6) Mengurangi kelainan dan komplikasi masa nifas
- 7) Merefleksikan otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan.

Manfaat senam nifas yaitu:

- 1) Membantu memperbaiki sirkulasi darah
- 2) Memperbaiki sikap tubuh dan punggung pasca persalinan
- 3) Memperbaiki otot tonus, pelvis dan peregangan otot abdomen
- 4) Membantu ibu lebih rileks dan segar pasca persalinan
- 5) Memperbaiki dan memperkuat otot panggul (Wulandari dkk. 2016).

#### **10. Infeksi Nifas**

Menurut Nugroho (2011) dalam Lidya (2018), infeksi masa nifas adalah adanya infeksi peradangan pada alat genitalia dan meningkatnya suhu badan melebihi 38 derajat celsius tanpa menghitung hari perama dan berturut-turut selama 2 hari. Adapun tanda-tanda infeksi masa nifas yaitu mengalami demam tinggi serta cairan nifas yang keluar dari mulut rahim berbau busuk.

## ***B. Tinjauan Tentang Nyeri luka Perineum***

### **1. Nyeri**

#### **a. Pengertian nyeri**

Nyeri adalah fenomena subjektif dimana respon yang dialami setiap individu akan berbeda untuk menunjukkan adanya masalah atau perasaan yang tidak nyaman (Sari, dkk, 2017). Nyeri perineum adalah nyeri yang diakibatkan oleh robekan yang terjadi pada perineum, vagina dan serviks, atau uterus dapat terjadi secara spontan maupun tindakan manipulatif pada pertolongan persalinan, robekan perineum ada yang memerlukan tindakan penjahitan ada yang tidak perlu, dari jahitan perineum yang menimbulkan rasa nyeri (Prawirohadjo, 2018).

#### **b. Klasifikasi Nyeri**

- 1) Berdasarkan sumber nyerinya, nyeri dibagi menjadi:
  - a) Nyeri somatik luar, nyeri yang stimulusnya berasal dari kulit, jaringan subkutan dan membran mukosa. Nyeri biasanya dirasakan seperti terbakar, dan terlokalisasi.
  - b) Nyeri somatik dalam, nyeri tumpul dan tidak terlokalisasi dengan baik akibat rangsangan pada otot rangka, tulang, sendi, jaringan ikat.
  - c) Nyeri viseral, nyeri karena perangsangan organ viseral atau organ yang menutupinya (pleura parietalis, pericardium, peritoneum).
- 2) Berdasarkan timbulnya nyeri, dibagi menjadi:
  - a) Nyeri akut, nyeri yang timbul mendadak dan berlangsung sementara, nyeri yang ditandai dengan adanya aktivitas saraf otonom seperti: takikardi, hipertensi, hiperhidrosis, pucat, dan perubahan wajah


- b) Nyeri kronik, nyeri yang tetap bertahan walaupun sesudah penyembuhan luka, atau yang awalnya nyeri akut lalu menetap sampai melebihi 3 bulan.
- 3) Berdasarkan derajat nyeri dikelompokkan menjadi
- a) Nyeri ringan adalah nyeri hilang timbul, terutama saat beraktivitas sehari-hari
  - b) Nyeri sedang adalah nyeri terus menerus, aktivitas terganggu yang hanya hilang bila penderita tidur
  - c) Nyeri berat adalah nyeri terus menerus sepanjang hari, penderita tidak dapat tidur dan sering terjaga akibat nyeri (Budi, 2020).

#### **c. Nyeri Perineum Pasca Salin**

Nyeri perineum (*Perineal Pain*) didefinisikan sebagai nyeri yang terjadi pada badan perineum (*perinel body*), daerah otot dan jaringan fibrosa yang menyebar dari *simpisis pubis* sampai ke *coccygis* oleh karena adanya robekan yang terjadi baik yang disengaja ataupun ruptur spontan. Kondisi nyeri ini dirasakan ibu berbeda dengan nyeri lainnya. Nyeri perineum cenderung lebih jelas dirasakan ibu berbeda dengan nyeri lainnya seperti rasa nyeri dialami saat berhubungan (*intercourse*) (Utami,2015:30).

#### **d. Intensitas nyeri**

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan individu. Skala (VAS) *Visual Analogue Scale* yaitu:



Gambar 2.1 *Visual Analogue Scale (VAS)* sebagai alat ukur nyeri

Sumber: Nadyah, 2013

### e. Penanganan nyeri

Berbagai macam metode untuk mengurangi nyeri jahitan perineum baik secara farmakologis, maupun non farmakologis. Secara farmakologis, menangani nyeri yang dialami dengan berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat-obat tertentu dalam penatalaksanaan nyeri. Metode non farmakologi adalah dengan relaksasi pernapasan. Teknik relaksasi dapat dilakukan untuk mengendalikan rasa nyeri ibu (Fitriani, R. 2016).

## 2. Luka / Ruptur Perineum

### a. Pengertian Luka/Ruptur Perineum

Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada diantara kelamin dan anus. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi di daerah perineum sewaktu persalinan. Robekan perineum (Ruptur perineum) adalah robekan yang terjadi pada saat bayi lahir baik secara spontan maupun dengan menggunakan alat atau tindakan (Azizah, 2019)



Adapun tingkatan Ruptur perineum yaitu:

1) Ruptur perineum derajat I

Ruptur pada mukosa vagina, kulit perineum

2) Ruptur perineum derajat II


Ruptur pada mukosa vagina, kulit perineum dan otot perineum

3) Ruptur perineum derajat III

Ruptur mengenai seluruh perineum dan otot spingter ani.

4) Ruptur Perineum derajat IV

Ruptur sampai mukosa rahim.



Gambar 2.2 ruptur pada perineum (Sumber: Info Bidan)

## **b. Faktor Penyebab Rupture Perineum**

Faktor-faktor penyebab ruptur perineum yaitu faktor ibu, faktor janin dan faktor penolong persalinan.

### 1. Faktor ibu

#### a) Paritas

Paritas adalah jumlah kehamilan yang mampu menghasilkan janin hidup diluar rahim (lebih dari 28 minggu). Beberapa pengertian yang harus diketahui dalam istilah paritas yaitu:

- 1) Primipara adalah seseorang wanita yang telah melahirkan bayi aterm sebanyak satu kali
- 2) Nulipara adalah seseorang wanita yang belum pernah bersalin sama sekali
- 3) Multipara adalah seorang wanita telah melahirkan anak beberapa kali, dimana persalinan tersebut tidak lebih dari lima.
- 4) Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan aterm lebih dari 5 kali (Fitriani, 2021).

#### b) Meneran

Secara fisiologis ibu merasakan dorongan untuk meneran bila pembukaan sudah lengkap dan refleks telah terjadi. ibu harus didukung untuk meneran dengan benar pada saat ia merasakan dorongan dan memang ingin mendedan. Ibu mungkin merasa dapat meneran secara lebih aktif pada posisi tertentu.

Beberapa cara dapat dilakukan dalam memimpin ibu bersalin untuk mengedan supaya mencegah ruptur perineum, diantaranya, menganjurkan ibu untuk mengedan sesuai dengan dorongan alamiahnya selama kontraksi, tidak menganjurkan ibu untuk menahan nafas pada saat meneran, mungkin ibu akan merasa lebih mudah mengedan jika ibu berbaring miring atau setengah duduk, menarik lutut ke arah ibu, dan menempelkan dagu ke dada, menganjurkan ibu untuk tidak mengangkan bokong saat mengedan, tidak melakukan dorongan pada fundus untuk membantu kelahiran bayi. Dorongan ini dapat meningkatkan resiko distosia bahu dan ruptur uteri, pencegahan ruptur perineum dapat dilakukan saat bayi dilahirkan terutama saat kelahiran kepala dan bahu (Dewanti, 2019).

## 2. Faktor janin

### a. Berat badan janin

Makrosomia adalah berat janin pada waktu lahir lebih dari 4000 gram. Makrosomia disertai dengan meningkatnya resiko trauma persalinan melalui pervaginam seperti distosia bahu, kerusakan klavikula, dan kerusakan jaringan lunak pada ibu seperti laserasi jalan lahir dan robekan pada perineum.

### b. Presentasi (puncak kepala, dahi, muka)

Menurut kamus kedokteran, presentasi adalah letak hubungan sumbu memanjang panggul ibu. Presentasi digunakan untuk menentukan bagian yang ada dibagian bawah rahim yang dijumpai pada palpasi atau pemeriksaan dalam.

### 3. Faktor penolong persalinan

Penolong persalinan adalah seorang yang mampu berwenang dalam memberikan asuhan persalinan. Pimpinan yang salah merupakan salah satu penyebab terjadinya ruptur perineum. Kemampuan penolong sangat berpengaruh terhadap kejadian ruptur perineum walaupun dalam kriteria inklusi sudah disebutkan bahwa penolong harus menggunakan teknik standar APN (Asuhan Persalinan Normal), namun bila posisi persalinan pasien tidak seperti di atas maka kemungkinan besar akan terjadi robekan pada perineum (Dewanti, 2019). Pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melalui introitus vagina dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan (Depkes RI.2019).

#### **c. Penanganan Ruptur Perineum**

Robekan perineum yang melebihi tingkat satu harus dijahit. Hal ini dapat dilakukan sebelum plasenta lahir tetapi apabila ada kemungkinan plasenta harus dikeluarkan secara manual lebih baik tindakan tersebut di tunda sampai plasenta lahir. Tujuan menjahit perineum adalah untuk menyatukan kembali jaringan tubuh dan mencegah kehilangan darah yang tidak perlu. Pada saat menjahit laserasi atau episiotomi gunakan benang yang cukup panjang dan gunakan sedikit mungkin jahitan untuk mencapai tujuan pendekatan dan hemostatis.

Penjahitan dimulai satu cm dari puncak luka. Jahit sebelah dalam keluar, dari atas hingga mencapai bawah laserasi. Pastikan jarak setiap jahitan sama dan otot yang terluka telah dijahit. Ikat benang dan sisakan 2,5 cm. kemudian

melakukan pemeriksaan ulang pada vagina dan anus untuk mengetahui terabanya jahitan pada rectum karena bisa menyebabkan fistula dan bahkan infeksi (Sari, 2022).

Menurut Dewanti (2019), kewenangan bidan dalam penjahitan luka ruptur hanya pada derajat satu dan dua, sedangkan untuk derajat tiga dan empat sebaiknya bidan melakukan kolaborasi atau rujukan ke rumah sakit, karena ruptur ini memerlukan teknik dan prosedur khusus.

Cara perawatan robekan perineum derajat II yaitu: apabila setelah buang air besar atau buang air kecil perineum dibersihkan secara rutin. Caranya dibersihkan dengan sabun yang lembut minimal 1 kali sehari. Biasanya ibu merasa takut pada kemungkinan jahitannya akan lepas dan merasa sakit sehingga perineum tidak dibersihkan atau dicuci (Ambarwati dan wulandari 2018). Ibu postpartum harus mengerti untuk membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu dari depan kebelakang, kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Anjurkan ibu untuk membersihkan vulva setiap kali selesai buang air kecil dan besar (Saleha, 2013).

Untuk cara mengganti pembalut yaitu bagian dalam jangan sampai terkontaminasi oleh tangan. Pembalut yang sudah kotor harus diganti paling sedikit 4 kali sehari. Ibu harus memahami tentang jumlah, warna, dan bau lochea sehingga apabila ada kelainan ibu dapat mengetahui secara dini (Ambarwati dan wulandari, 2018).

#### **d. Perawatan luka perineum**

Perawatan luka perineum pemenuhan kebutuhan untuk menyehatkan antara daerah yang dibatasi vulva dan anus pada ibu yang dalam masa nifas. Menjaga kebersihan pada masa nifas untuk menghindari infeksi, baik pada luka jahitan atau kulit (Nugroho, 2014).

##### 1. Kebersihan alat genitalia

Setelah melahirkan biasanya perineum menjadi agak bengkak/memar dan mungkin ada robekan atau luka episotomi.

- a) Menjaga alat genitalia dengan mencucinya menggunakan sabun dan air, kemudian daerah vulva sampai anus harus kering sebelum memakai pembalut dan pembalut diganti tiap 4 jam.
- b) Cuci tangan dan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah membersihkan daerah genitalia.
- c) Mengajarkan ibu membersihkan daerah sekitar vulva terlebih dahulu dari depan kebelakang baru kemudian membersihkan daerah anus.
- d) Hindari menyentuh luka.

#### **C. Tinjauan Nifas dengan nyeri luka perineum Menurut Islam**

Nifas adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan, sekalipun wanita itu melahirkan sebelum genap bulan kandungan. Seperti yang terjadi pada kondisi keguguran. Tidak ada batasan waktu tertentu bagi nifas, seandainya seorang wanita melahirkan, lalu darahnya berhenti sama sekali

setelah melahirkan, walau hanya sejam atau beberapa menit saja, maka selesailah nifasnya dan wajiblah ia melakukan apa yang wajib dilakukan oleh wanita-wanita yang dalam keadaan suci, yaitu shalat, puasa dan sebagainya. (Asy-Syarbashi, 2008:35-36).

Hal-hal yang dilarang dilakukan wanita yang sedang nifas

#### 1. Shalat dan Berpuasa

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ،  
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
”أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَ لَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا“ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami putra Abu Maryam, menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, ia berkata: menceritakan kepadaku Zaid, dari 'Iyadh, dari Abu Sa'id r.a. Ia berkata: Nabi Muhammad saw. Bersabda: “bukankah bila si Wanita ia tidak salat dan tidak pula berpuasa? Itulah kekurangan agama si Wanita” (HR. Al-Bukhari).

Islam melarang Wanita yang sedang masa nifas untuk melakukan salat dan berpuasa bukan karena merendahkan, tetapi karena kesucian ibadah yang akan dipersembahkan kepada Allah swt. Sehingga Wanita yang sedang masa nifas ditunda dulu untuk mempersembahkan ibadah salat dan puasanya. Masa nifas merupakan kasih sayang Allah swt. dalam bentuk keringanan tidak melaksanakan salat dan berpuasa. Karena wanita yang mengalami masa nifas merasakan kesakitan sebab terjadinya proses involusio uteri yaitu kembalinya Rahim ke keadaan sebelum hamil, islam empati terhadap sakit yang dirasakan Wanita, sehingga ia boleh tidak salat dan berpuasa.

Wanita hanya diperintahkan untuk mengqada' puasa saja, sebab puasa dapat dihitung dan hanya diperintahkan sekali dalam setahun. Berbeda dengan salat yang dilaksanakan setiap hari, maka jika diperintahkan untuk mengqada' pula, akan banyak salat yang terlewatkan.

## 2. Tawaf

قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ،  
عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي (رواه البخاري)

Artinya:

“Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kaum Wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan orang-orang yang haji, kecuali tawaf di Baitullah sampai engkau suci. (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa seorang Wanita yang sedang haid atau nifas boleh melakukan ibadah-ibadah haji secara keseluruhan selain tawaf. Ibadah hajinya tetap terhitung haji walaupun tidak melakukan tawaf. Adapun tawafnya diganti dengan membayar.

## 3. Memegang Mushaf

Wanita yang sedang nifas haram hukumnya membaca Al-Qur'an, sebagaimana dalam Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Waqiah 56:79:

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۗ ٧٩

Terjemahnya:

Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba (Allah) yang disucikan (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2019).



Al-Qur'an adalah kitab yang sangat mulia. Ia tertulis dalam kitab yang dijaga. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah bersuci, yakni orang-orang yang telah menyucikan dirinya dari hadas-hadas (Jalalain, 2014). Al-Qur'an memuat bermacam manfaat dan kegunaan. Karena ia memuat hal-hal yang membawa kepada keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an sendiri berada dalam Lauh Mahfuzh yang terpelihara, yang tidak mungkin didekati kecuali Allah, yaitu para malaikat. Tidak ada juga yang menyentuh Lauh Mahfuzh ini kecuali orang-orang yang dibersihkan dari kotoran dan dorongan nafsu (Al-Maraghi, 2014). Sebagai Kesimpulan, Ayat ini menjelaskan tentang larangan memegang ataupun membaca Al-Quran terhadap orang-orang yang berhadas. Kecuali orang-orang yang suci.

#### 4. Larangan bersenggama (berhubungan seks)

Haram pula bagi suaminya untuk menikmati segala sesuatu dari tubuhnya antara pusat dan lutut. Larangan ini didasarkan pada Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Baqarah 2:222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ  
 ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid katakanlah “haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah SWT kepadamu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang

mensucikan diri (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2019).

Pertanyaan tersebut muncul karena pria-pria yahudi menghindari wanita-wanita yang sedang haid, bahkan tidak makan bersama mereka dan meninggalkan rumah mereka pada saat mereka sedang haid atau datang bulan. Dengan demikian, pernyataan mereka pada hakikatnya bukan tentang apa itu haid. Tetapi bagaimana tuntutan Ilahi kepada suami pada saat istrinya sedang haid. Sesaat setelah turunnya ayat ini Nabi saw. Menyampaikan maksud jawaban Ilahi ini dengan menyatukan kepada seluruh umat Islam lakukanlah segala sesuatu (yang selama di benarkan) kecuali seks” (Shihab,2008: 582).

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, “Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (Ibnu Katsir, 2022).

Mereka bertanya kepadamu tentang hukum menggauli istri di waktu haid. Berilah jawaban bahwa sesungguhnya haid itu adalah kotoran. Maka janganlan kalian gauli mereka selama masa haid, sampai benar-benar suci. Jika telah suci, gaulilah mereka di tempat yang seharusnya (Al-Misbah,

2016). Sebagai kesimpulan bahwasanya seorang laki-laki haram hukumnya menggauli istrinya saat masa nifas atau haid sampai wanita tersebut bersuci.

Sedangkan dari segi kesehatan melarang berhubungan seks karena berhubungan seks selama nifas akan sangat berisiko karena mulut rahim masih terbuka dan dapat menyebabkan infeksi. Dan jika ibu mengalami masa nifas dan terdapat luka jahitan maka ibu merasakan nyeri, maka disaat suami menyetubuhi istrinya pada saat masa nifas maka ibu mengalami nyeri yang bertambah, dan jahitan pada perineum dapat terlepas karena adanya gesekan dari alat kelamin suami.

Karena itulah Islam sangat berkeinginan agar kaum muslimin terbiasa dengan kebersihan fisik dan jiwa, kesucian rohani dan jasmani, kemurnian hati dan tubuh. Dapat dipahami bahwa nifas atau darah yang keluar setelah perempuan mengalami persalinan, merupakan siklus biologis normal yang dialami perempuan. Istilah nifas itu sendiri seperti haid, namun nifas dan haid memiliki arti tersendiri, tetapi mempunyai kesamaan larangan-larangan dalam islam.

Selain larangan dalam masa nifas, terdapat pula anjuran yang dapat dilakukan saat menjalani masa nifas. Beberapa hal yang boleh dilakukan pada saat masa nifas yaitu:

a. Mendengarkan lantunan Al-Qur'an

Perempuan yang sedang masa nifas atau haid diperbolehkan mendengarkan bacaan Al-Qur'an orang lain. As syuyuti (2010) dalam

Ernawati (2015), berpendapat bahwa ada banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana pengaruh yang ditimbulkan saat seseorang mendengarkan bacaan Al-Qur'an baik pada seseorang yang mengerti makna dari bacaan tersebut ataupun tidak mengerti sama sekali. Pengaruh Al-Qur'an untuk hati benar-benar luar biasa, selain itu, energi yang dipancarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an akan mendesak seseorang bertindak apa saja yang dicintai Allah dan Rasulnya.

Sebagaimana dalam firman Allah swt :

“Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman (QS. Al-Fushsilat 41:44)”.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah (kuat) imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal (QS. Al-Anfal 8:2)”.

Firman pada ayat tersebut menyatakan bahwasanya Al-Qur'an disamping menjadi sumber petunjuk bagi orang yang beriman, juga mengandung kadar penyembuhan pada jiwa. Dengan mendengarkan lantunan Al-Qur'an menjadi terapi atau salah satu obat yang bermanfaat dan berpengaruh untuk tubuh, mempertahankan keteguhan jiwa dari penyakit batin, fisik, maupun psikis, serta memutus bisikan-bisikan godaan yang menyebabkan kecemasan, kegelisahan, dan kegundahan di masa nifas atau haid.

#### b. Berdzikir

Perempuan yang sedang haid atau nifas diperbolehkan untuk melafadzkan kalimat-kalimat Thayyibah, seperti dzikir, takbir, tahlil,

tasbih, tahmid dan bismillah ketika hendak makan atau pekerjaan lainnya. Allah swt. Menyeru kepada umatnya agar berdzikir dan memuji-Nya. Mendorong mereka untuk bertasbih, mensucikan, memuji dan mengagungkan Allah swt. dan menjadikan dzikir sebagai sarana paling agung untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Manfaat dzikir yang terbesar adalah membawa ketenangan dalam hati. Dengan berdzikir kepada Allah swt. Hati menjadi tenang. Apabila dikala sedang nifas maupun haid, psikis dan jiwa para perempuan terkadang mengalami kegundahan. Maka dari itu, berdzikir merupakan salah satu sarana untuk menenangkan jiwa.

#### c. Berdoa

Perempuan yang sedang nifas atau haid diperbolehkan memanjatkan doa. Doa merupakan perintah Allah swt. Sehingga berdoa itu terasuk ibadah. Banyak sekali doa yang bisa diucapkan oleh perempuan yang sedang nifas atau haid. Melafalkan doa-doa tersebut akan menghindarkan ibu dari kekosongan hati, sehingga memberikan ketenangan. Doa yang dapat dipanjatkan seperti doa Nabi Ibrahim a.s. yang mendoakan anaknya seperti terdapat dalam QS. Ibrahim/ 14:40).

رَبِّ اجْعَلْ لِي مَقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَجُلًا يَتَّقِلُ دُعَاءِ ٤٠

Terjemahnya:

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku" (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, 2019).

Nabi Ibrahim a.s . sengaja di dalam doanya ini memakai ungkapan min yang menunjukkan makna sebagian karena Allah swt. Telah memberitahukan kepadanya bahwa diantara anak cucunya itu terdapat orang yang kafir (Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku) semua doa yang telah disebutkan tadi (Al-Jalalain, 2014). Kemudian nabi Ibrahim a.s. melanjutkan doanya, “ Ya Tuhanku, bimbinglah aku untuk mengerjakan salat dengan cara yang benar, juga anak keturunanku yang baik-baik, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku (Shihab, 2015). Sebagai kesimpulan, ayat ini menjelaskan bahwa setiap muslim senantiasa berdoa untuk keselamatan, keamanan, serta orang tua perlu mennyiapkan lingkungan yang aman dan jauh dari berbagai kesyirikan dan kemaksiatan demi terjaganya fitrah dalam jiwa setiap anak yaitu tauhid.

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Asuhan Kebidanan***

Asuhan kebidanan adalah proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktinya berdasarkan ilmu dan kiat kebidanan. (UUD no. 4. 2019 kebidanan). Ikatan Bidan Indonesia (IBI), manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, doagnosa kebidanan, perencanaan intervensi, pelaksanaan dan evaluasi.

Pengertian manajemen kebidanan dan prosesnya perlu diperjelaskan untuk memberikan kesamaan pandangan. Varney (2003) mengatakan proses manajemen terdiri dari 7 langkah sekuensial, yang secara berkala

disempurnakan. Ini di mulai dengan pengumpulan data dan di akhiri dengan evaluasi. 7 langkah varney ini merupakan keseluruhan kerangka kerja yang berlaku dalam semua situasi. Setiap langkah kemudian dapat dipecah menjadi tugas yang terbatas yang bervariasi sesuai dengan kondisi pasien. Harus diakui bahwa langkah-langkah ini diambil berkolaborasi dengan pasien, atau bekerja sama dengan pasien atau keluarga pasien.

Langkah-langkah manajemen kebidanan/proses manajemen terdiri dari 7 langkah yaitu:

### **Langkah 1: Pengumpulan data/analisa data**

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Yang terdiri dari data subjektif dan objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Yang termasuk data subjektif antara lain biodata, riwayat menstruasi, riwayat kehamilan, riwayat persalinan dan nifas, biopsikologi spiritual, dan pengetahuan klien. Sedangkan data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien, hasil laboratorium, dan test diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus. Data objektif terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi), pemeriksaan penunjang (laboratorium, catatan baru dan sebelumnya).

Pada kasus post natal care dengan nyeri luka perineum, pengumpulan data dilakukan dengan anamnesa identitas pasien, setelah itu pemeriksaan fisik pasien,

yang meliputi: keadaan umum ibu baik serta kesadaran composmentis. Tanda-tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan fisik yang terfokus yaitu

Hasil pemeriksaan Abdomen dengan inspeksi, tidak ada luka bekas operasi, dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, uterus teraba keras dan bundar, TFU 1 jari bawah pusat. Dari hasil pemeriksaan Genetalia dengan inspeksi, tidak ada varices, tampak pengeluaran lochia rubra. Tampak jahitan pada perineum ruptur derajat II, jahitan masih basah dan hasil pemeriksaan palpasi tidak ada oedema.

Selain hal di atas, yang perlu diperhatikan adalah kondisi psikologis ibu. Ibu nifas yang baru saja melewati masa persalinan, cenderung lebih sensitive sehingga perlu diberikan support dan perhatian serta selalu mengingatkan ibu untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Yaitu anjurkan ibu untuk memperbanyak doa dan dzikir agar dimudahkan dalam menjalani masa nifasnya.

### **Langkah II: Interpretasi diagnosa/masalah aktual**

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Pada kasus post natal care dengan nyeri luka perineum dilakukan identifikasi diagnosa kebidanan yaitu pada data subjektif ibu mengeluh perutnya terasa mules dan nyeri pada luka perineum. Pada data objektif keadaan perineum ibu tidak terdapat tanda-tanda infeksi kemerahan dan berbau. Dan kebutuhan pada ibu nifas dengan luka jahitan perineum post natal care yaitu cara mengurangi rasa nyeri. Penanganan nyeri yang dapat dilakukan klien yaitu dengan relaksasi pernapasan.



### **Langkah III: Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial**

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi.. Pada kasus post natal dengan nyeri luka perineum masalah yang biasa timbul jika nyeri luka perineum tidak teratasi dapat menimbulkan infeksi.

### **Langkah IV: Tindakan Segera/Kolaborasi**

Melakukan konsultasi, kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain berdasarkan kondisi klien. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim lain sesuai dengan kondisi klien.

Pada kasus post Natal Care dengan nyeri luka perineum kasus emergency yang dapat terjadi seperti infeksi. Untuk mengantisipasi terjadinya infeksi dapat dilakukan dengan menganjurkan ibu menjaga kebersihan diri dan sering mengganti pembalutnya.

### **Langkah V: merencanakan asuhan yang komprehensif / menyeluruh**

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada kasus Post Natal Care dengan nyeri luka perineum rencana asuhan yang akan diberikan yaitu

mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital, mengkaji tingkatan nyeri yang dirasakan ibu, observasi TFU, kontraksi uterus dan pengeluaran *lochea*, observasi tanda-tanda infeksi pada luka perineum, mengajarkan ibu teknik relaksasi, untuk mengatasi nyeri yaitu menarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut jika timbul rasa sakit, menganjurkan pada ibu menjaga kebersihan vulva (*genetalia*), yaitu mencuci daerah vulva dengan bersih setiap sebesai BAK dan BAB, menganjurkan kepada ibu untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang terutama makanan yang mengandung protein seperti telur, ikan atau daging terutama ikan gabus yang sangat baik untuk proses penyembuhan luka, sayur-sayuran hijau, dan kacang-kacangan, serta menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi obat oral yang diberikan sesuai dosisnya. Menganjurkan ibu untuk sering berdzikir agar ibu merasa tenang dan dapat mendekatkan dirinya kepada Allah swt.

#### **Langkah VI: Melaksanakan perencanaan**

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seleuruhnya oleh bidan atau sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Walaupun bidan tidak melakukan sendiri ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaannya. Pada kasus post natal care dengan nyeri luka perineum disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan pada langkah kelima. Dalam memberikan asuhan hendaknya selalu berdoa kepada Allah swt.

## **Langkah VII: Evaluasi**

Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar akan terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi di dalam diagnosa dan masalah. Rencana tersebut dianggap efektif jika memang benar dalam pelaksanaannya.

Pada kasus Post Natal Care dengan luka perineum mengevaluasi asuhan yang telah diberikan yaitu tanda-tanda vital normal, TFU sesuai, kontraksi uterus baik teraba keras, lochea normal, tidak terdapat tanda-tanda infeksi, ibu sudah beradaptasi dengan nyeri, ibu mengerti dan bersedia melakukan hal yang telah dianjurkan, dan ibu bersedia mengkonsumsi obat yang telah diberikan.

### ***E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan***

Varney menyatakan bahwa alur berfikir bidan saat menghadapi klien meliputi tujuh langkah. Agar diketahui orang lain apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berfikir sistematis. Maka dilakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP yaitu:

1. *Subjektis (S)*

Data dari pasien didapat dari anamnesa yang merupakan langkah 1 Varney.

2. *Objektif (O)*

Hasil pemeriksaan fisik diagnostik dan pendukung lain untuk mendukung asuhan.

### 3. *Assesment (A)*

Kesimpulan apa yang dibuat dari data subyektif dan obyektif tersebut merupakan langkah II, III, IV Varney

### 4. *Planning (P)*


Menggambarkan pelaksanaan dari tindakan dan evaluasi perencanaan berdasarkan assesment sebagai langkah V, VI, VII Varney

Adapun plananing yang dapat dilakukan pada kasus post natal care dengan nyeri luka perineum yaitu:

Kunjungan I (6-8 jam setelah persalinan): Mengobservasi tanda-tanda vital ibu serta mengobservasi kontraksi uterus dan TFU ibu, mencegah pendarahan masa nifas karena atonia uteri, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya terutama daerah genetaliaanya, menganjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi, menganjurkan ibu untuk selalu memberikan ASI Ekeklusif pada bayinya, melakukan hubungan antar ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi agar tetap nyaman dengan cara memandikan dan membedong.

Kunjungan II (6 hari setelah persalinan): Memastikan involusio uterus berkontraksi, fundus dibawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, tidak ada bau, menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi atau pendarahan abnormal, memastikan ibu mendapat cukup makanan, cairan dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, menjaga bayi tetap hangat dalam merawat bayi sehari-hari.

Kunjungan III (2 minggu setelah persalinan): yang dilakukan pada kunjungan ketiga sama halnya dengan kunjungan kedua. Kunjungan ke IV (6 minggu setelah persalinan): menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit.



**BAB III**  
**STUDI KASUS**

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE PADA**  
**NY ” J ” DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DERAJAT II**  
**DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU**  
**TANGGAL 07 AGUSTUS 2022**

No Register : 46xxx

Tanggal Partus : 07 Agustus 2022 Jam : 19.05 WITA

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 07 Agustus 2022 Jam : 21.35 WITA

Tanggal Pengkajian : 07 Agustus 2022 Jam : 21.35 WITA

Pengkaji : Nurdianti

**A. LANGAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR**

1. Identitas istri/suami

Nama : Ny “J” / Tn “M”

Umur : 26 tahun / 35 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Ujung Pandang Baru

2. Keluhan utama

Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitannya.

3. Riwayat keluhan utama

Nyeri pada daerah perineum dirasakan ibu sejak selesai bersalin yaitu tanggal 07 Agustus 2022 pukul 19.05 WITA, karena adanya laserasi pada jalan lahir.

4. Riwayat kesehatan lalu dan sekarang

Tidak ada riwayat menderita penyakit serius seperti jantung, Diabetes Melitus (DM), Hepatitis, tumor, hipertensi, penyakit melular seksual (PMS), dan tuberkolosis (TBC). Tidak ada riwayat penyakit yang menyertai kehamilan seperti sakit kepala yang hebat, nyeri perut yang hebat dan kejang. Tidak ada riwayat ketergantungan obat, alkohol, dan merokok. Serta keluarga tidak memiliki penyakit menular dan menurun.

5. Riwayat Reproduksi

a. *Menarche* : 12 Tahun

b. Siklus Haid : 28 hari

c. Lamanya Haid : 5-7 hari

d. Dismenorea : Tidak ada

6. Riwayat KB

Ibu pernah menjadi akseptor KB jenis Implan, selama 3 tahun

## 7. Riwayat kehamilan, persalinan dan nifas

**Tabel 3.1 Riwayat kehamilan, Persalinan dan nifas**

Anak ke	Tahun	Tempat persalinan	Jenis persalinan	penolong	BBL	PBL	JK	Keadaan
1	2019	RS Masita	Spontan	Bidan	2600 gram	49 cm	P	Hidup
2	2022	PKM Jumpandang Baru	Spontan	Bidan	3.500 gram	50 cm	L	Hidup

Sumber: Data Primer

**Kala IV**

Kala IV berlangsung normal, pemantauan kala IV dilakukan sampai dengan 2 jam postpartum.

**Tabel 3.2 Pemantauan 2 jam Postpartum**

Jam ke	Waktu	Tekanan Darah	Nadi	Suhu	Kontaksi Uterus	Tinggi Fundus Uteri	Kandung Kemih	Pendarahan
1	19.35	90/60 mmHg	80x/i	36,6 °C	Baik	1 Jari di Bawah Pusat	Kosong	±40 cc
	19.50	90/70 mmHg	80x/i		Baik	1 Jari di Bawah Pusat	Kosong	±20 cc
	20.05	90/70 mmHg	80x/i		Baik	1 jari di Bawah Pusat	Kosong	±10 cc
	20.20	90/80 mmHg	80x/i		Baik	1 Jari di Bawah Pusat	Kosong	±10 cc



2	20.50	90/70 mmHg	80x/i	36,8 °C	Baik	1 Jari di Bawah Pusat	Kosong	±10 cc
	21.20	100/70 mmHg	80x/i		Baik	1 Jari di Bawah Pusat	Kosong	±10 cc

Sumber: Data Primer

## 8. Pola Kebiasaan Sehari-hari

### a. Nutrisi

Pola makan ibu frekuensi 3 kali sehari dengan jenis makanan nasi, sayur, lauk pauk. Ibu minum 7-8 gelas/hari.

### b. Eliminasi

Ibu BAK sebanyak 3-4/hari, berwarna kuning muda dengan bau khas amoniak. BAB sebanyak 1-2 kali/hari.

### c. Istirahat

Ibu tidur siang kurang lebih 1 jam/ hari dan tidur malam

### d. Personal hygiene

Ibu mandi 2 kali sehari memakai sabun, keramas tiap rambut kotor dengan menggunakan shampo, menyikat gigi 2 kali dalam sehari.

## 9. Pemeriksaan fisik terfokus

### a. Mata

Inspeksi : Konjungtiva merah muda

### b. Abdomen

Inspeksi : Tidak ada luka bekas operasi

Palpasi : Tidak ada nyeri tekan, kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, TFU 1 jari dibawah pusat.

c. Genitalia

Inspeksi : tampak pengeluaran Lochia Rubra, tampak jahitan pada perineum ruptur tingkat II (jumlah jahitan 6) dan masih basah

Palpasi: ada nyeri tekan pada perineum

**B. LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH AKTUAL**

Diagnosa : P<sub>11</sub>A<sub>0</sub>, 2 jam post partum, dengan nyeri luka perineum

1. P<sub>11</sub>A<sub>0</sub>

**Data Subjektif**

- a. Ibu mengatakan ini anak yang kedua
- b. Ibu tidak pernah keguguran

**Data Objektif**

- a. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar, TFU 1 jari dibawah pusat.

**Analisa dan Interpretasi data:**

Involusi uterus adalah proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil, penurunan TFU setiap 1 cm setiap harinya, sehingga pada hari ke 7 TFU berkisar 5 cm dan pada hari ke 10 TFU tidak teraba di simpisis pubis (Tihardimanto,2012).

2. Post partum hari pertama

**Data subjektif:**

Ibu melahirkan secara normal (pervaginam) tanggal 07 Agustus 2022 jam 19.05 WITA.

**Data objektif:**

- a. Tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat
- b. Tampak pengeluaran lochea rubra
- c. Kontraksi uterus baik, teraba keras dan bundar

**Analisa dan interpretasi data:**

Involusi uterus adalah proses kembalinya uterus ke keadaan sebelum hamil, penurunan TFU setiap 1 cm setiap harinya, sehingga pada hari ke 7 TFU berkisar 5 cm dan pada hari ke 10 TFU tidak teraba di simpisis pubis (Tihardimanto, 2012).

Lochea adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas, yang mengandung darah dan sisa jaringan desidua dari dalam uterus (Saleha, 2013).

## 3. Nyeri perineum

**Data subjektif**

Ibu merasa nyeri pada daerah perineum bila bergerak.

**Data objektif**

- a) Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak
- b) Nyeri tekan pada perineum
- c) Tampak pengeluaran lochea rubra
- d) Tampak jahitan pada perineum ruptur II ( jumlah jahitan 6) dan masih basah

**Analisa dan Interpretasi data:**

Nyeri perineum adalah nyeri yang diakibatkan oleh robekan yang terjadi pada perineum, vagina dan serviks, atau uterus dapat terjadi secara spontan maupun tindakan manipulatif pada pertolongan persalinan, robekan perineum ada yang memerlukan tindakan penjahitan ada yang tidak perlu, dari jahitan perineum yang menimbulkan rasa nyeri (Prawirohadjo, 2018).

Lochea adalah eksresi cairan rahim selama masa nifas, yang mengandung darah dan sisa jaringan desidua dari dalam uterus (Saleha, 2013).

**C. LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA DAN MASALAH POTENSIAL**

Potensial terjadi infeksi luka jahitan perineum

**Data subjektif**

Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan perieumnya

**Data objektif**

1. Jahitan perineum tampak basah
2. Pengelaran lochea warna merah (rubra)

### **Analisa dan interpretasi data**

Komplikasi pada luka perineum dapat menimbulkan nyeri pada ibu ketika masa nifas sehingga hal tersebut tentunya menimbulkan ketidaknyamanan yaitu terjadinya pendarahan pada luka robekan jalan lahir dan infeksi pada luka (Saleha, 2013).

Infeksi nifas adalah bakteri pada traktus genitalia, terjadi sesudah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu  $38^{\circ}\text{C}$  atau selama 2 hari dalam 10 hari pertama pasca persalinan dengan mengesualikan 24 jam pertama yang disebabkan oleh organisme yang menyerang bekas implantasi plasenta atau laserasi akibat persalinan adalah penghuni normal serviks dan jalan lahir mungkin juga dari luar (Tulas, dkk, 2017:2).

### **D. LANGKAH IV: TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI**

Tidak ada data yang menunjang untuk dilakukan tindakan segera/kolaborasi

### **E. LANGKAH IV: RENCANA/INTERVENSI**

#### **Tujuan**

1. Masa nifas hari pertama berlangsung normal
2. Mengatasi nyeri yang dirasakan ibu
3. Tidak terjadi infeksi pada luka jahitan perineum

#### **Rencana Asuhan**

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Rasional: Hal ini dapat mencegah terjadinya infeksi silang

2. Observasi tanda-tanda vital ibu

Rasional: Tanda-tanda vital merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan ibu

3. Kaji tingkatan nyeri pada ibu

Rasional: untuk mengetahui tingkatan nyeri yang dirasakan ibu dengan menggunakan *visual analog scale*. Nyeri ringan adalah nyeri hilang timbul, terutama saat beraktivitas sehari-hari, nyeri sedang adalah nyeri terus menerus, aktivitas terganggu yang hanya hilang bila penderita tidur, nyeri berat adalah nyeri terus menerus sepanjang hari, penderita tidak dapat tidur dan sering terjaga akibat nyeri (Budi,2020).

4. Menjelaskan pada ibu tentang penyebab nyeri luka perineum

Rasional : Adanya robekan pada saat proses persalinan yang telah dijahit

5. Beritahu kepada ibu cara mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi nafas dalam

Rasional : Relaksasi merupakan metode non farmakologis yang efektif untuk mengurangi rasa nyeri.

6. Anjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini secara bertahap

Rasional : mobilisasi dini dapat memulihkan kondisi tubuh dengan cepat, sistem sirkulasi didalam tubuh pun bisa berfungsi normal kembali. Bahkan dapat mencegah aliran darah terhambat. Hambatan darah dapat menyebabkan terjadinya trombosis vena dalam dan dapat menyebabkan infeksi.

7. Melakukan perawatan luka perineum

Rasional : Melakukan perawatan luka perineum dapat mencegah terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan.

8. Ajarkan pada ibu perawatan luka perineum dengan senantiasa menjaga kebersihan vulva dan perineum secara teratur, yaitu membasuh dari arah depan kebelakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vulva dan perineum, serta kenakan pembalut baru setiap sehabis BAB dan BAK atau setiap kali lembab dan tidak menggunakan obat-obatan tradisional karena dapat menyebabkan risiko infeksi.

Rasional: dengan menjaga kebersihan vulva dengan teratur dapat mencegah terjadinya infeksi yang disebabkan oleh kuman-kuman patogen.

9. Observasi TFU, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochia setiap hari.

Rasional:

- a. TFU merupakan salah satu indikator untuk mengetahui bahwa proses involusio berlangsung normal, normalnya TFU mengalami penurunan 1 cm/hari yang teraba keras dan bundar
  - b. Dengan mengobservasi kontraksi uterus baik atau tidak, karena apabila uterus berkontraksi dengan baik atau tidak, karena apabila uterus kurang berkontraksi akan menyebabkan pendarahan dan memperlambat proses involusio.
  - c. Perubahan warna, bau banyaknya dan perpanjangan lochea merupakan infeksi yang di sebabkan oleh involusio yang kurang baik.
10. Anjurkan ibu untuk menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu: mandi 2 kali seminggu menggunakan shampoo, dan menyikat gigi 3 kali sehari dengan memakai pasta gigi.

Rasional: Dengan menjaga kebersihan diri ibu merasa nyaman, dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi pada luka yang terdapat pada diri ibu.

11. Berikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup

Rasional: memulihkan kembali tenaga ibu yang terkuras selama proses persalinan.

12. Anjurkan ibu untuk menyusui bayinya tanpa dijadwalkan (*on demand*) secara bergantian pada payudara kiri dan kanan

Rasional: dengan sesering mungkin menyusui akan memacu hormon prolaktin yang akan memperlancar produksi ASI

13. Anjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan antibiotik yang diberikan

Rasional: Obat analgetik dapat mengurangi rasa nyeri yang dialami ibu dan obat antibiotik dapat menghambat mikroba atau jenis lain penyebab infeksi.

14. Berikan informasi kepada ibu tentang kapan ibu dapat mulai melakukan hubungan seksual, yaitu apabila sudah tidak ada lagi darah yang keluar dan jika dimasukkan jari atau lebih ibu tidak merasakan sakit

Rasional: agar ibu mengerti dan menghindari hubungan seksual sebelum selesai masa nifas

15. Menganjurkan suami dan keluarga untuk memberikan support kepada ibu agar tidak cemas, dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan dan membantu ibu merawat bayinya.

Rasional: Agar ibu tidak merasa sendiri dalam merawat bayinya.



16. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti mendengarkan llantunan ayat suci dan berdo'a Rasional: dengan mendekatkan diri, ibu akan merasa lebih tenang sehingga dapat menerima kondisinya bahwa semuanya adalah berkah yang diberikan Allah swt.

17. Buat jadwal kunjungan masa nifas hingga minggu keenam

Rasional: untuk memantau perkembangan ibu dan membantu jika terdapat keluhan

#### **F. LANGKAH VI: IMPLEMENTASI**

Tanggal 07 Agustus 2022                      Jam 21.35 wita

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan

Hasil: Tangan telah dicuci dan tangan telah kering dan bersih.

2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu 2 jam Postpartum

Hasil : Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal

Tekanan Darah    : 110/80 mmHg

Nadi                    : 80 kali/menit

Suhu                    : 36,7°C

Pernafasan            : 24 kali/menit

3. Mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan ibu, ekspresi wajah tampak meringis

Hasil : diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 3 (nyeri sedang)

4. Memberitahu ibu untuk mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi nafas yaitu dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung kemudian hembuskan perlahan-lahan melalui mulut

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti miring kiri atau kanan

Hasil : Ibu miring kiri dan kanan di atas tempat tidurnya

6. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil : tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, pengeluaran lochea rubra.

7. Melakukan perawatan luka perineum

- a) Mencuci tangan
- b) Menganjurkan ibu berbaring
- c) Membuka pakaian bawah ibu
- d) Menggunakan handscoon
- e) Melihat keadaan luka
- f) Membersihkan dengan betadine dan cairan antiseptik
- g) Mengompres bekas luka jahitan dengan kasa yang sudah dibasahi dengan betadine
- h) Memasang pembalut, celana dalam, dan pakaian bawah ibu
- i) Membereskan alat
- j) Mencuci tangan

Hasil : perawatan luka perineum telah dilakukan

8. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik yang telah diberikan

a. Paracetamol : 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai obat analgetik dan anti nyeri

b. Amoxicillin : 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai antibiotik, efek melawan bakteri gram negatif dan gram positif

Hasil : ibu bersedia

9. Menganjurkan suami dan keluarga untuk memberikan support kepada ibu agar dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan ibu dan membantu ibu merawat bayinya.

Hasil : Suami dan keluarga bersedia membantu ibu dalam merawat bayinya.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti mendengarkan lantunan ayat suci dan berdo'a.

Hasil : ibu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran

#### **G. LANGKAH VII: EVALUASI**

Tanggal 07 Agustus 2022 jam 21 .35 WITA

1. Masa nifas hari pertama normal, ditandai dengan:
  - a. Keadaan umum ibu baik
  - b. Kontraksi uterus baik, (teraba keras dan bundar)
  - c. TFU 1 jari dibawah pusat
  - d. Lochea rubra tidak berbau busuk

e. Tanda-tanda vital:

- 1) Tekanan Darah : 110/80 mmHg
- 2) Nadi : 80 kali/menit
- 3) Suhu : 36,7°C
- 4) Pernapsan : 24 kali/menit

2. Nyeri perineum

Nyeri belum teratasi: tingkat nyeri yang dirasakan ibu diukur menggunakan visual analogue berada pada tingkat 3 (nyeri sedang)

3. Tidak ada tanda-tanda infeksi yang ditemukan: suhu tubuh normal, luka jahitan tidak merah dan pengeluaran lochea tidak berbau.

**PENDOKUMENTASI ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY “J” DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DERAJAT II  
DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU  
TANGGAL 07 AGUSTUS 2022**

No Register :46xxx

Tanggal Partus : 07 Agustus 2022 Jam : 19.05 wita

Tanggal Masuk Ruang Nifas : 07 Agustus 2022 Jam : 21.35 wita

Tanggal Pengkajian : 07 Agustus 2022 Jam : 21.35 wita

Pengkaji : Nurdianti

**Identitas istri/suami**

Nama : Ny “J” / Tn “M”

Umur : 26 tahun / 35 tahun

Nikah/lamanya : 1 kali / 4 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Ujung Pandang Baru

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu melahirkan anak kedua pada tanggal 07 Agustus 2022 jam 19.05 WITA
2. Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitannya
3. Ibu mengatakan mendapatkan beberapa jahitan

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Ekspresi wajah tampak meringis
3. TFI 1 jari dibawah pusat, kontaksi uterus baik teraba keras dan bundar
4. Luka perineum masih basah
5. Pengeluaran lochea rubra

**Assesment (A)**

PII A0, post partum hari pertama, dengan nyeri luka perineum

**PLANNING (P)**

Tanggal 07 Agustus 2022                      Jam: 21.35 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan  
Hasil: Tangan telah dicuci dan tangan telah kering dan bersih.
2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu 2 jam Postpartum  
Hasil : Tanda-tanda vital ibu dalam batas normal Tekanan Darah 110/80 mmHg,  
Nadi 80 kali/menit, Suhu 36,7°C, Pernapasan 24 kali/menit
3. Mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan ibu, ekspresi wajah tampak meringis

Hasil : diukur menggunakan visual analogue, nyeri berada pada tingkat 3 (nyeri sedang)

4. Memberitahu ibu untuk mengurangi nyeri dengan teknik relaksasi nafas yaitu dengan cara menarik nafas dalam melalui hidung kemudian hembuskan perlahan-lahan melalui mulut

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini seperti miring kiri atau kanan

Hasil : Ibu miring kiri dan kanan di atas tempat tidurnya

6. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea

Hasil : tinggi fundus uteri 1 jari dibawah pusat, kontraksi uterus teraba keras dan bundar, pengeluaran lochea rubra.

7. Melakukan perawatan luka perineum

- a. Mencuci tangan
- b. Menganjurkan ibu berbaring
- c. Membuka pakaian bawah ibu
- d. Menggunakan handscoon
- e. Melihat keadaan luka
- f. Membersihkan dengan betadine dan cairan antiseptik
- g. Mengompres bekas luka jahitan dengan kasa yang sudah dibasahi dengan betadine
- h. Memasang pembalut, celana dalam, dan pakaian bawah ibu
- i. Membereskan alat

j. Mencuci tangan

Hasil : perawatan luka perineum telah dilakukan

8. Menganjurkan ibu untuk meminum hingga habis obat analgetik dan antibiotik yang telah diberikan

c. Paracetamol : 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai obat analgetik dan anti nyeri

d. Amoxicillin : 500 mg dosis 3 kali sehari

Sebagai antibiotik, efek melawan bakteri gram negatif dan gram positif

Hasil : ibu bersedia

9. Menganjurkan suami dan keluarga untuk memberikan support kepada ibu agar dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan ibu dan membantu ibu merawat bayinya.

Hasil : Suami dan keluarga bersedia membantu ibu dalam merawat bayinya.


10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt. Perbanyak amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah yang dapat dilakukan pada saat nifas seperti mendengarkan lantunan ayat suci dan berdo'a.

Hasil : ibu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran

11. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah untuk memantau perkembangan kesehatan ibu pada tanggal 08 Agustus 2022 (2 hari setelah persalinan)

Hasil: Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah dan ibu menjelaskan alamat rumahnya.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY "J" HARI KEDUA DENGAN NYERI LUKA PERINEUM  
DERAJAT II PADA KUNJUNGAN RUMAH**

Hari/Tanggal : Senin 08 Agustus 2022

Tempat : Rumah Ny "J" Jam : 16.10 wita

Pengkaji : Nurdiati

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka jahitan perineum
2. Ibu mengatakan belum dapat beraktivitas seperti biasanya
3. Ibu mengatakan telah mengganti pembalutnya dengan rutin yaitu setiap kali ibu merasa pembalutnya terasa penuh
4. Ibu mengatakan sudah BAK dan belum BAB
5. Ibu mengatakan ASInya belum banyak

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. Terdapat pengeluaran Lochea Rubra
4. TFU 2 jari dibawah pusat
5. Luka jahitan tampak masih basah

### Assesment (A)

PIIA0, Postpartum hari kedua dengan nyeri luka perineum

### Panning (P)

Tanggal 08 Agustus 2022

Jam: 16.15 WITA

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan  
Hasil: Tangan dalam keadaan bersih dan kering
2. Mengobservasi tanda-tanda vital ibu  
Hasil : tanda-tanda vital ibu dalam batas normal yaitu Tekanan darah 110/70 mmHg, Nadi 80 kali/menit, Suhu 36,8°C, Pernapasan 20 kali/menit
3. Mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan ibu  
Hasil : diukur menggunakan visual Analogue, nyeri berada pada tingkat 2 (nyeri ringan)
4. Memberitahu ibu cara mengurangi nyeri ringan dengan teknik relaksasi nafas  
Hasil : ibu berusaha menarik nafas melalui hidung kemudian di hembuskan perlahan-lahan melalui mulut
5. Menganjurkan ibu untuk melakukan mobilisasi dini, karena dengan mobilisasi dini dapat membantu proses penyembuhan luka serta menegah infeksi  
Hasil : Selain miring kiri dan kanan, ibu mulai duduk perlahan
6. Mengobservasi tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, dan pengeluaran lochea  
Hasil : TFU 2 jari dibawah pusat, kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar
7. Menjelaskan kepada ibu cara meningkatkan frekuensi ASI yaitu dengan cara meningkatkan frekuensi menyusui dengan prinsip based on demand (menyusui

sesering mungkin sesuai dengan keinginan bayi tanpa dijadwal) ibu harus dalam keadaan rileks.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dan akan menyusui bayinya sesering mungkin.

8. Memberikan dukungan kepada ibu untuk semangat menyusui. Menjelaskan bahwa hari pertama sampai hari ketiga biasanya ASI memang masih kurang. Kebutuhan makanan bayi juga belum terlalu banyak, sehingga tidak perlu memberikan susu formula. Bayi menangis tidak selalu menandakan bahwa ia lapar, tetapi itu adalah bahasa tubuhnya karena mulai beradaptasi dengan dunia di luar rahim.

Hasil: ibu mengerti

9. Mengajarkan ibu saat membersihkan genetalia dengan membasuh dari arah depan ke belakang hingga tidak ada sisa-sisa kotoran yang menempel di sekitar vagina dan perineum setiap selesai BAK dan BAB serta cukup dengan menggunakan air bersih

Hasil : Ibu melakukan anjuran yang diberikan

10. Memberikan pendidikan kesehatan tentang istirahat yang cukup  $\pm$  6-8 jam di malam hari dan  $\pm$  2 jam di siang hari, karena faktor istirahat dapat mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI, apabila ibu kurang istirahat maka produksi ASI juga akan berkurang

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

11. Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang yang mengandung karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, kacang-

kacangan, daging, ikan, dan telur), vitamin (buah dan sayuran hijau seperti bayam, kelor, katuk, labu kuning), pemenuhan nutrisi yang mampu menambah tenaga ibu untuk produksi ASI serta makanan yang berserat agar BAB ibu lancar serta memperbanyak minum air putih.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia mengkonsumsinya

12. Menganjurkan suami dan keluarga untuk memberikan support kepada ibu agar dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan ibu dan membantu ibu merawat bayinya.

Hasil : Suami dan keluarga bersedia membantu ibu dalam merawat bayinya.

13. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt.

Dan mendoakan anaknya dengan do'a nabi Ibrahim a.s.

Hasil : Ibu mengerti, dan ingin mendoakan anaknya

14. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 09 Agustus 2022

Hasil: Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY “J” HARI KETIGA DENGAN NYERI LUKA PERINEUM  
DERAJAT II PADA KUNJUNGAN RUMAH**

Hari/Tanggal : Selasa 09 Agustus 2022

Tempat : Rumah Ny ”J” Jam : 15.50 wita

Pengkaji : Nurdiati

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan nyeri yang dirasakan sudah sangat berkurang sesekali timbul jika melakukan banyak aktivitas
2. Ibu mengatakan ASI sudah mulai banyak
3. Ibu mengatakan kondisinya sudah mulai fit
4. Ibu mengatakan telah mengganti pembalutnya dengan rutin yaitu setiap kali ibu merasa pembalutnya terasa penuh

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran composmentis
3. TFU 3 jari di bawah pusat
4. Terdapat pengeluaran Lochea Rubra
5. Luka jahitan tampak masih lembab

**Assesment (A)**

PIIA0, Postpartum hari ketiga dengan nyeri luka perineum

**Panning (P)**

Tanggal 09 Agustus 2022

Jam : 15. 55 wita

1. Mengobservasi keadaan umum ibu, dan tanda-tanda vital ibu

Hasil : kedaan umum baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah 110/80 mmHg, Nadi 80x/menit, suhu 36,6 °C, pernafasan 22x/menit.

2. Mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan ibu

Hasil : diukur menggunakan visual Analogue, nyeri berada pada tingkat 1 (tidak nyei)

3. Mengobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan normal

Hasil : TFU 3 jari dibawah pusat, involusio uterus berjalan normal

4. Menganjurkan ibu untuk tetap melakukan aktivitas secara bertahap dan menghindari pekerjaan yang terlalu berat, karena dengan mobilisasi dini dapat membantu proses penyembuhan luka serta mencegah infeksi

Hasil : ibu mengerti dan bersedia melakukannya

5. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan menjelaskan kepada ibu akibat kurang istirahat dapat mengakibatkan kurangnya produksi ASI dan memperbanyak pendarahan yang dapat menyebabkan depresi dan ketidakmampuan untuk merawat diri dan bayinya

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan

6. Mengajukan ibu untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya yaitu selama 6 bulan

Hasil : Ibu bersedia melakukannya

7. Mengajukan kepada ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayi dengan cara di bedong kemudian cara merawat tali pusat yaitu tali pusat dibiarkan terbuka tidak dibungkus serta menjaga tali pusat agar tetap bersih dan kering untuk mencegah terjadinya infeksi

Hasil : Tidak ada tanda infeksi pada tali pusat, dan bayi telah dibedong menggunakan sarung.

8. Mengajukan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang yang mengandung karbohidrat (nasi, kentang roti), protein (tahu, tempe, kacang-kacangan, daging, ikan, dan telur), vitamin ( buah dan sayuran hijau) serta memperbanyak minum air putih.

Hasil : Ibu mengonsumsi salah satu makanan yang telah dianjurkan

9. Mengajukan suami dan keluarga untuk memberikan support kepada ibu agar dapat beradaptasi terhadap nyeri yang dirasakan ibu dan membantu ibu merawat bayinya.

Hasil : Suami dan keluarga bersedia membantu ibu dalam merawat bayinya.


10. Mengajukan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt.

Hasil : Ibu mengerti, dan senantiasa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an



11. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 15 Agustus 2022

Hasil: Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY "J" HARI KEENAM DENGAN NYERI LUKA PERINEUM  
DERAJAT II PADA KUNJUNGAN RUMAH**

Hari/Tanggal : Senin 15 Agustus 2022 Jam : 14.15 wita

Tempat : Rumah Ny "J"

Pengkaji : Nurdiati

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri pada jalan lahir
2. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna merah kekuningan
3. Ibu mengatakan bayinya tidur dengan nyenyak dan aktif menyusui
4. Ibu mengatakan ASInya sudah lancar
6. Ibu mengatakan kondisinya sudah fit

**Data Objektif (O)**

1. Ekspresi wajah ibu tampak senang
2. Keadaan umum ibu baik
3. Keluar ASI saat puting susu dipencet
4. TFU Pertengahan simpisis pusat
5. Pengeluaran lochea sanguilenta
6. Luka perineum tampak sudah menyatu

## 7. Tanda-tanda vital

- a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg
- b. Nadi : 82x/i
- c. Suhu : 36,5°C
- d. Pernapasan : 22x/i

**ASSESSMENT (A)**

PIIA0, post partum hari keenam

**PLANNING (P)**

Tanggal 15 Agustus 2022 pukul 14.20 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa ibu dan bayinya dalam keadaan sehat  
 Hasil :Ibu mengerti dan merasa senang.
2. Mengkaji tingkat nyeri yang dirasakan ibu  
 Hasil : ibu sudah tidak merasakan nyeri
3. Mengobservasi TFU untuk memastikan involusio uterus berjalan normal  
 Hasil :TFU pertengahan pusat-simpisis, involusio berjalan normal.
4. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi. Lochea yang keluar pada hari keenam akan berwarna kekuningan yang merupakan cairan berupa darah bercampur lendir disebut dengan lochea sanguilenta seperti yang terjadi pada ibu.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

5. Menganjurkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu : mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu dan menyikat gigi minimal 2 kali sehari.

Hasil : Ibu melaksanakan anjuran yang diberikan

6. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayinya dengan cara di bedong.

Hasil : Bayi dalam keadaan di bedong

7. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang yaitu karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, kacang-kacangan, daging, ikan dan telur), Vitamin( Buah seperti jeruk, apel, mangga, dan sayuran hijau seperti bayam). Dan rutin meminum air putih

Hasil : Ibu mengonsumsi makanan yang telah di anjurkan

8. Menjelaskan dan menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka makan akan beresiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa masuk ke dalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

12. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka yakni nyeri dan terdapat warna kemerahan di sekitar daerah luka, adanya pengeluaran darah yang banyak padahal sebelumnya sudah tidak, terasa panas di sekitar genetalia, bahkan

mengeluarkan nanah dan mengeluarkan bau yang menyengat dari luka bahkan suhu tubuh melebihi 37,5°C.

Hasil : Ibu mengetahui tanda-tanda infeksi dan ibu akan menjaga kebersihan dirinya terutama pada daerah luka.

9. Memberi konseling tentang KB yang tidak mengganggu produksi ASI
  - a. Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian ASI. MAL merupakan kontrasepsi yang menyusui secara penuh, belum haid setelah melahirkan dan umur bayi kurang dari 6 bulan. Keuntungannya efektivitas tinggi, sangat efektif, tidak mengganggu hubungan senggama, tidak perlu pengawasan medis dan tidak perlu biaya.
  - b. Pil Progestin (Mini Pil) bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat penetrasi sperma, mengganggu motilitas tuba sehingga transportasi sperma terganggu. Keuntungannya yaitu tidak mengganggu senggama, efektif bila digunakan dengan benar, kesuburan cepat kembali, dapat dihentikan setiap saat, tidak mempengaruhi ASI. Kerugiannya yaitu harus di gunakan setiap hari diwaktu yang sama bila lupa 1 maka kegagalan menjadi lebih besar, mual, pusing dan timbul jerawat.
  - c. Suntik 3 bulan, bekerja dengan cara mencegah terjadinya ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menghambat transportasi gamet oleh tuba, membuat selput lendir tipis. Keuntungannya yaitu mencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, tidak berpengaruh

terhadap hubungan senggama. Kerugiannya yaitu pasien sangat bergantung pada pelayanan kesehatan, kesuburan lambat kembali, kering pada vagina, libido menurun, sakit kepala dan timbul jerawat.

- d. Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK), bekerja dengan cara mengurangi transportasi sperma, menekan ovulasi, lendir serviks menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi. Keuntungannya yaitu daya aguna tinggi, perlindungan jangka panjang, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak mengganggu senggama, tidak mempengaruhi produksi ASI, dan dapat dicabut sesuai keinginan. Kerugiannya yaitu nyeri kepala, perasaan mual, kepala pusing, membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk laserasi pencabuta, dan perubahan pola haid.
- e. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), bekerjadengan cara menghambat kemampuan sperma masuk ke tuba fallopi, mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai cavum uteri, mencegah sperma dan ovum bertemu. Keuntungannya yaitu efektifitas tinggi, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI, tidak ada efek samping hormonal. Kerugiannya yaitu perubahan siklus haid, saat haid terasa nyeri, akseptor harus tetap memeriksa posisi benang AKDR.


Hasil : Ibu mengerti dan akan mendiskusikannya dengan suaminya.

10. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt.

Hasil : Ibu senantiasa mendengarkan rekaman lantunan ayat suci dan berdoa.

11. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kembali kunjungan rumah untuk memantau kesehatan ibu dan bayinya yaitu tanggal 28 Agustus 2022

Hasil: Ibu bersedia dilakukan kunjungan rumah.



**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY "J" HARI KEEMPAT BELAS DENGAN NYERI LUKA  
PERINEUM DERAJAT II PADA KUNJUNGAN RUMAH**

Hari/tanggal : Ahad, 28 Agustus 2022      Jam: 15.00 wita

Tempat : Rumah Ny "J"

Pengkaji : Nurdianti

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan ASInya banyak dan lancar
2. Ibu mengatakan bayinya sering menetek
3. Ibu mengatakan bayinya tidak rewel dan tidur nyenyak
4. Ibu mengatakan masih ada cairan yang keluar dari vagina berwarna kuning kecoklatan

**Data Objektif (O)**

1. Ekspresi ibu tampak ceria
2. Payudara banyak mengeluarkan ASI
3. TFU tidak teraba
4. Pengeluaran lochea serosa
5. Mengukur tanda-tanda vital
  - a. Tekanan Darah : 110/70 mmHg
  - b. Nadi : 80x/i
  - c. Suhu : 36,7°C



d. Pernapasan : 20x/i

6. Bayi kuat menetek, reflex menghisap dan menelan pada bayi baik.

7. Luka perineum sudah kering

### **Assesmenst (A)**

PIIA0, post partum hari keempat belas

### **Planning (P)**

Tanggal 28 Agustus 2022

Jam: 15.05 wita

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dalam keadaan sehat

Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang

2. Mengobservasi uterus untuk memastikan involusio uterus berjalan normal

Hasil : TFU tidak teraba, Involutio berjalan normal

3. Menjelaskan kepada ibu penyebab keluarnya cairan dari jalan lahir adalah lochea yang merupakan cairan rahim selama masa nifas dan mengalami perubahan warna pada waktu-waktu tertentu karena adanya proses involusi.

Lochea yang keluar pada hari keempat belas akan berwarna kecoklatan yang merupakan cairan berupa sedikit darah dan banyak serumen disebut dengan lochea serosa seperti yang terjadi pada ibu.

Hasil : Ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan.

4. Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut, membersihkan daerah genetaliaanya dengan membasuh dari arah depan ke belakang setiap selesai BAK dan BAB untuk mencegah terjadinya infeksi

Hasil : Ibu mengganti pembalut setiap lembab atau penuh serta tidak ada tanda-tanda infeksi.

5. Mengajarkan ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya (personal hygiene) yaitu mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu dan menyikat gigi 2 kali sehari.

Hasil : Ibu melakukan anjuran yang diberikan

6. Mengajarkan kepada ibu untuk selalu menjaga kehangatan bayi dengan cara dibedong

Hasil : bayi dalam keadaan dibedong

7. Mengajarkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang yang mengandung karbohidrat (nasi, kentang roti), protein (tahu, tempe, kacang-kacangan, daging, ikan, dan telur), vitamin (buah dan sayuran hijau), untuk membantu mempercepat penyembuhan luka serta pemenuhan nutrisi yang mampu menambah tenaga ibu untuk produksi ASI.

Hasil : Ibu bersedia mengonsumsi makanan yang dianjurkan.

8. Memotivasi ibu agar selalu memberikan ASI pada bayinya tanpa diselingi susu formula atau makanan tambahan lainnya

Hasil: Ibu mengerti dan mau melakukannya

9. Mengajarkan ibu untuk membawa anaknya imunisasi jika bayi berusia 1 bulan untuk mendapatkan imunisasi BCG

Hasil: Ibu bersedia membawa anaknya ke puskesmas untuk imunisasi BCG.

10. Memberitahu ibu untuk tidak melakukan hubungan suami istri sebelum masa nifas selesai

Hasil :Ibu bersedia melakukan apa yang telah dianjurkan

11. Menanyakan kepada ibu apakah sudah memilih alat kontrasepsi yang ingin digunakan

Hasil : Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi AKBK

12. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt.

Hasil : Ibu senantiasa berdoa dan mendengarkan lantunan ayat suci

13. Menyampaikan kepada ibu bahwa akan dilakukan kunjungan rumah yang terakhir untuk mengetahui dan memantau kesehatan ibu pada tanggal 18 September 2022

Hasil :Ibu bersedia untuk dilakukan kunjungan rumah.

**PENDOKUMENTASIAN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE  
PADA NY "J" HARI KEEMPAT PULUH DUA DENGAN NYERI  
LUKA PERINEUM DERAJAT II PADA KUNJUNGAN RUMAH**

Hari/tanggal : Ahad, 18 September 2022 Jam: 14.30 WITA

Tempat : Rumah Ny "J"

Pengkaji : Nurdianti

**Data Subjektif (S)**

1. Ibu mengatakan tidak ada keluhan yang dialami sekarang
2. Ibu sudah membawa bayinya imunisasi pada tanggal 05 September 2022 di puskesmas
3. Ibu mengatakan sudah tidak ada pengeluaran darah dari jalan lahir
4. Ibu mengatakan bayinya aktif menyusu
5. Ibu mengatakan sudah menggunakan Kb Implan
6. Ibu mengatakan sudah aktif melakukan pekerjaan rumah

**Data Objektif (O)**

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran Composmentis
3. Ekpresi ibu tampak ceria
4. Tanda-tanda Vital
  - a. Tekanan Darah : 100/70 mmHg
  - b. Nadi : 82x/i

- c. Suhu : 36,6°C
  - d. Pernapasan : 20x/i
5. TFU tidak teraba
  6. Luka perineum kering

### Assesmenst (A)

PIIA0, post partum hari keempat puluh dua

### Planning (p)

Tanggal 18 September 2022

Jam: 14.30 WITA

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ibu dalam keadaan baik  
 Hasil : Ibu mengerti dan merasa senang
2. Menganjurkan kepada ibu untuk selalu menjaga kebersihan dirinya dan bayinya  
 Hasil : Ibu bersedia melakukannya
3. Menganjurkan kepada ibu untuk tetap menjaga pola nutrisi dan istirahat  
 Hasil : Ibu tetap menjaga pola nutrisi dan beristirahat
4. Menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun, dan setelah bayi berusia 6 bulan menganjurkan ibu untuk memberikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun  
 Hasil : Ibu bersedia melakukan anjuran yang diberikan
5. Menganjurkan ibu untuk memperhatikan imunisasi lengkap bayinya sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat


Hasil : Ibu bersedia membawa bayinya untuk imunisasi sesuai jadwal.

6. Menganjurkan ibu untuk tetap mengingat dan berserah diri kepada Allah swt.

Hasil : Ibu senantiasa berdoa dan mendengarkan lantunan ayat suci

7. Menganjurkan kepada ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan apabila sudah waktunya mengganti Kb implant yang digunakan, atau apabila ibu mengalami keluhan terhadap Kb yang digunakan

Hasil : Ibu bersedia melakukannya



**Tabel 3.3**  
**Matriks Kunjungan**

Kunjungan	Waktu	Hasil Pemeriksaan	Asuhan	Evaluasi
I	07 Agustus 2022 Pukul 21.35 Wita  Postpartum hari pertama di ruang nifas	DS: Ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan perineumnya DO: a. Keadaan umu ibu baik b. Ekspresi ibu tampak meringis saat bergerak c. Diukur Menggunakan <i>Visual Analogue Scale</i> Tingkat nyeri yang dirasakan ibu kategori 3 (nyeri sedang) d. Tampak luka perineum masih basah e. Pengeluaran <i>lochea</i> rubra dan tidak berbau f. TFU I Jari dibawah pusat kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar	1. Mengobservasi keadaan umum dan tanda-tanda vital 2. Mengkaji tingkatan nyeri pada ibu 3. Memberitahu cara mengurangi nyeri 4. Menganjurkan untuk melakukan relaksasi pernapasan dan mobilisasi dini dengan miring kiri atau kanan 5. Menganjurkan ibu untuk meminum obat analgetik dan antibiotik yang diberikan e. Paracetamol: 500 mg dosis 3 kali sehari Sebagai obat analgetik dan anti nyeri f. Amoxicillin: 500 mg dosis 3 kali sehari	1. Keadaan umum ibu cukup, tanda-tanda vital dalam batas normal yaitu, TD:100/80 mmHg, N:84x/i, S:36,5°C, dan P:24x/i 2. Nyeri berada pada kategori 3 (nyeri sedang) 3. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan 4. Ibu telah meminum obat 5. Telah dilakukan perawatan perineum

			Sebagai antibiotik, efek melawan bakteri gram negatif dan gram positif	
			6. Melakukan perawatan perineum	
II	08 Agustus 2022 Pukul 16.10 wita  2 hari postpartum di rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengatakan masih merasakan nyeri pada luka jahitan perineum</li> <li>Ibu mengatakan belum dapat beraktivitas seperti biasanya</li> <li>Ibu mengatakan ASI nya</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadaan umum ibu baik</li> <li>Eksresi ibu tersenyum tetapi terlihat masih menahan nyeri</li> <li>Diukur Menggunakan <i>Visual Analogue Scale</i> Tingkat nyeri yang dirasakan ibu kategori 2 (nyeri ringan)</li> <li>Tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, N: 80x/I, S: 36,8°C, P; 20x/i.</li> <li>Tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar</li> <li>Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil pemeriksaan</li> <li>Mengkaji tingkat nyeri ibu</li> <li>Memberitahi ibu penyebab nyeri yang dirasakan</li> <li>Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene, istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas yang berat</li> <li>Menganjurkan untuk menyusui bayinya secara on demand</li> <li>Menganjurkan ibu untuk mengonsumsi makanan bergizi dan seimbang yang mengandung karbohidrat (nasi, kentang, roti), protein (tahu, tempe, kacang-kacangan, daging, ikan, dan telur), vitamin (buah dan sayuran hijau seperti bayam, kelor, katuk, labu kuning), pemenuhan nutrisi yang mampu menambah tenaga ibu untuk produksi ASI serta makanan yang berserat agar BAB ibu lancar serta memperbanyak minum air putih.</li> <li>Menganjurkan suami dan keluarga untuk terlibat dalam merawat bayi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan</li> <li>Nyeri ibu termasuk kategori 2 (nyeri ringan)</li> <li>Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan</li> <li>Ibu istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktivitas yang berat</li> <li>suami bersedia terlibat dalam merawat bayi</li> <li>Ibu senang membacakan anaknya doa dan mendengarkan lantunan murottal</li> </ol>



		j. Luka perineum tampak masih basah	8. Menganjurkan ibu senantiasa mengingat Allah swt dan mendoakan anaknya dengan do'a nabi Ibrahim a.s.	
III	09 Agustus 2022 Pukul 15.50 wita  3 hari postpartum Di rumah pasien	<p>DS:</p> <p>a. Ibu mengatakan nyerinya sudah sangat berkurang</p> <p>b. Ibu mengatakan ASInya sudah mulai lancar</p> <p>c. Ibu mengatakan kondisinya sudah mulai fit</p> <p>DO:</p> <p>d. Keadaan umum ibu baik</p> <p>e. Ekspresi ibu senang</p> <p>f. Diukur Menggunakan <i>Visual Analogue Scale</i> Tingkat nyeri yang dirasakan ibu kategori 1 (tidak nyeri)</p> <p>g. Tanda-tanda vital TD: 110/80 mmHg, N: 80x/I, S: 36,6°C, P; 22x/i.</p> <p>h. Tinggi fundus uteri 3 jari dibawah pusat kontraksi uterus baik teraba keras dan bundar</p> <p>i. Pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau</p> <p>j. Luka jahitan masih lembab</p>	<p>1. Menyampaikan hasil pemeriksaan</p> <p>2. Mengkaji tingkat nyeri ibu</p> <p>3. Mengingatkan ibu untuk menyusui bayinya secara on demand dan mengkonsumsi makanan yang bias menambah prduksi ASI, serta tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan lain</p> <p>4. Mengingatkan ibu untuk menjaga personal hygiene, istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas yang berat</p> <p>5. Menganjurkan ibu untuk mendengarkan murottal</p>	<p>1. Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan</p> <p>2. Nyeri ibu termasuk kategori 1 (tidak nyeri)</p> <p>3. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan</p> <p>4. Ibu istirahat yang cukup daan tidak melakukan aktivitas yang berat</p>

IV	<p>15 Agustus 2022 pukul 14.5 wita</p> <p>1 minggu postpartum di rumah pasien</p>	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengatakan sudah tidak merasakan nyeri</li> <li>Ibu mengatakan ASInya sudah lancar</li> <li>Ibu mengatakan kondisinya sudah fit dan biasa melakukan aktivitas ringan</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadaan umum ibu baik</li> <li>Ekspresi wajah tampak bahagia</li> <li>Tanda-tanda vital TD: 100/70 mmHg, N: 82x/I, S: 36,6°C, P; 22x/i.</li> <li>Tinggi fundus uteri perengahan simpisis dan pusat</li> <li>Pengeluaran lochea sanguilenta berwarna merah kekuningan dan tidak berbau</li> <li>Luka perineum sudah menyatu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil pemeriksaan</li> <li>Mengkaji tingkat nyeri ibu</li> <li>ibu untuk menyusui bayinya secara on demand dan mengkonsumsi makanan yang bisa menambah produksi ASI, serta tidak memberikan susu formula atau makanan tambahan lain</li> <li>Mengingatkan ibu untuk menjaga personal hygiene, istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas yang berat</li> <li>Menganjurkan ibu untuk selalu mengganti pembalut, membersihkan daerah genetaliaanya dengan membasuh dari arah depan ke belakang setiap selesai BAK dan BAB untuk mencegah terjadinya infeksi</li> <li>Mengingatkan untuk menjaga kebersihan kehangatan bayinya</li> <li>Menganjurkan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual selama 6 minggu selama masa nifas</li> <li>Menganjurkan untuk memperhatikan kebersihan dan menjaga kehangatan bayi</li> <li>Menganjurkan suami dan keluarga untuk terlibat dalam merawat bayi</li> <li>Memberikan konseling tentang Kb yang tdiak mengganggu ASI</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan</li> <li>Ibu sudah tidak merasakan nyeri</li> <li>Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan</li> <li>Ibu istirahat yang cukup daan tidak melakukan aktivitas yang berat</li> <li>Ibu akan berdiskusi dengan suaminya mengenai alat kontrasepsi yang akan digunakan</li> </ol>
----	---	---	--	--

			11. Menganjurkan ibu senantiasa mengingat Allah swt dengan mendengarkan lantunan Al-quran	
V	28 Agustus 2022 pukul 15.00 wita  2 minggu postpartum di rumah pasien	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu rutin menyusui bayinya</li> <li>Ibu mengatakan kondisinya sudah fit dan sudah dapat beraktivitas seperti biasanya</li> <li>Ibu dan suami sepakat ingin menggunakan alat kontrasepsi implant (AKBK)</li> </ol> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keadaan umum ibu baik</li> <li>Ekspresi wajah tampak ceria</li> <li>Tanda-tanda vital TD: 110/70 mmHg, N: 80x/I, S: 36,7°C, P; 20x/i.</li> <li>Tinggi fundus uteri tidak teraba</li> <li>Pengeluaran serosa berwarna kuning kecoklatan dan tidak berbau</li> <li>Luka perineum sudah kering</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil pemeriksaan</li> <li>Menganjurkan ibu untuk menjaga personal hygiene, istirahat yang cukup serta menghindari aktivitas yang berat</li> <li>Menganjurkan untuk menjaga kehangatan bayinya</li> <li>Menganjurkan suami dan keluarga untuk terlibat dalam merawat bayi</li> <li>Menganjurkan ibu untuk membawa anaknya imunisasi jika berusia 1 bulan untuk imunisasi BCG</li> <li>Menanyakan kotrasepsi apa yang diinginkan ibu</li> <li>Menganjurkan ibu senantiasa mengingat Allah swt dengan mendengarkan lantunan Al-quran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan</li> <li>Ibu bersedia melakukan apa yang dianjurkan</li> <li>Ibu dan suami sepakat ingin menggunakan alat kontrasepsi implan</li> </ol>
VI	18 September 2022 Pukul 14.25 wita	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu tidak ada keluhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu</li> <li>Mengingatkan ibu untu selalu mejaga kebersihan diri dan bayinya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ibu mengerti dengan hasil pemeriksaan</li> </ol>

6 minggu postpartum di rumah pasien		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ibu sudah membawa bayinya imunisasi di puskesmas Jumpandang Baru</li> <li>c. Ibu sudah menggunakan alat kontrasepsi implan</li> <li>d. Ibu sudah aktif melakukan pekerjaan rumah</li> </ul> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keadaan umum ibu baik</li> <li>b. Ekspresi wajah tampak ceria</li> <li>c. Tanda-tanda vital TD: 100/80 mmHg, N: 78x/l, S: 36,8°C, P; 22x/i.</li> <li>d. Pengeluaran lochea alba</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Mengingat untuk tetap menjaga pola nutrisi dan istirahat</li> <li>4. Mengajukan ibu untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan tanpa memberikan makanan tambahan apapun, dan setelah bayi berusia 6 bulan mengajurkan ibu untuk memberikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun</li> <li>5. Mengajukan ibu untuk memperhatikan imunisasi lengkap bayinya sesuai jadwal imunisasi di pelayanan kesehatan terdekat</li> <li>6. Mengajukan ibu senantiasa mengingat Allah swt dengan mendengarkan lantunan Al-quran, berdzikir serta bersyukur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Ibu mengerti dan bersedia melakukan apa yang dianjurkan</li> <li>3. Ibu bersedia membawa anaknya untuk imunisasi</li> </ul>
-------------------------------------	--	---	--	---

## **BAB IV**

### **PEMBAHSAN**

Pada BAB ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan pelaksanaan asuhan pada Ny “J” masa nifas dengan nyeri luka perineum derajat II yang Puskesmas Jumpandang Baru Makassar selama 1 hari pada tanggal 07 Agustus 2022 dan dilakukan kunjungan rumah pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan 18 September 2022. Pembahasan ini disusun berdasarkan teori dan alasan nyata dengan pendekatan manajemen asuhan Kebidanan yang terdiri dari 7 langkah yaitu:

#### **LANGKAH I : PENGUMPULAN DATA DASAR**

Pada langkah pertama ini berisi semua informasi yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa. Sedangkan data objektif adalah yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien yang terdiri dari pemeriksaan fisik yang sesuai dengan kebutuhan.

Pengkajian data dasar dilakukan pertama kali pada saat ibu masuk keruangan nifas. Pengkajian meliputi anamnesis berupa identitas ibu dan suami, keluhan utama, dan riwayat keluhan utama, riwayat kehamilan dan persalinan, riwayat kesehatan ibu dan keluarga, riwayat keluarga berencana, serta pola kebiasaan sehari-hari. Adapun data objektif yang menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan klien. Pada tahap pengumpulan data, penulis

tidak menemukan masalah/hambatan yang berarti karena baik dari keluarga maupun dari pasien itu sendiri selalu terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan sehingga mempermudah dalam pengumpulan data.

Dalam tinjauan pustaka tertera bahwa menurut Taylor (2011) dalam Sari (2017), nyeri adalah fenomena subjektif dimana respon yang dialami setiap individu akan berbeda untuk menunjukkan adanya masalah atau perasaan yang tidak nyaman. Nyeri perineum terjadi karena adanya jahitan pada perineum, jahitan perineum disebabkan karena adanya ruptur perineum. Ruptur perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Perineum merupakan kulit dan otot yang terletak antara vagina dan anus. Robekan perineum dapat terjadi pada hampir semua persalinan pertama (primipara) dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya (Rahayu, dkk, 2015). Ruptur perineum dapat disebabkan oleh faktor bayi, yaitu badan bayi baru lahir dan faktor persalinan.

Adapun uraian dari ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor bayi yaitu, berat badan bayi baru lahir, berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang 24 jam pertama kelahiran. Semakin besar bayi yang dilahirkan meningkatkan risiko terjadinya ruptur perineum. Bayi besar adalah bayi yang begitu lahir memiliki bobot 4000 gram. Adapun uraian ruptur perineum yang disebabkan oleh faktor penolong persalinan yaitu pimpinan persalinan yang salah merupakan salah satu penyebab terjadinya ruptur perineum, kerja sama yang baik antara klien dan penolong persalinan dapat mengatur kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melalui introitus vagina dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan (Nurasiah, dkk, 2019).

Berdasarkan studi kasus pada Ny "J" ditemukan data yaitu berat bayi 3.800 gram, ini sesuai dengan teori faktor bayi, yaitu berat badan lahir merupakan salah satu faktor terjadinya ruptur pada perineum derajat sehingga dilakukan penjahitan untuk menyatukan kembali jaringan tubuh yang menyebabkan terjadinya nyeri.

## **LANGKAH II: IDENTIFIKASI DIAGNOSA AKTUAL**

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap diagnosa atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil kajian pada Ny "J" didapatkan data subjektif dan data objektif yang menunjukkan diagnosa aktual adalah nyeri luka perineum derajat II. Penegakan diagnosa diperoleh pada hari pertama masa nifas dari data subjektif dimana ibu mengeluh nyeri pada luka jahitan perineumnya, nyeri semakin dirasakan ibu saat bergerak, sifat nyeri yang dirasakan ibu menetap pada perineum. Data objektif yang diperoleh yaitu ekspresi ibu ketika bergerak tampak meringis, didapatkan dari hasil mengukur tingkatan nyeri yang dirasakan dengan *Visual Analogue Scale* berapa pada tingkat 3 yaitu nyeri sedang.

Nyeri menurut *International Association For The Study Of Pain (IASP)* ialah suatu pengalaman emosional dan sensorik yang berhubungan dengan kerusakan jaringan secara aktual dan potensial. Konsep lama menjelaskan bahwa proses nyeri bergantung pada jalur nyeri saja dan intensitas nyeri yang timbul hanya dipengaruhi dengan besarnya stimulus yang didapatkan (Nurjannah, dkk, 2020).

Pada kasus Ny "J" data yang diperoleh salah satu faktor adanya nyeri karena adanya rangsangan pada ujung saraf di permukaan kulit. Serta dilakukannya

penjahitan. Ibu mengeluh merasakan nyeri pada jahitan bekas robekan pada jalan lahir pada saat setelah melahirkan. Persalinan ibu adalah persalinan anak kedua, dari hasil pemeriksaan vulva dan perineum didapatkan jahitan bekas robekan secara spontan pada perineum ibu. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa nyeri pada perineum disebabkan karena terputusnya jaringan atau otot-otot perineum akibat adanya robekan pada perineum baik yang disengaja maupun ruptur spontan (Azizah, 2019).

Dengan demikian penerapan tinjauan teori pada studi kasus ny “ J ” penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dengan kasus yang ditemukan.

### **LANGKAH III: IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL**

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosa potensial berdasarkan diagnosa atau masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Pada kasus nyeri luka perineum kemungkinan masalah yang timbul yaitu salah satu tanda bahaya nifas seperti terjadinya infeksi. Kondisi ibu pada kasus Ny ”J” pada saat ini dengan nyeri luka perineum akibatnya rusaknya otot-otot dan terjadinya robekan secara spontan.

Kulit merupakan bagian yang bisa menjaga tubuh dari kuman. Jaringan kulit adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kulit kalau jaringan pada kulit rusak maka memungkinkan atau memberikan jalan untuk kuman bisa masuk ke tubuh sehingga terjadi infeksi (Hidayat dalam utami, 2015:7).



Kebersihan vagina selama masa nifas harus dilakukan karena vagina merupakan daerah yang dekat dengan tempat buang air kecil dan tempat buang air besar yang setiap hari dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa robekan perineum merupakan rusaknya jaringan daerah perineum tersebut, dimana luka tersebut lembab dan rentan akan masuknya kuman-kuman. Pada masa nifas masih terdapat pengeluaran darah *lochea* dan kotoran yang keluar dari vagina. Vagina merupakan organ terbuka yang mudah dimasuki kuman dan mengakibatkan terjadinya infeksi dan kemudian dapat menjalar ke rahim (Tihardimanto,2012).

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny "J" dapat diidentifikasi masalah potensial yaituantisipasi terjadinya infeksi. Dengan demikian penerapan teori dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny "J" nampak ada persamaan dan tidak ditemukan adanya kesenjangan.

#### **LANGKAH IV : TINDAKAN EMERGENCY/ KOLABORASI**

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Pada kasus Ny "J" selama pemantauan, masa nifas ibu berjalan normal dan tidak ada komplikasi yang menyertai sehingga penulis tidak melaksanakan tindakan segera atau emergency.

#### **LANGKAH V : INTERVENSI**

Pada langkah ini direncanakan usaha yang ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap masalah atau

diagnosa yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Dalam konsep manajemen kebidanan bahwa perawatan nifas harus disetujui oleh klien.

Penatalaksanaan awal yang dilakukan adalah mengukur tingkat nyeri yang dirasakan ibu, kemudian menyusun tindakan untuk menangani atau mengurangi kadar nyeri yang dirasakan, menganjurkan kepada ibu untuk relaksasi dan mobilisasi dini di mulai dengan miring kiri atau miring kanan, melakukan perawatan perineum, istirahat yang cukup serta mengonsumsi obat-obatan yang diberikan, menganjurkan untuk selalu menjaga personal hygiene, mengobservasi TFU, tanda-tanda vital, kontraksi uterus, pengeluaran lochea, menganjurkan tidak melakukan hubungan seksual sampai masa nifas selesai.

Persalinan merupakan proses yang melelahkan, oleh sebab itu, ibu disarankan harus cukup beristirahat, dimana ibu harus tidur selama 8 jam pada malam hari dan 1-2 jam pada siang hari. Ibu nifas juga harus melakukan mobilisasi dini. Mobilisasi dini perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersubatnya pembuluh darah ibu. Ibu dilakukan untuk teknik relaksasi atau latihan menarik nafas yang dalam serta latihan tungkai yang sederhana, balik badan kekanan dan kekiri secara perlahan, duduk serta mengayunkan tungkai dari tepi ranjang. Setelah itu ibu dianjurkan untuk berjalan disekitar tempat tidur atau ke kamar mandi. Dengan begitu sirkulasi darah di dalam tubuh akan berjalan dengan baik (Ambarwati, 2018).

Perawatan luka perineum dengan mengajarkan kepada ibu tentang cara perawatan luka perineum. Melakukan perawatan luka perineum dapat mencegah

terjadinya infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Luka perineum merupakan rusaknya jaringan otot-otot perineum, dimana luka tersebut berada di daerah yang lembab dan rentan akan masuknya kuman

Infeksi pada luka perineum sangat tidak diharapkan oleh pihak petugas kesehatan terutama bagi ibu sendiri. Dengan menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka perineum diharapkan ibu dapat mengenali tanda dan gejala infeksi tersebut, sehingga ibu dapat mengambil tindakan segera yaitu kepelayanan kesehatan terdekat bila mengalami salah satu tanda infeksi Nugroho (2011) dalam Lidya (2018).

Adapun tanda-tanda infeksi pada luka perineum ialah pada luka jahitan terdapat pus/nanah, adanya bau busuk, suhu perineum lebih hangat dari suhu sekitarnya. Bila hal tersebut sampai terjadi maka penderita akan mengalami suhu tubuh  $38^{\circ}\text{C}$ , menggigil, pusng, mual, keputihan, keluar cairan nanh dari vagina, berbau sangat menyengat yang disertai rasa nyeri, pendarahan yang banyak padahal sebelumnya sudah sedikit. Menjelaskan tanda-tanda infeksi pada luka jahitan perineum, diharapkan agar ibu dapat lebih memperhatikan serta mencegah sedini mungkin infeksi (saleha, 2013).

Ibu dianjurkan untuk tidak melakukan pula hubungan seksual selama 6 minggu setelah persalinan karena saat masa nifas, mulut rahim masih terbuka maka akan berisiko karena mengakibatkan kuman dan bakteri yang hidup diluar bisa masuk kedalam rongga rahim dan menyebabkan infeksi (Rini, Susilo, 2017). Sedangkan dalam islam larangan ibu nifas sama dengan larangan orang yang haid.

Sehingga diharamkan untuk bersenggama hingga dirinya bersih atau suci sesuai dalam Q.S Al-Baqarah/2;222.

Selain itu, untuk psikologis dan ketenangan batin ibu, ibu dianjurkan untuk sering mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an, berdoa dan hal lain yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah swt. Pada langkah ini penulis tidak menemukan kesenjangan antara teori dan kasus yang didapatkan. Dimana rencana asuhan yang teori katakan memiliki kesamaan dengan kasus yang didapatkan.

#### **LANGKAH VI: IMPLEMENTASI**

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang ditentukan pada langkah-langkah sebelumnya. Pada kasus Ny'J" dengan nyeri luka perineum hari pertama masa nifas, implementasi asuhan yang telah direncanakan diberikan sejak ibu masuk di ruang nifas atau 2 jam pasca persalinan hingga masa nifas berakhir di puskesmas Jumpondang Baru. Didapatkan hasil pemeriksaan keadaan umum baik, dengan tanda-tanda vital normal, ekspresi wajah tampak meringis di ukur dengan *Visual Analogue Scale* nyeri pada tingkat 3 (Sedang), kontraksi uterus teraba keras dan bundar, Tinggi Fundus Uteri 1 Jari dibawah pusat, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, luka perineum tampak basah, melakukan relaksasi dan mobilisasi dini dengan miring kiri atau kanan, ibu mengonsumsi obat *paracetamol* 500 mg 3 kali sehari dan *Amoxicillin* 500 mg 3 kali sehari.

Pada kunjungan kedua di rumah pasien ialah keadaan ibu baik, tanda-tanda vital dalam batas normal, ekspresi ibu tersenyum tetapi terlihat menahan nyeri, diukur menggunakan *visual analogue scale* nyeri pada tingkat 2 (ringan), kontraksi

uterus teraba keras dan bundar, tinggi fundus uteri 2 jari dibawah pusat, pengeluaran lochea rubra dan tidak berbau, ibu mendoakan anaknya dengan doa nabi ibrahim a.s.

Pada kunjungan ketiga di rumah pasien ialah keadaan ibu baik, ekspresi wajah itu bahagia, diukur menggunakan *visual analog scale* nyeri berada pada tingkat 1( tidak nyeri) nyeri sesekali timbul jika banyak melakukan aktivitas, ibu memakan sayur kelor untuk membantu produksi ASI.

Pada kunjungan keempat di rumah pasien, keadaan ibu baik, ibu terlihat bahagia, ibu rutin memakan sayuran untuk menambah produksi ASI, ibu rajin mengganti pembalutnya, ibu mengatakan tidak merasakan tanda-tanda infeksi masa nifas seperti demam tinggi, ibu selalu mendengarkan murottal.

Pada hari kelima di rumah pasien, keadaa ibu baik, ibu selalu menjaga kebersihan diri dan bayinya, ibu menjaga kehagatan bayinya, ibu membawa anaknya imunisasi BCG di pelayanan kesehatan, dan ibu sepakat dengan suami untuk menggunakan alat kontrasepsi jenis implan. Pada hari keenam, hasil pemeriksaan baik, ibu sudah beraktivitas seperti biasa, ibu tetap menyusui bayinya secara on demand, dan senantiasa mengingat Aallah dengan mendengarkan murottal.

Semua tindakan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerja sama dan penerimaan yang baik oleh ibu serta dukungan dari keluarga dan petugas kesehatah di ruang nifas puskesmas Jumpandang baru.

Pada langkah ini penulis tidak menemukan hambatan yang berarti dalam memberikan asuhan kebidanan karena seluruh tindakan yang dilakukan telah mengarah dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Serta pasien dan keluarga dapat bekerja sama dengan baik dalam pelaksanaan pemberian asuhan kebidanan.

#### **LANGKAH VII: EVALUASI**

Dari hasil evaluasi setelah asuhan kebidanan yang dilaksanakan selama 42 hari dengan 6 kali kunjungan pada kasus nyeri luka perineum derajat II yang dialami Ny "J" yakni pada tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022 dilakukan di Puskesmas Jumpandang baru dan kunjungan rumah pada tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan berakhirnya masa Nifas tanggal 18 September 2022 tidak ditemukan adanya komplikasi yang signifikan dan hasil yang didapatkan setelah dilakukan implementasi secara keseluruhan mampu menangani nyeri yang dirasakan ditandai dengan tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik dalam batas normal dan ekspresi ibu tampak bahagia. Evaluasi dilakukan saat kunjungan pertama sampai kunjungan keenam, dengan menanyakan tingkatan nyeri, kondisi luka perineum dan pengeluaran lochea.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membahas dan menguraikan kasus Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II di Puskesmas Jumpandang baru mulai dari pengkajian hingga evaluasi maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran yaitu:

1. Telah dilaksanakan pengkajian dan analisis data ibu nifas pada Ny "J" dengan nyeri luka perineum pada tanggal 07 Agustus - 18 September 2022 di Puskesmas Jumpandang baru dan kunjungan rumah. Hasil dari analisa data didapatkan Ny "J" umur 26 tahun, PIIA0, dengan nyeri luka perineum derajat II
2. Telah dirumuskan diagnosa/masalah aktual ibu nifas pada Ny "J" pada tanggal 07 Agustus - 18 September 2022 di pukesmas jumpandang baru dan kunjungan rumah. Hasil interpretasi data Ny "J" umur 26 tahun dengan masalah aktual nyeri luka peineum derajat II.
3. Telah dirumuskan diagnosa/masalah potensial ibu nifas pada Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 September 2022 di puskemas jumpandang baru. Hasil interpretasi data didapatkan Ny "J" berpotensi infeksi luka perineum.
4. Telah mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi ibu nifas pada Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 September di puskesmas jumpandang baru tahun 2022. Hasil yaitu tidak diperlukan adanya tindakan segera/emergeny.

5. Telah menetapkan rencana tindakan asuhan kebidanan ibu nifas pada Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 september di puskesmas jumpandang baru tahun 2022 berdasarkan diganosa/masalah aktual dan masalah potensial seperti perawatan luka perineum, teknik relaksasi dan mobilisasi dini, pemantauan tinggi fundus uteri, pengeluaran lochea, pemberian ASI eksklusif, personal hygiene, KB, dan pemberian support.
6. Telah melaksanakan tindakan asuhan yang telah disusun pada ibu nifas Ny "J" dengan nyeri luka perneum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 september di puskesmas jumpandang baru tahun 2022. Hasil yang didapatkan yaitu semua perencanaan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan.
7. Telah mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 september di puskesmas jumpandang baru tahun 2022. Hasil yang didapatkan yaitu seluruh asuha telah diberikan dan tidak ada hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan teori.
8. Telah dilakukan pendokumentasian semua temuan dan tindakan yang telah dilakukan pada ibu nifas Ny "J" dengan nyeri luka perineum derajat II pada tanggal 07 Agustus - 18 september di puskesmas jumpandang baru tahun 2022 daam bentuk SOAP.



## B. Saran

### 1. Untuk klien

- a. Diharapkan kepada ibu masa nifas dapat meningkatkan kondisi fisik dan psikis, serta persoal hygiene untuk menghindari komplikasi yang lebih berat dalam masa nifas utamanya pada ibu nifas dengan nyeri luka perineum derajat II untuk mencegah terjadinya infeksi pada ibu.
- b. Diharapkan pada setiap ibu nifas agar mengkonsumsi makanan yang bergizi karena makanan yang bergizi akan memenuhi kebutuhan energi, juga untuk mempercepat proses penyembuhan dan pengembalian alat reproduksi mendekati keadaan sebelum hamil serta untuk memperbanyak produksi ASI.
- c. Diperlukan keterlibatan suami/keluarga dalam perawatan untuk meningkatkan hubungan yang lebih erat antar pasien dengan bayinya demi menambah pengetahuan dan bimbingan sebagai lanjutan perawatan dirumah.

### 2. Untuk bidan

- a. Sebagai petugas kesehatan khususnya seorang bidan diharapkan senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang lebih profesional berdasarkan manajemen kebidanan sebagai penanggung jawaban
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagai bidan harus sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan dari klien.

- c. Dalam pandangan islam dalam memberikan asuhan kepada klien harus menerapkan kaidah agama di dalamnya agar klien dapat mengerti tentang larangan dalam melakukan hubungan badan antara suami istri apabila dalam keadaan haid atau nifas.

### 3. Untuk Institusi Pendidikan

Dengan mengetahui permasalahan yang timbul pada ibu nifas dengan nyeri luka perineum derajat II, diharapkan institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta perkembangan sesuai prosedur dalam memberikan asuhan dan dalam pelaksanaan manajemen asuhan kebidanan dalam memecahkan suatu masalah kebidanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asy-Syarbashi Ahmad. 2008. *Yas 'Alunaka Tanya Jawab Lengkap Agama dan Kehidupan*. Jakarta: Penerbit Lentera
- Ambarwati. 2018. *Perinatal : Masa Nifas*. Jurnal Of Information Modeling, 53(9), 1689-1699.
- Ayu, Dkk. 2017. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: Penerbit EGC.
- Azizah, N. 2019. *Faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur perineum*.
- Bahiyatun, 2013. *Buku Ajar Ashan Kebidanan Nifas Normal*. Jakarta: EGC
- Budi, Martyarini, 2020, *Electronical games untuk mengatasi nyeri perawatan Luka* : Uny Press
- Dahri, Nurdeni, 2015. “*Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Islam (Tinjauan Terhadap, Haid, Nifas, dan Istidhadhah)*”.
- Departemen Agama, Ri. 2019. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Dewanti. 2019. *Kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin. Penerapan Embellishment Sebagai Unsur Dekoratif Pada Busana Modestwear, d(2017), 1–30*.
- Ethya Sari. 2020. *Hubungan Rawat Gabung Dengan Motivasi Ibu dalam Memberikan ASI di BPS Arifin Surabaya*. Jurnal Kebidanan, 9(1), 26–30. <https://doi.org/10.47560/keb.v9i1.238>
- Fitriani, R 2016. *Pengaruh Teknik Relaksasi Nafas Dalam Terhadap Respon Adaptasi Nyeri Pada Pasien Inpartu Kala I Fase Laten Di RSKDIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2013*. Jurnal Kesehatan, VII(2), 443–452. file:///C:/Users/Intel/AppData/Local/Temp/62-166-1-PB.pdf

- Hasana, Nur dan Ina damayanti. 2019. "*Hubungan Antara Perawatan Luka Perineum dengan Penyembuhan Luka Perineum Ibu Post Partum*". Jurnal Midpro.
- Indrianita, Dkk. 2021. *Kupas Tuntas Seputar Masa Nifas dan Menyusui Serta Penyulit/Komplikasi yang sering terjadi*. Malang: Rna Cipta Publisher
- Juneris, Yunida. 2021. *Buku Ajar AsuhanKebidanan Pada Masa Nifas Disertai Kisi-Kisi Ujian Kompetensi*. Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama.
- Maritalia, Dewi. 2012. *Asuhan Kebidanan Nifas Dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'Rifah, Asirotul dan Yeni Pratiwi. 2015. "*Hubungan Perawatan Luka Perineum Pada Ibu Nifas Dengan Lama Penyembuhan Luka Jahitan Perineum Ibu Nifas di Ruang Lingkup Bpm. Sanadah, S.st. Mojogeneng Mjokerto*".
- Nadyah, 2013. *Kegawat Daruratan Neonatal, Anak, dan Maternal*. Cat. Pertama. Makassar: Alauddin University Press
- Nugroho, Taufan. 2011. *Buku Ajar Obseti Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Yogyakarta: Penerbit Nuha Medika.
- Nurjanah, dkk, 2020. *Asuhan Kebidanan Postpartum*. Bandung: PT Refika Aditama".
- Prawirohardjo, Sarwono. 2018. *Imu Kebidanan*. Jakarta: P.T. Bina Pustaka Sarwono Prawirohadjo
- Rahayu, 2015. *Perbedaan Hasil Masase Perineum dan Kegel Exercise terhadap Pencegahan Robekan Perineum pada Persalinan di Bidan*". Jurnal Riset Kesehatan Vol. 4 No. 2
- Rini, Susilo, dan Feti. 2017. *Panduan Asuhan Nifas dan Evidence Based Practice*. Yogyakarta: Deepublish
- Safitri, Y. 2011. *Perubahan Pada Masa Nifas. Masa Nifas, 13-19*.

- Saleha, S. 2013. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Jakarta: Penerbit Salemba.
- Sumarah. 2011. *Perawatan Ibu Bersalin*. Yogyakarta: Penerbit Fitramaya.
- Sari, Dkk. 2022. *Pengaruh Senam Ibu Hamil dengan Kejadian Rupture Perineum di Puskesmas Minasaupa Makassar Tahun 2021. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 2. No.11 April*
- Sulfianti, Dkk. 2021. *Asuhan Kebidanan Pda Masa Nifas*. Yayasan Kita Menulis.
- Tihardimanto, A, 2012. *Sistem Reproduksi Wanita Fisiologi dan Integrasinya Berdasarkan Al- Qur'an dan Hadis*. Makassar: Alauddin University Press.
- Tulas, Dkk. 2017. *Hubungan Perawatan Luka Perineum Dengan Perilaku Personal Hygiene Ibu Post Partum di Rumahs Sakit Pancaran Kasih GMIM Manado*. e-Jurnal Keperawatan (e-Kep), Vol, 5, No. 1, 1-9.
- Utami, Sri. 2015. *“Perbedaan Tingkatan Nyeri Pada Ibu Post Partum yang Mengalami Episiotomi dengan Ruptur Perineum Spontan di RSUD Panembahan Senopati Bantul”*.
- Yuliana, Bawon, 2022. *Edemo dalam asuhan kebidanan Masa Nifas*. Takalar: Penerbit Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- Zan dan Namora. 2019. *Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Kencana

## LAMPIRAN



Dokumentasi Kunjungan Rumah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
 Website: fkiik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-3116 / Un.06-FKIK/PP.00.9/07/ 2022  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, 15 Juli 2022

Yth . Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
 Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan  
 Di  
 Tempat

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar Yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurdiati  
 N I M : 70400119008  
 Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kebidanan  
 Semester : VI (Enam)  
 Alamat : Toddopuli 19 Baru No. 05

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya tulis ilmiah sebagai salah satu Syarat Untuk Memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Karya Tulis Ilmiah :

**"Manajemen Asuhan Kebidanan Post Natal Dengan Nyeri Luka Perineum Tingkat II di Puskesmas Jumpandang Baru."**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.  
 2. Zelna Yuni Andryani, S.ST., M.Keb.

Untuk maksud tersebut kami memohon kepada Bapak kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian di Wilayah Kerja Puskesmas Jumpandang Baru terhitung mulai tanggal 20 Juli – 15 Agustus 2022.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terimakasih.



Tembusan :  
 -Rektor UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN  
 MAKASSAR

Lampiran 2 Permohonan Izin Penelitian

mmm



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [plsp@sulselprov.go.id](mailto:plsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor	: 5762/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-3116/UN.06-FKLIK/PP.00.9/07/2022 tanggal 15 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>NURDIATI</b>	
Nomor Pokok	: 70400119008	
Program Studi	: Kebidanan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)	
Alamat	: Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa	
	: PROVINSI SULAWESI SELATAN	

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE DENGAN NYERI LUKA PERINEUM DERAJAT II DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 Juli s/d 21 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 21 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

M A K A S S A R

Lampiran 3 Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan





KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
 HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
 DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION  
 "ETHICAL EXEMPTION"

No.D.078/KEPK/FKIK/VIII/2022

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
 The research protocol proposed by

Peneliti utama : NURDIATI  
 Principal In Investigator

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
 Name of the Institution

Dengan judul:  
 Title

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE DENGAN NYERI LUKA  
 PERINEUM DERAJAT II DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN 2022"**


**"MANAGEMENT OF POSTNATAL CARE MIDWIFERY CARE WITH GRADE II PERINEAL  
 WOUND PAIN AT THE JUMPANDANG BARU PUBLIC HEALTH CENTER IN 2022"**

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2)Scientific Values, 3)Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023  
 This declaration of ethics applies during the period August 5, 2022 until August 5,2023

August 5, 2022  
 Professor and Chairperson,

  
 DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

Lampiran 4 Keterangan Layak Etik

ALAUDDIN  
 MAKASSAR



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 295/PKM-JB/XI/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : NURDIATI  
 NIM / Jurusan : 70400119008 / D3 Kebidanan  
 Instansi / Fakultas : UIN Alauddin Makassar

Benar telah melakukan "PENELITIAN" Pada Tanggal 26 Juli 2022 s/d 21 Agustus 2022 di Puskesmas Jumpandang Baru, dengan judul :

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN POST NATAL CARE DENGAN NYERI  
 LUKA PERINEUM DERAJAT II DI PUSKESMAS JUMPANDANG BARU TAHUN 2022"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 November 2022

Kepala Puskesmas Jumpandang Baru



**Dr. Fauziah Bakhtiar**

NIP. 19731231 200501 2 023

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Peneliti

Nama : Nurdiati  
 Nim : 70400119008  
 T.T.L : Bocci, 28 Juni 2000  
 Suku : Bugis - Makassar  
 Agama : Islam  
 Alamat : Toddopuli 19 Baru no.5  
 Nama Orang Tua :  
     a. Ayah : Basir  
     b. Ibu : Maryam

### B. Riwayat Pendidikan

SD. Inpres Bocci : 2006-2012  
 SMP Negeri 3 Sinjai : 2012-2015  
 SMA Negeri 6 Sinjai : 2015-2018  
 UIN Alauddin Makassar : 2019-2022