

**STUDI LITERATUR**  
**KANDUNGAN FITOKIMIA DAN BIOAKTIVITAS LEMPUYANG**  
**GAJAH (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
Oleh:  
**MAKASSAR**  
**NURUL IZZAH FIRDAUS**

**70100117084**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2022**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nurul Izzah Firdaus  
Nim : 70100117084  
Tempat tanggal lahir : Sorong, 06 Juni 2000  
Jurusan : Farmasi  
Alamat : Jalan Kariango, Maros  
Judul : Studi Literatur Kandungan Fitokimia dan Bioaktivitas  
Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini tidak sah dan melanggar hukum.



Maros,

Januari 2022

Penyusun

**NURUL IZZAH FIRDAUS**

**70100117084**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Studi Literatur Kandungan Fitokimia dan Bioaktivitas Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)** yang disusun oleh **Nurul Izzah Firdaus, NIM. 70100117084**, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 09 November 2022 M** yang bertepatan dengan **14 Rabi'ul Akhir 1444 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Samata, 09 November 2022 M  
14 Rabi'ul Akhir 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S. Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Haeria, S. Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si	(.....)
Penguji I	: Apt. Mukhriani, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurkhalis A. Gaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)
Pelaksana	: Apt. Nur Azizah Syahrana., M.Farm	(.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

EIN Maudin Makassar, 



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Literatur Kandungan Fitokimia dan Bioaktivitas Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam akan terus tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang telah membimbing seluruh umat islam menuju kepada zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari akan banyaknya ujian serta rintangan pada setiap proses penyelesaian skripsi ini, namun hal tersebut tidak menjadi alasan untuk menyerah dan penulis tetap terus berjuang hingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis bukan satu-satunya orang yang berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini, namun terdapat dukungan dan doa orang-orang yang rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua terkasih, yaitu bapak Firdaus dan ibu Haeriany, yang selalu memberikan cinta kasih, dukungan serta doa yang mustajab untuk anaknya. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada suami tercinta Zuhail amru atas segala bentuk bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Semoga kita semua senantiasa selalu berada di jalan yang Allah SWT ridhoi serta selalu dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuluddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H. M. Faris Satrianegara, S.KM, MARS., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Ibu Apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Ibu Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
12. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Pembimbing I yang selalu membimbing kami dan mengarahkan kami serta meluangkan waktunya demi terselesainya skripsi penulis.

13. Ibu Apt. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si. selaku Pembimbing II kami yang selalu mengarahkan dan membimbing kami demi terselesainya skripsi ini.
14. Bapak Apt. Muh Rusdi, S.Si., M.Si. selaku Penguji Kompetensi yang telah memberi saran maupun masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Bapak Nurkhalis A. Gaffar, S.Ag., M.Hum. selaku Penguji Agama yang telah memberikan saran maupun kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Dosen farmasi dan Staf jurusan farmasi, atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada kami selama ini.
17. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi Angkatan 2017, (KOVALEN) dan teman-teman KKN yang selalu menyemangati dan mendukung kami sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
18. Kepada seluruh pihak yang senantiasa berkontribusi pikiran, tenaga dan motivasi, saya ucapkan terima kasih banyak karena dengan bantuan kalian skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan pada skripsi ini. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin  
Ya Rabbal Alamin.

Maros, Januari 2022

Penyusun

**NURUL IZZAH FIRDAUS**

**70100117084**

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
BAB II METODE.....	5
2.1 Strategi Pencarian Literatur.....	5
2.1.1 Framework.....	5
2.1.2 Kata kunci.....	7
2.1.3 Data base atau search engine .....	7
2.2 Kriteria Inklusi Dan Eksklusi Dalam Seleksi Studi .....	7
2.3 Seleksi Studi Dan Penilaian Kualitatif .....	7
2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi.....	7
2.3.2 Daftar hasil pencarian artikel .....	8
BAB III HASIL DAN ANALISIS .....	12
3.1 Hasil.....	12

3.2 Analisis .....	13
BAB IV PEMBAHASAN.....	32
4.1 Tinjauan Teoritis Tanaman Lempuyang Gajah .....	32
4.1.1 Klasifikasi tumbuhan .....	32
4.1.2 Nama daerah atau nama lain .....	34
4.1.3 Morfologi tumbuhan .....	34
4.2 Pembahasan Hasil .....	36
4.2.1 Kandungan fitokimia .....	36
4.2.1.1 Zerumbone.....	44
4.2.1.2 Diacetone alcohol.....	45
4.2.1.3 Kaempferol.....	45
4.2.1.4 Katekin.....	45
4.2.1.5 Luteolin.....	46
4.2.1.6 Linalool.....	46
4.2.1.7 Myricetin.....	46
4.2.1.8 Quercetin.....	47
4.2.1.9 Camphene.....	47
4.2.1.10 Z-citral.....	48
4.2.1.11 $\alpha$ -humulene.....	48
4.2.2 Bioaktivitas.....	49
4.3 Tinjauan Teori Bioaktivitas Tanaman Lempuyang Gajah .....	56
4.3.1 Antibakteri.....	56
4.3.2 Antioksidan .....	58
4.3.3 Insektisida.....	59
4.3.4 Antiinflamasi .....	61
4.3.5 Antileishmanial.....	63



4.3.6 Antiproliferatif.....	65
4.3.7 Imunosupresan.....	66
4.3.8 Penghambat tyrosinase.....	67
4.3.9 Penghambat asetilkolinesterase .....	68
4.4 Tinjauan Islami Tentang Pemanfaatan TanPaman Lempuyang Gajah ...	69
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN.....	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	99



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Framework .....	5
Tabel 2. Kriteria inklusi dan eksklusi .....	7
Tabel 3. Daftar artikel yang dianalisis .....	9
Tabel 4. Hasil analisis .....	13
Tabel 5. Kandungan senyawa <i>Zingiber zerumbet</i> .....	36
Tabel 6. Bioaktivitas <i>Zingiber zerumbet</i> .....	49



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka penelitian.....	6
Gambar 2. Hasil Pencarian seleksi jurnal .....	8
Gambar 3. <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith.....	32



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Situs pencarian pustaka .....	83
Lampiran 2. Daftar artikel yang dianalisis .....	89
Lampiran 3. Gambar Tanaman Lempuyang Gajah.....	98



## ABSTRAK

Nama : Nurul Izzah Firdaus  
Nomor Induk Mahasiswa : 70100117084  
Judul Penelitian : Studi Literatur Kandungan Fitokimia dan Bioaktivitas Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)

---

**Latar belakang** Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) merupakan spesies jahe liar yang telah banyak diteliti untuk berbagai kandungan fitokimia dan bioaktivitasnya dalam memelihara kesehatan tubuh maupun mengobati penyakit. **Tujuan** penelitian ini untuk mengetahui kandungan senyawa fitokimia yang terkandung dalam rimpang Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) serta bioaktivitasnya. **Metode** pada penelitian ini yaitu menggunakan metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*) yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dari database atau *search engine* yang digunakan yaitu *Google scholar, pubmed, dan sciencedirect*. **Hasil** dari analisis jurnal ditemukan 303 jurnal kemudian dilakukan identifikasi, skrining, dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian dari 19 jurnal ditemukan 124 kandungan senyawa fitokimia yang terdapat dalam tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)). Senyawa zerumbone merupakan senyawa yang paling banyak terkandung. Terdapat pula beberapa bioaktivitas dari tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)) diantaranya sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, anti proliferasi, antileishmania, penghambat tyrosinase, penghambat asetilkolinesterase, immunosupresan dan insektisida. **Kesimpulan** tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.)) memiliki banyak kandungan fitokimia yang bermanfaat serta memiliki beberapa bioaktivitas yang berpotensi sebagai alternatif pengobatan.

Kata kunci: lempuyang gajah, *Zingiber zerumbet*, *bioactivities, phytochemical compounds*.

## ABSTRACT

Name : Nurul Izzah Firdaus  
Student ID Number : 70100117084  
Research Title : Literature Study of Phytochemical Content and Bioactivity of Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)

---

**Background** *Zingiber zerumbet* is a wild ginger species that has been widely reported for the various phytochemical content and bioactivity in maintaining body health and treating disease. **Destination** this study was to determine the content of any phytochemical compounds contained in the *Zingiber zerumbet* plant and the bioactivity that can be generated from the plant. **Method** in this study using the PICO method (Population, Intervention, Comparison, Outcome) that match the inclusion and exclusion criteria of the database or search engine used, namely google scholar, pubmed, and sciencedirect. **Results** from the journal analysis found 303 journals and then identification, screening, by looking at the inclusion and exclusion criteria. The results of research from 19 journals found 124 phytochemical compounds contained in the Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) plant. Zerumbone was the most substantial compounds. There was also several bioactivities from the Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith), including anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-oxidant, anti-proliferative, immunosuppressant and insecticide. **Conclusion** *Zingiber zerumbet* contains many useful phytochemicals and has several bioactivities that have potential as alternative treatments.

Keywords: lempuyang gajah, *Zingiber zerumbet*, bioactivities, phytochemical compounds.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman di Indonesia dan yang terdata hanya 9.000 jenis yang merupakan tanaman obat. Hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang kaya akan sumber bahan alam dan tanaman obat. Keberagaman organisme dan iklim memungkinkan tumbuhan dapat tumbuh sepanjang tahun, serta budaya masyarakat yang terbiasa menggunakan tumbuhan obat sebagai pengobatan. Tanaman obat juga mudah diperoleh, hal ini menjadi peluang besar dalam pengembangan tumbuhan obat di Indonesia (Saudah et al., 2019).

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) menyatakan bahwa terjadi peningkatan sebanyak 13% penggunaan obat tradisional di Indonesia selama tahun 1980 sampai dengan 2004. Pada tahun 2010 sampai 2011 juga terjadi peningkatan sebesar 4,36%. Presentase penggunaan obat tradisional di Indonesia terus meningkat dalam jangka waktu tujuh tahun. Penggunaan obat tradisional banyak digunakan masyarakat walaupun terdapat banyak fasilitas kesehatan dan obat konvensional (Sari Dewi et al., 2019).

Obat tradisional merupakan ramuan bahan alam yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dan keanekaragaman. Tumbuhan obat dapat menunjang adanya ketersediaan obat-obat tradisional yang siap pakai (Jumiarni & Komalasari, 2017). Obat tradisional berasal dari budaya nenek moyang yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk menunjang kesehatan. Obat tradisional juga mempunyai peran besar dalam pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia, namun tidak semua tumbuhan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia (Dewantari et al., 2018).

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat merupakan salah satu cara masyarakat yang dilakukan secara turun temurun untuk memenuhi kebutuhan terutama untuk mengatasi persoalan terkait dengan kesehatan. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal antara lain mencakup pengobatan berbasis tanaman atau tumbuhan. (Marpaung, 2018). Salah satu kelompok tumbuhan yang biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman obat karena memiliki manfaat yang sangat beragam yaitu suku Zingiberaceae.

Zingiberaceae merupakan salah satu famili pada kelas Liliopsida yang banyak digunakan sebagai obat. Bagi masyarakat lokal Indonesia berbagai spesies dari famili Zingiberaceae bermanfaat ganda sebagai obat tradisional, bumbu masak, dan tanaman hias. Famili Zingiberaceae memiliki tiga suku, salah satunya adalah Zingiberaceae yang memiliki genus tunggal yaitu Zingiber (Silalahi, 2018).

Zingiber tergolong genus yang cukup besar pada famili Zingiberaceae, hal ini ditandai dengan tersebarnya 141 spesies, terutama di Asia. Genus tumbuhan ini terbatas pada daerah tropis Asia, Malaysia, dan Kepulauan Pasifik. Nama Zingiber, sebenarnya berasal dari kata Sanskerta yang mengacu ke tanduk banteng (Z. A. Zakaria et al., 2011).

*Zingiber zerumbet* termasuk tanaman semak semusim berbatang semu. Batangnya merupakan perpanjangan pelepah daun yang berbentuk bulat. Daun lempuyang mempunyai susunan tunggal berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat telur panjang, ujungnya meruncing, dan bagian tepi rata. Rangkaian bunga tanaman berbentuk tandan yang muncul dari batang dalam tanah, yang berwarna hijau atau hijau kemerahan/keunguan. Bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpang. Rimpang berkhasiat sebagai obat masuk angin, sakit perut, sesak nafas, pilek, radang usus, syaraf lemah, penambah darah, dan obat penambah nafsu makan. Rimpang mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid, dan tanin.



Kandungan utama minyak atsiri adalah sesquiterpenoid *zerumbone* yang memiliki aktivitas biologis, antara lain sebagai antikanker dan antitumor (Wahyuni et al., 2020).

Tanaman *Zingiber zerumbet* (L.) Smith (keluarga Zingiberacea), merupakan spesies jahe liar yang dapat dimakan dan telah banyak diteliti untuk berbagai aktivitas biologis. Sebagai contoh, ekstrak dan minyak esensial dari minyak *Zingiber zerumbet* telah dieksploitasi untuk khasiat anti jamur dan anti mikotoksinya terhadap beberapa mikroba seperti *Aspergillus flavus* dan *Aspergillus ochraceus*. Penelitian lain menunjukkan bahwa minyak esensial dari golongan zerumbone dapat meningkatkan nafsu makan dan berat badan pada hewan uji, senyawa zerumbone ini juga telah dilaporkan terdapat pada tanaman *Zingiber zerumbet*. Informasi literatur menunjukkan minyak esensial yang berasal dari *Zingiber zerumbet* dari seluruh dunia memiliki beberapa aktivitas biologis seperti anti mikroba, larvasida, anti nosiseptif, anti inflamasi dan anti oksidan. (Huong et al., 2020).

Melihat pentingnya tanaman *Zingiber zerumbet* bagi masyarakat dengan banyaknya aktivitas biologi yang ditunjukkan, maka perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pengetahuan tentang kandungan fitokimia dan aktivitas biologi dari tanaman lempuyang gajah dengan tujuan dapat menjadi landasan bagi penelitian yang lebih lanjut terkait pembuatan dan pengembangan sediaan obat dari tanaman lempuyang gajah. Berdasarkan uraian diatas maka akan dilakukan penelitian melalui studi literatur tentang kandungan fitokimia dan bioaktivitas lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) untuk mendapatkan gambaran dalam mengembangkan *Zingiber zerumbet* (L.) Smith sebagai tanaman obat.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa saja kandungan senyawa fitokimia yang terdapat pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)?
2. Bagaimana bioaktivitas dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) sebagai tanaman obat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kandungan senyawa fitokimia yang terdapat pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith)
2. Untuk mengetahui bioaktivitas dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) sebagai tanaman obat



## BAB II METODE

### 2.1 Strategi Pencarian Literatur

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui kajian pustaka. Metode studi literatur merupakan serangkaian penelitian dengan menggunakan teknik mengumpulkan data, menyeleksi, membaca dan menganalisa data, serta menarik kesimpulan dari data pustaka dan kajian kepustakaan yang diolah dalam proses penelitian.


#### 2.1.1 Framework


Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (Population, Interventions, Comparison dan Outcome)

**Tabel 1.** Framework

<b>P</b>	<b>I</b>	<b>C</b>	<b>O</b>
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
Tanaman Lempuyang Gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	Metode penentuan senyawa fitokimia dan bioaktivitas Lempuyang Gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	Perbedaan bioaktivitas Lempuyang Gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith antar penelitian	Kandungan fitokimia dan bioaktivitas Lempuyang Gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut:





**Gambar 1.** Kerangka penelitian.

### 2.1.2 Kata kunci

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian literatur yaitu Aktivitas Lempuyang gajah, Kandungan Lempuyang gajah, *Bioactivities of Zingiber zerumbet*, *Compounds of Zingiber zerumbet*.

### 2.1.3 Data base atau search engine

Data base atau *search engine* yang digunakan dalam penelusuran artikel yaitu *Google Scholar*, *PubMed*, dan *Science direct*.

## 2.2 Kriteria Inklusi Dan Eksklusi Dalam Seleksi Studi

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.** Kriteria inklusi dan eksklusi

Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2012-2022)	1. Jurnal yang sama
2. Subjek penelitian yaitu Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	2. Metode penelitian tidak jelas
3. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i>	
4. Kriteria jurnal memiliki <i>International Standard Serrial Number</i> (ISSN)/DOI ( <i>Digital Object Identifier</i> )	
5. Ketersediaan naskah <i>full text &amp; open access</i>	
6. Berbahasa Indonesia atau Bahasa Inggris	
7. Jurnal telah terindeks <i>sinta</i> atau <i>quartil</i>	


## 2.3 Seleksi Studi dan Penilaian Kualitatif

### 2.3.1 Hasil pencarian dan seleksi studi

Berdasarkan hasil pencarian artikel dari *data base* atau *Search engine* yang digunakan maka didapatkan artikel yang memenuhi kriteria inklusi dan

eksklusi untuk selanjutnya diidentifikasi secara rinci seperti yang terdapat pada tabel berikut:

<i>Pubmed</i>	<i>Science direct</i>	<i>Google Scholar</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Lempuyang gajah</li> <li>• Kandungan Lempuyang gajah</li> <li>• <i>Bioactivities of Zingiber zerumbet</i></li> <li>• <i>Compounds of Zingiber zerumbet.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Lempuyang gajah</li> <li>• Kandungan Lempuyang gajah</li> <li>• <i>Bioactivities of Zingiber zerumbet</i></li> <li>• <i>Compounds of Zingiber zerumbet.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas Lempuyang gajah</li> <li>• Kandungan Lempuyang gajah</li> <li>• <i>Bioactivities of Zingiber zerumbet</i></li> <li>• <i>Compounds of Zingiber zerumbet.</i></li> </ul>



**Gambar 2.** Hasil pencarian seleksi jurnal

### 2.3.2 Daftar hasil pencarian artikel

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi dibawah ini yang memuat judul, penulis dan tahun, nomor ISSN/DOI, database dan kriteria jurnal :

**Tabel 3.** Daftar artikel yang dianalisis

No	Judul	Penulis dan Tahun	ISSN/DOI	Database	Kriteria jurnal
1.	Zerumbone from <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) smith : a potential prophylactic and therapeutic agent against the cariogenic bacterium <i>Streptococcus mutans</i>	(da Silva et al., 2017)	10.1186/s12906-018-2360-0	Pubmed	Q1
2.	Standardized ethanol extract, essential oil and zerumbone of <i>Zingiber zerumbet</i> rhizome suppress phagocytic activity of human neutrophils	(Akhtar et al., 2019)	10.1186/s12906-019-2748-5	Pubmed	Q1
3.	Optimization of microwave-assisted extraction of zerumbone from <i>Zingiber zerumbet</i> L. rhizome and evaluation of antiproliferative activity of optimized extracts	(Ghasemzadeh et al., 2017)	10.1186/s13065-016-0235-3	Google scholar	Q2
4.	Comparison of Chemical Composition and Bioactivities of Essential Oils from Fresh and Dry Rhizomes of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith	(Tian et al., 2020)	10.1155/2020/9641284	Google scholar	Q2
5.	In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni ( <i>Zingiber zerumbet</i> ) Asal Pulau Timor	(Kapitan et al., 2017)	10.32938/sc.v2i02.82	Google scholar	S3
6.	Analisis Zerumbone dalam <i>Zingiber zerumbet</i> dan Aktivitas Penghambatannya terhadap Bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i>	(Lallo et al., 2018)	10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138	Google scholar	S3
7	Phytochemical estimation and in vitro antioxidant activity of rhizome of in vitro regenerated <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.	(Kothandaraman & Shanmugam, 2018)	0975-4873	Google scholar	Q4

8.	Contact and Repellant Activities of Zerumbone and Its Analogues from the Essential Oil of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith against <i>Lasioderma serricorne</i>	(Wu et al., 2017)	10.5650/jos.ess16166	Pubmed	Q2
9.	Antibacterial activity of ethanolic extracts from <i>Zingiber zerumbet</i> rhizome against <i>Salmonella spp.</i>	(Rahayu et al., 2019)	10.13057/biodiv/d201127	Google scholar	Q3
10.	Variation in secondary metabolite production as well as antioxidant and antibacterial activities of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) at different stages of growth	(Ghasemzadeh et al., 2016)	10.1186/s12906-016-1072-6	Pubmed	Q1
11.	Chemical Composition of the Essential Oil of <i>Zingiber zerumbet</i> var. <i>darcyi</i>	(Rana et al., 2012b)	10.1177/1934578X120701031	Google scholar	Q2
12.	Chemical Constituents of the Root Essential Oils of <i>Zingiber rubens</i> Roxb., and <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith	(Dai et al., 2013)	10.4236/ajps.2013.41002	Pubmed	Q3
13.	Identification of Chemical Constituents of <i>Zingiber zerumbet</i> Rhizome Extract Using GC/MS	(Biswabushan Dash et al., 2020)	10.1080/2311866.2020.1821775	Pubmed	Q3
14.	Antioxidant Activities and Cytotoxicity of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith Rhizome	(Nag et al., 2013)	2349-8234	Google scholar	Q4
15.	Chemical composition and biological activity of the essential oil of rhizome of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith	(B et al., 2014)	2278-4136	Google scholar	Q3
16.	Phytochemicals and Biological Activities of <i>Zingiber Zerumbet</i> (L.) Smith.	(A. Zakaria & Jamil, 2019)	2550-1453	Pubmed	Q2
17.	Zerumbone isolated from <i>Zingiber zerumbet</i> inhibits inflammation and pain in	(Somchit et al., 2012)	10.5897/JM-PR10.492	Pubmed	Q3



	rats				
18.	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm. from northern India: Potential source of zerumbone rich essential oil for antiproliferative and antibacterial applications	(Padalia et al., 2019)	10.1016/j.in dcrop.2018. 01.006	Google scholar	Q1
19.	Analysis of intraspecific genetic variation, antioxidant and antibacterial activities of <i>Zingiber zerumbet</i>	(Kaewsri & Deetae, 2016)	2231-7546	Google scholar	Q3



## **BAB III**

### **HASIL DAN ANALISIS**

#### **3.1 Hasil**

Pada pencarian jurnal melalui database *google scholar* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas lempuyang gajah, Kandungan lempuyang gajah, *Bioactivities of Zingiber zerumbet*, dan *Compounds of Zingiber zerumbet*. Diperoleh sebanyak 18 jurnal yang sesuai dengan judul.

Pada pencarian jurnal melalui database *pubmed* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas lempuyang gajah, Kandungan lempuyang gajah, *Bioactivities of Zingiber zerumbet*, dan *Compounds of Zingiber zerumbet*. Diperoleh sebanyak 69 jurnal yang sesuai dengan judul.

Pada pencarian jurnal melalui database *science direct* dengan menggunakan kata kunci Aktivitas lempuyang gajah, Kandungan lempuyang gajah, *Bioactivities of Zingiber zerumbet*, dan *Compounds of Zingiber zerumbet*. Diperoleh sebanyak 216 jurnal yang sesuai dengan judul.

Hasil identifikasi dari ketiga database pencarian berdasarkan kata kunci yang ditetapkan maka ditemukan 303 jurnal, kemudian setelah dilakukan identifikasi, skrining, dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi, jurnal yang memenuhi syarat hanya terdapat 67 jurnal. Sehingga untuk analisis jurnal diperoleh sebanyak 19 jurnal.

### 3.2 Analisis

**Tabel 4.** Hasil analisis

No	Judul Penulis dan Tahun	Population	Intervention	Comparsion	Outcome	
					Kandungan fitokimia	Bioaktivitas
1.	Zerumbone from <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) smith : a potential prophylactic and therapeutic agent against the cariogenic bacterium <i>Streptococcus mutans</i>  (da Silva et al., 2017)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode ekstraksi</b> rimpang diekstraksi melalui metode hidrodistilasi selama 6 jam <b>Metode pengujian senyawa</b> minyak atsiri diuji dengan analisis kromatografi gas – spektrometri massa (GC-MS), sedangkan kemurnian zerumbone diuji dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi (KCKT) <b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antimikroba zerumbone dievaluasi	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas anti bakteri	Minyak esensial dibentuk oleh senyawa zerumbone seskuiterpen 87,93% dengan kemurnian 98%, zerumbone terdeteksi di antara 19 konstituen kimia lainnya.	antibakteri terhadap <i>Streptococcus mutans</i>

			dengan estimasi <i>Minimum Inhibitory Concentration</i> (MIC) dan <i>Minimum Bactericidal Concentration</i> (MBC) menggunakan metode mikrodilusi			
2.	Standardized ethanol extract, essential oil and zerumbone of <i>Zingiber zerumbet</i> rhizome suppress phagocytic activity of human neutrophils  (Akhtar et al., 2019)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode ekstraksi</b> rimpang dimaserasi dengan 3L etanol 80% selama 72 jam <b>Metode pengujian senyawa</b> zerumbone diuji kromatografi cair kinerja tinggi fase terbalik yang divalidasi (RP-HPLC) sedangkan minyak atsiri diperoleh melalui hidro-distilasi rimpang dan dianalisis lebih lanjut dengan kromatografi gas (GC) dan GC-MS.	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas immunosupresan dengan melihat aktivitas kemotaksik, hambatan integrin CD18, dan fagositosis.	minyak atsiri mengidentifikasi 17 senyawa, diantaranya $\alpha$ -pinene, camphene, $\alpha$ -terpinen, 1,8-cineole, $\beta$ -ocimene, nonen-1-ol, terpinen-4-ol, $\beta$ -caryophyllene, $\alpha$ -humulene, (E)-nerodilol, caryophyllene oxide, humulene oxide, caryophylla-4 (14),8 (15)-dien-5.alpha.-ol, calamenene, $\alpha$ -bisabolol, farnesol, zerumbone, senyawa utama yang diidentifikasi adalah zerumbone.	sebagai immunosupresan

			<p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> uji kemotaksis dilihat dengan kit uji migrasi sel 24-sumur (<i>24-well cell migration</i>), pengujian integrin CD18 dan uji fagositosis diukur menggunakan <i>flow cytometry</i></p>			
3.	<p>Optimization of microwave-assisted extraction of zerumbone from <i>Zingiber zerumbet</i> L. rhizome and evaluation of antiproliferative activity of optimized extracts</p> <p>(Ghasemzadeh et al., 2017)</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode ekstraksi</b> sampel diekstraksi dengan metode gelombang mikro, refluks dan sonikasi menggunakan 10 ml pelarut etanol, methanol, n-heksan dan kloroform</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> zerumbone diisolasi dengan kromatografi cair kinerja ultra-tinggi</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> sebagai anti proliferaatif</p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas anti proliferaatif</p>	<p>minyak atsiri rimpang mengandung senyawa zerumbone</p>	<p>anti proliferaatif yang signifikan terhadap garis sel kanker HeLa tanpa toksisitas pada sel normal</p>

			dilakukan metode pengujian MTT			
4.	Comparison of Chemical Composition and Bioactivities of Essential Oils from Fresh and Dry Rhizomes of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith  (Tian et al., 2020)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode ekstraksi</b> rimpang diekstraksi dengan metode hidrodistilasi selama 5 jam, selanjutnya akan diuji dengan <i>gas chromatography mass spectrometry</i> (GC-MS) <b>Metode pengujian senyawa</b> Isolasi dan identifikasi zerumbone menggunakan metode rekristalisasi <b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antioksidan diuji menggunakan metode 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) dan ABTS, aktivitas antimikroba dilakukan dengan 7 strain, lalu dievaluasi	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas antioksidan, dan anti mikroba	minyak atsiri 0,65% dan 0,39% (b/ b), terdapat 36 senyawa yang diidentifikasi sebanyak 98,9% dari FR-EO, komponen utama adalah zerumbone (75,0%), diikuti oleh $\alpha$ -humulene (6,5%), humulene oxide I (3,8%), camphene (3,3%), humulene oxide II (2,7%), camphor (1,3%), caryophyllene oxide (1,3%), dan 1,8-cineole (1,2 %). 66 senyawa yang diidentifikasi sebanyak 98,8% dari DR-EO, terutama mengandung zerumbone (41,9%), diikuti oleh $\alpha$ -humulene (29,4%), humulene oksida I (6,0%), humulene oksida II (3,9%), camphene (3,9%), $\beta$ -caryophyllene (2,5%), camphor (2,4%), caryophyllene oxide	antioksidan dan antibakteri terhadap <i>Stafilokokus aureus</i> (ATCC 6538P), <i>Enterococcus faecalis</i> (ATCC 29212), <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (CMCC (B) 10104), <i>Bacillus subtilis</i> (CMCC (B) 63501), <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922), <i>Proteus vulgaris</i> (CMCC (B) 49027), dan <i>Candida albicans</i> (CMCC (P) 98001

			dengan uji difusi agar cakram		(2,1%), dan 1,8 cineole (1,6%)	
5.	In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni ( <i>Zingiber zerumbet</i> ) Asal Pulau Timor  (Kapitan et al., 2017)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode ekstraksi</b> rimpang dimaserasi menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol masing-masing sebanyak 150 ml selama 24 jam <b>Metode pengujian senyawa</b> uji kandungan senyawa yang terkandung pada ekstrak dilihat dengan <i>Liquid chromatography mass spectra</i> (LCMS). <b>Metode pengujian bioaktivitas</b> uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar (sumuran)	Penentuan bioaktivitas antibakteri	ekstrak etanol mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, tanin, dan fenolik. Analisis LC-MS ekstrak etanol menunjukkan bahwa senyawa yang terkandung dalam ekstrak adalah zerumbon dan gingerlikolid B	antibakteri terhadap <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Eschericia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
6.	Analisis Zerumbone dalam <i>Zingiber zerumbet</i> dan Aktivitas	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber</i>	<b>Metode ekstraksi</b> rimpang diekstraksi melalui metode maserasi, refluks,	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan	ekstrak rimpang mengandung senyawa zerumbone	aktivitas terhadap <i>Mycobacterium tuberculosis</i>

	<p>Penghambatannya terhadap Bakteri <i>Mycobacterium tuberculosis</i></p> <p>(Lallo et al., 2018)</p>	<p><i>zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p>soxhletasi dengan pelarut metanol dan destilasi air</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> zerumbone dianalisis dengan metode kualitatif, mengamati warna noda, serta harga Rf dan spektrum pada panjang gelombang 200-400 nm, dilanjutkan dengan analisis kuantitatif secara densitometri.</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> uji aktivitas antibakteri dinilai dari ada tidaknya pertumbuhan bakteri uji pada media yang digunakan setelah diinkubasi pada suhu 37°C selama enam minggu</p>	<p>bioaktivitas antibakteri</p>		
7.	<p>Phytochemical estimation and in</p>	<p>Tanaman Lempuyang</p>	<p><b>Metode ekstraksi</b> sampel bubuk kasar</p>	<p>Penentuan kandungan</p>	<p>rim pang mengandung asam galat (4,00 ±</p>	<p>sebagai antioksidan</p>



	<p>vitro antioxidant activity of rhizome of in vitro regenerated <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Sm.</p> <p>(Kothandraman &amp; Shanmugam, 2018)</p>	<p>gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p>diekstraksi dalam rasio 1:10 dengan metanol 99%. Ekstrak disaring dan dipekatkan dengan destilasi kemudian dikeringkan</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> hasil ekstraksi kemudian dianalisa dengan metode <i>high performance liquid chromatography</i> (HPLC)</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antioksidan diuji dengan metode 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) dan ABTS</p>	<p>senyawa fitokimia dan bioaktivitas anti oksidan</p>	<p>0,01mg/g), asam hidroksil benzoat (<math>6,10 \pm 0,10</math>), asam kumarat (<math>1,90 \pm 0,02</math>), asam vallinat (<math>2,43 \pm 0,08</math>) dan asam sinamat (<math>1,43 \pm 0,02</math>). Ekstrak metanol rimpang mengandung beberapa flavonoid seperti rutin, quercetin, kaempferol dan luteolin</p>	
8.	<p>Contact and Repellant Activities of Zerumbone and Its Analogues from the Essential Oil of</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode ekstraksi</b> rimpang mengalami hidrodistilasi selama 8 jam dan diekstraksi dengan n-heksan</p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas insektisida</p>	<p>kandungan utama minyak atsiri adalah zerumbone (40,2%), -caryophyllene (8,6%), humulene epoxide II (7,3%), camphene</p>	<p>sebagai insektisida atau penolak alami untuk pengendalian kumbang rokok</p>

	<p><i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith against <i>Lasioderma serricorne</i></p> <p>(Wu et al., 2017)</p>		<p><b>Metode pengujian senyawa</b> senyawa yang diekstraksi selanjutnya dianalisis dengan <i>Gas Chromatography Mass Spectrometry</i> (GC-MS) dan <i>Gas Chromatography – Flame Ionization Detector</i> (GC-FID)</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> Toksisitas kontak minyak esensial terhadap <i>Lasioderma serricorne</i> dilakukan dengan pengaplikasian secara topikal</p>	<p>dengan melihat kontak dan penolakan terhadap minyak esensial <i>Zingiber zerumbet</i></p>	<p>(5,9%) dan fenchene (4,7%).</p>	
9.	<p>Antibacterial activity of ethanolic extracts from <i>Zingiber zerumbet</i> rhizome against <i>Salmonella spp.</i></p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode ekstraksi</b> rimpang dibasahi dan dilarutkan dengan etanol 45% disimpan 24 jam, dikocok dengan shaker digital lalu disaring</p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas anti bakteri</p>	<p>ekstrak mengandung alkohol, flavonoid, saponin, terpenoid dan tannin. Senyawa yang paling dominan yaitu zerumbone, selain itu, terdapat senyawa lain berupa alpha-humulene,</p>	<p>antibakteri terhadap <i>Salmonella enteritidis</i> dan <i>Salmonella typhimurium</i></p>

	(Rahayu et al., 2019)		<p><b>Metode pengujian ekstrak</b> melalui uji <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry</i> (GC-MS)</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> dengan mengukur <i>Minimal Inhibitory Concentration</i> (MIC) dengan metode mikrodilusi dan difusi.</p>		linalool, humaladienone. dan	
10.	<p>Variation in secondary metabolite production as well as antioxidant and antibacterial activities of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) at different stages of growth</p> <p>(Ghasemzadeh et al., 2016)</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode ekstraksi</b> rimpang diekstraksi dengan metode refluks menggunakan akuades selama 2 jam pada suhu 65 °C</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> pemisahan kandungan fenolik dan flavonoid dari ekstrak kasar daun, batang dan rimpang, serta mengidentifikasi asam fenolik dengan</p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas antioksidan dan antibakteri</p>	<p>mengandung flavonoid dan asam fenolik yang diidentifikasi, antara lain katekin, quercetin, asam galat, dan asam ferulat</p>	<p>antibakteri terhadap strain bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Listeria monocytogenes</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Salmonella typhimurium</i>, dan <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p>

			<p>metode kromatografi cair kinerja ultra-tinggi (UHPLC), kemudian dilakukan uji chalcone synthase (CHS)</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> Uji DPPH digunakan untuk mengevaluasi aktivitas penangkapan radikal bebas, aktivitas antibakteri diuji dengan mengukur diameter zona hambat melingkar dan perhitungan konsentrasi hambatan minimum (MIC)</p>			
11.	<p>Chemical Composition of the Essential Oil of <i>Zingiber zerumbet</i> var. <i>darcyi</i></p> <p>(Rana et al., 2012a)</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode Ekstraksi</b> rimpang di hidrodistilasi selama 4 jam, destilat diekstraksi dengan dietil eter, lapisan eter dikeringkan di atas natrium sulfat</p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia</p>	<p>Senyawa utama yang teridentifikasi adalah zerumbone, diikuti oleh Tricyclene, <math>\alpha</math>-Pinene, Camphene, <math>\beta</math>-Pinene, Myrcene, <math>\alpha</math>-phellandrene, <i>p</i>-Cymene, Limonene, 1,8- Cineole, Linalool,</p>	-

			<p>anhidrat dan eter didistilasi pada penangas air</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b></p> <p>analisis minyak dengan metode <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry</i> (GC-MS)</p>		<p>Camphor, Camphene hydrate, Terpinen-4-ol, <i>p</i>-Cymen-8-ol, <math>\alpha</math>-Terpineol, Methyl salicylate, Bornyl acetate, Geranyl acetate, <math>\beta</math>-Elemene, <math>\beta</math>-Caryophyllene, <math>\alpha</math>-Humulene, <math>\alpha</math>-Muurolene, <math>\gamma</math>-Cadinene, <math>\delta</math>-Cadinene, Elemol, Nerolidol, Caryophyllene oxide, Humulene epoxide II, <math>\gamma</math>-Eudesmol, <math>\beta</math>-Eudesmol, <math>\alpha</math>-Eudesmol, Hexadecanoic acid.</p>	
12.	<p>Chemical Constituents of the Root Essential Oils of <i>Zingiber rubens</i> Roxb., and <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith</p> <p>(Dai et al., 2013)</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode Ekstraksi</b></p> <p>sampel diekstraksi dengan distilasi air selama 3 jam pada tekanan normal</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b></p> <p>minyak yang dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat, dilarutkan dalam 1 ml heksana untuk uji <i>Gas</i></p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia</p>	<p>Sebanyak 46 senyawa dapat diidentifikasi dari minyak akar, mewakili 99,6% dari kandungan minyak. Seperti monoterpenoid (76,1%) berlimpah dalam minyak. Konstituen utama adalah (<i>Z</i>)- citral (26,1%), camphene (16,3%), sabinene (14,6%), zingiberene (7,2%) dan lavandulyl acetate (6,7%).</p>	-

			<i>Chromatography</i> (GC)			
13.	Identification of Chemical Constituents of <i>Zingiber zerumbet</i> Rhizome Extract Using GC/MS  (Biswabhusan Dash et al., 2020)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode Ekstraksi</b> rimpang disokhletasi menggunakan aseton selama 7-8 jam <b>Metode pengujian senyawa</b> ekstrak yang didapatkan kemudian diuji dengan metode <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry</i> (GC-MS)	Penentuan kandungan senyawa fitokimia	Terdapat 9 senyawa yang teridentifikasi diantaranya Diacetone alcohol, $\alpha$ -Humulene, Octylcyclohexane, Caryophyllene oxide, Humulene epoxide, Aromadendrene oxide, Eudesm-7(11)-en-4-ol, Zerumbone, dan 14-hydroxy- $\alpha$ -Muurolene	-
14.	Antioxidant Activities and Cytotoxicity of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith Rhizome  (Nag et al., 2013)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode Ekstraksi</b> rimpang direndam dalam 1 liter etanol pada suhu 35,5°C dan disimpan di tempat gelap selama 7 hari, lalu disaring dan diuapkan hingga kering. <b>Metode pengujian</b> dilakukan penentuan uji pelifenol total dan uji flavonoid total dengan <i>UV-visible</i>	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas sebagai antioksidan	Kandungan polifenol total adalah 33,64 $\pm$ 3,22 mg GAE/g, kandungan flavonoid total adalah 26,79 $\pm$ 0,68 mg setara kuersetin/g ekstrak (QUE/g) serta ditemukan kaempferol sebanyak 11,63 $\pm$ 0,09 mg/g ekstrak	sebagai antioksidan

			<p>spectrophotometer, dan penentuan kandungan fenolik dengan analisis HPLC.</p> <p><b>senyawa</b></p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antioksidan diuji dengan metode 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)</p>			
15.	<p>Chemical composition and biological activity of the essential oil of rhizome of <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith</p> <p>(B et al., 2014)</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah (<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p><b>Metode Ekstraksi</b> rimpang dimasukkan ke dalam ekstraktor minyak, minyak dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat dan disimpan pada suhu 4±2 °C.</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> minyak hasil ekstraksi diuji dengan metode <i>Gas chromatography-mass spectrometry</i></p>	<p>Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas sebagai antioksidan, antibakteri, dan antileishmanial</p>	<p>minyak atsiri mengarah pada identifikasi sepuluh senyawa utama yang terdapat pada 98,4% minyak. Zerumbone (75,2%), α-caryophyllene (7,1%), camphene (5,1%), eucalyptol (2,4%), dan kamper (3,0%) adalah komponen utama pada minyak. Kandungan fenolik total minyak adalah 5,05 mg/100 g</p>	<p>antioksidan, antibakteri terhadap <i>Cryptococcus neoformans</i> ATCC 90113, <i>Plasmodium falciparum</i> D6 dan <i>Plasmodium falciparum</i> W2 serta antileishmanial terhadap <i>Leishmania</i></p>

			(GC-MS). Kandungan total fenolik minyak esensial ditentukan dengan metode kolorimetri Folin-Ciocalteu <b>Metode pengujian bioaktivitas</b> efek antioksidan dilihat dengan uji DPPH, antibakteri diuji dengan metode <i>broth microdilution</i> dan <i>disc gel diffusion</i> , aktivitas antileishmanial diuji terhadap <i>Leishmania donovani promastigotes</i>			<i>donovani promastigotes</i>
16.	Phytochemicals and Biological Activities of <i>Zingiber Zerumbet</i> (L.) Smith  (A. Zakaria & Jamil, 2019)	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)	<b>Metode Ekstraksi</b> rimpang dimaserasi dua kali dengan heksana dan diklorometana pada suhu kamar selama 48 jam.	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas sebagai penghambat tirosinase dan	rimpang menghasilkan dua seskuiterpen yang diidentifikasi sebagai zerumbone dan $\alpha$ -humulene	penghambatan tirosinase yang kuat, dan penghambatan aktivitas asetilkolinesterase yang rendah




			<p><b>Metode pengujian senyawa</b> Penguapan masing-masing pelarut menghasilkan ekstrak kasar heksana (ZZRH) dan ekstrak kasar diklorometana (ZZRD) yang kemudian difraksinasi berdasarkan polaritas pelarut dengan kromatografi kolom</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas uji</b> penghambatan tirosinase dilakukan dengan menggunakan metode <i>dopachrome</i>, Metode Ellman digunakan untuk aktivitas penghambatan acetylcholinesterase</p>	penghambat acetylcholinesterase		
17.	Zerumbone isolated from <i>Zingiber zerumbet</i> inhibits inflammation and	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber</i>	<b>Metode Ekstraksi</b> rimpang dikeringkan dalam oven pada suhu 37°C, lalu digiling	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan bioaktivitas	Kandungan zerumbone ditemukan dari kristalisasi dengan kemurnian 99%	sebagai antiinflamasi

	pain in rats (Somchit et al., 2012)	<i>zerumbet</i> (L.) Smith)	dan direndam dalam metanol selama 3 hari <b>Metode pengujian senyawa</b> ekstrak kemudian difraksinasi kolom dalam silika gel dan dielusi menggunakan campuran larutan organik heksana: etil asetat (8:2; v/v). <b>Metode pengujian bioaktivitas</b> uji antiinflamasi menggunakan model edema kaki, mengukur volume kaki sebelum dan setelah pemberian injeksi zerumbone 10 dan 20 mg/kg, carrageenan 0,05 ml dan prioksikam 20 mg/kg	sebagai antiinflamasi pada tikus		
18.	<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Roscoe ex Sm. from northern India: Potential	Tanaman Lempuyang gajah ( <i>Zingiber</i>	<b>Metode Ekstraksi</b> rimpang dihidrodistilasi selama 4 jam, dalam	Penentuan kandungan senyawa fitokimia dan	minyak atsiri terdiri dari seskuiterpenoid (87,83%), dilanjutkan oleh seskuiterpen teroksigenasi	antiproliferatif, antibakteri terhadap <i>Staphylococcus</i>

	<p>source of zerumbone rich essential oil for antiproliferative and antibacterial applications</p> <p>(Padalia et al., 2019)</p>	<p><i>zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p>rangkap tiga, untuk ekstraksi minyak esensial, minyak didehidrasi dengan Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> anhidrat</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> kandungan kimia minyak atsiri dianalisis dengan teknik <i>Gas Chromatography</i> (GC) dan <i>Gas Chromatography-Mass Spectrometry</i> (GC-MS)</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antibakteri diidentifikasi dengan uji difusi cakram, sedangkan aktivitas antiproliferatif diidentifikasi dengan uji MTT (Microtetrazolium)</p>	<p>bioaktivitas sebagai antibakteri dan antiproliferatif</p>	<p>(80,14%) dan hidrokarbon seskuiterpen (7,69%), hidrokarbon monoterpen (7,50%) dan monoterpen teroksigenasi (2,67%). Kandungan utama minyak atsiri adalah zerumbone (72,86%), humulene (7,09%), camphene (5,04%), humulene oxide I (2,45%), humulene oxide II (1,8%), dan camphor (1,41%)</p>	<p><i>aureus</i>, <i>Streptococcus mutans</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Staphylococcus epidermis</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> dan <i>Salmonella typhimurium</i></p>
19.	<p>Analysis of intraspecific genetic variation,</p>	<p>Tanaman Lempuyang gajah</p>	<p><b>Metode Ekstraksi</b> sampel diekstraksi dengan etanol 95%</p>	<p>Penentuan bioaktivitas sebagai</p>	<p>Kandungan total fenolik 15,24±0,17 dan</p>	<p>aktivitas antioksidan yang ditentukan dengan</p>

	<p>antioxidant and antibacterial activities of <i>Zingiber zerumbet</i></p> <p>(Kaewsri &amp; Deetae, 2016)</p>	<p>(<i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith)</p>	<p>(b/v). lalu 1 gram daun kering ditambahkan 10 ml pelarut dan diaduk pada suhu 37°C selama 14 jam</p> <p><b>Metode pengujian senyawa</b> kandungan total fenolik dalam ekstrak diukur dengan metode Folin-Ciocalteu</p> <p><b>Metode pengujian bioaktivitas</b> aktivitas antioksidan dilihat dengan uji ABTS, sedangkan aktivitas antibakteri dilihat dengan metode difusi cakram agar</p>	<p>antibakteri dan antioksidan</p>	<p>18,02±1,11 mg asam galat/g ekstrak</p>	<p>metode ABTS menunjukkan nilai EC<sub>50</sub> dengan urutan sebagai berikut: 12,74±0,04, 12,13±0,18 dan 11,92±0,13 mg/ml. Aktivitas antibakteri ekstrak etanolik dari sampel yang diuji diuji terhadap patogen: <i>Esherichia coli</i>, <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus cereus</i>, <i>Stapphylococcus aureus</i> dan <i>Stapphylococcus epidermidis</i>. Ditemukan bahwa ekstrak tersebut efektif melawan bakteri patogen gram negatif dan positif, kecuali <i>Stapphylococcus</i></p>
--	---	--	---	------------------------------------	---	--

						<i>epidermidis</i> . Nilai MIC ekstrak terhadap masing-masing patogen adalah 250, 250, 250 dan 3,90 mg/ml
--	--	--	--	--	--	---



## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Tinjauan Teoritis Tanaman Lempuyang Gajah

Tinjauan teori tanaman Lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) Smith mulai dari klasifikasi tumbuhan, gambar tumbuhan, nama daerah atau nama lain, morfologi tumbuhan dan kandungan tumbuhan.

#### 4.1.1 Klasifikasi tumbuhan

Klasifikasi tumbuhan dari Lempuyang gajah *Zingiber zerumbet* (L.) Smith yaitu (Cronquist, 1981).



**Gambar 3.** *Zingiber zerumbet* (L.) Smith

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Class	: Monocotyledon
Ordo	: Zingiberales
Famili	: Zingiberaceae
Genus	: Zingiber
Spesies	: <i>Zingiber zerumbet</i> (L.) Smith

*Zingiber zerumbet* (L.) Smith merupakan bagian dari keluarga Zingiberaceae, salah satu keluarga terbesar dari kerajaan tumbuhan. *Zingiber zerumbet* termasuk tanaman tahunan, aromatic, dan tuberose yang tumbuh di

lokasi lembab dimana pusat distribusinya terletak di wilayah Asia tenggara. Tanaman ini telah digunakan secara tradisional dalam makanan, minuman dan untuk tujuan biomedis serta hiasan (Tan et al., 2018).

Umumnya dikenal sebagai biji pinus, atau sampo jahe, tanaman herbal *Zingiber zerumbet* ini ditemukan tumbuh secara alami di tanah yang lembab dan teduh, dataran rendah atau lereng bukit, sebagai tanaman yang menyebar atau semak belukar. Tanaman herbal ini diyakini berasal dari India dan Malaysia, tetapi karena telah begitu lama dibudidayakan di seluruh Asia tenggara, Pasifik, dan Oseania, hal ini menjadi ketidakpastian mengenai darimana tanaman ini berasal. *Zingiber zerumbet* juga diklaim telah diperkenalkan di seluruh Pasifik oleh pemukim Polinesia kuno (Z. A. Zakaria et al., 2011).

Tanaman *Zingiber zerumbet* biasa disebut jahe liar yang telah digunakan untuk pengobatan sakit perut, sakit gigi, demam, keseleo dan gangguan pencernaan. Selain itu juga digunakan sebagai rempah-rempah jahe (Nongalleima et al., 2011).

Secara umum lempuyang atau yang dikenal juga sebagai *wild gingers* dibedakan menjadi tiga spesies yaitu lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), lempuyang emprit/pahit (*Zingiber americans*), dan lempuyang wangi (*Zingiber aromaticum*). Lempuyang gajah mempunyai ukuran rimpang lebih besar, daging rimpang berwarna kuning, dan berkhasiat sebagai penambah nafsu makan. Lempuyang emprit memiliki bentuk rimpang dan tanaman yang lebih kecil, warna daging rimpang kuning dengan rasa pahit, berkhasiat untuk meningkatkan nafsu makan. Lempuyang wangi memiliki daging rimpang berwarna keputihan dan berbau harum, dan berkhasiat sebagai pelangsing. Salah satu tumbuhan tertentu dari genus ini telah mendapatkan banyak minat

dari para ilmuwan di seluruh dunia karena nilai obatnya yang tinggi yaitu tumbuhan lempuyang gajah atau *Zingiber zerumbet* (L.) Smith (Silalahi, 2018).

#### **4.1.2 Nama daerah atau nama lain**

Tanaman Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) disebut dengan beragam macam nama di Indonesia, sesuai daerahnya seperti lempuyang kapur, lempuyang kebo dan bengle (Jawa), panglay (Sunda), Puni (Kupang) (Juliastuty et al., 2021). Sedangkan pada daerah Sulawesi yaitu lippujang (Bulukumba), dan laja (Jeneponto).

Bukan hanya lintas Indonesia, Lempuyang gajah di seluruh dunia dikenal dengan nama daerahnya masing-masing seperti lempoyang (Malaysia), ghatian dan yaiimu (India), jangli adha (Bangladesh), awapuhi (Hawaii), zurubah (Arab), hong qiu jiang (Cina), dan haeo dam atau bendungan hiao (Thailand Utara) (Z. A. Zakaria et al., 2011).

#### **4.1.3 Morfologi tumbuhan**

Lempuyang merupakan tanaman semak semusim berbatang semu. Batangnya merupakan perpanjangan pelepah daun yang berbentuk bulat. Daun lempuyang mempunyai susunan tunggal berseling, berwarna hijau, berbentuk bulat telur panjang, ujungnya meruncing, dan bagian tepi rata. Rangkaian bunga tanaman berbentuk tandan yang muncul dari batang dalam tanah, yang berwarna hijau atau hijau kemerahan/keunguan. Bagian tanaman yang banyak dimanfaatkan adalah bagian rimpang (Wahyuni et al., 2013).

Lempuyang memiliki batang tegak dengan tinggi sekitar 1-2 meter. Daun dan perbungaan dari *Zingiber zerumbet* berbentuk pinecone muncul dari rimpang yang tebal atau batang bawah yang tumbuh tepat di bawah permukaan tanah. Daun kadang-kadang berwarna keunguan di bawah tunas muda, tipis dengan ukuran sekitar 25-35 cm dengan pelepah mereka sangat kuat di



permukaan bawah. Tangkai daun berukuran sekitar 6 cm sedangkan ligule sangat tipis, utuh, dan lebar, panjangnya sekitar 1,5-2,5 cm. Daun tersusun secara bergantian sepanjang batang semu (pseudostem) yang melengkung dan dapat tumbuh mencapai 1- 2 m. Pembungaan (inflorescence) berukuran 6-12 cm, bewarna hijau ketika masih muda dan menjadi merah ketika sudah tua. Pembungaan muncul dari dari bagaian pseudostem dari daun dan berdekatan dan saling *overlapping* dengan satu braktea dengan braktea lainnya dan membentuk kantong terbuka pada saat bunga terbentuk. Panjang bracteole sekitar 3-3,5 cm dan lebar 2,5 cm sedangkan lebar bracteole kira- kira 2,5 cm dan bentuknya tipis tapi tetap kencang sampai berbuah. Bunga berwarna kuning atau putih pucat, yang biasanya lebih panjang dari pada braktea, rapuh, dan hanya bertahan beberapa jam, biasanya muncul pada bulan Agustus dan September dan muncul dari bracts paling rendah terlebih dahulu, dan ketika habis, bunga mengering dan jatuh (Silalahi, 2018).

Tanaman *Zingiber zerumbet* diidentifikasi dengan batang yang berukuran 0,9-1,2 m, rimpang berwarna keputihan dibagian luar dan berwarna kuning pucat dibagian dalam, mempunyai batang berakar besar, tidak banyak bercabang, tekstur keras, berwarna kuning didalam dengan aroma jahe yang kuat, disertai sedikit rasa pahit, memiliki akar berserat, batang berdaun dengan tinggi 0,9-1,5 m. Daun berukuran 5-7,5 cm, tidak bertangkai dan berbentuk lonjong, meruncing dan pangkal menyempit. Batang berbunga setinggi 30-45 cm berbentuk panjang, kuat dan sedikit lentur. Bunga berwarna kuning belerang, dengan paku tumpul berbentuk kerucut-lonjong atau bulat telur dengan lebar hingga 5 cm (Liu & Specht, 2019).

Rimpang *Zingiber zerumbet* terdapat cabang tidak beraturan dengan nodus dan ruas. Daun dengan panjang 6-12 cm dan lebar 1,5-2,5 cm.

Permukaan luar rimpang berwarna abu-abu tetapi bagian dalam berwarna kuning dengan bau aromatik dan sedikit pahit. Mikromorfologi pada tanaman *ingiber zerumbet* (L.) Smith (Das et al., 2018):

1. Daun : Bentuk sel epidermis atas dan bawah tidak beraturan. Garis dinding sel bergelombang. Stomata dengan tipe parasit
2. Batang : Banyak ikatan pembuluh, memiliki susunan berkas pengangkut yaitu floem dan xylem yang letaknya bersebelahan dalam satu jari-jari yang sama dengan jenis tertutup atau tidak memiliki kambium. Endodermis tidak ditemukan, setiap ikatan pembuluh dikelilingi oleh selubung sclerenchymatous yang berkembang dengan baik
3. Akar : Gugus xylem berjumlah 16-18, empulurnya besar dan parenkim

## 4.2 Pembahasan Hasil

### 4.2.1 Kandungan Fitokimia

**Tabel 5.** Kandungan Senyawa *Zingiber zerumbet*

No.	Kandungan Fitokimia	Referensi
1.	( <i>E</i> )-nerolidol 0,1% - 3,1%	(Akhtar et al., 2019) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019)
2.	( <i>E</i> )- $\beta$ -farnesene 0,7%	(Dai et al., 2013)
3.	( <i>E,E</i> )- $\alpha$ -farnesene 1,5%	(Dai et al., 2013)
4.	( <i>Z</i> )-nerolidol 0,1% - 0,4%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013)
5.	( <i>Z</i> )- $\beta$ -farnesene 0,1%	(Dai et al., 2013)
6.	( <i>Z,Z</i> )- $\alpha$ -farnesene 0,1%	(Wu et al., 2017)
7.	( <i>Z</i> )-g-bisabolone 0,2%	(Dai et al., 2013)
8.	2,6,6-trimethylundecan- 1,3-dien-9-yn-5-one 1,9%	(B et al., 2014)

9.	14-hydroxy- $\alpha$ -humulene 0,2%	(Padalia et al., 2019)
10.	14-hydroxy- $\alpha$ -muurolene 0,9%	(Biswabushan Dash et al., 2020)
11.	1,5,9-decatriene 1,3%	(Rahayu et al., 2019)
12.	1,5-heptadiene 0,3%	(Dai et al., 2013)
13.	1,6-octadien-3-ol 0,7%	(Dai et al., 2013)
14.	1,8-cineole 0,4% - 1,7%	(Akhtar et al., 2019) (Tian et al., 2020) (Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
15.	1-formyl-2,2,6-trimethyl- 3-cis-(3-methylbut-2- enyl)-5-cyclohexene 2,4%	(Wu et al., 2017)
16.	2-thujene 1,1%	(Wu et al., 2017)
17.	2-heptanol acetate 0,4%	(Dai et al., 2013)
18.	2-nonanone 0,1%	(Dai et al., 2013)
19.	3,6,6-trimethyl- bicyclo[3.1.1]hept-2-ene 1,8%	(Wu et al., 2017)
20.	3-carene 0,1%	(Wu et al., 2017)
21.	7- Pentadecen-5-yne 7,0%	(Rahayu et al., 2019)
22.	<i>allo</i> -Aromadendrene epoxide 0,4%	(Padalia et al., 2019)
23.	Aromadendrene oxide 1,98%	(Biswabushan Dash et al., 2020)
24.	Asam galat $4,00 \pm 0,01$	(Kothandraman & Shanmugam, 2018)

	mg/g - 18.02±1.11 mg/g	(Ghasemzadeh et al., 2016) (Kaewsri & Deetae, 2016)
25.	Asam ferulat -	(Ghasemzadeh et al., 2016)
26.	Asam hidroksil benzoate 6,10 ± 0,10 mg/g	(Kothandraman & Shanmugam, 2018)
27.	Asam kumarat 1,90 ± 0,02 mg/g	(Kothandraman & Shanmugam, 2018)
28.	Asam sinamat 1,43 ± 0,02 mg/g	(Kothandraman & Shanmugam, 2018)
29.	Asam vallinat 2,43 ± 0,08 mg/g	(Kothandraman & Shanmugam, 2018)
30.	Bicyclo[2.2.1]heptane-2- one 0,9%	(Rahayu et al., 2019)
31.	Bicyclol (3,1,1 Heptane. 2,6,6- trimethy 1,6%	(Rahayu et al., 2019)
32.	Borneol 0,1% - 2%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013)
33.	Bornyl acetate 0,5%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
34.	Calamenene 0,4%	(Akhtar et al., 2019)
35.	Camphene 1,9% - 16%	(Akhtar et al., 2019) (Tian et al., 2020) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (B et al., 2014) (Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
36.	Camphor 1,4% - 3,8%	(Tian et al., 2020) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (B et al., 2014) (Rana et al., 2012)
37.	Caryophylla-4 (14),8 (15)-	(Akhtar et al., 2019)

	dien-5.alpha.-ol 3,8%	
38.	Caryophyllene oxide 1,1% - 5,6%	(Akhtar et al., 2019) (Tian et al., 2020) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (B et al., 2014) (Biswabushan Dash et al., 2020) (Rana et al., 2012)
39.	Cinerone 1,4%	(Wu et al., 2017)
40.	Cis-1,7-Octadiene-3-yl acetate 1,5%	(Rahayu et al., 2019)
41.	Citronelly acetate 0,1%	(Dai et al., 2013)
42.	Citronellal 1,4%	(Dai et al., 2013)
43.	Curdione 1,2%	(Rahayu et al., 2019)
44.	Cyclone 0,11%	(B et al., 2014)
45.	Cyclohexanemethanol 1,1%	(Dai et al., 2013)
46.	Dehydro-aromadendrene 0,2%	(Dai et al., 2013)
47.	Diacetone alcohol 10,6%	(Biswabushan Dash et al., 2020)
48.	Eucalyptol 2,4% - 2,5%	(Wu et al., 2017) (B et al., 2014)
49.	Eudesm-7(11)-en-4-ol 2,8%	(Biswabushan Dash et al., 2020)
50.	Eugenol 0,4%	(Dai et al., 2013)
51.	Elemol 0,1%	(Rana et al., 2012)
52.	Fanchon 0,1%	(Wu et al., 2017)
53.	Farnesol 0,8%	(Akhtar et al., 2019)
54.	Fenchene 4,7%	(Wu et al., 2017)
55.	Flavonoid total	(Nag et al., 2013)

	26.79±0.68 mg	
56.	Geraniol 0,8%	(Dai et al., 2013)
57.	Geranyl acetate 0,1% - 1,6%	(Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
58.	Germacrene D 0,3%	(Dai et al., 2013)
59.	Gingerglikolipid b -	(Kapitan et al., 2017)
60.	Humaladienone 10,4%	(Rahayu et al., 2019)
61.	Humulene oksida 1,2% - 4,9%	(Akhtar et al., 2019) (B et al., 2014) (Biswabushan Dash et al., 2020)
62.	Humulene oksida I 2,4% - 3,8%	(Tian et al., 2020) (Padalia et al., 2019)
63.	Humulene oksida ii 1,8% - 7,3%	(Tian et al., 2020) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
64.	Isobornyl acetate 0,3%	(Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019)
65.	Kaempferol 29% - 46%	(Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016) (Nag et al., 2013)
66.	Katekin 38,6% - 127,5%	(Ghasemzadeh et al., 2016)
67.	Lavandulyl acetate 6,7%	(Dai et al., 2013)
68.	Ledane 3,4%	(Rahayu et al., 2019)
69.	Limonene 0,2% - 0,4%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
70.	Luteolin 60,8% - 140,9%	(Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016)
71.	Linalool 0,1% - 10%	(Wu et al., 2017) (Rahayu et al., 2019) (Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
72.	Methyl salicylate 0,3%	(Rana et al., 2012)

73.	Myrtenal 0,1%	(Wu et al., 2017)
74.	Myricetin 101,6%	(Ghasemzadeh et al., 2016)
75.	Myrcene 0,1%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
76.	Nerolidol 0,1%	(Rana et al., 2012)
77.	nonen-1-ol 1,7%	(Akhtar et al., 2019)
78.	Ocimene 0,4%	(Wu et al., 2017)
79.	Octylcyclohexane 0,6%	(Biswabushan Dash et al., 2020)
80.	<i>p</i> -cimene 0,1% - 0,2%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
81.	Phytone 0,4%	(Wu et al., 2017)
82.	Patchulane 1,5%	(Rahayu et al., 2019)
83.	Pentadecanoic acid 1,1%	(Rahayu et al., 2019)
84.	Phenolic total 15,24±0,17 mg/g	(Kaewsri & Deetae, 2016)
85.	Polyphenol total 33.64±3.22 mg	(Nag et al., 2013)
86.	Quercetin 25,1% - 141,7%	(Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016)
87.	Rutin 62,7% - 244,4%	(Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016)
88.	Selina-4(14), 11-diene 0,3%	(Dai et al., 2013)
89.	Sabinene 14%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013)
90.	Sylvestrene 1,1%	(Wu et al., 2017)
91.	Terpinen-4-ol 0,4% - 1,5%	(Akhtar et al., 2019) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019)

92.	Trans- $\alpha$ -bergamotene 0,1%	(Dai et al., 2013)
93.	Tricyclen 0,2% - 0,3%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
94.	Zerumbone 1,2% - 91%	(da Silva et al., 2017) (Akhtar et al., 2019) (Ghasemzadeh et al., 2017) (Tian et al., 2020) (Kapitan et al., 2017) (Lallo et al., 2018) (Wu et al., 2017) (Rahayu et al., 2019) (Padalia et al., 2019) (A. Zakaria & Jamil, 2019) (B et al., 2014) (Biswabushan Dash et al., 2020) (Dai et al., 2013) (Somchit et al., 2012) (Rana et al., 2012)
95.	Zingiberene 7,2%	(Dai et al., 2013)
96.	Z-citral 26,1%	(Dai et al., 2013)
97.	$\alpha$ -caryophyllene 7,1%	(B et al., 2014)
98.	$\alpha$ - humulene 6,5% - 15,6%	(Akhtar et al., 2019) (Tian et al., 2020) (Rahayu et al., 2019) (Padalia et al., 2019) (A. Zakaria & Jamil, 2019) (Biswabushan Dash et al., 2020) (Rana et al., 2012)
99.	$\alpha$ -bisabolol 1,03%	(Akhtar et al., 2019)
100.	$\alpha$ -cedrene 0,9%	(Dai et al., 2013)
101.	$\alpha$ -eudesmol 0,1% - 0,2%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
102.	$\alpha$ -gurjunene 0,3%	(Dai et al., 2013)
103.	$\alpha$ -pinene 0,5% - 3,3%	(Akhtar et al., 2019) (Padalia et al., 2019) (B et al., 2014) (Dai et al., 2013) (Rana et



		al., 2012)
104.	$\alpha$ -phellandrene 0,1% - 0,2%	(Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
105.	$\alpha$ -terpinene 0,36%	(Akhtar et al., 2019)
106.	$\alpha$ -terpineol 0,1% - 0,4%	(Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013)
107.	$\alpha$ -thujenal 0,3%	(Dai et al., 2013)
108.	<i>ar</i> -curcumene 1,1%	(Dai et al., 2013)
109.	$\beta$ -caryophyllene 0,8% - 8,6%	(Akhtar et al., 2019) (Tian et al., 2020) (Wu et al., 2017) (Padalia et al., 2019) (Rana et al., 2012)
110.	$\beta$ -ocimene 1,4%	(Akhtar et al., 2019)
111.	$\beta$ -bisabolone 1,9%	(Dai et al., 2013)
112.	$\beta$ -elemene 0,2%	(Dai et al., 2013)
113.	$\beta$ -eudesmol 0,5% - 0,9%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
114.	$\beta$ -pinene 0,1% - 0,5%	(Padalia et al., 2019) (Dai et al., 2013) (Rana et al., 2012)
115.	$\beta$ -selinene 0,6%	(Dai et al., 2013)
116.	$\gamma$ -eudesmol 0,1%	(Rana et al., 2012)
117.	$\gamma$ -terpinene 0,2%	(Wu et al., 2017)
118.	$\delta$ -cadinene 0,1%	(Rana et al., 2012)
119.	$\delta$ -3-carene 0,3%	(Padalia et al., 2019)
120.	<i>n</i> -octanal 0,1%	(Dai et al., 2013)
121.	<i>g</i> -elemene 0,2%	(Dai et al., 2013)
122.	<i>g</i> -terpinene 0,1%	(Dai et al., 2013)

123.	<i>g</i> -curcumene 0,1%	(Dai et al., 2013)
124.	<i>epi</i> - Bicyclosesquiphellandrene 2,6%	(Dai et al., 2013)

Pada hasil skrining dari 19 jurnal yang ada, terdapat 124 senyawa fitokimia yang terkandung pada rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith). Penelitian ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan pada 19 jurnal yang diteliti, diantaranya persamaan kandungan senyawa fitokimia yang teridentifikasi di berbagai jurnal sedangkan perbedaannya terdapat pada senyawa yang sama namun diidentifikasi dengan konsentrasi yang berbeda pada berbagai jurnal tersebut.

Hasil skrining juga menunjukkan adanya senyawa-senyawa mayor yang terkandung dalam rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) diantaranya :

#### 4.2.1.1 Zerumbone

Zerumbone dengan rumus molekul  $C_{15}H_{22}O$  merupakan golongan senyawa seskuiterpen yang ditandai dengan kerangka karbonnya berasal dari tiga satuan isoprena. Zerumbone pertama kali diisolasi dari minyak atsiri rimpang *Zingiber zerumbet* pada tahun 1956, sedangkan struktur kimianya ditentukan pada tahun 1960 dan kemudian dikarakterisasi dengan NMR dan sinar-X. Zerumbone memiliki tiga ikatan rangkap, dua terkonjugasi dan satu terisolasi, serta gugus karbonil terkonjugasi ganda dalam struktur cincin 11-membran (Oh et al., 2018). Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa zerumbone memiliki berbagai aktivitas biologis, termasuk aktivitas antimikroba, antioksidan, antidiabetes, antikanker, antiinflamasi, antialergenik, dan antiangiogenik (Lallo et al., 2018).

#### 4.2.1.2 Diacetone alcohol

Diacetone alcohol merupakan turunan senyawa keton. Diacetone alcohol termasuk senyawa organik yang digunakan sebagai bahan baku pada proses pembuatan methyl isobutyl keton dan methyl pentadiol dengan cara hidrogenasi dan digunakan sebagai bahan antara (intermediet). Fungsi lain dari diacetone alcohol adalah sebagai pelapis (coating), bahan aditif pada bahan bakar, pelarut lemak, pelarut cellulose acetat dan *synthetic organic* lainnya. Karena memiliki titik didih yang tinggi yaitu 168 °C sehingga tidak mudah menguap, berbau khas, dan secara wajar bukan merupakan senyawa yang berbahaya (Marczewski et al., 2018).

#### 4.2.1.3 Kaempferol

Kaempferol merupakan salah satu aglikon flavonoid yang paling banyak ditemui dalam bentuk glikosida. Kaempferol adalah tetrahidroksiflavon di mana empat gugus hidroksi terletak pada posisi 3, 5, 7, dan 40, dan termasuk senyawa berwarna kuning. Kaempferol ditemukan pada berbagai bagian tumbuhan, seperti biji, daun, buah, bunga, bahkan seluruh bagian tanaman. Kaempferol dan turunan glikosilasinya telah terbukti bersifat kardioprotektif, neuroprotektif, anti inflamasi, antidiabetik, antioksidan, antimikroba, antitumor, dan memiliki aktivitas antikanker (Imran et al., 2019).

#### 4.2.1.4 Katekin

Katekin merupakan kerabat tanin terkondensasi yang juga sering disebut polifenol karena banyaknya gugus fungsi hidroksil yang dimilikinya. Katekin teh hijau tersusun sebagian besar atas senyawa-senyawa katekin (C), epikatekin (EC), galokatekin (GC), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat (ECG), galokatekin galat (GCG), dan epigalokatekin galat (EGCG), perbedaan dari beberapa jenis katekin dilihat dari jumlah gugus hidroksilnya.

Katekin bersifat asam lemah ( $pK_{a1}=7,72$  dan  $pK_{a2}=10,22$ ). Sukar larut dalam air dan sangat tidak stabil diudara terbuka, bersifat mudah teroksidasi pada pH mendekati netral (pH 6,9). Katekin juga mudah terurai oleh cahaya dengan laju reaksi lebih besar pada pH rendah 3,45 dibanding pH 4,9 (Anjarsari, 2016).

#### 4.2.1.5 Luteolin

Luteolin atau yang dikenal juga 3,4,5,7-tetrahidroksiflavon merupakan senyawa polifenol golongan flavon yang terdapat dalam jumlah yang berlimpah di dalam lada hijau, perilla, seledri, dan teh chamomile. Luteolin juga dilaporkan memiliki aktivitas antitumor dengan menghambat proses proliferasi sel, menginduksi aktivitas DNA topoisomerase II, dan menghambat pembentukan sel kanker. Luteolin dapat menginduksi terjadinya apoptosis pada banyak jenis sel kanker. Senyawa ini juga mampu menghambat berbagai jenis rangsangan yang diinduksi oleh ekspresi gen proinflamatori dan senyawa kimia penginduksi karsinogenesis payudara, kolon dan kulit (Anjarsari, 2016).

#### 4.2.1.6 Linalool

Linalool termasuk senyawa terpenoid alkohol, berbentuk cair, tidak berwarna, beraroma wangi dan mempunyai rumus empiris  $C_{10}H_{18}O$ , serta rumus struktur 3,7 dimetil-1,6 oktadien-3-ol. Linalool merupakan senyawa alkohol rantai lurus. Senyawa linalool merupakan komponen yang menentukan intensitas aroma harum, sehingga minyak ketumbar dapat dipergunakan sebagai bahan baku parfum, aromanya seperti minyak lavender (Handayani & Juniarti, 2012).

#### 4.2.1.7 Myricetin

Myricetin dengan nama IUPAC 3,5,7-Trihidroksi-2-(3, 4, 5-trihidroksi fenil)-4-chromenone merupakan flavonoid alami. Myricetin pertama kali diisolasi dari Myricanagi, sebagai kristal berwarna kuning. Myricetin bersifat

padat tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti etanol, DMS (Dimethyl Sulfoxide) dan DMF (Dimethyl Formamide), THF (Tetrahydrofuran). Sedikit larut dalam air mendidih. Myricetin juga dikenal sebagai marijuanacetin atau myricetol, termasuk dalam kelas senyawa organik yang dikenal sebagai flavonol. Penelitian terbaru mengklaim bahwa myricetin menghasilkan efek kuratif yang berbeda pada kanker, diabetes, efek jantung. Myricetin juga memiliki beberapa aktivitas farmakologis lainnya seperti antioksidan, aktivitas agregasi antiplatelet, antikanker, antipenuaan, antiinflamasi, antihipertensi, analgesik antidiabetes, kardioprotektif, dan neuroprotektif (Nalla & Suhasin, 2021).

#### 4.2.1.8 Quercetin

Quercetin adalah salah satu flavonol terbaik. Quercetin ditemukan di banyak buah dan sayuran tapi juga banyak terdapat pada bawang merah, apel merah, anggur merah, teh, cranberry, kangkung, paprika dan brokoli. Quercetin juga mewakili subklas flavonol yang menunjukkan nutrisi dan sifat farmasinya. Struktur cincin dan konfigurasi aglyconnya dari kelompok hidroksil, menjadikannya salah satu dari flavonoid yang paling ampuh dalam hal kemampuan antioksidan. Quercetin telah menunjukkan kemampuan untuk mencegah oksidasi *low-density lipoprotein* (LDL) dengan menangkal radikal bebas dan ion-ion transisi sehingga quercetin membantu dalam pencegahan penyakit tertentu, seperti kanker, aterosklerosis, dan peradangan kronis, yang umumnya disebabkan oleh adanya ikatan rangkap pada flavon cincin aromatik pusat yang ditandai oleh struktur planar (Arifin & Ibrahim, 2018).

#### 4.2.1.9 Camphene

Camphene (3,3-dimetil-2-metilen-norkamfana) termasuk golongan monoterpen bisiklik yang menguap pada temperatur ruang dan berbau tajam

atau pedas (Dewick, 2002). Camphene merupakan konstituen minyak damar wangi yang dapat menurunkan kolesterol dan trigliserida (TG) dalam plasma tikus hiperlipidemia tanpa mempengaruhi aktivitas reduktase HMG-CoA dan menunjukkan bahwa efek hipokolesterolemia dan hipotrigliseridemia yang dikaitkan dengan mekanisme aksi yang berbeda dari obat golongan statin (Vallianou & Hadzopoulou-cladaras, 2016).

#### 4.2.1.10 Z-citral

Citral adalah terpen aldehida yang dibentuk oleh campuran dua isomer struktural (Z-citral atau neral dan E-citral atau geranial) dan tanaman berbasis citral merupakan bahan baku potensial atau sumber terpen untuk formulasi kosmetik, seperti parfum, krim, lotion atau sampo. Citral memiliki banyak bioaktivitas seperti antispasmodik, antiinflamasi, antipiretik, diuretik, dan obat penenang. Senyawa ini juga memiliki sifat antimikroba yang kuat dan efek feromonal pada serangga. Citral juga biasanya digunakan dalam sintesis vitamin A (Pereira et al., 2021).

#### 4.2.1.11 $\alpha$ -humulene

$\alpha$ -humulene merupakan senyawa golongan seskuiterpen yang banyak ditemukan pada tanaman. Senyawa ini menunjukkan sifat antiinflamasi oral dan topikal dalam model inflamasi yang berbeda dengan mengurangi tingkat sitokin inflamasi dan pro-ekspresi protein inflamasi melalui penghambatan jalur faktor nuklir kB (NF-kB). Selain itu,  $\alpha$ -humulene juga memiliki aktivitas antikanker berdasarkan kemampuannya untuk mengaktifkan apoptosis, menghentikan siklus sel, atau menghambat penanda proangiogenik, invasif, dan proliferasi (Rogerio et al., 2009).

## 4.2.2 Bioaktivitas

**Tabel 6.** Bioaktivitas *Zingiber zerumbet*

No.	Senyawa	Bioaktivitas	Referensi
1.	Zerumbone	Antibakteri	(da Silva et al., 2017) (Tian et al., 2020) (Kapitan et al., 2017) (Lallo et al., 2018) (Rahayu et al., 2019) (Ghasemzadeh et al., 2016) (B et al., 2014) (Padalia et al., 2019) (Kaewsri & Deetae, 2016)
2.	Zerumbone	Imunosupresan	(Akhtar et al., 2019)
3.	Zerumbone	Anti proliferative	(Ghasemzadeh et al., 2017) (Padalia et al., 2019)
4.	Zerumbone	Antioksidan	(Tian et al., 2020) (Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016) (Nag et al., 2013) (B et al., 2014) (Kaewsri & Deetae, 2016)
5.	$\alpha$ -caryophyllene, $\beta$ -caryophyllene, zerumbone	Insektisida	(Wu et al., 2017)
6.	Zerumbone	Antileishmanial	(B et al., 2014)
7.	$\alpha$ -humulene, zerumbone	Penghambat tyrosinase	(A. Zakaria & Jamil, 2019)
8.	Humulene, zerumbone	Penghambat asetilkolinesterase	(A. Zakaria & Jamil, 2019)
9.	Zerumbone	Antiinflamasi	(Somchit et al., 2012)

Pada hasil skrining 19 jurnal dengan melihat bioaktivitas yang ditunjukkan pada tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) terdapat berbagai penelitian yang telah mengungkapkan efek bioaktivitas yang berbeda, khususnya yang telah dibahas dalam jurnal terbukti memiliki aktivitas sebagai antibakteri (da Silva et al., 2017) (Tian et al., 2020) (Kapitan et al., 2017) (Lallo et al., 2018) (Rahayu et al., 2019) (Ghasemzadeh et al., 2016) (B et al., 2014) (Padalia et al., 2019) (Kaewsri & Deetae, 2016), immunosupresan (Akhtar et al., 2019), antiproliferatif (Ghasemzadeh et al., 2017) (Padalia et al., 2019), antioksidan (Tian et al., 2020) (Kothandraman & Shanmugam, 2018) (Ghasemzadeh et al., 2016) (Kaewsri & Deetae, 2016), insektisida (Wu et al., 2017), antileishmanial (B et al., 2014), penghambat tyrosinase (A. Zakaria & Jamil, 2019), penghambat asetilkolinesterase (A. Zakaria & Jamil, 2019), dan antiinflamasi (Somchit et al., 2012).

*Zingiber zerumbet* menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Streptococcus mutans* dengan uji kurva *time kill*, dengan hasil aksi maksimum dalam interval 48-72 jam mengurangi 94,78% koloni bakteri pada konsentrasi 250 g/ml dan membunuh semua bakteri pada konsentrasi 500 g/ml (da Silva et al., 2017). Pada jurnal lainnya menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap *Enterococcus faecalis* ATCC 29212, *Stafilokokus aureus* ATCC 6538P, *Bacillus subtilis* CMCC (B) 63501, *Pseudomonas aeruginosa* CMCC (B) 10104, *Escherichia coli* ATCC 25922, *Proteus vulgaris* CMCC (B). Hasil menunjukkan senyawa zerumbone memiliki diameter zona hambat berkisar antara 9,48 hingga 15,72 mm dan menunjukkan MIC (31,25-250,00  $\mu$  g/mL) dan MBC (62.50–250.00  $\mu$  g/mL). Minyak esensial segar memiliki diameter zona hambat (9,36-14,54 mm), MIC (78,13-156,25  $\mu$  g/mL), dan MBC (156.25–312.25  $\mu$  g/mL). Sedangkan pada minyak esensial kering memiliki



diameter zona hambat (8,23-12,31 mm), MIC (156,25 - 1250,00  $\mu$  g/ml), dan MBC terhadap semua strain yang diuji berkisar antara 156,25 - 2500,00  $\mu$  g/ml (Tian et al., 2020). Aktivitas antibakteri juga ditemukan terhadap *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Eschericia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa* menggunakan uji KHTM dilakukan pada konsentrasi ekstrak etanol 50 mgmL<sup>-1</sup> sampai 250 mgmL<sup>-1</sup> dengan hasil luas zona hambat pada bakteri *Pseudomonas aeruginosa* 2,59 mm, pada bakteri *Eschericia coli* 1,98-2,89 mm, pada bakteri *Bacillus subtilis* 2,27-3,42 mm, dan pada bakteri *Staphylococcus aureus* 3,85-7,71 mm. Hasil data uji KHTM memperlihatkan ekstrak etanol *Zingiber zerumbet* mempunyai aktivitas yang sedang. Ini berkaitan dengan kondisi ekstrak yang masih belum murni. Banyaknya senyawa yang terkandung dalam ekstrak kasar etanol ini mengakibatkan adanya sifat saling meniadakan (antagonis) antar senyawa dalam ekstrak sehingga mengurangi aktivitas antibakteri ekstrak etanol *Zingiber zerumbet* (Kapitan et al., 2017). Aktivitas antibakteri diidentifikasi terhadap *Mycobacterium tuberculosis* dengan menggunakan pembanding suspensi standar Mc. Farland pada konsentrasi 0,5%, 0,1%, 0,05%, dan 0,01%, dengan hasil penghambatan tertinggi yaitu 90% pada konsentrasi 0,5%, 88% pada konsentrasi 0,1%, 86% pada konsentrasi 0,05% dan 85% pada konsentrasi 0,01% (Lallo et al., 2018). Jurnal lain juga menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap *Salmonella enteritidis* dan *Salmonella typhimurium*. Ekstrak dengan konsentrasi 10% memberikan aktivitas antibakteri paling tinggi dibandingkan konsentrasi lainnya. ekstraksi *Zingiber zerumbet* menggunakan pelarut etanol 95% memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi terhadap *Salmonella enteritidis* sedangkan *Salmonella typhimurium* efektif dihambat oleh ekstrak dengan konsentrasi etanol 45% dan 7,5% (Rahayu et al., 2019). Adanya

aktivitas antibakteri terhadap berbagai bakteri dengan zona inhibisi masing-masing *Staphylococcus aureus* (7,3 mm), *Bacillus subtilis* (5,9 mm), *Listeria monocytogenes* (1,8 mm), *Escherichia coli* (3,5 mm), *Salmonella typhimurium* (5,3 mm), dan *Pseudomonas aeruginosa* (7,0 mm) pada ekstrak rimpang *Zingiber zerumbet*. Konsentrasi *Minimal Inhibitory Concentration* (MIC) dari ekstrak *Zingiber zerumbet* berkisar antara 30 sampai 100 g/ml. Nilai MIC yang lebih rendah menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih kuat (penghambat bakteri yang kuat aktif pada konsentrasi rendah). Oleh karena itu, hasil menunjukkan bahwa di antara strain bakteri yang diselidiki, *Staphylococcus aureus* lebih sensitif terhadap ekstrak daun *Zingiber zerumbet*, dengan MIC 30,0 g/ml dan lainnya sensitif terhadap ekstrak rimpang, dengan MIC 40-100 g/ml. MIC kontrol positif (gentamisin dan ciprofloxacin) berkisar antara 0,20 hingga 1,00 g/ml, yang lebih rendah dibandingkan ekstrak *Zingiber zerumbet* (Ghasemzadeh et al., 2016). Adanya aktivitas antibakteri ekstrak minyak esensial *Zingiber zerumbet* yang baik terhadap *Cryptococcus neoformans* ATCC 90113 dengan nilai IC<sub>50</sub> 8µg/ml. Zerumbone juga menunjukkan aktivitas yang baik dengan nilai IC<sub>50</sub> sebesar 3,9 g/ml dan 4,4 g/ml terhadap *Plasmodium falciparum* D6 dan *Plasmodium falciparum* W2 (B et al., 2014). Aktivitas antibakteri dengan zona penghambatan pertumbuhan dan MIC untuk ekstrak minyak atsiri terhadap strain bakteri yang diuji masing-masing berkisar antara 6 hingga 10 mm dan 166,6 hingga 833,0µg/ml. Minyak atsiri menunjukkan aktivitas maksimal terhadap *Staphylococcus aureus*-96 (166.6µg/ml) diikuti oleh *Streptococcus mutans* (208.0µg/ml) dan *Escherichiacoli* (208.0µg/ml), dan aktivitas antagonis moderat terhadap strain lain yang diuji yaitu *Staphylococcus aureus* -2940, *Bacillus subtilis*, dan *Staphylococcus epidermis* (833.0µg/ml), *Klebsiella pneumoniae* (666,0µg/ml),

dan *Salmonella typhimurium* (666,0µg/ml). Zona penghambatan pertumbuhan dan MIC untuk zerumbone terhadap strain bakteri yang diuji masing-masing berkisar antara 3 hingga 13 mm dan 52,0 hingga 666,0µg/mL. *Staphylococcus aureus*-96 (52.0µg/mL) dan *Streptococcus mutans* (62.5µg/mL), dan *Escherichia coli* (208.0µg/mL) diikuti oleh *Staphylococcus aureus*-2940 (208.0), *Klebsiella pneumoniae* (208.0µg/ mL), dan *Salmonella typhimurium* (208.0µg/mL) (Padalia et al., 2019). Sedangkan pada jurnal lainnya ditemukan aktivitas antibakteri ekstrak etanolik *Zingiber zerumbet* dari sampel yang diuji terhadap bakteri *Esherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Bacillus cereus*, *Stapphylococcus aureus* dan *Stapphylococcus epidermidis*. Ditemukan bahwa ekstrak tersebut efektif melawan bakteri patogen gram negatif dan positif, kecuali *Stapphylococcus epidermidis*. Nilai MIC ekstrak terhadap masing-masing patogen adalah 250, 250, 250 dan 3,90 mg/ml (Kaewsri & Deetae, 2016). Dari berbagai kumpulan penelitian diatas ditemukan adanya persamaan aktivitas yang ditunjukkan yaitu sebagai antibakteri, namun hasil yang ditemukan berbeda-beda berdasarkan metode pengujian, konsentrasi sampel, bakteri yang diuji maupun kualitas sampel itu sendiri.

*Zingiber zerumbet* diketahui menunjukkan adanya aktivitas immunosupresan pada penelitian ini, dengan melihat aktivitas kemotaksik, hambatan integrin CD18, dan fagositosis. Pada uji kemotaksik dan uji integrin CD18 ketiga sampel menunjukkan efek penghambatan yang bergantung pada dosis, hasil pada penghambatan aktivitas fagositosis ekstrak *Zingiber zerumbet* sebesar 55,43%, minyak esensial *Zingiber zerumbet* sebesar 69,20%, dan zerumbone pada 10 g/mL sebesar 76,97% (Akhtar et al., 2019).

*Zingiber zerumbet* menunjukkan aktivitas antiproliferatif dengan metode pengujian MTT terhadap garis sel kanker HeLa dengan konsentrasi

penghambatan (IC<sub>50</sub>) nilai masing-masing 4,3 dan 7,8 g/ml tanpa toksisitas pada sel normal (Ghasemzadeh et al., 2017). Sedangkan pada penelitian lain menunjukkan adanya aktivitas antiproliferatif dengan pengujian yang sama tetapi menunjukkan hasil yang berbeda yaitu hasil zerumbone menurunkan proliferasi sel kanker paru-paru, payudara, usus besar, hati dan leukemia setelah inkubasi 24 jam dengan IC<sub>50</sub> berkisar 20,60–31,15 µg/ml serta pertumbuhan keratinosit (43,13 µg/ml). Minyak atsiri mempengaruhi proliferasi sel kanker payudara, hati, leukemia dan paru-paru dan pertumbuhan keratinosit dengan kisaran IC<sub>50</sub> 33,37–46,02 µg/ml tetapi sedikit mengubah kelangsungan hidup garis sel usus besar dan ginjal (persen penghambatan  $48,14 \pm 0,47\%$  dan  $44,68 \pm 1,06\%$ ) (Padalia et al., 2019).

*Zingiber zerumbet* juga memperlihatkan adanya aktivitas antioksidan dengan metode uji DPPH dan ABTS pada ekstrak rimpang *Zingiber zerumbet* dengan hasil diameter zona hambat berkisar antara 9,48 hingga 15,72 mm dan menunjukkan MIC minimal (31,25–250,00 µ g/mL) dan MBC (62.50–250.00 µ g/mL) (Tian et al., 2020). Pada jurnal lain teridentifikasi adanya aktivitas antioksidan dengan metode pengujian yang sama, dengan hasil uji DPPH dengan nilai IC<sub>50</sub> 179 g/mL dan uji ABTS dengan nilai aktivitas penangkapan radikal sebesar 77 g/ml (Kothandraman & Shanmugam, 2018). Jurnal lain juga mendapatkan hasil adanya aktivitas antioksidan yang menunjukkan bahwa bagian rimpang tanaman dengan konsentrasi tinggi flavonoid dan asam fenolik menunjukkan aktivitas DPPH dan FRAP tertinggi (Ghasemzadeh et al., 2016).

Aktivitas antioksidan dengan metode uji DPPH pada ekstrak rimpang *Zingiber zerumbet* dengan hasil uji DPPH *Zingiber zerumbet* pada berbagai konsentrasi (0, 30, 60 dan 120 g/ml) menunjukkan efek yang lemah dalam menghambat DPPH. Nilai tersebut signifikan ( $p \leq 0,05$ ) pada konsentrasi yang

diuji. IC<sub>50</sub> adalah 417,14 g/ml untuk *Zingiber zerumbet* dan 2,71 g/ml untuk asam askorbat (Nag et al., 2013). Aktivitas antioksidan dengan metode uji DPPH pada ekstrak rimpang *Zingiber zerumbet* dengan hasil uji penghambatan DPPH minyak esensial *Zingiber zerumbet* menunjukkan aktivitas penghambatan DPPH (IC<sub>50</sub> 1,60 g/ml) yang sebanding dengan asam askorbat standar (IC<sub>50</sub> 1,59µg/ml) (B et al., 2014). aktivitas antioksidan dengan metode uji ABTS pada ekstrak rimpang *Zingiber zerumbet* dengan hasil aktivitas antioksidan yang ditentukan dengan metode ABTS menunjukkan nilai EC<sub>50</sub> 12,13±0,18 mg/ml (Kaewsri & Deetae, 2016). Dari berbagai kumpulan penelitian diatas ditemukan adanya persamaan aktivitas yang ditunjukkan yaitu sebagai antioksidan, namun hasil pada uji DPPH dan uji ABTS yang ditemukan berbeda-beda berdasarkan konsentrasi sampel, maupun kualitas sampel itu sendiri.

*Zingiber zerumbet* diketahui juga menunjukkan adanya aktivitas insektisida pada *Lasioderma serricorne* dengan hasil toksisitas kontak terhadap *Lasioderma serricorne* dewasa dengan nilai LD<sub>50</sub> sebesar 48,3 µg, dan uji efek penolakan bahwa pada konsentrasi uji 78,63 nl/cm<sup>2</sup>, minyak esensial menunjukkan penolakan yang lebih lemah dalam melawan *Lasioderma serricorne* dibandingkan dengan kontrol positif (Wu et al., 2017).

*Zingiber zerumbet* juga mampu bertindak sebagai antileishmanial dengan hasil pada uji antileishmanial minyak essensial menunjukkan aktivitas sedang dengan nilai IC<sub>50</sub> dan IC<sub>90</sub> sebesar 4,6 g/ml dan 18,0 g/ml. Zerumbone menunjukkan aktivitas yang baik dengan IC<sub>50</sub> dan IC<sub>90</sub> <1,6 g/ml dan 4,7 g/ml (B et al., 2014).

*Zingiber zerumbet* menunjukkan adanya aktivitas penghambatan tyrosinase dengan hasil menunjukkan ekstrak kasar heksana (ZZRH) dan

diklorometana (ZZRD) menunjukkan penghambatan tirosinase yang kuat dengan penghambatan 81% dan 97% masing-masing sebanding dengan kontrol positif, asam kojic dengan persentase penghambatan 96%. Terdapat pula aktivitas penghambatan asetilkolinesterase dengan hasil menunjukkan ekstrak kasar heksana (ZZRH) dan diklorometana (ZZRD) memberikan penghambatan aktivitas asetilkolinesterase yang rendah yaitu 6% dan 28% (A. Zakaria & Jamil, 2019).

*Zingiber zerumbet* memiliki aktivitas antiinflamasi pada tikus yang diuji dengan hasil yang diperoleh dari edema kaki yang diinduksi karagenan adalah zerumbone 10 dan 20 mg/kg menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang signifikan ( $P < 0,05$ ) dengan penghambatan maksimum masing-masing 45,67 dan 70,37%. Hal serupa juga diamati dengan uji edema kaki yang diinduksi prostaglandin E2. Zerumbone menghambat edema kaki tikus sebesar 87,80% (Somchit et al., 2012)

### 4.3 Tinjauan Teori Bioaktivitas Tanaman Lempuyang Gajah

#### 4.3.1 Antibakteri

Mikroorganisme atau mikroba merupakan organisme yang ukurannya sangat kecil sehingga memerlukan mikroskop untuk mengamatinya. Oleh sebab itu, mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik. Mikroba hidup di hampir semua lingkungan (air, udara, tanah) maupun di benda mati serta mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang ekstrim. Mikroorganisme yang berada di sekitar kita, ada yang bersifat menguntungkan maupun bersifat merugikan. Contoh mikroorganisme yang merugikan manusia atau menyebabkan penyakit adalah bakteri *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Keempat bakteri tersebut merupakan sebagian kecil dari bakteri patogen yang dapat

menyebabkan penyakit pada manusia, seperti infeksi saluran pernapasan akibat *Bacillus subtilis*, infeksi penyakit kulit dan meningitis akibat *Staphylococcus aureus*, infeksi pencernaan akibat *Escherichia coli*, dan infeksi pneumonia nosokomial akibat *Pseudomonas aeruginosa* (Surah & Kinan, 2019).

Salah satu pilihan pencegahan atau pengobatan terhadap serangan infeksi akibat bakteri dapat dilakukan dengan menggunakan antibiotik (Serment et al., 2012)

Ada banyak senyawa berbeda yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dan banyak istilah yang digunakan untuk mengkategorikan senyawa tersebut. Antimikroba, antibakteri dan antibiotik adalah istilah yang umum digunakan yang kadang-kadang dapat digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan penting antara kata-kata ini. Antimikroba berasal dari kata Yunani *anti* (melawan), *micro* (kecil) dan *bios* (kehidupan) serta mengacu pada semua agen yang bertindak melawan organisme mikroba, yaitu bakteri, virus, parasit dan jamur. Antibiotik berasal dari bahasa Yunani yaitu *anti* (melawan) dan *biotikos* (tentang kehidupan) (BSAC, 2018)

Antibiotik merupakan setiap zat yang digunakan dalam pengobatan dan pencegahan infeksi bakteri yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri (Singh et al., 2018).

Seiring dengan meningkatnya resistensi bakteri di dunia kesehatan, maka perlu adanya penemuan obat baru. Sumber antibakteri baru dapat diperoleh dari senyawa bioaktif yang terkandung dalam suatu tumbuhan (Serment et al., 2012) Contohnya terdapat pada tanaman lempuyang gajah.

#### 4.3.2 Antioksidan

Radikal bebas adalah sekelompok atom yang memiliki satu atau lebih elektron tidak berpasangan sehingga bersifat tidak stabil dan reaktif.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh radikal bebas bercirikan reaksi kimia oksidasi, sehingga muncul istilah stres oksidatif yang merupakan aktivitas penyerangan jaringan yang disebabkan oleh radikal bebas. Keberadaan radikal bebas dapat terjadi dari berbagai proses penyakit, racun, obat-obatan, logam, asap rokok, asap knalpot, dan cahaya matahari. Produksi radikal bebas yang berlebih dapat menyebabkan kerusakan oksidatif yang akhirnya menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker, aterosklerosis, diabetes serta penyakit degeneratif lainnya. Sehingga untuk mencegah efek yang merugikan akibat paparan dan produksi radikal bebas yang berlebih, maka diperlukan senyawa yang bersifat sebagai antioksidan (Santi, 2021)

Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron (*electron donor*) atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil, tetapi mampu menginaktivasi berkembangnya reaksi oksidasi, dengan cara mencegah terbentuknya radikal. Antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi, dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif (Cahyani, 2020)

Manusia memiliki antioksidan dalam tubuh, namun jumlahnya tidak mencukupi untuk mengatasi radikal bebas yang berlebih sehingga dibutuhkan antioksidan eksogen. Antioksidan eksogen dibagi menjadi 2 berdasarkan sumbernya, yaitu antioksidan alami dan antioksidan sintetik. Contoh antioksidan sintetik adalah BHA (*butylated hydroxyanisole*), BHT (*butylated hydroxytoluene*), TBHQ (*tertiary butyl hydroquinone*), dan PG (*propyl gallate*) (Hani et al., 2016).

Antioksidan sintetik dilaporkan memiliki efek samping bersifat hepatotoksik dan karsinogenesis. Kekhawatiran efek samping dari antioksidan sintetik ini menyebabkan pemanfaatan antioksidan alami menjadi salah satu



alternatif yang sangat dibutuhkan karena lebih efektif dan kurang toksik (Zuraida et al., 2017).

Tanaman obat merupakan sumber antioksidan eksogen yang bersifat alami. Antioksidan alami yang terkandung pada tanaman yaitu senyawa polifenol, karotenoid, dan vitamin (Saxena et al., 2013).

Beberapa senyawa kimia dalam tumbuhan yang dapat berkhasiat sebagai antioksidan, diantaranya berasal dari golongan Zingiberaceae terdapat kandungan seperti flavonoid dan terpenoid (Wandita et al., 2018). Salah satu tanaman golongan Zingiberaceae yang teridentifikasi sebagai antioksidan adalah *Zingiber zerumbet* (Kothandraman & Shanmugam, 2018).

#### 4.3.3 Insektisida

Pestisida merupakan golongan bahan kimia yang umum digunakan untuk membasmi hama dan gulma atau tanaman pengganggu. Hama seperti jamur, serangga, siput, dan hewan pengerat adalah organisme target pestisida. Pestisida digunakan diberbagai bidang atau kegiatan, mulai dari rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan lain - lain. Disamping manfaatnya, pestisida juga berpotensi juga meracuni dan membasmi makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman dan serangga yang berguna, binatang serta manusia. Hal ini dikarenakan kebanyakan bahan aktif dalam pestisida tidak memiliki efek toksisitas yang spesifik, sehingga mempengaruhi baik organisme target, non target, manusia maupun lingkungan dan ekosistem secara keseluruhan (Pamungkas, 2016).

Pestisida banyak sekali jenisnya, antara lain fungisida untuk mengendalikan jamur, rodentisida untuk hewan pengerat, herbisida untuk gulma, akarisida untuk tungau, bakterisida untuk bakteri, dan insektisida untuk membasmi serangga (Hidayati, 2014).

Insektisida merupakan kelompok pestisida yang terbesar dan terdiri atas beberapa jenis bahan kimia yang berbeda, antara lain organoklorin, organofosfat, karbamat, piretroid, dan N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET). Penggunaan organoklorin telah dilarang di dunia dan Indonesia. Organofosfat merupakan racun pengendali serangga yang paling toksik terhadap binatang bertulang belakang. Akibat insektisida ini terjadi penumpukan asetilkolin. Gejalanya adalah sakit kepala hingga kejang-kejang otot dan kelumpuhan. Karbamat termasuk propoxur yang merupakan senyawa karbamat yang dapat menyebabkan kerusakan syaraf dan diduga kuat sebagai zat karsinogenik. Pengaruhnya tidak berlangsung lama tetapi tetap berbahaya jika terjadi akumulasi. Selanjutnya piretroid, yang termasuk jenis transfultrin, d-alletrin, permetrin, dan sipermetrin. Piretroid mempunyai toksisitas rendah pada manusia karena tidak terabsorpsi dengan baik oleh kulit. Walaupun demikian, insektisida ini dapat menimbulkan alergi pada orang yang peka. Penelitian Picciotto pada tahun 2008 dari Universitas California mendukung adanya korelasi piretrin dengan autisme. Terakhir N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET), yang digunakan sebagai insektisida oles. N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) disarankan tidak digunakan pada pemakaian berulang setelah delapan jam. N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) dapat berpenetrasi melalui kulit sehingga menimbulkan keracunan. *The America Academy of Pediatrics* merekomendasikan agar N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET) tidak digunakan pada bayi yang berumur kurang dari dua bulan (Hidayati, 2014).

Banyaknya permasalahan serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap penggunaan insektisida kimia, kiranya upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem pengendalian hama terpadu (PHT) yang melibatkan pengendalian serangga pengganggu secara kimiawi,

biologis, kultur teknis dan penggunaan varietas resisten terhadap hama tertentu (Sari et al., 2018).

Salah satu teknologi yang harus dikembangkan adalah formulasi insektisida nabati berbahan aktif metabolit sekunder tumbuhan (Priyono, 2011).

Insektisida nabati merupakan insektisida yang berbahan baku tumbuhan yang mengandung senyawa aktif berupa metabolit sekunder yang mampu memberikan satu atau lebih aktivitas biologi, baik pengaruh pada aspek fisiologis maupun tingkah laku dari hama tanaman serta memenuhi syarat untuk digunakan dalam pengendalian hama (Sari et al., 2018).

Sifat-sifat dari insektisida nabati diantaranya adalah mudah terurai di alam (*biodegradable*), relatif aman terhadap musuh alami hama (*selectivity*), dapat dipadukan dengan komponen pengendalian hama lain (*compatibility*), dapat memperlambat laju resistensi, dan menjamin ketahanan dan keberlanjutan dalam berusaha tani (*sustainability*). Tumbuhan memproduksi berbagai jenis metabolit sekunder seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, dan lain-lain yang berguna sebagai pertahanan diri (Priyono, 2011).

Salah satu contoh tumbuhan yang mengandung senyawa aktif berupa metabolit sekunder yang dapat berfungsi sebagai insektisida yaitu tanaman *Zingiber zerumbet* (Wu et al., 2017).

#### 4.3.4 Antiinflamasi

Radang atau Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan (Agustina et al., 2015).

Fungsi inflamasi ada tiga yaitu menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi (sekuster) baik agen yang merusak maupun jaringan yang rusak. Pembengkakan, panas, nyeri, kemerahan dan perubahan fungsi termasuk ciri-ciri antiinflamasi (Fadhilah et al., 2021).

Pengobatan inflamasi mencakup dua aspek, yang pertama adalah meredakan nyeri yang seringkali menjadi gejala dan yang kedua adalah upaya penghentian proses kerusakan jaringan. Pengobatan inflamasi dapat menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) dan obat golongan steroid yang dapat meredakan reaksi inflamasi dengan baik tetapi dalam penggunaan jangka panjang akan memberikan efek samping. Penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid dalam jangka panjang akan memberikan efek berupa gangguan saluran cerna seperti ulser lambung, gangguan fungsi ginjal dan induksi kehamilan. Penggunaan obat golongan steroid dalam jangka panjang akan menurunkan respon imun tubuh terhadap infeksi, osteoporosis, moonface, serta hipertensi (Audina & Khaerati, 2018).

Obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) dan obat golongan steroid memiliki efek samping yang cukup serius pada penggunaannya. Karena banyaknya efek samping dari obat-obatan antiinflamasi yang umum digunakan saat ini, maka semakin banyak dikembangkan antiinflamasi yang berasal dari tanaman (Andayani & Suprihartini, 2018).

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan pada inflamasi yaitu tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang terbukti menunjukkan aktivitas antiinflamasi yang signifikan ( $P < 0,05$ ) dengan penghambatan maksimum masing-masing 45,67 dan 70,37% peradangan pada hewan uji (Somchit et al., 2012).

#### 4.3.5 Antileishmanial

Leishmaniasis adalah penyakit infeksi akibat parasit protozoa intraselular dari genus *Leishmania* yang disebarkan oleh gigitan vektor lalat pasir (*sandfly*) betina. Secara umum Leishmaniasis memiliki 4 gejala klinis, *Visceral Leishmaniasis* (VL) yang menimbulkan pembengkakan organ dalam, *Post-KalaAzar-Dermal Leishmaniasis* (PKDL) yaitu komplikasi yang muncul setelah seseorang sembuh dari VL, *Cutaneous Leishmaniasis* (CL) yang menimbulkan borok (*lesion*) di kulit, dan *Mucocutaneous Leishmaniasis* (ML) yang merusak jaringan mukosal. VL merupakan bentuk infeksi Leishmaniasis yang terparah karena dapat menimbulkan pembengkakan organ dalam (hati dan limpa) dan pelemahan daya tahan tubuh, sedangkan CL merupakan kasus yang lebih sering terjadi di dunia. Penyakit ini tersebar di wilayah tropis dan subtropis dan terkategori neglected tropical disease oleh PBB dengan wilayah penyebaran utama di sub-kontinen India, basin Mediterania (Timur Tengah, Eropa Selatan, dan Afrika Utara), dan Amerika Selatan. Per tahun, diperkirakan terdapat 2.000.000 kasus infeksi Leishmaniasis (500.000 VL dan 1.500.000 CL) di seluruh dunia. Leishmaniasis juga diperkirakan menimbulkan korban kematian sebanyak 50.000 jiwa per tahun, menjadikannya penyakit infeksi akibat parasit penyebab kematian kedua terbesar setelah malaria (Ketut & Hilmawan, 2019).

Leishmaniasis dikenal sebagai penyakit “orang miskin”, berkembang di wilayah dengan fasilitas kesehatan yang kurang baik dan sanitasi yang buruk serta terkait dengan malnutrisi. Leishmaniasis menyebar dengan cepat di wilayah dimana orang atau pekerja memiliki kebiasaan tidur di alam terbuka. Penyakit ini menyebabkan kematian yang signifikan dan biasanya banyak terjadi di negara berkembang dengan populasi padat, serta terbatasnya sumber

daya manusia untuk kontrol, pencegahan maupun pengobatan penyakit (WHO, 2010).

Vaksin Leishmaniasis belum ditemukan dan obat yang tersedia saat ini masih memiliki toksisitas tinggi. Cara yang paling efektif untuk memperkecil risiko transmisi infeksi leishmaniasis pada manusia dapat dilakukan dengan mencegah gigitan lalat pasir, menggunakan alat pelindung, serta mengkarantina dan memulihkan inang (manusia) yang terinfeksi. Tidak seperti parasit lainnya, seluruh jenis spesies leishmania di alam sangat sulit untuk diberantas, mencegah penyebaran *Leishmaniasis spp.* dari *host definitif* dan *host intermediate* lebih sulit dibandingkan dengan *Plasmodium spp* (Inceboz, 2019)

Keberadaan protozoa *Leishmania spp* di Indonesia, baik pada hewan maupun manusia belum pernah dilaporkan, meskipun kasus *Cutaneous Leishmaniasis* dengan diagnosis diferensial histoplasmosis pernah dilaporkan pada manusia. Keberadaan Leishmaniasis perlu diwaspadai karena penyakit ini banyak terjadi di negara tropis seperti Indonesia sebagai habitat yang cocok bagi perkembangan vektor dari *Leishmaniasis* (lalat pasir). Untuk mengantisipasi munculnya dan penularan *Leishmaniasis*, vektor *Phlebotomus* perlu diinvestigasi karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh perilaku dan jenis pekerjaan atau kegiatan manusia seperti bekerja di hutan/ sawah/ ladang/ perkebunan serta tinggal di pemukiman terpencil seperti kondisi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mempunyai berbagai spesies hewan liar dan domestik bahkan rodensia banyak terdapat di hutan dan perkebunan. *Leishmania spp* memiliki induk semang reservoir pada beberapa spesies hewan liar dan domestik serta manusia (Ekawasti & Martindah, 2020).

Tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dapat

menjadi alternatif pencegahan dan pengobatan pada kasus *Leishmaniasis* terbukti pada penelitian yang menunjukkan aktivitas antileishmanial pada protozoa *Leishmania dodovani* dengan nilai IC50 dan IC90 sebesar 4,6 g/ml dan 18,0 g/ml. Zerumbone menunjukkan aktivitas yang baik dengan IC50 dan IC90 <1,6 g/ml dan 4,7 g/ml (B et al., 2014).

#### 4.3.6 Antiproliferatif

Proliferasi sel didefinisikan sebagai peningkatan jumlah sel karena pertumbuhan dan pembelahan sel. Laju proliferasi sel bervariasi dari satu sel ke sel lain tergantung pada asal dan stadium sel, keberadaan dari berbagai faktor pertumbuhan, agen farmakologis, dan polutan juga mempengaruhi laju proliferasi sel. Pengukuran yang akurat dari tingkat proliferasi sel dalam studi in vitro berguna dalam studi sitotoksitas dan apoptosis. Proliferasi sel in vivo juga memberikan pengetahuan baru tentang situs proliferasi sel serta membantu untuk memahami tahap perkembangan berbagai hewan/organ dan patologi jaringan kanker (Singhal et al., 2014).

Proliferasi yang tidak terkontrol merupakan salah satu karakteristik sel-sel kanker. Laju pertumbuhan tumor merupakan marker prognostik yang dapat dievaluasi dengan mengkorelasikan pada level selular seperti mitosis. Sehingga jumlah sel yang bermitosis digunakan dalam memperhitungkan laju proliferasi pada neoplasma, biasanya neoplasma dengan proliferasi tinggi memiliki prognosis yang buruk (Pratiwi & Siregar, 2018).

Proliferasi paling jelas selama perkembangan, ketika zigot bersel tunggal memulai banyak putaran pertumbuhan dan pembelahan untuk membentuk massa sel organisme yang sedang berkembang. Saat organisme dewasa terbentuk, banyak sel berhenti tumbuh ketika mereka berdiferensiasi untuk melakukan fungsi khusus mereka. Proliferasi juga dapat terjadi pada sel

kanker dimana terus terjadi perkembangbiakan sel, hal ini dapat dicegah dengan pemberian senyawa yang dapat bersifat sebagai antiproliferatif (Berridge, 2012).

Salah satu senyawa yang dapat bekerja menekan proliferasi yang signifikan terhadap garis sel kanker HeLa tanpa toksisitas pada sel normal yaitu zerumbone, senyawa tersebut dapat ditemukan pada tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet (L.) Smith*) (Ghasemzadeh et al., 2017).

#### 4.3.7 Imunosupresan

Sistem imun merupakan kumpulan mekanisme dalam suatu makhluk hidup yang melindunginya terhadap infeksi dengan mengidentifikasi dan membunuh substansi patogen. Sistem ini dapat mendeteksi bahan patogen, mulai dari virus sampai parasit dan cacing serta membedakannya dari sel dan jaringan normal. Deteksi merupakan suatu hal yang rumit karena bahan patogen mampu beradaptasi dan melakukan cara-cara baru untuk menginfeksi tubuh dengan sukses (Sudiono, 2014).

Sistem imun dapat ditingkatkan atau ditekan, salah satunya dengan pemberian imunomodulator. Imunomodulator dibagi menjadi 3 kelompok yaitu imunostimulator, berfungsi untuk meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun, imunoregulator, artinya dapat meregulasi sistem imun, dan imunosupresan yang dapat menghambat atau menekan aktivitas sistem imun (Harsa et al., 2021).

Imunosupresan adalah golongan obat yang bekerja dengan menekan kapasitas sistem imun untuk merespon secara efektif terhadap antigen asing, termasuk antigen permukaan pada sel tumor. Imunosupresan dapat dihasilkan dari pembunuhan sel efektor imun atau dari penyumbatan jalur intraseluler



yang berperan dalam pengenalan antigen atau elemen lain dari respon imun (Rice, 2019).

Obat immunosupresian dapat diklasifikasikan menjadi lima kelompok, diantaranya glukokortikoid, sitostatika, antibody, obat yang bekerja pada immunophilins dan obat lain (Rathee et al., 2012). Namun pemberian obat sintetis tidak pernah luput dari adanya berbagai efek samping dalam pengobatan, hal ini menjadi pertimbangan untuk melakukan pengobatan alternatif seperti penggunaan obat alami.

Tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) dapat menjadi alternatif sebagai pengganti obat immunosupresan sintetis (Akhtar et al., 2019).

#### 4.3.8 Penghambat tyrosinase

Kulit merupakan bagian terluar pada tubuh manusia yang berperan penting dalam proteksi tubuh. Salah satu fungsi kulit adalah melindungi tubuh dari paparan sinar UV. Paparan sinar UV secara terus menerus dalam jangka lama akan menyebabkan hiperpigmentasi pada kulit. Hiperpigmentasi adalah gangguan pada pigmen kulit yang disebabkan karena adanya peningkatan produksi melanin dan pendistribusian melanin yang tidak merata, pada kondisi ini akan menyebabkan penggelapan pada kulit dan timbulnya noda-noda hitam pada bagian tertentu (Apriliani et al., 2018).

Produksi melanin yang berlebihan dapat menyebabkan kulit berwarna gelap atau depigmentasi. Penghambatan tirosinase merupakan cara yang paling banyak digunakan dalam proses depigmentasi kulit. Enzim yang berperan penting pada jalur sintesis melanin adalah tyrosinase (Charissa et al., 2016).

Tirosinase mengkatalisis langkah pertama dalam dua reaksi sintesis melanin, yaitu hidrosilasi L-tirosin menjadi 3,4-dihidroksifenilalanin (L-

dopa) dan oksidasi L-dopa menjadi dopaquinon. Dopaquinon merupakan senyawa yang sangat reaktif yang dapat mengalami polarisasi secara spontan membentuk melanin (Rauf et al., 2016).

Berbagai inhibitor tirosinase banyak ditemukan dalam kosmetik seperti arbutin, sistein, hidrokuinon, L-Glutation, asam kojat, asam glikolat, polyhidroxymethyl (PHM), dan asam retinoat yang penggunaannya dalam jangka panjang mengakibatkan efek samping yang menyebabkan karsinogenesis (Nur et al., 2020).

Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya bahan alam seperti tumbuhan yang digunakan sebagai inhibitor enzim tyrosinase. Salah satu bahan alam yang memiliki khasiat ini yaitu tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) (A. Zakaria & Jamil, 2019).

#### 4.3.9 Penghambat asetilkolinesterase

Alzheimer Disease (AD) adalah jenis penyakit yang umum dari dimensia yang menggambarkan kondisi ketika sel-sel saraf (neuron) di otak mati dan tidak lagi berfungsi normal. Kematian dan kerusakan neuron menyebabkan perubahan memori, perilaku dan kemampuan berpikir jernih. Dalam AD, otak mengalami perubahan yang pada akhirnya mengganggu kemampuan individu untuk menjalankan fungsi tubuh dasar seperti berjalan dan menelan, serta akhirnya berakibat fatal (Padua et al., 2017).

Penyakit Alzheimer merupakan salah satu akibat dari gangguan fungsi asetilkolin. Asetilkolinesterase (AChE) merupakan enzim yang berfungsi sebagai katalisator pada pemecahan asetilkolin (ACh) menjadi bentuk tidak aktif yaitu asetat dan kolin. Pengukuran aktivitas enzim AChE dapat menggambarkan akumulasi ACh dalam tubuh (Yuliani et al., 2014).

Pengukuran aktivitas enzim AChE dapat menggambarkan akumulasi ACh dalam tubuh dimana pada hasil ini menunjukkan pada penderita alzheimer dengan adanya aktivitas enzim asetilkolinesterase yang lebih besar. Adapun senyawa yang dapat menghambat dari aktivitas enzim AChE ini menggambarkan bahwa adanya potensi sebagai bahan dasar dari pembuatan obat alzheimer (Tri et al., 2020).

Terapi alzheimer masih identik dengan intervensi obat-obatan, seperti penghambat kolinesterase dan antagonis reseptor NMDA. Penggunaan obat-obatan sintesis tidak terlepas dari efek samping yang merugikan sehingga obat tradisional mulai menjadi pilihan (Puzi et al., 2019).

Salah satu alternatif pengobatan alzheimer secara tradisional yaitu menggunakan tanaman lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) yang menunjukkan adanya aktivitas sebagai penghambat asetilkolinesterase (A. Zakaria & Jamil, 2019).

#### 4.4 Tinjauan Islami Tentang Pemanfaatan Tanaman Lempuyang Gajah

Pemanfaatan tanaman sebagai bahan obat bagi umat islam merupakan suatu rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk semua makhluknya di muka bumi ini, salah satu contohnya ialah pemanfaatan tanaman lempuyang gajah sebagai tanaman obat. Al-Qur'an menjelaskan tentang banyaknya tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber dari obat-obatan.

Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*, QS. Asy-Syu'araa/ 26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan (tumbuh-tumbuhan) yang baik?” (Kementrian Agama, 2019).

Dalam tafsir *Taisirul Karimirrahman fi Tafsiri Kalamil Mannan* atau yang biasa dikenal dengan tafsir As-sa'di, Abdurrahman bin Nashr As-sa'di menjelaskan bahwa pada ayat diatas Allah SWT berfirman seraya mengingatkan untuk tafakkur atau merenungkan arti ayat tersebut “Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, yang indah dipandang dan mulia manfaatnya (As-sa'di, 2007).

Indonesia memiliki 25.000-30.000 spesies tumbuhan yang merupakan 10% tumbuhan dunia dan 90% tumbuhan Asia. Terdapat sebanyak 7.000 spesies dari jumlah tersebut digunakan masyarakat Indonesia sebagai obat. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat sudah berlangsung sejak ribuan tahun lalu (Wakhidah, 2017). Hal ini sesuai dengan penjelasan pada tafsir diatas, manusia dirasa perlu merenungi banyaknya macam tumbuhan yang Allah SWT karuniakan dan memanfaatkan khasiatnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat-Nya.

Berdasarkan ayat dan penjelasan diatas dijelaskan bahwa betapa besarnya kekuasaan Allah SWT kepada manusia. Sebab, Allah SWT telah menganugrahkan tumbuhan yang baik, tumbuhan yang indah dipandang, serta tumbuhan yang bermanfaat bukan hanya pada manusia, namun pada hewan dan mahluk hidup lainnya. Termasuk tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk mengobati berbagai macam penyakit, tumbuhan yang menjadi santapan hewan, sampai tumbuhan yang dapat memberikan cita rasa pada makanan maupun minuman seperti pada tanaman jahe, hal ini telah disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Insan ayat 17.

Allah *Ta'ala* berfirman, QS. Al-Insan/ 76: 17

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا

Terjemahnya :

*“Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe”*

(Kementrian Agama, 2019).

Thanthawi Jauhari menyebutkan dalam kitab tafsirnya *Al-Jawahir Fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim* bahwa surah Al-Insan ini adalah surah Madaniyyah dengan jumlah ayat sebanyak 31 dan diturunkan setelah surah Ar-Rahman. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di sana (dalam surga) mereka disuguhkan segelas khamr, karena lafadz *ka’s* dimaknainya sebagai *khamr*, suguhan *khamr* yang diberikan dengan campuran jahe, ayat ini menjelaskan bahwan minuman yang diberikan kepada penghuni surga tentu suatu minuman yang mewah, baik dan disukai. Jahe yang disebutkan pastinya bukan seperti jahe yang banyak didapati di dunia, namun seperti yang kita ketahui, tanaman jahe merupakan tanaman yang banyak digunakan sebagai penambah cita rasa pada makanan dan minuman maupun dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan (Jauhari, 1350 H).

Banyak ahli tafsir yang menyebutkan bahwa meminum *khamr* dengan campuran jahe merupakan salah satu kegemaran orang-orang Arab, karena campuran jahe membuat anggur terasa lebih nikmat. Rupanya dulu orang Arab biasa minum dua jenis anggur dengan dua bentuk yaitu yang terasa hangat karena campuran jahe yang mampu menghangatkan badan dan yang terasa sejuk karena campuran seperti pepermint (Jauhari, 1350 H).

Thantawi Jauhari juga menjelaskan bahwa orang Arab suka merasakan dan menikmati jahe, karena jahe dapat melegakan tenggorokan, mudah dicerna, manis, serta enak. Orang Arab menjadikan jahe ini sebagai minuman karena jahe menghasilkan rasa pedas yang membuat hangat tubuh (Jauhari, 1350 H).

Seperti yang telah dijelaskan, jahe bukan hanya dapat digunakan sebagai penambah cita rasa pada minuman, namun juga mampu menjadi alternatif

pengobatan dengan membantu pencernaan, mencegah mual karena jahe mampu memblokir serotonin, membuat lambung menjadi nyaman, meringankan kram perut dan membantu mengeluarkan angin (Savitri, 2008).

Berdasarkan ayat dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanaman jahe sudah digunakan sejak lama oleh orang-orang Arab dan sebagai minuman yang disebutkan dalam Al-quran sebagai minuman penghuni surga. Seperti yang diketahui, jahe merupakan tanaman dengan berbagai macam jenis termasuk tanaman lempuyang gajah yang dijelaskan pada skripsi ini, tanaman lempuyang gajah merupakan tanaman jahe liar dengan berbagai manfaat yang dapat diberikan kepada tubuh manusia. Hal ini membuat kita untuk mengingat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, bukan hanya nikmat makanan dan minuman yang diberikan, namun terkandung pula sejuta manfaat dalam kandungan makanan dan minuman tersebut, tentunya hal ini harus disertai dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

1. Identifikasi hasil dari 19 jurnal yang telah diteliti terdapat 124 kandungan senyawa yang dimiliki tanaman lempuyang gajah yaitu (*E*)-nerolidol, (*E*)- $\beta$ -farnesene (*E,E*)- $\alpha$ -farnesene, (*Z*)-nerolidol, (*Z*)- $\beta$ -farnesene, (*Z,Z*)- $\alpha$ -farnesene, (*Z*)- $\gamma$ -bisabolone, 2,6,6-trimethylundecan-1,3-dien-9-yn-5-one, 14-hydroxy- $\alpha$ -humulene, 14-hydroxy- $\alpha$ -muurolene, 1,5,9-decatriene, 1,5-heptadiene, 1,6-octadien-3-ol, 1,8-cineole, 1-formyl-2,2,6-trimethyl-3-cis-(3-methylbut-2-enyl)-5-cyclohexene, 2-thujene, 2-heptanol acetate, 2-nonanone, 3,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-ene, 3-carene, 7-Pentadecen-5-yne, *allo*-Aromadendrene epoxide, Aromadendrene oxide, Asam galat, Asam ferulat, Asam hidroksil benzoate, Asam kumarat, Asam sinamat, Asam vallinat, Bicyclo[2.2.1]heptane-2-one, Bicyclol (3,1,1 Heptane. 2,6,6- trimethyl, Borneol, Bornyl acetate, Calamenene, Camphene, Camphor, Caryophylla-4 (14),8 (15)-dien-5.alpha.-ol, Caryophyllene oxide, Cinerone, Cis-1,7-Octadiene-3-yl acetate, Citronelly acetate, Citronellal, Curdione, Cyclone, Cyclohexanemethanol, Dehydroaromadendrene, Diacetone alcohol, Eucalyptol, Eudesm-7(11)-en-4-ol, Eugenol, Elemol, Fanchon, Farnesol, Fenchene, Flavonoid total, Geraniol, Geranyl acetate, Germacrene D, Gingerglikolipid b, Humaladienone, Humulene oksida, Humulene oksida I, Humulene oksida ii, Isobornyl acetate, Kaempferol, Katekin, Lavandulyl acetate, Ledane, Limonene, Luteolin, Linalool, Methyl salicylate, Myrtenal, Myricetin, Myrcene, Nerolidol, Nonen-1-ol, Ocimene, Octylcyclohexane, *p*-cimene, Phytone, Patchulane, Pentadecanoic acid, Phenolic total, Polyphenol total, Quercetin,

Rutin, Selina-4(14), 11-diene, Sabinene, Sylvestrene, Terpinen 4-ol, Trans- $\alpha$ -bergamotene, Tricyclen, Zerumbone, Zingiberene, Z-citral,  $\alpha$ -caryophyllene,  $\alpha$ -humulene,  $\alpha$ -bisabolol,  $\alpha$ -cedrene,  $\alpha$ -eudesmol,  $\alpha$ -gurjunene,  $\alpha$ -pinene,  $\alpha$ -phellandrene,  $\alpha$ -terpinene,  $\alpha$ -terpineol,  $\alpha$ -thujenal, *ar*-curcumene,  $\beta$ -caryophyllene,  $\beta$ -ocimene,  $\beta$ -bisabolone,  $\beta$ -elemene,  $\beta$ -eudesmol,  $\beta$ -pinene,  $\beta$ -selinene,  $\gamma$ -eudesmol,  $\gamma$ -terpinene,  $\delta$ -cadinene,  $\delta$ -3-carene, *n*-octanal, *g*-elemene, *g*-terpinene, *g*-curcumene, dan *epi*-Bicyclosquiphellandrene. Senyawa zerumbone merupakan senyawa yang paling banyak terkandung dalam tanaman lempuyang gajah.

2. Terdapat beberapa bioaktivitas yang dapat ditimbulkan oleh tanaman lempuyang gajah diantaranya dapat digunakan sebagai antibakteri, antioksidan, anti proliferasi, insektisida, immunosupresan, antiinflamasi, penghambat tyrosinase, penghambat asetilkolinesterase dan dapat berperan sebagai antileishmanial.

## 1.2 Saran

Hasil penelitian ini tentunya membutuhkan penelitian lanjutan dengan cara komprehensif dan eksperimental guna mengembangkan informasi yang dikumpulkan terkait kandungan dan bioaktivitas tanaman lempuyang gajah menjadi sebuah sediaan atau produk yang nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat luas sebagai bentuk upaya peningkatan kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Tita, D., & Amir, Muhammad. (2015). Aktivitas Ekstrak Daun Salam ((*Eugenia Polyantha*) Sebagai Antiinflamasi Pada Tikus Putih (*Rattus Norvegicus*) Risna. *J. Trop. Pharm. Chem*, 120–123.
- Akhtar, N. M. Y., Jantan, I., Arshad, L., & Haque, M. A. (2019). Standardized Ethanol Extract, Essential Oil And Zerumbone Of *Zingiber Zerumbet* Rhizome Suppress Phagocytic Activity Of Human Neutrophils. *BMC Complementary And Alternative Medicine*, 19(1), 331. <https://doi.org/10.1186/s12906-019-2748-5>
- Andayani, D., & Suprihartini, E. (2018). Efek Antiinflamasi Ekstrak Etanol Krokot (*Portulaca Oleracea L.*) Pada Udem Tikus Yang Di Induksi Karagenin. 43–49. <https://doi.org/10.20961/jpscr.v3i1.15108>
- Anjarsari, I. R. D. (2016). Katekin Teh Indonesia : Prospek Dan Manfaatnya. *Jurnal Kultivasi*, 15(2), 99–106.
- Apriliani, A., Gana, A., & Hartati, R. (2018). Inhibition Test Of Tyrosinase Activity From Zingiberaceae Uji Inhibisi Aktivitas Enzim Tirosinase Beberapa Jenis Tumbuhan Zingiberaceae. 4, 46–58.
- Arifin, B., & Ibrahim, S. (2018). Struktur , Bioaktivitas Dan Antioksidan Flavonoid. *Jurnal Zarah*, 6(1), 21–29.
- Audina, M., & Khaerati, K. (2018). Efektivitas Antiinflamasi Ekstrak Etanol Daun Sumambu (*Hyptis Capitata Jacq*) Pada Tikus Putih Jantan (*Rattus Norvegicus L.*). 12, 17–23.
- B, C., Saikhom, C., Kh, L., Swapana, N., Cantrell, C., & Ross, S. (2014). Chemical Composition And Biological Activity Of The Essential Oil Of Rhizome Of Chemical Composition And Biological Activity Of The Essential Oil Of Rhizome Of *Zingiber Zerumbet (L.)* Smith. *International Journal Of Pharmacognosy And Phytochemical Research*, January.
- Berridge, M. (2012). Cell Cycle And Proliferation. *Portland Press Limited*, 1–42. <https://doi.org/10.1042/Csb0001009>
- BSAC. (2018). Antimicrobial E-Book Stewardship From Principles To Practice. *British Society For Antimicrobial Chemotherapy*, 345. <http://www.bsac.org.uk/antimicrobialstewardshipebook/BSAC-Antimicrobialstewardship-Fromprinciplestopractice-Ebook.pdf>

- Cahyani, D. R. (2020). Evaluasi Metode In Vitro Pada Analisis Aktivitas Antioksidan Beberapa Buah Tropis : Studi Kepustakaan. *Jurnal Sains Dan Teknologi Pangan*, 5(6).
- Charissa, M., Djajadisastra, J., & Elya, B. (2016). Uji Aktivitas Antioksidan Dan Penghambatan Tirosinase Serta Uji Manfaat Gel Ekstrak Kulit Batang Taya ( *Nauclea Subdita* ) Terhadap Kulit. 6(2), 98–107.
- Da Silva, T. M., Pinheiro, C. D., Orlandi, P. P., & Pontes, G. S. (2017). Zerumbone From Zingiber Zerumbet (L.) Smith: A Potential Prophylactic And Therapeutic Agent Against The Cariogenic Bacterium Streptococcus Mutans. *BMC Complementary And Alternative Medicine*, 1–9. <https://doi.org/10.1101/187906>
- Dai, D. N., Thang, T. D., Chau, L. T. M., & Ogunwande, I. A. (2013). *Chemical Constituents Of The Root Essential Oils Of Zingiber Rubens Roxb ., And Zingiber Zerumbet ( L.) Smith. 2013*(January), 7–10.
- Das, A., Kanta, K., & Nag, S. (2018). Anatomy , Micromorphology And Histochemical Localization Of Different Phytochemicals Of Two Medicinally Important Taxa Of The Family Zingiberaceae. *Life Science Informatics Publicatio*, 4(191), 191–198.
- Dash, Biswabhusan, Sahoo, A., Ray, A., Jena, S., & Nayak, S. (2020). Identification Of Chemical Constituents Of Zingiber Zerumbet Rhizome Extract Using GC/MS. *Journal Of Biologically Active Products From Nature*, 10(5), 411–417. <https://doi.org/10.1080/22311866.2020.1821775>
- Dash, Biswabushan, Sahoo, A., Ray, A., Jena, S., & Ayak, S. (2020). Identification Of Chemical Constituents Of Zingiber Zerumbet Rhizome Extract Identification Of Chemical Constituents Of Zingiber Zerumbet Rhizome Extract Using GC / MS. *Journal Of Biologically Active Products From Nature*, January 2021. <https://doi.org/10.1080/22311866.2020.1821775>
- Dewantari, R., L, M. L., & Nurmiyativ. (2018). Jenis Tumbuhan Yang Digunakan Sebagai Obat Tradisional Di Daerah Eks- Karesidenan Surakarta Types. *Bioedukasi*, 11(2), 117–122.
- Ekawasti, F., & Martindah, E. (2020). *Mewaspadaai Keberadaan Leishmaniasis Di Indonesia Sebagai Penyakit Zoonosis Oleh Protozoa ( Awareness Of The Existence Of Leishmaniasis As Protozoan Zoonosis In Indonesia )*. 30(2), 79–90.

- Fadhilah, H., Rachmani, K., & Hajaring, N. (2021). Aktifitas Kunyit ( *Curcuma Domestica Val .* ) Sebagai Antiinflamasi Ditinjau Dari Berbagai Literatur. *Edu Masda Journal*, 5(1).
- Ghasemzadeh, A., Jaafar, H. Z. E., Ashkani, S., Rahmat, A., Juraimi, A. S., Puteh, A., & Muda Mohamed, M. T. (2016). Variation In Secondary Metabolite Production As Well As Antioxidant And Antibacterial Activities Of Zingiber Zerumbet (L.) At Different Stages Of Growth. *BMC Complementary And Alternative Medicine*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12906-016-1072-6>
- Ghasemzadeh, A., Jaafar, H. Z. E., Rahmat, A., & Swamy, M. K. (2017). Optimization Of Microwave-Assisted Extraction Of Zerumbone From Zingiber Zerumbet L. Rhizome And Evaluation Of Antiproliferative Activity Of Optimized Extracts. *Chemistry Central Journal*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13065-016-0235-3>
- Handayani, P. A., & Juniarti, E. R. (2012). Ekstraksi Minyak Ketumbar (Coriander Oil) Dengan Pelarut Etanol Dan N-Heksana Prima. *Jurnal Bahan Alam Terbarukan*, 1(1), 1–7.
- Hani, R. C., Milanda, T., Farmasi, F., & Padjadjaran, U. (2016). Review: Manfaat Antioksidan Pada Tanaman Buah Di Indonesia. *Farmaka*, 14(1), 184–190.
- Harsa, R., Alquraisi, A., Pramiastuti, O., & Listina, O. (2021). A Literature Review: Aktivitas Imunomodulator Vitamin C. *Pharmacy Medical*, 4(1), 30–35.
- Hidayati, K. N. (2014). Penggunaan Insektisida Rumah Tangga Antinyamuk. *Jurnal Widyariset*, 17(3), 417–424. <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/viewfile/286/274>
- Huong, L. T., V. Chinh, H., T. G. An, N., T. Viet, N., H. Hung, N., T. H. Thuong, N., O. Giwa-Ajeniya, A., & A. Ogunwande, I. (2020). Zingiber Zerumbet Rhizome Essential Oil: Chemical Composition, Antimicrobial And Mosquito Larvicidal Activities. *European Journal Of Medicinal Plants*, 30(4), 1–12. <https://doi.org/10.9734/Ejmp/2019/V30i430197>
- Imran, M., Salehi, B., Sharifi-Rad, J., Gondal, T. A., Arshad, M. U., Khan, H., & Guerreiro, S. G. (2019). Kaempferol: A Key Emphasis To Its Anticancer Potential. *Journal Molecules*, 1–16.
- Jauhari, Thanthawi. *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*. juz 1, Beirut: Dar alFikr. 1350H.

- Jumiarni, W. O., & Komalasari, O. (2017). Eksplorasi Jenis Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Pada Masyarakat Suku Muna Di Permukiman Kota Wuna. *Traditional Medicine Journal*, 22(1), 45–56.
- Kaewsri, W., & Deetae, P. (2016). Analysis Of Intraspecific Genetic Variation , Antioxidant And Antibacterial Activities Of Zingiber Zerumbet Analysis Of Intraspecific Genetic Variation , Antioxidant And Antibacterial Activities Of Zingiber Zerumbet. *International Food Research Journal*, July.
- Kapitan, O. B., Ambarsari, L., & Falah, S. (2017). In Vitro Antibakteri Ekstrak Etanol Puni (Zingiber Zerumbet) Asal Pulau Timor. *Savana Cendana*, 2(02), 29–32. <https://doi.org/10.32938/Sc.V2i02.82>
- Ketut, D., & Hilmawan, A. (2019). *Urgensi Pencegahan Dan Pengendalian Risiko Infeksi Leishmaniasis Atas Kontingen Garuda Di Lebanon*. 18(1), 34–41.
- Kothandraman, G., & Shanmugam, S. (2018). Phytochemical Estimation And In Vitro Antioxidant Activity Of Rhizome Of In Vitro Regenerated Zingiber. *Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry*, 7(5), 566–570.
- Lallo, S., Kasim, S., Tayeb, R., Hasan, A. D., Sere, H., Ismail, I., & Arifin, T. (2018). Analisis Zerumbone Dalam Zingiber Zerumbet Dan Aktivitas Penghambatannya Terhadap Bakteri Mycobacterium Tuberculosis. *Jurnal Farmasi Galenika (Galenika Journal Of Pharmacy) (E-Journal)*, 4(2), 126–132. <https://doi.org/10.22487/I24428744.2018.V4.I2.11138>
- Liu, H., & Specht, C. D. (2019). Morphological Anatomy Of Leaf And Rhizome In Zingiber Officinale Roscoe , With Emphasis On Secretory Structures. *Hort Science*, 1–4. <https://doi.org/10.21273/HORTSCI14555-19>
- Marczewski, M., Kavalchuk, Y., Ulkowska, U., & Gliński, M. (2018). Diacetone Alcohol Decomposition And Benzaldehyde Cannizzaro Reaction As Test Reactions For The Basic Strength Measurements Of Alumina , Magnesia , Amberlyst Type. *Reaction Kinetics, Mechanisms And Catalysis*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/S11144-018-1492-Z>
- Marpaung, D. R. A. K. (2018). Tumbuhan Obat Dan Kearifan Lokal Masyarakat Di Sekitar Kawasan Tnbg, Desa Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Biosains*, 4(2), 85. <https://doi.org/10.24114/Jbio.V4i2.10295>
- Nag, A., Bandyopadhyay, M., & Mukherjee, A. (2013). Antioxidant Activities And Cytotoxicity Of Zingiber Zerumbet ( L .) Smith Rhizome. *Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry*, 2(3), 102–108.

- Nalla, S., & Suhasin, G. (2021). A Recent Review On Dietary Flavonoid-Myricetin. *Sys Rev Pharm*, 12(12), 3940–3950.
- Nongalleima, K., Swapana, N., & Nahakpam, L. (2011). *Biological And Chemical Properties Of Zingiber Zerumbet Smith : A Review Biological And Chemical Properties Of Zingiber Zerumbet Smith : A Review*. June 2015. <https://doi.org/10.1007/S11101-011-9222-4>
- Nur, S., Tinggi, S., Farmasi, I., Aswad, M., Hasanuddin, U., Burhan, A., Tinggi, S., Farmasi, I., Nursamsiar, N., Tinggi, S., & Farmasi, I. (2020). *Inhibitory Tyrosinase Activity Assay From Lyophilisate , Extract And Fractions Of Kersen Fruit ( Muntingia Calabura L . )*. January 2021.
- Oh, T., Jung, H., Lee, Y., Lee, S., Kim, G., Kan, S., Kang, H., Oh, T., Ko, H. M., Kwak, K., & Lim, J. (2018). Zerumbone , A Tropical Ginger Sesquiterpene Of Zingiber Officinale Roscoe , Attenuates A -MSH-Induced Melanogenesis In B16F10 Cells. *Journal Molecular Sciences*, 1–17. <https://doi.org/10.3390/Ijms19103149>
- Padalia, R. C., Verma, R. S., Chauhan, A., Singh, V. R., & Goswami, P. (2019). Zingiber Zerumbet ( L . ) Roscoe Ex Sm . From Northern India : Potential Source Of Zerumbone Rich Essential Oil For Antiproliferative And Antibacterial Applications Industrial Crops & Products Zingiber Zerumbet ( L . ) Roscoe Ex Sm . From Northern India : P. Elsevier B.V, November. <https://doi.org/10.1016/J.Indcrop.2018.01.006>
- Padua, A., Setyahadi, S., & Simanjuntak, P. (2017). *AKTIVITAS FRAKSI ETANOL DAUN SIRSAK (Annona Muricata Linn.) SEBAGAI PENGHAMBATASETILKOLINESTERASE*. 6, 145–150.
- Pamungkas, O. S. (2016). Bahaya Paparan Pestisida Terhadap Kesehatan Manusia. *Bioedukasi*, XIV(1), 27–31. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BIOED/Article/Download/4532/3355>
- Pereira, S. F., Barroso, A., & Mour, R. H. V. (2021). A Low Energy Approach For The Preparation Of Nano-Emulsions With A High Citral-Content Essential Oil. *Journal Molecules*, 1–11.
- Pratiwi, A. S., & Siregar, Y. (2018). Hubungan Kadar Vitamin D Plasma Dengan Indeks Mitosis Pada Pasien Kanker Payudara. *SRIWIJAYA JOURNAL OF MEDICINE*.
- Prijono, D. (2011). Pengembangan Teknologi Formulasi Insektisida Nabati Untuk

Pengendalian Hama Sayuran Dalam Upaya Menghasilkan Produk Sayuran Sehat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 16(2), 100–111.

Puzi, S., Herowati, R., & Nurrochmad, A. (2019). Uji In-Vitro Penghambatan Enzim Asetilkolinesterase Dan Identifikasi Fitokimia Fraksi Aktif Ekstrak Etanol Buah Mengkudu (*Morinda Citrifolia L.*). *Farmasains*, 6(1), 1–10.

Rahayu, I. D., Widodo, W., Prihartini, I., & Winaya, A. (2019). Antibacterial Activity Of Ethanolic Extracts From Zingiber Zerumbet Rhizome Against *Salmonella Spp.* *Biodiversitas*, 20(11), 3322–3327. <https://doi.org/10.13057/Biodiv/D201127>

Rana, V. S., Verdeguer, M., & Blazquez, M. A. (2012a). Chemical Composition Of The Essential Oil Of Zingiber Zerumbet Var. Darcy. *Natural Product Communications*, 7(10), 1369–1370. <https://doi.org/10.1177/1934578x1200701031>

Rana, V. S., Verdeguer, M., & Blazquez, M. A. (2012b). *NPC Natural Product Communications*. 9–10. <https://doi.org/10.1177/1934578X1200701031>

Rathee, P., Chaudhary, H., & Rathee, S. (2012). *Immunosuppressants : A Review*. December.

Rauf, A., Ningsi, S., & Nurdin, H. (2016). *Potensi Penghambatan Tirosinase Ekstrak Etanol Daun Tomat (*Lycopersicon Esculentum Mill, Var. Pyriforme Alef*)*.

Rice, J. M. (2019). Immunosuppression. *IARC Scientific Publications*, 159–164.

Rizal, S. (2020). Manfaat Alam Dan Tumbuhan “Sumber Belajar Anak” Dalam Perspektif Islam. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.

Rogério, A. P., Andrade, E. L., Leite, D. F. P., Figueiredo, C. P., & Calixto, J. B. (2009). Preventive And Therapeutic Anti-Inflammatory Properties Of The Sesquiterpene A -Humulene In Abbreviations: *British Journal Of Pharmacology*, December 2008, 1074–1087. <https://doi.org/10.1111/J.1476-5381.2009.00177.X>

Santi, N. M. (2021). Review: Aktivitas Antioksidan Ekstrak Bunga Gemitir (*Tagetes Erecta Linn.*). *Jurnal Farmagazine*, VIII(1).

Sari Dewi, R., Wahyuni, N., Pratiwi, E., & Muharni, S. (2019). Penggunaan Obat Tradisional Oleh Masyarakat Di Kelurahan Tuah Karya Kota Pekanbaru.

*Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia* 8(1), September 2019, 8(September).

- Sari, M., Lubis, L., & Pangestiningih, Y. (2018). Uji Efektivitas Beberapa Insektisida Nabati Untuk Mengendalikan Ulat Grayak (Spodoptera Litura F.) Di Laboratorium. *Jurnal Online Agroekoteknologi*, 1(3), 2–3.
- Saudah, S., Rasnovi, S., & Zumaidar, Z. (2019). Tingkat Pengenalan Masyarakat Terhadap Jenis Tumbuhan Obat Di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireun. *Jurnal Serambi Engineering*, 4(1), 392. <https://doi.org/10.32672/jse.v4i1.849>
- Savitri, Evika Sandi. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Saxena, M., Saxena, J., Nema, R., Singh, D., & Gupta, A. (2013). Phytochemistry Of Medicinal Plants. *Journal Of Pharmacognosy And Phytochemistry Phytochemistry*, 1(6), 168–182.
- Serment, H., Sudan, J. P., & Heftmann, M. (2012). Potensi Antibakteri Ekstrak Rumput Laut Terhadap Bakteri Penyakit Kulit Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Epidermidis, Dan Micrococcus Luteus Angelina. *Journal Of Marine Research*, 22(1), 83–85.
- Silalahi, M. (2018). *Botani Dan Bioaktivitas Lempuyang* (. 2(2), 147–160.
- Singh, P., Verma, N., Kumar, P., & Nagu, P. (2018). Review On A Potential Of Antibiotics. *Journal Of Drug Delivery And Therapeutics*, 8(5-S), 35–40. <https://doi.org/10.22270/jddt.v8i5-s.1936>
- Singhal, N., Rishi, V., & Yadav, H. (2014). Cell Proliferation Assays. *John Wiley & Sons, January*. <https://doi.org/10.1002/9780470015902.A0002566>
- Somchit, M. N., Mak, J. H., Bustamam, A. A., Zuraini, A., Arifah, A. K., Adam, Y., & Zakaria, Z. A. (2012). Zerumbone Isolated From Zingiber Zerumbet Inhibits Inflammation And Pain In Rats. *Journal Of Medicinal Plants Research*, 6(2), 177–180. <https://doi.org/10.5897/JMPR10.492>
- Surah, M., & Kinan, A. (2019). Aktivitas Antibakteri Amoksisilin Terhadap Bakteri Gram Positif Dan Bakteri Gram Negatif. *Jurnal Pijar MIPA*, 14(April), 33–35. <https://doi.org/10.29303/jpm.1029>
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as- Sadi. (2007). *Tafsir As-Sa`di, Jilid 1* (Edisi 1, Cetakan 1.). Jakarta: Pustaka Sahifa.

- Tan, J. W., Israf, D. A., & Tham, C. L. (2018). *Major Bioactive Compounds In Essential Oils Extracted From The Rhizomes Of Zingiber Zerumbet ( L ) Smith: A Mini-Review On The Anti-Allergic And Immunomodulatory Properties*. 9(June), 1–8. <https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00652>
- Tian, M., Wu, X., Hong, Y., Wang, H., Deng, G., & Zhou, Y. (2020). Comparison Of Chemical Composition And Bioactivities Of Essential Oils From Fresh And Dry Rhizomes Of Zingiber Zerumbet (L.) Smith. *Biomed Research International*, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/9641284>
- Tri, Y., Reubun, A., Kumala, S., & Setyahadi, S. (2020). *Penghambatan Enzim Asetilkolinesterase Dari Ekstrak Herba Pegagan ( Centella Asiatica ( L . ) Urb ), Ekstrak Daun Kelor ( Moringa Oleifera Lam . ) Dan Kombinasinya Inhibition Of Acetylcholinesterase By Extracts Of Gotu Kola ( Centella Asiatica ( L . ) Urb ), Moringa ( Moringa Oleifera Lam . ) Leaves , And Their Combinations*. 17(02), 451–458.
- Vallianou, I., & Hadzopoulou-Cladaras, M. (2016). *Camphene , A Plant Derived Monoterpene , Exerts Its Hypolipidemic Action By Affecting SREBP-1 And MTP Expression*. 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147117>
- Wahyuni, S., Bermawie, N., & Kristina, N. (2013). *Morphological Characteristic , Yield Potential , And Major Rhizome Constituent Of Nine Accession*. 19(September), 99–107.
- Wahyuni, S., Bermawie, N., & Kristina, N. N. (2020). Karakteristik Morfologi, Potensi Produksi Dan Komponen Utama Rimpang Sembilan Nomor Lempuyang Wangi. *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 19(3), 99. <https://doi.org/10.21082/jitri.v19n3.2013.99-107>
- Wakhidah, Anisatu. (2017). *Studi Pemanfaatan Tumbuhan Sebagai Bahan OBAT Oleh Masyarakat Desa Marimabate di Kecamatan Jailolo, Halmahera Barat*. Jurnal Pro-life. Jakarta. Indonesia.
- Wandita, G. A., Musfiroh, I., Farmasi, F., & Padjadjaran, U. (2018). Review Artikel: Tanaman Suku Zingiberaceae Yang Memiliki Aktivitas Sebagai Antioksidan. *Farmaka*, 16, 564–571.
- Wu, Y., Guo, S. S., Huang, D. Y., Wang, C. F., Wei, J. Y., Li, Z. H., Sun, J. S., Bai, J. F., Tian, Z. F., Wang, P. J., & Du, S. S. (2017). Contact And Repellant Activities Of Zerumbone And Its Analogues From The Essential Oil Of Zingiber Zerumbet (L.) Smith Against *Lasioderma serricorne*. *Journal Of Oleo Science*, 66(4), 399–405. <https://doi.org/10.5650/jos.ess16166>



- Yuliani, S., Pramono, S., Pascasarjana, P., Klinik, F., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2014). Uji Aktivitas Minyak Atsiri Rimpang Kunyit ( *Curcuma Longa Linn* ) ( *Kajian Penghambat Aktivitas Asetilkolinesterase* ). 2(2), 20–26.
- Zakaria, A., & Jamil, S. (2019). Phytochemicals And Biological Activities Of Zingiber Zerumbet ( L .) Smith . *Eproceedings Chemistry*, 4, 70–76.
- Zakaria, Z. A., Yob, N. J., Jofrry, S. M., Affandi, M. M. R. M. M., Teh, L. K., & Salleh, M. Z. (2011). Zingiber Zerumbet (L.) Smith: A Review Of Its Ethnomedicinal, Chemical, And Pharmacological Uses. *Evidence-Based Complementary And Alternative Medicine*, 2011. <https://doi.org/10.1155/2011/543216>
- Zuraida, Sulistiyani, Sajuthi, D., & Suparto, I. H. (2017). Fenol , Flavonoid , Dan Aktivitas Antioksidan Pada Alstonia Scholaris R . Br Stem Bark Extract ). *Jurnal Penelitian Hasil Hutan*, 35(3), 211–219. <https://doi.org/10.20886/jphh.2017.35.3.211-219>



## Lampiran 1. Situs pencarian pustaka

Google Scholar search results for "aktivitas lempuyang gajah". The search bar shows the query and a search icon. The results list several articles, including:

- Formulasi Nanopartikel Zerumbone dari Rimpang **Lempuyang Gajah** (Zingiber zerumbet L.): Enkapsulasi dengan Kitosan dan **Aktivitas** Sitotoksiknya terhadap Sel ... [PDF] ums.ac.id
- Uji **aktivitas** anti rayap ekstrak rimpang **lempuyang gajah** (Zingiber zerumbet Smith) terhadap rayap tanah (*Coptotermes curvignathus* Holmgren) ... [PDF] untan.ac.id
- ... Obat Antikanker Payudara dari **Lempuyang Gajah** dan **Lempuyang Emprit** dengan Kontrol Kualitas Berbasis Senyawa Penanda Zerumbone dan **Aktivitas** Antikanker ... [PDF] ums.ac.id
- ... **aktivitas** anti inflamasi ekstrak etanol rimpang **lempuyang gajah** (Zingiber zerumbet L.) terhadap sel T47D yang telah resisten (IC50 <math>4.59 \mu\text{g/mL}</math>) berdasarkan ekstrak **lempuyang** ...
- Minyak atsiri **lempuyang gajah** (zingiber zerumbet linn) dan uji **aktivitas** sifat antibakterinya terhadap streptococcus pyogenes dan pseudomonas aeruginosa ...

Kata kunci: Aktivitas lempuyang gajah

Google Scholar search results for "kandungan lempuyang gajah". The search bar shows the query and a search icon. The results list one article:

- ... EKSTRAKSI DAN **KANDUNGAN** MINYAK ATSIRI TERHADAP AKTIVITAS ANTIINFLAMASI DARI EKSTRAK JAHE (Zingiber officinale Roscoe), **LEMPUYANG GAJAH** ... [PDF] politekkesbendung.ac.id

kata kunci: Kandungan lempuyang gajah

Google Scholar search results for "bioactivities of zingiber zerumbet". The search shows 2 results in 0.00 seconds. The first result is a PDF titled "Comparison of chemical composition and bioactivities of essential oils from fresh and dry rhizomes of Zingiber zerumbet (L.) Smith" by M. Taa, X. Yu, Y. Hong, H. Wang, and Q. Deng, published in *BioMed research* in 2020. The second result is a PDF titled "Study on the chemical constituents and bioactivities of zingiber zerumbet (Ngai mist to)" by NMP. L., published in 2018. The interface includes filters for time range (2012-2022), sorting options (relevance, date), and checkboxes for patents and citations.

kata kunci: *Bioactivities of zingiber zerumbet*

Google Scholar search results for "compounds of zingiber zerumbet". The search shows 5 results in 0.05 seconds. The first result is a PDF titled "Major bioactive compounds in essential oils extracted from the rhizomes of Zingiber zerumbet (L.) Smith: A multi-review on their antiallergic and..." by JW. Jiao, D. Liang, G. Li, D. Han, published in *Frontiers in pharmacology* in 2018. The second result is a PDF titled "Streptomycetes zerumbet, a Novel Species from Zingiber zerumbet (L.) Smith and Isolation of Its Bioactive Compounds" by T. Tachibana, W. Puchong, Y. S. Phulthong, published in *Advances in Chemistry* in 2019. The third result is a PDF titled "Structural Elucidation of Two Flavonoid Compounds and Screening On Antipyretic Activity from the Rhizome of Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Sm." by MM Myint, MM Khin, published in *dagonuniversity.edu.mm*. The fourth result is a PDF titled "Volatile compounds from crude rhizome extract of Zingiber Zerumbet (L.) Smith by solid phase micro extraction and gas chromatography-mass spectrometry" by AG Khasbi, ST Akbar, published in *Researchgate.net* in 2019. The interface includes filters for time range (2012-2022), sorting options (relevance, date), and checkboxes for patents and citations.

Kata kunci: *Compounds of zingiber zerumbet*

NIH National Library of Medicine  
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

aktivitas lempuyang gajah

Advanced Create alert Create RSS Search User Guide

Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS

No results were found.

Your search was processed without automatic term mapping because it retrieved zero results.

The following term was not found in PubMed: lempuyang

Page 0 of 0

Article Availability:

- Abstract
- Free full text
- Full text

Article Attribute:

- Associated data

Article Type:

- Books and Documents
- Clinical Trial
- Meta-Analysis

Kata kunci: Aktivitas lempuyang gajah

NIH National Library of Medicine  
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

kandungan lempuyang gajah

Advanced Create alert Create RSS Search User Guide

Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS

No results were found.

Your search was processed without automatic term mapping because it retrieved zero results.

The following term was not found in PubMed: lempuyang

Page 0 of 0

Article Availability:

- Abstract
- Free full text
- Full text

Article Attribute:

- Associated data

Article Type:

- Books and Documents
- Clinical Trial
- Meta-Analysis

Kata kunci: Kandungan lempuyang gajah

NIH National Library of Medicine  
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

bioactivities of zingiber zerumbet

Advanced Create alert Create RSS

Save Email Send to

Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS

24 results

Page 1 of 3

RESULTS BY YEAR

2012 2022

TEXT AVAILABILITY

Abstract  
Free full text  
Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

1 Comparison of Chemical Composition and **Bioactivities** of Essential Oils from Fresh and Dry Rhizomes of **Zingiber zerumbet** (L) Smith.  
Cite Tian M, Wu X, Hong Y, Wang H, Deng G, Zhou Y.  
Biomed Res Int. 2020 Feb 11;2020:9641284. doi: 10.1155/2020/9641284. eCollection 2020.  
Share PMID: 32104711 [Free PMC article.](#)  
The chemical constituents and the antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic activities of fresh rhizome essential oil (FR-EO) and dry rhizome essential oil (DR-EO) of **Zingiber zerumbet** (L) Smith obtained from Southwest China were compared. ...Thus, fresh **Z. zeru** ...

2 Major **Bioactive** Compounds in Essential Oils Extracted From the Rhizomes of **Zingiber zerumbet** (L) Smith: A Mini-Review on the Anti-allergic and Immunomodulatory Properties.  
Cite Tan JW, Israf DA, Tham CL.  
Front Pharmacol. 2018 Jun 20;9:652. doi: 10.3389/fphar.2018.00652. eCollection 2018.  
Share PMID: 29973880 [Free PMC article.](#) [Review.](#)  
**Zingiber zerumbet** (L) Smith is part of the Zingiberaceae family, one of the largest families of the plant

Kata kunci: *Bioactivities of zingiber zerumbet*

NIH National Library of Medicine  
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

compounds of zingiber zerumbet

Advanced Create alert Create RSS

Save Email Send to

Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS

45 results

Page 1 of 5

RESULTS BY YEAR

2012 2022

TEXT AVAILABILITY

Abstract  
Free full text  
Full text

ARTICLE ATTRIBUTE

1 Major **Bioactive** Compounds in Essential Oils Extracted From the Rhizomes of **Zingiber zerumbet** (L) Smith: A Mini-Review on the Anti-allergic and Immunomodulatory Properties.  
Cite Tan JW, Israf DA, Tham CL.  
Front Pharmacol. 2018 Jun 20;9:652. doi: 10.3389/fphar.2018.00652. eCollection 2018.  
Share PMID: 29973880 [Free PMC article.](#) [Review.](#)  
**Zingiber zerumbet** (L) Smith is part of the Zingiberaceae family, one of the largest families of the plant kingdom. ...Although many studies have reported on the biomedical applications of **Z. zerumbet**, the anti-allergic effects of **Z. zerumbet** and its ma ...

2 Diversity of Volatile **Compounds** in Ten Varieties of Zingiberaceae.  
Cite Peng W, Li P, Ling R, Wang Z, Feng X, Liu J, Yang Q, Yan J.  
Molecules. 2022 Jan 17;27(2):565. doi: 10.3390/molecules27020565.  
Share PMID: 35056880 [Free PMC article.](#)  
Maas, *Curcuma rubescens* Roxb., *Curcuma aeruginosa* Roxb., *Curcuma attenuata* Wall., Hongfengshou, *Hedychium coronarium* Koeng, **Zingiber zerumbet** (L) Smith, *Hedychium brevicaula* D. Fang, *Alpinia*

Kata kunci: *Compounds of zingiber zerumbet*



Kata kunci: Aktivitas lempuyang gajah



Kata kunci: Kandungan lempuyang gajah

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

bioactivities of zingiber zerumbet

Year: 2011-2022 X

Advanced search

78 results

sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2022 (3)
- 2021 (13)
- 2020 (4)
- 2019 (10)
- 2018 (10)
- 2017 (7)
- 2016 (7)
- 2015 (7)
- 2014 (7)
- 2013 (8)
- 2012 (9)
- Custom range

Research article

Micropropagation, metabolite profiling, antioxidant activities and chromatographic determination of bioactive molecules across in vitro conditions and subsequent field cultivation stages of 'Shampoo Ginger' (*Zingiber zerumbet* L. Roscoe ex Sm.)

Bioanalysis and Agricultural Biotechnology, 24 July 2018, ...

Jeykumar J, Chinn, Parthaj R, Kshirsagar, ... Nilesh V, Pawar

Research article

*Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. from northern India: Potential source of zerbubone rich essential oil for antiproliferative and antibacterial applications

Industrial Crops and Products, 8 January 2018, ...

Rajendra C, Pachaik, Ram S, Verma, ... Mahendra P, Dinkar

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields &amp; filters, and multiple article download &amp; export options.

Sign in &gt;

Feedback

Kata kunci: *Bioactivities of zingiber zerumbet*

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

compounds of zingiber zerumbet

Year: 2011-2022 X

Advanced search

138 results

sorted by relevance | date

Refine by:

Years

- 2022 (5)
- 2021 (19)
- 2020 (10)
- 2019 (18)
- 2018 (16)
- 2017 (16)
- 2016 (11)
- 2015 (15)
- 2014 (16)
- 2013 (14)
- 2012 (12)
- Custom range

Research article

Standardized extract of *Zingiber zerumbet* suppresses LPS-induced pro-inflammatory responses through NF- $\kappa$ B, MAPK and PI3K-Akt signaling pathways in U937 macrophages

Phytotherapy, 18 September 2018, ...

Md. Arzuful Haque, Ibrahim Jantan, ... Shahtane Ghazali

Research article

Micropropagation, metabolite profiling, antioxidant activities and chromatographic determination of bioactive molecules across in vitro conditions and subsequent field cultivation stages of 'Shampoo Ginger' (*Zingiber zerumbet* L. Roscoe ex Sm.)

Bioanalysis and Agricultural Biotechnology, 24 July 2018, ...

Jeykumar J, Chinn, Parthaj R, Kshirsagar, ... Nilesh V, Pawar

Want a richer search experience?

Sign in for article previews, additional search fields &amp; filters, and multiple article download &amp; export options.

Sign in &gt;

Feedback

Kata kunci: *Compounds of zingiber zerumbet*

## Lampiran 2. Daftar artikel yang dianalisis

Moreira da Silva et al. *BMC Complementary and Alternative Medicine*  
(2018) 18:301  
<https://doi.org/10.1186/s12906-018-2360-0>

BMC Complementary and  
Alternative Medicine

### RESEARCH ARTICLE

Open Access

## Zerumbone from *Zingiber zerumbet* (L.) smith: a potential prophylactic and therapeutic agent against the cariogenic bacterium *Streptococcus mutans*



Thiago Moreira da Silva<sup>1</sup>, Carlos Danniell Pinheiro<sup>1</sup>, Patricia Ruccinelli Orlandi<sup>2</sup>, Carlos Cleomir Pinheiro<sup>1</sup>  
and Gemilson Soares Pontes<sup>3\*</sup>

#### Abstract

**Background:** Essential oil obtained from rhizomes of the *Zingiber zerumbet* (L.) Smith (popularly known in Brazil as bitter ginger) is mainly constituted by the biomolecule zerumbone, which exhibit untapped antimicrobial potential.

Akhtar et al. *BMC Complementary and Alternative Medicine* (2019) 19:331  
<https://doi.org/10.1186/s12906-019-2748-5>

BMC Complementary and  
Alternative Medicine

### RESEARCH ARTICLE

Open Access

## Standardized ethanol extract, essential oil and zerumbone of *Zingiber zerumbet* rhizome suppress phagocytic activity of human neutrophils



Nabilah Mohammad Yaqoob Akhtar<sup>1</sup>, Ibrahim Jantan<sup>2\*</sup> , Laiba Arshad<sup>3</sup> and Md. Areeful Haque<sup>4</sup>

#### Abstract

**Background:** *Zingiber zerumbet* rhizome and its bioactive metabolites have previously been reported to exhibit innumerable pharmacological properties particularly anti-inflammatory activities. In the present study, the 80%



## RESEARCH ARTICLE

## Open Access



# Optimization of microwave-assisted extraction of zerumbone from *Zingiber zerumbet* L. rhizome and evaluation of antiproliferative activity of optimized extracts

Ali Ghasemzadeh<sup>1\*</sup>, Hawa Z. E. Jaafar<sup>1</sup>, Asmah Rahmat<sup>2</sup> and Mallappa Kumara Swamy<sup>1</sup>**Abstract**

**Background:** The extraction of bioactive compounds from herbal materials requires optimization in order to recover the highest active dose. Response surface methodology was used to optimize variables affecting the microwave

Hindawi  
BioMed Research International  
Volume 2020, Article ID 9641284, 9 pages  
<https://doi.org/10.1155/2020/9641284>

*Research Article*

## Comparison of Chemical Composition and Bioactivities of Essential Oils from Fresh and Dry Rhizomes of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith

Minyi Tian,<sup>1</sup> Xianghuan Wu,<sup>1</sup> Yi Hong,<sup>1</sup> Huijuan Wang,<sup>1</sup> Guodong Deng,<sup>1</sup> and Ying Zhou<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Key Laboratory of Plant Resource Conservation and Germplasm Innovation in Mountainous Region (Ministry of Education), Collaborative Innovation Center for Mountain Ecology & Agro-Bioengineering (CICMEAB), College of Life Sciences, Institute of Agro-bioengineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China

<sup>2</sup>College of Pharmacy, Guizhou University of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550025, China

Correspondence should be addressed to Ying Zhou; [yingzhou71@yeah.net](mailto:yingzhou71@yeah.net)



Savana Cendana 2 (2) 29-32 (2017)  
Jurnal Pertanian Konservasi Lahan Kering  
International Standard of Serial Number 2477-7927



### *In Vitro* Antibakteri Ekstrak Etanol Puni (*Zingiber zerumbet*) Asal Pulau Timor

Origenes Boy Kapitan<sup>a</sup>, Laksmi Ambarsari<sup>b</sup> dan Syamsul Falah<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Pertanian, Universitas Timor, Kefamenanu, TTU – NTT, Indonesia.

<sup>b</sup> Pusat Penelitian Biofarmaka, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

<sup>c</sup> Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.

#### Article Info

##### Article history:

Received 8 Januari 2017

Received in revised form 20 Februari 2017

Accepted 9 Maret 2017

##### Keywords:

Antibacterial activity

Extraction

Puni

Wild Ginger

*Zingiber zerumbet*

#### Abstrak

Puni (*Zingiber zerumbet*) is a widely grown plant that used by Timorese people to treat ulcerative lesions in Timor Island. This study aims to determine the antibacterial activity of plants extracts and know the content of active compounds on the most active extracts of plants. Extraction of active compounds was carried out using four solvent ie n-hexane, ethyl acetate, ethanol, and aqueous solvent. Antibacterial activity test was done using the diffusion method of the four crude extract and extract with the highest activity was then used to find MIC value. Analyzed the content of the active compounds using LC-MS. It was found that ethanol extract had the highest antibacterial activity compared to other extracts. The MIC value of ethanol extract against *S. aureus*, *B. subtilis*, *E. coli*, and *P. aeruginosa* were respectively determined to be 50, 100, 150, 250 mg mL<sup>-1</sup>. The result of LC-MS analysis showed that the ethanol extract contained zerumbone and gingerlycolipid B. ©2017 Published by Savana Cendana.

Jurnal Farmasi Galenika (*Galenika Journal of Pharmacy*) 2018;4 (2): 126 – 132

ISSN : 2442-8744 (electronic)

<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Galenika/index>

DOI : 10.22487/j24428744.2018.v4.i2.11138.

### Analisis Zerumbone dalam *Zingiber zerumbet* dan Aktivitas Penghambatannya terhadap Bakteri *Mycobacterium tuberculosis*

(*Analysis of zerumbone in Zingiber zerumbet and inhibitory activity against Mycobacterium tuberculosis*)

Subchan Lallo, Syaharuddin Kasim, Rosany Tayeb, Arsil Damiyanto Hasan, Hartina Sere, Ismail, Tamsil Arifin

Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, 90245

#### Article Info:

Received: 12 September 2018

in revised form: 23 September 2018

Accepted: 01 October 2018

Available Online: 01 October 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ABSTRACT

Zerumbone has been reported to possess several biological activities. In our interest to this compound, we have identified and analyzed its

MAKASSAR

Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2018; 7(5): 566-570



## Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry

Available online at [www.phytojournal.com](http://www.phytojournal.com)



E-ISSN: 2278-4136  
P-ISSN: 2349-8234  
JPP 2018; 7(5): 566-570  
Received: 11-07-2018  
Accepted: 12-08-2018

Gandhi Kothandaraman  
Post Graduate and Research  
Department of Botany  
Pachaiyappa's College, Chennai,  
Tamil Nadu, India

Saravanan Shanmugam  
Post Graduate and Research  
Department of Botany

### Phytochemical estimation and *in vitro* antioxidant activity of rhizome of *in vitro* regenerated *Zingiber zerumbet* (L.) Sm.

Gandhi Kothandaraman and Saravanan Shanmugam

#### Abstract

*Zingiber zerumbet* (L.) Sm. is an important medicinal plant belongs to the family Zingiberaceae and it is commonly known as Bitter ginger, Pine cone ginger, Pine cone lily. The present study aimed to estimate

## Contact and Repellant Activities of Zerumbone and Its Analogues from the Essential Oil of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith against *Lasioderma serricorne*

Yan Wu<sup>1</sup>, Shan-Shan Guo<sup>2</sup>, Dong-Ye Huang<sup>1</sup>, Cheng-Fang Wang<sup>2</sup>, Jian-Yu Wei<sup>1</sup>, Zhi-Hua Li<sup>1</sup>, Jian-Sheng Sun<sup>1</sup>, Jia-Feng Bai<sup>1</sup>, Zhao-Fu Tian<sup>1</sup>, Ping-Juan Wang<sup>1</sup> and Shu-Shan Du<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Technical Center of China Tobacco Guangxi Industrial Co., Ltd., Nanning 530001, Guangxi, CHINA

<sup>2</sup> Beijing Key Laboratory of Traditional Chinese Medicine Protection and Utilization, Beijing Normal University, NO.19 Xijiekouwai Street, Beijing 100875, CHINA

**Abstract:** The contact toxicity and repellent activities of the essential oil extracted from the rhizomes of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith (Zingiberaceae) was evaluated against cigarette beetles (*Lasioderma serricorne*). The essential oil obtained by hydrodistillation was investigated by GC-FID and GC-MS. The

**BIODIVERSITAS**  
 Volume 20, Number 11, November 2019  
 Pages: 3322-3327

ISSN: 1412-033X  
 E-ISSN: 2085-4722  
 DOI: 10.13057/biodiv/d201127

## Antibacterial activity of ethanolic extracts from *Zingiber zerumbet* rhizome against *Salmonella* spp.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMBANG DWI RAHAYU<sup>1\*</sup>, WAHYU WIDODO<sup>2</sup>, INDAH PRIHARTINI<sup>2</sup>, ARIS WINAYA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Doctoral Program of Agricultural Science, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutarni No.188, Malang City 65145, East Java, Indonesia, Tel.: +62-341-551149, \*email: dwirahayuimbang@gmail.com

<sup>2</sup> Departemen of Agriculture Science, Graduate Program, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Bendungan Sutarni No.188, Malang City 65145, East Java, Indonesia

Manuscript received: 4 October 2019, Revision accepted: 26 October 2019.

**Abstract.** Rahayu ID, Widodo W, Prihartini I, Winaya A. 2019. Antibacterial activity of ethanolic extracts from *Zingiber zerumbet* rhizome against *Salmonella* spp. *Biodiversitas* 20: 3322-3327. The study aimed at investigating the antibacterial activity of ethanolic extracts of the Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* (L.) Smith) rhizome against *Salmonella enteritidis* ATCC 31194 and *S. typhimurium* ATCC 23564. An experimental method was employed for testing the antibacterial activity, with a completely randomized

## RESEARCH ARTICLE

## Open Access



# Variation in secondary metabolite production as well as antioxidant and antibacterial activities of *Zingiber zerumbet* (L.) at different stages of growth

Ali Ghasemzadeh<sup>1\*</sup>, Hawa Z. E. Jaafar<sup>1</sup>, Sadegh Ashkani<sup>2,3</sup>, Asmah Rahmat<sup>4</sup>, Abdul Shukor Juraimi<sup>1</sup>, Adam Puteh<sup>1</sup> and Mahmud Tengku Muda Mohamed<sup>1</sup>

**Abstract**

**Background:** *Zingiber zerumbet* (L.) is a traditional Malaysian folk remedy that contains several interesting bioactive

**NPC****Natural Product Communications**2012  
Vol. 7  
No. 10  
1369 - 1370

## Chemical Composition of the Essential Oil of *Zingiber zerumbet* var. *darcyi*

Virendra S. Rana<sup>a\*</sup>, Mercedes Verdeguer<sup>b</sup> and Maria A. Blazquez<sup>b</sup>

<sup>a</sup>Natural Product Chemistry Lab, Medicinal Plants and Horticultural Resources Division, Institute of Bioresources of Sustainable Development, Imphal, Manipur, India

<sup>b</sup>Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Valencia, Valencia, Spain

ranavs2000@yahoo.com

Received: March 20<sup>th</sup>, 2012; Accepted: August 8<sup>th</sup>, 2012

The chemical composition of essential oil obtained by hydrodistillation method from the rhizomes of *Z. zerumbet* var. *darcyi* was determined by GC and GC-MS. Thirty-three compounds, accounting for 93.6% of the oil were identified including twenty compounds in minor (0.1-0.6%) and eight in trace (<0.05%) amounts. The main compounds were zerumbone (69.9%)  $\alpha$ -humulene (12.9%), humulene epoxide II (2.5%), caryophyllene oxide (1.1%) and camphene (1.9%). In this analysis, it has been found that the variety could be used as an additional new source of natural zerumbone besides *Zingiber zerumbet*. This is a first report on the analysis of *Z. zerumbet* var. *darcyi* oil.

**Keywords:** Zingiberaceae, *Z. zerumbet* var. *darcyi*, Zerumbone, Essential oil.

## Chemical Constituents of the Root Essential Oils of *Zingiber rubens* Roxb., and *Zingiber zerumbet* (L.) Smith

Do N. Dai<sup>1</sup>, Tran D. Thang<sup>2\*</sup>, Le T. M. Chau<sup>1</sup>, Isiaka A. Ogunwande<sup>3\*</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Biology, Vinh University, Vinh City, Vietnam; <sup>2</sup>Faculty of Chemistry, Vinh University, Vinh City, Vietnam; <sup>3</sup>Natural Products Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Lagos State University, Lagos, Nigeria.  
Email: \*thangtd@vinhuni.edu.vn, \*isiaka.ogunwande@lasun.edu.ng

Received October 15<sup>th</sup>, 2012; revised November 27<sup>th</sup>, 2012; accepted December 10<sup>th</sup>, 2012

### ABSTRACT

*Zingiber rubens* Roxb., and *Zingiber zerumbet* (L.) Smith were collected respectively from Nghe An, Province and Ha Tinh, Province, Vietnam. The root essential oils were obtained by water distillation and analyzed by Gas chromatography (GC) and Gas chromatography coupled with Mass spectrometry (GC-MS). The most abundant components of *Z. rubens* were (*Z*)-citral (30.1%), camphene (9.7%),  $\beta$ -phellandrene (7.5%) and 1,8-cineole (7.0%) and zingiberene (5.3%). The main oil constituents of *Z. zerumbet* were (*Z*)-citral (26.1%), camphene (16.3%), sabinene (14.6%), zingiberene (7.2%) and lavandulyl acetate (6.7%). This species has low zerumbone (1.2%) content.

**Keywords:** *Zingiber rubens*; *Zingiber zerumbet*; Root Essential Oil; (*Z*)-Citral; Camphene; Sabinene; Zerumbone

TBAP 10 (5) 2020 pp 411 - 417

411



Taylor & Francis  
Taylor & Francis Group

ISSN Print: 2231-1866  
ISSN Online: 2231-1874

### Identification of Chemical Constituents of *Zingiber zerumbet* Rhizome Extract Using GC/MS

Biswabhusan Dash, Ambika Sahoo, Asit Ray, Sudipta Jena, Sanghamitra Nayak\*

Centre for Biotechnology, School of Pharmaceutical Sciences,

Siksha O Anusandhan (Deemed to be University), Bhubaneswar, India

Received 28 April 2020; accepted in revised form 08 September 2020

**Abstract:** *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. (family-Zingiberaceae) is an important medicinal herb. Though rhizome extract of this species has been used in traditional herbal medicine across the globe for the treatment of numerous diseases like worms, cough, leprosy, asthma and other skin diseases, the composition of the extract is not characterised properly till date. Thus, acetone extract of *Zingiber zerumbet* rhizome was subjected to Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC/MS) to analyze the phytoconstituents. A total of nine compounds were obtained out of which zerumbone was found to be the major constituent covering 64.58 % of the total area. Beside zerumbone, other important compounds like diacetone alcohol (10.64 %),  $\alpha$ -humulene



AkiNik

# Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry

Available online at [www.phytojournal.com](http://www.phytojournal.com)

ISSN 2278-4136  
 ISSN 2349-8234  
 JPP 2013; 2 (3): 102-108  
 © 2013 AkiNik Publications  
 Received: 22-8-2013  
 Accepted: 25-9-2013

**Anish Nag**  
 Centre of Advanced Study, Department  
 of Botany, University of Calcutta, 33,  
 Ballygunge Circular Road, Kolkata  
 700019, India.

**Maumita Bandyopadhyay**  
 Centre of Advanced Study, Department

## Antioxidant Activities and Cytotoxicity of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith Rhizome

Anish Nag, Maumita Bandyopadhyay, Anita Mukherjee

### ABSTRACT

*Zingiber zerumbet* (L.) Smith, popularly known as shampoo ginger, is one of the most commonly used ingredients in Indo-Malaysian traditional medicines. The antioxidant and cytotoxic activities of the ethanolic extract of *Z. zerumbet* rhizome (ZZ) was investigated. 2,2-di(4-tert-octylphenyl)-1-picryl-hydrazyl (DPPH) and hydroxyl radical scavenging assays showed significant radical scavenging activities of ZZ. The extract was rich in polyphenol and flavonoids. Cytotoxicity was assessed *in vitro* by trypan blue exclusion test. Human peripheral blood lymphocyte cells were incubated in different concentrations of ZZ (0, 15, 30, 60, 120, 300 and 600 µg/ml) for 3 h at 37 °C. The rhizome extract was found to be cytotoxic at concentrations higher for human consumption. In addition, HPLC analysis revealed ZZ as a rich source of kaempferol. Based on the results of the present investigation the rhizome may be used safely as a therapeutic antioxidant.



E-ISSN 2278-4136  
 P-ISSN 2349-8234  
 JPP 2014; 3(3): 130-133  
 Received: 08-07-2014  
 Accepted: 30-08-2014

**Chingakham B Singh**  
 Institute of bioresources and  
 sustainable development, Imphal-  
 795001, Manipur, India,  
 National center for natural  
 products research, University of  
 Mississippi, University, MS  
 38677, USA.

**Saikhom B Chanu**  
 Institute of bioresources and  
 sustainable development, Imphal-  
 795001, Manipur, India.

# Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry

Available online at [www.phytojournal.com](http://www.phytojournal.com)

## Chemical composition and biological activity of the essential oil of rhizome of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Chingakham B Singh, Saikhom B Chanu, Lenin Kh, Ningombam  
 Swapana, Charles Cantrell, Samir A Ross

### Abstract

The aim was designed to study the biological activity and chemical composition of essential oil of *Zingiber zerumbet* (L.) Smith. The essential oil extracted from the rhizome of the plant was analysed by gas chromatography-mass spectroscopy and its major components amounting to 98.4 % were found to be zerumbone (75.2%), α-caryophyllene (7.1%), camphene (5.1%), eucalyptol (2.4%), and camphor (3.0%). Antioxidant activity and total phenol content assay were studied using the DPPH and Folin-Ciocalteu colorimetric methods. Antimalarial, antileishmanial, antimicrobial assays were analysed for the essential oil and its major component, zerumbone. The essential oil and zerumbone exhibited antimalarial and antileishmanial activities, whereas only *Cryptococcus neoformans* showed antimicrobial activity of the essential oil.

## Phytochemicals and Biological Activities of Zingiber Zerumbet (L.) Smith.

Anamira Zakaria and Shajarahunnur Jamil\*


Department of Chemistry, Faculty of Science, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Johor Bahru, Malaysia  
\*Corresponding Author: shaja@kimia.f.utm.my

### Article history:

Received 11 June 2019

Accepted 17 July 2019

### GRAPHICAL ABSTRACT



Zerumbone     $\alpha$ -Humulene

### ABSTRACT

Zingiber zerumbet is one of the species belongs to the genus of Zingiber in the Zingiberaceae family. The phytochemicals of the crude extracts from the rhizome of Zingiber zerumbet were isolated and its biological activities were evaluated. Tyrosinase and acetylcholinesterase inhibition activities were screened on crude extracts and isolated compounds of the rhizome of *Z. zerumbet*. Phytochemical studies on the rhizome of *Z. zerumbet* have resulted in the isolation of two sesquiterpenoids. Their structures were determined as zerumbone (1) and  $\alpha$ -humulene (2) by spectroscopic methods. All isolates were evaluated for the first time for antityrosinase and antiacetylcholinesterase activities. Antityrosinase activity of the samples was determined against mushroom tyrosinase using microplate reader. Zerumbone (1) and  $\alpha$ -humulene (2) exhibited an excellent inhibitory activity against mushroom tyrosinase comparable to the standard kojic acid with 83% and 90% inhibition, respectively. Inhibition of acetylcholinesterase (AChE), tested by Ellman's method showed zerumbone (1) was active agents with percentage inhibition of 87%.

Keywords: Zingiber zerumbet, zerumbone,  $\alpha$ -humulene, antityrosinase, antiacetylcholinesterase

© 2019 Dept. of Chemistry, UTM. All rights reserved

Full Length Research Paper

## Zerumbone isolated from *Zingiber zerumbet* inhibits inflammation and pain in rats

M. N. Somchit<sup>1,2,3\*</sup>, J. H. Mak<sup>1</sup>, A. Ahmad Bustamam<sup>2</sup>, A. Zuraini<sup>1</sup>, A. K. Arifah<sup>4</sup>, Y. Adam<sup>3</sup> and Z. A. Zakaria<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Biomedical Sciences, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia.

<sup>2</sup>Institut of Bioscience, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia.

<sup>3</sup>Sports Academy, Universiti Putra Malaysia.

<sup>4</sup>Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia.

Accepted 13 April, 2011

Zerumbone a monocyclic sesquiterpene, is the major constituent of *Zingiber zerumbet* Smith. In Southeast Asia, *Z. zerumbet* is being used for its anti-inflammatory and analgesic properties. The objective of this current investigation was to evaluate the *in vivo* anti-inflammatory and analgesic activities of zerumbone isolated from *Z. zerumbet* in rats. The results revealed zerumbone potently inhibit inflammation induced by both  $\lambda$ -carrageenan and prostaglandin  $E_2$ , which was statistically similar to the nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) piroxicam. Zerumbone also potently inhibited pain in the subdorminal writhing test similar to the NSAID. Collectively, our results validate the traditional use of this plant and zerumbone has been demonstrated to be a potent anti-inflammatory and analgesic agent.



Contents lists available at ScienceDirect

Industrial Crops &amp; Products

journal homepage: [www.elsevier.com/locate/indcrop](http://www.elsevier.com/locate/indcrop)

## *Zingiber zerumbet* (L.) Roscoe ex Sm. from northern India: Potential source of zerumbone rich essential oil for antiproliferative and antibacterial applications



Rajendra C. Padalia<sup>a,\*</sup>, Ram S. Verma<sup>a</sup>, Amit Chauhan<sup>a</sup>, Ved R. Singh<sup>b</sup>, Prakash Goswami<sup>a</sup>, Shilpi Singh<sup>b</sup>, Sajendra K. Verma<sup>b</sup>, Suaib Luqman<sup>b</sup>, Chandan S. Chanotiya<sup>b</sup>, Mahendra P. Darokar<sup>b</sup>

<sup>a</sup> CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants (CIMAP), Research Centre, Patancheru, P.O.-Dairy Farm Nagla, Utham Singh Nagar, Uttarakhnad, 263149, India

<sup>b</sup> CSIR-Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants, P.O. CIMAP, Lucknow, 226015, Uttar Pradesh, India

International Food Research Journal 23(4): 1552–1557 (2016)

Journal homepage: <http://www.ifrj.upm.edu.my>



## Analysis of intraspecific genetic variation, antioxidant and antibacterial activities of *Zingiber zerumbet*

<sup>1,4\*</sup>Thummajitsakul, S., <sup>1,2</sup>Kaewsri, W. and <sup>3</sup>Deetae, P.

<sup>1</sup>Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Saiyok, Kanchanaburi 71150, Thailand

<sup>2</sup>Mahidol University, Amnatcharoen Campus, Amnatcharoen Province, 37000, Thailand

<sup>3</sup>Food Technology Program, Mahidol University, Kanchanaburi Campus, Saiyok, Kanchanaburi 71150, Thailand

<sup>4</sup>Faculty of Health Science, Srinakharinwirot University, Ongkharak, Nakhon-Nayok 26120, Thailand

### Article history

Received: 30 June 2015

Received in revised form:  
25 December 2015

### Abstract

Genetic variation of *Zingiber zerumbet* was determined by a RAPD technique using 7 arbitrary primers, and ITS, trnL intron and trnL-F spacer sequences. The RAPD results showed



**Lampiran 3: Gambar Tanaman Lempuyang Gajah**

Gambar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Izzah Firdaus atau dapat di sapa Izzah. Ia merupakan anak ke tiga dari enam bersaudara dari bapak Firdaus dan ibu Haeriany. Lahir di sorong, 06 Juni 2000. Mengawali pendidikan dibangku SD di MI Yapis Quba Sorong sejak 2006-2011. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pondok Pesantren Pondok Madinah Makassar. Setelah tamat dari Pondok Pesantren, kemudian meneruskan sekolah di SMK Farmasi Yamasi Makassar. Pada tahun 2017 mulai memasuki perguruan tinggi di Universitas Negeri Gorontalo Jurusan Farmasi sampai tahun 2018 karena beberapa alasan saya memutuskan untuk pindah ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan jurusan yang sama pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Motto hidup saya “Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”.

